

**MICHAELIS  
ETTMULLERI, ...  
OPERA MEDICA  
THEORETICO-  
PRACTICA, ...**

---

Michael Ernst Ettmüller,  
Timbro non identificato







669 = 511

3 d. 1. 6




















MICHAELIS  
ET TMULLERI,  
PHILOS. ET MED. D.  
OPERUM  
*TOMI II. PARS I.*







I. N. 7.

MICHAELIS ET TMÜLLERI,  
PHILOSOPHIÆ ET MEDICINÆ DOCTORIS.  
HUIUSQUE IN ILLUSTRACADEMIA LIPSIENSI PRO-  
FESSORIS PUBLICI ET PRACTICI, OLIM PER OMNEM EU-  
ROPAM CELEBERRIMI,

# COLLEGIUM PRACTICUM DOCTRINALE.

## PROLOGUS GENERALIS.



Raxis dividitur vel in  
vulgarem seu ordina-  
riam, vel extraordi-  
nariam: vulgaris seu  
ordinaria, adhuc est  
in anca, & in quam-  
plurimis mutila, id-  
que duabus ex causis:

I. Est defectus sufficientium experimento-  
rum in macro- & micro-cosmo, super  
quæ solida theoria, hoc est, aliorum,  
minus sensibus obviatorum phænomen-  
on, ex illis sensibus nobilioribus ob-  
servatis, eorumque fiendi modis ap-  
plicatio & fiendi ratio fundari possit.  
Ob id tam studiose hodie excolitur  
chymia & anatomia.

II. Est defectus genuinorum & generosorum  
remediorum in praxi tam universali-  
um, quam genuinorum specificorum,  
quæ nempe in se efficacia sint, & sine  
stomachi labore pharmaceutico, spon-  
te sua vim medicamentosam exerant.  
Unde qui supra vulgatam & ordinari-  
am praxin in medicina excelluerunt

Tom. II.

practici, hoc vel ope solidioris theo-  
riæ, vel ratione generosorum reme-  
diorum, præstiterunt. In quibus ul-  
timis sublimiores chymiatræ, ac horum  
antesignani Basilius Valentinus, Para-  
cellus, Helmontius, Poterius, &c. ex-  
celluerunt.

Hinc in praxi vulgari ratione prioris,  
theoriæ nempe, defectus vix circa radicem  
morbosam, sed potius circa ejus producta,  
versari datur: ratione posterioris interdum  
anus aut empiricus melius, maxime indu-  
strio & erudito Medico, curare observatur,  
& tam sæpè affectus in se curabiles incurabi-  
lium inscribuntur catalogo.

Dixi: praxin vulgarem vix circa radicem  
morbosam, ut plurimum minus cognitam,  
vel à priori hætenus imperscrutabilem, oc-  
cupari, sed vel circa causam occasionalem, vel  
circa productum morbosum tantum, hoc vel  
corrigeno vel tollendo; unde sæpius à po-  
steriori, rarius à priori, curare solemus. Rem-  
exemplo declarabo: Spina digito infixæ ex-  
ternè, vel internè vitiosum fermentum, spi-  
nz

(A)



næ instar lædens , producit , ut ibi externè tumor , inflammatio , abscessus , in chirurgia ; hîc verò internè , modò affectus chronici frequentius ex digestionem partis cuiusdam , vel publica vel privata , læsa ; modò acuti ex fermento peregrino , aut sanguinem aut spiritum inquinante , proficiscuntur . Hinc si spina maturè removeatur , omnia evanescunt symptomata ; qui verò vel anodynis , vel discutientibus , vel maturantibus , negotium tractant , naturæ quidem motum imitantur , & eam adjuvant ; sed à posteriori saltim , quàm à priori , spinæ nempe evulsionem commodius levare potuisses . Sic in maligna febre contagium insensibile est , quod morbum infert ; hîc vel sublatô , vel appropriatô remediô destructô , cessat febris : contagium est leve , quod in lue Venerea peccat , & fermenta digestiva hebetat ; hîc sublatô , facile omnia curantur , quæ difficillimè & radiosissimè per sudores aut salivationes aliàs mitigantur : Sic fermentum aut spina est exile , quod circa unum ac tantillum effluvium , acrius nares insigniter vellicans , impetuosum sternutationis spasmodum facit ; his sublatis , vel per appropriata correctis , cessat effectus ; qui per opium à posteriori saltem palliatur . Sanè frequentissimè in praxi occurrit , ut non nisi à posteriori productis morborum ac symptomatibus occurratur , à priori verò causâ seu spina intacta relinquantur ; idque vel ob causæ genuinæ ignorantiam , vel appropriati remedii defectum , Medicis ignorantibus optimè se agere opinantibus , scientibus verò tacitè ingemiscuntibus , & suos defectus adhuc deplorantibus .

Per extraordinariam praxin intelligo eam , quæ rarò instituitur & observatur , eaque differt à vulgari seu ordinaria duobus modis :

I. Ratione remediorum .

II. Ratione modi .

Illô , dum administrantur remedia , generosa , legitimâ tamen methodô ; hîc , dum praxis per curas magneticas , transplantatorias & amuleta , instituitur . Hinc in talibus medicandi rationibus nec venæ sectionibus , nec fonticulis & vesicatoriis , nec purgantibus , tantoperè opus habemus , quia sola data vomitoria , & diuretica ac sudorifera , applicata cum appropriatis , utramque faciunt paginam .

Ut ergò reformetur praxis ordinaria , & theoria magis perficiatur per repetita experimenta & observationes anatomicas & chymicas , & hinc remediis vel appropriatis particularibus , vel generosis universalibus , adeoque plurimis scopis satisfaciendis , sedulò opera danda erit . De utraque Praxi hic agemus , extraordinariam tamen , tanquam sublimiorem , ad finem reservabimus .

Ad ordinariam pergo , in qua non levis varietas est , tam ratione methodi , quàm ra-

tione remediorum ; hanc igitur , quantum possibile , correctam jam dabo : in qua circa quemvis affectum p. n. ordine pertractandum , quinque capita observanda veniunt , quibus consideratis , totus morbus innotescit .

I. Caput historia morbi est , ubi enarratur invasio & modus , affectusque accidentia , ubi sic omnis diagnosi ejusdem & omnia signa dignoscantur & eruuntur .

II. Subjectum seu pars affecta : ubi distinguendum est inter subjectum inhaesionis & radicationis .

III. Caput erit cognitio & evolutio causarum .

IV. Prognosis .

V. Est methodus medendi seu curatio affectus .

Theoria autem & praxis medica in antecessum præsupponenda : ubique observandum est , ut super fundamenta chymica & mechanica , adeoque experimenta , theoria & praxis medica fulciatur , ac res difficilis & obscura in tyronum gratiam dilucidetur , ita ut in functionibus primatum obtineant experimenta chymica , in animalibus verò mechanica aut mechanico-mathematica . Nam corpus nostrum est machina hydraulico-pneumatica cujus movens liquor spirituosus per chymiam explicandus : liquidem natura semper & ubique geometrizat . Jam verò , si ritè & cum laude praxin aggredi , inque ea feliciter progredi quis velit , ante omnia quatuor necessariò præcognita habere debet :

I. Ut exactè cognitam ac perspectam habeat naturam subjecti medicinæ naturaliter constituti , quomodo fiant naturales corporis humani operationes & functiones , uti & p. n. statum .

II. Ut exactè sit versatus in materia medica secundum omnia tria regna .

III. Tertium est , ut cognita sit pharmacia , i. e. præparationes medicamentorum , & artificiosæ compositiones .

IV. Nec sine commodo præsupponitur cognitio methodi generalis , cui specialis eo melius superstruetur .

## C A P U T I.

De

### Facultatibus Medicamentorum.

Cum totius corporis œconomia , tam naturalis quam præternaturalis morbosa , à modernis per principia mechanica , secundum particularum minutissimarum , ex quibus omnes ejus partes , tam continentes , quàm contentæ , constant , figuram , magnitudinem , situm ,

situm, & inde natam texturam eorumque motum & quietem explicantur, hæcque hypothesis per experimenta chymica optimè illustratur, ob id etiam medicamentorum facultates, secundum quas certam vim habent alterandi corpus, & inde natos eorundem effectus, optimè ex iisdem principiis materialibus deducuntur.

Adeoque simplicium quorumcunque in tribus regnis vices & proprietates non ex suppositis elementorum manifestis quatuor qualitatibus primis, multò minus ex ignoratis hætenus occultis proprietatibus determinandæ sunt, sed ex specifica earum virtute, ex singulari nempe particularum materialium textura in unoquoque subiecto definiendæ erunt, quæ ipsa ex semine primam suam nanciscuntur originem, adeoque texturæ talis materialis intimus quasi nucleus medicamentosus crasis seminalis ob id vocari solet.

Textura talis minutissimarum particularum in concretis, earumque seminalis crasis, cum certò à priori definiri adhuc nequeat, ob id secundum particularum quarundam in concreto magis prædominantium, in specie per particularum salinarum, acidi nempe & alcali seu urinosi, proprietates circumscribi solet; quia

- I. Dictæ triæ particule pro materialium textura primatum obtinent inter alias, nempe pingues seu sulphureas, aqueas, terreas particulas, utut hæc ipse omnes probabilissimè ex aqua sola primam habeant originem.
- II. Quia ex iis effectus quam plures materiales deduci possunt.
- III. Quia aliàs in omnibus tam naturæ quàm artis operibus mirabiles planè ac simul potentes se exhibent; &
- IV. Ipsa simplicia & particularia remedia saporum variorum sensu, proximè ex salinis principiis derivandorum, ceu tot differentiis medicamentorum crases indicibus se nobis subinde exhibeant.

Cæterum sub generali isto acidi & alcali conceptu specialis horum in unaquaque specie, & ut dixi, seminalis differentia attendenda est, secundum quam specificas & sibi proprias qualitates seu dotes obtinent: hinc v.g. sal alcali in armoracia specificum est antihypochondriacum: Sal volatile oleosum in chelidonio majori specificum anti-ictericum: acidum spiritus salis est speciale diureticum: acidum spiritus nitri est specificum carminativum, &c.

Quoad speciales ac simplicium & inde paratorum remediorum vires, eaque calida dicuntur, ut piper, sinapi, aliaque: operantur, vel quatenus immediatè sensus afficiunt, nempe linguam, & ita eam partium quarundam acrimoniâ feriunt, quæ dilutæ fibras & ner-

Tom. II.

vulos ita subeunt, ac si essent ignis corpuscula, uti hoc per spiritum nitri illustrari potest: vel quatenus mediatè tales particule massam sanguineam dissolvere, fermentationem ejus ratione salis volatilis oleosi intendere, & ita ejusdem incalescentiam, & consequenter caloris in partibus sensum augere valent; qualia sunt salia volatilia oleosa, imprimis olea destillata, aut spiritus inflammabiles.

Frigida è contrà sunt, quæ vel nullam talem impressionem motivam in partes sensiles faciunt, vel eam ab aliis particulis commotis exaltatam sistunt, quâ ratione saturnus frigidus, & inflammationes arcere dicitur: vel quatenus massam sanguineam plus minus inspissando, aut fermentationem ejus intensiorem coercendo, conceptum ejus calorem ita infringunt, uti interno usu sunt acida, & imprimis nitrata.

Sicca sunt ea, quæ substantiam humidam corporis, vel toridam nutritivam, vel serosam distributivam velut imbibunt: ut calcinata omnia, v.g. cornu cervi ustum; aut eandem dispergunt, & resolvunt, ut evacuantia omnia, imprimis sudorifera.

Humida è contrà erunt, quæ vel substantiam talem suggerunt, ut probe nutrientia temperata, passulæ, amygdalæ dulces: item potulenta, cerevisia, &c. vel illorum absumptionem sistunt, ut blanda anodyna, & quascunque evacuationes inhibentia.

Invaluit hætenus falsa persuasio, quod quam plurima simplicia ceu aperitiva ad viscera, hepatis, lienis, mesenterii, &c. obstructions, utut ferè semper imaginaria, commendentur: cum tamen talia profunt, saltem, quatenus vitiosos & præternaturales in corpore succos acres, salios, in specie acidos, & inde vitiatam sanguinis crasin, indeque derivata præternaturalia vitia bilis, lymphæ, succi pancreatici, digestionum errore subnata corrigunt, emendant, & in statum naturalem reducunt, siquidem ab horum succorum amertia, indeque natis vitiosis effervescentiis in primis viis, & inde læsa sanguinis fermentatione naturali, non autem à fictis obstructionibus, morbi in specie chronici oriuntur; unde talia aperientia putata propriè alterantia appellanda erunt.

Alterantia autem ista in genere bino modo prodesse observantur:

- I. Quatenus acidum vitiosum in corpore, in specie circa primas vias, destruunt; illud vel absorbendo, ut martialia terrea, calcinata; vel istud sui miscelâ in falsum tertium transmutando, ut alcalia, tam fixa quàm volatilia, illud temperando, ut oleosa seu pingua, tam volatilia quàm fixa: quæ inter primi generis etiam invertentia, & respectu effervescentiæ ab acido inductæ præcipitantia appellari solent.

A 2

II. Qua-



II. Quatenus alcali vitiosum in corpore, imprimis bilem & massam sanguineam corrigunt & emendant; istud vel acuendo simili alcali; vel temperando acidis, item oleosis seu pinguibus: nam & hæc duo, acidum & alcali, ex quorum conjunctione compositum tertium emergit, ut in macrocosmo, ita & in microcosmo, primariam meretur considerationem.

Præter alterantia hæc generalia quæ, universaliter vel acida vel amara, &c. corrigunt, ad alterantia specialia, quæ specialem causæ morbosæ peccantis nocendi rationem alterant, specifica seu appropriata dicta, respiciendum; scilicet absinthium febribus tertianis in specie, china chinæ quartanis, myrrha mensium defectibus, &c. medentur, utut sub generali amarore generaliter sale volatili oleoso, acidi peccantis destructivo, pollere dicantur.

Præter duo hæc acria, acidum & urinosum corrigentia, medicamenta sunt nulla salium facultate excedentia, indeque sapore dulci aut planè nullo, aut blandâ oleositate vel mucilaginositate se exhibentia, &c. Hæc ipsa interne acie quodcumque, in specie salsa dum obtundunt, dicuntur temperantia: dum quasi inviscant, dicuntur incrassantia: dum fauces leniunt, & recrementis tussi ejicientis quasi vias lubricant, dicuntur expectorantia: dum extrâ imposita acie dolorosum mitigant, & ita fibrarum ex dolore spasmodum seu crispaturam remitti faciunt, anodyna: dum eodem modo moderatè ab acido coagulatos succos blandè fundunt, emollientia: dum acrimoniam temperant, & temperando utrumque acie, horum amicam unionem in salum tertium, adeoque pus promovent, maturantia seu suppurantia dicuntur.

Emollientibus contrariari videntur adstringentia dicta, quæ ratione texturæ stypticæ quodammodo austeræ, in specie ex terreo cum acido plus minus compositæ, operantur, & vel fluida quodammodo incrassando aut coagulando sistunt, vel fibras partium sui additione stringunt, & ita angustant, ut alumen, terræ metallicæ cum acidis, animalium partes calcinatæ, plantago, gallæ, acacia nostras, &c.

Ad ista alterantia pertinent etiam febrifuga dicta, quæ febribus intermittentibus in specie medentur; & operari videntur, quatenus fermentum acidum febrile obtundunt, figunt, alterant, & destruunt: quinimò pertinent etiam ad ista ea, quæ menses pellere dicuntur; vel acidum simpliciter absorbendo, ut martialia; vel substantiâ suâ volatili sanguini certam fermentativam turgescientiam conciliando, ut volatilia, operationes suas exercent.

Ad alterantia ista etiam vulneraria pertinent, quæ acidum præternaturale & vitiosum, mitius quidem in vulneribus, acius in

ulceribus, blando suo & temperato alcali delent, & ita consolidationem, remoto acido corruptivo fermento promovent; siue externe applicentur locis affectis, siue interne propinentur.

Ceterum, dum aperientia dicta ex vulgato sensu rejecerim, non removenda erunt incidentia seu attenuantia, & externo usu resolventia dicta, quæ acrimoniam suâ salinâ, nunc falsâ temperatâ, nunc acidâ, nunc alcalinâ, viscida incidunt, aculeis suis penetrant, & ita coagulata plus minus, aut indurata, mollia & fluxilia faciunt, quæ inter externo & interno usu gummata imprimis eminent.

Experientiâ etiam comperitum est, præter specificam vim & crasin, quâ mediante certis humorum & causarum morbosarum vitiis medentur remedia alterantia, eorundem quædam certis quibusdam visceribus aut partibus magis amica aut inimica existere: qua ratione aromatica omnia cerebro & nervis, amara hepati, acida stomacho, terebinthinata renibus, &c. amica: econtrâ cantharides vesicæ, cepacea oculis, vitriolacea pulmonibus, mercurialia nervis inimicissima esse solent: non quod talia proprio impetu eò ferantur, sed quod per corpus communi circulo cum sanguine aut sero & lymphâ circumreptant, vel certis in partibus & locis ratione determinatæ figurationis minimorum promptius se insinuant, & ita certas alterationes alibi insensiles dictis in locis inducant, vel certas morbosas causas, quibusdam partibus in specie hostiles, singulariter corrigunt, qua ratione cinnabaris antimonii specificum cephalicum, item antiepilepticum fœniculum appropriatum ophthalmicum dicitur.

Porrò ad alterantia modò dicta vel maximè etiam pertinent aromatica, quæ odore plus minus forti, aut penetrante, & sapore acri plus minus amaricante, crasin suam in sale volatili oleoso constitutam habent, quod in eorum oleo destillato, totius crasin integram possidente, patet, ratione cujus cum activæ sint, penetrantès, adeoque sanguinis fermentativum motum stimulent, sal volatile oleosum sanguinis, & consequenter bilis augent, calida vulgo & sicca constituuntur, ratione hujus salis volatilis oleosi temperant omnem acrimoniam, cruditates viscidas resolvunt, adeoque cruditati acidæ, & inde congestis sordibus in intestinis & stomacho, indeque enatis flatibus, optimè conducunt: ob id etiam aromatica omnia stomachica; item carminantia seu flatuum discussiva esse solent.

Nervis porrò & cerebro, & inde compositis membranosis partibus, quibus acidum quodcumque inimicissimum esse solet, optimè prosunt, quas fovent & recreant, adeoque earum affectibus specificè succurrunt: ob id nervina, ac cephalica, ac uterina esse solent



## Medicamentorum Facultates.

lent aromatica, mensibusque simul movendis dicata.

Quin & cum ipsum sal volatile oleosum aptissimum sit, quod volatilizando & fermentando abeat in spiritus volatiles, eodem modo analogos spiritibus nostris vitalibus & animalibus, exinde vis eorum confortativa, ac ut vulgo vocant, cordialis, proximè emanat, hinc spiritus & aquæ confortantes, aquæ vitæ, aquæ apoplecticæ, &c. ex talibus ordinariò componuntur.

Porro ultra alterantia sunt & generalia remedia evacuantia, quæ inter, præter purgantia, sunt diuretica, & sudorifera: Diuretica sunt varia ac multiplicia, quæ nunc ad renes delata epos abstergunt, & impedimenta urinæ excretionis remonent, ut salia volatilia quæcunque; nunc urinarium serum acuunt, ut raphanacea, & ex insectis petita remedia, ut cantharides; nunc fermentum renum specificâ alcalinâ virtute acuunt, ut nitrosa volatilia; quæ inter primariò modò dicta insecta etiam eminent.

Sudorifera verò sunt, quæ acida absorbendo sanguini fluorem, & maiorem dissolutionem conciliant, ac ita feri uberiores & faciliorem secretionem, & cum eo sordium imbibitarum excretionem promovent, adeoque alcalinæ plus minus sunt naturæ, tam volatilia, quam fixa.

Aut, quæ suo modo huc pertinent, Alexipharmaca, utut hæc sint duplicia: partim sudorifera, & ita contagia maligna ejicientia; partim alterantia, & venena in sua crasi invertentia & corrigentia.

Atque hæc ferè sunt generaliora remedium particularium in praxi vulgari capita. Quibus meritò præferenda erunt universaliora, & quæ pluribus indicationibus simul satisfaciunt, adeoque pluribus in calibus applicari possunt, remedia; qualia non esse impossibilia, præter experientiam Paracelli, Helmontii, Butleri, de quibus scripta Helmontii, item Frondek, *Tract. Elixir arboris vite*, aliorumque, vel opium suo modo probabile reddit, quibusvis ferè in morbis legitimo usu salutare, & quod quæcunque ferè urgentia symptomata mitigat: utut palliativè potius spiritum & humorum effrænos motus sopiendo, quàm eradicatorivè affectus tollat.

Talia universalia, aut ad talium naturam proximè accedentia, sunt ex regno vegetabili & animali, præter opium ritè paratum, in specie salia volatilia oleosa, quodcunque aut causæ peccantis in morbis mitigantia, & ita noxas inde inductas corrigentia; ob id à Sylvio adeò decantata: hinc sulphura mineralium & metallicorum fixata, simili ratione universaliter acidum & urinolum peccans temperantia, & vi singulari anodynâ quæcunque in morbis urgentia tollentia, quæ

inter speciatim recensetur sulphur vitrioli fixum seu oleum ignis veneris Helmontii, & cum eo paratus mercurius diaphoreticus seu aurum horizontale, Ræ solares legitimæ, item sulphura antimonialia tam sicca, quàm ex his paratæ Ræ antimonii Valentini, & similia alia plus minus universalia,

## CAPUT II.

concernens

### Practica Generalia

circa

### Facultatem Vitalem.

**I**N legitima methodo instituendi praxin, ante omnia in corpore humano pro fundamento observanda imprimis differentia fundamentalis duarum facultatum, totum corpus gubernantium & conservantium, nempe vitalis seu naturalis, & animalis, harumque fundamenta. Genitalis autem ad animale refertur: vitalis in sanguine & spiritu vitali, & inde derivatis reliquis succis, & visceribus sanguinis alterationi dicatis, consistit. In his fundata est facultas vitalis, quæ conservat corpus in esse vitali: hæc verò animalis in spiritu animali, cerebro ac cerebello, & inde nato systemate nervoso & partibus nerveis, radicata est. Ratione prioris ad duo instrumenta naturæ mechanica, acidum & urinolum, tam in sanguine quàm chylo, ac inde derivatis succis, bile, succo pancreatico, lymphæ, &c. respiciendum, ut horum dyscrasia, anomaliz, varii motus, &c. ritè cognoscantur, & maturè emendentur: ratione posterioris ad multiplices nervorum distributiones & varias partium cum his connexiones, indeque natos consensus varios, probè attendendum, & hinc natis malis dolorosis ac convulsivis maturè occurrendum.

Ut res pateat clarius, in sanguine & inde derivatis succis, &c. duplex considerandus motus; nempe vel integræ massæ sanguineæ circulatorius, vel particularum ejus minutissimarum intestinus seu fermentativus. Ab his duobus dependet proximè vita hominis, ita ut uno intercepto pereat alter.

## ARTICULUS I.

De

### Motu Sanguinis Circulatorio.

**Q**Uod attinet motum sanguinis circulatorium seu localem: attendendum omnino practico medico est, ut conservetur in æquali tenore, præcaveaturque omnis ejus stagnatio, vel quod impedimentum huic sanguinis cir-

culo affert. Præstamus id mediante pharmacia & chirurgia: mediante pharmacia per sudorifera sanguinem colliquefacientia, quasi attenuantia, & ita velociorem quidem, æqualem tamen motum per vasa conciliantia. Chirurgia sanguinis emissiones suadet, quibus imminuimus quantum, & facimus, ut in vasis nimis repletis liberior sanguinis fluxus fiat. Id autem quàm optimè fit per sectiones tam arteriarum quàm venarum, tam vasorum majorum quàm minorum, per scarificationes & cucurbitularum impositiones, ac per hirudines. Effectus sanguinis evacuationis primarius est imminuere sanguinis quantum, & ita indicatur imprimis à plethora tam vera quàm apparente, quæ sui imminutionem postulat: Secundarius sanguinis missionis effectus est sanguinis liberiores circulum promovere, quod veteribus ventilatio dicitur, sive sanguis stagnet in toto, sive in parte, inflammationem parit, ac in toto corpore stagnans, affectum suffocatorium infert.

Huc etiam revulsio, averfio, derivatio, &c. pertinent, quæ non videntur legibus circulationis obfarc, utut plures putent: modo rectè explicantur. Imminuto enim sanguine movetur reliquus omnis facilius, largius & promptius, quoniam majus occupat spatium in depletis nonnihil vasis: unde & ille, qui stagnans subsistit in vasis, sublata plethorâ non adeo vehementer ampliùs sistitur, quin potius ad motum imminutum redintegrandum nonnihil disponitur.

Nihilominus tamen queritur: an delectus venarum in sectione sit habendus? Resp. quod respectu unius membri nullus respectus habendus; si enim vena secanda in brachio, perinde est, sive basilica sive mediana secetur, quia omnes oriuntur ex uno trunco: respectu autem diverforum membrorum maximè selectus habendus; statuitur enim in œconomia microcosmi duplex regio, inferior & superior, respectu cordis tanquam centri; si ergò malum quoddam est in regione superiori, & venæ sectio instituenda, ego seco venam in inferiore regione, v. g. pede, tunc dicitur certo sensu revulsio universalis. Nam exinde hoc habemus commodi, quod dum in regione inferiori evacuamus sanguinem, hic ipse propter minus obstaculum promptius movebitur inferiora versus, quàm superiora, dum scilicet ex corde erumpit in arteriam magnam: dum enim factâ inflammatione in parte superiore ramî arteriæ magnæ adscendentis sunt infarcti, tunc in ramo arteriæ descendens ob amplius spatium sanguis è corde erumpens potius inferiora quàm superiora versus propellitur, & ita revellitur, seu ad inferiora retrahitur.

Porro: quando sanguis in quadam regione stagnando dat inflammationem, si secatur vena in regione eadem, in loco vicino, ubi

pars affecta seu morbofa est, dicitur averfio seu revulsio particularis; sicut si sanguis evacuetur in contrario, dicitur averfio universalis: sic v. g. in ophthalmia si sanguis evacuetur in pede, est universalis; dum evacuatur in brachio, est particularis revulsio seu averfio: dum nempe sanguis superiora versus facto foramine in loco vicino inferiore evacuatur, estque nihil aliud, quam sanguinis stagnantis per locum proximum evacuatio. Et hæc averfio seu revulsio particularis non habet locum, nisi jam prægressa fuerit revulsio universalis.

Tertium denique, quando secatur vena loco affecto proxima, dicitur derivatio, in qua derivatione debent incidi eæ venæ, per quas aliàs sanguis stagnans naturaliter solebat fluere: v. g. pono anginam: in ea si vena non in collo, ubi sanguis stagnat, sed in pede secatur, dicitur revulsio universalis; in brachio quocunque, tanquam in loco ejusdem regionis, si instituitur, revulsio particularis seu averfio audit; si sub lingua raninæ, tanquam loco affecto proximæ, dicitur derivatio; quoniam per has sanguis in faucibus stagnans naturaliter debet refluere, & hæc est derivatio.

## ARTICULUS II.

De

*Motu sanguinis intestino, & inde orta cacochymia.*

**P**erit variat crasis seminalis, sic variat motus fermentativus, qui in jugi tenore per legitimum usum sex rerum non naturalium conservatur, per illegitimum læditur, & consequenter vitiantur salia, indeque oriuntur cacochymia, i. e. particularum dictarum salinarum ametriæ seu degenerationes à crasi naturali, anomalix & varix inde natæ effervescentiæ, ita ut in genere cacochymia sit vel acida, in qua acidum vitiosum est; vel alcalina, in qua sal urinosum vitiosum: vel pituita & serosa, quando salia peccantia nunc in pituitoso, nunc in seroso subjecto radicanter.

## MEMBRUM I.

De

*Cacochymia acida alteranda.*

**Q**uoad generalia verò, quæ acidum corrigunt, contraria alcalia nunc volatilia sunt, nunc fixa, tam in quanto quàm in quali, sive reverà talia, quæ acidum destruunt, sive terrea, acidum absorbentia: v. g. ex regno vegetabili omnia salia urinosa vel cineritia, absinthii, tartari, cardui benedicti, centaurii minoris, &c. destruunt acidum, & coëundo in falsum mutant; item omnia aromata & aromatica, qualia absinthium, mentha, fanicu-

feniculum, &c. oleosa & pingua, quæ obtundunt, & quasi hebetant aculeos acidi, siue sint expressa, siue, quod melius, destillata, ut omnes spiritus inflammabiles, spiritus vini, nasturtii, cochleariæ, &c. olea destillata, caryophyllorum, macis, &c. quo & camphorata pertinent. Ex regno animali acidum destruentia sunt: Spiritus & omnia volatilia, quæ abundantissime ex animalium partibus eliciuntur, ut cornu cervi, cranium humani, viperarum, urinæ, salis ammoniaci, sanguinis humani, item partes animalium quævis duræ, ut: cornua, ossa, ungulæ, lapilli cancrorum, maxilla lucii piscis, dens apri, ebur, os sepia, unicornu, cornu cervi ustum & sine igne, testæ cochlearum, reliquaque conchyliæ & producta marina, quæ potenter corrigunt acidum, ita ut eorum attractu planè mutantur, & ex iis emergat sapor urinofus. Ex regno minerali destruunt acidum sulphura mineralium fixa, ut antimonium diaphoreticum, quæcunque terrea fixa & lapides, ut creta, terra sigillata, corallia, hæmatites, osteocolla, silex calcinatus, & concreta metallica, istud absorbendo & edulcorando: Mars primariò, & omnia Martialia. promptissime id absorbent & dulcificant: post Martem eminet Saturnus, saccharum Saturni, & omnia Saturnina, quæ attractu acidi saporem dulcem saccharinum acquirunt: Aurum & solaria remedia habent potentissimam vim, contumacissima absorbendi acida, præsertim acidum vinosum, quale est acidum podagricorum, & ita podagram compescunt; specialiter quoque absorbent acida tartarea in corpore. Augent verò hæc acida, quæcunque assumpta talia, vel læsa digestio prima, in specie panis, vinum, &c. quæ habent acidum gratissimum nobis, maximè stomacho, unde acidum nativum per panem ritè paratum sustentatur, & per vinum in recta dosi conservatur; sin excedatur, acidum p.n. fit, & sic concurrebat vitium digestionis primæ: acidum item augent positivè dulcia, v. g. saccharata, mellita, &c. quæ omnia, utut primâ fronte dulcia, & acidis quasi contraria videantur, in recessu tamen habent acidum egregium, spiritum nempe insigniter acidum & corrosivum, qui per destillationem ex retorta, vel per fermentationem facillè excitatur. Excipiuntur tamen ab his passulata.

Pro corrigendo autem acido in genere, sufficiunt sequentes formulæ:

- ℞. *Lapill. 69. præp.*  
*Corall. r. præp.*  
*C. C. usti præp. à ʒj.*  
 ☉  
*absinth. l. card. bened. à gr. xv. l. xvj.*  
 ʒo *Dat. cumini.*  
*caryophyll. à gutt. xij.*  
*land. opiat. ferm. gr. v. l. vj. ad viij.*

M. f. pulvis pro 4. l. 6. dosibus. S.  
 Dämpffend Pulver auff etliche maßl.

℞. *Lapill. 69. præp. ʒiʒ.*

*unicorn. fossil.*

*corall. r. præp.*

*C. C. usti præp. à ʒʒ.*

☉ *absinth. ʒj.*

*nuc. moschat. ʒij.*

M. f. pulv. S. ut antea.

℞. *Lapill. 69. præp. ʒj.*

*off. sepia ʒʒ.*

*corall. r. præp.*

*creta præp. à ʒj.*

☉ *absinth. ʒij.*

*nuc. moschat. ʒʒ.*

M. f. pulv. S.

Dämpffend Pulver.

℞. *C. C. usti præp. ʒʒ.*

*corall. r. præp.*

*crystall. præpar.*

☉ *sigillat. l. ☉ absinth. à ʒʒ.*

M. S.

Dämpffend Pulver.

Usurpetur ante evacuationem, ubi peccat materia acida.

℞. ☉ *absinth.*

*lapill. 69. præp. à ʒʒ.*

M. f. pulv. pro duabus dosibus.

Potio destruens acidum:

℞. ♡ *card. bened.*

*fenicul. à ʒiʒ.*

☉ *xi ʒiʒ.*

*lapill. 69. præpar.*

*corall. r. præp. à gr. xv.*

☉ *fumar. gr. xij.*

ʒo *destillat. caryophyll. gutt. vj.*

*Syr. mentha ʒj.*

M. S.

Dämpffend Träncklein wohl umzurütteln.

Hæc sunt ingredientia talia, quæ in genere acidum corrigunt. Præ cæteris tamen omnibus Mars in corrigendo acido, in primis viis peccante, primatum obtinet.

Ex volatilibus pro corrigendo & destruendo acido austero hypochondriaco & hysterico talis sit formula:

℞. ♡ *majoran.*

*mentha l. rosmarin. à ʒiʒ. ad ʒij.*

*vita Matth. ʒij. l. ʒvj. ad ʒij.*

*Ess. castor. ʒiʒ.*

☉ *xi l. hujus loco liq. C. C. succin. ʒʒ. ad ʒj.*

*Syr. fumar. ʒʒ. l. ʒvj.*

M. f. Potio.

De qua capiatur, sæpe cochlear. j.

Nonnunquam adduntur *corall. r. præpar. & lapill. 69. præp. à gr. xv. ad xxiv. l. ʒʒ; item ʒo destill. caryophyll. gutt. iij. l. vj.*

MEM.



## MEMBRUM II.

De

*Cacochymia Alcalina Alteranda.*

**Q**uod attinet cacochymiam alcalinam, contra hanc, si alcali acrius fuerit, quæcunque acida, alcali destruentia, & in tertium salsum coeuntia, tam vegetabilium, ut acetum, succus citri, berberum, cydoniorum, &c. quam mineralium, spiritus eorum acidi, simplices & compositi, spiritus vitrioli, salis; nitrosa imprimis, ut nitrum probè depuratum, nitrum vitriolatum seu arcænum duplicatum Mynsichthii, tartarus vitriolatus, hepaticum rubrum; item spiritus nitri cum spiritu vini dulcificatus, qui mirè convenit in cacochymia biliosa, duplici ex causa, partim quod destruat acrimoniam salinam, partim quod figat ejus mobilitatem volatilem, quo minus in effervescentias p.n. erumpere possit; item sulphurea mineralia & metallica cum nitro fixata, ut sunt: Sulphur commune, omnia antimonialia cum nitro aut spiritu nitri fixata, antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale, &c. valde sunt decantata; quòd optimè acrimoniam & oleositatem volatilem temperant, indeque inflammabilitatem facilem figunt quasi & corrigunt, simulque anodyna sunt, & mediante sudore hæc fixata & correctæ per poros evacuant. Nitrata quidem ratione vero amaroris destruunt sal alcali volatile, ratione sulphuris copiosi adjuncti in omnibus nitratis corrigitur oleositas, & nimia figitur, ne eveniat effervescentia. Opiata quoque non sunt negligenda, quæ obortas hinc nimias effervescentias, palliativè quidem, potenter tamen, domant & refrænant, simulque conjunctos sæpius feroces spiritus compescunt; vel si cacochymia urinosa oleosa, corrigitur per spiritum & salia volatilia, ut salis ammoniaci, cornu cervi, &c.

Sal volatile oleosum, & inde natam bilem, augmentabunt in corpore quæcunque salia volatilia, tam acria quam oleosa, & hinc omnia aromatica & spirituousa, ut aqua cinnamomi, spiritus cochleariæ, spiritus cornu cervi, &c. item remedia amara, v.g. ex absinthio, centauryo minori, chelidonio majori, mentha, olea destillata aromatum &c.

In specie pro corrigendo sale volatili acri seu bilioso, indeque nata phlogosi, alvi fluore bilioso, siti, &c. v.g. in febribus ardentibus,

℞. *Di Ziat* 3j.*arcæ. dupl.* 3ß. l. 3ij.*Bezoard. miner.* 3j.M. f. *pulvis.*

div. in 3. part. æqu. S.

*Rübl-Pulver auff drey mahl.*℞. *Di Ziat* l. *arcæ. dupl.* 3ß.*Bezoard. miner.* 3j.

M. pro duabus dosibus,

℞. *Di Ziat* 3ß.*arcæ. dupl.* gr. xv. l. 3j.M. f. *pulvis.*

Item:

℞. *Ebor. f.* Δe*pulv. hepat. rub.* à 3ß.M. f. *pulvis,*

div. in 2. part. æqual.

℞. *pulvis hepat. rub.* 3ij.*lapill.* 69. *præp.* 3j.

M. div. in 2. l. 3. part. S.

Digestiv-Pulver / eines früh / das ander Abends.

Usurpetur ante evacuationem, ubi peccat sal volatile oleosum.

Item pro eodem scopo:

℞. ∇ *acetos.**rubi idai* à 3ß.*succ. citri rec.* l. *cydon. rec.* 3j.*Zii diaph.* 3j. l. 3ij. ad 3j.*Bezoard. miner.* 3ß. ad 3j.*Syr. rubi Idai* l. *acetos. citri* 3vj. ad 3j.℞. *Di dulc.* q. f. ad gratiam.M. f. *Potio*, D. S.*Rübl- und Alterativ-Tranc auff etliche mahl.*

Usurpetur pro aliquot dosibus, pro dosi cochl. ij.

℞. ∇ *rubi idai* 3ij.*succ. ejusd.* 3ij.*Zii diaph.* 3j.*Syr. rubi id.* 3ß.℞. *Di dulc.* q. f. pro grato sapore.

M. D. S.

*Rübl-Tranclein auff etliche mahl.*

Utraque verò, acida nempe & alcalina vitiata, temperant, & quasi obtundendo corrigunt remedia sulphurea, pingua & oleosa, ex omnibus tribus regnis, quæ quasi catholica celebrantur, tam volatilia quam fixa. In regno vegetabilii temperata sunt imprimis emulsiones ex seminibus oleosis, v. g. amygdalis dulcibus, pineis, pistaciis, seminibus quatuor frigidis majoribus & minoribus, papaveris albi, &c. Hæc siquidem oleositate suâ temperant omne acre, acidum & urinosum, in corpore: quod etiam faciunt olea destillata vegetabilium, sed cautiùs usurpentur ob oleositatem, qua valde inviscant: mucilagines & gummi Arabicum, tragacantha, saccharum, glycyrrhiza, althea, malva, & omnia ejusmodi emollientia, olea esculenta, rapæ, item opiata; sed palliando. Ex minerali regno lac, serum lactis, item gelatinæ animalium, &c. Præ cæteris sulphura mineralium, & hinc metallica fixa, sunt adeò nobilia, cum non solum temperent omne acidum acre in corpore, & hinc cacochymiam, sed etiam simul vi anodynâ prædita sint, adeoque hæc sulphura fixa in tanto precio apud practi-



præcticos habeantur; quatenus ad universaliū remedium classē propiū accedunt: id quod sulphura antimonialia, exque his parata R<sub>x</sub>, item R<sub>x</sub> solis, &c. sufficienter confirmant. Pertinet huc quoque aqua calcis vivæ.

## MEMBRUM III.

De

*Cacochoymia Pituitosa & Serosa.*

**T**ertio quoque radicantur salia peccantia in subiecto, nunc viscido nunc seroso; unde cacochoymia pituitosa & serosa. Facile ex cacochoymia serosa oritur viscida, & nonnunquam in certis solum partibus, ubi frigus accedit, vel aliæ causæ, v. g. in arthritide vaga supervenit sæpè fixior morbus: v. g. ischias, podagra, chiragra, nephritis, &c. sine dubio ex pituitosa cacochoymia.

Cacochoymia serosa evacuationibus, & serum seu lympham alterantibus, saltem tollitur: si verò hæc salia hærent in subiecto viscido, & cacochoymiam pituitosam constituunt, corrigitur per alterantia, incidentia, attenuantia & resolventia, imprimis per salia alcalia fixa, volatilia & falsa, quæ aculeis suis penetrant, & ita coagulata plus minus indurata, mollia & fluxilia faciunt: quo pertinent omnia salia digestiva dicta, imprimis tartarus, ut cremor tartari, seu crystalli tartari, R. tartari, spiritus tartari, salis ammoniaci, sal volatile tartari, spiritus carminativus, terra foliata tartari ejusque liquor, tartarus vitriolatus, item arcanum duplicatum Myrsichthii, sal ammoniacum, sal digestivum hypochondriacum, &c. quibus subinde aut lapilli cancerorum, aut corallia præparata, aut simile quid, ad infringendum magis acidum admiscenda: imprimis gummata, sagapenum, mastix, myrrha, in specie ammoniacum & galbanum, spiritus æris viridis, gummi ammoniacicum ærugine, acetum destillatum, spiritus salis dulcis, oxymel, &c. nec non vegetabilia aromatica aciora seu salina volatilia oleosa, vulgò aperientia, & febrifuga dicta, ut absinthium, carduus benedictus, centaureum minus, taraxacon, mentha, armoracia, rosamarinus, fœniculum, angelica, galanga, & omnia intensè amara; sicut de colocynthide notum est, quod itidem in muco viscido probè conducat.

Sit ergo digestivum, præmittendum purgationi pro incidenda materia viscida pituitosa, ut subsequatur evacuatio minus dolorosa & torminosa:

R.  $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{H}}$   $\overline{\text{Y}}$   $\overline{\text{P}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{C}}$   $\overline{\text{H}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{N}}$   $\overline{\text{D}}$   $\overline{\text{R}}$ . à gr. xv.

absinth.

card. bened. à  $\overline{\text{S}}$ .

M. f. pulvis.

div. in 2. part. æqual. S.

Digestiv. Pulver auff zweymahl.

Tom. II.

R.  $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . 3j. $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{C}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{R}}$   $\overline{\text{D}}$ . bened. 3 $\overline{\text{S}}$ .flor.  $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{X}}$   $\overline{\text{C}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{V}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$ . gr. xv.

M. f. pulvis.

div. in 3. partes.

R.  $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . 3 $\overline{\text{S}}$ .

lapill. 69. præp. 3j.

 $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{S}}$ .

M. f. pulvis.

div. in 2. part. æqu. S.

Digestiv. Pulver auff zweymahl.

R.  $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . 3 $\overline{\text{S}}$ . $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{B}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{N}}$   $\overline{\text{T}}$   $\overline{\text{H}}$ .

lapill. 69. præp. 3 gr. xiv.

M. f. pulvis.

div. in duas vel tres partes æqu. S.

Digestiv. Pulver auff etliche mahl.

R. crem.  $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$  3j. $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . 3 $\overline{\text{S}}$ . $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{B}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{N}}$   $\overline{\text{T}}$   $\overline{\text{H}}$ .cichor. a 3 $\overline{\text{S}}$ .

M. f. pulvis.

div. in tres partes æquales.

Capiantur una vel altera die ante evacuationem.

R.  $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{X}}$   $\overline{\text{C}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{D}}$   $\overline{\text{E}}$   $\overline{\text{P}}$   $\overline{\text{U}}$   $\overline{\text{R}}$ . 3j.Mastich. 3 $\overline{\text{S}}$ .

cinnam. 3j.

 $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{B}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{N}}$   $\overline{\text{T}}$   $\overline{\text{H}}$ . gr. vj.

D. S.

Magen. Pulver auff viermahl zu gebrauchen.

Usurpetur bis in die, mane ante prandium, &amp; à meridie aliquot horis ante cœnam.

In forma liquida.

R.  $\nabla$  *Mentha* 3j.

arcan. dupl. 3j.

lapill. 69. præp. 3 $\overline{\text{S}}$ . $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{S}}$  gr. v.Syr. de Hyssop. 3 $\overline{\text{S}}$ .

M. S.

Digestiv. Tranc auff zweymahl.

R. liqu.  $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . 3 $\overline{\text{S}}$ .

D. S.

Digestiv. Essenz.

de quo capiantur mane &amp; à meridie 30. vel 40. gutt.

R.  $\nabla$  *menth.* 3j.

cinnam. 3j.

g.  $\overline{\text{X}}$   $\overline{\text{C}}$   $\overline{\text{I}}$   $\overline{\text{V}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$ . 3j. $\overline{\text{Q}}$   $\overline{\text{S}}$   $\overline{\text{O}}$   $\overline{\text{L}}$   $\overline{\text{A}}$   $\overline{\text{T}}$ . 3j.

Syr. rosar. 3j.

Misc. pro duabus vel tribus dosibus.

Assumpto digestivo, propinetur purgans sequenti die, &amp; sic felicius operabitur, &amp; sine molestia.

## MEMBRUM IV.

De

Succorum Cacochoymicorum Evacuans Universalibus.

(B)

Ea,

**E**A, quæ cacochymia vitiatos succos evacuant, sunt varia, vel universalia vel particularia: universalia, si non totum evacuant corpus, operatio tamen ejus ad totam corporis machinam se extendit: hæc in quintuplici sunt differentia: vel enim sunt emetica seu vomitoria; vel catartica seu purgantia in specie sic dicta, per inferiora; vel diuretica seu urinam cientia; vel diaphoretica seu sudorifera; vel salivantia seu quæ ptyalismum concitant, horum verò particularia sunt apoplegmatismi, errhina, sternutatoria, item quæ interdum ex utero, ano, & vesicâ excernuntur.

## TITULUS I.

De

### Vomitoriis.

**N**unc igitur agam de evacuantibus universalibus, & primo quidem de vomitoriis, quorum sanè ingens est copia. Si tamen selectus vomitoriorum est institutus ex regno animali, nullum, quod sciam, prostat vomitorium, exceptâ rasurâ unguium humanorum. Hæc enim per noctem vino generoso infusa, manequè filtrata ac hausta, egregium est vomitorium; quod etiam nobilissimi Cnösselii, Medici Regis Poloniz, euporiston castrense fuit. Ex regno vegetabili asarum, nicotiana, helleborus albus, oleum olivarum, succus raphani rusticani, juli sambuci & ebuli cum aceto, & oleo olivarum præparati, oleum ex arillis baccarum sambuci, & succus vermicularis.

Inter hæc excellit asarum, quod veteribus jam dudum innotuit: ejus folia & radix saporem habent insigniter acrem ac mordicantem, qui in sua differentia exactissime æmulatur saporem zingiberis vel zedoariz. Ab hoc sale essentiali acri dependet primò vis vomitoria; cum enim particulæ hæc acres, membranas ac fibras ventriculi, imprimis copiosiores circa pylorum, vellunt, fibræ istæ constringuntur, sicque vomitus excitatur. Modus igitur curandi ac utendi asaro est triplex:

1. Pulveris.
2. In forma Infusi.
3. Decocti.

**I.** Quoad pulverem, observandum: quo exactius asarum in alcohol redigitur, seu minutius pulverisatur, eo melius vomitum, urinam & sudores ciet; particulæ enim ejus eo melius se insinuare possunt ventriculi plicis: è contra grosso modo pulverisatum non tam benè operatur, sed alvum magis laxat. Datur adulto à ʒss. ad ʒj; rustico verò robusto ad ʒss. propinatur in vino calido generoso in febribus, & quidem haustu paulò largiori.

℞. rad. asari ʒij ad ʒj.

piper. long. ʒss.

M. in febre quartana.

## II. Quoad infusa:

℞. fol. asari No. IX.

quæ scindantur in segmenta minuta, infundanturque per noctem in

▽ card. bened. ʒiv.

Hydromel. simpl. ʒss.

Manè colatura detur, quæ mitius purgat.

Pro infuso fortiori:

℞. folia asari virid. etiam No. IX.

Teruntur in mortario marmoreo, addendo hydromel simplex tamdiu, donec folia in succum redigantur: hoc deinde diluitur cum

▽ card. bened. ʒij.

**III.** Quoad decoctum, si decoquatur radix asari in aqua, amittit vim vomitoriam, & tantum fit diureticum: si autem in vino decoquatur, manet vis emetica, fitque vinum emeticum. Primus observavit hoc Helmontius; confirmavit verò Zvvelfferus & Boyle in principiis suis philosophicis. Ratio in suspensio est; dicam quod sentiam: Superius dixi, vim asari alterativam in sale essentiali fixo non adeò volatili consistere. Dum igitur in aqua decoquitur, partes salinæ volatiles avolant, decoctum amaricat, & fit tantum diureticum; si autem in vino decoquatur, penetrat vinum texturam concreti, antequam scilicet particulæ avolent salinæ. Decoquitur etiam radix asari cum hydromelite, quod tamen non est emeticum, sed egregium potius pectorale, mucum pectoris optimè incidens.

Igitur solum tantum inter vomitoria vegetabilia excellit asarum, reliqua sunt vitanda; nam subinde excruciant ægros miserè.

Hinc rejicio in specie tabacum, potentissimum vomitorium, & quidem ob summam, quam habet, violentiam. Sanè olei tabaci guttula una vel altera summè est venenosa; videmus enim, quantas in corpore nostro excitet turbas, unde metuendum, ne gravissima ac periculosissima exinde oriantur symptomata. Usurpatur autem nicotiana pro vomitorio triplici potissimum modo:

1. In fumo; si enim parum fumi deglutitur, mox fit vomitus, in non assuetis scilicet.

2. In infuso, si infundatur vino, ac filtratum mane bibatur; Vel

℞. Tabaci opt. Virgin. qu. pl.

Infundatur c. v. q. s. per noctem:

Manè propinetur de colatura cochlear unum, & sanè mirè præstat vomitum.

3. In masticatione: si scilicet pisi magnitudine tabacum masticatum cum saliva in ventriculum descenderit, subito excitatur vomitus.

Potest autem corrigi ejus venenum, per uni-

universalem vegetabilium venenorum correctionem, nimirum per salem tartari, & per nitrum fixatum; hoc enim additum exhibet essentiam parum vel nihil emeticam, sed è contra quibusdam laudatur in empyemate, asthmate humido; in specie verò syrupus nicotianæ.

Rejicio helleborum album; ut enim apud veteres fuerit usitatissimus helleborismus, tamen quoad helleborum album in desuetudinem abiit. Dici nequit, quam stupenda symptomata inferat idem.

Veteres longè robustioris constitutionis fuerunt, vel isti in Græcia helleboro albo gavisi fuerunt mitiori, & climatis ratione minus truculento: Accedit, quod ipsi non absque vino generoso dulci helleborum album adhibuerint, hinc nullum dubium, quin dulcedo vini temperare acrimoniam hellebori, potuerit. In mania tamen in usum venit, dum

℞. Rad. helleb. albi ʒj.

Infund. vino, coquatur, aut maceretur per noctem in loco calido: vinum hoc prius coctum abjiciatur; est enim nimis acre, radici residuæ aliud vinum Rhenanum superfundatur, & hoc cum radicibus tantum in infusione stet per noctem: mane colatura detur à ʒjß. ad summum ad ʒij.

Porro rejicio triviale illud vomitorium, scilicet oleum olivarum, & cuius ʒv. cum aqua tepida miscent: sed nocivum est, mirè enim inde laxatur tonus fibrarum & membrarum ventriculi, unde post propter atoniam debilis redditur idem.

Rejicio etiam vomitorium Plateri ex succo raphani rusticani, ab ʒij ad ʒiij cum hydromelite propinatum. Est vomitorium subinde potens, sed in ventriculo robustiori sæpè paulò diutius hic succus moratur, agitque in mucum ventriculi, ac eundem resolvit, unde gravis inflatio oritur.

Inter vomitoria vegetabilia etiam numeravi julos sambuci & ebuli: hi cum aceto & oleo olivarum in forma acetarii parantur, de quibus aliquot buccellæ sumptæ strenuè operantur; dosis tamen est incerta; nunc plus, nunc minus sumitur, hinc etiam incerto modo operantur, ac denique conqueruntur ægri de debilitate ventriculi; atoniam enim ventriculi relinquunt. Equidem oleum ex arillis baccarum sambuci expressum, paucarum guttarum dosi exhibitum, potens est vomitorium, unde & à Blochv vitio contra icterum laudatur: sed cum aserum nostrum præstet, hoc sufficere poterit.

Denique sedum minus seu vermicularis succum præbet, qui cum vino expressus potenter vomitum ciet. Novi quod in febribus tertianis certum hujus habent effectum, si scilicet hujus recentis cum vino tritæ ac subactæ vermicularis succus expressus ante

Tom. II.

paroxysmum hauriatur. Quidam etiam decem septimanis febre tertiana conflictatus, succo hoc liberatus fuit.

Pergo ad regnum minerale, quod suggerit vomitoria antimonialia & vitriolata: omnium optima, potentissima & tutissima sunt antimonialia; vitriolata & mercurialia vomitoria stomacho membranoso maxime sunt hostilia, summèque prosterunt ejus robur, in specie sal vitrioli vomitivum, quia ventriculo valdè adhæret, quicquid de hoc Angelus Sala dicat; adeoque pauca antimonialia ritè usurpata sunt instar omnium. Et quidem pro aliquot vomitoriis millenariis sufficit unicum vitrum antimonii, tam in forma liquida quàm sicca; & in casu rigorosiori ad turbith minerale Crollii vel Mynsichtii confugiendum. Jam de vitro antimonii dicendum, & quare illud elegerim, tradendum.

Notum est, sulphur externum non purgare, sed tantum regulum ʒ: igitur in particulis fixioribus antimonii vis emetica consistit. In quibusvis enim antimonialibus purgantibus ex acido sulphuris, cum substantia Saturnina coalescente, fit concretum vitriolicum, à quo oritur molestia ventriculi, & consequenter vomitus, dabo exemplum: gustetur parum Mercurii vitæ, & sapor vitriolicus nauseabundus se exferet; in hoc enim vis emetica Mercurii vitæ consistit, pari modo in vitro antimonii est textura vitriolica: hæ particule quasi vitriolicæ ventriculum vellicant, ut exinde vomitus sequatur: usurpatur tantum in infuso cum vino Rhenano, & syrupo; nunquam verò quoquo modo etiam correctum, in substantia; cruda enim talia assumpta loco infusorum, sæpè nociva sunt, aut ad minimum fallacia. Recipiuntur in specie vitri hujus antimonii, vel croci metallorum, vel Mercurii vitæ, qui genuina est antimonii proles, gr. V. aut plura, infunduntur in vinum Rhenanum, filtratum bibitur, ut sequatur vomitus; quia vinum Rhenanum est acidulum, & optimè imprægnatur antimonialibus particulis: & tum determinetur quantitas vini hauriendi, non vitri; quia liquor recipit, quantum recipere valet. Optimè præparare docet Kerkringius in *Comment. super currum triumphal. antimonii Basilii Valentini* pag. 144. & 169.

Præscribatur igitur ex tempore:

℞. vitri ʒij vel croc. metall. simplic. aut absinthiac. l. ʒij vitæ gr. ʒv. vj. aut viij.

Infundantur in

Vini Rhenan. generosiss. l. absinth. q. s. stent in loco tepido per noctem: manè filtratur exactè per chartam emporeticam: filtraturæ ℞ ʒj. l. ʒiß. ad summum D. S.

Brechwein.

Hauriatur, & sic tutò ac jucundè operabitur: addi etiam possunt aquæ cinnamomi ʒij.

(B 2)

Non



Non ineptum est, etiam quorundam inventum, quando ex vitro antimonii parvos calices vomitorios fundunt: his vini ℥j. infundunt, relinquunt in satis tepido loco per noctem, manè filtratum hauriatur, & sic egregium habebitur vomitorium. Talis calix ad plures sanè annos servari potest, nec quicquam ipsi sensibilibiter deccedit.

Pertinet huc etiam Martini Rulandi calix ex ligno ordinario tornatus, quem internè pice obduxit, huicque adhuc liquidæ frustula vitri antimonii grosso modo contusi inspersit, & eodem modo operatus est.

Secundus modus est, ut loco horum vinorum usurpetur in consistentia syruporum. Syrupum seu oxylaccharum emeticum optimum parare docet Ludovici in sua Pharmacia pag. 212. nempe

℞. *Croci metallor.* ℥ij. ℥ij.

Infundatur per triduum in loco calido in

℥i Vini ℥x.

ſæpiùs agita liquorem, dehinc filtra, & adde

*sacchari albi* ℥x.

vitro clauso in aqua calida detinendo, spontè saccharum solvitur, & si lubet, tingitur cum

*Essent. flor. papav. errat.* ℥j.

Hic modus est certus & tutissimus. Dosis

℥ss. ad ℥vj.

Ad hujus ferè, aut oxysacchari emetici Angeli Salz imitationem:

℞. *Vitri ℥ii* ℥ij. l. v.

Infund. aceto vini puro, stentque per aliquot dies in digestionem, subinde agitandum: post filtratur, ipsique ana sacchari albi addatur, sicque habetur syrupus elegans à ℥ij. ad ℥ss; in robustioribus ad ℥vj. propinandus.

Vel potest etiam fieri syrupus emeticus citratus hoc modo:

℞. *Vitri ℥ii pulver.* q. s. v. g. ℥ss. l. ℥j. infundatur in

*Succ. citri rec. per aliqualem resident.* dep. ℥ss. ad ℥bj.

Stent in digestionem blandi caloris subinde agitando: filtrato liquori addatur

*Sacchari ana;*

vel c. s. q. *sacchari*, coquatur ad syrupi consistentiam.

Habebitur sic syrupus elegans, cujus dosis ℥ss. esto.

Præscribitur sequenti modo:

℞. *∇ menth.* ℥vj. l. ℥j.

*cinnam. c. V.* ℥ij.

*syr. emet.* ℥ss. (ubi varietur dosis pro varietate preparationis.)

*Syr. Nicotiana* ℥ij.

M. S.

*Brech-Mixtur auff einmahl.*

Alium syrupum vomitorium habet Lotichius in *Consil.* pag. 52.

Tertius modus in infuso sit sapa vomito-

ria, quâ olim Sylvius frequenter in Belgio usus fuit, utut tamen ejus descriptio proster in Appendice Tilemanni *de Materia Med.* quæ ita sit:

℞. *Vitri ℥ii pulveris.* ℥j.

Infundatur in *musti rec.* vel *succi cydonæ rec.*

℥bj. plus minus:

stent in digestionem loco calido per aliquot dies & noctes, hinc filtratur exactè, vel per linteum, vel per filtrum chartaceum: liquor filtratus leni igne evaporetur ad consistentiam mellis seu rob liquidioris vel spissioris, ita tamen, ut rob liquefactum ad gutt. v. l. vj. seu, ubi spissius est, ad pisi unius vel duorum dari possit dosin, in quocunque vehiculo. Sufficientes movet vomitus, & est remedium euporiston.

Ad hujus imitationem prostat hîc Lipsiæ in officina Linckiana syrupus rubi idæi emeticus, qui sine saccharo paratus à ℥j. ℥ij. ad ℥j. leniter vomitus ciet.

Vomitoria hæc tutissima ac perpetui sunt usus. Post hæc in forma sicca eminet tartarus emeticus Mynsichtii, qui tutissimum est vomitorium antimoniale: vid. Mynsicht. in *Armament. Medic. Chymico* pag. 13. correctus à Ludovici in *Pharmacia*.

Dixi suprâ: vitrum antimonii non in forma sicca debere adhiberi, quia constet, vim hujus emetico-catharticam, quam in minutissimis suis moleculis diffundit in liquorem infusum, esse inexhaustam. Metuendum igitur, ne, si aliquid de vitro antimonii in substantia recipiatur, hoc in rugis ac plicis ventriculi hærendo, ita hypercatharsin continuam, & cholerae periculum, excitet.

Dicis: cur igitur tartaro emetico, qui est pulvis antimonialis, utimur? Resp. Tartarus emeticus est infusum antimoniale in forma sicca. Hoc quidem videtur paradoxon, sed tamen verum. Tartarus est filius seu privignus quasi vini: scilicet est acidum vini cum alcali terreo saturatum: sive ergo per infusionem, sive solutionem, idem acidum vini in forma sicca imprægnetur, quod post filtrationem coagulando ac crystallizando de substantia crassa antimoniali nil retinet: ergo idem est, ac si acidum vini infundendo in forma fluida rodatur vitrum antimonii, quàm si solutio tartari in forma sicca: optimus igitur tartarus emeticus ex vitro antimonii fit, si

℞. *Vitri ℥ii* ℥ij.

Teratur cum ana cremoris tartari, ebulliant cum effusione aquæ communis q. s. dum fervent omnia, tepidè filtrentur, & in frigido crystallisentur, & ita in forma sicca, humida & media, habemus tartarum emeticum. Dosis sunt gr. ij. l. iij. in robustioribus gr. iv. Præscribitur cum tantillo sacchari, ut sine nausea assumatur, ita:

℞. *℥i emet.* gr. iij.

*sacch. albiss.* gr. vj. l. ℥ss.

M. f.

M. f. pulvis. S.  
Brex-Pulver.

Addi possunt olei destillati menthæ gutt. ij. Item: quando per inferiora volumus simul stimulare, additur scammonium sulphuratum: ad gr. ij.

Assumatur in cochleari uno vel altero jusculi gallinacei, vel carnis.

In forma Boli:

℞. Rob junip. ʒß.  
℞i emet. gr. ij.  
scamm. Lat. gr. j.  
C. syr. cort. aur. f. Bolus.

Sic sulphur antimonii rite paratum præscribitur sequenti modo:

℞ Crem. ʒi ʒß.  
℞is ʒii aurati gr. vj.  
scamm. præp. gr. ij.  
M. f. pulvis, D. S.

Brex-Pulver auff einmahl.

Dixi quidem, hæc sufficere remedia: atamen si duro nodo applicandus sit durus cuneus, ad Mercurium accedendum est. Ex hoc sufficit turbith minerale, vel Crollii vel Mynsichtii. Illius modum præparandi vid. in *Basilica Chym. pag. 122. 123. 124.* Hujus verò in *Armamentario Medico-Chym. pag. 18.*

Ulus Turbith mineralis Crollii est ad gr. jv. vel v. pro scopo vomitorio. Non datur autem in formâ pulveris, ne attactu suo gingivas rodât, faucesque lædat, sed potius in forma boli vel pilularum: v. g.

℞. Turbith miner. Croll. gr. v.  
Theriac. opt. q. f.

Aut etiam turbith hoc minerale redigatur cum succo liquiritiæ Hispan. in formam pilularum. Quod turbith minerale Mynsichtii attinet, hujus dosis est à gr. v. ad vj, ac eodem modo ac præcedens propinatur.

Ulus hujus turbith est, ut morbos fixos, & ab aliis remediis planè inalterabiles, quantum possibile, tollat ac corrigat, partim viscidum, fomitem morbosum, potentissimè incidendo, partim acidum quodvis vitiosum fixissimum absorbendo, partim ex vitriolica sua textura ventriculum ad purgationes stimulo: Lues Venerea, gonorrhæa maligna inveterata, item scabies ferina, lepra, gutta rosacea, quæ ab acido oriuntur specifico, sine hoc turpetho minerali vix corrigi possunt: hinc inveteratas quartanas subinde turpethi usus ante paroxysmos eradicat, hinc, modò consent vires ægri, tutò hoc turbith adhiberi potest: sic usum cosmeticum obtinet; nam acida ista, quæ vel Saturnus, vel oleum tartari corrigere nequeunt, hoc turbith optimè corrigit.

Operatur ratione suæ substantiæ, qua absorbet quodvis acidum; ratione sulphuris externi

operatur colliquescendo humores viscidos; ratione sulphuris & vitriolicæ suæ texturæ nauseam, sicque vomitum efficit.

Rejicio ⊖ vitrioli vomitorium; nam si quis unquam illud gustarit, nauseosissimum est remedium, quod tantos horrores excitat in ventriculo, ut non tantùm ad nauseam & vomitus stimuletur, sed & per aliquot dies languores nauseosos patiatur ventriculus: imò sub operatione hujus salis vitrioli tantoperè tonus ventriculi laxatur, ut vix dici queat. Vis ejus vomitoria non est à spiritu sulphuris, nec à minera Martis; nil enim in his emetici est, & utimur quotidie iisdem absque vomitu; sed est potius à Venere, cujus tantillum vel mirum quantum integram massam sanguineam afficere potest. Nam si in lb j. salis vitriolici saltem ʒß sit mineræ corrosivæ Veneris, erit mirè vomitorium; mirè enim dilatativa est vis Venerea, ventriculoque inimicissima.

Nocent autem Vomitoria:

1. Herniosis,
2. gibbosis,
3. pulmonum ulceribus laborantibus,
4. hæmoptoicis,
5. ophthalmicis,
6. gravidis, &
7. mulieribus, quæ patiuntur prolapsum sinus pudoris & procidentiam uteri.

Vid. Mynsicht. in *Armament. Chymico p. 15.* ubi de Tartaro emetico.

Si vomitus difficilis, sumitur haustus cerevisiæ calidæ, vel jusculum pingue; sic is promptius succedit: si vomitus sequatur nimius, sumitur haustus vini Rhenani tepidi; sic omnis vomitus statim sistitur, & in præcordiis cruciatus facile evanescunt, licet à fortioribus antimonialibus stomachus irritatus fuisset: & licet vice prima rejiciatur, reiteratum tamen cum buccella panis, vomitus certè sistit; item opiata aromaticis sociata, hinc theriaca in vino assumpta, aut etiam cum spiritu vini crocato ventriculo calidè applicata.

## TITULUS II.

De

### Purgantibus per Alvum.

SEquuntur nunc purgantia: si enim per artem varia recrementosa per alvum rejiciuntur, vocatur in specie purgatio.

Locus purgationis sunt intestina, in quibus cum non præexistant ea, quæ ejiciuntur, ventilanda erit, antequam ulterius progrediat, quaestio: Per quam loca in purgatione artificiali transferantur excrementa in intestina? Resp. Loca ista, per quæ feruntur cò ex massa

(B 3)

fan-



sanguinea, esse tantum duos ductus istos, cholodochum & pancreaticum, quibus natura tunc temporis quasi abutitur; unde & quæ excernuntur, frequentissime flavodine tincta conspiciuntur: hi enim ductus sunt naturaliter distincti, ut quicquid ex M.S. in his fuit separatum, ad intestina amendant; quia nulli alii apparent ductus: simul tamen probabilis admodum Pechlini videtur sententia, *tractatu eleganti de purgant. cap. 36.* simul etiam per glandulas post intimam intestinorum membranam sitas mediantibus tubulis & parvis ductibus, ex dictis glandulis in intestina hiantibus, simulcrementa varia ex sanguine secreta in intestina deponi. Jam vero licet multi cum Plemio & aliis Autoribus statuunt, quod per vasa etiam mesaraica in purgatione artificiali separentur excrementa; respondeo tamen, quod sit contra legem naturæ universalem, quæ talis est, & per experientiam confirmatur, quod nempe nunquam fiat secretio cujusdam materię secernendæ ex massa sanguinea sine certo ac determinato cribro, per quod tanquam per filtrum separetur excernendum ab utili massa sanguinea: sin verò immediate, & contra tale instrumentum separativum, ut sic dicam, aliquid separetur e massa sanguinea, tunc hoc fit promiscuè nunc cum ipso sanguine, uti hoc patet in fluxu hæmorrhoidali, & in hæmorrhagiis quibuscunque criticis, nec non in vomitu sanguineo splenetico- rum; interdum periodico & salutari &c.

Equidem optandum esset, darentur vera purgantia, hoc est, quæ sordes saltem excrementitias ex corpore eliminarent, citra utilium nutritivorumque succorum depravationem simultaneam: Verum vulgò dicta purgantia non sunt talia, sed sub blandiente nomine virulentiam nocivam gerunt absconditam, hinc sanos & ægros æqualiter vexant, & tot sordes evacuant, quas impossibile esset citra vitæ periculum in corpore existere. Hinc etiam tam insignis oritur virium debilitatio post purgantium usum, morbis sub antiqua contumacia persistentibus, dum interim varia & gravia inferunt symptomata, in specie convulsiones, propterea etiam tam studiosè corrigi jubentur.

Operantur purgantia duplici ratione: vel irritando, & acrimoniâ suâ amarissimâ pertinaciter vellicando intestina; unde non tantum horum spasmi & violentæ contracturæ intestinorum, indeque propulsiones excrementorum sequuntur, sed simul etiam hiantia in ea orificia vasorum, cholodochi & pancreatici, item glandularum, simul irritata & vellicata eructant uberius sua contenta. Vel operantur, sanguinem & inde natos succos fundendo quodammodo, & simul colliquefactione in corruptelam resolvendo, unde sor-

des tam variz ante remedium non præexistentes post purgans assumptum in corpore generantur. Sub hoc tamen motu, quicquid heterogeneum est in sanguine, & à vitalitate proscriptum, facilius alteratur, & consequenter ejicitur, quàm quod magis vitale ac utile erit.

Omnia scilicet purgantia habent acrimoniâ volatilem insignem, utut non semper æquè faucibus perceptibilem, quæ in vegetabilibus fundata est in sale volatili oleoso acri, ratione adjuncti olei insigniter amaricante, indeque visciditatem insignem adjunctam habent: in mineralibus verò vis laxativa in textura sulphurea vitriolica, aut sulphure volatili acri quasi arsenicali, radicata est. Hinc etiam omnia acida destruunt purgantia vegetabilia varia, quatenus destruunt eorum sal volatile acre; item salia fixa, v.g. sal tartari corrigit purgantia, quatenus corrigit eorum oleum, & inde natam visciditatem, colliquefaciendo texturam resinofam purgantis, tollit; sicuti etiam fermentatio purgantium eadem mitigat, ferociamque non nihil domat: In mineralibus verò ea, quæ figunt sulphur volatile; quæ inter eminet nitrum, tollit eorum, v.g. antimonii, malignitatem purgantem, eamque saluberrimè diaphoreticam reddit.

Promiscuè ergò agunt purgantia in succos corporis nostri, tam nutritivos quàm excrementitios; unde sponte sua ruit divisio purgantium in cholagoga, phlegmagoga, hydragoga & melanagoga; quin unum alterumve purgans loco omnium sufficiat: utut pro circumstantiarum ratione nunc debilius nunc fortius eligendum sit. Nihilominus tamen pro morborum varietate solet interdum aliqualis selectus horum purgantium institui, quatenus sub generali virulentia laxativa in quibusdam vis specifica causæ morbosæ alterativa est recondita hujus vel illius morbi, qua ratione helleborus niger præter virulentiam laxativam etiam specialem habet vim contra affectus melancholicos; rhabarbarum ad affectus renales: ubi per alvum evacuandæ sordes tenaciores, in specie acidæ, præ reliquis confert colocynthis ritè præparata; in specie tamen Mercurius dulcis, si aliis permiscetur, uti evacuat, ita specialiter corrigit.

Laboramus abundantia purgantium, ex regno autem animali nil suppetit, cum in hoc nullum derur. Ex vegetabilibus ergò ex omni purgantium caterva 4 vel 5 mitiora & tutiora pro scopo medico sufficiunt, v.g. jalappa, senna, helleborus niger, aloë, rhabarbarum, &c. quibus, pro stimulis nunc de scammonio, nunc, ubi fortius agendum, de extracto trochiscorum alhandal, addi potest. Ex mineralibus sufficit Mercurius dulcis: omnibus præ-

præfertur antimonium per inferiora saltem purgans ritè paratum.

Modus usurpandi est varius, prout unum vel alterum remedium huic vel illi formæ aptum est; usitatissimè præscribuntur purgantia in forma pilularum, inter quas ex extracto catholico, variis additis, in specie Mercurio dulci, ubi mitius laxandum, MP. de ammoniaco debito stimulo, sufficiunt. Verùm in compositionibus veterum officinalibus, qualis de hiera, &c. purgantia sunt crudà in substantia addita minus correctà, ideò illa hodiè non frequenter præscribuntur. Moderni sumunt Extracta purgantium horum, sive sint simplicia, sive composita, quæ optimè fiunt per spiritum vini tartarificatum, vel beneficio Ræ tartari vulgaris, ut ratione salis tartari corrigatur aliquo modo vis laxativa excedens venenosa. Pro pilulis usualibus aloeticæ ad imitationem Ludovici concinnatæ, vel Tilemanni, præstant. Inter pulveres pulvis jalappæ compositus sufficit. Infusa inter fennatum cum rhabbaro aut helleboro est optimum. In forma electuarii purgantia in parva dosi commodissimè usurpantur, si per fermentationem parantur: sic paratur colocynthis in minuta frustula concisa, elaterium, scammonium, in specie esula, tichymallus, & tractatur sic, ut aliàs opium.

Quod attinet Jalappam: hujus vis solutiva, juxta Helmontium ex Hyppocrate, deprædatur aliquid de vita & facultatibus nostris. Hoc autem de aloë & rhabbaro vix dici potest.

Ufus radicis jalappæ medicus est vel generalis, vel specialis:

1. Generalis est, quod ab ejus radicis assumptione alvus solet provocari, & excrementa serosa plus minus flava egredi, citra tamen ventriculi subversionem & intestinorum intorsionem.
2. Usum specialem quod concernit: humidioribus subjectis tantum convenit; hinc etiam ad cachexiam pituitosam, hydropem, fluorem album, affectus catarrhales, &c. laudatur: in specie hydropicis, imprimis à Borello *Hist. & Obs. Medico-Phys. Cent. 2. Obs. 23. pag. 128.* tanquam appropriatum remedium commendatum. Vis operandi consistit in ejus particulis resinosis, id est, oleosis, ab acido fortiter concentratis, adeoque in particulis acido-salsis oleosis.

Malè igitur facit Medicorum vulgus, qui in nodulis infundit radicem jalappæ vino, cerevisiæ, aut aquæ communi: si enim hanc 100 amphoris aquæ infunderent, nihil tamen resinosa substantiæ, sed tantum mucilaginem quandam extraherent.

Modus operandi est duplex:

1. Particulis suis viscidis ventriculo & intestinis adhærendo provocat eorum spasmos, & sic contentorum excretionem.
2. Operatur etiam, quatenus subacta in primis viis, humores attenuat, dissolvit, acrimoniâ suâ liquefacit, sicque in serosum liquamen vertit.

Utendi modus est duplex: usurpatur enim vel in forma solida, vel fluida. In forma solida, si recipiatur pulveris ℞. operabitur quinquies, sexies: Vel, ut melius operetur, jungitur cum tartaro, vel tartaro viriolato; quoniam detergendo viscidum loco stimuli additur: v. g.

℞. pulv. jalapp. ℞. gr. xv. l. xvj.  
crem. q̄i l. q̄i viriol. l. arcan. duplic.  
gr. xij. ad xv.  
scammon. præp. gr. j. l. ij.  
℞i Sat. anisi l. macis, l. cinnam.  
gutt. ij.

M. D. S. Purgier-Pulver.

Vocatur vegetabile purgans polychrestum, ad plures usus sufficiens.

Vel alia ratione ita præscribitur:

℞. pulv. jalapp. ℞. ad gr. xv.  
Qi puriss. ℞. (l. Qi gr. jv. ad vj.  
& Q̄ gr. jv.)  
scamm. præp. gr. j. l. ij.  
℞i Sat. anisi l. macis gutt. j. l. ij.  
M. f. pulvis.

Purier-Pulver auffeinmahl.

Sine torminibus purgat. Vel

℞. crem. q̄i ℞.  
resin. jalapp. ℞.  
Q̄ gr. vij.  
℞i Sat. anisi gutt. ij.  
M. f. pulvis.

In forma Bolis:

℞. conf. flor. tun. ℞.  
crem. q̄i gr. xv.  
pulv. jalapp. ℞.  
℞i Sat. macis gutt. ij.  
C. syr. ros. sol. f. Bolus S.

Purgier-Zucker.

℞. pulp. passul. ℞.  
pulv. jalapp. ℞.  
scamm. præp. gr. j.  
syr. fumar. f. Electuar. S.

Purgier-Lattwerge.

In pilulis:

℞. Extr. cathol. gr. xij.  
mag. jalapp. gr. jv.  
Extr. troch. alhand. gr. ij.  
M. f. pilula. S.

Purgier-Pillen.

Quoad formam fluidam: usurpatur in essentia, qualis sit, si ℞. spiritus vini, aut alius appropriatus, & affundatur radici jalappæ cum cortice citri; Vid. Bartholinus in *Epist. c. g.*

℞. V

R. V l. *alius ~ rectif.* lb. j.  
*rad. jalapp.* ℥iv.  
*cort. citri* ℥vj.  
*croci* (qui coloris gratia additur)  
 gr. v.

Stent hæc in infusione in loco tepido, filtretur liquor, ac usui asservetur, diciturque *Essentia citrata*, cujus dosis ab ℥ss ad ℥vj.

In forma *Mistura*:

R. ∇ *byssopi* ℥j.  
*cinnam.* ℥iij.  
*pulv. rad. jalapp.* gr. xv.  
*Extr. troch. alhand.* gr. ij.  
*syr. cichor. cum Rhab.* ℥ss.  
 M. f. Potio: S.

**Purgier-Träncklein.**

Item, si ipsa resina in forma syrupi desideretur: v. g.

R. *res. jalapp.* ℥ss. ad gr. xij.  
 Θ℥ gr. vj. ad vij.  
 c. l. q. *syr. ros. simpl. l. resolutiv.* aut  
*similis suavioris*, fiat *syrupus gratus*.

In forma emulsionis si desideretur:

R. *sem. melon. exc.* ℥ss.  
*resin. jalapp.* gr. ix. ad xjv.

subigatur: deinde affundatur

∇ *sepidæ rosæ l. menthæ l. aliis appropri.* ℥j.  
 & redigatur in liquorem lacteum; add.

∇ *cinnamom.* ℥ij.

& edulcoretur cum syrupo rosato solutivo, aut alio quodam grato, aut rotul. manus Christi,  
 M. D. S.

**Purier-Milch auf einmahl.**

Addi etiam possunt scammonii ℥ati gr. ij. aut extr. troch. alhand. gr. j. cum gr. viij. Θ℥. Denique D. Hartvvigius cum vitello ovi seq. modo propinavit:

*Resinæ jalapp. sumit.* gr. vij. viij. l. ℥ss in robustioribus gr. xij. & xv. subigit cum vitelli ovi dimidia parte, vel cum integro vitello: hinc affundit ∇ *scenicul.* vel *menthæ* ℥ss, ut fiat emulsiformis potio: addit deinde ∇ *cinnam.* j. l. ℥ij. & sacchari aut syr. *cinnam.* parum pro edulcoratione;  
 D. S.

**Purgier-Milch.**

Suaviter & copiosè operatur.

Post jalappam pergo ad sennam, quæ unum ex optimis & mitissimis est purgantibus. Hæc primatibus medicinæ, veteribus Græcis, tuit incognita, nihilque de hac apud Hippocratem. Cum verò ars medica à Græcis ad Arabes, Saracenos & Mauros fuerit devoluta, Arabes in locupletanda ea fuerunt occupati, nobisque fruticem hanc notificarunt. Dicitur autem frutex Alexandrina, quod prope Alexandriam in Ægypto optimæ notæ invenitur.

Hujus sennæ Alexandrinæ tantum in usu sunt folia, & quidem ordinariò sine stipitibus; hi enim sunt fibræ corticis, hinc longè

fortiores quam ipsa folia, torminaque excitant, quare etiam rejiciuntur. Sunt qui putant, ideo non recipi stipites, quod adstringant, quod tamen est falsum; nam ideo potius rejiciuntur, ne nimis torminosum sint remedium.

Horum autem foliorum sennæ exsiccatorum usus est vel generalis, vel specialis; generalis est, dum ab eorum usu alvus aliquoties laxatur, plerumque tamen cum torminibus circa umbilicum. Quæ rejiciuntur, sub habitu seroso, viscoso, flavedine tincto, conspiciuntur: Interim tamen unum ex mitioribus est purgantibus. Specialis est, dum pro purgatione per *ἐνίκασι* in usu est, ideoque potius in morbis chronicis, quam acutis usurpatur.

In morbis igitur chronicis usurpatur, imprimis, dum producta morboſa eliminat, & viscosa evacuat: hinc v. g. in quartanis, febribus aliis chronicis, affectibus hypochondriacis, hystericis, in scorbuto, ictero nigro, & in specie melancholia hypochondriaca senna est inter usitatissima laxativa; unde à veteribus relata inter melanagoga, quæ succum melancholicum, i. e. acidum vitiosum, per *ἐνίκασι* purgant, non est adeò acris seu caustica, quàm alia purgantia, unde siccioribus tantum ac calidioribus conducit.

Vis ejus operandi residet in substantia mucilaginosa, unde tantum per menstrua aquosa extrahitur cum vel sine ebullitione mucilago, cujus nucleus est quasi resina subtilis ac acris, hæc autem mucilago est nunc volatilior, nunc spissior ac tenacior: Volatilior blandè operatur, sine insigni alteratione: Posterior autem crudelia tormina excitare solet. Cavendum igitur, ne sub infusione in loco calido mucilago ista spissior unà extrahatur, sicque ægrum maximis torminibus vexet; hinc ordinariè, ut eò meliùs operetur, corrigentia vel stimulantia, nimirum tartarus & zinziber, addi etiam solent. Zingiber additur; quoniam ejus acrimonià corrigitur vis stimulatix laxativa sennæ; tartarus verò vel cremor, vel sal tartari additur, ut horum medio mucilago ejus eò meliùs detergatur & attenuetur, ne tanta tormina excitet: nunquam igitur senna absque tartaro vel zingibere præscribenda.

Modus utendi duplex est: vel in substantia seu forma pulveris, vel in infuso adhibetur. In forma pulveris datur ordinariè à ℥ss. ad ℥j: in infuso dantur ordinariè ℥ij. ad ℥ss. Quoad pulverem: proſtat in officinis pulvis sennæ Montagnanæ compositus ex tartaro & senna; qui feliciter usurpatur, quoniam autem est nauseosus, rarò hodiè adhibetur. Qui ergò in forma pulveris sennam præscribere volunt, ita ut per *ἐνίκασι* tantum operetur, v. g. in morbis chronicis, ubi alvus siccior & phlogosis adest, item in scorbuticis, hypochondriacis, &c. sequentem in modum præscribat:

R. *Crem.*



℞. Crem. ꝯi.  
fol. senn. f. st. à ʒii.  
Zingib.  
semen anisi.  
Cinnam.  
Galang. ʒss.  
M. f. pulvis.

De hoc pulvere capiat æger pro liberanda alvo, vel in prandio cochleari uno iusculi, vel quantum cultelli cuspis capere potest, & suaviter laxabit.

Quoad infusum: malè infunditur senna à ʒii. ad ʒiʒ: senna certè multum largitur, & requiritur plus menstrui. Jam ergo senna cum tartaro aut infunditur, aut simpliciter ipsi coquitur: Quæ infunditur simpliciter, ipsi pro solutione additur Θꝯ; si verò coquitur, additur cremor tartari; folia enim sennæ non nisi ebulliendo solvuntur cum cremore tartari. Interim rarior sit sennæ usus in forma decocti cum tartaro, quo mucilaginosâ substantia tenerior evaporat, & spissior tantum remanet; sed potius in infuso utimur. Karò tamen infunditur sola absque helleboro nigro, qui plerumque additur, & blandè operatur: v.g. pro dosi una præscribatur talis potio laxativa:

℞. fol. sen. f. st.  
rad. polypod. à ʒiiij.  
crem. ꝯi ʒj.

Coqu. in f. q. ∇ simpl. vase clauso:

℞. Colatur. ʒiiij.  
adde  
∇ cinnam. ʒiiij.  
syr. borrag. ʒiʒ.  
M. S.

**Paxier-Trank auff einmahl.**

Per solam verò infusionem cum sale tartari:

℞. fol. senn. f. st. ʒij. iij. l. ʒiʒ.  
Zingib. l. sem. anisi ʒj.  
Θꝯ gr. xv. ad ʒj.

Infundantur in f. q. ∇ simpl. l. fumar. l. cichor. stent in loco tepido per noctem: manè colaturæ recipiatur qu. pl. Si mitiùs operari debet, recipiantur infusi senn. ʒij: si vehementius, recipiantur ʒjv.

Colaturæ addantur  
∇ a cinnam. ʒij. l. ʒiiij. ad ʒiʒ.  
syr. de succo cherm. l. rosat. solut. ʒij. l. ʒiʒ.  
M. D. S.

**Purgier-Tranklein auff einmahl.**

Sunt potiones gratæ palato, & elegantissimæ: leviter operantur, non hypercathartici inferunt. Color ruber est à sale tartari.

Vel, quod melius est, cum helleboro nigro aut rhabarbaro sequenti modo:

℞. fol. senn. f. st. ʒiʒ. l. ʒij.  
rad. helleb. nigr. ʒiʒ. ad ʒj. (vel Rhabarb. ʒj. ad ʒij.)  
sem. anisi ʒj. ad ʒj. l. Zingib. ʒj. ad ʒiʒ.  
Θꝯ gr. xv. ʒj. ad ʒiʒ.  
Tom. II.

Infund. in f. q. ∇ simpl. l. beton. l. fumar. l. byssop. l. cichor. stent in loco tepido per noctem: Colaturæ ℞. ʒij. iij. l. ʒjv. adde  
∇ cinnam. ʒiiij. l. ʒiʒ.  
syr. de pom. l. rosat. solut. ʒiʒ.  
M. D. S.

**Paxier-Tranklein.**

Possunt etiam de colatura recipi ʒvj. pro duabus dosibus.

Quod si pro pluribus dosibus infundatur v.g. in melancholia hypochondriaca;

℞. passul. min. ʒiʒ.

contus. in mortar. marmor. affundendo.

∇ fervidæ tibiʒ.

vel ebulliant passulæ conquassatæ in ∇ comuni:

℞. Decocti huius fervidi tibiʒ.

infunde

fol. senn. f. st. ʒiiij.

crem. ꝯi ʒj.

flor. violar. p. iij.

Stent in loco tepido vitro bene clauso, donec frigescant, frige factus liquor detur pro lubitu ad ʒiiij. vel ʒjv.

Quod si in morbis chronicis, febribus v.g. in quartana ad hecticas declinante, & febribus intermittentibus chronicis confirmatis, in quibus evacuatio ante paroxysmum fieri debet, infusum sennæ expectatur, sequens esto:

℞. fol. senn. f. st. ʒiiij.  
rad. helleb. nigri ʒiʒ.  
Zingib. ʒiʒ.  
Θꝯ ʒij.

Potest etiam addi radix acori.

Incisa ac contusa includantur nodulo, Infundanturque aqua, vel cerevisia fervida tibiʒ.

Et in loco tepido successivè frigescant.

De hoc infuso æger quartanarius hecticus recipiat duab. vel quatuor horis ante paroxysmum ʒij. l. iij. & exinde blande evacuabitur.

Ubi infantes immorigeri purgandi sunt:

℞. fol. senn. f. st. ʒj ad ij.

Hæc sola includantur nodulo, injicianturque cerevisiæ, quam potant, sic sufficienter evacuabuntur, præsertim si parum salis tartari addatur.

Pergo ad helleborum nigrum, ita dictum à suis radiculis nigris; flore enim est candidissimo, aut interdum etiam roseo.

Ufus ejus vel generalis, vel specialis. In genere hellebori internum usum sequitur perturbatio ventris ac tormina, hinc secessus serosi, aquosi & mucilaginosi, &c. A veteribus inter melanagoga refertur. In specie Paracelsus maximi fecit hanc plantam, quam ubique in scriptis suis laudat, eamque mutato nomine Dauram vocavit, dicitque: helleborum quatuor morbos cardinales curare, nimirum apoplexiam, epilepsiam, arthritidem, & nephritidem. Certum equidem est, quod in morbis chronicis, præsertim qui ner-

(C) vo-



vosum genus afficiunt, epilepsia, item in mania, elleborus niger singulare quid obtineat.

Quoad operandi modum, duæ facultates in eo distinguendæ: Facultas laxativa, & alterativa. Illa consistit in mucilagine acriore, quæ primis viis adhærens easdem stimulat: hæc consistit in particulis volatilibus & facile evaporabilibus quasi scorbuticis, hinc vim corrigendi habet. Specificum istud acidum, quod melancholicos, scabiosos, quartanarios, &c. vexat. Certè sunt, qui ex radice hac parant essentiam, quæ non laxat, sed alterat. Vis igitur alterativa præprimis usus ejus primarius est. Vix ejus consistit tam in mucilagine quàm in resina; unde tam per menstrua aquæ, quàm oleosa, v.g. per spiritum vini, quo resina acris elicitur, extrahi potest. Ista autem præcipitatio magis placet, quando per menstrua aquosa extrahitur. Imò frequentissimum est, ut uterque modus conjungatur pro essentia tam laxativa, quam alterativa obtinenda.

℞. Rad. rec. minutim incis. qu. pl.

Infund. in f. q. aquæ communis: ebulliat leniter vase clauso, stent in digestionem, quousque tingatur, omnia hæc mixta evaporent ad consistentiam rob. Capiti mortuo affundatur spiritus vini, sic elicitur essentia resinosa; post abstrahitur spiritus vini, & utraque extracta, tam extractum mucilaginosum, quàm & aliud resinofum scilicet, misceantur, cui, si aliquid sal tartari pro correctione aliquali adderetur, vix erit improbandum.

In substantia rarò aut nunquam adhibetur; nimis enim acrimoniâ suâ volatili turbat corpus, adeò, ut referat & Angelus Sala, quod radiculæ hellebori fonticulis impositæ mirè corpus turbarint. Recipiatur ergò potius in infuso, aut extracto. De cætero in usu etiam est radix ellebori non præparata. In officinis quidem usitatum est, ut radix aceto infundatur: verum sic mirè castratur. Infunditur autem elleborus rarò solus sed ferè cum fenna, ita ut modò fenna, modò ellebory in dosi prædominetur; semper tamen & sal tartari pro correctore resinositatis additur, ut sic suavius operetur. Seligatur aqua in infuso pro illis, qui medio modo se habent; serum lactis autem in scorbuticis siccioribus, in hypochondriacis, & qui *καύματα* viscerum habent: porro in scabiosis & sanguine scorbutico imbutis. Eligitur autem vinum pro utroque sanis. Sit igitur v. g. in scorbutico sequens formula:

℞. rad. Elleb. nigri ʒij.

fol. fenn. sst. ʒj.

Infund. in f. q. feri lactis depurati per noctem: mane

℞. Colat. ʒijj.

adde

~ cochlear. ʒj.

▽ cinnam. ʒij.

M. f. Haustus purgans pro una dosi.

De cætero in nodulis frequentissimus est

ellebori usus; hic enim modus optimè convenit pro pluribus dosibus.

Quoad extractum: vel recipi potest extractum compositum superius dictum, vel quod alii compendiosius faciunt:

℞. Radiculas hellebori nigri incisas, infundunt vino rhenano, digerunt tamdiu, donec vinum sapore & colore ellebori imprægnetur, post inspissant ad consistentiam rob.

Qui melius habere cupiunt, addunt subinfusione sal tartari, sicque habent extractum ellebori nigri correctissimum.

Quodvis igitur horum extractorum habueris, solum illud, quod cum spiritu vini extrahitur, est suspectum, facitque tormina. Præterea optimè & in forma pilularum extractum ellebori adhibetur, v.g. in epilepsia habituali omnium optimè sumitur cum Mercurio dulci:

℞. Extr. helleb. nigri ritè par. ʒss. ad gr. xv.

ʒii dulc. ʒss. l. gr. xv. ad ʒj.

Extr. troch. alhand. gr. j. ad iij.

(vel) scam. (pat. gr. j. l. ij, & extract. troch. alhand. gr. j. l. jss. l. ij.

c. f. q. ess. mentha, l. salvia l. ligni sassafr. aut sancti f. pilula.

D. S.

Blut-reinigende Pillen.

Vel pro purgando scorbutico aut cachectico etiam peculiari:

℞. MP. Pear. Querc.

Extr. helleb. nigr. a gr. xij. ad gr. xv.

scamm. præp. gr. j. ad iij.

c. f. q. solut. ʒ c. f. p. f. pil. pro una dosi.

Cnosselius in usu habuit pilulas balsamicas dictas, tantum non polychrestas, quarum basis est elleborus niger, suntque egregiæ in morbis chronicis pro scopo blandè evacuandi. Pilulæ ipsæ sunt seqq.

℞. MP. de tribus Ruffi.

Extr. helleb. nigr. a ʒss.

M. f. pilula.

Jussit capere ante cenam. Conferatur etiam de his M. A. N. C. German. in Append. si voluit formulam habere magis compositam, addidit & miscuit

ʒi Sat. gr. v.

resin. jalapp. gr. j.

Hæc compositio revera est tutissima, quæ etiam feliciter semper usus fuit in morbis chronicis; blandè enim operantur.

Aloë autem, pilulas de tribus Ruffi ingrediens, ita præparata sit, ut pars ejus gummosa magis quasi extravertatur, resinosa verò infringatur vel separetur. Ad imitationem harum pilularum seqq. præscribere soleo:

℞. MP. de tribus Ruffi.

Extr. helleb. nigr. a ʒss.

ʒli ʒtis ad albed. calc. gr. v.

scamm. præpar. gr. j.

c. f. q.

c. l. q. eff. g. xci f. pilula:  
quales hypochondriacis nostratibus proficua existunt.

Sunt qui destillando etiam liquorem ex helleboro nigro elicere satagunt; sed effectus nondum voto respondit.

Ipsa folia ellebori in formam essentiae redacta, citra vim solutivam tantum sunt alterativa, & in specie in melancholia hypochondriaca proficua.

Post elleborum nigrum sequitur aloe, quae tanquam succus expressus est concretum non simplex, sed ex parte ex substantia gummosa, ex parte ex resinosa constat. Haec binae substantiae (resinosa & gummosa) binis quoque facultatibus praeditae sunt: substantia mucilaginis seu gummosa laxat, inspissata nimium & more usitato ante prandium vel mane adhibita: contra resinosa adstringit, detergit viscidum, amaritiei suae balsamicam quavis humorum alterationes corrigit, bilem acuit, in specie in atonia ventriculi colluvieque ejus serosa egregium est remedium. Praeterea in specie adherendo haemorrhoidibus, easdem ad sui fluxum provocat. Pro scopo evacuandi minus convenit aloe, siue integra sumatur, siue substantia ejus gummosa tantum ad 3j. propinetur. Potissimum ergo usus ejus est in pilulis. In morbis chronicis successivè ægris pilulae haec convenient, et quidem sumitur integra, scilicet in substantia in subjectis humidioribus; pars ejus gummosa in subjectis calidioribus aut aridioribus: v. g. si cuicdam hypochondriaco succulento aut lautè viventi pilulae aloeticæ, quovis mense aut singulis 14 diebus usurpandæ, essent praescribendæ,

℞. Aloes lucid. 3ij.

g. xci in + liq. 3j.

℞. Lat. 3j.

c. l. q. eff. g. xci f. pilulae minores.

De quibus capiat æger vespere duas horas ante cenam, numero impares, v. g. 10. 15. &c. quæ altero mane blandè evacuabunt.

Si verò hæc pilulae usuales praescribendæ ad iterum prono, loco aloës lucidæ recipio aloen liquidam, cum aqua communi, aut aqua cichorii, aut succo hujus extractam: Sicut & loco Glassianarum aut Francofortensium pilularum sequentes pilulae usuales parari possunt:

℞. Aloen liquidam cum aqua cichorii l. f. ancili in leni digestionem extractam.

Alia

℞. succum cichorii, rosarum, violarum, &c. cujus ope elicitur mucilago, quæ filtrata ac inspissata in Extractum nigrum abit.

Ex hoc solo fiant pilulae parvæ ex uno grano ij. l. iij. Conf. Ludovici Pharmac. pag. 134.

Hic est optimus & simplicissimus aloës Tom. II.

usus. Quod si quis usuales, magis compositas, desideret, is modò dicto extracto gummoso aloës addat extractum gummi ammoniaci: v. g.

℞. Extr. gummi aloës 3ß.

xcij.

℞. li. ad albed. calc. 3j.

troch. alhand. gr. xij.

c. l. q. Eff. g. f. pilula.

Dosis harum sint xv. l. xx.

Hæc pilulae erunt egregium praeservativum, in morbis chronicis sub decremento lunæ ante novilunium assumendæ.

Post aloen, quæ cum rhabarbaro sola habetur innoxia, ad rhabarbarum pergo, plantam polychrestam & ægris egregiè proficua. Constat duplici substantia.

1. Volatili acriuscula, quæ in subjecto aquoso mucilaginoso fundata est, quæque levissimo igne avolat, ut nihil de ea remaneat; in qua tamen vis laxativa residet.
2. Fixiori adstringente amaricante absorbente, anodyna.

Hæc sunt potiores posterioris substantiae fixioris facultates: hinc uti ratione prioris substantiae blandè laxat, ita posterioris respectu adstringit, & ad omnes fluxus, omnesque laxos & dissolutos morbos, confert; hepatis adeo consecrata à veteribus, ut anima hepatis fuerit dicta: hinc ictero, hydropi, &c. conducit. Paracelsus multum ei in nephritide tribuit, quod verum etiam est: nam praeterea, quod urinam suo colore tingat, observatum quoque fuit, rhabarbari usum conducere, quatenus renum spiritum insitum confortando, vel fermentum vitiosum corrigendo juvat.

Utendi modum quod attinet, veteres dosi 3j. in substantia exhibuerunt, quæ dosi nimis magna est; in infuso potius cum aliis, aut in pulvere, adhibetur. Quoad infusum, in usu est v. g. in febris tertianis sequens:

℞. summ. cent. min. M. j.

Rhabarb. el. 3ij. l. 3ij.

fol. fenn. f. st. 3j.

℞. 3ß.

Infund. in l. q. Vini absinth. per noctem: mane colaturæ ℞. 3ij.

D. S.

Purgierender Bermuth Wein.

Praeterea etiam usurpatur in infuso pro pluribus dosibus, nimirum cum passulis pro scopo temperandi & dyscrasia sanguinis, in ictero, cachexia &c. corrigenda, v. g.

℞. passul. min. conquass. 3j. ad 3ß.

Rhabarb. el. 3ß. ad 3vj.

Cinnam. 3ij.

Infundantur in

Aqua comm. lb. jß.

Stent vase clauso per 24 horas in balneo Mariae; mane colentur.

(C 2)

Est

Est potio grata, agrisque admodum proficua. Rarum est, quod præcisè pro scopo purgandi assumatur, sed potius pro atonia viscerum corrigenda adhibetur. In hunc finem in hæmorrhagiis nimis, pro scopo præservativo & correctivo in fluxibus alvi & in iis, qui ad hydropem inclinant, adhibetur: v. g. in dysenteria, ejusque principio, sæpius similis pulvis mihi fuit in usu:

- ℞. *Rhabarb. electi.*  
*C. C. usti* a ʒß.  
*Extr. theriacal.* gr. jv. (aut hujus loco  
*laud. opiat* gr. ʒß.  
 ʒo *Sat. cinnam.* gutt. j. l. ij.  
 M. f. pulvis.

Communiter rhabarbarum tostum recipitur: sed nil valet; sic in fluxu hæmorrhoidum sequens præscripti remedium:

- ℞. *Rhabarb. elect.* gr. xv.  
*hamatit. præp.* ʒß.  
*Corall. r. præp.* gr. v.  
 M. f. pulvis.

Laxat alvum, & simul hæmorrhoides sistit. Sic in electuariis etiam contra hæmorrhagias nimias narium, uteri, &c. semper addendum est rhabarbarum: in specie pro cachecticis & hypochondriis sunt, qui parant electuarium alterans, bilem inertem acuens, tonum hepatis restituens, simpliciter ex passulis & rhabarbaro: sed in specie in ictero flavo expertum est sequens remedium:

- ℞. *passul. min. conquass.* ʒjv.  
*Rhabar. el. exactè pulveris.* ʒß.

c. f. q. *syrupi rosar. solut.* M. pro electuario.

De quo capiat æger mane quantitatem nucis moschatæ. Isti etiam, qui reconvescunt à morbis acutis, recipiant hoc electuarium, & ingens solamen percipient.

Sunt etiam, qui electuarium ex extracto rhabarbari parant cum spiritu vini; sed hoc nihil valet: alii cum aqua parare solent, rectius & prudentius quidem, quamvis & hoc limam mereatur. In officinis prostat syrupus de cichorio cum rhabarbaro, qui infantibus statim post partum propinatur, ut meconium, & varias istas sordes, quas in utero contraxerunt, evacuet: acui hic syrupus potest cum ʒi. l. ʒß. syrupi emet. Angeli Salæ. Alii habent elix. proprietatis cum rhabarbaro, quod laudo.

Restant scammonium & colocynthis; quæ duo raro simpliciter pro purgatione adhibentur propter vehementiam & violentiam: sed ferè semper loco stimuli aliis purgantibus adduntur, nimirum, quando non sumitur integra alicujus purgantis dosis, sed abbreviatur, tunc additur de his aliquid pro stimulo, v. g.

- ℞. *MP. de hier. c. agar.*  
*amm. Querc.* à ʒß.  
*scamm. præp.* gr. ij.

*trochisc. alhand.* gr. j.  
 c. ʒo *Sat. macist. pilula.*

- ℞. *MP. de hier. c. agar.* gr. xij. xv. ad ʒi.  
*g. xci c. +o solut.* ʒß.  
*scamm. ʒat.* gr. ij.  
*Extr. troch. alhand.* gr. j.  
 c. f. q. *Essent. absinth. l. lignor. l. ligni sassafr.* f. pilulæ.

Sunt polychrestæ. Addi etiam extract, absinth. ʒß. potest.

- ℞. *Extr. Cathol. Andern.*  
*panchym. Cr.* à ʒß.  
*g. xci c. +o liquef.* gr. xij.  
*scam. ʒat.*  
*Extr. troch. alhand.* a gr. j. l. ij.  
 c. *R ʒi f. pilula.*

- ℞. *Extr. panchym. Croll.* gr. xv.  
*g. xci c. +o sol.* ʒß.  
*scamm. ʒat.*  
*Extr. troch. alhand.* à gr. j. l. ij.  
 c. *Elix. propr. l. R. ʒi f. pilula.*

- ℞. *Extr. panchym. Croll.* gr. xv. ad ʒi.  
*absinth.* gr. vi.  
*scamm. ʒat.*  
*Extr. troch. alhand.* a gr. j. l. ij.  
 c. *R ʒi. l. Elix. propr. f. pilula.*  
 Item in pulveribus:

- ℞. *ʒi ʒ. lat.* gr. xij. ad xv.  
*scamm. ʒat.* gr. ij. l. ij.  
*troch. alhand. l. Extr. hor.* gr. j. l. ij.  
 M. f. pulvis pro dosi:

cui etiam addi potest  
 ʒo *Sat. anisi* gutt. ij

Hic pulvis ʒ. 6. vel 7. purgat, uti aliàs bona purgatio comparata esse debet; pulvis hic non fit molestus, mihi valdè familiaris. Purgantia enim non nimis violenta sint, nec in magna dosi præscribantur; sed lenia, & quæ vel sexies vel septies tantum ad excretionem stimulant.

In bolis:

- ℞. *Pulv. hypochondr. laxat.* ʒj.  
*scamm. præp.* gr. j. ad ij.  
 c. *conf. rosar. laxat.* f. Bolus.

D. S.

Purgier. Zuber.

Itaque scammonium est succus compositus, pro more vegetabilium ex gummosa & resinosa substantia. Resinosa autem est duplex: vel acrior, vel magis iners, insipida, ac picea. Prior cum spiritu vini, posterior mediante aqua elicitur. Posterioris modus est v. g. si scammonium teratur cum aqua simplici, fit mistura quasi lactea: gummosa substantia, aut cum contenta resina picea decantatur cum aqua; spissa verò materia remanens nullius est pretii, nisi quod tormina excitet. Modus hic est Brendelii, describiturque in Chymia sua in artis formam redacta, quam quibuscvis aliis præfero.

Præparatur tamen etiam seorsim resina cum



cum spiritu vini; laxat hæc, moderate tamen, præsertim cum aliis mixta. Prostat in officinis pulvis Cornachini Comitæ de Warwick, de quo Autor peculiarem librum conscripsit, qui conducit ad quosvis morbos acutos. Basini ejus constituit resina scammonii, v.g.

\*. *resin. scammon.* ℥℥.

℥iij. perfecte cum Mo alcalis. gr. viij.

crem. ℥i gr. iij.

M. f. pulvis.

Hic pulvis diversimodè operatur; modò enim laxat, modò vomitum excitat. Ad hujus pulveris imitationem aliquoties felici cum successu in tertianis præscripti sequens:

\*. *resin. scam.* gr. xii.

℥iij. diaph. gr. ix.

crem. ℥i gr. v.

M. f. pulvis.

Prodest imprimis in sanguineis, pituitosis, &c. In subjectis macris, biliosis, melancholicis, &c. non æquè succedit. Resina scammonii autem in hoc pulvere non tam pro scopo laxandi, quam alterandi, recipitur.

Ufus scammonii in genere est, ut sit stimulus in purgantibus. In specie sub usu ejus excrementa excerni solent tenuia, fluida, paulò acria; unde veteribus inter cholagoga relatum. Operandi modus est duplex: nimirum substantiâ suâ resinosa adhærendo & vellicando; substantiâ verò suâ gummosâ colliquefaciendo humores, & in ferofum liquamen permutando, operatur: Imo etiam infantibus scammonium propinari potest, & si pulveribus salinis addatur, satis operatur: e. gr.

\*. *Crem.* ℥i gr. xv.

℥i ℔lat. ℥℥.

*scamm. prepar.* gr. ij.

*troch. alband.* gr. i.

M. f. pulvis.

Hic pulvis 16. vicibus, blandè tamen, operatus fuit. Vel:

\*. *pulp. passul.* ℥i℥.

℥i ℔lat. l. ℔is digest. hyp. l. ℔ci gr. xii.

*resin. jalapp.* gr. vi.

*scamm. ℔at.* gr. ij.

c. syr. ros. sol. f. Bolus, S.

**Purgier-Lattwerge auff einmahl.**

Si in substantia in usum venire debet, potio sequens in forma emulsionis grata præscribi potest:

\*. *Resin. scam.* ℥℥. gr. xii. ad gr. xv.

Teratur cum

*sacchari* ℥ij. l. ℥iij.

affundendo sensim

*succi citri* l. *cydonior.* ℥℥. l. ℥vi. ad ℥j.

Misc. exactè, fiat *Potio lactea.*

Vel

\*. *Scammon. crud.* l. *prap.* ℥℥. ad gr. xv.

Teratur c. l. q. *rosar. cum paucis*

*oleo tartari p. d. acuta*, in mortario

lapideo, ut fiat *emulsio*: quæ decan-

teretur à fecibus, & addito paucis aqua

*cinnamoni* edulcoretur cum *saccharo*

l. *syrupo quodam*, & erit potio grata.

Tandem sese offert colocynthis, cujus etiam unicus est usus pro stimulo.

Ufus ejus est vel generalis vel specialis: generalis est, quod inter vehementissimâ a vegetabilium emineat purgantia; nam cum gravissimis torminibus purgat. Quoad usum specialem, proverbium est practicum: quæ alia non attingunt, ea attingit colocynthis, adeoque ad pituitas, vitreas veteribus dictas, seu mucilaginosissimos humores, prodest; hinc inter phlegmagoga primatum ducit, ac in lue Venerea præ aliis laudatur.

Colocynthis hæc

1. Saporis est amarissimi,

2. Simul adhæsivi, &

3. Sub minimo multum diffusibilis.

Ab his particulis est, quod usum colocynthidis sequitur æstus insignis, sitis clamosa, inflammatio ventriculi, tormina ventris, hypercathartis, imò periculum convulsionis: modò igitur ejus nimia acrimonia temperetur.

Ceteroquin sanè latet in ea vis retolutiva & laxativa humorum tartareorum, hinc in colocynthide est vis menses stimulandi, juxta Helmontium, hinc fortum & secundinas pellit. In specie cachecticis conducit, unde & quibusvis elixyriis anticachecticis addi solet. In correctione colocynthidis commendo, ut extrahatur cum menstruo aqueo potius, quàm spirituofo; aqua enim temperat resinam colocynthidis. Veteres per gummi tragacanthæ, ꝑo commune, &c. correxerunt, in trochiscos subegerunt, & vocarunt trochiscos alhandal: alii cum urina humana correxerunt. Optima tamen correctio est, quæ fit cum sale tartari essentiali, & si diutius digeratur cum sale tartari, acrimonia ejus perit, remanetque tantum sapor amarus.

Utendi modum quod attinet, nunquam per se exhibetur colocynthis, nisi in fortiori clysmate. Recentiores colocynthidem petiæ includunt, uti hoc imprimis urget Lobelius, cum tamen petia vix correxerit virulentiam ejus: igitur potius in infuso, vel in forma trochiscorum, vel extracti adhibeatur. In infuso nodulis laxativis additur dosi ℥℥. ad ℥j. in subjecto robusto. Optimus modus est in forma trochiscorum ad gr. j. l. ij. pro stimulo; extractum nunquam, quia minus tutum, usurpare licet: nam propter resinositatem insignia tormina excitat. Sunt qui dicunt: si poma colocynthidea recipiantur, ac incisa destillentur per alembicum, sic ascendere oleum, quod satis purgat. Sed sit fides penes experientiam.

Restat Mercurius dulcis, qui extractis purgantibus commodè additur, ut fiant pilulæ polychrestæ in morbis chronicis, quales lue Venerea, scabies ferina, epilepsia inveterata, & alii contumaciores affectus: v. g.

(C 3)

\*. *Extr.*





℞. Extr. panchym. Cr. l. ellebor. nigr. gr. xv.  
 ℞ii dulc. ℞ss. ad gr. xv.  
 scamm. Cat. gr. j. l. ij.  
 Extr. troch. alband. gr. j. l. jss.  
 C. eff. mentha l. ligni sassaf. f. pilula S.  
**Blut-reinigende Pillen.**  
 Vel

℞. Conf. fumar. 3j.  
 ℞ii dulc. gr. xv. ad 3j.  
 scamm. prap. gr. v.  
 C. syr. rubi idai f. Bolus.

### TITULUS III.

#### De Diureticis.

**I**nter evacuantiā generalia, convenientia sunt diuretica, per urinæ copiosum fluxum sortes recrementosas evacuantiā, suntque ea vel volatilia vel fixa: e. g. illa quod spectat:

℞. ▽ petrosel. 3ij. l. iij.  
 ononid. l. alkekeng. 3j.  
 Malvat. juniperin. 3vj. ad 3j. l. 3jss.  
 ~lumbr. per putref. 3iij.  
 3i vol. l. carmin. 3ss. ad 3vj.  
 syr. hed. terr. l. sanic. 3iij. ad 3vj.  
**M. f. Potio, cochleatim sumenda.**  
 ℞. ▽ heder. terr.  
 ononid.  
 petrosel. a 3j.  
 Malv. juniperin. 3jss.  
 ~lumbr. terrestr. per putref. rect. 3iij.  
 Θxci 3jss.  
 3. St. terebinth. vel junip. gutt. vj.  
 syr. hed. terr. 3j.  
**Dosis 2. 3. l. 4. cochlearia.**  
**M. f. Potio.**  
 ℞. ▽ fragor. 3ij.  
 R 3i 3ij.  
 syr. hed. terr. 3ss.  
**M. f. Potio.**  
 ℞. ▽ fragor. 3iij.  
 Θ essent. 3i 3iij.  
 Clyff. 3. 3j.  
 syr. hed. terr. 3ss.  
**M. f. Potio.**  
 ℞. ▽ fragor. 3iij.  
 lapill. 69. prap.  
 ~ois dulc. a 3j.  
 syr. hed. terr. 3ss.  
**Misc. pro Potione.**

Pertinent huc tartarea volatilia, spiritus tartari volatilis probè rectificatus, R nephritica Ammelungi quæ est multi usus, non saltem pro diureti, sed & sudore, in affectibus maximè scorbuticis non contemnenda.

Non cedit huic spiritus carminativus polychrestus de tribus Doct. Michaelis; est spiritus tartari volatilis egregiè diureticus, & ob vim discutiendi status dictus carminativus, usus egregii in morbis multis.

℞. ~lumbr. terrestr.  
 Θxci. a 3ij.  
**M. S.**

**Harn-treibender Spiritus 40. biß 50. Tropfen.**

Bis in die assumatur in haustu vini, aliàs sit sudoriferum; in vino verò ratione alcali mutatur in salsum:

℞. R 3i 3i sat. 3ss.  
 Dos. 50. gutt.

℞. R 3i 3ij.  
 Clyff. 3. 3j.  
**M. D. S.**

**Harn-treibende Tinctur.**

Dos. 40. gutt. Vel

℞. ~Carmin. de tribus 3jss.  
 lumbr. terr. 3jss.

**M. S.**

**Harn-treibender Spiritus.**

Dosis 40. gutt.

℞. liqu. terra sol. 3i 3iij.  
 ~Θxci 3jss. **M. S.**

**Harn-treibende Mixtur.**

Dosis 40. gutt.

**P**ertinent huc succinum, & sal volatile succini, diureticorum apex, oleum destillatum succini, petroleum, omnia raphanacea, aromatica, alliata, cepæ, &c. quibus præ aliis adnumero persicariam acrem, quæ mirabile est diureticum, & simul præservativum nephriticum, alkekengi, terebinthina, oleum destillatum terebinthinæ, juniperus, oleum destillatum, & spiritus bacc. juniperi; in specie malvaticum juniperinum, quod fit ex spiritu baccarum juniperi, rob juniperi affuso & digesto; camphora, urina humana, & inde natum sal ammoniacum, eiusque spiritus, lumbrici & eorum spiritus per putrefactionem paratus, & sal volatile; spiritus & sal volatile bufonum propter vim alimenti bufonum, quia vascuntur muscis de cantharidum genere, scarabæi majales dictis, & ubi fortiter agendum, infusum asellorum, & cantharidum ritè paratum:

Omnibus præfertur succus betulæ, de quo vid. Helmontius de Lithiassi. Fermentat instar vini, degenerat tandem in acetum acre; & in nephritide planè est singulare remedium. Vel fiat decoctum diureticum:

℞. HB. fragar.  
 parietar. a M. iß.  
 rad. 5. aperient. 3x.  
 bacc. alkekeng.  
 juniper. a 3vi.  
 sem. fraxini.  
 cicer. rubr. a 3iij.  
 crem. 3i 3ii.

**Coqu. in ▽ petrosel. & Alkekengi: In colat.**

℞. dissolv  
 Rob juniper. 3ii.  
 syr. alch. Fern. 3i.

~ois

~ *is cum spiritu frag. dulc. q. s. pro*  
grato sapore.  
Vel:

*℞. ras. ligni juniperini ʒiij.*  
Coqu. in f. q. *∇ a simplici.*  
Colatur. lb ʒβ. ferventi infund.  
*bacc. juniper. rec. ʒiij.*  
*rad. fenic. ʒj.*  
*~ a fol. ʒi ʒiij.*

stent in infuso per noctem: colatura edul-  
coretur cum syrupo de ʒ. radicibus.

Diuretica fixa in specie sunt omnia salia ar-  
tificialia falsa composita, qualia tartarus vi-  
triolatus, nitrum, sal digestivum hypochon-  
driacum, item salia vegetabilium ritè calci-  
nando parata, uti sunt sal stipitum fabarum,  
sal genistæ, & suo modo sal fimi columbini,  
&c. sunt salia falsa, & calcinatione diuturnâ  
fiunt alcalisata: item medix & quasi tempera-  
tæ naturæ sunt rob juniperi, semen violarum,  
milii solis, & ex his paratæ emulsiones con-  
cinnæ pro urina pellenda, extr. alkekengi:  
item vinum, in quo silices candefacti ali-  
quoties extincti fuerunt v. g.

*℞. ʒi ʒ. lat. gr. xv.*

*is genist. ʒβ.*

M. D. S.

**Harn-treibendes Salz.**

*R. ʒi ʒ. lat. ʒβ.*

*is stip. fabar.*

*genist.*

*fimi columbini ʒβ.*

M. f. pulvis, pro aliquot dosibus.

Sumatur in vino: vid. Hoffmannus in Meth.  
medendi.

Addi pro lubitu etiam possunt olei destil-  
lati terebinth. l. baccar. juniperi, gutt. jv. v. l. vj.

*℞. ʒi puri, l. crem. ʒi, l. ʒi puri, l. ʒi*  
*iat. ʒij.*

*ʒi ʒi.*

*ʒo Sat. terebinth. l. juniper. gut. iij.*

M. pro duabus part.

*℞. is genist.*

*stip. fabar.*

*lapill. 69. prap. ʒβ.*

*is vol. succin. gr. iij.*

M. f. pulvis.

*℞. Crem. ʒi ʒij.*

*lapill. 69. prap. ʒj.*

M. pro duabus dosibus, in vehiculo fer-  
vido assumentis.

*℞. ~ a fol. ʒi ʒβ.*

*lapill. 69. prap. ʒβ.*

Misc. pro tribus dosibus.

*℞. Crem. ʒi ʒij.*

*oli is ritè par. ʒj.*

M. pro duabus dosibus.

*℞. is essent. ʒi ʒj.*

*oli is ʒβ.*

M. in mortario lapideo, hinc exsicca, pro  
quatuor dosibus.

Diureticæ etiam sunt acidulæ natura-  
les, & huc spectat spiritus salis & nitri dul-  
cis.

In forma Boli:

*℞. Rob. juniper. ʒj.*

*lapill. 69. prap. gr. xv.*

*ʒi ʒ. lat. ʒβ.*

Misc. pro Bolo.

Pro electuario diuretico:

*℞. Conf. violar. ʒj.*

*rob. juniper. ʒβ.*

*lapill. 69. prap. ʒij.*

*arcan. dupl. ʒj.*

c. f. q. syr. hed. terr. fiat electuarium,

aspergendum cum ~ salis parum.

## TITULUS IV.

De

*Sudoriferis.*

**S**equitur tandem Evacuatio per sudorem,  
ob id diaphoresis dicta. Fit sudor,  
quando sanguis quacunque causa resolutus,  
& quasi liquetactus, crebriori circulo  
per universum corpus rapitur, sub quo  
motu simul attenuatur latex ejus aquosus,  
quo copiosius dissolvit & imbibit salia hete-  
rogenæ, aliasque particulas recrementosas,  
per sanguinis fermentativum motum separa-  
tas, simulque, dum per partes solidas circula-  
tur, salia ista acquisita lixiviali virtute mundi-  
ficat eas, sordesque sub nutritione relictas ab-  
stergit. Quicquid interea sub circulari hujus  
sanguinis, ejusque serosi laticis motu, defer-  
tur in vasa capillaria peripheriæ corporis, pe-  
netrat in glandulas miliares intercutaneas, per  
quas tunc guttularum minutissimarum tor-  
mâ tandem extra corpus ejicitur. De glan-  
dulis miliaribus Steno & Malpighius videatur.

Quoad sudorifera remedia: sumimus nunc  
volatilia, nunc fixa: priora sunt omnia sa-  
lia volatilia, & eorum spiritus tam ex regno  
animali, quàm vegetabili. Ex animali eli-  
ciuntur per simplicem destillationem, ut sal  
volatile, & spiritus cornu cervi, urinz huma-  
næ, salis ammoniaci, qui soboles est urinz,  
& polychrestus; ~ cranii & sanguinis hu-  
mani, viperarum; hæcque sunt tam macria,  
quàm pingua; illa, ubi sine caloris intensione  
artificiali provocare volumus sudorem; hæc  
ubi simul calorem intensiorem reddere ani-  
mus est. Ex regno autem vegetabili sunt o-  
mnia salia volatilia, quæ beneficio putrefa-  
ctionis fiunt, & sublequente destillatione.  
Pertinent huc etiam theriaca & Mithrida-  
tium, electuarium diascordii Fracasto-  
rii, & compositiones theriacales cum  
aceto imprimis vel vino assumentis;  
quæ

quæ copiosè sudorem eliciunt; spiritus volatiles oleosi, v. g. spiritus theriacalis camphoratus, florum sambuci, roris marini, &c. Pertinet huc R. bezoardica camphorata, mixtura simplex, nec non olea Sata, ut oleum succini, caryophyllorum, camphoræ; item olea destillata empyreumatica ex ossibus animalium aliisque, quæ prius aliquoties à capite mortuo rectificentur; sic enim deponunt foetorem, & ad aliquot guttas assumpta, copiosissimos & foetidos sudores eliciunt, ut oleum destillatum tartari, ligni Guajaci, buxi, &c. quæ cum nihil aliud sint, quàm resinæ vi ignis colliquatæ, patet: quod hac ratione etiam ipsa resinosa concreta vim sudoriferam exinde obtinebunt, ut angelica, ess. lignorum, theriaca ex aromatibus resinosis; item vegetabilia intensè amara; & quasi incidentia, qualia sunt: absinthium, carduus benedictus, radix vincetoxici, flores, baccæ, & succus sambuci, radix chinæ, cortex chinæ-chinæ, ligna exotica quæcunque, saffras, &c. domestica, ut lignum quercinum, &c. Formulæ sudoriferorum volatilium:

℞. *Θ\*ci vol.* gr. xv.

*Camph.* gr. ij.

M. S.

**Schweiß-Salz auff einmahl.**

℞. *∇ fumar.* ℥j.

~ *C. C. c. Θ\* vol.* ℥j.

*syr. card. bened.* ℥j.

M. pro potione S.

**Schweißsträncklein auff einmahl.**

℞. *∇ fl. samb.* ℥j.

~ *bacc. samb.* ℥j.

*Θ\*ci* ℥℥. ad ℥j.

*Camph.* gr. ij.

*Syr. card. ben.* ℥℥.

M. f. Potio.

℞. *∇ card. bened.* ℥℥.

~ *Θ\*ci* ℥j. vel *Θ vol. Θ\*ci* ℥j.

℥o *Sat. caryophyll.* gutt. j. l. ij.

*syr. fenic. l. cort. aurant.* ℥℥.

℞. *∇ scorzon.* ℥j.

*cinnam.* ℥℥.

~ *theriac. camph.* ℥℥.

*Θis vol. C. C.* gr. xij.

*succini* gr. vj.

*syr. scord.* ℥℥.

M. f. Potio.

Quoad sudorifera fixa: sunt omnia salia lixivialia fixa, ritè alcalisata; nam si remaneant falsa, diuretica potius proveniunt: item sulphurea metallica, & mineralia fixa; unde omnia antimonialia per nitrum fixata, ut antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale, simplicia & composita, aurum diaphoreticum, cinnabaris antimonii, &c. pertinent & huc suo modo animalium cornua & partes ossæ cum & sine igne præparatæ, mineralia, terra sigillata, unicornu fossile, &c. Præ

cæteris fixum polychreston est antimonium diaphoreticum martiale, in morbis chronicis, ut ictero, febribus, scorbuto, &c. Lapis bezoar nil valet, quia inter 1000. vix unus est genuinus, sed adulterinus, huic præfertur calculus humanus, qui optimum sudoriferum est, in morbis pestilentialibus insigniter proficuum.

Formulæ sudoriferorum fixorum:

℞. *℥ii diaph.*

*C. C. f. Δe*

*Θis card. bened.* ℥. gr. xij.

M. pro pulvere, hauriendo jejuno stomacho in vehiculo calido.

Vel

℞. *℥ii diaph. simpl. f. Dial.* ℥j.

*Θis card. bened.* ℥℥.

*land. opiat.* gr. j. l. ij.

℥o *Sat. caryophyll.* gutt. ij.

M. f. pulvis, pro una dosi. S.

**Schweiß-Pulver auff einmahl.**

℞. *C. C. f. Δe* gr. xv.

*Cinn. ℥ii* ℥℥.

*Bezoard. Qar.* gr. jv.

M. f. pulvis.

℞. *C. C. f. Δe*

*Θi ℥iati* ℥ gr. xv.

M. f. pulvis.

℞. *Rob samb. aut juniper.* ℥j. ad ℥ij.

*C. C. f. Δe* ℥j. ad ℥℥.

*℥ii diaphor.* ℥℥.

*C. syr. rubi idai f. Bolus, S.*

**Schweißtreibender Bolus oder Lattweg auff einmahl.**

℞. *Rob. samb.* ℥j.

*℥ii diaph.* ℥j.

*Extr. card. ben.* gr. vj.

*syr. fumar. f. Bolus.*

℞. *Extr. card. ben.* ℥℥.

*land. op.* gr. j. l. ij.

C. ℥o *Sat. anis. l. tartari rectif. f. pilula.*

D. S.

**Schweiß- und Ruhe-Pillen.**

℞. *Extr. card. bened.* ℥℥. ad ℥j.

*theriacal.* gr. v.

C. ℥o *succini f. pilula f. ut ante.*

℞. *Extr. lignorum* gr. xv.

*croc.* gr. iij.

C. ℥o *℥i fet. rect. f. pilula.*

Sudorifera mista ex fixis & volatilibus.

℞. *℥ii diaph. Dial.* ℥j.

*Θ vol. viper.* gr. v.

& quando æger est inquietus,

*land. opiat.* gr. j. l. ij.

M. f. pulvis.

℞. *∇ scabios.*

*flor. sambuc.*

*ulmar.* ℥ ℥j.

*cord. Herc. Sax. frig.* ℥vj.

~ *theriac. camph.* ℥iij.

*℥ii diaphor.* ℥℥.

C. C.



C.C.f. Δe 3j.  
 Ⓞ vol. C.C. 3ß.  
 Campb. gr. iij.  
 syr. scord. 3j. vel 3jß.

M. S.

**Schweiß-Trank/wohl umbzurütteln/auf viermahl.**

℞. ▽ fl. sambuc. 3j.  
 C.C.f. Δe 3ß.  
 Ⓞ vol. C.C. gr. v.  
 syr. fl. tunic. 3ij.  
 M. f. Potio.  
 ℞. ▽ flor. samb. 3j.  
 Theriac. Androm. l. Elect. diascord.  
 Frac. 3j.  
 Ⓞ is vol. viper. gr. vj.  
 Campb. gr. j.  
 syr. rubi idai 3ß.

M. D. S.

**Schweiß-Tranklein auff einmahl.**

℞. ▽. Card. bened. 3ij  
 Clyff. Ⓞ os. 3ij.  
 el. diascord. Frac. 3j.  
 syr. card. ben. 3ß.  
 M. f. Potio.

℞. R bezoard. 3j.

D. S.

**Schweiß-Tinctur auff zweymahl.**

In robusto vero corpore & casu periculoso pro una dosi 3j. sufficit.

Hæc sufficiant, quoad modum sanguinis fermentativum restituendum, & quoad alterationem ejus succorum.

## CAPUT III.

De

### Facultate Animali.

**A**bsolutâ ita consideratione facultatis vitalis generali Practica, pergimus ad facultatem animale, tanquam alteram principissam vitæ, in spiritibus animalibus & systemate nervoso fundatam. Quoad spiritus animales: attendenda est eorum substantia, hinc torpor & volatilitas: sed de his commodius infra de somno & vigiliis agam. Quoad systema nervosum: in hoc attendendum primò ad nutrimentum, quod est chylus, qui immediate eas partes nerveas nutrit, ob id etiam labes suas, in specie suum acrem, facile illis affricat, nervosis partibus per se inimicissimum. Secundò attendendum ad eorum structuram, quæ quanta est, tota constat ex subtilissimis & delicatissimis fibrillis, nunc coacervatis in nervos, nunc hinc inde separatis & distributis. Nam & ipsum cerebrum, tanquam basis systematis hujus, fibrarum talium delicatissimarum tegmine glanduloso inclusarum, est systema; unde consequenter ex hac textura, omne reliquum systema musculorum, membranarum, ner-

Tom. II.

vorum, tendinum, oritur: de quo vid. Malpighius *Tract. Scrutinium viscerum* item Willisius in *Anat. cerebri & nervorum*.

In hoc systemate nervoso maximè considerandus est debitus fibrillarum tonus, seu legitima eorum tensio, quæ dependet partim à propria textura, quæ instar chordarum sunt tensæ, partim ab influxu & radio spirituum animalium hæ fibrillæ nerveæ, in debito tono constitutæ, organon sunt motus & sensus. Ratione motus tam animalis quàm naturalis, obnoxie sunt hæ ipsæ fibræ vel defectibus paralyticis, vel etiam motibus convulsivis & spasmodicis, qui, spasmodici scilicet, insequuntur proximè præcedentem irritationis sensum, indeque natum rapidiorem spirituum motum. Irritatio hæc in specie est vel à frigore externo, vel si à causa interna, ordinariò oritur à vitioso acido: utraque nervis sunt inimicissima, hinc acidum destruentia, penetrantia, simul tamen temperata volatilia oleosa, adeoque aromatica nervis sunt amicissima: item sulphura metallica, quæ omnium acidum peccans corrigunt & destruunt, nervina & cephalica dicuntur, v.g. rosmarinus, mentha, salvia, majorana, lavendula, spica, stæchas Arabica, melissa, flores liliorum convallium, castoreum, omnia etiam proprie sic dicta aromata, ut: cardamomum, macis, cubebæ, galanga, &c. & omnia ex his parata, spiritus & olea destillata, cumque his parata salia volatilia oleosa: acidum etiam temperat succinum & succinata, rectè ab Helmontio nervorum solamina dicta, sal volatile succini, ejusque oleum destillatum, quod præcellens est; spiritus Ⓞ is ammoniaci anisatus, aliaque innumerabilia: in specie ad paralyticos aurum diaphoreticum Poterii, ad convulsivos cinnabarisanimonii, & alia sulphurata similia, vi singulari anodynâ prædita, item ex sanguine & cranio humano parata; imprimis si salia horum volatilia cum oleosis aromaticis fuerint reddita oleosa, item sal volatile oleosum Sylvii; quod eleganter procedit cum succino sequenti modo:

℞. Ψe.

Ⓞ xi 3 part. æqual.

Hisque addatur tertia pars succini.

Mistura irroretur modicè cum spiritu vini tartarizato, destilletur per retortam vitream in arena, & prodit spiritus salis ammoniaci succinatus, separandus ab oleo, & iterata rectificatione egregius fit in affectibus nerveis.

Similiter cum aliis oleis destillatis possunt fieri salia volatilia: elegans est hoc:

℞. Cinnamomum vel caryophyllos:  
 affunde

Spiritum vini probe tartarizatum.

Stent in digestionem aliquandiu: spiritus vitæ nitinctus affundatur mixturæ ex salis ammoniaci

(D)



niaci & calcis vivæ ana: destillentur per retortam more consueto forti igne; sic prodit spiritus urinosus, sapore & odore aromatico insigniter præditus, colore aureo vel sanguineo.

Pertinent & huc pro cura systematis nervosi alia salia volatilia composita, in specie liquor cornu cervi succinatus, nobilissimum remedium in motibus convulsivis partium internarum. Ex parte anatica salis volatilis cornu cervi probè depurati, & salis volatilis succini, crebrioribus cum spiritus vini extractionibus seu cum aqua simplici solutionibus depurati: hæc duo salia miscentur cum spiritu cornu cervi rectificato, & ad perfectam unionem aliquoties cohobentur.

Si ex tempore præscribenda sit mistura ad nervorum atoniam, & affectus à nimia sensilitate nervorum convulsivos polychresta, sit v.g. sequens formula:

R. ▽ *Menth.*

*fenic.*

*Meliss.* ʒj.

*Ess. castor.* ʒiij.

*Liqu. C.C. succin.* ʒij.

~ *Θξci simpl. l. dicto modo ʒss. ʒj.*

*land. opiat. gr. ij. l. iij.*

*Syr. cort. aurant. l. de canella ʒvj.*

*M. f. Potio.*

Capiat æger cochlear j.

Fibræ legitimæ tensæ sunt pariter instrumentum sensus: sensus autem, ut notum est, sunt vel externi vel interni: ratione illorum externorum in specie considerandum est:

1. Systema nervosum, huiusque major vel minor sensilitas.
2. Ratione sensus naturalis partium mutui consensus.

Sensus consistit in motione fibrillarum nervosarum, facta ab objecto externo. Variat autem systematis nervosi sensilitas, prout fibrillæ nervæ magis vel minus sensiles ac teneræ, adeoque ab objecto externo nunc facilius, nunc difficilius mobiles, ideoque magis vel minus sensiles sunt. Tales sensiles à levioribus remediis magnam patiuntur alterationem; alii è contrà à fortioribus non alterantur. Mulieres egregiè nos vexant in praxi ob mollem structuram: si molliusculæ & succulentæ, habent genus nervosum subtilissimum, & sensiliores sunt præ aliis, inde levi morbo facile alterantur, & proinde cogunt Medicos, ut in iis acriora & volatilia cum circumspectione usurpent, quæ aliàs in viris sine delectu adhibentur.

Consensus partium deducendus quoque ex harum fibrillarum nervosarum ramificatione varia. Cum enim iste supponat sensum, & fiat, quando una parte laborante altera pars simul afficitur, necesse est, ut fundamentum omnis consensus & morborum per consensum in structura & textura nervorum, in specie nervosarum membranarum, quæ ratur; ratione

quarum cum aliis connexæ consentiunt, non connexæ non consentiunt. Consistit ergo consensus partium in connexione unius cum altera, qui triplici imprimis solet fieri ratione, ita quidem, ut omnis propriè dictus consensus fiat ratione saltem nervorum: consentiunt nempe partes nervæ triplici modo:

1. Quatenus fibræ nervæ sunt continuæ: qua ratione imminente vomitu tremat labium inferius; Vel
2. Quatenus sunt contiguæ: quarum ratione calculus vesicæ subinde stimulum infert alvi, & tenesimum excitat.
3. Consensus partiū fit ratione connexionis mediantibus funiculis nerveis: qua ratione consentiunt renes, ureteres & intestina, stomachus & caput, &c.

Nimiam sensilitatem nervosi systematis, tunc spirituum impetuosiores motum, & inde nata symptomata spasmodica, quin etiam faciles nimis partium consensus, optimè sistunt opiata, & omnia similia narcotica ritè parata: item antimonialia sulphura metallica fixa, cum tamen opiata propter narcoticam virulentiam sint suspecta, non nisi probè correctæ; vel per fermentationem, quæ correctiones omnes superat; vel per digestionem cum salibus aut alcalib9 fixis, in specie cum sale tartari, adhibenda sunt. Suspecta autem sunt omnia virulenta narcotica, ut hyoscyamus, nicotiana, & reliqua narcotica.

Imminutam sensilitatem verò & motus defectum, plus minus paralyticum, adeoque spirituum animalium torporem, corrigunt optimè omnia acria aromatica, ut castoreum, & supra dicta salia volatilia oleosa, succinata, vegetabilia aromatica, aqua vitæ, cordiales, apoplecticæ, &c.

## CAPUT IV.

De

### Autoribus Practicis.

Quoad methodum practicam: respectu horum fundamentorum præ ceteris terræ vestigia Sylvii, prout conscripsit ideam præceos, & vestigia Willisi secundum principia in Pathologia cerebri & motibus convulsivis. Ratio, quod jungam hos duos, est hæc, quod neuter solus sufficiat, juncti melius: Illæ in sua praxi quam optimè principiorum salinorum, acidi & alcali, effectus, varias inde natas effervescentias, correctiones, adeoque humorum dyscrasias, explicuit, & mederi iisdem docuit; de motibus verò convulsivis tacet: Willisius verò citato loco, qui primus in hoc puncto oculos aperuit (ut autem eum Hôchstederus in observationibus, ut & Piso de colluvie serosa,) quoad motus convulsivos antea occultatos, multa prodidit. Quoad attinet Praxin Sylvii: in duobus locis cautè legendus, & quodammodo corrigendus:

1. Quod

1. Quod nimis multa effervescentiæ isti bilis & succi pancreatici tribuat, & ubi prior subinde causa sufficeret, eam in adjumentum vocet, ut nihil dicam de effervescencia in dextro cordis ventriculo ex bile adscendente, & lymphæ descendente, nec demonstrabili.

2. Quod multa nimis tribuat vaporibus, fumis & halitibus, ex effervescentibus succis in primis viis exhalantibus, &c. qui ut plurimum, tamen nihil habent in recessu, eosque jam rum excussit Helmontius. Inde quoque in affectibus per consensum nervorum Sylvius etiam hos fumos accusat: Ubi enim hi ipsi ab eo adducuntur, subsunt ut plurimum motus spasmodici & convulsivi nervorum, ex irritatione partium sensilium abdominis, quibus inferuntur, in spasmos contractorum; unde & aliæ partes, cum quibus connexi surculi conjunguntur, continuato tali spasmo per consensum simul affici solent.

Willisium verò quod attinet: hujus copula elastica intereà in medio est relinquenda, donec certior ejus ratio constet: quin in affectibus spasmodicis acidum, aliudve dolorosum, irritans, & mutuus nervosarum partium consensus intereà sufficiant. Ejus pharmacologia rationalis meretur etiam, quæ legatur.

Hi ex modernis imprimis Tyroni sufficiunt. Veteres quod attinet scriptores: horum omnium loco sit Sennertus, cujus libri practici nobis instar locorum communium sunt; maximè enim dictus hic vir in eo sedulus fuit, ut omnes affectus ordine declaret; nam ex omnibus Scriptoribus collegit flosculos: vel loco hujus sit Forestus, ejusdem nempe observationum libri, in cujus scholiis tota ferè praxis secundum veterum sententiam conscripta apparebit, per curationes plus minus illustrata. Helmontius sedulo omnibus legendus est; cum accuratorem post Paracelsum non habeamus. Judiciosè autem legatur, ne decipiāmini; quia ejus theoria interdum nimis est subtilis, ac subinde vix intelligibilis; lectori saltem veterum excutit, & nolentem volentem ad ulteriorem indaginem excitat: imitatio practica est impossibilis, quamdiu ejusdem scilicet generosioribus destituimur remediis, sine quibus eum imitari non possumus. Imo ipse in pluribus locis habet figmenta, e.g. sit ejus *Actio ignota regiminis*, ubi multa habet, quæ optimè ad *systema nervosum Willisianum* possunt applicari. Interim quantum possibile, eum imitari conemur; optimam enim suggerit methodum à priori curandi: experimenta ejusdem, tam chymica quàm medica, optima

Tom. II.

sunt, & quantum hætenus constat, certissima.

Qui ergò utiliter Helmontium legere cupit, observet:

1. Ne totum mox perlegere tentet, ob prolixitatis & confusionis metum.
2. Ut anatomicis & chymicis fundamentis probè instructus sit; &
3. Ut, quæ legit, tanquam paradoxa existimet, ulteriori meditatione digna, & ratione & experienciâ aut confirmanda, aut rejicienda.

Adeoque legantur in principio sequentes tractatus:

*Promissa Autoris,*  
*Venatio scientiarum.*  
*Causæ & initia naturalium,*  
*Archeus faber.*  
*Physica Aristotelis & Galeni ignara,*  
*Elementa,*  
*Terra.*  
*Aqua.*  
*Aer.*  
*Progymnasma meteorum.*  
*Complexionum ac missionum elementalium figmentum.*  
*Imago fermenti imprægnat massam semine.*  
*Formarum ortus.*  
*Natura contrariorum nescia.*  
*Spiritus vite.*  
*Calor efficienter non digerit, sed tantum excitativè.*  
*Triplex Scholarum digestio.*  
*Sextuplex digestio alimenti humani.*  
*Pylorus rector.*  
*Tartari historia.*  
*Inventio tartari in morbis temeraria.*  
*Alimenta tartari infantia.*  
*Tartarus non in potu.*  
*Custos errans.*  
*Demens idea.*  
*Scabies & ulcera scholarum.*  
*Asthma & tussis.*  
*Latex humorum neglectus.*  
*Canterium.*  
*Tria prima Chymicorum principia, neque eorum essentias de morborum exercitu esse.*  
*De flatibus.*  
*Victus ratio.*  
*Pharmacopolium & dispensatorium modernorum.*  
*Potestas medicamentorum.*  
*In verbis, herbis & lapidibus magna est virtus.*  
*Butler.*  
*De fontibus Spadanis paradoxa.*  
*Humidum radicale.*  
*Lunare tributum.*  
*Magnetica vulnerum curatio.*

(D 2)

In-

*Infantis nutritio ad vitam longam.  
Arcana Paracelsi.  
Arbor vita.*

Quoad observationum scriptores practicos, quales Borellus, Salmuth, Tulpius, Rhodius, Bartholinus, &c. legendi sunt cum iudicio exacto, attendendo in his ad duo:

1. Raritatem & varietatem casuum.
2. Effectum remediorum subinde consignatum.

Quoad prius: ad initium & finem morbi attendatur, ponderentur omnes circumstantiæ climatis, ægri, vitæ generis, &c. si allegantur, ut sic ad evolutionem causæ possimus pervenire. Eligantur etiam Autores, qui non de fide sunt suspecti. Si circumstantiæ non sint notatæ, modò huc modò illuc cogitatio dirigenda ad conceptus varios, ut ita versatile ingenium acquiramus, & inquiramus, quid sit magis vel minus probabile, ut in casu simili de causa & origine ejus eò melius possimus judicare. Ubi explicatio circumstantiarum & theoria simul notata est,

consideranda eadem, ex quibus principiis procedat? an ex Galenicis? an Paracelsicis? an sit purus Helmontianus? an verò hodiernus? & si possibile, cum probabilioribus concilietur. Instar omnium sit Burnett *in Thef. Practico*.

Quoad posterius: effectus probè considerandus est, tam remedium ipsum, & hujus efficacia per se, quàm, quâ ratione, quò tempore, & quibus circumstantiis adhiberetur fuerit? æstimando: Conferantur similia exempla ejusdem Autoris, & ad juvantia & lædencia intendatur animus; iterata enim exempla constituunt experientiam, quæ unâ in causarum indagationem nos deducit. Hinc circumstantiæ probè pensandæ, quatenus vel promovere, vel impedire, vel immutare, talem remedii effectum potuerint; quid aliud, vel melius, vel succedaneum, adhiberi potuisset; hoc enim modo praxis habitualis facile acquiritur: è contrà, nisi dicta probè considerentur, decipimur, quæ causa est, quod euporista & specifica sæpius non succedant, quia non sunt eadem circumstantiæ.



## PRAXEOS SPECIALIS

### LIBER I.

**Q**uæ prima methodus est, & facile applicabilis ad praxin, & intelligibilis, quam primò instituit Porterius, & dein Sylvius, procedentes secundum ordinem functionum in corpore, sic sine confusione tractantur. In corpore autem nostro functiones ex sunt primariæ, quæ nutritionem spectant, quia corpus nostrum conservatur per nutrimentum:

tamdiu quippe vivimus quamdiu nutrimur. Nutrimenti ergo assumptio & distributio est prima è functionibus primariis totius corporis. Assumimus autem alimenta, stimulat per appetitum, qui, quando fertur in sicca, vocatur fames; in liquida verò, vocatur sitis; ordinem ergò in morbis humani corporis observo, quem natura in nutriendo corpore, & incipio de appetitu animali seu fame & siti.

## SECTIO I.

*D E*

### APPETITU ANIMALI, & FAME LÆSA.

**A**nimes animalis tribus læditur modis:

1. Quando imminuitur, aut interdum penitus cessat, ut in anorexia.
2. Quando depravatur omnino, & fertur in vitiosa objecta, ut in pica vel malacia.
3. Quando augetur & excedit, ut in appetentia canina, & bulimo.

## CAPUT I.

*De*

### Anorexia.

**Q**uod attinet inappetentiam seu anorexiam: illa est, si ægri destituuntur desiderio ad alimenta, quod naturaliter habere debebant; & quidem nunc simpliciter, ita ut nullum planè stimulum habeant, nunc secundum quid, si in accessione ad mensam nullum habent appetitum; dum

autem edere incipiunt, eundem renovant. Si cum hoc prostrato adest simul horror ab alimentis, vocatur fastidium.

#### SUBJECTUM.

Subjectum hujus affectus est orificium stomachi sinistrum, in quo uti est sedes naturalis famis, ita etiam in p. n. fame affectum est.

#### CAUSÆ.

Quod causas: nota est rejecta veterum hypothesis de suctione vasorum ventriculi in assignanda causa appetitus, & rectius introducta fermentatorum doctrina: unde alimentorum digestionem & famem oriri dicimus à succo stomachi fermentativo, vellicante orificium ventriculi sinistrum; famem verò diminutam à defectu vellicationis istius. Igitur fames imminuitur, & per consequens aboletur vitio orificii stomachi, quando hujus nervi sunt affecti, ita ut non sentiant stimulum; aut vitio fermenti digestivi.

Jam quoad orificium sensile: deficit sensus



sus vellicationis in stomacho ob nervos ejus, vel propter spiritus animales affectos, sic ut non sentiat stimulus in orificio stomachi. Hi nervis sive per essentiam, sive per consensum sint affecti, anorexiam inferunt: sic nephritis, propter convulsionem per consensum afficiens plexum orificii sinistri nerveum, ut non percipiat sensum à fermento molestum, appetitum dejicit. Ratio est, quoniam renibus affectis & dolentibus, etiam reliqui nervi ex plexu Fallopiano seu mesenterii, levi spasmò & convulsione simul afficiuntur. Unde non tantum dolorem stomachi & vomitus excitant, sed præterea sunt causa, quò minus percipi possit vellicatio in stomacho à fermento facta, & sic appetentiam dejiciunt, quod etiam uti venit in colica & affectibus omnibus intestinorum, hernia itidem &c. in quibus ratione continuitatis stomachus simul plus minus afficitur. Hinc affectus omnis, afficiens stomachum, solet inferre prostratum appetitum, quo etiam pertinent tumores, vulnera & ulcera: de quibus vid. Schenkii *Obs.* pag. 335. & 346.

Quoad spiritus animales: hi inappetentiae causa sunt, quando narcoticis stupidiore redduntur, indeque nervi minus sensiles: vel quando motus eorum à fortiori objecto, ut amore, curis, meditationibus ita immutatur, ut vel non ferantur sufficienter ad stomachum, vel facta ibidem impressio non sufficiat determinando spirituum motui à fortiori objecto perturbato: sic notum est, laudanum opiatum & quæcunque opiata aliave narcotica immodicè ingesta appetitum prosternere: vid. Willisii *de Anat. Brutor.* P. 2. cap. 3. & in *Pharm. rational.* P. 1. Sect. 7. Cap. 2. Hinc notum est, quod nicotiana ejusque fumus notoriè inhibere soleat appetitum, propterea quia partim est narcotica, & nervoso generi stuporem inducit, partim quia imprægnata est sale volatili oleoso admodum penetrante, quod obtundit & temperat salinam vim stomachici fermenti. Facit huc inventum Indorum, quod refert Sennertus l. 3. *Prax.* P. 1. Sect. 2. cap. 2. pag. 97. ex Monarde, dum ipsi ad fallendum appetitum utuntur medicamento, facto ex foliis tabaci & conchyliis fluvialibus calcinatis, quæ duo in MP. cogunt & assumunt. Pertinet huc, quod deliria, tristitia, terror, triste ex inopinato allatum nuncium, &c. subito appetitum dejiciant, non secus ac alia graviora animi pathemata quælibet, item magni dolores, quatenus hæc omnia conspirant, ut spirituum animalium motum immutent. Sic parili ex causa ex subitanea pedis luxatione optimus etiam Helmontio prostratus fuit appetitus.

Quoad digestivum fermentum: imminuitur & cessat fames, I. quando fermentum digestivum in stomacho est obrutum à copiosa

materia viscida aut pituitosa, ita ut nequeat spicula sua exerere in nervos. Spectat huc saliva itidem viscida & glutinosa, fermentum stomachale inquinans, ordinariò appetentiam dejectam solet inferre: frequens est hæc in febre lenta laborantibus, & hæticis, qui conqueruntur de saliva glutinosa, & habent simul appetitum prostratum, unà cum compressione stomachi: idem etiam accidit in Hypochondriacis quibusdam, qui de imbecillitate corporis continua cum appetitu prostrato & glutinosa saliva conqueruntur; item inordinata aut nimis copiosa alimentorum, imprimis non facile digestibilium, una vice ingestio: cerevisia, seu potus non ritè defæcati, præsertim recentiores, tartarum & faeces in stomacho præcipitantes, appetitum stomachi prosternunt; sic pingua quæcunque copiosius assumpta, superingesto potu frigido, viscidum & crudum nidorosum in stomacho primitque viis cumulant, & iners reddunt ventriculi fermentum: hinc Sennertus *Pr.* l. 3. P. 1. S. 1. C. 1. notabile habet exemplum ex Avicenna de quodam, cui per 10. dies appetitus penitus fuit dejectus ex assumpta lbj. olei violacei, in quo cera & adeps in emplastri consistentiam dissoluta fuere: item acida vel austera cuncta, quatenus nempe difficiles digestionem cum puncturis stomachi faciunt, & vomitus acidus cient, sæpè quoque appetitum summè prosternunt. Item spiritus vini crebrius & copiosius assumtus ex se & ordinariè prosternit appetitum, quoniam acrimoniam acido-salvæ fermenti stomachi temperat, & coercet: Nam spiritus vegetabilium virtutem habet temperandi & corrigendi acrimoniam humorum in corpore nostro; item fit non rarò, ut aliquando bilis pinguior, & præternaturali motu suo ex intestinis in stomachum regurgitet: vid. Sylvius *Pr.* l. 1. pag. 15. unde & dejectus appetitus. Denique excernenda varia subito suppressa, alterantia, & inquinantia contenta corporis, etiam immutando plus minus succum stomachi esurinum, anorexiam inducunt; ut mensium suppressio, item intermissus coitus, &c. Sic Schenckius in *lib. 3. de inappetentia Obs.* l. p. 320. observat viduam ex desuetudine Veneris subitanea, & ex mœrore contracto, in insignem anorexiam prolapsam.

II. Secundum fermenti digestivi vitium in anorexia est, quando deficit in stomacho, id quod fit ob varias causas, in specie, quando vel in toto corpore imminuitur vel ad stomachum non deferitur, partim propter conturbationem spirituum, partim omnium humorum in corpore: hinc enim quibusvis in febribus, primariò continentibus, ardentibus scilicet ac malignis, secundariò intermittentibus, penitus cessare solet appetitus, defectu acidi vitalis in stomacho, labefactati ob humorum, adeoq. lymphæ

phæ plus minus factam alterationem, & imminutionem in universo corpore, nec non pinguedinem sanguinis, aut abundantiam bilis & salis volatilis oleosi, destruuntis aco-rem in nobis. Cæterum præ aliis assumpta multum huc faciunt: sic potus nimis appetitum prosternit, diluendo nimis & abster- gendo fermentum digestivum, item vinum, de quo Hippocrates *l. 2. Aph. 21.* e. g. potus recens, l. cerevisia, vel feri lactis usus nimius, de quo *Tim. in Cas. l. 3. Cas. 2. pag. 111.* Tandem calculi in stomacho geniti etiam appe- titum prosternunt: de quo Höferus in *Herc. Med. pag. 137.* non secus ac alcalia assumpta, item acidum absorbentia, ut creta, bolus, cornu cervi ustum, terra sigillata & Martia- lia, appetitum enecare solent: Sic acidum etiam ab urina obrunditur, e. g. in febribus famelicis, ubi propter acidum nimis vola- tile multum edunt, & corpora tamen non augentur, hinc urina propria commendatur,

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: in diagnosticis non opus est prolixitate, quoniam ex se patent, & ab ægris molestia hæc indigitatur.

### PROGNOSIS.

Nunquam bonum signum est appeti- tus prostratio, in specie, quæ citra causam manifestam aut citra stomachi oppressionem, ex defectu acidi naturalis in stomacho, vel eius omnimoda extinctione oritur, ut in prin- cipio malignorum affectuum evenire solet: in sanis morbum imminuentem, in morbo- sis semper aliquid mali, denotat, sive morbus hic fuerit chronicus, vid. Hippocrates *sect. 7. aphor. 6.* sive acutus, vid. Galenus in *Hipp. Sect. 2. Aph. 6.*

Qui obnoxii sunt affectibus chronicis convulsivis, podagricis, colicis, nephriticis, &c. hisque subito & sine causa appetitus de- ficit, est signum imminentis paroxysmi; nec hi ipsi sunt securi de cessatione morbi, nisi prius redeat appetitus.

Speciatim post quaslibet febres, curatas, quamdiu appetitus non redit, aut denuò pro- sternitur, semper pertimescimus recidivas. Verissimum enim est, in qualicunque etiam statu versetur æger, istud Hippocratis: in omni morbo constare mente, & bene se habe- re ad ea, quæ offeruntur, bonum: vid. *sect. 2. aphor. 33.*

Si ægri quidem appetunt, sed quæ offerun- tur, fastidiunt, malum signum est; deprava- tum enim, etiam mox defecturum innuit appetitum.

Si in morbis, etiam apparenter levibus, appetitus mox prosternitur, rarò bonum si- gnum est, & unum ex primariis signis mor- borum malignorum. Deinde appetitus in

principio & statu morbi defectus non est a- deò malum signum, modò in declinatione revertatur: sed si appetitus in fine aut decli- natione morbi de novo prosternatur, vel re- cidivæ, vel alterius cuiusdam novi morbi metum incutit. Si in principio morbi con- tinuò duret, periculosum est signum, quia virtutis vitalis magnam dejectionem & gra- viorem morbum denotat; præcipuè in quar- tanariis: item si à tumoribus similibusve ven- triculi incurabilibus morbis anorexia depen- deat.

Si pueri anorexia corripantur, periculum subest, utpote qui naturà voraces sunt, & multo alimento opus habent.

Denique est fatale signum, quando ægri in acutis febribus vel summa virium debili- tate & prostratione subito alimenta vel po- tum, quæ antea fastidiverunt, avidè appe- tunt, & assumunt.

### C U R A.

Methodum medendi quod spectat: in a- norexia curanda imprimis habenda ratio causarum, tam proximæ quàm remotæ, ut maturè removeantur; his enim sublati tol- litur effectus. Hinc si e. g. à causa externa spiritus turbentur, si per consensum nervi af- ficiantur, &c. ad hæc ipsa scopus dirigen- dus venit.

In specie, quod hic agendum superest Medico, est

1. Ut expurgentur ea, quæ vitiosa hæ- rent in stomacho; & hinc
2. Corrigatur aut restituatur fermentum stomachi digestivum.

Quæ ergò has causas removeant, sunt sto- machum evacuantia, & mucum copiosio- rem atque pinguedinem, abducentia; unde ut plurimum vomitoria, aut per inferiora purgantia, præmittenda veniunt.

Vomitoria sunt optima: hæc enim sunt, quæ commodissimè & immediatè molestum stomacho humorem vel lentorem expurgant, vomitoria conveniunt antimoniatæ, quæ utut operentur per vim stomacho inimicam & malignam, non tamen prohibet, quo minus legitimè præparata & cautè exhibita, operatus sequatur effectus. Usurpatur vel in forma sic- ca vel liquida, in infusis nempe antimonialibus.

Quando ergò appetitus est prostratus pro- pter præsentiam materiæ crassæ & viscidæ in stomacho, sequens paretur vomitorium:

℞. *va hyssop.* ʒj. l. ʒij.

*Cinnam.* ʒij.

+ *squillis.*

*syr. emet.* a ʒss.

℞ *sis compos. l. asthmat.* ʒij. ad ʒj.

M. S.

*Brech. Trānslein.*

Iis verò, qui non apti ad vomendum, aut à vomitoriis abhorrent, præscribantur purgantia per inferiora, qualia ex generalibus suprà dictis peti possunt. Interea specialiter præpollent aloëtica omnia, quæ amica sunt stomacho, sordes mucilaginosas detergunt, & easdem exhauriunt, licet amara sint: verum enim est proverbium: *Bitter ist Mund/ dem Magen gesund.* v.g. pilulæ Francofurt. seu Angelicæ dictæ: vid. Hoffmannus *Clav. Schræderian. pag. 105.* Pilulæ aloëticæ usuales Ludovici, quas videb. *in ejus Pharm. pag. 179.* item pilulæ aloëphanginæ cum scammonio acuatæ. Hæc pro evacuatione leniori assumuntur manè cum custodia; pro scopo verò stomachum saltem successivè purificandi, capiantur vespertino tempore unâ alterâve horâ ante cœnam: pro quo scopo hæc purgantia etiam cum aliis commutari possunt, v.g. cum decocto tamarindorum, si scilicet cruditas nidorosa simul adsit: conf. Rondeletius *Pr. l. 3. c. 13.* item per decoctum passularum cum fol. sennæ ad imitationem Timæi von Gûlden: & See. Ubi fortius agendum est, veterum compositio, nempe MP. de hiera cum agarico, meritò præfertur reliquis: in affectibus biliosis præscribo sæpius à gr. xv. ad ʒj. addendo simul gummi ammoniacum, extractum absinthii, &c. cum forti & acuto stimulo. e.g.

℞. MP. de hier. c. agar. gr. xij. ad xv.

Extr. absinth.

(vel loco hujus g. \*ci + o sol.) gr. viij.

scamm. ʒat. gr. j.

Extr. troch. alband. gr. ʒ. l. gr. j.

c. Elix. prop. Parac. aut Eff. absinth.

f. pilula, S.

#### Exterende Magen-Pillen.

Ubi stomachus mucilaginosâ materia fuit infarctus, sequens profuit:

℞. ▽ hyssop.

menthe ʒ ʒ.

ʒi Olari.

Extr. agar. à gr. vj.

scamm. ʒat. gr. ij.

M. f. Potio, S.

#### Exier. Tranklein.

Postquam præmissa fuerint evacuantia, usurpentur ea, quæ corrigunt stomachi appetentiam dejectam: qualia sunt, quæ vi salinâ volatili, nunc acri, nunc oleosa aromaticâ, pollent, & sordes mucilaginosas stomachi resolvunt & abstergunt: deinde conducunt acida blanda seu temperata, stomacho grata, quia præter vim stimulantem pro simili lentorem incidendi & attenuandi conveniunt usu, ac præterea blandâ suâ adstrictione tonum stomachi plus minus resolutum, firmant. Sed observandum: quod per acida provocare quidem seu irritare non nihil possumus famem, sed genuinam pro sti-

mulo digestionis præparare, Medico impossibile sit, adeoque optimum est, removere potius impedimenta: quo facto ipsa natura appetitu debito se refocillat. Parciores ergo & cauti magis in acidorum usu esse debemus, cum appetitus talis per acida quasi arte factus subinde plus noceat quam profit. Nam occasione acidæ stimuli plus ingerunt ægri, quàm naturali fermenti virtute digerere valent; unde cruditates acidæ sic colliguntur, 1000 malorum matres. Sane vix, præterquam à cremore tartari, usum proficuum in hoc casu observavi ab acidis, præsertim mineralibus, nisi forsan spiritus salis, & vitrioli Philosophicus, ab Hartmanno adeò commendati, præprimis dulcificati, in atonia ventriculi, aliquid opus contulerint, adeoque aromatica, præsertim aciora paulò, imprimis observavi proficua.

Qualia sunt salina volatilia, tam acria quàm oleosa, item aromatica & nervina; hinc mentha, in specie crispa, absinthium vulgare & Romanum, pulegium, salvia, rosmarinus, & in genere omnia nervina, sapore subacri & odore aromatico prædita, item omnia aromata, præprimis cinnamomum, galanga, caryophylli, zinziber crudum & conditum; imprimis zedoaria satis est decantata, ubi flatus sunt molesti in stomacho; sic grana piperis integra deglutita cruditates acidæ egregiè destruunt, sicut & de zingibere Platerus observavit; his confinia sunt semina calida majora & minora, item radix helenii recens singulare stomachicum est; nec minoris virtutis est calamus aromaticus verus, cujus loco substituitur radix acori veri, quæ tam cruda quam condita, & manè comesta, elegans est; item radix ari, sive recens usurpetur minutim incisa cum cochleari spiritus baccarum juniperi, vel spiritus vini; vel eadem simpliciter in loco umbroso exsiccata, & pulverisata, convenit insigniter in appetitu dejecto, & hinc dicitur vulgò *Zebr-Burgel*/ quæ non solum consumendo & absumendo materiam in ventriculo resistantem, & appetitum imminuentem, sed etiam fodiendo & irritando ventriculi parietes, & sic spiritus animales eò concitius commovendo, operatur. Hinc varia prostant ex his composita officinalia, ut species diatrion pipereon, species aromaticæ, & similia; ex simplicibus hisce paratæ essentia & elixyria, elixyr menthæ cum spiritu proprio per infusionem paratum, addito paucò saccharo; elixyr stomachale Quercetani, febrile Mynsichthi, essentia menthæ, zedoariæ, absinthii simplex & composita, pulegii, calami aromatici, & similia. Timæus von Gûldenlee facit mentionem essentia panis cum vino Malvatico destillatæ, quæ omnino non erit rejicienda.

Ex



Ex hætenus dictis paratur vinum medicatum stomachale, imprimis in malo magis chronico:

℞. *H. absinth.*  
*menth.* ʒ M. j.  
*rad. acori veri* ʒij.  
*gentian.* ʒß.  
*sem. 4. calid. maj.* ʒij.

Incis. includ. Nodulo, S.

**Püschel zum Magen-Wein.**

De quo infuso in l. q. vini, capiat æger omni die bis haustum, addendo omni haustui gutt. 6. spiritus salis dulcis.

Vel:

℞. *HB. menth. crisp.* M. iij.  
*rad. acor. veri rec.* ʒij.  
*helen. l. armorac. rec.* ʒi. ad ʒijß.  
*Zedoar.* ʒvj.  
*Cinnam.* ʒij.

Misce pro nodulo vino infundendo:

De quo æger manè & à meridie aliquot horis ante pastum, aut etiam in ipso pastu bonum haustum capiat, & egregiè appetitus allicitur.

Item:

℞. *HB. Mentha* M. ij.  
*card. ben.* M. j.  
*absinth.*  
*summ. cent. min.* ʒ M. ß.  
*rad. enul.*  
*caryophyll.* ʒ ʒß.  
*sem. sinapi l. cruce* ʒj.  
*cinnam.* ʒij.  
*caryophyll.* ʒj.

Incis. & cont. includ. nodulo, qui infusus l. q. vini. Capiatur omni manè ad libitum.

Quando simul laxandum, addi potest de *rad. belleb. nig. crud.* ʒß. *fol. fenn. s. s.* ʒj. ☉.

Imo sola radix armoraciz recens, cum ana rad. helenii rec. vino Rhenano vel absinthite, aut cerevisiæ intusa, omni mane hausta, egregium est remedium; quod insigniter commendat Gabelchoverus C. I. Cur. 14. in appetitu prostrato ex nimia visciditate & glutinositate salivæ cum nausea ac armatore in ore: idem præstat piperitis vino infusa & propinata; vel sufficiat haustus vini generosi: vel panis triticeus vino intinctus, sensim sensimque deglutitus.

Facit huc observatio Thoneri l. 3. pag. 141. qui fastidium ciborum ingens cum insigni virium prostratione & amarore oris curavit:

℞. *Rad. cichor.*  
*HB. absinth. Rom.*  
*card. bened.* ʒ M. j.  
*cent. min.* M. ß.

Decoqu. in vini & aquæ cichorei mens. ß. ad consumptionem tertix partis, de quo mane & vesperi capiat ʒß.

Similem videb. observationem in Foresto lib. 18. Obs. 8. Conf. etiam Riverius in Obs. 1. à

Pachequo communicata, & l. 9. Prax. p. 547. qui habet exemplum appetitus dejecti, per agrimoniam, absinthium, & centaurium minus in forma decocti ad aliquot dies ita aucti, ut etiam canina appetentia ferè secuta sit.

Præterea conveniunt etiam acida volatilia, non nimia, sed potius temperata, quæ inter, præter tartarum primas vias simul blande abstergentem & relaxantem, excellunt cydonia, quocunque modo usurpata; in his enim absoluta quasi cura est appetitus prostrati, imprimis cum vomitu aut alvi fluxu plus minus conjuncti; hinc Zacutus Lusitanus non satis ea commendare potest cum medicamentis ex cinnamomo. Facit huc quoque pulpa cydoniorum plus minus aromatizata, & syrupus cydoniorum simplex & aromatizatus; unde misturis ad stomachum roborandum cydoniorum succus aut syrupus permiscetur: e. g.

℞. *mentha* ʒij.  
*cinnam.* ʒij.  
*succ. cydonior.* ʒi. ad ʒijß.  
*syrup. cydon. aromat.* ʒß.  
M. f. Potio. S.

**Magen-stärkend Träncklein.**

Capiatur pro libitu.

Item spiritus mastichis acidus & panis nobilis est in affectibus stomachi omnibus; sicut & corrigit omnia purgantia stomacho adversa; item spiritus minerales acidi, cum spiritu vini ritè dulcificari, v. g. spiritus salis, nitri, & vitrioli dulcis à gutt. x. xii. l. xv. ad xx. l. xxx. pro una dosi, semper bihorio ante pastum in vehiculo, præsertim calido usurpati. Excellunt hæc inter spiritus vitrioli volatilis: item sal volatile succini acidum, ab adjuncta pinguedine liberatum, ad gr. xii. l. xv. subinde ante pastum usurpatum. Item spiritus ☉ volatilis ad gutt. xx. l. xxx. assumi potest. Optimum consilium est, ut maritentur hi spiritus cum vegetabilibus stomachicis vel aromaticis: hinc videmus Elixir proprietatis habere adjunctum spiritum acidum sulphuris vel salis, ut ita eò melius operetur: cujus dosi est ad gutt. 30. l. 40. jejuno stomacho usurpatum. Vel

℞. *Elyx. propr.* ʒij.  
*Essent. absinth.*  
*menth. l. cal. arom.* ʒ ʒj.  
M. S.

**Magen-Eisrier.**

Vel:

℞. *Conf. pulp. citri* ʒijß.  
*menth. flat.* ʒj.  
*pulv. hepat. r.* ʒij.  
*Sis coagul.* ʒij.  
c. l. q. *sy. cydonior. aromat.* f. *Electuarium.*

D. S.

**Magen-Lattwerge.**

Con-

Conveniunt etiam acetum pro condimentis in cibis, aut acetum volatilifatum & affusum zingiberi, semen crucæ l. sinapi, & zedoaria, uti & acetum squilliticum. Huc quoque pertinet pulvis epaticus rubeus, das **Gauff-Pulver** Dresdenium. Nec negligenda sunt elixyria stomachalia, quorum non vilissimum est elixyr stomachale compositum D. Michaelis, in quo conjungit aromata salina & oleosa cum spiritu salis seu vitrioli philosophico.

Hoc elixyr stomachale in scorbuto & malo hypochondriaco conjungitur cum spiritu cochleariarum hoc modo:

℞. *Elix. stomach.* ʒiij.

~ *cochlear.* ʒiij.

M. S.

### Magen-Elixier.

De hoc sumantur bis de die gutt. 30. ad 40. & insigniter appetitum renovat, & stomachum confortat: Vel

℞. *Elix. Oli Myns.* ʒij.

D. S.

### Magen-Stärkend-Elixier.

Dosis 30. gutt. bis in die, mane in vehiculo calido, vespere in frigido, semper bihorio antepastum.

De cætero alcalia eadem ratione ac aromatica operantur, v. g. sal cardui benedicti, item tinctura tartari acrior, i. e. sale alcali quasi caustico facta, ad 40. gutt. usurpata:

℞. R. *Qi acerr.*

*Elix. propr. sine acido* ʒiij.

M. D. S.

### Magen-Mixtur.

Item convenit essentia piperis cum spiritu vini tartarifato parata.

Pertinent huc etiam salsa, v. g. sal ammoniacum crudum, quod est egregium stomachicum, incidens. Idem sal ammoniacum convenientissimè cum aromatibus jungitur, & constituit pulverem stomachalem compositum: Sic pro stomacho detergendo & appetitu restaurando:

℞. *Flor. Osci*, l. *Osci depur.* ʒj.

*spec. dia 3. piper.* l. *cubeb.* l. *aliis arom.* ʒj. l. ʒij.

M. pro tribus l. 4. dof. S.

### Magen-Pulver.

Qui capiatur omni mane.

℞. *rad. ari crud.* ʒij.

*piperis nigr.* ʒij.

*Zingib.* ʒij.

*flor. Osci* ʒij.

℞ *Das. cal. arom.* ʒj.

M. f. pulvis, S.

### Magen-Pulver auff etliche mal.

℞. *lapill.* 69. *prap.* ʒij.

*galang.*

*Osci depur.* ʒj.

*piperis.*

Tom. II.

*Zingib.* ʒij.

M. f. pulvis.

℞. *Conf. summ. absinth.*

*rad. enul.* ʒiij.

*Zingib. cond.* ʒvj.

*spec. dia 3. piper.* ʒiij.

*Osci* ʒj.

c. *fyr. cydon. f. Electuarium*, S.

### Magen-Lattwerge.

Vel usurpetur vinum absinthit. cum sale ammoniaco: quo etiam faciunt tartarea remedia, ut cremor & crystalli tartari, tartarus vitriolatus, item Panacea Holsteinensium, sal tartari essentiale & similia; item liquor fol. ʒ ad 40. guttas.

Pertinent & huc pulveres stomachales salini, inter quos etiam est pulvis stomachalis D. Michaelis, item

℞. *Pulv. rad. ari* ʒj.

*arcan. dupl.* ʒij.

℞ *Das. menth.* ʒ gutt. vj.

M. f. pulvis, S.

### Magen-Pulver.

Dosis eine Messerspitze voll.

Huc pertinet etiam pulvis stomachalis Birkmanni, qui in Zvvelfteri *Animadvers. in Pharmac. August.* pag. 163. describitur.

Si anorexia ex vitio spirituum animalium & nervorum, ambra ejusque essentia aliis stomachicis juncta singulariter convenit: item vinum, spirituosum & aromaticum, potissimum verò essentia melissæ & pulegii, præprimis si juxta Hartmannum cum olei destillati bacc. juniperi aliquot guttulis, aut calami aromatici acuentur: item balsamus Peruvianus, si vel aliquot guttæ in haustu vini, aut cum saccharo propinentur, vel cum vitello ovi sorbilis assumantur, quod Riverius in *Pr. l. 9. c. 1.* ceu expertum commendat; unde R seu essentia balsami Peruviani cum Ra è tartaro parata in hoc passu foret usurpanda. Egregium quoque est electuarium stomachale Paracelsi, cujus descriptio datur in *Tom. 5. Oper.*

Vel præscribantur condita sequentia polychresta, pro senibus:

℞. *Rad. cich. cond.*

*Scorzon. cond.* ʒj.

*Conf. menth. crispa*

*absinth. Pont.* ʒij.

*fl. cichor.*

*rosar. r.*

*anthos.*

*Pulv. zedoar.* ʒj.

*acori veri*

*Cinnam. acerr.*

*Zingib.* ʒj.

*Mithridat. l. Theriac.* ʒij.

c. l. q. *fyr. menth. crispa* f. *Electuarium*.

D. S.

### Magen-Lattwerge.

Si expectantur moriuli stomachales,

(E)

℞. *Conf.*

*Rx. Conf. fl. anthos vel menthæ ʒß.  
rad. ari cond. l. zing. cond.  
spec. morf. Imperat. l. pulv. stomach.  
Birkm. à ʒij.*

*Extr. zedoar. ʒß.*

*c. f. q. sacch. in ▽ feniculi l. mentha sol. ʒviii.  
f. Morfelli,*

*irrorandi cum oleo destillato mentha.*

*D. S.*

#### Magen-Morsellen.

His adjungi possunt rotulæ bibitorix Dodonæi.

Sin pingua aut biliosa prosternant appetitum, commodè prædictum elixyr proprietatis, tam solum, quam cum amaris mixtum, & remedia ex absinthio usurpari possunt; quæ pinguedinem quæcunque potenter domant. In febribus, præsertim intermittentibus, ad revocandum appetitum amara talia, v. g. præter dicta, elixyr febrile Myns. sunt optima, quod elixyr videbitis in ejus *Armament. Chym. pag. 254.*

Si à narcoticis prostratus sit appetitus, acidæcum revocant.

Quod si verò, ut non rarò, v. g. in hypochondriacis, fieri solet, acidum p. n. ventriculi appetentiam turbet, absorbentia, v. g. lapilli cancerorum, creta, ebur &c. locum habebunt: item elixyr proprietatis sine acido; item cum spiritu salis ammoniaci paratum, essentia absinthii tartarificata, spiritus salis ammoniaci, simplex & aromatizatus.

Nec externa s. topica ad anorexiam negligenda, sed sub linimentorum, epithematum, emplastrorum, &c. formâ applicanda: inter quæ convenit crusta panis vino generoso, vel acidulo vel malvatico, aut aceto, probè ebria pulvere nucis moschatæ, macis, caryophyllorum, aliorumque aromatum aspersa, & ita instar scuti stomacho tepidè applicata; item elixyr menthæ calidè cum frustulo panis intincto ventriculo impositum, applicando desuper laterem calefactum, admodum convenit, præsertim in spirituum defectu. Balsamum Anglicum ventriculo illitum mirè etiam appetitum provocat. Convenit etiam oleum stomachale Cratonis, mastichis, nucis moschatæ, menthæ, absinthii, caryophyllorum, balsamum Peruvianum, tacamahaca, cerotum ex ladano, emplastrum stomachale Cratonis, Hartmanni. &c. c. g.

*Rx. ʒo expr. nucist. ʒijß.*

*ʒat. caryophyll. ʒj.*

*absinth.*

*mentha.*

*juniperi à ʒß.*

*M. D. S.*

#### Magen-stärkender Balsam.

*Rx. empl stomach. Hartmanni, vel de tacamah. q. f.*

*Malax. cum Bals. Peruv. & inducatur super*

*alut. sub forma scuti stomachalis.*

*D. S.*

#### Magen-Pflaster.

Pellis vulturis similiter in forma triangulari stomacho applicata, est expertum remedium: Vidi ego aliquot experientias felicissimas, ut ut videatur ridiculum. Egregia quoque est cera catholica Burri, cujus descriptionem communicavi in collegio Schrœderiano.

## CAPUT II.

*De*

### Appetitu depravato.

**Q**uod attinet appetitum depravatum, est hic vel in appetendo, vel averfando.

In appetendo est, si aliquid intensius, vel suctum vel insuetum, cum maximo desiderio appetunt, ut in pica & malacia: vid. Sylvius *Pr. l. I. c. 2.* in averfando; si certum edulii genus averiatur, qui affectus speciali nomine caret. Vocatur aliàs certorum ciborum fastidium, quando scilicet determinatè fastidiuntur cibi, v. g. omnimodè averfantur caseum.

## ARTICULUS I.

*De*

### Fastidio seu averfatione determinata.

**F**astidium hoc seu averfatio, est vel nativum vel adventitium: ita, ut nativum non tantum per dispositionem hæreditariam à parentibus in prolem propagetur, sed frequentius à matris imaginatione dependeat, ob quamcunque causam gestationis tempore pro ingratis judicata, alimenta averfantis: Adventitium verò post nativitatem excitatur:

1. Vel à mero quodam præjudicio, hæc vel illa alimenta pro ingratis habente.
2. Vel ab alimentis ipsis, in nimia copia vel ad nauseam oblati, vel iisdem non satis mundè paratis vel oblati.
3. Aliquando verò ab humorum, e. g. vitiosorum ventriculi fermentum corumpentium affluxu, ut in gravidis sæpe observatur, quorum indolem explicare difficile est, nisi ex aliis conjunctis symptomatibus eam forsan augurari liceat.

Cum autem rariùs occurrat in praxi, mittamushanc averfationem.

## ARTICULUS II.

*De*

### Pica & Malacia.

**P**ica in genere est appetitus ita depravatus, quando quocunque tempore inusitata penitus appetuntur; Malacia verò est appetitus quidem nimius, usualium tamen, ita ut usitata, sed cum nimis intenso appetitu seu desiderio

rio



rio appetantur, unde & interdum plus, quàm conducit, comedunt. Sic v. g. pica est, quando grvida appetit crudas animalium carnes, condimenta & medicamenta in majori quantitate, e. g. zingiber & theriacam: vid. Platerus *Obs. pag.* 239. carbones, cespites, corium, atramentum, cretam, plumbum: vid. Tulpius *lib.* 4. *Obs.* 43. vel noxia, ut calx viva, &c. quod refert Fernelius. Malacia verò est, quando certum edulii genus, v. g. haleces: vid. Tulpius *lib.* 2. *Obs.* 24. & alios cibos & potus usitatos, sed utrumque appetitu nimio & inconveniente, appetunt: patiuntur sæpè anxietates præcordiorum, languorem universi corporis, & supervenit vomitus variorum humorum, nisi voti sui compotes fiant.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta primaria ordinariò statuitur stomachus, imprimis orificium sinistrum, ejusque fermentum: Ubi enim fundamentum est, & quasi residet appetitus naturalis, ibi quoque residebit p. n. & depravatus. Sed si ritè rem consideremus, manifestum evadit, distinctum in hoc morbo complicato esse subiectum patiens: appetitum nempe læsum & phantasia depravatam, gustum, odoratum, auditum, seu horum sensuum organa depravata.

Phantasia affici, ex eo certum est, quod homines, dum stomachus appetitu sensili, ut sic dicam, afficitur, seu à fermento digestivo vellicatur, ferantur singulari affectu in tam varia, ut sunt creta, corallia, murorum calces, carbones, atramentum, &c. Namque non stomachus seu fermentum præcisè, sed phantasia est, quæ determinat appetitum ad hoc vel istud, e. g. in pica. Ergo & utique phantasia vitium habet. Si inter fermentum stomachi, ejusque in nervos operationem, & inter appetitum hinc consequentem animale, intercedit intermedium phantasiæ opus, necesse est, ut prius phantasia, quæ id, quod à reliquis sensibus externis & interno communi susceptum fuit, componendo & dividendo quasi actuperficat, pravè afficiatur, à quacunque causa occasionali fiat, quæ tamen frequentissimè in ventriculo fomitem seu nidum sibi eligit: Adeoque picæ & malaciæ sordes primaria in facultate animali, i. e. subiectum inhesionis in spiritibus animalibus erit locandum.

Quod gustus afficiatur, certum est ex eo, quod aliæ quoque res fœtidæ & pessimi saporis, & à quibus in statu sano ægri maximè abhorrent, cum insigni voluptate deglutiantur: quin & interdum dicant, habere talia suavissimos saporis. Exemplum videbitis in Salmuth *C. 2. Obs.* 62, de virgine, quæ omnia candida, & inter alia etiam calces parietum abra-

fas, ac cerussam, singulari voluptate devoravit, & earum deprædicavit suavitatem ac dulcedinem. At Borellus *Cent.* 4. *Obs.* 2. habet exemplum de virgine picante, quæ stercora humana comedit, quæ non sunt adeò sapida, & tamen cum insigni gustu appetita deglutivit: unde certum est, affici gustum sine dubio à lymphâ salivâ corrupta, & gustum depravante, quia alias talia ingerere non possent. Res illustrari potest ex eo, quod suppressio mensium in mulieribus creberrimè det picam, quando scilicet sanguis separatus, in valis uteri, ab externa vel alia causa coagulatus, stagnans inquinatur, indeque ad corruptelam sui tendens, ob denegatam excretionem sensim sensimque regurgitat in totam massam sanguineam; unde consequenter & afficitur lymphâ, quæ, uti per internam tunicam stomachi glandulosam transsudando, ad supplementum fermenti digestivi concurrat, ita eadem spirituum vehiculum salivæque materia existit. Dum igitur saliva infecta est, non potest non lingua simul affici, & gustus depravari, unde saliva non minus, quam fermentum stomachi vitale, simul affectum est in pica. Fracassatus equidem in *Epist. de Lingua pag.* 255. gustandi hanc in pica depravatam voluptatem à papillis nerveis vitiatas in lingua deducere nititur: sed ego consultius puto, si fundamentum constituatur in saliva.

Afficitur etiam odoratus, quatenus res fœtidæ cum singulari jucunditate naribus admoventur. Exemplum affecti odoratus habet Salmuth *C. 2. Obs.* 63. de virgine picante, quæ insigniter delectabatur à fœtore veterum librorum, à tineis blattisque erosorum, siturque prorsus corruptorum, ita ut nares per totos dies in tales libros immitteret, & odorem suavem, uti dicebat, hauriret. Item Borellus citato loco aliud exemplum habet de virgine picante, quæ intensissimè afficiebatur odore corii, tanquam balsamo, quare semper in ore detinuit & masticavit, ut perciperet odorem suavem, quæsititque calceos vetustissimos, quorum odorem fœtidissimum moscho & ambræ comparavit.

Hæc probant, esse non simpliciter affectum stomachum, sed insimul phantasia spiritusque animales, & hinc gustum & odorem, cæteraque sensoria. Id quod ulterius confirmatur ex eo, quod picantes non præcisè in alimenta ferantur, aut in talia, quæ alimenterum loco ab iis ingeri possunt; sed etiam in alia aliorum sensuum, non præcisè gustus aut tactus, in stomacho objecta: v. g. dum pica impellit mulierem ad exsuctionem venti ex foliis, vel dum alia per picam appetit fragorem carbonum fossilium pedibus contritorum: qualia exempla cum præcisè ex stomacho, secundum certam famis vel sitis modificationem affecto, non oriantur, potius phan-

phantasie suo modo aberranti rectius tribuntur. Conf. *Acta Societ. Reg. Volum. 1. pag. 447.* Distinguendum ergo videtur inter subiectum inhaesionis, quod revera stomachus, & obiectum Denominationis, quod est facultas animalis, ratione spirituum animalium in phantasia alteratorum.

### C A U S A E.

Quod attinet causam appetitus talis depravati, certum est, hærere in fermento digestivo stomachi. Nam sicut in genere appetitus oritur à fermento stomachi digestivo vitali naturaliter ritè constituto; ita in specie etiam ab eodem alterato appetitus vel auctus vel depravatus in pica & malacia originem ducit. Videmus enim quod omnia animalia habeant in suo genere determinatum stomachi fermentum digestivum, ratione cuius fermentum istud se habet, teu appropriatum agens menstruum, hinc unaquæque species fertur in cibum certum: sic canis appetit ossa, scyurus fructuum nucleos, felis mures, ciconia ranas, anser avenam, bos gramen, carduelis carduum, homo panem, &c. Unde simili ratione pica & malacia oriri videtur, nimirum dum certa ratione alteratum & determinatum est fermentum stomachi, ut in insuetà & singularia, nunc hoc, nunc istud, v. g. cretam, carbones, arenam, atramentum, &c. ardentè feratur. Sed in quo consistat ista specificatio fermenti, ut in singulis speciebus certo modo determinetur, & ita in unoquoque speciei individuo appetitus determinetur ad hoc vel istud? à priori adhuc est imperscrutabile. Ideæ certæ spiritibus impressæ, quas hic accusare volunt nonnulli, & intellectu & explicatu sunt difficillimæ, utut nativa quorundam ciborum appetentia per certam spirituum in utero matris alterationem facile & accuratè explicari queat.

Probabile interim videtur, fermentum ratione causæ occasionalis, ut plurimum in ventriculo existentis, acquirere singularem acrimoniam, eamque acrem, salam, plus minus corrosivam, cuius occasione tam determinata & sensibilis fit vellicatio, pro cuius varia impressione in orificium stomachi phantasia exinde decepta tam varia edulia, aut quæ horum loco ingeruntur, imò & subinde ridicula, appetit. Depravationem istam fermenti, quoad occasionales causas, confirmant exempla eorum, qui ex scabie retropulsa picam cretæ inciderunt: vid. M. A. N. C. *Ann. 1. Obs. 83. pag. 199.* item Fehr tr. *de absinthio pag. 98.* Sic cum scorbuto interdum pica & malacia complicari solet, de quo vid. Horstius *Obs. l. 7. Obs. 35.* Illustrat etiam istud assertum Hildanus *Centuriâ 1. Observatione 37.* dum refert: Picam abortam ex ulcere faucium, in quo pus generatum; unde appe-

rebantur haleces, pisces, & carnes salitæ & infumatæ, & similia falsa, quæ optimè deglutiebantur; res non appetitas verò, juscula, &c. fastidiebat, & nullo modo deglutire poterat, dum interim superiora, licet graviora & morbo nociva, sine ulla nocumeto benè digerebat. Nempe ex ulcere faucium exstillans pus in stomachum, alteravit ejus fermentum digestivum, istudque pro natura puris acrioris acidò falsi singularem impressionem fecit in orificio stomachi, & ad comestitionem halecum & similibus salitorum quasi stimulavit.

In specie malum hoc frequentius observatur in mulieribus gravidis; Riverius tamen curiosum exemplum habet *C. 4. Obs. 93.* de felle aliquandiu picante, non quidem grvida, sed tamen sterili, quæ devoravit calcem, carbones, & similia; unde liquor genitalis, vel aliud simile excernendum corruptum & suppressum, occasionem malo suggestit: sic picæ simile exemplum de cane venatica grvida videt in *Actis Societ. Reg. Volum. 1. pag. 447.* Non tamen gravidas solum eâ laborare, probare possunt similiter puellæ adhuc impuberes picantes, v. g. pica in puella 8. annorum observata in M. A. N. C. *Ann. 4. Obs. 143. pag. 150.* Sic pueri, item infantes picantes subinde observantur, imprimis ex matre chlorosi laborante, quod testatur Riverius in *Praxi*, & Petrus Johannes Faber, qui in *Curat. 62.* habet exemplum de proprio filio 3. annorum pica laborante, qui arenam, cineres & terram efflagitare, & magno cum appetitu iis vesci solitus fuit, lac verò & alios cibos omninò respuit. Conf. etiam M. A. N. C. *Ann. 6. Obs. 139. pag. 202.* Forestus *libro 18. Obs. 7.* & Fonsseca *l. 7. Obs. 91. in Schol.* Nec mulieres tantum, sed etiam viri non rarò pica & malacia laborare deprehenduntur: Exempla multa videbitis in Schenkii *Observat. l. 3. Obs. 1. pag. 319.* Ut nihil dicam de curiosa observatione, quam habet Bartholinus *Cent. 3. Hist. Anat. Hist. 79.* de marito picante, nauseante & vomente, cuius conjux grvida nausearet & vomeret: simile exemplum vid. in M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 215. pag. 316.* & Marcello Donato in *sua Hist. Med. l. 5. c. 1.* Quod si intentior sit picantis matris gravidæ appetitus, malum hoc non rarò est hæreditarium: quale exemplum habet Fonsseca *l. 2. Consil. 9.* de puella 14. annorum, quæ à tenera ætate infantili calcem parietum, & laterum fragmenta sæpè appetiit, & deterreri nullo modo potuit: quia mater grvida quoque testas & calcem comedere solita fuit. Quo etiam facit historia, quam habet Tulpus *Lib. 2. Obs. 24.* Novi hic mulierem, quæ impensè delectata cuspidibus acutis cretæ, cuius mater grvida melancholiâ hypochondriacâ correpta, his delectabatur.

Rarò

Rarò talia appetita nocent; sic picans sæpè aliquot cochlearia theriacæ, aliaque mulier *libj. zingiberis*, devoravit sine ulla insequente alteratione & noxa; teste *Platero Obs. l. 1. pag. 223.* Quo facit observatio *Tulpii l. 2. cap. 24.* de gravida, quæ gestationis tempore 1400. haleses devoravit sine noxa; Item stupendum est exemplum, quod habet *Platerus l. 4. pag. 240.* de puella, quæ cepam sub cineribus coctam theriaca impletam (quæ antea buboni pestilentiali fuit imposita) sine noxa devoravit. De la Forge, *Comment. super Cartes. de Homine pag. 285. & 286.* refert exemplum de puella picante, quæ comedit lapides; qui tamen fuerunt gratiores, quando prius ad tempus radiis lunæ expositi fuerunt.

Ex hæcenus dictis definiri potest pica, quod sit appetitus variarum rerum absurdarum, ex phantasia corrupta, quâcunque occasione vitiata, originem ducens. Adeoque sub hac latitudine subjectum picæ erunt spiritus animales, vel vitiati, vel vitiatè moti, quatenus exinde opus phantasie depravatur, utut crebrior occasio sit ex ventriculo & hujus fermento alterato, ubi subjectum radicationis erit.

Causa proxima erit vitiatus spirituum motus, quatenus phantasie munia turbat.

Causa remota occasionalis est multiplex, mensium defectus, gravidatio, fermenti digestivi alienatio, & quæ sunt aliæ plures circumstantiæ, semper hæc probè observandæ.

Uno nomine: videtur pica & malacia reverà esse species melancholice hypochondriacæ, quia ejusmodi homines aliaut plurimum melancholice signa præ se ferunt, in qua ad certum quoddam phantasma, occasione fermenti stomachalis p. n. alterati, dirigitur imaginatio; unde & tam delirus appetitus, & desiderium ad certum quoddam edulium, vel hujus loco aliud quid inusitatum assumendi, supervenit.

Nempe talia casu

- (1.) Imprimis stomachus evacuandus.
- (2.) Fermentum vitiatum acrius acidofalsum factum, saturandum, vel alterandum; et
- (3.) Stomacho acidis moderatis & ipsi gratis succurrendum.

### S I G N A.

Quod attinet signa: res est clara, quoad diagnostica.

Quoad prognosin: distinctè paululum & circumspicte pronunciandum: Nam citra noxam possunt comedi res appetitæ, sed sobriè: melius tamen est consueta, quàm planè inconsueta, imò noxia, appeti. Quamvis enim feminas talia p. n. sæpius sine damno assumpsisse observatum fuerit, quatenus nempe ex copioso rerum absorptarum esu tractu

temporis pravi tandem humores inde generantur, hincque fiunt corporis languor, cacochymia, hydrops, &c. potissimum cum vix semper sine noxa talia assumant, sed ab iisdem vel ad vomitum urgeantur, vel alia mala patiantur: quale quid, præter *Salmuth C. 1. Obs. 41.* *Brassavolus in Comment. Sect. 5. Aph. 24.* de muliere testatur, quæ mota desiderio assumendi glaciem, gravi incidit symptomata.

In prægnantibus imprimis observandum: eas denegationem rei appetitæ non semper ferre posse, quia per hanc fœtus non saltem variâ ratione defœdantur, vid. *Panarollus Pentec. 1. Obs. 12.* sed interdum trucidantur: cum notum sit de muliere, quæ duabus vicibus dentes in pectus cujusdam viri immittere, atque sic binis moribus petere gestiit, qui vit autem primum quidem morsum perculit, alterum verò recusavit: unde factum, ut duos filios in lucem ediderit, unum viventem, alterum mortuum. Iucundius exemplum habet *Salmuth C. 1. Obs. 41.* de muliere gravida, quæ picâ laborans summam habuit libidinem vellicandi barbam lanionis, unde magnam partem illius evulsit; quod etiam alterâ vice fecit; tertiâ verò vice lanio denegavit: hinc peperit tres fœtus, unum mortuum, & duos vivos. Unde vel ipsis connivendum, vel, quantum possibile, persuasionibus ad sanio rem mentem deducendæ. Interim rectè *Panarollus Pentec. 2. Observat. 50.* inquit: *Temperantia mulieribus picâ laborantibus optimum remedium.*

### C U R A.

Quoad curam: suprâ jam formatæ fuerunt indicationes, & cum præsertim pica & malacia in stomacho fundata sit, remediis stomachicis curanda venit. Ante omnia evacuandus stomachus vomitorio. In gravidis tamen cautius vomitus provocetur: nempe si saltem, quæ facillè vomunt, & adhuc in primis versantur gestationis mensibus: in ultimis, quarto, quinto & sequentibus mensibus non sine periculo propinantur. Faber pro vomitorio utitur sale vitrioli vomitivo, ut & infuso Mercurii vitæ: Mercurius vitæ per se est satis tutus: nec inepti sunt, qui cum desideratis vomitoria miscent, aut hæc illis superbibere jubent; sic enim præsentia rei exhibitæ ejus desiderium tollit, & humor pravus simul evacuatur: vid. *Sennertus Pr. l. 3. S. 2. C. 5.*

Si vomitoria locum non inveniant, purgantia per inferiora administranda, & quidem mitiora ex pilulis, præprimis aloeticis: quibus admiscendum est aliquid Mercurii dulcis ritè parati; Agricola miscet cum extracto hellebori nigri. Iurgando mulieres non gravidas, ex mensium suppressione pica laborantes, hoc modo:



℞. *℥* dulc.*Extract. helleb. nigr.* à *℥℥*.*Colocynth.* gr. j.c. *succo cydonior.* f. *pilula*, S.*Laxier-Pillen.*

Conveniens quoque est, ut purgantia propinentur simul cum re appetita, imprimis ut fallantur ægri.

Quod si verò totam humorum massam male se habere innotescat, juxta Sylvii *Praxin* l. 1 c. 2. §. 51. sudores quandoque blandos per antimonialia movere conveniet.

Præmissa evacuatione opera danda, ut alteretur vitium in ventriculo, ac corrigatur labes fermento stomachi digestivo inducta, quod fieri nequit, nisi causa istius removeatur. Hinc si v. g. menses suppressi sint, revo-centur: si aliquid affectionis hypochondriacæ subit, hæc tollatur. Hinc dentur stomacho grata & appropriata acida blanda, spiritibus volatilibus nonnihil temperata; quæ inter in regno vegetabili excellunt succus & syrupus cydoniorum, limonum seu citri, aurantiorum, granatorum acidorum, &c. Specialiter etiam commendatur à quibusdam aqua pampinorum vitis, primo vere ex vitium surculis incisis exstillans, usurpando vel solam, vel etiam diluendo cum *℥* theriacali, succo citri vel aurantiorum in forma julebi. Forestus l. 18. obs. 7. puellam picantem curavit per syrupum de ablynthio sæpius usurpatum, propinando postmodum purgans ex foliis fennæ. Commendantur etiam cappares cum aceto conditi, seu experti, quibus nonnunquam etiam solent addi semina carminativa, anisi, fœniculi, carvi, &c. Essentiam corticum aurantiorum cum essentia croci pauxillo in pica à menstruorum suppressione adhibuit cum successu Quercetani imitatus Fermisius: vid. Velschius *Mi-Elomim. Cent. 3. Obs. 12.* radices petroselinii cum decocto cicetum propter vim diureticam itidem conveniunt: haustus vini generosi itidem conducit, imprimis si sit infusum super folia menthæ vel portulacæ, & HB absynthii. Lindanus in *Coll. super Hartmannum* specificè commendat conservam rosarum cum spiritu vitrioli acidulatam; cui addit pulverem Zedoariæ in hac forma:

℞. *Cons. rosar.* *℥j*.*pulv. Zedoar.* *℥j*.— *℥* li q. s. ad grat. aciditat.M. f. *Electuarium*, S.*Magen-Lattwerge.*

De hoc subinde aliquid assumitur ter de die, mane, meridiæ & vespere:

Vel ℞. *Cons. mentha crisp.* *℥* lat. *℥jv*.*pulv. zedoar.* *℥j* ad *℥ij*.*syr. cydon. aromatiz.* *℥* s.F. *Electuarium*.

Item convenit aqua cinnamomi cydonia-

ta, vel sola, vel cum Elixyr menthæ imprægnata, & acidulata cum tantillo spiritus vitrioli Philosophici, v. g. præmissis præmittendis fiat mixtura stomachalis talis:

℞. *℥* ment.*meliss. cum vino* à *℥j℥*.*succ. cydon.* *℥j*. l. *hujus & succi citri* à *℥℥*.*Elix. mentha* *℥vj*.— *℥* is *dulc.* *℥℥*.*syr. de succo cydon.* pro lubitu.M. f. *Posio*. S.*Magen-Mixtur.*

Sylvius in praxi modernorum commendare solet salia volatilia, non communia, sed oleosa, seu oleis vegetabilium imprægnata: sed cautè adhibenda, quoniam sunt generosa nimis, & metus est, ne aliquando causent abortum.

Imò narcotica quoque, v. g. theriaca & Mithridatium magnarum observantur virium.

Interdum in graviore malo, imprimis gravidarum, saturandum & absorbendum est fermentum acre in stomacho; unde ad pulveres cachecticos & Martialia confugiendum est: vid. Brendelius *Consil. 103*. Ideo Riverius *Cent. 4. Obs. 23*. specificè commendat pulverem stomachicem Quercetani seu Birkmanni completum, qui vid. in Schröed. *Pharmac. l. 2. pag. 266.* & Zvvelfferi *Animadv. in Pharmac. Augustanam*; nec non crocum martis aperitivum, & hunc expertum dicit in pica mulierum, ex quacunque causa orta. Dantur & alii pulveres cachectici, quorum basis est Mars, loco cujus etiam corallia, terræ, perlæ, mater perlarum, ebur, & similia absorbentia, fermentum saturantia, adhibentur: quibus præmissis purgatio per pilulas Mercuriales instituenda venit.

Quæstio est: an venæ sectio conveniat in picantibus gravidis? & quibus ob mensium suppressiones hic affectus venit, etiam conveniat? Equidem de iis, in quibus menses suppressi, dubium non est, quin saphænæ sectione, suo tempore institutâ, multum adferatur auxilii. Interim non opus est, ut præcisè venæ sectio semper in tali affectu administretur, nec nisi plethora aliavé indicantia adsint, quæ venæ sectionem suadeant. Sic enim refert Rhodius in *Cent. 1. Obs. 57.* de quodam, qui scabie tædatus, & malacia insigni laboravit, & curatus fuit solo hæmorrhoidum fluxu. Unde sitientandum esset aliquid in tali affectu, ad naturam melancholiæ hypochondriacæ accedente, hirudinum ad hæmorrhoides applicatio interdum utilis videtur.

Ulterius observetur in gravidis, ne inferatur noxa fœtui, eas non semper denegationem rei appetitæ ferre posse; si enim denegatur ipsis res appetita, læduntur infantes. Ex tali casu observavit Schottus in *Physic. curiosa* puerum

puerum à pane abhorrentem, ex vicio matris, cui pianti denegatus fuit panis. Aliud Marcus Marci refert de ideis: Gravidam scilicet cum appetitu summo usam fuisse carpionum capitibus, increpara ab hoc, averfata fuit, ediditque puerum, cujus dimidia pars capitis fuit instar capitis carpionis: Vid. porro Salmuth, qui jucundum habet exemplum *C. I. Hist. 34.* Si res appetita à muliere non planè contranaturam est, e. g. arsenicum, & haberi potest, concedatur; non verò in nimia dosi. Interim imitemur artificium Panarolli, ut nempe persuasionibus & fraude defraudentur, i. e. modò ægrorum desideriis adstipulando, modò vel directè vel indirectè eadem detestando. Erat autem tale: Habuit puellam 12. annorum, devorantem corium inauratum, persuasit ei, pessimum habere saporem, illini- vit decocto colocynthidos cum particula asæ scetidæ; percipiens saporem, spontè cessavit: vid. *Pentec. 3. Obs. 38. & 50.*

## ARTICULUS III.

De  
Fastidio alimentorum.

**V**id. Sylvius *Prax. l. 1. c. 3. p. 33.* Contra- rium vitium modò explicatis affectibus est Fastidium alimentorum, scilicet nausea & horroris seu averfationis species.

## CAUSÆ.

Averfatur autem ventriculus, quæ ipsi sunt nociva, dum hujus fermentum pinguedine vi- tium est, sive sint assumpta pingua, sive cru- ditas nidorosa, sive saliva biliosa, stomachum lædens: sicut etiam ingenitum, seu ex certa læsione superveniens fastidium, semper præ- supponit præcedens nocumentum: v. g. fa- stidit & horret virgo cinnamomum, quia an- teà cum hoc larvatus fuerit pulvis purgans vi- olentus, à quo stomachus admodum fuerat læsus. Præ cæteris frequentius horrent ægri febricitantes carnem, quia læduntur ab ejus assumptione, quatenus non digeritur, sed in cruditatem nidorosam, & in liquamen ama- rulentum, degenerat, à quo offenditur ven- triculus. Horrent ægri tales cerevisiam lu- pulatam, partim propter amarorem, cum ta- les ægri subinde de molesto amarore in ore, aut de ructibus nidorulentis conquerantur; partim quod non digeratur, sed & ipsa facilè nidorem hostilem contrahat: Unde vel aquam vino temperatam, vel cerevisiam se- cundariam desiderant, cum talia facilè trans- eant, & suavi subacido sapore amica sint sto- macho. Observavi exinde, quibus ægris ad- huc cerevisiam benè bibentibus, crebrius propter urgentia symptomata, & repetitum, exhibitum fuit opium, quod exinde horrorem cerevisiæ contraxerint, propter nauseosum opii amorem, ventriculum offendentem.

Hinc quibus amata dantur purgantia, resino- sa præsertim, ut siti subinde urgentur, ita ce- revisiam ferè horrent, aquosa vel acidula ferè appetentes: Ob id julepi aciduli tam grati sunt talibus. Ob id, quamdiu cerevisia benè sapit quibusvis in morbis, præsertim acutis, bonum signum esse solet. Abstemiam à vi- no videb. in *M. A. N. C. Ann. 4. Obs. 103.* à pa- ne *Ann. 6. Obs. 158.*

## CURA.

Ad restaurandam autem suavitatem & faci- lem assumptionem cerevisiæ & carnis, nil me- lius observavi, quàm elixyr proprietatis Para- celsi ritè paratum & propinatum; Ab hoc enim adhibito appetitus talium redit, eoque curatur fastidium. Absinthium, uti etiam remedia ex mentha, imprimis elixyr menthæ, cum spiritu acido quodam acidulatum: hinc cydoniata, succus seu vinum, & syrupus cy- doniorum, cydonia condita, & similia, opti- mè conferunt.

## CAPUT III.

De  
Appetitu nimio.

**A**ppetitus nimius est, quando augetur, ita ut plus quàm naturæ legitimus cursus permittit, appetamus. Hic duplici vo- catur nomine: uno appetentia canina; alte- ro Bulimus.

## ARTICULUS UNICUS.

De  
Appetentia Canina & Bulimo.

**A**ppetentia canina, vulgò *Heißhunger* / dicitur à similitudine canum: quoniam taliter affecti alimenta non comminuunt, sed copiosè deglutiunt, interdum etiam evomunt, instar canum. Bulimus verò, vulgò *Wolfs- Wogen* / denotat ingentem famem. Dici- tur *Βελιμω* ideo, quia Græci omnibus rebus insignioribus vocabulum *βλ* præposuerunt: vid. Voigt *de albed. nivis p. 100.* Vulgò qui- dem appetentia canina & bulimus confun- duntur, & pro eodem affectu habentur: sed malè. Hæc inter autem talis est differentia: appetentia canina est continua, inordinata, & ferè inexplebilis fames, quando ægri instar canum avidè ingerunt alimenta intensè appe- tita, quæ aut promptè digerunt, aut, quod frequentius contingit, denuo indigesta evo- munt. Bulimus verò est tam intensa fames, per intervalla saltem recurrens, ut ægri ob id etiam propter stomachi orificium superius molestius affectum, per ejusdem consensum animi deliquium patiantur: vid. Sennertus & Riverius. Non tamen semper cum cani- na appetentia conjunctus est vomitus, ut re- statur

statut observatio Sennerti *l. 3. Pr. P. 1. Sect. 2. c. 4. p. 101.* Bulimus verò cum lipothymia seu defectu animi conjungitur.

### SUBJECTUM.

Subjectum morbi sine dubio est orificium stomachi sinistrum.

### CAUSÆ.

Causa autem appetitus aucti, tam in Bulimo, quam appetentia canina, est vel in vel extra ventriculum. In ventriculo causa proxima est succus acidus vel nimis corrosivus in stomacho residens, isque volatilis vel penetranter activus, adeoque non à materia viscida irretitus seu fixus, sed subtilis & quasi spirituosus in stomacho, orificium sinistrum insigniter vellicans seu morficans: Veteres, dum producant succum melancholicum, hoc ipso succum acidum in stomacho confirmant: nam Hippocrates ordinariè melancholicum succum per acidum describit, dum subinde melancholiam comparat cum aceto acerrimo. Petrus, & antiqui Galenici, adducunt bilem porraceam & æruginosam, seu mixturam illam, primariò ex acido insigni stomachi & bile resultantem; unde etiam infantes, quibus frequens est rejectio talis bilis porraceæ & æruginosæ, tunc temporis patiuntur tormina ventris, & exulcerationes ani; propterea, quoniam acidum etiam has exulcerationes producit: Hinc idem est, ac si dicant, peccare acidum corrosivum in stomacho. Hermeticorum schola, uti microcosmi actiones & operationes per macrocosmum definit, confugit ad spiritum salinum esurinum & vitriolicum famelicum, qui spiritus salinus acidus & acris cum sit acerrimus in stomacho, quicquid ingeritur, promptè celeriterque concoquit, & omnia assumpta, tanquam fortissimum menstruum dissolvit. Nec deest experientia: siquidem acida assumpta, imprimis verò ✱, succus citri, spiritus vitrioli & similia, uti naturaliter appetitum stimulant; ita & à similitudine effectuum poterit argumentari, quod talia intensiora in stomacho famem p. n. intendunt, & quæ ejiciuntur in appetentia canina per vomitum, acida plus minus viscida esse solent: teste Fonseca *l. 2. consult. 86.* & Horstio *l. 4. obs. 4.* Confirmant hoc etiam hypochondriaci & melancholici, qui ob acidum notorium laborant appetentia canina, & Blasius *Observ. Anat. p. 122.* ventriculum inexplebili fame laborantis acidum spirasse nidorem testatur: Ob simile enim acidum excedens canes non tantum ingerunt dura ossa, sed eadem etiam feliciter digerunt.

Præter acidum etiam acrimonia urinosa s. alcalica, maximè volatilis & activa, famem caninam causare probabile reddit, quod iis, quibus bilis per ductum peculiarem ad ventri-

culum defluit, & voraces quoque observentur: vid. Vesalius *de Hum. Corp. Fabr. l. 5. c. 8.* & Moebius *Fund. Phys. c. 10.* præprimis cum Poterius *C. 3. Obs. 96.* testetur, se acidis famem caninam curasse.

Huc etiam pertinet orificii & membranz nerveæ ventriculi nimia sensilitas, quæ spiritus copiosius allecti continuam famem excitant. Atque hæc quidem ordinariæ sunt appetentiæ caninæ causæ.

Extraordinariè etiam evenit, ut appetentia canina interdum oriatur à vermibus latis, sive in ventriculo producantur, sive ex intestinis huc conscendant; alimenta & chylum absumendo, & ventriculum rodendo, exemplum vid. in Tralliano *l. 7. c. 14.* Zacuto Lusitano *Med. Princ. Hist. l. 2. Hist. 68.* & Schenckio *l. 3. obs. 2. p. 318.* Vid. etiam Marcellus Donatus *Hist. Mirab. l. 4. c. 2.* Bonetti *Sepulchret. l. 3. Sect. 2. Obs. 9.* Sic B. D. Michaelis aliquando retulit, curasse se scæminam scorbuticam similiter appetentiâ caninâ laborantem, quæ post usum iucci nasturtii aquatici rejecit lumbricum latum insignis longitudinis, & exinde appetentia canina promptè cessavit.

Verum, an vermes soli possint inducere caninum appetitum? meritò dubitatur, propterea, quoniam taliter appetentes, uti promptè appetunt, ita promptè digerunt, quod fieri nequit à vermibus. Putarim ergò, unâ cum vermibus in intestinis simul adesse acidum succum esurinum nimium, à quo & appetentia oriatur, & etiam digestio succedat, quæ non solos præsupponit vermes.

Extra ventriculum ansam ex rebus non naturalibus præbet inedia, & longior alimentorum denegatio; ex præternaturalibus omnes evacuationes chyli & sanguinis immoderatæ.

Cæterum, utut tales, caninâ appetentiâ laborantes, multa devorent, & citò digerant, rarò tamen solent pingues fieri; sed potius emaciantur. Ratio est; quoniam in talibus ob acidos succos, & acriores etiam in corpore luxuriantes, massa sanguinea redditur aspera & minus nutritiva. Videmus hoc in scorbuticis, qui laborant atrophia propter excessivum acidum rancidum, specifici tamen saporis, à quo massa sanguinea aspera reddita minus potest nutrire corpus. Unde rarum est exemplum, quod habet Amatus Lusitanus *C. 7. Curat. 37.* de muliere melancholica, ingenti fame correpta, quæ ob id multa & copiosa devorabat, & cum arida fuisset & emaciata, exinde tamen postmodum pinguis fuit reddita. Rarissimum est, quod Schenckius *l. 3. ubi de fame canina, obs. 6. pag. 319.* famem caninam periodicam observavit, quotannis circa solstitium invadentem, & quidem tantummodò 20. dierum spatio persistentem, consequente ingenti ciborum fastidio; qui ipse itidem observationem habet famis caninæ epidem-



demica grassantis, c. l. obs. 1. p. 318. Sicut etiam rarum est, quod observatus fuit appetitus caninus epidemicus, quo fuit quidam curatus beneficio boli Armenæ, cujus usu vermes copiose ejecti sunt: vid. Forestus l. 2. obs. 28. in Schol.

Quod attinet bulimum cum animi deliquio: hic easdem habet causas, utut mitiores: attamen propter orificii stomachalis, & membranæ nervæ nimiam sensilitatem cum aliquali spirituum animalium dispendio aut corpore, ad lipothymiam tandem disponit. Distinguendum autem hic est inter appetitum verum & falsum: Falsus enim est, qui etiam interdum ægris ferè in ultimo mortis agone evenit, & est quasi imaginarius, & venit ex aliquali impetu delirioso, & malum signum est, præprimis si per totum morbi cursum sine appetitu fuerint.

### S I G N A.

Quod attinet signa: Diagnosin est facilis.

Quoad Prognosin: affectus hic ut plurimum est citra periculum; facile enim restituntur, nisi ob animi deliquium interdum imminet morbus, aut exinde deficiat æger, præprimis si ventriculo adhuc repleto illud contingat, aut magnas evacuationes & colliquationes corporis sequatur.

Post morbos, imprimis febres, in statu reconvalescentiæ sæpius solet invadere appetentia, caninæ similis; quæ tamen est sine periculo, signum potius est naturæ se recolligentis. Cæterum nisi ægri sint moderati & temperati, aut si nimis comedant, solent pati recidivam: vid. Riverius *Prax.* l. 9. c. 2.

Quæ canina appetentia cum vomitu aut frequentioribus dejectionibus perseverat, periculosa est, quatenus in cæchexiam, hydropem, tabem, &c. degenerare solet.

Bulimus superveniens morbis chronicis, quartanæ, hydropi, &c. rarò est citra suspicionem funesti eventus.

### C U R A.

Quod attinet curam: in hac duæ primariæ attendendæ sunt indicationes:

1. Est, ut temperetur acidum istud acre volatile.

2. Ut temperatum evacuetur.

Ea, quæ acre acidum istud temperant, ex superioribus sunt notissima, & in specie triplicia: (1.) Sunt salia alcalia dicta, tam volatilia quam fixa, præsertim posteriora. (2.) Sunt corpora terrea, & marina, absorbentia communiter dicta. (3.) Sunt pingua aut mucilaginosa, hisque similia, quæ obtundunt, & hebetant acidum: vid. Barbette *Prax.* p. 120.

Ex dictis patet, quod *Θ absinth.* bolus Armena, & sigillata & omnia *σλῖα* convenient in appetentia canina corrigenda.

℞. *Limas. σλῖα minuss.* pulveris.

Tom. II.

corall. r. prepar. à ʒʒ.

lapill. cancrorum præp.

lapid. carpiorum præp. à ʒj.

croci Orient. ʒʒ.

M. f. pulvis. S.

#### Dämpfend Pulver.

Sufficit pro duabus vel tribus dosibus, pro ut magis vel minus appetit æget, & manifestè appetitum minuit, in jusculo pingui assumptus.

Si volumus remedium ex salibus, potest sufficere hæc formula;

℞. *ʒij diaphor.* ʒʒ.

*ʒis absinth.*

cent. min. à ʒj.

vol. C. C. l. *Ca* aut *alium* ʒʒ.

*Eleosacch. anisi* aut *alium* ʒʒ. ad gr. xv.

M. f. pulvis pro dosib. duab. aut tribus, S.

#### Temperend Pulver.

Item urinæ potus tamen nimiam sedat.

Denique quod attinet oleosa: sunt quælibet olea expressa, & in specie olea destillata carvi, caryophyllorum &c. Pertinet huc etiam vitellum ovi ad duritiem cocti, quod, teste Hartmanno, valde convenit in appetentia canina propter copiosum oleum, acidum excedens egregiè obtundens, Villanovanus refert: quendam sibi hunc affectum pane calente, & amurea olei imbuto, sustulisse: mulierem vero bovis liquatum adipem cum pari calentis olei quantitate duabus vicibus bibisse, sicque caninam appetentiam cum quinque dierum fastidio commutasse.

Observandum autem, ne pinguibus ejusmodi utamur, ubi vomitus simul urget, ac si melius se incipiat habere æger, ab ulteriore eorum usu absteineat.

Commendantur præter modo dicta etiam cochleæ, cancri fluviatiles, caro suilla; hæc enim sunt difficillimæ digestionis, unde enervat vim corrosivam acidi esurini. Commendantur in diæta cerebra animalium, imprimis butyro frixa; quæ in totum sunt oleosa & pingua, item convenit amyllum & oryza cum multo butyro & lacte cocta; hæc namque sunt oleosa. Similiter pertinent huc pinæ & pistaciæ, oleosæ non minus, quam amygdalæ dulces.

Ratione olei destillati conveniunt omnes vegetabilium inflammabiles: hi namque nihil aliud sunt, quam olea volatilifata per fermentationem, & constant ob id blando acido pingui, imprægnato sale volatili plantæ. Unde spiritus vini, aut solum vinum dulce & generosum, appetentiam caninam sedat, ut Hippocrates *sect. 2. aphor. 21.* Galenus in *Comment. in hunc locum*, & Zacutus Lusitanus l. 2. de *Med. Princ. Hist. 69.* testantur. Item spiritus menthæ aut salvæ, aut vinum generosum, cui infusa salvia & absinthium, usurpari possunt; Faciunt huc quoque essen-

(F)

essentia absinthii, pulegii, melissæ, &c. quæ ab Hartmanno commendatur, imprimis si cum his maritentur olea destillata, v. g. carvi, & similia. Hincque à Sylvio commendatur potio sequens:

℞. ▽ *menth.* ʒij.

*coctlear.*

℞ *cinnam. cum* ~ *vin. par.* ā ʒʒ.

*styr. absinth.* ʒj.

Miscuit pro potione.

℞. ʒʒ *destillas. macis*

*juniperi* ā ʒj.

Misceantur.

Dentur 1, vel 3. guttæ pro dosi.

Denique hic non ineptè vel sociantur, vel subjiuntur opiata, adeoque sensum ventriculi stupefacientia, quo minùs orificium sinistrum percipiat vellicationem. Hæc ipsa tamen cautissimè sunt usurpanda, quoniam palliant tantum affectum, non verò reverà curant. Huc pertinent laudanum opiatum, theriaca, uti etiam mithridatium; pariter solanum furiosum seu maniacum cum vino infusum, si hauriatur, quaecunque appetentiam dejicit, uti expertus est Gesnerus in *epistolis*.

Ubi ita temperatum fuerit acidum, expurgandum est: Nam hic succus facessit omnino in serum, ut possit evacuari citra noxam. Purgatio instituenda est vel per vomitum, vel per secessum. Quoad purgantia seu evacuantia: præter illa, quæ aliàs in malo hypochondriaco præscribuntur, convenit imprimis extractum panchymagogum Crollii, item extractum Pagarici, senna, & medicamenta ex aloë parata: e. g. juxta Poterium C. 3. *Obs.* 96. pilulæ de hiera simplici Galeni. Imitandus venit hac in parte Forestus *Libr.* 18. *Obs.* 5. pag. 138. qui habet exemplum appetentia canina in Monacha cum vomitu ciborum, simulque humorum acidorum, in fine vomitus sentiente aliquid amarulenti, quod fauces vellicavit, quæ sola fuit curata per has pilulas:

℞. *MP. hier. simpl. Zuvelfferi* ʒj.

*Rhabarb. opt. pulveris.* ʒʒ.

c. f. q. *syrupi rosar.*

t. l. a. *pilula.*

Quæ cum aliquoties fuissent mane usurpata, vomitus morbusque cessavit, & hac ratione etiam alius juvenis fuit curatus.

Vel ℞. *Pulv. rad. jalapp.* ʒʒ.

*resin. scam.* gr. v.

Θ ʒi l. ʒi l. *gr. v.*

*limat. ʒis sine acido præp.* ʒʒ.

M. S.

*Laxier-Pulver.*

℞. *Extr. aloes c. ▽ ʒis. par.*

*corall. r. præparat.* aa. ʒʒ.

g. *\*ci c. + sol.* ʒj.

*extr. ʒis* ʒij.

*trochisc. alhand.* ʒʒ.

c. *ess. myrrh. f. pil. n.* 130. pro dosi 10 l. 15.

Quæ supra dixi de theriaca, etiam confirmantur à Fontano in *Curat. & Respons.* pag. 74. Boli Armeni usum confirmat Forcettus l. 21. *obs.* 28. *Schol.* Non minùs notatu digna est observ. Meæræ, qui in *Hist. Med.* pag. 159. refert bulimum repentinum sponte natura, succedente gravi diarrhœa, curatum.

Bulimum ergò quod attinet: cum sit defectus virium propter nimiam famem, curatur optimè per vinum generosum; imprimis vinum Malvaticum vel Hispanicum, vel Frontinicum, aut loco vini simplicis potest fieri vinum Hippocraticum, cui nux moschata & cinnomum similiaque infusa fuerunt. Præterea mica panis vino intincta naribus applicata præ cæteris curat bulimum: item commendatur odor vini: item panis, ipsiusque odor speciatim commendatur ad bulimum à Langio l. 2. *epist.* 28. Vinum licet aliàs naturaliter augeat famem, in bulimo tamen ratione animi deliqui remedium est: magis tamen convenit, si frustulum panis vino intinctum comedatur.

Tandem theriaca prodest: præcipuè haustus vini generosi, in quo theriaca parum solutum.

## SECTIO II.

### DE

## SITILÆSA.



Ueditur sitis tribus modis, I. Quando augetur, II. Quando deficit, III. Quando depravatur.

vel moderata, vel intensa seu clamosa: Illa v. g. ab exercitio, loquela diuturna, cum ariditate faucium: Hæc in febribus, post assumpta purgantia, assumpta venena acra,

### CAPUT I.

De

#### *Siti nimia.*

Quod attinet sitim nimiam, ante omnia distinguendi sunt ejus gradus; Est enim

#### PARS AFFECTA.

Illius subjectum sunt saltem fauces, vel speciatim pharynx. Hujus subjectum est simul orificium ventriculi sinistrum, ceu radicalis sedes famis & sitis. Illa faciliè & breviter, interdum

terdum uno haustu, vel repetitâ saltem calidâ faucium elutione, est corrigibilis: hæc repetitis etiam pluribus haustibus vix est extinguibilis.

*C A U S Æ.*

Causa proxima est vellicatio, quædam & molestia singularis, fauces affligens, unde prout causa talis vellicans in vehiculo plus minus glutinosa seu viscido hæret, indeque facilius seu difficilius eluitur, magis vel minus contumax esse solet.

Quoad causas remotas: Sunt hæc vel externæ vel internæ: Externæ varia assumpta acriora, v. g. aromata, *Θita*, piperata, purgantia, *ΟΟ*. Mercurius sublimatus: Internæ, quæ vellicant, sunt ferè triplices;

I. Est acrimonia alcalina plus minus oleosa, indeque plus minus amarulenta & glutinosa, aut bilis aut cujuscunque contenti fluidi, vel intra corpus geniti, vel ex assumptis in stomacho corrupti, & cruditate nidorosa falsa acri infecti. Hinc febribus continuis correpti in æstu cum effervescentia *Θlis* *Θli*, de intensiore siti ut plurimum conqueri solent, eâque magis vel minus intensâ, prout in talibus orgasmus bilis ex intestinis in stomachum regurgitat, aut prout nidorulentum acrius magis vel minus infecerit stomachum, ac prout parcior saliva tunc solet esse proventus.

II. Causa remota est acrimonia falsa, uti lymphæ in genere, ita lymphæ salivæ in specie, nempe in affectibus quibusdam catarrhalibus, cachecticis, hydropicis, &c. non secus ac in quibusdam scorbuticis, in quibus lymphæ salivæ *Θlior*, ac simul plus minus glutinosa existens, fomes est contumacis hujusmodi sitis.

III. Causa est saliva pauca, non sufficiens abluendo os & fauces; hinc post purgantia sequitur sitis, quia exhausta est & subducta lymphæ. Hinc qui diutius loquuntur, percipiunt sitim, quia deficit saliva ordinaria: hinc in febribus, præter *Θlia* biliosa acria, nimisurgens est sitis propter defectum salivæ. Facit huc saliva viscida & glutinosa, & plus minus aeris *Θsa*, ut in phthisicis, hecticis, tabidis; item febrientibus ac similibus, item ex morbis convalescentibus. In talibus enim saliva ut famem non leviter imminuit, ita contra sitim pertinacem ex faucium ariditate, linguæ glutinositate, &c. solet inducere.

Ad modo enarrata salivæ vitia multum tribuunt Spiritus influi, vel materialiter eam simul alterantes, vel ad secretionem ejus plus minus tribuentes. Hinc illorum defectus vel absolutus in imbecillioribus, defatigatis, &c. vel respectivus, dum inæqualis eorum in corpore fit motus, & ad quædam saltim loca specialius diriguntur, ut in magnis doloribus,

Tom. II.

iracundiis, paroxysmis febrilibus imminetibus, aut jam inchoantibus: Sitis ordinario ex saliva parcior, viscidior & glutinosior, indeque cum faucium ariditate seu siccitate, affligere solet.

Præter dicta probè etiam notandum: quod in siti simul sit habenda ratio pulmonum, qui in provocanda siti multum conferunt: quo magis æstus sanguinis in pulmonibus, eò magis æstuat pulmo; id quod ex vomica pulmonum, item ex empyemate, patet.

Verùm ad sitim vel augendam vel imminuendam multum facit consuetudo; Hi enim, qui adfecti sunt magnis potationibus, crebrius solent sitire: Exemplum huc faciens elegans habet Alexander Deodatus *in suo valetudinario pag. 26.* de puella septenni admodum siticulosa & bibacula, idque propter nutricem siticulosam.

In genere differentia sitis observetur: quod nempe quædam affligat cum ardore febrili; quædam sine eo: quod posterius in catarrhosis, scorbuticis, hydropicis, &c. obvenit.

*S I G N A.*

Signa diagnostica æger scit.

Quoad prognosin verò: nil per se sitis in recessu habet, sed per accidens saltem, prout est intensa vel non, ratione causæ morbosæ.

Sitis nimia & inordinata absque causa externa semper statum decidentis denotat, adeoque morbum imminere portendit.

Quæ à causis externis excitatur, potu assumpto facile sedatur; quæ verò à causis internis procedit, pro illarum diversitate variat.

Si æger sitiens, hoc est, in quo omnes causæ, circumstantiæ & indicia sitis, in febribus ardentibus & malignis, non conqueratur de siti, malum signum est: quia aut innuit adesse delirium, aut deficientem sensum partium in lingua, & omnimodam omnium facultatum prostrationem, adeoque imminentem mortem. Vid. Hippocrates *Seet. 4. Aphor. 48.*

Sitis in febribus aliisque affectibus brevioribus cum horum solutione spontè evanescit: In hydropo verò aliisque chronicis vix sedatur.

Sitis in febribus ardentibus parca, est admodum suspecta.

Cum naturaliter cum fame nulla sit sitis, & contra; adeoque, quamdiu acidum esurinum in stomacho dominatur, deficiat sitis; ob id in siti plus minus clamosa, illius nempe naturalis defectum semper concludamus: sicut etiam sitis talis defectu illius aliqualem adhuc præsentiam, & plus minus dominium colligamus.

Quando ægris, dum bibunt, potus deglutitus cum sonitu delabatur, *Wenn es flinset:*

(F 2)



get: *Glucf / Glucf* / pessimum signum est; innuit enim stomachi tonum planè resolutum.

*C U R A.*

In cura ergò seu methodo medendi tres indicationes dominantur:

1. Tollatur causa fauces irritans.
2. Augeatur materia seri & lymphæ salivalis.
3. Fallatur sitis.

Quod attinet hos scopos, & quidem indicationem primam; hæc, pro varietate varia, varia largitur remedia. Ea, quæ causam irritantem tollunt, partim sunt acida & magis austera, partim temperata, quæ acrimoniam plus minus *Θ*iam corrigunt. Acida nimirum sint ex vegetabilibus acetosa & similia, item pruna acida, fructus citri, aurantium, granatorum, acidorum, rubi idæi, berberes, ribes, cydonia, cerasa, & omnium horum succi; item primi omnium, tamarindi, qui in febribus præter hoc, quod sitim compescant, etiam æstum impediunt, & blandissimè alvum subducunt. Ex his succis parati syrupi eundem habent usum, ut ut non adeo potentem, propter admixtum saccharum. Pertinent huc succi expressi ex sempervivo & portulaca; item acetum tam simplex, quam rosaceum, violaceum & rubi idæi: sic *∇*æ destillatæ portulacæ, lactucæ, nymphææ, imprimis aqua fragorum. Ram rosarum & violarum prætereo; Imprimis convenit *R* flor. bellidis. Pertinet huc epaticum rubeum, ex mineralibus phlegma vitrioli acidulum, item phlegma *Δ*is, ~ mineralium acidi, tam simplices quam compositi, clysti dicti, in specie *Δ*is, vitrioli, *Θ*li philotophici, ~ *Θ*is, in febribus ætuosioribus spiritus *Θ*li, cum julebis & potulentis assumpti, quorum guttula paucæ sitim melius compescunt, quam alia potus genera, quæ destruunt acrimoniam. Clysti tales commodè potui ordinatio vel julebis possunt instillari vel guttula *X. XX. ad XXX.* dentur pro dosi.

Temperata sunt subdulcia aut subpinguia, lac & serum lactis, *Molcken* / sive solum propinetur, sive solvatur in sero lactis *Θ* datum, sive *∇* destillata seri lactis; modus utendi est, ut accipiat sero lactis mensura j. Huic indatur pomum citrium in taleolos incisum, sic enim acidum citri ex sero lactis præcipitat, quicquid caseosi aut butyrosi in eo continetur. Coletur ut fiat clarum; usurpetur pro potu. Sic emulsiones ex seminibus frigidis majoribus, aut etiam ex hordeo conveniunt, item passulæ, glycyrrhiza, imprimis cum radice Chinæ aut sassafras, decocta & propinata.

Ea quæ pro secundo scopo serum & lympham salivalem augent, sunt quæcunque potulenta ventriculo grata, majori dosi assu-

pta, quæ vino, vel cinnamomi alteriusve aromatis gratioris tantillo, temperata, ita ut julebi utrique scopo satisfaciant. Verum est, *∇*m simplicem appetere naturam: sed in illa, præsertim frigida, aut nimis copiosa propinanda sumus cauti; prostant enim exempla eorum non pauca, qui ex nimio aquæ frigidæ potu sunt demortui: Triâ recenset Amatus Lusitanus *C. 2. Curat. 62.* item Schenkii *l. 3. obs.* Conf. Marcellus Donatus in *Hist. Med. memorabil. l. 4. c. 6.* Sin verò non immineat mors, metus est, ne periculosum asthma inducat, idque propter coagulationem sanguinis in præcordiis. Tale observavit Gabelchoverus in *C. 2. Cur. 17. & 18.* Rarissimum est quod habet Bartholinus *Cent. 3. Hist. 89.* de mulieribus Grönländicis, per *∇*m frigidam potam à variolis curatis: potius conveniunt appropriata, quæ *Θ*iam acrimoniam blandâ aciditate temperant.

Tertio scopo ordinariè satisfaciunt gargarismata, elutiones faucium, mucilagines linguæ & faucibus illitæ.

Ex his variz possunt fieri formulæ, imprimis ex acetosa vulgari: nam acetosæ radix, folia & semen, decocta, liquorem seu aquam tinguunt colore rubeo instar vini, & recens expressus succus vinum rubellum colore & suavi acidulo sapore elegantissimè refert; unde ægri decipi possunt talibus: Hinc v. g.

*℞. Decoct. rad. & fol. acetos. lbj.*

adde

*Succ. acetos. rec. expr. ℥ij.*

*Syr. ribium*

*granator. aa ℥vj.*

*M. pro julebo.*

Gratus est gustui, sitim, in specie febrilem, simul compescit, & alvum apertam servat.

Usitatum aliàs est decoctum hordei simplex, hoc enim subpingue est; unde egregiè temperat *Θ*ia siticulosa, ut:

*℞. Decoct. hordei simpl. lbj.*

*Succ. citri.*

*cydon aa. ℥j.*

*R. flor. bellid.*

*rosar. aa. ℥j.*

*Syr. acetos. citri vel ribium ℥jss.*

~ *Θ*li aut *Θ*is q. s. pro grato acore,

*M. D. S.*

*Rühl: Julep gegen den Durst.*

Interdum julebi instar Rarum per infusionem ex tempore parandi præscribuntur, qui sunt gratissimi. Modus est hic:

*℞. Flor. rosar. r. l. bellid. ℥vj.*

*Irrorentur c.*

~ *u Δis q. s.*

*Infundantur in*

*Decoct. hord. lbjss ad lbij.*

Stent in loco calido, donec suaviter rubescat liquor: colaturæ, impr. si leniter abstergere animus est, adde

*Syr.*

Syr. jujubin.

acetos. citri

ribium ʒj.

(vel horum loco Syr. rubi idai ʒiij.)

M. pro Julebograto.

Vel

℞. Decoct. hordei lb. ij.

Flor. rosar. r. ʒß.

Succi citri ʒij.

Stent in calore moderato, per aliquot horas:  
post blandam ebullitionem colaturæ adde

Syr. ribium ʒij.

M. f. Julebus.

Loco decocti hordei interdum non sine fructu præscribitur etiam decoctum tamarindorum, in specie, quando alvus nimis clausa, simul blandè laxanda est: cui accedit Rolarum, violarum, &amp; bellidis, parata cum phlegmate Oli: Modus sit talis:

℞. pulp. tamarind. vel tamar. contus. ʒij.

Coq. in f. q. ∇ simpl.

Colaturæ lbj. adde

℞a flor. bellid. cum phlegm. Oli par. ʒj. l. ʒij.

Violar.

rosar. aa ʒj.

Syr. ribium

berber. aa. ʒj.

M. D. S.

**Eröffnender Julep gegen den Durst.**

Conveniens etiam est decoctum tamarindorum cum passulis, egregiè temperans ac simul alterans, præsertim istis in casibus, ubi aciditas tamarindorum non nihil suspecta videtur.

℞. Tamarind. ʒij.

passul. min. conquass. ʒjß.

Coqu. in f. q. ∇.

Colaturæ terventi infund.

cort. citri rec. ʒj.

Colaturæ refrigeratæ adde

℞a rosar. ʒß.

M. pro Julebo.

Sunt nonnunquam subjecta, quæ nequeunt perferre acida: in tali casu optimum est ∅ simpliciter depuratum secundum methodum Tacchenii Hipp. Chym. in fine, ad aliquot drachmas usque ad ʒß vel ʒj. mensuræ potionis ordinariæ, vel decocti hordei vel ∇æ appropriatæ additum: &amp; ita assumptum egregiè confert ad effervescentiam massæ sanguinis &amp; sitim febrientium temperandam: vel quod melius, ∅ gatum, quod convenit etiam hydropicis, quoniam urinam movet, e. g.

Præscriptionis formula, quæ est grata, cum aliis ∅ sit nauseabundum, est hæc:

℞. Decoct. hordei lbjß.

∇ Cinamom. ʒj.

∇i depur. vel ʒiat ʒj. ad ʒjß.

M. S.

**Tranck gegen den Durst.**

Vel

℞. ∇ acetos.

semperviv. aa. ʒiij.

rosar.

Succ. semperviv. aa. ʒij.

∇i depur. ʒjß.

Syr. Violar. ʒjß.

M. F. potio. S.

**Kühlender Tranck gegen den Durst.**Quod si in Icorbuticorum, hecticorum aut phthisicorum siti temperatis contra acrimoniam ∅ iam utendum sit, præter serum lactis convenit decoctum radice Chinæ cum radice liquiritiæ: de qua videb. Timæum von **Gölden-Klee** / l. 3. epist. 29. p. 687. ad cujus imitationem præscribi potest ita:

℞. rad. China in taleol. incis. ʒjß.

Liquiritiæ.

rasur. ligni sassafr. ana ʒvj.

Sant. rubri ʒiij.

Incisa &amp; contusa infund. in

∇ comm. lbvj.

Stent in MB per noctem: manè adde

passul. min. conquass. ʒjß. ad ʒiij.

Coqu. igne lento, vase benè cooperto ad lbiv.

De quo æger quotidie subindè pro lubitu capiat bonum haustum, manè calidè, &amp; à meridie frigidè.

D. S.

**Tranck gegen den Durst.**

Quod si hic quidam acidum aut citri aut acetosæ addere velit, per me erit concessum.

Mentio facta est radice liquiritiæ: hæc cum semine feniculi decocta temperat sitim, quando oritur p: æcisè ab acrimonia ∅sa, qualis affligit phthisicos, hecticos, empyematiceos &amp; catarrhosos: in quibus casibus non ad eò conveniunt acida, aut hæc saltim parcissimè; sed potius propinanda sunt temperata talia ex glycyrrhiza, passulis, &amp; similibus: præscribitur vel sola, vel cum hordeo, aut aliis. Exemplum sit tale:

℞. Hord. crudi M. j.

passul. min. contus. ʒj. l. ʒjß.

semen anisi.

feniculi à ʒj. vel ʒjß.

rad. liquirit. ras. ʒß.

Coqu. in Ment. iij. ∇a font. ad consumptionem tertiæ vel quartæ partis: circa finem addendo

Cinnam. opt. ʒjß.

De colatura bibat æger, quantum lubet.

Sed de his aliisque salivæ vitiis corrigendis conf. Sylvius l. I. Prax. c. 51. &amp; 52. Ex omnibus, quæ salivam viscidam ac glutinosam attenuant &amp; resolvunt, in primis excellit ∅\*, internè subindè usurpatum.

Denique in leviori malo pro fallenda siti conveniunt gargarismata quæcunque, quæ os abstergunt, &amp; fauces eluunt, ac simili ratione,

(F 3)

licet

licet non tollant, saltem magis torquere faciunt. Convenit itaque imprimis  $\nabla$  communis, in qua  $\Phi$  depuratum vel antimoniatum dissolutum: item cerevisia secundaria calidè gargarisata, ac divertæ oris collutiones, quæ alias in febribus continuis præscribuntur; præsertim quando lingua est arida, scabra, plus minus nigricans. In talibus casibus succus sempervivi majoris; item mucilagines linguæ & faucibus illinendæ, ex semine psyllii, cydoniorum, malvæ cum aqua rosacea & sempervivi majoris, aut cum phlegmate  $\Phi$ li extractæ: & horum mucilaginum  $\zeta j$ , solent convenienter addi ana vel dimidium succi sempervivi expressi, aut cydoniorum, & immisceri tantillum  $\Phi$ i depurati, vel salis ammoniaci: v. g.

$\mathcal{R}x.$   $\nabla$  sempervivi maj.  $\zeta iij$ .  
succij ejusdem  $\zeta iij$ .  
Mucil. sem. cydon. c.  $\nabla$  spermat. ranarum extr.  $\zeta j$ .

$\Theta * ci$   $\zeta j$ .

M. S.

### Rührender Mundschleim gegen den Durst.

Liquor detineatur in ore aliquamdiu, hinc de novo expuat. Vel

$\mathcal{R}x.$  Mucil. sem. cydon. cum  $\nabla$  sempervivi extr.  $\zeta iij$ .

Succ. sempervivi rec. expr.  $\zeta i$ .

$\Phi$   $\zeta j$ .

M. S. ut antea.

$\mathcal{R}x.$  Mucil. sem. cydon. c. phlegm.  $\Phi$ li extr.  $\zeta iij$ .

Syr. rubi idæi vel violar.  $\zeta vj$ .

M. S. ut supra.

Citrus quoque in taleolas incisus, saccharo inspissatus, vel ribes conditi, aut etiam aliquid de syrupo rubi idæi, acidulato cum paucis  $\sim$   $\Theta$ is dulcis, in ore contineri potest. Quo etiam rotulæ aut morsuli ex saccharo cum succo citri aut berberum parati spectant: item simlices parvulæ, aut crystallus ore volutata: vid. Borellus cent. 2. obs. 68. quo spectat quoque mastix. Mindererus in Medic. militari. Siccum panis frustum aut globulum plumbeum hinc inde in ore volvi jubet.

Sunt etiam quidam, qui omni manè tantum non continuè siti torqueri solent, talem optimè sistit vinum absinthites jejuno stomacho haustum; temperat enim oleum vitiosum, massam sanguineam inquinans.

Denique observandum, quod æstuentes, aut intensius laborantes, aut nimis defatigati, siticulosi existant, in quibus optimum levamen est  $\sim$  vini cochlear j. qui parte suâ volatili  $\Theta$ sa temperat & tollit acrimoniam  $\Theta$ ium, ex defectu spirituum in laboribus disperforum ortam. Conf. hic in specie Art. Anglic. vol. 1. p. 405. & 578. hujus loco & vinum vetus generosum non erit inconveniens.

## CAPUT II.

De

### Sitis defectu.

**S**itim imminutam aut deficientem quod spectat; affectus est rarus, imprimis in juvenibus: Nihilominus tamen præstant exempla, ubi non tam in morbo, quam citra illum, non rarò ad longum tempus omnis potus fuit neglectus; quales historias videb. in Platero obs. 237. & Lotichio lib. 4. obs. 1. & 2. Borellus cent. 2. obs. 68. similem observationem habet de abstinencia à potu per sex annos; item per annum integrum, & simile ferè exemplum videre est in Rhodio C. 2. obs. 56. Borellus l. 4. habet observationem de medico, qui nunquam sputum rejecit, nec mucum, ut ut optimè sanus. Cæterum ista lymphæ, quæ per secretum excernitur, ipsa fuit conversæ ad fauces, undè raram habebat sitim, & propter humectationem insufficientem difficulter loquebatur. Notum præterea est, ex Hippocrate, quod splenetici sint salivatores, hinc facile fieri potest, ut tales splenetici satis diu à potu abstineant: Exemplum habet Panarolus in Pentec. 2. obs. 19. de splenetico quodam, per trimestre spatium nil omnino bibente.

### PROGNOSIS.

Si ægri non conquerantur de siti, uti dictum, pessimum est signum.

### C U R A.

Sitis deficiens, si non in delirantibus observari contingat, aut ab humiditatis aqueæ minusque  $\Theta$ is in ventriculo & faucibus abundantia, aut à ventriculi stupore videatur dependere, adeòque illius imminutionem ventriculi per acriora stimulationem & excitationem postulat, quod præstant:  $\Theta$  cardui benedicti,  $\mathcal{R}$   $\mathcal{Q}$ i probè acris &  $\mathcal{Q}$   $\Theta$ latus, arcanum duplicatum, arcanum  $\mathcal{Q}$ i,  $\Theta *$  cum aromatibus mistum, elixyr stomachale Michaëlis, proprietatis, cum & sine acido.

## CAPUT III.

De

### Siti depravata.

**S**itis depravatæ rarissima exempla sunt, quæque sine fame depravata rarò existit, dum quædam subiecta aceto præ aliis delectari potibus interdum observamus, & ferè ad historias de pica vel malacia pertinent, cum quibus unam tandemque causam & curam exigit.

### C U R A.

In febribus ardentibus convenit imprimis vel aqua simplex, vel cerevisia secundaria, cui



cui addatur dimidium vini Rhenani, addendo pomum citri unum alterumve in taleolas incisum, quæ mista sufficiunt pro julebo; quibus in malignis optimo consilio addi potest gelatinæ C. C. rec. ʒj. in mensura istias misturæ.

Vel ʒ. Crem. ʒi ʒβ.  
Sacchar. ʒij.  
▽ font. mens. j.

Coque paulisper ad dissolutionem ʒri: remove ab Δe, & injice

Cinnamomi frustulatim concisi ʒij. tegatur probè, & in loco frigido frigescat: adde, si placet, flores papaveris erratici.

Vini saporem refert, & potus est gratissimus, & verè universalis.

Cætera ad fastidia cerevisiæ recensenda sunt: de quibus supra actum.

## SECTION III. DE MASTICATIONE LÆSA.

**A**limentorum assumptionem & masticationem læsam accuratè & succinctè complexus est Sylvius l. i. c. 4. Prax. Primaria, quæ hic occurrunt, vitia sunt, quando aut imminuitur aut deficit plus minus; vel quando depravatur masticatio. In imminuta aut deficiente masticatione primaria vitia sunt, vel musculorum moventium (ad quos etiam musculosa congeries, linguam constituens, pertinet: de cujus tamen malis infra, ubi de gustus vitiis) unde spasmus cynicus & tortura oris: vel maxillarum, & cum his dentium molarium.

### CAPUT I.

De

*Musculorum masticationi inservientium vitiis, in specie.*

*De spasmo cynico & tortura oris.*

**Q**uoad musculos moventes, primariò musculi temporales, & hinc musculi genis & labiis communes, sui considerationem merentur, cum in finem à natura magistra fabricati, ut præter ornatum decentem, movendæ maxillæ inferiori, & ad superiorem convenienter, idque validè, adducendæ inserviant.

Vitiatur horum musculorum motus, quando vel spasmo laborant, adeoque convulsi, seu pertinaciter eorum fibræ contractæ & rigidæ persistunt, adeoque inferior maxilla superiori constanter adducta persistit: vel quando idem paralyti laborant, & fibræ eorum relaxatæ & flaccidæ inferiorem maxillam pondere proprio deorsum labi permittunt, absque reductione ad superiorem. Convulsio ac paralytis temporalis musculi rara est, quin cum convulsionibus universalibus epilepticis & resolutionibus universalibus apoplecticis concurrat, quibus curatis utiliter & particulariter horum affectus cessat, nisi interdum spe-

ciali musculi vulnerati, vel alio modo affecti, sublit vitium, particularibus remediis externis, pro casuum varietate, & cum aliis similium partium similibus affectibus, convenientia vel analogia, curandum.

Genis & labiis inservientium musculorum simultanea convulsio aut paralytis pariter non nisi aliis gravioribus hujus generis aliarum partium internarum affectibus superveniunt, & tunc speciatim utriusque faciei partis convulsio, & oris hinc facta utrinque diductio, quæ in ridentibus, vel potius canibus ringentibus, spasmus cynicus dicitur. Sin vero alterutra saltem faciei musculorum pars vel convellatur, vel paralyti afficiatur, & exinde recta oris figura in alteram partem distorqueatur, in convulsione quidem pars sana ad ægram convulsam, in paralyti pars ægra resoluta ad sanam, oris tortura speciatim dicitur: in qua modò dicta oris ad alterum latus distortionem oculus alter ritè claudi nequit, nec æger debite exsufflare, quando expuere jussus, ex altero tamen oris latere id præstare potest. Quod si æger jubeatur ridere vel literam O pronunciare, facilè apparebit, alteram faciei partem liberè moveri non posse. Quod si pars faciei dura sit cum sensibili plus minus dolore, & hæc aliam rectè se habentem ad se trahat, à convulsione illius lateris malum esse, palam fit. Sin verò pars affecta mollis, laxa & minus sensilis, & ejus oculi inferior palpebra ferè decidit, & ad sanam partem trahatur, à paralyti malum esse ostenditur.

### CAUSÆ.

Causæ equidem, tam externæ quàm internæ, hujusmodi convulsionum & paralytium suo tempore, ubi de his in genere tractabimus, evolvuntur. In specie nunc in radice ac principio nervorum, ad faciei alteram partem derivatorum, hæret malum; tumque dimidium faciei totius, quin etiam alæ illius lateris partes, plures vel pauciores, simul afficiuntur. Sin verò specialiter vel in musculo uno alterove faciei, vel in nervi cujusdam furculo speciali,

ciali, ad hos derivato, malum hæreat, illa saltem faciei pars, quam iste musculus regit, occupata apparebit: sic v.g. Torturam oris à paralyfi tali particulari putat Epiphanius Ferdinandus *in Hist. Med.* 12. natam, ex sæpius repetita applicatione aceti acerrimi, cui fuerat immaceratum lithargyrium, ad foveas in variolis delendas: non secus Henricus ab Heer *in Obs.* 17. notat, quendam ex ebrietate sopitum & tota nocte nive verberatum, tortura oris maxima exinde laborantem, dextra gena fenestræ vicinior omnino resoluta. Torturam verò oris ex spasmo natam observavit Platerus *l. 1. observ. p. 137. & 139.*

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Tortura oris, si per se extiterit, malum est difficile, aut tardè curabile: si verò acutis morbis superveniat, eaque ex spasmo, periculosissima: quo etiam pertinet aphorismus Hippocratis 49. *Secl.* 4. in febre non intermittente, si labium aut supercilia, aut oculus, aut nasus pervertatur, imbecilli jam corpore, in propinquo jam mors est.

In specie superveniens spasmo vel paralyfi reliqui corporis, apoplexiam vel epilepsiam universalem portendit: Conf. *l. 2. Prognost.* 1. 8. & Fontanus *in Methodo dignoscendi morbos* c. 2. p. 8. & 10.

### C U R A.

Curæ præmissis universalibus, i. e. primas vias laxantibus, aut ulteriori efficaciam fortius purgantibus, & sudoriferis ex aromaticis & volatilibus, quin & interdum decocto sudorifero ex lignis, per aliquot dies continuato, si quidem ex paralyfi fuerit malum, utpote frequentius, postea vesicatoria nuchæ vel ad aurem affectum applicentur: ubi etiam cucurbitæ scarificatæ ad moveri possunt. Hinc castoreum, tam internè quàm externè usurpatum, est optimum: extractum ejus in ore detineatur: essentia castorei extrinsecus loco affecto crebrius illinatur, præsertim cum Ra benzoë commista, quam commendat Timæus à **Gülden=Klee** *in casibus* p. 73. Quin & essentia rosularum, salviæ, &c. similiter ad moveri possunt. Nucha item & vertebrae colli & vitæ rectificata foveri, & illiniri oleo destillato chamomillæ, succini & terebinthino debent. In ore detineantur masticatoria: v. g. Rotulæ Plateri,

*℞. Nuc. Moschat. 3j  
rad. pyrethri,  
angel.*

*Semin. flaphis agr. vel sem. coriandri,  
sinapi. aa. ʒi.  
angel. (vel cumini.)*

*cubebæ. aa. ʒʒ.*

*piper. ʒʒ.*

*maslich. ʒʒʒ.*

*cera q. s.*

*M. F. Rotula.*

Aut castoreum in V dissolutum, aut fiat gargasilatio, vel diuturna in ore retentio decocti radices pyrethri cum semine crucæ.

Ex spasmo si fuerit malum, universalia ista similiter locum habent, uti & sudorifera, & hinc quælibet ex & cum castoreo parata remedia, speciatim observanda & fructuosè imitanda: Videatur cura Plateri *l. c.* per narcotica aromatica, mediante sudore & somno hujusmodi affectum curantis, v. g. Mithridatum, syrupus papaveris, opiata & similiter. Evporiston optimum ex semine graminis, instar fatus usurpatum: Plura de hoc affectu videb. in Sennerto *l. 2. prax. part. 1. c. 8.* item in Timæo von **Gülden=Klee** / *in Cas.* p. 73. *M. A. N. C. Anno 3. Obs.* 332.

## CAPUT II.

De

### Maxillarum vitiis.

**M**axillarum, & his mediantibus dentium molarium vitio læditur masticatio, quando maxillæ immobiles vel in tantum vel in totum fuerint: idque vel ob luxationem, in qua os nimis hiat, à quavis violentia externa factam, interdum ex oscitatione vehementiori, adeoque nimio oris hiatu inductam, facile tunc per inflictam alapam, vel per percussione sub mento, tunc curabilem: vel ob tumorem, aut faucium in tonsillis inflammatis, aliavè ratione nimis tumentibus, in quibus vix os aperire potest; aut parotidum, liberum in sua cavitate maxillæ processibus motum impredientium: vel quando nutritionis privata errore, aut universalis ex massa sanguinis quasi decubitus ratione, lentus tartareusve humor junctionem illam maxillæ cum ossibus temporum repleverit, adeoque motum liberum illius impediverit, ut in scorbuto interdum contingere affirmat Sennertus. Quæ tamen omnia mala facile patent, eorumque ex aliorum similium graviorum curatione medicatio manifesta est. Conferatur quoad maxillarum hos & similes affectus, Sennertus *l. 2. c. 17.* His ferè modis imminuitur aut deficit maxillæ motus, ad assumptionem & masticationem requisitus.

## ARTICULUS UNICUS.

De

### Dentium stridore.

**D**epravatur motus maxillarum, quando tremulè movetur maxilla, unde sonus ex dentium crebriore collisione natus supervenit in affectu, ob id stridor dentium dicto. Oritur propriè à spasmico reciproco musculorum ingenis, abductioni & adductioni mutuâ operâ

ra inservientium, quialiquali convulsivo motu affecti stridorem talem inferunt.

*C A U S A.*

Specialiores hujus causæ sunt vel frigus externum, vel vermes seu lumbrici intestinorum, ex qua causa stridor dentium nocturnus infantibus familiaris existit: Sicut & ex causis aliis, convulsionibus communibus, oriri potest. Speciatim etiam per consensum fieri solet, in febrium nempe rigoribus, in quibus non raro est stridor dentium, ob consensum cum partibus circa præcordia membranosis.

*PROGNOSIS.*

Sine manifesta causa superveniens adulto dentium stridor, malum portendit aut apoplexiæ aut epilepsiæ imminens.

In febribus dentibus stridere malum, præsertim si deliranti id accadat.

*C U R A.*

In cura causis sublatis, & ipse affectus morbosus cessat; optimum tamen remedium est balsamus Peruvianus, extrinsecus usurpatus.

**CAPUT III.**

De

*Dentium vitiis.*

**D**entium vitio masticatio læditur, quando vel deficient, vel præsentis licet, vacillant, aut carie & stupore affecti, aut dolore afflicti fuerint.

**ARTICULUS I.**

De

*Dentium defectu.*

*C A U S A.*

**D**eficiunt dentes vel proprio, vel alieno, gingivarum nempe vitio, infra, ubi de dentium vacillatione, prolixius explicando. Proprio vitio, dum evelluntur, aut excutuntur, à quavis causa externa, vel ita alterantur, ut tanquam minus viventes non amplius cum gingiva viva coherere queant, sed spontè suâ decidant. Uti enim mortificatum, v. g. cariosum os, cum vicinis partibus vitâ communi & propriâ pro ratione influi & insiti gaudentibus, uniri nequit, sed necesse est, ut excidatur & separetur, quo cum vivo osse partes subjacentes molles, viventes, consolidatione debitâ, nutrimento mediante, uniri denovo queant; ita dens minus vitalis non jungitur amplius gingivæ, sed ab hac separatus excidit: Idque (1) si mortuus fuerit propriæ ætatis, adeoque senii sui ratione: de qua vid. Helmontius *Alimenta* §. 25. (2) si ab externis nimis lædatur & vitietur, ut sunt nimis frigida, aut copiosius assumpta, denti-

Tom. II.

bus inimicissima, & quæ senium eorum accelerant: item nimis calida, dentes & gingivas quasi amburendo alterantia; item nimis acida vel crebrius assumpta, vel dentibus admodum, à quibus successivè ita penetrantur & arroduntur dentes, ut frustulatim tandem excidant. Quo facit perversa plurium consuetudo, dolores dentium vel aceto simplici, vel per coctionem medicatam curantium, à quibus stupefunt non solum omnino dentes, & insensibiles sic fiunt subtiliores illorum intimæ fibrillæ; Sed & ipsi dentes simul mortificantur & corroduntur. Par ratio est opiatorum sæpius usurpatorum. (3) Nimis viscida & glutinosa dentibus inimica sunt, ut sunt omnia dulcia, saccharum, ficus, & caseus: Hæc ipsa enim, promptè & tenaciter dentibus adherendo, transpirationem eorundem propter necessariam nutritionem impediunt; Retenta quippe transpiratio turbat nutritionem privatam; unde illa in dentibus retenta acorem contrahunt, & alimentum proximum inficiunt, quod inde nutritioni ineptum nunc acrimoniâ sua nervulos in basi rodit, hinc dolor, nunc ipsum dentem ob vitiatam nutritionem flavum, hinc semimortuum reddit, qui exinde erosus plus minus decidit. In gingivis verò præterea irritando dolorem, tumorem & inflammatoriam dispositionem excitat, unde nutrimentum proprium alteratur, acre fit, accescit, propriam substantiam depascitur, unde flacciditas, intumescencia, feri subcruenti transudatio, exulceratio, fœtor, gangræna; hæcque v. g. ex caseo & lacte producuntur: multo magis ex saccharo & melle, quod hæc fermentando præterea accescant, & ita dentes ac gingivas eo magis lædant, ac vitalem eorum æconomiam turbent &c. (4) Carie denique plus minus exeli dentes à lapide dentali seu lithodonto oblecti, seu sordibus variis inquinati, nigrique ac fœtidi redditi, minus firmiter cohererent, sed successivè decidunt: Quæ posteriora vitia non nisi ex vitiata dentium nutritione privata, undecunque primitus orta, originem ducunt. In quem finem noto, nutrirî dentem non solum per propria sua vascula, arteriolas & venulas, circa sui radicem implantatas, sed lateraliter etiam ex adherentibus ipsis gingivis; undè & tam firmus eorum, quousque sani sunt, est nexus, ut dens seu osseum concretum, ex se indolens, quousque gingivis investitur, acutissimi sit tamen sensus, adeo mutux vitæ & nutritionis dentes sunt participes. Ac sanè particularis, ac præ aliis partibus propria dentibus est nutriendi & augmentandi ratio, adeo ut, cum continuâ attritione necessariò imminuantur, nisi novæ eaque continuâ augmentatione reparentur, brevi penitus absumerentur. Quod ulterius ex eo patet, quod uno evulso vel elapso vicini utrinque se dilatare magis soleant, & ex op-

(G)

posito



posito ipsi respondens oblongari non nihil, & in prioris spatium aliquantulum subintrare observetur.

### DIAGNOSIS.

Dentium defectus per se, partim *atrophia*, partim ex relatione, patet.

Causarum verò diversitas dignoscitur vel ab antecedente violentia externa, vel diuturna & tractatione, vel ab hoc producta salivatione, vel à scorbuto, vel ab antecedente diæta: utpote quibus prægressis, vel præsentibus, de causis certi erimus.

### PROGNOSIS.

Dentium defectus si fuerit à causa externa, de vicinis nihil metuendum, modò adhuc sint firmiores: Si verò oriatur à causa interna, v.g. scorbuto, &c. reliqui faciliè sequuntur, & successivè elabuntur.

### CURA.

Quoad curam: dentes excidentes aut deficientes reparare, solius naturæ est, quæ in junioribus per recentium dentium subnascen-  
tiam priores alveolis suis extrudit, & defectum ita restituit. Quamdiu itaque dentium novorum primordia & quasi semina intra gingivas restant recondita, novi dentes post priorum defectum renasci faciliè possunt: id quod non tantum genuini seu sapientie dicti dentes comprobant, sed quod etiam interdum in senectute dentes renati observati fuerint. Arti quod relictum est, saltem defectus illos naturæ non nihil supplere potest, artificiales dentes ex ebore, vel dente hippopotami fabricatos, in istorum locum substituendo, pro loquelæ saltem gratia, non autem pro melioris Masticationis beneficio. Vid. *Observationes Schenckii* p. 202. ex *Paræo* l. 1. cap. de dentibus, item *Riverius* in *Obs. Commun.* p. 357. vel 685. & *Borellus* l. 1. *Observat.* 10. pag. 18.

Quod si dentes elabantur aut ab incauta & tractatione, aut salivatione, conveniunt medicamenta Oaria, aut ipsa folia auri deglutita, &c. Ubi autem malum fuerit à scorbuto, acrimonia feri scorbutica temperanda, quod infra suo loco patebit.

## ARTICULUS II.

De

### *Dentium carie, fætores, & vermibus.*

**C**ariem dentis quod attinet: est hæc corrosio dentis, nunc major nunc minor, quæ insensibiliter substantia ejus absimitur, & nunc successivè excavatur, nunc altero latere pedetentim consumitur, donec successivè magis corrosus frustulatim excidat. Inchoat malum ut plurimum in parvo puncto

extrinsecus, quod nigrescit primitus, hinc foraminulum aperitur, sicque ad interiora ejus penetrat, quæ quo teneriora ac molliora, indeque facilius dissolubilia, eò promptius absumentur, & dentem cavum reddunt. Conjungitur tunc ad interiora ubi penetraverit corrosio, dolor, nunc major nunc minor, prout radicem dentis nerveum diversimodè simul arroserit. Ex corrosio ita dente nata sanies, ubi per dentis foraminulum relictum, ceu per fistulam, liberum spatium effluendi haud nacta fuerit, sed interiora magis ac radicem dentis unam alteramve, speciatim in maxillaribus, vitiaverit, acrimoniâ suâ nunc gingivam, nunc ipsam maxillam arrodit, & præsertim per illa hujus foramina, per quæ vasa in dentes subeunt, sensim extra effluit, & tubercula nunc in gingivis, nunc sub maxillis, excitat, quæ tamen exesa saniosum acre liquamen fundunt. Et licet curetur tale tuberculum & excitatum ulcusculum, subinde tamen quoties ex carioso dente sub nutritione vitiata nova sanies generatur, recidivar, & interdum in fistulam vel gingivæ seu maxillæ degenerat, adeò ut talia curari nequeant, nisi dens læsus evulsus fuerit.

Fætores etiam subinde dentes carioli inferunt, halitum oris inficientem, præsertim si major fuerit eorum excavatio, ut alimenta carnosæ retenta in eadem putredinem contrahere queant.

Imò ex nutrimenti dentis carioli proprii corruptione, aut alimentorum masticatorum in iisdem retentorum putredine, vermes in eorum cavitatibus generantur, gravissimorum dolorum aliorumque malorum autores,

### CAUSÆ.

Causa cariei est læsa dentis quâcunque occasione nutritio, sive gingivarum vitiatarum, & à contiguo dente abscedentium, indeque ejus lateralem nutritionem impediendum, (unde scorbutici gingivæ vitio omnium frequentissimi cariem patiuntur.) eveniat culpâ, sive ipse dens sub nutrimenti assimilatione, aut hujus successiva transpiratione frustratus, ex illius corruptela, & in acidum corrosivum degeneratione, cariem pedetentim contrahat. Acidum itaque ex nutrimento dentis degenerato dentem corrodens, cariem inducit.

Causæ remotæ rationem habent tam omnia dentes alterantia suprâ allegata, quàm infrâ circa gingivas, quoad dentium vacillationem, alleganda.

### PROGNOSIS.

Caries dentium maturè curanda, aliàs sæpius recurrentes odontalgias, tubercula & parvos abscessus gingivarum aut sub maxillis, interdum etiam fistulas circa dicta loca inferre potest.

### CURA.

CURA.

Quoad curam cariosorum dentium, præsentissimum equidem remedium est dentis cariosi evulsio, interdum etiam necessarium, si longius processerit caries, cum facile aliàs contiguus dens contagio carioso infici, & hinc idem malum contrahere possit: Ut taceam confirmatam cariem aliâ ratione, quàm evulsione, curari non posse. Quamdiu verò vel nondum eò usque processerit malum, vel propter pericula, sub dentium evulsione interdum observata, hæc nimis metuatur, remediis res tentanda est, cariei scilicet progressum ulteriorem inhibendo.

Evulsio appropriato peragitur instrumento, ac succedit eò melius, quo minus firmiter dens hæserit, & quo magis idem vacillaverit. Quo autem disponatur ad facilem magis, & minus dolentem evulsionem, remedia quædam à nonnullis adhiberi solent, v. g. tithymali succus denti inditus: Aut si ex eo & sale ammoniaco formentur globuli, aut cum farina triticea fiat pasta, & cavitati dentis indatur.

Præter tithymali lac alia ex simili lacteorum genere pari virtute pollent: ut lac ficulneum farinæ admixtum, vel ex lacte tithymali cum farina triticea subacta fiat pasta, quæ frixa in pinguedine ranæ facit dentes sine dolore cadere: vel farina siliginis misceatur cum lacte cataputæ instar pultis, indatur denti cavo, sicque aliquandiu permittitur, brevi sic cadere affirmant. Succus pariter chelidonii majoris, cavis dentibus inditus, eos frangit & ejicit. Petrus Asselinæus certum prodidit, quod si cicada, æstate inter segetes cantando se oblectans, confusa imponatur denti corrupto, tunc integrum illum eximi posse: vid. Velschius *Mischomim. Cent. 1. obs. 82.* Pinguedo item ranarum viridium, dentibus affricata, aut iisdem indita, dentium casum promoveret:

Vel ꝑ. *Gumm. ammoniat.*  
*Sem. hyoscyami*  
*Succ. ejusd. aa. ʒijß.*

Mixtis addatur

Pinguedo ranæ viridis, & ceræ parum, f. unguentum denti extrahendo applicandum vel indendum.

D. S.

Sonderlich Zahn-Salbleim.

De □ & dente canino huic usui proficuis vid. Sennertus *l. 2. Prax. §. 1. c. 10. p. 27.*

Cariei verò ulterior progressus per artem & medicamenta inhibetur, efficacissimè imprimis per inunctionem dentis in loco carioso cum cauterio actuali, sive ex ferro, sive ob subtilitatem commodiorem ex argento vel auro factò, tum auro foliato dens cavus repletur, vel ex cera, cum myrrha probè subacta, vel potius cerâ viridi propter admixtam æru-

Tom. II.

ginem impleatur dentis cariosi excavatio. Ipsa myrrha denti indita egregia est in hoc casu. Confer. hic Riverius in *Observat. Communikat. pag. 283. & 663.* ubi refertur, quod dentes terebinthina impleantur, & cauterio actuali dens inuratur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necessum visum fuerit, potentiale adhibeatur: Sic ¶ denti carioso admodum, vel ~Θ is gutt. j. vel ji. bombaci inditæ, ac denti adhibitæ, mirè corrosionem juvare & cariem præservare dicitur: item zingiber in oxymelite coctum & in cavernam dentis immisum, præservat corruptionem. Coralliorum pulvis denti cavo inditus, vel os sepiæ, item camphora cariei ulteriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum, cum melle rosato ad linimentum crassius redacto, caries inhibetur.

Vel ꝑ. *Corall. r. pp.*  
*offis sep. pulv.*  
*C. C. ussi præp. aa. ʒij.*  
*myrrh. el. ʒj.*  
*camph. gr. v. vel vj.*

c. f. q. *Mucil. tragac. f. pilulæ*, dentibus cariosis excavatis indendæ. S.

Sonderliche Zahn-Pillen.

Factorem dentium abiata caries sponte curati sin minus, gallia moschata cum cypro & mastichemista, denti cavo indatur. Tollitur & fæcor dentium, si abluuntur ¶, in qua Θ\* dissolutum, post prandium & cœnam.

Vermes ex dentibus elicere subinde necesse est. Præstat hoc optimè sabina in vino decocta, & in ore retenta. Mucum seu reliquias chyli interiori tunicæ ventriculi suilli seu pyloro adherentes, calentes adhuc, denti dolenti impositas, vermes elicere, traditur in *M. A. N. C. Ann. 9. Obs. 187.* Fumus item feminis hyoscyami specificus est, per infundibulum, susceptus ore. Confer *Acta Medica Hassniens. Vol. 1. p. 209.* Sufficit item ex fructu haliacabi confuso, cum cera mixto, & facta exinde pasta, in laminam ferreâ ignitam injecta, fumû suggerit, quo, ore excepto, catervatim vermes cum sputo copioso rejecti, & crudelissimi dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus ¶ is quoque dentibus cum bombace inditus vermes optimè necat, & dolorem inde oriundum placat, vel ex pulvere gallarum, cum succo radice pyrethri imprægnato paratur remedium, quod denti inditum vermes expurgat. Sevum cervinum quantum contra vermes dentium valeat, vid. Bartholinus *Centur. 3. Histor. 96.*

ARTICULUS III.

De

Lapide dentali seu lithodonto & dentium nigredine.

Quoad lapidem dentalem seu lithodonton (ut vulgò ex vana persuasione vocant

(G 2)

cant tartarum dentium) hujus ortum & genesin optimè delineavit Helmontius *Tract. alimenta tartari insontia* §. 22.

### C A U S Æ.

Nempe nutrimentum dentium laterale ex gingivis depravatum, sub sui perfectâ cum dente assimilatione frustratum & vitiatum, sicque in excrementitiam plus minus naturam degenerans, adhærescit saltem superficietenus denti, ibique, quia jam ad duritiem dentalem ex aliquali sui pro nutriendo dente alteratione determinatum fuit, ad indurescentiam quasi lapideam dentalem coagulatur saltem, & talem, plus minus tamen friabilem, duritiem acquirit, simulque, quicquid mucilaginis ciborum ac potuum imbibierit, simul sese fortiter indurat. Nunquam igitur sanæ gingivæ, & quæ cuspidali figurâ ad dentis medium assurgunt, hancque firmo amplexu retinent, dentalem hunc lapidem generare solent; benè autem laxæ, flaccidæ, cruentæ, minusque aptè dentibus adhærentes, adeoque externis injuriis ad sensilem dentis partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum suppeditantes, sed potius etiam laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Par omninò est ratio sordidorum, nigrotum, aliove modo malè coloratorum dentium: Quicquid enim hîc subest vitii, non nisi productum morbosum, exfrustata & depravata privata dentium nutritione enatum, seu externa illa, suprâ circa dentium casum commemorata, speciatim viscida & dulcia, primam occasionem suggererint, seu gingivarum morbosus status, alterando nutrimentum dentium, & vitiando lateralem ejus nutritionem in causa fuerit. Sanè ut scorbuticis nil æquè familiare est, ac gingivarum per varias subire passiones, speciatim cruentam flacciditatem, ita & in talibus dentium nigrities & sordities frequentissima est. Nigrities sanè dentibus adhærens, quid nisi extraventati ex gingivis plus minus corrupti, & acore infecti cruoris, dentibus adhærentis, vestigium est, à cujus hostili præsentia, ut irritantur gingivæ, & inviscantur dentis pori, ita ex facili hinc aciescentia, erosio & cariei successivus progressus. Juxta læsionem gingivarum & dentium læsio, indeque sordium excrementiarum pluralitas ac veritas æstimanda: Hinc & ab inunctione Mercuriali pro cura luis Veneræ, similive concitata salivatione, uti notabiliter vitiantur gingivæ, ita nigrescere subito, & pluribus sordibus inquinari observantur dentes.

### DIAGNOSIS.

Quoad diagnosin: Dentium ♂ & nigredo spontè nobis innotescunt: nec causarum signa distinctiva necessaria sunt, cum inter in-

ternas unica tantùm adsit, ut ut externarum variæ dari possint, ut ex supra dictis patet.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Lithodonton & dentium nigredo gingivis, uti & dentibus ipsis, maximè nocent; quia ad totalem erosionem, crebriorem dolorem, aut præmaturum casum, faciliè disponuntur.

### C U R A.

Tophi dentium eorumque sordities & nigrities curantur per ea, quæ sordes dictas abstergere, vitiosum earum acidum, gingivis & dentibus hostile, absorbere, & hinc blanda adstrictoriâ vi gingivarum tantum roborare valent. Quod si longius processerit malum, & tenacior mucus dentes vitiaverit, potenter incidentia & dissolventia, & quicquid heterogenei fuerit, absumentia, & quasi exedentia, adhibenda erunt, habendo semper respectum ad scorbutum plus minus præsentem. Convenient igitur in leviori modo os sepiæ, C. C. ustum, mandibulæ lucii piscis, testæ ovorum calcinatæ, cinis nicotianæ, rosismarini, urina calida, cum qua fricantur subindè dentes & gingivæ, tartarus calcinatus, aut parum salis tartari, aut aluminis usti, cineres vegetabilium, ut nicotianæ, &c.

Duriora subjecta lapidea ex silice, pumice, &c. vitanda sunt, quia crebriori usu gingivas atterere, & absumere valent, ut rectè monet Zvvölferus in *Pharm. Reg. p. 101.* nisi ubi fortius agendum; exempli loco sit farina virginica Mynsichthii, egregiè dentes dealbans, & à tartaro corrosivo purgans.

Hisce modò dictis convenienter radix iridis Florentinæ additur, partim quia & ipsa convenit, partim propter odoris gratiam. Paratis dentifriciis, aliquot guttæ olei Sati caryophyllorum, aut ligni Rhodii, possunt addi: c. g.

℞. C. C. usti ℥iij.

Corall. ℥iij.

rad. ireos Flor. ℥ij.

alum. usti

♂ ♀ a ℥j.

M. f. pulvis: qui irroretur cum

~u cochlearia,

addendo

℞. Sati. caryophyllor. guttas aliquot.

D. S.

Zahn = Pulver.

Quod si dictis pulveribus color purpurascens conciliandus, coctionigiam in aqua aluminis solvamus, & cum hac adspargamus pulverem, qui exinde rubescit: sed leni admotus igni idem purpurascit.

Quod si pertinacius fuerit malum, optimum remedium est spiritus salis cum melle ad gratiam saporis, vel quantum placet, mistus, & ita



& ita gingivis illitus. Spiritus vitrioli suspectus est, cujus loco oleum sulphuris in f. q. aquæ communis dilutum, vel cum melle rosato subactum, adhiberi potest. Pertinent huc opiata Borelli c. 2. obs. 65. ad gravius malum præsertim conveniens. Non incommodum est, si recipiatur vinum, cui permisceatur spiritus sulphuris, ut acescat: huic immittatur radícula polypodii per viginti quatuor horas: quæ siccata, & loco dentifricii adhibita dentes firmat, mundat, & candorem iisdem inducit. Et ea, quæ de spiritu vitrioli refert Riverius in l. 6. Prax. c. 2. potius spiritui  $\Theta$ is, quàm spiritui vitrioli applicanda veniunt. Quo etiam facit ejusdem liquor ex alumine usto, hic egregiè conveniens.

*Pulvis dentifricius Principisse Altenburgensis.*

$\mathcal{R}$ . off. *sepiæ*,  
C. C. *ust.*  
Pumic. *præp.* aa.  $\mathfrak{z}$ ij.  
Moschi  $\mathfrak{z}$ j.

M. f. *pulvis*: cui adspargatur  
~ *rosar.*  $\mathfrak{z}$ ß.  
& siccetur: Interim

$\mathcal{R}$ . *Gran. chermes*,  
*Santal. rubri* aa.  $\mathfrak{z}$ ß.

V q. s. pro extrahenda  $\mathcal{R}$ , qua  
irrita aliquoties prædictum pulverem & sicca.  
D. S.

*Zahn-Pulver.*

Non incommodum est, hujusmodi pulveribus dentifriciis  $\Theta$  \* subindè addere, dentibus, gingivæ, ac omnibus oris partibus imprimis conveniens. Vel

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  *plantag.*  
*Sedi min.* a.  $\mathfrak{z}$ ij.

$\Theta$  \* ci,  
 $\Theta$  \* ia.  $\mathfrak{z}$ ß. ad  $\mathfrak{z}$ j.

M. filtra. D. S.

*Zahn-Wasserlein.*

Quâ ipsâ dentes ab omni pastu abluantur, & gingivæ blandè fricentur.

Sanè  $\Theta$  \* in  $\nabla$  solum pro dentium ab omni pastu ablutione, foetorem eorum imprimis tollit: Sicuti matutina mundificatio cum urina humana dentes & gingivas à quàm plurimis malis præservat.

## ARTICULUS IV.

De

### *Dentium vacillatione.*

**D**entes sæpe etiam vacillant, seu minùs firmiter gingivis connectuntur.

C A U S Æ.

Quod attinet causas, dentes hoc vitium contrahunt vel propria, vel aliena, scilicet gingivarum, culpâ: Propria eadem est, sed in minori saltem gradu, quæ & dentes decidere penitus & cadere facit: Alienæ gingiva-

rum culpa consistit in eo, quod fibrosa illarum caro vel mollis, vel flaccida, vel simul tumida, vel etiam non nihil exulcerata, adeoque in omnibus his casibus plus minus cruenta, simul evadat. Rarum est, quod in Schenkii collectis *Observ. l. I. cap. de dentibus p. 200.* refertur, ex defluxione in dentium alveolos, hos gypseâ pituitâ interdum impleri, ut dentes extrudantur: suspicor tamen, non tam ex defluxione, quàm lapidis seu tophi dentalis uberiori incremento, potiùs vitium hoc ortum traxisse. Ista verò mala gingivarum oriuntur frequentissimè salivæ, vel in genere acrioris, vel in specie scorbutico sapore, seu vitioso acri  $\Theta$  e inquinatæ culpa, à qua conus fibrarum gingivarum resolvi & emolliiri, penetrari eadem, & plus minus successivè non rarò sensili admodum cum pruritu erodi assolent, vasculis sanguineis, una per diæresin vitiatas, sanguinem paulatim fundentibus.

Postea & Mercurii usus, tam pro salivatione excitanda, & hinc acrioris & præternaturali cujusque copiosioris salivæ profluvio, quam faciei pro usu cosmetico applicatus, ordinariò gingivam valdè laxare, & omnes dentes hinc mobiles quasi reddere solet. Huc pertinet etiam opiatorum usus in odontalgia.

### DIAGNOSIS.

Dentium vacillatio ex relatione facilè innotescit.

Causarum verò signa distinctiva cognoscuntur vel ex antecedentibus, e. g. odontalgia prægressa, salivatione  $\mathfrak{z}$ iali, vel conjunctis, v. g. scorbuto, &c.

### PROGNOSIS.

Dentium vacillatio, quæ ab odontalgia oritur, ut plurimum spontè remittit.

Quæ à salivatione  $\mathfrak{z}$ iali, hæc cessante, pariter cessat, modò non adsit gingivarum nigredo.

Vacillatio dentium à causa interna sæpè est diuturna; qua dentes tandem facilè elabuntur. Quod si ulterius cedat negotium, vitia-ri magis gingivæ, exulcerari profundius, absumi eadem, vel corrumpi etiam, & ad gangrænam disponi assolent. Malum, quod in genere *die Mundfäule* appellatur.

Quod si firmior paululum gingivarum fuerit textura, relaxatâ eadem nihilominus sanguinem uberius in se recipit, & spurâ intumescit & excrefcit carne laxâ, flaccidâ & sordidâ, & facilè ad tactum cruorem stillante, in gingivarum hinc dicta excrefcencia seu dentium superincarnatione.

C U R A.

Ucigitur removeantur hæc mala, præmissâ debita radice morbosæ internæ curatione, gingivæ flaccidæ, tumidæ, cruentæ &c. adstringen-

(G 3)

gendæ; exulceratæ absorbentibus & mundificantibus ac adstringentibus consolidandæ; corruptæ, & plus minus gangrænata, ab ulteriore mali progressu præservandæ. Conveniunt igitur flores rosarum rubrarum, aquilegiæ, & ex his paratum unguentum de aquilegia ad scorbutum oris præsertim proficuum. Descriptio prostat in Tilemanni *Mat. Med.* cornu cervi, & ebur ustum, lacca & myrrha, O. rām crudum quàm ustum, lapilli cancrorum, folia quercus, ligustri, radix Ireos Florentinæ, bistortæ, tormentillæ, flores malviæ arboreæ, nasturtium aquaticum, ruta, salvia, rosmarinus. Ex his vel fiunt pulveres dentifricii, cujus exemplum vid. in Bartholino *Cent. 6. Hist. 54.* qui elegans est pro dentibus scorbuticis: imbuatur ulterius cum spiritu cochleariæ, ut ita melius approprietur. Item:

℞. *Flor. malva arbor. rubr.* ʒβ.  
*C. C. usti* præp. ʒij.  
*alum. usti*  
*nuc. mosch.* à ʒj.  
*M. pulvis subtilissimus, S.*  
**Zahn-Pulver.**

Quo post oris collutionem, & dentium purificationem, benè fricentur gingivæ. Vel ex iisdem fiat decoctum, v. g. ruta in vino decoquatur: quo calidissimè os eluatur. Salvia, item rosmarinus, decocta in aqua cum paucis addito alumine, egregius est gargarismus ad dicta dentium vitia.

Vel ℞. *HB. salu. opt. m.* iʒβ.  
*Flor. malva hort. rubr.* mʒ.  
*rad. polypod.* ʒβ.  
 Fiat decoctio in ∇ font. lbj.  
*Colat. adde*  
*mell. rosat.* ʒiβ.  
*lap. prunell.* ʒiij.  
*alum. usti*  
*terr. sigill.* à ʒj.  
 Misc. pro dentiluvio, S.  
**Zahn-Wasser.**

℞. *Herb. salu.*  
*Cochlear.* à M. iij.  
 Coque in f. q. lactis.  
*Colatur. & lbj.* adde  
*Succ. cochlear. rec.* ʒij.  
*Syrup. aquileg.* ʒiv.  
 M. pro gargarismate.  
 D. S. ut antea.

Aliquandiu in ore teneatur.

Pertinet huc gargarismus de tormentilla Myns p. 403. Decoctum ad gingivas roborandas Poterii in *Pharmac. p. 12.* Si quoque aliud quid, certè myrrha & lacca in istis gingivarum vitiis sunt præstantissima: Hinc tinctura lacce Myns, est nobilissimum remedium in scorbuto & putredine gingivarum & oris, cui commodè myrrha associari solet. Nam sola myrrha crebrius masticata præset-

vare egregiè contra scorbutum oris. Tinctura lacce prostat p. 46. *Armament.* Mynsichthii, & confer. M. A. N. C. *Ann. 6. App. Tit. 10. p. 76.* B. D. Michaelis *Rm lacca* parabat ita:

℞. *Phlegm. Oli qu. v.*  
 in quo dissolv.  
*alum. usti, q. f.*  
 Solutionem hanc digere cum  
*lacca pulverisata,*  
 donec tingatur.

Non inconsumtum foret, si addatur myrrha, vel promiscuè ejus tinctura.

Vel  
 ℞. *Lap. medicament.* ʒj.  
 Solve in  
 ∇ *Plantagin. lbj.*  
*Colatur. D. S.*  
**Zahn-Wasser.**

Huic immixta spongiola applicetur loco affecto.  
 Vel

℞. ∇ *fedi min.*  
*prunell.* à ʒj.  
*cochlear.* ʒij.  
*mellis rosat.* ʒvj.  
 ∇ *is q. f. pro grato sapore.*  
 M. S. ut antea.

Humectetur linteam, & fricentur dentes & gingivæ, à scorbuto malè se habentes.

Porrò ulterius mel rosaceum, cum spiritu salis tantillo usque ad gratum acorem imprægnatum, omnia ulcera & putredinem partium in ore sanat, si præsertim ex scorbuto originem ducant, in specie, si simul cum decocto salviæ subinde abluantur gingivæ. Egregium quoque est linimentum Hartmanni ad hos gingivarum affectus, quod describit in *Praxi Chimiætr. p. 123.* sed cui non incommodè myrrha addenda venit, ad imitationem Sennerti in *Prax. l. 3. p. 5. sect. 2. c. 7. p. 633.* Cui simile est elegans linimentum contra oris & gingivarum scorbutum, quod habet Deckers in *Comm. in Prax. Barbette p. 156.* cujus loco possit etiam recipi:

℞. *alum. crudi* ʒiβ.  
*flor. aquileg.*  
*fol. salvia* à ʒij.  
*rad. Ireos flor.* ʒiβ.  
*myrrh. el.* ʒij.  
 c. f. q. *mellis rosati, f. Linimentum,*  
 egregium ad vacillationem dentium scorbuticam.  
 Vel

℞. *rad. bistort.* ʒiij.  
*flor. rosar. r.* ʒiβ.  
*balauft.* ʒj.  
*alum. usti.* ʒij.

Irroretur aliquot guttis *Oli Essenti caryophyllorum*, & imprægnetur largiter *cochlearia*; qui ad oris scorbutum est egregius.

Quo etiam pertinet linimentum Schreederi, p. 306. l. 2. c. 87.

Lini-

Linimenta hæc, tam pro gratia odoris quam propter vim specificam, & destillato caryophyllorum imprægnari possunt.

Præter hæc in exerescentia gingivarum scorbutica succus quoque cochleariæ, cum alumine usto mistus, perquam egregius est. Sicuti ad hæc ipsa gingivarum vitia ex scorbutico nulli cedit vermicularis, cujus decoctum cum alumine & melle nobile experimentum est, gargarizando usurpatum: vid. M. A. N. C. *Ann. 6. obs. 22. p. 50.* in Digby *Medic. Experimental. P. 1. p. 76.* Idem egregia est mixtura pro his gingivarum malis ex  $\nabla$  calcis vivæ cum alumine crudo & usto, ac radice Ireos Florentinæ: quod in mentem revocat aliam non inconvenientem misturam efficacissimam in scorbutico oris, nempe cremorem  $\nabla$  calcis vivæ supernatantem  $\Theta$  iformem.

*℞. hujus cremor. ʒiij.  
gummi lacce ʒij.  
℥l. Cypr. gr. vj.  
∇ rosarum.  
salv. à ʒjss.*

Solve calore leni, ut probè imprægnetur à lacca.

D. S.

*Zahn-Wasser zur Mund-Gäule.*

Mixtura hæc laventur gingivæ, & egregii usus erit.

Ac meritò extollitur usus lacce; nam B. D. Michaelis aliquando putredinem gingivarum scorbuticam tantam, ut gangrænam minaretur, & propter intensissimum fœtorem nemo juxta ægrum commorari posset, per solam tincturam lacce, præmissis internis universalibus, feliciter restituit.

Juxta laccam hanc nobilissima est myrrha, v. g.

*℞. fol. salv.  
alum. ust.  
maxill. lucii pisc. calc.  
myrrha à ʒjss.*

Mellis q. s. pro linimento ad fricandos dentes.

D. S.

*Mund-Gäublein.*

Quod si efficacius postuletur, aliquot guttis spiritus salis imprægnetur.

In graviore morbo ulteriùs procedendum est, atque præter linimentum Hartmanni supralaudatum, ad unguentum Ægyptiacum, cum melle rosato probè permixtum, deveniendum pro graviore exulceratione; aut inde metuendis malis gingivarum curandis.

Vel

*℞. alum. usti.  
℥ci à ʒj.  
massich.  
thuris. à ʒß.  
M f. pulvis, S.*

*Zahn-Pulver zur Mund-Gäule.*

Affricentur gingivæ, posteaquam ante &

post decocto salviæ, tormentillæ ac rosarum rubrarum oselotum fuerit.

Imò interdum  $\nabla$  ti gravior gingivarum luxuries sedanda. Cont. linimentum Sennerti *lib. 2. Prax. P. 1. c. 16. p. 52.* aut denique aquæ virides ex viridi æris, paucò auripigmento, alumine, & quibusdam vulnerariis, addito melle in  $\nabla$  m infusus & decoctis, hic commodè adhiberi possunt: quo affricte gingivæ à luxurie, flacciditate & putredine, defenduntur: e. g. sit vel decoctum  $\Theta$  sin decocto quodam, vel aqua viridis Hartmanni *Pr. p. 109. & 110.* vel aqua viridis Plateri, cujus descriptio prostat in fine observationum ejus. Harum basis est  $\Theta$  cum vino, aut melius  $\dagger$  o: associantur quoque colcothar, cerussa, alumen, &c. vid. Schræderi *Pharmacop.*

## ARTICULUS V.

De

### *Dentium stupore.*

**S**tupore tandem seu Hæmodia affici discuntur dentes, sicque masticationem impedire, quando speciali doloris genere afficiuntur.

#### SUBJECTUM.

Pars affecta in dentium stupore est horum perioestium tactu quasi semi-privatum.

#### CAUSÆ.

Causæ sunt vel internæ vel externæ. Interna causa est lymphæ salivalis aciditas: inter externas sunt acida, vel assumpta, vel vomitu rejecta.

#### DIAGNOSIS.

Diagnosis ex ægri relatione patet.

#### PROGNOSIS.

Dentium stupor à causa externa spontè remittit, nisi objectum fuerit majus contumax.

A causa interna dependens, ut plurimum est diuturna, & sæpè redit.

#### CURA.

Curat stuporem dentium portulaca recens masticata; caseus tam recens, quam vetustus, adeoque alcali manifestiore dives, filiqua ceracea masticata; item calidum ovi vitellum ad duritiem coctum applicatum. Omnium optimum est calida  $\square$  applicata.

## ARTICULUS VI.

De

### *Dentium Algore.*

**A**ffine dentium stupori malum est algore dentium, dum frigoris attractu notabiliter alterantur: Nempe acidum & frigus inimicif.



micissima existunt dentibus, undè illorum nimia impressione afficiuntur fibræ illorum interiores, & quasi irritantur, ut à cujusvis objecti actione specialis quidam dolor in dentibus percipiatur, masticationis negotium insigniter impediens.

C U R A.

Algorem hunc spiritus vini dentibus affricus, vel panis calens masticatus, vel vitellum ovi assatum, calidè masticatum: item theriaca dentibus affricata, huic malo medetur.

## S E C T I O I V.

### D E

## DEGLUTITIONE LÆSA.

**D**eglutitiolæditur, quando vel impeditur seu imminuitur, aut deficit, vel quando depravatur. Imminuitur

1. Oesophagi ex parte,
2. Stomachi seu orificii ventriculi superioris culpa.

Oesophagi vitium est, (1.) quando tam musculorum ejus tria paria, fauces sui ampliatione efformantium, unà cum sphinctere, paralyti resolvuntur, quàm ipsa musculosa ejus tunica simili malo corripitur. De posteriori vid. Willisus *Pharm. Rat. Vol. 1. p. 11.* de priori Tulpus *l. 1. Observ. c. 42.* (11.) propter ejusdem contracturam & angustiam: Sive hoc fiat (1.) tumoribus, tam propriis quàm partium vicinarum: Illud, quando inflammatur Synanche, aut quando scirrhuso tumore obsidetur, quando à caruncula excrecente vitatur: Exempla quorum vid. Rhodii *obs. 46. & 47. C. 2.* Hoc, quando tonsillæ, aspera arteria, aut uvula intumescunt, inflammantur; sive hoc fiat (2.) ab arcta nimis clausura & strictura fibrarum ejus, idque nunc ex spasmo seu convulsione; quo pertinent hypochondriaci subinde, non secus ac mulieres hystericae, gulæ adstrictionem & contracturam per nervorum spasmos ob consensum patientes. Nempe pertinet huc gulæ strictura ab utero, cuius mentionem facit Helmontius *Tract. Asthma & Tussis §. 31.* Hinc etiam in epileptico paroxysmo difficillima aut nulla solet esse deglutitio: Sicuti & stupenda convulsio & contractio faucium à vermibus videri potest in Thonero *l. 2. Observ. p. 94.* Hinc ex illarum nimia exsiccatione in febribus ardentibus continuis; quo suo modo etiam pertinet defectus salivæ, deglutitionem plus minus impediens, quia non satis madet gula; e. gr. post exercitium nimium: nunc ex illarum ab assumptis contractione & conglutinatione, quo Hochstedteri *facit Observ. Decad. 3. c. 5.* adstrictio gulæ ex potu vini malvatici, in quo radix consolidæ majoris infusa fuit. Sive hoc fiat (3.) ab obstructione, propter deglutita varia, aut ma-

jora in faucium isthmo hærentia, uti boli majores, nux Persica, ovum gallinaceum, &c. aut acuta gulæ infixæ, ibique tam sui insolitæ præsentia, quàm propter dolorem, & hujus occasione inflammationem aut abscessum, deglutitionem impediens, v. g. ossicula, spinæ piscium, aciculæ gulæ infixæ.

Orificium superius ventriculi seu stomachus in culpa est, quando ritè licet per oesophagi iter demissa nihilominus admittere debite recusat: id quod fit imprimis, quando quâcunque occasione irritatus seu laceffit, contumaciùs se stringit & claudit, adeoque assumpta ulterius progredi impedit. Id quod fit, (1.) quando vel inflammatum vel excoriatum, aut plus minus exulceratum, vel tumore quocunque, à priori nullo modo cognoscibili, obsessum fuerit: quo facit curiosa & notabilis observatio Willisi *Pharm. Ration. Vol. 1. p. 45.* (2.) quando copiosiores, plus minus acriores, flatus in ejusdem angustis inclusi fuerint, quorum inimicâ præsentia utrumque, speciatim superius, orificium ad pertinem suam stricturam irritatur. Undè assumpta non nisi difficulter admittit, aut admissæ eadem copiosi flatus eructantes insequuntur, eaque una rejiciuntur: quo facit non inelegans *Observ. Riverii l. 1. de morbis infrequentibus*, item Plateari *Observ. l. 1. p. 223.* (3.) Quando quâcunque de causa nauscat, aut assumenda horret ventriculus; nam & sic orificium claudit, non assumpturus sibi hostilia. Hac ratione familiare est febricitantibus, quælibet liquida aut esculenta fluida deglutire, sed carnes, ova frixa vel similia pertinaciter respuere, & oblata nullo modo, aut non nisi difficulter, admittere. Pertinet huc Amatus Lusitanus *Cent. 6. Curat. 49.* ubi post secretum sanguinis, & assumptorum corruptionem, deglutendi omnimoda difficultas, etiam vix, solâ vini assumptione salvâ. Conferatur Hildanus *Cent. 1. Obs. 37.*

Tandem depravatur deglutitio, & imprimis triplici modo:

1. Fit sæpius in morbis, ut liquida difficul-

ter

ter possint deglutiri, non solida: vid. Platerus. Id quod fit ob vitium gulæ: in specie ob ejus angustiam vel tumorem.

2. Accidit nonnunquam, ut solida facile deglutiri possint, non verò liquida: quæ hausta subito cum suffocationis metu per os & nares redeunt: quale exemplum habet Sanchez.

Vitium hoc fit propter laryngem, ob epiglottidem non perfectè claudentem laryngis rimulam, quæ à solidis quidem deprimitur, liquida verò dum in laryngem apertam penetrare inchoant, ex suffocationis aut doloris sensu cum impetu regurgitant, & quâ datâ portâ per os & nares prodeunt. Quo pertinet durities ossæ epiglottidis non ritè claudentis laryngem: de qua vid. Barbette in Anat. Practica.

3. Depravatur, quando in eodem assumptorum vel solidorum vel liquidorum genere quædam facile, quædam difficulter, quædam omninò non deglutiuntur: de cujus ratione infra, speciatim ex nausea ventriculi, constabit.

### PROGNOSIS.

Deglutitio quò magis vel minus tollitur, eò magis etiam vel minus periculum vitæ imminet.

Aparalyfi musculorum faucium nata difficilis deglutitio, periculosum & difficulter curabile malum est.

Quod si ob spirituum moventium defectum, & adeò insignem virium resolutionem, prout in acutis interdum accidit, malum evenit, pessimum signum, & mortis futuræ indicium est.

Si cum sonitu, quasi in lagenam vacuum, decidat potus, malum. In vulneribus si accidat ex convulsione deglutitio læsa, periculosum: sicut aliàs convulsiones faucium in acutis periculosa, in chronicis minus.

Si à tumoribus per se quidem, & ex interna causa naturali oritur malum, pro tumorum vel facile, vel difficulter, vel omnino non curabilium natura, prognosis facilis est: sic v.g. ex ulcere œsophagi cancroso omnimoda, adeoque lethalis deglutiendi impotentia: sic ob œsophagum cartilagineum factum deglutitio penitus abolita: vid. ann. 3. *M.A.N.C. obs. 170. p. 326.* adeoque lethalis.

Deglutitæ res alienæ in faucium isthmo vel hærent, vel extra hunc, vel ad ventriculum tandem descendunt. Dum in faucibus hærent, præter inimicam sui præsentiam interdum simul dolorem excitant, unde tumor, inflammatio, abscessus, iique vel lethales: de quo vid. Hildanus *cent. 1. obs. 35.* item *cent. 5. obs. 35.* ex ossiculo œsophago infixo tumor,

Tom. II.

dolor, febris, inflammatio, mors: vel hoc rupto abscessu rei peregrinæ cum pure excretionem aut descensum faciunt: Conferatur itidem Hildanus *cent. 1. obs. 32.* ubi mulier ossiculum devoratum, quo penè suffocabatur, septimo tandem die, excitatâ suppuratione, egressit: Vel per alia plus minus vicina loca exitum sibi quærunt: Quo facit exemplum notabile Paræi *l. 24. c. 19. chirurgie*, de graminis ramulo deglutito, qui postea integer per intercostale spatium erupit: idem Hildanus *cent. 1. obs. 31.* ubi spina piscis gutturi per biennium intixa, post excitato abscessu in extrema colli parte extracta: sicuti etiam ossicula, ex læsione claviculæ sinistri lateris secedentia, tussi post semestrem spatium excreta, legantur in *M.A.N.C. ann. 4. obs. 175.*

Dum verò ad ventriculum quocunque modo descendunt, vel inferius per anum successivè denuò excluduntur, dum v.g. miles metu, ne in itinere spoliaretur, sex ducatos deglutivit, eosque post aliquot & clystere abstergente sine noxa rursus reddidit, teste Michaëlis: vel dum fistula deglutita tertia die sine noxa per alvum fuit reddita, autore Bartholino *c. 1. hist. anat. 59.* Vel in stomacho pertinacius hærentes varia mala inferunt, dum v.g. pylorum obstruunt, quæ obstruatio, si contumacior fuerit, mortem comitem trahit, autore Kerckringio in *specilegio obs. 1.* Conferatur etiam Hildanus *c. 6. obs. 34.*

Quo etiam pertinent aciculæ, quarum quædam sine periculo, quædam cum summo periculo deglutitæ observantur, conf. *M. A. N.C. ann. 4. p. 77.* Vitri frustula aut annulus, cujus asperitate excitatam dysenteriam notat Zacutus Lusitanus *l. 2. Med. Princ. hist. 84.* Cæterorum huc facientium affectuum prognosis, ex dictis facilis est.

### C U R A.

Cura horum affectuum pro eorum varietate, & mali inde nati diversitate, etiam variat. Si paralyfis, ex generali paralytum & convulsionum cura patebit: in specie tamen si vitium paralyticum circa fauces, & principium œsophagi in culpa sit, convenit decoctum salviæ & crucæ cum vino paratum, in ore aliquamdiu detentum: vid. Platerus *l. 1. p. 209. observ.* item decoctum crucæ & sinapi, pulegii, nasturtii: item nux moschata masticata & deglutita est egregia: item ∇ vitæ infusionis thymi, simili ratione in ore detenta, vel & infusionis florum lavendulæ cum aliquot granis castorei similiter applicata: item aqua apoplectica, epileptica, &c. in ore detenta: essentia castorei, theriacalis cum essentia castorei junctus, ceraforum nigrorum, anisi, liliorum convallium, aqua Anhaltina, item succus salviæ mistus cum synapi: item cum nuce moscha-

(H)

moschata & castoreo, & instar linctus deglutitus: terebinthina cum aqua primulae veris mediante vitello ovi mista, successivè deglutita valdè convenit; item ꝑ succini destillatum, aut anisi, salviae, &c. guttatim inter fauces injecta, egregiè conducunt.

Externè collum regioque vicina inungenda oleo lumbricorum terrestrium, costino, & lumbricorum terrestrium cum oleo destillato succini, anisi, lavendulae, caryophyllorum, & similium. Quod si tumores harum partium oesophagum angustent, pro generali tumorum curatione vel gargarismis discutientibus Sculteti & Riverii, vel suppurantibus, siquidem cogniti fuerint quales sint, removendi sunt.

Clausura faucium & oesophagi à spasmo, aromaticis & nervinis, blandis opiat, additis tam internis quàm externis, curanda. Quando in febribus ardentibus aut malignis sine faucium tumore aut læsione sensibili, sed ex ariditate faucium & linguae, & proprii oesophagi exsiccatione, deglutitio aboletur: malum levare potest nonnihil per gargarismum Cornarii *obs.* 10. ex  $\nabla$  tepida cum paucis aceto vel etiam per mucilagines seminum cydoniorum cum aqua spermatis ranarum vel prunellae paratas, faucibus crebrius illitas, & blandè deglutitas. Externè unguentum Zacuti Lusitani *Prax. admir.* ad hunc affectum, compositum ex unguento filii Zachariae, unguento rosato, resumptivo, oleo amygd. dulcium, violarum, & mucilaginis cum lacte muliebri.

Salivae defectus potu praesertim vini vel cerevisiae secundariae refarcitur, item crystalli frustula in ore circumacta salivae copiam nonnihil provocant.

Assumpta externa pro sui varietate oppositis curanda, ut in illo Hœchstederi exemplo propinato acido strangulatio & faucium angustia sublata fuit.

Spasmus oesophagi hypochondriacorum & hysteriarum ut curetur, vide infra. Res alienae variae subinde deglutuntur, non levem molestiam inferentes: Inter quas sunt frusta vitri, pro quarum noxa avertenda, & ut sine damno per inferiora tandem excludantur, convenit in specie puls paulò spissior ex oriza vel milio, vel panico, debitâ copiâ assumpta, sine omni deluper ingesto potu: id quod et-

iam suo modo in aciculis à mulieribus deglutitis confert, item in spinis piscium aliisve acutioribus ad stomachum delatis obtinet: Sic per huiusmodi spissiora involutæ res deglutitæ acutiores sensim ex ventriculo per intestina ulterius promoventur. Aciculæ deglutitæ subinde gravia inferunt symptomata: Interim tamen, si ventriculo sint infixæ, adhibet Hildanus *cent.* 6. *obs.* 36. ꝑ amygdalarum dulcium & saccharum, in forma electuar. ii mista, ante pastum, ut ita dolor per ꝑ leniri, per saccharum verò ulcus fortè præsens abstergeri possit. Alias res deglutitæ in faucibus vel hærentes, vel etiam in asperam arteriam, aut ejusdem ramos, ex improvise dilapsæ, aut intra oesophagi superiorem tractum adhuc hærentes, ea iterum artificiosè eximenda veniunt, vel ulterius promoveantur, deorsum trudendo, vel tussi vel artificiali sternutatione, vel in specie excitatò vomitu per vomitorium liquidum infusum denuò foras ejiciuntur, propinando simul crebrius emollientia oleosa pro viis magis lubricis reddendis: Aut denique, si his modis non succedat negotium, instrumentis res tentanda, in quem finem vel forcipes rostris longis, vel instrumentum Willisii *Pharm. Rat. vol.* 1. p. 45. aut Hildani *cent.* 1. *obs.* 36. aut hujus succedanea *cent.* 6. *obs.* 34. vel candela cerea, vel spongiola cum filo, item pro aciculis hamulus Hildani *cent.* 6. *obs.* 34. adhibeatur, quo foras extrahantur: Denique observandum est, subinde res quasdam duriores in isthmo faucium diutius hære cum tussi, & variis symptomatis quasi phthisicis, quæ omnia re extraneâ interdum spontè excretâ evanescent: vid. Hœchstederus *Decad.* 6. *obs.* 10. Borellus *cent.* 4. *obs.* 63. Panarollus *Pentec. obs.* 7. In stomacho si fuerit vitium, priori ex causa, vel mala ejus methodicè curanda, vel instrumento Willisii *Pharmac. Ration. vol.* 1. p. 45. utendum. Si ex secunda causa: Carminativa externa & interna propinanda, infra de inflammatione stomachi dicenda. Quoad tertiam causam, stomacho gratis & acceptis insistendum.

Depravata deglutitio, cum quædam curabilis, quædam non curabilis, illa verò nervorum ex vitio speciatim oriatur, partim ex jamjam supra tractatis, partim suo loco dicendis, curatio manifesta erit.

## SECTIO V.

DE

## CHYLIFICATIONE LÆSA.



Chylificatio & alimentorum fermentatio læditur duobus modis.

1. Quando plus minus imminuitur, & tandem planè aboletur.

tur.

2. Quando insigniter depravatur, unde innumeræ alimentorum emergunt corruptiones: ad quas refertur etiam suo modo, si sub digestionem copiosus flatus nascantur.

CAPUT



CAPUT I.

De

*Chylosi imminuta, abolita  
& depravata.*

**C**hylosis imminuta & abolita aliàs dicitur coctio & chylosis læsa, ratione modi fermentativi dicitur peplis læsa, apeplia, & dyspeplia: quæ ultima nil aliud est, quam assumptorum in liquamen vitiosum conversio, ita ut è cibo potuque non chylus laudabilis, sed vel pituita, vel humor acris, alcalicus aut nidorosus, fiat. Hærent siquidem alimenta ultra ordinarium tempus in ventriculo, nullam planè vel exilem admodum mutationem in consistentia, colore & odore experiuntur, sed cruda aut semicocta, per quamcunque viam excernuntur: ita ut partes vel non, ut in apeplia, vel non sufficienter, nutriantur. Depravationes alimentorum alio nominere: Et cruditates dicuntur, quare licet sint innumeri modi, in specie tamen binæ istæ cruditates, acida & nidorosa, maximè peccant. Cruditas pituitosa, quam Sennertus & Riverius jungunt, ad chylicationem imminutam potius referenda erit.

Cruditas acida est, quando alimenta abeunt in liquamen acidum fixum, plus minus viscidum, nec sufficienter attenuatum & volatilifatum, fundamentum & origo tantum non omnium morborum chronicorum: Nidorosa cruditas est, quando eadem corrumpuntur ita, ut abeant in liquamen putrilaginosum horridi saporis & odoris, & omnino nutritioni ineptum, quod nidor vocatur: qualis percipi solet ex elu pinguium, aut ovorum cum butyro fixorum, nec adeò bene postmodum in stomacho digestorum; tunc enim exhalant ructus graveolentes, nidorosi,

C A U S A E.

Chyloseos ergò læsæ causa proxima erit vel in fermenti stomachici seu subjecti vitio, vel erit in vitio assumptorum alimentorum, seu objecti haud ritè proportionati. In fermento quidem, quando hoc non sufficienter, nec legitime digerit, sed depravatum alimenta potius corrumpit. Imprimis fermentum stomachi deficiens, spirituum animalium vel defectu, vel ad alias partes impetu, hinc parciore ad ventriculum affluxu, frustratur chylicationem, per causas de appetitu prostrato allegatas: hinc debilitati ut minus appetunt, ita minus etiam aut planè non digerunt; aut spirituum defectu aut in loco quodam dolentes, v. g. nephritici, aut gravioribus animi perturbationibus quasi præoccupati vel divertuntur, vel arcentur; aut quod conceptâ nausæ spontè abhorreant digestionem assumptorum.

Tom. II,

Deinde idem fermentum digestivum, vel non satis acre, vel non satis volatile non sufficienter digerere valet: contra nimis acidum fixum, aut à vitioso & peregrino acore, vel falso vel alio vitioso sapore, vel facile accensibilibus, ut dulcibus, in stomacho corruptum, uti fit in hypochondriacis & scorbuticis, cachecticis & aliis morbis chronicis, dissolvit quidem promptè alimenta, sed eadem non ritè fermentando, debite volatilifare nequit, nec in Sædinem debitam abit; quin potius nimio acore eadem in massam vitiosè acidam transmutat, ex quibus imprimis cruditas acida emergit. Quod si verò propter pingua copiosius assumpta, aut ova, butyro nimis frixa & condita, hebetetur fermenti activitas, aut etiam ex perverso bilis motu per vascula fellea ex intestinis hæc ipsa in stomachum aliquantulum regurgitet, ab hujus *Θ* volatilifatio debilitatur, alteratur etiam exinde fermenti activitas, adeò ut assumpta alimenta successivè putrescant & cruditatem nidorosam constituent.

Quod si eveniat, ut quæcunque occasione vitiosæ reliquæ ex præviis digestionibus vel rugis stomachi firmitus affixæ sint, vel intra ejus cavum etiam copiosiores aut parciore ut plurimum pituitæ viscidæ aut acidæ sub forma hæteant, & harum præsentia impeditur fermenti nativitas, cessat appetitus, deficit digestio. Inertia talis fermenti digestivi sæpè etiam inducitur in perversa curatione morborum, si remedia sunt pulveres fixiores, quales & fixum ac *Θ*ia fixa, & copiosè, in specie in acutis, præscribuntur. Observandum quoque, quod in reconvalescentia febrium intermittentium adsit labes stomachalis, ob inertiam fermenti stomachalis, nimis hebetati, aut nimis fixati à copiosis talibus ingestis.

Equidem in unoquoque individuo, tam brutorum, quam in specie hominum, peculiaris & à priori non perscrutabilis fermenti est varietas, ratione diversius usus assumptorum: unde fit, ut non tantum appetitus variet, sed etiam, ut ipsa variet alimentorum digestio, ita ut ea, quæ unus appetit avidè, ea facillimè digerat, alius econtra respuit, aut non sine molestia digerit. Appetitus sanè est index, qui loquitur & monstrat quasi, quæ sint assumenda: Nam quæ facile assumuntur, facile digeruntur; quia ea tantum appetuntur, quæ appropriata sunt fermento stomachi, & quæ ipsi sunt amica, consequenter facile dissolvit, & facile fermentat. Hinc inculcat nobis Hippocrates in aphorismis: *Quod appetit a facilius longè digerantur, quam non appetita.* Hinc etiam ii, qui certa quædam nonnunquam abhorrent edulia, incipiendo à minima dosi, & successivè ascendendo, eadem sibi successivè familiarissima reddunt.

(H 2)

red.

reddunt, qua ratione & venenorum victui quidam afflicti dicuntur, quatenus iisdem successivè fermentum stomachi alteratum & mutatum, talia olim hostilia, tanquam amica, facile arripit.

Quod attinet vitium chylosecos alterum: alimenta assumpta sunt causæ chylosecos læsæ, quando eadem certa ratione digestionem sunt inepta, quod fit imprimis vel propter earum quantitatem, dum sunt nimis copiosa, vel propter eorum qualitatem, dum sunt vitiosa, & digestionem alias inepta, aut ipsa assumptionis ratione ventriculo molesta. Quando enim copiosè nimis ingeruntur, & varia nimis assumuntur, non possunt digeri, quoniam fermentum ventriculi digestivum se habet in solutionis actu instar menstrui, habet determinatam activitatem, ultra quam non pergere potest: sicut unumquodque menstruum fermentativum, quod solvit & fermentat, requirit proportionem objectis debitam, in quod agere debet.

Præter quantitatem in specie varietas nimia ciborum etiam turbat digestionem: ut ut enim magna, adeoque alcahestica ferè sit fermenti stomachalis potentia, unde & semel varios admodum cibos potest dissolvere & fermentare; certum tamen est, quod non sit universalis, quin magis determinatur ad hunc vel illum cibum: Si ergo pingua cum acerbis, acida cum dulcibus, aromata cum vino aut V, fructus horæi cum aliis dyspeptis, lac cum fructibus horæis & acidis, & quasi quadrata cum rotundis, tam promiscuè ingeruntur, etiam certum est, quod fermentum, dum promptius agit in unum quam alterum, & sic citius unum vel alterum fermentescit, necessariò exinde digestio non leviter vitiatur, & pessimæ oriuntur corruptiones & cruditates; quarum comes est mucus copiosus in ventriculo residuus: vid. Kergerus *de Ferm.* Nam id, quod non rectè digeritur, vix nec absque difficultate per pylorum transmittitur, unde vel copiosius mucus obruit stomachum, vel retenta diutius in stomacho, tepore loci in putredinem & omnimodam corruptionem abeunt, & ulterius vitiatur Chylosis.

Quoad alimentorum qualitatem, eam præscribit simpliciter appetitus, secundum quem delectus est habendus; nam verum proverbium est: *quod sapit, nutrit.*

Ucut autem panis ex omnibus alimentis sit nobis familiarissimus, tamen uti omnis repletio mala, ita panis pessima; quia nimis exinde acor assumpta omnia imprægnat: & quia panis motus fermentativus est nimis, impeditur digestio, quatenus illius ratione non alteratur chylus in salum: huius verò ratione non subigitur debite, & subjectum tale debitam vitalem crasin seu characterem

à fermento digestivo recipere nequit, impeditur adeoque notabiliter digestio, cum pasta viscida & cruda relinquitur subinde in stomacho. Ex hoc etiam decidendum est; quare quidam vinum copiosius ferre queant, alii minus? nempe quorum volatilius ac subtilius, adeoque minus potens est fermentum digestivum, ut v. g. in pluribus literatis, hi ut plurimum læduntur à vino, huius acido prævalente acori fermentativo & uoso naturali, cum nec debite subigi, nec corrigi, nec appropriari tali subjecto potest; unde in talibus æstus facilis ab acido, ebrietas à Δe: hinc plures hypochondriaci, item cordis palpitationibus laborantes, tardius inebriari solent; vid. Langius *Misc. Cur. p. 39.*

Præter ciborum varietatem potus nimius, aut etiam nimis confertim ingestus, vel aquea quævis sunt, quæ insigniter turbant digestionem: ratio, quia

1. Potus nimius nimis diluit fermentum stomachi spirituosum digestivum.
2. Facit alimentorum in stomacho fluctuationem, quæ impedit nonnihil legitimam fermentationem.
3. Tonum stomachi lædit, eundem distendit, ejusque fibras laxat & flaccidas reddit, ut, digesta licet, non adeò commodè per pylorum emitti possint.

Huc etiam referendæ seræ nimis potationes, quarum rationes Lovverus *de Corde p. 140.* reddit. Quo etiam spectant, quando absque ullo, vel non sufficiente potu, cibi solidiores assumuntur, cum maceratione necessaria hac ratione defraudentur. Digestio alimentorum tandem læditur, quando alimenta non sufficienter masticantur, ita ut masticationem qui negligit, Arabibus animam suam odisse dicatur: vid. Helmontius *de Victus rat. §. 21.* Grembs *Arbor vita l. 2. c. 1. & 3.* & Mœbius *Fundam. Physiol. t. 9.*

Ex his facile patet, quid habendum sit de veterum intemperie inæquali: nam eandem non habere fundamentum in re, patet ex eo quod sanguis, qui calorem, & sic dictam temperiem vitiatur, omnibus partibus distribuitur æqualiter, & proportionaliter movetur ad hepar & ventriculum: Quamdiu ergo sanguis debito calore non viget, & quamdiu æquali proportionem circulatur, tam ad epar quam ad ventriculum, tamdiu sanè his ipsis etiam debitam conciliabit temperiem, & eodem modo debite calebit epar, atque calet ventriculus. In ista ergo, quam dixi, veterum intemperie, experientia vos docebit, quod reverà semper subsit vitium fermenti stomachici, quod sit nimis & vitiosè acidum, nec satis volatilisatum, quin simul obrutum copioso mucro crasso & viscido: Propterea instituitur in talibus cura, non cum iis, quæ calefaciunt stomachum & refrigerant hepar, sed quæ vim habent

habent attenuandi & dissolvendi, imò etiam volatilifandi & temperandi nimium fermenti acorem.

Præter has causas primarias chylosecos læsæ, secundariæ non nullæ adsunt, quæ, quatenus retentionem aut expulsionem turbant, etiam chylosin vitiant: quale exemplum non incognitum est. Procidentiam cartilaginis ensiformis, quàm sæpius causam fuisse chylosecos læsæ, & similium stomachi symptomatum, testis est expertus Zacutus Lusitanus in *l. Med. Princ. Hist. § 6. quæst. § 6.* item verrucæ ventriculo adnatæ chylosin turbare valent: quale exemplum habet Forestus in *c. 18. obs. 18. & 30.*

Preliis jam paulò & accuratius cruditas nidorosa & acida consideranda venit. Acida cruditas in acido plus minus viscido, digestionis defectu enata, consistit: Nidorosa verò cruditas nihil aliud est quàm putredinis inchoatæ species.

**I. Cruditas acida oritur**

1. Ob acidorum humorum in toto corpore abundantiam.
2. Ob acidorum frequentiore usum, vel etiam eorum, quæ licet non actu aciditatem manifestam præ se ferunt, reconditam tamen, & superveniente fermentatione se magis exferentem possident: qualia sunt saccharum & mel.
3. Ob usum aromatum acrium & magis osorum, v. gr. piperis, caryophyllorum, zinziberis, &c. ut pote quæ vel propter aciditatem reconditam, vel acidorum acrimoniam exaltandi energiam, sæpius sodam & cruditatem acidam producent.

**Cruditas nidorosa, ut pateat, observetur:**

1. Eam contingere in febribus, præsertim acutis, in quibus fermentum digestivum, ejusque debitus acor deficit, unde appetitus cessat, & alimentorum nausea supervenit, & cerevisiæ consuetæ lupulatæ seu nimis amaricantis horror adest; acidis contra delectantur.
2. Oriri eandem à bile similibusque humoribus alcalinis, ad ventriculum copiosius delatis.
3. Oriri frequentius ab assumptis, quæ aut ejusmodi nidorosam dispositionem in se habent, qualia sunt: pingua, oleosa, frixa, fermentum digestivum & ejus acidum plus minus obtundentia; quod faciunt in specie ova, lac & lacticia oleosa.
4. Quando assumpta quælibet in stomacho diutius morantur seu retinentur, rectè ob id monet Helmontius: *non putandum, quod chylus vitri instar in*

*fornace subinde excellentius coquatur, quo diutius retineatur; nam morâ nimia alienatur potius & corrumpitur.*

5. Nidorosa cruditas emergit ex horæis fructibus, facillè putrescibilibus; unde postmodum Diarrhœæ, &c.
6. Dulcia, quæ sub diurno calore ad amaritatem pronæ sunt, v. g. passulæ, glycyrrhiza, &c. eadem in stomacho facillè cruditatem nidorosam contrahunt, sub qua amarescunt, seu, ut aliàs dici solet, bilescunt.
7. Cruditatis nidorosæ præsentis sunt signa ructus, de quibus suprâ. Sic ægri: *Sie haben einen wunderlichen Geschmack. Es steigt ihnen auff wie faul holtz oder saule fische. Es steigt ihnen auff ganz bitter und ecklich.*

Ex his præsuppositis verè sequitur: hæc cruditatem nidorosam, quando fermentum stomachi vel deficit, vel assumptis plus minus ad hanc tendentibus ac dispositis infringitur. Unde debito modo nec fermentalem acorem contrahunt, nec digeruntur assumpta, sed morâ sui in loco calido humido ad corruptionem plus minus pro natura assumptorum scilicet, vel animalium, vel vegetabilium, ordinariò facillè putrescibilem, disponuntur. Unde pro putredinis natura alcali emergens, agens in pingue, saporem tetrum, vix explicabilem, subinde amaricantem, repræsentabit. Præ cæteris hoc illustrent ova, quibus vix citius quemcunque nidorem contrahere observatur; hinc etiam eadem ad duritiem cocta, brevi post tamen, nidorem eructant: Deinde facillimè ova cum butyro frixa nidorem concitant: alcali nempe ovorum copiosum agit non solum in proprium &c., sed simul in abundantius adjectum butyrum, unde & hujus additione & acidum stomachi magis obtunditur, adeoque ejus activitas sic parili ex ratione & nidoris vis intenditur: Hinc tetri ructus erumpunt, qui indicant quidem inchoatam fermentationem, sed depravatam, & in ipsa actione ex inertia fermenti digestivi deficientem; unde ex putredine contentorum ructus tales tetri oriuntur. Accedit pylorus in furorem actus, qui portas transitus claudendo, irritato ab hostili contento, dicta digerendo retinendoque magis magisque eorum putredinali corruptioni occasionem præbet.

**DIAGNOSIS.**

Quoad signa diagnostica: ea sunt facilia; nam in chylosi plus minus imminuta, præter ea, quæ habet Sennertus *l. 3. Prax. p. 128.* conqueruntur ægri de dolore gravativo stomachi, duabus horis post pastum: item de ructibus, etiam quinque vel sex horas ab alimentorum assumptione molestis, hisque non acidis, sed nunc insipidis, nunc putridis,



nunc  $\Delta$ eis, nunc genuinum assumptorum odorem & saporem adhuc representantibus: percipiunt dolorem gravativum circa præcordia post pastum plus vel minus obtusum: item conqueruntur tales ægri de appetitu maximè & ferè semper dejecto, de inflatione stomachi à pastu: item adest sæpè tensio & distensio præcordiorum. Præterea in talibus subjectis, imprimis hypochondriacis, mox post pastum adsunt phlogoses seu rubor faciei, quasi essent ebrii: item conqueruntur etiam ægri tales ut plurimum de difficili respiratione, ita quidem, ut respirationis impedimentum percipiant in præcordiis, in specie dum dorso incumbunt, ob tensionem insigniorem hypochondriorum: item matutino tempore solent habere os pituita & mucò viscido plenum, qui reverà est ex stomacho, dum per recubationem nocturnam, quæ regurgitat & pedetentim ad œsophagum tendit, & ita matutino tempore excernitur; Quæ à statu naturali recedunt, dum modò tenues & vossæ, modò crassæ & rubræ turbidæ apparent. Cæterum quando depravata est digestio, illam testantur imprimis ructus, Subinde vertigine corripuntur, imprimis jejuni, qualis vertigo imprimis in nondum senescentibus, semper radicem habet in stomacho. Hæc & similia signa ut plurimum etiam in malo hypochondriaco occurrunt, tam in principio quàm incremento, cum hujus mali radix revera hæreat in stomacho.

Cruditates acida cognoscitur ex soda, ructibus acidis & copiosioribus; item in talibus ægris solent præ cæteris copiosiores esse flatus, & quæ rejiciunt, aut naturâ aut arte per vomitum sunt admodum crassa, viscida ac pituitosa; interdum serosa, plus minus acida: alvus subinde est contumax, ob feces, ab acido vitioso coagulatas & induratas: alvus plerumque est adstricta.

Cruditates nidorosæ ructus habet fœtidos, aut saltem horridos, instar ovorum frixorum, aut piscium putridorum, atque hinc, præprimis matutino tempore, percipiunt saporem peregrinum & abominabilem quasi cinereum seu ligni putridi, quem sufficienter exprimere nequeunt: subinde amaror cum cardialgia & aliquali nausea percipitur ex ore & stomacho; quæ aut naturæ instinctu aut vomitu rejiciunt, sunt liquida, flava, & aut omninò insipida, aut quodammodo amaricantia, aut insipido-dulcia, aut ex amaro dulcescentia. Præterea habent alvum sæpius plus solito apertam.

#### PROGNOSIS.

Quod attinet signa prognostica: certum est, in chylosecis læsione & cruditatibus consistere fundamentum quamplurimum morborum, in specie chronicorum, adeò ut ex cruditate acida & ejus variis differentiis omnes febres intermittentes, malum hypochon-

driacum, scorbutus, nisi hic oriatur per contagium massæ sanguineæ communicatum, cachexiæ, passionibus colicæ, pathemata arthetica, calculi renum, affectus melancholici, in massa sanguinea deficiens hæmatosis, reverà originem ducant: item similis acor in stomacho, vitians alimenta, est origo morborum cutaneorum, scabiei, serpiginum, herpetum forsan & erysipelatum.

In genere omnium acidum seu acor vitiosus subinde in corpore oberrans, fundamentum habet in vitiosa digestionem ex corruptione acidi. Arthritis ipsa, dum vinum acescit in ventriculo, aut potulenta, ex vitioso acore tincta, proruunt in corpus, suos debet natales ex stomachi vitio.

#### CURA.

Quoad curam: Impossibile est arte promoveri vel instituere chylosin; est enim opus simpliciter naturæ, & dos vitalis fermentorum appropriata, juxta Helmontium, nullâ arte imitabilis. Ob id adjuvemus saltem naturæ opus, & corrigamus fermentum ventriculi, quantum fieri potest, & reducamus in naturalem statum,

1. Impedimenta quæcunque removendo.
2. Stomachum extergendo aromaticis volatilibus, & alcalino oleoso constantibus.
3. Stomacho sensibilem quasi stimulum addendo blandioribus acidis ipsi gratis.

Quoad primum scopum: Vomitoria primum obtinent locum, cruditates, omnesque sordes post digestionem relictas, veluti crudiores succos, removementia, inter quæ superius dictum infusa Galia esse præferenda; veriverbum enim est: quod hypochondriacis ebrietas usque ad vomitum salubris sit.

Post vomitoria purgantia impedimenta removementia inter quæ massa pilul. de hiera cum agarico in subjectis paulò robustioribus conducunt. Præter hanc pilulæ mastichinæ sunt elegantes, & stomacho appropriatæ; nam mastix est singulare stomachicum, ratione acidum volatile. Inter leniora, alvum evacuantia, est aloë, maximè pilulæ aloëphanginæ ex aromatibus factæ, exque ad imitationem Zvelfferi correctæ; *vidi ejus animadvers. in Pharmacop. Augustanam*; quæ si unò alterovè grano scammonii acuantur, magis conveniunt ad detergendas sordes mucilaginosas, stomacho sæpè adherentes, e.g.

MP. aloëphang. vel de ammon. gr. xvj. ad ʒj.

Qi & lat. gr. vj.

Scammon. ʒat. gr. ij.

extract. troch. alhand. gr. iʒ.

C.R. ʒi. pilula, S.

Exstrende Magen-Pillen.

MP.

℞. *MP. de hier. t. agar. vel familiar. Zuvelff. vel Extr. panchym. Crol-  
lii, vel Cathol. gr. xv.*

g. \*ci in \*o squill. sol. vel Extr. aut  
succ. inspiss. absinth. ʒʒ. vel gr. xij.  
extract. troch. alhand. gr. j. vel ij.

Scammon. ʒat. gr. j.

c. Elix. propr. vel Ess. mentha, l. ~  
mastich. f. pilula.

D. S. ut antea.

℞. *MP. mastich. ʒj.*

extr. absinth. ʒʒ.

troch. alhand.

Scamm. ʒat. a gr. ij.

c. ess. ligni sassafras. vel arc. ʒi, vel Elix.  
proprietas. f. Pilula,

D. S.

### Purgierende Magen-Pillen.

Pertinent huc pilula de ammoniaco Quer-  
cetani, familiares Zuvelfferi *Pharm. Reg. p. 66.*  
& pilula Tilemanni famigeratissimi, item  
pilula Benedictæ Schröderi. Alii non in-  
commodè cremorem ʒi in hunc finem adhi-  
bent, à ʒʒ. ad ʒj. in iusculo carnis vel pulli be-  
nè calido, hora unâ alterâve ante prandium,  
quavis septimanâ semel usurpando.

Alterantia contra chylosin læsam sunt ea,  
quæ constant ʒe volatili aromatico blando,  
quæ si maritentur cum subtilibus acidis, fiunt  
egregia remedia. Ex his imprimis commen-  
dantur semina, quæ vocantur minora calida,  
& post hæc galanga & zingiber. Conf. Plate-  
rus in *Observ. l. 2. p. 406.* Radix acori veri con-  
dita manè comesta quascunque cruditates &  
apepsias corrigit. Nux moschata quidem  
etiam est elegans, sed quia est nimis oleosa, &  
ob id obtundere solet fermentum stomachi,  
aliis subinde est temperanda, imprimis simpli-  
cibus stomachicis dictis, quæ sunt satis nota.

Præ cæteris palmam obtinebunt absinthi-  
um & mentha, hinc à quibusdam laudatur  
vinum absinthites, post absinthium myrrha,  
nec non zedoaria, item acorus, rosamarinus,  
& lignum sassafras, & quam plurima supra in  
anorexia allegata insigniter conducunt.  
Item acida ~uosa præ cæteris valent ut ~  
ʒis dulcis, item ~ ʒi dulcis; ~ mastichis  
benè rectificatus, mistus cum spiritu menthae.  
Elixyr proprietatis Paracelsi, cum acido per se  
in cruditatibus nidiosis maximè conducit,  
mistum cum spiritu cochleariæ.

Convenit etiam egregiè elixyr vitrioli  
Myns. titè paratum à ʒʒ. ad ʒʒ. & elixyr sto-  
machale D. Michaelis, essentia melissæ, men-  
thæ, pulegii, rosamarini, ligni sassafras, myr-  
rhæ, cum spiritu vini ʒisato paratæ conveni-  
unt, si acidulentur cum parva quantitate ~  
salis, vel spiritus vitrioli; Sic enim concipi-  
unt subtilem volatilem acorem, e.g.

℞. *Ess. melissa ʒj.*

~ ʒi Philos. ʒij.

M. S.

Magen-Essentia.

Dosis gutt. 40. l. 50.

℞. *Elix. menth. ʒij.*

~ cinnam. ~ of. ʒvj.

M. in sine pastus hauriatur cochl. j. vel ij.

Cydonia, & omnia ex his parata, mirè condu-  
cunt ad juvandam digestionem. Interdum  
etiam fiunt vina medicata, ut vinum absinthi-  
tes, vel fiat vinum tale medicamentosum jux-  
ta Sylvii *Praxin* ex absinthio, mentha, radice  
gentianæ, & acori veri, aliisque aromaticis,  
quibus de mace, vel zinziberis aliquid, potest  
addi: e.g.

℞. *Herb. menth. crisp.*

calam. montan.

absinth. a M. j.

Rad. enul. camp.

acori veri rec. a ʒj.

galanga ʒij.

Cinnam. ac. ʒij.

Macis ʒj.

Semin. anisi ʒij. ad ʒvj.

Concis. & contus. includantur *Nodulo, S.*

### Püschel zum Magen-Wein.

Nodulus hic infundatur in meni. j. vini Rhe-  
nani, stent per horas 12. in loco calido; de quo  
capiatur ante pastum bonus haustus, singulis  
haustibus addendo ~ ʒis dulcis gutt. xv. vel  
loco hujus elixyr proprietatis, imprimis cum  
spiritu cochleariæ factum & paratum. Vel

℞. *Herb. menth. crispæ.*

absinth. a m. j.

rad. enul. ʒvj.

zingib. vel zedoar. ʒij.

Cinnam. ac. ʒij.

Semin. anisi ʒʒ.

Incis. & contus. includ. nodulo, vino infun-  
dendo, ac in eodem ceu vehiculo ~ ʒis dul-  
cis gutt. xv. ad xx. assumuntur.

D. S. ut antea.

Electuarii loco sufficiat rob baccarum, juni-  
peri, imprægnatum pulvere zinziberis aut ma-  
cis, addito pauco saccharo ad imitationem  
Paracelsi.

Conveniunt ulterius egregiè ʒina, mu-  
cum incidentia & abstergentia, inter quæ  
ʒ\*, propinatum ad gr. xv. in vino absinthite  
seu infusionis ligni sassafras. Post hoc non min⁹  
etiam ʒ vitriolatum seu arcanum duplicatum  
Myns. egregium est aut ʒ ʒ-latus ad imitatiq-  
nem Tachenii paratus, imprimis si cum aro-  
maticis speciebus diatrion pipereon, aut cum  
speciebus diagalangæ, aut stomachicis Myn-  
sichtii, cubebis, similibusque pulveribus sto-  
machicis mistum, item terra foliata ʒi f. ʒ  
essentiale, epaticum rubrum, aut cremor ʒi,  
vel solus vel cum ʒ ʒ, vel similibus pulveri-  
bus stomachicis mistus. Nec mixtura simplex  
est inelegans, cum ex acido volatili tempera-

to constet, item spiritus carminativus de tribus, egregie convenit. Noti aliàs sunt pulveres stomachici Birckmanni & Quercetani, in quibus basis est radix ari & e volatili acri & penetrante imprægnata: Præterea pertinet huc pulvis stomachalis D. Michaelis. Vel

- ℞. Rad. aron. ʒj.  
lapill. cancr. præp. ʒß.  
Ois absinth. ʒj.  
Oo Dat. caryoph. macis à gutt. iij.

M. f. pulvis pro tribus dosibus, S.

**Magen-Pulver.**

- Vel ℞. Pulv. rad. aron. ʒß.  
Flor. O \*ci ʒij.  
piper. nigri ʒiß.  
zingiber. ʒß.  
Oo destill. calam. arom. ʒj.  
M. f. pulvis.

Poterius in usu habuit specificum stomachicum, quo plura præstitit in suis ægris; descriptio nullibi prostat: Interim probabile est, quod fuerit remedium ðiale ex regulo ʒij ʃiali, paratum ad imitationem ferè ʒij diaphoretici. Ad specifica stomachica pertinent etiam chocolata.

Hiscæ pro senibus annumeranda venit ambra grisea & medicamenta ambrata, vel in forma sicca cum saccharo; vel liquida usurpata, cum ~ unempe menthæ, vel melissæ, vel salviæ, in essentiam stomachicam redacta.

Non minoris pretii est herba theæ, quæ non tantum stomachum roborat, sed & præprimis liberat & præservat à calculo & arthritide.

Conducit etiam essentia piperis cum spiritu vini & essentia composita ex salvia, zedoaria, & myrrha, cum ~ O \*ci vinoso parata, dosi 40. gutt. item ~ a stomachicæ mastichinæ:

- e. g. ℞. Mastich el.  
rad. acori vulg. à ʒiij.  
galang.  
caryophyll. à ʒj.  
cinnam. ʒiß.  
zingiber.  
macis à ʒß.

His solum affunditur vinum malvaticum: digeruntur in loco calido, hinc per MB destillantur. Dosis est cochl. j. vel alterum per intervallo ante prandium vel cœnam per horam unam; item linctum multiplicatum eo madefactum commodè applicari potest regioni stomachi.

In specie quoad cruditatem nidorofam, ceu sæpius incorrigibilem, id quod corruptum, evacuandum est. Convenit autem vomitus, aut evacuatio per rhabarbarum & tamarindum. Præterea curatur per præcipitantia ʃea, inter quæ eminet crySTALLUS præparata. Post horum exhibitionem mirè conducunt julebi acidulati, & subacida volatilia, cydoniata, succus citri, succus & syrupus portulacæ, item conserva rosarum aut menthæ vitriolata, ~ Ois dulcis, Oli dulcis, elixyr proprietatis, ~ mastichis, ʃ hepaticus ruber cum ebore

sine igne, cremor & crySTALLI ʃi cum coralliis rubris: e. g.

- ℞. Crem. ʃi, l. pulv. epat. rub. ʒj.  
Corall. r. præp. ʒj. ad ʒij.  
M. f. pulvis pro 4. dosibus.  
D. S.

**Magen-Pulver.**

- ℞. Pulv. hepat. rub.  
ebor. f. Δe à ʒj.  
& S macul. nuc. mosch. gutt. ij. l. iij.  
M. f. pulvis pro aliquot dosibus.  
D. S. ut antea.

- ℞. Ois digest. hypochondr. ʒß.  
lapill. 69. præp. ʒj.

M. f. pulvis pro duab. dosibus.  
D. S. ut supra.

- ℞. Arcan. dupl. ʒij.  
off. sep. præp. ʒj.  
pulv. nuc. mosch. gr. vj.

M. pro duab. l. tribus dosibus. D. S. ut supra.

- ℞. Arcan. dupl. ʒij.  
Spec. diatrion piper. ʒj.

M. pro duab. dos.  
D. S. ut supra.

- ℞. liqv. ʃ fol. ʃi ʒiij.  
D. S.

**Magen-Essent.**

Dentur pro dosi 40. ad 50. guttulæ.

- ℞. ~ Ois dulc. ʒß.  
D. S.

**Magen-Spiritus.**

Dosis sunt gutt. 30.

- ℞. ~ mentha ʒiß.  
cinnam. ʒij.  
Succ. cydonior. ʒvj.  
Syr. acetos. citri. ʒß.  
M. f. Potio. S.

**Magen-Träncklein.**

- ℞. ~ mentha ʒij.  
cinnam. c. V. ʒß.  
Syr. cydonior.  
portul. à ʒiij.  
~ Oli dulcis parum.  
M. pro Potione. S.

**Magen-stärckend Träncklein.**

Cruditas vero acida corrigitur per absorbentia & acidum destruentia, ac aromatica volatilia, ut cochleariam, centaureum minus, rhabarbarum in nodulis, absinthium, radicem helenii & armoraciæ, acori veri, vinum & cerevisiam absinthitem, essentias, &c. Item caryophyllos, nucem moschatam, zingiber, de quo refert Platerus, Pontificios post jejunii quadragesimalis tempus cruditates, ex piscium esu collectas, optimè pulveris zingiberis usu corrigere, & mala inde nata avertere: per essentiam & ~ vegetabiles volatiles, menthæ, salviæ, cochleariæ, item aquam vitæ Matthioli, ~ antiscorbuticum, nasturtii, piperitidis, essentiam ligni sassafras, & similia; cinnamomifata huc etiam conferunt, galanga, mentha, fœniculum, rosamarinus,

R. ʃi



## Chylificatio læsa.

¶ Si aeris, elixyr proprietatis sine acido & volatilis, ~ ❖ ci volatilis, ¶i volatilis, C.C. & carminativus de tribus, & similia alcalia volatilia, imprimis cum spiritibus vegetabilibus commista, ut fiant ❖ volatilia oleosa: quale est ~ ❖ ci anisatus, caryophyllatus, sin acidum nimium, conveniunt ❖ia omnia fixa, ut ❖ absinthii, cardui benedicti, ¶i, artemisia, item ❖ digestivum hypochondriacum, arcanum duplicatum, & stomachalis Quercetani & Michaelis, lapilli 69. creta, C.C. ustum, ebur, &c.

Destructio acidò, purgantia demum adhibenda: nisi enim hæc methodus observetur, nihil per purgantia evacuabitur; sed tormina & motus convulsivi excitantur. Usus cancrorum fluviatilium mirè proficiuus est, præprimis si cum testis assumantur, cum egregiè acidum absorbeant, quod ne iterum augeatur, ab omnibus omnino acetariis, acidis aliis & acescentibus abstinendum est.

Externè ad Chylosin imminutam conferunt olea nonnulla Sata suavecotentia, plus minus aromatica, & itidem parata Baltama, hæc inter excellens est ❖ angelicæ Satum, mentha, caryophyllorum, macis, baccarum juniperi, &c. ❖ stomachale compositum Cratonis itidem est egregium, speciatim ❖ destillatum mastichis flavum rectificatum extrinsecus illitum. Vel

❖. ❖ Stomachal. Crat. ʒij.  
destillat. mentha ʒß  
caryophyllor.  
zedoar. ana ʒß.  
M. S.

**Neusserlich Oehl / den Magen damit zu schmierem.**

Illinatur stomachi regioni, applicando desuper laterem calefactum: Vel

❖. ❖ Menth. per infus. & coct. par. ʒij.  
expr. nuc. Mosch. ʒj.  
❖ destillat. mentha ʒß.  
macis  
caryophyll. ʒ ʒß.  
M. S. ut antea.

Pro balsamo sufficit ❖ nucis Moschatæ expressum cum oleo Sato corticum aurantium & macis mistum; vel balsamus stomachalis Timzi, item balsamus Peruvianus regioni præcordiorum illitus.

❖. ❖ expr. nucis. ʒij.  
destill. bacc. juniper. ʒj.  
Calami arom. ʒß.  
macis ʒß.

M. pro Balsamo S.

**Wagen-Balsam.**

Præterea tacamahaca, galbanum, mastix, &c. in forma emplastri seu scuti stomachalis regioni stomachi applicentur: e.g.

❖. Tacamahac. p. iij.  
Bals. Peruvian. p. j.

Tom. II

c. l. q. Theriac. seu ❖ destillato quodam, bacc. juniperi, &c. fiat Emplastrum:

D. S.

**Wagen-Pflaster.**

Item:

❖. Tacamahac. p. iij.

g. caranna p. j.

Malax. c. Bals. Peruv. vel ❖ destillat. mentha, postquam Δe liquefacta fuerint:

D. S. ut antea.

Vel

❖. Emplastr. stomachal. Crat.

Tacamab. à q. f.

liquefacta malax. cum Balsamo Peruviano.

D. S. ut supra.

Pertinet huc scutum stomachale de styraçe Hartmanni in *Praxi Chymiatr.* p. 167. item *Empl. de Tacamahaca* Schræderi *Pharm.* l. 2. cap. 53. n. 18. pag. 201. item *Emplastrum stomachale* Myns. in *armam. Chym.* p. 504. Tandem spongia vino generoso vel spiritu vini cui simplicia stomachica fuerunt infusa, imprægnata, stomachi regioni imposita, idque calidè, itidem in usu est: omnia denique externa in chylosi læsa conveniunt, quæ in anorexia dicta, & suo loco de vomitu & diarrhæa dicentur.

## CAPUT II.

De

*Flatibus in Stomacho & intestinis.*

**Q**Uando sub chylicatione vitiata simul generantur copiosi flatus, iique insigniter stomachum distendunt, dicitur inflatio stomachi: Quod si flatus cum sonitu non semper grato per os erumpant, dicitur eructatio: sin copiosi admodum suprâ & intrâ simul erumpant, ut in malo hypochondriaco, dicitur Cholera sicca; qui tres affectus parum inter se differunt, & uno modo curari possunt. Flatus hi si in stomacho retineantur, satis sunt molesti, imò interdum tant atroces, ut pessima inducant symptomata: Sic Bartholinus exemplum habet C. 2. *Epist.* 81. p. 687. scemina, quæ ventriculum adeo habuit inflatum, ut gravida habitâ fuerit.

Flatus cum neque ad vapores neque ad exhalationes referri possint (vid. Kergerus *Tr. de Ferm.* §. 3. c. 3. p. 223. & sequentibus) merito ab Helmontio ad tertiam quandam classem huiusmodi entium, nempe ad gas seu spiritus incoercibiles referuntur, quod gas ipsi est substantia subtilis, at spirituosâ, in corpus visibile incoercibilis, nec immediate reducibilis, genita ex mistis corporibus per motum fermentationis aut effervescentiæ.

Reperiuntur etiam flatus in aliis locis, si ma-

(1)

teria

teria & causa efficiens commoda adfuerit, non tantum in tumoribus flatulentis, sed & observandum est, quod in venæ sectione non levis flatus proruperit, quamvis à ventriculo & intestinis, aliisvè partibus, sæpè communicentur; ita ut qui nunc in stomacho exagitant, mox ad massam sanguineam delati flatus, præcordiorum anxietates, difficultates spirandi, &c. procreent, & sæpius ex vulneratis vasibus sanguineis prorumpant.

Natura eorum obscurissima est, & ordinariò solent confundi cum exhalationibus & vaporibus, qui tamen toto cœlo differunt.

Quod attinet vapores: ii sunt effluvia humida, beneficio caloris resoluta, à frigore tenui in guttas condensabilia, unde halitus condensati flores, fuligo dicuntur, cum quibus nullum commercium habent flatus, siquidem vapores & halitus calore solvuntur, & frigore constringuntur; neutrum autem horum flatus patiuntur.

Ex his patet: flatus esse producta nova corporum cum aliis nullo modo conferenda; unde ab Helmontio tanquam nova entia, novo nomine appellantur gas; generatio ergò eorum est de novo, cum non præexistant formaliter in assumptis, sed materialiter fiant demum in stomacho, idque nec à calore, nec à frigore per se, sed tantum ab acido præternaturali per vitiosam fermentationem, ex & in materia crassa, viscida & pituitosa; hinc est, quod veteres dixere, oriri flatus à Melancholia; unde in mulieribus hystericis, hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis, similibusque vitio fermenti ventriculi mucagine acida obruti, vel succi pancreatici nimis acidi, copiosissimi generantur flatus, propter acidum fermentans materiam pituitosam, & viscidam etiam quibuscunque ex cibis, ita ut causa efficiens non ructuum solum, sed & flatuum sit acidum: materia ex qua, seu subiectum, sit viscidum seu mucilaginosum pingue.

Flatus quod non insint assumptis, patet ex eo; quod duo homines, alter sanus, alter æger, iidem alimentis utentes, prior nullos generet flatus, posterior copiosissimos: ratio est diversitas fermentorum in stomacho, unde hypochondriaci & hystericæ ferè ex omnibus alimentis eliciunt flatus, quod alia non faciunt subiecta, quia in illis abundat acidum vitiosum. Certum interim est, alimenta quædam in quibusdam magis esse apta, ut exinde facillimè elaborentur flatus, quàm in aliis: e. g. raphanus, allium, cepæ; quoniam Ææ volatili acri abundantia, incidunt & attenuant mucilaginem stomachi, & postmodum cum acido stomachi concurrendo generant flatus.

Nisi ergò occasione talium ingestorum nati sint flatus, de subiecto materiæ viscidæ seu pituitosis humoribus confirmatur suspicio:

quod verò adsit in talibus talis mucilago acida viscida, experientia testatur; quia in vomitu cructant copiosa, crassa, viscida, renacia plus minus acida: interim rarum est exemplum, quod habet Rhodius *Cens. 2. Observ. 52.* de subitanea ventriculi & abdominis inflatione ex esu pinguium post ulum decocti Chinæ.

### PARS AFFECTA.

Pars primariò affecta est stomachus, tam cavum ejus ratione flatuum, quàm necessario orificium superius, cujus clausura conpiveret vel distendit, plus minus.

### CAUSÆ.

Causa proxima distensionis stomachi & flatus consistit in acido fermentante in materia viscida. Quo etiam pertinet compressio: quemadmodum enim aer naturam suam vim quandam elasticam seu expansivam possidet, ratione cujus ille compressus instar plumæ seu lanæ cujusdam semper se iterum explicare conatur, hincque vapores vel alia corpora leviora sibi contigua propellit, & ventum excitat; ita venti in microcosmi cavitatibus undulantes, si harum coarctatione comprimentur, aut per naturam suam expansivam, aut à calore viscerum magis agitati, vel novorum accessu superati, angustius hoc spatium evitare conando, unusque eorum alterum agitando, ventum microcosmi seu flatum producant: quod exinde evidens sit, quod circa coli illam flexuram arctissimam subsistant, flatuum copia & impetus major inde observatur, atmosphæram scilicet illam intestinorum compressam.

Remota sunt materia, vel assumpra vel retenta: assumpta sunt omnia talia, quæ viscidiores generant succos, quæ ad flatus disponunt: quoad retenta; constat, quod cruditas acida inducat flatus, ut sit in hypochondriacis, scorbuticis, cachecticis.

Porro de flatu naturali & præternaturali, item de quadruplici ructuum differentia, dum alius est acidus, ut in hypochondriacis & jejuniis; alius nidorosus non nihil graveolens, ex cruditate nidorosa; alius specificus, seu is, qui simplicium assumptorum odorem & saporem simul refert, v. g. post esum cepacearum, armoraciæ, raphani, piscium, alius insipidus, quando adsunt flatus sine certo ac determinato sapore: Conf. Helmontius *Tr. de Flat.* Interdum, licet rarius, adest etiam ructus foetidus, pessimæ notæ, & admodum horrendus.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica in inflatione stomachi, notandum: (1.) Quando erumpunt ructus, satis se prodit malum; quando verò hi ipsi, propter orificium stomachi finitimum



stom firmius clausum coercentur in cavo ventriculi, adsunt præcordiorum angustia. (2.) Deinde eadem præcordia sunt admodum distenta. (3.) Si eadem rangantur, renissus quidam ibidem percipitur. (4.) Aegri conqueruntur de difficili respiratione, propter distentum stomachum, & hinc impeditum diaphragmatis motum, in primis dum supini incumbunt; & dolor interdum tantus est, ut æger nesciat, quo se vertat; interdum ita, ut animi deliquia immineant, quod in hypochondriacis est frequens. (5.) Subinde quoque percipiunt flatulentias quasdam in stomacho, quando se jactitant ex uno latere in alterum, ut describitur à Foresto l. 18. obs. 39. in schol.

Gravitas & distensio talis quandoque non solum circa ventrem ipsum percipitur, sed & totum pectus occupat; aliquando verò retrò & inter collum & dorsum, ac ipsas vertebrae irruit: sæpè utrumque latus subit; interdum verò tumorem circa os ventriculi efficit, & tunc ructus inanes fiunt, parum alleviantes; & flatuum, qui per alvum excerni consueverunt, eruptio inhibetur: augetur malum, si ante perfectam restitutionem cibum largius accipiant; sic enim magis membra inflantur, & cum dolore distenduntur.

In genere distensio stomachi interdum usque adeo est molesta ægro, ut nesciat, quorsum se convertere debeat? Interrogatus de passione, dicit: *Es sey ihm alles zu enge sorne.* Imò hæc anxietates interdum eo usque procedunt, ut respirationes valde difficiles reddantur: Si emittunt ructus, levantur; eructaturi, de insigni angustia præcordiorum conqueruntur.

Inflatio ergo est Intumescencia, orta à flatibus, genitis ab acido per fermentationem in subjecto viscido.

### PROGNOSIS.

Quod attinet signa prognostica: nulli flatus sunt boni, excipiantur jejuni, licet melius sit, si cessant; innuunt enim stomachum sub digestionem plus minus defectuosum; unde ordinaria sunt hypochondriacorum symptomata.

Inflatio ventriculi, quæ in convalescentibus fit, recidivam morbi prioris significat.

Ut ut autem per se parum in recessu habeant inflatio stomachi & ructus, diutius tamen durantes, nec facile corrigibiles, metum futuræ tympanitidis, seu hydropis sicci injiciunt.

Ructus, qui ejiciuntur foetidi, pessimæ sunt notæ, & à Gabelchovero in Cent. 2. Cur. 15. in annotationibus admodum funesti declarantur: imo monet medicos, ut sibi caveant à taliter eructantibus, ne foetore contagium malignum in pulmones inspirent.

Rarum est, quod Bartholinus in actis Med. Hafnien. p. 198. & Rhodius C. 2. Obs. 52. observarunt externâ frictione corporis quocunque in loco ructus continuos,

Tom. II.

### C U R A.

1. In cura attenuanda & expurganda materia viscida, crassa & pituitosa in stomacho & primis viis hærens.
2. Per medicamenta aromatica & ino-volatilia & sa discutiendi flatus, ut facilius per guttur inferius erumpant, & simul acidum fermentativum temperandum vel corrigendum.
3. Flatuum impetus per  $\Phi$  &  $\Psi$  data, flatulentias figentia, & fermentationis motum sistentia, penitus cöercendus & figendus.

Quoad I. conveniunt medicamenta vomitoria, citius & tutius evacuantia è stomacho fomitem morbosum, maximè Galia: imprimis à Rulando usurpatur  $\nabla$  benedicta. Vomitoria si non comoda, alöetica imprimis conveniunt, & pilulæ ex iis paratæ; hinc & pilulæ mastichinæ, vel alöephanginæ, quibus semper addatur gummi ammoniacum, galbanum, succos viscidos resolventia & evacuantia: e. g. ad affectus stomachi chronicos & sæpe recidivantes, ex materia viscida acida oriundos, optimè conveniunt tales pilulæ usuales.

$\mathfrak{R}$ . g.  $\mathfrak{xci}$  in  $\div$  sol. 3ß.  
Mastich. el. gr. xv.  
aloes succot. gr. ix.  
extr. troch. alhand. gr. jv.  
c. essent. mentha f. pilula num. 60.

D. S.

Pillen auff etliche mahl.

Dosis 12. l. 15. &c.

Alia formula talium pilularum in affectibus hypochondriacis, hystericeis, scorbuticis:

$\mathfrak{R}$ . g.  $\mathfrak{xci}$  + solut.  
 $\Phi$  li  $\sigma$  is Car. a 3ß.  
aloes luc. gr. xv.  
Mastich.  
Myrrh. aa. 3ß.  
extr. troch. alhand. gr. viij.  
c. f. q. essent. vel  $\sigma$  Sat. mentha f. pilule num. 105.

D. S. ut antea.

Pillen auff einmahl.

Quidam etiam commendat pulverem senæ laxativum, qui non est inelegans: Vel

$\mathfrak{R}$ . pulv. jalapp. gr. xij.  
Scamm.  $\frac{1}{2}$  at. gr. iij.  
 $\Phi$  i gr. vi.  
 $\sigma$  Sat. carminat. cujusd. gutt. i. l. iij.  
M. f. pulvis, S.

Purgier Pulver auff einmahl.

Subtracto fomite, in specie mirè conveniunt simplicia aromatica, carminativa dicta, i. e. salia volatilia oleosa, acidum temperando & corrigendo, viscidumque incidendo, qualia sunt radices angelicæ, gentianæ, aristolochiæ rotundæ, acori veri, galangæ, cortices aurantiorum, nux moschata, cardamo: tum caryophylli, macis, zingiber, zedoaria, & cinnamonum,

(12)



momum, & ex his destillata 3a: è 3inis volatilibus oleosis simplicibus carminantibus paratz misturæ, v. g.

℞. *Aqu. fœnicul.*

*Mentha* aa. ʒiʒ.

*carmin. c. V.* ʒj.

~ *anisi.*

*essent. cortic. aur.* ʒiij.

3o *destillat. macis* gutt. v.

*Syr. cort. aurant.* ʒvj.

M. f. *Potio* cochleatim haurienda.

D. S.

### Träncklein gegen die Blähung.

*Chamomilla* tam vulgaris quàm *Romana*, harumque 3o destillata sunt optima; conf. *Forest. l. 18. Obs. 39.*

Porro semina quatuor calida majora, reverà sunt solamen pauperum, uti *Helmontius* dicit; eorumque in vino paratum decoctum, optimè prodest. Item 3a eorum destillata, vel cum his & ~u 3oci vinoso fiat 3o sum, hinc ~ *anisi*, 3oci *anifat*us, item feminis *dauci*, *baccæ lauri*, *juniperi*, ex quæ his parata quæcunque.

Post convenit *castoreum*, quod est singulare remedium ad omnes affectus flatulentos, maximè muliebres & *hypochondriacos*, vel in substantia, vel ejus extractum & essentia, imprimis cum spiritu 3oci vinoso facta, aliaque ex eo parata remedia; item *myrrha* atque *theracia*. *Cortices* etiam *aurantiorum* sunt nobile aromaticum ad acidum stomachi corrigendum, & status discutiendos, item eorundem essentia, & oleum datum, ~ 3oci *cinnamomifatus*, & in genere quæcunque aromatica 3e volatili oleoso largiter imprægnata. Ratione *cinnamomi* species omnes aromaticæ officinales hic expectantur: Vel

℞. *Semin. coriandr.* ʒʒ.

*anisi.*

*fœnicul.* aa. ʒij.

*zedoar.*

*zingiber.*

*galang.*

3oci aa. ʒj.

*Specier. diatrion piper.* ʒiʒ.

*Elaosach. aromat.* ʒij.

M. f. *Tragea grossa*. S.

*Magen-Trisincth.*

Uterius ex compositis sunt aquæ stomachicæ, usitatæ tam simplices, quàm compositæ, *fœniculi* & *menthæ*, ∇ carminativa *Dorncrellii*, ∇ *cinnamomi cydoniata*, *syrupus corticum aurantiorum*; item *syrupus baccarum lauri* vel *juniperi*: de quibus vid. *Horstius l. 4. obs. 4. & lib. 5. obs. 2.* quin etiam spiritus *anisi*, essentia *chamomillæ Romanæ*, olea 3ata *seminum carvi*, *anisi*, *corticum aurantiorum*, *cinnamomi*; item *balsamus sulphuris terebinthinatus* & *anifat*us in contumacio-

ribus ructibus est optimus; omnibus his moritò præfertur ~ carminativus de tribus.

Ex his variæ concinnari possunt formulæ.

℞. *Aq. mentha* ʒij.

*carmin. Dorncr.* ʒj.

~ *iberiac. camphor.* ʒiij.

*carminativ. de trib.* ʒiʒ.

*laud. opiat* gr. iij.

*Syr. cortic. aurantior.* ʒvj.

M. f. *Potio*. S.

*Magen-stärkende Mixtur.*

Detur in paroxysmo, ubi nullus ardor aut æstus:

℞. *Aqu. chamomill.* ʒiij.

*essent. Castor.* ʒij. ʒiʒ.

~ 3oci *anisi.* ʒj.

*Syr. cort. aur.* ʒiij.

M. S. ut supra.

℞. *Elyx. propriet. sine acido* ʒiij.

*essent. castorei* ʒij.

*opii* ʒj.

M. D. S.

*Magen-stärkend-Elixier.*

*Dosis* 40. guttulæ.

Tandem etiam ~ 3i nobilissimum est carminativum, imprimis dulcificatus. Hic enim, utut sit acidus, præfertur tamen reliquis, figendo potenter erumpentes ~ flatuosos, & impediendo fermentationis & effervescentiæ motum, adeoque quascunque flatulentias cohibet: speciatim confert, si cum flatibus conjunctus sit ardor, seu æstus, aut etiam superveniant vagæ phlogoses, quæ nunc citò iterum evanescent, nunc citò advolant, & solent oriri ex bile cum acido, in intestinis concurrente & vitiosè effervescente. Melioratur adhuc, si pro dulcificatione ejus loco ∇ simplicis sumitur ~ appropriatus, v. g. spiritus *anisi*, *menthæ*, *baccarum juniperi*, aut etiam spiritus vini aliquis aromaticus, seu spiritus vini carminativus ex vegetabilibus compositus, cujus exemplum exhibet *Sylvius l. 1. Prax. c. 9. §. 18.*

Convenit & ejus mixtura polychresta ex-temporanea contra status & ructus, & omnes morbos flatulentos.

Ad hujus imitationem præscribere soleo sequenti modo:

℞. ∇ *menth.* ʒij.

*carmin.* ʒvj.

*Elix. menth.* ʒʒ.

~ 3i *dulc.* gutt. xv.

M. S. ut antea. Vel

℞. ∇ *menth.* ʒij.

*carmin. Dorncr.* ʒj.

~ 3i *dulc.* ʒj. ad ʒiʒ.

ʒij *diaphor.* ʒj.

*laud. opiat* gr. iij.

*Syr. cinnamom.* ʒvj.

M. S.

*Mixtur gegen die Blähung.*

Item

Item ~ Dietheriacalis ad 20. vel 30. gutt. convenit.

Porro ambra in ructu contumaci ceu singulare specificum commendatur à Zacuto Lusitano l. 2. *Prax. admir. Obs.* 7. cum saccharo in forma pulveris usurpatum.

In ructibus foetidis pilulæ mastichinæ conveniunt imprimis.

Item ad ructus acidos diuturnos præ cæteris conveniunt grana piperis, vel integra vel modicè contracta, no. v. vel vi. manè jejunè deglutita, vid. Riverius *Obs.* 37. *Morb. infrequent.* item armoracia; sicuti ad acidum destruendum in flatulentis affectibus alii laudare solent talos leporis pulverisatos, aut talos suillos, lapillos cancerorum, C. C. præparatum, imprimis ustum, ebur ustum, corallia rubra præparata, diaphoreticum, &c. Unde ex his aromaticis & Fœis possunt fieri pulveres egregii, e. g.

℞. C. C. usti præp. ʒiʒ.

cryst. præp.

ebor. usti præp. ʒ ʒʒ.

Θis absinth.

Chamomill. ʒ ʒj.

M. f. pulvis. S.

Pulver auff etliche mahl.

Dosis ʒj. ad ʒʒ. Vel

℞. ∇ Mentha ʒiij.

cinnam. spirituos. ʒiij.

lapill. 69. præp. ʒj.

Syr. fœniculi ʒiij.

M. D. S.

Träncklein auff etliche mahl.

Essentia absinthii omni pastu in cerevisia usurpetur, item succus expressus, vinum absinthites, ab omni pastu vespertino usurpetur pulvis ex coralliis, osteocolla, & osse sepiæ 22. pulverisatis in ∇ juniperino. Vel

℞. Ebor. usti

corall. r. præp. ʒ ʒʒ.

Spec. diatrion piper. ʒj.

Extract. zedoar.

cors. aur. ʒ ʒʒ.

c. f. q. sacchari, in ∇ fœniculi solut. f. Rotula, irrorandæ cum

ʒo destillat. macis aut fœnic. gutt. iij.

M. D. S.

Magen-stärckende Rucklein gegen die Blähung.

Ubi nimia & contumacissima mucilago flatuum & ructuum causa, optimus est ~ asthmaticus, vel solus, vel mistus cum duplo elixyr stomachalis Michaëlis, dosis gutt. xx. vel xxx.

Externè ʒoa, tam destillata quàm decocta aut infusa, carminantia supra citata commodè possunt illiniri, fovendo desuper locum latere calefacto. Reliquis præfertur ʒo destil-

larum sapphirinum chamomillæ, seminum carminativorum: Vel

℞. ʒo expr. nuc. Mosch. ʒiʒ.

destillat. bacc. juniper. ʒj.

macis ʒʒ.

M. S.

Magen-Balsam.

Vel

℞. ʒo Chamom. ʒʒ.

expr. nucist. ʒij.

destillat. cort. aur.

fœnic.

mentha.

zedoar. ʒ ʒʒ. ad ʒj.

M. pro Linimento, S.

Magen-Salblein.

Aut focus humidus externè applicandus, e. g.

℞. ~ anisi ʒij.

vini camphor. crocat. ʒʒ.

theriac. ʒiʒ.

M. S.

Umschlag wider die Blähung.

Applicetur cum panno coccineo, imponendo desuper laterem calefactum.

Item applicetur emplastrum de baccis lauri, malaxatum cum oleo chamomillæ, absinthii, menthæ vel juniperi. Vel

℞. Tacamahac. p. iij.

Balsam. Peruv. p. j.

Liquefacta misc. cum theriaca in emplastrum.

Item ∇ infus. aromaticorum, extrinsecè applicatus calidè convenit.

Clysmata carminantia etiam commodè simul injici possunt, qualia præscribi solent in cardialgia, colica flatulenta, &c. Clysmata etiam ex □ humana imprimis pueri, vel sola, vel cum carminantibus cocta, e. g.

℞. rad. angel. ʒj.

sem. anisi.

fœnicul. ʒ ʒij.

sem. pistor. ʒʒ.

Coque in □ pueri.

℞. Colatur. ʒij.

adde

Mell. despum. ʒj.

ʒo destillat. carvi ʒj.

Misc. pro Clystere in tympanitide.

Vel

℞. spec. carmin. M. j.

rad. levist. ʒvj.

sem. anisi ʒiij.

Coque in f. q. □ hum.

℞. Colatur. ʒvj. ad ʒviij.

adde

Elect. de bacc. lauri ʒvj.

Mell. qial. ʒj.

Θiner. clavell. vel □i ʒiat. ʒʒ.

M. f. Enema.

## S E C T I O VI.

D E

## ASSUMPTORUM IN STOMACHO RETENTIONIS LÆSIONE.

## CAPUT I.

De

*Vomitu & Nausea.*

**N**otum est, quod omnia alimenta, quæ per os ingeruntur, transmittantur ad stomachum; si autem fiat, ut huiusmodi ingesta rejiciantur denuò per os sursum ex stomacho, est motus præternaturalis: & dum varia humida, sanguis, pus, acida, biliosa, &c. subinde per superius ejus orificium & connexum œsophagum ejiciuntur, vocatur vomitus, quem ordinariò nausea præcedere solet. Jam quod attinet vomitum: vomitus revera nil aliud est, quam convulsio pylori, qui nervosus & fibrosus est, & hinc systole totius ventriculi per irritationem imprimis orificii superioris gravem & nimiam; dum enim, ut omnium optimè Helmontius expressit *Tract. Pyl. Rect. §. 2. 6. 21.* pylorus irritatus fortiter se contrahit, & constringit, fit, ut continuato fibrarum tractu, subito sequatur motus totius ventriculi peristalticus invertus, qui à pyloro progreditur usque ad stomachum, & in orificio sinistro terminatur: idque propter fibras nerveas, tam circulares quam transversas, stomachi tunicam mediam intertexentes, & in specie ab orificio sinistro ad dextrum protensas similiter constrictas; hanc pylori & totius stomachi convulsionem ad orificium sinistrum usque sequitur similis gulæ convulsio, indeque omnium contentorum ex stomacho in gulam, & sic per consequens ex gula in os profusio. Est enim pylorus, uti rectè inquit Helmontius, rector & præses retentionis & transmissionis alimentorum in stomacho, & omnium in stomacho reperibilium & excretorum. Vera esse ea, quæ modò dixi, confirmat ocularis experientia: conferratur, quoad vomendi modum Olaus Rudbeck, in *suis observationibus anatomicis, in Observ. 20. pag. 309.* Conf. simul Kerkringius *specil. anatomico observ. 1.* ac Willis in *Pharmac. Rationali Part. 1. sect. 2. c. 1. pag. 83.* item quæ habet Helmontius in *tractatu Pylori rector.* Si aperto pyloro vomitus contingeret, in duodenum maxima evomendorum pars de-

decideret: unde hujus pylori primum est peccatum in iis, qui lienteria corripuntur.

Nausea præcedit vomitum; quæ vulgò dicitur laxatio nimia orificii superioris; quod tamen omninò falsum est: quin potius nihil aliud est, quam inane vomendi desiderium, & consistit in nimia orificii superioris vel sinistri ventriculi clausura, & firmiore constrictione, propter irritationem ejus loci à re molesta factam, quod innuere videtur Riverius, quando in *Praxi l. 9. c. 7.* orificii dicti robur accusat; sicut fortior constrictione pylori dat vomitum. Nam quod in nausea adsit talis constrictione & angustatio orificii stomachi superioris, patet ex eo: quod nausea revera sit species fastidii, quo aliquid abhorremus, & differt à vomitu secundum magis & minus: quando enim vel integer stomachus, vel speciatim orificium ejus superius à re molesta vellicatur, & hoc exinde nonnihil convellitur, fit nausea; unde in omni fastidio, & in specie in nausea, tam difficile deglutimus, dum boli deglutiti in gula circa orificium superius ventriculi hære revidentur, & ulterius propter nauseam & ventriculi constrictionem inferiora versus descendere non possunt. Deinde, quando comedimus nauseantes aliquid, tunc sanè post deglutitionem rei molestæ sequitur ructus, non verò antè; quia scilicet antea stomachus erat clausus, qui per intrusionem deglutiti aperitur, & sic sequitur ructus. Qui nauseant ex vino, post nauseam ructant cum molestia & difficultate: hinc est, quod, quando audimus res horridas, vel quando olfacimus res ingratas, hoc ipso nauseamus, dum totus stomachus ex contrarietate, & bina ejus orificia se quasi contrahunt. Claudat se orificium superius ex quodam horrore objecti molesti, quod fastidit; unde si nauseantibus res ingrata detrudatur, hoc ipsum sæpius, antequam stomachum intrat, per superiora rejicitur, ex pertinaci scilicet stomachi clausura, est igitur nausea stomachi quædam constrictione respicientis rem ingratan: sicut si continetur irritatio à re molesta istius loci, ita ut fibræ exinde usque ad pylorum protensæ exinde convellantur, adeoque fortior pylori, & consequenter totius stomachi, superveniat strictura, & convul-



visus spasmus, nauseam sequitur vomitus: vid. Helmontius in *Tr. Pylor. Reclor*. Orificium enim inferius superiori magis est robustum, unde & fortius; superius verò magis sensibile, unde illud in vomitu necessario vi convellitur, superius autem se aperire, & pressuræ pylori cedere debet.

Cum ergo constet: vomitum esse constrictionem convulsivam, patet, illum referendum esse inter actus non voluntarios, adeo ut rarus sit vomitus voluntarius: quale exemplum Bartholinus *C. 1. Histor. anat.* 39. observavit. In his certè voluntariè vomentibus videtur adesse similis stomachi structura, atque est in hominibus ruminantibus, qualia exempla etiam videre potestis in Aquapendente, & in Horstii *Obs. l. 4. Observ.* 9. & citato Bartholino *C. 5. Histor.* 16. Nempe in his ruminantibus observatus fuit stomachus solito fibrosior & carnosior, quasi vestimento muscoloso esset indutus, ratione cuius, tanquam per musculos, voluntariè movetur stomachus, & fit regurgitatio ciborum in os pro ruminatione; aut voluntariò rejiciuntur penitus per vomitum.

#### PARS AFFECTA.

Subjectum nausæ & vomitus, seu pars affecta, est ventriculus, & quidem ratione orificii sinistri in nausæ; ratione pylori autem in vomitu.

#### CAUSÆ.

Horum causa proxima est, quicquid vehementer irritare, h. e. difficili molestiæ sensu afficere potest orificium stomachi superius & inferius; hinc enim fit, ut, irritatis fibris nerveis, copiosius eò deriventur ~ animales, à quibus convulsivus stomachi excitatur motus. Irritatio autem est præternaturalis molestia ac violenta sensatio: sensatio est violenta impressio, ab objecto facta in parte sensibili, quæ impressio in partibus externis vocatur dolor, in internis vocatur irritatio. Si ergo adest irritatio superioris orificii, fit nausæ; si inferioris, fit vomitus.

#### DIFFERENTIÆ.

Ratione hujus observandæ sunt differentiæ, quando vomitus est vel naturalis, vel artificialis. Artificialis elicitur arte, vel mechanica, dum intruditur digitus in os; vel pharmaceuticâ, scilicet per remedia vomitoria stomacho ingrata.

Vomitum naturalis est vel symptomaticus, qui occasione alterius morbi, certo modo per consensum stomachum afficientis, evenit, ut in paroxysmis febrium intermittentium; vel est criticus, qui evenit in statu morbi, beneficio naturæ solventis &

emittentis materiam morbificam eodam, & se ipsam cum salute ægri exonerantis. Symptomaticus est vel per essentiam primariò affecto stomacho, vel per consensum secundario eodem laborante: si per essentiam causa irritans, i. e. humores seu excrementa acrida vel in eo generantur, vel aliunde eò deferuntur; in specie vel ex copiosis arteriis stomachum ubique cingentibus; vel ex intestinis, in specie duodeno, per vitiolem regurgitationem succi biliosi & pancreatici in ventriculum. Vomitus per consensum fit, si ob connexionem nerveam cum alia parte affectâ sequitur vomitus: e. g. ex plagacapitis: vomitus ratione materiæ excretæ alius est alimentorum, alius medicamentorum, alius purulentus, alius sanguineus.

Per essentiam fit vomitus propter causam irritantem in stomacho existentem, quæ sunt vel contenta liquida, vel ipse ventriculus affectus: v. g. inflammatus, vulneratus, aut exulceratus, aut excoriatus, adeoque facile irritabilis. Prior causa infert vomitus leviores facileque curabiles: posterior verò contumaciores, interdum lethales. Imprimis vomitus admodum diurni & continui, aut qui nullis cedere volunt remediis, sæpius vitium vel pylori, vel partis solidæ adhærentis præsupponunt, ita ut hic sit vel omninò occlusus, vel scirrhus, vel tremore alio affectus, cujus non pauca hinc inde præstant exempla: sic Salmuth *C. 1. Histor.* 20. dicit: quod scirrhus pylori interdum eveniat Hypochondriacis, qui vomitus continuos ciborum inducat: item Bartholinus *C. 4. Hist.* 47. ex pyloro, callo obducto, vomitus continuos observat: Rhodius *Cent. 2. Observatione* 63, habet vomitum perpetuum à steatomate, utriusque scilicet orificio adnato. Vomitum ex ulcere vidit Hildanus *C. 5. Observ.* 36. ex fistula Schneiderus *de Catarrhis*, speciatim *pag.* 439. ex gangræna Ballonius *Lib. 1. Consil.* 43. & ex herpete Panarollus *Penth. Obs.* 43. Sicut in morbis malignis post vomitus continuos & contumaces, atque insequentem mortem, observatum fuit, quod eschara quasi & incipiens gangræna in eorum stomacho reperta fuerit. Pertinent huc vomitus scorbuticorum sæpius contumacissimi propter S acre scorbuticum vellicans.

Hæ & similes causæ imprimis inducunt vomitum per essentiam.

Quod attinet contenta liquida vomitus inferentia: sunt vel assumpta, vel retenta, vel transmutata, vel transmissa errore quodam ex intestinis. Ad transmissa pertinet vomitus, in principio paroxysmorum, febrium intermittentium, dum nempe succi ex pancreate & felle in intestinum duodenum effusi, violenter effervescentia pylorum irritant vicinum, aut etiam in ipsum stomachum regur-

gurgitant, & ita vomitum inferunt: item si bilis per insertionem ductus cholodochi vitiosam, item sanguis congrumatus, pus, huc deferantur: quo etiam feces alvi spectant, & clysteres & suppositoria vomitu rejecta. Mirabilia interdum excreta ex stomacho per vomitum sunt rejecta, inter quæ est rete illud artificio quasi humano contextum, de quo vid. Kerkringius in *spicil. anatom. Observ.* 6. observatus etiam fuit vomitus butyraceus, licet æger butyrum non comederit; seraceus, cochlearum, bufonum, lacertarum, vid. Bartholinus *C. 5. Histor.* 54. & Schenkius *Observ.* & M. A. N. C. *ann.* 3. Notum est, quod assumpta, sive quantitate nimia ingesta, ut comestationibus & crapulis dediti experiuntur, sive qualitate quacunque vitiosa, acrida & rancida, ventriculo aliàs inimica & molesta, & præprimis, quæ vel individuali fastidio abhorremus, vel ðalia, & alia, aut similia acrida, irritando stomachi tunicam nerveam, vel quæ in eodem faciliè corrumpuntur, quod gulonibus, item infantibus lactantibus frequens malum, vomitum inferant: sicuti videmus tantillum odoris ðalis, quod imprægnat vinum infusionis antimonii, citra corporalem ejus motum, stupendos non raro inducere vomitus. Ita ab arsenico vomitum lethalem Sal-muth *C. 1. Obs.* 10. ab helleboro albo Bonetus *Sepulchret.* 1. 3. *Seç.* 8. *Observ.* 6. ab assumpta Gilla Theophrasti Henricus ab Heer *Obs. oppido rar.* *Obs.* 26. ex abusu infusi agarici & foliorum sennæ Libavius in *Cista Med. Hornungii Epist.* 76. & à croco metallorum Hildanus *Cent.* 4. *Obs.* 51. atque 79. annotarunt. Faciunt huc etiam pingua, aut crebrius aut etiam copiosius assumpta; idque duplici ex ratione; pingua enim ceu difficillimè digestibilia, reluctando fermento acido-Oino, non leves inferunt molestias & gravant stomachum: præterea orificium superius laxant; unde, dum ex irritatione horum supervenit pylori constric-tio, ex laxitate stomachi faciliè supervenit vomitus. Huc pertinent decem uvæ ultra tres menses succi plenæ rejectæ, quarum mentionem facit Kerkringius *loco allegato*, item suo modo vomitus sebaceus in M. A. N. C. *ann.* 3. *Obs.* 253.

Retenta sunt v. g. recrementa post digestionem primam in stomacho: transmutata sunt cruditates variz, nidorosz, & acidæ: quo etiam pertinent vermes, nauseam & vomitum excitantes: de quibus Riverius *Cent.* 1. *Obs.* 28. & Bartholinus *Cent.* 1. *Histor.* 47. & C. 3. *Histor.* 14. M. A. N. C. *ann.* 3. *Obs.* 258. & Mæbius *instit. Med. lib.* 2. P. 2. c. 5. pag. 183.

Vomitum per consensum est ferè frequentissimum, & fit, si causa conjuncta sit extra ventriculum, motusque hi ab extraneo quodam ipsi imprimantur. Partes ventriculum in

consensum trahentes duplicis generis sunt: ita ut vel ratione continuitatis, quæ partibus cum ventriculo intercedit, œsophago scilicet, diaphragmati & intestinis, vel ratione istarum partium, cum quibus stomacho intervenientibus nervis est connexus; sic œsophagi pars superior, si digito tantum vel quocunque modo irritetur, si non statim vomitum, vomendi tamen conatum, excitat: diaphragmatis concursus tussis, illiusque validior concussio, vomitum pedissequum habens, confirmat: licet communionem nervorum, quæ partes has duas intercedit, aliquid huc conferre, non adeò improbable sit. Intestinorum tandem affectus eo modo accusandi sunt, quatenus iisdem illorum motus peristalticus vel in totum, vel ex parte invertitur, eoque ad ventriculum continuato, hic exagitur, & concutitur: hinc notoriè sequitur vomitus in dysenteria, passione colica, iliaca, & vermibus, quæ per communes sibi nervos movent vomitus, sunt præsertim, caput, renes, epar, uterus atque lien: sic in nephritide, ordinatio supervenit vomitus, quia renes ex eodem plexu mesenterii hauriunt nervos, ex quibus nonnulli ad stomachum derivantur: pariter ac abdominis reliqua viscera vomitus sympathicos excitant, qui à solis illorum spasmis deduci debent, quoniam nervos à plexibus mesenterii communes cum ventriculo possident: item in passionibus mulierum hystericeis crebrius oriuntur vomitus, & quidem interdum salubres; nam in his partes membranosz insigniter convelluntur: item in contusionibus cranii, aliisve similibus vulneribus capitis sæpissimè superveniunt biliosi vomitus, propter membranas cerebri, stomacho & reliquis partibus, præsertim internis, plus minus communes, aut genus nervosum ad inordinatum motum concitatum, quod colligitur à tremore, convulsionibus & deliriis, eundem vomitum concitantibus. In specie mulieres patiuntur vomitus insignes, non tantum propter suppressionem menstruorum, sed etiam quando virorum sunt cupidæ, ob-~ animales affectos, & inde succum fermentativum stomachi alteratum: vid. Hildanus *C. 4. Obs.* 32. item Deodatus in *valetud.* pag. 172. & Höferus in *Her-cule Med.* p. 137. Quo etiam referendi vomitus spontanei salubres, qui periodicè infestant nonnullos, idque ferè ex viscerum abdominis, ventriculo plus minus vicinorum vel connexorum vitio: tale exemplum refert Schenckius *lib.* 3. *Obs.* 1. dum quidam singulis mensibus per biduum bilem utramque & cum pituita conjunctam vomere solitus, vitam ad multos annos produxit. Imprimis ii hoc malo vexantur, qui vitio nonnullo splenis sunt affecti, ut videre est apud Forestum in *lib.* 18. *Observas.* 17. de quodam, qui circa lienem subin-

subinde dolebat, idque per certa intervalla, unde certis ferè periodis humorem melancholicum, sæpè etiam omninò atrum, evomunt: sic Borellus *in C. 3. obs. 93. pag. 270. & 279.* insigniter commendat utilitatem vomitus menstrui: & apud Panarollum *in Pent. 1. obs. 22.* habetur vomitus matutinus ordinarius, multa symptomata præservans, item vomitus septennis salutaris in puella ob menses suppressionem. Zacutus Lusitanus *l. 2. Prax. admir. obs. 13.* de quodam, qui singulis mensibus duobus diebus quatuordecim vel 15. libras per vomitum excernebat humoris nigerrimi & pici liquidæ similis, qui exinde omnino salvus ad annum 80. produxit vitam; & *Obs. sequenti* refert, quendam tribus quibusvis mensibus atrabilario vomitu periodico laborantem usu chalybis curatum, a pertis hæmorrhoidibus, per quas evacuabatur sanguis, & *lib. 3. Prax. admir. obs. 115.* recenset perniciosissimum vomitum menstruum materiæ globiformis concretæ. Facit huc vomitus studiò prolectus in hypochondriacis, si scilicet singulis mensibus, aut sex hebdomadibus, semel largius mero se ingurgitant, & hinc vomitum artificialem non citra sanitatis commodum instituunt. Elegans quoque & admodum ridiculum est exemplum Plateri *in observ. pag. 655.* de frequenti vomitu, post amputatum caput secuto: simile inter rara referendum est exemplum Bartholini *C. 4. Histor. 44.* de vomitu contagioso in familia quadam, qui malignitatis fuit suspectus, & similiter alios per contagium affecit. Pertinet huc vomitus continuus lethalis ex corruptione & sphacelo pancreatis, quod cum substratum sit ventriculo, sphacelolum factum illum facilè irritare potuit: vid. Barbette *in sua Prax. l. 4. c. 2.* item vomitus contumax lethalis ob pancreas lapidosum vel scirrholum factum recentetur à Panarollo *Pentec. 1. obs. 44.* & depressio cartilaginis mucronatæ, quam Barbette *Anat. Practic. lib. 4. c. 4* & Deckers *in Praxin ejus pag. 156.* annotarunt.

Inter ea, quæ vomuntur, etiam est pus, & sanguis purulentus & cruentus.

Spleneticis valdè familiares sunt vomitus quicunque continui, tam cruenti, quam non-cruenti. Vomitus spleneticus non-cruenti subinde periodicè nonnullos affligunt, præcedente non rarò dolore tensivo circa regionem splenis, idque cum talium ægrorum euphoria: vid. Forestus *l. 18. observ. 17.* item Borellus *Cent. 3. observ. 93.* & in *Append. dictæ Centur. pag. 279.*

Vomitum puri fit ex variis locis, pure vel in ipso ventriculo ex hujus abscessu, ratione ductus continui, v. g. œsophagi & intestinorum, vel ex aliis partibus per metastasin translato ad stomachum: quod testantur

observationes, abscessus hepatis, pancreatis, lienis, mesenterii, &c. fuisse evacuatos per vomitum, sicut ab abscessu hepatis vomitu rejectum pus Bonettus *in sepulchr. l. 1. obs. 40.* testatur: de quibus infra plura, ubi de inflammationibus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: de illis vix opus est, ut multa dicam, cum satis manifesta sint: imminente enim vomitu patiuntur ægri aliquam molestiam circa præcordia, & monstrant regionem cordis: huic supervenit vertigo, cum qua salivæ copiosus fluxus evenit, tremor labii inferioris, tandem violentus conatus stomachi, quo rejiciuntur omnia ex stomacho.

Causæ autem quia variant, determinantur hoc modo: differentia nempe vomitus per essentiam & per sensum probè attendenda est, quia in hac versatur cardo totius curæ, & artificiali conjecturâ hinc opus est.

Nempe vomitum esse per consensum hariolamur, si partes quædam suo modo consentiunt cum stomacho, vel ob vicinitatem texturæ cum nervis affectæ, ita ut vel doleat, vel passa læsionem plus minus sensilem, subito superveniat vomitus, stomacho antea robusto.

Sæpè affectus hi per consensum ratione originis, sunt adedò occulti, ut non nisi artificiali signorum syndrome præcognoscantur, donec manifesti fiant: v. g. interdum calculus & colica faciunt vomitus, ubi calculus non statim sentitur.

Vomitum per essentiam cognoscitur, si post repetitos vomitus, & stomacho exinanito sæpè supersit inanis vomendi conatus, illius gravitas, tensio & inflatio, cibi fastidium, ructus acidi vel nidorosi, similiaque signa observentur: & quidem, si tumor vel ulcus subsit, nullis remediis mitigari potest excretio, imò pus in posteriore casu simul excernitur: sin verò vulnus, ex loco aliisque illius circumstantiis hoc concludere licet.

Utrum verò humor ad vomitum stimulan in cavitate ventriculi liberè fluctuet? vel rugis aut tunicis ipsius inhæreat? dignoscitur: quod ille levissimo conatu & sine alimento rejiciatur, contingat à pastu quædam ventriculi tensio & anxietas, aut si post pastum vomitus contingat, ut plurimum solum tamen humores vitiosi excernuntur: hic verò ab ingestis præprimis demum cibis contingit, citra verò illos nausea admodum molestat, & rejiciuntur alimenta sine humoribus aut cum illis maximo demum cum conatu viscerum & crassi valde.

## PROGNOSIS.

(K)

18



In specie causæ remotæ ante omnia probè considerandæ sunt, cum ipsi vomendi conditionibus; hinc enim vomitus, qui est à causa externa, vel ex mensium suppressione, qualis in gravidis, vel vomitus in principio morborum spontaneus non nimius, vel in declinatione morborum criticus, potius salutares sunt, quam periculosi: sin verò nimius, à pharmaco præsertim aut veneno, vitæ periculum portendit.

Si à tumore similique conformationis ventriculi morbo contingit, pro hujus faciliiori aut difficiliiori cura de vomitu sedando modò major modò minor spes est.

Vomitum ab humore viscido difficillimè curatur, dum Hildanus *Cent. 4. Observ. 32.* de quadam Religiosa refert; eam per 31. annos singulis diebus pituitam viscidam, bile interdum intermixtam, evomuisse.

Vomitum chyli & alimentorum frequentior, malus est, potissimum si cum febre fiat: vid. Hippocrates *Leç. 7. aphor. 37.* semper enim ratione excretorum observandus est *Aphor. 2. Sect. 1.* in vomitionibus, quæ spontè fiunt, si qualia oportet, evacuentur.

Vomitum lividum, præsertim plus minus graveolens, aut vermium, superveniens in morbis, præsertim malignis: item vomitus humoris fusci & obscurè nigricantis sunt lethales.

In morbis malignis vomitus continuus & protractus pessimum signum est.

Ordinarium quidem est, ut in morbis malignis ex contagio haustis in principio morbi adsit nausea & vomendi conatus: sed si in progressu morbi superveniat vomitus, isque pertinaciter perduret, pessimum est signum, & plerumque mors sequitur. In benignis morbis optimum signum est vomitus, sive in principio sit, sive in statu, ut sit in febribus intermittentibus, ardentibus benignis, innuit enim vim naturæ adhuc laudabilem.

Vomitum, qui superveniunt casui ab alto, percussioni, & aliis læsionibus capitis, functum sunt signum, innuunt enim gravem læsionem cerebri, cranii & meningum, & nisi tempestivè instituaturs trepanatio, mors supervenit.

Vomitum hypochondriacorum & scorbuticorum, item spleneticorum, aut qui lienis & aliorum viscerum scirrhus, aliisque chronicis laborant affectibus, periodicus, est saluberrimus, cui supervenientes hæmorrhoides levamen morbi certum tutumq; afferunt.

Vomitum porraceus, æruginosus, nigricans, item ex multis humoribus constans, ceu variegatus ac foetidus, valde periculosus est: vid. Hippocrates *Prognost. loco allegato §. 11. 12.* &c. & Riverius *l. a.* nisi tales à certorum ciborum cruditate aut corruptione proveniant:

niger verò, qui affectibus melancholicis obnoxiiis contingit, non semper est periculosus.

Vomitum ex pituita & bile permixtus, uti commodissimus est; ita sincerior, seu pituitosus aut biliosus tantum, deterior observatur: vid. Hippocrates *Prognostic. Text. 12. §. 7. & 10. & l. 1. Prædict. Textu 881.* item Riverius *Prax. l. 9. c. 7. pag. 413. & 414.*

Pariter secum alvi & ano injectorum vomitum semper lethalis existit: vermium verò aliorumque toto genere p.n. rejectio, utut ratione causæ mala quidem sit, bona tamen ratione effectus dicitur.

Denique vomitus criticus est laudabilis, symptomaticus verò, periculosus: vid. Deekers in *Praxi Barbett. pag. 128.*

Modò attendamus causas, faciles erimus in prognosi.

### C U R A.

Quod attinet methodum medendi: in hac

1. Causarum remotarum irritantium habenda est ratio, exque ante omnia removendæ.
2. Sensus ventriculi, speciatim pylori, acutus, & nimius spirituum impetus, ceu causa efficiens formalis, opiatu leniendus & sufflaminandus.
3. Medicamenta ventriculo grata aromatica volatilia suaveolentia, admistis blandè acidis adstringentibus pro fibrarum debito tono firmando, & labefactato restituendo, usurpanda.

Pro his scopis obtinendis observandum:

I. Non quemlibet vomitum esse sistendum: non spontaneum, aut motum instinctu naturæ, sed saltem eum, qui aut nimius aut symptomaticus, adeoque ex vi causæ morbosæ cum virium ægri dispendio accidit. Vomitum criticus sinendus est, nisi sit nimius: vomitus mulierum gravidarum non est suppressendus, nisi excedat, quia tunc evacuatur corpus primis mensibus, & puerperium inde ipsis salubre evenit; non tamen excedat modum. Pluribus evenit in principio morbi vomitus, qui non sistendus, sed si maturè vult suppressi, illum promoveamus.

II. In vomitu scorbutico non conveniunt calida aut acris aromatica, quæ malum magis exasperant, sed potius absorbentia seu acrimoniam & scorbutici mitigantia & temperantia, qualia sunt lapilli 69. ebur sine igne, corallia, & diaphoreticum, item juxta Euguenum lac, præprimis caprillum, cum succo nasturtii aut cochleariæ mistum; ut sic cessante acrimonia cesset vomitus: vid. Dorningius *Cent. 2. Epistol. 30.*

III. Vomitum sanguinis citò compescere optimum est, aliàs ob copiosam profusionem sanguinis ac spirituum sequuntur lipothymia ac syncopes lethales.

IV. In vermibus semper procurandus, nec

nec alvus sit adstricta, sed alternis ad minimum diebus, vel arte, vel natura, alvi dejectio promovenda.

V. In omni vomitu unicè observetur, ne alvus sit adstricta, sed quantum possibile est, aperta teneatur, hinc lenes clysteres tantum non in omni vomitu, imprimis contumaci, commendantur, ut, quod irritat ventriculum, derivetur ad intestina, & eliminetur. Iidem tamen in pauca quantitate injiciantur, ne ventriculi fundus colo incumbens exinde comprimatur & irriteretur: conf. Gabelchoverus *Cent. 2. Cur. 43*. Purgans blandum interdum convenit, quod revellendo simul videtur operari, cui tamen tantillum opii addendum.

Excipitur tamen casus, morborum quorumvis, cum excretionem cutanea, plus minus critica, conjunctorum, e.g. febres acutæ cum variolis, petechiis, purpura, scabies, aut pathemata corporis & artuum scorbutica per excretionem cutaneam, miliarum, &c. levatorum. In his enim, præsertim febribus acutis cum excretionem cutanea conjunctis notandum, sicut ante excretionem istam ferè intensius urgent præcordiorum pathemata, anxietates, difficiles respirationes, vomitus, hypochondriorum tensiones, alvi fluxus; &c. quæ omnia præcedente ista excretionem cutanea cum euphoria cessant; ita si impediatur ista excretio, mox vel redire hæc pathemata, & horum loco capitis & generis nervosi symptomata supervenire. Etsi ergo in tali casu pertinacior vomitus urgeat, profectò vel planè non, vel cautissimè conveniunt clysmata, ne motus iste ad extrà excretorius. invitando intestina, provocetur intro, ac diarrhoea symptomatice aut dysenteria excitetur. Potius appropriatis sudoriferis, opiatibus, debite mistis naturæ turbatus motus restituitur.

VI. Somnus: quantum fieri potest, conciliandus: Nam & hic motum humorum quemcunque, tam progressivum, quam intestinum, sistit, irritationes lenit, & evacuationem quamcunque cohibet.

VII. Ab errore externo, imprimis à veneno ingesto, si sit vomitus, non est sistendus, sed tamdiu usus remedium continuan- dus, quamdiu est suspicio veneni aliquid adhuc superesse, & medicamenta in ventriculo remaneant. Promoventur in tali casu vomitus, assumendo potulentia, in specie pingua, acrimoniam excessivam venenorum corrigentia.

VIII. In nausea, inappetentia, & similibus stomachi humoralibus affectibus non diu cum vomitoriis, cunctandum, ne præternaturalibus humoribus alio sum raptis, frustra instituat vomitus & alii graviore superveniant affectus: Conf. M. A. N. C. *ann. 8. obs. 42. pag. 71*. Vomitiones verò inanes cum intu-

Tom. II.

mente abdomine, rhabarbaro optimè juvantur, ut notat Pharos Medicorum p. 399. §. 32.

Quod ergo attinet remedia ad vomitum directa, quæcunque causa sit irritans, removenda, unde si fuerit per essentiam vomitus, evacuanda est causa irritans. Causam autem, quæ remonent, sunt varia, pro causarum varietate. Pro hoc scopo usurpatur vomitorium, & quidem mediocre, præprimis si assumpta copiosiora prava & quocunque modo stimulantia, item humores excrementitii in ventriculo tale quid præstent: vid. Vallesius *lib. 2. Epidem. Lect. 5*. Hoffmannus *M.M. lib. 1. c. 9*. & Riverius *l. a. p. 414*.

Aut etiam blandum purgans supra jam commendatum. Utraque interdum ad modernorum imitationem cum parva opii dosi usurpanda: quod si verò per consensum vomitus fuerit, curato primario morbo, etiam curabitur vomitus.

Quæ irritationem stomachi sensibilem, & nimium spirituum impetum compescunt, sunt opiata, & alia anodyna, quatenus spirituum in fibris ventriculi impetum refrænant, sensum stomachi obtundunt, ejusque perceptionem heberant. Omnes vomitus compescuntur laudano opiato, quod primum vomitus sistens est, præprimis si à vomitorii nimio impetu tale quid fuerit: vid. Sylvius *Prax. lib. 1. cap. 15*. & Willsius *loco allegato*. Potest etiam usurpari essentia opii, theriaca, Mithridatium, philonium Romanum, electuarium de ovo, dialcordii Fracastorii, essentia & extractum theriacale cum laudano opiato, syrupus papaveris, crocus, tantum internè quam externè adhibitus: e.g. in vomitu simpliciter compescendo, demulcendo ventriculum nimis irritatum.

℞. Aq. menth. ʒij.

Mastichin. ʒij.

el. dialcord. Frac. ʒij. vel ʒiij.

Succ. cydon. ʒvj.

M. f. Potio, S.

Starck & Trandflein.

Expertus etiam est sequens Bolus in vomitu, singultu & similibus.

℞. Theriac. ʒss.

land. opiat. gr. j.

ʒs. destill. macis gutt. ij.

r. succ. cydon. f. Bolus. D. S.

Latirverge auff einmahl.

His pro tertio scopo adjungantur stomachica benè odorata & aromatica, ventriculo grata. Nam uti foetida nauseam inferunt, sic aromatica suaveolentia solantur stomachum. Hæc inter primaria sunt cydonia, & quæcunque cydoniata, in specie vinum cydoniatum per fermentationem, mentha, absinthium, melissa, radix zedoaria & cyperii, cortices citri & aurantium, mastix, caryophylli, nux moschata, macis, præ cæteris cinamomum, & hinc Aq. cinamomi simplex & cydoniata,

(K 2)

lyru-

syrupus de canella Myns. essentia cinnamomi & cassiæ ligneæ Myns. elixyr menthæ, aqua mastichina Mynsichthi, item decoctum Joëlis pag. 324. ad quemvis vomitum præstantissimum ex caryophyllis & mastiche: quod videb. apud Sennertum l. 2. *Prax. de Vomitu*, p. 155. Item essentia & ~ mastichis, menthæ, theriacalis camphoratus, elixyr proprietatis Paracelsi: de quo vid. Horstius l. 4. *Obs.* 15. Elixyr vitrioli Mynsichthi, balsami Peruviani aliquot guttulæ, & ejus R ad imitationem Willisii parata; hinc simplicium istorum extracta, & o destillata. Camphora cum speciebus dia-moschi assumpta commendatur à Riverio. Quoad adstringentia, excellunt cydonia, syrupus de rosis siccis, qui blandè adstringit, syrupus coralliorum Quercetani, hinc succus granatorum, + vini, rosaceum, præprimis acetum zedoariæ per infusionem; decoctum & extractum radicis tormentillæ, bistortæ, quo vix præstantius remedium hoc in casu datur; extractum absinthii, ligni aloes. In specie confert ~ Oli cum conserva menthæ, absinthii, rosarum, &c. præsertim ~ Oli ois, qui primarium specificum est ad sistendum vomitum: nam præter acorem stomacho gratum habet simul saporem adstringentem ob consortium substantiæ metallicæ, quam cum vitriolo secum vehit; uti etiam ~ Oli Philosophicus, item cum spiritu Oli vel spiritu Di ex sigillata paratus liquor stypticus: vid. Prævotius p. 41. in *selectis*. Hinc dicitur à Prævotio & Bartholeto aurum potabile ex sigillata; quia sigillatæ inest aliquid de primo ente auri. R ois adstringens similiter est conveniens, & omnes ex o paratæ Ræ; alumen misturis additum pro hoc scopo, & absorbentia oca primaria sunt, ut bolus Armena, sigillata, corallia, & omnia ex iis parata medicamenta; Ex his omnibus præ cæteris palmam præripit succus cydoniorum: hinc spiritus vitrioli prodest; Nam spiritus seu oleum vitrioli ad aliquot gutt. v. vel vj. in haustu vini Malvatici admodum commendatur à Rulando & Hartmanno in vomitu diuturno, dosi cochl. j. vel ij. donec sistatur vomitus. Alii mixturam hanc præscribunt ita:

℞. ▽ *Mentha* ʒij. vel iij.  
*cinnam.* ʒvj.  
*Succi cydon.* ʒj.  
 ~ Oli rect. gutt. v. vel vj.  
 o destillat. *cinnam.* gutt. iij.

M. S.

#### Anhaltendes Magen-Träncklein.

Capiatur cochleatim, v. g. cochl. j. per vices & felicissimè operabitur: cui interdum gr. j. vel ij. ad summum gr. iij. laudani opiatum possunt addi, & sic erit efficacior. Vel

℞. ▽ *cinnam. simpl.* vel *cydon.* ʒiij.  
 ~ Oli ʒß.  
 o destillat. *cinnam.* gutt. iij. vel jv.  
*Syrup. Mentha.* ʒj.  
 M. f. Potio, S.

#### Anhaltende Magen-Mixtur.

In specie convenit in vomitu nimio, qui in febribus accidit, cum animi deliquio, aut ubi extrema frigent, propter ambram, quæ stomacho pergrata.

Item ubi non sufficit acor adstrictorius, ad alumen confugiendum, quod in omnibus fluxibus sanguinis & aliorum succorum potentissimum est: & sanè insignis Practicus, sequentem misturam in secretis habet contra vomitum, lienteriam, alvi fluxum & similes affectus, ubi moderatà aut paulo fortiori opus est adstrictione. Formula est hæc:

℞. *Aqu. Mentha.*  
*cinnam.* a ʒiß.  
 (vel ▽ *Mentha.* ʒij.  
*cinnam. spirituos.* ʒj.)  
 adde  
 ~ Oli ʒß.  
 o destillat. *mac.* gutt. v. l. vj.  
*alum.* gr. iv. vel v.

M. pro haustulo cochleatim capiendum in vomitu, tam sanguineo quàm communi, lienteria, & aliis diarrhæis.

Theriaca ʒj. cum aceto assumpta etiam confert. Vel paretur bolus ex theriaca, & ~ Oli ad gutt. ij. l. iij. In vomitu febrium, præsertim malignarum, remedium elegans o absinth. ʒj. cum cochleari succi limon. vel granatorum misti. vid. Riverius *Cent.* 1. *Obs.* 15. & C. 2. *Obs.* 99. c. g.

℞. ▽ *Cinnam.* ʒiß.  
*Succi Citri* ʒj.  
*Ois absinth.* ʒj.  
*corall. r. præp.* ʒij.  
*Syr. de ros. sic.* ʒij. l. iij.  
 M. S. ut supra.

Si pituita crassa in causa sit, pro hujus incisione conveniunt aromatica & incidentia oina, ut ~ Ois vel nitri theriacalis. Sin verò malum ab erosione & inflammatione tunicarum ventriculi, conveniet linctus ex mucilagine seminis psyllii, cydoniorum, cum Syrupo solutivo: vid. Barbette, *Prax. loco allegato* p. 134. & 136.

Inter externa ad vomitum compescendum, præter illa de anorexia relata, conveniunt crusta panis seu panis tostus aceto vini vel vino adstringente, aut in quo cydonia ebullierint, vel vino malvatico ebrius, hinc pulveribus aromaticis, caryophyllis, cinnamomo, mace, &c. adpersus, & ita externè stomacho calidè applicatus: item v cam-



camphoratus, vel balsamum Anglicum calidè cum linteis multiplicatis sæpiùs admotum, item fofus humidus ex decocto abfinthii, menthæ, meliffæ, pulegii, & fimilibus aromaticis in vino vel aceto decoctis, cum linteis multiplicatis vel fpongia calidè admotus, c. g.

℞. Comar. abfinth.  
herb. menth. à M. ij.  
rad. acori veri.  
levist. ā. 3vj.  
cyperi ☉.  
galang. aa. 3ij.  
Mastich. 3ß.  
caryophyll.  
macis aa. 3ij.

Concif. & contuf. includ. facculo interpaffato, in forma oblonga vel triangulari, qui ita paratus & probè calefactus imponitur stomacho; vel calefactus irroretur c. vino, & calidè imponatur stomacho; vel coquatur in vino, V. + o, &c. & ita fervidus applicetur.

Item theriaca, vel fola vel cum Balsamo Peruviano probè mifta, illinitur externè copiosè regioni stomachali, vel alutæ inducta emplaftri formâ admovetur: vel ad imitationem Hæchftedteri irroretur theriaca cum aceto rubi idzi, & applicetur regioni stomachali: vid. in decade 7. Caf. 6. Item fiant linimenta fuaveolentia ex theriaca, additis ois Satis, vel fiat linimentum ex oleo nucis Moschatæ expreffo, tanquam corpore, cum oleo deftillato macis, carvi, menthæ, zedoariæ &c. & aliquot guttis olei deftillati caryophyllor. acuaturn externè inungitur: c. g.

℞. So expr. nuc. moschat. l. o. deftill.  
bacc. juniperi 3j. ad 3ij.  
deftillat. mentha.  
caryophyll.  
macis aa. 3ß.  
cinnam. gutt. v.  
M. D. S.

#### Magen-Balsam.

Item oleum mastichinum, abfinthii cydoniorum, menthæ, o stomachale Cratonis, emplaftrum stomachale Cratonis, de Caranna, quod est fingulare; compositio ejus secundum Barbette in sua Praxi, ubi de vomitu pag. 158. est hæc:

℞. Spec. arom. ros.  
Mastichis el.  
So expr. nuc. mosch. aa. 3j.  
deftillat. cort. citri  
macis aa. 3ß.  
g. caranna q. f.  
M. f. Emplaftrum.

Inducatur super alutam, obducatur cum syndone rubro in forma scuti stomachalis, D. S.

#### Magen-Pflaster.

Vel

℞. Empl. stomachal. Crat.

tacamahac. aa. q. f.

Malax. c. f. q stomachal. Craton. vel Balsam. Peruviano: induc super alutam, f. scutum stomachale absque syndone, irroretur cum oleo Sato menthæ.

D. S.

#### Magen-Pflaster.

Sacculus croci ventriculo admotus, egregiè vomitum sistit, etiam eum, qui navigantibus solet esse familiaris: de quo eleganter videbitis historiam in Baconis, Verulamii Histor. vita & mortis pag. 121. Egredia sunt cataplasmata, facta ex fermento, additis pulveribus aromaticis, quale est Mynsichthii ad singultum, vel quod addit Deckers in Barbette Praxin, ex Colleg. Jonstoniano D. Michaelis desumptum.

Ad imitationem horum in contumaciori vomitu aut morbo navigantium, tale stomacho applicandum venit.

℞. ferment. acerr. 3ij. vel iv.  
pulv. mentha 3j.  
zedoar. 3vj.  
nuc. moschat. no. iij.  
macis.  
Caryophyllor.  
Cinnam. aa. 3iß.  
sem. anisi.  
cumini.  
fenicul. aa. 3ij.  
+ rosar. parum.

Misc. ad consistentiam cataplasmatidis, applicandi ventriculo in vomitu nimio.

D. S.

#### Magen-Pflaster.

Loco nucis moschatæ & reliquorum aromaticum cataplasma hoc guttis aliquot o. i deftillati macis & caryophyllorum irrorari potest.

In specie vomitus artificialis est sistendus: c. g. post assumptum vomitorium vehementius aut diutius ægrum vexans, & tùm convenit fofus externè calidè applicatus, ex abfinthio, mentha & aromatibus facculo inclusis, & in vino decoctis: item haustus vini generosi non nimis frigidi supervomitiones seu hypercathartes ab æalib. sistit. Theriaca etiam, si vires ferant, aut pilula unica laudani opiat aut parum essentia opii, in elixyr menthæ propinatæ. Præsentaneum etiam remedium dicitur potus lactis cum pane cocti, aut panis vino generoso acido intinctus & comestus. Clyster itidem ex lacte, in quo theriac dissoluta, injiciatur: item crusta panis tosta, vino generoso imbuta, cum pulveribus aromaticum inspersa applicetur.

Sic lac quoque vomentibus interdum operato remedio est, vid. Helvvig de obitu Wrangelii, §. 102. idque præsertim, si ex a-

( K3 )

crio-

eriori aut venenoso medicamento fuerit concitatus. Conf. Forestus *lib. 18. obs. 18.* unde & scorbuticorum in vomitu proficuum foret. Item in excoriatione aut erosione ventriculi, lac cum saccharo conducit. Quomodo alias ardores, anxietates, vomitus, qui excoriationem ventriculi, præsertim circa antrum pylori insequuntur, sint tractandi, vid. Wepferus de *Cicuta aquat. pag. 330.*

Si nausea aut vomitus imminet ab assumpto medicamento, vel ingrato vel foetido, convenit masticatio corticum citri recentium, cui subinde de pulpa aliquantulum adhæreat; vel panis tostus aceto intinctus, & pulvere caryophyllorum inspersus, ori ac naribus admoveatur.

Plura de vomitionibus nimis per medicamenta factis, earumque medendi ratione, vid. Willsius in *Pharmac. Ration. pag. 75.*

## CAPUT II.

De

### Vomitu Cruento.

#### CAUSÆ.

**V**omitùs sanguinis, seu vomitus cruentus, est, quando rejicitur sanguis per os: & fit vel ex aperta quacunque ratione arteriola aut venula stomachi, idque vel vitio suppressarum consuetarum sanguinis aliorumvè humorum evacuationum; vel vitio splenis, adeoque ex dehiscente vase brevi in stomachum; vel denique vitio pancreatis, in quo una alteravè vena à lymphâ ejus p.n. acidior exesa, aut aperta, refundit sanguinem in duodenum, qui regurgitat in stomachum.

Quoad excretiones suppressas, post hæmorrhoidum & mensium suppressionem ex robore naturæ supervenit vomitus cruentus: idque tam in gravidis quàm non-gravidis. Exempla talia non sunt rara, & referuntur à Rulando in *Cur. Empiric. Cent. 3. Cur. 4.* Corthummio de *Morb. atton. c. 70. §. 33.* & Hæchstettero *Decad. 2. Cas. 6.* item Schenckio *l. 3. Obs.* Quin & prægnantes ipsæ ex mensibus retentis interdum affliguntur vomitu tali sanguineo, idque ferè sine periculo; est enim motus naturæ, quos non facilè licet alterare: vid. M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. observ. 6.* Salmuth *C. 2. Hister. 54.* & Schenck. *lib. 4. Observ.* Ad hanc consuetarum evacuationum suppressionem pertinet ulcus consolidatum antiquum tibiæ, vomitum cruentum inferens: vid. Rhodius *Cent. 2. Observat. 65.* In mutilatis vomitus cruentus non rarò contingere solet, pede manuque ablata, ubi natu-

ra sanguinem redundantem per vomitum rejicit. Vid. Corthummus *lib. de Morb. atton. c. 70. §. 35.*

Spleneticis tandem valde familiares sunt vomitus cruenti. Quoad modum: certum est, quod per splenem nil immediatè veniat in stomachum, sed fiat beneficio vasorum brevium, arteriosi & venosi, quæ rarò ferè & nunquam oriuntur ex splene, sed ex arteria cœliaca, splenica & vena splenica ante ingressum horum vasorum: quando ergò splen scirrhusus, vel alio modo infarctus, non potest admittere sufficienter sanguinem per arteriam splenicam affluentem, qui tamen stagnando in dicta arteria, ob denegatum spatium non potest remeare convenienter ad splenicam venam, lege circulationis; impedito sanguinis motu in arteria & vena splenica, stagnat quodammodo in arteria splenica, in specie circa vas ejus breve, ante nempe ingressum arteriæ in lienem, quod vas breve ad ventriculi fundum subrepat. Sub tali occasione stagnatio sanguinis impediti facta, tandem per vas breve apertum sanguis arteriosus in stomachum evacuatur, hinc subindè ante vomitum sanguinis percipiuntur pullationes circa dorsum in latere sinistro, Zacutus Lusitanus in *lib. 2. Med. Princ. Hister. 10.* aliquot recenset exempla spleneticorum & similium, quos sanguinis vomitus similiter sublevavit: qualia etiam habentur in Platero *lib. 3. observat.* & Schenckio *lib. 3. observat.*

Non tamen semper è splene sunt cruenti isti fluxus, uti hoc communiter existimant, quin & ex hepate, citra lienis noxam, vomitus sanguinis fieri potest: de quo conf. Hæchstetterus *Dec. 10. Cas. 9. pag. 440.* Miræ sanè ut subindè sunt humorum metastases & translationes, ita & vasorum anastomoses & apertiones. Conf. de vomitu sanguineo, an ex splene an ex hepate? Schenckius *lib. 3. observ. 1.* Thonerus in *observat. p. 140.* Sennertus *Pr. lib. 3. P. 5. Sect. 2. cap. 2. pag. 507.* Bartholinus *Cent. 3. Hister. 36. C. 4. Hister. 60.* Horstius *lib. 4. observ. 5.* Observationem rariorem habet Riverius *Cent. 4. Observ. 26.* de rustico, qui cum aquam fluminis potasset, ac inscius hirudinem simul hausisset, hæc lateribus stomachi infixæ, continuum sanguinis vomitum induxit.

Denique ex pancreate subindè fieri sanguinis vomitum, ex eo ferè patet, quod interdum tales sanguinem vomentes conquerantur de dolore profundo sub hypochondrio dextro; locū scilicet monstrant inscii, ubi inferitur ductus pancreaticus in intestinū duodenum, & prætereà talem vomitū sanguinis sæpius sequi solet & puris vomitus, quod fit non nisi ex pancreate exulcerato, vel per abscessum

sum nonnihil vitiato. Et tales vomitus pancreatis præ cæteris solet præcedere dolor gravativus & obtusus in superiori lumborum regione, ubi situm est pancreas. Habeo hac in parte consentientem Sylvium in *l. 1. Prax. cap. 15.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet diagnosin vomitus cruenti: non rarò decipiuntur medici, qui vomitum materiæ nigricantis habent pro cruento: vid. Hæchstædterus *Dec. 2. Cas. 4. & 5.* sunt enim succi atrabilarii vulgò noti, nati partim vitio digestionis primæ, partim ob miscelam variorum humorum in intestinis, ex qua miscela oriuntur. Si ergò rejiciuntur fluida rubicunda, innuitur rejici sanguinem arteriosum: Si obscura fluida, grumolæ instar substantiæ hepatis, est semper sanguis venosus: si verò non adeò obscurus, sed saltem nigricans cum sensu dolorifico morsicante, vel cum sapore acerbo aut austero, rejicitur, talis non est sanguis, vel saltem non solitarius, sed simulacidi succi, qui sui miscelâ atramenti instar humorem nothum eruentum emergere faciunt. Novi medicum, deceptum ab alio, qui se ingurgitavit vino cerasino, illud suprà iterum & infrà reddens; iste Medicus putavit, esse sanguinem nigrum.

### PROGNOSIS.

Vomitus sanguinis diuturnus malus est.

Vomitus spleneticorum cruentus, aut qui aliorum viscerum chronicis affectibus laborant, periodicus, saluberrimus est.

In quocunque sanguinis vomitu sæpiùs recurrentes supervenientes hæmorrhoides salutem afferunt morbi certam.

Excretiones sanguinis sursum aut deorsum in exanthematis, variollis, morbiis & similibus lethales sunt: vid. Hæchstædterus *Dec. 1. Cas. 8.*

Vomitus cruentus vitio evacuationis solennis suppressæ, v.g. obstructionis mensium, &c. non adeò est nocivus, nisi excedat; quia observationes testantur, nonnullis ordinariò ferè menses vomitu fuisse rejectos: vid. Panarollus *Pentec. 1. Observat. 6.* Bartholinus *Cent. 5. Hist. 32.* & Timæus à Gûlden. *Rec. l. 4. Casu 12.*

Lindanus in vomitu sanguinis hoc instituit Prognosticon: sanguinem ægri rejiciunt ex ventriculo duplici formâ; vel grumosum seu crassum & atrum; vel tenuem fluidum, & nigrum instar atramenti, & acrem. Neutrum autem est atra bilis, per vitiosum succorum in intestino duodeno concursum facta: quibus enim atra bilis exit, ii prostridie moriuntur; nam atra bilis longè differt à sanguine, quæ omnes partes exeundo quasi cauterizat.

### C U R A.

Vomitus sanguinis, si criticus, non sopiendus: morbidus verò consideratur vel absolute, prout est excretio sanguinis simpliciter præternaturalis, vel respectivè, respectu causarum antecedentium, quæ sanguinem vel coacervant, vel in specie ad ista loca diffundi faciunt. In vomitu igitur cruento curando posterioris hujus ratione causæ antecedentes removendæ, idq; extra paroxysmum, vel excretiones conluctas revocando, vel viscerum vitia corrigendo. Prioris ratione, idque in primo paroxysmo, sanguinis motus ne nimis in ventrem effundatur, corrigendus, vel revellendo vel avertendo, sanguis verò jam effusus, duplicia postulat remedia:

1. Vasa apertâ adstringentibus sunt coërcenda, ut sanguis sistatur.
2. Sanguis effusus plus minus congruatus relictus resolvatur & rejiciatur.

Adeoquæ venæ sectio vel in brachio, vel in pede, aut etiam per hirudines, hæmorrhoidum apertiones, in corpore vel simpliciter plethorico, vel in quo sanguinis evacuationis suppressa est, subinde præmittendæ sunt.

Fœminæ sanguinem evomentes profluentibus menstruis protinus liberantur, Authore Hippocrate: utriq; sexui sanguinem evomentium aut hæmorrhoidum profluvium salubriter supervenit: quod ubi parcius, phlebotomia prodest. Quodsi vero solennem quandam sanguinis suppressionem superveniat vomitus cruentus, ex mensibus suppressis saphæna aperiatur; sin ex vitio viscerum abdominis v. g. lienis, hæmorrhoides, item vena brachii sinistri aperienda: sin hepatis, V.S. in brachio dextro; sin ab hæmorrhoidibus suppressis, vena ischiadica in parte sinistri pedis minimo digito vicina: sin ex hæmorrhagia narium consuetâ suppressâ, ex vena brachii, ejusdem lateris cum nare, unde sanguis fluere solebat. *Conf. Forestus lib. 18. Obs. 18. & 17. schol. pag. 159. & 160.*

Remedia inter pro primo scopo, sunt adstringentia, quæ ex cydoniis, plantagine & portulaca parantur, imprimis succus & syrupus: item ablinthium, & præ omnibus aliis succus radices urticæ majoris; quæ vel decocta tantum vel infusa est admodum experta. Præterea convenit syrupus de symphyto Fernelii, de quo vid. Bartholinus *Cent. 3. Obs. 61.* Item expertissimus in Anglia est syrupus sequens, paratus ex succis foliorum plantaginis & radices symphyti majoris, quem non solum valdopere commendat Boyle in *Philosoph. Experimental. Vol. 1. p. 110.* sed descriptionem ejus videb. etiam in Digby *Recept. Vol. 1. pag. 50.*

Catholicus est ferè in quacunque sanguinis rejectione compescenda, aliàs ad suppressendum



mendum sanguinem ☉ seu ☿ li eminet, qui simul stypticâ vi vata firmat; hinc ∇ urticae majoris & foliorum plantaginis, acidulata cum spiritu vitrioli, sumitur cochleatim; & pro hoc scopo ab Hartmanno & Rulando maximè commendatur in *Thesuro* pag. 184.

Porro semen hyoscyami Heurnio usitatum, crocus ☿ is adstringens, imprimis iste qui ex ☿ lo ☿ is in aqua soluto injectione olei tartari per deliquium præcipitatus & edulcoratus. Ræ ☿ is adstringentes, item terra sigillata, catechu aliæque aquæ medicatæ, lapis hæmatites, præsertim cum blandè acidis propinata. Item R ☿ li ☿ is est egregia in quacunque hæmorrhagia.

Forestus in l. 18. Obs. 18. habet mixturam ex trochiscis de carabe & ☿ sigillata cum aquis convenientibus dilutis, quæ præmissâ venæ sectione habet effectum singularem, in sanguine fluente sistendo, & concreto simul dissolvendo; quæ mixtura descripta est in Senerto l. 3. *Prax. de Vomitu* p. 158.

Ad cuius imitationem:

℞. Aq. burf. pastor.  
plantagin.  
portul. aa. ʒi.  
+ rosac. ʒiij.  
troch. de carab.  
terr. sigillat. aa. ʒiβ.  
Syr. myrtin. ʒvj. ad ʒj.

M. D. S.

Anhaltender Tranc̃lein.

Sylvius habet misturam ad quameunque sanguinis excretionem, & in specie ad vomitum sanguinis, polychrestam in Praxi, l. 1. cap. 9. §. 20. quæ prima fronte quidem inanis apparet, sed quod ipse testari possum, admodum est proficua.

Ad cuius imitationem sequenti modo potest præscribi:

℞. Aq. plantag. ʒiij.  
cinnam. spirituos. ʒiij.  
\* vel rosac. ʒiβ.  
corall. r. præp. ʒβ.  
terr. sigillat. gr. xv.  
laud. opiat. gr. ij.  
Syr. myrtin. ʒj.

M. D. S.

Blut-stillendes Tranc̃lein.

Loco + i addi quoque possunt gutt. xij. ☿ li.

Capiatur cochleatim.

Item.

℞. ∇ plantag. c. ☿ li. Diacidul. q. v.  
cui addatur

☿ sigill. pro lubitu c. g. ʒj. l. ʒβ.

M. S. ut antea.

Detur subindè cochleatim.

Effervesceit quidem, sed non diu durat, & acquirit saporem adstringentem aluminosum.

℞. Aq. hyperici.

plantagin. aa. ʒij.

succi plantagin. rec. expr. l. cydon. l. granator. ʒvj. vel ʒj.

hamat. præp. ʒβ.

bol. armen. præp. ʒj.

laud. opiat. gr. iij.

syr. de symph. ʒvj.

M. D. S.

Blut-stillendes Tranc̃lein.

Commodè & lapilli 6ʒ. possunt addi, quando nempe metus est coagulati sanguinis adhuc in stomacho hærentis; quod patet ex angustiis præcordiorum, imminente lipothymia, difficili respiratione, pulsu debili, ventriculi inflatione, facieque citrina ac pallida; quibus interdum superveniunt phlogoses. In his enim usurpentur sanguinem grumosum dissolventia, ut lapilli 6ʒ. cum + o soluti, vel corallia præparata in vino acido, & diaphoreticum, succinum, trochisci de carabe, & de terra sigillata, camphora. In specie sperma ceti à ʒβ. ad ʒj. in jusculo calido, vel haustu cerevisiæ dissolutum & assumptum mirabile est; ad dissolvendos sanguinis grumos relictos per rhabarbarum, simileve laxans educere; aut etiam vomitorio leniore evacuare conveniet. Conf. Bonetti sepulchret. p. 733. §. 9. & Riverius Cent. 4. Obs. 26.

In vomitu sanguinis vitio splenis, in quo copiosiore aut æger interdum deficit, aut viribus licet resumptis, in incurabilem ascitem delabitur, noto: ad præservationem & fundamentum curationis, & inde metuenda plurima mala, nil melius convenire, quàm Martialia aperientia dicta, & hinc absinthium, omniaque ex eo parata. Conf. Dodonæus in Hist. stirp. p. 24. & in Obs. p. 47. Præmittenda tamen aut subinde socianda erunt Martialia pro cura magis tuta ac fida.

Externè ad vomitum cruentum scutum ex theriaca cum croco, aceto rubilidæi irroratum, convenit ex Hæchstedtero Dec. 2. Casu 5. vel panis tostus, cui in vino malvatico vel aceto intincto sit adpersus caryophyllorum pulvis, autore Hartmanno *Prax. Chimiæ* p. 177.

## S E C T I O V I I.

D E.

## DOLORIS SYMPTOMATIBUS STOMACHI.

**N**otum est, & frequenter in Praxi experimur, quod ægri conquerantur de gravissima anxietate & angustia circa præcordia, & dolore cordis, & similibus, & simul nesciunt, quid conquerantur, de his & eorum symptomatibus, quibus tam multum negotii nobis facessunt, nunc agemus.

## CAPUT I.

De

*Angustia & Anxietate Præcordiorum.*

**Q**uod attinet anxietatem & angustiam præcordiorum, notum est, cor ex se nullo sensu, nullaque molestia corpori esse molestum: cæterum sæpius evenit, ut in præcordiis, hoc est, ut explicat Fernelius l. 4. de Febr. c. 10. regione circa ventriculum, diaphragma, jecoris cavum, lienem, pancreas, in specie ventriculo, ejusque superiore orificio, adeoque in ea regione, quæ costis nothis, anteriora versus sternum se inflectentibus circumscribitur, non raro sint anxietates & insignes molestiæ, item frequentes dolores ægris gravissimi. Sin dolor sit, qui in ea regione frequenter affligit, & quando ægri intento digito monstrant in fovea ista, quæ dicitur scrobiculus cordis, in specie vocatur dolor stomachi seu cardialgia; præprimis si unâ cum dictis anxietatibus & angustiiis præcordiorum jungatur insignis dolor compressivus & constrictivus, ut dicant: *Ich habe Angst / es will mir das Herz abdrücken*; quod innuunt cum contortionis sensu: quando verò cum his anxietatibus & angustiiis conjunctus sit sensus morificationis & ratiōnis, vocatur cardiognome, *Herzeng-Angst*; dicunt: *Es reißt / es beißt / es frist / es greift wie mit Krallen an das Herz*. Anxietates illas optimè illustrat vomitus imminens ab assumpto vomitorio, qui uti maximè anxios reddit ægros: *Es ist ihnen alles zu enge / es ist wie Himmel und Erden auff ihnen gelegt / es will ihnen das Herz abdrücken / es sey eine rechte Todes-Angst*: Cardialgiam verò repræsentant dolores illi, qui post deglutitos grandiores bolos, aut duriora assumpta, nos sensibilissimè & interdum atrocissimè affligunt, quod vocant *das Magen-Drücken*.

## P A R S A F F E C T A.

In utroque casu malum semper oritur ab  
Tom. II.

affecto plus minus orificio ventriculi sinistro: præsupponenda nempe hinc sensibilitas hujus orificii, & inde nata proclivitas ad sui contracturam, variosque spasmos. Anxietates istas dico oriri omnes quibusvè in morbis simpliciter ab affectis præcordiis, seu speciatim ventriculo, uti non solum ostendunt angustia istæ, quæ vomitum ab assumpto medicamento immediatè præcedunt; sed & mulieres hystericae subinde de gravissimis anxietatibus vagis, *von grosser Herzeng-Angst* conqueruntur, in quibus simpliciter affectum esse orificium stomachi superius, testantur ructus subindè supervenientes, à quorum eruptione sensibile levamen percipiunt; item in febribus, v.g. intermittentibus, nunc præcedunt, nunc in ipso paroxysmo affligunt anxietates multiplices: quæ quod sint ex stomacho, confirmatur ex eo, quod à frigido potu affatim hausto ordinario insigniter exasperantur, & non nisi vomitu superveniente solvantur: In febribus, tam benignis quàm malignis, gravissimæ anxietates itidem simpliciter sunt ex molestato orificio sinistro stomachi, & partibus membranosis affectis, nullo verò modo ex corde affecto. Etsi enim sudor videatur levare in talibus malum, tamen revera in stomacho est, & cessante sudore redeunt: nempe suppresso sudore effluvia ista, quo insensibiliter aut sensibiliter aliàs diffiantur retenta, affligunt præcordia & membranas earum partes; unde anxietates, parili ferè ratione, atque in diarrhæis, quò copiosiori diaphoresi gaudet corpus, eò minor erit diarrhœa, sed quò minor est diaphoresis, eò copiosior alvi fluxus. Porro esse anxietates ex præcordiis, ostendunt gravissimæ istæ præcordiorum angustia, & subindè lethales anxietates cum hypochondriorum extensione, præcurrentibus lipothymiis, sudore frigido, &c. quæ superveniunt interdum contorsioni vertebrarum: hinc est, quod il, qui cœnâ largiore se replent, noctem insequentem inquietam patiuntur, dum hinc inde se jectigare ob anxietatem coguntur, saltem propter stomachum; ex nimia repletionem male affectum. Quotiescunque ergo ægri vel anxii sunt, vel de anxietatibus conqueruntur: *Es sey ihnen so angst und bange umbs Herz*; certi esse possumus, semper vitium esse in stomacho speciatim circa sensibilissimum ejus sinistrum orificium.

## C A U S A E.

Causæ, quæ anxietates tales pariunt, sunt nunc manifesta acriora, vel stomacho hostilia  
(L)

stilia assumpta, ut Mercurius sublimatus, O-O, lac coagulatum, fungi, &c. nunc alimenta sub digestionem corrupta, ut fructus horzi, vitata nunc contenta peregrina, ut flatus & humores æruginosi, nunc miasmata & fermenta aliunde suscepta, ut in peste morbi- que contagiosis, nunc ipsi ventriculo impres- sum vitium, inflammatio, eschara, &c. nunc nervorum vitia convulsiva, orificium ejus aut membranas partes vicinas inficientia, ut in vertebrarum contorsione.

#### C U R A.

Curantur anxietates hujusmodi per alca- lia aromatica & ôsa, seu carminativa & dis- cutientia, & effervescentes succos, in specie acidum, corrigentia, uti sunt O-lata & O-ta, in genere per ea, quæ succos vitiosè efferve- scentes corrigunt, & halitus inde elatos resol- vunt & discutunt. Semper ergo est habenda ratio morbi adjuncti humorum efferve- scentium & reliquarum causarum, pro qua- rum varietate etiam cura varianda.

## CAPUT II.

De

### Cardialgia.

**Q**Uoad cardialgiam seu cardiogmum: Regio stomachi, præsertim in scrobi- culo cordis, veteribus vocata fuit *xardia*, quæ vox utut propriè significet cor, nihilominus tamen, quoniam talis dolor sto- machi seu orificii superioris sæpius in consen- sum trahit totumque corpus, ut exinde non rarò sic dictæ lipothymia, syncopes, su- dores glutinosi, frigidi, ut moribundorum cir- ca caput, virium omnimodæ prostrationes, & non rarò stupenda & horrenda symptomata oriantur; propterea vocarunt dolorem hunc cardialgiam, quasi dicere voluerint dolorem cordis, cum tamen non laboret cor, sed affi- ciatur orificium ventriculi sinistrum. Et qui- dem iste dolor orificii superioris est admodum molestus & intensissimus, ac subindè propter symptomatum frequentiam & vehemen- tiam toti corpori periculosus: propter quam causam etiam Helmontius ibidem statuit se- dem animæ & duum-viratum, seu conspira- tionem lienis cum stomacho, seu sede ani- mæ, cujus duum-viratus jus se extendat in omnes operationes animales homini proprias.

Observanda hic imprimis est differentia hominum: quidam habent orificium stoma- chi sensilius, quidam minus: illi, uti sæpius anxietate & cardialgiâ laborant, ita crebrius lipothymiam incurrunt, quæ tamen non ter- reat medicum. Contrarium est in reliquis.

#### PARS AFFECTA.

Nobilis pars est hic locus affectus: nam lo-

ve vulnus, si attigerit hoc orificium sinistrum, ferè est lethale: imò Bartholinus in C. 5. Hi- stor. 34. ex pugno stomacho violentius appli- cato subortam esse mortem annotavit, non rarò epileptica superveniunt pathemata ob dolorem ejus ventriculi, à bile prassina eve- nientem: de quo vid. Amatus Lusitanus C. 1. Cur. 20. Nec mirum est; quia orificium stoma- chi, maximè nerveum & admodum sensibi- le, consensum facilè cum toto systemate ner- volo facit; unde isto affecto, totum nervo- sum genus compatitur, & in spasmus ac con- vulsionem pertrahitur.

Cardialgiæ autem hæ, interdum sunt va- gæ, interdum fixæ. Vagæ nunc cessant & iterum incipiunt; hærent unicè in stomacho & intestino duodeno; oriuntur ex effervescen- tia succorum heterogeneorum, maximè bilis cum aliis succis p. n. fermentantibus; undè simul percipiuntur phlogoses. Cardialgiæ verò fixæ oriuntur ex simili causa, sed con- tinuò agente.

Observandum hic simul, quod cardialgia non semper præcisè affligat in parte abdomi- nis anteriore epigastrica, quin potius sæpè in dorso sentitur, non tantummodò in supre- ma lumborum regione, aut circa ultimas ver- tebras thoracis, sed sæpè dolor sequitur du- ctum œsophagi, ita ut sæpè intra scapulas sursum ascendere videantur, & sit à spasmo- dica contractione & motione œsophagi sto- machi continuati.

#### C A U S A E.

Causa proxima cardialgiæ est insignis læsio & contractura convulsiva dicti orificii ventri- culi, utpote partis sensibilissimæ, ex molesta irritatione oriunda, quæ læsione, ratione ner- vorum plurium & majorum ac spirituum ani- malium insigniter affectorum, postmodum facilè totius microcosmi œconomia turbatur, & gravia symptomata oriuntur, vel potius totum nervosum genus in consensum trahi- tur, & actionum animalium consequenter in- signis læsio & prostratio supervenit. Si cau- sa irritans sit acris & corrosiva, oritur sensus corrosionis insignis seu mortificationis, cum an- gustiis junctæ.

Causa remota est omne id, quicquid læde- re potest dictum orificium, & ad dolorificum ejusmodi spasmus concitare, sive hoc fiat im- mediatè & per essentiam, sive per consensum saltem.

Per consensum non adeò frequentes sunt cardialgiæ, ut ut interdum in nephritide, in contorsione vertebrarum dorso, *weñ man sich weh gethan hat*/ gravis dolor observari so- leat; levis quidem est hæc res, sed neglecta, paucis hebdomadibus crudelia infert sympto- mata item à depressione & induratione carti- laginis eniformis: vid. Ballonius Epidem. 1. 2. p. 242. & Sennertus Prax. lib. 2. P. 1. c. 26. aliarum-




aliarumque partium vitiis, e.g. calculis in vesicula fellea contentis : vid. Kentmannus *de calculis*, à lapide in intestino jeuno: vid. Schneiderus *l. 3. de Catarrh. c. 7.* item à scirrho pancreatis, & mesenterii: vid. Riverius *Cent. 1. Obs. 90.* Interdum hysterica passio gravior cardialgiam per contentum infert.

Per essentiam verò vel ipsius stomachi aut partium vicinarum subest vitium, vel in stomacho contentorum, & horum vel intus genitorum, vel extrinsecus assumptorum. In specie quoad contenta, seu frequentiores cardialgiæ autores, sunt flatus: imprimis in stomacho vacuo oberrantes, plus minus eum distendentes: hi namque ex potenti utriusq; orificii strictura inclusi angustius, vago motu vagas & insignes anxietates, ac subinde cardialgias inducunt, in specie aciores, acidi acrosivi, aut simili vitioso acore inquinati: unde hypochondriacis & hystericis frequens est hoc malum: vid. Rhodius *Cent. 2. Observat. 70.*

Porro sunt excrementa quæcunque in stomacho stabulantia, quæ inter ferè primatum obtinet materia viscida glutinosa & acida, pituita vitrea dicta, orificio stomachi sinistro impacta, quæ dicitur oriri à tartareis humoribus; hi enim acore vitioso inquinati, rodunt & vellicant, & quasi perterebrant stomachum, unde isti dolores, qui post pastum horam unam vel duas ægros vexant: item excrementa talia, quæ vulgò bilis porracea, & æruginosa à colore viridiusculo vocari solet, in quibus acidum peccat corrosivum, gravissimas præcordiorum angustias & molestissimas cardialgias inferunt: vid. Platerus *l. 2. Observ. p. 436. & 498.* Amatus Lusitanus *l. 1. Cur. 20.* Zacutus Lusitanus *Pr. adm. lib. 2. Obs. 1.* & Panarollus *Pent. 1. obs. 20.* Excrementa hæc oriuntur partim ex corruptione assumptorum sub digestionem primam, v.g. uvarum: vid. Rhodius *Cent. 2. obs. 53.* partim verò transmittuntur ex intestinis, in specie ex duodeno in stomachum, quando enim bilis, vel naturaliter vel præternaturaliter constituta, occurrit acido paulò intensiori, vel pancreatico, vel stomachico, tunc ex horum tam solitaria quàm simultanea cum chylo miscela abeunt in varios & distinctos humores diversarum proprietatum, nunc nigros, nunc virides, nunc feculentos, nunc alio colore vitioso præditos. In specie in bile porracea & æruginosa peccat acidum pancreatis nimium, forsani simul vitiosè austerrum: unde talia evomentes sæpius patiuntur stuporem dentium ex vitioso acido, ex quo cum bile amara concrevit liquor viridis acris & corrosivus deterrimi saporis, & qui in stomacho, si non vomitum aut choleram morbum, certè gravissimas angustias & cardialgias inferre solet: vid. Bonettus *l. 3. S. 7. obs. 22.* Hollerius *obs. propr. 21.* & Borellus *C.*

Tom. II.

*1. obs. 54.* Huc etiam pertinent lapides & calculi in cavitate ventriculi collecti aut tunicis adnati: vid. Hoeferus *Hert. Medic. l. 3. c. 1.* & Bonettus *l. 3. S. 7. obs. 31.* Præterea assumpta vitiosa & extraordinaria nimis acria similiter inferre solent cardiacam passionem: sic Valeriolus *l. 1. obs. 7.* & Salmuth *C. 1. obs. 9.* intensissimam cardiacam passionem referunt, ortam ex improvise haustu Mercurii sublimati loco emulsionis amygdalarum, sed præterea quoque Platerus *in obs.* cardialgiam lethalem ob  propinatum; Bonettus *Sepulchret. l. 3. S. 7. obs. 2. & 3.* Bartholinus *Cent. 2. Hist. 18.* à veneno; Petrus Johannes Faber *in Curat.* exemplum habet cardialgiæ intensæ cum pravis symptomatibus, ex esu nimio casei recentis & mollis, cui simile fieri solet, si lac quodcunque intempestivè haustum, aut si acidum quodcunque, v.g. vinum (vid. Amatus Lusitanus *Cent. 6. obs. 56.* item Forestus *l. 18. obs. 13*) superingeratur, indeque coaguletur & grumescat in stomacho; de cardialgia à potu frigida vid. Rhodius *Cent. 2. obs. 71.* Balsami Sulphuris abusu *Act. Hassn. Volum. 1. c. 131.* Rhodius *C. 2. obs. 72.* cardialgiam crudelem inducit ex hirudinibus productam, naribus, ut fieri solet in Gallia, pro hæmorrhagia artificiali excitanda applicatis, postmodum per nares ingulam, & orificium stomachi sinistrum irrepentibus: cardialgiam quoque intulerunt læcæ, ut habet Gesnerus *l. 2. Hist. Animal. cap. de lacerta;* pediculi, vid. Heurnius *de morbis capitis c. 7.* lumbrici, vid. Hercules Saxonia *Prælect. Pract. P. 2. c. 7. §. 4.* Henricus ab Heer *obs. 16.* & Rhodius *l. 4.* Elegans est, quod habet Platerus *in Obs.* de cardialgia intensissima & cruciatu maximo ob deglutitam anguilam vivam, quam postmodum mortuam, & veluti excoriatam, per alvum excrevit. Cardialgiam etiam Platerus habet ob deglutitum scarabæum: aliud exemplum habet intensæ cardialgiæ, obortæ ob deglutitionem cochlearis, quod ipsum sequenti die per anum reddidit. Pertinet huc vitrum deglutitum, & acicula deglutita per urethram iterum egressa, cardialgiam, angustias præcordiorum respirationem difficilem, & dolorem punctionum ventriculi, inferentes.

Quod ipsum attinet ventriculi aut partium vicinarum vitium, cardialgiam inferens, variū admodum esse potest: sic Hildanus *C. 3. observ. 20.* observat dolorem ventriculi, primo levem, hinc gravissimum cum dolore capitis, tandem vagè omnes corporis partes vicissitudine mirā affligentem, lethalem: in aperto cadavere ulcus cavum magnum & foetidum circa orificium ventriculi sinistrum fuit inventum: quale etiam observavit Dodoneus *Obs. Med. c. 25.* non secus ac Riverius *Cent. 1. obs. 90.* notat ventriculi dolorem diuturnum lethalem, ubi, aperto cadavere, inventus scir-

(L 2)

thus

rhus, pancreas, mesenterium, jejunum & pylorum occupans: similes tumores, ventriculo dolorem inferentes, observavit Hippolytus Boiscus de *Facultat. anal. lect. 2. pag. 21.* & Zachinus P. 2. *obs. 11.* Pertinet huc suo modo luctus, mœrores aut diuturnæ tristitiæ ad cardialgias pertinaces disponentes. *Conf. Platerus in Obs. p. 15.*

Hi ipsi dolores stomachi seu cardialgiæ, ut ut vagum sint symptoma, non rarò sunt periodici, statuto tempore ac periodo affligentes; hinc inde hujus rei prostant exempla, quale imprimis est singulare Bartholini C. 3. *Hist. 50.* ubi recenset tales ventriculi dolores periodicos alternis diebus statuto tempore affligentes: sic Guarinonius in *Conf. 170.* habet intensum ventriculi dolorem, menstruo tempore affligentem in muliere.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica anxietatum & cardialgiæ: recensentur ab ægris, qui conqueruntur, se insignes molestias in præcordiis sentire, monstrantque regionem sterni inferiorem & scrobiculum cordis; quæ sita, non possunt verbis sufficienter exprimere molestiam: quibus sæpe accedunt inquietudines, vigilæ, respirandi difficultas, item imminetia subinde animi deliquia; quæ ordinariò progreditur vertigo aut scotomia: anxietates has insequuntur faciei livor, extremorum refrigerationes, & subinde sudores frigidi: ægri interdum quasi exanimati jacent, interdum ex doloris acerbitate se mirè jectigant, nescii ferè quid agant.

Porro observanda distinctio: ne forsan cardialgia paulò inferiùs protensa seu protracta habeatur pro dolore colico, & colicus dolor in ea parte coli, quæ immediatè subternitur stomacho, habeatur pro cardialgia: qualia exempla Schenckius in *Observ.* recenset l. 3. de quibusdam Medicis deceptis, curantibus quendam in anteriore stomachi regione dolorem sentientem, tanquam cardialgia laboraret; quem tamen errorem detexit unicus clyster injectus, dum nimirum hoc ipso fuit sedatus dolor colicus, aliàs enim nihil præstitisset clyster. Id quod in specie dignoscitur, considerando circumstantias loci dolentis, & hinc antecedentia & consequentia: Nam ut plus magis sursum versus protenditur dolor in cardialgia, qui in colica vera, quasi deorsum versus umbilicum & lumbos vel renes descendit, & rarò etiam sola affligit cardialgia, quin si paulò atrocior fuerit, horrenda infert symptomata. Causarum signa, an sint humores, an flatus, an per essentiam, an per consensum renum, an per consensum alius alterius par-

tis? præter hoc, quod facile patent, recensentur à Sennetto in *Praxi.*

### PROGNOSIS.

In Prognosi: dolor ventriculi seu cardialgia, licet adstantibus videatur terribilis, & ægris funesta, tamen ex se leve malum est, & nihil habet in recessu, modò mox curetur: si tamen sit acerbior, ut diutius protrahatur, propter syncopes metum, non contemnendum malum est, propter periculosiora, quàm aliàs superveniunt, symptomata, unde magis periclitantur in cardiaco hoc affectu, qui os ventriculi admodum sensibile habent, aut obnoxii passionibus convulsivis; item qui raræ aut teneræ sunt texturæ; sic in febribus, cujus symptoma existit, præsertim continuis & acutis, tam benignis quam præsertim malignis; dum ægri simul de æstu & ardore insigni circa ventriculum, vel quæ aliàs dicitur soda, aut etiam de vera cardialgia conqueruntur, res meritò suspecta aut admodum periculosa est: vid. Hippocrates S. 4. *aphor. 65.* signum siquidem est, partim magnam adesse humorum saburram, partim ingentem ventriculi inflammationem cum subsequente sphacelo, partim nervorum orificii ventriculi stricturam spasmodicam.

Ista, quæ oritur ex pituita viscida, plus minus acida, contumacior quidem cæteris, minus tamen molesta, ac minus gravibus symptomatibus stipata esse solet. Pessima est, quæ ex acri & mordicante humore oritur.

Cardialgia post alimenta vitiosa assumpta sæpè quidem est molestissima; rursus tamen remittit, modò non supervenerit febris.

Cardialgia in puerulis sæpè epilepsiam; in adultis verò morbos chronicos, eosque molestissimos, excitat.

Cardialgia denique à lumbricis & flatu ut plurimum minus periculosa; interdum tamen ex lumbricis ventriculum mordentibus gravissima symptomata oriuntur, ex quibus ægri repente deficiunt; vid. Riverius *lib. 9. cap. 10.*

### CURA.

Quod attinet curam: in hac

1. Mature removenda imprimis causa stomachum irritans aut lædens qualiscunque, sive sit interna, sive sit externa, item sive per essentiam sive per consensum fuerit.
2. Placandus est stomachi dolor aut natæ inde angustia, tam per generalia opiata intermissa, quàm per specialia aroma-

aromatica appropriata ; ita tamen, ut quamvis causæ sublatio ordinariè primum locum obtinere debeat, interdum tamen anodyna & narcotica, si dolor nimis urgeat, præmittenda veniant.

Primam quod attinet indicationem, quæ causam irritantem removeret, in affectu per essentiam, nempe humoralium contentorum, sive assumptorum; sive intus genitorum vitiorum, per se planum est, quod excellent vomitoria, quæ Amatus Lusitanus, Faber, & omnes Autores, commendant. Si verò est per consensum, curetur morbus primarius: v.g. nephritis, in qua dentur anodyna. Hinc in principio febris intermittentis & ardentis, si æger patitur cardialgiam enormem, maturè propinetur vomitorium.

Post vomitoria, & quidem in malo minus acuto usurpanda sunt purgantia; sed quoniam hæc per se ventriculo sunt inimica & molesta, irritando ejus orificium sinistrum faciliè possunt exasperare malum; propterea convenientissimum est, ut iisdem addantur opiata, de quo videre potestis Riverium in sua Praxi, ubi de Vomitu, l. 9. c. 7. pag. 415. item de cardialgia c. 10. pag. 433. ac Schultziū in Consilio 114. aliosque. Sic veteres præscribebant elect. diaphænic. ʒß. & philon. Pers. ʒij. pro electuario. Verum quoniam talia Electuaria ferè sunt nauseosa, commodius à modernis præscribitur talis formula, quæ etiam in colica est proficua: v.g.

℞. ʒi ʒlat. vel arcan. duplic. Myns.  
gr. xv.

scammon. ʒat. gr. ij. l. iij.

laud. opiat. gr. j. l. ij.

extr. troch. alband. gr. j.

ʒo destill. carvi vel cham. Rom. gutt. ij.

M. f. Pulvis. S.

**Parier-und Schmerzstillend-Pulver.**

Vel

℞. MP. aloeph. cum scammon. gr. xv. ad ʒj.

Extr. troch. alband. gr. j.

laud. opiat. gr. j. ad gr. iß.

ʒo destillat. succini gutt. iij.

Cum essent. absinth. f. pilula.

D. S.

**Parier-und Schmerzstillende Pillen.**

Ubi tamen simul observandum, quod opium, quoniam omnes spirituum & humorum motus sistit, si addatur purgantibus, ejus respectu purgantium dosis plus minus augmentanda sit, ne supprimatur omninò minor purgantis dosis. Et conveniunt talia purgantia opiatis mista, in specie iis, qui obnoxii sunt hypercatharsi, aut faciliè vexantur torminibus intestinorum; ut mulieribus, quæ ex levi purgatione suffocationem uterinam incurrunt. Item convenit talis mixtura iis,

qui facillimè sunt solutionis alvi, item convenit hæc mixtura iisdem, qui acidis aut corrosivis succis abundant, ac lymphæ acriori Stomachica turgent, in specie scorbutico-hypochondriacis, quibus per purgantia commotis ob succos crudos & acidos gravissima superveniunt abdominis tormina: de hac mixtura vid. Hæferus in Herc. Med. p. 124. item Sylvius. Poterius curavit aliquando cardialgiā aliis omnibus reluctanter in suis Observ. Cent. 1. Cur. 24. mediantibus laudatissimis suis pilulis catholicis; quorum compositio prostat in ejusdem pharmacia spagyrica, & præcipuum ingrediens est magnesia saturnina meteorisata, quæ videtur esse flores ʒii correcti per inferiora saltem purgantes.

Quod si cardialgia oriatur à flatibus, aut exhalationibus ex effervescencia humorum in intestino duodeno, uti contingit interdum in febribus intermittentibus, item in paroxysmis hypochondriacis & hystericeis, v. g. optima sunt clysmata carminantia.

℞. HB. calaminth.

origan.

ruta a M. j.

fol. lauri a M. ʒ.

sem. anisi.

cumini.

dauci aa. ʒj.

Θ ʒiß.

Coque in f. q. ∇.

Colatura ʒix. adde

Elect. lenis. ʒj.

ʒo anethi.

ruta aa ʒß.

M. f. Enema. S.

**Clystier gegen die Blähung.**

Sal tartari additur propter duplicem scopum: (1.) ut menstruum acuet; (2.) ut vi ʒinā incidat.

℞. HB. mentha.

origan.

puleg. aa. M. j.

flor. Chamomill. M. ʒ.

rad. angel. ʒvj.

bacc. lauri ʒiij.

semin. anisi.

dauci.

fenicul. aa. ʒj.

Coque in f. q. ∇ simpl. & ☐ human.

Colatur. ʒvii. l. ʒix. adde

Elect. lenitiv.

de bacc. lauri aa. ʒß.

ʒo destillat. anisi

feniculi aa. ʒß.

vitell. ovi no. j.

M. f. Clysma, S.

**Blähung-Clystier.**

Injiciendum tepidè, vel unâ vice, vel, si flatuum obstiterit præsentia, duplici vice applicetur.

(L 3)

Ri-



Riverius in tali casu habet Clysmata ex solo vino albo aut Hippocratico cum oleis destillatis carminativis parata, quæ non sunt inelegantia.

Quæstio est: an venæ sectio conveniat? quod negatur; per se enim in Cardialgia tollenda nil emolumenti habet, unde, quando prostant exempla cardialgiarum, per venæ sectionem curatarum, verè sunt casuaria, nec ex lege artis exhibita. Exemplum tale habet Riverius *C. 1. Observ. 44.* de dolore vehemente, ventriculi & lienis regionem occupante, qui aliis omnibus irritis, venæ sectione tandem fuit curatus; vel cardialgia propter alium affectum ex sanguine nata fuit, & cum hoc suo modo conjuncta, ratione cujus venæ sectio indicata fuit, ut v. g. in mensibus suppressis, item si à sanguinis turgescencia nimia dependeat: pertinent huc etiam exempla Thoneri *in Observ. pag. 135.* de dolore ventriculi immani & ingenti in plethorico, venæ sectione curato; quia adfuit suspicio inflammationis stomachi.

Sensum doloris tollunt imprimis papaverina & opiata: vid. Wedelius *Opiol. pag. 116.* quæ inter veteribus in usu fuit philonium Romanum ad ʒj. item pilulæ de cynoglossa ad ʒss. Modernis in usu est laudanum opiatum, cum decocto flor. chamomill. usurpatum, & laud. hystericum; item usurpetur sequens mistura specifica contra dolorem stomachi & præcordiorum, aut ad cardialgiæ omnes causas:

- ℞. *Aq. chamomill. ʒiij.*  
*Succ. cydon. ʒj.*  
*Elix. menth. vel citri vel aurant. ʒss.*  
*℞o destillat. chamomill. vulg. vel Rom. gutt. vj.*  
*laud. opiat. gr. iij.*  
*Syrup. de hyssop. ʒiij.*  
 M. D. S.

**Schmerzstillende Mixtur aufsetzliche mahl.**  
 De qua capiantur pro dosi duo vel tria cochlearia, & in genere anxietates dispellit.

Mixtura hæc diversimodè specificari potest; hinc potest huic etiam addi ~Θ\*ci, aut sin ardoris sensus simul adsit, ~Θi dulcis: e. g.

- ℞. *Aq. Chamomill. ʒij.*  
*carminat. Dorner. ʒj.*  
*elix. mentha ʒss.*  
*~Θi dulc. ʒss.*  
*laud. opiat. gr. iij.*  
*Syrup. cinnam. menth. ʒ ʒss.*  
 M. S. ut antea.

Vel etiam pro causarum varietate addi possunt pulveres quidam terre fixi absorbentes.

- ℞. ~Θ\*ci anisat. ʒss.  
*essent. opii ʒss.*

M. pro tribus dos. S.

**Schmergenstillende Essentz.**

℞. ~carminativ. de trib.

*essent. castor. aa. ʒss.*

*opii ʒss. ad ʒj.*

M. S. ut supra.

Convenit etiam R ʒi acerrima ter in die à 40. ad 50. guttas.

Alias quæ in cardialgia in genere conveniunt pro causarum ratione: ut appropriata stomachico aromatica blanda, quando flatus aut similia adsunt; Aromatica talia ad cardialgiæ usitata præ cæteris sunt radix angelicæ & enulæ campanæ, fœniculi, HB. & semen fœniculi, anisi, HB. rorismarini: specificum est chamomilla, tam vulgaris quam præstantiori cum effectu Romana, sanè Riverius, & Amatus Lusitanus vix sufficienter possunt commendare ~m chamomillæ destillatam in cardialgia flatulenta, si ad ʒiij. propinetur; hinc decoctum chamomillæ ceu expertissimum mirificè à Foresto ad cardialgiæ commendatur. Alii essentiam florum chamomillæ cum proprio spiritu paratam extollunt. D. Michaelis paravit essentiam hanc cum spiritu vegetabili carminativo, cujus ʒss. ad ʒj. propinata in affectibus stomachi & cardialgia erit convenientissima & elegantissima. Alii ℞o destillatum saphirinum chamomillæ vulgaris, & Romanæ meritò extollunt in haustulo vini assumptum, aut ℞o nucis moschatæ mixtum & exterius illitum, vid. *Act. Med. Hassens. Vol. 1. pag. 213. & Vol. 2. Observat. 87. pag. 208.* Pauli *Quadrup. Botan. pag. 253.* in specie Amatus Lusitanus *Cent. 3. Cur. 30.* Forestus *l. 18. Observat. 20.* Post chamomillam ulterius conveniunt decoctum ligni sassafras, hyssopus, summitates anethi, menthæ crispæ, item flores anthos & verbasci, qui sunt singulariter anodynæ. In specie cortices citri & aurantiorum, & ex his parata elixyria, R & ℞o destillatum corticum aurantior. Ex dictis simplicibus destillatæ ~æ, chamomillæ, florum sambuci, hyssopi & cinnamomi conveniunt. Vinum absinthites similiter est utile, uti etiam ad dolorem acrem vinum decoctionis nucis moschatæ, qui laudatur insigniter à Stoeckero *in Praxi*; item ~ anisatus seu ~ & ℞o destillatum anisi, ~Θ\*ci simplex & anisatus. In urgente casu potest propinari elixyr menthæ, item ℞a destillata carminativa, e. g. oleum destillatum carvi experimentum est Thoneri *in Observat. pag. 136.* ad gutt. iv. vel v. usurpatum.

Quod si percipiatur, simul ardor in regione stomachali, tunc modò dictis aromaticis commodè adduntur blanda acida, quæ ardorem refrænant, v. g. succus & syrupus granatorum acidorum, rob & syrupus cydoniorum, succus citri, syrupus acetositis citri; & speciatim ~niri dulcis, imprimis ex spiritu

ritu nitri cum duplo ~ anisi dulcificatus, & similia.

Si oriatur cardialgia & stomachi anxietas à succis acrioribus, acidis, ex bile porracea & æruginosa, prassina dicta, eadem propinantur acidum effervescentes destruentia: v. g. testæ cochlearum marinarum, mater perlarum, ꝯ Marchionis, C. C. ustum, ebur ustum, lapilli cancrorum, in specie Crystallus præparata: v. g.

℞. *Crystall. mont. præp.* ʒj.

*Corall. r. præp.*

*C. C. usti præp. ana.* ʒʒ.

*Land. opiat. gr. ij. l. iij.*

M. pro tribus dosibus, S.

**Chmerzstillendes Pulver.**

Nempe in tali bili æruginosa, teterrima symptomata ventriculo inferente, crystallus montana præparata specificum alexipharmacum bilis æruginosæ rectè dicitur Langio.

Si mucilago viscidior cardialgiam inferat, addenda erunt ꝯea & gummata, ut cremor ꝯi, & gummi ammoniacum.

Pertinet huc cardialgia intensissima & periculosissima, nata ex hausto Mercurio sublimato, in quo convenit ꝯ amygdalarum dulcium cum lacte mistum. Quidam solo lacte; quidam verò cum oleo tartari p. d. temperato, utuntur pro portione, cujus historiam & curam refert Valeriola l. i. *Observat.* 7. Scultetus in *Armam. Chir. P. 2. Observat.* 59. terram sigillatam cum syrupo consolidæ majoris in erosione ventriculi dolorifica ut singulare remedium commendat.

Pertinet huc suo modo elegans casus, quem habet Thonerus in *Observat. pag.* 136. de dolore ventriculi punctorio, qui fuit curatus per ʒiij. olei amygdalarum dulcium, in iure galli propinati; quò factò intra 3. horas acicula per vias ꝯrias fuit excreta, & exinde dolor omnis subito disparuit.

In cardialgia à vermibus:

℞. *Elyx. propriet. sine acido* ʒj.

~ ꝯci ʒj.

M. S.

**Magen-Elyxier.**

℞. *Essent. absinth. ꝯif.* ʒij.

~ ꝯci ʒiij.

M. S.

**Magen-Essentz.**

In doloribus ventriculi senum gravioribus, aut etiam in aliis cardialgiis cum gravi virium dejectione & lipothymia junctis, elegantes sunt pilulæ Poterii, quas describit C. 3. c. 30. ita:

℞. *Ambra gris. gr. ij. l. iij.*

*Mofebi*

*Croci Orient. aa. gr. j. l. ij.*

*opii Thebac. gr. iv.*

Misc. f. pilula.

Idem Poterius citato loco c. 31. habet exem-

plum diuturni doloris ventriculi, aliis omnibus irritis, tandem decocto ligni cassias per 20. dies continuato curati.

Item absinthium ejusque essentia senibus vigilantibus prodest: Sic Zacutus Lusitanus l. 2. *Med. Princ. Hist.* 58 *Observat.* 10. exemplum habet de importuno ventriculi dolore potu vini absinthitis curato. Wedelius essentia suæ carminativæ addit essentiam castorei & anodynæ, cum oleo caryophyllorum gutt. j. vel altera: valet & in singultu & in inflammationibus ventriculi, dosi gutt. xxx. miscet cum elixyr proprietatis, quando cruditates ventriculi adsunt. Descriptionem essentia hujus carminativæ videb. in ejus *Opiol. pag.* 119.

Quod attinet externa: interdum hic maxime conveniunt linimenta suaveolentia ex oleis imprimis destillatis concinnata.

℞. ꝯ. *destillat. chamomill.* ʒj.

*macis.*

*caryophyllor. aa. ʒʒ. l. gutt. xv.*

*Balsam. Peruviani* ʒʒ.

cum ꝯ. *expr. nuc. mosch. q. s. f. Balsam.*

D. S.

**Magen-Balsam äußerlich zu gebrauchen.**

Po stlinimenta externa conveniunt ulterius emplastra, regioni stomachi applicanda: quæ inter elegans est emplastrum carminativum Mynsichthii; item, si suspicio sit flatuum, emplastrum de baccis lauris. Ex omnibus excellit tacamahaca, per experientiam Poterii singulariter commendata in l. 3. c. 32. *pag.* 240. quæ sola in forma emplastri regioni stomachi applicata, acerbissimos dolores curavit, & hætenus crebrâ experientiâ ejus usus fuit confirmatus; quod etiam fuit in frequenti usu D. Michaelis: loco ejus sumi potest gummi carannæ, non minoris efficacæ. Scilicet tacamahaca misceatur cum p. j. Balsami Peruviani pro confortatione stomachi. Inducatur super alutam in forma scuti stomachalis, S.

**Magen-Pflaster.**

Applicetur ut adhæreat. Est nobile remedium in hujusmodi affectibus stomachi, in specie in cardialgiis, unde emplastrum stomachicum de tacamahaca Schræderi commodissimè usurpati potest. Ipse Poterius circa finem Pharm. spagyricæ excellens habet emplastrum ex tacamahaca compositum pro affectibus stomachi.

Item convenit emplastrum ex ana tacamahacæ & ceroti stomachalis cratonis, quæ liquefacta in mortario calido malax. cum Balsamo Peruviano. D. S.

**Magen-Pflaster.**

Jam quoque omnia, quæ de tacamahaca dicuntur, intelligenda etiam sunt de gummi carannæ, nobilioris forsitan usus: vel ex ana gum-

gummi caranæ & tacamahacæ, in mortario calido liquefactorum, & cum balsamo Peruviano malaxatorum, fit emplastrum.

Denique post hujusmodi emplastra usurpantur externè etiam foci vel fomentationes ex aromaticis, regioni stomachi applicando: iique duplici sub forma, aut ut species coquantur in  $\nabla$  & aceto, aut in vino, & istud decoctum pannis linteis triplicatis aut quadruplicatis applicetur stomacho; vel ipsæ species insuuntur sacculo, coquantur parumper  $\nabla$  vel vino, & ita sacculus applicatur regioni stomachi subindè renovandus. Foci potest esse talis, quem commendat inter alia Forestus in lib. 18. observ. 22. ad cujus imitationem

$\mathfrak{R}$ . HB. absinth. nostrat.

Pont.

flor. chamomill.

melilot.

rosar. r.

HB. mentha aa. Mj.

sem. anis.

carvi aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Coque in l. q.  $\nabla$  comm.

Colatur. lbj. adde:

Theriac.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Aq. rosar.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

+ i rosac.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

M. pro foci ventriculi regioni applicando. S.

Eufferliche Bähung.

Sacculi fiunt meliores ita:

$\mathfrak{R}$ . Com. absinth.

HB. majoran.

flor. chamom. Rom.  $\mathfrak{z}$  M. j.

bacc. juniperi cont.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ .

sem. anis.

carvi.

cumini.

fenicul. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Incisis & contusis impleatur sacculus oblongus interpassandus, qui ebulliat in vino aut aqua, & ita, quam calidè fieri potest, imponatur regioni stomachi, repetendo crebrius.

D. S.

Säcklein dufferlich aufzulegen.

$\mathfrak{R}$ . HB. origan.

rorismar. aa. Mij.

rad. acor. veri.

galang. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

caryophyll.

cynam.

macis aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

bacc. lauri.

sem. anis.

carvi.

fenicul. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

Incisa & cont. includ. sacculo, qui vino generoso ebulliat, & applicetur. S.

Species zur Bähung.

Omibus in casibus satifaciet hyoscyamus,

quem in Cardialgia scorbutica præprimè commendat Dravvizijs una cum alijs antidynis: c. g.

$\mathfrak{R}$ . fol. hyosc. albi.

malva sub prunis cocta & debite pistat.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

farin. hord.

lent. ana cum decocto lent. ad debitam consistentiam redact.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

muc. tragac.

sem. psyll.

cydon. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ij}$ .

M. f. Cataplasma, S.

Schmerzstillender Breij.

Quod si dolor stomachi & ventris sit occasione refrigerationis corporis externæ, & inde natorum flatuum, tunc conveniens est, simplex quidem, sed admodum bonus, sacculus Montagnanæ.

$\mathfrak{R}$ . furfur. M.  $\mathfrak{ij}$ .

mili tosti M.  $\mathfrak{ij}$ .

Sis comm. decrep. M. j.

Misceantur.

Calefiant in sacculo, & applicentur.

In Colica, quoque est elegans.

Mulieres interdum vitio, ut putant, matricis, & ejus occasione impuritatibus congestis, contumaces dolores in orificio ventriculi superiori percipiunt, quos in casu tali tollit sequens:

$\mathfrak{R}$ . Unguent. pomar.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

sevi hircin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

M. f. Linimentum, S.

Pindernde Salbe.

Quibus inungatur scrobiculus cordis mane, meridie & vespere, aliquot diebus.

## CAPUT III.

De

### Ardore Ventriculi.

**N**on rarò ebullit p. n. in stomacho materia excrementitia, undè insignis ardor & dolor stomachi percipitur, ut quasi copiosi fumi  $\Delta$ ei per gulam ascenderent. Malum hoc à primaria passione vocatur ardor stomachi, iis verò, qui Germanos sectantur, Soda.

#### PARS AFFECTA.

Subjectum est stomachus ratione contentorum, & orificium sinistrum cum œsophago ratione ætus.

#### CAUSÆ.

Causa ejusmodi proxima est effervescencia nimia in stomacho, orta ab acido vitioso nimio, effervescente cum quodam alcalino pingui seu oleoso, & cruditate nidorosa.

Cau-



Causæ remotæ sunt variæ: quædam respiciunt nunc acidum, nunc alcali ut. nosum, unde alimenta vel nimis acida, v. g. vinum, +, &c. vel pingua assumpta, cruditati nidorosa: anîam præbentia, ardorem ventriculi excitant. Hinc ii, qui sunt iracundi, aut quibus faciliè acrior bilis ex duodeno in stomachum regurgitat, obnoxii semper huic affectui propter effervescen-  
tiam bilis cum acido stomachi, tunc temporis vitiosi, obortam: item hypochondriaci plures, in quibus similiter acidum in stomacho prædominatur, quando mellita, aut saccharata, & alia dulcia faciliè aciescentia assumunt, propter horum facilem effervescen-  
tiam cum acido faciliè sodam incurrunt: imò etiam aromatica, aut acia, v. g. allium & cepæ, assumpta copiosius, effervescendo cum acido, non raro sodam inducunt.

## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica ex agrorum relatione patent; quando nempe circa præcordia conquerruntur de dolore gravativo, sub forma aquæ ebullientis sensim sensimq; adscendentis, & fauces inferiora versus constringentis: quem dolorem etiam ructus nidorosi & amarescentes tandem comitantur.

## PROGNOSIS.

Nihil habet in recessu, imprimis qui post alimenta assumpta observatur, cum faciliè cesset: qui tamen sine causâ manifesta affligat, morbum chronicum ut plurimum constituit.

## CURA.

Occurrimus faciliè sodæ, modò temperemus maturè acrimoniam humorum effervescen-  
tium, aut destruamus acidum vitiosum, subjungendo, si opus fuerit, vel vomitorium, ad quod tamen raro recurrimus, vel laxativum.

Conveniunt igitur v. g. lapilli cancerorum, uti et ebur ustum, bolus Armena, corallia præparata, lapilli carptionum vel percarum, crystal-  
lus præparata, lac lunæ, unicornu fossile & similia. Præceteris creta, hinc species diacretæ, & morsuli de creta Mynsichti sunt expertissimi; vel horum loco

- ℞. Creta præp. ʒii.  
nuc mosch.  
ebor. usti præp. aa. ʒj.  
unic. fossil.  
corall. r. præp.  
lapill. 69. præp. aa. ʒij.

Cum ʒiv. vel vj. Sacch. in ʒ portul. solut. f. Mor-  
suli.

Quibusdam usitatum est etiam lateres com-  
bustos intensius rubescens pulverisatos cum saccharo mistos, aut in morsulos redactos pro-  
pinare; nam & hi, quoniam participant de terra  
ali, potenter compescunt quæcunque effervescen-  
tiam: album Græcum seu stercus canis ossa vorantis à multis est probatū. Quibusdam etiam in usu est siliqua ceracea comesta. Con-  
serva fructuum cynosbati ad ʒi. dosi avellanæ cuiusdam magnitudinis insigniter convenit, sed hic observetur, quod fibrillæ istæ in inter-  
iore parte fructus, quibus adhærent semina, non sint separandæ. Syrupus & conserva ex  
Tom. II.

summitatibus quercus commendatur ab Hor-  
stio l. 4. Observat. pag. 194. Portulaca, ejusque  
succus & syrupus, aut ipsa planta recens assump-  
ta, sunt egregia; ut & succus semper vivi: ni-  
trum etiam depuratum vel antimoniatum in ʒ  
florum sambuci solutum, item cremor ʒi ad ʒi.  
datus, vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 120. p. 386.  
vel specificum illud Kergeri de Ferment. contra fe-  
bres. v. g.

- ℞. crem. ʒi ʒj.  
corall. r. præp. ʒi. l. ʒi. ad ʒij.  
M. pro dosibus duabus. S.

## Dämpffende Pulver.

His denique addatur nux moschata, quia oleo temperata est. Ex his variæ possunt fieri for-  
mulæ, c. g.

- ℞. Creta præp. ʒʒ.  
C. C. usti præp. ʒj.  
corall. r. præp. gr. xv.  
M. pro dosibus duabus, S.

## Dämpffend Pulver.

- ℞. Creta præp.  
farin. later. ʒ. ʒi.  
nuc. mosch. gr. v.  
M. f. pulvis. S.

## Dämpffend Pulver.

- ℞. arcan. dupl. ʒij.  
off. sep. pulv. ʒj.  
nuc. mosch. gr. vj.  
M. pro dos. duab. S.

## Dämpffend Pulver.

- ℞. Spec. diacreta Myns. ʒi ʒi.  
arcan. duplic.  
nuc. moschat. aa. ʒʒ. M.  
℞. Creta albissim. præp. ʒiij.  
corall. r. præp.  
ebor. usti præp.  
crystall. præp. aa. ʒij.  
nuc. mosch. ʒi.  
M. f. pulvis

D. S. ut antea.

Vel cum f. q. Sacch. f. Morsuli.

- ℞. Conf. summ. querc. ʒj.  
creta præp. ʒij.  
nuc mosch. ʒj.

c. f. q. syr. portul. f. Electuarium.

Inter evacuantia, temperatis succis & sedato  
effervescen-  
tiam motu, optimi sunt tamarindi  
in decocto aut infuso usurpati, laxant nempe &  
refrigerant egregiè, ac in biliosis hunc affe-  
ctum sedare solent: vel usutur Rhabarba-  
rum, aliavè similia: vel ubi purgatione vali-  
diore opus,

- ℞. MP. de ʒco Querc. gr. xij.  
magister. jalap. gr. iij.  
scamm. ʒat.  
extr. troch. alband. à gr. ij.

c. Elyx. propriæ. f. pilula.

(M)

SECTIO

## S E C T I O V I I I .

D E

## FECUM ALVINARUM A CHYLO SEPARATIONE ET SUCCORUM PANCREATICI ET FELLEI EFFERVESCENTIA VITIOSA.

**E** Quidem tractanda hic prius veniret tam chyli à fœcibus alvinis secretio læsa, quàm succorum pancreatici & fellei effervescencia vitiosa, sed ne actum agam, videatur de his Sylvius in lib. 1. Prax. p. 10. & 11.

Sufficiat a notasse quosvis morbos chronicos præter cruditatē acidam stomachi vel oriri vel saltem foveri à vitio horum duorum succorum, ac vitiosa deinde chyli perfectione & separatio-

ne. Adeoque & isti morbi, qui obstructionibus hepatis aut lienis, mesenterii &c. ordinariò adscribuntur, revera ex vitio digestionis primæ, & hinc alterationis chyli in duodeno tribuendi erunt; non secus ac plura mulierum circa menses vitia radicem primam circa has partes figunt: Unde si quæ obstructiones, tumores, aut similia viscerum abdominis in chronicis morbis subinde observantur, producta potissimum morboſa asserenda sunt.

## S E C T I O I X .

D E

## CONTENTORUM IN INTESTINIS EXPULSIONE LÆSA.

**E** xpulsio hæc contentorum in intestinis læditur tribus modis:

1. Quando diminuitur, ita ut aut rara sit, aut ad tempus omnino nulla: id quod fit in alvi retentione.
2. Quando augetur in alvi fluxibus variis, diarrhœa, cholera, lienteria, cæliaca.
3. Aut denique quando depravatur, ita ut cum dolore, cum torminibus, aliisve similibus stipata contingit symptomatis: item quando retinenda excernuntur, dum loco fœcum rejicitur sanguis vel alia, ut pus, uti fit in dysenteriiis, fluxibus hæmorrhoidalibus, &c.

Fit autem hoc: (1) Propter eorum paucitatem ex alimentis paucis assumptis. (2) Propter eorum ad motum peristalticum ineptitudinem; quando enim ineptè sunt in motu, fit ut stagneant in intestinis, eorumque, imprimis coli, cellulis, ut non possint protrudi: vid. Kerkringius in *spicil. suo Anatom. obs.* 39.

Inepta sunt ad motum contenta, tribus ex occasionibus:

I. Propter eorundem exsiccationem & indurationem, v. g. ob paucitatem potus, in iis qui parcè vivunt, in febribus ardentibus post nimios sudores, post graviores corporis motum, &c. Assumpta etiam quædam duriora & austera similiter fœces plus minus indurant, ut panis crustæ & spiræ, quæ ipsæ assumptæ nimiam copiam propter visciditatem & tenuitatem suam non raro solent duriores dare fœces, indeque etiam alvi periculosissimam obstructionem: vid. Moebius in *insit. pag.* 453. Sic res comperta est de mespilis, alvi adstrictionem causantibus, præprimis hoc faciunt eorum lapilli, die ferne; hinc vulgò fructus hi dicuntur *Arstlamern*; item ova ad duritiem cocta similiter insigniter solent alvum adstringere: exemplum habet Cornarius in *suis Consil. Conf.* 4. de quodam item fructus nonnulli horæi cum pellicula tenaci obducti & deglutiti, quales sunt uvæ crispæ, die *Stachelbeeren*; item uvæ vitis, si scilicet comedantur unæ cum pelliculis: sic ab esu in moderato nucum castanearum constipationem alvi obstinatam in matre lactante & infanthulo lactato observavit Timæus von *Güldenlee* l. 5. *Cas.* 15. p. 215. item cerasa, & imprimis eorum nuclei integri devorati: vid. Helmontius *Tr. sextupl. digestio.* Kerkringius *obs.* 6. Schenkii *obs.* 1. 3. *sub Tit. de excrementis.* Quies & somnus nimius multa etiam possunt, de quibus vid. Hoechstederus *Decad.* 4. *Cas.* 1. p. m. 336.

Facit

## CAPUT I.

De

*Expulsione Contentorum in intestinis diminuta.*

## ARTICULUS I.

De

*Alvi Retentione.*

## C A U S Æ.

**A** lvi retentio est, dum parum vel nihil excernitur, aut admodum tardè fit contentorum intestinalium excretio: cujus causa est vel in ipsis contentis expellendis, vel in intestinis expellentibus.

Quod attinet expellenda: hæc ipsa inferunt retentionem alvi, quando non perveniunt usque ad intestinum rectum propter deficientem motum peristalticum, ut istud excretionem irriterent; cessante enim stimulo, cessat alvi excretio.

Facit huc etiam II. Fœcum alvinarum nimia visciditas & glutinositas pertinacius parietibus intestinorum adhærens, ratione cuius subindè impedimento est, quo minus fœces possint excerni: unde ii, qui copiosè utuntur viscidis alimentis, sive qui eadem in pituitam excrementitiam, sive mucum viscosum, ex transmutata digestionem transmutant, solent esse obnoxii alvi adstrictioni: aut qui mucu viscido vel acido vel austero abundant, in specie pituitâ, quâ vocant, vitreâ, alvi solent esse obstructioris; idque magis, quod parcius bibunt, aut quod parcius moventur; feces enim à mucu & pituita simili involutæ & coagulatæ in intestinis hærent, ut hæc non sentiant stimulum fecum. Undè interdum hypochondriaci, obstructionem alvi incurunt: In talibus enim deficiente motu, minus quasi concussis intestinis, feces retentæ pedetentim tenaciorem consistentiam acquirunt, indeque alvum clausam patiuntur.

Præterea III. fœces condensatæ & coagulatæ alvi obstructionem inducunt; idque ex vitio acidi, vel stomachici, vel pancreatici in intestinis prædominantis, imprimis si simul austerus plus minus fuerit iste acor. Notum enim est, quod bilis & succus pancreaticus, uti separant cremorem nutritium ab excrementis, ita simul excrementis certam consistentiam tribuunt, secundum quam nunc magis nunc minus sunt fluxilia. Undè uti abundans alcali oleosum bilis diluit fœces & fluxiles facit, ita acidum vel stomachi vel pancreatis vitiosum, fœces istas nimis coagulat, hinc & indurat. Hinc plures hypochondriaci, & mulieres hystericae, laborant ordinariò alvo obstructa, & alvi excreta sunt fermè nigricantia propter austeritatem nimiam succi pancreatici, hinc etiam in quadam icteri specie solent aut omnino, aut maxima ex parte, induratæ & condensatæ esse feces, hinc alvus lægnis & tarda, propter bilis absentiam, & consequenter acidi in intestinis abundantiam.

Et hæc sunt causæ, propter quas alvus vitio fecum plus minus supprimitur: supersunt causæ, quando ulterius vitio ipsorum intestinorum non sufficienter propellentium supprimuntur feces.

Vitio autem horum plus minus tardior est alvus, & obstructa: (1) Quando eadem sunt angustata & inepta ad transmissionem, id quod fit, si ea obstructa, aut infarcta, v.g. in inflammatione eorum: unde indurescunt & quasi nimis coalescunt: ac ordinariò alvus supprimitur in tumoribus hærentibus intra velicam etiam & intestinum rectum, vel intervulvam & anum in mulieribus: Exemplum videb. apud Tulpium l. 3. cap. 10. Huc pertinet anus imperforatus: de quo vid. Fabricius Hildanus P. 1. obs. 3. Benivenius & Paræus & Job van Meekern cap. 22. pag. 160. Affectus autem hic parum attenditur; perforato enim ano cessat symptoma: item in gangræna, in qua pellis eorum corrugatur, unde malum est desperatum: Exemplum habet Bartholinus Centur. 6. Hist. 38. & Barbette in sua Praxi l. 4. cap. 7. pag. 198. item quando coalescunt post eorum exulcerationes, aut post dysenterias. Conf. Johannes Rhodius cent. 2. obs. 77. Marcellus Donatus c. 10. l. 4. pag. 361. & M. A. N. C. Ann. 2. pag. 140. Tom. II.

ubi alvus suppressa lethalis fuit ex ulcere intestini recti. Pariter ex crescentia carnea in intestino quodam enata alvi obstructiones inter: Conf. M. A. N. C. Ann. 6. pag. 137. & Rhodius Cent. 2. obs. 82.

Præter hanc angustationem intestina (2) non promovent fœces, quando deficiunt in suo motu peristaltico, idque ob affectionem vel paralyticam, vel convulsivam: quoad priorem quidem, dum resolutæ fibræ motui peristaltico sunt ineptæ & intestina fiunt insensibilia, etiam cessat intestinorum motus peristalticus, ut in stupore ani: hinc non raro frustra apoplecticis stimulat alvus per clysmata, intestinis interdum paralyti affectis & insensibilibus redditis: quoad posteriorem, oritur intestinorum affectio convulsiva, quando ex irritatis intestinis sequitur pertinax fibrarum contractura, vel quando undecunque ipsæ fibræ intestinorum in uno alterove loco spasmo contractæ non promovent contenta, ob impeditum peristalticum eorum motum: id quod fit v.g. in omni colica convulsiva, in colica scorbutica, & similibus intestinorum doloribus, ubi fibræ intestinorum ratione doloris irritatis, & speciatim plus minus contractis, in loco spasmo correpto, fœces hærent. Sic etiam in nephritide pariter obstinata est alvus ordinariò, propter consensum cum fibris intestinorum spasmo convulsis, unde & tormina tunc non rara sunt. Frequens est gravidis, partui vicinis, alvi adstrictio ob uterum & grandiolem foetum, qui intestinum rectum comprimit.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica, sunt hæc: si ægri raro & non quotidie, sed interdum ad aliquot dies, interdum etiam septimanas, non ejiciunt fœces: vid. observat. Panarolli Pent. 1. l. 5. ubi observat aliquem, qui interdum in 15. diebus, interdum ad 20. interdum post 3. menses demum solitus est exonerare alvum, sed rarum & infrequens hoc est.

Symptomata autem hujus obstructionis sunt varia: dolores abdominis gravativi, compressivi, nunc vagi, lancinantes, supervenit nausea, vomitus interdum, capitis symptomata, inquietudo, jectigatio corporis, vigilia, vertigo & cephalalgia.

#### PROGNOSIS.

Alvi suppressio malum est frequens, & quidem pro circumstantiarum conditione nunc plus nunc minus periculosa. Pertinacior si fuerit, subindè est lethale malum, nunc immediatè & per se, nunc mediatè, insequente nempe ileo.

Deinde si non semper infert lethum, nihilominus per experientiam quorundam patet, quod alvus pertinacius clausa subindè gravia inferat symptomata, interdum animi deliquia: item quod nonnunquam in ipsa excretionem alvi superveniant ex conatu naturæ hæmorrhagiæ narium: Exemplum tale habet Salmuth c. 3. obs. 26. Fœces in alvo nimis obstructæ in intestino colo coacervatæ & coagulatæ interdum decipiunt medicos, ut tales ægros habeant pro splenicis: Nam vulgaris est consuetudo, ut omnia symptomata in hypochondrio sinistro adscribantur falsò spleni; unde cum in latere sinistro colon sit angustius &

(M 2) pro-



propterea intorqueatur deorsum versus re-  
nem, hinc sæpius fit, ut ibidem locorum  
hærentia scybala talia inferant symptomata,  
quæ vulgò spleneticis attribuuntur, exemplū  
talis pro spleneticis habiti exhibet Salmuth  
*Cent. 1. obs. 24. & c. 2. obs. 98.* Conf. item  
Sylvius *l. 1. Prax. c. 14. §. 57. p. 168.* Pana-  
rollus *c. 1. obs. 1.* Nec est, quod decipiamur ex  
eo, quod malum non sit in colo, pro-  
pter retentas varias sordes, quia purgantia  
suum faciunt officium; nam in talibus per  
purgantia evacuantur copiose liquida & te-  
nuiora, ipsis crassioribus & viscidioribus fœ-  
cibus ac muco adhuc remanentibus, uti jam  
olim hoc observavit Sennertus *Praxi l. 3. p.*  
*202. & 285.*

Tandem omnis alvi obstructio semper so-  
let augere stomachi & capitis pathemata,  
unde, omnibus præmonentibus practicis, in  
vulneribus capitis, cephalalgia, in melan-  
cholicis, & quibuscunque capitis affectibus,  
semper opera danda est, ut sit libera alvus  
& aperta, non quidem propter vapores a-  
scendentes, sed propter consensum, quem  
mediantibus nervis copiosissimis omnia in-  
terna viscera, in specie intestina, habent  
cum suo principio, cerebro. Quælibet iti-  
dem mali hypochondriaci pathemata ab al-  
vo obstructa exacerbantur.

Obstructio alvi contumacior in hominibus  
tenerioris ætatis sæpius producit epilep-  
siam, in specie autem eam, quæ dependet  
ex vitio excrementorum: per repletionem  
enim irritantur tandem intestina, & ob con-  
sensum totum systema nervosum convellitur.

Obstructio alvi cum passione colica mor-  
bum extremè exasperat.

Prægnantium obstructio contumacior  
reddit partum valdè difficilem.

Obstructio alvi ex paralyti intestinorum  
ut plurimum est lethalis.

C U R A.

Quod attinet curam: in ea ante omnia  
consideranda est causa morbosa proxima,  
quæ removenda; sic enim symptoma imme-  
diatè solvitur; unde

1. Fecum contentarum ratione conve-  
niunt ea, quæ emolliunt; earum-  
que visciditatem & austeritatem cor-  
rigunt, adeoque fluida & mobilia  
excernenda reddunt.
2. Conveniunt ratione intestinorum, quæ  
vel eorum angustiam tollunt, vel  
eadem plus minus sensilia vellicant,  
ac blandè stimulant: vel denique  
irritationem in iis, & inde natum  
eorum spasmus tollunt.

Ea, quæ emolliunt, & fluxilia faciunt, &  
vias lubricant, sunt aquosa, oleosa, mucila-  
ginosa, dulcia, & hinc gummata; quæ ra-  
dem stimulant & leniter irritant, sunt acida,

tàm Oina quàm specifica purgantia, & horum  
instar, intense amara: fecibus enim fluxi-  
libus & intestinis leviter irritatis, eorum mo-  
tu peristaltico concitato, ejiciuntur conten-  
ta. Quæ irritationem vel spasmus intesti-  
norum sistunt, sunt anodyna seu lenientia,  
mucilaginosa & temperata, oleosa, hinc nar-  
cotica & opiata. Quæ intestinorum mala,  
vel curabilia, ut inflammationem, exulce-  
rationem; vel incurabilia, ut coactum  
&c. levant, ex affectus ratione patent. Quæ  
dictis indicationibus satisfacit materia medi-  
ca, imprimis internè sunt amygdalarum  
dulcium, recens nempe expressum ad  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  $\text{ij}$ . l.  
jv. quod optimè & blandè alvum subducit  
sive assumatur per se, sive in cerevisia calida;  
vel juscula pinguis.

Vel

$\mathfrak{R}$ . amygdal. dulc. rec. expr.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

syr. rosat. solut.  $\mathfrak{z}\text{j}$ .

M. pro Haustu.

Sic medicamenta ex jalappa, ex foliis sen-  
næ, & ex scammonio prolunt: item aloeti-  
ca, de quibus notetur, non esse adhibenda  
in frequenti alvi obstructione, uti & Rha-  
barbarum; quia talia medicamenta præter  
virtutem laxativam in se continent subse-  
quens aliquam adstrictoriam, nisi hæc cor-  
rigantur, per adjuncta antimonialia ritè pa-  
rata, & in casu externo in clysteribus usur-  
panda. Sal sarmentorum vitis saturatum  
cum spiritu Ois blandè etiam alvum subdu-  
cit irritando nervos. Item conveniunt insi-  
gniter ova sorbilia cum butyro assumpta, ea-  
que, quò magis sorbilia, eò magis seu plus  
movent alvum, emolliendo æque ac auste-  
ritatem corrigendo: de quo vid. obs. in Hoe-  
feri *Hercule medico*, p. 199. Bartholinus *C. 6.*  
*Histor. 65.* & Brassavola de *Purgantibus c. 2.*  
item copiosus potus promovendo contenta  
alvum fluidiorem reddit, vid. Bartholinus  
*Centur. 5. Histor. 40.* id quod in specie aut hy-  
pochondriacis aut laboriosis necessarium est,  
item mulieribus. Potus hic nunc est usitatus  
seu ordinarius alimentosus, nunc medicatus,  
quæ medicatio imprimis fit, quando potu-  
lenta alterantur solventibus emollientibus  
& laxantibus, in specie cum passulis, quæ  
sunt egregium remedium ad blandè laxan-  
dum alvum, & nihil aliud, quam mustum  
concentratum, temperatæ in se, & quæ  
blandam irritandi vim obtinent; unde vel  
passulæ nudæ assumptæ conveniunt, impri-  
mis hypochondriacis & scorbuticis, quibus  
alvum sustinent apertam; nam purgatio iis  
nocet: vel cum passulis, earumque pulpa, tan-  
tillum permiscetur cremoris  $\mathfrak{q}$ i aut arcani  
duplicati, c. g.

$\mathfrak{R}$ . pulp. passul.

amarind. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

crystall.  $\mathfrak{q}$ i  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

pulp. rad. jalapp.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

scamm.

*scamm. ʒi.*

*ʒii per inser. purg. ʒß.*

*c. l. q. syr. ros. solut. f. Electuarium. D.S.*

**Exierende Lattwerge/ des Morgends und Abends 2. gute Messerspißen genominen.**

Conveniunt specificè passulæ laxativæ, quarum variæ sunt descriptiones, uti videbitis in Dispensatoriis. Fiunt ex passulis cum cremore ʒi & Senna: præscribo ʒß. pro dosi, c. g.

*ʒ. fol. Senna f. st. ʒij.*

*•Crem. ʒi ʒij.*

Decoq; in ʒ lbj. ad consumptionem tertiz partis:

*ʒ. Decoctum expressum, & infund. passul. min. lbj.*

Decoque ad molliem, & adde

*Syr. rosar. solut. ʒvj.*

*M. D. S.*

**Exierende Rosinen/ 1. Löffel voll vordem Abendessen.**

**Vel**

*ʒ. fol. senn. f. st. ʒij.*

*Cinam.*

*Zingiber. aa. ʒij.*

*ʒ endiv.*

*Vini opt. generos. aa. ʒvj.*

Infunde per ʒ, manè bulliant ad consumptionem tertiz partis: colaturæ adde

*prun. enucl. Ungar. N. xx.*

Decoquantur cum

*sacchari ʒij.*

ad consistentiam syrupi: adde

*ʒ cinnam. ʒß.*

*syr. rosar. sol. ʒijß.*

*D. S.*

**Exierende Pflaumen.**

De prunis his laxativis ante cœnam assumat patiens tres vel quatuor, juxta Thonerum *obs. 2. l. 2.* vinum passulatum similiter egregium est delicatulis, quod alvum adstrictam blandè educit; item vinum passulatum laxativum Timæi in *Epistol. l. 3. Epist. 26. p. 224.* ad cujus imitationem Meibomius sequenti modo præscribit:

*ʒ. passul. min. ʒij.*

*fol. senn. f. st. ʒj.*

*cinam. ʒij.*

Incisis & contus. affundit lb. iij. vini per horas 24. decolatura propinat ante cœnam bonum haustum.

Ipse sæpè ad hujus imitationem præscribo decoctum passularum cum senna, vidi egregios effectus, c. g.

*ʒ. pass. min. contus. ʒjß.*

Conquassentur in mortuario, ut fiat pasta, coque in *Aq. comm. lb. iij.*

Colaturæ terventi lb. jß. ad lb. ij. infunde

*fol. senna f. st. ʒij.*

*flor. violar. p. iij. l. sem. anisi. ʒij.*

Stent in loco calido per noctem: manè ʒa. colatur.

*D. S.*

**Exier-Transf.**

De quo capiatur haustulus pro libitu manè,

præprimis in hypochondriacis, hystericis, affectibus melancholicis, & blandè stimulat.

Facit huc serum lactis probè depuratum, quod in febribus, tam ardentibus & malignis, quàm hypochondriacis & scorbuticis, si alvum habent obstructam, ac simul phlogosi ac æstuatione laborant, aliisque in casibus ad alvum suaviter laxandam conducit. Ratione ʒositatis suæ, in alcali volatili ʒofo fundatæ, temperat egregiè succi pancreatici vitiosum acidum, plus minus austerum, ac demulcet acrimoniam ʒis scorbutici, simulque emollit fœces, siue solitariè usurpetur, siue, si fuerit debilius, cum syrupo rosarum solutivo adhibeatur, siue infusione & ebullitione aliquali tamarindorum magis gratum & laxativum reddatur.

Nota aliàs quoque sunt decocta vel juscula pullorum, imprimis in quibus herba emollientes, v. g. folia malvæ, HB. parietariæ, violaria, Mercurialis & similia ebullierint: qualia decocta successivè usurpata similiter blandè alvum subducunt: vid. decoctum emolliens ex radice althææ Horstii *obs. p. 273.* M. l. N. C. Ann. 3. p. 372. Barbette, & Hartmannus; loco quorum etiam recipi potest:

*ʒa. Rad. Althææ ʒj.*

*Herb. malva M. j.*

*Pass. minor. ʒvj.*

Coqu. in l. q. ʒa:

*Colatura lbj. vel lbjß. adde*

*fol. senn. f. st. ʒij. l. ʒj.*

*Cremor. ʒi ʒj.*

Stent per noctem, blandè bulliant ad dissolutionem ʒi; manè iterum coletur: collaturæ adde

*Syrupi de spina cervin. ʒj. pro libitu, q. l.*

*M. S.*

**Exierender Transf.**

Item decoctum de ficubus Massiliensibus seu quibuscunque aliis similiter alvum subducit, imprimis si decoquantur in potu ordinario seu decocto hordei simplici. Fiunt etiam conservæ laxativæ violarum & rosarum elegantes, quando loco sacchari his additur manna electa Calabrina, & flores recentes violarum & rosarum cum hac conjunguntur in conservam, quæ mista cum pulpa passularum & tantillo cremoris ʒi blandissime & suaviter alvum subducunt. Quod si duriores fœces, aut copiosus mucus, aut viscidus, aut pituita vitrea intestina incrustarit, & alvi obstructionis fuerit fomes, nil melius est gummate ammoniaco & galbano, in vehiculo appropriato dissoluto, siue solo, siue stimulo laxativo acuato: v. g.

*ʒ. Aq. Mentha ʒj.*

*g. xi + fol. ʒj.*

*syr. rosar. sol. ʒj.*

*M. pro duab. dosibus. S.*

**Exier-Translein auff 2. mahl.**

Hæc potio in duas partes divisa sit: mirabiliter dissolvit mucum & evacuat; si vero contuma-

tumacior sit alvus, acuetur hæc potio stimulantibus. Ubi ergo mucus tenax, in iis præscribo talem formulam:

℞. *Aq. menth.* ʒj. l. ʒjß.  
*Cinnam.* ʒiß.  
*g. \*ci + sol.* gr. xv. l. ʒj. usque ʒß.  
*ʒi Olati* gr. vj. viij. ʒß. ad gr. xv.  
*scamm.* ʒat. gr. ij. l. iij.  
 vel *hujus & extr. troch. alhand.* ʒ. gr. j.  
*Syr. de pomis l. rosat. solut.* ʒß. l. ʒj.  
 M. S.

#### Parier = Träncklein.

Insigniter mucum viscidum educit: in mollioribus subjectis gummi \* sufficit.

Tandem *Θina* & *Θea* remedia, ut crystalli & cremor *ʒi*, l. solum ad ʒj. in jusculo fervido, præsertim in quo *HB.* quædam emolliens prius decocta fuerit, propinatus; vel cum granis duobus scammonii ʒati vel extracti trochiscorum alhandal acuat: item horum loco etiam ipsum *Θ* essentielle tartari à ʒß. ad ʒj. usurpatum usque ad ʒij. in vehiculo calido, vel solum vel dicto modo acuat, aut etiam *R ʒi* legitime per spiritum vini parata pro senibus. Gravioribus & contumacioribus in malis ad Mercurium vivum potest fieri confugium ad ʒij. l. iij. pro una vice, vel in jusculo carnis pinguiore, vel in oleo amygdalarum dulcium propinatum: vid. *M. A. N. C. Ann. 3. obs. 225. & 315.* alii laudant vinum, in quo *g* vivus per mensem in loco tepido fuerit infusus, intercedente crebra agitatione, aut aliquamdiu ebullierit; quod vinum, relicto Mercurio, non tantum lumbricos enecat, sed insigniter alvum, etiam pertinacissimam, referare dicitur, si ad cochleare unum vel alterum propinetur. In desperatissima alvi obstructione, irritis aliis, mirabile obtinet *Θ* fulminans à gr. vj. viij. l. viij. ad x. usque, cum extracto hellebori nigri in pilulas redacto: conf. *Rolsinccius in Chym. pag. 339.* Vel

℞. *Syr. rosat. solut.* ʒß.  
*ʒi fulmin.* gr. xij.  
*troch. alhand.* gr. j.  
 M. S.

#### Eröffnender Saft auff einmahl.

Sanè in adulto quartanario à gr. v. auri fulminantis, c. nitro dato ante paroxysmum propinati, effectum suavis laxationis observavi: nitrum datum torpida irritat intestina, ut facilior fiat excretio, & respectu talis nitri adjuncti *Θ* fulminans mira præstat in hoc affectu. Quoties itaque animus est, hoc aurum fulminans loco laxativi porrigere, non nimis edulcorandum, ut sapor *Θ* sinus aliquantisper remaneat. Deinde & hoc singulare est, quod in adultis fæces nigerrimo colore inficiat, tam *Θ* fulminans, quam *Θ*ri cum spiritu *Θ*is solutio. Fortiora enim purgantia

minus conveniunt in pertinaciori alvi obstructione, ne irritando intestina, horum spasmos dolorosos & tormina excitando, malum exasperetur; undè cautissimè in talibus casibus tractentur purgantia, ne præpostero horum, præsertim acriorum, usu intestina magis contrahantur & excrementa indurentur, ac ex continuata irritatione dolorosa ægri in morbum iliacum moveantur.

Externè quæ applicantur, sunt primariò quidem, uti notum est, clysmata, eaque ex emollientibus & lubricantibus parata, v. g.

℞. *HB. albaa,*  
*Chamomill.*  
*Melil.*  
*malva* ʒ. Mß. l. Mj.  
*rad. lil. albor.* ʒjß.  
*Θ ʒj.* ad ʒij.  
 Coque in *∇ simpl.* vel *seri lactis caprill.*  
*Colatura* ʒix. adde  
*Θis gemm.* ʒj.  
*ʒo lil. alb.*  
*Mell. rosat. aa.* ʒj. l. ʒjß.

M. pro clysmate emolliente in induratis fecibus tepidè injiciendo.

D. S.

#### Erweichend Clystier.

Injecto clysmate æger aliquamdiu lateri dextro incumbat, ut feratur usque ad intestina.

Virtutem irritandi intestina torpida obtinet quoque mel inter clysteres assumptum, siue simplex siue compositum: v. g. mel rutaceum, rosaceum, Mercuriale, & ad imitationem mellis etiam manna Calabrina.

℞. *spec. emoll.* M. iij.  
*flor. samb.* M. j.  
 Coqu. in *l. q. lactis bubuli.*  
*Colatur.* ʒvj. adde  
*Mell. Mercurial.* ʒiij.  
*vitell. ovor.* num. iij.

Misc. pro Enemate pro duabus vicibus. S.

#### Erweichend Clystier.

Vel sola clysmata ex lacte bubulo cum melle & saccharo pro scopo laxativo injecta, sufficiunt.

Sunt etiam, qui decoquunt passulas in jure vituli, & colaturam decocti instar enematis injiciunt cum laudabili effectū. Item si ex nephritide vel simili affectu alvus obstructa sit, clysteres emollientes terebinthinati perquam sunt proficui: item clysmata ex solo oleo expresso seminis lini, item ex oleo seminis rapi, sunt admodum experta: v. g.

℞. *ʒo express. sem. lini*  
*rap. aa.* ʒjv. l. v.  
*dia. coloc. Quercetan.* ʒvj. l. ʒj. ad ʒjß.  
 M. pro clysmate. S.

#### Erweichend Clystier.

Sanè Prænotius alvi segnitiam gravem solo oleo communi benè maturo, ad lib. j. per clysterem injecto, levavit: Sic *Rulandus in Thes. Pract.*



*Pract. Cent. 4. obs. 99. p. 233.* exemplum habet alvi per tres hebdomadas obstructæ, ita ut nullis neque clysinatibus neque supposito-riis moveri posset, tandem injectis singulis horis ʒiv. olei olivarum, alvus emollita, & multa scybala rejecta fuerunt: sic idem Ru-landus c. 9. *curat. 53.* quendam rusticum, qui similiter ob scybala indurata alvum habuit obstructam, curavit per clystma ex oleo semi-nis lini ad ʒv. quod injectum nunc solum, nunc cum ʒß. trochiscorum alhandal, egre-giè alvum obstructam curavit: c. g.

*Re. S. rapar. in quo ʒi. trochisc. alband.*  
ebull. ʒviii.

adde

vitell. ovi n. j.

mell. rosac. ʒi.

Misc. pro Enemate, S.

**Erweichend Clystier.**

Ubi autem emollientia hæc pro solvenda al-vo non suffecerint, his præmissis, ad alia quæ-dam paulo acriora accedendum erit, & quan-do jam metus est induratarum fœcum, egre-grium est ʒ gemmæ, quod à ʒß. ad ʒi. usque ad ʒiß. vel ʒij. clysteribus additum, quascun-que fœces induratas potentissimè resolvit & fluxiles facit; Forestus l. 21. *obs. 5.* hoc optimè in fœcibus induratis à ʒi. ad ʒij. cum decocto emolliente simplici usurpavit: sic Lindanus commendat in obstinatissima alvi obstructione enema solummodo ex jusculo carnis cum melle paratum, cui addatur ʒæ à ʒß. usque ad ʒij.

*Re. HB. Chamom. c. flor. M. iij.*

flor. samb.

verbasf. aa. M. j.

Coqu. in f. q.  $\nabla$  a simpl.

Colatura ʒix. adde

ʒ gemm. ʒi.

mell. ros. ʒi.

M. pro Enemate, S.

**Erweichend Clystier.**

Ubi flatus simul adsunt, clysteribus addi potest

ʒ destill. cumini.

carvi à ʒß.

Quod si sal gemmæ non sufficiat, commo-dissimè in clysteribus incoquitur, vel pulpa Colocynthid. in nodulo ligat. Vel etiam tro-chisci alhandal. v. g.

*Re. Spec. emoll.*

carmin. aa. M. j.

pulp. coloc. in pet. lig. ʒij.

Coque in  $\nabla$  simplic.

Colatura ʒix. adde

ʒ gemm. ʒi.

el. benedict. lax. ʒß.

M. f. Enema.

*Re. HB. ʒial.*

parietar. aa. M. j.

pulp. coloc. in pet. lig. ʒi.

Coque in f. q.  $\nabla$ ,

Colatura ʒix. adde

Mell. ʒial. ʒi.

M. pro Enemate.

Sed observetur: quod in his, ubi acria sti-mulantia, ut sal genimæ, colocynthis &c. ingrediuntur, oleosa & mucilaginosola omit-tenda sint: olea enim obrundunt ʒinam acri-moniam, & sic non possunt incidere & sti-mulare; vel ubi colocynthis non est suffi-ciens, ad ʒalia est confugiendum, si scilicet loco colocynthidos ʒi. croci metallorum decocto superius dicto emollienti incoqua-tur: nam hoc extremum est remedium, cujus usum crebriorem factum videbitis in *obs.* Ri-verii; vel quod magis approbem, infusum fiat croci metallorum, cujus ʒiij. aut jv. decocto emollienti jam facto admiscetur, & sic con-junctim injiciuntur, additis simul reliquis convenientibus. Formula sit hæc:

*Re. Decoct. emoll. usit. ʒv.*

Infusi croc. metallor. ʒiij.

elect. benedict. laxat. ʒi. ad ʒiß.

M. f. l. a. Clyster. feliciter stimulans, S.

**Abführend Clystier.**

Loco infusi talis ex tempore potest syrupi eme-tici ʒi. ad ʒiß. addi; feliciter enim stimulat.

Vel: *Re. Spec. emoll. usit. M. ij.*

croci metall. in pet. lig. ʒi. ad ʒiß.

Coque in f. q.  $\nabla$  a ad ʒx.

Colatura adde

ʒ gemm. ʒi.

elect. benedict. lax. l. lenitiv. ʒi.

Misc. pro Enemate.

*Re. Decoct. scor. reg. ʒiij. ʒix. ad lb. j.*

ʒ liis sarment. vitis ʒi.

elect. benedict. lax. ʒi.

mell. rutac. ʒß.

Misc. pro Enemate.

Cæterum in clysinatum usu speciatim obser-vandus est intestinorum status: ubi enim inte-stinorum motus deficit, & hæcce minus sensi-lia stimulum indigent, acria saltem stimulan-tia usurpanda sunt modò dicta: Ubi verò irri-tatis intestinis, indeque dolorosis eorum spa-smus, aut ubi aliàs suspicio est, intestina quocun-que loco affecta aut irritata ibidem contrahi arctius, & spasmo affici, ibi stimulantibus & a-crioribus malum exasperatur: emollientibus & lenientibus saltem tunc insitatur, etiam eadem subinde per os propinando.

Applicatis clysinatis, si ulterior necessarius sit stimulus, imprimis applicentur suppositoria, eaq; multiplicia communiter parantur ex ʒe & melle, & cum pulvere radice hellebori ni-gri; Sylvius de alvo obstructa, cap. 11. §. 38. seqq. subministrat, & omnibus præfert suppositoria ex alumine, idque ad imitationem Angeli Salæ, in *Appendice pag. 840.* sive fiant ex aluminis rupei frustulo, in formam suppositorii conciso, & oleo amygdalarum dulcium, vel liliorum alborum illito; vel si alumen pulverisatum uniatur cum tragacantha in aqua liliorum alborum soluto. Lidanus ex decocto melle atque ʒe marino gem-meove paratâ commendat, ita quidem, ut in talibus suppositoriis, pro adultis quidem, possit sumi ʒi. ad ʒi. una cum granis tribus vel jv. tro-chutco-

chiscorum alhandal, & ita fieri suppositorium acre. In parvulis verò loco trochiscorum alhandal possunt sumi species hieræ picræ Galeni, eæque cum pauca quantitate salis gemmæ permisceri cum melle in suppositorium latisacre.

Vel

℞. *supposit. acut.* N. ij.  
illinantur oleo *diacoloc.*

Stuel. Zäpfflein.

℞. *Pulv. jalapp.* ℥j.

*Sis gemm.* ℥ss.

c. f. q. Mellis ad debitam consistentiam cocti  
f. *suppositorium.* S.

Stuel. Zäpfflein.

Cæterum observetur, quod, ut eò melius operentur suppositoria & clysmata, iis præmittenda sint medicamenta emollientia sive lubricantia & incidentia per os, ne frustra iis irritetur alvus, & sequatur, quod sæpè fit, inflammatio intestini recti. Sub horum usu fit infessus seu Balneum ex emollientibus confectum; sub egressu verò è balneo usurpentur etiam Unguenta externè abdomini illinenda, vel àcculi simpliciter lenientes & emollientes, plus minus Anodynæ in lacte cocti, ubi nempe spasmus &c. vel in fœcibus durioribus vel intestinorum spasmus; vid. Borellus 2. 1. *observat.* 12. seq.

Econtrà applicantur interdum unguenta acriora stimulantia ad concitandam vim intestinorum motricem labentem, sive promovendum intestinorum motum peristalticum, cum felle tauri, sale gemmæ &c. acuata. Commendatur zibethum umbilico inunctum (obiter moneo, in colica hoc inunctum esse secretum) præterea emplastrum ex felle tauri & colocynthide umbilico applicatum est egregium: exemplum habet Schenckius l. 3. *observationum de excrementis.* Item ꝑ colocynthidos perverficam destillatum nobile & singulare quid est: maceratur prius in aqua communi, & destillatur; sic prodit ꝑ paucum, cujus una alterave gutta umbilico illita, alvum satis stimulat: quod etiam faciunt extracta purgantium non nimis inspissata. In officinis prostat Unguentum de Arthanita, quod malaxatum c. f. q. ꝑ ei dia-colocynthidos Quercetani, & abdomini toti illitum, alvum optimè referat: D. Moebius ad hoc, tanquam ad sacram anchoram consuetam, confugit, applicando supra umbilicum, quod etiam commendat Claudinus de ingressu ad infirmos, l. 10. c. 2.

Vel: ℞. ꝑ *amygd. dulc. rec.*

*pingv. anserin.*

*butyr. Majal.*

*Ungu. dialthæa* aa. ℥ij.

*Salis gemma* ℥ss.

*spec. hiera simpl.* ℥ss.

*Colocynthid.* ℥j.

*diagryd.* gr. v.

M. f. *unguentum.*

Illinatur abdomini ad movendum alvum. Solenander *Conf.* 29. *Secl.* 3. p. m. 306.

Vel

℞. *Unguent. de Arthanit.*

*Martias.* aa. ℥jss.

*pingv. anserin.* ℥j.

& ℥ss.

*diagryd.* ℥j. ad ℥ss.

c. f. q. ꝑ *arillor. ebuls.* f. *linimentum.*

Vel

℞. *Elater.* ℥ij.

*scamm.* ℥jss.

*Extract. troch. alband.* ℥j.

c. f. q. ꝑ *diacolocynth.* redige in *Linimentum.*

Quâ ratione nonnulli etiam in alvi obstructione commendant, ut plantis pedum applicetur linimentum, factum ex oleo populeo, cum hiera picra. Sic

℞. *resam juglandis,* imple cum *pinguedine anserina,* applica umbilico, simulque abdomen illine eâ. Item.

℞. *Pomum assatum:* subige cum *pinguedine anserina,* & abdomini illine.

Item pulpa pomorum Borsdorffianorum cum paucis croco subacta & abdomini totâ instrata convenit quoque. Sunt qui dicunt, quod in desperata alvi obstructione nil melius sit, quam si digitus intinctus oleo seminis rapi vel lini immittatur ano; hinc enim potentissimè solvi asserunt.

Alietiam sunt modi, quibus juvantur alvo adstricta laborantes, inter quos observatu dignum est exemplum, quod recenset Meibomius *Tract. de usu flagrorum in re quæ p. 7.* de quodam Principe, qui non potuit alvum deponere, nisi prius à servo flagellatus. Præterea tussis & sternutatio similiter adjuvant nonnihil excretionem alvi: sic Platerus in *obs. p. 210.* habet exempla quorundam, qui ob duritiem excrementa ægrè potuerant per podicem excernere: his crebriorem tussim imperabat, ut beneficio istius tussis, diaphragmate moto, infra excrementa eliciantur. Fit nonnunquam, ut aut à podice nonnihil læso, aut excrementis crassioribus aut induratis, hæc hæreant, ut non nisi insigni dolore possint excerni, uti etiam fit in hæmorrhoidibus, ut animi sæpè deliquium patiantur ægri. In tali casu idem imitandus venit Platerus, qui fomentat cum oleo, & simul imperat sternutationem & tussim, & sic feliciter alvi suppressionem tollit, & feces retentas ejicit: Vid l. 6. p. 346.

## ARTICULUS II.

De

### Passione Iliaca.

Iliaca passio tanquam consequens contumacioris alvi, est motus peristalticus intestinorum inversus, ubi cum dolore circa umbilicum intensissimo excrementa alvina motu retrogrado per os ejiciuntur à contumaciori alvi obstructione.

Distinguitur ab excretionem illa per alias vias de novo apertas facta, v. g.

1. Per umbilicum apud Schenckium l. 3. *obs.* 4.

& 5. sub titulo: *stercora alieno loco excreta.*

2. Per fistulas ex intestinis perforatis *observ.* 6.

*apud eundem;* & penem cum urina *obs.* 7.

*citati auctoris;* simul apud Borellum c. 3.

*observ.* 16. & Hildanum *Cent.* 1. *obs.* 74.

3. Ulterius mulieribus quibusdam per naturalia, v. g. *obs.* 8. per ulcus vesicæ & intestini recti *obs.* 10. per partem pedis superioris *observ.* 11. Schenckius l. 3. p. 293.

Vocatur etiam convolvulus & chordapson, quod tenue intestinum tactu deprehendatur convolutum instar chordæ, cujus causa rectè dicitur motus intestinorum peristalticus inversus

sus, ita ut reverà id, quod est vomitus in stomacho, hoc sit iliacus morbus in intestinis.

PARS AFFECTA.

Subjectum seu pars affecta sunt intestina, nunc tenuia nunc crassa, veteres quidem crediderunt tenuia hic saltem affici: attamen contrarium testatur experientia, dum coli reliquorumque intestinatorum diversi loci passim inflammati in cadaverum sectionibus observantur, licet sæpè ileon, & post principium coli, sit sedes partis affectæ: primariò tamen eo in loco est pars affecta, ubi motus peristaltici est inversio: nam intestinum rectum fœtui in utero prorsus occlusum, & quidem intus, passionem hanc intulisse diebus plus minus 8. observavit Johannes Postheus: vid. *Observ. Anatom. in anatomiam Realdi Columbi p. m. 52.* Facile quoque fieri potest, ut per contentum afficiatur mesenterium & aliarum vicinarum partes.

CAUSÆ.

Causa motus talis peristaltici inversi est irritatio quæcunque intestinatorum, incerto quodam eorum tractu, ita tamen, ut intestinum irritatum non possit benè deorsum versus moveri.

Causa ergò proxima intestinatorum affectorum formalis est spirituum animalium impetus, motum istum concitans: Materialis est contumax eorum obstructio, quam insequitur distensio ab urgentibus & cumulatis fecibus, quæ facta spiritus animales concitantur, & fibrosæ intestinatorum portiones irritantur ad motum inversum.

In specie causæ occasionales irritantes, excrementorum transitum per intestina plus minus impediētes, sunt variae: Hildanus *Observat. cent. 1. observ. 61.* ex scirrho & ulcere cancroso in cæco, quod ileum oppleverat, ut nil ad colon penetrare potuerit, hunc affectum observavit: Sic etiam Nicolaus Fontanus *in consiliis & responsis p. 84.* post iliacam passionem lethalem observat materiam indurata & quasi lapideam sine ullo volvulo circa intestinum cæcum pertinaciter adhærentem, illudque ita extendentem, ut extrahi non potuerit; subsequitur iliaca passio etiam hernias tam intestinales quam umbilicales. Assumpta austeria & similia pertinaciter alvum occludentia etiam huc faciunt: hinc ileon ex usu nimio mespilorum aut aliorum duriorum & austeriorum observatum fuit. Ileon pertinacem ex usu malorum cydoniorum nimio observavit Zacutus Lusitanus *lib. ult. Prax. n. 2. obs. 2.* curatum, aliis irritis, stercore vaccino recenti, toti abdomini ter illito: idem *l. c.* dolorem iliacum ex fecibus induratis ob esum copiosum avellanarum, per balneum oleagineum & omenti arietini liquefacti lbj. cura-

Tom. II.

tum. Pariter *l. 2. Medic. Princ. hister. 97. observ. 16.* ex pyrorum crudorum ingurgitatione nimia obstructis intestinis volvulum observavit. Forestus *l. 21. obs. 23.* describit ileum ab arsenico sumpto propter hujus corrosivam irritationem, per 8. amygdalarum dulcium, concitato vomitu, curatum. Observata quoque fuit inflammatio & ileos, si ægri post nimium motum, calorem & sudorem, ingurgitarunt frigida, & est interdum lethalis. Ulcera pariter intestinatorum corrodentia, impediendo motum peristalticum, huc pertinent; hinc rectè Kerkringius *specil. observ. 42.* iliacam passionem interdum ab ulceribus intestinatorum gravioribus cum inflammatione potius, quàm eorum intorta convoluzione, oriri asserit. Ulteriori itidem considerationi relinquo, quod Peyerus *de intestinatorum gland. p. 79.* affirmat, interdum lympham in plexu quodam glandularum intestinalium austeriorem & stypticam factam, pertinacem stricturam efficere posse. Panarollus *in Pentec. 1. observ. 50.* quatuor habet species ilei à diversitate causarum differentes: primam causam dicit esse herniam: secundam convulsionem intestinatorum: tertiam adstrictionem ilei ad instar sarciminis Lucanica, & quartam descensum intestini unius in cavitatem alterius.

Examinemus has causas; vulgaris est persuasio, convolvi intestina; undè Riolanus dicit; Volvulum instar digiti complicari. Verum ista convolutio intestinatorum est falsa; quamdiu enim ea mesenterio adhærent, impossibilis est talis convolutio, demonstrante hoc ipsum Helmontio *in Tr. de flatibus*, ubi acutè Riolanum refutat; unde & nata hinc appellatio volvuli, quando ileos dicitur volvulus à volutatione, est absurda. Nec quæquam offendat, quod hinc indè apud Autores, etiam Barbettum, fiat mentio intestinatorum convolorum, per anatomen in iliaceis observatorum; nam arbitror, subesse tum semper gangrænam intestinatorum, in quo corrugari invicem ac complicari solent, & ita apparenter convolvi videntur intestina; hinc Riverius *cent. 3. observ. 26.* notat passionem iliacam lethalem, in qua ileum tribus complicationibus convolutum & complicatum, & quasi compactum in unam massam circa finem illius, & tota hæc portio gangræna affecta fuit: vid. egregius discursus in Kerkringii *specil. anat. observ. 42. p. 95. & 96.* ubi iliacam passionem ex ulceribus intestinatorum & inflammatione refert.

Verum descensus intestini unius in alterum, sive superioris in cavitatem inferioris, sive ingressus inferioris in cavitatem superioris, est satis frequens, & in Praxi à Sylvio aliquoties observatus: vid. *l. 1. Prax. c. 15. §. 18. & seqq.* Causa hujusmodi ingressus sunt subinde flatibus, subinde ægri nimia ac inordinata commotio.

(N)

Et



Et sanè ingressus hic mutuus intestinorum est frequentissima veri ilei causa, cujus fiendi modum oculariter observavit Peyerus *de gland. intestin.* p. 83. Præter exempla Sylvii etiam videbitis in Schenckio l. 3. *Observat.* item apud Realdum Columbum l. 1 §. p. 487. *de re anas.* Blasium & Plempium *in fund. medic. cap. de mesenterio*, Henricum ab Heer *observ.* 24. §. 4. Denique inflammatio intestinorum, & hanc subsequens gangræna, quatenus corrugat intestina, subinde dant affectum huncce lethalem: conf. Kerkringius *in specil. anat. observat.* p. 42. item Bartholinus *in epist. c. 4. epist. 92. p. 529. & epist. 93. p. 542.* Helmontius *Tract. de flatibus* §. 31. Inflammationem à fecibus induratis dependere asserit: dubium tamen est, utrum feces producant inflammationem? an inflammatio fecum indurationem: nam veronon videtur simile, in ileo contentam materiam ita posse indurari, ut protrudi ab intestinis continuo motu peristaltico agitatæ nequeat. Ansam autem inflammationi præbent succi intestinorum præternaturaliter acidi, qui fracedine suâ sanguinem, intestinorum substantiæ influentem, inquinant, inflammationesque causantur, quo pacto forsan etiam subortum est contagium, inferens ileum, teste Alexandro Benedicto l. 19. c. 8. & Olao Borrichio *in epistolis Bartholini citatus*.

Observavit etiam Caspar Bartholinus & Posthius, uti jam dictum, ileon ob intestinorum coalitum, quare & hic coalitus obstructionem & insequentem inflammationem producere valet: vid. *M. A. N. C. ann. 9. observ. 93.* Curiosum est, quod Forellus l. 21. *obs. 19.* referat ileum periodicum, tertio quovis die recurrentem, idque ex Dodonæo, cujus *observ.* vid. in Schenckio. Alias in Jamaica insula ileum est malum endemium, in quibus intestina se mutuo intrant, authore Bartholino C. 4. *ep. p. 529.* Plures causas vid. in Bartholin. C. 4. p. 542.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: eadem per se sunt clara, quando nempe nil aut parum descendit per inferiora; hinc successivè abdomen indurescit & intumescit, superveniunt murmura varique motus in abdomine, successivè ægri nauscant, sæpèque percipiunt vomendi conatum, supervenit vomitus, primò quidem omnium ingestorum, successivè recrementorum variorum flavescentium, & tandem per os contenta intestinorum excrementa, quæ aliàs per podicem essent excernenda, vomitu rejiciuntur; modò adest habitus foetidus, interdum lipothymix; tormina itidem subinde crudelissima ægros vexant, & anxietates vix explicabiles eosdem fatigant: tandem sudor admodum frigidus syncopiticus advenit: dolor abdominis interdum est in-

tensus, ut etiam clysmata injecta interdum per os prodierint: adest interdum pulsatorius & ardens dolor in certo abdominis loco, si scilicet adest inflammatio intestinorum, adestque simul ut plurimum febris lipyria, ubi nempe frigent extrema, interiora vero uruntur; ubi feces vel prodeunt per os, vel imminent prodire: ☐ supprimitur, quod vesica in consensum trahatur: vires omnes languescunt, singultus supervenit, qui prodromus convulsionum & epilepsix, quæ huic tragœdiæ tandem finem imponit.

Imprimis autem hic notanda sunt, quæ ileum præsentem aut futurum esse, monstrant: Et quidem imminet ileum produnt: (1) Alvus pertinaciter suppressa, ita ut podex interdum intro retractus appareat, ut neque specillum neque fistula clysmatica intrudi possit, (2) Intestinorum tenuium crudelia tormina, (3) Incipiens nausea & vomitus: Quod si (4) superveniunt singultus, ferè mors est in olla.

In fiente nonnunquam sequitur aliqualis dejectio excrementorum tenuium & fluidorum; in facto verò nulla: Imminet aut jam adest in facto ileo vomitus frequens succi bilioli cum excrementitiis humoribus, quando intestina crassa, primariò colon, affecta sunt, adest simul podex interiora versus restrictus, ita ut ne fovea appareat, & tanta sit angustia podicis, ut ne specillum quidem introire possit; si podex autem liber est, tunc intestina tenuia sunt affecta, magis tamen superiora, ut jejunum, quando magis nausea & vomitus urgeat: ubi majores dolores circa regionem epigastricam cruciant ægros, ileon est affectum, si jam adest sphacelus, cessat dolor, sæpiusque adest sudor frigidus, difficilis respiratio ob consensum nervorum, tandemque supervenit lipothymia, in nonnullis etiam epilepsia, equidem & in colica interdum analogæ symptomata observantur; quanta tamen hæc inter sit differentia, videatur Sennertus l. 3. *Prax. p. 247.* ubi de ileo; item Riverius *in Prax. l. 10. c. 2.* Nam sæpius gravior colica pro iliaco morbo à timidis medicis habetur.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: rarò evadunt iliaci omnis enim ileus est periculosus & peracutus affectus, in quo plures intereunt, quàm convalescunt; unus tamen facilius curatur, quàm alter.

Qui tales sunt ex inflammatione intestinorum, ut plurimum, si non semper, moriuntur; qui ex gangræna, semper est lethalis.

Ileos, ubi etiam stercoris vomitus supervenit, ut plurimum est exitialis, & à quo pauci convalescunt. Si tamen ex hernia superveniat vomitus, non adeò desperatus est, quàm si ex aliis causis; vid. præter Sennertum *in Prax.*

Pr. l. 3. ubi de ileo pag. 248. M. A. N. C. ann. 2. obs. 25. pag. 370. ann. 6. obs. 44 & ann. 8. obs. 93. ut uterque ileos ex hernia non sine periculo sit.

Qui ex scybalis est induratis, vel ex mutuo intestinorum ingressu, curari potest.

Si ingressus fiat per adscensum, curari potest; si verò per descensum, est incurabilis, teste Sylvio.

Si ex usu legitimo opiatorum succedat, quies atque somnus & doloris remissio, salva res est; si verò non, desperata.

In ileo dolor iste acutissimus subito sine causa manifesta deficiens, gangræne intestinorum signum est.

Facit huc Aphorismus 10. Hippocratis sect. 7. Ab ileo vomitus, aut singultus, aut surditas, aut convulsio, aut desipientia, malum.

Si contingat cum stranguria, nisi febre superveniente copiosior fluxerit, juxta Hippocratem sect. 6. aphor. 44. lethalis est; cum juxta allegatum Hippocratem sect. 7. §. 3. febris convulsionem solvat: item si febris acuta cum parotidibus adsit: item si alvus citra causam manifestam fiat aperta: vid. Tulpus l. 2. obs. 4. & Rhodius c. 2. obs. 79.

Arabes quinque gradus ilei constituerunt:

1. Periculosissimus is est, quando stercus vomunt.
2. Si sudor ex toto sit foetidus.
3. Cum ~, qui respiratione emittitur, est foetidus.
4. Cum ructus est foetidus.
5. Cum per alvum crepitus foetidus exit.

Fit quandoque, uti observat Rhodius, Cent. 1. Obs. 79. ut etiam in ileo lethali tandem ante mortem alvi excretio superveniat, quæ tamen malum potius est signum, nempe deficientis facultatis animalis, seu spirituum animalium, unde non amplius tam fortiter contrahuntur intestina, sed hæc flaccida facta, toties antea irritata facile excernuntur, vel potius quasi prolabi sinunt excrementa.

### C U R A.

Quod attinet Curam, consistit hæc in eo:

1. Ut irritatio intestinorum sistatur.
2. Ut excretio contentorum naturalis quacunque ratione promoveatur.

Unde prout causa irritans varia, & prout multipliciter alvus silti potest, varianda subinde specialis cura.

Ea, quæ usurpantur, sunt tam interna quam externa. In genere, quoad multiplices istos scopos, adhuc observandum:

I. Ubi stercora dura adsunt, aut ubi saltem præsupponuntur talia, ibi nil agi potest, nisi hæc ipsa indurata clysteribus prius emolliantur: nam si diu nimis expectent ægri sine præsidio, & stercora postmodum per superiora ejciantur, rarò, vel cum magna difficul-

Tom. II.

tate, evadunt. Testantur hoc non solum curæ Foresti l. 21. obs. 22. & seqq. sed etiam rustica, quæ cum per quinque aut plures dies noctesque ex ileo omnia per superiora rejiceret, nec quicquam retinere posset, clystere emolliente injecto servata est. Excretio igitur retentorum omni studio promovenda venit.

II. In ileo morbo quæcunque purgantia fortiora, aut etiam leviter stimulantia, per os exhibita non conveniunt, nisi jam sedata sit omnis intestinorum irritatio, & hinc ortus motus eorum inversus: nam subsistente irritatione, & durante aut imminente vomitu intestinali, purgantia quæcunque, tam lenia quam fortiora, semper evadunt vomitoria, & ita malum non leviter exasperant. Conf. Sydenham Tr. de Meth. curandi Febr. p. 67. & 68. loc. Prax l. 4. Sect. 3. c. 6. avvezo vom Scharbock / so da Scherger machet / c. 8. p. 305. M. A. N. C. Ann. 2. obs. 238. Atque hæc imprimis de stimulantibus per os intelligenda sunt: quæ etiam clystematica forma injiciuntur, tutius uturpantur. Potius ergo laxantia adhibenda.

III. Observandum: licet periculum præfens vitatum sit, metuendum tamen, nisi sequatur multa excretio, & revocetur omnino motus humorum deorsum, qui sursum ferebatur, non extra periculum esse ægrum. Nam quia totus venter inferior commotus est, non prius securitas credenda erit, quam sequitur alvi profluvium, aut spontè, aut per artem provocatum. Unde mortui sunt nonnulli incuria ista, de quibus Medicus jam securus erat, ut dicit Balionius l. 2. Conf. 24. Semel ergo cessante morbo iliaco seu vomitu stercoreo, non mox à cura abstinendum: prospiciatur igitur ægro, ne in recidivam cadat, aliàs facilem.

IV. Etiam observetur, quod in hoc affectu ægri subinde summâ virium dejectione laborent, & non rarò animi deliquiis: propterea medicus semper Vin aut spiritum theiacalem camphoratum, aut Vcum Vcinnamomi, præsertim propter ventriculi labem, aut spiritum rosatum ambratum, confectionem alkermes, quo viribus consulatur, aut similia reactiva in promptu habere debet: animi deliquium oritur ex foetore, quo tales sunt affecti: Jam omnia foetida spiritibus nocentissima judicantur. De foetore hoc consulatis Panarollum Pent. 4. obs. 16. de juvene quodam volvulo tandem mortuo, qui foetidissimum odorem non tantum in omni vomitu & ructu, sed etiam tandem ex toto corpore expiravit.

V. Opiata propter irritationem & præternaturalem motum & dolorem interdum usurpanda sunt, sed cautè: sistunt quidem irritationem & motum peristalticum inversum, sed simul impediunt alvi excretionem. Propterea considerandum est, quod magis urgeat

(N 2)

nempe

nempe si (1) magis affectum inducat irritatio, præmittenda sunt opiata, & hinc subjungantur, quæ alvum stimulant, & feces educunt: sin verò ex obstructione undecunque orta natum sit malum, hæcque adeò magis urgeat, danda sunt, sed non, nisi relaxatâ seu apertâ alvo, ad irritationis & motus peristaltici inversi memoriam quasi tollendam, aut recidivam præcavendam. (2) Quando aliis omnibus irritis, aut in specie propter continuum vomitum nihil intromitti potest, perperis omnibus circumstantiis ad compescendum stomachi furorem propinentur. Non tamen expectetur, donec vires deficient penitus, sed his utcumque adhuc robustis opiata usurpanda, appropriatis tamen stomachicis junctâ; e.g. cum aqua menthæ spirituosâ, ∇ cinnamomi &c. ut aliquandiu sufflaminato motu peristaltico inverso, alia remedia melius operentur. Porro (3) in spasmo intestinorum à Seacri scorbutico, nervos meseraicos aut fibras afficiente, ut in colica scorbutica, ad remissionem illius usurpari possunt, ut remittente spasmo, alia abstergentia aut evacuantia eò melius operari possint. (4) In inflammatione intestinorum fugiantur, ne ad citam gangrænam hæc disponant, item si mors est in olla, ne prostituantur remedia aliâ salutaria: de quo opii usu in passione iliaca conf. Wedelius in *Opiol.* p. 120. item M. A. N. C. *ann.* 2. *obs.* 238. p. 340. & *ann.* 9. & 10. *obs.* 114. p. 279.

VI. In ipso morbo, à quacunque causa fuerit, ægri vitent frigida quævis, tam alimenta quam medicamenta; quin calidâ intus & extrâ usurpentur. Omnis potus frigidus fugiendus, sed calidis ventriculus demulcendus: jam convalescentes tanquàm puerperæ tractandæ, nec sese à frigido exponant, nec in victu peccent; quin in & post affectum victus tenuis ordinetur, & non nisi cochlearia aliquot jusculi gallinacei sorbeantur, ova forbilia &c. assumantur, quemadmodum & ad motis externis studiosè se à frigore præservent ac defendant: hinc paradoxon satis videtur, quod Hippocrates *l.* 2. *Epidem. Sect.* 6. in volvulo tenui seu molli (id est flatuoso) frigidum vinum multum merum commendet: vid. Vallesius *Commentar. in hunc locum*, & Horstius *Centur. Problem. Dec.* 6. *Quæst.* 2.

Conveniunt ergò in hoc affectu quamplurima suprâ ad alvum adstrictam laudata, uti sunt, ratione quidem alvi clausæ, clysmata abstergentia & emollientia & ex vino, ☐ pueri & feminibus carminantibus parata, à Zacuto Lusitano *l.* 7. *Medic. Princ. Histor.* 97. *obs. sequ. commendata.* Simplicia emollientia, & ex his parata clysmata, item oleum lini, raparum, sesaminum, &c. clysmatis instar usurpanda, satis sunt cognita: quo etiam pertinet clyσμα emolliens Wedelii in M. A. N.

*C. ann.* 2. *obs.* 238. Quod si hæc emollientia non satisfaciant, & opus sit stimulo, ipsis incoquitur colocynthis, item sola dicta applicantur, quibus incocti sunt trochisci alhandal, vel oleum diacolocynthidos mixtum: vid. Rulandus in *thes. Pract.* p. 232. ubi habet observationem de ileo periculoso, curato per clysterem ex olei seminis lini ꝑvj. cum trochiscor. alhandal ꝑijß. parum bullitis: hoc benè inunxit umbilicum, reliquum injecit: excretis copiosis, hoc solo curavit: Quo pertinet clyster Hartmanni ex jure pisorum, extracto esulæ, oleo lini, in quo trochisci alhandal ebullierint. Vel

℞. HB. *malva*,  
parietar. aa. M. j.

flor. *meliss.*

*sambuc.* aa. M. ß.

Coque in l. q. ∇ *simpl.*

Colatur. ꝑviij. adde

℞ & ꝑj.

Syr. *emet.* Ang. *Sala* ꝑj.

M. f. Enema in fœcibus induratis viscidis.

Facit huc Poterius *Obs. & Curat. l.* 2. c. 83. de iliaca passione, per oleum supra & infra infusum curata. Riverius commendat pro clysmate decoctum intestinorum & omenti vervecis, in quo butyrum & parum ℞ dissoluta sint; sed in induratis fœcibus: item Lindanus laudat clyσμα ex decocto hordei, vel alio, addito nitro ad ꝑij. idque in specie, si malum adsit, aut metuendum ex inflammatione intestinorum: vel ad imitationem Zacuti *l.* 2. *Med. Princ. Obs.* 97. ex Scribonio Largo fiat clyσμα ex oleo cum ruta & nitro decoctum, quo iliacum morbum cum vomitu stercorum curavit. Quod si verò vel motus peristalticus inverti incipiat in intestinis crassis, aut ab ipso podice, qui tunc est retractus, injecta talia stimulantia rarò, imò nunquam, scopo satisfaciunt, sed potius irritant: valent tantum in intestinis tenuibus, in crassis verò affectis per superiora curamus: vid. M. A. N. C. *ann.* 3. *obs.* 209. Propterea omnes benè observentur circumstantiæ, & usurpentur, quæ nullo modo stimulant, sed simpliciter emolliunt & relaxant. Emollientia & relaxantia sunt juscula, acrimoniam plus minus temperantia, & blandè abstergentia, ut juscula gallinacea, vel sola, vel cum chamomilla aut plantis emollientibus decocta: v. g.

℞. HB. *malva c. fl.*

flor. *chamom.* Rom. aa. M. j.

rad. *alib.*

*liquirit.* aa. ꝑß.

Coque in jusculo gallinaceo:

Colaturæ ℔j. l. ℔ijß adde

liqu. ☐ a fol. ꝑi ꝑvj.

℞ amygd. dulc. ꝑvj.

M. f. potio S.

Erweichender Trank.

De qua



De qua infecibus induratis ad  $\mathfrak{z}$ iv. pro dosi probè agitando haurienda.

Subindè etiam pingua, intestinali lubricantia, in usu sunt, qualia sunt  $\mathfrak{o}$  commune aut amygdalarum dulcium, sed recens, ad  $\mathfrak{z}$ ij. in iusculo calido assumendum; item vinum malvaticum  $\mathfrak{o}$ um  $\mathfrak{z}$ ß. spermat. ceti. Vel

$\mathfrak{R}$ .  $\mathfrak{O}$  amygdal. dulc.  
Vini malvat. aa.  $\mathfrak{z}$ ij.  
Theriac.  $\mathfrak{z}$ j.

M. pro Potione, S.

**Erweichender Tranc.**

Vel  $\mathfrak{R}$ . Decoct. pass. min. c. tamarind.  $\mathfrak{lb}$ ß.

$\mathfrak{O}$  amygd. dulc.  $\mathfrak{z}$ j. l. ij.

syr. de pom.  $\mathfrak{z}$ ß. M.

$\mathfrak{R}$ . Crem.  $\mathfrak{z}$ i  $\mathfrak{z}$ j.

scamm. prepar. Brendel. gr. jx.

extr. trochisc. alband. gr. ij.

$\mathfrak{O}$  destill. anisi gutt. vj.

M. f. pulvis:

Div. in 2. partes æquales, S.

**Eröffnende Pulver.**

Rapatum decoctum, tam crudarum quam prius assatarum, copiosius haustum est laudatum; vel decoctum florum chamomillæ adjecto butyro non. Oito tepidè haustum: nec minus succus pomorum Borsdorffensium putridorum mirabilis est in tali iliaceorum casu: Conf. M. A. N. C. ann. 6. observ. 114. p. 153. Et sanè observavi in quodam iliaco, quod post injectum clystma ex  $\mathfrak{O}$  rapar.  $\mathfrak{z}$ iv. lini  $\mathfrak{z}$ ij. diacolocynthidos Quercetani  $\mathfrak{z}$ vj. invicem miscendo; idque sæpius repetitum, cum simul bina poma Borsdorffiana rasa comedisset, copiosi secessus scetidi cum flatibus indè fuerint subsecuti.

Quod si hæc, & quæ supra de alvo obstructa fuerunt commendata, non sufficiant, in pertinaci alvi clausura conveniunt bina remedia, quæ instar omnium sunt: nempe globuli plumbei sclopetorum &  $\mathfrak{z}$  vivus. Conveniunt globuli, si scæcum induratarum retentio, sive conglutinatio intestinorum aliqualis adsit, sive ingressus intestini inferioris in superius ileum excitaverit; quo in casu inferius detruditur in suum locum; sed præmissis imprimis usu olei amygdalarum dulcium recens expressi, iusculi pinguioris, similisvè fluidi, ut horum medio quasi lubricentur viæ. Globulos hos primùm credo introduxisse Helmontium Tr. de Flat. §. 31. Ubi verò inflammatio, vel gangræna, vel hernia, vel ingressus intestini superioris in inferius, excitaverint affectum, nihil profunt, quia potiùs exasperant malum; vid. Henricus ab Heer observ. 2. & M. A. N. C. ann. 3. observ. 96. p. 155. pluresque alii autores, Velschius Hecatoft. 2. p. 19. observ. 33. cum sarturno  $\mathfrak{z}$ ium in amalgama redigere, hincque globulos parare docet. Rarum est, quod ileus ex omphalocæle per dictos globulos curatus fuerit, autore Velschio l. 6. Sic Zacutus

Lusitanus l. 2. Præceos admiranda observ. 27. observat, quod pila plumbeæ primò 12. post 18. parvæ tamen, (Germanicè Schrott) curarint ileum desperatum ex nimia castanearum crudarum ingurgitatione ac scæcibus indè induratis natum; Verùm hi globuli non semper adeò sunt tuti, quia interdum diutiùs in corpore morantur: tale exemplum de tali globulo observatum, qui 11. die tandem redditus fuerit per alvum: taceo, quod non semper sufficiant: vid. Fontanus in consil. p. 85.

Globulis ergò plumbeis præferendus  $\mathfrak{z}$  vivus: sed probè sit depuratus & copiosè ingestus, in dictis casibus, ubi utiles sunt globuli plumbei. Communiter ad  $\mathfrak{z}$ j. præcipitur, ut capiatur in oleo lini, vel  $\mathfrak{O}$  amygdalarum dulcium aut cum  $\mathfrak{O}$  communi & saccharo, movendo non nihil ægrum desuper; quod quidem non contemno, sed puto tamen,  $\mathfrak{z}$ ium ad aliquot uncias assumendum esse, ad minimum  $\mathfrak{z}$ ij. l. jv. interdum etiam à  $\mathfrak{lb}$ ß. ad  $\mathfrak{lb}$ j. ut eò melius penetrare possit, applicando simul externè fomenta blandè emollientia, & postmodum simul ac per alvum ejectus est, (nam si minor est dosi, tardè & difficulter redditur) propinetur ægro  $\mathfrak{O}$ i amygdalarum dulcium  $\mathfrak{z}$ ß. cum olei destillati anisi  $\mathfrak{z}$ ß. ut lubricentur denuò & emundentur intestina: commodum etiam est, ut præmittatur aliquamdiu  $\mathfrak{O}$  amygdalarum dulcium recens ab  $\mathfrak{z}$ ß. ad  $\mathfrak{z}$ j. vel  $\mathfrak{z}$ ij. vel sperma ceti in vehiculo calido, ut eò melius lubricentur viæ. Aliquando Erbenius, Archiater Polonus, propinavit ad  $\mathfrak{lb}$ . ij. Mercurii vivi præsentē febri in pertinaci obstructione alvi, & variis antea adhibitis catharticiis & fortissimis enematis referari non potuit: Ut ergò promptiùs operetur assumptus  $\mathfrak{z}$ , ægrum post deambulationes primùm, mox saltationes, curru demum impositum hinc inde cum violentia & impetu, über Pflaster und gebaute Aecker / trahi iussit, qui postmodum domum reversus in somnum incidit, manè verò reperit stercora cum Mercurio vivo in lecto, utut per 3. dies noctesque illum detinuerit. Vel immittatur æger in B. Væ tepidæ vel decocti emollientis tepidi, postquam Mercurium ita assumpsit, ut interius Mercurii usus promoveatur per externum istum fomentum. Conf. Henricus ab Heer observ. 2. Zacutus Lusitanus loco allegato observ. 35. & Parræus l. 16. c. 58. Quia verò globuli &  $\mathfrak{z}$  frigore suo aliquantum intestina lædunt, post horum usum Zacutus loco allegato clysterem ex vino generoso; Henricus ab Heer l. 4. ex vino Cretico injicere jubet, quod aliis emollientibus & anodynis enematis præstare licebit; imò quia interdum Mercurius aliquoties & in majore quantitate exhibitus retinetur, hinc dolorem colli, & intumescenciam gingivarum movet, & exin salivatio imminet, his etiam partibus succurrendum per mel rosarum, syrupum

rupum violarum, &c. & illi exitus per clysteres omni studio promovendus, & reliquæ ipsius per interna Oaria, v. g. bezoarticum Oare, & diaphoreticum, aliaque diaphoretica, consumantur, qui vult videre plura de Mercurio in iliaca passione, videat Riverii *Prax. p. 456.* item Rhodijum *in cent. 2. observ. 80. & in observat.* Henrici à Moench, *cul-tro anat. Lyseri annexu, p. 244.*

Præter hæc dicta ratione irritationis plus minus intensæ, internè etiam præter anodyna & opiata supra laudata juscula pingua emollientia, quæ acrimoniam temperant, & indurata emolliunt, usurpari solent; quorum historiam videbitis in Riverio. Imprimis jusculum decoctionis malvæ, aut decoctum florum meliloti & chamomillæ, item juscula decoctionis raparum, quæ & leniunt, & simul blandè abstergunt; item decoctum hordei cum melle & Oo assumendum. Sydenham *c. l.* ubi de eorum symptomatis, in principio morbi pro sistenda irritatione & compescendo vomitu laudat ʒj. Ois absinthii cum succo limonium assumpti, superingestâ subinde ʒ menthæ; ac sanè remedium hoc non est contemnendum.

ʒ. Aq. menthæ ʒij.  
cinnam.  
zedoar. c. v. aa. ʒij.  
Ois absinth. ʒß.  
laud. opiat. gr. ij. l. iij.  
syrupi de spinacervina ʒvj.

Misc. pro Potione, S.

**Rindernd Magen = Träncklein.**

ʒ. Aq. faniculi,  
menthæ aa. ʒj.  
theriacal. camphor. ʒij.  
Elesacch. cinnam. gr. xij.  
laud. opiat. ferm. gr. ij.  
syr. fanicul. ʒß. M.

Item — terebinthinæ à Petrazo ceu egregius commendatur ad sistendam irritationem. Commendatur etiam theriaca in haustu vini calidi generosi ad ʒj. assumpta, quando scilicet malum non est ab inflammatione, multum præstat; item syrupus papaveris & similia.

Vel. ʒ. succin. prapar.  
ʒij diaphor.  
cinn. ʒij aa. ʒß.  
laud. opiat. gr. ij.  
camphor. gr. j.

M. f. pulvis, S.

**Rindernd Pulver.**

Si ab inflammatione malum fuerit, post abstinentiam alimentorum à Riverio adeò commendatam, cæteris paribus venæ sectio proficua erit, tam in brachio quàm crure, repetita, cum clysteribus emollientibus, anodynis ex lacte cum paucis saccharo, mucilagine seminis psyllii, & nitro.

Si ab hernia, tractetur saltem hernia, inte-

stina reponendo, ut suo loco videbimus: imò in casibus desperatis cum sectione quoque, vid. Duretus *in Hollerii Prax. cap. de hernia.* Paræus *l. 7. c. 15.* & Barbette *Anat. Pract. l. 4. c. 2.* testaturque Riverius *in praxi*, quosdam pedibus suspensos liberatos fuisse. Aliàs clysteres aciores non negligendi sunt, dum Rolfinccius *l. 7. Consil. 5.* repetitis clysteribus antimoniatæ sceminæ iliacam ab hernia restitutam fuisse refert.

Sin ab ulcere, res desperata satis est, & solis emollientibus atque laxantibus operandum.

Si à gangræna, est incurabilis.

Hiscæ internis, ad ilei curam usitatis, etiam simul externa, partim alvi excretionem promoventia, partim emollientia & suaviter lenientia usurpantur.

Oleum igitur destillatum chamomillæ cæruleum cum pinguedine taxi, anseris, anatis, &c. permixtum, universo abdomini crebrius illinendum: vel Galbanetum Paracelsi, cum unguento de artanita & dialthæa mixtum, & oleum chamomillæ vulgaris, vel anethinum, & dia-colocynthidis Quercetani, crebrius illinatur abdomini, lintea probè calefacta desuper applicando: e. g.

ʒ. Ung. dialth.  
de artan. aa. ʒjß.  
pingu. taxi,  
Oo dia-colocynth. aa. ʒj.

M. f. linimentum.

Item Zacutus Lusitanus *l. ult. praxeos n. 2. obs. 2.* curat ileon pertinacem ex esu malorum cotoneorum induratis scæcibus contractum, aliis omnibus irritis per stercus vaccinum recens crebrius repetitum toti abdomini instratum.

Si dolor urgeat, quod est frequens symptoma, convenit omentum agni castrati recentissimè & calidè abdomini impositum; mirè enim solet lenire dolorem & mitigare symptomata. Quidam etiam sanguinem vesperilionis, tanquam specificum, hypochondriis illinunt, uti etiam, si exuvie serpentum cum oleo rosaceo decoctæ ventri toti applicantur: vel sit etiam infessio in B. decoctionis plantarum emollientium, ut beneficio infessionis in balneo relaxatio fiat, & compescatur dolor: e. g.

ʒ. HB. chamomill. c. fl. M. jv.  
malva,  
melilot. c. flor.  
parietar. aa. M. iij.  
bacc. juniperi lbß.

Incisa & cont. misceantur pro Balneo.

Applicantur etiam cataplasmata ex pomis Borsdorffianis putridis cum tantillo croci, vel ex stercore ovillo cum lacte cocto.

Veteres, & jam quoque moderni, in casu, quo intestina à copioso stercore fuerunt repleta, una cum præsentia flatuum applicarunt follem,

follem, & flatus copiosos in intestina injece-  
runt, cum in finem, ut flatus intestina nimis  
distendentes scybala iisdem impacta à parieti-  
bus abscedere facerent, & postmodum sepa-  
rata stercora facilius per clysmata, vel aliis  
modis, possint elici. Videre potestis hinc ap-  
plicandi modum in Hippocrate l. 3. *de morb.*  
*Text.* 15. §. 24. Amato Lusitano c. 1. *Curat.* 100.  
item in Riverii *Praxip.* 456. ut etiam in Ephi-  
phanio Ferdinando *Histor.* 74 Zacuto Lusita-  
no in l. 2. *Prax. admirande obs.* 28.

Denique, cum omnia alia videntur frustra-  
nea, deliberandum est, an audiendum sit  
consilium Barbette, quod habet in *sua anatome*  
*ad Praxin applicata* 148. qui dicit: aliis nil ju-  
vantibus apertionem abdominis esse institu-  
endam, & manuali operâ intestinorum situm  
corrigendum.

## CAPUT II.

De

### *Expulsione contentorum* *aucta.*

Quando nempe aut citius aut crebrius,  
aut frequentius, aut copiosius, ejiciun-  
tur copiosa excrementa & contenta. In ge-  
nere vocatur alvi fluxus, qui pro excretorum  
varietate vario modo nocet, & varia sortitur  
nomina, dum distinguitur in diarrhœam,  
lienteriam, dysenteriam.

## ARTICULUS I.

De

### *Diarrhœa.*

Communissimus alvi fluxus est, qui voca-  
tur Diarrhœa, quæ est humorum vario-  
rum plus minus naturalium aut corruptorum  
diversimodè constitutorum per alvum co-  
piosus effluxus, ut plurimum ortum habens  
ex massa sanguinea, per fermentationem ex-  
crementa segregante, & in intestina aman-  
dante: hinc enim pro varietate excremen-  
torum, quæ solent effluere, variant Diarrhœæ,  
quæ sunt nunc conjunctæ cum torminibus,  
nunc cum flatuum proventu, interdum sine  
iis, interdum in intestino recto pulsatione,  
nunc pituitosæ, nunc serosæ, nunc biliosæ,  
nunc viridescentes, nunc cruentæ, sine tor-  
minibus tamen, nunc purulentæ, quando  
nempe pus per inferiora rejicitur, & qui sunt  
alii modi. Observata quoque fuit Diarrhœa  
pinguis & oleosa instar butyri: vid. M. A. N. C.  
*ann.* 2. *obs.* 20 p. 35. Interdum Diarrhœa lapidosa,  
vel copiosi lapides per alvum excreti, ut refert  
Schenkianus in *obs.* 1. Etiam observata fuit ver-  
minosa ex fructibus horæis corruptis: vid.  
Horstius l. 4. *obs.* 16. sed mittimus has diar-  
rhœas mirandas. Purulenta diarrhœa spe-  
ciatim oritur ex prægressa ruptura cujusdam

aut abscessus aut ulceris mesenterii, pleuriti-  
corum, &c. sic enim Paræus in suis operibus  
ex ulcere artuum pus per alvum rejectum re-  
fert: sic habentur exempla diarrhœæ sanio-  
sæ ex rupto jecoris abscessu, vid. Benedictus Syl-  
vaticus C. 3. *Cons.* 15.

Præ cæteris observandæ sunt differentiæ  
Diarrhœarum ratione causarum fiendique  
modorum: dum nempe Diarrhœa est vel ar-  
tificialis, qualis est purgatio seu catharsis, per  
medicamenta instituta ratione veneni alcali-  
ni; vel est naturalis citra artem medicam, sed  
ipso naturæ motu instituta: & hæc est vel  
spontanea, vel non-spontanea, quæ sit naturâ  
coactâ. Illa, quæ facile in corpore cætera  
sano excitatur, & nullum morbum præceda-  
neum habet, quâ excernuntur ea, quæ de-  
bent, vel ob causam & errorem externum, ut  
v. g. fructibus horæis assumptis, esu cucume-  
rum: talia enim inferunt Diarrhœam, quate-  
nus in stomacho fermentantur, & sic successi-  
vè pessundant fermentum stomachi, & mas-  
sam sanguineam fermentando, orâsmum bi-  
lis excitant. Huc etiam pertinet refrigeratio  
corporis nocturna. Vel ob internam ma-  
terix morbosæ metastasin, quando propter  
aliquam evacuationem suppressam fit Diar-  
rhœa, qualis v. g. pleuritidem in senes septua-  
genario solvit; de quo vid. Panarollus *Pentec.*  
1. *observ.* 36. aut quando pleuritidi suppuratæ  
supervenit Diarrhœa purulenta; hæcque diar-  
rhœæ cum euphoria relinquuntur, quia fiunt  
ad salutem ægri: faciunt huc diarrhœæ, quæ  
dicuntur oriri ab hepate, cerebro, liene, &c.  
v. g. Zacutus Lusitanus l. 2. *Præcos admir. obs.*  
22. refert fluxum diuturnum cerebralem, caute-  
rio ad bregma indito curatum: Idem l. 2.  
*Med. Princ. Histor.* 76. refert alvi fluxum ex  
debilitate brachii unius subortum, eo corro-  
borato sanatum: sic refert Rhodius l. 2. *obs.*  
84. insignem Diarrhœam ex  $\square$ æ suppressio-  
ne natam, dum fuit rejecta per pancreas  $\square$ .  
sic lochia suppressa interdum excitant diar-  
rhœam, puerperis non insalubrem, ob mate-  
rix metastasin: similis Diarrhœa videtur esse  
ista, quam refert Meera, contra Willisium in  
*Historiis Medicis varior.* p. 131. de diarrhœa  
serosa, ut ipse inquit, oriunda ex capite, quæ  
remotè ex massa sanguinea orta videtur, ut-  
pote quæ, quoties suppressa fuit, toties co-  
piosi pediculi generati sunt, ipsâ verò fluen-  
te, ipsi pediculi evanescebant: Sic Schenkianus  
l. 3. *obs.* diarrhœam ex disrupto lienis ab-  
scessu notat; & Sylvaticus c. 3. *Consil.* 18. re-  
fert diarrhœam saniosam cum febre & jecoris  
abscessu, ex bubone sub axilla.

Omnes hæ diarrhœæ saltem spontaneo na-  
turæ motu, per metastasin nempe materix, &  
variâ ex uno loco ad alterum translationem  
seu motum, originem duxerunt. Vel deni-  
que spontanea diarrhœa excitatur ob sponta-  
neum



neum humorum motum, ubi ex quacunque causa vitium bilis, ejusque  $\Theta$  volatile oleum, ordinariò subelle aut simul jungi solet, quatenus regurgitat in stomachum, ejusque acidum destruit; unde anxietates, sitis, & tandem diarrhœa supervenit. Tales sunt diarrhœæ, quæ ex mutata diætâ in peregrinationibus, item quæ tempore verno aut autumnali quibusdam suâ sponte superveniunt.

Non spontanea est vel morbus vel morbi. Diarrhœa quæ est morbus, est ista, quæ subinde ægros affligit, sive externæ sive internæ occasionis ratione, item quæ alterationi corporis post fructus horæos superveniunt. Hujusmodi diarrhœa interdum est vel epidemica, quæ ut plurimum simul contagiosa; alia non epidemica. Diarrhœa contagiosa per halitum contagiosum multiplicatur, & simul est maligna, quæ interdum in acutis anxietates, symptomata graviora, & sudores frigidos sæpè habet comites. Denique diarrhœa morboſa alie est accidentalis, alia est habitualis; Accidentalisis in morbis externis ex improvifo venit; Habitualis est, quando nempe quidam diu & subinde ad longum tempus habent alvum laxiorem, vel qui levi ex causa solutionem alvi crebriam habent. Testantur observationes, talem alvum solutam quosdam ad annum unum, vel aliquot etiam, affligere. Diarrhœæ diurnæ & quasi habituales, quasi catarrhales sunt, adeoque à cerebro veteribus oriri dicuntur, vid. *Pharos Medic. p. 411*. item Zacutus Lusitanus. Videntur hic insinuari diarrhœæ serosæ, noctu magis affligentes, lymphæ præsertim pancreaticæ vitio enatæ: hinc & ex glandulis intestinorum; vid. & Deodatus *Valitud. p. 50*. semper tamen ad ventriculi digestionem læsam, ceu fundamentum mali & hic respiciendum.

Faciunt huc ex scorbuti vitio diarrhœæ singulares, quæ subinde oriuntur; vid. Sennertus *l. 3. Prax. p. 592*.

Diarrhœa morbi, seu quæ contingit in morbis, est nunc symptomatice, nunc critica. Criticæ diarrhœæ fiunt, quando in acutorum morborum statu & declinatione materia cocta, seu fœces massæ sanguineæ, fermentando separata & præcipitata, sero involuta per convenientia loca filtrata & cribrata separantur, & ita confertim per intestina amendantur. Quò & pertinent Diarrhœæ sanguinis, utut raræ, & quidem per modum criseos affligentes: quales diarrhœas aliquot observavit Rhodius *in C. 2. observ. 85*. ubi habet de diarrhœis sanguinis criticis, in febribus ægros ad salutem vindicantibus: quale exemplum nullus unquam autorum annotavit.

Symptomatice Diarrhœa in morbis est, quæ in principio aut incremento morborum & febrium malignarum, ex turgescencia massæ sanguineæ fermentativa, sumitque orga-

smo, & speciatim ex fermento maligno eam colliquante, quæ periculosa, oritur; quæ si non semper, saltem ut plurimum est maligna. Symptomaticas istas inter sunt primariæ colliquæfactivæ dictæ, quando ægri cum paucis alimentis copiosissima varia excernunt. Oritur ex sale acerrimo volatili, unde morbus acutissimus oritur, talesque diarrhœæ præter ardentes & malignas febres, ut & pestilentiales, imprimis phthificos & hæcticos vexant: siquidem phthificis ordinariò aliquandiu ante mortem superveniunt, hinc & phthifica quamplurimi ab injecto clysmate saltem usuali copiosas patiuntur dejectiones, & à levi etiam propinato medicamento insigniter evacuantur, sed simul admodum læduntur: Colliquativa dicitur, quia ros partium nutritivus, ac ipsa massa sanguinea, ex texturæ mutatione ita fatiscunt, ut instar liquaminis serosi copiosè per alvum evacuentur, cum juncta notabili corporis emaciatione, viriumque sensili prostratione. Sanè quibuslibet tabidis, undecunque id mali contraxerint, de facili talis imminet diarrhœa. Diarrhœæ etiam quædam observantur periodicæ per certum tempus affligentes & redeunt, idque in habitu nonnihil cacochymico, & debiliore fermenti stomachi activitate. Exemplum habet Forestus *in l. 27. observ. 2*. de diarrhœa quadam spontanea, quæ serosi & alii humores excernebantur, singulis ferè tribus mensibus recurrente, præprimis si olusculis humidis, præsertim pepombus, vesceretur: Sic diarrhœam etiam menstruam refert Schenckius *l. 3. observat.* quæ diarrhœa declinante luna cum variis torminibus afflicta, ita, ut tandem ægrum etiam interfecit.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta ut cognoscatur, duo suppono:

1. Quod excreta ista, quæ per diarrhœam rejiciuntur, non sint actu in intestinis: nam interdum in ægris excrementa ad 40. vices rejiciuntur. Certum ergo est, materiam hanc effluentem deferri ad intestina, partim ex ventriculo ratione assumptorum, partim ex massa sanguinea, per ductus tam pancreaticos quam choledochos ac vasa excretoria glandularum intestinalium. Unde si ita dicta excrementa per vasa choledocha magis transcolentur, & à bile simul concitata magis tingantur, fit diarrhœa dicta biliola; si verò per pancreaticæ vasa uberius materia effunditur in intestina, aut per glandulas miliares, dicitur serosa &c. sicut, si ipsa excreta paulò grassiora & viscidiora, ac minus tincta fuerint, & sic chylus nondum assimilatus sanguini esse videtur, dicitur diarrhœa pituitosa; quæ

quæ tamen vel ex vicio chylicationis, vel ex vicio intestinorum, quibus incipiens imminet dysenteria, originem habet. Aliàs una est Diarrhœa in radice.

1. Recrementa ista, quæ excernuntur, antè non præextitisse in massa sanguinea talia: siquidem tanta saburra sanguini permista esse haud potuisset sine subitanea vitæ noxa, cum aliàs sani fuerint; sed fieri materialiter ex sanguine corrupto per degenerationem.

Pars ergò affecta, seu subjectum radicationis est imprimis massa sanguinea, interdum turbata, & sub forma talium sordium corrupta. Subjectum denominationis sunt intestina, quatenus per ea talis fluxus fit; & stomachus, quatenus in hoc hæret causa occasionalis, sine qua fit nunquam diarrhœa; Et sic intestina instrumentaliter tantum & purè passivè se habent, massâ sanguineâ primariò affecta existente.

### C A U S Æ.

Quoad causas: scrutabimur imprimis eas, quæ diarrhœam morbosam inferunt, utpote cum exinde cæteræ species faciliè judicari aut earum fiendi ratio explicari possit. Cum ergò omnis diarrhœa, à quacunque causa dependeat, sit purgatio quædam naturalis, sive à causa externa sive interna oriatur, sive contagiosa sive maligna sit, sive non, eòdem planè modò se habebit, atque hypercatharsis à medicamento purgante oriunda. Jam verò inferunt purgantia hypercatharsin duobus modis:

1. Irritando tantum simpliciter stomachum & intestina, unde uberius liquorum, qui in iis locis vel naturaliter transcolantur, vel transcolari apti nati sunt, fluxus: quod faciunt Galia, resinæ aciores purgantium vegetabilium; item ☿; arsenicum: vid. in Riverio *Observat. cent. I. observ. 28*. Vel
2. Fermentando, & ratione  $\Theta$ is volatilis acris, destruentis acidum sanguinis nativum ac vitale, colliquefaciendo massam sanguineam, speciatim chylum quasi musteum, nec adeò perfectè sanguini assimilatum; unde partes colliquatæ, sic excrementosæ & putrefactæ redditæ, sero involutæ, per convenientes vias ad intestina amandantur: idque per ductum, partim pancreaticum, partim biliosum, in quibus transcolatorio modo ea à massa reliqua separatæ & statæ, ejiciuntur & expelluntur: uti fit à laxantibus, venis infusis, aut quando odoribus purgantium, aliisvè similibus modis quidam purgantur, licet non levis co-

pia per glandulas miliares in intestina etiam transeat; vid. Pechlinus de *Purg.*

Ex utraque etiam causa diarrhœæ quoque, & excessivus earum gradus, cholera, oriri solent:

1. Ab irritatione: ut à Mercurio sublimate, aut  $\nabla$  forti, Poterius observavit.
2. A fermentatione: ut à fructibus horæis, à contagio fermentativo aliunde suscepto.

Ibi simplex acrimonia rerum irritando hoc malum infert: ob id affectus suâ naturâ levior est: Hic simul fermentum præternaturale acre  $\Theta$ inum adest, plus minus malignum fermentando agitans, turbans & colliquefaciens humores & massam sanguineam, & in sordes mutans; estque naturæ nunc acidæ, nunc volatilis: quod fermentum acre similiter prosternit fermentum stomachi. Undè nunquam observatur diarrhœa, in qua non stomachus semper simul sit labefactatus.

Ex dictis manifestum evadit: causam diarrhœæ proximam seu occasionalem esse humorem acrem, seu potius minimum ejus fermentum, nempe acre, vel irritans intestina, vel inquinans ac plus minus colliquefaciens massam sanguineam. Fermentum istud acre volatile atque alcalinum, ac occultè acidum, specifici tamen saporis, esse videtur, quod cum bile, vel in intestinis vel in folliculo telileo, commistum talem texturam, saporem & naturam acquirit, quod purgantium naturam seu crasin imitatur, & ita similem cum iis effectum producit.

Fermentum hoc sæpius quoque acidum esse, usitatissima juvantia persuadent: qualia præter opiata sunt corallia, terra sigillata, C, C. ustum, hæmatites, &  $\Theta$ alia, tormentilla, ejusque extractum acre, vinum absinthites, pastus orizæ, item puls amygdalarum dulcium cum lacte &c. talia nempe omnia temperando, ac in specie corrigendo acido inserviunt.

Juxta has causas proximas, causa interna remota seu occasio disponens corpus ad diarrhœam, nunc est fermentum stomachi digestivum, nunc est ipse internus naturæ per humores concitata motus: fermentum stomachi, quando non debito modo se habet, sed labefactatum, adeoque vel debile, vel vitiatum est, hincque quod cibos nec fermentet, nec bilem digerat, adeò subito hujus culpam alvus luit, ejusque fluxus excitatur. Unde quæcunque acidum spirituosum stomachale quocunque modo destruere, econtrâ bilem augere, vel in orgasmum p. n. concitare valent, ad alvi fluxum disponunt: sicuti quorum potens est stomachi acidum esurinum, à propinatis purgantibus difficulter laxari solent, & rarius habent diarrhœam; quia acidum sto-

machi

(O)

machi destruit fermentum acre alcalinum oleosum, quod agitando sanguinem, infert diarrhœam. Ab interno naturæ motu provenit diarrhœa, aut per motum criticum, aut symptomaticum: de quibus jam dictum. Accedit his simul habitus corporis, multum ad diarrhœam promovendam faciens: nam iis, qui densæ sunt texturæ, & cutim habent spissam, adeoque parum transpirant, uti sæpius quotidie egerunt, quàm qui poros habent apertos, ita & illi diarrhœis magis obnoxii: uti rectè annotat Gabelchoverus *cent. 3. cur. 73. in schol.* quia transpiratio insensibilis impeditur, & turgescencia sanguinis promovetur: propterea id, quod retinetur, per alvum solet deponi. Rationem in glandulis intestinorum querere nititur Peyerus *Tr. de glandulis intestinorum p. 86.* hinc in qualibet diarrhœa tam sedulo opera danda, ut vel copiosiori insensibili transpiratione, aut sensiliore sudatione, corpus perspirabile conservetur.

In specie ubique causæ antecedentes examinandæ, an ab errore externo? an verò ab interno fermento aut contagio? an ab humorum orgasmo oriatur malum? ex his etiam differentiarum diarrhœæ essentialium patet ratio: & speciatim epidemica plus minus maligna aut contagiosa, ex fermento alcalino Sino acrimaligno, vel ex inquinamentis aliis stomacho hostilibus, vel cum  $\Delta$  inspirato, vel cum assumptis ingesto, vel excretis ægrorum suscepto, se confestim multiplicat, & primitus oritur. Diarrhœæ habitualis fundamentum in vitio fermenti digestivi, ab assumptis alterati, & bilis à naturali crasi alteratæ, residet: Illud non ritè digerit & subigit, nec tali corpori appropriat assumpta: hæc, non ritè perficit & separat eadem ab excrementis, quin hæc potius mutuâ miscelâ saporem acrem intestina irritantem, & ad celeriores expulsionem stimulantem, acquirunt: quibus occasionibus & ventriculus & intestina adeò irritabilia successivè evadunt, ut à levissimo objecto, v. g. ab ordinario potu, ad excretorium motum, seu sui contracturam irriterentur. Viscera etiam, ut hepar, pancreas, &c. in tono soluta, humorum transcolationi occasionem suggerere possunt, unde talia effluunt, quæ aliàs retinere deberent. Diarrhœa colliquativa fundamentum habet in deficiente plus minus acido stomachali; & acriori e contra redditâ bile, unde partim chylus acris  $\Theta$  sus evadit, intestina stimulans, partim ista acrimonia  $\Theta$  sa massam sanguineam resolvit, colliquefacit, ut in sua textura fatiscens in serosum  $\Theta$  sum liquamen abeat, quod per glandulas intestinales & pancreas secretum sub tali diarrhœæ specie excernatur. Diarrhœa omnis oleosa & pinguis, si non est ab assumptione nimia pinguium, oritur ex colliquefactione pinguedinis corporis, adeoque

conjuncta est cum ejusmodi macie & tabe lethali.

Quoad causas remotas externas, diarrhœam excitantes, sunt partim frigidi potus, partim ipsa assumpta, facilè fermentabilia aut corruptibilia. Notum enim est, quod inter assumpta fructus horzi, item cucumeres, melones, pruna, uvæ, &c. utpote facilè fermentescibiles diarrhœam inferant.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica, quæ ex relatione ægri patent, antecedentia & consequentia optima dant signa: semper adest nausea insignis, & ut plurimum appetitus dejectus, sitis e contra aucta, & dejectio virium; interdum aliqua simul vexant tormina, aut murmura, vel borborygmi, immediatè scilicet excretionem antecedentia: Malo ingravescente tandem veniunt præcordiorum anxietates, lipothymia, & sudores frigidi, maximè circa frontem, tandem mors, nisi maturetur cura.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: in hac ante omnia exactè observandæ sunt differentia Diarrhœarum: nam ex harum consideratione, & cum viribus ac statu ægri collatione manifesta se exerit prognosis.

In specie omnis diarrhœa critica spontanea non nimia, si excernuntur ea, quæ debent, idque cum euphoria ægri, salutaris est; sin minus, contra: vid. Hippocratis *aphor. 2. l. 1.*

Nec rejicienda est ea, quæ ob materiæ metastasin, vel spontaneum humorum motum, accidit.

Symptomatica verò in principio morborum, aut morbis malignis cum excretionem cutanea junctis, superveniens, si non semper, certè ut plurimum, est mala: Sic v. g. Diarrhœa superveniens peripneumonix, est pessima, & omnis talis alvi fluxus in principio morborum superveniens, ut plurimum malus est: quia (1) impedit coctionem materiæ morbificæ seu legitimam heterogenearum fœcum separationem per naturalem humorum fermentationem. (2) Quia vires prosternt. (3) Quia subsequens est febrilis colliquationis: id quod patet, quia rejecta tunc temporis ut plurimum sunt fœtida. Ergo talis diarrhœa symptomatica semper sistenda, aut saltem ita cohibenda, ne fiat nimia. Unde semper errant Medici, qui tunc purgantia indicari existimant, quando scilicet supervenit talis diarrhœa. Sed rectè dicit Lindanus; ipsos tunc nescire, quid sit superveniens morbo; nam cum talis diarrhœa superveniat tantummodo morbo propter summam materiæ cruditatem, eamque sæpius malignam, non debet sanè irritari aut exasperari purgantibus. Pertinet huc & *sect. 6. aphor. 15.* Hippocratis, & *l. 5. Epidem.*



*Epidem. Text. 4. & l. 1. de morb. Text. 6.* longâ diarrhœâ laboranti superveniens vomitus, morbum solvit: Hincubi in diarrhœa habituali urgent stomachi symptomata, nausea, vertigo, anxietates præcordiorum, vomitus blandus instituat; item *aphor. 17. sect. 6.* ophthalmia laborantem alvi profluvio corripere, bonum est; nempe fit tunc diarrhœa ex metastasi; conf. Galenus *in lib. contra Julium c. 1.* item *aphor. 29. sect. 7.* si leucophegmata detento diarrhœa supervenit, malum solvit; conf. M. A. N. C. *ann. 3. p. 215.*

In quacunque diarrhœa, quo magis valet stomachi appetitus, eò melius est; quo magis prostratus, eò pejus, & redeuntes ructus acidi vel rediens appetitus diarrhœam declinantem innuunt.

Omnis diarrhœa epidemica contagiosa, est maligna & periculosa.

Hippocrates *Aphor. 34. Sect. 5.* dicit: mulieri uterum gerenti, si alvus multum fluat, periculum est, ne abortiat; quia spiritus debilitantur, fœtus fit imbecillior, & instar ponderis jacet in utero, uterus in suo tono relaxatur, neque sufficiens est ad retinendum fœtum, unde irritatus convellitur, & dolorem exhibet, fœtumque excludit, unde abortus. Sed limitandus hic aphorismus est: siquidem rectè hic Schulzius *Conf. 340.* Ubi, inquit, *videris fluorem ad sistendum inobedientem, (nempe in gravida.) ne multum urgeas; ferunt enim nonnunquam prægnantes ejusmodi evacuationes usque ad partum citra noxam: uti contigit in uxore fratris mei, qua prægnans per quatuor menses, sanguinolentas dejectiones etiam cum rursus intestinorum passa est, nec ullo medicamento sisti poterat, tandem excluso fœtu sano & incolumi sponte sua intermisit.* Vid. item Platerus, quoad hoc punctum, de gravida in *Observat. pag. 802.* item de simili alvi fluore & dysenteria, gravidarum Ballonius *l. 2. Consil. 57.* Ratione excretorum notetur; quò magis hæc à statu naturali recesserint, adeoque quò deterioris conditionis fuerint, eò cæteris paribus diarrhœa deterior habenda est: hinc si crassa admodum, aut alba, aut viridia, aut crocea, aut spumantia dejiciuntur, hæc omnia mala sunt; item mala est dejectio pauca, glutinosa, alba, subpallida, lubrica; exitiosa verò est nigra, utut non semper, æruginosa, pinguis, livida, fœtida, &c. innuunt enim hæc fermentum sanguinis colliquefactivum magnum putridum. Versicolor quidem diuturnior est, sed nihilominus exitialis.

Omnium periculosissima est diarrhœa colliquativa, & quidem semper in morbis acutis; & si talis tabidis aut hæcticis superveniat, plerumque lethalis est: & quibus Phthisicis, vel confirmatis, vel quibus capilli defluunt, spontè superveniens diarrhœa, semper est colliquativa, & eosdem ad orcum deducit.

Tom. II.

In diarrhœis sudor & ordinariò suppressus, si iterum copiosius profluant, de alvi fluxu cessaturo spes quædam illucescit.

### CURAE.

Ante omnia considerandum: an & quæ sit curanda? sinenda est diarrhœa spontanea, quæ vitio assumptorum, vel ratione metastaseos naturæ morbo sæ evenit, cum motus naturæ non corrigendus, nisi excedat, indeque vires deiciat: Item critica diarrhœa etiam curanda non est, nec turbandus faustus conatus naturæ, sed prospiciendum saltem appropriatis stomacho, ut conservetur appetitus, ne superveniant ejus symptomata; observantur enim tales interdum spontè cessare: imo interdum promovendæ sunt hæ ipsæ.

Curanda verò est, (1) diarrhœa artificialis nimia sive hypercatharsis, si scilicet copiosa egeruntur, de quo videatur Willisius *in Pharmacœutic. rational. p. 110.*

(2) Diarrhœa spontanea, si excessiva & ex errore externo: In tali sæpè conjuncta sunt funesta stomachi symptomata, ut nausea, vomitus, quæ ne prosternat vires, aut superveniat cholera, maturè sistenda.

(3) Diarrhœa symptomatice omnis, & conjuncta cum prostratione virium, anxietatibus ægrorum, interdum cum syncope.

(4) Diarrhœa epidemica aut maligna contagiosa ob periculum prostrationis virium; cum sæpè sint lethales.

(5) Habitualis diarrhœa, quæ ob inveteratum stomachi malum, aut hepatis tumorem; hæc enim ad tabem deducit ægrum.

Quoad ergò methodum medendi: observata causarum remotarum diversitate, diarrhœæ quàm maximè curari debent, ut symptomatice & epidemicæ his indicationibus levantur:

1. Fermentatio p. n. massæ sanguineæ compescenda, aliorumque contentorum colliquefactio fermentativa inhibenda, & fermentum  $\Theta$ inum acre destruendum, idque moderatè acidis incrassantibus & adstringentibus.
2. Blandis sudoriferis junctis massa sanguinea repurganda ac fermentativa substantia eliminanda; sic curatio erit magis fida seu tuta.
3. Acre irritans quodcunque temperandum absorbentibus, vulgò præcipitantibus dictis.
4. Irritationis sensus auctus opiatum theriacalibus vel similibus sopiendus, adeoque hinc natus spirituum impetus, & efferus humorum motus localis, iisdem sistendus.
5. Blandè evacuanda sunt excrementa, occasionem subministrantia, si quæ sunt.

(O 2)

6. Sto-

6. Stomachus, quantum possibile, & appetitus læsus, ejusque tonus plus minus resolutus, apprimè restituendus.

Pro his scopis melius consequendis sequentia probè observanda sunt axiomata:

I. In quovis alvi fluxu, qualiscunque etiam sit, ventriculi semper summam habendam esse curam, cum semper hic sit labefactatus: quo agis enim functio stomachi appetitiva læsa, eò periculosior est diarrhœa, & appropriatis maturè succurrendum stomacho: imò certum est, diarrhœam non posse curari, nisi stomacho appetitus redeat; hinc calidus potus & calidus fons apprimè conveniunt: ipsi scilicet ægri observant, subito atque potum saltem frigidiusculum ingerunt, quod mox alvi stimulum sentiant: item parvus potus in quavis diarrhœa convenit, cum Foresto *annotante l. 22. obs. 4.* bibendi abstinencia omnem alvi fluxum maximè solvat: Pro resolutio autem ventriculi tono restituendo conveniunt vinum & vinosa, cydoniata, mastix, & ex hac parata medicamenta, vinum absinthites, mentha, cinnamomum, &c. reliquis medicamentis admiscenda. Calidi fons sunt varii, tam sacculi, quales supra circa vomitum ordinati, quàm emplastra, præsertim ex tacamahaca, cum balsamo Peruviano & aromaticis applicata.

II. In diarrhœa symptomatica aut maligna nullo modo purgandum. Pessimus mos est, quod in morbis acutis, aut aliis in principio supervenientibus, purgantibus velint succurrere.

III. In diarrhœa epidemica contagiosa maligna, & quidem in principio, ubi vires integræ, alexipharmaca, tam acidum quàm alcalinum fermentum peccans destruentia, & per sudorem ejicientia, primatum obtinent: hinc theriacalia, item & essentia theriacalis, R. Bezoardica cum opio, Galia fixa, & sigillatæ primatum ducunt. Imprimis si à fermento p. n. humores ipsi ad colliquationem disponantur: nam si à simplici irritatione intestinorum est diarrhœa, non æquè necessaria sunt, unde in epidemica pariter atque contagiosa magis, quàm aliis speciebus, conveniunt: æger simul quietus, & in loco calido se contineat.

IV. In nulla diarrhœa in principio evacuationi per alvum, ut quibusdam mos est, instituitur, sed sufflaminato humorum impetu, ubi necesse fuerit, vel clysmatis blandis alvus eluenda, vel blando rhabarbarino aut tamarindis, intestina abstergenda, idque in casu, quando adhuc hærent reliquæ recrementorum, quæ intestina irritant: conf. hic Septalius *in animad. & Caut. Med. l. 7. §. 89.* Potius ergo spectatores motus aliquandiu naturæ erimus, quamdiu non excedit, & morbificæ causæ potissimum rationem habeamus. Rhabarbarum tamen in omni diarrhœa prodest, non præcisè scopo evacuandi (utut & hic subinde

accidat, præsertim in dysenteriiis) sed alterandi anodyno styptico. Hinc in dysenteria, nimia menstruatione, mictu cruento, hæmorrhoidibus, affectibus infantum ex cruditate acida & pituitosa adeo proficuum existit.

V. Utut vomitus in diarrhœis sit periculosus, tamen ubi ventriculus maximè laborat, cautè tamen, adeoque ubi in principio diarrhœæ, aut in statu, maximè urgent stomachi symptomata, nausea, vertigo, anxietates præcordiorum, & exinde diuturnior evadit affectus, vomitus est imperandus: idque ex Hippocrate *sect. 4. aphor. 17.* item *aphor. 15. sect. 6.* qui sunt aurei, & l. 2. *de ras. victus* §. 15, 16.

VI. Adstringentia, quæ talia, non conveniunt in diarrhœis: quid enim juvat stringere & arctare partes alvum irritantes, & excernenda retinere, dum omnia adhuc sunt in motu? Omnium Prædicorum testimonia perhibent, quod, si in principio maturius adhibeantur, aggravent morbum, dum sæpius metastaseos in aliam partem nobilem, aut supervenientium convulsionum, febrium, & gravissimorum symptomatum abdominis supervenit metus: sic enim ex diarrhœa, cydoniatis intempestivè suppressa, ileon lethale observavit Ballonius: vid. Bonettus *Pharos Medic. pag. 413.* nec stomachus aut intestina tali laborant laxitate nimia, vel resolutio tono, non magis scilicet, quàm in hypercatharsi. Non igitur, nisi in diarrhœa diuturna jam curata, pro primarum viarum tono redintegrando, propriè dicta adstringentia, cydoniata v. g. aut ex mespilis desumpta, conducunt. Cui autem lubet in principio hæc usurpare, adjungat semper sudorifera. Cætera, quæ sapore styptico plus minus imprægnata sunt, v. g. tormentilla, & sigillata, C. C. ustum, saccharum hi, &c. non tam adstringendo, quàm specifica sui texturæ saporem fermenti vel humoris peccantis corrigendo, absorbendo, prodesse potius videntur.

VII. Ridiculè nimis à quibusdam Medicis vinum prohibetur, quia peccet bilis vel adsit febris: sed falluntur. Vinum enim in diarrhœa est potus medicamentosus, quatenus ventriculo amicum, tam simplex generosum, quàm medicatum, & viribus attritis tanquàm refocillativum ægris est propinandum; hypercatharsin enim sæpè haustus calidi vini curavit. Sic diarrhœam trimestrem desperatam vino rorismarini curatam refert Welschius *Hecatoest. 2. p. 29.* sic in diarrhœa post purgantia, post tractuum horarum abusum, vinum absinthites egregiè confert.

Inter remedia ex regno vegetabili primatum ducunt theriacalia, adeoque opium & omnia opiata: nam opium quoscunque motus & evacuationes corporis, compescit, hæmorrhagias sistit, paroxysmos febriles inhibet, vomiti-

vomitibus sedat, &c. in genere omnes humorum motus, siue sint effervescentiæ, siue alii, potenter compescit, unde semper cum absorbentibus & diaphoreticis miscetur opium correctum. Propter hoc opium theriaca in  $\dagger$  assumpta expectando sudorem est egregia, de qua, & speciatim de electuario diascordii, jam supra dixi, & considerationem meretur effatum Foresti *l. 22. obs. 17*. Tales jure meretur laudes, contra quoscunque alvi fluxus, imprimis cholicos, ita ut veteres non satis illam potuerint laudare, cum maximè ab opio vim suam habeat sudoriferam, assumitur à ʒj. ad ʒij. & quidem, quò magis est recens, eò potentius operabitur: compescit mordacitatem humoris, & torporem inducit; quoniam minus infractæ sunt opii vires. Eadem theriaca commodè etiam regioni umbilicali & stomachi illinitur, siue sola, siue cum balsamo Peruviano mista, aut etiam aliquot guttis olei destillati macis imprægnata. Ovi vitella bina, cum albumine quoque ad duritiem cocta, cum aceto rosaceo irrorata, & quasi acidulata, experimentum sunt præstantissimum Helmontii in *Tr. Pylorus Rector. pag. 184. §. 22.* aliquoties à me expertum, etiam in diarrhœa, quæ jam per 4. dies pertinaciter theriacalibus resisterat: conf. *M. A. N. C. ann. 8. p. 67. 68.* Interdum addo pulverem nucis moschatæ vel macis. Sunt qui recipiunt boli Armenæ & nucis moschatæ ana, miscent cum uno alterove vitello ovi ad molliem cocti, & ita sine ʒi assumunt contra diarrhœas, quod experimentum est Stœckeri in *sua Praxi*. Malum cydoniam cerâ impletum & allatum, comestumque egregiè convenit.

Quibusdam etiam, ceu probatissimum commendatur sebum hircinum, quod liquefactum cum tantillo farinæ triticeæ miscetur, ut fiat instar pulmenti. Tormentillæ radix, ejusdem decoctum, & in specie extractum ejus cum aqua quadam aut V factum, præmissâ, si opus est, levi purgatione abstetforiâ; v. g. rhabbaro, myrobalanis, unâ alterâve vice à ʒß. ad ʒj. usurpatum in convenienti vehiculo, ut jusculeo calido, V cinnamomi, cum vino cydoniatò, V menthæ, &c. egregium est in omni diarrhœa & dysenteria, tam benignis quàm malignis epidemicis, & omnibus aliis medicamentis præcellit: addi potest, si opus est, laudanum hystericum vel laudani opiatigr. j. ad j. Faciunt etiam huc plantago, ejus radix & semen, item portulaca; folia myrthi, flores balaustrorum, Lyfimachia flore luteo & purpureo. Diarrhœam in specie compescunt fructus austeri, quatenus pontici: quales sunt myrtillorum, cydonia, mespila condita, aut quod præstat, cruda; horum enim succus cum succo persicarum maculatæ mixtus, & leni Δe ad tertiam partem inspissatus, maximum est remedium. Forestus *l. 22. obs. 1.* aliquoties

feliciter expertus est usum mespilorum in quibusdam, diarrhœa continua laborantibus, qui aliis irritis fuerunt curati: item addi potest non ineleganter sorbus torminalis, quæ est egregium specificum in diarrhœis etiam epidemicis, item in diuturnis, quæ ab usu fructuum horarum superveniunt: In ejus locum etiam rob sorbi aucupariæ potest substitui: sed hoc est inferioris conditionis, utut egregiè etiam conveniat stomacho. Spongia salicis exsiccata, & à ʒß. data, in quibusdam singulariter commendatur: sicuti etiam ʒj. seminis sophiæ Chirurgorum præstantius est, atque semen plantaginis supra laudatum. Residuum ab extracto rhabbari, aut etiam rhabbarum costum, scopis multis satisfacit, astringit, acrimoniam humorum temperat, & tum temporis potenter sudorem movet. Nux moschata & macis communia sunt, & omnibus nota contra diarrhœam remedia, eorumque olea destillata internè & externè conveniunt. Gelatinæ C. C. ʒjß. in potu ordinario dissoluta est admodum specifica in diarrhœis, in specie epidemicè grassantibus.

Denique cinnamomum, ex quo V & ʒi est decoctum, præstans est, item malum cydonium, ejusdem succus recens, item miva cydoniorum, aromatisata, unde miva cydoniorum aromatica cum theriaca mista, additis aliquot guttulis ʒi destillati cinnamomi, vel macis, experimentum est sæpius probatum Lotichii in *Observationibus*; quibus si addantur aliquot grana laudani opiatigr. j. erit bolus eò magis efficax.

Vel

ʒi. *Miv. cydon. aromatiz. ʒij.*  
 V *cinnam. spirituos. ʒvj.*  
 V *sigill. ʒß 1. Bezoard. mineral. g. xv.*  
*laud. opiatigr. j.*  
 ʒi. *destillati cinnam. vel macis gutt. ij.*  
 M. D. S.

Träncklein Löffelweise.

Itali lignum lentiscinum, seu lignum, ex quo transudat mastix, laudant, & ubi potest haberi minori pretio, est admodum elegans. In cujus locum decoctum mastichis, siue gummatiss ex lentisco secreti, ceu stomachicum nobilissimum usurpari potest. Fuit secretum D. Osvaldi contra diarrhœam in V appropriata vel potu ordinario. Prescribi potest ita, ad imitationem nempe Tilemanni in *Materia Medica*:

ʒi. V *plantagin.*  
*fol. querc.*  
*tormentill.*  
*rosar. aa. lbß.*

Vel harum loco

ʒi. V *simpl. l. pluvial. lb. ij.*  
*mastich. cl. ʒij. ad ʒß.*  
*macis ʒj.*

(O 3)

Coquan-



Coquantur: Colaturæ adde

∇ cinnam. ʒi.

Misc. pro Potu ordinario, S.

Trancf auff etliche mal.

Vel edulcoretur cum rotul. manus Christi perlata vel syrupo mastichino vel cydoniorum pro julebo. S.

**Zulep.**

Qui crebrò tepidè hauriatur; à Stœkero enim & plurimis aliis egregiè in diarrhœa con mendatur.

Potest etiam de succo cydoniorum Qatò addi parum.

Loco hujus decocti Stœkerus imprægnat ∇m fumo mastichis: scilicet adjiciunt mastichen supra prunas candentes, fumum excipiunt ollâ novâ vitreatâ, & mox ollam fumò bene repletam implent ∇ simplici vel appropriata, hoc subindè repetunt, donec subtilem mastichis saporem acidulum ∇ contraxerit. Inter ∇s appropriatas sunt imprimis ∇ tormentillæ, pimpinellæ, plantaginis & portulacæ: ex succis sunt succus cydoniorum & granatorum, rob & muscus prunorum sylvestrium, quod rob commodissimè loco succi hypocistidis potest substitui. Alias ∇ chalybeata, item serum lactis chalybeatum, uti & + chalybeatum, convenit. Decoctum granorum juniperi stomacho gratum & diureticum, laudatur à Riverio; Qm enim promovendo necessariò alvum exsiccat: item decoctum C. C. priapi cervi, ceti, &c. pro potu ordinariò assumptum, corrigendo & temperando egregiè convenit in quibusdam diarrhœis, speciatim epidemicè grassantibus, aut aliàs contagiosis. Ellenbergius, quondam Medicus Hallensis Saxo, pro potu ordinario ment j cerevisiæ, in qua decoxit sacchari albi ʒij. & gummi Arabici ʒß. propinat. Porro terræ istæ minerales sigillatæ, bolus Armena, & Oaris in aurifodinis, quæ habet principium metallicum, Deum acidum, ratione cujus convenit figendo fermentum alcalinum & promovendo sudorem. Ut autem promoveatur, maritetur cum spiritu vitrioli Martis; sic naturam acido-austera acquirit, uti est in liquore styptico: qui præmissò blando diaphoretico aptus est ad gutt. xx. hinc Martialia, crocus martis & ∇ vitrioli dulcis, quatenus temperant quodcunque acre, & in specie acida absorbent, simulque vi sudoriferâ pollent, sunt convenientissima in quacunque diarrhœa, in specie, si cum vehiculis acidulis assumantur, aut cum uili irrorentur.

Inter absorbentia etiam sunt coralliatæ, cornu cervi, crystallus, smaragdus; sic nempe Zacutus Lusitanus l. 1. Med. Princ. Histor. 22. & observ. annexa diarrhœam diuturnam & ingentem refert, ex veneno ab amasia in cibo propinato, aliis irritis per smaragdum percuratam ad gr. xij. in conf. cydoniorum: sic

in diarrhœis biliosis, crystallum laudari solet, quam pro hoc scopo sequenti modo præscribere soleo:

℞. Crystall. præp. ʒij.

Bezoard. Gal. ʒj.

laud. hyst. gr. jx.

M. f. pulvis pro 2. dosibus, S.

Pulver auff zweymal.

Facit huc similiter lapis hæmatites, tam naturalis, quam ex saccharo saturni & Olo Martis præparatus artificialis, à ʒß. vel gr. xj. ad gr. xv. & ʒj. in ∇ appropriata: de quo vid. M. A. N. C. ann. 2. observ. 43. p. 227. & Glauberus p. 6. qui miscendus est cum croco ∇ adstringente, non tam pro scopo, adstringendi, quam vitiosos sapores absorbendi: Conf. Poterius cent. 3. c. 77. cent. 2. c. 39. & 81. ubi gravia alvi profluvia croco ∇tis prostant curata.

Ex hæctenus dictis plures concinnari possunt formulæ: v. g.

℞. ∇ tormentill. ʒij.

vel hujus loco plantag. & portul. ʒß.

+ vini l. rosac. ʒß. l. 3vj.

elect. diascord. Fracast. ʒij.

& sigillat. ʒij.

ʒii diaphor. ʒj. ad ʒß.

syr. cydonior. l. syr. de ros. sic. 3vj.

M. D. S.

**Anhaltender Schweifstrancf.**

Cochleatim capiat æger probè tectus in lecto, vel pro duabus aut tribus dosibus sudorem expectando.

℞. Aq. menth. ʒij.

cinnam. 3vj.

Extr. tormentill. gr. viij.

croci ∇is adstring.

laud. hyst. aa. gr. vj.

syr. cydon. ʒß.

M. pro una dosi, S.

Pro temperanda acrimonia humorum:

℞. Amygdal. dulc.

sem. papav. alb. aa. ʒß.

c. f. q. decocti C. C. f. Emulsio ad ʒß.

adde

∇ cinnam. 3vj.

& sigill. alba

corall. r. præp.

C. C. usti præp. aa. ʒß.

Edulcoretur cum julepo rosar. S.

**Temperirende Milch wol umzurütteln auff etliche mal.**

Vel

℞. Conf. Rosar. Gal. ʒj.

& sigillat. ʒß.

Podestillas. mac. gutt. j.

laud. opiat. gr. ij.

cum syrupo myrtino f. bolus, D. S.

**Anhaltende Lattwerge auff einmal.**

Vel

℞. Conf. rosar. r. ʒj.

Bezoard.

Bezoard. miner. gr. xv.  
 laud. opiatigr. jß.  
 ℞o destill. cinnam. gutt. ij.  
 cum syrupocydon. f. Bolus, S.  
 Anhaltender Bolus.

Vel

℞. Conf. menth. ℞lat. 3jß.  
 electuar. diascorâ. Fracast. 3jß.  
 ℞a sigill. 3j. ad 3j.  
 ℞ii diaphor. Dial.  
 Extr. rad. tormentill. aa 3ß.

cum syrupoimperator. t. Electuarium, aliquoties de die sumendum doli 3ij. S.

Anhaltende Lattwerge.

Tandem in diarrhœa epidemica maligna, cum modò dictis semper alexipharmaca sudorifera præprimis usurpanda erunt, quæ etiam conducunt in quacunque diarrhœa; nunquam enim diarrhœa sine sudore curatur. Sudorifera sunt Galia fixa, aliaque satis cognita; miscenda tamen semper appropriata, cum u theriacali jungatur u mastichis, cum terra sigillata, u volatile viperarum & similia. Superiori anno, eum grassaretur hic diarrhœa epidemica non absque applausu medentium aliquoties usum vidi egregium hujus pulveris, etiam ubi jam adesset delirium.

℞. ℞a sigillat.  
 ℞ii diaphor. a gr. xv.  
 pulv. macis l. nuc. mosch. gr. jv.  
 u vol. viperar. gr. vj.

M. f. pulvis pro una dosi. S.

Anhaltend Pulver.

Cui interdum laudani opiatigr. j. l. ij. addi possunt. Usurpatur inf. q. vini aciduli. In eadem diarrhœa maligna gelatina C. C. soluta & potui addita, semper egregium habuit effectum.

In diarrhœa à veneno, per insectiam potò, laudatur timaragdus ad gr. xij. in conf. cydoniorum assumpta. Ut verò stomacho simul succurramus, optimè ipsi conducent cydoniata, speciatim vinum cydoniatum pro iubitu subindè hauriendum. Vel sit mistura cydoniata, urgente siti subindè cochleatim loco julepi haurienda, intermedio reliquorum remedium tempore.

℞. Aq. rubi idai 3ij.  
 cinnam. cydon. 3j.  
 succi cydon. 3jß.  
 u ℞li ℞is gutt. vj. l. u ℞ii dulc. gutt. xv.  
 fr. cydon. aromat. 3vj.

M. D. S.

Stärck-Träncklein oder Magen-Mixtur.

Item pro scopostomacho succurrendi conducit haustus vini generosi, item vitellum ovi cum aceto.

Externè contra diarrhœam prævalet theriaca, imprimis recens ventriculo vel umbili-

cali regioni imposita & illita, vel sola vel cum ana balsami Peruviani aut ℞i destillati mastichis mista, quæ irroretur aliquot guttis olei ejusdem destillati, in specie macis: sicut & balsama stomachalia ordinariò conducunt. Item fomenta, parata ex aromaticis, absinthio, mentha, melissa, caryophyllis in vino decoctis, & ita regioni stomachali & umbilicali cum linteis applicatis; item olea destillata aromatica macis, mentha, carvi, &c. extrinsecus illita, v. g.

℞. Theriac. Andr. rec. 3ij.

℞o destill. bacc. junip. l. menth. 3j.  
 caryophyllor.  
 macis, l. nuc. moschat. aa. 3ß.

M. f. Linimentum, quod

Stomacho & umbilico illinatur, imponendo laterem calefactum: Convenit quoque crusta panis tosta cum vino austero l. + o ebria & imprægnata, & pulvere nucis moschatæ, caryophyllor. aspersa, calidè admoveatur stomacho: Vel

℞. ℞o dest. macis,  
 menth.  
 carvi ana 3j.  
 nucist. expr. q. l. pro balsamo.  
 ℞. ferm. acerr. 3ij.  
 pulv. fol. mentha 3j.  
 zedoar. 3ß.  
 caryophyll.  
 galanga.  
 zingiber. aa. 3ij.  
 + rosac. q. l.

M. f. Cataplasma, illinendum linteis, S.

Sonderlich anhaltend Pflaster.

Item fatus spirituosus pro stomacho, e. g.

℞. u menth. 3j.  
 theriac. 3vj.  
 Essent. Croci 3ij.

M. applicentur cum linteis multiplicatis calidè: sæpius repetendo.

Quando opus est leni intestinorum abstersione, tunc imprimis usitatum est rhabarbarum, idque nunc in substantia ad 3j. c. conservarosarum usurpatum; vel rhabarbarum tostum ad 3ß. l. 3ij. cum pulveris nuc. mosch. gr. vj. l. viij. usurpatum; vel in forma sicca, vel cum syrupo rosarum solutivo: vel syrupus rosarum solutivus propinatur in decocto hordei: cui additur 3j. ℞a sigillatæ: e. gr.

℞. Rhabarb. el. 3j. l. 3ß.  
 nuc. moschat. gr. viij.  
 laud. hysser. gr. iij.

M. f. Pulvis. S.

Abspülend Pulver.

Vel

℞. Rhabarb. testij 3ij.  
 cortic. myrobal. citr. 3ß.  
 c. conf. rosar. fiat Bolus, S.

Abspülender Zucker.

Vel

Vel etiam detur blandum decoctum tamarindorum, quod suaviter alvum laxat, & stomacho amicum est. Sed non conveniunt talia, nisi in declinatione pro reliquis exterminandis, vel in principio, quando nempe excernenda varia, vel in primis viis congesta sunt, vel ad hæc loca aliunde moventur, vel quando ex fructibus horæis malum recens natum est.

Clysmata etiam anodyna ex lacte in tali intestinorum vellicatione, in specie, si in crassis fuerit malum, optimè conveniunt: quorum tunc habetur indicatio, quando crebrius, & tamen parcius, deiciunt ægri, peccante magis acrimoniâ quàm copiâ excernendorum.

℞. lact. chalybeati ℥viii.  
vitelliovi n. j.  
& chamomill.  
mellis rosac. aa. ℥j.

M. f. Enema. S.

Rindernd Clystier.

Si ab acrimonia oriatur dolor in ano, & excoarctatio intestini recti & podicis, confert clyisma ex lacte, vel simplici vel chalybeato: item fons ex lacte calido, cum spongia applicato: vel lactis decoctio cum floribus verbasci, chamomillæ, foliis hyoscyami, &c.

In specie in Diarrhœa artificiali, si sit ex hypercatharsi, conveniunt (1.) narcotica, quæ sensum irritationis tollunt, & inde natos quoscunque humorum motus sistunt, ut opiata; hinc theriaca & electuarium diascordii cum aqua cinnamomi usurpatur: (2.) diaphoretica terrea, quæ humorum turgescerentiam compescunt, & acrimoniam temperant: v. g. sigillata, antimonium diaphoreticum, cornu cervi sine Δe, item hæmatites vulgaris, vel artificialis cum saccharo saturni & Oleo ♂is; hinc vinum Rhenanum generosum, speciatim vinum absinthites, item ~ & essentia theriacalis, sive per se sive cum aliis, e. g. essentia anodyna mista.

Abdomini, imprimis regioni epigastricæ, emplastrum ex theriaca imponatur: vel fons ex decocto absinthii, menthæ, cum aromatibus in vino decoctis.

Quod si tormina, aut alvum egerendi conatus adsint, clyisma ex lacte tepido, in quo theriaca dissoluta sit, injiciatur, aut etiam clyisma ex vulnerariis nonnihil adstringens & blandè abstergens. Confer. *M.A.N.C. ann. 3. observ. 303. p. 525.*

Diarrhœa nimia ob errorem externum, v. g. fructus horæos, &c. per absorbentia & figentia sistitur.

℞. Corall. r. præp.  
C. C. ussi aa. ℥j.  
nuc. moschat. gr. xij.  
essent. opii gutt. xv.

M. pro duabus dolibus, in haustu cerevisiæ

calidæ, vel vini absinthitis calidi assumendis, S.

#### Unhaltende Pulver.

Si ex metastasi nimia futura sit Diarrhœa, radix mali est evellenda, & præsertim cum catarrhosi tali diarrhœæ sint obnoxii, præsertim nocturnæ, ut rectè insinuat Ballonius: vid. Bonetti *Pharos Medic. p. 411.* avertentibus, & aliorum derivantibus, adeoque vesicatoriis aut fonticulis diarrhœa talis erit lenienda. Egregiam observationem talis diarrhœæ catarrhalis vocatæ, per vesicatoria curatæ, videbitis apud Zacutum Lusitanum.

Diarrhœa ex spontaneo humorum motu nimio, pariter ut ea, quæ ex errore externo oritur, tractanda, ventriculo imprimis succurrendo: ubi amara, ut absinthium & theriaca speciatim conducunt:

Vel

℞. rad. ari ℥ij.  
tormentill. ℥j.  
piperis ℥ss.  
M. f. pulvis.

Dosis quantum capit cultelli cuspis, in vino.

In diarrhœis quasi habitualibus, ad aliquot annos durantibus, conveniunt internè imprimis Martialia quæcunque, & aromatica stomacho grata: imò thermæ. Sic Riverius *l. 2. observ. 47.* mentionem facit alvi fluxus per octennium durantis, thermis curati: quibus ipsis thermis etiam curatus fuit alius alvi fluxus diuturnus, cum ulcèribus conjunctus: teste eodem citato loco, *observ. 49.*

Colliquativa diarrhœa vix, nisi curato primario morbo, auferri poterit: interim temperantibus ac blandè adstringentibus ulterior ejusdem progressus, quantum possibile, cohibendus.

## ARTICULUS II.

### De Cholera.

**S**ummus diarrhœæ gradus, & qui rarò absque malignitate existit, est cholera, ista nempe affectio, quando cum summo impetu ex singulari violentia varix sordes recrementosæ, tam sursum per os quàm deorsum per anum, expurgantur, concurrente simul ventris ac intestinorum dolore, plus minus vehementer, inflatione & distensione hypochondriorum, cardialgia, siti, pulsu celeri & frequenti, interdum parvo, insigni præcordiorum angustia, nec raris intervenientibus lipothymis; supervenit inquietudo & jectigatio, partium extremarum frigus, sudor frigidus, imprimis circa frontem, & prostratio virium, tandem quoque adveniunt singultus & convulsiones, prodromi lethalitatis.

Omnia hæc symptomata sunt atrociora, prout causa efficiens occasionalis actior & maligni-



malignior extiterit; malum acutum hoc à diarrhœa differt secundum magis & minus, nulloque sui præcedente præfagio suboritur, ultra 2. vel 3. dies non durat, rarò ad quartum, sæpè funestum existit, & dicitur cholera humida, in qua varii succi, nunc acres nunc insipidi, peccant. Nam præter hanc etiam cholera sicca datur, notha nempe, in qua saltem flatus copiosi supra & infra, vel per utrumque guttur, eructantur, frequenter in lipothymiam cedens, ac in hypochondriacis subindè observabilis.

Acres hoc, sive irritans, sive colliquefaciens, sive (idque ut plurimum) utrumque fuerit, nunc humoris copiosi facie se exhibet, ex assumptis nempe vel in se vitiosis, vel saltem intus corruptis genitum; nunc verò, idque ut plurimum in vehementiori affectu, & qui spontè suâ ex interna oritur causa, sub mole minima existit, adeoque rectè fermentum malignum appellari potest.

### PARS AFFECTA.

Subjectum seu pars affecta cholerae proximum est intestinum duodenum cum pyloro, & principium jejunii, ibidem scilicet, ubi inferuntur isti ductus, Pancreaticus, & Cholodochus: Hæ enim partes à succis acris plus minus & contrariis eò effusis irritatæ ac vellatæ, in convulsivum stimulantur motum, adeoque ex peristaltico motu sursum ac deorsum naturaliter simul succos hos aciores, aut insigniter corruptos emittunt.

### CAUSÆ.

Causa proxima sunt vel fortis ac insignis irritatio ab acri, tam assumpto venenoso, quam in corpore præternaturaliter genito; vel colliquefactio & conturbatio massæ sanguineæ, indeque natorum succorum, à fermento peregrino acri maligno de natura alcalina, cum ipsis confuso, quod fermentum vitiosum massam sanguineam fermentando alterat, transmutat, & corrumpit ita, ut partes corruptæ ac vitiosæ sero involutæ, tandem per abusum ductus cholodochi & pancreatici ad intestina ablegantur, & ibi concurrendo & effervescentia hanc tragœdiam cholerae agunt; unde simillima infert symptomata, atque purgantia actia maligna assumpta. Prioris exemplum est cholera, quam observavit Poterius *cent.* 2. c. 59. à potu  $\nabla$  nata: posterioris exemplum suggerunt v.g. purgantia maligniora inconsulto propinata. Nam quod tale vitiosum fermentum sit, quod massam sanguineam inquinet, patet ex eo, quod, utut non rarò ab alimentis corruptis occasionaliter inchoetur cholera, nihilominus tamen excrementorum quantitas est tanta, ut alimenta, aut quævis assumpta omnia, & quocumque modo corrupta, longè superet: quæ excrementa non oriun-

tur, nisi ex massa sanguinea, quæ communis fœcus & promus condus est totius œconomiae animalis. Hinc etiam est, quod purgantia, si sint nimia, non rarò choleras excitent, in istis scilicet, in quibus copiosa salia contraria, præsertim acida, per medicamentum purgans fermentante motu ad intestina detruduntur, & ibidem tam effervescentia, quam mutuâ sui miscelâ vitiosum saporem acquirendo, tam violenter intestina stimulant, & choleram excitant: uti interdum in hystericeis, scorbuticis & similibus, observari solet. Hinc etiam est, quod fructus horæi, aut ipsius aëris vitio in liquamen acres quasi vitriolatum corrupti, aut in stomacho imbecilliori sub digestionem vitiiati, in talem chylum vitiosum ac fermentativum abeant, ut & intestina irritando, & massæ sanguineæ crasin turbando & colliquefaciendo, choleram excitant. Undè etiam ex ista commotione p. n. massæ sanguineæ symptomata febrilia non rarò adfunt, tam ratione pulsus, quam ratione caloris & cephalalgiae. Imò facit huc imprimis historia Amati Lusitanici *cent.* 3. *curat.* 88. de muliere cacochymica cholera correpta cum febre, supervenientibus tandem mensibus, in qua, quando effluebant menses, alvus erat adstricta, simul verò atque menses supprimerentur, cum febris insigni augmento redibat cholera, & sic vicissim. Sic adjunctus dolor ventris & intestinorum, inflatio eorum ac distensio, effectus genuini contentorum acrium effervescentium, dicta confirmant.

Dum ergo confluunt per ductum felleum & pancreaticum succi varii plus minus corrupti, ex eorum miscela, & concursu emergit humor tertius diversi coloris & proprietatum, adeoque nunc bilis æruginosa, nunc porracea, nunc alia similis, tam supra quam infra rejici videtur, & in specie dum movetur, bilisque intensius imprimis à fermento maligno (quo nomine nihil aliud concipere possumus, quam summam acrimoniam, etiam in minimo interdum efficacissimam, nervosis partibus sensibilissimam, & summam p. n. impressionem, humoribus verò in singulari textura sua mutationem inferentem) concitata, tam graviora ac periculosa circa præcordia in regione stomachi, & præsertim in lumbari dextra, ubi intestini duodeni situs, symptomata excitare solet. Peracutum enim est malum cholera, quodque graves anxietates præcordiorum, extremorum refrigerationes, lipothymias, sitim, pulsus intermittentes, singultus, non rarò convulsiones cum pulsu parvo, celeri & frequenti, inducit: simili ratione atque eadem à malignioribus purgantibus quotidie observamus. Hinc etiam est, quod theriacalia, sudorifera, & malignitati resistentia, primariò in hac cholera sunt attendenda: unde etiam Panarollus *Pentec.* I. *observ.* 28. choleram

(P)

leram à veneno quasi putredinali asserit, & Johannes Colle *l. 3. Med. Pract. ubi de morbis malignis*, inter affectus ventriculi malignos reponit. In genere quæcunque & qualiacunque symptomata fortem ac deleteriam antimonialem purgationem, aut helicorum album sequuntur, aliudve violentius catharticum, ea similiter obvia sunt in cholera. Jam verò notum est, quod dicta rectè inter venena corpori inimica reponantur.

Hæc in genere de causis & fiendi modo.

Quoad remotas occasionales causas: quæ fermentum corruptivum & cholera producunt, sunt vel internæ vel externæ. Hæ in specie sunt assumpta varia plus minus præternaturalia: Illæ verò aut ex assumptis intus genitæ, aut spontanea contentorum corruptela natæ, ac putredine maligna inquinatæ: frequentiores tamen causæ sunt, vel assumpta fermentando faciliè corruptibilia, & in nidorem biliosum transmutabilia, nisi debitè à fermento ventriculi subigantur; vel medicamenta assumpta acriora plus minus maligna; vel denique certa venena, aut acrimoniâ corrosivâ, aut propriâ suâ naturâ cholera inducentia.

Quoad assumpta: notum est, quod ex usu Persicorum aliorumque fructuum horzorum faciliè effervescebiliū, & postmodum putrescendo in nidorem biliosum alcalinum degenerantium, oriantur cholera: vid. Timæus *von Gûlden-Klee / l. 3. casu 8. p. 119*. Zacutus Lusitanus *l. 2. Præcos admir. observ. 15*. Fontanus *in analect. c. 35. exempl. 12*. item ex esu melonum eandem cholera observavit Zacutus Lusitanus *l. 1. Præx. admir. observ. 16*. itidem ex esu fructuum præcocium cum ovifris, superbibitâ frigidâ, observavit cholera ingentem idem Zacutus Lusitanus *lib. ult. Præcos admir. histor. c. 1. n. 7*. hinc etiam mustum, cerevisia novella, vinum non ritè defœcatum, facillimè cholera inducunt, si eorum fermentativa vis ad massam sanguineam forsitan digestionis errore deferatur: Sic Schenckius observavit cholera ex musto, esu fungorum, petu frigidæ, vid. *l. 3. observ. 3*. ex vino acido in nimia quantitate ingurgitato Riedlinus *observ. 51*. Phascolis, cepis, fungis Brassavol. *l. 9. in Hippoc. de victu acutorum l. 4. text. 103*. ex nimio raphani esu cholera itidem observavit Amatus Lusitanus *C. 2. Curat. 32*. ex esu nimio lactis, uti subindè interdum est cholera, cholera observavit Henticius ab Heer *in Observat. oppido rara 15*. sic ex oriza cum lacte parata, seu frigide assumpta, itidem cholera observavit Zacutus Lusitanus *loc. citato observ. 16*. speciatim ova barbi & lucii piscium insigniter cholera inferunt: de quibus Schenckius *l. 7. Observat. it. Timæus in Cas. l. 1. c. 7. p. 118*. qui ipse per esum barbi contraxit cholera.

Post alimenta imprimis sunt medicamenta purgantia nimis generosa, aut fortiora, aut inconcinna dosi, vel subjecto, cujus contenta quælibet sunt acriora, propinata, quæ non rarò inducunt cholera: vid. Riverius *C. 2. observ. 19*. item in Rhodio *Cent. 2. observ. 69*. Forestus *l. 18. observ. 44*. cholera periculosissimam observat ex taleolis radicis hellebori albi, vino infusus, concitatam, curatam per ʒij. pulveris florum nymphaeæ albæ, ceu proprii ejus antidoti: Sic venena quædam acria, uti sunt ☿, ☿lia, ☿alia, Mercurialia, in specie Mercurius sublimatus corrosivus, item præcipitatus, acrimoniâ suâ nunc pylorum, nunc duodenum, rodendo crebras inducunt choleræ. Inter internas causas, febres malignæ in principio sui interdum adjunctas habent choleræ, ut plurimum lethales: sic & cholera epidemica, plus minus maligna, subinde observatæ fuerunt, qualem refert Sydenham *Tr. Observat. de morb. acutis S. 4. c. 2. p. 239*. sic Willsius *in Pharm. ration. vol. 1. S. 3. c. 3. p. 119*. cholera malignam refert etiam epidemicam, quam tamen sub nomine dysentericæ non cruentæ describit. Sæpius satis pestilentialia observantur, seu pestem in sinu gerunt, v. g. illa, cujus Riverius *Observat. morb. infrequentium 26*. meminit. Rarum etiam est, quod ab occlusa fontanella cholera à se observatam refert Johannes Michael Fehr *tr. de absinth. p. 106*. Ut nihil dicam de singulari idiotyncralia, cujus ratione ex auditu tonitru cholera subinde enata: vid. *Acta Societ. Reg. vol. 1. p. 446*. Ratio hujus est in Hannemanni *method. cognosc. simpl. veget. §. 35. p. 71*. Sicuti notatu dignum est, quod habet Fonsseca *l. 1. conf. 84*. de cholera, in qua evacuabantur sursum & deorsum nigra, idque vitio lienis obstructi ob mentes deficientes. Tandem Panarollus *Pentec. 1. observ. 11*. observavit in viro cholera sanguineam, cum maximis symptomatibus, occasione nimie Veneris contractam; per ʒij. lapidis hæmatitis, in vino seu succo granatorum acidorum assumpti, curatam.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: ex superius facta enarratione symptomatum clara sunt: ex quibus etiam est facilis.

### PROGNOSIS.

Cholera, quæ sponte suâ sine causa manifesta externa corripit ægros, ut plurimum est funesta ac ferè lethalis.

Cholera periculosissimum & peracutum est malum, intra biduum vel triduum, imò 24. horas, ægrum jugulans: utut ex Rhodio *superius allegato* constet, in quodam ex ʒio minus decenter præparato cholera ad biennium, per intervalla tamen, & quidem per periodos,

afflixisse. Periodum ferè observat tertianariam, ita nempe, ut de tertio in tertium diem moveatur, seu plus minus exasperetur.

Cholera, quæ supervenit in principio febrium, imprimis malignarum, ut plurimum est funesta, utut in declinatione quarundam febrium interdum possit esse salutaris, si nempe fiat per modum criseos, quod tamen rarissimum est.

Propter malignitatem cautissimè tractanda cholera; suspecta enim admodum est propter metum recidivæ; cum sæpius ægri jam convalescentes ex superventu inopinatæ recidivæ obeant: vid. Horstius *l. 4. observ.* 8. ubi notat, cholicam passionem ferè curatam ex potu vini non ritè defecati, lethaliter recidivantem.

Minus periculosa est cholera, ubi stomachus non affectus, ubi non lipothymia & anxietates præcordiorum sunt.

Quo perturbatio ventris major est, & quò magis patitur ventriculus, eò periculosior est cholera, & etiam periculosiora habet symptomata, eòque citius mortem infert.

Quo magis à statu naturali recedunt excrementa, speciatim si fuerint livida, aut si fuerint foetida, aut si fuerint nimis corrosiva: qualia sunt ea, quæ dicuntur æruginosa, & porracea, item cum loturæ carnis simile quid excernitur, eò periculosior est cholera: & longè adhuc majus malum, si nigra aut livida rejiciantur, ut ex Tulpii *Observat. l. 1. a.* intelcere potest.

Cholera colliquefactiva, mutans habitum corporis, semper ferè lethalis est.

### C U R A.

In cura eadem medendi ratio est cholerae, quæ vomitus atque diarrhoeæ, utut remedia magis efficacia, aut magis selecta subinde adhibenda sint. Maximè attendendæ sunt causæ: an oriatur ab assumptis? an à fermento maligno? propter quod summâ circumspeditione opus est, quoniam cholera suspecta est propter metum recidivæ;

1. Temperandum est acre, quod cholera infert, & blandè in principio morbi per leniter sudorifera evacuetur.
2. Destruendum est fermentum malignum alcalinum.
3. Hinc utroque in casu opiatis humorum & partium motus sistendus; &
4. Appropriatis odoriferis stomachus roborandus.

Pro his scopis melius obtinendis, observetur:

I. Semper medicamentis anti-cholericis addenda esse alexipharmaca bezoardica, vel ipsa remedia propinata ex se vim habeant alexipharmacam; quia causæ ejus ut plurimum sunt malignæ, ut rectè monet Langius *Com-Tom.* II.

*ment. in Fabrum;* unde non satis sumus tuti in cura.

II. In principio morbi benè considerandus naturæ motus, idque in specie, si ab externis assumptis facilè fermentescibilibus vel putrescibilibus oriatur malum; Si enim, monente Hippocrate, evomuntur ea, quæ debent, confert, & facilè ferunt: unde ex tali causa, v. g. ab alimentis corruptis & similibus, nata cholera non subito nimis est suppressenda, & ab adstringentibus fortioribus in initio est abstinendum & cavendum, quia suppressa excrementa commota adhuc aut fermentativa, sive à fermento maligno per colliquationem transmutata fuerint, sive ex assumptis genita detineantur, sub cinere gliscunt & novum ac deterius incendium minantur: uti hoc rectè monet Forestus *l. 18. observ.* 45. item Amatus Lusitanus *cent. 3. cura* 88. Igitur cum lenissimi cathartici operatio novos in super exciter tumultus, spectatores potius naturæ agere debemus, aut saltem in principio juxta Riverium & Sydenham acre istud abstergendum blandè ac diluendum; hinc demùm opiatis morbi impetus frangendus.

III. Opiata nunquam satis laudanda sunt remedia in cholera & omni alvi fluxu, quæ sanè nunquam omittenda, & in majori quàm consueta dosi, e. g. ad gr. jv. præscribenda: sin tamen magna adsit virium dissolutio seu prostratio, magna laudani dosi juxta Riverium non est exhibenda, sed melius est, partitis vicibus propinare, adeoque in minori dosi, in grano uno vel duobus subsistendum, semper cum appropriatis analepticis miscenda, & etiam bis in die exhibenda: quinimò si tardius accesserit medicus, ita ut æger vomitu ac dejectionibus ad plures horas fuerit exhaustus, jamque graviora symptomata, v. g. extremarum frigus, imminet, in tali casu, omissis quibuscumque aliis auxiliis, mox ad sacram laudani anchoram est accedendum.

IV. An imio potu, in specie frigido, quantum possibile, abstinendum: haustus tamen vini moderatus optimè convenit, nisi pro scopo abstergendi & temperandi vel serum lactis, vel decoctum hordei cum syrupo rosarum, vel decoctum pulli aquosius, aut simile propinetur. Sed omnia, quantum possibile, tepidè exhibenda.

V. In declinatione morbi, ubi cessat impetus, adstringentia & stomachum roborantia usurpentur, ubi conveniunt. Brevibus: Purgantibus igni oleum additur, & adstringentibus ac suppressantibus ignis intra viscera coercetur, vid. Sydenham *Observat. p. 241.* Ergo temperanda ante omnia humorum est acrimonia, hinc eorum & spirituum impetus coercendus; tandem quantum possibile, blandissimè simul abstergendum & eluendum est. Scopo priori absorbentia fixa, secundo opiata,



ra, præsertim cum aliquali diaphoresi usurpata, & denique rhabarbarum in iusculo pulli, vel decoctum tamarindorum, vel serum lactis, vel decoctum hordei cum passulis usurpandum. Conf. *Septalius in animadv. p. 201.* ubi dulcia, ut mannam, saccharum, mel, meritò rejicit; & quidem dum naturam evacuantem adjuvamus, non dierum, sed horarum spatio motus naturæ est dimetiendus, quod idem rectè monet *p. 202.* Adeoque præcipitantia sudorifera blandis opiatibus mista optime convenient, expectato sudore. Cum vomitus urget, medicamenta brevibus intervallis & cochleatim assumantur: vel cum vix liquida possint propinari, ob id dentur boli opiatibus imprægnati, qui sicci deglutiendi, abstinendo aliquandiu ab omni potu. Conf. Grim. *compend. med. chym. p. 78. & sequ.*

Medicamenta igitur, quæ dictis convenient scopis, sunt mentha, & omnia ex mentha parata; cum hæc, ceu singulare specificum, stomachum suo modo pacificans commendetur à Tralliano. Portulaca item & scordium ac plantago, sive in decocto cum syrupo cydoniorum & confectione alchermes, aut electuario diascordii, sive eorum succus cum mentha, propinentur: Pariter semina 4. frigida majora, amygdala dulcia, & similia, & ex his paratæ emulsionēs, propter vim temperandi acrimoniam humorum effervescentium à quibusdam commendantur: quas tamen minus probō, quia laxant stomachum: aromata oleosa, nux moschata, caryophylli, & similia: Acida item, effervescentiam sanguinis nimiam compescunt, commendantur:  $\Theta$  prunellæ à Riverio laudatur, ubi cum cholera conjunctus est ardor & sitis. Aliàs internè prætereà convenient terra sigillata, &  $\varphi$  Oaris, &  $\sigma$  Oaris. Similiterque hinc commendatur crystallus præparata ad 3℔. & ceu singulare laudatur specificum, bilem æruginosam temperans. Juxta crystallum & smaragdus est, qui acerrimi istius succi corrosivi vim infringit, speciatim ubi jam convulsiones imminere videntur. Ulteriùs Martialia, imprimis  $\delta$  diaphoreticum Martiale est egregium; hinc C.C. ustum, ebur sine igne, corallia rubra, &c.

Quoad differentias causarum: in cholera à causa nimis acri nata, adeoque à venenis corrosivis aut similibus excitata, convenient imprimis pinguis & oleosa, acre tale obtundentia: ut  $\sigma$  amygdalarum dulcium, aut butyrum non  $\Theta$  itum, quæ corrosivitatē demulcent: item lac, cui semper appropriata, ut  $\varphi$  sigillata, admisceri possunt; Convenient intereà acre istud absorbentia, ut  $\varphi$  minerales sigillatæ, crystallus præparata; vid. Langius in *epistolis l. 1. c. 4. & l. 3. c. 1.* item Zacutus Lusitanus in *l. 2. Præcos admir. observ. 15.* Vide-

ri etiam potest Henricus ab Heer in *Observ. 1.* ubi choleram, inepto usu fontium Spadanorum ortam, usu crystalli montanæ cum succo cydoniorum, vel limonum, & berberum, unoque alterovè clystere curavit.

Si à perverso usu & effervescentia fructuum horæorum oriatur malum, præter blanda abstergentia, eorumque colluviem evacuantia, conducunt præcipitantia dicta,  $\Theta$ ia alcalia, terrea: ut  $\Theta$  absinthii,  $\Theta$   $\varphi$ , & sigillata, ac ebur ustum: quibus opiata semper addenda: ad imitationem nempe cerevisiæ vel musti effervescentium impetuosius, dictis mediis cohibitorum.

Vel

$\mathcal{R}$ . Aq. torment. 3j.  
cinam.  
menth. aa. 3℔.  
—  $\Theta$  li gutt. xv.  
elect. diascord. Fracast. 3j℔.  
 $\varphi$  sigillat. 3j.  
croci  $\sigma$  us adstr. 3℔.  
syr. cydonior. 3j℔.

M. f. Potio, quæ etiam in diarrhœa convenit.

D. S.

Starch • Tranchlein.

Si verò à fermento maligno per modum nimis purgationis excitata fuerit cholera, convenient blandè acida, istud destruentia ac præcipitantia, sudorifera blandis opiatibus mista expectato sudore, v. g. succus & syrupus granatorum, ribium & berberum, syrupus coralliorum, portulacæ, — vitrioli, imprimis Martis, & cum spiritu  $\Theta$  i aut vitrioli paratus liquor stypticus: item solutiones coralliorum cum succo citri aut limonum; tinctura item  $\Delta$  is vitrioli insigniter convenit; uti etiam in principio morbi  $\mathcal{R}$  bezoardica, mixtura simplex, quæ & effervescentiam massæ sanguineæ compescit ratione — vitrioli blandè adstringendo, & sudorem movendo malignitati occurrit:  $\varphi$  x minerales cum blandè acidis propinatæ, hinc  $\varphi$  sigillata cum —  $\Theta$  li est egregia, item  $\delta$  diaphoreticum, simplex & Martiale, bezoardicum  $\Theta$  are,  $\mathcal{V}$  ale, & Martiale, ebur sine  $\Delta$  e vi absorbendi & sudoriferâ, itidem convenient.

Præ cæteris laudatur opium, & omnia ex opio parata remedia, quæ inter præcellit ad choleram electuarium diascordii Fracastorii, cujus dosis ad summum convenit in cholera à ʒij. ad 3j. theriaca & Mithridatium, & ex his facta extracta theriacalia, — & essentia theriacalis & menthæ: quibus in majori malignitate semper addenda est camphora.

Ex dictis facilè est, varias formulas concinnare: Sic Sylvius in quacunque humorum attemperatione, & hinc orta cholera curanda, hanc misturam commendat:

$\mathcal{R}$ . Aq.

- ℞. *Aq. mentha* ℥iij.  
*ebor* f. Δe, ℥ij.  
*crystall. prap.* 3℞.  
 ☞ *a sigillata* ℥j.  
*laud. opiat* gr. iij. vel hujus loco  
*essent. opii* 3℞.  
*syrupi portulac.* 3vj.

M. f. Potio. S.

### Stärck-Träncklein.

- ℞. *Aq. portulac.* ℥iij.  
*cinam.* 3℞.  
 ~ *sberiacal.*  
*el. diascord. Frac.* aa. ℥ij.  
*conf. alkerm.* 3j.  
*ebor.* f. Δe 3℞.  
*syr. corall. Quercetam.* 3vj.

M. f. Potio.

- ℞. *Theriac.* 3j.  
 ☞ *a sigill.* ℥j.  
*crystall. prap.* gr. xij.  
 cum *syr. mentha* f. Bolus, S.

### Anhaltende Stärck-Lattwerge auff einmal.

- ℞. *Conserv. menth.* 3j.  
 ☞ *sigillat.*  
*corall. r. prap.*  
*crystall. prap.* aa. 3℞.  
*laud. opiat* gr. ij.  
 cum *syrupo corall. Quercet. f. Bolus.*

- ℞. *ebor. sine Δe.*  
*crystall. prap.* aa. 3℞.  
*laud. opiat* gr. iv.  
 M. f. pulvis.

Divide in duas part. aequal.  
 . D. S.

### Anhaltendes Stärck-Pulver.

- ℞. ☞ *sigillat.* l. 8ii diaphor. 3j.  
*Bezoard. Car. l. 4ial.* 3℞.  
*laud. opiat.* gr. 3℞.

M. f. pulvis.

Dentur 2. doses, S.

### Anhaltend Stärck-Pulver.

- ℞. *Aq. mentha* 3ij.  
*cinam.*  
 + *bezoard.*  
 ~ *theriacal. camph.* aa. 3℞.  
*syr. acetos. citri l. cydon.* q. f.

M. pro vehiculo istorum pulverum, S.

### Stärck-Träncklein zum Pulver.

- ℞. *Crystall. prap.*  
*Ebor. f. Δe l. Unic. veri prap.* à 3j.  
*corall. rubr. ppt.*  
*Boli Arm. ana* 3j. ad 3℞.  
*laud. opiat* gr. vj.

M. f. pulvis pro aliquot dosibus, S.

### Anhaltend Stärck-Pulver auff etlichmal.

- ℞. *Aq. mentha* 3iv.  
*cinam.* 3℞.  
*essent. theriacal.* 3ij.

*syr. corall.* 3vj. ad 3j.

M. D. S.

### Stärck-Träncklein zum Pulver.

Timæus von Gilden = Klee in cholera, & profluvio alvi vehementissimo, & similibus fluxibus, commendat suam opiatam bezoardicam; compositio extat p. 422.

Quod attinet externa in cholera; conveniunt quæ imprimis stomachum respiciunt, quæ inter eminent theriaca; V, aut aromaticus aut camphoratus, seu largiter camphorâ imprægnatus, in specie à vegetabilibus cordialibus & aromaticis abstractus, qui cum linteo multiplicato ad 3ij. præcordiis celeri manu applicetur. Hoc ipso æger, qui per quatuor noctes diesque pertinaci cholera suprâ & infrâ etiam generosissima remedia rejecit, curatus fuit. Conf. Henricus ab Ficer in *observat.* Vel

- ℞. V *camphor.* 3ij.  
*theriac.* 3j℞. ad 3ij.

M. pro epithemate ventriculi, S.

### Außerliche Magen-Mixtur.

Proficuum etiam est panis tostus vino generoso intinctus, & pulveribus aromaticis adspersus.

Si ex corruptione alimentorum nata sit cholera, in tali casu Sylvius *Præcos* l. 1. c. 15. §. 29. partim pro excretionem per superiora adjuvanda, partim inferiora versus promovenda, propinat vomitorium Gale, admisto laudando opiato; formula hæc est:

- ℞. *Oxyfacc. vomitiv.* 3ij.  
*laud. opiat.* gr. 8. l. gr j.  
 ▽ *mentha* q. f.

M. f. haustus.

Quod equidem propter vomitorii vim haud facile imitari jussit, potius ut temperarem, simulque abstergerem, serum lactis solum, vel cum 3j. alterave syrupi rosati aut violarum solutivi temperatum, vel blandum tamarindorum decoctum cum eo paratum, imprimis si adsit nimia sitis, cum temperet effervescentiam sanguinis, exhiberem, vel infusum blandum ex rhabarbaro, & bolum ex eodem cum conserva rosarum, exhibendo sudorem: item pulpa tamarindorum ad 3j. in sero lactis dissoluta non est frustranea. Applicantur etiam clysmata lenientia, cum theriaca imprimis admista, addendo 3ij. vel iij. theriaces uni clysmati ad imitationem Riverii l. 3. *observ.* 78. Loco theriacæ interdum permisceatur electuarium diascordii.

Si cholera sit à remedio purgante, ut exinde oriatur hypercatharsis, tunc vel solum sufficit laudanum opiatum, si cum vino bibatur: aut

- ℞. *Essent. theriacal.* 3ij.  
*opii* 3℞. ad 3j.

Mista propinentur ad gutt. 40. bis vel ter in die. Uti etiam notum est, quod theriaca à

(P 3)

3j. ad

3j. ad 3ij. ac theriacalia ratione opii præ cæteris in quacunque hypercatharsi convenient, in haustu vini generosi calidi, aut absinthitis assumpta: sicut Riverius *Cent. 2. Obs. 19.* habet observationem de cholera ex superpurgatione admodum periculosa, propinatis gr. vj. laudani opii exoptatè curata. Similiter idem Riverius curavit senem 70. annorum, propinando interdum decoctum plantaginis & portulacæ, de quo superius, cum syrupo cydoniorum & electuario diascordii ac confectioe alchermes, singulis noctibus exhibendo granum j. l. ij. laudani opii. Facit quoque c. 3. *obs. 78.* mentionem cholæræ cum tertiana febre malignæ curatæ præscripto clysmate ex jusculo cum confectioe alchermes ad 3ij. & theriacæ rec. 3j. deinde ad præcautionem semper duabus horis ante paroxysmum gr. ij. laudani opii propinavit, & sic præservavit & curavit. Simile exemplum habebitis in *Obs. 4. communicata à Pacheco.*

### ARTICULUS III.

#### De Lienteria.

**A**lvi fluxus auctos pertinet etiam Lienteria, i. e. intestinorum levitas seu diarrhœa assumptorum, quæ est, quando assumpta omnia, prout fuere ingesta, per alvum egeruntur: aut est talis alvi fluxus, in quo parum aut leviter aut omninò non immutata per alvum egeruntur assumpta, ita ut tunc referant exactè proprietates suas omnes.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta primaria est ipse stomachus, maximè pylorus. Si enim pylori orificium non ritè clauditur, dilabuntur alimenta ex stomacho, & tunc supervenit lienteria; quia non ad debitum tempus persistunt in stomacho. Cum verò in naturali statu ad legitimam digestionem requiratur, ut fermentum digestivum debitè dissolvat & alteret alimenta, ut stomachus convenienter eadem retineat, sanè ex contraria causa necessariò oritur lienteria.

#### CAUSÆ.

Causæ ergò lienterix sunt investigandæ vel in fermento stomachali non dirigente, vel in pyloro non retinente. Nempe

1. Succus stomachi fermentativus, aut omninò deficiens, aut iners; aut excrementis variis impeditus, lienteriam efficit.
2. Quando pylori tanta est laxitas, & econtrà reliquarum stomachi partium tanta irritatio, ita ut non debitè retineat, quin potius assumpta per pylorum dilabuntur, quàm revera excernantur,

etiam lienteria oriri solet: idque, uti dixi, in specie, quando cum hac pylori laxitate vel levissima conjungatur stomachi irritatio aut molestia.

Prior lienteria vulgò dicitur oriri à facultate concoctrice læsa: Posterior verò à retentrice labefactata & expultrice irritata.

Ad has duas causas proximas collimant cæteræ remotæ, ventriculus & pylorum ad irritationem & laxationem disponentes. Illustrant hoc observationes Authorum: Sic Forestus *l. 22. obs. 30.* Lienteriam observat admodum contumacem, ortam ex ulcere ventriculi. In hoc enim non tantum fuit notabilis alteratio succi fermentativi stomachi, & ob id imminuta digestio, sed præterea etiam stomachus ab ulcere doloroso continuo irritatus quolibet assumpta sui contractione mox deinde ejecit: curatum tamen fuit hoc ulcus & per consequens etiam lienteria, (1) abstergendo & mundificando per  $\nabla$ m mulsam; item per decoctum hordei cum melle rosaceo: postmodum (2) consolidando cum decocto radice symphyti majoris cum  $\nabla$  Lemnia vel alia sigillata propinata, vel cum lacte vaccino, item pulvere equiseti. Sic lienteriam ex irritatione stomachi, ab acriore humore in eodem retento ortam, Gabelchoverus *Cent. 2. Obs. 47.* observavit, dum refert exemplum cujusdam, qui borborygmis & debilitate stomachi non nihil affectus, omnia potulenta in ea forma, qua assumpsit, per alvum denuo egressit: curatus tamen fuit per abstergentia & temperantia, imprimis serum lactis.

Porro inter remotas causas crebrior & nimius potus etiam subinde ad lienteriam disponit, idque propter relaxationem nimiam stomachi, præsertim pylori, oriundam: Amatus Lusitanus *Cent. 6. Cur. 7.* lac, prout desumptum, ejectum observavit, quam lienteriam ex nimio muco in ventriculo putat, & per oxymel cum speciebus hieræ picræ & rhabarbaro curavit. Sic Deodatus in *Valetud. p. 28.* puellam nimis siticulosam & bibulam ex nutrice bibula lienteriam affectam ex relaxato pyloro in hoc malum incidisse refert. Denique scorbutus non rarò secum conjunctam habet lienteriam, primùm observante Barbette in *Praxi*; cum tamen continuo in praxi occurrat, ut excrementa à talibus assumpta, sicut fuerunt ingesta excernantur. Malum est difficile & admodum contumax in scorbuticis, & originem ducere videtur ex irritatione stomachi ex  $\Theta$  acri scorbutico; vi. <sup>1.</sup> Molinet-*Exercit. anatomico-pathol. l. 2. c. 4. p. 281.* Tandem ab errore externo, & assumptis fructibus horæis interdum periculosa evenit lienteria, in quo observatum est, quod potus parum immutatus redditus fuerit, quæ



quæ sæpè est lethalis; innuit enim fermentum stomachi planè deletum ab ipsis assumptis, diarrhoeam excitantibus.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica; res est aperta.

Ut autem causas distinguamus, notandum, quod in illa, quæ ex digestionestomachi debilitate oritur, semper sit halitus foetidus & acidus, appetitus dejectus, flatus stomachi, murmur abdominis, & similia.

Quæ à laxitate pylori, ex causis antecedentibus, & proximarum reliquarum denegatione colligitur.

Quæ verò ab irritatione, ex mordicatione, rosione & ardore ventriculi, & acrium per superiora ac inferiora rejectione dijudicatur: quibus accedunt acrimoniæ scorbuticæ, similiæ in toto signa.

### PROGNOSIS.

Prognosis quod concernit:

Lienteria scorbutica est malum periculosum, difficilis curationis, & facilè recidivans: imò si graviores morbos excipiat, ut plurimum lethalis evadit: vid. Barbette *Prax.* l. 4. c. 3. §. 6.

Lienteria periculosa est in prægnantibus.

Lienteria diu durans, uti tandem atrophiam & tabem, ita summam virium prostrationem necessariò comitem habet; ut taceam, ad cachexiam quoque successivè eandem disponere.

Lienteria, quæ gravioribus supervenit morbis, sive acutis, in specie in febribus ardentibus, & malignis, sive chronicis est periculosa; & similiter lenta tabe ægrum interficit, quia difficulter curatur propter virium insignem dejectionem, quæ tamen deberent restaurari per assumpta.

### CURA.

1. Stomachum esse roborandum, & tam aromaticis quam moderatè acidis blandè adstringendum, ut ita fermenti stomachalis vigor redire queat, & pylori fibrarum laxitas restituatur: adeoque pro hoc scopo conveniunt omnia illa, quæ tam in anorexia quam aperijsa fuerunt insinuata.

2. Irritationem in stomacho maturè esse sistendam, tollendo acrimoniam humorum quorumcunq;, in specie Stomachum, & sopiendo ventriculi sensum: adeoque pro hoc scopo, quæ in vomitu, cholera, aut diarrhoea fuerunt laudata, locum invenient.

Pro quibus scopis feliciùs obtinendis, notandum est:

I. Quod in præsentia excrementorum ventriculi pituitosorum vel similium conveniant quidem vomitoria, eadem tamen admodum lenia. Fortiora enim vel quantitate vel qualitate, in specie oleositate nimia infecta, quæ veteribus fuerunt in usu, tonum ventriculi facillimè destruunt, aut certè malum irritant: quod si minus purgatio per superiora locum habeat, fiat levis evacuatio per inferiora; blandior nempe, & quæ præter vim absterfivo-laxativam simul nonnihil adstringit, & stomachum roborat: uti sunt aloëtica, rhabarbarum, panacea stomachi, myrobalani &c.

II. Si metus vel suspicio veneni adsit, ordinaria methodus relinquenda, & hoc per convenientem viam evacuandum, iisque per alexipharmaca, aut veneno per specifica resistendum. Quod pariter observandum, si lienteria ex fungis & aliis fructibus horæis copiosius assumptis, & facilè corruptibilibus, similibusque occasionibus externis contracta fuerit, ut appropriatis alexipharmacis obviam eatur.

III. Cavendum est juxta Forestum l. 22. *obs.* 22. in hoc fluxu à fortioribus purgantibus, uti etiam à magna eorum dosi, adeoque, quantum possibile, cum iis procedendum, quæ aliqualem adstrictionem alvi participant, utut in principio, præsentibus recementis fortius irritantibus, non statim ad ea procedere debeamus, quæ fluxum adstringunt. Convenit ergò inter laxativa rhabarbarum cum vino: Sic Helidæus Paduanus in *obs.* p. 126. puerum trium annorum, gravi lienteria affectum curavit per ℥j. rhabarbari cum succo cydoniorum vel vino ante cœnam exhibitum. Addunt etiam species hieræpicæ: pilulæ pariter mastichinæ conveniunt hoc in passu, quæ ex blandis purgantibus, stomachicis ac aromaticis sunt compositæ ad gr. xv. vel ℥j. tuto possunt ordinari; item pilulæ aloëticæ.

Medicamenta ergò, quæ ad lienteriam conveniunt, quod attinet, ferè sunt eadem, quæ suprà ad vomitum fuere laudata, iisdem simul observatis cautelis, sunt quæ omnia stomachica blandè acida, & aromatica: qualia sunt v.g. absinthium, mentha, salvia, cinamomum, in specie cydonia, & omnia cydoniata, mespila condita, nux moschata & macis, galanga, zingiber, item corallia, solutiones & syrupus coralliorum Quercetani: unde refert Fabel in *Cur.* 65. de lienteria præmissâ purgatione, ∇ cinamomi & syrupo coralliorum. Hinc coralliata, & speciatim paulò elegantiores Ræ coralliorum, maximè sassafrata, in ∇ vel spiritu cinamomi propinata, conveniunt insigniter in lienteria, cum ratione participationis substantiæ coralliorum acre quodve temperent, & ra-

& ratione menstrui stomacho ut plurimum grata sint. Præterea convenit zingiber in India conditum, uti & ovis moschata in India condita, item myrobalani condita; potenter enim adstringunt. Elyxir proprietatis, tam commune legitimè paratum, quàm sine acido, non est inelegans. O etiam legitimè applicatum aliis irritis valet in quacunque viscerum laxitate, & à Petrazo in *diff. Harmonica* laudatur ceu singulare, & præsentissimum remedium in hoc affectu, pulvere tenuis cum aliis in liquida aut sicca forma; mistura supra in vomitu commendata, & hic notanda. Optimum est O dulcificatum: Sic priapus cervi & tauri insigniter conveniunt, si pulverisatæ à ʒʒ. ad ʒj. in vino medicato propinentur. Vinum quoque absinthites chalybeatum convenit, aut vinum infusionis absinthii, melissæ, pullegii, menthæ, &c. legitimo usu erit proficuum. Forestus l. 22. obs. 28. refert lienteriam desperatam, ex qua orta macies, curatam aliis irritis hoc remedio: exhibuit nempe vitellum ovi pulvere nucis moschatæ unius insperso, super regulam ignitam, seu calefactam assatum: unde loco hujus euporiston Helmontii ad diarrhœam ex vitello ovi unico vel duobus ad duritiem coctis, cum pulvere nucis moschatæ & aceto rosaceo etiam locum inveniet, cujus usum felicem & ego in diarrhœis observavi. Tandem succus citri, cydoniorum, &c. cum aqua cinnamomi, miva etiam cydoniorum aromatica cum pauca & sigillata mista, & hinc leviter aliquot guttis spiritus vitrioli irrorata similiter laudatur; item conserva rosarum blata cum terra sigillata vel cum theriaca mixta, lienterias curat.

Quæ irritationis sensum tollunt, sunt theriaca & theriacalia, laudanum opiatum & omnia opiata, item electuarium diascordii Fracastorii. Ex his facile est plura componere. Facit huc inprimis Electuarium Sennertini. r. in sua Praxi, ubi de lienteria p. 295. quod est expertum: vel

ʒj. Conserv. menth. vel rosar. probè blata ʒiij.  
Theriac. opt. l. loco hujus diascord. Fracastor. ʒij.  
℞ destill. mentha gutt. vj.  
cinnam. gutt. iij. l. jv.

c. Miva cydoniorum aromatizata, aut succo cydon. f. Electuarium.

Cui etiam addi potest & sigillata, vel alia similis à ʒij. ad ʒj. pro lubitu, S.

#### Magenstärkende Lattwerge.

De hoc detur crebrò portio nucis juglandis vel castanæ ad instar, donec lienteria cesset: & simili forma, ex Amato Lusitano desumpta, Riverius felicitèr est usus: vid. *Pr. Med. lib. 10. cap. 4.* Amatus Lusitanus *lib. 2. cap. 56.* hoc solo senem lientericum curavit. Panis biscoctus in V maceratus, & hinc theriaca illitus & comestus etiam convenit in lienteria.

Aliquando cuidam in lienteria scorbutica præscripti sequens Electuarium:

ʒj. Corall. r. præp.  
& sigillat.  
lapill. ℞ præp. aa. ʒj.  
℞ ci gr. xv.  
Galang.  
Zingiber.  
Cubebar. aa. ʒʒ.  
Miva cydonior. aromatiz.  
succo cydon. ana q. f. f. Electuarium molle: D. S.

#### Magen-Lattwerge.

Vel ʒj. lapill. ℞ præp. ʒij.  
corall. r. præp.  
ʒij diaphor. aa. ʒij.  
℞ vol. C. C. ʒj.  
℞ destill. maris.

mentha aa. gutt. vj.

M f. pulvis.

Dosis ʒj. manè & vesperi.

His etiam laudanum opiatum addi potest.

Denique ~ mastichis, decoctum mastichis cum aliis mixtum; ejus ~ acidulus, syrupus mastichinus Timæi von Guldentlei/ quem in *Epistol. 456.* describit, cum & destillato menthæ & cinnamomi, & omnia similia in vomitu usitata, optimè hic conducunt. Præter communia adstringentia, ut sunt mastix, & sigillata, tunica interna stomachi gallinacci, &c. commendatur præ cæteris coagulum leporis & hœdi siccatum, & ad ʒj. propinatum. De aliis adstringentibus, ~ salis, liquore styptico, ceu notis, non est ut multa dicam; observandum saltem: an magis tonus stomachi roborandus appropriatis adstringentibus? an magis acre vellicans abstergendum & temperandum?

Externè in laxitate stomachi, ut debitus ejus tonus restituatur, convenit sacculus sequens pro foru:

ʒj. Com. absinth.  
HB. mentha aa. mj.  
flor. chamomill.  
rosar. r. a mʒ.  
caryophyll.  
nuc. moschat. aa. ʒj.  
zedoar.  
zingib. aa. ʒʒ.

Includantur iacculo interpassando, qui in vino coctus vel maceratus tepidè ventriculo admoveatur, & subinde repetatur.

ʒj. Com. absinth.  
HB. major.  
mentha aa. m. j.  
chamon. e. fl. m. jv.  
mastich. ʒij.  
caryophyll.  
nuc. moschat. aa. ʒʒ.  
zedoar.  
zingib. aa. ʒj.

Saccu-

Sacculo interpassato inclusa S.

Magen: Säcklein.

Ebulliat in vino, & crebrò applicetur stomacho. Qui si non suffecerit, plura externa applicanda, suprà in appetitu prostrato, chylicatione læsa, & vomitu lauclata. Cataplasma ex fermento & pulveribus aromaticis suprà in vomitu laudatum, hic & in quibuscunque affectibus stomachi maxime locum habet. Formulam quoque videre potestis in *Colleg. Jonstoniano* Michaelis: sicut & emplastrum stomachale de laudano Cratonis vel solum vel mistum unà cum tacamahaca & balsamo Peruviano, de quo superius egregium est contra lienteriam. Rulandus recipit solum micam panis, eamque aceto imprægnatam regioni stomachi non absque successu applicat.

## ARTICULUS IV.

De

*Cæliaca.*

**C**œliaca affectio propriè insinuat vitium ventriculi, male chylicantis, & cruda nunc deorsum, nunc fursunt, nunc per utramque viam deicientis, adeoque lienteriam, subversionem ventriculi, choleram, sub se comprehendit; si secundum primam impositionem & genuinum usum applicare velimus rebus sua nomina. Vulgo vero audit cœliaca passio, quando nempe alimenta assumpta quidem digeruntur in stomacho, sed digesta sub forma chylosa cum excrementis unà per alvum excernuntur; quam tamen Riverius lienterix saltem gradum remissiore credidit.

Duplex hujus cœliacæ, annotante Sylvio *Pr. l. i. c. 13. §. 3. & 4.* fiendi est modus.

1. Quando chylus non secernitur à fecibus alvinis in intestinis, sed simpliciter, prout ex stomacho solet dilabi, sine alteratione foras emittitur, cum debilitate ægri & insigni languore virium; unde excreta grisea, plus minus albicantia chylosa invicem permixta apparere solent.
2. Quando fit quidem secretio chyli ab excrementis, cæterum propter defectum distributionis chyli hic quidem secretus, tandem cum excrementis confusus nihilominus excernitur.

Priore passionis cœliacæ species fit vitio bilis, dum ad intestina non deferatur, ut ibidem possit instituere secretionem istam, h. e. quando bilis in intestinis deficit, quod fit in icteri ista specie, in qua obstructus est porus choledochus: nam solus succus pancreaticus non potest perficere chylum, aut debitam secretionem instituere sine bile, aut deferatur licet bilis ad intestina, si tamen hæc est iners,

Tom. II.

& in sua crasi vitata, i. e. non sufficienter *Sina* acris, sed potius tantummodò oleosa ac nimis pinguis, aut potius nimis serosa vel aquea, tunc similiter nulla excrementorum à chymo nutritivo potest fieri separatio, hujusvè debita perfectio; unde vel cœliaci fluxus species emergit.

Posterior cœliacæ species fit, quando nulla distributio fit, quia obstructa aut infracta sunt officia vasorum lacteorum in intestina hiantium, & mucosita. In perfecto tamen cœliacæ affectionis gradu dolores ventriculi, febris, jectigatio, anxietas, &c. à pastu brevi post urgere solent. conf. Fernelius *Pathol. p. 305.* & *Pharos Medicor. p. 414.*

### CAUSÆ.

Causa proxima prioris est obstructio vel infarctus dictorum ductuum, sive à calculo sive à mucositate, sive ab alia re.

Causa proxima posterioris est obstructio vel infarctus vasorum in intestina tenuia hiantium.

In his autem cœliacis fluxibus ventriculus ut plurimum est salvus, quia chylus perfectus excernitur: uti hoc observant Frambesarius in *Consil. l. i. §.* Interdum enim fit legitime digestio prima, licet secunda vitietur: sicut taliter affecti non raro insignem habent appetitum, quod observat Forestus *l. 22. obs. 26.* in muliere, in qua appetitus adhuc fuit salvus. Interim tamen hoc non universaliter adeo asserendum; quin nunc magis nunc minus salvus videatur: id quod docet curiosa observatio 76. *M. A. N. C. ann. 4. & 5. p. 63.* ubi quidam post cujuslibet generis carnum esum fluxum chylosum patiebatur: In hac nempe carnes, quia non bene in chylum perfectum digerendo transmutabantur, sed probabiliter nidoroso sapore corrumpebantur, etiam inde factus chylus separationi ac perfectioni ulteriori in intestinis ineptus, fluxum chylosum concitabat. A piscibus nihilominus etiam durioribus, tam recentioribus, quam Stitis & fumo induratis, non idem patiebatur, quia sine dubio ventriculi fermento magis appropriati, & hinc melius digesti fuerunt. Vitium ergò totum fluxus cœliaci est vel in ipso chylo malè digesto, adeoque inepto subeundæ alterationi bilis, vel in ipsa bile non secernente, vel in poris intestinorum non admittentibus chylum.

Causa remota est omne id, quod folliculum felleum aut cholodochum obstructum, aut mucum copiosum in intestinis facit: sic officia vasorum lacteorum aut à mucositate obstruuntur, e. g. in infantibus aut senibus, quibus malum hoc satis frequens est; aut à coarctatione & cicatrice intestinorum post diuturnos alvi fluxus, præsertim dysentericos, hinc membranz intestinorum interioris erosionem consti-

(Q)





Quidam commendant adstringentia, sed non conveniunt, potius malum exasperant. Frambesarius loco supra cit. ceu specificum commendat priapum cervi.

Quod attinet externa in cæliaca: parum aut nihil operantur, nisi concurrat vitium ventriculi in chylicatione læsa, in quo casu applicari possunt, quæ suo loco dicta.

## CAPUT III.

De

*Expulsione contentorum alvi depravata.*

### ARTICULUS I.

De

*Dysenteria.*

**N**ON raro depravatur alvi fluxus in excretionibus dolorosis, quando præter chylum aut similia ex alvo ejicitur sanguis, æquè ac pus seu sanies, cum ventris dolore ac torminibus, quas inter primatum ducit Diarrhœa cruenta, aut secundum legitimum veterum usum dicta dysenteria.

In genere quicunque alvi cruentus fluxus secundum Veteres, Hippocratem, & coetaneos aut successores ejus, dysenteria appellari solet, solis hæmorrhoidibus exceptis, quibus adhuc stat sua autoritas, unde in hoc generali sensu apud Veteres tres sunt gradus sive potius differentię dysenteriarum.

I. Prima differentia est, quando sine intestinorum vitio, motu & impetu naturæ, ex quacunque causa sanguis bonus in toto corpore abundans ex venarum orificiis in intestinis apertis effunditur, & per alvum excernitur: differens saltem loco effluxus ab hæmorrhoidibus, in quibus saltem venæ ani aperiuntur: in hac verò dysenteria etiam reliquæ, ad superiora intestina secundum totam eorum longitudinem, perque omnes eorum anfractus, distributæ. Talis dysenteria interdum evenire solet iis, quibus aut membrum aliquod amputatum fuit, e.g. pes, brachium, &c. tunc enim non potest non abundare sanguis in toto corpore: quale exemplum refert Hildanus in *Obs. Cent. 2.* aut in quibus solennes evacuationes sanguinis suppressæ, sanguis per alvum sibi viam quærit, v.g. mulieribus, quibus supprimuntur menses; non raro talis diarrhœa cruenta supervenit hominibus spleneticis aut melancholicis; item quibus vomitus cruentus, etiam interdum talis diarrhœa cruenta familiaris est. Pertinent huc dysenterię notæ scorbuticorum, de quibus vide Horstius in *suis obs. l. 7. obs. 35. p. 393.* dum scorbutici sæpius sanguinem excreverunt, qui neque hæmorrhoidalis neque diarrhœa genuina fuit, sed diarrhœa nota ex anastomo-

Tom. II.

si vasorum in intestinis orta. Sic pariter ex ulcere mesenterii interdum diarrhœa cruenta oriri solet: talis sanguinis excretio item est usitata iis, qui laborant, ut ut raro, ulcere pancreatico, quale Sylvius in *Pr. observavit*, quod ulcus apertum interdum pus, interdum autem non parum sanguinis effudit. Pertinent huc etiam dysenterię criticę singulares: de quibus vid. Rhodius in *suis Observationibus* quales nullus Autorum unquam observavit.

II. Secunda species dysenterię est iste fluxus, quo sanguis tenuis & aquosus, & loturæ carniū similis, uti appellant, sine dolore excernitur, quod propter hepatis imbecillitatem fieri dicitur, & aliàs fluxus hepaticus appellatur; quia falsò præsupponunt oriri vitio hepatis non ritè sanguificantis. Tacebo jam de hoc, est enim reverà nil aliud, quàm aperiatio vasorum internorum sive superiorum hæmorrhoidalium.

III. Tertia species dysenterię est, quando ob vitium intestinorum ipsi modicum cum insignibus torminibus, & cum muco albescente, hinc cum purulenta materia, sanguis ejicitur, quæ tertia species κατ' ἐξοχήν dysenteria dicitur, prout hodiè id nominis venit; estque nil aliud, quàm diarrhœa cruenta torminosa, sicuti reliquæ diarrhœæ cruentæ fere semper sunt absque torminibus.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta in dysenteria sunt intestina, nunc crassa; vid. Spigelius *anatom. p. 179.* Panarollus *Pentec. 1. obs. 9.* & Bartholinus *Cent. 6. Histor. 2.* nunc tenuia, quod præsertim sectiones cadaverum, quales Barbetre *Pr. l. 4. c. 5.* & M. A. N. C. *ann. 3. obs. 116.* testantur, disparitas quædam signorum, de qua in diagnosi diceretur, credere jubet; nunc conjunctim, quod Horstius *l. 4. obs. 20.* docet; quatenus scilicet ab objecto vellicantur, irritantur, & ~ insitus incandescit.

### CAUSÆ.

Causa dysenterię est vel efficiens proxima formalis, l. materialis sive occasionalis; illa est ~ influus, sed occasione dolorosa ad p. n. impetum provocatus, & dolorum torminosorum & excrementorum, sanguinis ac mucii profusionis primus artifex.

Sed misso hoc, ceu causa universali, causa imprimis particularis seu occasionalis irritationis talis consideranda venit. Hoc est acré quodcunque internum, pertinaciter intestinis adhærens, eaque in tantum continuo vellicans & stimulans, ut propter irritationem continuam tandem sanguis effluat, idque cum insigni dolore: ab acri objecto enim intestina membranosa vellicata & puncta se contrahunt, unde tormina, cum ad locum læsum fiat uberior sanguinis affluxus, & per læsionem vasa aperiuntur, & sanguis profun-

(Q 2)

datur:

datur: e. g. qui acrioribus sternutatoriis utuntur, post crebram sternutationem sanguinem emungunt. Optimè sciendi modum dysenteriae ostendit hypercatharsis, quod purgantibus acribus, v. g. antimonio, propinatis violenta fiat vellicatio, quâ intestina spasmò afficiuntur, & sic hypercatharsis cruenta supervenit.

Acre autem hoc in specie est acidum membranis intestinorum nervisque inimicissimum: unde v. g. mulieres hystericæ, acrioribus, acidis & erodentibus succis turgidæ, & quæ aliàs vel systema nervorum sensibilius obtinent, aut affectibus intestinorum spasmodicis obnoxie sunt, mediocribus etiam purgantibus facillè graves dysenterias incurrunt, unde quodcunque acre fortius intestina vellicans, simulque plus minus sanguinem & reliquos inde derivatos succos exagitans, facillè dysenteriam excitare potest. Novi bina exempla in hystericis, quæ habuerunt systema nervosum intestinorum sensibile, quod gravem dysenteriam incurrerint.

Porro, ratione hujus causæ materialis distinguenda est ante omnia dysenteria, dum alia est sporadica, alia communis, hæcque vel endemia, vel epidemica; alia est benigna, alia maligna, & omnis epidemica solet esse contagiosa & nunc cum, nunc absque febre affligere.

Dysenteria benigna oritur ex acri quocunque, frequentius tamen ex acido plus minus corrosivo, intestina potentiùs irritante, & plus minus excoriante, & ita tormina & sanguinis effluvium excitante; sive oriatur ex assumptis talibus, aut corruptis, aut in acorem peregrinum degenerantibus, sive ex succo pancreatico nimis corrosivo, vel per se tali, quando non temperatur sufficienter à bile, vel propter irritationem à purgantibus copiosius in intestina effuso. Nil enim magis est inimicum partibus nerveis & intestinis, quàm frigus & acidum, unde, si tale quocunque errore ad intestina pervenerit, membranas nervosas rodit, excoriat, & ad sanguinis profusionem disponit. Rara nempe est dysenteria benigna, quæ sit vitio sanguineæ massæ, sed ferè tantum ex contentorum in intestinis corruptione & depravatione. Hinc notum est, quod imprimis fructus horæi, qui facillimè corrumpuntur, & corrupti, vel in corpore alterati & non ritè digesti, intensum & fortem acorem contrahunt, dant dysenteriam: quos inter fructus pepones, melones imprimis & cucumeres eminent, uti etiam pruna cerea, *die Spillinge* / quæ ipsa non paucos dysentericos reddidisse refert *Forestus l. 2. observ. 23*. *Sennertus in Praxi*, & *Mœbius in institutis*. *Saccharum*, item cibi dulces & melliti, in stomacho corrupti, imprimis in hypochondriacis

aut hystericis, in quibus subjectis viciosa fermentatione vel nimis acescunt, vel sui miscela cum bile orgasmum excitant, & camarinam nimis movent, dysenteriam interdum inferunt: Eius item uvarum nimius, uti etiam musti, plus minus fermentando & acescendo facillè ad dysenteriam disponit; nam mustum corruptum similiter acescit: Purgantia etiam fortiora, uti & aut colocynthis, aut similia, irritando acrius & vellicando intestina, & ita acrium succorum ad ea derivationem promoventia, dysenteriam non rarò inferunt, ordinariò in subjectis systematis nervosi subtilioris: Etiam vivus pro cura luis Venereæ extrà illitus dysenteriam interdum inferre observant Galli: sic ulcus pedum diuturnum curatum dysenteriam intulit lethalem: vid. *M. A. N. C. ann. 2. observ. 213. p. 314*. & vermibus quoque dysenteriam excitari, vid. *Riverius l. 3. observ. 3*. & *Bartholinus Act. Hafniens. t. 5. observ. 31*. sic & usu aceti in plumbeo vale asservati observata fuit dysenteria à Sennerto; vel etiam aquis in canalibus plumbeis diutius asservatis: Adamas devoratus nec minutissimè tritus dysenteriam infert, propter angulorum acutiem incidendo & perforando intestina; cum notum sit, solum vitrum non ritè comminutum tale quid præstare: vid. *Zacutus Lusitanus in l. 1. Prax. admir. observ. 18*. item *l. 2. observ. 18*. de dysenteria, tabe & morte ex adamante impolitò devorato. Sed dico: adamas non minutim tritus; aliàs enim minutissimè pulverisatus pro dysenteriae cura adhibitus fuit, uti refert *Wormius in Mus. p. 103*. Idem ex asperitate annuli deglutiti observavit idem *Zacutus Lusitanus* dysenteriam, quali dysenteriae plus crassa oriza mederi potest.

Hæ causæ, sive errore externo sive interno, inferunt dysenteriam benignam, in quibus peccat acidum acre intestina erodens. Sed hæc fuit dysenteria benigna, quæ non multum faceffat negotii.

Quoad endemiam dysenteriam, nullibi hujus mentionem factam observavi, præterquam in *Sydenham Observat. circa morbos acutos p. 247. §. 4. c. 3*. qui talis endemicæ Hybernorum dysenteriae mentionem facit.

Epidemicam quod attinet: hæc omnium frequentissima est, & autumnali præsertim tempore, aut hujus confiniis, solet affligere. Oritur ab acerrimo, intestinis specifico suo sapore insensibilissimo, eoque sub mole minima efficacissimo, adeoque saltem fermento subtili tot mala inferente. Hoc nunc acrius est, Galis aut helleborinæ vel colocynthidæ quasi profapix, nunc mitius: unde nunc maligna, nunc benigna, utraque insigniter contagiosa.

Maligna plus habet in recessu, & imprimis observanda vis ejus contagiosa, quæ se per

cont. 2-



contagium malignum mirificè in corpore humano propagat: non enim solum per sedes communes promptissimè inficit, sed etiam, quod observatu dignum est, per instrumenta clysterum potest alium inficere: teste Helidæo Paduano *Italo in Observat. p. 104.*

Exempla talium dysenteriarum epidemiarum plus minus malignarum sunt frequentissima, imprimis scripsit de hac la Moniere *de fluxu dysenterico epidemico*, it. Willisius *in Pharm. Rat. P. 1. p. 119. & 125.* it. Schenklius *in Observat. l. 6. Bartholinus cent. 2. histor. anat. 65.* non minus quàm Amatus Lusitanus *cent. 3. tur. 90.* & quidem talis dysenteria maligna non promiscuè quæcunque animalia affligit: nam dysenteria interdum in homines solum, interdum in bruta tantum grassatur, dum Salmuth *l. 3. observ. 55.* canes saltem & feles dysenteria contagiola maligna laborantes observat, quod rarum est. Oriuntur huiusmodi epidemicæ dysenterix ex causa externa plures affligente, in quorum corporibus exaltatum contagium fermentativè vi se multiplicat, imprimis præter Æm plus minus p. n. alteratum, & alimenta inquinantem, ex vtrum vitio, ac fructuum horarum corruptela & inquinamento. Sic dysenteria lethalis ex esu brassicæ capitatæ, noxio rore infectæ, refertur in *M. A. N. C. ann. 3. observ. 88. p. 143.* item post diuturnam siccitatem & ætatem squalidam, ubi rubedo corripuit fructus, aut miasma malignum exit ex terra, foliis arefactis instar arsenici adhærens: quale fuit miasma anni huius seculi 24. & 66. in quibus mirabiliter grassata fuit dysenteria, ubi post Æm squalidum fructus corrupti: Post Æm squalidum, & inde hinc ortam efflorescentiam candidam instar Os Saturni in canalibus plumbeis tectorum, superveniente pluvîa & flore isto ita abluto, ac vti inquinante anno 1644. dysenteriam pertinacem in Belgio ortam observavit Lindanus *in coll. privat. ad Hartmannum.* In consideratione huius dysenterix malignæ contagiosæ, cum omnia contagia consistant in miasmate fermentativo, massam sanguineam inquinante, & consequenter succos alterante, rectè arbitror sensisse Willisium *de causa dysent. tr. de febribus c. 10. p. 186.* quod scilicet talis dysenteria non oriatur ab humore aliquo vitioso in internis visceribus producto, qui acrimoniâ suâ corrodat, sed causam ejus esse miasma quoddam sanguini impressum, adeoque intimè ipsi confusum, inde ad intestina latum, iis imprimis inimicum, acrimoniam hostilem afferens, intestina irritans, vasorum oscula referans, & sanguinis excretionem faciens. Apud Practicos veteres, majorum vestigiis insistentes atque hypothesebus, observatur notata & alia dysenterix differentia, in intestinale & hepaticam, vid. *Pharos medic.*

p. 417. Hepatica illis videtur dici, cum vel spontaneo naturæ motu critico, vel coacto symptomatico, vel motu medio non naturali quasi ex venoso genere per modum despumationis, ut sic dicam, sordes recrementoſæ per hepatis ductus cholodochos rejiciuntur, à quibus læsa & irritata intestina dysenteriam contrahunt. Dysenterix hepaticæ exemplum subministrare videtur Horstius *l. 4. observ. 22. p. 181.*

Quod attinet progressum in dysenteria, est talis: In principio, dum dolores & tormina intestinorum urgent, excernuntur liquida albicantia, plus minus mucilaginosæ, seu mucus albicans, hinc sanies & pus cum sanguine. Unde prout nunc plurimum de sanguine, nunc plus de muco excernitur, dividunt vulgò dysenteriam in *die rothe und weisse Ruhr*: Sanguis, qui profunditur, non est præcisè ab excoriatione aut exulceratione intestinorum, ut vocant: nam utut hoc in benigna ab acrimonia succorum acido-corrosiva simpliciter oriunda locum habeat, in maligna tamen, & in qua tantillum saltem miasina acre, contagii medio propagatum, causæ proximæ vices obtinet, non opus est tali excoriatione. Sufficit ab istius contagii acerrima & intestinis inimicissima acrimonia continuò & tam fortiter stimulari intestina, ut hac ex irritatione & crebriori contractione tandem proprium cruorem fundant & exprimant, simili modo atque à pulvere sternutatorio fortius vellicantur nares, ut mucum crebriorem, & tandem largam hæmorrhagiam fundant, ita ut cruoris profusio sit saltem consequens, & effectus alterationis in intestinis: nempe spina alicubi infixa ex doloris occasione affluxum sanguinis uberiores, indeque, ubi denegatur hæc excretio, tumorem facit. Similis spina & tantillum acre alicubi rodens in benigna, vel miasma virulentum intestino hostile in epidemica & maligna; hinc vellicatis intestinis, & horum repetiti spasmi, & insignior sanguinis fluxus excitatur, unde tumentibus sanguine intestinis eadem rubent, & non raro inflammantur, & per aperta partim, partim erosa vasa, cruorem profundunt.

Nempe hoc est indignatio archæi Intestinalis, seu spiritus insiti, cruorem proprium furiosè profundentis, ex irritatione ab occasionali fermento, uti loquitur Helmontius, acris, intestinis insigniter hostili, unde & tormina, & sanguinis per anum profusio, aut muci extravalatio, copiosè superveniant: hinc etiam rectè dicit: quod dysenteria à pleuritide tantum differat in radice seu loco affecto, cum quoad causam convenient.

Mucus hic sub cursu morbi interdum est valdè copiosus. Multi admirantur, unde sit  
(Q 3) non

non sanies est, aut pus; utut sint, qui dicunt: quod nihil aliud sit, quàm pituita, quæ naturaliter oblinat parietes intestinorum; quod tamen non potest esse propter nimiam & excessivam, quæ subinde excernitur, ejus quantitatem, pro qua capienda intestina ipsa interdum non sufficerent. Probabilior videtur Heliontii sententia, qui dicit: destillare mucum talem ex intestinis læsis, & esse nihil aliud, quàm nutrimentum intestinorum irritatorum proximum, sed depravatum, aut frustra intestinis infusum: simili modo enim pars exulcerata plorat liquorem, qui nihil aliud est, quàm nutrimentum istarum partium; ita nutrimentum hoc cum intestinis læsis, excoriatis & exulceratis assimilari nequit; ex parte læsa nunc sub forma muci, nunc saniei, nunc puris in cavum eorum destillat, prout diversi sunt gradus corruptelæ hujus alimenti proximi: jam sæpè sanguinem una effundunt loturæ carnum similem.

Tres autem gradus in hac dysenteria imprimis observandi sunt:

1. Quando tantum adsunt atrocia tormina cum excretionem mucosa & cruenta.
2. Quando cum torminibus copiosus mucus plus minus p. n. & cruentus excernitur, quemque vulgò dicunt esse abrasionem aut aliqualem excoriationem intestinorum.
3. Quando in tantum suscepit malum augmentum, ut jam in intestinis læsis sequatur perfecta exulceratio.

Quod in graviore dysenteria pus generetur in intestinis, patet ex anatome: non enim tantum in intestinis, sed & in glandulis mesaraicis pus copiosum colligitur & abraditur. Ista autem abrasio iterum est triplex, secundum ista nempe, quæ una cum mucosâ interdum excerni observantur:

1. Quando saltem interiora velamenta bombycina, seu crusta ista, quæ intestinorum carni obducitur, abraduntur.
2. Quando jam aliquid de intestinorum tunica crassa abraditur. Hippocrates vocare solet ramenta intestinorum in *sect. 7. aphor. 67.*
3. Quando jam ipsorum intestinorum substantia crassiuscula sive caro quasi frustulatim eroditur, & tunc exeunt carunculae, ut dicit Hippocrates *sect. 4. aphor. 26. & 31.* qui tertius gradus est acerbissimus, & mortiferum signum.

Carunculae tales, quarum passim apud autores fit mentio, quid sint? explicatu obscurum est. Sanè substantiæ intestinorum membranosa non videntur esse, potius glandulae intestinales tumefactæ, & morbi progressu à substantia intestinorum separatæ, & ita excreta carnum sive molecularum carnosarum speciem referentes.

Tandem: an sit exulceratio in intestinis dysenteria affectis? uti vulgò alleritur, merito dubitatur; & rectè hoc negat Holderhofius *tr. de err. medic. p. 33.* ex eo, quod alias dysenteriae cura per specifica tam citò fieri non posset: ut taceam, tantum non impossibilem curatu videri talem exulcerationem, cum aliarum partium membranarum exulcerationes, ut laryngis, item fistulae ani, sint ut plurimum incurabiles. Ergò non, nisi in diuturniore dysenteria, eaque graviore, tandem excoriatio, & forsàn aliqualis exulceratio, locum habebit, quæ in ordinaria non statim statuenda erit.

Dolor acerrimus, qui torquet dysentericos, non est promiscuè & simpliciter ex corrosione aut exulceratione intestinorum, utut hæc videatur totalis causa; sed ferè maxima ex parte est ex convulsione & corrugatione spasmodica intestinorum, quæ intestina irritata spasmò quodam correpta se convellunt & contrahunt, & motu quasi vermiculari se torquent. Tormina hæc ordinariò præcedunt excretionem, nisi intestina gangrænata sint, quando sub ista spasmodica contractione intestina simul propellunt, & ulterius cogunt contenta, & ita ad excretionem stimulant.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica ex dolore & excretionem imprimis desumuntur.

Dysenteria nempeprehendit ægros cum insignissimis intestinorum doloribus & torminibus: subsequuntur dejectiones, & quoties dejectur alvus, ingens cruciatus & intestinorum depressio cum dolore, & molestissimo viscerum omnium quasi descensu, adest: dejectiones non sunt stercorosa, sed variarum rerum, nunc simpliciter mucosa, nunc intermixta sanguinea, nunc simpliciter sanguinea, quæ aggravescente morbo fiunt putrilaginosæ, & interdum membranarum speciem referunt.

Quando sanguis simul excernitur plus minus dysenteria cruenta, *die rothe Ruhr* appellatur: si verò mucosa superabundant, aut solitaria sint, in specie dysenteria alba, *die weisse Ruhr* vocatur.

In maligna sæpius est conjuncta febris plus minus intensa, eaque interdum petechialis, lingua subalbida mucilagine densè obsita, & si vehementius æstuet corpus, nigra etiam & sicca observatur, una cum summa virium prostratione: ægri sunt anxii & inquieti, sitiunt insigniter, subindè procedente ulterius morbo sanguis sincerus copiosus confestim effluit: id quod corrosionis majorum aliquot vasorum in intestinis & mesenterio argumentum est. Nonnunquam intestina inflammantur, indeque gangræna incurabili afficiuntur, aphthæ interdum fauces obsident, imprimis, quando adstrin-

adstringentibus intempestivè adhibitis suppressa fuit dysenteria, afficitur successivè simul intestinum rectum, unde ordinario dolorosissimum tenesmus patiuntur ægri: supervenit non rarò ani procidentia, appetitus prostratus, interdum nausea & vomitus urgent ægros: non rarò succedit singultus tanquam pessimum signum, & vigilia, ut etiam interdum deliria, & tandem quoque lethales convulsiones superveniunt. Grassatur communiter in incolas instar pestis, estque contagiosa, seque tunc temporis sub forma febris malignæ multiplicat.

Causarum signa partim ex excrementorum conditione, partim à signis humorum in corpore abundantium, partim à vitæ genere, v. g. militari, ac diata, similibusque circumstantiis petuntur.

An maligna & pestilens sit? colligitur ex eo; si commune fuerit malum, pluresque cum symptomatis malignitati propriis, v. g. anxietate præcordiorum, petechiis, &c. moriantur.

Ante omnia autem pro meliori cura sciendum est: an tenuia an crassa intestina afficiantur? denunciant hoc locus & modus doloris, tempus exitus excrementorum, & horum varia mixtio. (1) Locus doloris arguit tenuia intestina affecta, qui est circa & infra umbilicum, ubi situm ileon & jejunum: in crassis vero affectis est magis circa latera infra & juxta stomachum, secundum nempe coli ductum. (2) Quoad modum doloris: hic longè vehementior est effectus intestinis tenuibus, ac si cultris hinc inde discinderentur, aut quasi aciculis pungerentur; qui econtrà dolor remissior & nonnihil obtusior est in crassis. (3) Celer excretio post dolorem crassa intestina affecta; tardior verò excretio tenuia intestina labefactata arguit, eò quod à loco affecto ad podicem longior via sit: (4) Si tenuia afficiantur, permixta magis & confusa invicem sunt excrementa, stercus, sanguis, & mucus, propter longius iter, quod mutuò conficiunt: in crassis verò intestinis minus sunt confusa, sed potiùs adsunt aperta vestigia distinctionis à se invicem. (5) Tenuia affecta magis ad vomitum stimulant ægros, præsertim quo propiùs respectu ventriculi afficiantur: crassa minus, undè & anxiosi magis sunt, & pejus se habent ægri in tenuibus affectis, quàm in crassis. Consultatur quoad hoc punctum & prognosin in dysenteria Sennertus, qui satis est accuratus, & Riverius.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin:

Benigna minus est periculosa, maligna periculosa.

Quo magis tenuia afficiuntur intestina, eò periculosius laborat æger, & econtrà,

Considerandum etiam; an dysenteria habeat febrem? item an adsit vomitus? Sanè omnis dysenteria, præsertim epidemica, cum febre juncta periculosior esse solet, quàm quæ sine febre; & quo magis acuta & malignior hæc fuerit: si, undem & petechiæ in febribus talibus observatæ fuerunt.

Indysenteria quasi pestilentiali eò periculosius laborat æger.

Ista dysenteria, quæ cum vomitu affligit, & cui fere se adungere solet singultus, est deterima; cum periculum sublit, ne ipse stomachus plus minus affectus sit: Quo magis enim affligitur stomachus cum cibi fastidio, eò periculosior est: si non adest vomitus, & ægri alimenta assumunt cum appetitu, talis non est lethalis, nisi culpâ medici fiat.

Dysenteria, in quibus excreta sunt viridia, nigra aut varia, aut admodum graveolentia, sunt pessima: item dysenteria, quæ ab atra & porracea bile, ut vocant, incipit, nulla præcedente febre, nec coctionis signis apparentibus, exitiosa est, teste Hippocrate *sect. 4. aphor. 22. & 24.* & Fontanò *in methodo generali p. 62. & 77.* propter corrosivum acicillimum succum, valde erodentem intestina; item quæ à dejectione biliosa aut æruginosa, hinc magis erodente: vid. Hippocrates *sect. 7. aphor. 23.* Omnium tamen crudelissima videtur, quæ à pituita acida atque Æsa, utpote qui humor ratione tenacitatis difficilè abstergitur.

Si dysenterix ructus superveniat, vel crepitus ventris, bonum signum est, scilicet redeuntis suo modo fermenti digestivi.

Econtrà convulsiones ac deliria, dysenterix supervenientia, mortem ut plurimum significant.

Si à dysenteria laborantibus veluti carunculae deiciuntur, lethale est: teste Hippocrate *sect. 4. aphor. 26.* ut plurimum quæ profundius ulcus denotant: vid. Sennertus *Prax. l. 3. p. 2. sect. 2. c. 7. p. 334. & 337.*

Dysenteria indolens sæpè mali est ominis; *σύνχωρις* enim seu gangrænam intestinorum, indeque inductam insensibilitatem ostendit. Conf. *de dysent. epidemica quorundam indolente M.A.N.C. ann. 2. observ. 43. p. 82.* item Bartholinus *Actis Med. Hafniens. vol. 2. p. 138.* Rhodius *cent. 2. observ. 88.*

Quando adest tenesmus in dysenteria cum hiatu ani, ita ut clysteres injecti statim elabuntur, aut cum tanta podicis adstrictione, ut nihil possit intromitti; certum plerumque est mortis signum; vid. la Moniere *tr. supra cit. c. 5. p. 164. & 191.* Nempe hic tumor, illic paralytica constitutio intestino recto inducta ex virtutis animalis prostratione adest.

Dysenteria, si est symptoma febris malignæ aut variolarum, periculosa est, & fere lethalis.

Dysen



Dysenterix superveniens febris, aut quæ aderat, si intenditur, malum est; quoniam inflammationem aut insignem intestinorum corruptelam ostendit.

Lienteria superveniens dysenterix diuturnæ, est admodum mala.

Aphthæ dysenterix supervenientes, plurimum lethale sunt indicium.

Gravida cum dysenterico tenesmo correpta, frequentius abortum patitur; idque cum periculo, imprimis si grandior fuerit fœtus. Interdum tamen dysenteria gravidis ante partum salutaris observata fuit: teste Boresto *l. 22. observ. 34.* item Amato Lusitano *cent. 2. observ. 51.* quia post partum plerumque hac liberantur: testante Hippocrate *sect. 2. prædictor. text. 30. & l. 5. epidem. text. 33. l. 7. epidem. text. 49.* & Sennerto *Prax. l. 3. p. 243.* per bina exempla hoc comprobante. Sit autem benigna, non maligna, non nimis gravis & non longè ante partum; aliàs est periculosa, & mors in olla: epidemica tamen gravidis non lethalis observata fuit in *M.A.N.C. ann. 3. observ. 17. p. 22.*

Dysenteria cum oris amarore vel vomitu bilioso in principio malitiosissima esse solet, in specie in principio: vid. Savona in *decif. med. 31. p. 80.* & *M.A.N.C. ann. 8. observ. 63. p. 106.*

Riverius *cent. 2. observ. 36.* ex maculis in facie erumpentibus in dysenteria; item ex singultu dysenterix in progressu morbi superveniente, signum prognosticum lethale ominatur; imminent enim convulsiones, in principio autem singultus non adeò funestus.

Si in dysenteria post aurem sinistram vel dextram nigræ maculæ vel tubercula apparent, æger citò moritur; in quo equidem incertus est Sennertus; signum tamen certum esse vult Hæterus in *Herc. med. p. 192.*

Hi, qui ex dysenteria intereunt, præcipuam mortis causam habent intestinorum gangrænam: vid. Riverius *l. 3. observ. 2.* Ac sanè quidam dysenteriet ante mortem absque pulsu toti algidi, adhuc tamen de interiorum intensissimo æstu conqueruntur: conf. *M.A.N.C. ann. 8. observ. 63. p. 106.*

Dysenteria à causa externa, ut à fructibus horæis, non adeò periculosa est; quæ autem ab interna, sæpè periculosa: in qua si sanguis sincerus excernatur, periculosior est, ob vasa majora erosa.

Quo magis vel minus intestina exulcerata sunt, eò gravior vel mitior dysenteria est.

Dysenteria, quæ intestina crassa affecta, utpote symptomata minus periculosa habens, ac à clysteribus multum levaminis admittens, non adeò periculosa est; ut & quæ à mania oritur: vid. Hippocrates *sect. 7. aphor. 5.* Conf. *M.A.N.C. ann. 3. observ. 116. p. 215.*

Spleneticis superveniens dysenteria, bonum signum est: vid. Hippocrates *sect. 6.*

*aph. 48.* nisi hæc longior extiterit; tunc enim aut ex lienteria, aut hydrope pereunt, juxta *sect. 6. aphor. 43.* & *Coac. sect. 3. præcept. 295. & 296.*

Pariter & podagricis salutaris observatur dysenteria, juxta *l. 2. prædict. text. 15.*

De cætero senes & pueri ex hoc morbo sæpius pereunt, quàm qui media ætate constituti sunt: vid. Hippocrates *sect. 2. text. 30.* & Sennertus *Prax. l. 3. p. 243.*

### C U R A.

Quoad curam: in genere pro meliori medicationis ratione, atque scriptorum practicum utiliori lectione, observandum ante omnia: an benigna, an verò maligna fuerit dysenteria? item an à causa interna vel externa? & hæc vel assumptis acribus, vel contagio nata fuerit? Nempe epidemica non sunt præcisè malignæ, id quod notatum in *M.A.N.C. ann. 8. observ. 163. p. 106.* Et ex his considerationibus variarum dysenteriarum, variat subindè apud practicos medendi ratio, uti patet legenti ex la Moniere, Willitio *Pharm. ration.* Sydenham in *Observat. de morb. acutis* &c.

Quoad methodum medendi: in hac sequentes indicationes observandæ:

1. Irritatio intestinorum sistenda, tam acre vellicans corrigendo, quàm opiatis, aliisque anodynis & appropriatis sensum irritationis nonnihil sopiendo, indeque provocatum spirituum impetum compescendo.
2. Præcipitantibus sive absorbentibus & blandis sudoriferis, in specie in dysenteria maligna, massa sanguinea ventilanda, & miasina contagiosum eliminandum. Interdum in benigna blandè abstergentibus & laxantibus intestina eluenda.
3. Noxa intestinæ illata debitis vulnerariis, item adstringentibus sive stypticis ac similibus restituenda.

Methodus hæc diversa est à methodo vulgari; quia vulgò respicitur saltem ad productum morbosum, nempe ad intestinorum exulcerationem; non verò respiciunt radicem morbi seu acre istud vellicans, unde tot malæ oriuntur: Hinc jubent communiter (1) evacuare intestina purgando. (2) Clysteribus eadem abstergere. (3) Dolorem urgentem sedare; & (4) ulcera purificare & consolidare. Sed in hac methodo sæpè feliciter moriuntur ægri, & qui evadunt, naturæ, non artis beneficio id obtinent.

Pro his scopis autem melius obtinendis, observantur sequentes regulæ:

I. Quod anodyna & narcotica à multis quidem ceu necrotica in dysenteria proclamantur, quod exemplo illustrat *l. 3. obs. 10.* Thoenus

nerus & Zechius *Conf.* 37. sed falsò ; idque saltem vitio præconceptæ hypotheseos : quin potius expertus ille practicus Lindanus in hac tota cura semper ab anodynis & narcoticis curam incipiendam suadet, in quo consentiunt ferè omnes moderni, vid. Barbette in *Pr. lib. 4 c. 5. p. 180.* Horstius *lib. 10. obs. 3.* Hæterus in *Herc. Med. p. 195.* Deodatus in *valedudin. pag. 340.* Wedelius in *Opiol. pag. 121.* Undè etiam tot prostant exempla feliciter curatarum dysenteriarum per sola opia : Sic Riverius in *lib. 1. observ. 64.* refert dysenteriam in fluxum epaticum mutatam cum febre & summa virium prostratione, per laudanum opiatum curatam : vid. etiam *lib. 2. obs. 37. 44. & 84.* item *l. 3. observ. 4. l. 4. observat. 87.* in specie Willisius in *Pharm. Ration. Vol. 1. Sect. 3. cap. 3. pag. 128. & pag. 300.* nec non Ludovici in *M.A.N.C. ann. 4. obs. 207.* Helmontius *Tr. Buttl.* & Marcus Marci in *Oplo narcoticum & anodynum*  $\Delta$  placans dolores, dicit esse : terra  $\Theta$ -li dulcis pro hoc scopo  $\Delta$ atur cum sale ammoniaco, & est arcanum Anglorum.

II. Sed non danda, ut dixi, opia in principio sola, sed potius aliis, præsertim appropriatis, mista, idque in specie specificis & absorbentibus sudoriferis in dysenteria maligna, e. g. theriaca cum ossè humano & hepate viperino : item si opus fuerit, blandè intestina abstergentibus, in specie rhabarbaro, in benigna jungi debent ; sic melius & tutius operantur.

Ac sane crebrius licet repetitum opiatorum usum, adeoque quasi continuatum optime ferunt dysenterici, minus debilitantur exinde, quam ab afectionibus & tenesmo continuis. Nempe præmisso laxativo una vel altera vice mox ad laudanum opiatum accedendum, & in hujus usu perseverandum ; nisi ubi urgeat malum, tum enim mitigatis utcumque opio symptomatibus blanda laxatio subjungenda, opio iterum hinc usurpato. Signum autem remittentis mali est, si ab opiatorum usu pededentim somno naturali corripiantur ægri, quamdiu verò ab illius usu nulla debita quies observetur, & agrypni mancant ægri, etiam citra manifestam causam, malum est indicium delitescentis adhuc mali, cohiberi, non curati, aut enervati. Irritati enim adhuc, insensibiliter licet, naturam indicio est ; & ferè malignitatis gravioris, ac spiritibus magis intensi, aut mali pertinacioris saltem, ac de facili recidivantis docet.

III. Laxativa in dysenteria maligna nihil valent, sed nocentissima sunt : potius irritatis intestinis crabrones excitamus & vires dejicimus : in benigna verò suam merentur laudem, in principio usurpata ; sic enim eluunt alvum. Si autem in principio morbi laxati-

vum propinatum fuerit, mox ab hujus facta operatione opiatum subiciendum. Nempe quoad abstergentia primas vias ac blandè laxantia, habenda simul ratio tam subjecti patientis plus minus cacoehymici, quàm causæ antecedentis, an sit ab assumptis ? an sit à contagio ? idque tam propter impetum dysentericæ majorem vel minorem, quàm propter alia in subjecto cacoehymico metuenda symptomata. Cacoehymiam igitur in principio convenientibus laxare, non inconveniens est ; uti & , si à fructibus horæis malum ortum fuerit, præmisso tamen quoque sedativo, v. g. vespera antecedente : imò laxanti quoque opiatum addere convenit. Quando itaque primæ viæ abstergendæ, ac alvus blandè laxanda est, sit in principio vel rhabarbaro vel sero lactis ; de quibus infra : in progressu morbi penitus abstineamus. Adhuc ii ipsi, qui in principio suadent purgationem, non sine cautela hoc faciunt : volunt nempe, si dysenteria oriatur ab humore atrabilario, acerrimo & maximè corrosivo, quod tunc ferociam illius potius temperando purgandum sit. De modo purgandi optimè scripsit Ludovicus Septalius in *animadv. & Caut. Medic. l. 7. pag. 224.*

IV. Vomitus in dysenteria planè sunt inane quid, in malignis planè nocivi, nisi dysenteria sit ab hypercatharsi, aut assumpto veneno aut ventriculi vitio.

Si conveniunt, magis in benigna, quàm maligna locum habere videntur, ( la Montre tamen *Tract. de fluxu dysenterico maligno* observavit subindè in primo principio vomitoria fuisse proficua. Et arbitror hoc ita esse, in casu nempe, quo contagium malignum inspirando haustum ventriculum saltem adhuc obsident ) idque si superiora intestina laborent, si cacoehymia adsit, aut malum foveat, nec non humorum in primis viis, intestinis & ventriculo molesta sabuttra ; si denique natura eò vergat, ægrique eidem facilius auscultent, viribusque adhuc consent, &c. Vomitu namque diuturnas dysenterias curatas vidit Mercatus.

V. Sudoris tam per se, quàm diaphoreticis provocati, in specie habenda est ratio in dysenteria epidemica plus minus maligna. Sanè cum hic ante aliquot annos in universa hac regione grassaretur dysenteria epidemica maligna, pastores pagani suos rusticos solis sudoriferis ; præprimis tincturâ bezoardicâ, curarunt. Eodem tempore quidam rusticus, & ipse dysentericâ malignâ correptus, sumpsit balsami  $\Delta$ is gutt. xx. & ultra, cuius repetito usu per repetitos sudores ipse fuit curatus, adeoque tentandum, videtur, annon in dysentericis malignis sulphurata, crocata, & camphorata præservativè pariter curativè futura sint optima ? v. g. flores  $\Delta$ , extractum

△, bals. △ juniperin. ac succinatum potius, elixyr pestilentielle Crollii, V spiritus vini camphoratus, crocatus, theriacalis, &c. Undè dicit Petrus in suis dissertationibus: quòd rectè faciant Hermetici, qui dysenteriam non tam purgantibus, quàm diaphoreticis aggrediuntur, & statim correcto △e baccis juniperinis, alternis diebus potionem Paracelsi pestilentialem, aut aquam theriacalem, aut simile diaphoreticum alexipharmacum propinent: post expulsionem veneni postmodum curativo appropriato utantur. Hinc etiam ipse la Moniere refert: quod sudor primis morbi diebus vel spontè prodians, vel debito sudoriferorū usu prolicitus, dysenteriam frequenter supprimit, serosis humoribus foràs propulsis. Quo magis ergò corpus transpirat, & magis sudoribus afficiuntur, eò mitior est dysenteria. Exinde apparet, eandem ferè, quæ in febribus continuis & malignis, methodum medendi observandum esse.

VI. Adstringentia, ut talia, in principio & progressu morbi nil valent; potius graviter nocent. Siquidem non relaxata, sed irritata sunt intestina: imprimis nocentissima sunt intempestivè, h. e. ante appropriata & alexipharmaca in maligna, & ante abstergentia laxativa in benigna, exhibita: interdum saltem in declinatione morbi commodè usurpari possunt. Nam validè adstringentibus, maximè in principio, dysenteria suppressa, subinde graves excitat affectus, nunc paresin contumacem, nunc abscessus mesenterii: vid. la Moniere: sicut enim Martini in *Tr. de Morbo mesenter.* pag. 44. inflammationem & abscessum mesenterii periculosum notat ob dysenteriam sinistrè adstringentibus curatam & suppressam: sic etiam paresin ex dysenteria intempestivè suppressa observavit Velschius de *Ægagrop. Diff.* 2. pag. 16. Sic in quos morbos dysenteria adstringentibus suppressa subinde defierint, vid. Hildanus *l.* 3. *observat.* 42. & 46.

Quemadmodum igitur perquam nocivum est, mox aut saltem intempestivè adstringentibus & stypticis sufflaminare dysenterias, ita simul probè attendendum, ut fermentum dysentericum probe correctum totum ex corpore eliminetur, alias enim aut vitiando lympham, aut afficiendo genus nervosum, cui in specie inimicum existit, (nam & intestina huc spectant,) varia excitare potest symptomata. vid. Horst. *lib.* 4. *observ.* 21. & *lib.* 8. *observ.* 11. & 12. Velschius *Ægagrop. diff.* 2. *Cur.* 4. pag. 60. Rhodius *Cent.* 11. *observ.* 87. Thonerus *Observat.* pag. 195. & 246. Correctio hæc fit, ut dictum, per appropriata in maligna, per temperantia in benigna, in specie per lacticia: evacuatio partim per sudorem in maligna, per alvum in benigna.

Et quidem neglectus laxativorum ac sudoriferorum, illorum præprimis in principio, horum in declinatione; perversus e contra opiatorum usus imprimis occasionem pravis symptomatibus subministrare videtur.

VII. Venæ sectio frustranea est in quacunque dysenteria; in maligna enim nociva, nisi forsitan gravis evacuationis sanguinis suppressio aliud suaserit: in quo tamen casu cautè fiat, adeoque nemini Autor sum, ut imitetur Sydenham in *Observat. de Morb. acutis* pag. 251. *Sect.* 4. c. 3.

VIII. Clysmata rarò sunt usurpanda: Nam utut hæc vulgò sint usitatissima in dysenteria, tamen sæpius sunt pessima: scilicet nimio abusu malum exasperant potius, quàm leniunt. Locum non habent, nisi (1.) Ubi affecta sunt intestina crassa; ad tenuia enim eorum vis non pertingit. (2.) In benigna, ubi eluendæ sordes quædam. (3.) Ubi acrimonia insignior temperanda. (4.) Quando nimis affliguntur tenuia intestina superiora & pylorus, ut quasi per accidens revulsorio stimulo liberentur. (5.) Ubi consolidatio necessaria: non tamen crebrius aut copiosius injiciantur; quia (α) Omnes clysteres, qualescunque fuerint, etiam ex lacte, intestina, tanquam aliud peregrinum, plus minus irritant & vellicant, & ita malum quodammodo exasperant, & reverà motus spasmodici fiunt: vid. Helmontius, qui accuratus est quoad usum clysmatum in dysenteria. (β) Quia tenesmus sæpè graviter per clysmata exasperatur; & (γ) Quia ipsa intestina irritata mox denuò clysteres rejiciunt, & ita propter suas contracturas & spasmos dolores exasperant, parum juvare possunt; in declinatione ergò morbi usurpanda.

IX. Stomachi in tota cura dysenteria summa semper habenda est ratio, non secus ac in quibusvis alvi fluxibus. Quò magis enim furit, eò pejor erit status morbi; & quò melius se habet, vel appetendo nonnihil, vel alimentata quædam perferendo, eò major spes salutis adest: e contra appetitus penitus dejectus, aut vomitus superveniens, aut etiam singultus, pessima sunt signa. Ob id semper simul appropriatis interne pariter & externe stomacho succurrendum est, cujus ratione vinum, præsertim in adjuncto vomitu, non nocet absolutè consideratum; acoris verò ratione nonnihil suspectum videtur: Modicè autem propinatum stomachum restaurat, & in dysenteria epidemica salubre est. Ann. 1666. cum dysenteria maligna epidemicè grassaretur in Misnia, præsertim ruri, observatum fuit, quod ægri, dum laborarunt vomitu in dysenteria, cerevisiam, julepum & laxativa omnia evomuerunt, potum vini autem calidi conducibiliorem fuisse ægris pota cerevisia, cumque citius retentum, nec adeò

subi-



subito per vomitum fuisse rejectum, ob id etiam videri nunquam omittendum est in remediis antidysentericis.

X. Caveant sedulo ægri, ne corpus refrigerent, sed quantum possibile, calidum illud & blando calore irroratum conservent, præsertim pedes: nam quod calidiora conservantur extrema, eo melius habent ægri; si vero tantillum refrigerentur, præsertim pedes, acerbiores superveniunt dolores. Eadem ex ratione a frigida potu, quantum possibile, abstineant; simul enim atque potus non calidus ingeritur, subito tormina & alvi excretio crudeliter superveniunt; hinc juscula decoctionis gallinarum sæpius sorpta licet minus grata, sunt summè proficua.

XI. Denique quieti sint ægri, & quantum possibile, omnem corporis iactationem remittant, nec ex lecto surgant, sed saltem per patinas substratas colligant rejicienda. Sane, referente la Moniere *cap. 6, pag. 104.* quies tantæ fuit utilitatis, ut, qui statim à morbi principio decubuerunt, nec veriti sunt in lecto, vel in pulvinari, vel super lintea deicere, morbi violentiam facile superarint: sic quod magis quiescunt, eo minus fluxus exacerbatur.

Nec XII. negligenda est, cum eam tantum salubrem commendet Riverius. Refert Amatus Lusitanus in *sua C. 2. Curat. 47.* de quodam dysenteria epidemica laborante, qui celebravit cum uxore coitum, & manè sanus evasit.

Plures cautiones, quæ ad Praxin faciunt, videbitis in Willisi *Pharmac. Rational. Vol. 1. pag. 131. & 132.* item Septalio *citato loco pag. 220.* item in Holderhoff *de erroribus Medicis, ubi de dysenteria.*

Remedia alterantia in dysenteria, acरे vitiosum peccans temperantia, & irritans sistentia, sunt vel communia, vel specifica; ita enim meliori cognitionis ergo distinguere lubet: communia sunt & conveniunt, vel quatenus adstringunt, ut styptica, vel quatenus consolidant, ut vulneraria, quæ blando suo alcali demonstrante Helmontio & Tachenio acidum in exulceratis intestinis temperant & absorbent, vel quatenus in genere omne acre corrosivum destruunt, istud vel obtundendo, ut pingua, oleosa, lacticia; vel succos acidos & corrosivos imbibendo & absorbendo, ut ex medicata, ossa animalium, corallia & reliqua alcalia: specialia vero seu medicamenta specifica sunt ista, quæ speciatim acरे dysentericum, ut sic, emendare, & consequenter vim ac impetum insiti cohercent, & singulari proprietate dysenteriam propriè curare valent, & quantum vim & energiam antidysentericam longa experientia confirmavit.

Tom. II.

Interspecifica eminent priapi cervi, ceti, & tauri, cranium humanum cum ulnea, tragæ granorum actes, sanguis leporis, hepar serpentum, ungula equina, stercus caninum; sicut & generalia absorbentia commodè cum specificis misceri possunt. Priapus ceti est omnium optimus, quem laudat D. Michaelis: post hunc est cervi priapus; vilissimus est priapus tauri. Facit mentionem horum priaporum Helmontius in *Pleura Furente*, eosque commendat non magis contra dysenteriam, quàm in specie contra pleuritidem, usurpantur vel in forma sicca vel in forma humida: In forma sicca, quando nempe exsiccantur lentè in forno, hinc raduntur, & quantum fieri potest, comminuuntur, cujus rasura præscribitur à ʒss. ad ʒj. in jusculo calido, sive in potu lactis, sive in ∇ foliorum quercus, aut etiam in potu cerevisiæ calidæ; idque subindè repetatur, & unum est ex optimis contra hunc morbum remediis, vel solum, vel cum laudano opiato usurpatum. Superiori anno pauper, desperatâ dysenteria correptus, remedium à me petebat, & præscripsi ei sequens:

℞. rasur. priapi cervi ʒij.

laud. hysser. gr. ix.

M. f. pulvis pro duabus dosibus.

Vel

℞. Conserv. rosar. antiqu. ʒss.

rasur. priapi cervi ʒij.

laud. opiat. gr. iij.

c. f. q. syr. cydon. arom. f. electuar. pro 2. dosibus.

D. S.

Unhaltende Lattwerge auff zweymahl.

In forma liquida præscribuntur in decocto, quod ad aliquot uncias crebrius haustum similiter est expertum, à quibusdam in secretis habitum. Non tantum per se potando; sed etiam pro vehiculo aliis intervrit remediis, v.g. cum eodem emulsionem parando ex seminibus appropriatis, semine papaveris albi, pincis, amygdalis dulcibus, &c. e.g.

℞. sem. papav. albi

4. frig. maj. aa. ʒiij.

amygd. dulc. ʒij.

c. f. q. Decocti priapi cervi vel ceti f.

Emulsio:

℞. sigillat. alba ʒj.

unc. fossil.

corall. r. præp. aa. ʒss.

syr. papav. albi ʒss.

D. S.

Unhaltende Stärk & Milch.

Sic fit Julepus in dysenteria conveniens:

℞. Decocti priap. ceti vel cervi lbss.

∇ cinam. ʒj.

syr. corallor. Querc. ʒij. vel iij.

(R 2)

M. pro

M. pro Julebo : S.

### Anhaltender Stärck-Julep.

Hauriatur crebrius, imprimis nocte, quo dysenteria invalescit : est grati saporis, & optime convenit.

Superiori anno aliquoties præscripti non sine effectu :

℞. fol. hed. terrestr.

plantag.

sanguis. aa. M. j.

flor. rosar. r. p. iij.

rad. tormentill. ʒiʒ.

ras. priapi ceti vel cervi ʒiij.

Incisa & contusa coquantur in f. q. ▽ simpl.

Colatura lb iij. adde

▽ Cinam. ʒj.

℞. Cydon. arom. ʒij. l. iij.

M. D. S.

### Anhaltender Stärck-Tranc.

Plura qui cupit videre de efficacia horum priaporum, adeat Dorncrellium *Tract. German. de Dys.* item Stöckerum in sua *Praxi* pag. 38. in quem commentatus est Tholdius.

His priapis multiplici experientia ferè apud omnes confirmatis, subindè alia permiscuntur, & fiunt pulveres compositi antidysenterici, v. g. multi commendant hunc pulverem :

℞. Priapi cervi ʒiʒ.

rad. symph. major.

tragacanth.

nuc. mosch. aa. ʒiij.

℞a sigillat.

Bol. Arm. præpar.

C.C. usti præp. à ʒij.

zedoar. ʒiʒ.

M. f. pulvis.

D. S.

### Anhaltend Pulver.

Hunc pulverem multum commendat Eurerus *Tr. de dysenteria* pag. 25.

Vel ℞. ʒ sigill. ʒiʒ.

ras. priapi cervi ʒj.

C.C. usti sine Δe ʒvj. ad ʒj.

corall. r. præp.

pulv. tormentill. aa. ʒiij.

M. f. pulvis. S.

### Anhaltend Pulver.

Cujus dosi ʒj. bis vel ter in die in vehiculo quocunque calido.

Vel

℞. ras. priapi cervi ʒij.

C.C. sine Δe

ʒiij diaphor. aa. ʒj.

M. f. pulvis.

Divid. in tres partes æquales, S.

### Anhaltende Pulver.

Addi his pulveribus possunt laudani opiatæ grana aliquor, & gutta ʒi cinamomi.

Vehiculum prædictis pulveribus esse potest :

℞. Aqu. card. bened.

mentha aa. ʒiʒ.

cinam. ʒvj.

ess. opii ʒiʒ.

℞. card. bened. ʒvj. M. D. S.

### Stärck-Tranclein zum Pulver.

Juxta priapum cervi, C. C. est egregium remedium, quod multis scopis ad curam dysenteriae satisfacit, sive ustum assumatur, sive sine igne præparatum propinetur, imprimis ejus & eboris gelatina : v. g. sit Julepus propinandus ad dysenteriam :

℞. Decoct. Scorzon. c. C. C. lb iʒ. (loco hujus potest sumi decoctum priapi cervi pro lubitu)

Gelatin. C. C. ʒj.

▽ Cinnamom. ʒvj.

℞. de symph. Fern. ʒj.

M. f. Julepus : S.

### Stärck-Julep.

Capiatur pro lubitu.

Vel etiam Gelatina C. C. & Gelatina priapor. diëtor. maximè priapi cervi, dissolvuntur in potu ordinario hoc modo :

℞. Gel. C. C.

priapi cervi aa. ʒj.

M. S.

### Gallerde ins Trinken.

Hæc Gelatina super Δe liquescit, cujus dosi cochl. ij. l. iij. in Mens. j. cerevisiæ vel potus ordinarii, & crebrius usurpari potest. Non alterat saporem cerevisiæ, & tamen egregiè confert; sunt enim hi priapi concretum quasi medium inter cardilagineas & ossa.

Quidam commendant pro potu decoctum C. C. cum radice pimpinellæ, uti est Riverius, utpote qui pimpinellam sanguisorbam scilicet ceu expertam in dysenteria commendat : vid. Riverius *Cent. 3. observ. 84.*

Juxta C. C. etiam aliorum animalium, imprimis violenter interemptorum, ossa & cornua in dysenteria sunt usitata & egregia, partim sine igne præparata, partim & usta. Usta quidem, qualiacunque sint, coincidunt vi absorptivâ, temperativâ & diaphoreticâ : sed & non usta conveniunt. De ossibus bovinis calcinatis, quæ multum commendantur, item ossibus humanis, calcinatis aut sine igne præparatis, saltem moneo, quod rasura cranii humani, vel cranium humanum sine Δe ad ʒj. vel sola vel cum opiatæ, sunt egregium specificum in dysenteria, imprimis desumpta ex homine violenter interempto. Exempla prostant, quod dysenteria contumax beneficio rasuræ pulverisatæ cranii humani ad ʒj. propinatæ fuerit curata, quæ etiam experta est ab illustri Dno Boyle, Anglo, ut ipse mihi narravit : videatur etiam commendata hæc rasura apud Riverium in sua *Praxi* l. 10. cap. 6. hinc etiam usnea cranii humani, tam suspensâ quàm tota fracti, singulare specificum est in

dys-

dysenteria à ʒss. l. gr. xv. ad ʒj. sive solum sive cum aliis propinata. Porro dens hippopotami, & hujus loco unicornu verum, est singulariter expertum, si præparatum à ʒj. ad ʒj. propinetur. De hoc dente vid. Wormius & Bartholinus. Confert imprimis hic dens hippopotami tunc temporis, ubi imminet convulsiones, certum est, quod obiter adjungo, experimentum contra hæmorrhoides nimium fluentes.

Uva quercina singulare dicitur specificum, in Sennerto *cap. de Dys. p. 359.* item Schenkio *l. 3. obs.* Verum cum non semper reperiatur, non incommodè potest substitui viscum quercinum, aut etiam fungus quercinus, vel fungus sorbi aucupariorum.

Tragea granorum ætes, seu panis insuccatus cum succo baccarum sambuci, est egregium specificum à plurimis expertum. Laudes videbitis in Hartmanni *Praxi chym. pag. 19.* item Borello *l. 2. obs. 40.* Sanguis leporis linteo mundo excipitur, quod siccatum haustui cerevisiæ vel potui ordinario per noctem intusum dysenteriam curat: aut ipse sanguis leporis legitime præparatus & pulverisatus à ʒss. vel ʒj. propinetur, nobile & expertum est remedium: vid. Helmontius *Tr. Potestas medicamin. §. 28.* Et usum hujus lintei expertus est desideratissimus noster Præceptor, D. Michaelis, felicissimo sæpius cum successu. Commendat & hunc sanguinem Schenck in *Thesauriolo Secret. 10. Thes. 2.* Rhumelius *p. 415.* & Mindererus in *der Kriegs-Ärgney.*

Juxta hunc sanguinem non minoris etiam est usus sanguis pavidæ agni, qui etiam prius perterrefactus & in articulo mortis constitutus, juguletur, & sanguis colligatur, & usurpetur: sic enim pavor, ejusque idea sigillat sanguinem totum, ratione cujus remedium est ad dysenteriam. Usurpatur igitur & talis sanguinis, à ʒss. ad ʒj. imprimis in succo vel syrupo cydoniorum: cui si addere velimus vel mumiam, vel aliquid simul de lapide hæmatite, perinde est. De sanguine agnino vid. etiam Rhumelius in *Intro. Herm. p. 415.* item Mindererus in eleganti sua medicina militari. Porro inter specifica dicta hepar serpentum & viperarum ritè exsiccatum & pulverisatum etiam nobile est specificum, & primum ferè locum meretur in omni dysenteria, seu communi seu benigna, seu epidemica maligna: vid. *M. A. N. C. Ann. 2. obs. 127. p. 209. dosis* à gr. xv. ad ʒj. vel solum, vel cum crystallo mixtum, quæ bilis porraceæ & dysentericæ Antidotus prædicatur à Langio in *Epistol. 1.* & experimento comprobatur ab Heer in *ejusmodi observatione de cholera.* D. Michaelis in frequentissimo simul ac expertissimo & felicissimo fuit usu, cui communicatum fuit à D. Ellenbergio, Medico Hallensi, qui satelliti

Principis fluxu desperato laboranti in haustu vini rubri propinavit, tam felici successu, ut intra horam fuerit suppressus fluxus: e. g.

ʒ. Pulv. hepat. viper. ʒss.  
crystall. præp. l. corall. r. præp. ʒj.  
laud. opiat. ferm. gr. ij.

M. pro duabus dosibus. S.

Anhaltende Pulver.

Vel

ʒ. Pulv. hepat. viper. ʒij.  
extr. tormentill. ʒss.  
laud. opiat. gr. ij. l. laud. hysser. gr. jx.  
o. destillat. mac. gutt. ij.

M. pro duabus dosibus.

Præter hepata viperarum sunt, qui insigniter etiam commendant hepata ranarum viridum, qui & simili usu dicitur fuisse secretum Paracelsi antidysentericum, de quo sit fides penes autorem.

Non ignotum est etiam, quod à multis commendetur pomum excavatum, cum cera & gummi Arabico repletum, assatum & comestum tanquam specificum antidysentericum. Laudatur admodum tale pomum ab Hartmanno in *Pr. Chymiatr. pag. 191.* ut etiam ab Hortio *l. 4. observ. 20.* item in *Problema. pag. 70. Dec. 60. Quæst. 5.* Sanè Amatus Lusitanus in *l. 6. Curat. 14.* multiplici ceræ usu curatam dysenteriam observat. Loco pomi communis melius est, si usurpetur pomum cotoneum maturum, utpote cum hoc non sit inelegans contra dysenteriam remedium: Autor est Valeriola *l. 3. observat. 4.* præscripti aliquando experimenti gratiâ:

ʒ. Gum. Arab. ʒj.

Mastic. ʒj.

pulverisatis adde

laud. opiat. gr. ij.

Hic & pomo excavato indebatur ac assabatur, & totus comedebatur; erat elus in sapore adstringentissimus: sed non vidi adeò magnum effectum, utut non sit contemnendum remedium.

Quo etiam pertinet & dysentericus Cratonis ex gummi Arabico, coralliis & tragacantha.

Porro stercus canis seu album Græcum vulgò commendatur, & admodum expertum est remedium pro pauperibus, speciatim si canis per 6 ☉ probe ossibus fuerit nutritus: Dosis à ʒss. ad ʒj. addito pauculo saccharo in vehiculo lactis caprilli, vel simplicis vel chalybeati: sanè Franciscus Joel in sua *Praxi de dysenteria*, & Forestus, uti etiam Mindereus in *Medic. militari*, idem multis nominibus commendant.

Ungula equina, seu istud cornu molliusculum, quod ex ungulis equinis excinditur, quando ferramenta applicantur, exsiccata & pulverisata ad ʒj. frequenter propinata, optimum est remedium ab Eurero ad dysente-

(R 3)

caba-



riam commendatissimum; quam ungulam caballinam in butyro vel pinguedine tostam, & quidem ex equa, itidem specificè laudat Helmontius *Tract. Pylor. Reclor.* §. 22. item *Tract. Ignota Actio Regim.* §. 41. Videri etiam potest Langius *Comment. in Fabrum*, qui & ipse adstipulatur Helmontio, ejusque alièrta approbat.

Satyrioni multa attribuunt in hoc morbo, idque imprimis, qui Paracelsi terunt vestigia, duz vel tres radices potui infusæ, & ita potatz, singulariter commendantur contra dysenteriam.

Aqua suberata, sive aqua, in qua suber bullierit, pro potu ordinario, item pulvis suberis combusti, arcanum dicitur contra dysenteriam, expertum à Borello *Cent. 1. Observ.* 23. & 57. & à Riverio *in l. 4. observat.* 87. Quidam etiam commendant insigniter julos juglandis, tempore vernali in Majo arboribus adnascentes, qui sereno cælo collecti, siccati & pulverisati ad ʒj. in aquis appropriatis propinantur. Huc pertinet Tormentilla, ejusque pulvis & extractum, rob item sorbi torminalis, & hujus defectu sorbi aucupariæ, unicornu fossile, terra vitrioli dulcis ex Bolo Oali saltem desumpta, quibusvis Oalibus longè præferenda: quæ Oalia juvant quidem, ubi ab acido specialiter originem trahit dysenteria, malumque est levius, quia acidum saturant; lignum fraxini justo tempore collectum, ad ʒj. pulveretenus in vino calido adhibitum, singulare est specificum.

Tandem alumen inter alia quàm plurima etiam laudatur ad dysenteriam, & quidem tantummodò recipiunt tria aluminis frustula magnitudinis pisi, propinant in vino rubro calido, & pretiosum dicunt esse arcanum. Alii, quod magis approbo,

℞. alum. crud. ʒß.

cinam. ʒiß.

Redigunt in formam pulveris, & ita in vino rubro dosi ʒj. propinant.

Sicut etiam aluminis aliquot grana aliis pulveribus mista sunt optima.

Hæc ferè sunt specifica.

Progredimur ad ea, quæ communiter & generaliter ad dysenteriam usurpari solent, & pleraque simplicia styptica, adstringentia, & acidum absorbentia, & pingua istud obtundentia, ac alias in diarrhœa, cholera & vomitu usitata; item quælibet vulneraria magis usitata sunt, v.g. plantago, portulaca, tormentilla, pimpinella, sanguisorba, perfoliata, hederæ terrestris, centumnodiû, Lysimachia, potentilla, folia quercus, millefolium, bursa pastoris: radix tormentillæ, plantaginis, Nymphææ, filipendulæ, consolidæ majoris, pzonix, bistortæ, enulæ: flores rosarum rubrarum, balaustrorum, juli corylini, flores papaveris rhæados, bellidis, hyperici,

cimæ quercus: semina plantaginis, acetosæ, portulacæ, nasturtii, aquilegiæ, perfoliata, papaveris albi, &c. Stockerus *in sua Praxi* tanquàm expertum commendat semen papaveris contusum, cum vitello ovi, & frixum in cineribus: mala cydonia, mespila, sorba, myrtilli, spongia cynosbati, nux moschata, &c. hinc omnes dictorum simplicium succi, syrupi, extracta; succus plantaginis & hederæ terrestris ceu singulares laudantur. In fine dysentericæ valdè confert succus absinthii, & menthæ depuratus, ac saccharo in syrupum redactus; habet enim mentha cum absinthio mista miram vim corroborandi ventriculum: aquæ burse pastoris, cinamomi, quercus, &c. commendantur specificè ab Horstio; ab aliis aqua tormentillæ, plantaginis, cinamomi cydoniata, syrupus de rolis siccis, myrtinus, plantaginis, portulacæ, cydoniorum, coralliorum Quercetani, de symphyto Fernelii, papaveris: imò si dysenteria à multo fructuum usu contigerit, in ipso principio valdè laudat hic tyrupum de absinthio cum ʒ cinamomi vel theriacali Riverius *in Praxi*, melius erit ejus decoctum.

Præ cæteris convenit lac crebrius usurpatum, in principio serosius, e.g. caprillum abstergendi fine, in progressu lac bubulum consolidandi & glutinandi fine: hinc & ex lacte parata remedia frequenter à quibusdam in dysenteria laudantur, quia temperant humores acres, irritationem intestinorum sistunt, & quibusdam additis, simul adstringunt, lac amygdalarum dulcium & seminum, sive emulsio cum aqua chalybeata parata, ut oleositas omne obtundat acidum: item lac chalybeatum, tam medicamenti quàm alimenti vices sustinet. De jejuno ejus usu vid. Holderhoff *loco citato pag. 39.* item, quomodo in meru coagulationis corrigendum, & ne vitiosè concrecat, præcavendum? videatur *Pharos Medic.* Bonetti ex Ballonio p. 426.

Eò præstantius evadit lac, si appropriata in ea decoquantur: nempe lac chalybeatum, in quo radix symphyti majoris decoquatur.

℞. lact. rec. in quo §. 1. 6. deleatur O ignisum M. j.

Huic incoquantur

Rad. symph. major.

tormentill. aa ʒj.

ad tertiz partis consumptionem.

D. S.

Heilende Milch.

Decolatura ter in die propinetur bonus haustus.

Vel

℞. ras. priapicervus ʒiß.

rad. tormentill. ʒj.

Coqu. in lactis lb. ij.

Colatura misc. cum paucis Saccharo.

D. S.

Anhaltende Milch.

Sed NB. absit febris.

Si

Si ipsum lac solitarium videatur incommodius, dimidio  $\nabla x$ , vel communis vel cuiusdam appropriatæ, diluatur, invicem ebulliant, & ita crebrius propinentur. Convenit itidem decoctum orizæ in lacte cum vitellis ovorum, & succo hederæ terrestris. Mirè prodest tale lac, in dysenteriis quibusvis, & eo efficacior erit hic potus, si singulis haustibus addatur  $\mathfrak{zj}$ . stercoris canini, & exprimatur.

Præterea essentia & syrupus symphyti majoris, essentiæ vulnerariæ compositæ, extractum theriacale, tormentillæ, &c. usurpantur, quæ extracta cum laudano opiato dant elegantes pilulas nocturnas: item  $\nabla$  theriacalis camphoratus,  $\mathcal{R}$  corallorum sassafrata,  $\mathcal{R}$   $\nabla$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$ , liquor stypticus ex  $\nabla$  sigillata cum  $\nabla$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$ , à Bartholetto liquor aureus dictus,  $\mathcal{R}$  hæmatitis, & theriacalia quæcunque, item mixtura simplex in principio dysentericæ malignæ.

Præter dicta etiam  $\nabla x$  minerales conveniunt, ut  $\nabla$  sigillata, ossa humana calcinata  $\nabla$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$  dulcis, ex cuius  $\mathfrak{zj}$ . ter propinata Faber *Cur.* 28. pag. 324. puerum curavit. Hinc Agrisola hunc commendat bolum:

$\mathfrak{zj}$ .  $\nabla$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$ .  
off. microcosm. calc. gr. xii.  
Theriac.  $\mathfrak{zj}$ .  
M. pro Bolo.  
Vel

$\mathfrak{zj}$ . Theriac.  $\mathfrak{zj}$ . ad  $\mathfrak{zj}$ .  
 $\nabla$  sigillat.  
 $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$ . aa. gr. xv.  
off. microcosm. præp. gr. xij.  
M. f. Bolus: S.

Anhaltende Lattwerge auff einmahl.  
Vel

$\mathfrak{zj}$ . Theriac. Andr.  $\mathfrak{zj}$ .  
hamatis. præp.  $\mathfrak{zj}$ .  
off. microcosm. præp. gr. xv.  
sacchar. Saturni gr. vj.  
M. f. Bolus.

$\mathfrak{zj}$ . Conserv. ros.  
diascord. Fracast.  $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$ .  
ras. priap. cervi  $\mathfrak{zj}$ .  
troch. de carabe  $\mathfrak{zj}$ .  
Corall. rubr. ppt.  
 $\nabla$  sigill. ana  $\mathfrak{zj}$ .  
Extr. tormentill.  $\mathfrak{zj}$ .

c. l. q. Syr. cydon. F. electuarium, de quo capiat pro lubitu, ut cardialgiam aliqualem inferat; simul pro potu nocturno:

$\mathfrak{zj}$ . Decoct. priap. cerv.  $\mathfrak{zj}$ .  
 $\nabla$  Cinam. spirituos.  $\mathfrak{zj}$ .  
Succ. cydon.  $\mathfrak{zj}$ . M.

Item bolus Armena, & diaphoreticum, mirrha, sulphur & flores sulphuris, succinum sunt egregia, imprimis lapilli cancerum præparati, umbilicus marinus præpa-

ratus, trochisci de terra sigillata & de carabe ad  $\mathfrak{zj}$ . insigniter conferunt.

$\mathfrak{zj}$ . Aq. Plantag.  $\mathfrak{zj}$ .  
Cinam.  $\mathfrak{zj}$ .

+rosacei  $\mathfrak{zj}$ .  
el. diascord. Fracastor.  $\mathfrak{zj}$ .  
Trochisc. de carabe et de  $\nabla$  sigill.  $\mathfrak{zj}$ .  
lapill. 69. præp.  $\mathfrak{zj}$ .  
 $\mathfrak{zj}$  diaphoret.  $\mathfrak{zj}$ .  
Syrup. Myrtin.  $\mathfrak{zj}$ .

M. f. Porio: S.

Anhaltende Stürck-Mixtur.

Sic etiam crocus Martis adstringens à  $\mathfrak{zj}$ . ad  $\mathfrak{zj}$ . & hinc rubrica fabrilis, quæ multum de  $\nabla$  te participat, conveniunt: pulvis bezoardicus Sennerti cum aliis compositis in malignis: & Saxonicus adstringens Bezoardicus, thus, myrrha, gummi Arabicum, putamina ovorum anserinorum, ossa bovina, ebur, maxilla lucii piscis, dens hippopotami, os sepia, talus porcini calcinatus, qui commendatur à Bartholino *Cent.* 5. *Histor.* 97. & saccharum Saturni, à  $\mathfrak{zj}$ . ad gr. xv. cum aliis mineralibus usurpatum: unde etiam cum hoc saccharo Saturni præparatur  $\mathcal{R}$  antiphthifica, pertinet etiam huc Michaëlis liquor stypticus, &  $\mathcal{R}$  illa  $\nabla$  te adstringens ex  $\nabla$  sic dicta Olari cum  $\nabla$   $\mathfrak{zj}$   $\mathfrak{zj}$  paratus: conf. Hoffmanni *Clav. Schröd.* p. 133.

His & additur theriaca, Mithridatium, electuarium dialcordii Fracastorii, laudanum opiatum, & similia nota. Qui præservacionis gratia aliquid postulat,

$\mathfrak{zj}$ . Theriac. Andr.  $\mathfrak{zj}$ .  
ras. priapi ceti  $\mathfrak{zj}$ .  
pulu. rad. tormentill.  $\mathfrak{zj}$ .  
Extr. ejusd.  
unic. fossil. aa.  $\mathfrak{zj}$ .  
 $\mathfrak{zj}$  diaphor.  $\mathfrak{zj}$ .  
laud. opiat. ferment. gr. xv.  
c. l. q. succi cydonior. f. Electuarium.  
D. S.

Præservirende Lattwerge.

Quod si vel in principio vel in declinatione dysentericæ benignæ laxativa pro primis viis abstergendis usurpanda veniant, cautè hoc fiat, quandoquidem ii, qui in dysentetia statim eunt ad purgantia, non curant, sed omnia deteriora faciunt; qui verò prius sistunt spirituosum impetum, ac tormina sufflamant, optimè curant, dicit Lindanus. Inter purgantia sufficit aloë, vel usurpetur imprimis rhabarbarū, quod tutum est, nunc crudum, nunc leviter tostum, ut partibus volatilibus exhalatis reliqua substantia interea styptica minus laxet; & hinc myrobalani: nam præter vim laxativam simul vim anodynam rhabarbaro tribuit Holderhoff *l. c.* pag. 39 nunc solum usurpatur, nunc cum laudano opiato, hinc v. g.

$\mathfrak{zj}$ . Conf.

℞. *Conf. rosar. antiqu.* ʒj. ad ʒij.  
*pulv. rhabarb.* ʒiβ. l. ʒij. l. *toſſi* ʒij.  
*laudan. opiat.* gr. j.  
*ſyr. de roſis* q. ſ.  
 M. f. *Bolus*:

℞. *pulp. paſſul.* ʒij.  
 ʒ *rhabarb. el.* ʒβ. ad ʒj.  
*laudan. opiat.* gr. j.  
 M. f. *Bolus*:

℞. *Aq. plantaginis* ʒj.  
*cinnam.* ʒj.  
 ʒ *rhabarb. el.* ʒβ.  
*laud. opiat.* gr. j.  
*ſyr. myrobal.* ʒβ. M. S.

### Laxier-Träncklein auff einmahl wohl um- zurückeln.

℞. *Rhabarb. el.* ʒij.  
*ſlor. rosar. r.* Mj.  
 Infunde in ſ. q. *ſeri lactis*:  
*Colatura* ʒij. l. iij. adde  
*ſyr. de roſ. ſicc.* ʒij. ad ʒβ. M.

℞. *∇ plantagin.* ʒj.  
 ʒ *rhabarb.* ʒi.  
*laud. opiat.* gr. j.  
 c. *ſyr. myrobal.* l. *cydon.* q. ſ. M.

Laxantia talia commodius manè propinan-  
tur: ſomnifera verò ſeu opiata tutius & con-  
ſultius ſub noctem dantur, quia raro de die  
agunt, noctu verò felicius ægri dormiunt, ad-  
hæc circa noctem ordinariò exaſperatur dyſ-  
enteria. Fit interdum, ut dyſenteria cor-  
repti patiantur dolorem gravativum obtu-  
ſum & compreſſivum ſub umbilico, quaſi ma-  
teria ibidem incuneata hæreret, undè facile  
oriri ſuſpicio poſſit, quaſi pathema hoc orire-  
tur ex ſuppreſſis per opiata ſecceſſibus, qui ta-  
men non eſt; quin potius ex continuato  
ſpaſmo inteſtinatorum, in quodam loco perti-  
naciùs vellicatorum, originem ducit: undè  
externè lenientia, item later calefactus abdo-  
mini applicatus moleſtiſſimum iſtum dolo-  
rem compreſſivum & gravativum in abdo-  
mine ſiſtunt.

Si Dyſenteria maligna, omittenda laxati-  
va, & nunc in principio, nunc ſub curſu mor-  
bi, ſudorifera uſurpanda veniunt, ſpecificis  
juncta: c. g.

℞. *C. C. ſ. Δe* ʒj.  
 ʒii *diaphor.* ʒβ.  
 ʒ *vol. viperar.* gr. v.  
*laudan. opiat.* gr. j.  
 M. f. *pulvis*: S.

### Anhaltend Stärck-Pulver.

℞. *Aq. mentha* ʒj.  
 ʒ *theriac. campb.* ʒj. ad ʒij.  
 ʒii *diaphor.* ʒj.  
*off. hum. calc.* ʒβ.  
*extr. theriacal.* gr. v.  
*ſyr. card. bened.* ʒβ.

M. f. *Potio pro una vice*: S.

### Anhaltend Stärck-Träncklein.

Ubi nimia diſſolutio ſanguinis adest, liquor  
ſtypticus ſive ʘ potabile Bartholetti ex ʘ ſi-  
gillata & ʘ u ʘi convenit.

℞. *Q. E. Cinnam.* ʒj.  
*mentha* ʒβ.

M. D. S.

### Stärck R 20. biß 25. Tropffen.

Quibus & ſimilibus, tam generalibus,  
quàm ſpecificè legitima methodo uſurpatis,  
ubi mitigatum fuerit malum, pro reſtituenda  
inteſtinatorum noxa ab ulceribus induc-  
ta, in  
tertia indicatione morbi conveniunt potio-  
nes vulnerariæ, quibus nempe abſtergantur  
& conſolidentur inteſtina, & purificetur ſan-  
guis. Conveniunt etiam tunc baſama ʘis  
tam commune cum oleo terebinthinæ, aut  
oleo aniſi, aut oleo baccarum juniperi, aut  
oleo ſuccini præparatum; quàm baſamum  
ſulphuris nobilius, quod nobis deſcripſit Po-  
lemannus *Tr. de ʘe Philoſophorum*, qui videat-  
ur: fit ex ʘe ʘato ʒii. Potiones vulnerariæ  
poſſunt præſcribi hoc modo ad imitationem  
Sylvii l. i. c. 13. §. 52.

℞. *Heder. terreſtr.* M. ij.  
*Alchymill.* ſ. *pyrol.*  
*plantag.* ʒ M. j.  
*ſummit. hyperic. florent.* M. j.  
*raſur. C. C.* ʒiβ.

Coque in ſ. *∇ ſimplic.*

*Colatura* ʒiix. ʒix. l. x. adde  
*ſyrup. Corallor. Quercet.*  
*de ſymph. Fernel.* ʒj.

M. pro *Potu.*

De quo bis vel ter æger quotidie bonum hau-  
ſtum capiat, qualibet vice x. xii. ad xv. gut-  
tas baſami ʘis terebinthinati vel aniſati ſi-  
mul aſſumendo.

Item baſamum Peruvianum præter hoc,  
quod vomitum in dyſenteria moleſtum ſup-  
primat, etiam inteſtiniſ læſis ad ʒβ. mirè  
conducit. Propinatur in forma pulveris cum  
ſaccharo albo aut coralliis præparatis miſtum;  
vel in vitello ovi aſſumptum & diſſolutum  
egregium eſt; ſicuti etiam clyſteribus felici  
cum ſucceſſu addi ſolet: conf. M. A. N. C.  
*Ann. 3. obſ. 77. p. 127. & Ann. 8. obſ. 63. p. 106.*

Item ℞. *H. B. heder. terr.*

*plantag.*  
*tormentill.* aa. Mj.

*ſt. balauſt.* p. iij.  
*raſ. priapiceti* ʒij.

Coque in *∇ ferrarior.*

*Colatura* lbij. adde  
*Syr. corall. Querc.*

*de ſymph. Fern.* aa. ʒiβ. M. S.

### Anhaltender Wund-Tranck auff etliche mahl.

Juxta hæc interna, non negligenda exter-  
na, quæ inter imprimis conveniunt interdum  
clyſmata pro certis ſcopis injicienda: ſed non  
adeò frequenter uſurpentur, ne magis inte-  
ſtina



ſana irritentur , ac crebriora ſuperveniant tormina.

Clyſmata autem iſta ſunt aut temperantia acrimoniam humorum , adeoque ſimul anodyna , aut ſunt consolidantia exulcerationem , ſeu inteſtinorum læſionem. Imprimis quando urget tenſmus , vomitus, tormina craſſorum inteſtinorum, tunc conveniunt anodyna clyſmata, quæ & temperant , ſicuti in fine morbi vulneraria uſurpanda. Ea quæ temperant , & vi anodyna polleant, ſunt clyſmata ex lacte, vel ſolo, vel in quo ſaccharum injectum, injicienda tepidè : vel lac , cui interdum ratione doloris incoquantur flores chamomillæ & aliquot capita papaveris, addito parum ſacchari : vel clyſmati ex lacte addantur theriacæ ʒij. ſic interdum lac chalybeatum, in quo diſſoluta ʒß. plus minus ſevi hircini, cum vitello ovi diluti, ne iterum concreſcat, eſt elegans : e.g.

℞. lact. vaccin. l. ſimpl. l. chalyb. ℥j.  
ſevi hirc. ʒj.

Mixta injiciantur pro Clyſtere : S.

**Pindernd Clyſtier.**

℞. flor. melilot.  
ſambuci.  
verbasc. aa. Mj.

Cap. papav. c. ſem. N. iij. ad v.

Coque in ſ. q. lact. bubul. chalybeat.  
Colatura ℥j. adde

Theriac. ʒj.

ſevi cerv. l. hirc. ʒß. ad ʒvj.

Vitell. ovi q. ſ. pro ſolvendo ſevo.

Miſc. pro Enemate : S.

**Pindernd Clyſtier.**

Loco capitum papaveris addi poteſt *Phlo-nium Romanum* ad ʒij. omiſſâ theriacâ , vel *laudani opiati* gr. ij.

Quibuſdam expertum eſt clyſma , quod recipit lactis quantum ſufficit, in quo decocta ſunt radix ſymphyti majoris & ciceres rubri : cui additur

pingued. caprin. cum vitello ovi diſſol. ʒj.

Porro etiam commendantur clyſmata vulneraria ſive consolidantia, inter quæ imprimis commendo clyſmata terebinthinata, ad imitationem Sylvii l. 2. §. 51. & Barbetæ præſcripta : v. g.

℞. lact. rec. chalyb. ʒjv. vj. ad iix.

Terebinth. in vitello ovi ſol. ʒij. l. ʒiij.  
ad ʒß.

Mellis roſac. ʒß. l. ʒvj. ad ʒj.

M. f. Clyſter. S.

**Heilend Clyſtier.**

Cui etiam theriaca ad ʒj. l. ʒij. addi poteſt.

De hoc enemate dicit Sylvius : tali enemate, & quidem unico, circa initium, adeoque maturè injecto, curavi non ſemel dyſenteriam cum puris dejectione conjunctam.

℞. HB. burſa paſtor.

plantagin. aa. M. j.

rad. ſymph. maj. ʒj.

Tom. II.

Coque in ſ. q. ∇ ſimpl.

Colatura ʒiv. ad ʒvij. adde

Balf. Per. in vitell. ovi diſſol. ʒj. l. q. ſ.

M. f. Clyſma : S.

**Heilend Clyſtier.**

Tepidè injiciatur.

Pertinent huc clyſmata ex cancriſ fluvialibus, & eorum decoctis, quæ ſimiliter egregiè conveniunt. Modus præſcribendi eſt talis :

℞. Juris ∇ fluv. contuſ. l. coct.  
ʒviii. l. ʒx. adde

ſevi hircini cum vitello ovi ſolut. ʒj.

M. l. a. pro Clyſmate.

Acre corroſivum abſorbet , & vulnerariâ vi prodeſt inſigniter in dyſenteria.

In dolore adhuc urgente addatur ſyrupus papaveris à ʒvj. ad ʒj. ita enim præſcribit Deodatus :

℞. Juris ∇ fluv. ʒiv. l. vj.

ſucci ∇ fluv. contuſ. expr. ʒiij.

Colaturæ calidæ adde

vitell. ovi. N. j.

Syr. de ſymph. Fern. ʒj.

papav. albi ʒß.

M. pro Clyſmate.

Oleum lini in dyſenteria præſentaneam præſtat operam : vid. Roſſinécus *Chym.* pag. 222.

Inter externa ulteriùs commendantur ; inunctiones, quò pertinet theriaca, abdomini largiter illita, item emplaſtra theriacalia Timæi l. 3. Caſu 18. & linimenta ex oleo maſtichis, cydoniorum, myrtino, hyperici, abſinthii, menthæ, nardino, hyoſcyami, nucis moſchatæ expreſſo, & ſimilibus, acuatîs cum deſtillatis macis, menthæ, ceræ, chamomillæ, anethi, aniſi, ſceniculi, ſimilibusque appropriatis, quæ calidè largiter tam ventriculo quàm univerſo abdomini illinenda. Porro regioni ſtomachali omentum vervecis recen-ter extractum, & o. hyperici itroratum imponendum, quod inſigniter commendatur. Addunt quidam theriacæ & his oleis etiam æm ſigillatam, corallia, crocum ovis adſtringentem : ſed eſt ridiculum ; nihil enim hæc operantur, cum ulteriùs penetrare nequeant. Par ſit judicium de emplaſtris ex talibus & ſimilibus paratis, uti eſt emplaſtrum contra rupturas, & emplaſtrum ſtypticum Mynſichtii.

NB. Fomenta etiam in forma ſacculorum varia applicantur, qui interdum egregiè ſunt ex foliis quercus in aceto coctis, abdomini & podici applicati, Rulando in ejuſdem Praxi uſitati.

℞. Fol. querc.

Furfur. tritic. aa. M. iij.

Fl. chamomill.

verbasc. aa. M. ij.

Conciſa includantur ſacculis duobus, uno rotundo majore, altero oblongo minore : immergantur aceto calido, & major applicetur umbilico ; minor verò podici urgente dolore

( S )

lore

lore tenesmode; crebrius repetantur, & egregie conferunt.

D. S.

**Lindernde Säcklein.**

℞. flor. chamomill.  
linar.  
sambuci.  
verbasf. aa. M. ij.  
sem. fenugraci  
lini aa. ℥ij.  
bacc. junip.  
lauri aa. ℥j.

Incisa concludantur sacculo interpassando, abdomini applicando.

℞. HB. verbasf. c. flor. M. ij.  
flor. chamomill.  
sambuci aa. M. j.

Incisa & contus. includantur sacculo.

Wepterus admovet spongiam è decocto florum verbasf. in lacte cum levamine,

℞. Iberiac. ℥vj.  
℞. destillat. mac. ℥j.  
M. L. Linimentum : S.  
**Lindernd Säcklein.**  
℞. Iberiac. Androm.  
℞. expr. nuc. mosch. à ℥ij.  
destillat. macis ℥j. l. ℥ss.

M. pro Balsamo : S.

**Lindernder Balsam:**

Inungatur regioni stomachali & umbilicali, imponendo desuper laterem calefactum.

Omnia aliàs conveniunt, quæ suprâ de vomitu & diarrhœa dicta fuerunt. Item

℞. ℞. expr. nuc. moschat. ℥ss.  
Balsam. Qis anis. ℥ij.  
Peruvian. ℥j.

M. f. Linimentum.

Porro notabile est, quod excretio fœcum sanguinolentarum super caput mortuum vitrioli vel vitriolum modicè calcinatum, vi quasi sympatheticâ singulariter conveniat in dysenteria, id quod Cnœffellii fuit secretum; aut pulvere sympathetico cruor ejus aspergi potest. Ager ergo semper fœces deponat super ☉ & li, vel excrementa prima vice excreta cum salis communis manipulo miscantur. Quo etiam facit persicaria cum vino decies chalybeato in mortario contusa, & ad cataplasmatis consistentiam cocta; applicatur lumbis & spinæ juxta renes, refrigeratum denuò applicetur; post aliquot horas in fimo equino sepelitur, sicque morbus curatur: vid. Agricola *Chirurg. parv. p. 820*. Tandem suffitus ex rasura C. C. podice exceptus, quando nempe rasura C. C. inicitur prunis candentibus, & fumus exhalatus per infundibulum excipitur: item suffitus aceti, super laminam ferream candefactam effusi, item suffitus ex zingibere ano excepti crebrius, & quoties alvum dejiciunt acri, sunt egregii & modernorum quorundam, in spe-

cie Anglorum, qui dysenteriam sic curarunt, experimenta elegantia, maximè in dysenteria cum tenesmoi Quæ plantis pedum applicantur, non magni facio, ideoque hoc etiam prætereo.

## ARTICULUS II

De

**Tenesmo.**

**T**enesmus dysenteriz cognatum, & ut plurimum conjunctum malum est: nam ordinariò dysenteriz etiam supervenit; adeò ut ferè id, quod in intestinis superioribus est dysenteria, hoc in intestino recto est tenesmus. Germanicè vocatur *der Stuhlzwang*/ quibusdam *der Arschfistel*. In genere nempe consideratus, est assidua cupiditas egerendi per alvum, in qua ipsa tamen parum, idque ferè saltem nonnihil mucosum, aut viscosum, aut cruentum, aut purulentum aut nihil omninò excernitur.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta est intestinum rectum, imprimis ubi anus cingitur sphinctere musculofo, ibi sensibile admodum est, & si leviter irritatur, Tenesmus adest.

### CAUSÆ.

Causa tenesmi proxima efficiens formalis est spirituum eò provocatorum impetus: cujus causa occasionalis est irritatio continua intestini recti, quod quacunque occasione ita stimulatum & irritatum spirituum vi se contrahit, & ita egestionem urget.

Irritatur autem intestinum rectum & stimulat vel per consensum ratione aliarum partium, vel per essentiam. Per consensum etiam observatur aliquid in nephritide seu dolore renum, quia tunc temporis sub motu calculi contingit tenesmus propter quosdam nervos ex plexibus mesentericis ad intestinum rectum derivatis, ex quibus etiam alii ad renes distribuuntur: Observavit id Timæus von Guldenslee/ & ego etiam: item calculus vesicæ, ubi imminet urethræ, in viris frequenter tenesmum inducit, pondere suo & irritatione colli vesicæ similiter irritans intestinum rectum: confer. Horstius in  *suis Problem. pag. 70. Dec. 6. Quæst. 6.* item Timæus von Guldenslee in *Epistol. p. 242.* Ad hæc mulieres propinque partui tenesmum interdum patiuntur, propter uterum incumbentem intestino recto.

Hi sunt Tenesmi per consensum.

Per essentiam frequenter oritur Tenesmus, si malum hæret in ipso intestino recto, primariò à mucos tenaci acido seu pituita viscida acida, firmiter intestino recto agglutinata, & istud plus minus rodente, vellicante, hinc excoriantem, & tandem planè exulcerante: quæ

ratio-

ratione ordinariò dysenteria supervenire solet, propterea quod, quæ excernuntur, acida & acria corrosiva, & simul glutinosa, intestinis pertinaciter adhærent: item anus inflammatus similiter non rarò infert tenesmus, undè & hæmorrhoidibus cæcis, indeq; plus minus tumentibus aut dolentibus tenesmus, ceu frequens comes, se associat. Pertinent huc etiam ascarides intestinum rectum mortificantes & rodentes; qui ut plurimum etiam, si non semper, tenesimum inferre solent: vid. Forestus l. 21. observat. 29. in schol. Tandem purgationibus violentioribus aut post aloën crudam sæpius usurpatam etiam supervenit tenesmus, partim propter excrementa acriora excreta, & intestino recto nonnihil adhærentia, & illud plus minus stimulantia, partim verò propter particulas purgantium resinosas, visciditate suâ dicto intestino pertinaciùs adhærentes & hoc continuo stimulant. Faciunt etiam hic omnes excoriationes, exulcerationes, aut fistulæ internæ intestini recti.

### DIAGNOSIS.

Diagnosis est clara per se, imprimis ex relatione ægri.

### PROGNOSIS.

Tenesmus ex se consideratus, leve est malum: si tamen habeatur causarum ratio, variat prognosis.

Nempe qui per consensum, est absque periculo; per essentiam vero subindè procidentiam ani infert.

Interim si processerit, & non ritè curetur, inducitur excoriatio intestino recto, & non rarò in ulcus sordidum degenerat, quòd ulterius tandem facilè in fistulam ani abit, difficulter sanabilem, sed per sectionem curandam, quales fistulæ hic locorum sunt raræ; in Anglia verò frequentes.

In gravidis gravior tenesmus, si non semper, subinde tamen abortus est causa; vid. Prognosis in dysenteria, & Hippocrates sect. 7. §. 27. Id quod confirmat la Moniere de Dysenteria, c. 5. pag. 169. nempe prægnans dysenterica tenesmo correpta semper abortum passa est; & cum periculo, si grandior fuerit foetus.

### CURA.

Cura varianda est pro causarum ratione: ante omnia causa vellicans removeatur; unde &, si per consensum fuerit tenesmus, curato priori morbo & ipse evanescit. Inter cæ opiat vellicatio intestini spasmodica maturè sistatur, si per essentiam fuerit, imprimis causa materialis, humor acris, acidus & viscidus, corrigatur & abstergatur; excoriatio verò indè nata aut exulceratio jam facta mundificetur, & denique consolidetur. Conveniunt ergò clysmata mucum abstergentia, &

Tom. II.

vi anodynâ irritationem sistentia in pauca quantitate, nempe ad ℥ss. injecta, simul hæc vel ex simplici lacte, cum sevo hircino permisto. Nam & forus lactis tepidi tenesimi molestiam lenit. Aliàs nudum decoctum cicerum rubrorum cum floribus verbasci instar clysmatis cum sevo hircino, vel cum melle rosaceo injectum, cui & Θ℥ additum, satis est conveniens: e. g.

℞. flor. verbasci. Mij.

femin: cicer. rub. ʒij.

Θ℥ ʒj.

Coque in f. q. ▽ simpl.

Colatura ℥ij. adde

sevi hircini cum vitello ovi dilut. ʒjss.

Mell. rosati ʒj.

M. pro Clysmate, pro duabus vicibus applicando: S.

### Lindernd Clystier auff zweymahl.

Formulam elegantem habebitis in Sennerti Praxi, ubi de tenesmo, quam etiam commendat D. Michaelis, in qua basis sunt lumbrici terrestres, ex quibus parata clysmata etiam in dysenteria sunt egregia:

℞. flor. verbasci. Mj.

rosar. r. Mss.

lumbric. concis. ʒj.

sem. fœnugr.

psyllis aa. ʒij.

Coque in lacte recenti, ubi magis dolor leniendus: vel in sero lactis ubi materia peccans abstergenda:

Colatura ℥ij. adde

Mell. rosac. ʒvj. ad ʒj. l. ʒjss.

M. l. Clyster pro duabus infundendus vicibus, S.

### Lindernd Clystier auff 2. mahl.

Præ cæteris appropriatum remedium in tenesmo est verbasculum, seu, ut aliis vocatur, rapsus barbatus, quocunque modo externe usurpatum, speciatim decoctum ejus aut florum in lacte, cum spongia vel linteis multiplicatis instar fomentiano admotum: nam dolorem lenit, acrimoniam temperat, fluxionem repellit, ac speciatim tenesimum quemcunque, etiam dysentericum, curat. Facit huc suffimigiunt ex verbasco & terebinthina Mynsichtii, quod egregiè convenit: vel fiunt simul sacculi ex verbasco, foliis quercus & anserina, qui vel in lacte decocti, vel loco ejus in aceto fervido ebulliti, potius applicentur.

Vel

℞. HB. linar.

verbasci aa. Mj.

flor. chamom.

verbasci. aa. Mij.

Include sacculo, in lacte chalybeato coquendo.

D. S.

Schmerzstillendes Eß klein.

Äger in sella perforata decocto ferventi infundat.

(S 2)



fideat, & fumum exsurgentem excipiat; vel in lacte chalybeato cocta linteis multiplicatis calidè applicetur; vel includantur sacculo interpassato, & calidè parti dolenti admoveantur. Optimi clysteres fiunt ex jure capitis aut carnis vervecinæ cum aliquot guttis olei destillati Philosophorum vel ceræ; hoc enim ꝑ ceræ mirabile est in exulceratione intestini recti, potenter abstergit & consolidat. Loco olei ceræ aut similium etiam balsamum Peruvianum, simili ratione applicatum, est efficax. Præter dicta & suffitus Tenesmus sistunt, in specie suffitus ex latere candefacto vel limatura ꝑis candente, aceto ferventi infuso, ano exceptus à quibusdam etiam multum est commendatus. Aliàs fiunt etiam suffitus ex thure, myrrha, galbano, nuce moschata, rosæ & similibus: item fumus decoctionis sabinz ex  $\nabla$  & aceto, laminæ ferreæ aut lateri calefactis infusæ, profecto exceptus, Stœckerus *in Praxi* mirabiliter juvare dicit suffumigium de thure & pice, super carbones vivos projectis. Quod si verò gravius urgeat tenesmus, etiam possunt applicari glandes sive suppositoria, parata ex sevo hirci, vel melle inspissato, cui pilulæ de cynoglossa vel nonnihil de opio additum fuerit; conf. Amat. Lusit. C. 3. Hist. 97. sed vereor, ne sola applicatio suppositorii, irritando intestinum, malum exasperet.

Tandem, ubi nonnihil exulceratus fuerit anus, conveniunt injectiones ex vulnerariis paratæ, illinendo postmodum cum oleo rosarum & lumbricorum terrestrium, probè in mortario plumbeo agitatis; vel etiam cum solutione lithargyrii in aceto subactis & in linimenti consistentiam redactis; vel cum unguento populeo, de tutia, aut unguento diapompholygos, aut de cerussa camphorato, aut etiam dicta linimenta levi supposito ex sevo hircino cum pulvere thuris, tutia & similibus excepta ad mundificandum & consolidandū ulcus ita applicentur; vel unguenti albi camphorati & diapompholygos ana, cum pauca  $\nabla$  li dulci subacta, & in consistentiam unguenti redacta, quocunque modo, vel linteis vel aliis applicatur, vel ano intruditur.

Denique ad consolidandum & mundificandum ulcus in tenesmo enatum, ꝑ mastiches optimè convenit ad aliquot guttas in  $\nabla$  menthæ, plantaginis aut pulegii exhibitum, quod valdè laudatur, conferens etiam, si ex ipsa dysenteria fuerit malum. Hillerus *in C. 1. Curat. 75.* refert tenesmum chronicum & admodum contumacem, quem post multa alia frustra curavit oleo  $\nabla$  li rubello in jusculo carnis exhibitio, à quo purulenta multa excreta fuerunt. Hæremus adhuc in fluxibus alvi, & quædam in iis, in quibus excernitur sanguis.

## ARTICULUS III.

De

## Fluxu Hepatico.

**F**luxus hepaticus modernis rarissimè visus, adeò ut ob id non pauci omninò dubitent, dari reverà talem fluxum, utut hi, non quidem antiquissimi, sed majoris ævi, multa de eodem clamitent & scribillent, adeò ut etiam Varandæus conscripserit specialem *Tract. de Hepatide*, seu de hoc affectu, aut alvi fluxu vitio hepatis contingente.

Est veteribus hic fluxus epaticus, quando nempe sanguis aquosus & imperfectus, tenuis, atque, ut vocant, loturæ carniū similis, absque dolore aut gravioribus symptomatibus per alvum copiosè rejicitur.

Appellationis ratio desumpta fuit, prout à veteribus describitur, ex præconcepta hypothesis majorum, quod nempe hepar sanguificet; adeoque cum hunc fluxum oriri voluerint ex deficiente sanguificatione in hepate, ob id eum fluxum epaticum vocarunt. Sed talis fluxus hepaticus veterum est reverà non-ens; si enim exactè consideremus exempla eorum, qui referuntur hoc fluxu laborasse, ea longè aliud quid persuadent, scil. nil aliud, quàm fluxum hæmorrhoidalem, ex hæmorrhoidibus superioribus oriundum. Unde nunquam hepatis vitio hoc fieri dicendum est, cum hepar de sanguificandi munere jam sit depositum.

Quod ergo attinet diarrhœam cruentam, dysentericæ contra-distinctam, tres sunt tantum casus, in quibus oriri solet: Nempe 1. quando uberius fluunt hæmorrhoides internæ & superiores, qualem sub nomine hepatici fluxus intelligit Barbeite *in sua Praxi*.

2. Quando talis fluxus remanet post dysenteriam, jam curatam, in qua propter depauperatam massam sanguineam, & excoriatâ interiorem intestinorum membrânâ, vasa sanguifera excoriata nondum perfectè consolidata; sic enim etiam subindè aliquid de sanguine tenuiore transudat, & sic indolens talis sanguinea diarrhœa, & ut Sydenham vocat, dysenteria habitualis, superesse solet.

3. Quando quacunque occasione vasa quædam sanguifera in intestinis, vel per anastomosis, vel per diæresin, aperiuntur, & ita hæmorrhagiam intestinale excitant.

Eadem etiam causæ internæ, quæ v.g. hæmorrhagiam narium excitant, eæ etiam similem hæmorrhagiam intestinis inferre valent, in specie acrimonia sanguinis, perforans plus minus orificiola intestinalium vasorum, quæ causa

causa eò est promptior, quò serosus magis sanguis simul existere solet, qualis affectus exemplum suggerit Deodatus, qui fluxum hepaticum ac diarrhœam cum fluore uterino & profluvio mensium immodico in una fœmina simul observavit in *Valetudin. pag. 231.* Conf. etiam Bentius de *Medicina Indorum pag. 24.* Quâ ratione etiam huc pertinet dysenteria notha scorbuticorum, cujus facta est mentio suprâ, nisi & hæc fortan ad hæmorrhoides pertineat. Adhæc ex suppressione consuetæ cujusdam sanguinis evacuationis etiam fluxus cruentus talis oriri potest. Quo pertinet observatio Foresti *l. 2. Observ. 20.* de fluxu sanguinis puri ex vita otiosa, & sanguinis narium fluxu usitato suppresso, venæ sectione in brachio curata: sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Medic. Princip. Histor. 84.* observat sanguineum fluxum hepaticum in iis, in quibus artuum aliquis præcisus; item ab omiſsa exercitatione solita, & similibus causis: Exemplum tale proponit Deodatus *l. 4. p. 217.* non minus quàm Borellus *C. 1. Observat. 99.* Tandem occasione insignioris cujusdam & confirmatæ obstructionis in quodam viscere abdominis, propter impedimentum circulationis sanguinis interdum arteriæ mesentericæ aperiuntur in intestina, & talem fluxum cruentum excitant. Quò pertinet Bartholinus *Histor. 41. Centur. 6.* ubi notat cruentas dejectiones, supervenientes mesenterii obstructionibus salutares: sic sanguinis miros fluxus in lienosis videbitis recensitos in Marcello Donato *l. 4. Histor. Med. Mirab. cap. 9.* Quò facit *obs. 20.* Foresti *l. 22. in schol.* excretionis sanguinis viri, in indurato splene factæ salutaris. Adeò ut de fluxu hepatico, & ipsi simili, meritò dubitent moderni, cum rarissima, imò ferè nulla, prostent exempla. Ob id Barbette *l. 4.* vult, quod talis fluxus, dictus hepaticus, sit tantummodò apertio superiorum venarum hæmorrhoidalium, per quas evacuetur sanguis, & subinde per anum defluit & effluit; quæ sententia etiam mihi videtur verissima.

Quibus tamen placet defendere talem fluxum, qui à veteribus vocatus fuit hepaticus, ipsi nullam aliam possunt assignare causam, quàm nimiam sanguinis aquositatem & tenuitatem, ob nimiam feri abundantiam, quod ipsum abundans serum in tantum tenue & fluxilem reddat massam sanguineam, simulque vasa sanguifera, imprimis meseraica, copiosiora adeò laxet, ut exinde sanguis aquosus per vasa laxata faciliè & copiosè transudare possit.

Unde remota causa erit partim chylicatio læsa, partim feri excretio vitiata seu impedita: Chylicatio læsa, quando aut copiosis assumptis potulentis aut alia quacunque ex ratione chylus non lacteus & legitimæ

consistentiæ, sed tantummodò tenuis, aquosus & admodum fluxilis generatur. Unde si postmodum vel vitio renum vel debite motionis corporis, vel alia quacunque ex causa supprimitur feri excretio, non potest non exinde subsequi sanguis aquosus & faciliè transudabilis.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: per se patent eadem.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: eandem similiter statuunt, quæ solet statui in fluxu nimio hæmorrhoidum, aut aliis præternaturalibus, sanguinis excretionibus: scilicet excretionimis copiosa & frequens sanguinis tandem corpus ad cachexiam, hinc hydropem, tabem & similia symptomata necessariò disponit, ut propterea fluxus hepaticus dictus, in juvenibus interdum difficulter, in senibus verò nunquam ferè aut rarò curetur. Præsupponit semper scilicet in corpore vitium, à quo ipso fluxus dependet, & cujus respectu magis vel minus curabilis evadit.

#### CURA.

Quod attinet curam: pro causarum antecedentium seu remotarum varietate variat, aliàs eadem est, quæ reliquarum hæmorrhagarum: conveniunt etiam eadem remedia styptica, quæ vel in diarrhœa usurpantur, vel quæ ad nimium hæmorrhoidum fluxum adhibentur, vel denique, quæ alias hæmorrhagias quascunque in genere suppressere solent: unde si sit hæmorrhoidum apertio, harum lege curetur, præsertim per sternalia, in specie per R<sup>m</sup>  $\frac{1}{2}$ is Oli. Si sequitur dysenteriam, eadem est cura, quæ dysentericiæ levioris.

In specie, quæ ad fluxum suppressendum commendantur, sunt imprimis ex tormentilla, plantagine, sanicula, coralliis, agrimonia, & ex urtica majore petita remedia, succus plantaginis, portulacæ, & succus urticæ majoris, uti quemcunque sanguinis fluxum sistunt, ita in specie ad fluxum hepaticum commendantur: quibus si misceatur succus saniculæ, eò est convenientior. Cum his succis misti syrupi coralliorum, item papaveris albi, eorum vires intendunt. Conveniunt etiam Martialia, quæ omnia per se semper adstringunt, tam  $\frac{1}{2}$  Martialis in mineris  $\sigma$ is frequens, quàm etiam crocus  $\sigma$ is adstringens, & lapis hæmarites cum succo granatorum; aut R<sup>m</sup>  $\frac{1}{2}$ is Oli sive R<sup>m</sup>  $\sigma$ is adstringens: de quibus alibi; quia præparationes eorum sunt variæ, adeoque habendus delectus. Agrimonia sive eupatorium specificum est Poterii, qui dicit: se decocto eupatorii desperatam hepaticidem curasse. Cum hoc decocto sive parata essentia ex succo eupatorii si misceatur R sulphuris vitrioli,

aut legitima lapidis hæmatitis R erit mistura maximè conveniens, v. g.

R. *Essent. agrim.* ʒss.

Ra. *Dis Oli* ʒij.

*Essent. anod. c. succ. cydon.* l. quocumque modo parat. ʒj.

M. S.

Anhaltende Tinctur.

Dosis 30. guttulæ.

Non sine ratione addo essentiam opiatam, propterea quoniam practicum observatibus constat, fluxum hepaticum post dysenteriam laudani opiatu usu curatum. Id quod affirmat etiam Bontius in *medic. Indorum cap. 4.* qui dicit: optimum remedium ad fluxum hepaticum esse extractum opii vel croci.

Si acrimonia plus minus serosa dictum malum inducat, rhabarbarina, item vulneraria & adstringentia cum opiatu conducunt: hinc terræ, ut ʒ sigillata, corallia, trochisci de carabe, unicornu fossile, &c. conveniunt. Item non inconsultum est ad sudores & sudorifera decurrere, ad imitationem *Varandai*: qui l. c. p. 173. dicit: *Quidam putant in progressu morbi non inutile esse sudores decocto quodam, ut seminis milii, radice china vel sarsaparilla provocare, quia sudores alvi fluxum imminuere solent, rapta aliorum serosa materia, & hepar calefaciunt, quod experiri non erit inutile: si enim æger sudet, & leviter id ferat, magna erit salutis spes.* Pro hoc scopo lignum lentiscinum, item lignum cotoneum, decoctum instar aliorum lignorum, & propinatum singulariter commendatur in hoc morbo: Porro gelatina C. C. parata vel infuccata cum ʒ cinamomi, à Lindano in tali casu tanquam experta commendatur.

Denique passulæ singulariter in hoc morbo conveniunt; hæ enim multum faciunt ad laudabilem sanguinis crasin, & æquabilem fermentationem conservandam. Facit huc *obs. 20. l. 22.* Foresti, ubi nil aliud ægrum vexavit, quam talis diarrhœa cruenta, ex sanguine acriore nata.

Nec abludit cura Petri Johannis Fabri, qui notat fluxum hepaticum ex potu ʒ frigida & usu lactucarum cum aceto multo curatum, præmissâ purgatione ex extracto rhabarbari, syrupo coralliorum cum ʒ cinnamomi sæpius sumpta.

Quod si suppressa quædam sanguinis excretio malum induxerit, hac in ordinem revocata, & interea venæ sectione revulsoriâ institutâ, curetur malum.

Quod si tandem impedimentum sanguinis

circulo ex infarctu aut tumore visceris injiciatur, hoc, quantum possibile, sublato, & venæ sectione revulsoriâ administratâ, fluxus cruentus sufflaminandus erit.

## ARTICULUS IV.

De

*Hæmorrhoidibus.*

**A**D fluxus cruentos pertinent etiam affectus hæmorrhoidales. Hæmorrhoides, quoad vim etymii, nihil aliud notant, quam quemcumque sanguinis fluxum; propriè tamen usurpatur tantummodò de fluxu sanguinis ex externis venis intestini recti, vocatur *die guldene Uder* / quia solum ad usum ægrotum vasa hæc stillant sanguinem. Dantur quidem etiam hæmorrhoides muliebres, siue evacuatio sanguinis ex vasis externis vulvæ: de quibus tamen, cum non sint hujus loci, inter morbos mulierum agendum.

Hæmorrhoidalia hæc vasa, ratione insertionis in intestinum rectum, sunt duplices: nempe hæmorrhoides superiores seu internæ, & inferiores seu externæ: externæ extrinsecè podicem lambunt: utraq; constituunt arteriam cum ejus socia vena.

Quoad originem, arteria hæmorrhoidalis superior seu interna oritur ex arteria mesenterica inferiore; venæ v. ex ramo splenico venæ portæ: unde dixerunt veteres, sed falsò, per hunc rami evacuari splenem per hæmorrhoides, cui tamen asserto repugnat lex inviolabilis sanguinis circulationis.

Quoad vasa hæmorrhoidalia externa siue inferiora, horum arteria quidem oritur ex trunco hypogastrico arteriæ iliacæ internæ, venæ verò ex vena cava, nempe ex ductu ejusdem hypogastrico, ex quo etiam vena pudendi, item vena, quæ ad musculus clunium, item vena, quæ ad intestinum rectum derivatur, & hæc sunt hæmorrhoides externæ. Jam verò cum ex hoc ramo hypogastrico, arterioso pariter ac venoso, deriventur etiam in mulieribus vasa ad collum uterinum, per quæ fit excretio menstrua, adeò ut ista vasa hæmorrhoidalia ad anum, & vasa menstrualia uteri oriantur ex uno trunco, exinde facile patet, quid fiat nonnunquam, ut sæpius in mulieribus menstruationis defectus compensetur fluxu hæmorrhoidum. Exemplum vid. in Horstii *obs. lib. 4. obs. 52. p. 196. & Prob. Decad. 6. Qu. 18. pag. 91.* conf. Bartholinus in *Act. Med. Hafniens. Vol. 1. p. 156* subinde etiam cum mensibus, sed rarò simul fluunt hæmorrhoides. Conf. M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 24. pag. 39.*

Ante-



Antequam ulterius pergamus, melioris doctrinæ ergò ante omnia differentia hæmorrhoidum sunt attendendæ: nempe hæmorrhoides in genere sunt vel furentes, vel fluentes: illæ sunt dolentes, & alio nomine dicuntur cæcæ, ex eo, quoniam non sunt apertæ, sed osculis quasi clausis connivent; unde propter clausuram furibundè dolent & tument. Fluentes, sive apertæ dictæ, sunt, quæ apertè sanguinem fundunt, & nunc confertim rivuli instar, nunc successivè guttatim effundunt: Prius si fiat, signum est affectæ arteriæ: si guttatim & pedetentim effluat, venæ sunt affectæ, sicque fit excretio, maxime si feces alvi ejiciuntur, tunc enim ante excretionem conatus est pressorius. Hæmorrhoides hæc fluentes sunt vel spontaneæ, vel non spontaneæ: Spontaneæ sunt beneficium naturæ se ipsam exonerantis, in morbis chronicis oriuntur, & subinde in apparenter sanis cum euphoria solent emitti, hæmorrhoides non spontaneæ sunt vel criticæ vel morbidæ: criticæ sunt, quæ morbum acutum in declinatione solvunt, adeoque salubres sunt; morbidæ verò sunt, quæ propter quaecunque causam in perniciem ægri in morbi principio oriuntur, irritatâ naturâ ab impetu causæ morbificæ, adeoque sunt nocivæ & p.n. hæmorrhoidum fluxus subindè est frequens viris, rarò quidem nostris, magis autem Italis; in his enim hic fluxus hæmorrhoidalis quasi vicarius est menstruationis muliebris. Hinc enim prostant exempla virorum, per statas periodos hæmorrhoidum fluxum patientium, ita ut interdum singulis mensibus, interdum singulis septimanis, nonnullis in viris redeant: ob id etiam alio nomine hæmorrhoides fluentes dividuntur in erraticas, quæ insalubres, & periodicas. Erraticæ sunt, quæ nullum certum recursus tempus observant: Periodicæ, quando eadem, certâ & singulari periodo, recurrunt: qualis periodiationis hæmatodes exempla in viris videb. in M.A.N.C. Ann. 4. Observat. 44. & 69. item in Amato Lusitano C. 5. Cur. 3. imò, quod in quibusdam viris suppressus menstruus hæmorrhoidum fluxus periculosam hæmoptysin in iis induxerit. Mulieribus etiam interdum accidunt hæmorrhoides, sed tunc temporis ut plurimum ex conjunctæ sunt, cum vitio mensium, quod vel supprimantur, vel naturali regula emanerint: in his autem subjectis, nunc certus ordo observatur, nunc sunt sine ordine. Aliquot scio exempla, quòd in habitu corporis succulentiore & turgidiore partium post 49. annum, quando naturaliter fluere desinunt menses, superveniat fluxus hæmorrhoidum periodicus, ita ut, cum in his certa periodo fiat evacuatio per uterum, nunc naturaliter cessantem insequatur hæmorrhoidum fluxus. Imò interdum à junio-

ribus ex mensium obstructione præternaturali oriuntur hæmorrhoidales fluxus, fluentes periodicè, qualia exempla subministrat Horstius l. 5. Observat. 45. In gravidis pariter, quibus naturaliter connivent mentes, interdum superveniunt hæmorrhoides fluentes: exemplum habet Schenckius l. 3. Observ. de hæmorrhoidibus. Observatur tamen etiam in pueris talis fluxus, vid. M.A.N.C. Ann. 4. pag. 299. Id quod fluit per apertas hæmorrhoides, ordinariò est sanguis, similis cætero in corpore sanguini, adeoque nunc floridus, nunc obscurus, nigricans: interdum tamen loco sanguinis etiam alii excrementitii succi, v.g. humor, vel albidus & aquosus, nonnihil viscidus, aut etiam aliæ variæ visitates, sub hæmorrhoidum forma per has venas emulgi solet; quæ ipsæ mucositates hæmorrhoidales sunt similes fluori albo in mulieribus, qualis hæmorrhoidum fluxus nothi, ut sic dicam, exempla videb. in Sennerto, ubi de hæmorrhoidibus p. 427. item Schneidero 3. l. de Catarrh. c. 7. p. 270. & seqq. item M.A.N.C. Ann. 1. Observ. 75. pag. 180. Interdum etiam aqua citrina & loturæ carniū similis, aut similis aquositas, effluit in istis hæmorrhoidibus, quas vesicales appellant: vid. Forestus l. 23. Obs. 5. sic fluxum hæmorrhoidum ichorodes, ejusque curam, videbitis in Velschii Hecatost. 2. p. 62. Sic & feri acerrimi fluxus per hæmorrhoides in quodam arthritico observatus fuit.

Effluunt autem interdum hæmorrhoides spontè citra arbitrium aut intentionem ægri: observavit tamen contrarium Panarollus Pentec. Observ. 47. de quodam, qui, si voluit, ex intentione intensè potuerit promovere & sistere hunc fluxum hæmorrhoidalem.

Quod attinet hæmorrhoides furentes seu cæcæ: hæc sunt nihil aliud, quàm incipiens inflammatio ani; ordinariò enim ferè insequuntur se mutuo, ex impedito sanguinis fluxu & refluxu per venas hæmorrhoidales: sanguis enim evacuandus, dum propter clausuram osculorum in istis vasis, & fibrarum vellicatarum stricturam, non potest excerni, nec remeare, necessariò stagnat, stagnatione partium porulos arctat, & in iis subsistit, atque sic tumorem ac inflammationem inducit; unde hæmorrhoides interdum suppurantur, & in abscessus ani periculosos degenerant, talis ergò cæcarum hæmorrhoidum status est admodum dolorosus, adeò ut in tali casu ægri dicant, eas esse ita dolentes, quasi perforetur podex ferro candente: & quando volunt excrementa alvi excernere, propter ingentem dolorem sæpius animi patiuntur deliquia: imò dum internæ ita affectæ sunt hæmorrhoides, ex præterlabente stercore interdum tales oriuntur dolores, ut etiam convulsiones superveniant: Scio ego exemplum mulieris

ris hoc in loco, quæ, quando volebat excernere alvi excrementa, in animi deliquium cum faciei tumore, rubore & incallescencia incidebat ex iisdem hæmorrhoidibus cæcis: simul ac verò excreta fuerunt stercora, cessabant omnia talia symptomata: conf. Bartholinus *C. 4. Histor. Anat.* 40. p. 320. Externæ taliter affectæ præter dicta symptomata, tam sessionem quam ambulationem admodum molestant reddunt.

Hæ venæ ergò hæmorrhoidales cæcæ ex sanguine stagnante, & in hoc loco coacervato, sæpè insignem contrahunt tumorem, imprimis in externis, qui tumor subindè ad insignem magnitudinem foràs prominet, adeo ut referat Lindanus in coll. manuscripto super Hartmannum, se observasse hæmorrhoides cæcas in tantum tumorem auctas, ut pugni instar extra anum foras prominere. Sub isto tumore subindè variam magnitudinem atque figuram vasa hæmorrhoidalia repræsentant, undè à figuræ varietate etiam varia nomina sortiuntur, & prout vel verrucas vel uvarum baccas, mora, ficus, &c. repræsentant, etiam hæmorrhoides nunc verrucæ, nunc uveæ, nunc ficales, aliàs mariscæ, appellari solent. Tumor ergò hic variformis cum sit, cauto opus Medico est, ne confundantur hæmorrhoides dolentes cum verrucis, cristis aut condylomatibus ani: de quibus vid. Riverius in *Praxi* p. 417. Tales hæmorrhoides cæcæ & tumescentes nunc spontè disparent, nunc perseverant, nunc aperiuntur, nunc fluunt: Imo si sanguis stagnans non discutitur, aut dissolvitur, spontanea coagulatione indurantur & in perfectos scirrhus abeunt, qualia exempla non sunt pauca; vel suppuratæ degenerant in abscessus, ex quibus oriuntur ulcera mali moris, & non raro fistulæ. Prostat exemplum intestini recti ex tumore hæmorrhoidum cæcarum scirrhusi, imprimis Sanchez in *obs.* pag. 377. de muliere mortua ex hæmorrhoidibus cæcis diuturnis, quæ ipsa post mortem dissecta ostendit intestini recti terminum 6 digitorum longitudine ad anum usque scirrhusum & induratum; simile exemplum vid. in Riverio *l. 3. obs.* de dolore & inflammatione hæmorrhoidum, in tumorem durum degenerantium. Item hæ hæmorrhoides cæcæ ex sanguinis inclusi constitutione nunc mites sunt & benignæ, nunc malignæ, cancræ, gangrenosæ, &c. Effluunt autem hæmorrhoides imprimis citra voluntatem aut intentionem ægri, & sponte naturæ: nihilominus consuetudo, seu altera natura, est adeo potens, ut etiam hæmorrhoides voluntariò fluentes reddere queat: Exemplum habet Panarollus *Pent. 2. Obs.* 47. de senè, qui cum jam juvenis laborasset fluxu hæmorrhoidum salutari, in tantum sibi reddidit familiarem cun-

dem, ut, cum in senectute se aliquo modo malè haberet, pro voluntate intensè potuerit promovere & sistere hunc fluxum hæmorrhoidalem, prout ipsi libuerit. Sane crebrior recidiva hæmorrhoidum cæcarum, it. earum genesis in gravidis & difficulter parientibus se instar varicum habere videtur. vid. Velthuisius de *liene* p. 94.

### PARS AFFECTA.

Subjectum est podex seu inferius orificium intestini recti ratione vasorum sanguifluorum.

### CAUSÆ.

Causæ affectuum hæcenus recensitorum hæmorrhoidalium, ut sanguis vel fluat vel stagnet, sunt vel internæ, ita ut quasi sua spontè superveniant, vel externæ, dum variè afficiuntur ista vasa ab externis occasionibus.

Quoad causas internas: quocunque modo accidunt hæmorrhoidalia pathemata, omnia sunt præter naturam, cum hæmorrhoidales affectus naturaliter nemini contingant, adeoque semper eorum affectus præsupponat statum p. n. & morbidum. Hinc sicuti mulieribus vitio mensium supervenire solent, ita viris non nisi hypochondriacis, aut exinde scorbuticis vel splenicis; uno nomine: melancholicis affectibus ab acido vitioso natis, accidunt. Hinc rectè notat Forestus *lib. 23. obs. 5. in schol.* quod iis, qui laborent hæmorrhoidibus, color faciei ad viridem nonnihil colorem declinet, teste Avicennæ: id quod in multis aliquando advertentes, solo hoc signo inducti, eos hæmorrhoidibus laborare pronuntiavimus. Nempe semper præsupponitur vasorum illorum stimulus vel irritatio, vel spina iisdem infixæ, h. e. fermentum Sinum in sanguine ejusque sero præternaturale, quod quacunque occasione vel hæreditario ex vitio, vel ex præcedentis causis morbosæ contractum, nunc externæ occasionis, nunc solennis cujusdam sanguinis evacuationis suppressæ causa, ad ista loca delatum, vellicando loca ista sensilia, imò & fibrarum nervearum stricturâ, sanguinis stagnationem seu coacervationem, hinc tumorem plus minus inflammatorium, tandem dolorem intensissimum ac fluxum infert; uno nomine: quæ sunt causæ, quare subindè crebriores & chronicæ hæmorrhagiæ narium sive habituales aliæ sanguinis evacuationes quosdam affligunt, ex etiam sunt causæ hæmorrhoidalium pathematum, cum non, nisi excretionis loco, differant. Conf. de tali fermento vitioso elegans consilium Cnöffelii in *M. A. N. C. Ann. 5. & 6. Append. pag. 1.*

Quoad causas externas: sunt ex varicæ, motus nempe aut agitatio sub equitatione vel uestio-

vectione paulò laboriosior, cursus diuturnus, saltatio, & similia. Fœminæ etiam in ultimis gravidationis mensibus, aut etiam; ubi difficili laborant partu, cæcas incurrunt hæmorrhoides; in utroque enim casu motus sanguinis circa uterum & anum nonnihil impeditur, partim vasa propter uterum angustata, in causa sunt, quòd tumeant vasa hæmorrhoidalia; cum podex imprimis non parum patiatur, & ita occasio subministratur, ut stagnet in venis hæmorrhoidalibus, utut non observarim ex tali casu natas hæmorrhoides, nisi in istis, qui ad hypochondriaca seu melancholica pathemata sunt proclives. Ac sanè, quò crebrius pariunt mulieres, eò magis hos affectus exasperant. Purgationes quoque vehementiores non rarò inducunt hæmorrhoidalia pathemata, partim ac præcipuè, quando particulæ medicamenti purgantis resinosa acres intestino recto visciditate suâ pertinacius adhærent, illudque stimulant, partim quando purgatione acres & Gini evacuati humores circa intestinum rectum non rarò dolores excitant. In specie hîc accusari solet aloë, quasi venarum ora aperiat, & hæmorrhoides cieat. Effatum hoc est Arabum, à Leonhardo tamen Fuchsio, & Johanne Jacobo Manardo, minus Arabibus faventibus, hoc rejicitur: sed revera commune hoc est quibusvis purgantibus magis resinosis, ut in dispositis hæmorrhoides concitent: Sic Manardus in *Epistol. Medicin. l. 12. Epistol. 3. pag. 226.* ex potu rhabarbari id observavit in viro; quod etiam de sennatis & scammoniatis à se observatum refert Scultetus in *Arman. Chirurg. Observ. 76.* Nimia etiam sanguinis intestina commotio, v.g. à nimia iracundia, uti quibusdam hæmorrhagias narium, ita prædispositis ex causa interna, vel ex vasorum & intestini recti relaxato tono hæmorrhoidales affectus infert.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa lumborum dolor sine manifesta causa ex febre, hæmorrhoidum instantium est signum: vid. Gabelchoverus *Cent. 2. Curat. 65. Annotat. pag. 98.* Distinguendus ante omnia fluxus hæmorrhoidalis verus à diarrhœa cruenta scorbuticorum, quæ aliàs vocatur dysenteria scorbutica mendosa: de quo videndus in specie Horstius *l. 7. observ. 38. pag. 393. & 394.* ubi fit mentio fallacis hæmorrhoidum fluxus, scorbuticis familiaris: qui ipse in hoc differt à vero fluxu hæmorrhoidum, quod hæmorrhoides veræ attritu excrementorum imprimis aperiantur, & etiam cum excrementis unâ sanguis evacuetur: ob id etiam rarò solet excerni sanguis, antequàm excrementa prodant: sin verò fiat, ut promiscuè excernatur sanguis tam ante quàm post excrementa, vel etiam

longè post excretionem sine dolore, torminibus, &c. copiosus sanguis effundatur, tunc suspicionem potius esse, numne sit scorbutica evacuatio, quam fluxus hæmorrhoidalis? alias color faciei ad viriditatem inclinans pathognomonicum signum est hæmorrhoidibus laborantium, teste Foresto. Interdum instante hæmorrhoidum fluxu occiput & cervix valde dolent, dolorque per totum dorsum descendere videtur, qui hæmorrhoidibus fluentibus evanescunt.

Deinde signa hæmorrhoidum tumentium distinguenda à condylomatibus, cristis, verrucis, & aliis ani affectibus: vid. imprimis in Riverii *Pr. pag. 417. de hæmorrhoidibus cæcis l. 10. cap. 11.* Nempe à Rhagadibus distinguuntur, quod hæ sunt fissuræ ulcerosæ; à condylomatibus, quatenus hæc rugarum podicis intumescentiæ oblongæ ejusdem cum reliqua illius substantiæ sint, & extra venarum quoque loca compareant; cum hæmorrhoidum eminentiæ magis rotundæ, nigrae, & in venarum tantum extremitatibus existant; à thymis sive verrucis, quod hæ sint tubercula exilia & carnosæ: qualia etiam in genitalibus utriusque sexus ab impuro coitu exoriri solent, flores thymi figurâ æmulantia, coloris candidi aut subrubri ac doloris expertia; à ficis, quatenus, quamvis hi tumores pariter lividi & dolorosi sint, carnosi tamen magis observantur, cum hæmorrhoides nihil, nisi venæ sanguine turgidæ sint.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: certum est, hæmorrhoides tam fluentes quàm furentes esse præternaturales.

Observanda autem distinctio hæmorrhoidum supra allegata: nempe criticæ aut spontaneæ, non nimia, sed parcè, debitè & periodicè fluentes, sunt saluberrimæ: nam teste experienciâ & autoritate veterum præservant & curant morbos, vulgò melancholicos dictos, aliosque graviores chronicos: uti sunt affectus hypochondriacus, mania, melancholia hypochondriaca, scorbutus, scirrhi ac tumores viscerum, & similia mala, & quando fiunt loco menstruationis muliebris, sunt similiter salutare. Sic exempla viro-  
rum longævorum ex hæmorrhoidum periodico fluxu videb. in M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 192. pag. 294. Ann. 4. & 5. Observat. 44. pag. 39. & Observ. 69. pag. 57.*

E contrâ clausæ vel intempestivè suppressæ dictos morbos exasperare solent; sicuti in scorbutico suppressæ hæmorrhoides mortis causa observatæ vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 331. pag. 543. Hippocrates l. 4. epid.*



1. 31. & 16. *Aphor.* 12. Horstius l. 2. *Observat.* 26. & Highmorus *Anat.* pag. 256.

Hinc suppressæ hæmorrhoides, quæ semel ac iterum fluxerunt, nunc foveant, nunc exacerbant chronicos morbos, præsertim arthritidem, quæ ab iisdem fluentibus non parum levatur.

Verùm ubi fluxus hic fuerit nimius & copiosus admodum, eadem imminet pericula, quæ hæmorrhagiam nimiam quamvis solent insequi; nempe universum corpus debilitat, ad hydropem, tabem, similesque affectus disponit, in specie viros ad exercitium Venerum omninò impotentes reddit; conf. hic Hippocrates *Secl.* 6. *Aphor.* 11. 12. & 21.

Imprimis notandum est, quod diuturnas curanti hæmorrhoides incumbat, ut una harum servetur aperta, quia aliàs varii morbi imminerent corpori: conf. Deodatus in *valetud.* pag. 93. item Horstius in *Probl. Decad.* 6. *Quæst.* 8. pag. 71. quod illustrat *Observat.* Amati Lusitani *Cent.* 5. *Curat.* 3. ubi ex menstruo hæmorrhoidum fluxu suppresso copiosus sanguis per os effusus fuit, & alius menstruum sanguinis sputum exinde contraxit. Atque hoc imprimis evenit, quando simpliciter stringuntur vasorum ora, sine fermenti interni, sanguinem agitantis & dicta pathemata inferentis, correctione.

Hæmorrhoides cæcæ malè curatæ, seu ubi jam adest inflammatio, non rarò dant ulcera, quæ facillimè degenerant in abscessus, ulcera, & interdum fistulas incurabiles, in Anglia malum molestissimum, interdum lethale.

### C U R A.

In cura primariò attendendus est naturæ motus, & constitutio subiecti plus minus vel sana vel morbida, hoc est, chronicis affectibus plus minus obnoxia: natura enim sola in quibusdam subiectis statuque minus naturali hunc motum & evacuationem in salutem horum instituit, ut nempe majora mala avertat. Hinc

1. Hæmorrhoides fluentes seu fluere consuetæ, ut suo tempore fluant, conservandæ; quia mitigant majores morbos chronicos.
2. Hæmorrhoides consueto fluore suppressæ, sive in cæcas degenerantes, aperiendæ.
3. Hæmorrhoides nimium fluentes moderatè sistendæ.
4. Nunquam fluere consuetæ, rarò; aut in chronicis saltem affectibus, in quibus apparet motus naturæ ad hæc vasa, & in subiectis tantùm tali evacuatione opus habentibus, aut eam fa-

cilè ferentibus, præsertim ubi suppressâ solenni sanguinis evacuatione natura quasi spontè eò inclinatur, aperiendæ.

5. Hæmorrhoides cæcæ si non fluxerint, vel non ex usu sit, ut fluant, aut resolvendæ aut discutiendæ, aut si aliàs fluxerint, aperiendæ.

Semper verò earum dolor inflammatorius sistendus. Ergò tria saltem remediorum genera pro curandis hæmorrhoidalibus affectibus locum habent:

1. Quæ eas aperiunt.
2. Quæ eas claudunt.
3. Quæ appropriata & anodyna dolentes discutiunt.

Pro istis scopis ritè obtinendis notandum in genere, quod pro curandis hæmorrhoidibus nimis apertis omnia convenient illa remedia, quæ in diarrhæis, dysentericiis, vel ipsa cholera, aut etiam aliis quibusvis hæmorrhagiis, specificè conveniunt virtute. Cæcis verò omnia illa exactè conveniunt, quæ vulgò in morbis spleneticis, & referendis viscerum obstructionibus laudari solent.

Moneo autem, hæmorrhoidalium pathemata, sive fluant sive non fluant, existere non in exactè sanis, sed qui inclinant ad affectus hypochondriacos, ita ut hæmorrhoides sint consequens talium affectuum hypochondriacorum, hinc rectè dicunt Practici: *Hæmorrhoides in sua radice magnam habere cognationem cum affectu hypochondriaco*: Conf. *Miscellanea curiosa medica*, anno 3. *Observat.* 22. pag. 40. i. e. hæmorrhoides corpore sano constituto non apparentes, sunt signum deficientis plus minus sanitatis, & hypochondriacorum affectuum quasi consecutarii: adeoque remediis huic appropriatis, in specie Martialibus, & hinc vegetabilibus amaricantibus aromaticis, eorum radicalis cura tractanda est, eò terè modò, ac in genere morbi chronici & vulgò dicti splenetici tractari solent. Martialia enim fluentes sistunt, & cæcas vel faciunt, ut dispareant, vel aperiunt, quod observatum est in liquore *olis Olari*. Cum his usurpentur simul appropriata, ut scrophularia, millefolium flore albo, crassula, pilulæ de bdellio. Conf. Wedelius *Oper.* pag. 124. & M. A. N. C. *Ann.* 3. *Observ.* 22.

In genere Martialia & hinc appropriata in hæmorrhoidalium affectuum cura utramque absolvent paginam. Martialia quidem una eademque citra adstringendi vel aperiendi respectum promiscuè in quibusvis hæmorrhoidum pathematis conveniunt: quatenus acidum specificè peccans in sui fonte corrigunt, & alterant, unde effectus ejus morbo si facillè cessant; hinc liquor Martis *Olari* vel

vel solutio Martis cum succo cydoniorum, item in gravioribus malis acidularum usus conducit. Externè verò imprimis conducunt Saturnina, in parte affecta acidum peccans absorbentia, & corrigentia: unde omnia linimenta & unguenta in mortario plumbeo bene subigi debent, & liquidis externis cerussa vel saccharum Saturni addatur.

Quoad media, cæcis aperiendis convenientia, consuetum est, ut, antequam applicentur aperiencia, præmittantur emollientia hæmorrhoides cæcas, balnea nempe aut semicupia emollientia, item fomenta, imprimis parata ex lacte tepido, vel solo, vel cum emollientibus bullito; observante id Zacuto Lusitano *in sua Praxi*, emollientia verò aperiuntur vel applicando hirudines, vel fricando foliis ficus recentibus modicè tritis, quæ forti impressione lac acre ac ferè causticum plorant, vel si hoc non sufficiat, illinuntur commode cum succo cyclaminis, eoque vel solo, vel cum succo betæ misto, imprimis ubi jam adsit inflammatio, vel dolor nimis urgeat. Vid. Henricus ab Heer *in Observ. oppidò rar.* 6. vel recipiantur alia acria, ut succus ceparum recens, vel solus, vel cum aloë sub forma linimenti mistus: item succus ari, bryoniæ, centaurii minoris, &c. externè illitus, eandem aperit, suppositoria etiam ex radice cyclaminis facta, hæmorrhoides insigniter stimulant, ut aperiuntur, vel ex hiera picra cum pulvere colocynthidos & melle parata: & colocynthidos, aut solus, aut etiam adjecto felle bubulo, aut felle porcino, cum melle l. 8, amygdalarum amararum permistus in consistentia linimenti; cancri itidem fluviales in oleo cocti ad mellis consistentiam, & imprimis in metu inflammationum conveniunt.

Tandem linimentum ex medulla colocynthidis, cum oleo amygdalarum amararum probè mista, illitum etiam easdem referat: item cataplasma factum ex stercore columbino, cum semine staphisagriæ & lupinorum, similiter applicari potest. Succus & pulpa galiopsidis furentes hæmorrhoides aperit. Valde quoque commendatur ad obstructas hæmorrhoides, quod sequitur:

*Re. ☐æ vetusta & sana bonam partem:*

Quæ bulliat ad minimum per horam unam; despumetur & purificetur, addendo in fine

*Urticas parvas f. galiopsides incisas:*

Subigantur & firmiter exprimantur.

Quod si calor adsit hæmorrhoidum, simul addenda est ☐ Rosarum: sin verò adsit simul pruritus hæmorrhoidum, addendum nonnihil de succo limonum, vel aceto destillato, vel aceto rosaceo.

Tom. II.

His ita permistis æger collocetur in sella, & foveatur linteo multiplici, fotu isto calidissimè imprægnato: quæ lintea tam diu novo fotu calido imprægnata admoveantur subinde, donec hæmorrhoides aperiuntur.

Denique inter aperiencia hæmorrhoidum ora, & quæ fluxum earum promovent, nil melius est applicatione hirudinum venis ani. Modus applicationis est: Illinatur locus cum aqua dulci saccharata, vel lacte tepido, vel sanguine animalium recenti, ut facilius hirudines allecantur: si sufficienter suxerint, adspargantur ☐e communi, cujus acrimoniam sentientes decidunt: vel illinatur locus ☐ absinthii: si interdum introrepant in anum, tunc ne internè suctu malum inferant, injiciatur clystma ex ☐ Oita, tunc à tali clysmate hirudines decidunt, & unà cum clysmate ejiciuntur. Conf. Sennertus l. 3. *Prax. ubi de hæmorrhoidibus Quæst.* 3. Quod si verò profundius delitescant vata hæmorrhoidalia, ac præsertim superiora, ita ut commoda hirudinum applicatio fieri nequeat, imitemur Zacutum Lusitanum l. 2. *Pr. Admir. Observat.* 83. qui docet: quomodo hæc per cucurbitulam applicatam commodè manifestandæ sint: quæ aliàs supra genua in parte externa applicatæ in hæmorrhoidibus suppressis conveniunt.

Quoad interna remedia, promovent hæmorrhoidum fluxum remedia aloëtica quæcunque; hinc pilulæ aloëphanginæ, & elixyr proprietatis, & similia, item mirtha, quoscunque sanguinis fluxus promovent: item quæcunque purgantia acriora & magis resinosa commodè usurpari assolent. Fluentes hæmorrhoides sive apertas quod attinet, si non ritè fluant, modò dicta easdem promovent; in specie fotus ex emollientibus: sin verò nimis fluant, in tali casu supprimantur. Supprimuntur tam remediis internis quàm externis. In fluxu hæmorrhoidum nimio corpus exactè purgandum est, vid. *Pharos Medic. pag.* 429. idque speciatim, ubi vel feri copiosioris aut acrioris aut scorbuti tinctura imbuti occasione fluxus exacerbatur, & hoc rhabarbaro, vixque alio remedio, imo & in gravidis. Conf. *Act. Medic. Hassn. vol.* 5. *pag.* 157. Tamarindos commendat Riverius ad hæmorrhoides fluentes: item cimæ quercus, exque his parata conserva & syrupus: Decoctum ligni lentiscini præservat à nimio fluxu hæmorrhoidum: syrupus de rosis siccis, utut vulgaris, est tamen efficax; Borellus namque *lib.* 4. *Observat.* 58. refert, quod hæmorrhoidum fluxus nimius ad s̄bx fuerit sedatus per syrupum hunc aliquoties adhibitum: Syrupus & succus portulacæ, myrtinus & cydoniorum sunt convenientes: succus urticæ majoris ad ʒij vel

(T 2)

tres.

tres haustus, est experimentum Riverii C. 4. *Observ.* 81. item alius irritis succus stercoris asinini haustus, aut ex hoc paratus syrupus est optimum adstringens, decoctum sanguisorbæ in potu ordinario aliquamdiu continuatum experimentum est Bartholini in *Art. Medic. Hassniens.* volum. 1. pag. 165. Dens equi marini præparatus & assumptus fuit D. Michaëlis secretum; ex quo dente etiam curabat fieri annulos pollicis pedum applicandos, quibus hæmorrhoides felici cum successu compescere solebat: ossa microcosmi præparata; item trochisci de carabe, quæ à ʒi ad ʒj. usurpari possunt, conveniunt: item de ☿ sigillata, & in genere omnia ea remedia, quæ infra ad hæmorrhagias nimias laudantur itemq; supra de vomitu sanguineo fuerunt commendata ac ferè vi acidi absorptivâ simul instructa sunt, hic optimè conveniunt, speciatim Martialia omnia, quæ uti acidum hypochondriacum absorbent, ita hoc ipso in Oli quasi naturam degenerant, & alvum suaviter apertam servant, dum simul sanguinem coagulando, excretiones ejus quascunque, & speciatim per hæmorrhoidalialia vasa, sistunt, ut Ræ Martiales, R ☿ Oli, R Oli ☿ Zvveifferi, R antiphthifica, liquor ☿is Oaris, crocus ☿is ☿atus, lapidis hæmatites & similia.

℞. ▽ plantagin.  
portulac. aa ʒiʒ.  
Ræ ☿is Oli ʒiʒ.  
laud. opiat gr. iij. l. jv.  
syr. corallior. ʒvj.  
M. f. Potio: S.

#### Anhaltend Träncklein.

Speciatim etiam pilulæ de bdellio dosi ʒj. subinde usurpatæ, mirabiliter nimium hæmorrhoidum fluxum sistunt: id quod imprimis videri potest apud Solenandrum in *Praxi S. 4. Consil.* 20. item Forestus *lib.* 23. *observat.* 5. unde quidam non sine successu adhibent suffitum de bdellio.

De opiat, quo pertinet theriaca, etiam internè contra hæmorrhoides fluentes usitat, taceo, cum per se nota sint.

Externè, quæ hæmorrhoidum nimium fluxum sistunt, sunt suffitus nidorosi & olidi, ut suffitus picis, carbonibus ardentibus injectus, exceptus in sella perforata; vel ex thure & mastiche ano exceptus: vid. Riverius: spongia ista terrestris, crepitus lupi dictus, meritò commendatur à Solenandro, qui siccatus & vasis hæmorrhoidalibus nimis apertis admotus non tantummodò sanguinem fluentem sistit; sed etiam partes jam exulceratas optimè sanat. Vid. Scholzius *Consil.* 202. Probatum sunt sacculi Rulandi, qui

ex glandibus contusis & foliis quercus, fermentur interpassati, injiciantur in + fervidum, quorum unus post alterum calidè podici applicetur, continuato usu: item pulvis ex subere ulso & mumia applicatus: pulvis bufonis combusti, vel pulvis ranæ terrestris applicatus hæmorrhoidibus, easdem stringit: item fuligo furni splendens, conqualata cum albumine ovi, ac postmodum cum telis aranearum in forma linimenti hæmorrhoidibus nimium fluentibus applicata, fluxum hunc similiter cohibet. Est experimentum Helidæi Paduani. De pulvere sympathetico res nota est. Polygonum sub axillis positum laudatur à Wedelio in *M.A. N.C. Ann.* 3. *observat.* 22. Sunt, qui recipiunt sanguinem recenter excretum, in lamina ferrea benè calefacta exsiccant & pulverisatum inspergunt hæmorrhoidibus fluentibus, & sic subito sistunt, quod observavit Rhumelius. Pinguedo etiam anguillæ, quæ, dum assatur, exstillat, non saltem egregium est contra dolores hæmorrhoidum remedium, sed & nimium fluorem optimè sistit. Hartmannus commendat cingulum ex helleboro nigro. Verùm eò magis commendarem elleborum album, cujus folia sunt instar plantaginis nerveæ: ex his linteo infutis factum cingulum lumbis applicatum, est singulare experimentum Lindani contra fluxum hæmorrhoidum & menses, cujus felicem successum aliquoties observatum in Collegio suo confirmat; imprimis si adhuc pulvis subtilissimus de corticibus quercus adspargatur, qui instar polinis adhæret, & aliàs in dysenteria est magnum remedium. Tandem ☿ Oli dulcis ritè edulcorata, vel sola cum bombace applicata, vel cum albumine ovi subacta, aut cum succo plantaginis in linimenti consistentiam redacta, & ita applicata, egregiè confert: item

℞. Unguent. de liquirit.  
☿ hyperic. q. l.  
Misc. pro Linimento: S.  
Lindernd Sälblein.

Vel unguentum de lithargyrio vel tutia, cum cinere ostrearum subactum, compescit nimium hæmorrhoidum fluxum; item suffumigium rasuræ ungulæ equinæ.

Venæ sectio in brachio, quam quidam usurpant, non adeò necessaria videtur, nisi forsitan occasione solennis suppressæ sanguinis evacuationis hæmorrhoidū nimius metuetur fluxus. Quando autem V. S. locum habet, tum in corpore pleno superiores potius venæ aperiantur, quàm inferiores, (v. g. in tumore

re



re nimio plus minus inflammatorio, aut dolore nimio, cuius occasione alia metuenda symptomata, aut nimio etiam fluxu: &c.) potissimum si hæmorrhoides non sint provocandæ; venis namque malleoli apertis, interdum sanguis magno cum impetu ad partem affectam ruit, unde exacerbatur malum, & inflammatio aut gangræna accedit. Alias corpore non æquè pleno, aut sanguine non adeo turgescente, revellendum ex salvatella, antequam hirudines applicentur. Vid. Rhodius *Analect.* p. 485. & 486. Quod si verò hæmorrhoides cæcæ non aperiendæ, nihilominus tamen admodum dolentes & tormentantes discutiendæ sint, pro sistendo dolore anodyna, ut lac, opiata, decoctum foliorum hyoscyami in lacte chalybeato, ac similia sub fots forma, vel cum spongia, vel cum linteolis multiplicatis, calidè applicata egregiè conferunt. Imprimis tamen quædam specifica crebriori experientiâ hic conveniunt: Probata hic & momordica, cuius fructus sive poma spinosa & rubicunda in oleo communi, vel lini, vel quod melius est, in oleo amygdalarum dulcium infusa, dant nobile & in specie ad hæmorrhoides cæcas optimum: In muliere quadam, quæ ex mensibus imminutis dolore hæmorrhoidum afficiebatur, feliciter hujus tentavi experimentum. Post momordicâ eminet hic etiam præcæteris verbasum & ex floribus ejus intusum paratum &c. Verbasum certè appropriatissima est planta ad cæcas & furescentes hæmorrhoides compescendas. Applicatur variis modis, præprimis in lacte vel in ∇ ferrariorum vel vino adstringente cocta folia vel flores verbasci instar suffitus, vel fomenti spirituosi in tella perforata. Experimentum hoc est Mynsichthii ad condylomata & hæmorrhoides cæcas; aut flores verbasci & sambuci simul sacco inclusi pro fomento in ∇ simplici vel lacte bulliant, & ita applicentur: aut in graviore dolore, ubi verbasci fots solus non sufficit, imitemur Forestum l. 23. obs. 6. in *scholiis*, qui feliciter curavit fots foliorum & florum verbasci sive thapsi barbati in ∇ cum semine hyoscyami cocti, quo ipso omnis dolor evanuit. Quidam recipiunt lanam verbasci, hanc cum terebinthina miscent in formam pilularum, quibus pro suffitu utuntur ad hæmorrhoides compescendas, id quod experientiâ comprobavit. Quidam etiam pro eodem scopo faciunt cataplasmata ex foliis & floribus dictorum simplicium in lacte decoctis, & applicant cum fructu: Quod si inflammatio præsens, aut hæc multum progressa sit, convenienter adduntur folia portulacæ.

Post verbasum & sambucum nota sunt folia mandragoræ, item folia solani furiosi,

portulacæ, hyoscyami, flores chamomillæ & similia. Post verbasum eminet linaria, cuius & aut etiam ex linaria, vel sola vel cum floribus chamomillæ, parati fots, in lacte cocti & applicati, item linimenta, unguenta, &c. cum sevo hircino sunt singularissima specifica Hartmanni pag. 198. §. 3. in *Pr. Chym.* Conf. Horstius l. 4. obs. 50. & Hoferus in *Herc. Med.* p. 195.

℞. HB. linar. M. ij.  
flor. verbasci M. j.  
sambuci M. 3.  
sem. fenugr.  
lini aa. ʒj.  
Incis. & contus.

D. S.

Species zur Bähung.

Linimentum in dolore & tumore venarum hæmorrhoidalium plerumque cæcarum inter topica varia palmam sibi præripit, quod paratur ex herbis & floribus linariæ coquendo cum adipe porcino: cui expresso parumper refrigerato vitellum ovi permiscetur, & cum lana aut gossipio parti dolenti applicatur. Hoc linimentum confestim ad miraculum sistit dolores, referente Johanne Wolffio Medico Hassiaco celeberrimo, qui hoc secretum Principi suo Hassiæ Landgravo revelare noluit, donec ipi annuatim bovem benè saginatum promitteret: Vid. Schönfelders *Hist.* p. m. 50. Volterus in *der Hebammen-Schul* p. 132. laudat seqq.

℞. HB. linar. cum flor. lut. M. ij.  
hyosc. M. ʒ.  
&c. rosar.  
verbas. aa. ʒiij.  
butyr. rec. ʒv.

Coqu. & exprim. per pannum: fluat de-nuò adjiciendo

fol. linar. M. j.  
Exprime & adde  
vitell. ovor. no. ij.

Misc.

℞. HB. linar. M. ij.  
flor. verbasci M. j.  
samb. M. ʒ.  
sem. fenugr.  
lini a ʒj.  
Incisa & contusa

D. S.

Species zur Bähung.

Coquantur in ∇ vel lacte.

Decoctum fundatur super lateres calefactos, in tella perforata excipitur suffitus; post huic decocto immittuntur linteamina, & sub forma fots humidi applicantur.

(T 3) ℞. Ungu.

℞. Ungu. de linar. ʒi.  
 ʒo express. sem. hyosc. ʒij.  
 sacchari Saturni. ʒss. ad ʒij.  
 M. pro linimento.

Liquor quoque simpliciter ex floribus linariæ putrefactis egregiè anodynus in hoc casu colligi potest, atque ex floribus sambuci & verbasci.

Quidam etiam commendant oleum, in quo baccæ HB. paridis cum modico vino coctæ sunt, quod dat linimentum reverà elegans, uti in hæmorrhoidibus cæcis ac furentibus in puerpera observavit Gesnerus, ac commodè canerosi hæmorrhoidibus quælibet ex baccis his remedia applicari possunt. Pertinet huc ʒo septem florum Mynsichtii, item ʒo seminis papaveris & hyoscyami, in specie ʒo asellorum, aut etiam scarabæorum stercoriorum, ex quibus, cum oleo carvi vel lini infusis, pluribus permistis, fiunt olea expertissima. Oleum & cineres scarabæorum sæpius expertus est in cæcis hæmorrhoidibus Bierlingius in *Adversar. Curios. Centur. 1. pag. 49.* Ursulæ Cartelæ, Principissa Italia Patavina, in secretis fuit *oleum asellorum*: Nempe aselli contusi coquuntur in oleo violaceo, aut lini, aut quod optimum, cum oleo nucum expresso: In tali quodam oleo etiam sine coctione in cucurbita probè clausa aliquamdiu digeruntur, hinc ʒo ex iis exprimitur: eodem modo cum scarabæis stercorariis ʒo & linimentum anodynum ad hæmorrhoides expertissimum parari potest, quod valdè commendat Solenander S. 4. Conf. 20. Quidam parant unguentum ex modò dictis oleis, quod externis hæmorrhoidibus commodè potest illiniri; in hæmorrhoidibus verò intus latentibus sub forma suppositoriorum immitti, ut pertingat ad partem affectam, hoc modo:

℞. Asell. contus. ʒj.  
 ʒo violac. ʒij.  
 Coqu. & colentur, add.

Cera ʒss. plus minus, prout magis vel minus desideramus unguentum fluidum vel crassum. M.

Conf. Fonseca l. 1. Conf. 27. & Borellus C. 1. Observ. 63. Oleum Buxi insigne est anodynum, propter quam causam etiam applicatur hæmorrhoidibus dolentibus.

Tandem in usu etiam sint contra dolorem & tumorem hæmorrhoidum cæcarum mucilagines seminis psyllii, lini, cydoniorum, nunc solæ, nunc cum saccharo Saturni & camphora pauca mistæ: quibus etiam parum opii addi potest in gravi dolore, & ita applicari. Dictis mucilagibus in ardore ac inflammatione commodè adduntur succus portulacæ, succus medii corticis sambuci: Vel

℞. Mucil. sem. psyll.  
 cydonior.

Mucil. lini 2a. cum ʒo rosar. par. ʒss.  
 butyri rec. non ʒi ʒj.  
 vitell. ovor. no. ij.  
 ʒo rosar. complet. parum.

Agitentur in mortario plumbeo ad colorem lividum usque, t. l. a. linimentum, S.

*Lindernd Sälblein.*

Vel

℞. Mucil. rad. alth.  
 sem. cydon.  
 lini 2a. c. ʒo rosar. parat. ʒij.  
 ʒo ovor. ʒij.  
 expressi sem. hyosc. ʒss.

M. f. linimentum in mortario plumbeo.

Oleum enim ovorum in mortario plumbeo agitatum, dolorem maximè lenit.

℞. Mucil. sem. cydonior. c. sperm. ran.  
 extr. ʒj.

ʒ. camphorat. ʒij.  
 sacch. Saturni ʒj. M.

Quo linteum humectatum applicetur crebrius.

Balsamum ʒis ad extra, i. e. cum oleo hyperici, aut nucum, aut seminis papaveris expresso paratum, est nobile experimentum Rulandi contra hæmorrhoidalia pathemata: cui assentitur Fonseca, interim tamen in huius defectu & balsamum ʒis terebinthinatum non incongruum est. Posterior hæc compositio paulò acrior est: addatur ergò saccharum hni vel camphora. In hæmorrhoidibus cum inflammatione, gangræna incipiente, ac tumentibus pugni instar sequenti linimento uxor Monsieur Navarret septimanæ decursu restituta est:

℞. ʒo ovor. ʒi.  
 bals. ʒis.  
 ʒo Philos. aa. ʒss.  
 Misc. pro Linimento.

Videatur Blegny Tom. 1. Observat. pag. 26. Ubi deficit verum balsamum ʒis Rulandi, tunc

℞. flor. ʒis,

Misceantur cum terebinthina, aut oleo terebinthinæ, & applicentur.

Vel ad imitationem huius Rulandi in *Curat. Empir. Centur. 1. Curat. 7.* applicetur sacculus ex foliis quercus & glandibus contusis paratus, qui in aceto coctus & applicatus, ut ipse loquitur, miraculi instar dolores sistit hæmorrhoidales: Unde ad imitationem Rulandi hunc sacculum in usum quoque vocavit Lotichius in *Observ. pag. 427.* Loco horum fiunt etiam sacculi ex fursuribus triticeis & floribus verbasci, quæ invicem cocta applicantur.

Denique scrophularia summum est remedium, quod singulariter & super alia convenit in quibuscunque hæmorrhoidalibus affectibus, in quocunque statu fuerint, multiplici adhi.

adhibetur usu, interno pariter ac externo: nunc enim hæc radix scrophulariæ autumnò collecta, amuleti instar secum gestata, aut coxæ alligata in regione dorsi, ut fæmora attingat aut cutim, singulare experimentum est, fluentes nimirum sistendo, atque dolentes & cæcas dissolvendo: vid. Horstius & Scultetus in *Armam. Chirurg. Tab. 42. pag. 174.*

Internè usurpata radix scrophulariæ, vel etiam foliorum ꝑ usurpatus, cum cibo vel potu capiendo, dolorem omnem statim sistere, læpissimè expertum esse asserit Henricus ab Heer *obs. 20.* sive ipsa substantia sicca, aut viridis, sive decoctum assumatur: Conf. etiam Schultzius *Consil. Med. p. 207.* Sicuti eadem radix in tessulas dissecta, filo annexa, & vino infusa, nimium fluxum hæmorrhoidalem compescere solet. Pater nempè de hoc novem diebus in nimio fluxu bibat: post radices exprimantur, & siccantur, ac eo modo, quo siccantur radices, etiam hæmorrhoides imminui, & quasi siccari, ac nimium dolorem cessare, asserunt. Si verò rursus aperire velimus, vino vel aquæ simplicis rursus imponendæ sunt, atque tunc iterum nonnihil hauriendum. Item sola recens hæc radix frixa cum butyro dat unguentum singulare ad hæmorrhoides dolentes, vel radix recens collecta autumnò benè mundata & contusa in mortario lapideo cum butyro recenti fiat unguentum, quod in olla nova clausa per dies 15. in cella aut fimo equino aut alio loco humido reponitur: dein liquefacto sensim leni Δe butyro exprimatur, & cum pinguedine humana servetur pro linimento egregio & singulari contra hæmorrhoides dolentes. Solenander *S. 4. Conf. 20.* mentionem facit cujusdam chirurgi, qui omnes hæmorrhoidales affectus certò curavit, per herbas integras scrophulariæ & crassulæ majoris cum suis radicibus: macerat eas seu infundit in cerevisiam, & ita infusi hujus manè & vesperi bonum haustum offert: nam quantum sola hæc crassulæ majoris radix verno tempore, dum primò folia protrudit, & aliquot ejus nempe nodi, saltem externè suspensa, ut circa lumbos cutim attingant, conferat in hæmorrhoidum cæcarum doloribus, ex quacunque causa natis, videbitis in *Miscellaneis curiosis Med. anno 2. observat. 195. p. 296.* & Bartholini *Actis Hassniens. Vol. 1. c. 51.* Id quod probavi aliquando in Studio, Hæmorrhoidibus cæcis admodum afflicto, qui hoc usus amuleto egregiè convaluit. Chelidonium minus, idque usu tam interno quàm externo, fluentes sistet, dolentes verò aut tumentes perfectè sanat. Herba siccata infunditur cerevisiæ; herba verò recens contusa aut succus expressus, si extrinsecus admoveatur, certà experienciâ idem præstat: Hoc modo empiricus quidam omne

hæmorrhoidum vitium curabat. Aqua destillata adhibita eos curavit, qui ferè hydro-pici facti fuerunt nimio profluvio: planta contusa oleo incocta dat unguentum contra quæcunque hæmorrhoidum vitia, in specie contra hæmorrhoides dolentes & tumentes: flores etiam & folia manè comeduntur: in specie si radix hæc appendatur, tanquam singulare secretum ad hæmorrhoides commendatur. Quidam

℞. Pulv. rad. scrophular.

Chelid. min. aa. ʒiʒ.

cum ꝑ. verbasci f. linimentum.

D. S.

Rindernd Säcklein:

Vel

℞. HB. Chelidon. min.

linar.

flor. verbasci aa. M. j.

rad. hyosc.

scrophular. aa. ʒʒ.

Ex incis. & contus. f. sacculi, lacti incoquendi.

D. S.

Rindernde Säcklein.

Vapor decocti in sella perforata excipiaturo, postmodum species decoctionis sacculo inclusæ applicentur calidè loco dolenti, vel ex sicca forma, vel immersi prius in lac decoctionis.

Decoctum millefolii internè crebriùs usurpatum ad sedandas hæmorrhoides furentes, & absumentas fluentes, est nobile: Vires hujus decocti vid. in *obs. 5.* Riveriana, communicata à Pachequo: pulvis item millefolii & tormentillæ. His addenda est theriaca recens, quæ linteis illita, hæmorrhoidibus recentibus cæcis imposita, brevi dolorem compescit.

Tandem sit hoc unguentum compositum:

℞. Balsami ʒis, impr. c. ꝑ. hyperici par. ʒiʒ.

& momord. ʒj.

sem. papav. expr. ʒʒ.

sacchar. Saturn. ʒj.

Camphor. gr. viij.

M. f. Linimentum.

Camphoram non immeritò addo: nam mirabile est remedium ad hæmorrhoides dolentes; si ejus ʒʒ. ad ʒj. subigatur in ꝑ. malvæ vel rosar. ʒj. & ita applicetur cum linteis ad dolentes & ardentes hæmorrhoides: v. g.

℞. Aq. fl. verbasci l. feniculi ʒiʒ.

camphoræ c. ꝑ. amygd. sol. ʒj.

M. D. S.

Rühlende Mixtur.

Et cum linteis duplicatis applicetur rimæ ani.

Vel

℞. Aq. rosar.

flor. verbasci. aa. ʒvj.

ꝑ. camphorat. ʒiij.

sacchari Saturni ʒj. M.

In



In immenso ardore & dolore egregiè quoque convenit linimentum ex cerussæ *part. ij.* & *camphor. p.j.* cum paucò *V camphor.* illinendum.

Quod si chronici facti sint, & quasi habituales, affectus dolorosi hæmorrhoidales, speciatim post mensium emansionein, convenit egregiè fonticulus in tibia: vid. Velschius *Hecatost. 2. pag. 50.* & Zacutus Lusitanus *l. 2. Præcos admiranda Observat. 82.*

Hæmorrhoidum excrecentium curationem facilem & tutam videb. apud Rhodium *Cent. 2. Observ. 94.*

Molestum symptoma est, quando puerperæ hæmorrhoidibus cæcis affliguntur; in tali casu prodest istud linimentum ex decocto baccarum paridis in oleo cum modico vini, quod antea laudavi, cujus olei illinitio statim dolores cessare facit, uti expertus loquitur Gesnerus in *Epistol. l. 1. pag. 21.*

Item *℞. Ciner. suberis, Pantoffel-Holz/ qu. v. & cum ana vitelli ovi & ʒo rosar. aut ol. semlini t. Linimentum nobile:*

Quod frequentius feliciter usurpavit Forestus in dolore hæmorrhoidum cæcarum: vid. *lib. 23. Obs. 25. Conf. Hartmannus in Pr. Chymiatr. pag. 160.* Loco hujus infundi potest cotyledon adjectis aliquot guttis libanotidis coronariæ: vid. Velschius *Mischomim. Cent. 1. obs. 38. annex. M.A.N.C. anno 4.*

Loco hujus sunt, qui commendant insigniter per experientiam confirmati cinerem talpæ, eumque cum linteo ex indusio senis in  $\nabla$  appropri. madefacto cæcis & dolentibus applicant.

Si nimius adsit ardor sub dolore, commodè suber cum oleo rapistræ, quod Lindanus loco olei myrtini sumit, aut in defectu hujus cum oleo lini probè misceatur in mortario plumbeo in unguentum, & aliquantum succi sempervivi seu sedi majoris addatur, cum tantillo cerussæ & ceræ; Potest etiam camphora addi. Aliàs in simili dolore applicatum saccharum Saturni cum aqua rosarum est elegans.

Denique non rarò exulceratæ sunt extrinsecus hæmorrhoides dolentes, & in abscessus degenerant, ad quos experimentum est singulare Dn. Boyle *Phil. Experim. T. 2. Sect. 1. pag. 213.* factum ex oleo amygdalarum dulcium cum  $\odot$  fulminante, ulceribus & apostematibus applicandum. Facit etiam mentionem hujus Bartholinus *l. 4. Epistol. pag. 523.* Præ cæteris vid. Agricola in *Chir. Parva pag. 594.* conf. & Velschius *Hecatost. 2. pag. 61.*

## ARTICULUS V.

De

*Ani Pruritu.*

PROPTER cognationem affectuum observo, subindè quosdam graviter affligi pruritu ani satis molesto, in quo aliis irritis, optima est  $\nabla$  plantaginis, in qua modicum aluminis coctum fuerit, qua ipsa abluatur & foveatur locus pruriginosus; sicuti ad similem ani affectum cum exulceratione junctum præstans est linimentum hocce:

*℞. Lithargyr.*

*ʒis citr.*

*tragac. aa ʒj.*

cum  $\dagger$ o, adjecto paucò oleo rosaceo, f. Linimentum.

D. S.

*Sälslein.*

Quo locus in podice inungendus.

In casu, quando oritur dolor ani, qui accidit ob chartam, vel vitriolo l. pipere l. simili inspersam; optimè convenit postmodum solus ani cum lacte tepido, additâ paucâ  $\nabla$  rosacea, uti vult Boerellus *Cent. 4. Observ. 82.* Plura, ubi de inflammatione ani.

# S E C T I O X.

## D E

### C O N T E N T I S I N T E S T I N O R U M

#### P R Æ T E R N A T U R A L I B U S ;

#### I N S P E C I E ,

## D E

### V E R M I B U S seu L U M B R I C I S I N -

### T E S T I N O R U M .

**V**ermes intestinorum adultos pariter ac infantes crebrò vexant; & symptomata adeò plura cum aliis morbis communia inferunt, ut etiam doctos Medicos aliquando fallant, referente Foresto. Triplex horum differentia communiter statuitur: (1.) Teretium seu vermium longorum, lumbricorum in specie sic dictorum; (2.) latorum, qui vesicæ instar aut membranæ tenuis aliquot ulnarum longi subindè excernuntur; & (3.) ascarides seu parvi isti vermes, termitibus similes, qui intestinum rectum incolunt, inter quos lati rarissimi sunt. Præter hos tamen etiam aliarum vermium differentiarum subinde observabiles sunt, uti sunt, vermes cucurbitini dicti; item observati fuerunt vermes cornuti: vid. M.A.N.C. ann. 3. *Observ.* 63. pag. 109. item *bicipites* l.c. *Observ.* 84. pag. 141.

C A U S Æ.

Generantur lumbrici quivis ex proprio suo semine, utcunque nobis communicato, quod imprimis ex ascaridibus patet, qui licet copiosissimè per medicamentum purgans rejecti, brevi post tamen repullulant, de novo ægros vexant, denuò ejiciendi. In specie lumbrici vivipari observati fuerunt, teste Panarollo *Pentec. Observ.* 15. Schenckio l. 3. *Observationum*, Foresto l. 21. *obs.* 26. & c. Borello l. 1. *observ.* 98. Cauti tamen hîc simus, ne intestinula lumbricorum cum eorum fœtura confundamus; de quo vid. Bartholini *Act. Medic. Hassniens.* vol. 4. pag. 157. In specie lumbrici palmaris longitudinis observari solent, ut plurimum convoluti invicem, pluresque innati: Ergò rarum est, quod lumbricus teres longitudinis trium ulnarum observatus fuerit in M.A.N.C. *Ann.* 3. *observ.* 254. pag. 457. Nam latus aliàs lumbricus ad plures ulnas excrecere solet, qualem 3. ulnarum, item 6. ulnarum longitudinis excretum vidit Joelin *Praxi*; 6. & 7. ulnarum in M.A.N.C. *Ann.* 6. *observ.* 104. sicut Amatus Lusitanus *Cent.* 6. *Curat.* 74. Vermem latum 4. cubitos longum per vomitum excretum observavit. Plures & notabiles de lumbricis observationes videb. in Binningero.

Tom. II.

Causæ remotæ hujus mali sunt præprimis cruditates ventriculi ac intestinorum putrilaginosæ; unde in pueris adiphagiæ litantibus præsertim pullities ejusmodi verminosa observatur, non illis saltem, qui dentitionis ætatem superarunt, juxta Hippocratem *Secl.* 3. *Aphor.* 26. sed minoribus & lactantibus etiam adhuc: unde bilis minus amara, sed hebes & iners, generatur; hinc, ubi deficit bilis, lumbricorum patriam esse rectè Helmontius dicit.

#### D I A G N O S I S.

Dignoscitur lumbricorum præsentia ut plurimum ex fœtore oris peculiari & adacorem vergente, salivâ copiosiore ex ore profluente, inod fœtente & cum nausea rejecta; item stercoribus, bubulis similibus, corruptis & griseis, tunc sc. ubi oculi album flavedinem simul contrahit, seu icterus adjunctus est.

Accedunt his alia signa minùs frequentia, dolor sc. & morsus ventris, præprimis horis matutinis, ita, ut abdomen quoque interdum inflari videatur, pavores nocturni, dentium stridores, tremores atque convulsiones, febres modò erraticæ, modò continuæ, corporis contabescencia, item gingivarum erosio: Vid. Riverii *Praxis* l. 10. c. 9. facies modò rubra suffunditur, modo pallefcit, appetitus ad voracitatem usque intenditur, nares frequentius scalpunt, ventriculo jejuno sitiunt, tussis siccâ laborant, ab alimentis tamen assumptis, imprimis dulcibus & lacte, potissima symptomata remittunt, ab acidis verò & amaris secus.

Qui lumbrico lato laborant, eos varia & multiplicia atque diuturna symptomata vexant; quæ inter etiam hoc peculiare observatur, quod cum excrementis alvi corpuscula cucurbitæ seminibus analoga prodeant: Vid. Bartholinus *Act. Med. Hassniens.* vol. 4. p. 150.

Quoad ascarides: notum est, quod hi ipsi phases lunæ observare soleant; vid. Bartholinus l. 4. Unde etiam in specie noctu à nona vel decima hora nocturna usque ad auroram moveri & excitari solent, hoc est, fodicare & vexare ægros, cætero tempore, manè, totâ die & vespere, ut plurimum quieti sunt.

( U )

Præ-

Præter hanc molestiam & hoc mali junctum habent, quod invalescentes quibusdam anum & intestinum rectum, imò nates & femora erodere soleant, quin & ulcus ani & intestini recti in quibusdam excitent, quod refert Schenckius *lib. 3. Observ.*

#### PROGNOSIS.

Quò plura sibi habent combinata symptomata, & quò illorum plures atque majores existunt, eò peiores etiam observantur.

Sunt verò, si speciem consideremus, minus noxii ascarides, nisi majores existant: latè verò utut haud gravia excitent symptomata, difficilioris tamen curationis observantur.

In morbis aliis spontè prodeuntes vel per alvum, vel per os, & quidem in statu cruditis & principio morbi, rarò sunt sine periculo: Nam vim mortis imminuentem ac summam malignitatem denotant, unde fugà se volunt redimere: sin verò excernantur in statu coctionis & declinatione, bonum est.

#### CURA.

Pro cura ergò vermium imprimis observandum, ut

1. Enecentur.
2. Per purgantia, imprimis jalappam & dulcem aliavè media, ejiciantur, ne putrescant in intestinis, & sic ex iisdem, novo suscitato seminio, novi lumbrici generentur: Vid. Riverius *C. 1. Observ. 28. C. 2. Observ. 5. Observ. Comm. 7. pag. 280. 318. & 398.*

Imprimis autem lunà decrefcente sub ultima ejus quadra quivis vermes aggrediendi, & qui vermibus obnoxii sunt, semel in mense decrefcente lunà debitis subsidiis sunt præservandi: In specie in morbis puerorum semper vermes debent esse suspecti, cum præ cæteris istis soleant esse familiares, autore Salmuth *Cent. 1. Observat. 264.* quod pariter de adultis ait Borellus *C. 1. Observ. 89.*

Remedia ergò magis appropriata, vermes enecantia, sunt in specie raphanus rusticanus, ejusque succus, & destillata cum aliis mista, nasturtium, absinthium, carduus benedictus, centaurium minus, flores persic. tanacetum, flores hyperici, de quibus vid. Bartholinus *Act. Hassniens. vol. 1. Observ. 40.* herba sabina, scordii, corallina, radix dictamni albi, filicis, gentianæ, graminis, zedoariæ, uti & allium, cepæ, porrum, in lacte cocta, &c. semen cinæ, portulacæ &c. myrrha & aloë, quælibet remedia ex cornu cervi. ~ cornu cervi essentificatus, de quo vid. Hartmannus *pag. 179.* quælibet gïalia, unde bolus Hartmanni cum conserva rosarum & floribus benzoës; item infusum ac decoctum gïii cum ~ graminis, ceparum aut allii paratum, item pulvis contra vermes officinarum ex gïo cum saccharo subacto.

Pulvis Timzi von Guldenslee / quem *l. 5. Cas. 16.* & arcanum ejusdem, quod *l. 6. Epist. 2.* describit, oleum lignorum, v.g. coryli, item juniperi, quæ Riverius *l. 4.* commendat, egregia sunt. Spectant huc etiam acida, v.g. succus citri, ~ Oli vel ~is, sanè ~ communis ~u ~is acidulata subinde hausta mirabiliter vermes expellit: alii ~um Oli cum l. q. sacchari in pulveris formam redactum contra vermes propinant. Sic Wedelius puerum verminosum R violarum vitriolata curavit: Vid. *Tr. de Medic. Facultat. l. 2. Sect. 2. c. 5. pag. 179.* quod etiam præstat conserva rosarum vitriolata cum aliis mista.

Extra clysteres frequenter injecti, & primò quidem ex lacte, decocto ficuum, passularum, liquiritia, melle &c. pro alliciendis vermibus, ubi per os anthelmintica exhibita sunt, imprimis conveniunt. Quod si verò ad crassa intestina descendisse videantur lumbrici, ex enecantibus & specificis illa parari debent, v.g. ex radice graminis, gentianæ, absinthio, scordio, centaurio minori, portulaca, corallina, semine cinæ, &c. in lacte coquendis & cum melle applicandis.

Abdomini denique applicatur fel tauri cum pulvere colocynthidos subactum, quod umbilico impositum, fortiter eos pellit: Item cataplasma ex myrrha, aloë, aceto rosaceo, & felle tauri paratum; ~, absinthii, amygdalarum amararum, hyperici, diacolocynthidos Quercetani, & quod Crato *l. 3. Consil. 25.* commendat, petroleum, item oleum destillatum ligni coryli, aut cataplasma ex farina lupinorum, myrrha, aloë, &c. quale Rulandus *Cent. 2. Observ. 21.* præscribit, item ex hiera picra cataplasma, ~, contra vermes, cujus Bartholinus *Cent. 2. Hist. 67.* meminit, unguentum contra vermes Offic. item Timzi *l. 5. Casu 16.* aut ex unguento de artanita, & ~ vivo, quod Riverius commendat: Vid. Platerus *Praxi Tom. 3. pag. 881. & 882.*

In specie ad latos vermes, qui scorbuticos imprimis affligunt, succus nasturtii recens expressus exhibitus est optimus: item pulvis jalappæ cum semine santonici à ʒj. ad ʒʒ. propinatus, est eorum purgans, teste Dravvizio vom Scharbock / *pag. 127.* Item species diaturbich cum rhabbarbaro, hinc gïalia.

Ascarides verò in specie curant supposito-ria ex caseo Hollandico aut lardo, nunc simpliciter ita applicata, nunc melle illita; item enemata abstergentia cum colocynthide; item enemata vel balnea ex absinthio: Vid. Bartholinus *Act. Med. Hassniens. Vol. 4. p. 150.* hinc pulvis ex ~o ~lato, C. C. & extracto trochiscorum alhandal eos ejicit, uti & Mercurialia. Plura infra, ubi de morbis infantum.

#### SECTIO



# SECTIO XI.

DE

## VARIIS INTESTINORUM DOLORIBUS.

**I**N naturali quidem statu indolens planè & consequenter insensibilis intestinorum est actio, & contentorum distributio, nisi quòd tantum intestinum rectum sentiat stimulum, quando fæces sunt excernendæ. Deinde tantummodò interdum levia adsunt murmura & borborygmi, quando status naturalis intestinorum tenuium, speciatim ilei, peristaltico intestinorum motu hinc inde agitur, ista murmura & borborygmos infert: nihilominus tamen præternaturali in statu subinde hæc ipsa variis & gravissimis cruciantur doloribus, tormina aliàs appellatis à torquendo, quod in his intestina quasi contorqueri aut convolvi, & omninò constringi videantur: ac reverà formaliter omnes ferè dolores intestinorum, paucissimis exceptis, à convulsivo spasmo intestinorum, in quem à spiritu imperu cientur, immediate oriuntur, quò torqueri & convolvi videntur.

Utut autem causaliter sint varii, vix tamen quæcunque causæ dolores inferunt, nisi ad motus convulsivos per irritationem intestina disponantur. Causæ ergò, dolores intestinorum facientes, sunt irritatio intestinorum, quibus motus convulsivus inductus fuit, sub quo ægri affliguntur. Helmontius non solum convulsiones spasmodicas illustrat eleganti exemplo *Tr. de Flatibus* §. 38. ubi refert in puero herniam umbilicalem à flatibus, ut intestina prolapsa potuerint per tunicam tenuem conspici, qui ingentes passus dolores, quotiescunque intestina lumbricali spasmo convelli conspecta sunt; sed & ordinariò ferè alvus suppressa esse solet sub talibus intestinorum doloribus, dum spasmis istis impeditur, ut nimis retardetur naturalis motus peristalticus, & hujus medio contentorum protrusio. In specie tamen, cum in his multa lateant, observandum: nullum Autorum hanc materiam rectè pertractare, exceptis duobus, Willisio sc. & Sylvio, licèt variè: Sylvius sc. virtutes activas secundùm salia explicat, Willisius verò convulsiones, spasmos, horumque naturam rimatur. Horum vestigiis insistamus, & hos duos simul conjungamus pro meliore intellectu.

### D I F F E R E N T I Æ.

In scrutinio autem causarum ante omnia observandæ sunt horum dolorum differentie, desumptæ vel à parte affecta, vel à causa efficiente. Ratione quidem partis affectæ distribuuntur intestinorum dolores vel ratione intestini dolentis, vel ratione situs partis

dolentis. Intestina quæ afficiuntur, nunc sunt tenuia, nunc crassa. Tenuia si afficiantur, ut jejunum & ileon, vocari solet imprimis dolor iliacus, quando vero in intestino crasso, in specie in colo, & partè superiore intestini recti urget dolor, colicus dici solet, utut non raro hi duo dolores confundantur à vulgo, adeòque in genere quæcunque intestinorum tormina generali colicæ nomine venire soleant; facile tamen distingui possunt, observando saltem doloris atrocitatem, & intestinorum tenuium & crassiorum situm. Nam dolores intestinorum tenuium, imprimis iliaci, acerbissimi sunt & crudeliores colicis. Iliaci porro dolores regionem umbilicalem, & infra eam regionem hypogastricam occupant; Colici verò magis lateralia & superiora petunt. Nam colon intestinum à dextro inguine incipiens, supra & circa dextrum renem sursum assurgit versus hepar, & inde sub costis nothis transversim fertur ad hypochondrium sinistrum, cujus magnam quidem partem occupat; nihilominus tamen mox angustatum contorquetur ad renem sinistrum in hypochondrio sinistro, indeq; porrò ad inguen sinistrum, ubi tandem ad os sacrum in intestinum rectum devolvitur. Hinc isti dolores, qui in abdominis ambitu modò descripto percipiuntur, omnes sunt colici, utut nonnulli cum tantum hoc appellent nomine, quod partem abdominis superiorem & anteriorem instat cinguli ambiat; cum tamen sæpe dolor usque ad umbilicum, imò interdum usque ad vesicam insigni ambitu devolvatur, qui reverà etiam sunt colici. Tenuè verò intestinum, ubi emergit ab intestino duodeno, versus hypochondrium sinistrum torquetur, & hinc recedens mediotullium ventris imprimis occupat; Unde in, & circa, & infra umbilicum percepti dolores sunt imprimis iliaci.

Ratione situs doloris hic iterum est differentia: dum nempe quidam dolor dicitur hypochondriacus, alius lumbaris, & alius umbilicalis: Hypochondriacus dolor est iste, qui imprimis & frequentissimè percipitur in hypochondrio sinistro, interdum, sed rarius, in hypochondrio dextro, idque sub costis nothis, dolor acerbus est & admodum pertinax, qui communiter adscribitur lienis affectu. Unde vulgò quicunque dolores in ista parte percepti mox habentur pro augurio affectus splenis; attamen, cum iste dolor sit ut plurimum punctorius, rodens, & mordicans, lien verò ejusque parenchyma per se ferè insensibile sit, adeoque vix, præterquam gravativum & obtusum dolorem, imprimis ex infarctu ejus nimio enatū, à vitiosis

(U 2).

succis

succus seu sanguine productum, vel saltem dolorem obscurissimè tensivū, seu quasi distendentem, ex detenta ejusdem substantia membrana, perpeti queat, facillè patet: quod dictus dolor punctorius & terebrans, saltem colo, sub hypochondrio sinistro non nihil angustato, & deorsum versus contorto, propriè conveniat: Unde etiam his doloribus hypochondriacis tumor nunc durus & tactui renitens in hypochondrio sinistro, nunc verò insignis istius hypochondrii intumescencia, tumor mollis & facillè cedens superveniat. Conferatur Sylvius *Prax. cap. 14. §. 5. & 57. vid. & Salmuth Cent. 1. Observ. 24. item Hildanus Cent. 1. Observ. 58.*

Post dolorem hypochondriacum est lumbaris dolor, etiam frequentissimus, siquidem pylorus dum in intestina se dimittit, intestinum duodenum reperitur circa dextram lumborum regionem; unde, si in intestino duodeno circa principium jejuni subinde oriuntur dolores, tum isti dolores percipiuntur circa dextram lumborum regionem, seu in dorso; *es reißt mich im Rückgrad* / dicunt ægri.

Dolor hic lumbaris est multiplex: nunc nephriticus, nunc mesentericus, nunc pancreaticus, nunc intestinalis.

Nephriticus est, qui ex renibus, vel calculo, vel alio affectu laborantibus oritur, & ut plurimum obtusus, gravativus & contundens esse solet, & vitia in excretionem urinæ varia adjuncta habet. Ægri dicunt: *es drückt mich* / *es ist kein Stechen*; est enim instar ponderis prementis & contundentis mallei in regione lumbari.

Mesentericus est, qui fit circa lumbos, propter mesenterium superioribus lumborum vertebri annexum, cujus nervi vellicati propter spasmos & convulsiones, quas subeunt in dicta regione, graves lancinantes dolores, & quasi divellentes lumbos à spina dorso, excitant; unde dolores parturientium, hysterici, &c. subindè oriuntur. Frequens hic dolor est scorbuticus, & vulgò confunditur cum nephritico, licet reverà non ita, & inchoando in dicta lumborum regione tandem universū abdomen & intestina occupet.

Lumbaris pancreaticus fit ex pancreate, transversim lumbis incumbente, affecto, vel tumente, vel scirrroso, vel exulcerato, vel simili morbo laborante, estque in superiori regione lumbari juxta costas nothas obscurior seu obtusus, & in profundo delitescens, quasi contundens, & leviter interdum pulsans, minusque molestus.

Lumbaris intestinalis dolor est, qui circa regionem lumbarem affligit, frequenter ad hypochondrium dextrum inclinat: fit ex dolente intestino duodeno cum principio jejuni, vel propter chylum vitiosum, vel propter confluentes ibidem binos succos, felleum &

pancreaticum, ibidem acrimoniâ suâ & effervescentiâ præternaturali varios dolores lancinantes excitantes.

Dolor umbilicalis oritur à dolore iliaco.

Altera differentia doloris intestinorum fundatur in varietate causæ efficientis, & fiendi modo; indeque tormina abdominis sunt vel humorosa, vel convulsiva. Nam ut ut semper ferè tormina à spasms intestinorum, vel in toto tractu, vel in quadam parte oriantur, ea tamen ratione causæ antecedentis ita dirimere lubet, quatenus tales dolores symptomatici, vel à contentis humorosis, in intestinis hærentibus, occasionaliter proritantur; vel quatenus sine his, ipsorum nervorum ad intestina distributorū vitio & spasmo, excitantur: Ideò distinguimus, & per humorosam eam intelligimus, quæ fovetur à causa materiali in intestinis hærente: per convulsivam eam, quæ oritur ex vitio nervorū, ad intestina ex plexibus mesenterii distributorum, ratione quorum intestinis in fontibus oritur colica convulsiva, quæ doloribus variis, & pro causarum proximarum varietate afficiendi modo distinctis, affligit: hinc dolor in colica humorosa est nunc fixus seu perterebrans, nunc pungens, nunc distendens, nunc rodens, nunc contundens, nunc gravans, nunc pulsans: de quibus colicæ humorosæ differentiis & causis præ cæteris Sylvius in *cap. 14.*

Sic enim dolor perterebrans & fixus est, quando sc. intestina in uno eodemque loco perterebrari aut quasi perforari videntur: oritur hic ipse vel à scybalis induratis, in cellulis intestinorum firmiter impactis, & tunc est pertinax; vel à mucilagine viscida glutinosa & acida, in determinato loco quodam hærente, & pertinaciter agglutinata, in specie in angulis intestinorum sub hypochondrio sinistro, in quibus aptum invenit diversorium. Et hic est dolor iste, qui hypochondriacos non rarò vexat.

Dolor pungens in colica humorosa oritur ab acido acriori pertinacique intestina vellicante & pungente, quasi acu vellicentur.

Dolor distendens & quasi disrumpens est, quando intestina distendi & disrumpi videntur. Hic oritur frequentius à flatibus natis ex materia viscida per vitiosam fermentationem ab acido inductam: & hic dolor colicus à flatibus vitio assumptorum est frequens, semper tamen necesse est, concurrat intestinorum spasmus, nunc in uno quodam loco fixus, nunc hinc inde vagus, cujus occasione flatibus exitus intercipitur, qui aliàs de facili, quâ datâ portâ, exitum invenirent.

Dolor gravans oritur ex materia copiosa plus minus viscida, absque acrimonia cuiusdam parti, maximè intestinis tenuibus, infixâ; intestinis crassis talis dolor gravativus sæpè

pè cum sensu tumoris remittentis est. Interdum tumores & abscessus in mesenterio latentes talem dolorem gravativum in abdomine inferunt: Nè ergo confundantur.

Quod si parum acidum sit peccans hæc materia, sive ex vitio stomachi, sive succi pancreatici, præter gravativum dolor quasi contundens oriri solet, qui etiam sensu molestus est, dicunt: *es sey unterföchtig / als wenn der Leib geprügelt wäre.*

Dolor rodens oritur ab acido acri non nihil falso, quasi muriatico, vellicante, ardente, fodicante, & quasi excoriante intestina: ut plurimum etiam in intestinis agnoscit vermes.

Denique dolor adest pulsans, qui ex arteriarum, in motu pleno impeditarum, est spasmus, & frequenter inflammationem intestinorum comitatur, vel quando hæc ad inflammationem disponuntur: ut patet ex inflammato digito propter infixam spinam, in quo mox pulsans arteriarum dolor percipitur. Præterea tamen & aliud quodvis inimicum objectum, gravius intestinum quoddam in loco vellicans, facile ex superveniente spasmo arteriolarum dolorem pulsantem inferre potest.

Tormina abdominis convulsiva sunt, quæ cum dolore contorquente, lacerante, lancinante, & abdomen subinde contrahente, nunc in duritiem tendente, nunc vago, nunc fixo, aut convulsionibus & contorsionibus intestinorum simpliciter oriuntur; omnisque originem habet ex spasmodicis & convulsivis contractionibus intestinorum.

Colica hæc convulsiva sine causa materiali in intestinis hærente, iterum est vel accidentalis vel habitualis: accidentalis est ista, quæ à causa evidenti solitaria, nunc externa, nunc interna, sine præcedente certa in corpore prædispositione ad colicam, oritur, & iis, qui genus nervosum sensilius, adeoque facilius irritabile obtinent, imprimis molesta est, adeoque frequenter à causa externa vel à morbo quodam interno, in alia quâdam parte radicato, excitatur; & sic per consensum frequentius intestina affligit. Talis v. g. observatur in nephritide, in aut post partum, item in purgationibus.

Tormina abdominis habitualia sunt illa, quæ habitum quasi contrahunt, i. e. quæ certam in corpore & firmiter radicatam dispositionem seu causam antecedentem & fomitem in corpore latente agnoscunt, quo leviter causa procathartica vel occasionali quacunque in corpore latente commoto atrociora, nunc levia, tormina abdomen occupant. Tormina hæc nunc successive denuò remittunt, sed sæpius reverti solent, in quibus sæpè umbilicus introrsum retrahitur, interdum insigniter distenditur, & duritiem notabilem contrahit:

subinde etiam in epilepticos motus, interdum in paralytica pathemata transcunt. Talis est v. g. dolor abdominis scorbuticus, item in suffocationibus hypochondriacis vel hysteri-  
cis vulgò dictis, virorum & mulierum est ob-  
vius, estque nihil aliud, quam convulsio mesenterii, & plexuum nervosorum & conjunctorum intestinorum, quarum partium vehementiorem contracturam ulterius insequitur faucium constrictio, & quasi suffocatio. In hac præter tormina abdominis adstant difficiles respiraciones; *es will mir das Herz abdrücken*/ inquirunt.

Pertinent huc etiam isti gravissimi abdominis dolores, qui non raro morbis diuturnis, & in specie febribus intermittentibus malè curatis, in quibusdam superveniunt, quod cum tædio experimur, qui nullis cedunt remediis evacuantibus, quæ frustra propinantur, & potius malum irritant. Originem videntur habere ex metastasi fermenti morborum ad glandulas mesenterii, nervos imprimis circa plexos meseraicos vellicantis, unde postmodum spasmi dolorosi pertinacissimi partium abdominis membranarum superveniunt; sicut etiam non rara sunt similia tormina in mesenterii abscessibus morbisque cognatis: vid. Bartholinus *Cent. 1. Epist. pag. 253*. Propter communicationem spasmodicam colica etiam periodica, certisque temporibus affligens, observata fuit.

Omnes hi dolores, tam humorosi quam convulsivi, hoc commune habent, ut ratione adjunctorum nunc cum ardore aut phlogosi plus minus intensæ, nunc verò cum algore seu frigoris aut rigoris sensu affligant, nunc vomitus adest, nunc abest, nunc, idque sæpius, contumax alvi obstructio, nunc alvus fluida, interdum nimis aperta; ardor & æstus nunc universum corpus occupat, atque plus minus febrilis est, & verè ex impetu spirituum, & concitatiore sanguinis cæterorumque humorum motu, occasione dolorum concitatus, oritur: interdum saltè in profundo sub hypochondrio dextro prope regionem lumbarem, ubi inferuntur ductus pancreaticus & choledochus in intestinum duodenum, percipitur. Hic autem ardor & phlogoses ibidem perceptibiles sunt ex effervescencia acidi cum bile peritonei; exinde enim caloris ac ardoris sensus oritur. Algor vero, qualis e. g. in febribus intermittentibus obvius est, oritur ex succo pancreatico nimis acido aut austero, qui occurrens bili paucæ vel minus oleosæ aut etiam obrutæ ex materia viscida effervescit quidem, dolorem tamen cum frigoris sensu junctum infert. Reverà autem vix videtur esse positivum frigus, quin potius oritur ab acido peccante, membranas meseraicas & vicinas vellicante, & in spasmos cogente, qui frigoris sensum solent repræsentare; pa-

(U 3)

nili



rilifere ratione, atque rigor & frigus febrile non nisi à tali membranarum circa præcordia, & hinc panniculi carnosum, spasmus tremulo oriuntur. Vomitus interdum abdomine dolentes affligit, præsertim in colica convulsiva crebriores observantur, ut in nephritica, hysterica & scorbutica notum est: minùs in colica humorosa, nisi vel intestina superiora tenuia magis afflicta sint, vel occasione assumptorum, in ventriculo corruptorum, malum ortum fuerit; interdum tamen à colo malè affecto, quatenus ventriculo proximè substernitur, vomitus concitari solet. Alvus adstricta, ut plurimum oritur ex intestinorum convulsiva, eaque pertinaci in quodam loco contractura, unde in convulsiva frequens est, & hinc etiam in humorosa, magistamen in illa, ac etiam si aperiatur alvus in convulsiva, parum commodi exinde percipiunt ægri, secus in humorosa; in hac enim, si evacuetur, quod evacuari debet, melius ordinariò habere solent ægri.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta in talibus torminibus semper sunt intestina primariò, nempe à morbo, i. e. à dolore; pars vero affecta à causa in colica humorosa sunt eadem intestina, uti etiam in colica convulsiva, quando malum est per essentiam: sed in colica convulsiva per consensum, aut etiam in colica habituali, vitium est in nervis, & plexibus mesenterii nerveis, vel per consensum affectis, vel ab acido acricò deposito & congesto irritatis.

#### C A U S Æ.

Ex his patet: quæ sint causæ omnium in intestinis dolorum? In genere sunt 2. causæ, quæ dolorem intestinis inferunt:

Prima causa sunt contenta in intestinis varia, plus minùs naturalia, quæ iisdem dolorem inferunt, & multiplex eorum nocendi artificium.

Secunda causa est spasmodica intestinorum convulsio, qua intestina in miras dolorificas crispationes & contorsiones coguntur.

Adeoque in omnibus intestinorum torminibus, tam humorosis quàm convulsivis habitualibus, quoad causam antecedentem, respiciendum est imprimis ad acre acidum plus minùs austerum, plus minùs viscidum; vel ex stomacho ad intestina delatum, adeoque ab assumptis vel vitiosis, vel vitiosè digestis, eò distributum; vel in plexibus nerveis mesenterii, vicinisque locis membranosis, pertinaciter hærens, & à quacunque causa externa excitatum.

Quoad intestinorum contenta, quæ colicam humorosam constituunt, imprimis dixi esse attendendum ad acidum: vix enim datur colica vera, quæ non habeat ortum seu doloris sensum ex acore vitioso, & intestinis

molesto; qui si adest, dat tormina, vel flatus, distendentes intestina; hinc colica flatulenta! hinc colica stercoraria à stercoribus induratis! hinc colica pituitosa à succis glutinosis, imprimis acidis, item ab assumptis, præsertim fructibus horæis, fermentescilibus, item à crevisia novella, item à pinguibus cum superingesto potu frigido, vel acidulo crebriores oriuntur colicæ. Bilis enim per se inepta est ad inducendum dolorem colicum, cum per se diluat potius contenta, & ita ratione talis volatilis oleosi, quod est saponariæ naturæ, intestina quasi abstergat, temperet acorem, & adhærentes sordes instar clysteris naturalis per abusum naturæ quasi abluit: aut si biliosa observetur colica, à bile porracea seu æruginosa originem eadem habebit: ac potius biliosus in subjecto plus minus viscido hærens, indeque elevati flatus, humorosas colicas inferunt. In specie sub purgationibus generosioribus hypochondriaci & scorbutici sæpius tormina patiuntur, partim à stimulis remedii purgantis, partim ab acrioribus ad intestina commotis humoribus; item post esum alimentorum difficulter digestibilium, aut qui copiosam mucilaginem viscidam loco chyli subministrant, colicæ subindè oriuntur, præsertim si abdominis superveniat nimia refrigeratio. Sic post cibos acidos, fructus horæos, poma cruda immatura, pira, vinum, & mustum infecatum, post potus non ritè defecatos (Reuterling) nec depuratos, item post abusum cerevitiæ albæ, Brehm/ ex tritico facile fermentescibilis, & similium potuum, unà cum melle aliisque dulcibus, præsertim in digestionis debiliore stomacho fermentando & acescendo subindè colicæ superveniunt: item ex ostrearum nimio usu frequenter oriuntur atrocissima tormina, quod aliquando observavit Forestus l. 21. obs. 7. præ cæteris flatus, hinc stercora diutius retenta, & tandem cruditates viscidæ acidæ in intestinis frequentissimè tormina abdominis inferunt; hinc hypochondriaci, in quibus notissimus est excessus acidi, & in quibus reperitur materia viscida in abdomine & intestinis, & copiosi flatus, admodum proclives sunt ad tormina colica; hinc rectè mulieres prohibent nutrices ab omni acido, exinde enim infantes in tormina ventris incidunt. Acidum enim, uti lac coagulat in stomacho, ita viscidam mucilaginem in intestinis exinde producit, unde exoriuntur exinde tormina infantum. Hac ratione intelligenda venit doctrina Paracelsistica, quæ pro causa colicæ adducit spiritus Ætherium resolutos, aut etiam Quum nimis resolutum, aut etiam coagulatum nimis, qui tartarus stypticis luminosisque acutis spiritibus intestina & vicinas partes irritet & excruciet: nempe acidum peccans hoc ipso insinuat. Stercora quod

Quod attinet nimis indurata, in intestinis tenuibus viscida & crassa, & ab acido plus minus auctero coagulata, colicam stercorariam dictam, subinde perquam contumacem, inferunt subsistentibus firmitus in intestinorum cellulis dictis stercoribus, & ita ad dolorem eadem irritantibus; hinc in ictero interdum supervenit colica pertinacissima ex defectu bilis & abundantia succi pancreatici in intestinis, unde contenta ab acido coagulata & constipata intestina vellicant; hinc acida maximè nocent colica laborantibus.

Facit huc dolor colicus in lue Gallica interdum affligens, ex acido specifico narus viscido, qualem observavit Zacutus Lusitanus *l. 2. Præcos Admir. obs. 22.* nullis, nisi Mercurialibus ungventis, succumbens.

Pertinent huc varia p. n. deglutita: uti, quando v. g. ex nummis aureis deglutitis, indeque eorum subsistentia, in cellulis coli stercori transitum impediendo, contumacissima colica oritur: vid. Bartholinus *C. 3. Epist. 69.* item Borellus *C. 4. obs. 25.* Item ex potu aquarum arsenico infectarum colica observata est. Colicam atrocissimam cum tussi, præcordiorum angustia & respirandi difficultate à vapore hnihausto videb. in *M. A. N. C. Ann. 3. obs. 131.* Idem observatum est ab Vishauptis ex vase plumbeo intus incrustrato, ibidem.

Pertinent huc calculi, qui subinde à colicis fuerunt excreti cum levamine, ita, ut reverà detur colica calculosa à calculis in intestinis coagulatis: qualia exempla vid. *l. 4. obs. 44. & seqq.* Horstii, it. in Benevenio *cap. 9. p. 122.*

Ex vermibus quoque & lumbricis in intestinis stabulantibus gravissimus colicus dolor oboritur: vid. Amatus Lusitanus *Cent. 1. Cent. 5. & 33. p. 232. 236. & 237.* Conf. etiam Schenkius, & *M. A. N. C. Ann. 8. obs. 70.* Hildanus *Cent. 1. obs. 57.* Thonerus *l. 3. obs. 4.* Rhodius & Salmuth: dolorem à lacertis & bufonibus vid. Barthol. *Cent. 5. Histor. 94.* Tandem spectant huc ipsi intestinorū affectus p. n. multiplices dolores inferentes, ut nil dicam de inflammatione intestinorū, colicum dolorem lethalem ex intestinis à dysenteria conglutinat, observat Rhodius *Cent. 2. obs. 77* sic pariter colicam lethalem notavit Sculterus in *Arman. Chirurg. obs. 61.* natam ob cancerum occultum, ex obstructione meatus choledochi.

Pertinet huc denique, quod observat Horstius *l. 4. obs. 47. p. 238.* tormina continua sub hypochondrio dextro à calculo, vesicam biliariam replente, & intestinū atterente. Pariter colicum dolorem à pituita, in externa intestinorū superficie hærente, notat Riverius in *obs. communicatis.*

Secundam causam colicæ dixisse spasmodicam convulsionem & contorsionem, quæ constituit colicam convulsivam. In hac considerandum etiam venit acidum nervis eorumque fibris inimicissimum, in plexibus nerveis mesenterii vicinisque locis pertinacius hærens, à quacunque causa externa excitatum, idque vel cum nutrimento proprio ad dictas partes delatum, vel cum vehiculo lymphæ eò depositum: id quod in scorbuticis, hystericis, &c. post febres malè curatas certissimum est. Item tormina abdominis contumaciora, ut ut non semper æquè atrocia, sæpè ab abicellis in glandulis mesenterii & pancreate fiunt, teste Bartholino *Cent. 1. Epist. p. 253.*

Sunt autem hæc tormina convulsiva vel hy-


pochondriaca & hystERICA, vel scorbutica, vel febrilia. Passionem hystericam quidem quod attinet: reverà hæc nihil est aliud, quam species colicæ convulsivæ, cujus fundamentum hæret in plexibus nerveis mesentericis irritatis, & in spasmodicas convulsiones concitatis, unde etiam partium superiorum superveniunt spasmi, indeque præcordiorum angustia, difficiles respiraciones, &c. vid. Willisius de *Passione Hyster.* Scorbutici dolores omnium sunt vehementissimi, & miserè torquent, ut iuxta illum ceteræ species sint saltem risus jocusque; quos ex convulsionibus intestinorum rectè, & omnium optimè demonstrat Johannes Drabitus in *Unterriecht von dem Schmerztmachenden Scharbock* *S. 8.* qui eleganter hoc negotium declaravit per motus convulsivos & ipsimos nervorum in & extra mesenterium ortorum, & ad intestina derivatorum.

Inchoat in specie ejusmodi dolor à dorso ac regione lumbari, hinc & pergit ad interiora, & intestina graviter affligit: inchoat sc., ubi annectitur mesenterium, & pertingit anteriora versus usque ad umbilicum; interdum est admodum vagus & oberrans, interdum fixus, & in quo umbilicus interiora versus retractus apparet; interdum in intestinis & abdomine convulsiones & contracturas intert dolorosas. Subinde hæc cessant, & superveniunt nunc convulsiones artuum, nunc verò pareses, quibus cessantibus, repetit abdominis dolor: interdum pertinaciter abdomen afficit. Quæ omnia certè non possunt concipi, nisi per talem convulsionem. Accedit quoque, quod in tali colica podex sæpè sit pertinacissimè clausus, & interiora versus contractus, quando nempe & ipse est convulsus, ita, ut nullum clyisma poterit applicari propter spasmus, simul intestinum rectum occupantem. Fit non raro, ut ipsum abdomen excavatum appareat, & umbilicus intorsum versus retractus videatur propter istas convulsiones, quibus umbilicus, & forsitan etiam ipsum peritoneum, simul afficitur. Certum est, quod hi dolores abdominis convulsi sint gravissimi & contumacissimi, & nisi rectè tractentur, facillè degenerant in pareses, uti in locis vinosis, Austria, Moravia, Franconia, &c. satis experiuntur incolæ, vel contracturas artuum. Subindè prostant vestigia talium dolorum convulsivorum apud Tulpium *l. 3. obs. 22.* & Thiermeyerum *Pr. T. 2. c. 4* aliosque scriptores practicos & theoreticos; sed quos hi ipsi saltem ex humoribus, speciatim ex bile derivare nituntur. Conf. Forestus *l. 25. obs. 3.* item Riolanus in *Encheires. Anat. de Peritoneo c. 3. pag. 96.* sed facilis esset dolorosorum horum symptomatum explicatio, modo superius dicta ponderentur.

Febrilia tormina sunt ea, quæ febribus intermittentibus diuturnis non adeò benè curatis supervenire solent, ut ut etiam critico modo superveniant: alvus pertinaciter est clausa, purgantibus etiam fortioribus si laxantur ægri, sit tamen ferè sine dolorum levamine. Videntur autem oriri ex metastasi materiae morbosæ, delatæ ad glandulas mesenterii, vellicantis partes nerveas; unde etiam non raro sunt similia tormina in mesenterii abcessibus.

Ut, quæ hætenus dixi, de differentia doloris colici, clarius percipiantur, inspicatur sequens tabula.

In



Multa



Multa essent dicenda de colicis malignis: sed temporis angustia impedit hoc. Moneo saltem, quod vomitus & singultus talis colicæ ex vicinitate stomachi & diaphragmatis omnes fiant ex similibus spasmis ex mesenterio vibratis.

### DIAGNOSIS.

Pergo ad signa diagnostica.

Diagnostica signa doloris hauriantur ab ægro & symptomatum syndrome.

Ut autem ritè cognoscantur hi dolores intestinales, & à se invicem discernantur, tria summa capita observanda sunt:

1. Antecedentia, ut constitutio ægri, vitæ ratio, morbi consueti, an scorbuticus, calculosus, &c.
2. Adjuncta seu essentialiter inhærentia: nempe ipse doloris modus, & adjuncta reliquarum partium symptomata.
3. Consequentia: mutationes nempe in urina, in alvi excrementis, juvantia & nocentia, si alvus non respondet, fæces induratae, vel intestina contracta; si purgantia nil evacuant, vel parum sine levamine, est colica convulsiva.

Ex his invicem collatis, sed probè ponderatis, facile est, dolores dictos à se invicem discernere, & sciendi eorum rationem cognoscere. Inspecie attendendum: an sit colica humorosa? an verò convulsiva? & si hæc; an sit accidentalis? an vero habitualis? & si habitualis; an sit scorbutica, hysterica; an alia?

Solitaria facile distinguitur ab ea, quæ incipit in affectibus uteri: nam ubi cum convulsione intestinorum concurrat convulsio partium ad uterum pertinentium, percipitur dolor, qui à lumbis deorsum trahitur versus sinum pudoris: item si adest simul affectus uterinus, dolor iste etiam ad os femoris seu coxendicis pertingit: item, si adsit junctus dolor iste cum difficultate motus, percipitur gravamen in dorso & lumbis prope renes, & hinc sequitur postmodum dolor colicus.

Denique si acerbatur dolor colicus, ut fiat passio hysterica, tunc percipiunt simul angustiam in præcordiis, item impedimentum in respiratione, propter similem convulsionem diaphragmatis deorsum versus.

Ut à dolore nephritico distinguatur colica, observetur, quod in dolore colico post pastum sit remissio, imprimis post assumpta aromatica; dolor vero renalis post pastum fit acerbior. Deinde, si adest dolor renalis, mutatio semper est in □, quod non est in colica: aut, quod obiter moneo, quod in dolore colico renali adsit stranguria insignis, & □ coloris admodum fulgidi & Sini excernitur, sed non semper. Tandem, ubi dolor est colicus, clysteres aut evacuationes alvi renalem aut pa-

Tom. II.

rum, aut nihil solent levare. Denique in renali colica adest semper dolor plus minus obtusus ac gravativus in dorso circa lumbos, qui non est in colica vera.

Plura de signis distinctivis colicæ veræ à nephritica, videb. in Sennerti *Praxi*.

In colica convulsiva est dolor lacerans, sed non ita gravativus & obtusus, ut in renibus: Urinæ excernuntur pallidæ & lactææ, copioso sedimento imprægnatæ, quod non fit in reliquis speciebus colicæ.

### PROGNOSIS.

Quod attinet signa prognostica: Colica ex se leve malum est, rarò periculosum; quæ tamen interdum ex adjunctorum aut supervenientium symptomatum, aut plurium circumstantiarum ratione, & ubi est nimis contumax, potest esse periculosa, imò lethalis.

Humorosa, & quæ fit à materia in intestinis contenta, mitior est, & facilius curatur convulsivâ.

Porro omnis colica convulsiva, quò magis complicata habet symptomata ventriculi, eò est periculosior, & difficilior curatu.

Inspecie vomitus colicæ superveniens rarò bonum signum est.

Colica humorosa flatulenta gravia symptomata facit, & ad tympanitidem disponit.

Colica convulsiva habitualis omnis periculosa est; partim ob diuturnum paroxysmum; partim, quod sæpius recurrat, & sic periculosior fiat: firmiter radicata facit mala multa; nam huic non rarò superveniunt aut pareses, aut epilepsiæ: Sic Hæferus in *Hercule med.* p. 185. exemplum habet colicæ, quæ gravem cephalalgiam & maniam induxit, cum cæcitate & impedita deglutitione. Item Thonerus in *Observat.* p. 93. observat colicam in geminatam visionem & epilepsiam terminatam; nec rarum est, quod intulerit tetanum totius corporis & contracturas partium externarum.

In humorosa colica saltem attendendum est, ne sub ejus exacerbatione & alvi obstructione superveniat ileos morbus.

Evenit interdum, ut colica humorosa degeneret in abscessus, vid. Hildanus, *C. 2. observ.* 74. Conf. etiam *C. 1. observ.* § 4. ubi prostant exempla doloris colici in abscessum intestinorum degenerati. Aliud videbitis exemplum in Panarollo *Pentec.* 4. *observ.* 50. qui habet dolorem colicum intra 10. horas lethalem, quæ tamen sunt rara.

Colica scorbutica convulsiva interdum est lethalis, ita, ut observata fuerit instar morbi peracuti intra 3. aut 4. jugulasse ægrum.

Raucedo in colica ut plurimum lethale signum est. Denique in omni colica, quò magis aperta alvus, & stimulata respondet, bonum est; quò contumacior, imprimis si podex retractus, periculosum est, & metus passionis

(X)

fionis iliace; vid. Riverius *in Praxi de dolore colico*.

Pergo ad

### C U R A M.

Cura colicæ est duplex; nempe instituat<sup>r</sup> vel in paroxysmo, vel extra paroxysmum.

In paroxysmo

1. Causa irritans intestina maturè sopienda, & ipse intestinorum sensus dolorosus, indeque natus motus convulsivus opiat<sup>s</sup> sistendus.
2. Si est colica humorosa, causa peccans materialis, ejusdem nempe acrimonia acida, aut visciditas, aut alius nocendi modus, corrigenda, & maturè per alvum educenda.
3. Si colica est convulsiva, appropriata nervina, in specie salia volatilia oleosa opiat<sup>s</sup> mista, propinanda sunt.

Extra paroxysmum hōc sedatō, morbus primarius, fomes morbosus, unde dolores pendent, isque in specie in colica convulsiva habituali, variis appropriatis est tollendus, & crebrior aut consveta recidiva præcavenda.

Pro dictis tribus scopis in paroxysmi cura obtinendis, imprimis in toto paroxysmo, repetitus clysterum legitimè applicatorum usus sedulò est observandus, ut his ipsis, pro varietate intentionum variis, continuo alvus, quantum possibile, evacuetur & servetur aperta: magis autem conveniunt clysmata talia, si in humorosa malum hæret in intestinis crassis; minus vero, quando in tenuibus, & quidem ubi non sumus certi, in humorosa materiam peccantem hære præcisè in intestinis tenuibus, minus conveniunt purgantia clysteribus admista, propter metum volvuli: Ubi verò certi sumus, malum hære in intestinis crassis, imprimis colo, uti communiter fit in dolore hypochondriaco, tunc etiam fortiora purgantia seu stimulantia clysmatis addi possunt.

Deinde conveniunt, ubi ventriculus gravis simul affligitur, ut tanquam revulsorio stimulo tam causa irritans, quàm motus spirituum, ad intestina derivetur: Item, quando post propinata purgantia non sufficienter respondet alvus, optimum est in talibus casibus clysteribus acris plùs minùs purgantibus naturæ motum promoverè. Quando verò malum hæret in intestinis tenuibus, potiùs blandissima laxantia & abstergentia per os conducunt: quod confirmat experientia D. Mœbii in infante colica laborante, cui medicus quidam aliquot clysteres applicandos curavit, sed sine fructu: tandem Mœbius advocatus laxans blandissimum per os adhibuit, quod ex voto cessit, & infans brevi convaleuit: Videatur *colleg. Mœbii in synopsi cap. de colica*: Quod si videmus, clysteribus acrioribus al-

vum non respondere, & malum non mitigari, iis ulterius insistendum non est, sed præsumendum, vitium hære vel in intestinis superioribus, vel esse colicam simpliciter convulsivam. In convulsiva colica clysteres anodyn<sup>i</sup> & leniter demulcentes sunt optimi: item accedendum est ad clysmata terebinthinata, quæ in quavis convulsione sunt optima. Si in colica imminet metus ilei, vel podex sit pertinaciter retractus, non ad eò copiosè injicienda sunt, ne promoveamus iliacum morbum.

Clysinata, quæ in omni colica conveniunt, sunt in principio morbi vel mitiora emollientia, stercora in intestinis abstergentia, aut carminantia: vel si non suffecerint, fortiora purgantia, aut acriùs stimulantia ex colocynthide, antimonio & similibus, præsertim in humorosa, quando alvus p. n. & pertinaciter obstructa, clysmata insigniter emollientia profunt, quæ fiunt ex lacte simpliciter, addito saccharo aut melle, oleo communi aut lini; vel quando coquuntur in lacte quædam emollientia, quæ blandè alvum lubricant, talia sunt optima, imprimis in doloribus abdominis scorbuticis, item in hypochondriacis, in quibus cum melle mirè conveniunt. Vid. Horst. *Observat. p. 395*.

Si magis anodyna desiderentur:

℞. *Fol. hyoscyam.* Mj.

Coqv. in f. q. *lactis*:

*Colatura* ℥ix. l. ℥x. adde

*Mellis rosati* ℥j.

M. pro clysmate anodyno, S.

*Lindernd Clyster.*

In graviore colica, ubi materia hæret in crassis intestinis, injici possunt ex oleo expresso sem. lini, raparum, &c.

℞. & *expr. sem. lini.*

*rapar.* ā ℥v.

M. pro enemate.

Vel addantur

& *diacolocynth.* ℥vj.

& misc. pro clysmate.

Vel ubi aut mucus viscidior, aut stercora indurata, in intestinis hærent, omisso oleo, clysteribus sal gemmæ ā ℥j. ad ℥ij. addendum est: v. g. clysteri, suprà dicto ex oleo seminis lini & raparum ℥j. salis gemmæ addi potest: Vel

℞. *HB. malva* Mij.

*flor. sambuc.*

*verbasc.* ā Mß.

*rad. lil. alb.* ℥ß. ad ℥j.

Coqv. in ∇ *simpl. q. f.*

*Colatura* ℥viii. vel ℥ix. add e

*lect. hiera picra* ℥ß. l. ℥vj. ad ℥j.

(vel pro scopo emolliendi *El. lenit.* ℥iß.)

Θ *gemm.* ℥ij. ad ℥j.

M. pro clysmate unâ vice applicando.

Ubi verò sunt flatu, convenit clysmata carminans & emolliens, imprimis cum Θ *gemmæ* injectum c. g.

℞. *Spec.*

℞. *Spec. carm.* Mij.  
*rad. angel.*  
*levist.*  
*sem. carvi* à ʒʒ.  
*bacc. junip.* ʒj.  
 Coqv. in l. q. ∇.  
*Colatura* ʒviij. adde  
*elect. de baccis lauri* ʒvj.  
*Mell. rutac.* ʒʒ.  
 ☉ *gemma* vel ☉ *depur.* ʒij.  
 M. f. *enema*, S.  
**Blähungs-Clystier.**

Loco salis gemmæ in colica flatulenta potius ☉ destillata simul addenda, quæ potenter penetrant, & flatus discutunt: e. g. sit clysmata carminativum anodynum, quale etiam hypochondriacis, item hystericis commodè præscribi potest hoc modo:

℞. *Fol. lauri* p. iij. vel Mj.  
*flor. Chamom. Rom.* aut *Vulgar.* Mjʒ.  
*rad. Angel.* vel *levist.* ʒvj.  
*Sem. 4. calid. minor.* à ʒij.  
 Coqv. in ∇ *comm.* q. l.  
*Colatura* ʒx. adde  
*Elect. de bacc. lauri* ʒvj.  
*Syrup. papav. f.* ʒʒ. vel *Ther.* ʒj. ad ʒij.  
 ☉ *destillat. angel.*  
*carvi*  
*cumin.*  
*bacc. lauri* à gutt. iij. vel jv.  
*Vitell. ovi* No. j.

M. pro clysmate pro 2. dosibus injiciendo, propter flatus, qui impediunt, quò minus totum una vice possit injici.

Ulterius, ubi sunt nimii flatus in intestinis præcæteris conveniunt clysmata ex ☉ pueri.

℞. ☉ *pueri impuberis*;  
 & ipsi addatur  
*fermenti* parum;  
 ipsique postmodum incoquatur *semen anisi* &  
*anethi*, & *colatura* ʒviij. l. jx. addatur  
*mellis despum.* ʒj.

sicque injiciantur; inbgniter confert in affectibus flatulentis.

℞. *Decoct. carm.* ʒvj.  
 ☉ *human.* ʒjv.  
*fermenti* ʒj.  
 ☉ *comm.* ʒj.  
*mell. rosar.* ʒj.

M. pro clysmate ad imitationem Valeriolæ præscripto in gravioribus doloribus flatulentis.

℞. *Spec. carminat.* Mij.  
 Coqv. in l. q. ☉ *humana.*  
*Colatura* ʒviij. adde  
 ☉ *destillat. terebinth.* ʒj.  
 M. f. *Enema*.

℞. ☉ *puericales.* ʒix.  
*sperm. ceti* ʒiij.  
*vitell. ovi* No. j.

Tom. II.

*Syrup. papav. alb.* ʒj.  
 M. f. *Enema*.

Confer. Deodatus in *Valetudinario* p. 197.

Faciunt huc etiam clysmata terebinthinata cum ☉, quæ superius in dysenteria dedi, & imprimis in doloribus convulsivis, nephriticis, hystericis, scorbuticis, &c. sunt optima, & multum commendantur à Deodato in *Valet.* p. 247.

℞. ☉ *human.* aut *decoct. emoll.* ad imitat.  
*Willisii* ʒj.

*terebinth. cum vitello ovi dissol.* ʒij. vel ʒiij.  
 ad ʒʒ.

*mell. colat.* vel *Mercurial.* ʒvj. vel ʒj.

M. f. *Clysmata*.

Conferatur hic Willisius de *anima bruta.* rum p. 394. P. 2. c. 15.

Sunt, qui ceu singulare clysmata laudant decoctum veronicæ cum myrrha & vino, quibus B. D. Langius addit ☉ ʒʒ ad ʒj. aut Rm ☉. Senibus clysmata ex vino malvatico cum oleo chamomillæ, & quæ vim anodynâ habent, facienda, hinc syrupus papaveris, sed cautè, addendus.

Fortiora clysmata, eaque in colica humorosa saltem conducentia, minus in convulsiva, sunt ea, quæ ingreditur colocynthis in petia ligata, vel ∇ benedicta, aut infusum croci metallorum ab ʒiij. ad ʒij. vel iij. de quibus vid. Riverius C. 1. observ. 57. & 67. item C. 2. observ. 12. & C. 3. observ. 22. & supra de alvo obstructa, v. g.

℞. *Juris pisorum* ʒvij. vel viij.

∇ *benedict.* ʒj. vel iij.

*Elect. lenitiv.* ʒvj. vel ☉ *comm.* ʒj.

M. f. *Enema*, S.

**Lindernd Clystier.**

℞. *Decoct. pisor.* iʒij.

*scor. reg.* ʒi ʒvj. ad ʒj.

*mellis* ʒial. ʒj.

M. pro *Clysmate*.

Præter fortiores pertinent huc clysteres ex fumo tabaci, maximè proficui in colica humorosa, & in omnibus doloribus abdominis, vid. *histor. anatom.* 66. Bartholin cent. 6. & c. 4. *epist.* p. 253.

Instrumentum verò, quò commodè potest Anglorum more applicare sibi unusquisque tale clysmata, & fumum tabaci sub hac forma intestinis immittere, habet Bartholinus in cent. & hist. jam allegata, & Simon Pauli *Quadrupart. Botan. class.* 3. p. 462. & 463. non tantum dolores sistunt, sed & alvum laxant.

II. Præter clysmata in omni colica, in specie humorosa, minus in convulsiva, attendendum est, an conveniat purgatio per alvum, an verò non? Nempe tutius possumus purgare remediis per os propinatis, ubi contenta in intestinis urgent, quam ubi malum simpliciter à spasmis fuerit. Deinde, si intestina ex strictura convulsiva, propter contenta etiam

(X 2)

irri-



irritantia, sint nimis firmiter clausa, cavendum à purgantibus, magis magisque irritantibus; sed potius lenissima, emollientia, eluentia intestina, aut simpliciter lubricantia oleosa & passulata conducunt. In specie in principio colicæ, dum adhuc dolor urget, propriè dicta purgantia minus conveniunt, sed omninò nocent; irritando enim intestina malum fortius exasperant, & ex auctâ hac intestinorum contracturâ minùs laxant. Imò cum in colica sæpius adsit periculosus vomitus, metus est, ne ita purgantibus irritentur crabrones: quò sæpius iterantur, in deterius labitur æger, & magis disponitur ad affectus paralyticos; sin verò mox in principio usurpari debent, sint non nimis violenta, sed lenia, & simul opiatissima, ut sistant dolorem, & causam morbosam eliminant ex intestinis: semper nempe considerandum est, ne aciori laxativo irritatis intestinis omninò impediatur excretio fecum, & ad contumacem ileon disponatur æger. Adhuc sæpius evenit, ut purgantia, licet fortia, nihil operentur, sed subsistant, unde subsequitur inde dolorum augmentum: Ergò purgantia talia vitanda. In progressu verò morbi, attenuatâ viscidâ materiâ, & temperatâ ejusdem acrimoniâ, blandè subducentia conveniunt. Deinde, si ex inflammatione est colica, medicus caveat, ne ullo, quantumvis leni medicamento subducente, utatur; ex irritatione enim intestinorum inflammatio augetur, & hinc volubili seu ilei metus supervenit. In colica humorosa, in specie, ubi intestinorum peregrini ac vitiosi hospites sunt exturbandi, purgantia locum habent, vario tamen, pro circumstantiarum ratione, regimine, &c. Nempe, si dolor non adeò urget, & morbus sit ex errore victus, aut simili causa externa; aut malum sit à viscida tenaci & acida pituita, cum dolore terebrante & gravativo, in principio purgari potest; secus differendum hoc ipsum, donec nonnihil mitefeat dolor. In pituita enim vitrea vel acida, si quis lenientibus solis contentus à purgantibus veris absteineat, nil aget; potius, quamprimum viscida materia attenuanda, & per purgantia attenuantibus mista, eadem evacuanda: conf. Septalius in *animadv.* l. 7. §. 72. Nempe invertenda interdum medendi methodus est, & urgente nimis dolore mox ad laudanum confugiendum, quod alias tutius sit, ubi præmissa fuerint alvum aperientia. Horst. l. 4. *observ.* 7. Amatus Lusitanus *cent.* 4. *cur.* 95. & *cent.* 7. *cur.* 22. Purgantia autem in colica humorosa conveniunt nunc fortiora, nunc mitiora, fortiora hæc & propriè dicta purgantia, in specie, ubi ex spâsimo fortius contracta sunt intestina, aut motus eorum peristalticus minùs fieri solent, non conveniunt, quin lenissima plura præstent, quàm aciora & fortissima. Sic Henricus à

Moinichen *observ.* 5. ad Bartholinum *missa* dicit, quod Donadonus alvi stypticatatem ad 3. septimanas durantem solo serî caprini copiosè sumpti usu curaverit: Sic, referente Sennerto, observatum est, cum æger quidam 30. clysteres sine effectu accepisset, alium medicum mannâ ab 3j. ad 3ij. cum 3ij. olei amygdalarum dulcium propinasse in juscule gallinæ pingui, & ægrum à dolore liberasse. Commendat hanc misturam Riverius *Prax.* l. 10. c. 1. vel 60. amygdalarum dulcium loco butyri juscule admisceatur, quibus etiam spermatis ceti 3ß. commodè addi potest. Singulare experimentum Cratonis ad solvendam alvum, & sedandos dolores colicos est oleum amygdalarum dulcium 3ij. ad iij. cum vino malvat. & spermate ceti: vid. *dissertat. med. de sperm. ceti* c. 2. §. 4. p. 11. Imo propinata purgantia interdum egregiè operari observantur, in humorosa, sed sine levamine; quia scilicet non purgant, quod purgandum erat; ex tenuium irritatione serosa liquamina proritantur, dum vitrea in crassis relinquitur pituita: vid. Sennert. *Prax.* l. 3. p. 201. & Salmuth *cent.* 1. *observ.* 78. p. 49. hinc partim aliquis selectus purgantium, partim appropriatorum, gummatum, & dulcis additio observetur. Adeoque purgantia propriè dicta rariùs, laxantia, sive abstergendo, sive emolliendo, sive leniter fermentando operentur, frequentissimè conveniunt.

Inter emollientia & abstergentia sunt imprimis potio passulata, & hinc pulveres salini cum stimulo scammoncato. Inter lubricantia & pingua convenit potio Plateri in principio doloris colici propinanda, quæ ex leniente & emolliente procedit.

℞. 80. amygdal. dulc. 3ij.  
vini malv.  
syrup. papav. 3ß.  
M. f. Potio.

Quæ detur pro haustu. Nam & oleum amygdalarum dulcium in juscule calido propinatum, subito sedat tormina infantum. Loco syrupi papaveris etiam spermatis ceti 3ß. addi, & ita alvus laxari potest; Vel ubi tutius uti licet purgantibus, cremor ʒi cum resinis purgantium propinetur ad imitationem Willisii c. 1. p. 396.

Vel infusum sennæ cum ʒi & zingibere paratum, vel infusum rhabarbari cum sennâ, adhibeatur. Vel ubi viscida ac tenax pituita primariò peccat, potiones cum gummate ammoniaci in colica humorosa sunt admodum convenientes: propterea ubi pertinax est colica ex pituita vitrea & acida:

℞. ʒi mentha 3j. vel 3ijß.  
cinam. 3j. 3ij. vel 3ß.  
Gumm. amm. cum aceto solati 3ß.  
l. ʒi. ad 3ß.  
ʒi ʒlat. 3ß. ad gr. xv.

scamm.

*scamm. ʒat.*  
*trochisc. alb. à gr. j. vel ij.*  
*syrup. rosar. solut. vel de pom. ʒß.*  
*M. pro una vice, S.*

**Purgier = Eräncklein auff einmal.**

*℞. lapill. ʒ prepar. gr. xij.*  
*ʒi ʒlat. ʒß.*  
*trochisc. alb. gr. ij.*  
*M. F. Pulvis*  
*D. S.*

**Erweichend Pulver.**

In declinatione verò morbi, ubi viscida adhuc, vitrea & acida pituita in intestinis hæserit, commodè usurpentur eadem gummata cum ʒ dulci, qui eam potenter dissolvit & abstergit. Imitandus hac in parte Deodatus.

*℞. MP. de hier. cum agar.*  
*ʒ dulc. à gr. xv.*  
*troch. alb. gr. i.*  
*& destillat. anisi gut. ij.*

*Cum essent. mentha. f. pilulæ: S.*

**Purgier = Pillen.**

*℞. MP. de ʒco Querc. ʒj.*  
*extract. absinth. ʒß.*  
*troch. alb. gr. ij.*

*cum ʒ destillat. anisi. F. Pilulæ.*

*Item ℞. ʒi ʒlati gr. xv. ad ʒj.*  
*scamm. prepar. gr. ij.*  
*troch. alb. gr. ij.*  
*ʒo destillat. zedoar. gut. j.*  
*M. F. Pulvis: S.*

**Purgier = Pulver.**

Quod si verò in colica humorosa mox in principio purgantia convenient, commodè eadè cum opiatas misceantur, ut suprà de cardialgia dictum fuit, quò sine maiore intestinorum irritatione sublato dolore alvus laxetur.

Pilulas cum laudano opiato permixtas videbis apud Poterium *Cent. 3. r. 27*. Pertinent huc Pilulæ Stæckeri, quibus, ut ipse scribit, cum summo suo honore Ducem Tartarorum curavit in colica:

*℞. Aloës succoter. vel pilul.*  
*aloëphang. ʒj.*

*opii.*

*croc. à gr. j. vel ij.*

*(pro crocopotest sumi & castoreum.)*

*M. f. Pilulæ.*

Quarum vel dimidia pars, vel omnes, exhibentur jejuno stomacho; dolorem enim post horam sedant, & postmodum solvunt.

Si volumus, ut in meliore dosi meliùs & potentiùs operentur, acuamus has ipsas cum gran. ij. vel iij. *scammionii ʒati*, & ita commodè usurpari poterunt.

*℞. Aloës rosar. ʒj.*  
*extracti zedoar. gr. viij.*  
*scamm. ʒat. gr. j.*  
*laud. opiat. gr. j.*  
*ʒo destillat. carv. gutt. ij.*

*Cum essent. zedoar. f. Pilulæ.*

*Item ℞. G. ʒci cum aceto sol. ʒj.*  
*diagryd. gr. vj.*  
*laud. opiat. gr. jv. vel v.*

*M. f. Pilulæ pro 4. dosibus.*

Clysteribus quoque laudanum opiatum à quibusdam imici solet à gr. iij. ad ʒß. nec dubium est, quin cessaturus sit dolor: sed cautè agendum est: Conf. Borellus *Cent. 4. obs. 94*. Loco hujus tutiùs theriaca ad ʒij. clysteribus additur.

Sedato autem paroxysmo in colica convulsiva, conveniunt appropriata purgantia commodè cum sudorifero usurpanda.

III. In usu vomitoriorum remediorum, quæ interdum necessaria sunt, cauti sumus maximè: si enim ventriculus & supernæ partes intestinorum repletæ nimium fuerint, ex usu maximè erit, ut medicamentis ad dejiciendum ingestis locus detur pertranseundi. Quod si totus dolor, ejusque causa, infernas partes oblideat, non solum frustra tentatur vomitus, sed aliquando fit cum certa ægrorum pernicie, cum volvulosi faciliè exinde fiant. Illustrat vomitoriorum usum observatio Plateri *l. 2. observationum p. 451. seqq.* Adolescens quidam nobilis ex inordinata victus ratione, & nimio potu vini muscati Narbonensis, cardialgiâ primùm, mox colico dolore laborans, postquam semel curatus, maturiùs, quam par erat, se æri frigido concedidisset, & quadrigis celeriter per urbem veheretur, recidivam pass⁹ 7. septimanarum spatio, durante morbo, licet sæpius clysteribus & narcoticis usus fuisset, non tamen integrè sanari potuit, donec vomitorio Gualini⁹ fuerit, à cujus usu mox magnam copiam æruginosæ bilis aliquoties vomuit, uti & pituitæ, atque inde urinæ, quæ ex atro crocæ diu permanserunt, in naturalem colorem permutatæ, ipsæque sensim ad se redire cœpit.

IV. Opiata in dolore colico semper sunt optima, in principio & progressu morbi adhibita, primariò in colica convulsiva, hinc etiam in humorosa; Et quidem tutiùs est, ut alvi evacuatio præmissa fuerit, nisi summa doloris atrocitas nimis urgeat: frequentius tamen in usum duci possunt, ubi materia morbosa fuerit tenuior & acrior, minùs verò ubi eadem fuerit viscidior. His ipsis opiatas, semper appropriata & resolventia pro causæ morbosæ dispositione varia addenda erunt, ut eò meliùs succedat operatio. Præceteris opiatas laudanum hystericum est egregium remedium, tam in colica convulsiva, quam etiam in reliquis. Denique, si quando opiatas utendum, non sunt differenda eò usque, donec vires vitales jam collabascant, ægerque non longè sit ab interitu: tali enim in casu non rarò solet. vita dormiendo finiri: potiùs in principio aut incremento morbi viribus validis usurpantur. Adeoque in colica humorosa usurpantur opiatas post purgantia, & hinc etiam purgantibus

mista, & non, nisi in casu necessitatis, ante purgantia. Nempe, ubi tanta est, sive ventriculi debilitas, sive vomituritio, ut nec pilulæ possint detineri, ibi (1) remedium anodynum ordinetur, (2) paucis horis elapsis catharticum, eò temporis spatio interjecto, ut narcoticum à cathartico tanto distet intervallo, ut ab eo non vincatur & pereat, eas tamen in ventriculo moras trahat, quæ ad virtutem purgativam communicandam eidem sufficiant, ut suam demùm exserat operationem, cessante altero, licet catharticum, modò id possit fieri, diu post anodynum rectissimè propinetur, cum etiam ad horas 12. ab hoc assumpto alvus isti ægrius respondeat, atque non, nisi operosius, solvatur. Cum autem hîc, uti in aliis plerisque morbis, in quibus indicantur narcotica, catharticum semper dolorem intendat (saltem finitâ jam operatione, quâ quidem vigente, mitius nonnunquam cum ægro agitur:) idcirco solenne est, anodynum ingerere, ubi primùm expiravit cathartici *ἐνέργεια*, ut rectè loquitur Sydenham *in observ. circa morb. acutos* pag. 294.

294.  
Ex his patet, opiata conducere magis (1) in convulsiva quàm humorali. (2) In accidentali quàm habituali. (3) Quæ à materia acri, tenui, seu ut vocant biliosa, quàm quæ à materia viscida. (4) In flatulenta, quàm humorali. (5) Præmissa alvi quacunque lenitione tutiora esse. (6) Appropriata causæ vel morbo socianda esse.

V. In omni colica fugiendum frigus, præsertim ventriculi & pedum; hinc calidus potus est optimus. Et observavi in colica convulsiva cum copioso vomitu conjuncta, & aliquot secessibus, ex abdominis ab aura frigida refrigeratione nata, optimum fuisse remedium bonum haustum  $\nabla x$  vitæ juniperinæ, unde omnia mala cessarunt. Hinc rara est & vix imitanda observatio, quam habet Amatus Lusitanus *Cent. 1. Curat. 2. & C. 7. Cur. 21.* Zacutus Lusitanus *l. 2. Prax. Admir. obs. 25.* Forestus *l. 21. obs. 12.* Tulpus *l. 2. obs. 37. & imprimis Septalius loco supra citat. §. 82.* colicæ desperatæ, copiosæ  $\nabla x$  multâ nive refrigeratæ potu curatæ. Sed arbitror, accidentarium fuisse affectum, quasi occasione refrigerationis intestinorum convulsorum spasmi relaxati fuerunt; unde mirabilis flavæ bilis copia evacuata fuit.

VI. In flatulenta colica, in qua flatus non  
causæ, sed semper producti morborum rationem  
habent, utut per accidens affectum exasper-  
rent, in principio carminantia actia & aro-  
matica valdè discutientia minus conveniunt,  
sed potiùs saltem in declinatione; illorum ve-  
rò loco tunc ~ ① dulcis adhibeatur.

VII. Quod si alvus relaxata, & ista universalia plus minus præmissa fuerint, & nihilomi-

nus tamen dolor persistat, aut si urgeat adhuc colica convulsiva, ad appropriata accedendum est, et quæ in specie aromatica; nam hæc acidum temperant, flatus resolvunt, viscidum incidunt, simulque nervis amica sunt; eorumque spasmos sistunt, adeoque in genere in quibuscunque abdominis doloribus conducunt. Talia sunt HB. veronica, quæ seu singulare specificum laudatur; cui tamen non cedit chamomilla, imprimis Romana, sclarea, cortex aurantiorum, zedoaria, gentiana, helenium, absinthium, semina 4 calida majora: ex quibus modò dictis destillata olea, decocta & alia multiplicia præparata valent, ut aqua florum chamomillæ, veronicæ, cinamomi, menthæ, aquæ spirituosæ compositæ, & *carminativa Dorncrellii & anticolica*. v. g.

82. Flor. chamom. Rom.  
 sambuci  
 fol. menth.  
 ruta sicc. ʒm. iij.  
 baccar. junip. rec. ʒijß.  
 lauri excort. ʒvj.  
 semen tumin. ʒj.  
 anisi,  
 fœnic. à ʒß.  
 calam. arom. ʒjß.  
 flav. cort. aurant. ʒiiij.  
 cinam. acuti ʒvj.  
 zedoar. ʒiiij.

Pulverisentur omnia tenuissime, & adspersantur cum  $\sim$  *Directif.* ℥ss. ad ℥vj.

Infundantur c.s.q. V, non adeo exactè recti-  
ficato: stent per 12 horas in MB. dige-  
rantur lento igne, vase bene munito.  
Tandem destillantur per alembicum ex  
arena vel cineribus lentè, ut caveatur  
empyreuma.

Dosis est cochlear. j. vel ij.

Huc pertinet etiam essentia carminativa Wedelii in *Opilog.* descripta, cum anodynis & castoreatis mista. Item syrupus corticum aurantiorum, de papavere, ubi dolor adest; syrupus de Althæa Fernelii, ubi emolliendum, & acrimonia temperanda; Castoreum,  $\Delta$ , omnia  $\Theta$ ia volatilia, adeoque liquor CC.  $\Theta$ is ammoniaci,  $\sim$   $\Phi$ i,  $\sim$  carminativus de tribus, stercus equinum, stercus lupinum, testes equini, &c. Promiscuè hæc in quibusque abdominis doloribus conveniunt, in specie tamen, ubi flatus urgent in hypochondriacis, spiritus carminativus de tribus, &c. est optimus. Ubi verò sunt tormina convulsiva hysterica, liquor cornu cervi succinatus,  $\Theta$ ia volatilia  $\oslash$ sa, item camphora, &  $\nabla$  theriacalis camphorata, item stercus equinum, & similia conducunt: v. g. in genere contra dolores abdominis,

℞.  $\nabla$  chamom. ℥ij. vel iij.  
 ☞ theriacal. simpl. vel camph. ℥ij.  
 Laud.



*Laud. opiat. gr. ij. vel iij.*

*syrup. cortic. aurant. ʒʒ.*

M. F. Potio, cochleatim usurpanda: S.  
Vindernd Träncklein auff etliche mal.

In colica humerosa flatulenta:

℞. ▽ *menth. ʒij. l. iij.*

(vel ▽ *menth. & chamom. à ʒʒ.*)

*elixir mentha, (nisi urgeat æstus)*  
*ʒij. ad ʒʒ.*

*essent. carm. ʒj. vel ʒʒ.*

~ *Qi dulc. vel anti-colic. ʒʒ. vel ʒij.*

(vel ~ *Qi rectif. gutt. xv.*)

M. F. potio.

Capiatur cochleatim, subinde, si possibile, aliqualem sudorem expectando. Et conuenienter in specie talis mixtura cum ~ *Qi* in colica cum ardore corporis quasi febrili juncta, seu in colica putata biliosa.

℞. ▽ *sem. anisi.*

*flor. cham. à ʒij.*

*cinnam. ʒj.*

~ *zedoar. ʒʒ.*

*Qi dulc. ʒij.*

℞. *destillat. anisi, gutt. vj.*

*laud. opiat. gr. ij.*

*syrup. rad. enul. ʒj.*

M. F. Potio, haurienda cochleatim.

In colica convulsiva, qualis est scorbutica, hypochondriaca, hysterica, &c.

℞. ▽ *fl. chamom.*

*mentha*

*puleg. vel veron. à ʒj.*

*ess. castorei ʒij. vel iij.*

*liq. CC. succ. vel hujus loco ~*

*\*ci ʒj. vel ʒʒ.*

*laud. opiat. gr. iij. (vel ess. opii ʒj. ad ʒʒ.)*

*syrup. artemis. vel cort. aurant. ʒvj. vel ʒj.*

M. f. Potio.

Capiatur cochleatim pro 2. vel 3. dosibus, expectetur, si possibile, blandus sudor.

℞. ▽ *chamomill.*

*fl. sambuc. à ʒʒ.*

*ess. castor. ʒʒ.*

*unic. veri prap. ʒj.*

*maxill. lucii piscis ʒʒ.*

*volat. C. C. gr. vj.*

*syrupi artemis. ʒij. M.*

℞. *lapill. ʒ prap. ʒʒ.*

*volat. C. C. gr. xij.*

*laud. hyster. gr. jx.*

M. pro 2 dosibus: S.

Schmerzstillende Pulver.

℞. *unicorn. veri prap.*

*cinnab. ʒij*

*fl. ʒis à gr. viij. ad ʒʒ.*

*laud. opiat. gr. ij.*

M. F. Pulvis.

Contra colicas humorosas:

℞. ℞. *destillat. carvi,*

*cumini,*

*angelica l. anisi*

*aurant.*

*chamom. l. fenic. ʒ gutt.*

*vj.*

M. D. S.

Del gegen das Reißen.

℞. ℞. *jam prescripta:*

*adde*

*sacchari albiss.*

*fl. ʒis à ʒij.*

*maxill. lucii pisc. ʒj.*

*laud. opiat. gr. vj. ad ʒʒ.*

Pulver gegen das Reißen auff etliche mal.

Quod si cum ardore, aut caloris vel æstuationis sensu, affligunt tormina, nil melius est, quàm nitrata, imprimis ~ *Qi* dulcificatus effervescentem bilem optimè compescens. Si verò cum rigore vel dolore affligant tormina, talia, quæ absorbere & corrigere valent acidum, ut sunt *Si* alcalica fixa, item animalium ossa & partes duræ, speciatim maxillæ lucii piscis, lapilli ʒ, vel unicornu præparatum, vel tali leporis, aliaque similia acidum absorbentia, & hinc dolorem compescencia supra dictis addi possunt.

Dolor lumbaris nephriticus optimè per thebinthinata, per pilulas ex terebinthina, &c. compescitur, quæ ipsa etiam in dolore lumbari mesenterico conuenienter usurpantur.

Ut in specie considerentur remedia interna: chamomilla, tam vulgaris quàm Romana, corrigendo acidum austerum ventriculi & intestinorum, egregia & instar omnium in torminibus alvi quibuscunque est, aliis irritis me nunquam deseruit, cujuscunque sint conditionis colicæ, ita, ut decoctum florum chamomillæ vulgaris in ▽ communi vel cerevisia paratum, calidè haustum, sæpius reiteratum, & quæcunque ex eadem parata, mirabile sint remedium; hinc & ▽ & decoctum ejus cum ▽ communi specificè commendatur à Gabelchovero c. 1. *Cur. 10.* siue solitariè siue additis corticibus citri & aurantium propinetur. In muliere, colicâ convulsivâ per ▽ & pertinacissimè laborante, opiatibus & appropriatis frustratis solo hujus in cerevisia decocti usu repetito eandem curatam observavi. In specie ℞ ejus sapphyrinum ad aliquot guttas haustum, est præsentissimum carminativum & anodynum, unde fibrarum contracturis blando suo contactu medetur. Porro hormonum istud odoratum, quod vocatur sclarea, miraculosum quid facit in colica virorum, tam convulsiva,

siva, quàm humorosa & flatulenta, uti & in suffocatione mulierum hysterica, sive decoctum ejus, sive exinde parata essentia, aut per fermentationem paratus & aliquoties abstractus, in conveniente vehiculo usurpatur. Radix allii jam à Galeni temporibus laudatur; notum enim est exemplum de rustico, esu allii se curante, quod ex Galeno habet Schenckius in *observ.* & Zacutus Lusitanus de *Med. Princ. Histor. l. 2. Histor. 95.* hinc ad hujus imitationem commendatur jusculum ex allio & oleo olivarum, quæ calidè hauriantur cum parte dimidia vini optimi: & hanc mixturam ceu sæpius expertam commendat Borellus c. 4. *obs.* 92. Post hæc eminent cortices aurantiorum, in quibus non est vis vulgaris anticolica, maximè in humorosa & flatulenta ex acido austero, & certè essentia seu tinctura corticum aurantiorum cum eorum spiritu, vel imprimis cum spiritu chamomillæ Romanæ parata, aut extractum, aut saltem eorum pulvis usurpatus, & imprimis ꝑ destillatum, aut elæosaccharum ex hoc paratum, sunt egregia remedia in affectibus colicis: acidum enim quodcunque potenter corrigunt, flatulentias cohibent, nervisque ab acido vellicatis perquàm grati existunt. Pertinet huc pulvis Schalleri ad Colicam, quem quidam commendant. Compositio est hæc:

℞. Cortic. aurant. ʒjss.  
maxill. lucii pisc. præpar.  
infer. aurat.  
lapill. cancr. præp.  
sal. leporis.  
succin. præpar.  
zedoar. ʒij.

M. F. Pulvis pro aliquot dosibus.

Dosis à ʒss ad ʒij. l. ʒj. si fieri potest, in vehiculo tepido.

Meliorari potest hic pulvis additione florum sulphuris, & irroratione cum oleis carminantibus, v. g. ꝑ destillato corticum aurantiorum, item essentia opii.

Vel ℞. Rasur. eboris ʒij.  
corall. rubr. præp.  
lapill. ʒ. præp. ʒj. ʒ  
ʒ sigill. gr. xij.  
ꝑ destillat. cort. aur. gut. j.  
anisi,  
carvi,  
fenicul.  
zedoaria ʒ gut. j.

M. F. Pulvis pro 2. dosibus: S.

Schmerzstillend Pulver.

Helenium ejusque radix in vino decocta, item absinthium, radix Imperatoris, & similia acria aromatica, experta etiam sunt in colica, & postmodum absinthium convenit, imprimis iis, qui in peregrinationibus colica laborant, sive decoquatur, sive minutim dissectum cum saccharo misceatur & capiatur, &

in colica è februm reliquiis oborta nil melius esse usu absinthii, refert Fehr de *absinthio* pag. 173. ob id Mindererus in *medicina militari* contra colicam tanquam optimum euporiston commendat vinum decoctionis absinthii, vel radices helenii cum corticibus aurantiorum calidissimè potum, addito theriacæ vel Mithridatii pauco; quæ duo ob opium dolorem sistunt: item theriaca cum CC. assumpta, expectando sudorem: vel decoctum radicum enulæ cum essentia absinthii & spiritu theriacali egregium est experimentum, tollens intestinorum tormina ex vitio contentorum nata: quod etiam præstat extractum acori veri: semina 4. calida majora, aut elæosaccharum ex hoc paratum sunt egregia remedia in affectibus colicis in vino decocta, & rectè dicuntur ab Helmontio solamen pauperum appropriata intestinis, & affectibus flatulentis. Virtus & usus consistit in eo, quod nempe contractionem inhibendo, & aciditatem, nunc lymphaticam, nunc viscidam, intestinis hostilem corrigendo eorum spasmos, & inde ad tactum sensilem duritiem remitti faciunt, & sic quodvis acidum intestinorū irritatorum temperant & corrigunt: Conf. Helmontius in *Traët. de Flatibus* §. 75. Semina hæc decocta in vino generoso & hausta à Stœkero commendantur, unde & eorum destillata olea, non secus ac oleum destillatum zedoariæ, corticum aurantiorum, vel angelicæ, vel menthæ, vel macis, ad aliquot guttas propinata, sunt laudata in flatibus, torminibus & doloribus intestinorum, spiritus salis ammoniaci anisatus, castoreum, & omnia medicamenta ex eo, egregiè conferunt; non tantum in colica, ubi adsunt flatus, quos potenter discutit, aut ubi adest pituita viscida acida, quam temperat, sed etiam in colica convulsiva; non secus ac in suffocatione uterina, quæ reverà est colica convulsiva, item in doloribus scorbuticis convulsivis, egregium quoque est castoreum; sive perse, sive mistum cum aliis: in specie in colica convulsiva cum salibus volatilibus propinatur, cum sale volatili succini, cui si addatur unum vel alterum granum opii, fit egregium medicamentum. Dabo exemplum in colica convulsiva:

℞. Castor. ʒss.  
Sis volat. succin. ritè parati: gr. v.  
laud. opiat. gr. ʒss. vel ij.

M. F. Pulvis: S.

Schmerzstillend Pulver auff einmal.

Veteres castorei ʒj. ad ʒij. in haustu vini calidi propinarunt in pertinaciori colica, uti constat ex Joëlis *Praxi*, & Solenandri *Consiliis*, si colica sit orta, uti dicit Joël, à causa frigida; in aliis tamen etiam convenit: & Solenander commendat castoreum clysteribus additum: scilicet aliquot grana ejusdem in vino dissoluta, infunduntur cum clystere in coli-

colica: vid. ejus sect. 3. Consil. 28. Nos utimur castoreo cum R Qi acerr. vel etiam cum ~ Qu amm. vino sine essentia extracto, quæ sola 3ß. ad 3j. dosi, vel cum essentia opii sociata, optimè conducunt. Vel

R. R Qi acerr. 3ij.

ess. castor. 3ij.

M. S.

#### Resolvende Tinctur / 40. Tropfen.

Ipsa enim R Qi, cea prætentilimum remedium mirè extollitur ab Hauptmanno & Langio. Vel

R. Elixir. propr. sine acido.

R Qi acerr. a 3j.

M. S.

#### Resolvende Elixier.

R. R Qi acerr. 3ß.

ess. gumm. amm. 3ij.

myrrh. Q sat. 3ß.

M. D. S.

#### Resolvende Essentz 50. Tropfen.

R. ~ carminat. de tribus 3ij.

ess. castor. Q 3ß.

opii 3ß. ad 3j.

M. D. S.

#### Resolvende Mixtur Tropfenweise.

Dosis gutt. 50.

Pertinet huc decoctum B. D. D. Langii, & essentia anonyma ex castoreo & asa foetida cum V tartarifato parata; quæ essentia anonyma & in colica & in passionibus hysteris, i. e. colicis convulsivis, & in præcavendis variolis & morbillis, est egregia; item extractum castorei, vel cum laudano opiato, vel cum extracto theriacali, quod habet vim opiatam, mixtum, & cum oleo quodam destillato in pilulas anticolicas redactum, dicta tormina sedat.

Ex his ferè paratur Extractum specificum anticolicum Mynsichthii, quod dosi 3j. vel 3ß. ad 3j. in omni vehiculo commodè usurpari potest. Elegans est compositio, ut ut quædam adsint ingredientia non multi pretii. Flores sulphuris a 3ß. ad 3j. cum tantillo myrrhæ, præmissis præmittendis, in colica valdè profunt, propinanda commodè in vino vel alio vehiculo calido, probè corpus contegendo, & sanè expertissimum sunt remedium. Vidi Romæ egregium effectum in Comite, colica pertiniaci laborante, qui aliis irritis per 3ß. florum Qis fuit curatus. Vel permiscetur Q & ejus flores convenienter cum elæosaccharis carminativis, factis ex oleo destillato corticum aurantium, anisi, zedoariæ & similibus, quibus imprægnatur saccharum: v. g.

R. Flor. Qis 3j. ad 3ß.

Qo destillat. anisi

zedoar. a gutt. ij.

laudan opiat gr. i.

sacch. q. i.

M. F. Pulvis. S.

Tom. II.

Aromatum Qe volatili oleoso imprægnatorum vis anticolica per se nota est, v. g. zedoariæ, quæ est carminativum egregium, flatuum resolutivum, & quæ, præmissis præmittendis, tam in substantia, quam in R. & inde parato extracto, est nobilis; galangæ, quæ aliàs egregium est uterinum, cinamomi, gentianæ, caryophyllorum, nucis moschatæ, & hinc ex his paratæ species sic dictæ aromaticæ compositæ in dispensatoriis: nempe species diacumini, diacalaminthæ, dianisi, diagalangæ, diatrion pipereon, & tandem species diasulphuris Mynsichthii: item olea earum destillata ad aliquot guttas propinata, similiter egregiè commendantur, qualia sunt carvi, cumini, anisi, fœniculi, caryophyllorum, lauri, corticum aurantium, angelicæ, succini, macis, zedoariæ, menthæ; quod insigniter commendat Thonerus: cumque iis possunt fieri composita elæosacchara: Hinc Panarollus *Pentec. 2. obs. 8.* ceu sæpius expertum remedium ad colicam ex causa frigida commendat oleum baccarum lauri, aut oleum ex corticibus aurantium per expressionem paratum cum vino, quò bibitô ægri per breve tempus sedato dolore somnum capientes convalescerunt. Vino guajacino curatam colicam cum convulsionibus videbitis in Amato Lusitano *Cur. 32.* & M. A. N. C. *ann. 3. obs. 274.* Hisce non ultimo loco addendus ~ Qi dulcis, quibusdam nat' *égox* dictus anticolicus, est summum Hartmanni arcanum & ultimum refugium, quem ipse describit in *Praxi Chymiatricæ*; imprimis si ~ Qi benerectificatus cum duplo vel triplo V, à simplicibus aromaticis abstracti, seu cohobati misceatur. Hic spiritus anticolicus dosi 3ß. ad 3j. in vehiculo appropriato calido propinatus nobilissimum est remedium in colica flatulenta biliosa, ad eò ut etiam in tympanitide suum faciat egregiè officium, præsertim, ubi vagæ phlogoses aut æstuationes corpus affligunt, si expectetur blandus sudor; sic enim eò melius operatur. Vehiculum appropriatum est imprimis decoctum radicis helenii vel decoctum priapi tauri.

Modus præparandi est, si ~ dicti rectificati benè in quantitate pedetentim misceantur, misti in MB probè digerantur, digesti duabus vel 3. vicibus cohobentur, donec perfectissimè uniantur, & sic fit egregius ~ compositus Qi dulcis anticolicus, loco V vulgaris melius sumitur ~ appropriatus, v. g. ~ chamomillæ per fermentationem paratus, aut idem ~ infusus speciebus carminantibus digestus, & tandem in balneo aliquoties cohobatus; sic enim rapit secum particulas carminantium aromaticas, i. e. salinas volatiles oleosas per alembicum, & ita cum spiritu nitri junctus fit efficacior & melior.

Hisce annumeratur & ab Hartmanno  
(Y) com-



commendatur  $\sim$  terebinthinæ, &  $\circ$  ejus, quod abstergit egregiè intestina, hinc cum eo paratus balsamus sulphuris terebinthinatus præprimis est egregius in colica contumaci, etiam convulsiva, unde quidam commendant sequens oleum compositum ad colicam:

$\mathcal{R}$ .  $\circ$  f.  $\sim$  terebinth.

bacc. junip. a part. æqual.

Infundantur flores hyperici: digerantur per  $\mathcal{O}$ , exprimantur, & ita cum floribus novis pergatur, donec oleum rubicundissimum fiat.

Hujus dosi gutt. xij. xv. ad  $\mathfrak{z}$ j. in brodio sumptum est in colica humerosa expertissimum.

Spiritus carminativus ex nitro, tartaro &  $\sim$  vini est nobilissimus planè in torminib<sup>9</sup> abdominis. Datur probè rectificatus  $\mathfrak{z}$ ss. in quocunque vehiculo calido præstantissimo auxilio; in colica similiter commendantur.

Præterea testes equini exsiccati, pulverisati, & propinati ad  $\mathfrak{z}$ j. cum pulvere seminis anisi  $\mathfrak{z}$ ss. laudatissimum est experimentum Fosseæ anticolicum in l. 1. Consil. 57. qui pulvis testiculorum equinorum in  $\nabla$  liliorum convallium, addito parum croci, exhibitus excellens est experimentum contra colicam, polychrestum Zvvelfero.

Pudendum seu priapus tauri, sive ejus rasura, sive decoctum, experimento egregiè comprobatum est à Zacuto Lusitano l. 2. *Præcos admiranda obs.* 24. in colica convulsiva, quam, ut & dysenteriam, curat & præservat. Dosis ad  $\mathfrak{z}$ j. in vino Malvatico vel decocto helenii. Similiter commendat pudendum cervi Bartholinus *Cent.* 6. *Hist.* 50. Fuligo pulverisata & cum aceto destillato mista & bibita calidè, statim dolorem pellere dicitur. Similiter etiam  $\sim$   $\square$ olus fuliginis aliquando felici cum successu fuit propinatus; quæ remedia & in casu ab alto & passionibus hysteriis & pleuritide &c. egregiè conveniunt, dum acidum in hisce malis potenter corrigunt. Saccharum Saturni in colica à nimio acido remedium est singulare, si ad gr. iij. vel iv. cum aliis propinetur; in saccharo enim Saturni magna vis medica latet.

Denique stercora animalium sunt remedia aliis omnibus, si non anteferenda, saltem tamen æquiparanda. Hisce præ cæteris parabilibus remedium, licet sordidum, addatur stercus equinum recens, ab equo avena pasto, cujus succus cum liquore quocunque appropriato, in specie cerevisia calida, expressus & imbibitus, imperando, quantum possibile, quietem, & expectando sudorem, singulare & præsentaneum est experimentum contra colicas, imprimis convulsivam; vid. Riverius l. 10. habirâ tamen, si fieri potest, ratione sexus. Loco hujus stercus catti exsiccatum in aëre, in vino resolutum & edulcora-

tum, hinc percolatum, aliquando Magnatem aulicum restituit. Non cedit huic stercus lupinum, experientiâ confirmatum contra colicam ex quacunque causa natam, dosi  $\mathfrak{z}$ ss. ad  $\mathfrak{z}$ j. Vid. Panarollus, *Pentec.* 3. *obs.* 36. Hartmannus in *Praxi Chym.* pag. 184. item Forestus l. 21. *obs.* 15. in *Scholio* Amatus Lusitanus, *Cent.* 3. *Curat.* 12. item Riverius *cent.* 1. *obs.* 59. & 86. & tantum non apud omnes Autores in magnis laudibus versatur stercus lupi, præmisso clystere: hinc etiam  $\nabla$  destillata ex stercore bovis junioris ad  $\mathfrak{z}$ j. propinata laudatur. Sic succum stercoris columbini cum lacte expressum laudatum videbitis in Velschio, *Heracost.* 2. p. 32.

Si metus sit, quod in pariesin transeant tormina abdominis, clysmatis blandis alvus stimulanda est; internè verò  $\Theta$ ia volatilia, ut  $\Theta$  volatile  $\square$ x,  $\sim$   $\Theta$ is ammoniaci simplex & anisatus, liquor cornu cervi succinatus, in specie ex tartaro & spiritu tartari volatili propinata, expectato sudore sunt convenientissima, quia non tantum acidum, nervos velligans corrigunt, sed pariesin præcavent & curant, expectetur post usum eorum sudor, quo apparente, paroxysmus, si non planè, sensibilibiter tamè tollitur. Spiritus tartari volatilis legitime paratus, est excellens remedium pro curanda pariesi per sudorem.

Vel

$\mathcal{R}$ .  $\sim$   $\Theta$   $\mathfrak{x}$ c. anis.  $\mathfrak{z}$ j.

ess. laudan. opiat. Lancelotti.  $\mathfrak{z}$ j. M.D.S.  
**Schmerzstillende Mixture Tropfenweise.**

Pro dosi propinentur gutt. 24.

$\mathcal{R}$ .  $\sim$   $\Theta$   $\mathfrak{x}$ ci anis.

succinati a  $\mathfrak{z}$ j. M.D.S.

**Schmerzstillender Spiritus.**

Si ab errore externo fortè dolor colicus ortus fuerit, possunt internè præscribi absorbentia, laxativa & opiatia mista: e. g. utilis erit sequens pulvis:

$\mathcal{R}$ . lap.  $\mathfrak{S}$  præp.  $\mathfrak{z}$ j.

scamm.  $\mathfrak{L}$ at. gr. iij.

laudan. hister. gr. iv. (vel laudan. opiat. gr. i. vel ij.)

$\circ$ , destillat. cortic. aurant. gutt. ij.

M. f. pulvis pro una vice.

Dentur 3. doses.

Capiantur in vehiculo calido.

Grana integra piperis cum spiritu vini propinata in colica post crapulam, vel cerevisiæ vitio, præcedente frigore contractam, commendat Hoffmannus de *Medicamentis officialibus*: cruditates enim acidas piper optimè destruit.

Dolorem lumbarem nephriticum optimè curat terebinthina, & omnia medicamenta ex ea parata, ut balsamus sulphuris terebinthinatus, quæ etiam sunt optima in dolore mesenterico,

Dolor,

Dolor, qui cum frigore affligit, optimè curatur additis appropriatis oleis destillatis aromatum, ut aurantiorum, &c. In æstu ad-  
dantur nitrata, maximè ~Di dulcis anti-  
colicus.

Inter externa, quæ applicantur abdomini, ad compescendos dolores colicos & iliacos, eorumque spasmos & convulsivos motus, eminent ex supra laudatis simplicibus desumpta olea cocta & destillata, ut o. anethi, chamomillæ, rutæ, amygdalarum dulcium, laurinum, o. destillatum baccarum lauri, juniperi, corticum aurantiorum, macis; & omnia, quæ intus sumuntur: e. g.

℞. o. anethi per coct.

chamom. a ʒij.

destillat. chamom. ʒj.

anisi,

carvi,

cumini,

fanic. vel xedoar. a gutt. vj.

addatur

Corporis pro Balsamo q. s. pro lubitu

M. S.

Neusserlicher Balsam.

℞. o. anethi

chamom. a ʒij. l. ij.

destillat. cham. vel mentha ʒʒ.

angel.

cumin.

ruta a ʒʒ.

M. S. Zertheilendes Del.

Vel cum o. nucis expresse Balsamus;  
vel cum Tacamahaca emplastrum.

Item in colica convulsiva:

℞. & destillat. succini. ʒij.

spica ʒʒ. vel a p. æqu.

M. S. Neusserlich Del gegen das Reißen.

Illinantur largiter regioni abdominis, in specie umbilicali, & fovendo desuper latere calefacto.

Oleum quoque corticum aurantiorum cum o. destillato angelicæ vel anisi sociatum, & umbilico illitum, in colica convenit:

Vel ℞. o. laurini ʒʒ.

castor. pulveris. vel ejusd. o. ei ʒj.

M. f. Linimentum.

quod umbilico inunctum non est inconve-  
niens, imponendo laterem calefactum.

℞. o. laurini.

anethi.

chamom. a ʒʒ.

galbani Paracelsi. ʒj.

destillati succini. ʒʒ.

carvi,

cumini,

faniculi, a ʒʒ.

M. f. Linimentum.

Paracelsus feliciter utitur zibetho; vel zibethum umbilico inunctum cum oleo nucis moschatæ, addendo parum olei destillati

Tom. II.

macis, egregiè convenit. Loco hujus Balsamus zibethi Mynsichthii in *Armament. p. 79.* egregiè commendatur; vel balsamum apoplecticum, quod zibethum ingreditur, umbilico illinatur, & desuper locus foveatur: pinguedo cati silvestris, uti in epilepsia interna est nobile, ita in doloribus convulsivis abdominis est egregium: sumitur asservata & depurata, & illinitur probè regioni umbilicali. Jubent quidam differentiam sexus observare, sed tamen non adeò necessarium est. Quibus placet zibethum addere, remedium magis efficax habent.

Horum loco excellit contra omnia tormina abdominis galbanum, in specie in convulsiva colica atrocior; umbilico applicatum, sive galbanum in forma emplastri sit malaxatum cum oleo succini vel spicæ, vel alio appropriato, vel balsamus Peruvianus externè abdomini instilletur, vel emplastrum matricale de galbano malaxatum cum o. destillato succini, quod optimum est ad spasmus convulsivum, regioni umbilicali applicetur:

Vel ℞. Galb. in V non rectif. soluti ʒij.

o. chamom.

rutacæ a ʒʒ.

crocigr. vj.

M. f. Linimentum: S.

Salblein gegen das Reißen.

Vel Galbanum simpliciter lento Δe liquefactum, cum part. ij. o. succini, & part. j. olei spicæ malaxatum, inducatur alutæ, & applicetur; quod optimum est galbanetum Paracelsi, de quo vid. Schræderus, ubi de Galbano, Sennertus de Colica, & Hartmannus in *Praxi Chymiatr.*

Interim hujus defectu & o. destillatum succini vel solitarium, vel partes ij. cum o. ei spicæ parte j. mistæ, commodè contra dictos dolores umbilico illiniri possunt.

Horum loco o. saponis commodè adhiberi potest, quod egregium in his affectibus est ob penetrantiam alcalinam, quæ destruitur acidum: nempe destillatur sapo cum calce viva, vel cum cineribus ossium calcinatorum, ut destruaturs ejus acidum, per Oxam: cujus o. ei gutt. ij. vel jv. umbilico illinuntur, pro cura colicæ torminosæ. Vel dissolvatur sapo in V ad mellaginem: massa cum a calceis vivæ destilletur, & cohobetur aliquoties. His addatur o. petreæ album, quod multum in recessu habet; quod non tantum abdomini illitum, sed & regioni lumbari, in specie in doloribus lumbaribus, nephriticis & mesentericis, est egregium sistens & compescens dolorem.

Emplastro denique ex gummate tacamahacæ, vel solo vel cum emplastro de meliloto mixto, & cum oleo chamomillæ vel aliis carminantibus malaxatum; vel Tacamahaca cum Balsamo Peruviano malaxata & imposita, est bona: Vel,

(Y 2)

℞. Gal-

℞. *Galban.*  
*tacamah.* aa. part. jß.  
*Bals. Peruv.* part. j.  
 F. l. a Emplastrum. S.  
**Gertheilend Pflaster.**

Aliàs usitatum etiam est emplastrum ex bac-  
 cis lauri, uti & emplastrum carminativum Syl-  
 vii cum emplastro nicotianæ mixtum. Stercus  
 suillum cataplasmatibus instar calidè applica-  
 tum, laudatur à Rulando; cataplasma verò ex  
 stercore equino cum oleo rutaceo, experi-  
 mentum est Joëlis & Amati Lusitani.

Tandem sacculi & fomenta in ∇ & vino  
 aut lacte cocta in dolore abdominis scorbuti-  
 co, calidè applicata abdomini conveniunt, v. g.

℞. *summ. hyoscyami*  
*flor. sambuci* a mij.  
*chamom.* mij. ad iv.  
*bacc. junip. rec.* jß. ad jij.

Includantur sacculo, probè interpassato,  
 qui vino calido, aut lacti vaccino vel caprillo  
 immersus aut ebullitus, cum linteis multipli-  
 catis calidè abdomini applicatur, & sæpius rei-  
 teratur; maximè enim egregium est in colica  
 scorbutica.

℞. *fol. lauri*  
*ruta* aa mij.  
*summit. anethi*

*summit. cent. min.*  
*flor. cham. Rom.*  
*sambuc.* a nß.  
*rad. angel.*

*levistici* a jij.  
*bacc. lauri* j.

*juniperi* jß.

*sem. 4. calid. maj.* a jij.

Concis. & contus. coq. in vino, in vase  
 clauso: D. S.

**Neusserliche Bähung.**

Huc pertinet sacculus avenaceus calidè ap-  
 plicatus:

℞. *Avena* part. ij.  
*bacc. junip.*  
*sem. coriandri.* a part. j.

Contula misc. includantur sacculo.

Item sacculus ex milio calidè abdomini ap-  
 plicatus, egregiè conducit. Catellus Meli-  
 tensis colicā afflictis appositus, anodynus est:  
 Lapis nephriticus amuleti instar appensus mi-  
 rificè contra colicam laudatur.

Extra paroxysmum Martialia profunt: ma-  
 ne nempe datur solutio ōis cum succo pomo-  
 rum, vel in robustioribus liquor ōis Ōaris, &  
 vesperi ~ Ōis ammoniaci anisatus. Profunt  
 etiam diuretica cum carminativis mixta: vid.  
 Willisius de anima brut. p. 397.

## S E C T I O XII.

DE

### SITU INTESTINORUM MUTATO.

**V**ritè fiat contentorum in inte-  
 stinis distributio, & conveniens  
 excrementorum egestio, necesse  
 est, ut hæc debitum observent si-  
 tum; qui est ut naturaliter interiùs colligan-  
 tur à mesenterio, utpotè cui connexa sunt, si-  
 mulque vertebriis lumborum, imprimis supe-  
 rioribus, suspendantur & annectantur; exte-  
 riùs verò eadem ritè à peritonæo, tanquam in  
 bursa, contineantur. Quod si verò mutetur  
 hic intestinorum situs ex loco tali naturali in  
 alium, fieri nequit hoc sine insigni tumore, qui  
 tumor ab intestinis, extra locum proprium  
 prolapsis, communiter hernia dicitur.

#### CAPUT I.

De

#### Herniis.

**H**ernia Germanis *ein Bruch*; Græcis *κῆλη*,  
 vocatur.

Fit hoc, quando bursa peritonæi in quo-  
 dam loco aut rumpitur aut relaxatur, tunc  
 per laxatum aut ruptum peritonæi locum in-  
 testina elabuntur, & ita herniam inferunt. In-  
 testinis his, uti notum est, tanquam linteum  
 vel indusium superstratum est omentum, si-  
 militer ubi intestina à peritonæo collecta hoc  
 ipsum simili ratione, aut cum intestinis, aut

absque iis rupto aut laxato peritonæo, decide-  
 re potest; unde vel *ἐπιπλοκήλη*, vel *ἐπιπλο-  
 τερσικήλη* oritur.

Definitur, quod sit prolapsus aut intestino-  
 rum tenuium, aut omenti, ex limitibus peri-  
 tonæi, dependens aut à vulnere, aut à laxa-  
 tione.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta partim est peritonæum, quod  
 variis in locis læditur, partim sunt intestina &  
 omentum, quando situm suum mutant; unde  
 peritonæum aut plane rumpitur, aut dilatatur:  
 Intestina ergò saltem tenuia, jejunum ileon,  
 unà cum suprà instrato omento in hernia ita  
 prolabi possunt; crassa enim, quia nimis fir-  
 miter connectuntur, immobiles sunt.

Loca, in quibus ordinariò laxatur: aut peri-  
 tonæum rumpitur, sunt varia: frequentissimè  
 hoc fit in ejusdem processibus circa inguina,  
 per quos in scrotum descendunt vasa sperma-  
 tica, ibique convolvuntur testes: & postea  
 est umbilicus. Unde etiam ratione partis  
 affectæ hæc duæ sunt primariæ herniarum  
 species: nempe enterocoele seu hernia  
 scrotalis aut inguinalis, dum omentum  
 vel intestina per processum peritonæi ad  
 inguina & scrotum descendunt: & ompha-  
 locoele seu hernia umbilicalis, quando inte-  
 stina



stina vel omentum per partem peritonæi, cingentem vasa umbilicalia post partum præcisa, laxant & dilatant, ita, ut hæc peritonæi pars extendatur circa cicatricem dictam umbilicum, ad quem modum accidit hernia umbilicalis & omphalocele.

Hernia scrotalis est vel perfecta seu completa, vel imperfecta seu incompleta: Imperfecta est hernia inguinalis seu bubonocèle, quando saltem in inguinibus seu regione bubonum est tantum tumor ab intestinis prolapsis, & super osse pubis hærentibus: quæ si successivè ulterius descendant in scrotum, est hernia scrotalis perfecta. Istud verò, quod per peritonæum læsum prorumpit, est vel omentum, vel intestinum, vel intestina nunc conjunctim, nunc separatim. Quod si descendat solum omentum in scrotum, est epiplocele: si verò tam intestina sola, quod raro fit, quàm omentum, per peritonæum ruptum, dicitur enterocèle.

Hæc duo loca, umbilicus & processus peritonæi, sunt ferè, per quæ ordinariò & frequenter fiunt herniæ; non autem sunt sola; nam etiam in aliis locis abdominis peritonæum læsum ruptum aut laxatum dat hernias, observante hoc primùm Barbette in sua *chirurgia* P. 1. c. 71. quæ, quia rariores, ab imperitis chirurgis tanquam abscessus tractari solent, non citra periculum ægri. Refert etiam citato loco exemplum herniæ, ubi per processus peritonæi laxatos & ruptos facta sit hernia, ubi intestina non in scrotum delapsa, sed juxta scrotum parti musculosæ femoris infederint, & ita juxta scrotum ingentem tumorem ex laxata cutè induxerint: Idem Barbette observat rupturam peritonæi juxta spinam dorsæ, & ibidem ex intestinis prolapsis factam herniam: sic etiam Bartholinus *cent. 2. hist. 95.* observat talem herniam supra regionem umbilicalem, mox infra cartilaginem ensiformem ex ruptura peritonæi, quæ est similiter singularis: Sic ex utero rupto intestina prolapsa observat Schenckius l. 4. *Observat. p. 650.* Simile exemplum Nanzelius *habet in anal. microscopi & macroscopi p. 705.* de descensu intestinorum in capacitatem uteri, ex rupta uterice vice, quæ etiam loco secundinæ ab imperito chirurgo fuerunt extracta. Observandum tamen hic est, ne præternaturalis testiculi situs falsò habeatur pro hernia: Nam interdum testiculorum alter non semper in scroto hæret, sed ossi pubis incumbit; sicut interdum planè intra abdomen retrahitur, & tumorem infert. Non ergò iste tumor ex testiculo confundatur cum bubonocèle vel abscessu istius loci, de quo Schenckius in *Observ. p. 541.*

#### C A U S A.

Causa herniarum proxima latet in ruptura aut laxatione peritonæi: hinc omnia, quæ

quocunque modo aut rumpere, aut successivè laxare aut dilatare possunt quodam in loco peritonæum, induunt naturam causarum remotarum. Ruptura in omphalocele aut aliis speciebus est frequentior, in scrotali verò est rarior, quoniam rupto processu peritonæi intra musculorum confinia intestina subsistunt, & ita saltem inguinalem herniam faciunt, cum eadem successivè per dilatatum peritonæum, tanquam per demonstrata vestigia faciliè in scrotum descendant. Hinc tales causæ internæ sunt paucæ & raræ, interdum subest character hæreditarius, ita, ut herniosi parentes herniosos generent fœtus. Aliquot exempla videbitis in Hildano *cent. 6. observ. 73.* Fiunt etiam interdum herniæ intestinales ex nimia & violenta purgatione, teste Platero in *Observat.* Ætas quoque infantilis & puerilis ob peritonæi teneritudinem hic confert aliquid: Herniam etiam à primo ortu refert Hildanus, & Scultetus *observ. 60. P. 2. armam. chirurg.* Congenitam umbilici herniam ex matris repentina imaginationis impressione meminit. Ut plurimum causæ externæ hernias inferunt, ut sunt motus & saltus nimius; sic v. g. distensio quædam femoris causa fuit herniæ inguinalis, & consequenter scrotalis, apud Job von Meckern l. 66. p. 297. Similiter idem observavit herniæ inguine augmentum ex vomitu p. 282. Hernias etiam infert clamor nimius, unde ratione continui clamoris infantes facillimè fiunt herniosi; item fortior sternutatio, tussis nimia, &c. vid. Schenckius: item nimium ponderosa bajulatio, equitatio, saltatio, &c. Platerus refert ex impetutauri cornubus factam herniam l. 3 p. 712. difficiles partus subinde hernias, imprimis omphalocelen, seu herniam umbilicalem, inducunt.

#### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica: In omni hernia adest tumor præternaturalis: interim tamen tumori soli non est fidendum. Itaque cauti sumus in cognoscendis herniis, nè decipiamur, & tumorem ex præternaturali situ, similesque hernias putemus; si enim tumor præternaturalis adsit, & in scroto nullus testiculus, tumor non dependet ab hernia: Sic *observ. 55.* refert Marchette p. 104. villicum quendam, bubonocèle laborantem, accessisse barbitonsorem, qui bubonocelen ratus est bubonem Veneream: quapropter sectionem administravit, quâ factâ, stercus loco puris emanavit. Itaque præter tumorem notetur in diagnosi: tumorem herniosum nunc incrementum, nunc decrementum pati, nonnunquam etiam planè aboleri.

Alias hernia incipiens faciliè cognosci potest: nempe tumor, ubicunque locorum sit, mollis, ferè indolens apparet: dum æger in dorso jacet, intestina & omentum prolapsa spontè

in cavitatem abdominis recedunt, & tumor totus ut plurimum disparet: Imò resupinato ægro, ac elevatis nonnihil cruribus & natibus, interdum cum murmure intra abdomen relabuntur; erecto verò ægro tumor talis redit, accrescit & protuberat, estque ut plurimum sine dolore, nisi aut intestina inflammata, aut flatibus aut stercore indurato repleta, aut in angustiore foramine inclusa, irritationis & doloris occasionem subministrant.

Jubendus etiam æger, ut tussiat; hoc etenim facto, quando aliquid in scrotum descendit, crepitum observamus.

Præterea omentum & intestina semper digitis possunt repelli, nisi aut flatus, aut excrementa indurata id impendant.

Hernia confirmata iisdem cognoscitur signis, in specie, si successivè magis magisque incrementum capiat: item, si causæ præcedentes potuerint eandem inferre. Vid. Sennertus.

Factam herniam quod attinet: est malum sine periculo, si reponitur; si verò non, sed in loco rupto vel laxato hærent intestina, tunc periculum est non leve.

### PROGNOSIS.

In prognosi, quò diuturnior, & quò major vel minor, eò etiam periculosior aut levior est hernia. Mulieres equidem solent pejus longè & periculosius laborare ex herniis, licet parvis & exilibus, quàm mares, vid. *Pharos Med. p. 404*.

Confirmata est curatu difficilis, præsertim in adultis, in quibus rarissimè absque chirurgica operatione curari possunt: in tenella infantum ætate facilius succedit negotium.

Si ex hernia superveniat vomitus, non adeò desperatus est, quàm si ex aliis causis: vid. *M.A.N.C. ann. 6 & 7. observ. 44*. Sennertus in *Praxi, ubi de oleo p. 248*. Bina sunt pericula, quæ ex herniis ingruunt: nempe colica & morbus iliacus, occasione intestinorum irritatorum in loco prolapsus; Sive irritentur à causa externa, frigore, contusione, &c. Sive à causa interna, retentis fecibus, flatibus, &c. Deinde fit interdum, ut intestina prolapsa inflammantur, & inflammata gangrænam concipiant, & sic æger moriatur: quale exemplum habet Hildanus ex epiplocele demortui, *observ. 72. cent. 1*. Si herniis subito factis, & exaggeratis gravi dolore, singultus superveniat, aut ileos, paucissimi evadunt: Tulpius saltem *l. 3. observ. 13*, contrarium habet exemplum de hernioso vomitu stercoreo seu ileo, qui evasit; Nam si intereunt ægri, aut ileo, aut intestinorum inflammationum gangræna moriuntur.

Rarum est, quod intestina prolapsa & inflammata suppurentur, & suppurata extrorsum versus aperiantur, ita ut sterces, & interdum ipsa assumpta alimenta per aperturam pro-

deant: de quo Hildanus in *Observat.* item Job van Meeckern.

### C U R A.

In cura omnis herniæ tres scopi sunt attendendi:

1. Ut reponantur intestina & omentum prolapsum in situm naturalem.
2. Ut reposita intestina in situ naturali firmentur, ne denuo excidant.
3. Ut peritonæum ruptum aut laxatum consolidetur, quod in senibus aut ætuosis difficile, in junioribus & sedentariis faciliè debitis subligaculis partem affectam comprimendo.

Pro scopis meliùs obtinendis observandum:

I. Clysterum usus non negligendus, quando flatus vel murmura intestina crassa occupant, vel alvus contumacior est, & symptomata gravia ægrum torquent: Conferatur Hildanus *cent. 6. observ. 73*. sic enim intestina crassa absterguntur & faciliùs ex intestinis tenuibus in eadem derivantur excrementa, & sic removentur impedimenta. Purgantia autem exulent.

II. In hernia intestinali cordatus Medicus semper flatuum rationem habeat, & proinde nobiliorum carminantium & præcipitantium usum quàm sedulò observet, cum talium causa & inde producti flatus mirè exasperent hernias.

III. Herniæ à frigore, præsertim subitaneo, solent fieri lethales: irritata nempe intestina dolorem, hinc spasmum & duritiem concipiunt, quos insequitur ileos: vid. Velschius in *hecatost. 2. p. 6*. item *M.A.N.C. ann. 8. observ. 93. p. 154*. Ira quoque sedulò fugienda est: testatur D. Michaëlis, duas mulieres herniosas ex ira in iliacam passionem & mortem incidisse.

IV. Cautiones in repositione manuali observandæ sunt, quas imprimis suggerit Panarollus in *reposit. & cura herniarum Pentec. 5. observ. 49*, quæ omnes per quàm sunt laudabiles, exceptâ secundâ, ubi frigida intrâ & extrâ commendat, quin tepida, aut subcalida usurpanda sint.

Conf. quoad herniarum curas Hildan. loco superius citato, Scultet. in *arm. chirurg. tab. 39*.

Ut E. reponantur intestina prolapsa, hæc ipsa conveniente corporis situ resupinato, quod primariò intelligendum est de hernia umbilicali & inguinali; secundariò etiam de reliquis, cruribus, & natibus nonnihil elevatis, ut intestina naturali quodam impetu per locum naturalem retrocedant, adjuvanda est aut si spontè retrocedere nolunt intestina prolapsa, comprehendantur linetolo calido manu sinistrâ, dextrâ verò, & quidem digito indice & pollice, inuncto oleo *Ætis Rulandi*, per rupturam intrudantur. Notetur

nam tamen, non proficuum esse, sæpius intestina prolapsa manibus palpitare; siquidem hoc modo & dolor & hernia augetur: simul autem impedimenta, flatu imprimis, stercora, & hinc intestinorum ad tactum induratio removenda. Induratio hæc intestinorum non præcisè est à fecibus induratis, quales vix reperiuntur in intestinis tenuibus, quæ solummodò procidere solent, sed potius ex membranarum tensione & spasmodico intestinorum affectu. Ergo irritatio ista, duritiei occasio, blandis fomentis externis resolvenda, internis aromaticis carminantibus, intestinis anicis, & tensionem tensumque eorum & flatuum genesin impediens sustenda: de quibus in *Colica*.

Pro dictis igitur impedimentis removendis internè conveniunt 4. semina calida majora, quocunque modo sumpta, speciatim probè contusa in vino vale clauso ebullita, & calidè pota, addendo interdum parum lapillorum & præpar. de quibus vid. Helmontius *tract. de flatibus*; externè verò fomenta, unguenta, cataplasmata anodyna, carminantia & blandè emollientia. Usurpanda sunt emollientia in induratis fecibus & intestinis; discutientia in flatuum præsentia; anodyna in irritationis molestæ plus minus dolorosæ, & hinc duritiei urgentia. Ingredientia per se patent: Vegetabilia carminantia cum lacte coquuntur, & vel in forma cataplasmatum, vel lac decoctionis cum linteis multiplicatis tepidè hernioso loco imponendum:

℞. Flor. chamom.  
meliss.  
sambuc.  
verbasc. aa M. ℞.  
Rad. Angel. 3℞.  
Sem. fenugrac. 3vj.  
f. l. a. Decoctum c. f. q. lactis.  
D. S.

#### Neusserlich lindernder Umschlag.

Intestina si sunt refrigerata, foveantur linteolis calidis. Riverius applicat Vinstar fomenti calidè, & sic restituit herniosos: vid. *cent. 3. observ. 82*. Aliàs imponuntur intestina & omenta calida animalium, v. g. canis, vervecis, vituli, in specie omentum agni castrati tepidè admotum commendatur: Vel

℞. 3. insol. chamom.  
Lis Ruland. aa 3℞,  
destill. anethi.  
chamom. aa gutt. viij.  
M. D. S.

#### Neusserlich linderndes und zertheilendes Del.

Item litus blandus cum oleo amygdalarum dulcium, hyperici, chamomillæ, liliorum alborum tepido: interdum fons ex lixivio acri, semine cumini & paucio vino malvatico, filo crudo exceptis, admovetur. Solenander *S. 4. consil. 13*. ceu expertissimum commendat

contra intestina prolapsa stercus ovillum dulci lactibubulo vel caprillo incoctum: Colatura in forma fons, remanentia verò blandi cataplasmatum scroto calidè & crebrius post sufficientem fomentationem imponendum, donec intestina tractabilia fiant: Fidem facio, me aliquoties isto fons, cum res videretur in præcipiti esse, prolapsa intestina reposuisse, antea frustra tentatis aliis, addendo temper V aliquam portionem; partim enim emollic, partim dolorem sedat, partim discutit: conf. Hildanus *c. 6. observ. 2. & 70*. Simul clysmata emollientia & carminantia injiciantur, ut evacuatis intestinis crassis, recto & colo, facilius intestinorum tenuium, quippe quæ in herniis prolabantur, contenta, vel flatulenta vel humorosa, eò pergere possint, insimulque intestina leviter irritentur, & liberent se à fecibus: deinceps exinanito recto & colo, paratur quoque spatium vacuum intestinis reponendis.

Exemplum clysteris emollientis esto hoc:

℞. Herb. atriplic.  
malva,  
parietar.  
flor. samb. aa. M. j.  
rad. alth.  
lil. alb. aa 3vj.  
sem. anisi,  
lini aa 3℞.  
Coqu. in f. q. furæ carnis vitul.  
Colatura 3x. adde  
Terebinth. c. vitell. ovi solut.  
Mell. Zial. 3j℞.  
M. f. Clysm. S.  
Erweichend Clyster.

Si verò nimium diu prolapsa tuerint intestina, ita ut jamjam inflammationem susceperint, instituat curatio modò præscripta in ileo.

Præter dicta quæ applicantur intestinis prolapsis, sive in scrotum, sive umbilicum, conveniens est, regioni lumbari, ubi nempe mediante mesenterio appenduntur intestina, quædam applicentur, quæ nervos ad mesenterium delatos firmant & restaurant, & sic mediantibus his intestina prolapsa quasi retrahantur; quæ inter eminet emplastrum, Hoffmanni in *M. M.* cujus descriptionem vobis communicabo:

℞. Gum. xci  
galban.  
sagapen. aa 3ij.  
Terebinth.  
Cera Virg. aa 3vj.  
Magnet. arsenical. 3ij. gr. xv.  
Rad. ari 3j.

Gummata solvantur in f. q. ✱, & coqu. in formam emplastri, intermistis postea reliquis speciebus.

Extendatur emplastrum super alutam, quod dorso & lumbis applicatum, intestina valido tractu in locum naturalem redire facit.

Aliàs



Aliàs etiam hujus loco pinguedo urfina, quæ quibusdam tanquam secretum & lumbis illita ad retrahenda intestina, item, quæ adhuc mollior est, pinguedo erinacea commodè applicari potest: loco hujus pinguedo leporis dorso vel lumbis illita, & hinc exuvie serpentum superimpositæ, admodum retrahunt, & intestina retenta firmant: Aut talia si non sufficiant, subinde ad chirurgiam accedendum est, & apertione loci herniosi intestina reponenda, ipseque locus consolidandus, qua facillimè interdum sine remediis curari possunt herniæ.

Ut verò reposita intestina in loco firmantur, idque per peritonæi, vel laxati vel rupti, quantum possibile, consolidationem, præter corporis quietem summè necessariam, internè conveniunt omnia remedia vulneraria, & ex his parati pulveres, potiones aut essentia traumaticæ eaque semper carminantibus temperata: sicuti senior quidam herniosus, qui etiam pedifragium passus, per aliquot septimanas quiete & vulnerariis usus, herniâ curatus fuit: vid. etiam Hildanus *cent. 5. observ. 54.* Similiter vulneraria inter eminent perfoliata: refert enim Solenander *loco supra citato* de quodam, perfoliatæ usu ab hernia curato. Deinde symphytum majus, & omnes reliquæ consolidarum species, herniaria, quæ est laudatissima Hollerii planta, ab eo quocunque modo ad herniarum curam commendatur, si ve decoquatur, si ve pulvis assumatur, aut quocunque modo usurpetur: sicut herniæ quamplurimæ curatæ referuntur in Velschii *Mictom. cent. 3. observ. 76.* pulvere cochlearum, quarum loco cancerorum lapilli substitui possunt, & seminis perfoliatæ ʒj. rad. ireos ʒß. mistis cum trag. aromat. ʒiij. loco hernioso pinguedine anserina inuncto, & linteis, mastiche & thure suffitis, suppositis. De usu quoque perfoliatæ & consolidæ Saracenicæ cum axungia gallinæ, melle, & butyro majali egregio, vid. in *M.A.N.C. ann. 3. observ. 306. 341.*

℞. *Herb. herniar.*  
*perfoliat.*  
*flor. hyperic. aa. M. j.*  
*rad. symph. ʒij.*  
 Coqu. in l. q.  $\nabla$  *comm.*  
*Colatura ʒx. adde*  
*Syrup. de symph. Fern. ʒiij.*  
 M. D. S.

*Heilender Tranch.*

Vel ℞. *Herb. herniar.*  
*bistort.*  
*perfoliat. aa. M. ʒ.*  
*rad. sigill. Salom.*  
*symph. maj. aa. ʒß.*  
*sem. nasturt.*  
*hyperic. aa. ʒij.*  
 Incisis & contulis affunde  
*Vini rubri Mens. j.*

Stent per noctem in loco temperato, ne vinum acefcat.

Mane & vesperi deinceps hauriat æger ad ʒij. cum una vel altera cusp. cultelli *lap. ʒ.*

*preparator.*

Vel coqu. species prædictæ in s. q. *cerevis. secundar.*

℞. *Herb. alchimill.*  
*herniar. a M. j.*  
*rad. consol. maj. ʒj.*  
*sem. nasturt. ʒß.*

Coqv. in l. q. *vini.*

*Colatura ʒvii. d. -*

Deinde hic imprimis etiam vulnerariæ plantæ sunt in usu, quæ inter præstantissima sunt: millefolium, plantago, & geranium Rupertianum, bistorta, &c. sic semen nasturtii nulli cedit in hoc puncto, externè pariter & internè usurpatum: idque hoc ex fundamento, quod acrimonia sua caustica uberio-rem alimentorum affluxum excitet, quo ipso peritonæum eò facilius consolidatur. Est adhuc Medicus Polonus, qui pueros herniosos quamplurimos restituit propinando internè semen nasturtii in vino, si ve sub forma decocti vel potus, aut etiam cerevisiæ medicatæ; exteriùs verò applicando frustum pellis vel cutis anguillæ, oblitum cum albumine ovi: Idem sem. nasturtii commendat etiam insigniter Forestus *l. 27. observ. 15.* uti etiam Fonseca *l. 2. cons. 36.* qui tanquam expertam hanc describit herniarum curam hoc modo: scilicet *pulv. sem. nasturtii* subigit probè cum albumine ovi, extendit super alutam, & apponit ad herniam, neque removel, donec ex se decidat.

Vel ℞. *Herb. herniar.*  
*sem. anisi aa. ʒij.*  
*nasturt. ʒß.*

M. f. *pulvis grossus*, irrotandus cum *balsamo ʒi.*

Pertinet etiam huc *Ceratum Sciopii* ad hernias intestinales expertum similiter ex semine nasturtii. Descriptio sequens est optima:

℞. *G. carann. p. ij.*  
*sem. nasturt. p. j.*

Subigantur c. l. q. *terebinthina cocta*, & f. l. *a. Ceratum*, quod impositum, & diutius continuatum herniam intestinale breviter ferè sanat.

Sub usu tamen hujus emplastri alvus semper sit fluida, ne sub nimio conatu egerendi hernia aggravetur: maxime autem juvat, si sumatur singulis diebus manè & vesperi seminis nasturtii pulverisati cum vino rubro ʒj. per aliquot septimanas, & hanc curam tanquam expertam commendat Fonseca. Post semen nasturtii est & radix sigilli Salomonis, cujus decoctum in vino aliquandiu continuatum singulariter etiam à Foresto *l. 27. observ. 15.* ad herniarum curam commendatur. Paracellus folia betonicæ & faniculæ albæ decoxit in vi-

no,

no, & propinavit pro hernia curanda. Aquæ vulnerariæ dictæ, vina medicata vulneraria, item ex plantis dictis paratæ conservæ & essentiz, imprimis essentia herniariæ, symphytisive sanguis symphyti, flores hyperici, &c. crebrius usurpatæ conducunt. Item pulvis lumbricorum terrestrium, & ex his parata essentia, similiter convenit in hernia.

Externa igitur sint adstringentia vulneraria, loco rupturæ aut laxationis imponenda, eaque pro intentionis varietate multiplicia: v. g.

℞. *Pell. anguill. Sit. vel serpent. q. l. lixiv. fortiss. q. l.*

Coqu. ad consistentiam emplastri alutæ superinducendi. D. S.

### Bruch-Pflaster.

Sic decoctum pellis arietinæ ob viscositatem & lentorem cum aliis resinosis redactum in emplastrum, multa præstat: etiam succus herniariæ cum farina fabarum rupturæ applicatur, & à Fabro præ cæteris commendatur: Item exuvia serpentum confusæ, & ex his paratum emplastrum prodest: quidam suadent rupturæ applicandum, utut alii dicant, quod regioni dorsi admotum firmet intestina. Singulare quid obtinet & omnibus præfertur oleum lacertorum, cujus insignia encomia & usus videbitis in *Fonsæc. l. 2. Consil. 36.* & hinc *Zvvelffero in Pharmac. Reg. p. 266.*

De cætero subinde in usu sunt cerata multiplicia, composita ex pice navalis, cui tanquam corpori & basi additur mastix, thus, bdellium, gummi ammoniacum, caranna, terebinthina & similia: quibus etiam addi solent sanguis draconis, bolus Armena, crocus Martis adstringens, hæmatites, viscus quercinum, terra sigillata, vitrioli dulce &c. Magna quidem promissione, sed sæpius expectatione fallaci, prostant. Magnetem etiam quidam addunt: Si ergo magnes in similibus aliquid præstaret, hoc ratione particularum Martialium fieret. Emplastra talia videbis apud Hoffmannum in *Thef. Pharm. p. 69.* & apud *Zvvelffero*,

Mulier quædam medicastra plures herniosas curavit emplastro facto ex resina, pice, & lateribus coctis pulverisatis. Hæc diu probè permixta ac subacta crasse inducuntur super alutam, & ita applicantur. Illinatur quoque locus crebrò balsamo  $\Delta$ ris Rulandi, aut bals. sulph. hyperici.

Pertinet huc & emplastrum diasulphuris Rulandi, vel

℞. *empl. contra ruptur. usit. dia- $\Delta$ ris Rul. picis naval. liquef. à q. l.*

Malax. c. f. q. oleo ovor. aut hyperici, aut bals.  $\Delta$ ris: inducatur super alutam, herniæ applicandam. S.

### Bruch-Pflaster.

Applicetur, quàm calidissimè & ger perferre Tom. II.

potest, nec removeatur prius, quàm spontè decidat: ubi deciderit, balsamo  $\Delta$ ris, eodemque calido, pars probè inungatur, & iterum empl. recens imponatur, quandiu necessarium fuerit. Vel

℞. *empl. contra rupt.*

*detacamabac. a q. l.*

Malax c. oleo destill. succini l. hyperici inducatur super alutam.

Non inconueniens videtur mucilago radicis symphyti majoris, quæ instar cataplasmatiss imposita meritò à *Zvvelffero* extollitur: uti & ejus decoctum impositum henriis multum in recessu habet: quo etiam facit cataplasma mucilaginosum in *Pharm. Reg. p. 312.*

Præterea oleum mastichinum, myrtinum, hyperici, terebinthinæ & spicæ conveniunt: imprimis oleum vitellorum ovorum à quibusdam singulariter commendatur. Sunt quibus suspecta sunt hujusmodi externa pingua & oleosa, quia nimis laxent & ad maiorem peritonæi dilatationem occasionem suggerant: hinc non adeò inepto consilio jubent recipere acetum destillatum acerrimum, in quo lythargyrium solutum, cui ipsa lintea intincta repositis intestinis superimponantur, ac probè firmentur usque ad consolidationem: uti etiam quidam insigniter commendant emplastrum, quod fit ex gummi ceraforum nigrorum in oleo hyperici dissoluto, adjecto pulvere thuris & mastichis, donec fiat emplastrum seu ceratum loco affecto calidè applicandum pro consolidatione. Ballamus salis gemmæ commendatus est insigniter ab *Hartmanno in Praxi Chymiat. c. de Hern. p. 210.* Ejus descriptio est manca; primaria & genuina est hæc:

Dum  $\Delta$ ita præparatum, & ad fluorem redactum est, prout vult *Hartmannus*, affundatur ipsi ~ aut oleum terebinth. ad eminentiam trium digitorum: digerantur aliquandiu, hinc abstrahantur, cohobentur postmodum aliquoties, donec oleum terebinthinæ evadat rubicundissimum, quod oleum rubrum abstrahatur ad consistentiam aliqualem, donec scil. balsamus elegans in fundo remaneat.

Cæterum cum his ipsis externis necesse est, ut simul usurpentur debita subligacula, *Bruchbänder* / quibus subjici possunt emplastra.

Observetur hic sedulò: ut quotiescunque emplastra firmiter adhærere desinant, & novo opus sit, subligaculum non removeatur, nisi prius corpore posito ad situm superius laudatum. Nam utut per bimestre spatium emplastro usus sit patiens, tamen de novo instituenda erit curatio, si semel prolabantur iterum stanti & gro intestina. Subligaculorum talium ideam & descriptionem apud *Paræum in Script. Chirurgicis*, in *Hildani observat.* & *Job van Meeckern* videbitis.

(Z)

Curam

Curam herniæ magneticam videbitis in M. A. N. C. ann. 4. & 5. obs. 102.

## CAPUT II.

De

### Ani Procidentia.

**A**ni procidentia fit, quando sub fœcum excretionem intestinum rectum ita prominet & protruditur, ut non possit rursus spontè retrahi intra corpus, aut licet retrahatur, mox incipiat denuò prolabi. Fit autem hoc nunc cum, nunc sine dolore, vel cum vel sine inflammatione, nunc cum vel sine tumore, nunc cum nunc sine hæmorrhoidibus affectis.

#### PARS AFFECTA.

Jam autem naturale est, quod in omni alvi excretionem intestinum rectum aliquantisper protrudatur, sed factâ excretionem idem intestinum à musculis levatoribus denuò sursum retrahitur, ita, ut excretionis actus sit completus, & ex podicis extrusione & podicis retractione constet. Quando itaque ista protrusio naturalis excedit, retractio verò naturalis deficit, tunc contingit necessariò affectus, quem vocant ani procidentiam.

#### CAUSÆ.

Duplex ergò hujus ani procidentiae est causa:

1. Est nimia aut frequentissima aut violenta ani extrusio, & ita fibrarum musculorum levatorum aliqualis læsio & laceratio.

2. Est musculorum levatoriorum plus minus resolutorum deficiens retractio; quæ nunc seorsim, nunc junctim accidunt: v. g. à calculo vesicæ, & irritari continuò per consensum intestinum rectum, ac ad continuam protrusionem stimulari potest.

Nimirum & frequentius aut violentius extruditur anus propter quæcunque acia & morficantia in intestino recto hærentia, quæ omnia istud intestinum continuò vellicant & stimulant, à quo stimulo intestinum se contrahit indefinenter, & foras protruditur; hinc imprimis tenesmus & dysenteria interdum ani procidentiam inferunt: item diarrhœæ, clysteres aciores, aut etiam suppositoria nimis stimulantia, inducunt non rarò hunc affectum, uti hæc refert Panarollus *Pent. 1. obs. 23.* Stercora dura aut excrementa viscida in intestino recto hærentia, ac difficulter excernibilia, ut sic dicam, continuò stimulo & continuâ protrusione etiâ procidere faciunt anum; quod etiam facit subinde difficilis partus, dum parturientes omni conatu & retenta respiratione motum excretorium inferiora versus moliantur, qua occasione cum fœtu per anteriora, simul anus per posteriora, non rarò egreditur: quale exemplum habet Amatus Lusita-

nus c. 1. *Curat. 93.* & Gabelchoverus *Cent. 1. Curat. 71.* Hæmorrhoides dolentes anum continuò stimulant, item nimium fluentes, pariter ad hoc malum disponunt: Item calculus vesicæ virorum per consensum continuò irritans podicem, ita ut crebriori egerendi conatu anus subinde graviter procidat.

Quando ita protrusus est anus, secunda causa, nempe musculorum levatoriorum impedita retractio, accedit propter constitutionem eorum paralyticam; sive hoc fiat vitio ipsarum fibrarum in musculis motricium; sive vitio nervorum ad musculos dictos derivatorum. Facit huc suo modo percussio fortior seu casus ab alto super os sacrum aut vertebrae lumborum, ubi nervuli derivantur, quæ paralytin horum musculorum inducit: item si nimio conatu anus semel protrusus diutius extra hæreat, ita ut fibræ musculorum levatoriorum retrahentes nimis laxentur, lacerentur aut flaccidæ fiant, similiter procidentiam ani subinde chronicam inferunt; fibræ enim in toto solutæ & quasi paralyticæ impediunt retractionem ani: sicuti intestina prolapsa, dum nimium refrigerantur ab ambiente Aëre, musculi fibrarum resolvuntur; quin etiam excrementa ferofiora aut aquosiora copiosius vel crebrius per anum excreta, intestinum rectum & musculorum fibras laxantia, ut nequeant intra corpus retrahere anum, etiam subinde hoc malum inferunt.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: sunt facilia, & per sensum patent: causas ex antecedentibus facillè possumus hariolari.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: ani procidentia per se ordinariè non multum habet in recessu, & pro causarum varietate vel facilius vel difficilius curam admittit: nunc etiam periculosior, nunc minus periculosa esse solet; nisi enim subito aut repente curetur, interdum in periculosum ani tumorem terminatur.

In specie duplici in statu periculosa fit; vel cum inflammatione, vel paralyti musculorum: ani procidentiam cum inflammatione non rarò tandem gangræna subsequitur: si conjuncta cum hæmorrhagia vel tenesmo, sic difficulter curatur; chronica enim fit interdum: ani procidentia, quæ orta est à paralyti musculorum levatoriorum, difficulter curatur, quia reposito licet semel ano, tamen quando denuò excernitur cum excrementis, malum facillè recidivat.

#### CURA.

Quoad Curam, duo sunt notanda:

1. Anus prolapsus est reponendus; &
2. Repo-



2. Repositus probè firmandus, ne tam facile prolabatur. Repositio est facilis fitque imprimis manuum ope, quando indice digito blandè intruditur anus, vel quando lintum cum decocto adstringente vel vino calido, prout necessitas postulat, ebrum circumvolvitur indici digito, & hujus medio anus intruditur. Quando ita repositum est intestinum, patiens extendere debet coxas & crura, & ita extensio, quousque potest, corpore vel supra ventrem, vel etiam supra alterum latus, quamdiu potest, quietus jacere debet, ut ita repositus meliùs firmetur anus.

Ut verò repositio meliùs faciliteretur, considerandum priùs: an quædam adsint impedimenta repositionem vel impedientia? uti sunt: stercora dura, aut sordes in ano, aut ani prolapsi inflammatio; vel recidivam minitantiæ? uti sunt: ani nimis diuturna refrigeratio, vel musculorum levatoriorum paralytica constitutio; quæ ipsa priùs ante repositionem removenda sunt, adeoque lac decoctionis herbæ meliloti vel florum verbasci, vel florum sambuci, in forma clysmatis applicetur & foveatur anus, ut emolliantur stercora indurata & removeantur. Si verò causæ sint sordes, aut mucus acrior intestinum stimulans, hoc priùs abluendum & eluendum est fomento abstergente & blandè adstringente: pro quo scopo conveniunt, quæ modò insinuata fuerunt; vel horum loco decoctum foliorum quercus, florum verbasci, cicerum rubrorum, parietariæ, &c. cum aqua ferrariorum paratum usurpetur. Si verò adsit inflammatio vel etiam tumor intestini prolapsi aut similium, inflammationi priùs arcenda applicatione foci emollientis & discutientis: ad quos foci usurpantur imprimis folia & flores verbasci, meliloti, chamomillæ, sambuci, malvæ, violariæ, &c. quæ coquuntur nunc in lacte, nunc in ferrariorum, nunc in vino rubro adstringente; v.g.

℞. flor. sambuc.  
chamomill.  
hyperic. a m. ℞.  
rosar. rubr. p. ij. vel iij.  
summit. absinth.  
melilot. aa M℞.

Coquantur in lacte vel vino rubro:

In lacte, ubi dolor; in vino, ubi tumor durus & renitens; ubi verò tumor inflammatorius, in sero lactis: & hoc decocto anus tumefactus & inflammatus subinde fomentetur ac foveatur, donec omnia ista pathemata cessaverint.

His omnibus remotis impedimentis, reponendus est anus, illinendo priùs cum oleo rosarum vel myrtillorum super asperso pulvere gallarum contusarum, C. C. ulto & mastichis pulvere ana; si enim adstringitur anus, meliùs que firmatur, quòminus recedere & excidere possit. Præterea ad firmandum anum prolapsum in suo loco, convenit etiam remotis im-

Tam. II.

pedimentis suffitus ex seminibus & floribus verbasci, floribus chamomillæ & resina abietis: vel quod adhuc melius est, instituatur suffitus Kesleri, quem describit in suis *Centuriis Processuum* t. 4. n. 15.

℞. Asphalti,  
succini,  
mastich.  
thuris,  
myrrha a ʒj.

M. pro suffitu: S.

### Sonderlich Räucherpulver.

Excipiatur ano in sella perforata: hoc facto foveatur aut illinatur vel cum pinguedine cervina liquefacta, vel cum oleo ovorum, & ita intrusò ano æger probè intensus pedibus lateri incumbat.

Ut verò firmetur meliùs anus plus minus repositus, faciliùsque etiam reponatur, multum confert tale emplastrum calidissimè regioni ossis sacri superiori aut etiam lumbis applicatum, quod ita paratur:

℞. gumm. opopanax.  
sagapen. aa q. s.

liquefacta calidè inducantur super alutam, f. emplastrum, & applicetur, quantum fieri potest, calidè.

Aliàs contra ani procidentiam & firmandum intestinum rectum Hartmanni experimentum in *Prax. Chymiatr.* est asser quernus benè calefactus & mastiche illitus; cui, quam calidè ferre possit æger, per horæ quadrantem infideat, quin etià loco mastichis sola medulla cervina aut hircina liquefacta, & ita intestino prolapsò, unà hoc blandè reponendo, & hinc illita, simili ratione applicata confert.

Loco pinguedinum harum etiam frixentur flores verbasci in butyro non salito, frixa benè transcolentur, quo ipso simili modo anus inungatur. Ceu aliis præferendum remedium habetur cinis scarabæorum pilularium, qui intestino subinde prolapsi inspersus, & hinc istud intestinum denuò repositum mirè firmare dicitur.

Quod si fiat, ut hæmorrhoidibus juncta sit, vel etiam sequatur eas procidentia ani, optimū est oleum mastichis, in quo bullierint scarabæi: sicuti, si in eodē oleo mastiches bulliant flores verbasci, egregium est specificum ad procidentiam ani ex tenesmo. Irritis aliis, insigniter conveniunt sacculi sequentes:

℞. fursur. m. ij.  
fol. millefol.  
flor. verbasce. aa m℞.

Insuantur sacculo interpassato, coqu. in aa vini & aceti, & applicentur tepidè podici, ut perfectè anus firmetur.

Conveniunt imprimis, si post partum difficile malum natum fuerit: Vid. Gabelchoverus *Centur. I. observ. 71*. Loco aceti vel vini, aut similis liquoris convenientis, etiam deco-

(Z 2)

decoquantur in aqua ferrariorum, quæ potenter adstringit & anum firmat.

Reposita ita anus si non remaneat, præter convenientem corporis situm, ad corrigendam musculi levatoris resolutionem simul appropriata nonnulla aromata conveniunt: v.g.

℞. *Flor. chamom.*  
*balauftior.*  
*anthos,*  
*fol. salvia,*  
*lauri* ꝑ. ij.  
*nuc. cupress.*

*gallar. centuf.* à part. iv. l. vj.  
*cori. granator.* 3j.

Coquantur in ∇ vel vino chalybeato: applicentur & usurpentur pro fotu.

Quod si post repositionem firmatō etiam anō remaneat calor aut etiam rubedo in anō, ne ulterius superveniat inflammatio aut etiam aliud gravius symptoma, recipiatur ∇ plantaginis, in qua solutum est saccharum Saturni, & ita anus hoc ipso blandē fovendus est; aut loco hujus suprà dictis fomentis adstringentibus utendum.

## SECTIO XIII.

DE

### CHYLI AD RELIQUAS PARTES MOTU ET DISTRIBUTIONE LÆSA.

**S**eparatus ita in duas partes chylus beneficio bilis & succi pancreatici, ejus subtilior & tenuior ac fluidior pars ulterius per crustam intestinorum bombycinam & porulos intestinorum ita configuratos, ut cremorem hunc lacteum saltem admittant, crassiores verò partes his poris non proportionatas, imò etiam flatus & æm excludant; de quo videatur Lovverus *Tract. de Corde* p. 212. in vasa lactea influit, & leniter ab iisdem absorbetur, restitante ejus parte viscida sub specie muci; pars verò crassa excrementitia sensim sensimque ad intestina crassa motu eorum peristaltico ablegatur, ubi sub forma stercorum excluduntur, dum in recto intestino constitutā molestiā & pondere idem ad sui excretionem stimulant; quæ tantò est major, quò feces sunt fluidiores; tantò minor, quò eadem crassiores.

Impeditur autem chyli distributio:

I. Quando nulla fit in intestinis transcolatio; idque duplici ex causa.

1. Quando obducta & obliterata sunt intestina à copioso mucō crasso & viscido, simulque orificia vasorum lacteorum, quam obstructionem sequitur
2. Fluxus cœliaci species; sic enim excrementa chylosa excernuntur; de quo superius, ubi de cœliaca affectione.
- II. Quando per diarrhœam aut dysenteriam abrasa intestinorum interna tunica, sequuntur hinc inde cicatriculæ, quibus simul occluduntur pori seu orificia vasorum lacteorum in intestina hiantia.

Denegatam hanc chyli transcolationem necessum est ut sequatur corporis atrophia ac tabes; quæ tamen minoris est momenti, quando ex prima causa oritur, sed posterior ex occlusionē pororum seu orificiorum vasorum lacteorum, ac cicatricibus post dysenteriam vel diarrhœam è crassa tunica intestinorum, imprimis tenuium, relictis nullo modo est cura-

bilis, sed tabidum ægrum interimit.

Quod si fiat, ut jam transcoletur chylus, & derivetur in vasa lactea, tamen si in ipsis vasis lacteis, circaglandulas mesenterii in specie, obijciatur impedimentum, ulteriorem chyli progressum impediens, etiam læditur & impeditur debita distributio.

Hæc obstructio fit imprimis à chylo ipso nonnihil viscido, aut, quod frequentius est, à pituita seu mucō intestinali resoluta, in vasa lactea pulso, ac ibidem denuò coagulato: id quod fit v. g. post exercitium nimium, dum corpore bene calefacto subito ingurgitatur potus frigidus; à calore enim exercitii & motu primo liquefactus mucus ac attenuatus, in vasa lactea propulsus superventu haustus frigidi denuò congelascit & spissescit, & ita vasa lactea ac glandulas mesenterii infarcit.

Quando ergo chylus in venis lacteis tale invenit impedimentum, & nihilominus tamen novus continuò succedit, vasa lactea insigniter distenduntur, & cum instructa sint suis valvulis, fit, ut tunc in mesenterio copiosæ ubique appareant vesiculæ: qualia exempla non pauca observata sunt. Quod si vero venæ lacteæ rumpantur, quod facillè fieri potest; tunc chylus effunditur in cavum abdominis, unde oritur certa quædam ascitis particularis species; vid. Sylvius *Prax. l. i. cap. 16. & 17.* ubi notabilia imprimis sunt ea, quæ de ascite scribit: ita, ut ascitis propriè dicti, seu particularis abdominis hydropis, & in quo pedes non simul intumescunt, adeoque confirmatæ universalis cachexiæ proles non est, speciatim quod subito interdum generatur ex causis occasionalibus, iis præsertim, quæ à Sylvio memorantur, frequentissimam occasionem existimem talem chyli per lacteas effusi stagnationem; sicut non negarim, & aliis ex causis in aliis abdominis visceribus vel locis, lymphaticis ruptis, & lymphæ extravasationem, & hinc asciticam intumescen-  
sup-

supervenire posse; simili ferè ratione curandam, atque de illa ex chylo effuso disserit Sylvius, de quo suo loco plura, ubi de lymphæ motu impedito.

Tandem si malum in ductu thoracico, vel ab obstructione vel laceratione, hæreat, fit cum morte animalis, licet lenta, & est ferè malum incurabile. Hoc saltem in loco occasione obstructionis vasorum lacteorum considerandæ sunt obstructiones viscerum abdominis, & in specie mesenterii, item hepatis, lienis, pancreatis, &c. nempe apud veteres praticos duo ferè sunt fontes morborum chronicorum, nempe antipraxia viscerum; & eorundem obstructiones.

Quod attinet antipraxiam viscerum: de hac superius dixi sub chylicatione læta, eamque rejeci in institutionibus. Interim hæc antipraxia non confundenda cum robore inæquali partium, & deinde cum accidentario quodam visceris cujusdam fervore. Scilicet debilius subinde ratione balsami sui seu in-siti observatur viscus præ altero; id quod & in partibus externis non rarum est, à quacunque occasione læsum, & hinc debilitatum fuerit viscus aut pars, v. g. brachium, in quo diu gestatus fuit fonticulus, aut quod aliquando gravius sauciatus fuit, restitutum denuo, debilius ac minus robustum, flaccidius, frigidius, sub tempestatum mutationibus irritabilius, præ altero observatur; hoc verò robur inæquale nulla partis antipraxia est: Quoad accidentariam visceris incalescentiam; accidit interdum, ut viscus quoddam fervidius reddatur, quam naturaliter esse debet: sic v. g. renes interdum æstare, aut hepar intensius fervere observatur: id quod fit propter p. n. quasi spinam acidam infixam, cujus hostili præsentia visceris incalescentia supervenit hinc impedimentum actionis propriæ, non autem cum alia visceris antipraxia aut contrarietate, unde & non refrigerantibus, sed spinam infixam evellentibus, hoc est, acidum corrigentibus, curandum: de quo vid. Helmontius *tract. Retenta.*

Quoad alteram originem morborum chronicorum, obstructiones nempe vasorum mesaraicorum & viscerum in hypochondriis: nihil frequentius his ipsis in scholis Medicorum occurrere solet: Hinc nullus est rusticus, nec vetula, qui non sciant loqui *von der Verstopfung der Gefäß-Adern*/unde ordinariò origo febrium intermittentium, continuarum, cachexiæ, mali hypochondriaci, scorbuti, icteri, pathematum abdominis, & similium affectuum chronicorum, tam in schola Galenicorum, quam Paracelsitarum, & aliquorum modernorum derivantur, à quibus passim etiam oppilationes & infarctus, à tartaro hinc inde coagulato factæ incusantur.

Cæterum sicuti qualitates occultæ Physicorum sunt asyla ignorantia eorum; ita simili

ratione dicere audeo: quod etiam tales in abdomine viscerum obstructiones & antipraxia viscerum sæpius sint velamen, quo ignorantiam suam palliant Medici. Equidem duo imprimis sunt, quæ fulcire videntur hanc hypothesein: quorum alterum hanc opinionem reddit probabilem, alterum inculpabilem. Probabilem hanc de obstructionibus vasorum mesaraicorum hypothesein reddit, quod in di-ctis morbis chronicis quamplurima abdominis symptomata, tormina ventris, phlogoses, alvi fluxus, &c. in quibus videtur esse impeditus humorum motus, ægris molesta sint, præsertim cum circa hypochondria affligant: et si alia quædam pars sit affecta, semper tamen præcedant, conjungantur aut subsequantur abdominis passiones: quin etiam, quod subinde scirrhi & steatomata in mesenterii glandulis, item in aliis abdominis visceribus sint inventa: Alterum, quod inculpabilem reddit hanc hypothesein, est: quod fons per anaton-men non adeò possit detegi: Cum enim præsupponant infarctum vasorum capillarium, quæ ordinariò post mortem collabascunt & reperiuntur clausa, hinc post mortem nulla satis accuratior inquisitio institui potest: sed potius hos, ut & alios medentium errores, tegit terra. Res ut pateat accuratius, tres imprimis consideremus canales & meatus, in quibus obstructio fieri supponitur:

- I. Sunt vasa sanguifera, arteriæ & venæ, quæ invehunt & revehunt,
- II. Vasa lymphatica & lactea, quæ ex uno loco invehunt in alterum.
- III. Sunt pori & meatus partium continentium, eorumque particulares ductus, per quos nunc continua nunc interrupta est liquorum trajectio, primariò quidem viscerum, hepatis, lienis, pancreatis, pulmonum, renum, glandularum; & secundariò partium carnosarum.

Quod si in his locis debeat fieri obstructio, tunc sanè necesse est, ut humor in motu impeditus stagner, hinc pars intumescat, & oriatur vel liquoris stagnantis coacervatio, aut ruptia vasis liquoris in motu impediti in vicina loca extravasatio. Et

I. Quidem in vasis sanguiferis, ubi est in aliquo vasculo obstructio, necessariò impeditur sanguinis motus. Unde sanguine hoc in ista parte impedito, primò fit ejus stagnatio, ex stagnatione tumor partis, hinc capillarium vasorum ruptio: his ruptis sanguinis vel extra corpus, vel in quadam corporis cavitate, extravasatio, & hinc necessariò inflammatio, stante continuò sanguinis circuitu; sive sit impeditus motus in arteriis, & tunc adest continua pulsatio; sive in venis, & tunc est renitentia & distensio.

II. Ubi in vasis lacteis aut lymphaticis fit obstructio, similiter fit lymphæ transcuræ in motu



motu impeditio, ita ut per vasa lymphatica non aliorum commoveatur, nec ab his resorbatur lymphæ ex parte: unde hæc in parte coacervata dabit tumores serosos: sin verò jam absorpta sit, adeò & in motu per vasa ex horum obstructione impediatur, crescere solet lymphæ in his venis, à qua tumor seu obstructio: unde à lymphæ stagnante fit vasorum distensio, tandem ruptio, & ita lymphæ necessaria effusio: lymphæ ista effusa in peculiarem cavitatem, dat hydropem particularem, v. g. hydrocephalum, hydropem pectoris, palpitationem cordis ex aqua pericardii abundante, ascitem partium abdominis, & similes alias hydropes particulares, effusa vero lymphæ in poros partis solidæ partem istam instar spongiæ tumefaciet, adeoque tumores œdematosi & serosi exinde pro varietate lymphæ variam originem ducunt.

Obstructiones, quæ dicuntur fieri in ipsis visceribus aut partibus continentibus, etiam suos dant tumores, indeque vel inflammationes, vel abscessus, vel scirrhus, nec sine his contingere possunt. Cum enim meatus & pori earum in hunc finem sint constructi, ut aliquid transeat, necessariò ex istis obstructis non potest non fieri interdum liquoris transeuntis stagnatio: unde pars necessariò intumescit, & tumefacta per suppurationem degenerat in abscessum, aut ubi materia stagnans inspissatur aut indurefcit, fiunt tumores duri plus minus indolentes, & ad tactum renitentes; qui ex sanguine in partibus sanguineis dicuntur scirrhi; ex lymphæ verò in partibus glandulosis dicuntur strumæ seu scrophulæ. Talis coagulatio & induratio materiæ obstructæ ordinariò fieri solet ab acido, subsistente aut in sanguine plus minus vitioso, in specie crudiore atque crassiore, aut in lymphæ viscidior, in quocunque loco obstructo, hinc sensim sensimque partes subtiles avolant & evanescent, quæ ipsæ aliàs temperabant acidum: his discussis materia, sive sanguis sive lymphæ, sensim inspissatur, & à restitante acido ita firmitus coagulatur & induratur. Quod autem adsit tale acidum in abscessibus, per se patet ex suppuratione: quod insit tale acidum in scirrhis & scrophulis, ex eo est manifestum, quod hi tumores, si inconvenienter tractentur, ita, ut acidum eorum vitiosam contrahat effervescentiam, facillimè in caneros exulceratos & depascentes tam scirrhi quàm scrophulæ degenerent.

Patet ex dictis: quid habendum sit de obstructionibus? nempe nullo modo universaliter esse negandas obstructiones; hoc enim absurdum esset: abusus tantum tollendus, & imaginariis istis obstructionibus superstructis morbis aliud fundamentum querendum: Nam & ductus cholodochus, non minus quàm ipse ductus pancreaticus in cœliaca pas-

sione oscula vasorum lacteorum, ubi hiant in intestina, tubuli renum, ureteres in nephritide, &c. subinde reperiuntur obstructi, subsequenter exinde variis symptomatibus: mesenterii item obstructiones esse repertas, una cum glandulis ejus induratis cum subsequente corporis macie, similiter hinc inde prostant exempla, & plurima practitorum experimenta loquuntur; abscessus quoque omnes & scirrhi necessariò obstructiones præsupponunt: Verum in febribus intermittentibus, etiam cachexiis, hypochondriacis, & similibus morbis chronicis, sæpius omninò nihil adest, quod obstructionis arguat; maximus enim est error in praxi, ut istud, quod est productum morbosum, habeatur pro causa morbi: Quod si verò in his morbis chronicis jam inveteratis tandem superveniant tumores viscerum scirrhosi aut inflammationes, v. g. quando quartanis inveteratis, malo hypochondriaco confirmato, &c. comitem se sistit scirrhus lienis, aut ictero scirrhus hepatis, hydropis prodromus, aut in cachexia confirmata deprehendantur glandulæ tumentes & scirrhi mesenterii; quaestio adhuc est de tali tumore & præsupposita vera obstructione: an sit causa & radix talis morbi? an verò potius sit productum morbosum? Et quidem scirrhus aut similes tumores quod attinet; in his integer quidam ramus aut huic annexæ visceris partes, omninò oppilantur, & in talem tophum coguntur: unde per eam cessat penitus contentorum trajectio, adeoque successivè vicini rami pedetentim dilatati ejusdem munere fungi videntur: Certis sitis, quod nullum reperietis morbum chronicum ex viscerum infarctu derivatum, in quo non primaria morbi radix & origo semper hæreat in stomacho & primis viis, atque vitiata digestione. Nempe digestio prima in ventriculo & ejus perfectio in intestinis plus minus læsa, sunt fons omnium morborum chronicorum. Læsiones hæc fiunt vel vitio objecti seu errore externo, vel vitio fermenti digestivi in stomacho, aut vitio succorum, biliosi aut pancreatici vitiatorum, quorum multiplex alteratio fecunda mater morborum talium esse solet. Speciatim bilis vel parcior vel inertior fovere & contumaces quasi reddere solet hos ipsos affectus, unde ametria chyli, dyscrasie sanguinis, partium nervosarum multiplices dolorosi affectus, originaliter ex vitioso acido primarum viarum propullulare solent, dominante semper acido, seu vehiculo plus minus seroso aut viscido, eoque semper vario, ipso etiam magis vel minus volatili aut fixo; unde vitiosum imprimis acidum tantum non in omnibus chronicis reperietis morbis. Unde etiam basis curandorum talium morborum consistit in vomitoriis, quibus & febres intermittentes, & malum hypochondriacum, & omnes affectus melancholici, cachexiæ itidem, necessariò.

riò sunt primitus aggrediendæ. Conveniunt ergo remedia tam generalia alterantia, nempe acidum corrigentia & absorbentia, viscidum alterantia, eaque evacuantia, & hinc stomachum & bilem balsamicam atomaticâ vi restaurantia; quàm specifica, speciales sapores acidos enervantia, & specialia vitia humorum emendantia, quæ imprægnata sunt  $\Theta$  & alcali, aut fixo, aut volatili acri, aut volatili oleoso: qualia sunt v.g. aromata antiscorbutica, aperientia dicta: hinc etiam est, quod v.g. Martialia & Saturnina in dictis morbis sint adeo usitata, ut tales ægros ad acidulas, ceu sacram anchoram, soleamus ablegare, quæ turgidæ sunt primo ente Martis. Jam vero  $\sigma$ is concreta terreum, habens pro subjecto  $\Phi$  in quandam bolarem, quæ beneficio  $\Delta$  is acidi coagulatur in corpus Martiale, per se simpliciter adstringit, & omnia ex eo parata saporem habent adstringentem. Unde Mars, lac chalybeatum, potus chalybeatus, & omnia Martialia, in dyarrhœa, dysenteria, & in alvi quibuscunque fluxibus, hæmorrhagiis, viscerum atonius, &c. conveniunt, quæ ipsa tamen etiam in malo hypochondriaco propinantur. Dum ergo per se semper  $\sigma$  adstringit, quomodo in talibus malis ex obstructionibus suppositis conveniant, & quomodo aperire queant? dubium remansit. Primus nobis aperuit oculos Helmontius in *Parad. de fontibus Spadanis*, cujus vestigiis laudabiliter inlustrit Tacchenius in *Hipp. chym. c. 28.* ubi agunt de Marte: qui duo toti sunt in eo, ut ostendant Martem per se semper adstringere, per accidens verò in dictis morbis chronicis aperire: vid. Ludovici in *Pharm.* quatenus ratione suæ texturæ terrestris promptissimè absorbet in se sapores vitiosos acidos, austeros, ponticos, aluminosos, aliaque similia  $\Theta$  ia corrosiva, sive, uti vocat Helmontius, sylvestria, in stomacho & intestinis oberrantia, quibus absorptis, dum agunt in  $\sigma$ is corpus fixum terrestre, orane suum vitiosum saporem & omnem excessivam qualitatem omninò exuunt & deponunt, & vitriolicam & absterisivam acquirunt naturam: id quod fit propter mutationem texturæ particularum, indeque laxando alvum dictos sapores morborum vitiosos sub forma nigrarum fecum ex corpore se evacuant.

Par fere ratio est cum Saturno, cujus saccharum & ex hoc parata cum  $V$  tinctura revera sunt egregia, in melancholicis hypochondriacis, affectibus scorbuticis aut similibus, quibusdam crystalli ex minera cum  $\sim$   $\Theta$  parati loco sacchari in usu esse solent.

Quæ ex regno vegetabili hîc usurpantur, vel acria volatilia, antiscorbutica dicta, vel aromata oleosa vel amaricantia, hepatica dicta, vulneraria blandè diuretica & similia, conveniunt. Conducunt autem talia in tali-

bus morbis chronicis, non quatenus penetrant dictas obstructions, sed quatenus partim amaritie suæ, acrimonia volatili, &c. quæ in recessu habent  $\Theta$  volatile plus minus acre vel oleosum, contraria sunt vitiosis  $\Theta$ ibus aut saporibus acidis, in stomacho & primis viis & ipsa  $M. S.$  hinc inde oberrantibus, quos dicta alterantia præcipitant aut eadem alterant, aut in  $\Theta$ sum transformant, & ut plurimum per urinam evacuant; partim bilem in terrem acuant, & acriorem oleoso  $\Theta$  & volatili temperant. Talia vegetabilia, quæ obstructionem respiciunt, & stomachum restaurant, sunt v.g. radices quinque aperientes: item radix rubiæ tinctorum, eryngii, enulæ, cichorii, taraxacum, arum, chelidonium majus, levisticum, endivia, fumaria, radix graminis, filicis, polypodii, fragariæ, curcumæ, asari, pimpinellæ: asari radix in substantia assumpta, aut in vino decocta, est egregium vomitorium; in  $\nabla$  a verò bullita dat potum diureticum, & curativum febrium, & morborum chronicorum, teste Helmontio & Zwelffero. Præterea conveniunt marrubium, quod in scirrhus hepatis & lienis commendatur, hyssopus, artemisia, absinthium, centaureum minus, cardobenedictus, agrimonia, chamædrys, scolo-pendria, &c. His jungitur etiam, quam vocant Itali Milzatellam, quæ est nihil aliud, quàm species galiopulsidis minoris. De floribus genistæ res est nota. Cortices item fraxini, tamarisci, radicem capparis, & similes: semina calida minora, uti vocant, nigellæ, dauci, & similia: item cicuta. Nam radice cicutæ quidam curavit obstructionem epatis, pulvere ejus à  $\mathfrak{z}\beta$  ad  $\mathfrak{z}\text{ij}$  propinato: decoquitur etiam, & decoctum adhibetur. Sabina non mulieribus solum est dicata, sed etiam infarctibus, quos vocant, viscerum. Inter aromatica oleosa, acidum temperantia, in usu sunt: galanga, rosmarinus, salvia, fœniculum, mentha, semina calida majora, levisticum, absinthium, & similia amara, plus minus odorifera.

Item tolluntur tales affectus per temperata, v.g. per usum lactis, per passulas & similia, quæ viciatos sapores obtundunt, & ita morbos corrigunt.

Quoad acria, attenuantia viscidum, conveniunt hîc omnia antiscorbutica & antihypochondriaca, qualia sunt imprimis nasturtium, & omnes nasturtiorum species, cochlearia, persicaria, piperitis &c. Operantur ratione salis volatilis oleosi, quod destruit acidum, eliminat sordes primarum viarum, & sal scorbuticum temperat & corrigit: Item semen sinapi egregium est in scirrhis, uti & erucæ. Jam hæc simplicia vegetabilia duplici modo usurpantur: vel cruda, vel præparata: Cruda sumuntur, nunc recentia, quorum vis consistit in sale volatili, sed faciliè dissipabili, ad



ad imitationem Horstii cum sero lactis probe depurato; nunc sicca, quæ sunt quasi oleosa, & quorum vis medicamentosa in concreto quasi concentrata est.

Quoad præparata: etiam succi, decocta, & per fermentationem, essentia & extracta, parari solent; v. g. essentia fumariz composita, essentia absinthii, essentia myrrhæ, cum spiritu vini tartarifato seu cum tinctura tartari, essentia absinthii scorbutica cum spiritu cochleariz parata; it. noduli ex dictis simplicibus vino infusi.

Adduntur his gummata quæcunque, præsertim ammoniacum, sagapenum, mastix, & hinc galbanum & myrrha; quatenus hæc pituitam viscidam aut vitream seu mucaginem acidam, hinc inde intestinis & stomacho adnatam resolvunt & abstergunt; & certum est, quod gummi ammoniacum in scirrhis viscerum & similibus, ab infarctu verò ortis affectibus nullis aliis cedat remediis; potest sumi in forma pilularum, vel saltem potest purgantibus addi; vel ex viridiæris & gummi ammoniaci destilletur acidus volatilis & penetrantissimus; vel quidam recipiunt spiritum viridis æris, & in eodem dissolvunt vel extrahunt gummi ammoniacum, quæ est essentia egregia.

Ex dictis in specie in usu esse solent essentia & extracta, si nempe spiritus per fermentationem proprius affunditur ipsi vegetabili, aut ad imitationem Angeli Salæ ejus succo inspissato: sic enim fit v. g. essentia absinthii; ex succo menthæ inspissato cum spiritu menthæ per fermentationem facta: ex succo baccarum sambuci inspissato, affuso spiritu florum sambuci vel baccarum sambuci, fit egregia essentia contra erysipelata; ex succo fumariz inspissato cum spiritu fumariz paratur essentia antiscorbutica. Idem potest fieri ex antiscorbuticis, nasturtio, & cochleariz.

Præferuntur his quintæ essentia dictæ, paratæ ex eorum spiritu inflammabili per fermentationem parato, & spiritu eorum urinoso volatili per putrefactionem parato; qui duo junguntur in debita proportionem cum oleo simplici destillato, & sic mediante digestionem diuturna & repetita cohobatione coeunt invicem in quintas essentias dictas, ex quibus volatili, oleo & spiritu constantes; & crassius misti optimè referentes. Salia volatilia in forma camphoræ ascendunt cum sapore simplicium.

Præ cæteris inter salia eminet imprimis  $\text{Q}$ , quod egregium est simplex & vegetabile concretum, ad quod Medici, tanquam ad sacram anchoram, confugiunt in morbis chronicis, imprimis ubi laborat stomachus, non ut aperiat obstructions, sed ut sordes varias primarum viarum eliminat, & vitiosos sordes succi pancreatici & fermenti digestivi corrigat;

unde usurpatur nunc cremor, ut & crystalli tartari, in vehiculo fervido. Quod verò hujus aciditas quibusdam sit suspecta, ut in se insignem vim habeat incidendi, attenuandi & resolvendi, prætereaque urinam ciendi, tunc conveniens est, ut cremori tartari addatur  $\text{Q}$ , vel recipiatur cremor tartari, aut tartarus crudus, & pro suspecta ista aciditate temperanda misceatur cum dimidio salis tartari, dissolvatur blandè in aqua fervida, post fermentationem filtratur, & ita in loco calido evaporent: sic evadit sal tertium egregiè diureticum, & nobile digestivum salum egregium; vel addi possunt lapilli cancrorum aut similia subjecta, quæ vim salinam acuunt, aciditatem verò nonnihil temperant.

Pertinet huc terra foliata tartari & liquor terræ foliatæ tartari: quo etiam facit tartarus solutus Tachenii, egregium & universale digestivum: similis naturæ ferè est  $\text{Q}$  solutus Bartholeti in tr. de respiratione, quem vocat expertum alexipyretum: item  $\text{Q}$  digestivum hypochondriacum ex additione  $\text{Q}$ , ad  $\text{Q}$  in præparatione hujus spiritus. Non cedit his arcanum Mynsichti seu panacea Holsatica, facta ex alcali  $\text{Q}$ , saturato nonnihil à spiritu  $\text{Q}$  in hypochondriacis, scorbuticis, febribus intermittentibus, remedium sanè singulare, blandum somnum concilians. Sed juxta hæc ex tartaro paulò fixiora, imprimis conveniunt volatilia ex tartaro, spiritus nempe ejus & sal volatile; non autem spiritus communis & phlegmaticus, sed per se crebrius rectificatus, & à quo ritè volatilifatus: nobilissimus est in morbis chronicis quibuscunque & similibus affectibus, obstructionibus vulgò tributis, quatenus vitia digestionis primæ & secundæ propter vitiatos succos corrigit & eliminat; est enim de natura salium alcalium volatilium, saponariæ virtutis, & qui abstergit quascunque sordes in corpore vitiosè enatas. Præterea quodcunque acidum destruit, istudque per vias urinarias ablegat. Loco horum spiritus carminativus de tribus ex tartaro, nitro & vini spiritu per retortam tubulatam paratus, instar omnium & nobilissimus est: Est enim revera nihil aliud quam spiritus tartari volatilis. Tandem ipsum oleum tartari foetidum destillatum, constans ex sale volatili, per acidum proprium concentrato, & in oleiforme corpus redacto, debite cum alcali proprio commistum & digestum, imbibendo aciditatem nimiam destillando suggerit spiritum & sal volatile nobilissimum in chronicis affectibus. De sale tartari notum est, quod, si quid aliud, hoc sit egregium incisivum. Verum cum sit fixæ naturæ, & reluctetur stomachi digestionem, ob id melius est, si volatilifetur: In specie autem volatilia tartarea præ reliquis volatilibus præminentiam habent in eo, quod acidum nostrum peccans frequentissimè expul-  
lentis,



lentis, imprimis vinosis, aut fermentando in vinosam aciescentiam redactis oriatur, quibus volatilia ex tartaro, utpote ejusdem cum vino prosapix, optimè resistunt, ita destruunt, & cum urina evacuant atque evocant.

Ex regno animali pro usu Medico in morbis chronicis conveniunt partes animalium duræ, salibus volatilibus turgidæ, ossa & cornua præparata, lapilli ☿ marina, & in specie testæ cochlearum, quæ marina præ aliis singularem habent vim alcalinam, quâ omne acidum mutant in salsum: imprimis ☿ia eorum volatilia aut spiritus urinosi. Omnes enim animalium partes suggerunt copiosum sal volatile urinofum, quod elegans est in morbis chronicis, sapores vitiosos destruendo: Talia sunt v. g. spiritus & sal volatile cornu cervi, sanguinis humani, viperarum, succini, urinæ humanæ. Nam urina humana ad chronicos hos affectus, utut sordida, est tamen expertissima: vid. Solenander *Consil.* 12. *sect.* 1. qui dicit: quod rusticis & agrestibus hominibus in obstructione epatis & lienis, harumque partium tumoribus, sæpè potandam dederit ☿m propriam, idque magno ac felici cum successu. Melius autem est, si etiam præparetur ex urina immediatè spiritus, aut mediante ☿\*co. Loco horum omnium in specie esse potest ☿\*ci adjectione cujusdam alcali fixi, sive sit ☿☿i, sive cineres clavellati, sive calx viva, paratus: Spiritus ☿\*ci cum sale tartari paratus, si ritè conjungatur cum oleis destillatis, hujus sal volatile arripit oleum, & destillando se coagulat in butyraceam massam, & exinde fiunt salia oleosa elegantissima.

Vulgò etiam splen bovis insigniter commendatur in affectibus hypochondriacis, spleneticis & hepaticis, & exinde paratum decoctum vel essentia splenis bovis: decoctum ad morbos chronicos habet Quercetanus in *Pharm.* essentiam Hartmannus & Zvvelfferus. Essentia hæc splenis bovis cum spiritu fumaræ, melissæ, aut spiritu cochleariæ parata, præter usum anticachecticum experta est in morbo virgineo ex obstructione mensium orto; est enim expertissima in provocandis mensibus: si conjungitur cum essentia Martis aperitiva legitimè parata, fit egregium remedium in affectibus chronicis & hypochondriacis: item ex suppressione mensium natis; non quidem ratione splenis bovis, sed ingredientium appropriatorum. Adduntur his lumbrici terrestres, qui non cedunt aliis remediis in vi diuretica & aperitiva: Item formicæ, ex quæ his per putrefactionem earum paratus spiritus volatilissimus, egregiè diureticus, & imprimis in affectibus scorbuticis optimus & polychrestus; qui mediante urinâ salia vitiosa acida imbibita & præcipitata foras e ducit, in specie ☿ lumbricorum, præter quem vix habetur par remedium in ar-

Tom. II.

thritide vaga scorbutica. Rudi Minervâ lumbrici contuli infundantur vino cum radice armoraciæ, aut ipsi lumbrici decoquantur contuli; quod infusum aut decoctum bibitum similiter est egregium in his affectibus.

Legitima ergò utendi methodus his ipsis est, ut usurpentur

1. Digestiva; hinc
2. Vomitoria vel blanda laxantia promovendis impedimentis.
3. Præparato sic corpore Martialia, ut promptius absorbere & imbibere queant vitiosa acida: Quibus
4. Interponantur, non purgantia propriè dicta, quæ insigniter tales ægros & tandem frustrâ vexant, & subinde periculosa symptomata inferunt, ex acriorum & effervescentium succorum ad intestina provocato influxus; sed blanda potiùs & per epicrasin laxantia, & quæ leni stimulo intestina mediocriter proritant: Et

5. Subjungantur alterantia aromatica, in specie volatilia, plus minùs amaricantia.

Inter digestiva, reliquis ferè præmittenda, in specie laxativis, eminent imprimis ☿ia salia, aut nonnihil urinosa, succos acidos attenuantia, & acre omne blandè temperantia, qualia sunt: tartarus vitriolatus Tachenii, sal ammoniacum, ☿ hypochondriacum, arcanum duplicatum, liquor terræ foliatæ tartari, R tartari, R scoriarum reguli antimonii, R vitrioli Martis Zvvelfferi.

Quod II. attinet vomitoria: hæc sunt nota ex antimonio, quæ sunt optima: præstant autem liquida siccis; & si opus est, reiterentur.

3. Martialia ex suprâ dictis sunt cognita; sive usurpantur artificialia, nempe Ræ, croci, infusa antimonialia; sive naturalia, ut sunt acidulæ. In horum tamen usu aliquandiu persistendum est, ut radicitus corrigatur causa morifica, in specie liquor ☿is ☿aris: continuetur ad 3. 4. usque ad 6. vel 7. septimanas, ascendendo à gutt. 10. 12. ad 20. vel 25. & descendendo, bis in die, manè in vehiculo calido, à meridie in frigido. Si non sufficiant, hautiantur acidulæ naturales in loco natali.

Hiscæ Martialibus interponantur subinde blanda laxantia, successivè &, ut vocant, per epicrasin evacuantia. Si alvus ordinariò fluit, bonum signum est; si verò interdum tantum fluat, interponantur dicta remedia per epicrasin purgantia: vid. Wedelius *de Med. Facult.* pag. 46.

Hæc inter eminet rhabarbarum, quod aliàs anima hepatis dicitur, blandum est laxativum, & amaritiæ suâ simul corrigit & acuit bilem, additis stimulis salinis, v. g.

℞. Rhabarb. el. ʒj.  
arcan. dupl. ʒss.

M. f. Pulvis S.

Expirend Pulver auff einmal.  
(Aa)

Vol

Vel fiat electuarium ex pulpa passularum cum rhabbaro pulverisato, recipiendo ad quamvis unciam pulveris rhabbari ʒj. & ita sub forma electuarii aliquandiu contiguando.

Dosis nucum juglandium quotidie bis; est remedium ad cachexiam & quasvis alteri species commendatissimum: unde Helidæus Paduanus facit pilulas ex rhabbaro pulverisato, & ex gummi ammoniaco, in aceto dissoluto; & hæc fuerunt ejusdem pilulæ, optimæ in morbis cachecticis.

IV. Si quid aliud ex purgantibus medicamentis convenit, imprimis sunt gummata, in specie gummi ammoniacum cum laxativis acuata: Talia sunt pilulæ de ammoniaco Quercetani: item Bontii, Riverii vel Hartmanni, quæ satis sunt commendatæ & utiles: item pilulæ aperientes Tilemanni:

℞. Aloës succor. ʒj.  
gumm. \*ci + o solut. ʒʒ. vel ʒj.  
Qdasi. ʒiij.  
cum Ror. f. pilulæ.

De quibus num. ix. x. l. xi. xv. ad xx. capiantur horâ unâ vel alterâ ante coenam.

Nempe pertinent huc omnes pilulæ usuales seu domesticæ dictæ, quæ sub cursu curationis morborum chronicorum omni septimana simul capiantur, in specie sub usu Martialis, v. g.

℞. G. \*ci in + o solut. ʒij.  
Qi + ritè parat. ʒj.  
aloës luc. gr. xv.  
mastich.  
myrrha aa ʒʒ.

Extract. troch. alhand. gr. viij.  
c. essentia menth. fiant pilulæ: S.

**Erweichend- und eröffnende Pillen**  
auff etliche mal.

℞. Gummi ammon. in aceto solut. ʒj.  
scam. ʒrat. gr. iv.  
extract. troch. alhand. gr. j.  
cum ess. cathol. purg. f. pilulæ.  
D. S.

**Magen-Pillen auff einmal.**

Faciunt huc pilulæ ex gummatis Sylvii ex Praxi Med. l. i. c. 2. §. 34. c. 7. §. 52. & c. 14. §. 50. c. 34. §. 110. & c. 35. §. 16. quæ multum tribuunt ad evacuandum in his morbis. Dictarum pilularum aliquot capiat æger mane jejuno stomacho; item & dulcis in his chronicis affectibus, in specie splenetis, cum extracto hellebori nigri est egregius, qui cum sit tenuissimus, uno vel altero grano extracti troch. alhandal est acuendus, hac forma:

℞. ʒii dule. gr. xii. vel xv.  
extr. helleb. nigr. vel MB de amm.  
Quercet. gr. xv.  
troch. alhand. gr. j. vel ij.  
cum essent. absinth. f. pilulæ.

quibus etiam gutta i. vel altera & destillati cumini addi potest: S.

**Zeitheilende Magen-Pillen auff einmal.**

Item pilulis convenienter permiscuntur chalybeata, & Oculi, ut ex pilulis Sylvianis patet, vel extractum Oculi sequenti forma:

℞. extract. helleb. nigri,  
Oculi aa. gr. xv.  
troch. alhand. gr. ij.  
scammon. ʒrat. vel rosat. gr. iv.  
c. eff. live Ror. liquida f. pilulæ S.

**Purgierende Stahl-Pillen.**

Sin in forma pulverum debent dari laxativa, dantur imprimis cum salibus digestivis, v. g.

℞. ʒrs Oculi. ʒʒ. vel gr. xv.  
scammon. ʒrat. vel rosat. gr. iv.  
troch. alhand. gr. iv.  
So destillat. anisi. gutt. ij.  
M. f. pulvis. D. S.

**Laxier-Pulver.**

Hic pulvis interdum septies, interdum duodecies laxat.

Faciunt huc etiam passulata, in specie eorundem decocta, imprimis cum Martialibus usurpanda, in subjectis paulò siccioris constitutionis. Convenienter etiam usurpantur infusa ex fol. sennæ cum sale tartari, quæ sunt rubicunda, & omnis teret sapor est correctus, cum & sine rhabbaro; vel mista cum gummi ammoniaco; & purgantia alia.

℞. Fol. senna f. f. ʒʒ.  
sem. anis. ʒʒ. vel ʒj.  
Oculi ʒj. ad ʒʒ.

Infund. in f. q. ∇ simpl. stent in loco tepido per noctem.

colat. ʒiij. vel iv. adde  
∇ cinam. ʒiij. vel ʒʒ.  
syrup. de cichor. c. rhabarb. ʒʒ. l. q. v.  
M. D. S.

**Laxier-Trancf.**

In genere tandem dictis aliquandiu continuatis fit accessus ad alterantia aromatica: eaque vel simpliciter talia, vel simul plus minus laxantia. Faciunt huc imprimis noduli vino infundendi, qui ipsi parantur ex simplicibus nunc aridis, quæ sunt quasi oleosa, & quorum vis medicamentosa in concreto quasi concentrata est; nunc verò ex recentibus, in iis nempe, quorum vis in Oleo volatiliore, sed facile dissipabili consistit. Alterantibus his purgantia infusioni apta permiscuntur: non enim omnia purgantia conveniunt, ut infundantur, qualia sunt, quorum vis purgans consistit in parte resinosa, quoniam resinam non attingit ∇: quorum vero vis purgans consistit in parte mucilaginosâ, ea possunt infundi & subministrant suam vim liquori aquoso seu vino.

℞. herb. absinth.  
mentha,  
ror. mar. aa mj.

Rad.

Rad. fenic.

levist. aa. ʒß.

galang. ʒß. vel ʒvj.

zedoar.

zingib. aa. ʒij. vel iij.

cort. aurant. ʒß.

(vel borum & cort. citri à ʒij.)

cinamom. ʒij. vel iij.

M. pro Nodulo vino infundendo: S.

Püschel zum Magen-Wein.

quod vel simpliciter ita bibitur, capiendo quotidie bis semper ante pastum una vel alterâ horâ bonum haustum.

℞. Herb. rec. cochlear. mij.

absinth.

chelid.

fumar.

nasturt. aa. mj.

fol. fenna s. s. ad ʒj.

rad. rec. acori veri, vel enula,

armorac. aa. ʒß. usque ad ʒj.

hellebor. nigri crud. ʒvj.

esul. prapar. ʒij. vel ʒiij.

zedoar.

zingib.

cinam. aa. ʒj.

sem. anisi,

fenicul. aa. ʒij.

Θʒ ʒvj.

M. pro Nodulo vino infundendo:

D. S.

Laxier-Püschel.

Θʒri stimulans est, & menstruum reddit idoneum pro purgantibus extrahendis: posset loco ejus addi cremor tartari, sed sal ʒri est melius.

Capiatur subinde unus altervé haustus, & laxabitur blandè corpus. Dabo aliud exemplum ex alterantibus siccis & laxantibus:

℞. herb. absinth.

rorismar.

mentha aa. mij.

fol. fenn. s. s. ʒvj.

rad. enul.

fenicul.

levist. aa. ʒvj.

helleb. nigri crud. ʒjß.

esule prapar.

galang.

zedoar.

zingib. aa. ʒij.

passul. min. ʒj.

Θʒri ʒij.

Includ. Nodulo. S.

Püschel in Wein.

Ad alterantia dicta aromata pertinent etiam Elixir proprietatis sine acido, Rʒri composita, & Elixir anticachecticum alterativum.

℞. aloës succot. ʒj.

gumm. ammon. ʒvj.

Tom. II.

myrrh. ʒß.

croci ʒij.

Infundantur c. s. q. Rʒri acerrimæ, mediante digestionē diuturna extrahatur essentia composita.

Dosis ad 30. vel 40. gutt. bis in die propinanda. Vel elixir anticachecticum laxativum:

℞. aloës,

myrrha,

gummi ammon. a ʒß.

croci.

caryophyll. aa. ʒiß.

rad. helleb. nigri crud. ʒiij.

pulp. colocynth. num. i.

pulverisatis gros. modo adde

Θʒri ʒiß. ad ʒij.

Affunde vini spiritum non dephlegmat, q. s. digerantur per diem & amplius. Nunc

℞. Θʒci depur. aa. cum Θʒri.

addatur istis & parum V non dephlegmati, saltem q. s. ad solvenda salia, digerantur, filtrentur.

Dosis 40. Tropffen.

Quò etiam pertinet essentia myrrhæ, essentia absinthii, vincetoxici, præsertim ex succis spissatis cum spiritu cochlear. paratæ.

Quod si in hujusmodi chronicis affectibus subinde obstructions revera tales, tam mesenterii, quàm lienis ac hepatis, ac inde supervenientes tumores duri ac scirrholi deprehendantur, nascuntur pariter hi ipsi ex acido viscido, cujus hostili præsentia stringuntur fibræ, clauduntur pori ac ordinarius fluidorum transitus plus minus impeditur, unde Hippocratis Magni lienes & tumores viscerum superveniunt. Reverà ex talibus præsertim mesenterii obstructionibus ac tumoribus, subinde oriuntur aut saltem pertinaciter foveantur chronici morbi, mirabilibus ac subinde difficulter explicabilibus symptomatibus, iisque quotidie variantibus, stipati. Et quidem mesenterium, si quadam in parte affectum sit, difficulter cognosci potest, cum in profundo ferè situm est, supervenire tamen solet aliqualis, mollis tamen, & sine fluidi contenti indicia, abdominis tumor, excreta alviliquida, subinde varia, dolor obscurus, interdum plus minus gravativus in profundo abdominis percipitur, & agri successivè emaciari videntur, nec nisi, ubi longius processerit malum, tactu tumor renitens tandem cognoscitur, imò interdum vix ante cadaveris apertionem observabilis est.

Lienem verò aut hepar si affligant obstructions & tumores, dolor gravativus, simulque obtusus plus minus tensivus, in eorum regione percipitur, interdum quoque, si majores sint, tactui patent dolores punctorii, item vagi, nunc distendentes nunc denuò evanescentes, nullo modo his visceribus conveniunt,

(Aa 2)



niunt, sed intestinorum sequuntur affectiones. Aegrorum talium floridus faciei color perit, ac splenetici, obscuro, lividi, & quasi plumbei, apparent. Hepatici verò ad vitiosam flavedinem ferè declinant; urinæ crudæ subinde variantes excernuntur, exque ferè pauciores; tandem tumor hydropicus sæpissimè vitæ finem imponit. Deteriora hæc sunt mala, si lien affectus hepar in sui consortium traxerit; cum omnis ex splene refluxus sanguinis immediatè petat hepar. Recentia hæc mala, ac inde successivè succurrentes chronici morbi, nunc hypochondriaci, nunc scorbutici affectus symptomata, imitantes, adhuc curabiles sunt: magis verò confirmati, ac præsertim, ubi jam in scirrhum abierint tumores, incurabiles existunt.

Curandi ratio ex suprâ dictis sponte patet, nempe per interna acidum corrigentia, humorem stagnantem plus minus viscidum incidentia & resolventia, & per epicrasin evacuantia, primatum ducunt: quibus & externa emollientia ac attenuantia socianda. Martialia ergo ante perfectum scirrhum sunt optima; hinc enim aquæ Martiatæ tumentes lienes absumere dicuntur: sed ubi ad scirrhum degenerant, nocent plurimum Martialia. Rationem eamque satis exactam suggerit Tachenius in *Hippocr. Chymico Clav. pag. 181. & 188.* hinc gummata, præsertim gummi ammoniacum & galbanum, & plura alia, ex his concinnata remedia sunt optima: item tinctura tartari, spiritus tartari, ac alia quævis salia volatilia, sed patienter & crebrius usurpata. Hinc quælibet vulgò aperientia dicta, v. g. cortices ligni fraxini, scolopendriæ, ceterach, filix, absinthium, rhabarbarum, marrubium, quælibet antiscorbutica & similia, aliàs aperientia, item hepatica, vel splenetica dicta, locum inveniunt; cum quoad rem facti seu experientiam omnes conveniamus, saltem quoad theoriam, seu experimentorum per causas scrutinium, differamus.

Externè conveniunt tales partium abdominis tumores, plus minus scirrhum minitantes, emollientia gummata, in specie ammoniacum, galbanum, sagapenum, bdellium, & similia. Jungantur his vegetabilia ad narcoticorum naturam proprius accedentia, v. g. nicotiana, cicuta, hyoscyamus &c. exque iis parata emplastra varia, splenetica dicta, quæ ut plurimum fiunt ex gummi ammonico, galbano, sagapeno, &c. cum succis plantarum appropriatarum, nempe cum succis nicotianæ, mandragoræ, cicutæ, bryoniæ: radicis cucumeris agrestis & similibus. Imò ipsum opium pro talibus emollientis tumoribus duris scirrhosis partium abdominis, quibus & alia istis tumoribus appropriata socianda sunt: videatur Döring. *Tract.*

de Opio c. 5. Hinc emplastrum de nicotiana est egregium: c. g.

℞. *Extract. nicot. per decoct. par. p. iij. opii in extract. redact. p. j.*

Cum terebinthina, oleo nicot. & pauca cera.  
f. Emplastrum.

Zwelfserus egregium cataplasma ad scirrhos lienis ex nicotiana describit in *Pharm. Reg. ult. editionis p. 312.* hinc etiam in officinis prostant unguenta & emplastra splenetica. Convenienter etiam usurpatur emplastrum splenicum Aquapendentis ex part. ij. gummi ammoniaci in aceto soluti, parte j. succi nicotianæ, part. ʒ. resinæ & terebinthinæ & succi ebulli, cum oleo cappatum & sufficiente quantitate ceræ mistis, paratum: Item emplastrum de cicuta cum ana gummi ammoniaci in aceto destillato soluti mistum, quod super alutara inductum, & applicatum parti dolenti, non est inconveniens, malaxatum cum oleo succini.

Profunt præterea emplastra alia de ammoniaco parata: item emplastrum Heurnii, ex cicuta & gummi ammoniaco, quod describit Sennertus in *Praxilib. 3 p. 4. c. 6. p. 492.* malaxatum cum oleo Philosophorum, succini, &c. Pertinet huc emplastrum Sennerti de cicuta, quod in omnibus tumoribus abdominis est egregium.

Facit huc etiam emplastrum carminativum Sylvii in *Praxi lib. 1. c. 14. §. 58.* quod in se etiam egregium est in hujusmodi affectibus, ubi externâ opus est applicatione.

Item emplastrum de ranis cum Mercurio Vigonis dictis in casibus, irritis sæpè aliis, est egregium, qualia etiam variis scirrhosis huic inde abdominis tumoribus commodè applicarivalent: Vel ad liquefendam & emolliendam pituitam viscidam:

℞. *Gumm. ammon. in ʒto squill. solut. ʒj. tacamahac.*

*emplast. de mucilagin. aa. ʒʒ.*

\*ci ʒiij. vel ʒiij.

M. lento igne coque in consistentiam emplastri: S.

**Erweichend- und zertheilend Pflaster.**

℞. *Empl. de ran. c. ʒio ʒj.*

*gumm. ammoniac. in ʒo solut. & insp. ʒʒ.*

*opii in aceto sol. & inspiss. ʒʒ.*

M. f. Emplastrum.

Malaxetur cum ʒo destillato juniperi vel Philos.

℞. *Empl. de hyoscyam. ʒʒ.*

*g. ammon. vel galban. ʒij.*

M. f. Emplastrum.

Malaxari possunt talia emplastra usustempore cum ʒo, destill. succini, vel quod melius, utut ingrati fœtoris, ʒo destillato gummi ammoniaci, aut oleo ʒi. In tumoribus duris, & ad scirrhum inclinantibus etiam oleum Philosophorum, saponis, vel ceræ potest recipi.

Ante

Ante vero horum applicationem non incommodum fuerit, præmittere inunctionem partis cum oleo laurino, nicotianæ, &c. cum oleo destillato philosophorum vel gummi \*ciætido permistis: item unguentum Martiatum purgans commodè adhiberi poterit, dictis oleis dilutum.

Bartholetus *tr. de respiratione* commendat sinapismum humidum, quæ utitur in lienis infarctu & ejusdem induratione: Fit nempe ex sinapi cum ☐a contuso & applicato instar cataplasmatidis: Non est inelegans; nam volatile urinæ potenter penetrat, unitum cum sale volatili sinapi seminis.

## SECTIO XIV.

DE

### RESPIRATIONIS VITIIS.

#### CAPUT I.

De

#### *Inspiratione læsa.*

**A** Eris in pulmones dilatatos susceptio seu inspiratio læditur: quando omninò cessat & aboletur, seu plus minus deficit, seu suffocatur, uti fit in suffocatione dicta.

#### ARTICULUS.

De

#### *Suffocatione.*

**A** Bolitz respirationis seu suffocationis plus minus imminentis causæ sunt multiplices, ex triplici tamen hauriendæ fonte, quatenus respiratio seu aëris admissio & reciprocatio tollitur: vel

- I. Vitio viarum, Aem non transmittentium, ut palati, gulæ, laryngis: vel
- II. Vitio pulmonum vitiosè constitutorum, & Aem extrinsecus irruipientem non admittentium: vel
- III. Vitio musculorum & nervorum ad respirationis negotium requisitorum, thoracem & consequenter pulmones & alias partes non legitimè dilatantium ac moventium, & ita Aem non sufficienter impellentium.

#### MEMBRUM I.

De

#### *Suffocatione à viis interclusis,*

in specie de

#### *Strangulatis & submersis, & ineptè deglutitis.*

**Q**uod attinet primam causam, nempe vias clausas, non admittunt hæc Aem, quando eas vel extrinsecus aliquid angustat vel intrinsecus iisdem adhæret.

Extrinsecus sese offert in specie strangulatio, quæ à laqueo injecto angustantur fauces & bronchia, & constricta larynge intercluditur omninò Aë transitus; quod fit in suspensis: in quibus notandum, quod subito si stringitur laqueus, & angustantur vasa sanguifera,

in momento omnis sensus & motus pereat, in specie sensus.

Ratione causæ externæ fit etiam suffocatio sæpè ob submerfionem in ∇m, præsertim quatenus aqua replet fauces & laryngem, partim quatenus impeditur Aëis admissio: Nam ii, qui intereunt in aquis, partim intereunt propterea, quia non possunt attrahere Aem, partim quoniam ∇ frigida pulmones vel replens vel sanguinem præsentem coagulat, ut suffocati intereant.

Porrò ad angustationes viarum pertinent tumores in & circa collum, strumæ internæ, inflammationes internarum partium ad fauces pertinentium; sive sit inflammatio; sive tumor faucium, tonsillarum, &c. sive sit inflammatio ac tumor musculorum laryngis & gulæ in angina; sive sint alii abscessus & tumores, in vicinia laryngis geniti, qui omnes laryngis dilatationem impediunt, & angustationes desperatas atque suffocationem inferre possunt.

Pertinent huc varia & multa ingesta, quæ vel quacunque ratione in faucibus, sive in capite œsophagi ratione nimix molis, sive in larynge, hærentia occasionem præbere possunt, quò minus aperiri queat laryngis rimula, unde necessariò sequitur suffocatio. Tales sunt boligrandiores, qui uti implent fauces, & obstruunt bronchia, sic necessariò inferunt suffocationem, si non occurratur talibus: dum v.g. Bartholinus *cent. 1. hist. anat. 11.* ex subito deglutitæ linguæ bubulæ frusto suffocationem subitam notavit: sic Forestus *l. 15. observ. 28.* refert non nulla talia exempla ex comestione bolorum majorum suffocatorum, ut quidam ex frusto carnis fumo indurata in gula hærentis; quidam ex frustis pomorum non ritè masticatis, suffocatus ferè fuerit; alius ex frusto tabaci, &c. Pertinet huc inepta deglutitio rerum majuscularum, vel epiglottide nimis elevata in asperam arteriam irruipientium: quale quid inter ridendum & loquendum deglutientibus interdum contingit, indeque unum vel alterum arteriæ asperæ ramum obstruentiū, & suffocationem inferentium: hinc

(Aa 3)

suffo.

suffocatio à deglutito phasculo in asperam arteriam illabente refertur in *M.A.N.C. ann.2. obs.153. p.240.* Sic Schenkus *l.2. Obs.* refert de matrona nobili, sumptura pilulas, quarum unam in asperam arteriam attraxit, & inde terè suffocata fuit. Plura videb. *l.4. & Marcelli Donati histor. medic. mirabil.* In genere quicquid laryngis & epiglottidis motum debitum ac dilationem impedire potest, suffocationem minatur; unde etiam pili epiglottidi casu involuti strangulationem inferre possunt. Confer Forestus *l.15. observ.29.* vid. Bartholinus *Cistâ med. p.524.* sic ex uvæ acinis alii suffocati fuerunt: suffocationis ex pyro crudo improvidè deglutito mentionem facit Rhodius *Observat. p.92.* Sic ex musca in fauces involante Hadrianum Pontificem suffocatum historia tradunt. Facit huc etiam polypus narium, ubi caro fungosa nimis excreescens non tantum nares obstruit, sed interdum quædam crura in fauces protendit; unde non leve suffocationis periculum imminet: Sic à struma, internè circa jugulum abscondita, suffocationem observat Platerus *l.1. observ.172.* Pertinet huc rarus casus, dum ex prolapsu palati repentinam & periculosam suffocationem imminere notat Tulpus *l.1. observ.38.*

#### DIAGNOSIS.

Quoad signa: suffocatio si oriatur à viis interclusis, res est facilis, & per se patet.

#### PROGNOSIS.

Prognosis sub aquis suffocatorum omnium optimè explicat Albinus *in tr. peculiari:* Nempe spes restitutionis deficit,

1. So sie durch die Nase oder Mund bluten. 2. So sie den Mund / wie die Sterbenden / offen haben.

#### C U R A.

Quoad curam: variat hæc pro causarum antecedentium ratione.

Scilicet impedimentum ex viis est auferendum: sic v.g. suspensis laqueus solvendus, vena secanda, frictiones artuum instituendæ, mola liquida infundenda, in loco calido seponendi: Conf. methodus revivificandi ludricò vel seriò suspensos in Wepffero, *tr. observationum de loco affecto in apoplexia p.182.* ubi elegans refert exemplum de ancilla, quæ per unum diem suspensa fuit Oxoniæ: item Bartholinus *cent.2. epist.96. p.717.* Horstius *l.2. observ.9.*

Sub aquis suffocati, ut ex orci faucibus revocentur & restituantur, docet Helmontius *tr. demens idea §.50.* item Bartholinus *cent.6. histor.68.* Nempe elatis pedibus inclinato corpore concutiendi sunt, ut hausta & effluat maturè; vel reponantur supini inclinato capite percutiendo pedes. Hisce encheiresi-

bus addatur methodus Borelli, qui suffocatorum talium cordi panis assati micæ & calidè imbutas admoveat easque sæpius repetit; & hinc, ubi reviviscere, incipiunt agri, pro alteratione corporis interna corrigenda, propinentur sudorifera spirituosæ; vel imitemur Forestum *l.15. observ.26.* propinando calidè decoctum florum chamomillæ in cerevisia factum, evocando in lecto sudorem; qui ipse etiam *c. l.* puellam duorum annorum in vomu saponariorum delapsam ferè morituram leni vomitu curavit. Plura de submersis conf. *M.A.N.C. ann.6. & 7. observ.20. p.30. observ.75. p.104. obs.76. p.108. observ.89. p.129. observ.125. p.162. & observ.130. p.173.*

Quando in faucibus hærent boli, istorum descensus promovetur concussione in dorso, ubi est via œsophagi, ac propinentur lubricantia, ut amygdalarum dulcium, in appropriata, & mucilago seminis cydoniorum. Forestus *loco supra citato* frustum carnis fumo indurata in gula hærens lenta deglutitione cassæ, cujus beneficio lubricatum fuit œsophagi iter, ad ventrem promovit: sic suffocationem imminuentem ex frustis pomorum non ritè comminuti per lam bitionem oxymellis squillitici, incisis sic frustulis, & spontè ad stomachum delabentibus.

Præ cæteris observatum est à Foresto, quod ex potu & fauces ferè occlusæ, exhibitâ mucilagine seminis cydoniorum lambendo deglutitâ, curatæ sint: Vel in graviore malo imitemur Platerum *Observat. p.386.* qui ex ossiculo gulæ infixio, unde dolor, & ardor, & per consensum laryngis spiritus angustia, per cataplasma maturans & suppurans applicatum, facta suppuratione & cum pure ossiculi excretionem procuravit. Si hoc non potest fieri, maturè res est extrahenda instrumento chirurgico, vel promovendus est vomitus artificialis successivè medicamentum lambendo, vel vomitus naturalis digitis provocetur. Si res deglutita hæreat in larynge, aut bronchiis asperæ arteriæ, maturè excitanda est tussis, vel promovenda violenta sternutatio, ut sic ista res ejiciatur ab irritatione, & provocetur vomitus, ut hujus conatu ejiciatur res per fauces.

## MEMBRUM II.

De

### Suffocatione ex gas variarum rerum.

Secunda suffocationis plus minus imminens causa est in pulmonibus infarctis, aut sem irrumpentem sufficientem non admittentibus: quo pertinet non tantum varius mucus viscidus pulmonum bronchia oblidens, ut in asthmate confirmato; item excrecentiæ in pulmonibus natæ & introitum impe-



impedientes. In specie tamen subitanea suffocatio interdum imminet vitio pulmonum, quando sanguis quacunq̃ ex ratione vitiosè stagnat, & serum impeditur in pulmonibus, eoq̃que nimis replet, & ita respirationis negotium insigniter impedit, ut angustia tales suffocantes consequantur: sic Panarollus *Pent. 1. observ. 13.* exemplum habet suffocationis ortæ ex nimia sanguinis abundantia, & ita nimia venarum turgescencia à sanguine copioso ac turgido, à quo sanguinis per pulmones motus fuit impeditus. Ad suffocationem propter pulmones eventientem etiam referri solent istæ frequentissimæ, quæ ex exhalationibus seu gas sylvestri, ut rectius vocat Helmontius multi ac cerevisiarum, aliorumque liquorum fermentantium & effervescentium, ac parietum recentium à  $\Psi$  recenter incrustatorum, animalibus imminet: Item quæ ex inspirato fumo carbonum accensorum, item ex gas metallicis in metalli fodinis originem ducunt: Item quæ ex puteis & cryptis sub terraneis, latrinis diutius oclulis, ex fornicibus lithanthracum diutius oclulis &c. subindè exhalant: quò etiam faciunt hausti odores, fumi minerales acidi volatiles, ut  $\delta$ ij,  $\Delta$ is incensi,  $\sim$   $\Theta$ i,  $\nabla$ , & similes fumi aut vapores, utpote quæ omnia subitaneam plus minus suffocationem, vel ejus saltem periculum inferunt. De gas ex effervescente musto & fermentante cerevisia suffocante res mira est; In cellis enim vinariis, quando fermentat cerevisia recens, & effervesceit mustum, si quis ingrediatur cum faculis ardentissimis, ita illas extinguit, ut ne scintilla remaneat.

Quæstio jam est: Qua ratione talia gas vegetabilia vel mineralia, seu fumi exhalantes, tam subito animalia quacunq̃ jugulent, ac ardentissimas faces extinguant? an sanguinem in præcordiis afficiendo, & ad sui coagulationem & consequenter stagnationem in pulmonibus disponendo, ita ut ægri catarrho suffocativò sanguinè intereant? an verò hi ipsi fumi & gas (altia)  $\sim$  vitales & animales afficiant? quos vel instar candelæ extinguendo, narcosi & stupore afficiendo, ad regimen corporis ineptos reddant, unde ægri quasi apoplectici intereant? Prius pro aris & focus proluxius defendit Schneiderus *l. 2. de catharrhis: c. 1. l. 2. S. 2.* ubi confirmat suam hypothesin, quod nos ipsi percipiamus, hauriendo tales fumos sylvestres, angustiam in thorace & præcordiis, & subito difficultatem respirationis, quibus perceptis non turbetur statim caput, sed prius pectus: ubi non nihil ad se redeunt, plerumque vomitu exercentur, & mucosam multa sponte vel arte ex naribus & ventriculo rejiciuntur, & in specie, quod ægros ita affectos post curationem nunc pleuritis, nunc peripnevmonia, nunc rauces, nunc febres, nunc tabes, aliaque similia symptomata,

ut plurimum cum spuma circa os, & sanguinis & pulmonum noxa nata, insecuta sint, ut etiam simul lethargus vel apoplexia invadat, aut ad se redeunt delirent interdum, non tamen esse signum prius affecti cerebri, quin potius spiritibus vitalibus, his fumis imprægnatis, ad cerebrum promotis supervenire tale symptoma, non verò proprium morbum constituere: cum quo conf. Schenkius in *Observat.* quas habet ex Paræo: posterius vero Helmontius aliiq̃ defendunt. Multi, quos inter & Marcellus Donatus, volunt imprimis affectum esse cerebrum. Fundamentum erroris est in eo, quod putarunt veteres, respiratione attrahi  $\Delta$ em in cerebrum per os cribrifforme.

Reverà ex una parte suffocationis subitaneæ, ex impedito sanguinis tam fermentativo quàm circulatorio motu, videtur species; ex altera tamen parte affecti sunt  $\sim$  animales, & consequenter systema nervosum. Et reverà apoplexiam, & quidem positivam, prout Helmontius eam in *tr. de Lith.* distinguit, refert symptomatum concursus, cum apoplecti corum instar & jaceant, atque in vitam revocandi sint ægri: Nempe, sicut gas tale in momento mirabiliter extinguit ignem quemcunque candelæ aut facis, ut ne scintilla supermaneat, destruendo activitatem  $\sim$  seu salis nitro- $\Delta$ ei, à quo conservetur  $\Delta$  & flamma; ita simili ratione tale gas inhibet alterationem sanguinis ab  $\Delta$ e inspirato, beneficio illius  $\Theta$ is inducendam, unde subitaneo fermentationis sanguinis defectu universum spirituum, tam vitalium quàm animalium, systema turbatur, & in fonte quasi eclipsin patitur; simul tamen certo stupore afficitur, & narcosi quasi papaverinâ inquinatur. Illustrant hæc ea, quæ in specie habet Mayow *tr. de nitro &  $\sim$  nitri  $\Delta$ ec. 7. & 8.* & Boyle in *suâ machina*; parilem nempe  $\Delta$ is ad  $\Delta$ m & vitam animalium esse necessitatem: & uti  $\Delta$ is alteratio aut defectus subito  $\Delta$ em extinguit; ita etiam vitam tollit: quod cum fiat ob  $\Delta$ is vitium, reverà ob respirationem plus minus viciatam tales ægros simul lædi apparet. Percipiunt tales ægri angustiam præcordiorum quasi suffocatoriam mox in principio, non quasi  $\Delta$ e crassus pulmones nimis repleat, aut ex crassitie respirationi ineptus sit; sed mox videntur extingui  $\sim$  animales, & suffocari taliter affecti; quoniam ex hostili præsentia  $\Delta$ is vitiati inspirati pulmones & thorax se stringunt, ac minus pro admittendo  $\Delta$ e sedilatare volunt; hinc mox sub primo talis  $\Delta$ is inspiratu pectoris angustia: vitiato postmodum sanguinis fermentativo motu, ac superveniente hinc spirituum vitalium subita eclipsi, adeoque syncope, etiam spirituum animalium deficientia in motu, indeque vertigo, sensus & motus abolitio oritur, propter interruptum summè necessarium

rium radiosum spirituum nexum, pari ratione atque suspensis eo ipso, quo constringuntur carotides, mox eadem symptomata superveniunt propter interceptam spirituum continuitatem. Interim tamen adhuc dubium restat: quomodo hic gas inspiratus sanguinem in pulmonibus atque ~ animales alteret? Sanè gas hunc motum fermentativum sanguinis, instar motus  $\Delta$ ei, mox extinguere, ~ animales figere, manifestum est: sed quâ vi hoc præstet? quæritur; nam sanguinis coagulatio, quam alii hîc incusant, minus satisfacit. Sanè gas ista omnia sunt naturæ volatilis  $\Delta$ ex, unde obtundunt & hebetant vim  $\Theta$ is nitro- $\Delta$ ei, à quo ut conservantur flammæ, ita conservatur fermentatio & spiritus ascentia vitalis in præcordiis. Quod gas tale sit quodammodo de natura  $\Delta$ ea, patet ex carbonibus, quorum incensorum  $\Delta$ , minerali simillimum, beneficio lixivii & alcali fixi eliciendum, dissolutum exhalans gas hoc constituit. Ita gas metallicum aut minerale, fossiles inquinans, præter odorem  $\Delta$ eum, quem spirat,  $\bigcirc\bigcirc$ ilis ab omnibus dicitur esse naturæ, quod  $\bigcirc\bigcirc$ crudum & volatile metallorum  $\Delta$  est.

Quod denique gas ex cerevisia vel musto, aliisque liquoribus fermentantibus, exhalans etiam sit  $\Delta$ ex volatilis naturæ, patet ex affectu inebriativo, soporoso & carotico, quem infert ægris, quasi spiritu vini uberius se ingurgitassent. Ab hoc sulphure volatili etiam vis narcotica gas horum inspiratorum deducenda videtur, siquidem & narcosis opii in ejusdem  $\Delta$ e volatili fundata est; sicuti tales per gas exhalans affecti; non secus ac affectus per opiata nimia inducti per castoreum curantur. Hæc demonstrant, quod ejusmodi gas polleat vi  $\Delta$ ea stupefactivâ, unde partim apoplectici, partim suffocati intereunt tales ægri, & magis sunt affecti ~ animales.

#### C U R A.

Contra hæc mala, vel imminetia, vel etiam jam affligentia, nempe contra gas aut tales fumos inspiratos, duo primatum obtinent: nempe acetum & castoreum.

Talibus ergo ægris, præmisso in specie vomitu, idque eò potentiori, quò magis caroticorum aut apoplecticorum instar jacent, infundatur + & cum aceto quocunque parata remedia; idque cochleatim: vel etiam acetum castoreo mistum, vel + infusionis castorei, dicto modo usurpatur. Non autem convenit in suffocatione à gas minerali, sed tantum vegetabili: scilicet, ubi haustum gas sylvestre, & malum gravius, infunduntur vomitoria liquida commodè cum spirituosis, cum ~u theriacali, simplici aut camphorato, aut aqua apoplectica, aut essentia castorei, aut similibus mista; ut simul extinguatur gas malignum & ejiciatur: nam mirum est, quan-

tum excitentur ægri per vomitoria; simul etiam sternutatoria insufflanda sunt naribus. Item in  $\Delta$ em exportandi sunt ægri, os diducendum, continuo ventus faciendus, facies crebrò  $\nabla$  frigidâ adspargatur, hinc acida & castorina conducunt. Castoreum enim conveniens est in corrigenda cruditate & virulentia opii, in quo est tale  $\Delta$  narcoticum, ut in  $\Delta$ e carbonum, & in effervescentium vegetabilium fumis & vaporibus: similiter incidit sanguinem congrumatum: copioso enim sale volatili est imprægnatum: v.g.

℞.  $\nabla$  Hyssopi  $\zeta$ ij.

+i theriac.  $\zeta$ ß. vel  $\zeta$ vj. ad  $\zeta$ j.

castor.  $\zeta$ ß. ad  $\zeta$ j.

M. D. S.

#### Haupt- und Luft-Träncklein.

Cochleatim assumatur, præmisso vel subsequente vomitu.

An larga V.S. conducat ad imitationem Panarolli? ferè dubito; nisi forsitan in plethoricis aut obesioribus, in quibus naturâ tardior est sanguinis motus, pro quo melius promovendo locum invenit: Plura de his videb. in Sennerto l.i. *Præcos, ubi de caro p.656.* item Schenkio ex *Parao p.217. l.2. Observat.*

### MEMBRUM III.

De

#### Suffocatione convulsiva.

**T**ertia denique causa suffocationis hæret in nervis & motu spirituum animalium, non moventibus musculos, thoracis aut laryngis motui dicatos: Hinc etiam forti apoplexiâ tacti non tantum instar strangulatorum suffocati intereunt propter deficientem thoracis & pulmonum motum; sed præterea quoque in syncope & similibus pathematis, deficiente sanguinis & spirituum in pulmonibus motu. Tandem propter nervorum cessantem motum ex spirituum animalium defectu lethalis suffocatio supervenit, quando ex resolutione nervorum paralytica cessat partium respiratori inservientium motus; e contra suffocatio imminet ex spasmo aut convulsione musculorum & nervorum, respiratori inservientium: v.g. dum mulieres hystericae, aut viri hypochondriaci interdum suffocari videntur, in quibus nervi paris vagi ac intercostales spasmo affecti; qui, uti omnia viscera interna abdominis, ita in specie musculos thoracis ac laryngis constringunt: percipiunt enim tales ægri angustias faucium, quasi laqueo strangularentur, idque ex convulsione seu spasmo musculorum laryngem imprimis, & hinc diaphragma moventium, quibus convulsis larynx stringitur, & epiglottis clauditur, unde tales ægri plus minus suffocantur; quæ strictura nihil aliud est, quam convulsio musculorum & partium nervosarum.

Quod

Quod talis suffocatio immensitas ex nervis, rectè Willisius in *Anat. Corpor. c. 10. & in Description. Nervor. c. 26.*

Nec solus Willisius statuit hanc convulsionem, sed reperitur etiam in Solenandro *Conf. 24. de difficili & periculosissimo affectu in musculis laryngis & aspera arteria, ubi sæpius imminerebat suffocatio, idque ex convulsione laryngis, uti similiter singularem laryngis convulsionem, & inde natam suffocationem, habet Bartholinus Cent. 4. Epistol. 77. p. 454.* Pertinet huc, quando ex venenis nonnullis assumptis, in specie ex fungis, ob id dictis stragulatores, quemadmodum prostant exempla, subinde oritur suffocatio: Nam & hæc similiter ex affectis nervis, indeque laryngis & diaphragmatis convulsione oriri probabile est. Facit huc etiam singularis *Observatio Plateri in lib. 1. Obs. pag. 171. de imminente suffocatione ex coitu, de rustico aliàs robusto & sano, qui, quoties cum muliere rem habuit, semper in suffocationem quasi lethalem incidit: imò ipse aliquando fuit in hac domestica adeò sedulus, ut in ipso actu animam exspiraverit. Notum namque est, quod coitus rectè appelletur epilepsia parva, propter quasi convulsionem quandam in tali actu, quo afficiuntur nervi; unde ex simili convulsivo affectu nervorum, thoracem moventium, talem suffocationem in coitu natam fuisse, probabile est.*

### DIAGNOSIS.

Signa sunt petenda ex eo, quod simul alia coincident symptomata, quæ mulierem vel hystericam vel matrem hypochondriacum ostendunt: item, quod huiusmodi suffocationes paroxysmatim repetant, nec continuò affligant, ex levissima causa redeant, & sine materæ cujusdam sensilis excretionem denuò cessent.

### C U R A.

Pro cura talis suffocationis convulsivæ in paroxysmo eadem in genere conveniunt remedia, quæ in passionibus hystericis, aut affectibus epilepticis in usu sunt: quæ inter eminent, castorina & Æia volatilia, in specie liquor C. C. succinatus, Æia ammoniaci simplex & anisatus, Æia volatile succini, atq; etiam Æia destillatum succini, item Æia volatilia cum camphora, & ipsis sociata opiata: uti videbitis in Willisio *de morbis convuls. p. 214.*

℞. Aq. Mentb. vel pulegii l. alius appropri. ℥ij.

ess. castor. ℥ij.

opii ℥b.

~ Æia ℥ij.

M. D. S.

Sindernd Rufft-Träncklein.

℞. Aq. Mentb. ℥ij.

~ Carmin. de trib. ℥ij.

Tom. II.

lapill. & præp. ℥b. vel ℥ij.

laudan. hyst. ℥b.

℞. cort. aur. ℥vj. M.

Sin ex fungis sit malum, horum Alexipharmacum est oxymel squilliticum, vel solum vel cum theriaca propinandum, præmissio pro circumstantiarum ratione vomitorio. *Conf. Timæus von Gildenflee in Cas. pag. 311. item Panatollus Pentec. 3. Obs. 45. aliq; Conveniunt etiam ~uola camphorata, ~theriacalis camphoratus, &c.*

## CAPUT II.

De

### Respiratione Depravata.

**L**æditur respiratio, quando eadem depravatur, ita ut nimis crebra, difficilis, laboriosa, ac non rarò cum insigni conatu & anxietate, ac in qua subinde imminere videtur suffocatio, perficitur, nempe in Dyspnœia, cujus primus gradus dicitur aliàs Anhelatio simpliciter, & fit, si ægri frequentius & crebrius respirant, qualis respiratio eorum, qui diuturno cursu defatigati sunt. Secundus gradus dicitur Anhelitus asthmaticus, si frequentia ac summo cum labore respiratio ducitur, ut nisi fiat, suffocatio imminet: qui ubi adeò ingravescit, ut ægri non possint amplius supini jacere; sed coguntur erecti respirare, sublati alis & admodum expanso pectore, oritur tertius & deterrimus gradus, qui orthopnœia vocatur: de quorum orthopnœicorum erecta respiratione Helmontius *Tr. Tussis & Asthma, item Catarr. Deliram. §. 45.* Nam simul ac tales orthopnœici incumbunt in dorso, imminet suffocatio: simul ac verò erecti respirant, levamen percipiunt. Omnia autem hæc in genere asthmatis nomine vocabo.

## ARTICULUS I.

De

### Asthmate.

**H**istoria asthmatis hæc est: scilicet adest in Homni asthmate respiratio frequens, eaq; laboriosa & difficilis, cum anxietate circa præcordia, ut anxiosi nesciant, ubi levamen possint percipere: adest sæpè tussis, interdum crebra & molesta, interdum non, interdum adest stertor, interdum sine omni stertore orthopnœia laborant.

### PARS AFFECTA.

Subjectum & pars affecta sunt pulmones.

### C A U S A E.

Cum autem asthma sit multiplex, ideo causa proxima omnis dyspnœiæ & orthopnœiæ

(Bb)



pncipia est deficiens admissio & reciprocatio  $\Delta$ is, propter expansionem & constrictionem vesicularum plus minus deficientem, quæ insigniter impedita respirationem tollit, & hinc anxietatem & angustias, ut & suffocationis periculum infert; siue pulmonum, siue thoracis, siue aliarum partium impedimento hoc ipsum eveniat.

Veteres, multique ex modernis, unam saltem asthmatis speciem sibi concipiunt, ab obstructione & compressione bronchiorum dependentem; & si sine manifesto pulmonum infarctu asthma contingat, vaporibus & flatibus, ab aliis visceribus adscendentibus, hoc tribuunt, sicut Silvium quoque egisse, ex scriptis ejus constat. Pro diversa tamen causæ morbosæ natura, ejusque diverso situ, Helmontius *Tr. Tussis & Asthma* §. 18. asthma dividit in humidum & siccum, Willisius *in Pathol. Cerebri* in pnevmonicum & convulsivum; imò ex his duobus mixtum addit: vid. *Pharm. Rat. P. 2. h. 1. c. 12*. Melioris ergo doctrinæ gratia in genere secundum citatos hos autores, qui primi nobis in hoc puncto oculos aperierunt, dividam in humidum & siccum, seu, ut aliàs vocantur, in asthma manifestum & occultum: asthma humidum seu manifestum est istud, quod à materia quadam vitiosa fovetur, ut ab ejus præsentia, motu ac occasione oriatur, ab ejus verò excretionem, aut vomitu, aut quocunq; modo facta remotione & promotione, idem cessat. Inde etiam tale asthma humidum frequentius conjuncta habet tussim, simul stertorem, expectorationem & sreatum. Dantur tamen etiam asthmata humida, ubi nec tussis nec sreatus adest, sed conqueruntur de difficili anhelitu interno, interdum certis quibusdam paroxysmis exasperatur. Asthma verò occultum seu siccum est, quod citra præsentiam talis materiæ, frequentissime ex sola convulsione partium, thoracis & pulmonum motui inservientium, in specie diaphragmatis, oritur, unde & sine sensibilibus materiæ excretionem cessat.

Primum asthma, manifestum seu humidum ratione foci & loci morbofi, est duplex: nempe oritur interdum ex pulmonibus, hinc asthma pectorale; interdum, ex stomacho & primis viis, estque stomachale. Asthma humidum, quod fit ex vitio pulmonum, est multiplex: frequentior causa est mucus crassus viscidus, tenax & mucilaginosus, quem alii vocant pituitam viscidam, nunc  $\Theta$ us, nunc acidus, nunc insipidus, ex deficiente naturali, & depravata præternaturali, pulmonum nutritione natus, qui ipse successivè in proprio pulmonum parenchymate, maximè in bronchiis eorum, coacervatus & hærens, non raro impedit  $\Delta$ is ingressum & egressum, & ita vitia pulmonum dilatationem & constrictionem; vel pus in vomica, abscessibus pul-

monum, empyemate, phthisi; vel serum copiosius inundans pulmones; vel sanguis in motu per pulmones plus minus impeditus, vel ob abundantiam, vel ab acido coagulationem, vel ob nimiam turgescientiam & quasi ebullitionem, vel ob vitium cachecticum. In stomacho & in primis viis est vitium, si mucus crudo & inde natis flatibus obsideantur; item si ac hydrope abdomen nimis occupetur.

Siccum seu occultum asthma fit vel ratione conformationis ingibbosis; item ob cruda tubercula, grandines, calculos, &c. bronchia obsidentes; deglutita pulmones obstruentia; item propter deficientem pulmonum nutritionem, indeque horum corrugationem & exsiccationem seu ratione convulsione nervorum & musculorum respirationi inservientium, diaphragmatis, laryngis, aliorumque; vel denique ratione fibrarum propriarum pulmonum nimis stricarum ac contractarum, vesicularum dilatationem impediendum; idque coincidit cum caduco pulmonum Helmontii. Specialius paulò hæc explicanda veniunt: asthma, quod fit ex vitio pulmonum, & ut plurimum intelligitur sub asthmatis mentione, est vel per epigenesin, vel per metastasin: per  $\epsilon\pi\gamma\epsilon\gamma\epsilon\sigma\iota\varsigma$  vitio nutritionis propriæ depravatæ; per  $\mu\epsilon\tau\alpha\sigma\tau\alpha\sigma\iota\varsigma$  vitio materiæ ex sanguine, vel immediatè, vel ex alio loco mediante sanguine aut lymphæ ad pulmones depositæ.

Per  $\epsilon\pi\gamma\epsilon\gamma\epsilon\sigma\iota\varsigma$  igitur fit asthma, quando vel vitio  $\Delta$ is, aut vitio aliorum inspiratorum, v. g. in metallifodinis fossoribus, vel alia quacunque ratione, irritatur larynx & aspera arteria, ita ut exinde harum partium lædatur digestio, & nutrimentum proximum degeneret in liquamen serosum mucosum, aliâque ratione corruptum. Præter inspirata etiam lymphæ consideranda est, quæ uti continuo humectat asperam arteriam, ita, si ab  $\Delta$ e inspirato aut quacunque ratione lædatur, excoarctetur, aut aliâ via vitietur, in specie, si acris,  $\Theta$ sa, aut plus minus acida reddatur, acrimoniâ suâ erodendo pulmonum teneram substantiam, nutrimenti ejus depravationem, & ita succorum crudorum ac mucilaginosorum coacervationem infert. Nempe hoc est, quod Petrus Johannes Faber *in Path.* tradidit scilicet excrementa in pulmone ab ejus alimentis sequestrata & abundantia, esse causam grandinis vel lapidis,  $\Delta$ ique coagulati, si indurescant. Quod si verò adhuc sint liquida, oriri asthmata, tussis & catarrhos suffocativos, si sc. liquidum hoc excrementum in lentam, gypseam & vitream mutetur visciditatem, verum produci asthma; hinc frequens imprimis hoc est iis, qui in mineris metallicis sunt occupati, aut qui mineralia,  $\nabla$ tes, Galia, & in specie Galia, tractant, & in laboribus Chymicis versantur;

tur ; inspiratum enim tale gas seu fumus acrior & malignus cum  $\Delta$ e ita inquinant digestionem pulmonum , ut loco assimilationis alimenti proprii hoc ipsum degeneret in varii generis excrementa : uti de hoc eleganter differit Helmontius *Tract. Tussis & asthma* §.

44. Pertinet huc etiam quæcunque materia in aut prope pulmones hærens , & liberum eorundem motum impediens , ut sunt imprimis abscessus & apostemata , vomica pulmonum , quæ ob pus genitum , vel pulmones corruptos , inferunt affectus asthmaticos. In omni pulmonum vomica difficilis est anhelitus : Vid. Poterius *l. 3. c. 27.* & Riverius *C. 1. Observ. 82.* sic Dodonæus , refert *in observat. 19.* exemplum asthmatici mortui , cujus in pulmonum inferiori sede & basi , qua septo transverso incumbit , reperti sunt abscessus duo insignes , in utraque parte unus , à quibus inundati pulmones materiâ purulentâ asthma lethale induxerunt : Vid. Hildanus *C. 3. Hist. 39.* Hinc etiam phthisici , item empyematici , ut plurimum sunt asthmatici & frequenter orthopnœiâ intereunt propter pus , quod vel in empyemate in cavo thoracis fluctuat , vel , quod unum alterumve latus pulmonum inundat.

Per  $\mu\tau\alpha\sigma\alpha\upsilon\upsilon$  fiunt humida asthma pnevmonica variis ex causis : v. g. dum febres continuæ interdum solvuntur per decubitus in pulmones materiæ in sanguine coctæ , cujus copiosâ rejectione , præsertim mediante tussi , omnia postmodum levantur mala. Quin & serum in corpore copiosius quacunque causâ occasionali retentum , ut fluxiliorem facit sanguinem , ita etiam asthma talia inferre solet : unde hinc inde observationes prostant , ex solitis feri evacuationibus suppressis obortorum asthmatum : Vid. Rhodius *C. 2. Obs. 27.* de orthopnœia ingenti , oborta ex sero sanguinis , quo pulmones & ejus circumjacentia loca repleta fuerunt : id quod patuit per solutionem , quoniam intra 24. horas fuit levata per excretionem 36. librarum  $\square x$ . Nec serum tantum , sed etiam sanguis ipse , non saltem quacunque occasione in cavum pectoris effusus , sed quacunque ratione in suo motu impeditus , ac in vasis pulmonum stagnans , aut tardius per eos circulatus , aut etiam impensius subinde ebulliens aut turgescens , asthma ac orthopnœiam inferit ; sicut gravior talis affectus dat catarrhum suffocativum ex sanguine : Conf. Willisius *Pharm. Rational. P. 2. pag. 239.* Hinc est , quod post cursum seu motum vehementiorem simus quodammodo quasi naturaliter asthmatici , quoniam sanguis per motum rapidum ac velocem per vasa motus , vix tam promptè circulari potest per pulmones ex dextro cordis ventriculo in sinistram , quin non nihil subsistat , ac in pulmonibus hæreat ;

Tom. II.

Unde videmus etiam , quod mulieribus , quibus suppressi sunt menses ; item viris , quibus suppressus hæmorrhoidum fluxus , asthma supervenire soleant ; quia in talibus sanguis copiosius retentus abundans hæret , & quodammodo circa pulmones stagnat , & non facile potest circulari. Quod verò in sanguinis menstrui & hæmorrhoidalis suppressione sæpius sit impedita circulatio in pulmonibus patet , quod talibus tam frequens symptoma est sputum cruentum seu sanguinis. Cachectici porro ad unum omnes ex levissimo corporis motu sunt asthmatici plus minus , quatenus in his sanguis crudus , ex cruditate ventriculi acida , & quasi semichylosus ex defectu digestionis primæ , diutius hæret in pulmonibus , tardiusque in iisdem movetur , propter tardiores ab  $\Delta$  : rarefactionem & alterationem propter glutinosiorem paulo consistentiam , ratione quorum non nisi lento motu per pulmones circulari potest. Unde celerius moto sanguine sub corporis motu , facilius circa pulmones subsistit , ac asthma tale inducit.

Facit huc , quod ex terrore , in quo sanguis admodum ad similem sui in præcordiis stagnationem disponitur , orthopnœia lethalis oborta fuerit : teste Foresto *C. 16. Observat. 10.* In genere quicquid sanguinis circulum circa præcordia vel per pulmones quocunque modo sufflaminat , asthma inferit ; hinc quæcunque materia , aut in pulmonibus , aut in sinistra cordis auricula coagulata , stagnans , dyspnœiam lethalem inferit : ita Riverius *Centur. 1. Observ. 82.* tale exemplum habet ex dyspnœia mortui , in quo post mortem reperta fuit materia viscida coagulata in sinistra cordis auricula , à qua impeditus sanguinis motus dedit dyspnœiam lethalem. Facit huc , quod potus subitanei frigidi post labores , aut corporis nimiam incalescentiam , aut etiam lotio corporis in  $\nabla$  frigida sub nimio æstu , asthma inferant ; quia in talibus post nimium æstum aut motum massa sanguinea insigniter attenuatur , dissolvitur , & fluxilis redditur : ex subito verò , rei imprimis frigida , vel potu , vel intempestiva applicatione , sanguis grumosior factus in pulmonibus stagnare , & ita necessario asthma inferre solet : Rulandus in *Thef. pag. 112.* refert dyspnœiam jamjam suffocantem & ferè lethalem ex haustu copiosæ  $\nabla x$  frigidissimæ , ob ingentem sitim in intenso canicularium æstu excitatam ; per vomitum  $\nabla x$  benedictæ subito restitutam. Simile exemplum asthmatis , excitati ex potu frigida , & balneo frigido , habet etiam Gabelchoverus *C. 2. Cur. 17 & 18.*

Tandem & hydrops pectoris asthma gravior inferre solet.

Ex modo dictis obiter duo observanda sunt :

1. Sanguinem , lympham , serum & materiam vitiosam quamvis in pulmonibus ,

(Bb 2)

bus, quæ asthma tale inferunt, non destillare ex capite, uti falsò putarunt majores nostri; sed omnem istam solummodò ex vasis, vel sanguifluis vel lymphaticis, eò inferri; siue fiat immediatè, siue mediatè, mediante nempe alimenti degeneratione, aut lymphæ alteratione.

- II. Asthmata hæc humida eò esse vel graviora, vel pertinaciora, quò magis materia peccans acrimoniâ suâ, aliâve pulmonibus inimicâ impressione, hos aut asperæ arteriæ ramos irritaverit, ac ita eorum fibras ad pertinaciores sui constrictiones stimula-  
laverit.

Asthma humidum vitio stomachi ac primarum viarum subinde reperitur in iis, quorum stomachus est infarctus materiâ crassâ, plus minus viscida ac mucilaginosa, &c. flatibus generandis apta: conf. Lindanus, & Gabelchoverus l. 4. *Observat.* 4. quæ ubi quacunque ratione fuerit agitata, turgescere & quasi inflari incipit, sicque gravia & periculosa admodum dat asthmata, per paroxysmos subinde affligentia; unde etiâ in tali asthma ægri conqueruntur de angustia præcordiorum sub costis nothis; partim quia nimia distensione ventriculi, à talibus copiosis succis & flatibus onerati, impedit liberum diaphragmatis motum deorsum versus, quod tamen ad pulmonum dilatationem maximè est necessarium; unde etiam tales fiunt asthmatici, imprimis post pastum, dum etiam alimenta vitiosa fermentatione turgescendo distensionem istam præcordiorum, indeque diaphragmatis motum impediunt; partim verò, quia diaphragma ipsum quodammodo simul in consensum trahitur ex irritatione stomachi, ut ejus convulsio tandem, & hinc perversus sub respiratione motus sequatur; ita ut arbitretur, plura esse asthmata humida, quæ radican-  
t in stomacho, quàm in pulmonibus. Id quod apprimè confirmat Gabelchoverus *Cent.* 4. *Curat.* 20. & *annotatione*; quod scilicet ii, qui asthma-  
ti sunt obnoxii, ferè habeant ventriculum frigidum, imbecillum & flatulentum; quoniam in talibus ex vitiata digestionem coacervantur mucilagines, & cruditates acidæ. Hoc sanè verissimum est de omni asthma humido pituitoso, tam pulmonali quàm stomachali: in talibus asthmaticis ex vitio primarum viarum sæpius etiam adsunt flatus, qui insigniter dyspnœiam intendunt. Sic qui laborant cruditate acidæ stomachi, & qui exinde originem ducunt, scorbutici & hypochondriaci, sæpius post pastum, præsertim vespertinum, difficillimam patiuntur respirationem, idque saltem vitio digestionis primæ cruditatis acidæ, indeque natorum copiosissimorum flatuum, & rejicere solent tales ægri multa viscida per os, quæ ipsa

non tam ex pectore, quàm ex stomacho, oriri solent. Confirmat hoc, quod vomitu præsentem ejusmodi asthma laborantes levamen habeant. Refert Rulandus in *Theaur. Pract.* p. 109. 112. & 120. se curasse asthma per vomitum, dum rejectæ pituitæ lentæ cum bile permixtæ sint aliquot libræ: Item Sylvaticus in *Cent.* 2. *Conf.* 49. observat asthma singulis noctibus recurrens cum suffocationis periculo, à quo non prius æger fuit immunis, quàm succederet spontè vomitus assumptorum & materiæ pituitosæ: sic Timæus in *Epistol.* p. 122. refert asthma contumacissimum, & nullis cedens remediis, vehementi tandem provocato vomitu curatum: imò, scio aliquos scorbuticos, qui, quando post pastum vel haustulum vini hauriunt, brevi fiunt asthmatici. Tale asthma ex flatibus & hypochondriacum dicitur à Riverio asthma nothum, estque mihi unum ex certissimis signis mali hypochondriaci, quando ægri à pastu, aut interdum manè, dum resupinati in lecto jacuerunt, conqueruntur de difficili respiratione propter impedimenta circa hypochondria. Hydropici denique confirmati tandem etiam fiunt asthmatici; partim propter liberum diaphragmatis motum impeditum; partim propter distentos musculos abdominis, thoracis dilatationem & sursum versus elevationem seu sublationem impedi-  
entes; partim propter copiosius retentum serum cras-  
sin sanguinis vitians, & acrimonia sua pulmones nonnihil vellicans, hinc enim & tussiculosi tandem redduntur hydropici.

Asthmatici interdum patiuntur stertorem in faucibus & tussim, & hujus medio materiæ viscidæ excretionem, qui stertor vulgò signum habetur infarctorum pulmonum: sed observavi, quod etiam in stomacho infarcto à tali muco talis stertor & tussis adfuerit. Distinctio autem facienda est stertoris: Quidam est ex pectore, si vitium hæret in bronchiis pulmonum, vel ramo asperæ arteriæ: tunc enim aer reciprocè materiam quatit & concutit, unde stertor ex profundo auditur, *sic röheln*: quidam est ex faucibus, si scilicet circa membranam pituitariam posteriorem mucus copiosus est in confinitate laryngis & epiglottidis, & quasi oblitur. Reverà ergo stertor iste omnis oritur ex lymphâ viscidiorè, ex membrana pituitaria posteriore copiosius eructata, quæ in isthmo faucium hærens, seu reciproco  
Æis motu circa caput laryngis agitata & commota, talem stertorem seu dyspnœiam superficialem infert, similem illi, qui in nocte à nobis dorso incumbentibus auditur.

Alterum asthma, siccum nempe, seu occultum ab Helmontio dictum, est istud, quando citra ullum fomitem materiale, vel materiæ sensibilis cujusdam accessionem aut recessionem aut excretionem, paroxysmus & iubi-



& subito incipit, & etiam subito cessat, non verò succellivè tale asthma mirabile, neque per expectorantia, neque per vomitoria, neque per purgantia, solet levare, sed licet videatur corpus purificatum, pertinaciter tamen persistit. Invadit nunc periodicè, nunc vagè, vel propter motum animi, ut terrorem; vel propter motum corporis, ascendendo in altum: aliquandiu durat, & cessat sine manifesta causa, iterumque advenit levissima ex causa: aegri corripuntur asthmate momentaneo, sunt aliàs sani, donec paroxysmus veniat. Varia hujus asthmatis exempla admodum curiosa vid. in Helmontio, *Tract. Asthma & Tussis* §. 41.

Convulsiva asthmata fiunt (1) vitio conformationis partium ad respirationem pertinentium; hinc enim omnes gibbosi ferè evadunt tandem asthmatici; aut etiam, qui aliàs malè conformatam spinam dorsi, qua impedit respirationem pulmonum legitimam, obtinent: Quo etiam facit sterni ac costarum notharum vitiosa conformatio, orta ex sterni cum costis ad inferiora reflexione: quale exemplum refert Schenkus in *Obs.* item tubercula aut grandines similesque variz excrecentiz in bronchiis pulmonum: Tumores scirrholi in pulmonibus: calculi item; vel intra bronchia pulmonum successivè geniti hos ipsos obstruentes, & ita liberum aëris commercium impediētes: quale asthma rarioris observationis Helmontius *l. 4. §. 43.* vocat, & inter humidum & siccum ambigens pronunciat, vel etiam extra bronchia incumbentes eadem angustantes: aut alia concreta præternaturalia, sive in parenchymate pulmonum, sive in bronchiis pulmonum hæreant; talia enim asthmata ferè continua & incurabilia inferre solent: vid. Forestus *lib. 17. obs. 10.* item Helmontius *Tract. supra citato p. 93.* sic à scirrhopulmonum asthma in *M. A. N. C. ann. 3. obs. 262. p. 474.* Schulzius. à calculis asperam arteriam externè comprimētib<sup>9</sup> asthma lethale notat Kerkringius *Spicileg. obs. 72.* Singulare est etiam exemplum Tuipei *l. 2. obs. c. 7.* de dyspnœia admodum diuturna cum tussi, orta ex putamine nucis avellanæ, capiti asperæ arteriæ inhærente. Asthmata talia vocat Helmontius sicca, & caducum pulmonum: Willisius in *Pathol. Cerebri de Morbis convuls.* c. 12. item *Pharm. Rat. P. 2. p. 240.* vocata asthmata convulsiva; quia à convulsionibus partium respirationi inservientium, à quacunque causa contingentibus, oriuntur: Lindanus verò in *Coll. Manusc.* super Hartmannum asthma tale siccum omnium optimè appellat crampam seu convulsionem diaphragmatis. Nulli tamen horum latitudinem affectus debitè exhauriunt: in genere, antequam ad specialiora transeam, dico: talia asthmata esse asthmata convulsiva. At apud

veteres altum est de his silentium quoad theoriam, utut, qui attentè Practicos legit, plurima hinc inde talium asthmatum, tam occultorum quàm manifestorum, reperiet exempla; ut in Pisone *de Morbis à colluvie serosa or. tis* p. 192. & 222. ubi talium asthmatum originem ex hypothese per serum, frustraneo tamen conatu, explicare nititur: item Platerus in *l. 1. obs. p. 170.* cum videret, quod non possit conciliari tam stupenda exempla cum infarctu pulmonum, dicit oriri ex catarrho, qui subito ex capite in pulmones & thoracis musculos derivetur: item Johannes Colle, in *Tr. Cosmitor Medicus* p. 159. Simillimum Helmontianis refert exemplum, in quo tandem nolens volens fateri cogitur, oriri tale asthma à pravo motu pulmonum & constrictione, seu à flatuum & fuliginum copia. Ipse Sylvius talia asthmata ex vaporibus & halitibus, ex intestinis oriundis & pulmones replentibus derivat. Multa exempla talia recenset Schenkus p. 234. & 237. in *obs.* Marcellus Donatus in *l. 4. Histor. Med. Mirab. l. 3. c. 12.* Riverius *Cent. 3. obs. 85.* Fonteca *l. 1. Conf. 11.* Benedictus Sylvaticus *Centur. 2. Conf. 60.* Hic Sylvaticus c. 1. simile Helmontianis habet exemplum, ubi casus est syncope epileptica, cui conjunctum est asthma non sine suffocationis periculo, aucta imprimis, ubi supinus jacebat æger, affligens propter vaporem quendam, quem sentit ex ventre inferiore ad superiora dilatatum, & ad fauces: vid. quoque *Conf. 6.* Sylvatici jam citati de palpitatione cordis cum syncope, simulque angustia & difficultate spirandi, ex vitio hypochondrii sinistri.

(2) Sunt asthmata convulsiva in specie sic dicta, quæ fiunt ratione nervorum, musculos respirationi inservientes ad spasmos & convulsiones adigentium. Facit huc difficilis respiratio in iis, qui patiuntur vertebrarum dorsali contorsionem, das Wehethun / & quasi cingulo circa costas nothas contracti, difficulter admodum respirant, propter nervos ex vertebis subluxatis prodeuntes, nonnihil compressos, & hinc sensibilius irritatos. Item pertinet huc asthma convulsivum & occultum muliebre seu hystericum, quod in viris vocatur asthma hypochondriacum: nam in hystericis paroxysmis præter varia symptomata alia, sæpius insignis est respirandi difficultas, ita ut ægræ omni momento suffocari videantur, quod tribuit Helmontius actioni regiminis uteri, in viris splenis vitiis: cum tamen simpliciter oriantur à convulsionibus, vel diaphragmatis, vel musculorum thoracem moventium, vel musculorum laryngis ob consensum nervi eò tendentis. Partes hic affectæ reverà sunt muscoli respirationi, ac præsertim inspirationi, inservientes, sive sint diaphragma, sive thoracis musculi externi, aut

intercostales; sive musculi laryngis & faucium. Exemplum tale habet Horst<sup>9</sup> l. 5. obs. 32.

Facit huc rara & notata digna Thoneri obs. l. 2. obs. 1. p. 94. Orthopnoëia cum suffocationis periculo ob fauces summè constrictas, unà cum aliarum partium vagis convulsionibus, excitatas ex vermibus intestinorum, quibus excretis Orthopnoëia & partium convulsionibus cessabant. Quando ergo jam inferunt hi convulsionem aliarum partium, certum est, quod convulsio thoracis similiter det asthma & orthopnoëiam. Vitium hic quærendum est in nervis iisque imprimis paris vagi & intercostalis. Afficiuntur autem hi nervi, vel in exortu in cerebro & cerebello circa radicem; vel in progressu circa varios eorum plexus, nunc superiores circa pectus, nunc, idque frequentius, inferiores, nempe mesentericos; vel denique in ipsis musculis, quibus inferuntur: confer. Willisius *Pharm. Rational.* P. 2. p. 241. Illustre exemplum asthmatis talis convulsivi vitio nervorum circa suum exortum affectorū, vid. in Hoboken *Anat. secund.* p. 214.

In specie cum huiusmodi asthmata convulsiva, quæ maximè ex nervis & musculis affectis oriuntur, incognita sint apud Practicos, notetur, quod multiplex admodum varietas in his observabilis sit, idque tribus imprimis ex causis:

1. Propter texturam & tractum seu distributionem planè singularem nervi intercostalis & paris vagi, qui duo nervi, cum subministrant suos nervulos in thoracem & abdomen, præsumunt movendis membris, ac partibus etiam colli, thoracis & abdominis, & ultra mirabilem sui structuram & distributionem, & pluribus plexibus hinc inde diversimodè sociantur, & hinc per consensum mutuum varios ac insignes spasmos ac motiones, etiam remotioribus in locis, excitare valent: vid. Willisius in *Anat. Cerebri*: qua ratione nephriticos quosdam difficiliore respiratione laborantes, hinc non raro asthmata convulsiva incurrere, quorum fomes latet in abdomine, ibidem afficiens nervos, ex quorum consensu thoracis pathemata, ut in hypochondriacis notum est. Adeoque minùs rectè in quovis asthma vulgò ad pulmonem saltem habetur respectus: sic enim ex rene putulento dyspnoëam lethalem *Pharos Medic.* p. 359. & p. 468. orthopnoëam insignem ex calculo renum, quo deturbato respiratio libera rediit.
2. Causa secunda est varietas musculorum duplici motui, dilatationis & constrictionis, tam laryngis quàm thoracis inservientium, & tam in anteriori quàm posteriori thoracis parte situa-

torum, unà cum diaphragmate; qui omnes cum variam structuram & distinctum motum, & hunc vel dilatationi vel constrictioni thoracis inservientem obtineant, hinc suas peculiariter habeant functiones, & suas miras alterationes, mitum non est, quin musculis affectis diversimodè, etiam functionum sequantur læsiones, & tam insignis varietas circa asthmata convulsiva observetur.

Istud verò, quod in asthma convulsivo afficit nervos, tam in eorum radice, quàm in eorum progressu, ut plurimum est acidum vitiosum plus vel minus austerum, nervis, uti notum est, inimicissimum: hinc scorbutici, hypochondriaci, mulieres hystericæ, &c. non raro tali affliguntur asthma: non secus ac ii, qui inunctionibus Mercurialibus pro cura luis quæ malè sunt tractati, aut sub ipsa cura si incautiùs se exposuerunt, his subinde nervorum impressionibus vitiosis asthmata convulsiva sunt familiaria.

Pertinent pariter huc arthritici confirmati: & in quibus vel rariùs vel difficiliùs paroxysmi podagrici superveniunt, in talibus huiusmodi asthmata solent supervenire.

Asthmata hæc convulsiva sæpiùs solent esse hæreditaria, non secus ac convulsionibus epilepticæ graviores etiam subinde sunt hæreditariæ, redeunt etiam quodammodo, sequuntur tempestatum mutationes, & ephemeridum loco ægris inserviunt, atque nunc vagos, nunc ut plurimum periodicos inferunt paroxysmos, certum tempus recursus observantes: imprimis tempore vespertino infestant, ut intermedio tempore ægri sint maximè sani, & etiam cesset sine sensibili remotione materiz. Ubi cessaverint aliquandiu, facillè per multiplices occasiones externas, v. g. per iracundiam, mutationes tempestatum, &c. recidivam incurrunt.

Tertio loco observandæ sunt pulmonum fibræ nervæ, exque propter obscurum pulmonum sensum non tam sensiles, quàm motrices, & speciatim constrictoriæ, propter quem finem & pulmo suis nervis instructus est. Fibræ dictæ prout stringuntur nimis, aut contrahuntur diversimodè, præsertim si irritatæ convellantur, vesiculas pulmonum membranaceas stringendo angustiores, & pro Ac suscipiendo ineptiores redduntur, adeoque sui strictura asthmaticum pathema inferunt.

Strictura ista pulmonum ferè est sensibilis, quâdo nempe quis odores acido Acetos, v. g. ~ nitri aut ~ accensum, vel butyrum antimonii, ~ recentem, ~ m ~ ci generosum ac similia odore tenus haurit; mox enim halitus suspenditur, fauces & thorax constringuntur, ac ~ intercipitur, quo sensu ferè conciliari potest Helmontii strictura pororum membranz pulmonis, aut saltem doctrina, quam huc superstruit

perstruit, hoc modo intelligibilius explicari potest.

Undecunque igitur irritentur, aut malè afficiantur dictæ fibræ pulmonum; siue sit acutum internum; siue externum, eas irritans, corrugans & constringens; siue sint ~metallici; siue aër externus, inclementior aut impurius inspiratus, tale asthma exinde oriri potest.

Res ut pateat, consideremus tria, quæ ad legitimum pulmonum motum, & hinc ~is reciprocationem faciunt:

1. Legitima partium mechanica confortatio.

2. Musculorum instrumentaliter motum, & nervorum, musculorum motum mediante ~uum animalium influxu dirigentium constitutio.

3. Observandæ sunt fibræ ipsæ nervæ pulmonum, tam membranæ undique pulmones cingentes, quam aliæ ad ipsas vesicas pulmonales, pro istis ritè colligendis, hinc inde dispersæ, quæ fibræ pro fibrarum natura motu saltem contractivo erunt instructæ, ad eoque constringere saltem & coarctare vesiculas pulmones, sed nulla alia ratione movere poterunt. Nempe de his fibris in Epistol. ad Amicum refert Malpighius: in pulmonibus unum observari non indignum consideratione: In ranis enim & lacertis exterius reticularis adest plexus ex carneis fibris, ita ut sit mirus musculus, comprimens singulas cellulas pulmonis; & in testudine, præcipuè interius etiam huiusmodi reticularis musculus mirus observatur: Idem etiam plexus carneus circa pulmones in reliquis perfectis animalibus patet, si extremitates lobulorum turgidæ adhuc & molles perlustrentur; tunc enim caro aliquantulum rubet & turget. Conferatur etiam, quoad has fibras, Lamsverde *Tr. de Respirationis Schvvaammerdam. Exspirat. p. 35.* ac tanè ab his fibris caduceus iste pulmonum Helmontii, vel eorum spasmus rectius derivari videatur.

Asthmata hæc humida & sicca nunc sunt solitaria, nunc subinde conjuncta, ac sanè rarum est humidum asthma, cui non subinde & convulsivum supervenire solet. Huc videtur pertinere asthma non rarum, quod insequitur suppressam aut malè curatam scabiem: vid. Hildanus *Cent. 3. Hist. 39.* ubi observavit asthma lethale ex repulsa scabie, aut etiam, quando post ulcera intempestivè clausa sequitur asthma: siquidem ex scabie retropulsa ordinariò difficultas respirationis, interdum perfecta suffocatio supervenire solet; sic Lin-

danus in *Coll. super Hartm.* ex serpigine retropulsa asthma periculosum natum observavit; & ipse etiam asthma convulsivum ex podice scabioso vidi. Malum videtur tunc esse complicatum; natum partim à fermento scabiei acri, pulmonum fibras vellicante, & ita ad fortiores contracturas stimulante; partim ex sanguinis crasi hinc vitiata, in debito fermentationis motu ac textura depravata, ac quasi cachectica reddita: v. g. sanguine à serò nimis fuso & liquato à ~ialibus, siue in unguento siue alio modo adhibitis, & tunc pulmones tum copiâ tum acrimoniâ gravante, unde & asthma pituitosum simul supervenire solet. Hinc observandum: materiam rejectam per os in asthmaticis interdum esse causam mali, nempe in asthmate humoroso; interdum verò effectum, nempe in asthmate sicco eorum, quæ constitutionis sunt succulentioris & humidioris, & quorum sanguis & lympa, mollioris quasi ac minus firmæ texturæ, alterati facilius, & in variam formam mutari potest. In talibus enim ex crebriori pulmonum agitatione, & ~is per asperam arteriam reciprocatione, subinde copiosior paulò lympa, per glandulas in asperam arteriam effusa, in mucum coit, in paroxysmi convulsivi declinatione ejiciendum. Hinc ulterius in omni asthmate, etiam humoroso, ad motum thoracis, plus minus liberum, vel impeditum, semper respiciendum: nam ratione spirituum ex irritationis cujusdam circa pulmones sensu ut plurimum in paroxysmo aliquid convulsivi concurrit, unde & pro hujus ratione plus minus malum intenditur, ac tali ex causa opiata interdum leniunt tales paroxysmos.

Notandum ulterius: quod difficilis ista respiratio, quæ tam in tussi humida in statu, quàm etiam in tussi sicca principio adest, non sit semper aut saltem non solum à pulmonum infarctu aut catharro, aut simili quodam vitio, sed frequentissimè oriatur ex irritatione pulmonum, & hinc fibrarum earum contractura, indeque impedita plus minus earum expansione. Signum mihi erat, adesse talem irritationem, quoties æger vel loquens, vel validius inspirans, tussire cogebatur: nam in talibus casibus, propter crebriorem aëris reciprocationem, irritati magis pulmones tussim concitabant magis, unde difficultatem respirationis magis ex simplici pulmonum irritatione, quàm materiæ peccantis coacervatione, ortam judicavi: hinc tali in casu ex opiat, v. g. ex ~u ~ci anisato cum essentia opii misto, semper levamen observavi; non saltem minorem tussis violentiam, sed etiam liberiores mox respirationem, vellicationis nempe sufflamminato sensu. Hinc etiam sensus doloris compressivi, siue gravativi in pectore, siue profunde pulmonum, non semper à copia materiæ, sed sæpius à fibra



fibrarum pulmonalium in particulari quodam loco irritatarum constrictione, quam compressivus ac gravativus talis dolor subinde insequi solet.

Observandum denique est hoc: quando jam tales convulsiones, vel musculorum vel fibrarum pulmonalium, dant asthmata, quòd tunc ut plurimum simul & tardior sanguinis circuitus per pulmones esse soleat, adeò ut ex impedito plus minus ejus motu non tantum insignis in præcordiis anxietas, & majus imminenti suffocationis periculum adsit: ac præterea tali in casu rubor malarum ac faciei, vasorum in collo major intumescencia, aut sensibilis etiam arteriarum pulsatio, adesse solet.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: asthma ipsum se manifestat sponte. Necesse ergo est, ut attentus sit Medicus ad cognoscendas asthmatum siccorum & humidorum differentias, quas ex plurium circumstantiarum collectione saltem sumere potest. Et quidem asthma humidum esse vel vicio stomachi, vel vicio pulmonum, cognosci potest ex causis antecedentibus, ex hypochondriacis symptomatis, & pectoralibus magis urgentibus: item si paroxysmus adsit cum stertore, aut cum tussi, aut etiam cum copiosæ materiæ in aut post paroxysmum rejectione: ita quidem, ut hoc ipsum fiat cum levamine ægri.

In asthma autem humido seu manifesto, si mucus continetur crassus in bronchiis pulmonum, respiratio est difficilis cum sonitu ex profundo, eoque stertente, & tussi, ac pituitæ plus minus copiosæ excretionem, quæ quò magis excernitur, eò magis affectus imminuitur: si verò materia peccans sit in substantia pulmonum, vix talis adest sonitus, nec nisi successivè, idque non adeò copiosè, per tussim aliquid rejicitur. Sin tamen est vitium humorale in pulmonibus, aut in ventriculo, asthma solet esse continuum, quod semel etiam curatum, antequam denuò repetat, successivi incrementi signa prodit.

Utut autem sit continuum, subinde tamen exasperatur, idque præsertim vesperi ac nocte, quo tempore omnes ægri asthma humido affecti pejus habere solent; quod tamen omni asthma ferè commune est, ut vespertino ac nocturno tempore acerbius affligat; item quod motu corporis semper exasperetur, item quod pro Æis mutationibus melius, vel pejus habere soleant ægri, signa asthmatis manifesti quilibet potest faciliè cognoscere.

Quoad asthmata verò sicca, convulsiva, & speciatim caducum pulmonis: ex eo ferè se produnt, quod non sint continua, sed interdum planè intermittant, paroxysmatim repe-

tant, ita quidem, ut subito inchoent, hinc etiam subito cessent, sine ullo fomitis materialis, vel præsentis vel antecedentis, vestigio, aut manifesta rejectione: ex improvviso enim irrumpit in ægros, aliàs optimè respirantes, atque evanescit citra sensibile respirationis nocumentum, utut debiles admodum, plus minus tamen, ægri esse soleant: saltem difficile est hariolari, ubi lateat fomes & fermentum seu spina, nervos hostili suâ præsentia irritans, & ad spasmos provocans.

Porro nullus humor, nullus stertor, aut nulla tussis, item nulla humoris excretio adest in talibus asthmaticis, utut subinde sonus coactus (*es pfeiff*) exaudiatur: quod si aliquid excernitur, aut screatu rejicitur, hoc fit in fine, & parum est; multum ut plurimum inspirant, sed parum expirant, si sint convulsi muscoli expirationi inservientes: contrarium fit in asthma humido, in quo non sufficienter possunt respirare.

Quoad signa distinctiva: si malum originem à capite ducat, adest vel antecedit vertigo, dolor capitis, sensus fluctuationis in capite & similia capitis pathemata: si verò est in abdomine, adsunt rugitus, murmura, ubi ligatura circa costas prodest.

Quod si diaphragmatis muscoli, aut loca vicina sint affecta primario, semper accedit ingens dolor instar zonæ in ista regione, ubi annectitur diaphragma costis nothis: sin muscoli thoracem moventes afficiantur, conquerruntur ægri in paroxysmo de sensu, quasi universus thorax firmiter constringeretur ac comprimeretur; *als wenn die Brust zusammen geschnürt würde.* Si laryngis & faucium muscoli affecti sint, suffocationis, quasi laqueo injecto, sensum habent ægri. Si pulmo constrictus primario sit, inexplicabile quoddam impedimentum respirationis experiuntur ægri.

Fomes asthmatis convulsivi, ubi præcisè hæreat, symptomata, vel antecedentia vel adjuncta aliarum partium, ferè commonstrant. Plura vid. in Sennerto & Riverio.

### PROGNOSIS.

Quod attinet prognosin: asthma omne tam per se, quàm in progressu morbi superveniens, semper est periculosum & grave, maximè in morbis acutis, in specie in malignis, in quibus ex funestissimis signis est.

Periculosiora sunt tamen occulta quàm manifesta; item inveterata: siue sint humorosa; nam hæc ferè insignem pulmonum læsionem arguunt: siue convulsiva; nam talia epilepticum in quodam nervorum plexu radicatum fomitem præsupponunt.

Asthma inveteratum quodcunque rarò perfectè curatur; quoniam vel levissimo dicitur errore, vel alio peccato, subinde recidivat.

In Febre acuta superveniens asthma, sive in cursu, sive post morbum acutum sequatur, semper est valde periculosum.

Asthmaticis omnibus aliquandiu jam tum hoc morbo laborantibus ut plurimum cachexia, insignes tumores pedum œdematosi, & tandem inferioris corporis tumor quasi hydropicus supervenit, & sic moriuntur.

*C U R A.*

Imprimis considerandum est: an asthma sit morbus primarius & solitarius, vel secundarius & complicatus? hoc est: an superveniat phthisicis, empyicis, hypochondriacis, hystericis, scorbuticis, aut similibus? Ille primario in specie curandus venit: si verò sit affectus secundarius, præcisè non curatur, nisi in primario sublato morbo, adeoque tunc ad morbum primarium respiciendum est, nisi interdum paroxysmi gravius urgeant; nam sanato vel sublato morbo primario, & hoc symptoma cessat.

Asthmata ergo, quæ primario constituunt morbos, curanda sunt; & quidem in genere, quantum possibile, libera & sufficiens respiratio procuranda:

- I. Impedimenta,  $\Delta$ i libero accessum & recessum per pulmones denegantia, removendo.
- II. Respirationis organorum inordinatos motus plus minus convulsivos compescendo.

Ratione prioris  $\Delta$ is ambientis ventilatio, erecta sessio, alvi subductio, venæ sectio, positiones sanguinem attenuantes, ejus motum circularem promoventes, viscida, pulmones infarciencia incidentes, spirituosæ, blandè dulces, pulmones demulcentes, conveniunt: interdum etiam vomitoria utiliter administrantur: ratione posterioris antispasmodica, anodyna, volatilia, &c. sunt optima.

In specie asthma humidum, κατ' ἐξοχὴν sic dictum à viscido mucogenitum, curatur:

- I. Materiam peccantem viscidam attenuando & dissolvendo.
- II. Præparatam per convenientes vias, vel scretu & tussi, vel vomitu, vel scessu ejiciendo: &
- III. Id quod restat in specie extra paroxysmum, removendo, & novum proventum maturè impediendo: adeoque vel pulmonibus læsis & vulneratis appropriatis pectoralibus, si asthma humidum vitio pulmonum fuerit; vel stomachi digestio prima sedulo rectificanda, si hujus errore nata fuerit.

Asthma siccum similiter curatur in paroxysmo & extra paroxysmum:

In paroxysmo quidem (1.) Conformationis vitia difficillimè curantur; excrecentiæ tamen, tubercula aut grandinis beneficio ~

Tom. II.

sulphuris per campanam successivè absumi posse, sunt qui asserunt.

(2.) Asthma convulsivum & nervorum & musculorum vitio curabitur, radicitus fontem ejus corrigendo, respiciendo præsertim viscus, in quo lateat. In specie

- I. Paroxysmus imminens suspendendus per opiata: vel
- II. Idem præsens sistendus per volatilia & castoreata, item mineralia antepileptica & similia, acidum nervis inimicum corrigentia, nunc solitaria, nunc opiatis temperata.
- III. Recursus paroxysmorum præcavendus vesicatoriis, vel brachiis, vel nuchæ, vel femoribus applicatis, pro nervorum vel nidi varietate: etiam fonticuli interdum inurendi.

Ex propria fibrarum pulmonalium strictura natum asthma curatur.

- I. Causam irritationis, quantum possibile est, corrigendo & removendo.
- II. Opiatis sensum vellicationis sistendo.
- III. Appropriatis simul vulnerariis & balsamicis, pulmonibus succurrendo.

Extra paroxysmum verò curatur: primarium morbum curando, & paroxysmi recidivam prævertendo.

Pro his scopis ritè obtinendis, notandum:

I. In paroxysmo asthmatis cujuscunq; vomitoria omnium esse optima, ita ut hæc vel mox in principio, paroxysmo gravius affligente, adhibenda sint, etiam quando maximè videtur urgere suffocationis metus, quem interdum mirè sedant; nihil enim æquè paroxysmos asthmaticos humidos curat, quàm vomitus: Hinc omnes cordati practici semper in asthma vomitoria usurpant & subinde gravissimorum paroxysmorum, vomitoriorum propinatorum usu levatorum, observationes prostant: Nec est, quod exinde metuatur suffocatio: inanishic est metus; nunquam tale quid observatum: In humido sanè æqualiter evacuat materiam vomitus, sive in pectore sive in stomacho hæreat. Unde pus phthisicorum, qui in pulmonibus fluctuat, sæpiùs optimè & feliciter per vomitoria evacuat; & talia etiam id, quod bronchiis pulmonum fortiter impactum est, certò & feliciter deturbant: quin etiam expectorantibus remediis commodè remedia vomitoria, sed in imminuta dosi, possunt permisceri, ut saltem stimulent expectationem, non autem vomitum inferant: vel præmissis resolventibus & attenuantibus sunt propinanda, & ita stomacho & primis viis occurrendum; id enim, quod in his hæret, vix meliùs ac per vomitoria evacuat. Exempla per vomitoria, in paroxysmo propinata, feliciter curatorum prostant hinc inde in authoribus, imprimis Rulando in *Thef. Med.* pag. 103. 109. 112. 116. 118. 120. & sic porro: Poterit

(Cc)

cent.

*Cent. II. Cur. 16 & 46. & cent. III Cur. 22. Timæo in Epistol. p. 122. Platero lib. I. obs. p. 165. Hocfero in Herc. Med. pag. 118. & Horstio in Problem. Decad. 4. quest. 5. pag. 50. Hartmanno Pr. Chimiast. pag. 134. Riverio l. 7. Prax. c. I. & Petrazo Nosol. l. I. Diff. 18. Imò natura ipsa monstrat interdum proficuum usum vomitoriorum: sic Sylvaticus C. 3. consil. 49. refert asthma singulis noctibus recurrens cum suffocationis periculo, à quo non prius æger fuit immunis, nisi spontè succederet vomitus tam assumptorum quàm materiæ pituitosæ. In asthmate sicco vomitus convenit extra paroxysmum & in paroxysmo, nisi forsitan metuenda pathemata hysterica obstiterint; tutius tamen extra quàm in paroxysmo. Intervomitória ad hunc scopum usualia sunt partim Galia, partim quæ ex nicotiana parantur: aqua nicotianæ ad ℥j data, vel syrupus nicotianæ sumptus ad cochlearia duo egregiè promovet vomitum; imò solus fumus nicotianæ per tubulum attractus, & gutture haustus, potentem vomitum pro asthmate curando movet. Deinde succus expressus radicis ireos nostratis ad ℥ss vel ℥jad ℥ij, prout est plus minus validus, in hydromelite vinoso propinatus, tam ex ventriculo quàm pulmonibus ortam orthopnœiam desperatam curavit, teste Platero *Obs. l. 1. p. 175.* Facit huc vomitorium secretū Freitagii ad asthma & empyema, quod habet in *Aurora Medicorum c. 20.* descriptum: & est vinum emericū Heurnii ex elleboro albo, quod prostat in Schroedero l. 4. p. 239.*

Cujus si semi-cochlear cum aliis laxantibus exhibeatur, præclare alvum sine vomitu educit: cochlearis vero unius mensura vomitum excitat. Misturis vel Linctibus aliquot guttæ hujus infusi additæ, empyematis expectorationem copiose movet; hinc præstantissimum remedium ad asthma & empyema est hoc:

℞. Passul. mundat. ℥jv.  
Rad. liquirit. ras. ℥j.  
Mell. despumat. ℥ij.  
Sacchari Candi ℥v.  
Vini Hispan. ℥vj.

Bulliant, ut fiant instar conditi: cui tantum admisceatur spiritus  $\phi$ is per campanam, ut gratum acquirat saporem, hinc aliquot guttæ vini illius helleborati instillentur, quoties eas in os recepturus es.

His tamen vel commodè præmittenda vel adjungenda sunt expectorantia remedia, quæ acidum corrigere & visciditates istas attenuare & resolvere valent: qualia primaria sunt ea, quæ ex gummi \*co præparantur, ut potiuncula Brunneri, item syrupus nicotianæ & similia:

c. g. ℞.  $\phi$ \*ri ℥j.  
spec. diatr. piper. ℥ss  
M. f. pulvis:  
div. in 3. partes æquales: S.  
Digestiv. Pulvis.

Vel si materia sit nimis viscida:

℞.  $\nabla$  pulmon vit. c. succo nicot. ℥ss.

syrup. de jujub. ℥ss.

nicot. per iterat. infus. par. ℥ij.

~  $\phi$ u gutt. xv. M. S.

Kräfftiges Brust-Träncklein auf 2 mal.  
Notandum II.

I. Pus, si asthmatis causa, evacuandum vel per expectorantia, vel per paracenthesin thoracis.

II. Abscessus vel ulcus consolidandum, de quo *infra*, ubi de *phthisi*.

Notand. III. In paroxysmo asthmatis cujuscunque, speciatim humidi, in quo sanguis in motu suo simul per pulmones vel præcordia plus minus sistitur,

I. Ad venæ sectionem properandum, ut sanguinis copia imminuatur, & ejus liberior motus non nihil juvetur, adeoque sic in specie in asthmate, vitio sanguinis enato, locum obtinebit, minus in reliquis: Vel

II. Sanguis coagulatus dissolvendus, de quo, ubi de casu ab alto: Vel

III. Vitium cachecticum emendandum, de quo, ubi de cachexia: Vel

IV. Solitæ evacuationes revocandæ, v. g. menses proritandi, aut si fieri nequeat, fonticuli in regione loci, consuetæ excretioni vicini, inurendi.

V. Turgescentia quælibet, acidum effervescentia absorbentibus, aut blandè diaphoreticis, aut copiam sanguinis imminuentibus, corrigenda.

Notandum IV. In nullo paroxysmo cujuscunque asthmatis purgantia conveniunt, imprimis propriè sic dicta seu fortiora, quia cum potius exasperant: quod observarunt unanimiter omnes practici, quia agitant corpus & succos contentos, & symptomata morbi pejorant; nisi forsitan ad imitationem Poterii purgantibus, opiata in paroxysmo addere velimus: de quo vid. *cent. 3. c. 22.* Nam opiata sedant paroxysmum & symptomata, quæ aliàs purgatione inducuntur, dum interea pilulæ laudabiliter operantur. Facit huc monitum Scholzii in *cons. 92. In asthmaticis*, dicit, *diligenter cavendum, ne dentur fortiora evacuantia, à quibus commoveatur & agitetur materia, ipsaque fluxiones augeantur: videmus enim homines alioquin sanos post purgationem multum exspuere, & emungere nares sæpè ob motam materiam: quanto magis hoc illis accidere possit, quibus spontè, & quidem continuo, fluxiones ad pectus moventur.* Aliàs post sedatum paroxysmum ad præcavendam recidivam, & si quæ sunt reliquæ morbosæ, ad eas exhauriendas conveniunt evacuantia quæcunque moderata, in specie pilulæ, quibus semper gummi ammoniacum addendum venit: v. g. MB de ammoniaco Quercetani: item MB de hiera cum agarico, mista cum gummi ammoniaco; c. g. Freitagii has habet pilulas:

℞. Gal-



℞. Galban. c. + osol. ʒʒ.  
extr. troch. alband. gr. ix.  
diagryd. gr. iij.

c. ʒ. destillato carvi f. pilula pro tribus dosibus.  
D. S.

Resolvende Pissen auf 3. mal.

Ubi asthma ex vitio stomachi, conveniunt hæc pilulæ:

℞. MP. de hier. c. agar. ʒi.  
G. \*ci + osquillit. sol. ʒʒ.  
extr. troch. alband. gr. ji.  
cum ~ anisi vel ∇ asthmatic. f. pilula.  
D. S.

Purgier Pissen auf einmal.

Pilulæ catholicæ Poterii similiter sunt expertæ contra asthma, nec negligendus est in tali casu & dulcis, cum scammonio sulphurato acuat, quem Riverius usurpat. Vid. cent. 3. observat. 28. & 31. Vel

℞. MP. de amm. Quercetani gr. xv.  
ʒii dulc. ʒi.  
extr. troch. alband. gr. ij.  
ʒ. destillat. anisi gutt. ij.  
Cum f. q. ~ anisi. f. pilula.

Vel ℞. Pass. min. purg. ʒi.  
ʒi ʒ. lat. Tacch. ʒi.  
M. S.

Laxier Rosinen auf 2. mal.

Item prodest aliàs oxymel de nicotiana Quercetani purgans; vel possunt fieri vina medicata squillitica aromatica successivè evacuationia: c. g.

℞. Herbar. Anthos,  
mentha,  
salvia aa Mj.  
fol. senn. f. st. ʒvj. vel ʒj.  
rad. armorac. rec. ʒij  
Ireos Flor. nostr. recent. ʒj ʒ. ad ʒij.  
Florent.  
acori veri,  
angelic. aa ʒj.  
radic. zedoar. vel galang. ʒij.  
cinnam. ʒi.  
passul. min. ʒvj. vel ʒj.

Infund. in vini Mens. ij.

Hauriatur cochleatim qu. v. semel & bis, ut laxet.

Not. V. Si asthmatis causa est serum, hoc evacuandum per urinam vel sudorem, vel vesicatorium confertim, vel per fonticulum pedetentim.

Not. VI. Sudorifera in asthmate convulsivo & sicco, tam in quàm etiam extra paroxysmum, non negligenda sunt: nam iis rectè adhibitis, interdum asthma præcaventur, aut horum paroxysmi sæpè sedari possunt, maxime si ex volatilibus sint præparata. In asthma humido etiam suum locum habent quodammodo; id quod confirmat Scholzius supra citato loco inquit: *Multum prodest sudor, qui & fuligines & aquositates collectas discutit* Provocari potest decocto guajaci calidè assum-

Tom. II.

pto: facit quoque ad expectorationem & puitæ in pectore incisionem. Scio quosdam decocto ligni sassafras usos pro potu quotidiano in vigore hujus morbi, & alios id saltem loco vini in principio pastus assumpsisse, & exinde eximiam opem sensisse.

Not. VII. Opiata multum conferunt, præsertim respectu paroxysmi. Quando enim nimius spirituum impetus, & hinc inordinatæ pectoris motiones, item quorumcunque in corpore contentorum fluidorum nimius motus ad pectus urgent, optimè his omnibus opiata ritè administrata, præsertim appropriatis permista, multum conferunt. In asthma quidem humido, quatenus materiæ peccantis motum & excretionem sufflaminant, suspecta videntur, cum magis incrassetur, & quasi inspissetur materia peccans: Ad nimiam verò paroxysmi ferociam mitigandam, qui à concitatori spirituum impetu per accidens quasi exacerbatur, optima sunt. Tutiora autem sunt in asthma sicco, tam ante paroxysmum eundem præcavendo, quàm in paroxysmo eundem minuendo. Conferatur Willisius in Pharm. Rational. Part. I. p. 299. & P. 2. pag. 247. Talia sunt essentia opii, theriaca ac Mithridatium, syrupus diacodium Montani. Nempe in quovis paroxysmo asthmatis, tam humidi quàm sicci, spirituum impetus, & hinc concitator sanguinis ac lymphæ motus ad partem probè attendendus, & si nimius, opiatis non nihil sufflaminandus. Docuit hoc veterum experientia practica: hinc Fonseca lib. I. conf. 85, inquit: *Articularius in paroxysmo asthmatico & difficultate respirandi suffocativa damnat communem curationem, quæ sit avertendo materiam, quæ fluit; quia hic modus curandi agit magis illam: esse potius inhibendam fluxionem, quæ incrassant, præsertim si fuerit tenuis. Quare exhibet syrupum de papavere, diacodium, & devenit ad opiata: quale est philonium Romanum ad ʒi, quàm etiam Galenus videtur laudare curationem catarrhi suffocantis: deinde adhibet cucurbitas ad vertebrae dorsi & super scapulam: hac ratione omnes evaserunt. Illi verò in quibus processit evacuantibus divertentibus, & materiam agitantibus perierunt, quæ certè verè proferuntur, ut mihi etiam experientia compertum est.* Quoad philonium majus seu Romanum vid. Zvelfserus Animad. in Pharm. Aug. pag. 261.

Not. IIX. Asthmata si oriuntur ex scabie retropulsa, tunc omnis movendus est lapis, ut iterum appareat scabies in extima cute mediantibus sudoriferis, in specie volatilibus, & hinc appropriatis, nempe remediis ex helenio, ejus extracto & essentia fumaria, ejusque essentia simplici vel & composita, extracto theriacali, decocto helenii & fœniculi & similiter: item antimonio diaphoretico, cum Sibus fixis & volatilibus misto, massam sanguineam purgando, scabiem denuò expellentibus; nisi enim fomes scabiei denuò sub cute

(Cc 2). dcfi-

defigatur, omnis cura erit frustranea; in quem finem etiam vesicatoria, femoribus & brachiis applicata, optima sunt. Quod si nullo modo possit reproduci scabies, in tali casu imitandum est Zacuti Lusitani egregium inventum, qui talem ægrum cum alio scabioso in eodem lecto collocat, ut ab hoc fermentum scabiei malignum & ulcerosum hauriat, & ita denuo scabies introducat.

Not. IX. Si à fumis metallicis, in specie Mercurialibus, oriuntur asthmata, tunc nil in horum causa perficitur cum ordinariis ad hunc affectum remediis, nec expugnatur; sed potius appropriatis mineralibus & metallicis remediis listenda: hinc & dulcis, item Mercurialia fixa bezoardicum solare, turpethum minerale, item & antimonii, & diaphoreticum ac similia in usu sunt. Exempla talium asthmatum ex fumis metallicis, imprimis Mercurialibus, curatorum, videb. in Horstio l. 7. *Observat.* 25.

Not. X. Si dyspnœia oriatur à subito frigida potu vel frigore admissio, præsertim post æstum, imprimis conducunt, quæ sanguinem grumosum resolvere valent: in quo puncto succum bellidis in vino propinandum esse, vid. Mindererus in der *Kriegs-Arzhney*. Acetaria ex bellide in ætate laudat Deodatus in *Panth. Hygiast.* l. 3. cap. 22.

Remedia ergo alia appropriata, quæ conveniunt in asthmate humido, sunt imprimis incidentia, attenuantia, expectorationem promoventia, &c. plus minus aromatica, stomacho & pulmonibus amica, v. g. helenium, marrubium album & nigrum, hyssopus & capilli &is, ros &is; tussilago, scabiosa, pulegium, calamintha, acorus verus, carduus benedictus, satureja, crocus imprimis, item folia & flores rorismarini, de quibus vid. experimentum Borelli in *C. 4. Obs.* 46. qui flores vel ejus folia coquere jubet cum vino optimo & melle ad dimidiæ partis consumptionem, & capere ante somnum. Porro veronica, radix raphani, ari, zingiberis, zedoariæ, bryoniæ, cujus succus artificiosè prolectus, præter vim laxativam, singulares hic habet vires contra asthmata: dissolvit enim, quicquid grumosum & coagulatum est in corpore, & pectus liberat, quem videb. præparatum in Hartmanni *Pr. Chimiast.* p. 95. His addatur helenium optimum antiasthmaticum, quocunque modo usurpetur, imprimis pulverisatum, & cum melle in electuarii formam redactum, in asthmate stomachali radix iacris, vel vino infusa & pota, vel lentè in umbra siccata, ut retineatur & acerrimum, & pulverisata, pro expectoratione etiam egregia est, cum vino assumpta. c. g.

*℞. Pulv. radic. ari* ℥iv.  
*Ireos Flor.*  
*cinnab.* ℥ii āā ℥ij.  
*flor. &is.*

*Benz. pulveris.* āā ℥j.

*M. t. pulv. S.*

**Brust- und Lufft-Pulver.**

*Dosis* ℥℞.

Ex his fiat *Vinum medicatum pectorale* tale:

*℞. HB hyssopi,*  
*rorismar.*  
*flor. rapar.* āā Mj.  
*rad. ireos flor.* ℥j℞.  
*aristol.* ☉.  
*liquirit.* āā ℥j.  
*zedoar.* ℥℞.  
*caricar. pingv.* n. viij.  
*femin. urtica* ℥vj.

*anisi,*

*fenicul.* āā ℥iij.

Ex incis. & contul. fiat *Nodus pro Vini mens.* ℥j.

*D. S.*

**Püschel zum Brust- und Lufft-Wein.**

*Vel* *℞. HB. Marrub. M.* ij.

*com. absinth. vel hyssopi,*

*rorismar. vel veron.* à M. j.

*rad. enul.* ℥ij.

*Ireos flor.* ℥j.

*Imperator.* ℥iij. vel ℥℞ ad ℥vj.

*zedoar.* ℥iij. l. ℥℞.

*passul. min.* ℥j. l. ℥j℞.

*fem. anisi,*

*fenicul.* ℥℞. l. ℥vj.

Hæc ipsa incisa includantur nodulo, infundendo vino:

De quo æger bis vel ter quotidie hauriat bonum haustum,

Vel coquantur in ▽ addito melle, & ita fiat post colaturam hydromel pectorale;

Vel decoquantur in ▽ vel vino, & cum s. q. sacchari fiat syrupus pectoralis.

Vel ꝓ aqua, aceto & melle pro oxymelite pectorali.

Aut addatur decoctioni oxymel. squillit. q. s. pro gratia saporis.

*Vel* *℞. HB. hyssopi,*

*marrub. āā M. ij.*

*rad. enul.* ℥ij.

*fem. fenicul.* ℥℞.

*anisi.* ℥ij.

*& a sol. &is* ℥iij.

*▽ simpl.* lb. ii.

*Mellis despum.* lb℞.

Coqu. in vase clauso: in fine despumetur, & addatur:

*Cinnam.* ℥iij.

*Croci Orient.* ℥j.

Coletur pro Hydromelite pectorali resolvente & incidente, *D. S.*

**Auflösender Brust-Transl oder Meth.**

Convenit imprimis senibus, asthmate humido laborantibus, addi potest pro lubitu syrupus nicotianæ. Junioribus propter metum febris, scorbuticis aut hypochondriacis propter fermentationem, cautè præscribatur.

*Vel*

Vel ꝑ. HB. scabios. M. ij.  
 heder. terrest. M. j.  
 rad. enul. ʒjʒ.  
 Ireos flor. ʒvj.  
 sem. anisi,  
 faniculi aa. ʒiij.

Coqu. in l. q. ∇ simplic.

Colatura huius adde

Oxymel. squillit. ꝑ. f. pro gratia saporis.

M. D. S.

### Resolvirender Lufft- und Brust-Tranck.

Tabernaemontanus in Herbar. decoctum botryos commendat, quod cum oxymelite dari potest. Oleum seu liquor sacchari, tam simplex quam compositus, qualem habet Riverius *Prax. l. 7. c. 1.* similiter tanquam expertum commendatur in paroxysmo: vid. etiam Petrus *l. 1. Dissert. Harmon. 18. §. 44.* sed in genere moneo: fugiendum esse ab usum sacchari & saccharatorum mellitorumve in omnibus morbis, speciatim in affectibus pectoris: saccharum enim, propter facilem effervescentiam ac hinc flatulentiam, multos exasperat morbos, quorum radices in primis viis latent: imprimis febres, post hinc scorbutum & malum hypochondriacum deterius reddit. Tandem ut ut phthisicis, tussiculosis & asthmaticis familiarissimè præscribantur saccharata, in nimia tamen copia malum potius aggravant, quam leniunt, viscidiora reddendo excrementa, & putrilaginem & corruptelam pulmonum magis intendendo. Imprimis de nocuementis sacchari in affectibus pectoris vid. Garenzier in *Tr. de Tabe Anglica*, ubi dat exemplum tale: *Si quis frustra duo carnia recipiat, & unum ex his saccharo adspersat, altero non conperso, & per noctem relinquat, mane invenit unum putredine correptum, altero non saccharato adhuc sine noxa existente.*

Porro essentia croci in asthma multum commendatur, item essentia helenii & ligni sassafras, essentia radice Ireos Florentinæ cum spiritu anisi parata. Convenit etiam ∇ seu succus raphani recens expressus, qui cum saccharo est egregium incidens, resolvens & expectorans. Modus est, quando raphanus recens in taleolas incisus, & saccharo adpersus, inter duas patinas exprimitur, vel quando comminuitur raphanus, & cum saccharo mistus exprimitur. In omni tussi & asthma, respirationem lædentibus, hic succus potentissimum est expectorans, omnem mucum ubique resolvens, tam in pulmonibus quam in stomacho. Convenit itidem + & oxymel, nunc simplex, nunc compositum & squilliticum, quod Veteres in frequenti usu habuerunt: imprimis ∇ cinnamomi cum oxymelle scyllitico mista est egregia in senibus; & hanc ipsam in paroxysmo commendat Riverius *Centur. 3. obs. 8. & obs. 21. ut & Prax. Med. l. 7. c. 1.*

ꝑ. ∇ Cinnam. ʒij.  
 oxymel squillit. ʒj.  
 M. D. S.

### Lufft-Trancklein.

Propinetur cochleatim, præsertim in senibus: ac sanè oxymella talia præstant ferè syrupis, &c. D. Schœnfelder *Hist. & Cur. 44. p. 174.* inquit: *Vidi, & præsens fui non infima nota mulieri, paroxysmo asthmatico conflictata de repente suasi, ut sumeret aceti ruta, quod statim suprajannam cubiculi in promptu erat, cochl. ij. & ita quasi miraculo quodam paroxysmus sedatus est.* Notæ sunt aliæ aquæ pectorales & asthmaticæ spirituosæ, quas inter frequentior est aqua asthmatica Imperatoris Rudolphi, quæ est ∇ aromaticus syrupus de marrubio, de absinthio Mynsichtii: & speciatim ∇ rectè destillata & syrupus nicotianæ ex multiplici infusione paratus, atque sic magis à vomitoria liberatus, est perquam utilis: imprimis Epiphanius Ferdinandus in *Histor. Med. Mirab. Histor. 48. & 32.* hunc syrupum seu vinum commendat remedium, ad mucum in asthma, & pus in Empyemate evacuandum: sed necesse est, ut vis ejus emetica mediante diuturna digestionem infringatur.

Et quidem ratione  $\Theta$ lis volatilis acerrimi oleum ejus est vomitorium, sed ejus  $\Theta$  volatile est egregium in affectu pectoris. Utraque ratione convenit nicotiana; nam dum adhuc instructa est virtute vomitoriæ, convenit in paroxysmo pro vomitorio; postmodum ubi hæc est infracta, ejus  $\Theta$  volatile acre insigniter expectoratur; unde Petrus Johannes Faber commendat ∇ nicotianæ ad asthma præmisso purgante ad ʒiv. cum ∇ cinnamomi & gutt. iv. vel vj. aut x. ~ Qi instillatis: sic essentia betæ cum ~ u vini extracta, & melle excepta, egregium est expectorans.

Præ cæteris asthma humidum vix melius habet remedium tam in quam extra paroxysmum, quam gummi ammoniacum in vino vel aceto vel alio liquore appropriato acidulo dissolutum; nil namque æque resolvit, & expectorat mucilagines viscosas ac tartarum, uti vocant, pulmonum atque stomachi & primarum viarum, quam gummi ammoniacum, quod ipse felici usu præscribo. Datur à ʒj. ad ʒʒ. vel ʒj. in + vel liquore appropriato acidulo dissolutum; hinc basis est commendatissimæ potiunculæ Brunneri ad asthma in ejus consiliis, *Cons. 34.* quam multi Autores commendant, quos inter est etiam Timæus in *Cas. p. 97.* Ingrata quidem est, sed admodum in paroxysmo asthmatis humidi convenit; addi potest oxymel squilliticum, e. g.

ꝑ. ∇ hyssopi ʒiij.  
 G. \*cis c. + osol. ʒj.  
 ~ cochlear. ʒʒ.  
 oxym. squillit. ʒvj.  
 (Cc 3)

Gr.



*fyr. de eryf. Lobel. ʒij. M. S.*

**Rufft = Träncklein.**

Detur in asthma scorbuto.

Hujus occasione paratur etiam ~ asthma-  
ticus B. D. Michaëlis in asthma humido ex-  
pertissimus: Vocatur etiam aliàs spiritus  $\oplus$ is  
compositus, vel spiritus gummi ammoniaci  
compositus, qui mirabilis est ad incidendam,  
attenuandam & dissolvendam quancunque  
massam viscidam, in quocunque loco stabu-  
lantem, & tollendum asthma; sive per se in  $\nabla$   
asthmatica Rudolphi, vel alio vehiculo  $\oslash$ so  
inflammabili conveniente; sive etiam additis  
aliis, e. g. elixyr proprietatis, &c. usurpetur.  
Dosis ~ est à guttul. 30. ad 40. in vehiculo  
quodam vel  $\nabla$  destillata; aut diluatur cum  
spiritu hyssopi, essentia helenii, & fiat mixtu-  
ra cochleatim usurpanda: e. g.

*R. Aq. hyssopi. ʒij.*

*mentha. ʒi.*

*asthmat. Rud. ʒvj.*

*~  $\oplus$  ʒj. vel ʒij. ad ʒij.*

*fyr. nicot. ʒvj. vel oxymel. squillit. ʒj.*

*M. S.*

**Rufft = Träncklein auff ess. mal.**

Vel *R. aqu. flor. rapar.*

*asthmat. Rud. aa ʒij.*

*~ g. \*ci c.  $\oplus$  ʒj.*

*oxymel. squillit. vel fyr. nicot. ʒj. M.*

*R. Elix. pectoral. ʒij. vel iij.*

*~ asthmat. ʒij.*

*M. S.*

**Rufft = und Brust = Elixyr.**

Alii solummodo spiritum gummi ammo-  
niaci cum æruginè destillatam miscent cum  
spiritu anisi vel zedoariæ, & ita similiter egre-  
gium remedium habent contra asthma. Qui-  
dam loco ~ asthmatici laudant etiam ~  $\oplus$ i  
dulcem, e. g.

*R.  $\nabla$  Asthmatic. Rud. ʒij.*

*~  $\oplus$ i dulc. ʒij. M. S.*

**Rufft = Wasser / Löffelweise.**

Nonnulli recipiunt gummi ammoniacum,  
& miscent cum aliis, aut faciunt exinde loh  
vel electuarium, quale videb. in Riverio Cen-  
tur. 3. obs. 21. e. g.

*R. G. \*ci in vino sol. ʒj. l. ʒij.*

*oxymel. squillitici.*

*fyr. rad. enula.*

*Marrub. aa ʒj. M. S.*

**Rufft = Saft auff etliche mal.**

Cui etiam pro lubitu addi potest  $\nabla$  hyssopi  
ad ʒij. vel iv. item spermatis ceti ʒij. vel ultra.

*R.  $\nabla$  hyssopi. ʒij.*

*veron. ʒj.*

*~  $\oplus$ ci anis. ʒij. l. ʒj.*

*fyr. de hyssopo ʒij.*

*M. D. S.*

**Rufft = Träncklein.**

Huc spectat ~  $\oplus$ ci anisatus, vel ~ car-  
minativus de tribus, de quo capiat ʒger 30. vel

40 guttas ter in die: manè in vehiculo cal-  
do; à meridie bihorio ante pastum in frigido,  
vesperi, post moderatam cœnam sub introitu  
lecti iterum.

Vel *R. R. ʒij.*

*~  $\oplus$ ci ʒij. M. D. S.*

**Resolvende Tinctur.**

Usurpetur eodem modo.

Elixyr proprietatis Paracelsi & ipsum insi-  
gnis est efficaciz in asthma, pro varietate  
præparationis à guttis xv. xx. ad xxx. propina-  
tum. De oleis seminum pectoralium, ut oleo  
destillato anisi, salviæ, rosmarini, in haustu  
vini propinandis, nihil dico, quoniam sunt  
aliàs satis nota. Facit huc suo modo deco-  
ctum ad asthma expertum & utilissimum  
Fransci Joëlis l. 3. *Prax. Sect. I. c. 5. p. 15.* cu-  
jus basis & radix zedoariæ. Nam sola radix  
zedoariæ mirè levat dyspnœiam, si comeda-  
tur, eodem docente Joële. Loco radicis  
zedoariæ alii laudant radicem zingiberis, si  
scilicet hujus ʒj. in lb v.  $\nabla$  communis coqui-  
tur ad consumptionem lbj. & hinc aliquan-  
tulum sacchari ac mellis addatur pro potu or-  
dinario. Ab ista potione Joëlis non abludit  
potio Brunneri, qui eam tanquam panaceam  
in paroxysmo commendat, ubi aliàs sedari  
nequeat.

Juxta dicta  $\Delta$ , & in specie ~  $\Delta$ is acidus  
per campanam paratus, in  $\nabla$  appropriata ad  
gratam aciditatem propinatus, admodum  
commendatur à Practicis ad alleviandum pa-  
roxysmum asthmatis humidi: Miscetur cum  
aqua florum raparum, scabiosæ, hyssopi, sy-  
rupus helenii ad gratum saporem, & propina-  
tur tam in-quàm extra paroxysmum: addatur,  
si placet, syrupus de nicotiana: Vid. de hoc  
Thonerus, Horatius Augenius, item Brunne-  
rus in *Conf.* 34. Imò ab omnibus Authoribus  
commendatur tam ad malum præcavendum,  
quàm paroxysmum imminuendum: sicut  
aliàs extra paroxysmum crebrior florum  $\Delta$ is  
usus, uti & potus  $\Delta$ atus, pulmonibus opti-  
mè confert. Variæ possunt fieri misturæ hu-  
jus olei  $\Delta$ is, imprimis ad imitationem misturæ  
Brunneri:

*R.  $\nabla$  Flor. rapar. ʒvj.*

*cinnam. c. v. ʒij.*

*fyr. nicot. ʒj.*

*~  $\Delta$ is q. l. pro subtili acore. M.*

Vel *R. aq. fœnicul.*

*hyssop.*

*flor. rapar. aa. ʒj.*

*~ zedoaria ʒvj.*

*$\Delta$ is q. l. M.*

Commendo  $\nabla$  florum raparum: nam de  
hac Brunnerus c. l. dicit: quòd hæc aqua cum  
croco & pauco moscho mixta miraculosè  
asthmaticis restituat respirationem.

Facit etiam huc potus  $\Delta$ atus Helmontii,  
 $\Delta$ e accenso & suffitu probe imprægnatus, qui  
opti-

optimus est pro potu ordinario: vid. *Tumulus Pests.* & *Tr. Tussis & asthma* in fine: & conf. Cnæcellii elegantissimus liber *de Cura febr. epidem. malign.* p. 96. qui cum spiritu  $\Delta$ is etiam gummi \* miscet, quod addi potest, nisi sapor molestus fuerit: c. g.

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  Flor. rapar.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$ .

byssop.

veron. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ . vel  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

$\sim$  xedoar.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . vel  $\mathfrak{z}\mathfrak{vj}$ .

g. \* c. c. + o sol.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

$\sim$   $\Delta$ isq. l. ad acorem gratum.

Misceantur.

Denique crocus, uti & sperma ceti in paroxysmo propter vim resolvendi egregie conducit, imprimis in asthmate senum, & ceu mirabile laudatur à Timæo von Gilden-Klee / ad levandum subito paroxysmum asthmaticum, etiam atrocissimum, si scilicet à  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . vel solitariè vel cum ana lapillorum cancrorum, in  $\nabla$  hyssopi cum ejusmodi syrupiparum, aut in haustu cerevisiæ calidæ propinetur; dissolvitur enim sic sperma ceti instar butyri, & facile ac sine nausea assumitur: c. g.

$\mathcal{R}$ . Sperm. ceti  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Croc. or.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

M. pro duab. dos. S.

Pufft-Pulver.

Aliàs etiam potest propinari in  $\nabla$  hyssopi, cui saporis gratia additur syrup. de nicotiana,

Vel  $\mathcal{R}$ .  $\nabla$  Cinnam.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Sperm. ceti  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

oxymel. squillit.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

M. D. S.

### Zertheilend Pufft-Träncklein.

Singulare enim & expertum est remedium. Experimenta videb. in Timæi von Gilden-Klee *Cas. l. 2. Conf. 10.* p. 97.

Tandem terebinthina cruda per se à multis commendatum est remedium in asthmate. Usurpandi modus est varius: optimus est, si dissolvatur in vitello ovi, & assumatur; aut affusa  $\nabla$  appropriata fiat liquor lacteus seu emulsio, quæ in paroxysmo asthmatico, item in aliis pectoris affectibus, est egregia. Dosis est à  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . quocunque modo usurpata. Balsamum etiam  $\Delta$ is quodcunque, etiam solum commune terebinthinatum, & in specie cum oleo anisi præparatum, quod magis appropriatum est, uti quibusvis ferè pectoris affectibus, ita in specie asthmati extra paroxysmum quocunque modo usurpatum, ad reliquias removendas, & imprimis pulmones restaurandos, egregie confert, de quo gutt. 6. vel 8. ad gutt. 20. in vitello ovi vel haustu cerevisiæ calidæ, tanquam experimentum commendat Lindanus in *Colleg. super Hartmann.* Quod si nimius calor metuetur, ob id suadet Scholzius, ut ex Balsamo  $\Delta$ is cum gummi ammoniaco fiant pilulæ, quibus assumptis haustus appropriatus desuper ingur-

gitandus, ut eò promptius operetur: Flores etiam extra paroxysmum pro pulmonum conservatione atque, si laxi fuerint, restitutione usurpantur. Nempe

$\mathcal{R}$ . Flor.  $\Delta$ is

• sacchar. ana q. v.

M. pro pulvere. S.

### Brust-Pulver.

Hisce addantur denique millepedes seu aselli. Hi ipsi namque à Veteribus Practicis mirabiliter laudantur in asthmate humido, quin tamen etiam juxta Willhium convenienter in asthmate sicco seu convulsivo adhiberi possint, nullum dubium est. Lindanus sanè in *Coll. super Hartmannum* in solis his animalculis perfectam asthmatis curam consistere asserit. Usurpantur vel in substantia ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ . vel exsiccati aut præparati vel pulverisati miscentur cum melle addendo parum gummi ammoniaci, ex quibus cum syrupo nicotianæ fit linctus seu potius electuarium spissum, ita sapius assumendum. Optimus præparandi modus videtur, ut hi ipsi aselli conquisiti & panno lineo inclusi macerentur seu infundantur in vino aut decocto pectorali.

Vel  $\mathcal{R}$ . Vini infus. Millep.  $\mathfrak{z}\mathfrak{viii}$ .

Extr. rad. helen.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

croc.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

Syrup. de byssopo,

marrub. aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

M. D. S.

### Pufft-Träncklein auff etliche mal.

Conteratur Bartholinus *Actor. Hassniens.* *Vol. 1. c. 92.* Alii in asthmate puerorum millepedes cum croco & cinamomo infundunt vino, quod expressum, & cum paucis sacchari, vel syrupo de hyssopo aut marrubio edulcoratum, propinant ægris, certissimo, ut dicunt, experimento: vid. Petrus, & Schenkius in *observat.*

Sin flatulentia stomachi malum exasperent, quod fit in hysteris & hypochondriacis,  $\sim$  carminativus est egregius. Tentandum etiam aliquando, quid salivatio Mercurialis in asthmate humido contumaciore præstatura sit? Occasionem suggerit Thiermayer *Conf. 146.* qui refert asthma per ptyalismum ex pilulis cum Mercurio dulci curatum: sicuti *idem c. l. 2. p. 55.* refert, quendam asthmaticum ex pediluvio cerevisiæ calidæ ilico factum arthericum, & ab asthmate liberatum: quod ipsum confirmat pediluviorum usum in asthmate. Videatur Hæferus *Herc. Med. p. 119.*

Denique quoad asthmata occulta, tam ex convulsione musculorum & nervorum, quam ex strictura ipsorum pulmonum, in his cura non nihil est varianda, cujus medendi rationem jam supra habuimus.

Quoad materiam medicam: in his asthmaticis occultis & convulsivis instar cynosuræ probè

probè observandum est effatum Helmontii: quod nempe id, quod epilepticum adultum sanat, sanet etiam talem asthmaticum, unde remedia antiepileptica, item antihysterica, tam fixa, quam in specie volatilia  $\Theta$ ina &sa, castorina, hic sunt convenientissima, ut rectè observavit Willisius in *Pharm. Ration. P. 2. p. 246.* observando simul, quod tales asthmatici ut plurimum sint hypochondriaci, ubi dictis subinde etiam de laudano opiato aliquid addendum. Et quantum opiata prosint in asthma, videb. in Willisio loco allegato p. 299. observavi in asthma tali occulto, ex podagra retropulsa oriundo, omni vespera repente, quod theriaca imminente paroxysmo assumpta eadem præcaverit, ita ut post ejus usum ista nocte non reversus fuerit.

Conveniunt ergo ad paroxysmum mitigandum aut præcavendum  $\Theta$ ia volatilia, in specie  $\Theta$  succini, C. C. cranii & sanguinis humani, ac horum &  $\Psi$ i, liquor C. C. succinatus, ~ carminativus, de tribus,  $R$ is, essentia catarrhalis, castoreum, essentia ejus cum ~  $\Theta$ \*ci parata. Ex asellis etiam & lumbricis, in quibus est sal polychrestum, parata medicamenta, ~ lumbricorum per putrefactionem paratus, cinnabarina, & similia  $\Delta$ a metallica meritò à Willisio in hoc casu commendari videntur. Cum his uti dixi, miscenda subinde opiata: hinc Dominus Boyle in *Utilitate Philosophia Experimental. P. 2. p. 92. & p. 121. item pag. 377.* refert exemplum talis asthmatis convulsivi, & orthopnoæ inveteratæ, & terè desperatæ, per usum sanguinis humani, cum laudano opiato Helmontii cum succo cydoniorum facto curatæ: item p. 270. asthma convulsivum refert per  $\Theta$ ia volatilia curatum.

Ex dictis sequentes concinnari possunt formulæ: e. g.

℞. Pulv. epil. March.  $\mathfrak{z}$ j, vel  $\mathfrak{z}$ ial. gr. iij.  
cinnab.  $\mathfrak{z}$ ij gr. ij.

$\Theta$  volat. succin. gr. iij.  
laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis. S.

**Stillend Brust-Pulver.**

Vel ℞.  $R$ is compos.  
~ carmin. aa.  $\mathfrak{z}$ ijj.  
ess. opii  $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S.

**Rufft-Mixtur / 40. Tropffen.**

Vel ℞.  $R$ a  $\Delta$ is vel ess. catarrhal.  
liq. C. C. succin. vel ~  $\Theta$ \*ci anis. à  $\mathfrak{z}$ ijj.  
ess. opii  $\mathfrak{z}$ j. M.

Vel ℞.  $\nabla$  Hyssopi vel scabios.  $\mathfrak{z}$ ij.  
asthmat.  $\mathfrak{z}$ ß. vel  $\mathfrak{z}$ j.

~  $\Theta$ \*ci  $\mathfrak{z}$ j.

syr. de hyssopo  $\mathfrak{z}$ ij. l.  $\mathfrak{z}$ ijj. M.

Vel ℞.  $\Theta$  amygd. dulc. rec. expr.  $\mathfrak{z}$ ß. ad  $\mathfrak{z}$ vj.  
spermat. ceti  $\mathfrak{z}$ ß.  
croci gr. vj. M.

His remediis utiliter interdum interponitur, interdum præmittitur vomitus, præsertim ubi fomes mali hæret in abdomine, nisi hysterica pathemata obstaculo sint; vid. Dn. Boyle l. 4. p. 270. Huc pertinent  $\Theta$  destillata pectoralia & nervina, ut  $\Theta$  destillata anisi, sal-viz, rorismarini, succini, terebinthinæ, &c.

Externè huc faciunt etiam linimenta externa anodyna & emollientia, pectoralia aliàs dicta, loco quorum sufficit solum  $\Theta$  amygdalarum dulcium; vel ad imitationem Wedelii de Med. Comp. p. 180.

℞. Ungu. potab. r.  $\mathfrak{z}$ ijj.

croci pulveris.  $\mathfrak{z}$ ß.

$\Theta$  destillat. anis.

fenicul. aa. gutt. xv.

M. f. linimentum. S.

**Lindernd Brust-Salblein.**

Vesicatoria quoque scapulis aut brachiis applicata subinde multum opis præstant, tam irritatione molesta spirituum influentium morbum divertendo, quam seri acrioris, præsertim scorbutici, fomitem derivando aut avertendo.

## ARTICULUS II.

De

*Singultu.*

**S**ingultus est inspiratio violenta & interrupta cum impetu ac cum sono ingrato, & dependet à subitanea ac vehementi diaphragmatis deorsum versus contractione, & reverà convulsione. Percipimus enim omnes, quod singultiendo cum impetu inspiremus, & quod tunc simul regio ventriculi antrorsum versus moveatur, sicuti hoc aliàs fieri solet in omni ordinaria inspiratione. Dum ergo diaphragma violenter & cum impetu deorsum versus contrahitur, ventriculus & abdomen necessariò antrorsum versus propelluntur, & ita cum subitanea inspiratione singultus efficitur. Veteribus aliàs singultus statuitur affectus stomachi irritati; sed parùm consideratè: Nam & ipse Hippocrates & Galenus in *Commentar. super Aphorif. 3. sect. 7.* apertè statuit: talem stomacho esse singultum, qualem nervis convulsionem. Imò hinc inde Autores practici apertè comparant singultum convulsioni: sed cujus partis? nempe istius partis, quæ inspirationi primariò inservit, & talis pars est imprimis diaphragma, quod scilicet convulsam violentè & cum impetu deorsum tractum, singultum infert; adeoque primus, qui hanc sententiam, quod singultus sit affectus diaphragmatis, defendit, est Platerus: à partibus etiam stat Sylvius: Conf. Mayovvius de *Respirat. p. 292.*

I. Quod confirmat, est quod nos omni tempore voluntariò possumus singultire. Hoc apertè



apertè innuit, non stomachi esse actionem, in quo nullus est motus voluntarius; sed necessario affici partem, quæ voluntatis nonnihil subjacet imperio. Jam nullus talis est musculus in toto respirationis negotio, quàm diaphragma, quod respirationi primariò inservit, & nervis ex cerebro & cerebello constat; pro hujus enim varia alteratione pro voluntatis imperio possumus etiam respirationem variis modis mutare.

II. In omni singultu percipitur motus vehemens abdominis circa regionem epigastricam extrorsum versus, quod non potest concipi alio modo fieri, nisi quod diaphragma ex convexitate nimia aliquantisper planius redditum omnia abdominis contenta deorsum aut extrorsum premat. Nam cum hoc fiat saltem inspirando, & in omni inspiratione diaphragma moveatur deorsum, patet, diaphragma saltem in singultu esse affectum.

III. Nullus potest singultus fieri, nisi inspirando, id est  $\Delta$ em attrahendo, & ita diaphragma deorsum versus movendo.

IV. Sæpius curatur singultus solâ inspiratione continuata, & quàm longissimè inhibita expiratione. Jam ergo, si esset motus expulsius stomachi in singultu, inspiratione potius aggravaretur malum, quam curaretur. Ratio, quia in inspirando diaphragma comprimit stomachum, unde potius irritaretur ad singultum, quàm quod exinde malum levaretur: imò ex constrictione fibrarum sequeretur vomitus.

V. Notum est, joco interdum, imò sæpissimè, curari singultum: Id quod innuit, non aliquid naturalis, sed potius voluntarii, & secundum rationis ductum alterabilis partis, primariò in singultu affectæ, quæ in inspiratione non est alia, quàm diaphragma.

VI. Ad hæc sternutatio superveniens singultui hunc solvit, teste Hippocrate *sect. 6. aphor. 13. Miscell. Acad. Nat. Curios. ann. 3. obs. 138. p. 216.* & Wedelio *de Medicamentorum facultatibus p. 212.* Ratio, quia forti sternutatione, adeoque sub forti ista expiratione, concussum diaphragma ex se dispellit, non minùs quàm ex stomachi orificio, quod istud antea irritabat.

VII. Nimii animi motus, v. g. risus, terror, ira, & similia pathemata, curant singultum: idque ratione spirituum animalium, qui à fortiori objecto commoti & alterati minus vacant singultui. Exemplum talium ab animi motibus, e. g. terrore felis, muris, &c. curatorum habet *Valerola obs. 4. l. 2. p. 162.*

VIII. Ad hæc absque stomacho affecto hepatis inflammatio sæpè dat singultum exitiosum; quia hepar inflammatum parte suâ convexâ immediatè contingit diaphragma, parte verò concava stomachum. Unde tunc continuus hujus diaphragmatis motus molestiam

creat, ratione cujus irritatur continuò ac stimulatur, ut convellendo singultiat.

IX. Observatur etiam non rarò singultus in morbis convulsivis, v. g. in passionibus hystericis.

Singultus ergo formale consistit in contractione violenta & convulsiva diaphragmatis inspiratoria.

### C A U S Æ.

Causa hujus violentæ diaphragmatis convulsionis est omne id, quicquid ad violentam, non tamen durantem, sed interruptam subinde & reciprocam contractionem, diaphragma irritare & vellicando stimulare valet. Hoc ipsum sæpius hæret in stomacho, orificio nempe ejus superiore, quod diaphragma perforat, ipsique in transitu firmiter satis connectitur. Pertinent ergo huc imprimis alimenta, aut medicamenta nimis acia assumpta, vel alia quæcunque: sic quidam loco balsami  $\Delta$ is assumens  $\phi$  vitrioli, exinde in gravem & periculosum incidit singultum; Barbette *in sua Praxi l. 4. c. 2. p. 136.* Sic solus panis quantitate nimia comestus, & ilico devoratus, singultum concitare dicit Ferdinandus *in histor. Medic. Conf. 43.* item in febribus continuis ardentibus, post intemperatum & intempestivum juleporum acidorum & emulsionum refrigerantium usum, non rarò singultus sequitur, saltem vini potu curandus; Schenkii *l. 3. obs.* Alia itidem ventriculum intensius alterantia, in specie refrigerantia, singultum inferunt: sic enim Timæus *von Gûlden = Klee in cas. l. 3. cas. 5. p. 115.* refert singultum gravem & contumacem ex potu copioso  $\nabla$ æ frigidæ &  $\Phi$ i, sic singultum obstinatum per bimestre ex nimio  $\nabla$ æ frigidæ haustu post æstum observavit Riverius *Morb. infrequent. obs. 1.*

Sed præter occasiones tales externas & ex internis singultus supervenit stomacho affecto, sive per essentiam afficiatur, sive per consensum: Per consensum v. g. in vulneribus capitis, in nephritide, in imminente ileo, in hernia graviore. Per essentiam afficitur stomachus, dum ab acriori quodam plus minùs viscido succo, intra rugas prope orificium superius hærente, originem ducit, cujus expellendi nixum singultus insequitur.

Ratio, quod ex affecto orificio superiori superveniat singultus seu diaphragmatis convulsio, est consensus stomachi cum diaphragmate, quia stomachi os superius faciliè transit non per circulum nerveum diaphragmatis, ut fert communis opinio, sed per hujus musculum posteriorem, ibique idem firmiter satis annectitur. Conferatur nova ac accurata

(Dd)

diaphra-

diaphragmatis anatome Caspari Bartholini, cujus epitomen videb. in Bartholini *Act. Medic. Hassniens. Volum. 4. pag. 14.*

Præterea plures alix etiam causæ, quocunque modo diaphragma afficientes, sive in hoc ipso sive in pectore hæreant, ad singultum disponere possunt: ut v. g. hepatis inflammatio in parte gibbosa, ubi immediatè contingit diaphragma, singultum infert, uti jam superius dixi. Quò etiam pertinent conformationis vitia, luxatio nempe costarum inferior, dum costarum interiora ad ventriculum versus detorsio, ut iis adhæreat diaphragma, causa fuit singultus trimestris, quarum repositio ejusdem curatio existit, teste Schenkio *in lib. 3. Observationum*: item continuum singultum ex compressione undecimæ thoracis vertebræ observavit Rhodius *Cent. 2. Obs. 61.* Infantibus & junioribus magis voracibus frequentes singultus contumaces, idque imprimis ex pituita viscida acida, pertinaciùs stomachi orificium obsidente, unde etiam non rarò chronicus & admodum diuturnus talis esse solet singultus. Ex arthritide non ampliùs artus afficiente singultum desperatum observavit Velschius *Hecatosf. 2. pag. 30.* Purgationes effrenes subinde singultus malo omine sequuntur, ut notat Hippocrates *S. 7. aphor. 41.* siquidem non rarum est, convulsiones aciores insequi Purgationes. Tandem febribus sæpè continuis, aut in statu periculoso, aut in quibus jam convulsiones imminet, supervenit: partim ex pessimè affecto stomacho; partim ex spasmis jam imminetibus ceu ultimo naturæ conatu: Denique ipsis morbis convulsivis, vel universalibus vel particularibus, per consensum diaphragmatis simul afficientibus subinde supervenit singultus: hinc etiam passionibus hystericis subinde singultum supervenire observavi.

Rara item singultus qui vult exempla, adeat Marcellum Donatum *in libr. 4. Histor. Medic. mirabilisc. 5.* Schenkium *lib. 3. Obs. Bartholinum Cent. 2. Histor. Anatom. 4.* Item *Cent. 3. Epistol. 61.* de muliere adeo graviter singultiente, ut per biennium à dæmone obsessa crederetur: quibus addantur Bartholini *Acta Medica Hassniensia Vol. 2. Obs. 28. & Volum. 1. Obs. 73.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: singultus per se patet & cognitu facillimus est; vel infantibus quoque notus: saltem curiosus sit Medicus in perscrutandis causis remotis seu fomite morbofo: an hæreat causa irritans in stomacho? an in alio quodam loco.

### PROGNOSIS.

In Prognosi observandum: quod singultus ex causa externa, vel manifesta, vel vitio

assumptorum, vel vitio excretorum, sit affectus levis, minus periculosus.

Singultus autem quicunque superveniens Vomitus, aut purgationi nimix, diarrhœæ aut dysenterix, sæpiùs & ut plurimum periculosus est; quia imminentes convulsiones epilepticas, in talibus morbis ut plurimum lethales, innuit.

Superveniens singultus inflammationi hepatis vel alius visceris malum pronunciat. Hippocrates *sect. 5. Aphorism. 58. & sect. 7. Aphorismo 17.* Exemplum hujus refert Amatus Lusitanus *Cent. 5. Cur. 30.*

Pertinaci alvi suppressioni morbo iliaco, repentinæ & contumaciori herniæ, aut etiam aliis intestinorum periculosioribus doloribus, superveniens singultus admodum periculosus esse solet; innuit enim imminet vomitum stercoris lethalem.

Singultus in omni continua febre & morbo acuto periculosus est, nisi fiat instante crisi per vomitum: hinc Platerus *l. 1. Obs. pag. 218.* rectè asserit, singultum febribus ardentibus mox in principio aut circa statum supervenientem & perleverantem, plerumque esse mortis prænuntium; quod tamen non æquè universaliter verum est, contrario apparente in Horstio *l. 1. Observat. 25.*

Singultus sæpè diuturnum malum est, ægrotumque subinde per plures dies, menses, annos, &c. affligit, interdum penitus incurabilis observatur, in quo casu occultum quoddam conformationis vitium, os ventriculi, aut diaphragma, aut nervos afficiens, ferè subesse solet.

### C U R A.

Quoad curam: in hac duo sunt consideranda:

- I. Causa proxima & occasionalis, quæ irritat diaphragma ad convulsionem, est removenda; &
- II. Materiâ remotâ ipse irritationis sensus diaphragmaticus est tollendus, ut consequenter ejusmodi contractura convulsiva remittat.

Ea, quæ vulgaria anicularum sunt remedia, compressionem thoracis, respirationem omissem, &c. omitto. Dico potiùs: ad singultum compescendum ratione indicationis posterioris insigniter commendari opium, & quolibet opiata ac theriacalia: Sic Horstius *l. 1. Observat. 25.* singultum pertinacem admodum, febri continuæ circa finem supervenientem, curavit recipiendo *Conserva rosar. 3j.*

*Theriaca Androm. 3ß.*

*laud. opiat. gr. ij. vel iij. M.*

Hinc Galenus similiter commendat opiata: sed eadem miscere jubet cum appropriatis, nempe cum castoreo, galanga, zingibere, caryophyllis, mastiche & similibus; hinc etiam ad singultum, item vomitum & similia, talem ferè

ferè bolum expertum commendat Timæus von Guldenslee.

- \*. Theriac. Androm. ℥ij.
- ligni aloes ʒß.
- ℞o destillat. mac. gutt. ij.
- laud. opiat. gr. j.
- Misc.

Loco ligni aloës alia appropriata possunt addi, in specie castoreum, semen anili, &c.

Joel in omni singultu ceu præsentissimum commendat C. C. usti ʒj. quocunque modo usurpati. Forestus habet Julepum, quo ipso aliquoties feliciter usus est contra singultum.

Ubi verò pertinacius fuerit malum in corpore robusto, ubi non sufficiunt, & conferunt opiata, ante omnia præmittatur vomitus ex Galibus, ut hujus medio eradicetur fomes morbosus ex ventriculo, præsertim quando talis contumacior singultus ex pituita, ut vocant, vitrea, superiori stomachi orificio firmiter impacta, oriatur: quibus verò infesta sunt vomitoria, danda sunt imprimis aloëtica, ut pilulæ ex aloë, successivè mucum tollentes, vel solæ, vel cum grano laudani opiatæ mistæ: aut si malum fortius hæret, purgantibus misceatur & dulcis, idque ad imitationem Riverii C. 3. Obs. 42. sicut Rhodius Cent. 2. Obs. 60. singultum 7. dierum cum hiera, cum oxymelle data, excretis ʒxij pituitæ sanatum refert.

Peraetapurgatione vel vomitu, dum languet stomachus, ad consuetudinem singultus penitus tollendam propinentur remedia ex zedoaria, corticibus aurantiorum, chamomilla Romana, &c. B. D. Langius curavit singultum decem dierum ex humoribus crassis, tunicis ventriculi impactis, beneficio Ss Oli ad ʒij in Vino malvatico dati, quo maxima pituitæ vitreæ copia exclusa, singultu planè cessante. Pro corroboratione dedit bis:

- \*. Ebor. usti ʒß vel ʒj. aut ebor. f. Δe ʒß.
- ℞o destillati cinnam. mac. vel anisi vel caryoph. gutt. v.

M. pro pulvere.

Propinetur in ∇ menthæ spirituosa.

Vel ad imitationem Sylvii danda est talis mistura:

- \*. ∇ menthæ ʒß.
- vita Matthiol. ʒß vel ~ theriac. simpl.
- aut Camphorat. ʒij.
- Conf. alkerm. ʒj.
- laud. opiat. gr. ij.
- syr. menthæ ʒvj. vel ʒj.

M. D. S.

Stöck-Träncklein.

Pertinet huc etiam mistura sæpius ad singultum experta cydoniata cum extracto zedoariæ & laudano opiato in M. A. N. C. anno 6. Obs. 149. p. 210.

Quibus misturis, ubi semel flatus & eructationes stomachi adsunt, qui interdum in sin-

Tom. II.

gultu reperiuntur, & stomachum insigniter distendunt, commodè ~ nitri, vel simplicis gutt. vj. vel viij. vel potius ~ Qi dulcis, aut ~ Qi theriacalis à ʒß ad ʒj: aut si adjuncta sint pathemata hysterica, loco confectionis Alkermes extractum castorei admisceri potest.

Externè in quocunque singultu in specie expertum est cataplasma Mynsichthii ad singultum, compositum ex fermento acri, pulvere menthæ & aliis aromaticis, malaxatum cum oleo castorei, impositum regioni stomachali; vid. Mynsichthii Armament. Sect. 38. Simile est Cataplasma Schmuckii, quod tanquam certum & probatum ad singultum commendat: compositionem habet in Thef. Med. 2. Secret. 18. & est hæc:

- \*. Bacc. lauri,
- ros. rubr. sylvestr.
- menthæ aa Mj.

Pulverisata subige c. fermenti acerrimi quantitate ovi, impone patinæ, affunde + fervens, & calidissimè cum linteo triangulari impone regioni stomachi & præcordiorum: si exsicceetur, denuò cum aceto irroretur & applicetur.

Deinde convenit etiam externè emplastrum de galbano crocatum Mynsichthii, cujus descriptionem videbitis in armam. chim. sect. 37. p. 511. item ℞o destillat. anisi gutt. aliquot umbilico aut scrobiculo cordis illitæ, in usu esse solent. Panis etiam calidus linteo obvolutus, ventriculo applicatus, efficax est remedium, imprimis si vino Malvatico vel alio generoso irroratus fuerit, & ita applicetur regioni stomachali. Quidam cum spongia aut pane calido applicant ventriculo fotum humidum, factum ex aceto calido valdè acri, cocto cum castoreo, pipere & sinapi.

Pro varietate autem causarum ad singultum disponentium etiam modò dictis generalibus specialia quædam admiscenda sunt.

Singultus & irritatio si fiat ab humoribus acris corrosivis ac æruginosis, plus minus effervescentibus, tunc suprâ dictis appropriatis in specie addantur absorbentia: qualia crystallus præparata, ebur usum, vel cornu cervi usum: item lapilli cancrorum, quia absorbent omnes corrosivos humores: item S. Oar. sigillata, bolus Armena: item lapilli percarum & carpionum, & absorbens Wedelii, cum opiatæ mista. In specie pelliculæ internæ stomachi gallinacæ exsiccatæ & pulverisatæ, & in ∇, succo & syrupo portulacæ usurpatæ. Singultum supra dictum ex assumpto acriori, e. g. ol. vitrioli hausto excitatum, Barbette curavit mixtura in praxi præscripta, ad cujus imitationem

- \*. Vendliv.
- plantag. aa ʒj.
- succi semp. viv. maj. depur. ʒj.
- (Dd 2)

C. C.



*C. C. usque præp. 3j.*  
*lapill. & præparat. 3j.*  
*& sigill. 3b.*  
*laud. opiat. gr. ij. vel iij.*  
*syr. portulac. 3j.*

M. D. S.

### Dämpffend Träncklein.

Si suspicio adit veneni assumpti, vel malignitatis in singultu: v. g. in febre maligna, modò dictis appropriatis & alexipharmacis ex & sigillata addatur & cordis cervi, cordialis Her- culis Saxoniz, aqua cinnamomi cum vino, & cydoniata, syrupus corticum citri, & analepti- cus Mindereri, laudanum opiatum vel extra- ctum theriacale, & similia malignitati appro- priata; ad imitationem Riverii *Centur. 4. Ob- servat. 78.* Sanè & datum ad 3j. est conveni- entissimum.

Ubi singultus est conjunctus morbis con- vulsivis aut hystericis, his ipsis per & Sia vola- tilia, castoreum, & opium curatis, simul sin- gultus evanescere solet.

Si singultus est symptoma affectus cujus- dam gravioris, ut inflammationis hepatis, fe- bris acutæ, &c. spontè equidem, morbo pri- mario curato, singultus cessat; quia tamen partim molestum, partim mali ominis est sym- ptoma, propterea simul sudorifera, & blanda opiata cum affectui primario appropriatis, jungenda erunt.

Si singultus sit à nimia refrigeratione sto- machi, in specie, post nimium æstum ex hau- stu copioso frigido, optimum consilium est, ut ad imitationem ejus instituat B. aquæ dul- cis, in quo plantæ nervinæ incoctæ sunt, cui infideat æger.

## ARTICULUS III.

De

### Incubo seu Ephialte.

**I**Nter affectus p. n. Inspirationem lædentes pertinet etiam incubus seu ephialtes, qui & ipse reverà est nihil aliud, quàm pectoris af- fectus, impedita nempe ac difficilis respiratio, in specie sufflaminata inspiratio, dormienti- bus imprimis ac dorso incumbenibus, cum insomnio quodam ponderis præcordia pre- mentis ac suffocationis imminenti obveni- ens, cujus occasione vigiles, quia talia delirant somniantes, varia subinde sibi de persona aut re certa superincumbente narrare solent ephialte affecti.

Est nempe complicatus affectus abdominis Incubus, quem ipsi ægri ritè explicare neque- unt: propterea constituitur à quibusdam se- des in stomacho, ab aliis in pectore, ab aliis in capite: symptomata ferè tali ordine semu- tuò insequuntur:

- I. Læditur respiratio, maximè inspiratio:

Hanc

- II. Insequitur sensus, aut saltem metus im- minentis strangulationis.
- III. Est depravata loquela, dum loqui ne- sciunt incubo affecti, sed gementes, queruli &c. fiunt, aut sonum saltem in- conditum, rectius boatum, aut saltem sonum gravem proferunt; unde & vo- cati parum aut nihil respondent, & ferè immobiles jacent.
- IV. Adest insignis anxietas præcordio- rum: &
- V. Denique insomnium supervenit rei aut objecti alicujus, nunc certi nunc incerti, thoracem prementis, & quasi con- stringentis: Quibus
- VI. Accedunt maculæ rubæ, lividæ, cœ- rulescen-tes, artus imprimis pingentes, & manè postmodum apparentes.
- VII. Expergetactis, dum omnia cætera evanescunt symptomata, corporis tre- mor, & non rarò diaphragmatis vibra- tio celerrima & violenta superest, unà cum totius corporis lassitudine.

## C A U S Æ.

Quoad causam & fiendi modum incubi: quæ vulgò proferunt, omnibus nota sunt; sci- licet inculant obstructionem meatuum cere- bri ac principii spinalis medullæ, à vaporibus crassis ex abdomine eò exhalantibus; unde impedito ~uum animalium influxu ista sym- ptomata superveniant, obque hanc rationem incubus ad affectus capitis ordinariò refertur: vid. Sennertus *l. 1. Prax. P. 2. c. 29.* Hic ta- men in *Paralipom. pag. 113.* hanc sententiam mutavit, & incubum esse affectum respiratio- nis læsæ cum insomnio gravi asseruit; sicut jam suò tempore Fernelius & Platerus insul- sissimam hanc veterum opinionem rejece- runt, dicendo: morbum hunc primario ad af- fectus thoracis & respirationis læsæ; secunda- riò ad affectus capitis, pertinere. Nempe hi ipsi causam proximam statuerunt humorem crassum melancholicum vel pituitosum circa præcordia hærentem, quo humore quacun- que ex causa commota aut turgescen- te dia- phragma & pulmones comprimantur; unde exhalantibus vaporibus vox opprimatur; & denique iisdem cerebrum petentibus ~ ani- males conturbentur & misceantur, unde so- mnium tale sequatur: sed adscensus iste va- porum ex primis viis ad caput usque, & quic- quid illis superstruitur, ruinoso utitur funda- mento, & facilis est solutionis.

Audiantur modernorum quidam, in specie Schneiderus in libro specialissimo *de Catarrh. cap. de Catarrho nar. pag. 246.* item in *Diss. de Epilepsia*, & per consequens etiam de in- cubo, ubi rectè incubum ad convulsionem spe-

species refert, in specie talem, in quo thoracis musculi hominis, somnium capientis, ita afficiantur, ut respiret exinde laboriosus.

Res ut pateat paulò clariùs, ordine procedendum: scilicet causa incubi proxima est omneid, quod liberum thoracis, & in specie reciprocum diaphragmatis motum inferiora versus in somno impedire potest: hoc namque ita primariò quoad respirationis negotium impedito, secundariò etiam reliqui musculi inspirationi inservientes in motu impediuntur: Quicquid ergo primariò libero diaphragmatis motui, secundariò reliquorum musculorum, inferre potest impedimentum, est causa incubi.

Thoracis, ac speciatim reciproci diaphragmatis motus impeditur, vel quatenus est causa externa & objectum quoddam, diaphragma opprimens, & ejusmodi motui deorsum versus reluctans, & oritur exinde incubus accidentalis & quasi levior; vel læditur diaphragmatis motus vitio nervorum ejusmodi, & musculorum thoracis motui inservientium; id quod fit in incubo habituali, utpote graviore, & qui firmiores egit radices, & ex quadam dispositione interna radicata plus minus, vel sæpiùs vel difficiliùs ægrum efficit.

Incubus accidentalis fit, quando liber diaphragmatis motus saltem impeditur, propter impedimenta in primis viis ac abdomine, motui ejus deorsum resistantia. Hæc inter imprimis est stomachus, qui vel copiosioribus alimentis infarctus; vel materiâ viscidâ aut mucilaginosâ inquinatus; aut flatuum copia, aut potu nimio & cruditatibus distentus. Propterea Hildesheim in *Spicil. de affect. capitis*, *spicileg.* 4. p. 434. inquit: Qui scire cupit, quid sit incubus? is ante somnium comedat castaneas, & superbibat vinum fæculentum. Hinc rarò incubo afficiuntur, qui laudabili utuntur diætâ, aut qui sobriam amant cœnam: econtrâ ob *addon Payian* familiaris esse solet.

In habituali verò ac continuo incubo, quatenus habet causam quandam in corpore latentem, ad nervos imprimis respiciendum venit, eos nempe, qui respirationi inserviunt, & imprimis diaphragmatis motui, ob quorum vitium actus respiratorius prohibetur: adeoque ad nervos paris octavi, unde & intercostales progrediuntur, & qui ex cerebello primas radices habent, hîc imprimis respiciendum, ut rectè asserit Willisius in *Anat. Brutorum* P. 2. cap. 6. p. 246. & notabili observatione fundamentum habitualis incubi in parte capitis postica circa cerebellum confirmat Lovverus *Tract. de corde* p. 157. de quodam nobili: Adeò, ut respectu causæ revera nervorum affectus sit incubus habitua-

lis, isque vel paralyticus, vel convulsivus, i.e. qui vel ex denegato plus minus spirituum animalium influxu, propter impedimentum quasi obstructionis, & inde hinc musculorum resolutione, velex impetuoso nimis spirituum per dictos nervos propter irritationem quandam influxu, & hinc musculorum spasmo, oriatur. Prius Veteres, & adhuc suo modo Willisius loco allegato, ubi cerebellum affectum esse putat, ut Ephialtes quasi lethargus sit cerebelli: item Lovverus loco all. asserunt: Posterius verò affirmant moderni: vid. Schneiderus loco allegato: Et ob id à quibusdam, in specie Arabibus, incubus epilepsia nocturna: item epilepsia parva propter convulsiones musculorum thoracis, quæ similiter fiunt in omni insultu epileptico, vocari solet: unde in epilepticis respirationis est difficultas, & spuma apparet circa os; quo nomine vocatur à Roderico à Castro *Tr. de Epil. c. ult.* quia incubus confirmatus in epilepsiam degenerare tandem solet. Timæus von Gûlden-Klee sanè in casibus l. 1. cap. 17. refert incubum, cujus historia ferè persuadet, ad mala quasi paralytica eundem esse referendum; nihilominus in epilepsiam tandem lethalem desiit: Econtrâ Rhodius c. 1. obs. 54. refert exempla incubi vigilantibus obvenientis, qui in apoplexiam terminari observatus fuit. Forfan utrumque, ut in variis casibus, nempe tam paralyticum, quam convulsivum, in incubo locum habet: sicuti non rarum est, paralytin cum spasmis, & contrâ, subinde permutari, ita quidem, ut causa incubi, acidum nempe peccans, lymphæ medio ad cerebellum delatum, nunc irritando nervos respirationi inservientes, ac cordis motui dicatos, affectus spasmodicos; nunc spirituum motum nonnihil sufflaminando leviores affectus paralyticos inducat: hinc etiam cura ejus specialis ferè remediis antiepilepticis perficitur. Revera ergo incubo infestante laborant nervi diaphragmatis, & hinc reliqui musculi thoracis motui inservientes, qui convulsi impediunt motum diaphragmatis dilatatorium, unde necessariò respirationis difficultas supervenit.

Verùm cum idem nervus ex intercostali profectus, musculos thoracis movens, etiam furculum pro motu laryngis subministret, hinc est, quod consequenter à nervi intercostalis irritatione simul etiam convellatur larynx, qui exinde sensum strangulationis, & post modum etiam loquelæ impedimentum, aut saltem sonum inconditum, qualem epileptici aliàs etiam edere solent, subinde gemebundû, efficit; & cum etiam simul sub respirationis defectu imminuta plus minus evadat sanguinis

(Dd 3)

circu-

circulatio, ob id ab eodem infarcti pulmones anxietatem insignem præcordiorum inducunt: sicut dum evigilant tales ægri, cor insigniter palpitat, quod testatur motum convulsivum: & cum hæc omnia fiant imprimis in somno, facile ejus occasione anima rationalis, talium rerum nescia, concipit somnium quasi ponderis, nescio cujus, incumbentis. Notum enim est, quod iis, in quorum vesiculis seminalibus genitura turgēt, indeque genitalia nonnihil titillat & vellicat, ordinariò accidunt somnia &ea, quasi rem habeant cum hac vel illa scēmina cum voluptuosa genituræ excretionē. Uti ergo turgescētia & eruptio genituræ dat somnia &ea; simili ratione motus diaphragmatis & hinc thoracis impeditus dat somnia, & imaginationes compressionis & constrictionis thoracis à re superimposita. Somnium tale vagum applicatur interdum certo cuidam subjecto, unde tali affectu laborantes certum sibi objectum imaginantur: quando enim conqueruntur: *es lüge auff der Brust*; tunc est determinatum, & fit imprimis occasione sanguinis stagnantis in præcordiis: sic nimis premi imaginantur à vetula ingrata, quale exemplum habet Schenkius p. 129. l. 1. *observat.* de sacrificio, qui putavit, se comprimi à vetula, quam vidit & contrectavit. Hæc ratione Forestus incubo affectus putabat, pectus suum comprimi à cane nigro, unde respirare non potuit, utut scēmina videret esse somnium fallax; ut de se refert l. 10. *obs.* 51. Simile ferè exemplum habet Zacutus Lusitanus l. 1. *Prax. admir. pag.* 42. quod mediante gio per superiora & inferiora curatum fuit. Hinc rectè dicit Vincentius Alfarius à Cruce, idque ex autoritate Galeni, quod Ephialtes sit quædam quasi in somno epilepsia, cum eadem, utut leviora, perpetiantur in incubo dum quiescunt, quæ patiuntur comitiali morbo correpti, cum vigilant: utrobique scilicet ægrè respirant, & vox incondita profertur. Vitium imprimis est in nervis, in specie in nervo intercostali, sive in ejusdem radice aut exortu in cerebro & cerebello, sive in uno alterovè ejus plexu, antequàm scilicet surculos thoracem moventes hinc inde distribuit, lacessito in specie à lymphâ plus minus acri, acida, subtili tamen, unde respirationis symptomata, hinc cætera consequentia. Exemplum incubi ex nervo in exortu affecto allegavi *suprà ex Lovvero de corde.*

Affligit incubus in specie dormientes: nihilominus non mirandum, si in ipsis etiam vigilantibus oriatur; nil enim impedit, quo minus & in his diaphragma & reliqui muscoli, etiam interdum convellantur: refert enim Rhodius l. 1. c. item Smetius in *Misc. Med. de Incubop.* 547. observationes incuborum vigilantibus obvenientium. Adeòque formaliter ad affectus nervinos partium respirationi

inservientium, nunc paralyticos, nunc convulsivos, referendus incubus; materialiter seu subjectivè magis subjectum constitutionis melancholicæ, ut vocant, affligere solet. Hypochondriacis & scorbuticis imprimis familiaris est incubus, & quidem speciatim inclinantibus ad melancholiam hypochondriacam, sicuti aliàs affectus varii convulsivi frequentes sunt hypochondriacis; unde etiam iisdem facile talis pectoris potest obvenire convulsiva constriction. Imò ex hypochondriacis talibus ad scorbutum declinantibus derivandæ videntur maculæ, quæ eorum cutim pingunt; hæ ipsæ enim ut scorbuticis familiares sunt, ita etiam exinde, dum declinante incubi paroxysmo aliquis mador interdum prorumpit, illæ maculæ, das *Alp-Kneipen* / originem habebunt.

Præterea vermes abdominis in pueris inferunt incubum, sicut hi ipsi hostes ad horrendas etiam epilepsias, aut convulsiones, eosdem admodum disponunt: vid. Sennertus l. 1. *Prax. P. 2. cap.* 29. p. 579. Rarum est, Romæ observatum fuisse incubum epidemicum, quod ex Cœlio Aureliano refert Sennertus l. 1. sicuti mirabilis est affectus, quem recenset Forestus l. 10. *obs.* 52. medius inter incubum & epilepsiam, tertio quoque die rediens, & ita periodum tertianam observans, nodulo ex semine nigro præoniæ cerevisiæ immisso curatus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: patent ex relatione ægri. Possunt etiam hauriri ex concumbente cum ægro. Taliter enim affecti, imprimis noctu profundo somno oppressi, solent fieri anxii & queruli, gementes, raucum & inconditum sonum aut boatum proferentes, jacent immobiles, ita ut neque manum neque pedes moveant, parum aut nihil vocati respondent, & cum impetu, & expergefacti de nimia anxietate cordis & lassitudine conqueruntur, & varia de rebus præcordia prementibus referunt.

## PROGNOSIS.

Quod attinet prognosin: Incubus accidentalis ex se & causâ externa nil habet in recessu: Habitualis verò subinde prodromus est epilepsiæ, imprimis in junioribus; sicuti in senioribus minatur apoplexiam & melancholiam.

Quod si incubo nocturno jungatur subinde vertigo diurna, prognosis est eò certior, & malum periculosum.

Si incubus, dicit Sennertus, accidit partim dormienti, partim vigilant, deterior est; quia epilepsiæ propinquior: & rursum deterior, si post excitationem sudor frigidus, tremor



tremor cordis, spasmus, aut syncope sequatur.

## C U R A.

Quoad curam in ephialte: si est accidentalis,

I. Evacuandus est stomachus & primæ viæ.

II. Ordinetur benè dieta; & speciatim lautior cœna, & subitaneus post pastum decubitus vitetur.

III. Propinanda medicamenta volatilia & sa plus minus antiepileptica seu convulsionibus appropriata.

Habitualis seu confirmatus incubus ad modum mali hypochondriaci, melancholiæ hypochondriacæ, aliorumve morborum chronicorum, curari debet: nempe per digestiva, præsertim Galia, hinc per evacuantia, quibus subjungantur volatilia ac antiepileptica.

Inter evacuantia primatum obtinent vomitoria antimonialia. Modus adhibendi omnibus est notus. Si inferius laxare volumus, fiat hoc mediante extracto hellebori nigri, & Mercurio dulcificato in forma pilulari, quæ in epileptico insultu sunt expertæ.

℞. g.

℞. *Extr. helleb. nigri,*

*℥. dulc. ʒ. gr. xv.*

*scamm. ʒ. gr. ij. vel iij.*

*extr. trochisc. alhand. gr. j.*

*cum ʒ. destillato succini f. pilulæ.*

D. S.

## Haupt- und Magen-Pillen.

Aliàs insula etiam lennata sunt in usu; item MP. officinalium de lapide lazuli commendatur à quibusdam. Zacutus Lusitanus l. 7. *Med. Princ. Histor. in Observat. cap. 8.* commendat aloë, ut optimum in ephialte confirmata remedium; quæ passulis majoribus, quibus exempti sint acini, indatur ciceris parvi magnitudine: quarum passularum nonnullæ cum ʒj. diætæ aloës semper duabus horis ante pastum assumptæ, certè dicuntur curare incubum ac vertiginem, modò aliquandiu continuetur, donec ephialtes planè eradiceatur. Loco hujus remedii etiam pilulæ aloë-phanginæ juxta Zacutum Lusitanum simili ratione ad ʒ. vel 6. usurpari possunt: præservant non tantum ebrietatem; sed etiam assumptæ ante cœnam digestionem juvant sine metu insignioris laxationis: Quod si fortius laxare debeant, grano uno alterovè magisterii scammonii acuari possunt. Loco harum pilularum substitui possunt pilulæ sine cura Cyriaci Weberi, quarum descriptionem videbitis in *Pharmac. August. Class. 6.*

Præmissa purgatione iudorifera volatilia pro universo corpore abstergendo & sanguine ventilando sunt maximè proficua. Inter appropriata hinc convenientia præ cæteris palmam refert Pzonia mas, cujus radix, folia, semen & flores sunt frequentissimi in usu; si ve ra-

dix debito tempore collecta infundatur potuit si ve ejus ʒ. si ve grana seminis num. 15. usurpentur; si ve ex his paretur emulsio; si ve ex floribus fiat ℞, & aliquandiu continuentur. Huic adjunguntur nonnulla alia in epilepsia usitata, ut flores itæchados, lavendulæ, anthos, &c. à quibusdam smaragdus præparata tanquam singulare specificum contra somnia turbulenta, pavores nocturnos, & contra incubum & in infantibus & adultis insigniter commendatur. Alii cubitum ituri præservationis gratiâ ab incubo theriacam cum aqua Pzoniz assumunt; vi enim opiata convulsivos spasmos sistit: loco cujus etiam elæosaccharum roris marini, succini, salviæ, lavendulæ, cinnamomi, anisi & similia sub introitu lecti, præcedente cœnâ parca assumpta, commendari solent.

Anisum enim appropriatum in incubo remedium est; semen scilicet ejus paulò largius sub introitu lecti prægressâ parca cœnâ assumptum, cum etiam oleum ejus præstet egregiè in curandis somniis truculentis & turbulentis, sub introitu lecti ad aliquot guttas cum aliis permixtum & assumptum, unde etiam insomnia turbulenta & pavores nocturnos puerorum idem oleum potenter sistere solet: item ~ carminativus de tribus, vel ~ ʒ. ci anisatus, à guttis 30. vel 40. vespere post moderatam cœnam sub introitu lecti: vel

℞. R. ʒ. ʒ. ʒ.

~ ʒ. ci ʒij.

M. S.

## Resolvende Tinctur.

Quod si forsan in paroxysmo Medicus vocaretur, ita ut medio noctis quasi orthopnoicus spiraret æger, vomitorium præscribat. Sed si hoc jam aliquot dies noctesque antea præscriptum sit, aut suspicio sit magis flatulenta, quàm præcisè humorosa peccare, præscribatur clystima, simulque mixtura volatilis aromatica: e. g.

℞. HB. absinth.

*hyssopi ʒ. Mj.*

*fl chamomill. M. ij.*

*bacc. laur. ʒj.*

ʒ. ʒij.

Coqu. in f. q. ∇ simpl.

Colatura ʒix. adde

*Elect. de hiera c. agar. ʒj.*

*olei destillati terebinth. ʒj.*

M. pro Clysmate: S.

## Abführend Clystier.

℞. ∇ Hyssopi ʒij.

*mentha ʒj.*

*cinnam. ʒj.*

~ ʒ. ci ʒij. vel ʒij.

*syr. nicot. ʒj.*

M. D. S.

## Haupt- und Magen-Tranklein.

Capiatur cochleatim.

Vel M.

Vel ꝑ.  $\nabla$  Hyssopi  $\mathfrak{z}$ ij.  
 menth.  $\mathfrak{z}$ i.  
 cinnam.  $\mathfrak{z}$ vj.  
 ~ asthmat.  $\mathfrak{z}$ i.  
 oxymel. squillit.  $\mathfrak{z}$ ß.  
 M. S.

Resolvirend: Haupt- und Brust-  
 Eranklein.

Quomodo infantes tractandi, videb. in  
 Willisio de Anima Brutor. pag. 248.

## CAPUT III.

De

### Vitiis expirationis læsæ.

**V**itia, quæ expirationem lædunt, sunt imprimis

I. Sternutatio, quando exspiratio fit cum impetu & insigni labore.

II. Tussis, quando exspiratio fit interruptim & cum sonitu.

Quo etiam faciunt

III. Vocis vitia, quando  $\Delta$  erumpens non legitimam, sed vitiatam vocem profert.

## ARTICULUS I.

De

### Sternutatione.

**S**ternutatio est vitium singulare in  $\Delta$ is expiratione contingens, & quidem nihil aliud, quàm motus convulsivus musculorum pectoris expirationi inservientium, & ita reverà est affectus pectoris, in quo motu convulsivo, post aliquam inspirationis inchoatæ suspensionem, subitò & magnâ, sed mox item cessante vi per nares & os  $\Delta$  unâ vice exploditur, unde sonus raucus excitatur. Omnium consensu duo conjuncta sunt in sternutatione, nempe sensus quidam certæ cujusdam molestiæ in naribus, conjunctus cum violenta thoracis compressione.

### PARS AFFECTA.

Pars proximè affecta sunt musculi thoracis, ejus constrictioni & expirationi dicati, speciatim musculi intercostales interni, & abdominis.

Forma sternutationis consistit in motu convulsivo musculorum expirationi dicatorum, & diaphragmatis: id quod patet in specie, dum voluntariò artificiosam ciemus sternutationem, quod necessum est fieri à musculis voluntariis imperio subjectis.

Scilicet percipimus semper simul in sternutatione non solum cum impetu constringi thoracem: sed etiam diaphragma moveri sursum, simulque subitò abdomen comprimi ab ejus musculis, & hinc à contentorum sursum motu diaphragma intra thoracem cogi, indeque postmodum regionem illius instar

cinguli, ubi connectitur costis nothis diaphragma, dolere. Unde & in partu difficili, aut secundinarum retentione, proficua est sternutatio, dum à musculorum abdominis subitanea constrictione exploduntur contenta: sicuti è contrario in herniis intestinalibus eadem nocet.

Causa occasionalis hujus convulsionis est in specie, quicquid valet irritare membranam narium internam superiorem: Nulla enim unquam fit sternutatio, in qua non membrana ista sensibilis, nares internas succingens, vellicetur, & quasi in crispationes cieatur: quo factò demum pectus per consensum irritatur & ita convellitur.

Fundamentum hujus consensus est quædam per plexus connexio furculorum quorundam nervorum paris tertii & quarti ad nares productorum, cum pari nervorum vago & intercostali, thoracem moventium: nervulis ergo istis ad nares dimissis, occasione membranæ vellicatæ, spasmus fortiori, adeoque secundum eorum ductum irritatis, & ita spasmus correptis, simili spasmus convelluntur nervi thoracem moventes, & exinde diaphragma aliquandiu propter inspirationem protractiorem deprimitur, sed mox cum impetu & forti motu sursum propellitur: vid. Sylvius in *Anat. Cerebri*: sicuti & cæteri musculi inspirationi inservientes magis tenduntur, sed mox superveniente contrario spasmus nervorum & musculorum, expirationi inservientium, sternutatio supervenit, adeò ut re-  
 cte Bartholinus sternutationem levem epilepsiam, nuncupet in *Act. Med. Hassniens.* vol. 2. p. 49. Certè, quo sensibilior est ista narium membrana superior, eò propter faciliorem irritationem promptius sternutamur: hinc Itali ex crebriori pulveris sternutatorii abusu, & hinc membranæ crebrius irritatæ, sed à copiosiori lymphæ affluente minus sensibilis factæ culpâ, minus sternutare solent, cum nos Germani ex tantillo eorum pulveris odore crebrius sternutare soleamus. Interim ultra præviam talem irritationem interdum & convulsus quid esse, & etiam per consensum aliarum partium per consensum vellicando thoracem excitari posse sternutationem: vid. curiosa historia illustrata in *M.A.N.C. ann. 3. obs. 138. p. 2. 47.* ubi referuntur in ancilla sternutationes 300. in uno paroxysmo, eoque singulis 24. horis periodicè repetente. In his, ubi sunt crebriores & vehementiores sternutationes invitz, ad nervos convulsos respiciendum. Plura de sternutatione ejusque natura conf. Martinus Schockius: Schneiderus *Tr. de Offecribriiformi*, & in specie de catarrhis Willisius in *Pathol. Cerebri*.

Irritatio ista membranæ narium intimæ variis fit modis: internè & externè. Externè nunc sunt odores fortes: sic post odorem majore-

majoranæ, rosarum, Basilici nonnulli sternunt: acidum in fumo etiam sternutationem excitat; nunc pulveres in Ævolitantes inspirati; nunc medicamenta paulò acriora naribus insufflata, ut nasturtium. Quò pertinent omnia sternutatoria artificialia, à quibus, vellicatâ membranâ narium, sternutatio promovetur: qualia sunt, quæ fiunt ex majorana, liliis convallium, radice ellebori albi, euphorbio, foliis nicotianæ, castoreo, esula præparata, & præ cæteris omnibus, quæ fiunt ex vitriolo ad albedinem calcinato. Internè lymphæ membranas narium aliàs naturaliter humectans, paulò acrior imprimis si fuerit, hinc coryzam frequentes sternutationes præcedunt.

Patet ex his: in omni sternutatione cerebrum esse insons, non verò concuti, ut vulgò dicunt. Concutitur sanè caput, sed sine cerebri concussione. Patet etiam, quod ea, quæ sternutatione ejiciuntur foràs, primario sint ex faucibus & naribus, secundariò ex pectore, aspera arteria, & pulmonum bronchiis, ex naribus & faucibus quidem, quando membranæ pituitariæ à Schneidero de Catarrhis primus descriptæ, continuò talem plorant lympham, quæ oritur ex glandulis post dictas membranas confitis: Quæ lymphæ, ubi fuerit copiosior, aut etiam spissior, quod fit ab Æ inspirato, cum impetu per laryngem erumpens obstacula ista molesta & humores ibidem hærentes removel & ejicit. Quod si quid hæret in bronchiis asperæ arteriæ, aut larynge, illud simul sternutatione expellitur. Hinc in morbis pulmonum, pleuritide & peripneumonia sternutatio mala est, autore Hippocrate: ad pituitam verò in bronchiis pulmonum contentam, potenter expellendam, quæ tussi rejici non poterat, sternutamentum conferre, docet Galenus: videatur Riverius, ubi de Sternutatione. Unde etiam sternutatoria, quæ ex narium confiniis hos humores serolos, plus minus viscidos propriè emulgent, nihil ex capite emungunt, nec cerebrum purgant, sed tantum ex membranis narium, præsertim pituitaria superiore, substratisque glandulis, hauriunt: simili ratione atque apophlegmatismi nihil omninò ex capite, sed immediatè ex glandulis palatinis sublingualib⁹ & maxillaribus; mediatè vero ex massa sanguinea, emulgent & hauriunt. Interdum mucus firmiter impactus in stomacho, etiam sternutationem excitavit.

Fit interdum, ut coitus etiam sternutationem promoveat: vid. Bartholinus *Centuria 5. Historia 99.* Quò etiam pertinet Amatus Lusitanus, qui dicit: quod quidam, qui à Venere aliquamdiu abstinerit, ad spectâ pulchrâ muliere, fortiter sternutarit; cujus sternutationis optimum medicamentum sit coitus: Vid. *Centur. 4. Obs. Cur. 3. in Scholio*: item inspe-

Tom. II.

ctio Ois sternutationem excitare, vid. Mayovv *Tr. de Se, nitro, &c.*

Patet ex dictis etiam, sternutationem esse motum quendam singultui contrarium: nam in singultu cum impetu inspiramus, seu diaphragma convellitur deorsum; sicut in sternutatione cum impetu expiramus, & diaphragma convellitur sursum. Porro in singultu fit sonus clarus & ingratus propter apertum laryngem; in sternutatione fit sonus raucus & stridulus propter occlusum nonnihil laryngem, & propter impedimentum narium.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica per se patent.

### PROGNOSIS.

Quod attinet signa prognostica: sternutatio à causa externa, nisi crebrior sit, non mala est.

Copiosior, frequentior, violentior, sine causa manifesta crebro repetens, est mala, & interdum lethalis, utut leve videatur malum; graves enim nervosi systematis affectus epilepticos, aut convulsivos, aut in ætate grandæva apoplecticos & paralyticos, portendit: conf. Horstius in *Obs. p. 290.* ubi habet sternutationem admodum dubiam in puella, quod confirmat Hildanus *Cent. 4. Observ. 12.* de sternutatione lethali in puerpera observata, quæ, cum aliquoties sternutasset, exspiravit.

Interdum ex suppressa sternutatione per artem oborta est epilepsia.

Ulterius sternutatio nociva est oculis: sic enim ex sternutatione nimia cæcitatem nonnunquam obortam refert Hildanus *Centuria 1. Observ. 24.* uti etiam Rolfinccius in *Diff. Anatom. pag. 1254.* Ob id cauti simus in oculorum affectibus cum sternutatoriis, ne cæcos reddamus eos, quibus debemus visum conservare. Potius ergo errhina in oculorum affectibus & epilepsia conveniunt, in quibus etiam sunt optima; minus sternutatoria: Conf. Bartholini *Act. Med. Hassniens. Vol. 2. p. 243. 248. 251. & 303.*

Postmodum sternutatio in mulieribus per accidens aliquid habet in recessu: nempe promovet menses, partum difficilem, molam, fortiter totum abdomen commovendo, & fortiter universum ferè nervorum systema concutiendo; quando enim ita concutitur abdomen, insigniter sanguis circa uterum stagnans promovetur & cominovelur: Vel factâ tali concussione motus & vibratus uterus, sponte ejaculat foetum. De mensibus vid. Hildanus *Cent. 3. Obs. 51.* De partu verò, uti etiam de strangulatu uteri, audiendus est Hippocrates *Section. 5. Aphorism. 35.* Vid. *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 138.*

(Ec)

In



In nimium autem fluentibus mensibus & in gravidis periculosa est fortis sternutatio.

Denique sternutatio post usurpata sternutatoria fortia non succedens, malum signum est, speciatim si hoc fiat in apoplexia aut epilepsia, & similibus affectibus: signum enim est, totam vim animalem esse prostratam.

### C U R A.

Quod attinet curam: hæc consistit in eo, ut narium vellicatio, & hinc ortus impetuosus spirituum motus, & sic nata thoracis convulsio, tollantur. Removenda ergo in Sternutatione est

I. Causa membranarum narium vellicans;

II. Sensus irritationis obtundendus.

Unde odor opii aliorumque narcoticorum, vel laudanum opiatum ipsum assumptum, est optimum ad sternutationes nimias. Exemplum habet Zacutus Lusitanus, item & rosaceum opio impræguatum interioribus naribus illinendum. Ocymum commendat Amatus Lusitanus, ut & ejus succum. Tandem semen feniculi & anisi aceto infusa naribus pro odoratu admoveantur. Lac tepidum, vel cum  $\nabla$  suaveolente temperatum, etiam pro naribus eluendis injectum, est optimum; præsertim si stimulatio ab occasione externa, inspirato sc. acriori sternutatorio, fuerit excitata: vid. Horstius *l. 5. obs. 51.* item Forestus item Bartholini *Acta Med. Hassniens. vol. 2. p. 166.* loco lactis tepidi cremor lactis & mucilago seminis cydoniorum vel psyllii cum aqua nymphæ extracta, naribus injecta conducit.

Plura de Sternutatione nimia videb. in Amato Lusitano *cent. 4. cur. 4.* Horstius *in obs. lococitato*, & in specie *M. A. N. C.* supra allegata.

## ARTICULUS II.

De

### Vitiis Vocis.

**A**D expirationis vitia & vocum præternaturalia pertinent errata, cum vox propriè formetur sub  $\Delta$ e exspirato. Talia sunt, quando vel deficit vox in aponia; vel vitiatur in specie in raucedine.

## MEMBRUM I.

De

### Aponia.

**D**eficit vox vel vitio thoracis, vel vitio laryngis: thoracis vitio deficit, quando  $\Delta$  non convenienter exspiratur, uti fit in apoplexia graviore, aut tali thoracis convulsione, ubi inspiratio & exspiratio impeditur, ut subinde fit, e. g. in affectibus hystericis & aliis convulsionibus. Vitio laryngis, non modificantis

$\Delta$ em sub elisione, vel propter ejus rimulam, vel propter musculorum ac nervorum movementum causam. Rimulæ adest vitium, quando à tumoribus vicinis impeditur plus minus ejusdem apertio: item quando epiglottis facta est ossea, vel quando ab assumptis adstringentibus angustatur penitus & constringitur rimula laryngis, de quo vid. Barbetæ *Anatom. Pract. libr. 1. c. 4.* Vox deficiens musculorum & nervorum vitio in specie dicitur aponia, quæ nil aliud est, quam obmutescencia ex vitio laryngis: si enim vitio linguæ fiat, dicitur loquela amissa, & linguæ tunc motus deficit, aut alia ejus vitia suis signis se exhibent, quæ in aponia secus se habent, in qua nullum linguæ vitium, præsertim quoad motum, observari solet. Aponia dicitur aliàs anaphthia, quæ Hippocrati sunt distincta à modernis verò confunduntur: Aponia enim Hippocrati idem ac apoplectici, cum aponia nomine intelligat illos, qui ne motum quidem ullum prætericum seu voluntarium retinent: Anaphthos verò eos, quibus vitio laryngis vox cessat aut deficit: Vid. Gorræus *in definition. Medic. p. 27. & 51.*

### C A U S A.

Aponia ista, prout communiter accipitur, fit ex vitio nervorum & musculorum, quando hi nunc paralyti seu resolutione, nunc spasmolaborant. Quoad vitium paralyticum: Aponia fit frequentissimè à paralyti musculorum laryngis: ita ut totus larynx sit apertus, & ita deficiente  $\Delta$ is in larynge strictura, nullus possit formari sonus; siue larynx vitio proprio, siue vitio nervorum recurrentium ad eas distributorum accadat. Nam in canibus dissectis, vellicatis illis nervis, aponia in promptu est: sic videmus non rarè aponos fieri, qui magna raucedine laborant: Id quod fit probabiliter à nimia humiditate & consequenter resolutione musculorum laryngis. Manifestum hujus rei exemplum est, quod refert Tulpius *l. 1. obs. p. 78.* Hinc etiam tardior loquela ob abundans phlegma, qui anno 12. demum loqui coepit, teste Amato Lusitano *cent. 6. curat. 5.* Pertinet huc etiam crapula, subinde aponiam inferens paralyticam: Vid. Herchsterus *decad. 3. cas. 9.* Quo etiam facit aponia ex casu ab alto, & inde contracto vitio nervorum paralytico: Poterius *r. 2. cap. 11.* & jam olim notata observatio Galeni, quæ vid. in Sennerto *libr. 2. praxi pag. 254.* sic ex terrore nervorum vitio facta aponia, per apoplectica restituta, vid. in Bartholini *Act. Med. Hassniens. vol. 1. obs. 101. p. 193.* Curiosa etiam est aponia paralytica, ex globulo plumbeo per vomitum moto, indeque recurrentes nervos premente, de quo

de quo vid. Deodatus in *Valetudin.* pag. 97. Ut taceam nervos recurrentes quovis infortunio abscissos vel resectos: conferatur Sennerius *lib. 2. Prax. Part. 3. c. 4. p. 355.* Tempore hyemali observavi aliam aphoniam in virgine, quæ cubans noctu in hypocaufto, ac suaviter dormiens, ob extinctam lampadem ex oleo non adeò puro constructam, & huius fumo retro successivè inspirato, altero mane surgens, cætera sanissima, aphona erat. Videbatur subesse vitium quasi paralyticum laryngis ejusque musculorum, ex isto fumo inspirato læsum, quo hiantes, non potuit formare vocem. Curabatur per electuarium ex scordii pulverisato, cum melle excepto, crebrius assumpto & deglutito. Atque hæc aphonia ad constitutionem nervorum & musculorum paralyticam pertinent, si in paroxysmo apoplectico accedant, & hoc cessante, etiam aliquandiu affligant, sive sine eo, aliis functionibus omnibus salvis, ægros subindeprehendant.

Quoad alterum aphoniæ fiendi modum: hunc ex contrario vitio, v. g. convulsione musculorum & nervorum laryngis, fieri insinuavi: tum enim constricta rimula similiter nullam potest edere vocem.

Observatur crebrò talis in graviore paroxysmo hysterico, in quo aphonia jacent ægræ, pariter ac epileptici; convulsionibus enim sæpius aphoniæ superveniunt. Speciatim videatur hic epileptica aphonia per venæ sectionem curata, in Hoechstedtero *Decad. 4. Cas. 1. & conf. casus parallelus, nempe Cas. 2. & 4.* Item ex vermibus in ventriculo & intestinis subinde obmutescencia observatur, teste Foresto *l. 21. obs. 28. in scholio, & l. 14. obs. 33. in schol.* Notum nempe variis spasmodici affectus sunt, occasione vermium obvenientes. Pertinere etiam huc videtur curiosa observatio in Bartholini *actis med. Hassniens. volum. 1. obs. 86. pag. 170.* Nam ex constrictionis sensu in loco affecto spasmus nervi recurrentis adfuisse probabiliter concludi potest. Forfan & huc pertinet aphonia ista mirabilis *M. A. N. C. Ann. 3. obs. 121. pag. 193.* Sponte sua ex improvviso affligens, sponte suâ denuo cessans ac recidivans: nempe vix paralyticum, sed potius convulsivum quid subesse videtur. Forfan etiam huc pertinet aphonia, suborta ex retenta gonorrhœa virulenta, Fonticulis in inguine apertis curata, apud Zacutum Lusitanum *lib. 1. prax. admir. observ. 97.* nempe acre virus quæcumque facile nervos recurrentes vel musculos laryngis irritando ex spasmò aphoniam inferre potuit. Res dubia quidem est: an aphonia in febribus interdum superveniens paralyticum potius an convulsivum vitium sit? Interim tamen, quantum colligere valeo, ad convulsi-

va vitia potius referrem: Nam & quæ in variolis non rarò observantur aphoniæ, (vid. Hildanus *centur. 6. observat. 14.*) ex convulsione potius esse videntur, cum convulsiva pathemata non rarò in illis observentur; dum scilicet acre variolarum venenum nervos recurrentes irritando, ad spasmos illos cogit: sicut tussim, raucedinem, ac his affinia, asperæ arteriæ ac laryngis mala eadem inferunt. Sed præter paralytin ac convulsionem etiam subitanea spirituum perturbatio ad aphoniam disponere valet: sicuti videmus, quosdam nimio terrore perculsos planè quasi obmutescere. Pertinet huc mirabile exemplum à *Pharias* ex visis canceris in *M. A. N. C. ann. 2. observat. 145. p. 229. & anno 3. observat. 187. pag. 348.* Præ quo longè curiosior est subitanea ista aphonia cum perfecta in toto corpore *ἀνασθησία*, omnibus cæteris, tam vitalibus quàm animalibus functionibus salvis in *M. A. N. C. anno 3. observat. 251. pag. 454.* quæ omnia tamen beneficio venarum ramnarum sectionis breviter evanuerunt.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin apoplexiæ juncta aphonia, difficilius curatur, ac interdum diuturna esse solet.

Quæ cum singultu fiunt aphoniæ, pessimæ sunt, autore Hippocrate.

Balbi profluvio alvi maximè cortipiuntur, teste Hippocrate *sect. 6. aph. 32.* & hoc ipso ferè sanantur.

Aphoniæ per se & solitariæ, modò ritè tractentur ægri, successivè curabiles sunt; quæ verò fiunt sub cursu febrium malignarum, pessimæ notæ signum solent esse.

### C U R A

In cura ad primarium morbum, cujus symptoma est aphonia, aut saltem ad ejus causam antecedentem, respiciendum, ut his remotis facilior prædicti symptomatis fiat curatio. Pro quo curando ad laryngem & ejus musculos ac nervos recurrentes imprimis respiciendum, tam eorundem paralytin undecunque natam, quàm spasmus ex nimia irritatione linguæ removendo: internè per volatilia aromatica & nervina, aliàs cephalica dicta, e. g. ~ *Θ\** ci cum essentia castorei & *ῥ* *ῥ* succini mistum & destillatum, liquorem C. C. succinatum, &c. subindè sudorem simul provocando, & etiam ptyalissimum masticatoriis promovendo. Imò in contumaciori malo, præsertim paralytico, dicta sudorifera ex lignorum decoctis instituenda venit. Hinc externè faculi ex nervinis aromaticis, ~ u vini irroratis, exterius collo applicandi; vel ~ apoplectici cum ~ u lumbricorum vel formicarum eodem in loco calidè cum linteis multiplicatis applicandi, aut olea destillata nervina succini, (Ec 2.) lavan-

lavendulæ, rutæ, juniperi cum theriaca permista, aut cum balsamo Peruviano subacta, ibidem frequentius illinenda, aut etiam essentia castorei, vel solitaria, vel istis sociata, sedulo admovenda; oleum imprimis spicæ linguæ illitum in loquela amissa egregie convenit; internè etiam cum V. Vel

℞. HB. *salv.*  
anthos āā Mj.

*sem. eruca*  
*sinapi* āā 3j.

Coq. in f. q. ∇ *simpl.* in vase clauso:  
Colatura ℔j. adde

— *Cerasor. nigr.* 3vj.

Θ\*ci 3j.

*Mellus anthos.* 3j.

Misc. pro gargarismate in aphonia, laryngis affectu post paroxysmum apoplecticum. S.

#### Mund-und Gurgel-Wasser.

Internè V, cui flores lavendulæ infusi, cochleatim propinandus. Pro quorum omnium meliori successu, ubi circumstantiæ aliæ permiserint, & venæ sectio sub lingua interdum institui potest. Vid. M. A. N. C. ann. 3. *Obs.* 251. & Wedelius *disput. de vena sectione* cap. I. pag. 7.

## MEMBRUM II.

De

### Raucedine.

**E**X minoribus causis fit vox nonnihil immutata seu depravata, quando nempe diversimodè & non naturali modo sonat vox, quod fit variis modis. Præsuppono nempe hic notitiam ac constitutionem fistulæ pneumaticæ, ejusque capitis laryngis, ut & muscutorum laryngis, seu vocem formantis, h. e. Vocales, qui sunt sonus ex larynge simpliciter emissus, & oris certa amplitudine, majore vel minore, absque nova allisione variatus; sicut, dum partes oris, speciatim lingua, vocem variâ allisione & inflexione modificant, consonantes fiunt, & consequenter propriè sic dicta loquela seu vox articulata efformatur. Jam ergo uti notum est, quod per fistulam pneumaticâ in longitudine & latitudine, humiditate & siccitate, &c. aliis qualitatib⁹ & circumstantiis prout variat, varius formetur etiâ sonus, nunc gravis, nunc suavis, nunc clarus, nunc stridulus, nunc raucus; ita simili ratione cum nostra fistula pneumatica seu aspera arteria & larynge comparatum est, similibus ex causis vocem variante; dum nunc est ampla, nunc angusta, nunc est sicca, nunc humida, nunc alio modo vitiata, varios etiam ac varias voces per expirationem profert: speciatim quando est sicca & arida, profert vocem claram, ac so-

num, quem speciatim in febribus acutis ardentibus vocamus clangosum: Ubi verò larynx & aspera arteria est nimis humida, tunc fit vox rauca, fit eadem simul obscura & quasi interrupta, quando non tantùm humida, sed etiam mucilagine crassa inviscata est aspera arteria. Cum ergo aliæ vocis depravationes vix cadant sub Medici curam, imprimis agam de raucedine.

Redditur vox rauca, quando **A** exspiratur per asperâ arteriam & laryngem, nimis humidas ac nimis madefactas, unde sæpè in diuturna loquela vox raucescit: quia quo plus loquimur, uti copiosior lymphæ emulgetur saliva in os; ita propter motum laryngis copiosior lymphæ emulgetur istâ occasione in laryngem, unde hæc uberius effusa tandem raucedinem infert.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta in Raucedine est aspera arteria, ejusque larynx; larynx enim primario format vocem.

### CAUSÆ.

Causa raucedinis proxima interna est in specie nimia effusio lymphæ tenuis & moderatæ glutinosæ, quæ per asperam arteriam transsudat, eamque cum larynge aliâs naturaliter humectat & imbuit, ut partim ab **A** inspirato, vel inclementiore, vel variis effluviis permisto, defendat, partim ut, ubique eandem planam reddendo, voci formandæ aptiorem reddat, & oritur hæc ipsa ex glandulis juxta annulos laryngis sitis: de quibus præter Bartholinum in epistol. vid. Schraderus in *obs.* pag. 199. quibus addatur membrana glandulosa interiùs cingens asperam arteriam: de quo Willisius in *pharmac. rational. part. 2. p. 11.* Quod si lymphæ hæc majori copiâ eo suffundatur, & nimis humectet asperam arteriam & laryngem, hoc modo omnis raucedo oritur, ut in aliis instrumentis pneumaticis fistulæ humectatæ dant raucum sonum.

Observanda est differentia raucedinis, vel recentis vel inveteratæ: Illa à lymphæ simpliciter tenui, nunc mitiori, nunc acriori, nimis saltem humectante: Hæc à crassiore, mucosa, tegmine aquoso obducente interiùs bronchum nascitur.

Causa remota excitans habet convenientiam cum tussi: nempe est irritatio laryngis, cujus occasione copiosior lymphæ contingit effusio, sive fiat irritatio à causâ externa, sive interna.

Quoad externam: raucedo subinde solet oriri occasione **A**is inclementioris inspirati, fumi **A**is accensi & spirituum acidorum inspiratorum, aut effluviis acrim **A**i per-



permistorum; unde etiam subinde tussim nunc præcedere nunc comitari solet raucedo. His & suo modo diuturnior sermo aut loquela vel vociferatio intensior, aut cachinnus diuturnior & vehementior addi possunt: quia quo plus loquimur, eò copiosior emulgetur saliva per vasa salivalia & per glandulas, ratione motus linguæ: parili ratione per motum laryngis asperæ arteriæ copiosior lymphæ provocatur, quæ dat raucedinem: Item facit huc potus nimis maximè acidulatus: Potus vini raucos quosdam facit, quatenus successivè fauces irritat, etiam consequenter ad laryngem effunditur lymphæ, unde raucedo.

Internè ad raucedinem disponit seu irritat laryngem affectus catarrhalis, lymphæ acrior, salior, aut acidior, quacunque occasione vel vitiata, vel ad asperam arteriam delata; quæ titillando & irritando uberiores lymphæ effusionem, & ita raucedinem concitat. Talis autem raucedo vulgo catarrho tribuitur, & propriè bronchus dicitur, qui nullatenus à capite destillare putandus est, quoad vulgaram opinionem, sed ex propriis laryngis & asperæ arteriæ glandulis effunditur, & frequentissimè à causis externis provocatur. Interdum tamen etiam ex vitio interno oritur. Facit huc excoariatio partium asperæ arteriæ internarum ex lymphæ simili acri: id quod in huc Venerea obtinet, quæ sæpius gravem & diuturnam raucedinem infert. Multum confert constitutio narium & faucium ad raucedinem: coryzantes etiam emittunt vocem raucedine præditam nonnihil: sicuti scorbutici ob acrius serum faciliè raucescunt. Tussis crebrior, præsertim in qua acrior plus minùs materia ejicitur, irritando laryngem, & hinc copiosioris lymphæ instillationem provocando, ad raucedinem disponit; hinc phthistici, item empyematici, non rarò raucescere solent. Omnes hæ causæ moderatæ aut quæ faciliè corrigibiles sunt, levem inferunt raucedinem.

Quod si verò gravior & contumaciior raucedo fuerit, ita, ut vel copiosior lymphæ continuo effusa tandem spissescat, utificari potest tempore hyberno, vel alio modo vitietur, & in mucum degeneret; vel occasione irritationis laryngis & uberiores lymphæ effusionis tandem successivè læsa aspera arteria & larynx simul suum nutrimentum proprium, sub assimilatione alienatum, profundant, istudque in cavam asperæ arteriæ deponant, malum gravius longè & periculosius redditur, & hinc subinde mucosa spissa oris expectoratione ægri reddere solent; hinc apud Practicos prior raucedo à sero tenui & acri, posterior verò à materia pituitosa, oriri dicitur. Unde & imprimis in inveterata tali raucedine, aut in diuturniori malo, ad pulmones vel maximè re-

spiciendum erit, cum talis occultam vomitum pulmonum insequitur, ut rectè observatum fuit in Bartholini *Act. Med. Hassniens. vol. 2. p. 295.*

Reliqua vocis vitia, ut sunt vox tremula, intercepta, &c. videantur in Sennerto *lib. 2. Prax. cap. de vitis vocum.*

### PROGNOSIS.

In prognosi: Raucedo à causis externis nihil mali innuit; inveterata verò, aut quæ à causis internis læsionem insignem asperæ arteriæ conjunctam habet, in specie in senioribus, aut quæ per annum & diutius continuatur, vix sanatur; recidivat enim levi, & tussim chronicam aut periculum phthificos infert; sicut & bronchi & coryzæ in valdè senibus coctionem non admittunt; vid. Hippocrates *sect. 2. aph. 40.*

Phthisi autem raucedo conjuncta eandem exasperare solet; quæ enim ob suppurationem phthificos & peripneumoniam fit, ferè sub mortem futuram fieri solet.

### C U R A.

In cura attendendum ante omnia, ut causa remota, irritans asperam arteriam & hinc propinqua, removeatur, sic spontè cessat; unde, quoad proximam, observandum imprimis: an raucedo ab externa vellicante fauces vel interna causa inducatur? deinde, an lymphæ humectans mitior; an verò acrior fuerit? id quod juncta tussis ostendit; Item an recens vel inveterata sit? hoc est, an simpliciter à lymphæ tenui acri & copiosiore nimis, humectante asperam arteriam; an verò simul à mucro crassiore & viscidior, ex degeneratione alimenti oriundo, & laryngem incrustante oriatur; id quod partim ex sensu majoris vel minoris titillationis, partim ex excretis per os, quæ secreatu vel tussi rejiciuntur, manifestum est.

Recens igitur raucedo à causa externa enata, hæc remora per opiata, lenientia, temperantia, irritationem & hinc lymphæ effusionem sistendo; à causa verò interna, à lymphæ copiosa per sudorifera catarrhalia ex *Se* volatili succini, quælibet corporis contenta atque etiam lympham mundificantia & ordinarium motum ejus promoventia; & hinc per temperantia & opiata, acrimoniam lymphæ demulcentia tollitur, quæ maturè maritentur sudoriferis; sic enim magis tuta est; præmissis, si opus fuerit, purgantibus talibus, quæ sub feri forma evacuare solent, qualia in specie sunt gummi guttæ, radix jalappæ, cortex radicis esulæ, elaterium, ebulus & sambucus: de quibus infra, ubi de vitiis glandularum. Inveterata verò raucedo per incidentia, & hinc expectorantia,

optimè levatur. Raucedo si sit à lymphate-  
nui & à causa externa, fauces vellicante, pa-  
rum vel nihil per os excerpitur: si verò sit in-  
veterata, ubi mucus copiosus incrustat laryn-  
gem materia crassa viscida plus minus copiosè  
per sreatum & ruffim expectoratur: pro quo  
scopo interdum vomitus etiam necessarius est.  
Quod si altiores in corpore radices habeat  
malum, v.g. lucem &ream, scorbutum, vomi-  
cam pulmonum, &c. ad hæc primaria cura  
dirigenda, simul tamen symptomati, scil. rau-  
cedini, succurrendum.

In raucedine ergo recenti à lymphâ nimis  
acri, tenui & copiosa, conveniunt temperan-  
tia, incrassantia aliàs dicta, quæ acrimoniam  
lymphæ leniunt, & fauces plus minus lubri-  
cant: item opiata & similia præsertim papa-  
verina: unde syrupus de papavere, diaco-  
dion Montani cum baculo liquiritiæ usurpa-  
tus, essentia opii, theriaca, &c. conveniunt.  
Inter temperantia convenit admodum gly-  
cyrrhiza ejusque syrupus, & alia medicamen-  
ta ex ea, syrupus violarum, de jujubis, quem  
Rulandus & Dodonæus valdè commendant;  
oleum sacchari, tam simplex quàm compo-  
situm; mucilago radice altheæ cum saccharo,  
juscula avenacea cum passulis: sic diacodii  
Montani, item scabiosæ syrupus, vel misti,  
vel cum rob passularum subacti, cum baculo  
liquiritiæ assumpti, omnibus Loh incrassan-  
tibus & expectorantibus præstant: Vel

℞. Syr. papav. alb. ʒvj.

violar.

glycyrrhiz.

de jujub. aa. ʒß.

rob. moror. ʒiij.

M. D. S.

#### Gafft gegen die Heiserkeit.

Capiatur successivè lambendo cum gly-  
cyrrhiza.

Vel ℞. Syr. diacod. Mont. ʒvj.

mell. vel rob. passul. ʒij.

extr. liquirit. ʒj.

diluantur cum paucò ▽ scabiosa.

M. D. S.

#### Gafft zum Halse.

Balsamum sulphuris anisatum aut terebin-  
thinatum, vel solum vel cum saccharo in for-  
mam pulveris subactum, est quoque exper-  
tum in lymphâ copiosiore, etiam viscidiorè;  
cumque hoc raucedinem, quæ ad aliquot an-  
nos duraverat, curavit Riverius: item flores  
Δis in ovò sorbili assumpti, temperando lym-  
pham catarrhalem & præservando partes  
pneumonicas ab erosione vel excoriatione.  
Borellus Cent. 4. obs. 47. conclamatum haustu-  
tumi florum Δis, cum salviæ foliis per os ex-  
cepti, restituit: parem experientiam sequen-  
ti obs. 29. habet. Si quid aliud, sperma ceti  
expertum est à ʒj. ad ʒß. vel ʒj. aliquot vicibus  
assumptum. Item rapæ earumque decocta

cum saccharo simplici vel candifato meritò  
commendatur à Timæo in Consil. l. 2. Conf. 12.  
p. 100. perquam egregium est temperativum,  
ac quælibet ex rapis dulcibus, sive recentibus  
sive siccis parata remedia. Passulæ itidem  
elegantès sunt ad raucedinem, tam majores  
quàm in specie minores; unde rob passularum  
est egregium: item decoctum passularum  
cum aniso non contemnendum est in rauce-  
dine incipiente remedium; quo etiam spectat  
decoctum Simonis Pauli in Quadrip. Botan. p.  
44. Joël confirmat, myrrham in ore deten-  
tam raucedinem tollere; vel

℞. succi liquirit. ʒij.

myrrha ʒj.

tragac. ʒj.

sacch. penid. vel Canar. ʒij.

cum ▽ rosar. f. Morfali in ore tenendi, & suc-  
cessivè deglutiendi: S.

#### Mund- und Hals-Morsellen.

Vel ℞. Spec. dia-ireos simpl. ʒiij.

tragac. ʒj.

fl. Δis ʒij.

extr. croci, gr. vj.

c. f. q. sacch. in emuls. papav. sol. F. Rosula,  
successivè deglutiendæ. S.

#### Halß- und Mund-Küchlein.

In raucedine verò inveterata, aut ubi jam  
mucus viscidus vel lymphâ crassa peccat, tunc  
incidentia, resolventia & expectorantia pri-  
matum obtinent. Præ cæteris convenit sy-  
rupus de erysimo Lobelii, aliàs κατ' ἐξοχήν sy-  
rupus contra raucedinem appellatus, me-  
diante quo raucedinem desperatam se curasse  
asserit Lindanus & Schulzius in M. A. N. C.  
ann. 3. obs. 153. p. 275. vid. in specie Sennet-  
tus l. 2. Prax. P. 3. c. 3. p. 360. Syrupi hujus  
loco conveniunt passulæ minores aut earun-  
dem pulpa, cum semine erysimi contuso pro-  
bè subacta: Electuarium quoque ex melle,  
scordio & foliis salviæ; item radice helenii,  
pulverisatis & ad consistentiam electuarii spif-  
sioris subactis, itidem sit commendatum,  
quod sub dosi castaneæ magnitudinis aliquo-  
ties in die assumptum mucum dissolvit, & ex-  
pectorationem promovet. Syrupus de pras-  
sio seu de marrubio, uti & oxymel squilliti-  
cum, etiam est egregium:

Vel ℞. ▽ Hyssopi,

scabios. ā ʒj.

asthmat. ʒvj.

oxym. squillit. ʒß.

syr. de erys. Lobel. ʒj.

o. destillat. anisi, gut. vj.

M. f. Potio: S.

#### Besteillender Gafft zur Heiserkeit.

Egregium etiam est balsamum sulphuris,  
vel terebinthinatum, vel anisatum, vel juni-  
perinum, ad aliquot guttas in vehiculo ca-  
lido, vel suprâ dicto modo usurpatus, nisi

rau-



Raucedo ad aliquot annos duraverit: curat simul excoiationem, aut incipientem plus minus exulcerationem partium pneumonica- rum. Item radix ari acris imprimis commen- datur ab Horstio, propinando nempe pulve- rem ejus cum ana sacchari simplicis vel candi- sati cum vitello ovi permistum; vel cum syru- po violarum aut papaverino aut alio in cle- ctuario redactum; uti etiam pulvis pecto- ralis Ludovici, & ~Θ\*ci anisatus, &c. Brassica denique seu caulis (unde & loh de caulibus) & in specie ejus succus, vel solus succus nonnihil inspissatus, & cum melle mi- stus, admodum ad raucedinem extollitur: vid. in specie Codronchius *Tr. de Vitiis vocis & respirationis*. Riolanus commendat cubebas, quæ scilicet sunt deglutienz aut cum aqua vel decocto mellis propinandæ.

Contra raucedinem subito ex fumo tabaci inspirato enatam præmisso nonnihil violarum syrupo ipse fere aphonus curatus fuit:

Rx. ~Scabiosa 3ij.  
asthma. 3vj.  
~Θ\*ci anis. 3ij.  
Syr. de hyssopo.  
erys. Lobel. à 3vj.  
M. f. Potio: S.

Fräncklein gegen die Heiserkeit.

Capiebat cochleatim.

Præ cæteris Codronchius loco allegato duo habet remedia ipsi frequenti usu in rau- cedine experta, & quæ etiam D. Michaelis tanquam probata sæpius commendavit: re- censentur à Sennerto *L. 2 p. 359. & 361.* & Ga- belchovero *C. 1. cur. 74.* qui videantur.

Vel Rx. ~Hyssopi 3ij.  
asthma. Rud. 3j.  
Syr. de Erys. Lob. 3ij.  
M. D. S.

Gasse wider die Heiserkeit.

Vena sectio vitanda: diuturnam enim & incurabilem fere raucedinem reddit: vid. M. A. N. C. *ann. 2. obs. 57.*

## ARTICULUS III.

De  
Tussi.

Juxta raucedinem etiam sub expiratione contingit affectus frequens admodum & satis communis, qui vocatur tussis. Opus quidem naturæ, h. e. insolentia actionis, ex- citata propter materiam morificam, i. e. actio extraordinaria, quæ non fit, nisi adsit materia naturam irritans, adeoque est bonum signum malæ causæ. Est autem tussis motus con- vulsivus expirationis thoracis, in quo non una, sed pluribus simul ac interruptis vicibus, fit actis interdum & contentorum in aspera arte-

ria vicinisque locis per os expulsio, cum vio- lenta admodum corporis concussione. Omnis nempe tussis fit, dum musculus thoracis strin- gentes & aërem sic expellens non blando ac naturali modo subsident, sed potius vio- lenter simul & confestim, utut interruptis vi- cibus, contrahuntur, & quodammodo con- velluntur, ita ut rectè à quibusdam tussis re- feratur ad motus convulsivos expiratorios thoracis, non autem ad veras convulsiones. Adest aliàs complicata actio in tussi ex stric- tura nempe aliquali laryngis ob irritationem, & ex forti & vehementia aëris ex thorace elisione propter vehementem hujus contractionem. Utrumque occurrit in tussi, exinde enim ex- surgit ille sonitus, qui in tussi percipitur; si la- ryx non stringitur, utut thorax sit exhaustus & vehementer expiremus, non tussimus; sed si stringitur, sonitus ac vera tussis adest. Notum est aliàs, quod tussis nunc sit voluntaria, nunc verò coacta. Cum enim tussis fiat per muscu- los, imprimis diaphragma, qui muscoli tho- racis, certo modo obediunt voluntati, hinc fit ut pro voluntatis imperio variè expiratio- nem alterare, & sic etiam tussim provocare queamus, quatenus scilicet inspiratio & ex- spiratio est actio media seu mista, partim ani- malis, partim naturalis, & eatenus certo mo- do à nobis determinari solet. Non rarò ta- men nobis nolentibus admodum contumaces sunt tusses, quæ sunt p. n. & considerationi Medicæ subsunt.

## CAUSÆ.

Causa proxima est irritatio asperæ arteriæ, ejusque ramorum, sive fiat per essentiam si- ve per consensum, à spirituum impetu in mo- tum convulsivum acti. Afficiuntur igitur hi à quavis irritatione, quæ liberam respira- tionem impediat, in quocunque etiam sit organo, in pulmonibus, faucibus, diaphrag- mate, ventriculo, epate inflammato, &c. frequentissimè tamen occasione irritationis asperæ arteriæ, vel sine tali occasione prævia ex solis spasms & motibus convulsivis, tam ex primario affectu, quam ex consensu cum aliis partibus nerveis, in tussi nempe convul- siva: sic enim quærent Anatomi, unde fit, quod auriculæ membranâ interiore stylo ve- xata oriatur tussis inanis; ac rectè dicunt: fieri per consensum propter irritationem, & hinc aliqualem spasmum plexus nervi audito- ri cum nervis intercostalibus, præsertim istis ad asperam arteriam derivatis, & sic fit tussis inanis, vellicatâ auriculâ internâ. Sic etiam observantur subinde tusses con- vulsivæ præternaturales, seu quæ inter- dum, sine vicio partium pneumonica- rum post epilepsiam aliasque convulsiones, per simplicem nervorum & musculorum tho- a.



thoracem moventium & contrahentium spasmus, sunt observabiles. Exemplum talis tussis convulsivæ de virgine epilepsia afflicta, videbitis in *Willisii Patholog. Cerebri*, quamvis & hi spasmus modò ex partibus respiratori in-servientibus primariò affectis, modò per consensum cum aliis partibus nerveis contingant, ratione cujus tales tusses convulsivæ cum aliarum partium convulsionibus conjunctæ, hypochondriacis & hystericis frequentes sunt, in genere iis, qui vitiis nervosi generis ex acido præternaturali, imprimis lymphæ acidæ, obnoxii sunt: potissimum infantes nimis tussiendo interdum quoad partes respiratori in-servientes ita convelluntur, ut respiratio quasi interrumpatur, suspendatur aut perversatur, quod vulgo apud nos vocant: *Sie bleiben nassen*; vid. *Willisii Pharmac. Rational. P. 2. Sect. 1. cap. 6. p. 61.* sicut & *Hildanus c. 2. obs. 66.* mentionem facit tussis ægrum interficientis, quæ fortè fuit convulsio vehemens diaphragmatis. Tales tusses convulsivæ non secus atque alii morbi convulsivi, epilepticis affines, non solum sunt chronicæ, sed etiam periodicæ.

Sed missis his merè convulsivis, illam in specie consideremus tussim, quæ causam materialem, respirationis organa afficientem, agnoscit, præsertim eam, quæ ex prævia irritatione asperæ arteriæ originem ducit, adeoque tam laryngis, quàm bronchiorum cum appendicibus vellicabilibus seu lobularibus, ut vocat *Willisius* locò allegato *p. 8.* affectionem sequitur, seu, ut *Helmontius* loquitur, tussis oritur ex sensu noxii, infestantis laryngem à sui principio usque ad pulmonum profunditatem, sive mediatè sive immediatè eadem afficiatur: ad quem posteriorem modum & ventriculus acri lymphæ vellicatus, & diaphragma, malè affectum, spectant vel concurrunt. Facit huc exemplum *Bartholini c. 6. Histor. Anat. 97.* de tussi per annum inveterata in vacca, in qua post mortem salvis pulmonibus inventum fuit jaculum diaphragmati infixum, à quo continuo irritatum diaphragma non potuit non talem tussim inveteratam & continuam inferre; sicut & hepar inflammatum siccam tussim comitem habet. Huc faciunt & tusses à vermibus in aspera arteria, quarum exempla habet *Zacutus Lusitanus l. 2. Prax. Admir. observat. 36.* & *Benivenius obs. cap. 67.* Infantes interdum gravi tussi laborant, ubi accusatur stomachus: sæpè tamen vermes stomachum vellicant, ut rectè dicit *Sennertus l. 2. Prax. cap. de Tussi*, & *Forestus l. 16. observat. 2. in Schol.* quò vellicatò sequitur talis tussis inanis cum motibus convulsivis & epilepsia, & sic potius videtur ex genere tussis, per consensum & motum convulsivum ex nervis excitata.

Pars verò affecta à causa occasionali materiali est:

- I. Larynx & aspera arteria admodum sensibilis, vellicata & lacerata, in specie quoad tunicam internam, eandem investientem.
- II. Oesophagus & stomachus: quorum ille, asperæ arteriæ, hic verò, diaphragmati est continuus & connexus.
- III. Denique ipsi muscoli moti, aut nervi eos moventes.

Causa remota irritans & tussim provocans est, quicquid musculos aut nervos irritare aut vellicare potest, sive hoc fiat mediatè sive immediatè: ista enim vellicatione fibræ tam musculorum quàm nervorum crispantur velocem ac rapidum spirituum motum ac influxum excitant, de quo plura, ubi de convulsionibus: undè necessariò contracti muscoli thoracem contrahunt, & prout irritatio est interrupta, etiam interruptus seu subfultorius thoracis est motus.

Fit ista irritatio, uti dixi, nunc per essentiam, nunc per consensum: Per essentiam, quando vitium, quod tussim concitat, aut est in ipsis nervis, aut est in musculis: Per consensum verò, quando alia quædam pars, cui nervi intercostales, thoracem stringentes consentiunt, afficitur; & sic mediante altero vellicantur nervi, unde tussis: e.g. si scalpitur auris & tussis talis per consensum fit ratione nervorum, estque semper tussis sicca.

## DIFFERENTIÆ

Jam verò considerandæ imprimis differentia, dum tussis i. ratione modi est vel sicca vel humida. Tussis humida est, quando concussionis istius ope, & aeris elisi violentia, humores, ut sanguis, pus, mucus seu pituita, lymphæ, & similes liquores per os excernuntur, ex quocunque loco proveniant talia: sicca verò tussis est, quoties magno ac diuturno conatu patum aut nihil excernitur, sed irritò tussiendo conatu corpus universum fangatur, quæ tussis inani seu sicca continuata non raro graviores, tam corporis, quàm speciatim hypochondriorum aliarumque partium dolores contundentes & plus minus lacerantes oriuntur. Imò hac ipsa tussi inani herniæ tam intestinales, quàm etiam scroti seu testium tumores excitantur: sicut non raro conatu isto aliquando urina, aut etiam alvi fæces, involuntariò protruduntur: qualem graviores ac vehementiores tussim ferinam secundum Hippocratem appellare solent.

II. Causæ irritantis ratione oritur tussis vel à causa externa vel à causa interna: Ultraque tussis, tam siccam quàm humidam, & quidem pro foci materiæ occasionalis ratione

tione vel pectoralem vel stomachalem excitare possunt.

Causa externa sunt vel inspirata vel assumpta. Inspirata sunt  $\Delta$  inclementior, praesertim hybernus, fumi minerales acriores, fumus v. g. nitri vel sulphuris incensi, & eorum effluvia.

Pertinet huc tussis metallifossorum, qui ex gas acido inspirato in tales tusses incidunt: tussis epidemica communiter grassans in plurimos, sive benigna fuerit, ut item tempore hyberno inclementiori, sive maligna, quae nempe conjuncta est cum febre catarrhali maligna, *mit Glus-Siebern* / ex singulari aëris inquinamento à pluribus contracta. Non desunt exempla, imprimis apud Solenandrum, ex quo etiam allegat Schenckius *L. 2. Observat.*

Assumpta sunt quaecunque vel per errorem in asperam arteriam delata; hinc vel minutissima gutta potus vel mica panis, aut simile quid, ex irritatione concitat tussim pertinacem ex modo dicta ratione, vel mediante oesophago & stomachi orificio superiori asperam arteriam afficientia: sic e. g. quando infueti bibimus vini spiritum acriorem ac aliud spirituosum acrius, vel quando assumimus admodum acria, maximè acida, tunc eo tempore, quo transeunt hæc oesophagum, utut clausa sit larynx, nihilominus tamen vellicando asperam arteriam, oesophagi canali continuam, tussim, nunc leniorem nunc asperiore, efficiunt.

Inspirata vel assumpta hæc quatenus inferunt tussim, primò dant tussim siccam simpliciter ex irritatione laryngis enatam, in specie si hyeme aër inclementior, irritantur simul nares, sternutamus aliquandiu: Tussis verò hæc aliquandiu continuata consequenter ex læsione partis ita irritatæ tandem fit humida, ac materię primò serosæ, tandem mucosæ, expectoratio sequitur, quæ interdum est copiosa, ut tussis chronica oriatur. Communis hîc fert fabula, destillare talem materiam ex capite in laryngem, quod falsum est; non enim saltem in larynge & bronchiis pulmonum, sed in ipso etiam pulmone successivè colligitur, hinc evacuatur. Nempe primo uberior lymphæ ex irritatione transudat in dicta loca, quæ pedetentim condensatur in mucum plus minus crassum & viscidum: Quod si gravior ex irritatione dictorum sit læsio, & phlegmonodes plus minus dispositio vel etiam aequalis excoariatio, ipsum nutrimentum dictarum proximum, maximè asperæ arteriæ & partium circa fauces consitarum, in debita assimilatione impeditum unà transsudat, & successivè alteratum sub muci pituitosi forma evacuatur; quod in naribus dat coryzam, in

Tom. II.

faucibus tussim humidam. Hinc ordinariò duo tempota in tali tussi distingui solent: Quamdiu enim est sicca, tussim à catarrho tenui esse asserunt, materiam adhuc crudam evacuationi ineptam, hinc remedia concoquentia seu incrassantia dicta, reverà anodyna & temperantia usurpant: Deinde dum est humida, & mucus excerni incipit, materiam coctam asserunt, adeòque incidentia pro facilitanda expectoratione usurpant, hinc semper tales tusses ab inspiratis superveniunt. Mucus ergo iste varius, nunc insipidus, nunc acris  $\Theta$ lus, nunc subacidus, non est causa morifica, ut vulgò putatur, sed potius est productus effectus, qui oritur ex vitiosa assimilatione alimenti asperæ arteriæ, quâ ipsâ assimilatio nutrimenti vitatur, quando aspera arteria à vitio externo plus minus læditur. Hoc nempe est, quod suis custodibus tribuit Helmontius *Tr. Custos errans*: qui dictis partibus præsides, eas ab externorum inspiratorum injuriis defendunt, quibus læsis & hinc errantibus, privata illorum locorum digestio vitatur, & ros nutritivus in talem lympham seu liquamen ac mucum crassum & viscidum pervertitur, quod ipsum incrustans ac vellicans asperam arteriam tempore hyberno, dat istas contumaces tusses. Quæ omnia facilè ex dictis conciliari possunt, per custodem dictarum partium spiritum insitum & hinc influentem intelligendo. Ex tali causa externa genitæ tusses nunc sunt propriæ, nunc verò sparsæ seu epidemicæ, prout quodcunque grave  $\Delta$ is vitium inspiratione plures læserit.

Causæ internæ, quæ tussim inferunt, etiam nunc humidam nunc siccam excitant: & quidem tussim humidam quod attinet, illa dependet à materia nonnihil viscida, plus minus acri & salsa, quæ subsistit vel in aspera arteria & pectore, vel in oesophago & stomacho. Illam vocabimus tussim pectoralem; hanc stomachalem.

Humida tussis pectoralis oritur variis ex causis: quandoque peccat

Mucus viscidus ex degeneratione alimenti proximi vel pulmonum vel laryngis natus, sive lædatur alimenti harum partium assimilatio occasione causæ externæ, sive internæ, Quo pertinet abscessus & ulcera pulmonum, phthisis, vel quando à sanguine ejusque sero acriori eroso pulmonum parenchymate, aut quando à lymphæ acriori excitatur larynx aut aspera arteria, adeòque dictis in locis postmodum nutrimentum proximi assimilatio impeditur; quia nutrimentum tale pro læsionis varia ratione etiam in varium mucum, sordes, purulentias, &c. degenerat, & ita irritando pulmones & asperam arteriam tussim hu-

(Ff)

midam



midam infert, in qua copiosè talia præternaturalia excrementa eliciuntur. Pertinet huc tussis humida, quæ morbos acutos & febres ardentes insequitur, quæ fit, quando nullibi apparente crisi, recrementa febrilia M. S. cocta in pulmonibus hinc inde defiguntur, & sive in statu sive declinatione morbi, ex massa sanguinea depurata deponuntur, hæc etiam humidam tussim cum copiosæ materiæ rejectione constituunt, cui phthisis supervenit, nisi maturè curetur. Facit huc etiam sanguis in casu ab alto in pulmonibus collectus & alii affectus, qui pulmones inundando irritant asperam arteriam & tussim humidam à causa interna inferunt: item inflammatio pulmonum & pleuræ, in quorum principio tussis sicca, in incremento ex lymphâ & sanguine mistis, & mutuâ temperaturâ tertium mucosum constituentibus, etiam tussis humida observari solet; quin & in suppurata pleuritide & peripneumonia purulenta, non secus ac in pulmonum exulceratione: item tussis in empyemate pulmonum observabilis, in qua copiosa purulentia has partes irritat, & tussi rejicitur. Hinc falsum est, mucum istum à materia, quæ subinde tussi humida rejicitur, destillare ex capite in pulmonum bronchia; cum aliam longè, eamque variam, sortiatur originem.

Observandum etiam: falsam esse hypothesin vulgarem, quod ea, quæ in tussi humida tussiendo aut screando per os ejiciuntur, omnia sint ex pulmonibus. Omnia quæ screamus, sunt ex faucibus imis; quia ex membrana pituitaria posteriore frequenter mucosa rejiciuntur, quæ stabulantur in stomacho, successivè per orificium superius sudant in œsophagum, ubi sursum screantur, donec tussiper os ejiciantur. Multi sunt, qui manè evigilantes multa copiosa ejiciunt, nunc cum, nunc sine tussi: pectus est innocens; sed sunt ex stomacho reliquæ ex alimentis non ritè coctis, & sub forma materiæ pituitosæ forti screatu ejiciunt, quod signum primarium est morbi hypochondriaci.

Præter talia mucosa, aut etiam aquosa, quæ sunt ordinaria rejecta, etiam varia extraordinaria nonnulla rejiciuntur: sic vermes cruciformes instar erucarum per tussim rejectos vidit Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admirand. obs.* 36. item Benivenius *observat. c.* 77. Deinde lapides non rarò sunt observati tussiendo excreti, qualia exempla imprimis sunt in Borello *c.* 1. *obs.* 67. & Zacuto Lusitano *lib. 1. Prax. Admir. obs.* 95. & 96. de calculo magno tussi projecto. Imo in ulcere pulmonum ejusdem abscessus, in tabe pulmonum

frustula, integri venarum rami ac surculi, frequenter observati fuerunt rejecti. Sic Tulpus *lib. 2. obs. cap.* 12. habet surculum venæ arteriosæ expectoratum; item *cap.* 3. observavit venam ex pulmonibus rejectam: Sic integros pulmonum lobos cum suffocationis metu tussi rejectos observat Tulpus *l.* 1. *c.* 14. uti etiam Benivenius *in obs. cap.* 88. Mirum est, quod interdum observatæ fuerint turundæ, in ulceribus & vulneribus thoracis usurpatæ, tussi tandè per os ejectæ; Unde moderni Chirurghi turundis alligant filum: Nam tales turundas tussi rejectas habet idem Tulpus *lib. 1. cap.* 15. item Hildanus *c.* 1. *obs.* 46. item *c.* 6. *obs.* 22.

Ex stomacho & œsophago affecto oritur tussis humida, dum copiosa mucosa lymphâ ex membrana pituitaria, quacunque occasione in stomachum successivè descendens, indeque œsophagum & orificium superius irritans, & hinc mediatè asperam arteriam afficiens, simulque in stomacho coacervata primam digestionem turbans, indeque cruditatibus acidis occasionem præbens, gravem tussim chronicam infert: quales tusses non tantummodò senibus sunt familiares, sed etiam junioribus. Sanè frequentissima est tussis ex stomacho irritato, ut ut parum attendatur à Practicis; nempe quando vitium hæret circa orificium superius, quod connectitur diaphragmati: nam sic sæpè tusses oriuntur adeò contumaces & pertinaces, ut dum semel ingruit, conatus tussiendo primò quidem inanis, tamen non remittat ante vomitum aut rejectionem mucilaginis viscidæ. Humidæ autem tusses ex stomacho oriuntur interdum, sed rariùs, ex prægresso errato digestæ, aut digestionis undecunque facto impedimento, & congesto hinc mucosissimo, orificium vellicante, & mediatè ac per consensum tussim provocante, cum materiæ viscidæ excretionem ex profundo, & ipsis ægris hoc fatentibus, stomachi regione elevatâ. Sic Lotichius *obs.* 244. de periodicis annuis tussibus ex debilitate ventriculi refert. Plures sane in praxi tusses humidæ vitio stomachi enatæ observari solent, quàm vitio pectoris; & quidem dum orificium superius graviùs vellicatur, simul diaphragma exinde afficitur, & ad tussendum stimulatur; vel dum simul œsophagus vellicatus contiguam sibi asperam arteriam per consensum afficit, ac in tussim proritat. Tussis talis humida stomachalis rarò est per protopathiam, sed ferè semper per deuteropathiam. Oritur nempe sæpissimè ex vitio vel læsione membranæ pituitariæ posterioris, sive ab aëre externo inspirato malè afficiatur, quâ occasione ferè coryzam



zam conjunctam sequi solet, sive interdum lymphæ acrioris per membranam hanc transcolatz, eandem irritantis & plus minus exco-riantis, vitio accidat: talibus enim occasio-nibus per hanc membranam copiosè lymphæ spissior, & junctim simul nutrimentum ejus-dem proximum pedetentim per œsophagum in stomachum destillat, unde irritatur hujus orificium superius, indeque turbatur digestio prima, & hinc primitus tussis sicca, hinc gra-vior cum copiosæ materiæ viscidæ rejectione, imò non rarò superveniente vomitu, nunc pi-tuitæ, nunc alimentorum ingestorum. Et quando in tussi tali, tam incipiente quàm con-firmata, ægri vellicationem quandam circa faucium loca superiora, ubi nempe est pituita-ria membrana posterior, persentiunt, hinc materiam talem ex capite defluere existimant. Dicunt: *Ich fühle es/ wenn es auff die Lun-geß* ut.

Probè autem distinguendum venit: an tus-sis humida sit ex pectore, an ex stomacho, an nervis? Distinctionis signa suppeditat:

1. Irritationis seu titillationis locus, ubi nempe ægri stimulum ad tussim cogentem pri-mò percipiunt, an in larynge aut aspera arte-ria, vel pectore, vel inferius circa regionem scrobiculi cordis? Nam posterior locus tus-sim stomachalem, priores pectoralem innu-unt. Jubeatur æger profundius respirare; sic enim, mox tussire incipiet, si vitium est in pulmonibus; secus si in stomacho.

2. Respiratio læsa, quæ in tussi humida pul-monum vitiò est difficilis. Tussis autem omnis humida, si est sine respiratione læsa, non est ex pulmonibus, sed faucibus: interim tamen etiam in tussi stomachali solet esse laboriosa, sed ita, ut ægri tunc regionem stomachi mon-strent.

3. Sonitus in tussiendo locum affectum monstrat: tot nempe sunt modi in sonitu tus-sis, quot sunt loca, in quibus materia latet; sicut etiam variat pro materiæ excernendæ natura, quod si sonitus non adeo superficialis, sed quasi ex loco profundo, & ex imo pectore: it. quando ægri percipiunt gravamen in præ-cordis, tussis ut plurimum est in stomacho, & tunc simul conqueruntur ægri de dolore an-trorsum: imò percipiunt ante tussim ibidem vellicationem quandam, & ita tussis ex pro-fundiori loco hausta etiam indicat affectum stomachum: ubi verò sonus est quasi superfi-cialis, monstrat affectam asperam arteriam: item interdum quicumque ex cavo thoracis procedit, & quem brevi post sequitur excre-tio, tunc sæpius malum hæret in ipsis pulmo-nibus & bronchiis.

Sonus ex profundo quasi raucus, *es röhelt/* pulmones affectos dicit, qualis in empyema-

ticos cadit: est symptomatica, quatenus vel exsiccet pulmones, vel quatenus simul em-pyema in pulmonibus movet.

4. Tussis stomachalis pertinaciter affligit, ut subindè, præsertim in infantibus, vomitus, nunc materiæ pituitosæ, nunc alimentorum ingestorum superveniant, secus ac in tussi pe-ctorali fieri solet.

5. Ostendunt hoc antecedentia; si nempe præcesserint causæ lædentes pulmones aut asperam arteriam; vel si præcesserint causæ, quæ stomachum lædere possunt, ex iisdem de loco affecto concludi potest.

6. Adjuncta quoq; symptomata considera-da sunt. Nam ubi adest aepsia, appetitus pro-stratus, sensus stomachi gravativus, intensior tussis, vitium est in stomacho: Ægri ipsi di-gito intento monstrant locum affectum sub scrobiculo cordis, in regione stomachi prope ejus orificium sinistrum, se sentire inquietes coacervatum & sensibilibiter molestantem sreatu rejectam materiam ex stomacho per gulam sensim sensimque attolli, non est im-probabile, imprimis cum ex succo rap-hani hausto paulò post copiosissimè rejiciantur mucosa.

Ubi verò exacerbetur, utut continuò affli-gere soleat, noctu; aut ubi simul conjuncta est febricula quasi nocturna; aut alia pathe-mata catarrhalia, ratione lymphæ nimis aspe-ræ per illam membranam pituitariam excre-tæ; aut ubi adjuncta signa phthifica, osten-dunt tussim pectoralem.

Tussis pectoralis ex affecta aspera arteria & larynge non raro oritur, imprimis à vitio lym-phæ, naturaliter oblinentis dicta loca: Hac enim ex vitio catarrhali si fuerit, præternatura-liter acrior, *Os*-acidior; sive præviâ externâ occasione, sive propriò naturæ motu lymphæ ita alterata, insignem tussim inferre solet.

Tussis talis, quæ in specie catarrhalis dici-tur, potissimum affligit tempore vespertino & nocturno, usque ad mediam noctem, i.e. so-let vexare ægros tempore nocturno à 7. usque ad 12. horam, tempore diurno quasi silet: imò concurrit sæpe febricula quædam lenta plus minus intensa, in qua ægri interdiu satis com-modè se habent; à meridie autem & apparen-te vesperâ vagis horripilationibus vexantur, quas ingruente nocte insequitur æstus totius corporis, non tamen adeo intensus, sed plus minus moderatus, præsertim capitis, & hinc reliqui corporis, donec revertente aurorâ fe-bricula denuò cesset. Hinc etiam non rarò accidit, ut etiam sub æstu illo febrili artuum lincinationes & dolores vagi unâ affligant, ex lymphæ acido sapore, partes nerveas vel-licante, oriundi. Hisce indiciis præsentibus

(Ff 2)

cer-

certum est, subesse vitium lymphæ, vel acidæ vel falsæ.

Tussis talis catarrhalis originem ducit ex lymphæ vel falsidioræ, quæ uti in M. S. febrim talem plus minus lentam excitat, & sub cute pustulas; ita laryngem & asperam arteriam irritando, tussim siccam infert. Non rarum tamen est, tussim talem siccam nocturnam etiam sine febre affligere, pariter ex catarrhali vitio lymphæ oriundam. Itidem catarrhis depluentibus à capite tribuunt autores eam; sed post Helmontium *tract. catarrhor. deliramenta*, imprimis Schneiderus *de catarrhis* caliginem excussit: Hic enim in eo est totus, ut dicat: excrementa tussiendo rejecta in tussi tali catarrhis tributa tam sicca, quàm quæ successivè supervenit, humida, transudare ex sanguine per tunicas, quas vocat pituitarias. Verùm rectius Steno observavit, quod post has tunicas, communiter pituitarias Schneideri ac alias similes, per quas serosæ materiæ fit transcolatio, sitæ sint copiosæ glandulæ, quorum orificia hient in istas tunicas pituitarias, & ita lympham in istas cavitates effundant; adeoque, dum dicit Schneiderus, in coryza transudare mucum per tunicam seu membranam pituitariam superiorem, internè nares succingentem; in tussi verò transudare mucosa rejectanea per membranam seu tunicam, asperam arteriam investientem, &c. potius cum Stenone dicendum: sub his tunicis latitare glandulas, suam lympham per istas exonerantes.

Quando ergo ista lymphæ est p. n. acrior, falsior, acidior, aliove simili plus minus corrosivo sapore imprægnata, non potest non fieri tussis, quia vellicatur aspera arteria. Salsa sit lymphæ ex concursu acidæ & urinose, uti ex pathologicis patet.

Ad has tussies ex lymphæ vitio genitas pertinet etiam tussis, quæ præcedit variolas & morbillos, itidem sicca & admodum molesta; nec non ea, si variolæ pulmonem & asperam arteriam obsident; cujus exemplum habet Lotichius *in observat. pag. 143.* item quæ infantibus ex malè curata scabie, aut ex tineæ capitis, aut achoribus quovis modo repulsis, nascitur. Hæ ritè tractatæ curari possunt, ut non fiant humidæ; sin minus, tussis etiam humida supervenit, ex supradictis rationibus, imò & phthisis variolis successivè secuta observata fuit.

Radix mali, unde talis lymphæ vitiosa generatur, tussim talem catarrhalem, præsertim nocturnam inferens, est in ventriculo; errata nempe digestionis ejus, & hinc deficiens in intestinis ejusdem perfectio; quibus in

locis chylus vitiosus falsus aut acido-falsus genitus sui tabem mediante lymphæ variis partibus, ac speciatim, quavis occasione eò derivetur, pulmonibus affricat. Ratio, quare tussies tales vespertino ac nocturno tempore magis exasperentur, adhuc intricata est. Universale aliàs est, quod morbi à feri ac lymphæ vitio oriundi his temporibus magis exacerbari soleant, ad quod ipsum non parum videtur conferre prohibita pl<sup>o</sup> minus transpiratio insensibilis, vesperi ex remittente tepore diurno min<sup>o</sup> copiosè procedens. Observata etiam fuit tussis sicca vitio pulmonum, quando nunc calculi, nunc excrecentiæ aliæque in bronchiis pulmonum tussim inferunt. Refert Schenkii *in l. 2. observat.* tussim siccam admodum diuturnam ex irritatione continua capitis laryngis, propter calculos in tonsillis genitos, qui irritando dederunt tussim.

Quod si verò causæ stomachi & œsophagi internæ inferant tussim siccam, vocari ut plurimum solet tussis ferina, in qua gravissime, etiam continuò & interruptis vicibus, tussiant: si incipiunt tussire, vix remittere sciunt. Oritur ex materia salsa acri, præsertim tenui & subtili, rarò crassa, pertinaciùs stomachi orificium superius vellicante istudque rodente, nihil hic excernitur: interdum etiam tantoperè urget, ut pertinaci tussi & concussione stomachi vomitus sequatur, & facilè partem affectam præter dicta sonus profundus, locum irritationis in tussi & suprà allegata declarant. In specie infantum tussis quæcunque, si non à causa externa, semper fundamentum in stomacho habet, sive humida sive sicca; post vomitum cessat, respiratio est libera, nihil ejicitur materiæ: ergo est causa in stomacho: Accedit & hoc, quod lentiant circa præcordia & circa stomachum gravativum quid, & sic tussis non potest esse in pulmonibus. Quò etiam pertinet in Schenkii *observat. pag. 237.* Tussis nova infantum Luterii grassans, quinta dicta, in qua etiam ventriculus affectus fuit.

Pertinent huc istæ tussies, quæ non rarò in principio paroxysmorum februm intermittentium unâ alterave hora paroxysmum antecedunt, & fiunt simpliciter ex irritatione orificii stomachi superioris, nata ex motu inchoato fermenti febrilis & motu humorum succi pancreatici & biliosi, circa intestinum duodenum à dicto fermento febrili agitatorum, unde tussis per ventriculi consensum cum diaphragmate circa paroxysmorum principium contingere solet, & quidem tales ordinariò ferè sunt hypochondriaci, seu in quibus abundat acidum in stomacho. Tales enim tussies sunt, quas quidam contrahunt, dum in

lectis

lectis aëri liberiori se exponunt circa regionem stomachalem, exinde facile fit, ut pertinax tussis stomachalis superveniat.

Senes sæpius quoque tussi laborant, eaque pectorali, si vitium est ex aëre externo inspissato; si verò citra talem externam læsionem senes tussiendo excernant copiosa viscida, & simul conquerantur de dolore plus minus compressivo in scrobiculo cordis, ordinariò vitium stomachi subesse solet, natum ac sustentatum ex defectu digestionis primæ in senibus.

De arthriticorum tussi res etiam intricata videtur: observavi aliquoties arthritidi obnoxios, si hæc aliquandiu inducias dederit, quod tales facillè occasione tussim, eamque humidam, incurrant cum sensu molesto circa scrobiculum cordis, ac difficili plus minus inspiratione, quæ symptomata superveniente podagra leviter & quasi sponte evanescent. Revera stomachalis videtur tussis, cum faber podagræ reverà in stomacho cudatur.

Interdum varæ tussium differentię subinde complicantur, ita, ut in dispositis tussi humidæ facillè superveniat tussis convulsiva. Sic pariter tussis humida, tam stomachalis quàm pectoralis, ferè complicari ac simul affligere possunt.

### PROGNOSIS.

Prognosis facilis est. Fundamentum ejus ex varietate causarum efficientium, subjectorum patientium, & utriusque adjunctarum circumstantiarum desumi solet.

Tussis frequens nimis & diuturna non rarò ad hæmoptysin disponit.

Tussis ferina, tam in infantibus, quàm etiam adultis, maribus herniam, in prægnantibus abortum causat.

Tussis sicca nocturna in subjecto, quod debiles habet pulmones, minatur phthisin, quatenus ex continua pulmonum concussione, & lymphæ actoris in eorum parenchyma translatione, tandem erosionem, & ita ulcus pulmonum, & hinc phthisin, quam ex catarrhis oriri putant, infert.

Capiti debilitato admodum nociva est tussis; uti etiam iis, quibus affecti sunt oculi.

Tusses senum diurnæ non maturantur, dicit Hippocrates *sect. 2. aphor. 40.* adeòque difficillimè curantur.

Tussis hydropi superveniens, malum est: vid. Hippocrates *sect. 6. aphor. 35.*

Tussis à causa externa nihil habet in recessu, & sine periculo est; quæ verò à causa interna, sive sit pectoralis sive stomachalis phthisin minatur, aut eandem incipientem ostendit.

Scorbuticis frequentiores tusses sunt suspectæ, ne ex partibus serosis phthisin contrahant.

Interdum febribus ardentibus, imprimis

curatis & in declinatione non rite purgatis aut judicatis, supervenit tussis humida ex metastasi materiæ morbificæ concoctæ: in talicasu, quæ si rectè procedat expectoratio, bona est; sin minus, & non in tempore succurrimus ægro, periculum imminet phthysicos aut periculosi asthmatis.

Tussis omnis humida inferens læsionem pulmonum, periculosa est ob phthysicos metum.

Tussis graviter affligens phthysicos, ubi subito cessat, signum periculosum est.

Tussis stomachalis humida cruditates, atrophiam, tabem, &c. minatur ex vitio chyli, corrumpentis plus minus lympham; tandem etiam pectoralem infert: quod etiam suo modo de tussi sicca stomachali verum deprehenditur.

### C U R A.

In cura attendendum ante omnia: an tussis morbus sit primarius, an verò secundarius? qualis v.g. phthysicorum, pleuriticorum, &c. Nam hæc primariò morbo sublatò vel sponte cessat aut sedatur. Interim attendatur naturæ motus in tali casu, ut promoveatur, si sit parvus, in phthysicis v. g. & purulentis; vel inhibeatur, si sint nimii, ut in tussi ferina crebrius inani, & ita saltem temperetur.

In hac vero cura tussis cujuscunque

1. Ante omnia removenda est causa irritans seu ad tussim stimulans; &
2. Sistenda est vellicatio aut irritatio.

Quiduo scopi utut pro varietate causarum varient, ut plurimum tamen ad removendam causam melius remedium non est, quàm vomitus, qui in quavis tussi est proficuum, in contumaciore verò, præsertim stomachali, est necessarius, sine quo tussis chronica tutò non potest curari; qui uti convenit in tussi recenti, ita sine eo tussim inveteratam curare admodum difficile est. Quæ verò pro secundo scopo vellicationem sistunt, sunt imprimis, uti notum est, opiata, in specie appropriatis mista.

Aliàs materia Medica in tussi tribus ferè generalibus capitibus absolvitur: nempe incrassantibus, incidentibus, & balsamico-vulnerariis.

Incrassantia sunt opiata ac temperata dulcia, quæ tussim à materia tenui & serosa, & inde ortum irritationis sensum, sistunt, acre vellicans mitigant, & ita materiam vellicantem ad consistentiam moderatam pro meliore expectoratione disponunt; unde ab effectu incrassantia dicuntur.

Incidentia sunt, quæ in tussi humida mucum glutinosum pro meliori expectoratione disponunt & attenuant, ac mobiliorem reddunt.

Balsamico-vulneraria, quæ noxiam excoarctationem bronchiorum aut pulmonum



aut stomachi emendant, ut posteriores progressus maturè inhibeantur.

His itaque præmissis, tussis pectoralis sicca à causa externa inducta, qualis tussis tempore hyberno ex aëre inclementiore, vel sub laboribus chymicis accedit, optimè tollitur per opiata maturè adhibita, sive sit laudanum opiatum, sive theriaca, sive syrupus papaveris: c. g.

℞. *Conf. tussilag.* ʒʒ.

*laud. opiat.* gr. ij.

M. pro Bolo: S.

**Abend: Zucker auff einmal.**

Capiatur bihorio ante cœnam.

Imprimis si quis læsus à frigore hyberno, ut immineat coryza, maturè curari potest sic:

℞. *Theriac.* ʒj.

& *destillat. anis.*

*succin.* à gut. ij.

M. D. S.

**Glug: Theriac auff einmal.**

Capiatur sub forma boli cum iudore.

Conveniunt etiam pilulæ de styrace Sylvii. Item in tussi orta à vitio aëris externi hyberni usurpetur decoctum radicis zedoariæ in vino, vel decoctum radicis helenii cum passulis in vino Malvatico calidè haustum, & sudor expectetur. Alii non ineptè faciunt, dum juniperi baccarum M. iij. coquunt in cerevisia ad consumptionem tertiæ partis, & decoctum calidè hauriunt, expectato sudore; vid. Riverius in *Praxi*: item R baccarum juniperi Mynsichthi, in *Armament. Chym. sect. 2.* descripta convenit. Præsertim autem optimè semovent vim causæ externæ, balsama odorifera ex ois destillatis, v. g. apoplectica, vel anisatum vel succinatum, largiter naribus illita: item ois destillata anisi, macis, suffitus succini, gummi animæ, &c. Nam talis larga illitio alterata aërem introeuntem, ut non fauces vel asperam arteriam lædat. Ubi metuenda coryza, imitemur Helmontium *Tr. de asthmate & tussi*, paremus sternutatorium ex saccharo & pulvere hellebori nigri ana, addendo aliquot guttas ois destillati caryophyllorum. Talis loco sternutatorii tempore vespertino suffletur in nares; sic tollitur omnis noxa. Jujubas in vini spiritu maceratas commendat Hartmannus ad præservandam tussim in *Praxi Chymiatr.*

Quodsi à mineralibus eorumque fumis sub laboribus chymicis inspiratis oriatur noxa tussim inferens, optimus est panis largiter butyro illitus, ante laborem assumptus; sic acrimonia inspirata obtunditur, & tussis ac similia præcaventur; sicuti etiam post alterationem jam nonnihil inductam theriaca, & ejus medio provocatus sudor, promptè eam tollunt: sin inducta læsio ab his, non curatur

melius, quàm per vulneraria, & quidem pectoralia, si decoquantur in cerevisia.

Quodsi eadem tussis à causa externa nata, dum jam fuerit inveterata, ut jam ejiciantur copiosa mucosa, adeoque reddita humida, curatur ut reliquæ tusses humidae, præmisso nempe laxativo, in specie vomitorio, conveniunt opiata eam sistentia; hinc subjungenda, si sit tussis pectoralis, vulneraria & appropriata pectoralia, noxam inductam demum corrigentia, & inde nutrimenti aut sanguinis in ea factam degenerationem sistentia. Vel si tussis fuerit stomachalis, noxa curatur aromaticis stomachicis. Vesperis propinanda sunt opiata, ut caveatur generatio: si sistitur, tunc denuò læsio à tussi antecedente inducta appropriatis curanda. Si in pulmonibus pars est affecta, ad eluendam noxam, nemalum recideret, vulneraria pectoralia sunt usurpanda, ubi excellit in specie hedera terrestris, cherefolium, veronica, scabiosa, helenium, ejusque radix, tussilago, lignum assafras, & similia. Hæc decoquantur in aqua, vel cerevisia, & decoctum calidè bibatur bis vel ter quotidie; sic læsio sistitur, consolidatur, & alia mala supervenientia præcaventur.

Tussis humida pectoralis, quatenus constituit morbum, curatur materiæ crassæ vel causæ irritantis evacuatione, adeoque per incidentia, attenuantia, resolventia, atque expectorantia dicta, interpositis præsertim vomitorio, vel moderato purgante (nam rarius profunt hic purgantia) & tandem per pectoralia & vulneraria, læsionem in bronchiis & pulmonibus obortam tollentia, & ulteriorem progressum aut recidivam faciliorem præcaventia.

Conducunt ergò hic pro scopo incidendi & expectorandi succus raphani recens cum saccharo candi, arum ejusque radix: item spiritus asthmaticus, gummata, in specie \*cum, & ex eo parata remedia liquida, & in genere omnia ea, quæ suprâ in asthmate humido; item raucedine inveterata, fuerunt laudata: item marrubium album, ejusque decoctum, helenium, hedera terrestris in tussi à putrilagine pulmonum, hyssopus, zingiber, &c. Schræderus laudat egregiè decoctum calami aromatici. Porro crocus, radix ireos Florentinæ, tussilaginis, zedoariæ, veronica, scabiosa, mentha, rosmarinus, & modò dictorum flores, nicotiana ejusque syrupus & oxymel nicotianæ in tussi ex lymphâ crassâ; atq; ex melle, scordii & helenii pulvere paratū electuarium. It. acetum scylliticum, oxymel simplex, & oxymel squilliticum compositum, cui incoctum marrubium, botrys, ejusque succus & syrupus, syrupus de erysimo Lobelii, elixyr pectorale Michaëlis vel Wedelii cum spiritu gummi

gummi ammoniaci, vel salis ammoniaci anisato. Conveniunt etiam vegetabilium dictorum conservæ, & sic porro. Vulgò commendatur ∇ pulmonum vituli cum plantis pectoralibus destillata: sed quo jure? nescio.

Pro expectorando ergo mucos, quocunque in loco ille hæreat.

℞. ∇ *fenic.*  
*hyssop.* aa. ʒij.  
*asthmat.* ʒvj. vel ʒj.  
*oxymel. squill.* ʒj.  
*syr. nicos.* ʒvj. M.

Pro scopo vulnerario pectorali convenit ∆, ejusque flores: item balsama ∆is, quæ sunt nobilissima, sive sit terebinthinatum, sive quod melius, anisatum, aut juniperatum, aut succinatum. Talis aliquot guttæ vj. viij. x. ad xij. & xv. semel vel bis in die in vehiculo calido vel ovi vitello, optimè conveniunt ad eluendam noxam pulmonum: aut cum balsamo ∆is fiat elæosaccharum: item benzoë antihæcticum Poterii, antimonium diaphoreticum, & vulneraria pectoralia supra laudata. Prostant etiam hinc inde pulveres pectorales, & pulvis contra phthisin, qui conveniunt in tussis ex vitiis lymphæ:

℞. *Rad. Ireos Flor.*  
*flor. ∆ris* aa. ʒj.  
*ʒii diaphor.* ʒʒ.  
*laud. opiat.* gr. jx.  
 ∅o *sacchar. fenic.* q. s.

M. pro pulvere: S.

**Heilend Brust-Pulver.**

Vel ℞. *Pulveris pectoral. Mich.* vel *Ludov.*

ʒi.  
*antihæct. Pot.* vel *ʒii diaphor.* ʒʒ.  
*laud. opiat.* gran. j.  
 ∅o *sacchar. anisat.* q. s. M.

Vel ℞. *Lap. ∅ prapar.*

*ʒi. ∆is* aa. ʒj.  
*laud. opiat.* gr. j.  
 ∅o *destillat. anisi* gutt. j. M.

℞. *Ras. ligni sassafr.* ʒj.

Maceretur in

∇a *fontan.* Mens. ij.  
 adde

*Herb. heder. terr.* vel *Veron.*

*pulmonar.*

*scabios.* aa. Mij.

*passul. min. conquass.* ʒj.

*sem. anisi*

*fenicul.* aa. ʒʒ.

Coqu. invicem ad tertias, in fine decocti addendo

*rad. liquirit. ras.* ʒijj.

*Colatur.* D. S.

**Brust-Tranch.**

Vel ℞. *herb. heder. terr.*

*veron.* aa. Mj.

*hyssopi*

*marrub.*

*pulmonar.*

*tussilag.* aa. Mʒ.

*flor. enula,*

*scabios.* aa. P. ij.

*rad. enul.*

*Ireos flor.*

*sem. cartham. cont.* aa. ʒvj.

*rad. mechoacan. albiss.*

*passul. min.* aa. ʒj.

Incis. & contus. D. S.

**Brust-Species.**

Ex his in aqua decoctis potest fieri decoctum pectorale. Vel possunt coqui cum hydromel, & per manicam Hippocratis aliquoties colari, & usurpari bis vel ter in die, pro urgentia affectus, mane haustus calidus, & à meridie bihorio ante cœnam, & sub introitu lecti:

℞. *Herb. rec. veron.*

*heder. terr.*

*scabios.* aa. M. j.

*cherefol.* Mʒ.

*ras. lign. sassafr.* ʒj.

Coqu. in l. q. ∇ *simpl.* addendo in fine decoctionis

*passul. min. conquass.* ʒij.

*ras. rad. liquirit.* ʒj.

Ebulliant iterum leniter, hinc dum fervent adhuc, suspende in nodulo *cinam. elect.* ʒijj.

*Colatura* ʒʒ. D. S.

**Brust-Tranch.**

Tussis humida stomachalis, ex humida viscida materia orta, curatur, præmissis attenuante & vomitorio, aromaticis nonnihil temperatis stomachalibus, reliquias materię peccantis incidentibus, attenuantibus & solventibus, & stomachi tonum restaurantibus. Pro purgationis scopo vomitoria ʒialia equidem nota sunt, quæ nunc per se evacuationis scopo usurpantur, nunc supra dictis potionibus in minuta dosi adduntur, pro promovenda expectatione. Sanctè testor, quod ex usu vomitoriorum ne minimum noxæ observaverim. Pro scopo purgandi per inferiora convenit MP. de hiera cum agarico, vel extractum ejus, addito gummi ammoniaco in +ro soluto, acuatam cum extracto trochiscorum alhandal. e. g.

℞. MP. de hiera cum agar. gr. xv.

G. \*ci +o sol. ʒʒ.

*extr. troch. alhand.* gr. j.

∅o *destillat. anisi* gutt. ij.

c. *Essent. g. \*ci f. pilulæ:* S.

**Purgirende Brust- und Magen-Pillen.**

Similibus pilulis terinam tussim à pingulibus vaporibus, in muliere aliquando curavi.

Vel ℞. MP. de \*co. *Querc.* gr. xv.

*hier. c. agar.* gr. viij.

*extr. agar.* gr. v.

*bals. ∆is anis.* gutt. ij.

c. *Ess.*

C. Eff. g. \*ci f. pilula, usurpandæ imprimis in tussi ex materia crassa & viscida, post febres acutas non rarò obvenientes.

Quin etiam his ipsis & dulcis commodè potest addi, quem usurpat Riverius cum diagrydio: vid. cent. 3. obs. 31.

Vulgò pro scopo purgationis usurpant agaricum in infuso ad 3ß. cum oxymelite; sed ignavum est simplex. Potius extr. ejus cum aliis. Quidam semen carthami ab 3ß. ad 3vj. infundunt; ut ut etiam ex hoc semine à 3iß. ad 3ij. elegans emulsio purgans fieri possit.

Opiata ac similia in tussi humida, ubi expectoratione opus, non conveniunt; excretionē enim impediunt, & hinc materiam evacuantem crassiorem ac viscidiorē reddunt. In fine tamen, ubi maximam partem evacuata est mucilago, & crebrior tussis inanis sæpius repetens, antequam aliquid ejiciatur, superest, in talibus ad vestigia læsionis irritandis delenda commodè cum aliis papaverina usurpari possunt, ut nempe his nimia irritatio ac crebrior frustranea tussis suspendatur, interea verò materia expectoranda præparetur, ut minori labore excernatur: v. g.

℞. ∇ scabios. 3ij.  
asthmat. 3vj.  
flor. 4is 3j. ad 3ß.  
syr. diacod. Mont. 3j.  
M. S.

#### Hust-Träncklein.

Pro incidenda materia viscida & crassa, præterea, quæ suprâ de asthmate ex stomacho oriundo dicta sunt, imprimis conducit hæc potio admodum experta:

℞. ∇ Hyssop.  
tusilag. aa. 3ij.  
asthmat. ~ of. 3ß.  
oxymel. squillit. 3j.  
syrup. de hyss.  
nicot. aa. 3vj.  
M. D. S.

#### Mixtur gegen den Husten aufsetzliche mal.

Addi etiam potest pro meliori incisione & faciliore rejectione ~ Qi dulce aut 0is dulcis q. pl. pro grata aciditate. Hæc mixtura subinde cochleatim sumpta expectorat egregiè.

Elixyr pectorale D. Michaëlis cum spiritu asthmatico mixtum, uti in asthmate, ita in tussi à stomacho, notum est, quod sit egregium: e. g.

℞. Elix. pector. Mich. vel Propr. 3ß.  
~ g. \*ci 3ij.  
M. S.

#### Hust-oder Brust-Elixir 40. Tropffen.

Item ℞. Rad. ari acerr. 3j.  
spec. dia-ireos. 3j.  
Extr. rad. helenii vel zedoar. 3ß.  
ad 3ß.

Cum sacch. in ∇ fœnic. vel menth. vel scabios.

sol. q. f. fiant Rotulæ, adspargendæ cum 0, destillat. fœnic. S.

#### Hust-Rücklein.

Vel ℞. Rad. ari. 3iß.  
g. \*ci in + sol.  
mastich. elect. aa. 3j.  
Qi 0lar. 3ß.

c. f. q. sacch. in ∇ menth. sol. f. Rotulæ.

Adnumerandum hic mulierum euporiston, quod est:

℞. Succ. rapban. express. q. pl.  
adde

sacchari candi. parum.

Mirabiliter resolvit in pectore & stomacho, atque expectorat.

Pro altero scopo, stomacho nempe appropriata sunt elixyr stomachale, elixyr proprietatis, quod cum & sine acido in vino enulato usurpatum, egregiè commendatur. Elixyr quidem cum acido in principio videtur exasperare tussim: verum, modò continuetur ad tempus, neminem spe suâ frustrabit. Egregiè etiam à Stœckero commendatur decoctum zedoariæ cum vino paratum, elixyr menthæ acidulatum cum ~ u 4is, & Qi acris, vel sola vel cum ~ u 0 \*ci simplici aut anisato, malvat. juniperinum, essentia & extractum helenii, item essentia croci, & chocolata. Quo etiam pertinet balsamus Peruvianus, guttatim ad 6. vel 8. guttas usurpatus: quin etiam præmissis præmittendis in tali tussi aliquando liquorem ~ x fol. Qi, item R0li 0is Zvvelfferi pro debita rugarum ejus expansione proficua observavi. Convenit etiam tam in tussi pectorali quàm stomachali humida, uti etiam suo modo sicca, electuarium, quod fit ex

Herb. scord. M. ij.  
salv. M. j.  
flor. 4ris 3ij.

Hæc omnia subtilissimè pulverisata, vel sola, vel addito laudano opiato, cum syrupo diacod. excepta, subinde deglutuntur ad sistendas tales tusses.

D. S.

#### Brust-und Magen-Lattwerge.

Quod si sit tussis sicca nocturna pectoralis, adeoque catarrhalis, talis curatur & præservatur, nunc præmissis nunc omissis vomitorio, per volatilia sudorifera, opiatum mista, vespere imprimis assumenda, interdum sudorem imperando, quæ lymphæ vitium catarrhale corrigunt, blandè discutiunt, & velli-cantis irritationem sistunt: v. g. ~ 0 \*ci simplex vel anisatus, liquor C. C. succinatus, à gutt. 40. ad 50. & alia, quibus adjungenda essentia opii vel alia opiata & papaverina. Unde & Veteres Philoniis contra talem tussim, & syrupis diacodion, usi fuerunt. Nobis verò opiata imprimis sunt in usu, eaque permista imprimis talibus, quæ acrimoniam lym-



℞.  $\Theta$ \*ci anifat. ʒiſſ. ad ʒij.

Essent. opii. ʒj.

M. S.

**Brust-Spiritus/40. vel 50. Tropffen auff animal.**

Sumatur bihorio ante cœnam, & si opus, ante introitum lecti.

Vel istis præmissis appropriata pectoralia, imprimis balsamica oleosa sulphurea, lympham corrigentia & noxam partis eluentia, usurpentur, quæ etiam interdum sola sufficiunt, v. g. flores  $\Delta$ is, qui jam à Celso contra tussim pectoralem à lymphâ acri sunt commendatum remedium, ut eorum ʒj. quovis mane in ovo sorbili accipiat: conf. Thesaurus Rulandi p. 109. storax liquidus, benzoë, & flores benzoës in ovo sorbili, sperma ceti, & destillatum anisi, fœniculi cum saccharo, balsamum  $\Delta$ is anifatum, R $\Delta$ is, quam habet Willsius in Pharm. Ration. P. 2. p. 113. e. g.

℞. R $\Delta$   $\Delta$ is ʒij.

Essent. opii ʒb.

M. D. S.

**Brust-Essent.**

Dentur pro dosi 40. vel 50. guttæ, bihorio ante cœnam, & si opus, ante introitum lecti, usurpandæ.

℞.  $\Theta$ \*succin.

R $\Delta$   $\Delta$ is aa ʒj.

Ess. opii ʒb.

M. D. S.

**Hust- und Brust-Essent.**

Dentur 30 vel 40 guttæ pro dosi.

℞.  $\nabla$  Scabios. ʒij.

fl. papav. errat. ʒiſſ.

R $\Delta$   $\Delta$ is Willis. ʒiſſ.

styr. diacod. Mont. ʒiſſ.

M. D. S.

**Hust-Cass.**

Conveniunt item succinata omnia, myrrhata, & reliqua, quæ vulgò incrassantia seu propriè tenuem & acrem lympham temperantia appellantur, v. g. laci violæ, glyzyrrhiza, jujubæ, passulæ, radix ireos Florentinæ, helenii, horumque decoctum, herba veronicæ, scabiosæ; item vulneraria pectoralia, ut veronica, hederâ terrestris, &c. syrupus de jujubis, rosarum, scabiosæ, loh passularum, decoctum raparum, & ex hoc decocto paratus syrupus. Hordeata etiam sunt in usu, ubi est lymphâ acidâ &  $\Theta$ sa, quam temperant: hinc Botellus centur. 4. observat. 89. refert de tussi, macie & agrypnia, hordeatorum usu curatis: item caticæ cum spiritu vini compastæ, species diaiteos usitatæ, pulveres pectorales varii, semen papaveris, syrupus papaveris, amygdalæ dulces, & pilulæ de cynoglossa, loco quarum moderni usurpant laudanum opiatum, mixtum imprimis cum spermate ceti, item cum succino; vel, quæ meliores, pilulæ

Tom. II.

de styrace & ad tussim Schrœderi, quarum descriptiones videbitis in ejus Pharm. l. 2. cap. 73. num. 6. & 7. p. 252. Admodum elegantes sunt pilulæ de storace Sylvii in tussi sicca nocturna citra febrim ad temperandam lympham  $\Theta$ sa & acidam optimè, quas rectè dicit posse substitui pilulis de cynoglossa.

Observeetur hîc de succo glyzyrrhizæ, quod sæpius soleat adulterari, idque variis quisquiliis ac pulveribus pro ponderis augmento: unde dum propinandus succus glyzyrrhizæ pro temperanda lymphâ acidâ vel salâ, multum aggravat malum: nam reperitur in ʒb succi glyzyrrhizæ una alteravè drachma quisquiliarum. Ubi ergo volumus esse cauti, præscribimus succum glyzyrrhizæ Hispanicæ, cujus defectu

℞. Succ. glyzyrrh. in  $\nabla$  hyssopi solutus, qui filtretur & inspissetur. Verum in inspissatione exactus observeetur ignis gradus; ubi enim vel leviter excedit, fit succus amaricans & empyrevma contrahit, quod etiam est nocivum.

Vel ℞ Extr.  $\Delta$ is pulveris. gr. xij.

croci gr. ij.

myrrhæ elect. gr. jv.

laud. opiat. gr. j.

c. eff. succin. f. pilulæ: S.

Abend-Pillen vor den Husten.

Vel ℞. Succin. præpar. ʒb.

myrrh. el.

$\Theta$  vol. succin. aa gr. v.

extr. croci gr. ij. vel jv.

laud. opiat. gr. j. vel ij.

$\Theta$  destillat. succin. gutt. ij.

cum eff. opii vel lign. sassafr. vel succin. f.

Pilulæ, bihorio ante cœnam sumendæ.

D. S. ut suprâ.

Quodsi pilulæ sint molestæ, loco earum habet rotulas has Sylvius loco citato; nam & ipsum saccharum in tali tussi convenit:

Vel ℞. Spec. diatr. simpl.

Trag. fr. ʒj.

fl.  $\Delta$ is ʒij.

extract. croci gr. vj.

c. f. q. Sacch. in Emuls. semin. papav. albi solut. f. Rotula,

adspargendæ aliquot guttulis  $\Theta$ i destillat. anisi.

D. S.

**Hust- und Brust-Rüchlein.**

℞. Spec. diatr. usit. ʒiſſ.

fl.  $\Delta$ is ʒij.

laud. opiat. gr. jv. vel v.

c. sacch. in  $\nabla$  scabios. solut. f. Rotula.

℞. Fl.  $\Delta$ is ʒi.

benzoës,

succin præp. aa ʒb.

shuris

g. Arab. aa ʒj.

extract. croci ʒb.

(Gg)

laud.

laud. opiat. gr. iij.  
c. sacch. in  $\nabla$  fenic. sol.  $\mathfrak{z}$ ij. f. Rotula, ad-  
spargendæ cum  $\phi$ o destillat. anis.

℞. Conserv. flor. anthos  
beton.  
calend. aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

succini prapar.  $\mathfrak{z}$ ij.  
myrrh. elect.  $\mathfrak{z}$ ij.  
benzoes,  
thuris. aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

c. sacch. in  $\nabla$  serpill. sol. f. morsuli: irro-  
randi cum  $\phi$ o destillato succini. S.

**Brust- Worsellen.**

Vel fiat pulvis temperans seu incrassans:

℞. Rad. ireos Fl.  $\mathfrak{z}$ ij.  
flor.  $\phi$ is  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\phi$ o destillat. anis.  $\mathfrak{z}$ ij. ad  $\mathfrak{z}$ ℔.  
fenicul. gutt. xv.

sacch. opt.  $\mathfrak{z}$ ij.

M. F. S.

**Brust- Pulver.**

Dosis  $\mathfrak{z}$ ij. detur bis in die, & convenit, si  
lætho est in pectore. Vel

℞. Spec. diatreos usit.  $\mathfrak{z}$ ij.

flor.  $\phi$ is  $\mathfrak{z}$ ℔.

laud. opiat. gr. iij.

M. f. p. pro tribus dosibus.

D. S.

**Brust- Pulver auff 3. mal.**

Ad tussim difficilem noctu tantum per 4.  
vel 5. horas affligentem, cum febre catarrhali  
& coryza, præmissis universalibus ad tempe-  
randum serum acre,

℞. Sperm. ceti. gr. xxiv. vel  $\mathfrak{z}$ ℔.

laud. opiat. gr. iij.

M. & divid. in 2. part. æqual.

Una pars hora pomeridiana 5. altera pars  
hora 10. vespertina sumebatur, & optimè pro-  
fuit.

℞. Sperm. cet.  $\mathfrak{z}$ ij.

succin. prap.  $\mathfrak{z}$ ij. vel  $\mathfrak{z}$ ℔.

myrrh. elect. gr. viij. ad  $\mathfrak{z}$ ℔.

laud. opiat. gr. iv.

M. f. pulvis.

Dividatur in 3. vel 4. part. æqual.

D. S.

**Temperirende Glus- und Brust- Pulver.**

Capiantur manè & vesperti bihorio ante  
vel post cœnam.

℞. Conserv. rosar.  $\mathfrak{z}$ ij.

antihect. Pos.  $\mathfrak{z}$ ℔.

flor.  $\phi$ is

spec. diatreos aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

c. syr. diacod. f. Electuarium.

D. S.

**Temperirende Glus- und Brust- Lat-  
verge.**

Faciunt huc elæosacchara, maximè ex oleo  
succini, quæ in talibus sunt nobilissima. Sy-  
rupus diacodion Montani, & syrupus scabio-  
se, vel misti, vel cum rob passulæ. subacti,

cum baculo liquiritiæ assumpti, & ita pede-  
tentim deglutiti, etiam hic egregium sunt re-  
medium, omnibus loh. incrassantibus & ex-  
pectorantibus præferendi.

Alias ad temperandam lympham salam &  
acidam præprimis opiata ac papaperina, &  
dicta ex spermate ceti & succino conveniunt,  
imprimis gummata mucilaginosæ, qualia sunt  
tragacanthum, item gummi Arabicum: radi-  
ces etiam subdulces, imprimis glycyrrhizæ,  
althææ, helenii, & similes: e. g.

℞. Spec. diatræg.  $\mathfrak{z}$ ℔.

p. rad. alth.

liquirit. aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

laud. opiat. gr. vi.

M. f. pulvis. S.

**Temperirende Brust- Pulver.**

Vel ℞.  $\nabla$  Loh sani & experti.  $\mathfrak{z}$ ij.

loh sani & experti  $\mathfrak{z}$ ℔.

spec. diatr. simpl.  $\mathfrak{z}$ ℔.

succin. prapar.  $\mathfrak{z}$ ij.

syr. diacod. mont.

de jesus. aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

M. D. S.

**Uindernde Brust- Cafft.**

℞.  $\nabla$  Fenic. vel scabios.  $\mathfrak{z}$ ij.

asthmæ.  $\mathfrak{z}$ ij.

syr. diacod.  $\mathfrak{z}$ ℔.

M. D. S.

**Uindernde Brust- Träncklein.**

℞.  $\nabla$  flor. papav. err.  $\mathfrak{z}$ ij.

syr. papav. simp.

de jesus. aa.  $\mathfrak{z}$ ℔.

M. pro duabus dosibus. S.

**Uindernde Brust- Cafft auff 2. mal.**

Vesperti unam bihorio ante cœnam, & al-  
teram sub introitum lecti sumendo.

In fine

℞. MP. de succ. Crat. gr. xvj.

extr. agar. gr. viij.

troch. alband.

scamm. Crat. aa. gr. ij.

c. essent. ligni sassafr. f. pilula. D. S.

**Glus- und Brust- Pillen.**

In tussi sicca chronica, affligente pectus,  
& à lymphæ vitio oriunda, adeoque phthisin  
plus minus minitante, dicta sulphurea balsa-  
mica, noxam eluentia, non sufficiunt, & tus-  
sis fit continua, & postea incipit ejici muco-  
sa materia ex ulcere pulmonum. In tali ca-  
supro lymphæ correctela optima sunt deco-  
cta lignorum sudorifera, matutino tempore  
usurpanda. Talia præservativa matutina sunt  
decoctum quajaci, imprimis ligni sassafras,  
vel decoctum hujus aut radice chinæ cum  
passulis, mediantibus quibus & corrigitur  
lymphæ & per sudores evacuato latice morbo-  
so, eosq; subinde repetitos & aliquandiu con-  
tinuatos, optimè curantur hæ ipsæ vid. quæ se-  
perius dixi de siti. Hæc quantum valeat, vid. Lo-  
tichius obs. 4. 3 c. 10. obs. 1. p. 233. & Pilo de colluv.  
ser. p.

*ser. p. 184.* Vesperi beneficio opiatorum sistatur violentia tussis.

Externè *℞. Capit. allii Num. 3.*  
c. f. q. pingued. porcin. contundantur in formam unguenti,

D. S.

**Brust-Gälblein.**

Hoc vesperi ante lecti ingressum prope ignem plantæ pedum illinantur, quod per tres dies continuandum.

Vel sumatur saltem pinguedo lucii piscis.

Si sit tussis sicca ferina stomachalis, eaque inveterata, curatur præmissio vomitorio, maturè tamen instituto, partim per opiata, partim per temperata, aërem, orificium ejus vellicantem corrigentia: qualia sunt flores *Δis*, passulæ, & omnia ex passulis, decoctum raparum, liquiritiæ & ejus succus, decoctum helenii unà cum passulis Corinthiacis cum vino Hispanico vel Malvatico paratum: & postmodum saccharum album addatur pro lubitu, & coquatur ad consistentiam aliqualem syrupi.

Pro dosi manè & vesperi detur cochl. j.

Hoc remedium auctorum tussim præmissio vomitorio mirè sedat: in infantibus absque vomitu à Lindano laudatur. Interdum etiam de syrupo diacodii vel pro ratione circumstantiarum essentia opii cuilibet dosi aliquantum addi potest. Vel

*℞. R.  $\overline{\text{R}}$  compos. 3ij.*

*~ Θ \* ci anis. vel alius vol. & si aromat. 3j.*  
*Ess. opii 3b.*

M. D. S.

**Hust-und Brust-Elixir.**

Dosis 40 gutt. manè, à meridie, & sub introitum lecti, in quocunque vehiculo, expectando sudorem.

Addatur his decoctum raparum, quod certè est egregium remedium, sive rapum sit recens vel exsiccatum, & in tussi sicca omni, vel catarrhali vel pectorali vel stomachali nobile.

Pertinet huc euporiston: scil. passulæ aut ficus cum spiritu vini combusti vesperi in tussi ferina sicca, ex stomachi vitio cum tussi, superveniente asperitate faucium, phlogosi, vel raucedine cum tussi catarrhali & chronica.

Potè convenit glyzyrrhiza, ejusque succus, nec non electuarium helenii cum melle, accetera suprà in tussi sicca laudata. Sic facit huc euporiston Amati Lusitani c. 6. *curat.* 90.

Videatur etiam Rulandus loco citato, qui viro annorum 40. tussi vehementissima & asthmate afflicto pulverem hunc præscripsit. Benzoë sanè rectè vocatur balsamus pectoris, & in morbis aliis pectus affligentibus reverà est egregium remedium; unde essentia croci atque essentia succini mista, in tussi ex pectore affecto orta, erit egregia.

Tom. II.

Vel *℞. Pulpæ passul. min. 3iij.*

*flor.  $\Delta$ is 3b.*

*c. f. q. syr. papav. simpl. F. Electuarium.*

D. S.

**Brust-Katwerge.**

Capiatur pro lubitu.

Loco florum *Δis* communium quidam commendant flores sulphuris saccharatos.

Quidam omnes tusses curavit per pomum excavatum melle rosaceo impletum, supra prunas positum, & ita sub noctem devoratum. Sed tussis hæc ferina, modò præmissus fuerit vomitus, ut plurimum sponte evanescere solet, tantillis temperatis postea assumtis.

In genere tussis humida ferè ut asthma humidum curatur: Tussis autem sicca simili ferè ratione atque affectus catarrhales levatur.

Superest tussis nervorum seu convulsiva, quæ curatur ut aliæ convulsiones epileptiæ, & imprimis præmissis univèrsalibus per *Θia* volatilia & succinata, quæ inter liquor C. C. succinatus est egregius: unde etiam Dn. Boyle in Philos. experimentalis in tussi quacunque, etiam inveterata, sola solet commendare *Θia* volatilia, v. g. ~um & *Θ □ x*, item, ~m C. C. aut *Θ C. C.* tanquam singularissima & expertissima.

Cum fauces sint subinde læsæ, & à lymphâ acriori plus minus excoctæ, rubentes, & quodammodo inflammatae, ob id acrimoniâ blandè temperantia & incrassantia dicta, item dulcia plus minus fauces lubricantia & lenientia, conveniunt. Sunt autem talia passulata, succus glyzyrrhizæ, syrupus violarum, rosarum, de jujubis, tussilaginis, si abiosæ, liquiritiæ: item syr. diacod. à Montani cum syrupo scabiosæ mistus, & cum baculo liquiritiæ gustatus, subinde lambendo deglutitus. Elæosacchari linctus, rotulæ supra dictæ & similia ex remediis supra recensitis parata:

*℞. Syr. diacod. Mont. 3vj.*

*mell. passul. 3ij.*

*extract. liquirit. 3j.*

diluantur cum pauca *∇* scabios. in consistentiam Loh.

D. S.

**Hust-und Brust-Safft.**

Vel interdum glyzyrrhiza recens continuò maceratur; sic enim oblinuntur fauces & lubricantur.

Pertinet huc liquor seu oleum sacchari ex saccharo & *V*, uti habet Hartmannus:

Convenit maximè, si tussis affligit ex squalore *Δis* sicci vel squalidi, & inde orta raucedine. Riverius facit oleum sacchari compositum, dum *Vm* imprægnat appropriatis pectoralibus. Loco hujus olei sacchari sunt qui recipiunt ovum ad duritiem coctum & exempto vitello albumen induratum saccharo replent, ita nonnihil perforant & in cellam suspendunt, & ita fit oleum sacchari, quod ar-

(Gg 2)

bitror



bitror non esse inconueniens. Rhumelius in *Herm. p. 137.* saccharum Canarium laudat.

Potest etiam externè aliquid plantis pedum addi, scilicet ante lectum lucii piscis pinguedo, vini spiritus, spiritus menthæ & similes.

Fit interdum, ut cum tussi conjuncta sit hæmoptysis seu sputum sanguinis; in tali casu Forestus commendat syrupum myrtillorum *l. 16. obs. 20. in Scholio*, imprimis si cum decocto pallularum, cum spica aromatizzato, assumatur.

## ARTICULUS IV.

De

### Catarrho Suffocativo.

**A**ffectus ex hætenus dictis, nempe ex asthma, præsertim sicco, tussi, & rauedine complicatus, diversimodè tamen, ita ut nunc hoc, nunc illud symptoma observari videatur, isque vel subito irruens, vel ex improviso exasperatus, nunc continuus, nunc remittens, & vel periodicè vel incertis intervallis repetens, & quidem suffocationis periculum plus minus inferens, cum stertore, materię vel paucę vel nullius rejectione, catarrhus suffocativus *ein Stöckflusß* vulgò dicitur, adeò ut vulgus in genere quancunque respirationem subito difficiliorem redditam & suffocationem minitantem, in specie si cum tussi conjuncta fuerit, nomine catarrhi suffocativi appellare soleat. Hinc fit, ut asthma occulta interdum recurrentia, item asthma humorosa, imprimis vespere graviter affligentia, sub hunc censum veniant & confundantur; item tusses ferinæ, in specie nocturnæ, gravius affligentes, imprimis cum excretionem copiosiore facta conjunctæ, huc à quibusdam trahantur. Catarrhus tunc dicitur à præconcepta opinione, quasi subito, ex cerebro præsertim, fluat humor serosus plus minus pituitosus, qui bronchia & pulmones replens suffocationis periculum intendat. Sed paucis rem explicat Lindanus *in colleg. manuscr. super Hartmann. Prax. Chymiatr.* dicendo: *Maxima de nihilo nascitur historia, nil obscurius hæc de catarrho suffocativo doctrinæ: Nam ipsa anatome eam ostendit falsissimam, & quomodo materia vel pituitosa vel serosa, à capite potius in pulmonem, per rimam asperæ arteriæ, & epiglottidem obstantem, transibit, quam per œsophagum, &c.* Alii igitur verè cautiore per venas à capite deferri tales humores, hinc deponi in pulmones, replere hos & asperam arteriam, & suffocationem ita inferre putant. Sed ridiculas has de catarrhis suffocativis hypotheses non solum discutit & refutat Helmontius *Tract. Catarrhi Deliramenta*; sed &

Vincentius Baronius *Tr. de Pleuropneumonia*; & Schneiderus *de Catarrh. l. 3. cap. 4. p. 276. & 296.*

Ut supra ergo monui, complicatus affectus est, qui vulgo suffocativi catarrhi nomine venit. Unde in vulgi judicio & præconceptis hypothesebus, per ignorantes Medicos confirmatis, hic non inhærendum; propterea triplicem catarrhi suffocativi putatitii, asthma convulsivo contradistincti, differentiam facio, prout in praxi observare eam mihi contigit.

I. Est catarrhus suffocativus ex pulmonibus affectis, ex hostili acido inspirato, vel intus genito, illis profundius se insinuante, irritatis, hinc proprias fibras fortius se stringentibus; unde suffocationis imminet necessitas, non prius cessans, donec lymphæ uberioris irrigatione irritans illud præternaturale, & eorum mutuo coalitu concretum mucosum factum, ablutum & abstersum fuerit, cujus expectoratione morbus solvitur. Remanet tamen subinde vestigium in illis fibris, ita ut levi occasione renovatum spasmus & spirituum occlusionem minentur.

Pertinere huc videtur infantum quorundam plus minus robustorum catarrhus suffocativus cum epilepsiæ metu junctus, dum v.g. simpliciter creberrima thoracis systole & diastole cum levi vel nulla tussi continuo suffocant videntur; idque ipsum etiam evenit subinde ita, ut tali spasmodicâ affectione pulmones constringi & thorax coarctari ita videatur, ut & respiratio libera impediatur, & sanguinis per pulmones circulus impediatur: hinc facies eorum rubicunda esse, & præcedere talem affectum per aliquot dies vel rauedo levis vel tusculicula solet. Conf. Hildanus *c. 3. observ. 10. & cent. 2. obs. 66.* item Schenkus *in obs. pag. 149.*

### C U R A.

Ut itaque talem affectum in adultis opiata & attemperantia, vulgò incrassantia dicta, optimè levant, etiam paroxysmos; ita & talibus infantibus thoracica, item sperma ceti, &c. in vehiculo calido propinata, observantur proficua: cum e contra asthma humida, item tusses humores, præsertim ex stomacho in infantibus non rari, imprimis per nicotianam, item per blanda emetica, curari debeant.

II. & III. Differentia catarrhi suffocativi vera est catarrhus laryngis,

Ad bronchum pertinens; quando subito respiratio difficilis redditur cum adjuncta sensibili laryngis irritatione, indeque superveniente tussi, eaque satis violenta, cum ex creatu in principio paucio, progressu & in fine copioso, semper tamen cum levamine. Quæ in prin-

principio paroxysmi ejiciuntur, ferè sunt tenula, pauca & serola, quæ in progressu fiunt crassa, viscida & copiosa, quæ dicuntur cocta: auditur interdum stertor & sonitus, interdum raucedo adest, aut præcedit, aut sequitur, vesperi & noctu plerumque affligit, dum enim dorso incumbunt patientes, exasperatur: præcedit interdum dolor capitis & partium colli vicinarum, &c.

Ex dictis elicitur: Catarrhum hunc suffocativum propriè loquendo esse affectionem laryngis, in quo hæc & caput asperæ arteriæ, in specie epiglottis, afficitur primariò; hujus enim & epiglottidis & laryngis irritatio, & hanc semper insequens pertinacior strictura seu clausura, omne id præstat, quod aliàs Catarrhus suffocativus dicitur; ita, ut catarrhi suffocativi formale in arcta & stricta clausura laryngis, ob irritationem hujus, consistat. Jam vero, sive in ipsa larynge hæreat malum, & sic erit affectus simillimus broncho cum raucedines sive supra aut extra laryngem, saltim in ambitu aut superficie epiglottidi incumbat causa peccans, eritque tunc catarrhus suffocativus, qui pertinet ad catarrhum membranæ pituitariæ posterioris Schneideri. Nempe notum est, si tantum aquæ aut cervisæ guttula aut mica saltim panis sub inspiratione laryngem ingreditur, quod hanc admodum sensilem irritando mox faciat ejus convulsionem seu pertinacem ab epiglottide occlusionem & suffocationem; nisi impetuosior tussis mox insequens illata denuò eliminat: & quò diutius sit ista irritatio, eò plus pituitæ postmodum excernitur. Unde ex quacunque causa interna, si similis fiat in faucibus irritatio, tunc similis subito imminet tussis, strictura vel suffocatio, & similia pathemata.

. C A U S Æ.

Causa ergo irritans, quæ infert hujusmodi subitaneum pathema, est respectu laryngis vel interna vel externa. Interna ut plurimum est affectus feri vel lymphæ acrioris, nunc salioris, nunc in specie acidioris ad bronchum delatæ, & tunc titillatio adest ob acrimoniam lymphæ acidioris ad laryngis interiora latæ, quæ defertur ob læsionem à causa externa, ab inclementia aëris introducta, tuncque pars læsa plorat copiosam lympham, nunc saliam, nunc acidam, estque sic catarrhus suffocativus nihil aliud, quam quasi raucedo subitanea, hinc irritatur larynx, stringitur epiglottis; unde metus suffocationis subitaneus. Periodicè hoc fit interdum, singulis noctibus repetens: quale exemplum appositè huc facit, quod habet Riverius c. 3. observ. 15. Hæc, nempe causa externa, talem catarrhum suffocativum inferens, est imprimis lymphavi-

scidior, glutinosior & copiosior cujuscunque saporis, ex membranâ pituitaria posteriore & inferiore ad fauces copiosius delata, & subito inviscans quasi laryngem, & epiglottidis liberum motum impediens; unde mox suffocatio imminens, tussis, & copiosus materiæ viscidæ scretus cum sensu læsionis in faucibus: estque affectus reverà catarrhalis, nempe vitio membranæ pituitariæ posterioris, & ejusdem est naturæ cum asthmate humido, cum tussi chronica, imprimis stomachali. Exasperatur hic affectus subinde vesperi & noctu, & frequenter per se subito ex prægressa causa externa, imprimis ab aëre inclementiore aut maligno, aut variis effluviis spirituum acidorum mineralium imprægnato, facta alteratione, vel ex tussi diuturna & chronica oritur, uti patet in exemplo Hildanic. 6. obs. 8. Subolevit hoc Platerus, unde catarrhum suffocativum angustiam intra fauces ait, & catarrhum non ad pulmones, sed ad fauces delabi animadvertit l. 1. obs. 185.

C U R A.

Catarrhus suffocativus à causa externa curatur eodem modo ac raucedo recens seu tussis nocturna sicca, v. g. per vomitoria, & post per opiata ac similia alia temperata, in crassantia dicta, i. e. lympham acrem, in specie acidam, temperantia, vel si minus in principio conveniunt vomitoria, præmisso clymate per sudorifera blanda lymphæ motum & materiam corrigentia, hinc per opiata irritationem faucium tollentia & sistentia.

℞. ▽ Scabios. ʒiij.  
asthmat. ʒvj.  
~ ♂ \*ci anisat. ʒj.  
syr. papav. alb. ʒj. vel hujus loco  
diacod. Mont. ʒiij.  
D. S.

Ruffi-Träncklein.

℞. ▽ Menth.  
scabios.  
serpill. āā ʒj.  
asthmat. ʒvj.  
~ ♂ \*ci anis. ʒij.  
flor. Δis ʒʒ.  
syr. diacod. Mont. ʒj. M.  
℞. Essent. catarrhal. ʒiij. vel ʒij.  
~ ♂ \*ci anis. ʒj.  
M. S.

Ruffi-und Glug-Essenz.

Si asperior fuerit mistura propter spiritum salis ammoniaci, omitti potest.

Si malum est à causa externa, curatur ut asthma humorosum, vel tussis chronica, imprimis stomachalis, nempe per vomitum, & deinde per attenuantia, & mucum visci.

(Gg 3)

certain est, subesse vitium lymphæ, vel acidæ vel falsæ.

Tussis talis catarrhalis originem ducit ex lymphæ vel falsidioræ, quæ uti in M. S. febrim talem plus minus lentam excitat, & sub cute pustulas; ita laryngem & asperam arteriam irritando, tussim siccam infert. Non rarum tamen est, tussim talem siccam nocturnam etiam sine febre affligere, pariter ex catarrhali vitio lymphæ oriundam. Itidem catarrhis depluentibus à capite tribuunt autores eam; sed post Helmontium *tract. catarrhor.* deliramenta, imprimis Schneiderus *de catarrhis* caliginem excussit: Hic enim in eo est totus, ut dicat: excrementa tussiendo rejecta in tussi tali catarrhis tributa tam sicca, quàm quæ successivè supervenit, humida, transudare ex sanguine per tunicas, quas vocat pituitarias. Verùm rectius Steno observavit, quod post has tunicas, communiter pituitarias Schneideri ac alias similes, per quas serosæ materiæ fit transcolatio, sitæ sint copiosæ glandulæ, quorum orificia hient in istas tunicas pituitarias, & ita lympham in istas cavitates effundant; adeoque, dum dicit Schneiderus, in coryza transudare mucum per tunicam seu membranam pituitariam superiorem, internè nares succingentem; in tussi verò transudare mucosa rejectanea per membranam seu tunicam, asperam arteriam investientem, &c. potius cum Stenone dicendum: sub his tunicis latitare glandulas, suam lympham per istas exonerantes.

Quando ergo ista lymphæ est p. n. acrior, falsior, acidior, aliove simili plus minus corrosivo sapore imprægnata, non potest non fieri tussis, quia vellicatur aspera arteria. Falsa fit lymphæ ex concursu acidæ & urinose, uti ex pathologicis patet.

Ad has tusses ex lymphæ vitio genitas pertinet etiam tussis, quæ præcedit variolas & morbillos, itidem sicca & admodum molesta; necnon ea, si variolæ pulmonem & asperam arteriam obsident; cujus exemplum habet Lotichius *in observat. pag. 143.* item quæ infantibus ex malè curata scabie, aut ex tinea capitis, aut achoribus quovis modo repulsis, nascitur. Hæ ritè tractatæ curari possunt, ut non fiant humidæ; sin minus, tussis etiam humida supervenit, ex supradictis rationibus, imò & phthisis variolis successivè secuta observata fuit.

Radix mali, unde talis lymphæ vitiosa generatur, tussim talem catarrhalem, præsertim nocturnam inferens, est in ventriculo; errata nempe digestionis ejus, & hinc deficiens in intestinis ejusdem perfectio; quibus in

locis chylus vitiosus falsus aut acido-falsus genitus sui tabem mediante lymphæ variis partibus, ac speciatim, quavis occasione eò derivetur, pulmonibus affricat. Ratio, quare tusses tales vespertino ac nocturno tempore magis exasperentur, adhuc intricata est. Universale aliàs est, quod morbi à feri ac lymphæ vitiis oriundi his temporibus magis exacerbari soleant, ad quod ipsum non parum videtur conferre prohibita pl<sup>o</sup> minus transpiratio insensibilis, vesperi ex remittente tepore diurno m<sup>o</sup> copiosè procedens. Observata etiam fuit tussis sicca vitio pulmonum, quando nunc calculi, nunc excrementa aliaque in bronchiis pulmonum tussim inferunt. Refert Schenkius *in l. 2. observat.* tussim siccam admodum diuturnam ex irritatione continua capitis laryngis, propter calculos in tonsillis genitos, qui irritando dederunt tussim.

Quod si verò causæ stomachi & cesophagi internæ inferant tussim siccam, vocari ut plurimum solet tussis ferina, in qua gravissime, etiam continuo & interruptis vicibus, tussiant; si incipiunt tussire, vix remittere sciunt. Oritur ex materia falsa acri, præsertim tenui & subtili, rarò crassa, pertinaciùs stomachi orificium superius vellicante istudque rodente, nihil hic excernitur: interdum etiam tanto perè urget, ut pertinaci tussi & concussione stomachi vomitus sequatur, & facile partem affectam præter dicta sonus profundus, locum irritationis in tussi & suprà allegata declarant. In specie infantum tussis quæcunque, si non à causa externa, semper fundamentum in stomacho habet, sive humida sive sicca; post vomitum cessat, respiratio est libera, nihil ejicitur materiæ: ergo est causa in stomacho: Accedit & hoc, quod sentiant circa præcordia & circa stomachum gravativum quid, & sic tussis non potest esse in pulmonibus. Quod etiam pertinet in Schenkii *observat. pag. 237.* Tussis nova infantum Luterii grassans, quinta dicta, in qua etiam ventriculus affectus fuit.

Pertinent huc istæ tusses, quæ non rarò in principio paroxysmorum febrium intermittentium unâ alterave hora paroxysmum antecedunt, & fiunt simpliciter ex irritatione orificii stomachi superioris, nata ex motu inchoato fermenti febrilis & motu humorum succi pancreatici & biliosi, circa intestinum duodenum à dicto fermento febrili agitatorum, unde tussis per ventriculi consensum cum diaphragmate circa paroxysmorum principium contingere solet, & quidem tales ordinariò ferè sunt hypochondriaci, seu in quibus abundat acidum in stomacho. Tales enim tusses sunt, quas quidam contrahunt, dum in lectis



ledis aëri liberiori se exponunt circa regionem stomachalem, exinde facile fit, ut pertinax tussis stomachalis superveniat.

Senes sæpius quoque tussi laborant, eaque pectorali, si vitium est ex aëre externo inspissato; si verò citra talem externam læsionem senes tussiendo externant copiosa viscida, & simul conquerantur de dolore plus minus compressivo in scrobiculo cordis, ordinariò vitium stomachi subesse solet, natum ac sustentatum ex defectu digestionis primæ in senibus.

De arthriticorum tussi res etiam intricata videtur: observavi aliquoties arthritidi obnoxios, si hæc aliquandiu inducias dederit, quod tales facili occasione tussim, eamque humidam, incurrant cum sensu molesto circa scrobiculum cordis, ac difficili plus minus inspiratione, quæ symptomata superveniente podagra leviter & quasi sponte evanescent. Revera stomachalis videtur tussis, cum faber podagræ reverà in stomacho cadatur.

Interdum variaz tussium differentiaz subinde complicantur, ita, ut in disposita tussi humidæ facili superveniat tussis convulsiva. Sic pariter tussis humida, tam stomachalis quam pectoralis, ferè complicari ac simul affligere possunt.

### PROGNOSIS.

Prognosis facilis est. Fundamentum ejus ex varietate causarum efficientium, subjectorum patientium, & utriusque adjunctarum circumstantiarum desumi solet.

Tussis frequens nimis & diuturna non raro ad hæmoptysin disponit.

Tussis ferina, tam in infantibus, quam etiam adultis, maribus herniam, in prægnantibus abortum causat.

Tussis sicca nocturna in subjecto, quod debiles habet pulmones, minatur phthisin, quatenus ex continua pulmonum concussione, & lymphæ acrioris in eorum parenchyma translatione, tandem erosionem, & ita ulcus pulmonum, & hinc phthisin, quam ex catarrhis oriri putant, infert.

Capiti debilitato admodum nociva est tussis; uti etiam iis, quibus affecti sunt oculi.

Tusses senum diuturnæ non maturantur, dicit Hippocrates *sect. 2. aphor. 40.* adeoque difficillimè curantur.

Tussis hydropi superveniens, malum est: vid. Hippocrates *sect. 6. aphor. 35.*

Tussis à causa externa nihil habet in recessu, & sine periculo est; quæ verò à causa interna, sive sit pectoralis sive stomachalis, phthisin minatur, aut eandem incipientem ostendit.

Scorbuticis frequentiores tusses sunt suspectæ, ne ex partibus serosis phthisin contrahant.

Interdum febribus ardentibus, imprimis

curatis & in declinatione non rite purgatis aut judicatis, supervenit tussis humida ex metastasi materiæ morbificæ concoctæ: in tali casu, quæ si rectè procedat expectoratio, bona est; sin minus, & non in tempore succurrimus ægro, periculum imminet phthiseos aut periculosi asthmatis.

Tussis omnis humida inferens læsionem pulmonum, periculosa est ob phthiseos metum.

Tussis graviter affligens phthisicos, ubi subito cessat, signum periculosum est.

Tussis stomachalis humida cruditates, atrophiam, tabem, &c. minatur ex vitio chyli, corrumpentis plus minus lympham; tandem etiam pectoralem infert: quod etiam suo modo de tussi sicca stomachali verum deprehenditur.

### C U R A.

In cura attendendum ante omnia: an tussis morbus sit primarius, an verò secundarius? qualis v.g. phthisicorum, pleuriticorum, &c. Nam hæc primariò morbo sublato vel sponte cessat aut sedatur. Interim attendatur naturæ motus in tali casu, ut promoveatur, si sit parvus, in phthisicis v. g. & purulentis; vel inhibeatur, si sint nimii, ut in tussi ferina crebrius inani, & ita saltem temperetur.

In hac vero cura tussis cujuscunque

1. Ante omnia removenda est causa irritans seu ad tussim stimulans; &
2. Sistenda est vellicatio aut irritatio.

Quiduo scopi utut pro varietate causarum varient, ut plurimum tamen ad removendam causam melius remedium non est, quam vomitus, qui in quavis tussi est proficuum, in contumaciore verò, præsertim stomachali, est necessarius, sine quo tussis chronica tutò non potest curari; qui uti convenit in tussi recenti, ita sine eo tussim inveteratam curare admodum difficile est. Quæ verò pro secundo scopo vellicationem sistunt, sunt imprimis, uti notum est, opiata, in specie appropriatis mista.

Aliàs materia Medica in tussi tribus ferè generalibus capitibus absolvitur: nempe in crassantibus, incidentibus, & balsamico-vulnerariis.

Incrassantia sunt opiata ac temperata dulcia, quæ tussim à materia tenui & serosa, & inde ortum irritationis sensum, sistunt, ac vellicans mitigant, & ita materiam vellicantem ad consistentiam moderatam pro meliore expectoratione disponunt; unde ab effectu incrassantia dicuntur.

Incidentia sunt, quæ in tussi humida mucum glutinosum pro meliori expectoratione disponunt & attenuant, ac mobiliorem reddunt.

Balsamico-vulneraria, quæ noxiam excoriationem bronchiorum aut pulmonum

(F f 3)

aut

aut stomachi emendant, ut posteriores progressus maturè inhibeantur.

His itaque præmissis, tussis pectoralis sicca à causa externa inducta, qualis tussis tempore hyberno ex aëre inclementiore, vel sub laboribus chymicis accedit, optimè tollitur per opiata maturè adhibita, sive sit laudanum opiatum, sive theriaca, sive syrupus papaveris: c. g.

℞. *Cons. tussilag.* ʒʒ.

*laud. opiat.* gr. ij.

M. pro Bolo: S.

**Abend: Zucker auff einmal.**

Capiatur bihorio ante cœnam.

Imprimis si quis læsus à frigore hyberno, ut immineat coryza, maturè curari potest sic:

℞. *Theriac.* ʒj.

& *destillat. anis.*

*succin.* à gut. ij.

M. D. S.

**Glug: Theriac auff einmal.**

Capiatur sub forma boli cum sudore.

Conveniunt etiam pilulæ de styrace Sylvii. Item in tussi orta à vitio aëris externi hyberni usurpetur decoctum radicis zedoariæ in vino, vel decoctum radicis helenii cum passulis in vino Malvatico calidè haustum, & sudor expectetur. Alii non ineptè faciunt, dum juniperi baccarum M. iij. coquunt in cerevisia ad consumptionem tertiæ partis, & decoctum calidè hauriunt, expectato sudore; vid. Riverius in *Praxi*: item R baccarum juniperi Mynsichthi, in *Armament. Chym. sect. 2.* descripta convenit. Præsertim autem optimè semovent vim causæ externæ, balsama odorifera ex ois destillatis, v. g. apoplectica, vel anisatum vel succinatum, largiter naribus illita: item ois destillata anisi, macis, suffitus succini, gummi animæ, &c. Nam talis larga illitio alterat aërem introeuntem, ut non fauces vel asperam arteriam lædat. Ubi metuenda coryza, imitemur Helmontium *Tr. de asthmate & tussi*, paremus sternutatorium ex saccharo & pulvere hellebori nigri ana, addendo aliquot guttas ois destillati caryophyllorum. Talis loco sternutatorii tempore vespertino suffletur in nares; sic tollitur omnis noxa. Jujubas in vini spiritu maceratas commendat Hartmannus ad præservandam tussim in *Praxi Chymiatr.*

Quodsi à mineralibus eorumque fumis sub laboribus chymicis inspiratis oriatur noxa tussim inferens, optimus est panis largiter butyro illitus, ante laborem assumptus; sic acrimonia inspirata obtunditur, & tussis ac similia præcaventur; sicuti etiam post alterationem jam nonnihil inductam theriaca, & ejus medio provocatus sudor, promptè eam tollunt: sin inducta læsio ab his, non curatur

melius, quàm per vulneraria, & quidem pectoralia, si decoquantur in cerevisia.

Quodsi eadem tussis à causa externa nata, dum jam fuerit inveterata, ut jam ejiciantur copiosa mucosa, adeoque reddita humida, curatur ut reliquæ tusses humidae, præmisso nempe laxativo, in specie vomitorio, conveniunt opiata eam sistentia; hinc subjungenda, si sit tussis pectoralis, vulneraria & appropriata pectoralia, noxam inductam demum corrigentia, & inde nutrimenti aut sanguinis in ea factam degenerationem sistentia. Vel si tussis fuerit stomachalis, noxa curatur aromaticis stomachicis. Vespero propinanda sunt opiata, ut caveatur generatio: si sistitur, tunc denuò læsio à tussi antecedente inducta appropriatis curanda. Si in pulmonibus pars est affecta, ad eluendam noxam, nemalum recidivet, vulneraria pectoralia sunt usurpanda, ubi excellit in specie hederæ terrestris, cherefolium, veronica, scabiosa, helenium, ejusque radix, tussilago, lignum sassafras, & similia. Hæc decoquantur in aqua, vel cerevisia, & decoctum calidè bibatur bis vel ter quotidie; sic læsio sistitur, consolidatur, & alia mala supervenientia præcaventur.

Tussis humida pectoralis, quatenus constituit morbum, curatur materiæ crassæ vel causæ irritantis evacuatione, adeoque per incidentia, attenuantia, resolventia, atque expectorantia dicta, interpositis præsertim vomitorio, vel moderato purgante (nam rarius profunt hic purgantia) & tandem per pectoralia & vulneraria, læsionem in bronchiis & pulmonibus obortam tollentia, & ulteriorem progressum aut recidivam faciliorem præcaventia.

Conducunt ergò hic pro scopo incidendi & expectorandi succus raphani recens cum saccharo candi, arum ejusque radix: item spiritus asthmaticus, gummata, in specie \*cum, & ex eo parata remedia liquida, & in genere omnia ea, quæ suprâ in asthmate humido; item raucedine inveterata, fuerunt laudata: item marrubium album, ejusque decoctum, helenium, hederæ terrestris in tussi à putrilagine pulmonum, hyssopus, zingiber, &c. Schræderus laudat egregiè decoctum calami aromatici. Porro crocus, radix ireos Florentinæ, tussilaginis, zedoariæ, veronica, scabiosa, mentha, rosmarinus, & modò dictorum flores, nicotiana ejusque syrupus & oxymel nicotianæ in tussi ex lymphâ crassâ; atq; ex melle, scordii & helenii pulvere paratû electuarium. It. acetum scylliticum, oxymel simplex, & oxymel squilliticum compositum, cui incoctum marrubium, botrys, ejusq; succus & syrupus, syrupus de erysimo Lobelii, elixyr pectorale Michaëlis vel Wedelii cum spiritu gummi

gummi ammoniaci, vel salis ammoniaci anisato. Conveniunt etiam vegetabilium dictorum conservæ, & sic porrò. Vulgò commendatur ∇ pulmonum vituli cum plantis pectoralibus destillata: sed quo jure? nescio.

Pro expectorando ergo mucò, quocunque in loco ille hæreat.

℞. ∇ fenic.  
hyssop. aa. ℥ij.  
asthmat. ℥vj. vel ℥j.  
oxymel. (quill. ℥j).  
syr. nicot. ℥vj. M.

Pro scopo vulnerario pectorali convenit ∆, ejusque flores: item balsama ∆is, quæ sunt nobilissima, sive sit terebinthinatum; sive quod melius, anisatum, aut juniperatum, aut succinatum. Talis aliquot guttæ vj. viij. x. ad xij. & xv. semel vel bis in die in vehiculo calido vel ovi vitello, optimè conveniunt ad eluendam noxam pulmonum: aut cum balsamo ∆is fiat elæosaccharum: item benzoë antihæcticum Poterii, antimonium diaphoreticum, & vulneraria pectoralia supra laudata. Prostant etiam hinc inde pulveres pectorales, & pulvis contra phthisin, qui conveniunt in tussi ex vitiis lymphæ:

℞. Rad. Ireos Flor.  
flor. ∆is aa. ℥j.  
℥ii diaphor. ℥℔.  
laud. opiat. gr. jx.  
o sacchar. fenic. q. s.

M. pro pulvere: S.

Heilend Brust-Pulver.

Vel ℞. Pulveris pectoral. Mich. vel Ludov.

℥i.  
antihæct. Pot. vel ℥ii diaphor. ℥℔.  
laud. opiat. gran. j.  
o sacchar. anisat. q. s. M.

Vel ℞. Lap. o prapar.

℔. ∆is aa. ℥j.  
laud. opiat. gr. j.  
o destillat. anisi gutt. j. M.

℞. Ras. ligni sassaf. ℥j.

Maceretur in

∇ a fontan. Mens. ij.  
adde

Herb. heder. terr. vel Veron.

pulmonar.  
scabios. aa. Mij.  
passul min. conquass. ℥j.  
sem. anisi  
fenicul. aa. ℥℔.

Coqu. invicem ad tertias, in fine decocti addendo

rad. liquirit. ras. ℥ij.  
Colatur. D. S.

Brust-Tranch.

Vel ℞. herb. heder. terr.

veron. aa. Mj.  
hyssopi

marrub.  
pulmonar.  
tussilag. aa. M℔.  
flor. enula,  
scabios. aa. P. ij.  
rad. enul.  
Ireos flor.  
sem. cartham. cont. aa. ℥vj.  
rad. mechoacan. albiss.  
passul. min. aa. ℥j.  
Incil. & contus. D. S.

Brust-Species.

Ex his in aqua decoctis potest fieri decoctum pectorale. Vel possunt coqui cum hydromel, & per manicam Hippocratis aliquoties colari, & usurpari bis vel ter in die, pro urgentia affectus, mane haustus calidus, & a meridie bihorio ante cœnam, & sub introitu lecti:

℞. Herb. rec. veron.  
heder. terr.  
scabios. aa. M. j.  
cherefol. M℔.  
ras. lign. sassaf. ℥j.

Coqu. inf. q. ∇ simpl. addendo in fine decoctionis

passul. min. conquass. ℥ij.  
ras. rad. liquirit. ℥j.

Ebulliant iterum leniter, hinc dum fervent adhuc, suspende in nodulo cinam. elect. ℥ij.

Colatura ℔j℔. D. S.

Brust-Tranch.

Tussis humida stomachalis, ex humidavi- scida materia orta, curatur, præmissò attenuante & vomitorio, aromaticis nonnihil temperatis stomachalibus, reliquias materiæ peccantis incidentibus, attenuantibus & solventibus, & stomachi tonum restaurantibus. Pro purgationis scopo vomitoria & alia equidem nota sunt, quæ nunc per se evacuationis scopo usurpantur, nunc supra dictis porcionibus in minuta dosi adduntur, pro promovenda expectatione. Sanctè testor, quod ex usu vomitoriorum ne minimum noxæ observaverim. Pro scopo purgandi per inferiora convenit MP. de hiera cum agarico, vel extractum ejus, addito gummi ammoniaco in trocho soluto, acuatum cum extracto trochiscorum alhandal. e. g.

℞. MP. de hiera cum agar. gr. xv.  
G. \*ci troch. ℔℔.  
extr. troch. alhand. gr. j.  
o destillat. anisi gutt. ij.  
c. Essent. g. \*ci f. pilulæ: S.

Purgirende Brust- und Magen-  
Pillen.

Similibus pilulis terinam tussim à pingulibus vaporibus, in muliere aliquando curavi.

Vel ℞. MP de \*co Querc. gr. xv.  
hier. c. agar. gr. viij.  
extr. agar. gr. v.  
bals. ∆is anis. gutt. ij.

c. Ess.



C. Eff. g. \*ci f. pilula, usurpandæ imprimis in tussi ex materia crassa & viscida, post febres acutas non rarò obvenientes.

Quin etiam his ipsis dulcis commodè potest addi, quem usurpat Riverius cum diagrydio: vid. cent. 3. obs. 31.

Vulgò pro scopo purgationis usurpant agaricum in infuso ad ʒʒ. cum oxymelite; sed ignavum est simplex. Potius extr. ejus cum aliis. Quidam semen carthami ab ʒʒ. ad ʒvj. infundunt; ut ut etiam ex hoc semine à ʒʒ. ad ʒij. elegans emulsio purgans fieri possit.

Opiata ac similia in tussi humida, ubi expectoratione opus, non conveniunt; excretionē enim impediunt, & hinc materiam evacuantem crassiorem ac viscidiorē reddunt. In fine tamen, ubi maximam partem evacuata est mucilago, & crebrior tussis inanis sæpius repetens, antequam aliquid ejiciatur, superest, in talibus ad vestigia læsionis irritandis delenda commodè cum aliis papaverina usurpari possunt, ut nempe his nimia irritatio ac crebrior frustranea tussis suspendatur, interea verò materia expectoranda præparetur, ut minori labore excernatur: v. g.

℞. ∇ scabios. ʒij.  
asthmat. ʒvj.  
flor. ʒis ʒj. ad ʒʒ.  
syr. diacod. Mont. ʒj.  
M. S.

#### Hust-Exācklein.

Pro incidenda materia viscida & crassa, præterea, quæ suprà de asthmate ex stomacho oriundo dicta sunt, imprimis conducit hæc potio admodum experta:

℞. ∇ Hyssop.  
tusilag. aa. ʒij.  
asthmat. ~ of. ʒʒ.  
oxymel. squillis. ʒj.  
syrup. de hyss.  
nicot. aa. ʒvj.  
M. D. S.

#### Mixtur gegen den Husten aufsetzliche mal.

Addi etiam potest pro meliori incisione & faciliore rejectione ~ Qi dulc. aut ʒis dulcis q. pl. pro grata aciditate. Hæc mixtura subinde cochleatim sumpta expectorat egregiè.

Elixyr pectorale D. Michaëlis cum spiritu asthmatico mixtum, uti in asthmate, ita in tussi à stomacho, notum est, quod sit egregium: c. g.

℞. Elix. pector. Mich. vel Propr. ʒʒ.  
~ g. \*ci ʒij.  
M. S.

#### Hust-oder Brust-Elixir 40. Tropffen.

Item ℞. Rad. ari acerr. ʒij.  
spec. dia-ireos. ʒj.  
Extr. rad. helenii vel zedoar. ʒʒ.  
ad ʒʒ.

Cum sacch. in ∇ fœnic. vel menth. vel scabios.

sol. q. f. fiant Rotulæ, adspargendæ cum ∇ destillat. fœnic. S.

#### Hust-Küchlein.

Vel ℞. Rad. ari. ʒʒ.  
g. \*ci in + sol.  
mastich. elect. aa. ʒj.  
Qi ʒlat. ʒʒ.

c. f. q. sacch. in ∇ menth. sol. f. Rotulæ.

Adnumerandum hic mulierum euporiston, quod est:

℞. Succ. raphan. express. q. pl.  
adde

sacchari candi. parum.

Mirabiliter resolvit in pectore & stomacho, atque expectorat.

Pro altero scopo, stomacho nempe appropriata sunt elixyr stomachale, elixyr proprietatis, quod cum & sine acido in vino enulato usurpatum, egregiè commendatur. Elixyr quidem cum acido in principio videtur exasperare tussim: verum, modò continuetur ad tempus, neminem spe suâ frustrabit. Egregiè etiam à Stœckero commendatur decoctum zedoariæ cum vino paratum, elixyr menthæ acidulatum cum ~ u ʒis, & Qi acris, vel sola vel cum ~ u ʒis \*ci simplici aut anisato; malvat. juniperinum, essentia & extractum helenii, item essentiacroci, & chocoalata. Quo etiam pertinet balsamus Peruvianus, guttatim ad 6. vel 8. guttas usurpatus: quin etiam præmissis præmittendis in tali tussi aliquando liquorem ~ x sol. Qi, item R ʒli ʒis Zvelfferi pro debita rugarum ejus expansione proficua observavi. Convenit etiam tam in tussi pectorali quàm stomachali humida, uti etiam suo modo sicca, electuarius, quod fit ex

Herb. scord. M. ij.  
salv. M. j.  
flor. ʒis ʒij.

Hæc omnia subtilissimè pulverifata, vel sola, vel addito laudano opiato, cum syrupo diacod. excepta, subinde deglutuntur ad sistendas tales tusses.

D. S.

#### Brust-und Magen-Latwerge.

Quod si sit tussis sicca nocturna pectoralis, adeoque catarrhalis, talis curatur & præservatur, nunc præmissis nunc omissis vomitorio, per volatilia sudorifera, opiatum mista, vespere imprimis assumenda, interdum sudorem imperando, quæ lymphæ vitium catarrhale corrigunt, blandè discutiunt, & vellcantis irritationem sistunt: v. g. ~ ʒis simplex vel anisatus, liquor C. C. succinatus, à gutt. 40. ad 50. & alia, quibus adjungenda essentia opii vel alia opiatum & papaverina. Unde & Veteres Philoniis contra talem tussim, & syrups diacodion, usi fuerunt. Nobis verò opiatum imprimis sunt in usu, eaque permista imprimis talibus, quæ acrimoniam lym-

℞. ~Θ\*ci anisat. ʒiʒ. ad ʒij.

Essent. opii. ʒj.

M. S.

### Brust-Spiritus/40. vel 50. Tropffen auff einmal.

Sumatur bihorio ante cœnam, & si opus, ante introitum lecti.

Vel istis præmissis appropriata pectoralia, imprimis balsamica oleosa sulphurea, lympham corrigentia & noxam partis eluentia, usurpentur, quæ etiam interdum sola sufficiunt, v. g. flores ʒis, qui jam à Celso contra tussim pectoralem à lymphâ acri sunt commendatum remedium, ut eorum ʒj. quovis mane in ovo sorbili accipiatur: conf. Thesaurus Rulandi p. 109. storax liquidus, benzoë, & flores benzoës in ovo sorbili, sperma ceti, ʒo destillatum anisi, fœniculi cum saccharo, balsamum ʒis anisatum, R ʒis, quam habet Willisius in Pharm. Ration. P. 2. p. 113. c. g.

℞. R ʒis ʒij.

Essent. opii ʒʒ.

M. D. S.

### Brust-Essent.

Dentur pro dosi 40. vel 50. guttæ, bihorio ante cœnam, & si opus, ante introitum lecti, usurpandæ.

℞. ~Θ\*succin.

R ʒis ʒij.

Ess. opii ʒʒ.

M. D. S.

### Hust-und Brust-Essent.

Dentur 30 vel 40 guttæ pro dosi.

℞. ∇ Scabios. ʒij.

fl. papav. errat. ʒiʒ.

R ʒis Willis. ʒiʒ.

syr. diacod. Mont. ʒiʒ.

M. D. S.

### Hust-Safft.

Conveniunt item succinata omnia, myrrhæta, & reliqua, quæ vulgò incrassantia seu propriè tenuem & acrem lympham temperantia appellantur, v. g. lac violæ, glyzyrrhiza, jujubæ, passulæ, radix ireos Florentinæ, helenii, horumque decoctum, herba veronicæ, scabiosæ; item vulneraria pectoralia, ut veronica, hederæ terrestris, &c. syrupus de jujubis, rosarum, scabiosæ, loh passularum, decoctum raparum, & ex hoc decocto paratus syrupus. Hordeata etiam sunt in usu, ubi est lymphâ acidâ & ʒsa, quam temperant: hinc Borellus *centur. 4. observat. 89.* refert de tussi, maciæ & agrypnia, hordeatorum usu curatis: item caticæ cum spiritu vini compastæ, species diaireos usitatæ, pulveres pectorales varii, semen papaveris, syrupus papaveris, amygdalæ dulces, & pilulæ de cynoglossa, loco quarum moderni usurpant laudanum opiatum, mixtum imprimis cum spermate ceti, item cum succinno; vel, quæ meliores, pilulæ

Tom. II.

de styrace & ad tussim Schrœderi, quarum descriptiones videbitis in ejus *Pharm. l. 2. cap. 73. num. 6. & 7. p. 252.* Admodum elegantes sunt pilulæ de stiorace Sylvii in tussi sicca nocturna citra febrim ad temperandam lympham ʒsam & acidam optimè, quas rectè dicit posse substitui pilulis de cynoglossa.

Observetur hic de succo glyzyrrhizæ, quod sæpius soleat adulterari, idque variis quisquiliis ac pulveribus pro ponderis augmento: unde dum propinandus succus glyzyrrhizæ pro temperanda lymphâ acidâ vel salâ, multum aggravat malum: nam reperitur in ʒʒ succi glyzyrrhizæ una alteravè drachma quisquiliarum. Ubi ergo volumus esse cauti, præscribimus succum glyzyrrhizæ Hispanicæ, cujus defectu

℞. Succ. glyzyrrh. in ∇ hyssopi solutus, qui filtretur & inspissetur. Verum in inspissatione exactus observetur ignis gradus; ubi enim vel leviter excedit, fit succus amaricans & empyrevma contrahit, quod etiam est nocivum.

Vel ℞ Extr. ʒis pulveris. gr. xij.

croc. gr. ij.

myrrhæ elect. gr. jv.

laud. opiat. gr. j.

c. eff. succin. t. pilulæ: S.

### Abend-Pillen vor den Husten.

Vel ℞. Succin. præpar. ʒʒ.

myrrh. el.

ʒ vol. succin. ʒʒ gr. v.

extr. croci gr. ij. vel jv.

laud. opiat. gr. j. vel ij.

ʒo destillat. succin. gutt. ij.

cum eff. opii vel lign. sassafr. vel succin. f.

Pilulæ, bihorio ante cœnam sumendæ.

D. S. ut suprâ.

Quod si pilulæ sint molestæ, loco earum habet rotulas has Sylvius loco citato; nam & ipsum saccharum in tali tussi convenit:

Vel ℞. Spec. diair. simpl.

Trag. fr. ʒj.

fl. ʒis ʒij.

extract. croci gr. vj.

c. f. q. Sacch. in Emuls. semin. papav. albi solut. f. Rotula,

adspergendæ aliquot guttulis ʒoi destillat. anisi.

D. S.

### Hust-und Brust-Rüchlein.

℞. Spec. diair. usit. ʒiʒ.

fl. ʒis ʒij.

laud. opiat. gr. jv. vel v.

c. sacch. in ∇ scabios. solut. f. Rotula.

℞. Fl. ʒis ʒi.

benzoës,

succin præp. ʒʒ ʒʒ.

sturis

g. Arab. ʒʒ ʒj.

extract. croci ʒʒ.

(Gg)

laud.

laud. opiat. gr. iij.  
c. sacch. in  $\nabla$  fœnic. sol.  $\frac{3}{4}$ ij. f. Rosula, ad  
spargendam cum  $\frac{1}{2}$ o destillas. anis.

℞. Conserv. flor. anthos  
beton.  
calend. aa.  $\frac{3}{4}$ ij.

succini prapar.  $\frac{3}{4}$ ij.  
myrrh. elect.  $\frac{3}{4}$ ij.  
benzoes,  
thuris. aa.  $\frac{3}{4}$ j.

c. sacch. in  $\nabla$  serpill. sol. f. morsuli: irro-  
randi cum  $\frac{1}{2}$ o destillato succini. S.

**Brust-Morsellen.**

Vel fiat pulvis temperans seu incrassans:

℞. Rad. ireos Fl.  $\frac{3}{4}$ ij.  
flor.  $\frac{1}{2}$ is  $\frac{3}{4}$ j.  
 $\frac{1}{2}$ o destillas. anis.  $\frac{3}{4}$ j. ad  $\frac{3}{4}$ ℔.  
fœnicul. gutt. xv.

sacch. ops.  $\frac{3}{4}$ ij.

M. F. S.

**Brust-Pulver.**

Dosis  $\frac{3}{4}$ j. detur bis in die, & convenit, si  
lætio est in pectore. Vel

℞. Spec. diatreos usit.  $\frac{3}{4}$ j.  
flor.  $\frac{1}{2}$ is  $\frac{3}{4}$ ℔.  
laud. opiat. gr. iij.

M. f. p. pro tribus dosibus.

D. S.

**Brust-Pulver auff 3. mal.**

Ad tussim difficilem noctu tantum per 4.  
vel 5. horas affligentem cum febre catarrhali  
& coryza, præmissis universalibus ad tempe-  
randum serum acre,

℞. Sperm. ceti. gr. xxiv. vel  $\frac{3}{4}$ ℔.  
laud. opiat. gr. iij.

M. & divid. in 2. part. æqual.

Una pars hora pomeridiana 5. altera pars  
hora 10. vespertina sumebatur, & optime pro-  
fuit.

℞. Sperm. cet.  $\frac{3}{4}$ j.  
succin. prap.  $\frac{3}{4}$ j. vel  $\frac{3}{4}$ ℔.  
myrrh. elect. gr. viij. ad  $\frac{3}{4}$ ℔.  
laud. opiat. gr. iv.

M. f. pulvis.

Dividatur in 3. vel 4. part. æqual.

D. S.

**Temperirende Glus- und Brust-Pulver.**

Capiantur manè & vesperti bihorio ante  
vel post cœnam.

℞. Conserv. rosar.  $\frac{3}{4}$ ij.  
antihect. Pas.  $\frac{3}{4}$ ℔.  
flor.  $\frac{1}{2}$ is  
Spec. diatreos aa.  $\frac{3}{4}$ ij.

c. syr. diacod. f. Electuarium.

D. S.

**Temperirende Glus- und Brust-Pat-  
werge.**

Faciunt huc elæosacchara, maximè ex oleo  
succini, quæ in talibus sunt nobilissima. Sy-  
rupus diacodion Montani, & syrupus scabio-  
se, vel misti, vel cum rob passulæ. subacti.

cum baculo liquiritiæ assumpti, & ita pede-  
rentim deglutiti, etiam hic egregium sunt re-  
medium, omnibus loh incrassantibus & ex-  
pectorantibus præferendi.

Alias ad temperandam lympham salam &  
acidam præprimis opiata ac papaverina, &  
dicta ex spermate ceti & succino conveniunt,  
imprimis gummata mucilaginosæ, qualia sunt  
tragacanthum, item gummi Arabicum: radi-  
ces etiam subdulces, imprimis glycyrrhizæ,  
althææ, helenii, & similes: e g.

℞. Spec. diatræg.  $\frac{3}{4}$ ℔.

p. rad. alth.

liquirit. aa.  $\frac{3}{4}$ j.

laud. opiat. gr. vj.

M. f. pulvis. S.

**Temperirende Brust-Pulver.**

Vel ℞.  $\nabla$  Loh sani & experti  $\frac{3}{4}$ j.

loh sani & experti  $\frac{3}{4}$ ℔.

Spec. diatr. simpl.  $\frac{3}{4}$ ℔.

succin. prapar.  $\frac{3}{4}$ j.

syr. diacod. mont.

de jujuk. aa.  $\frac{3}{4}$ j.

M. D. S.

**Lindernde Brust-Caffi.**

℞.  $\nabla$  fœnic. vel scabios.  $\frac{3}{4}$ ij.

asthmat.  $\frac{3}{4}$ vj.

syr. diacod.  $\frac{3}{4}$ ℔.

M. D. S.

**Lindernde Brust-Träncklein.**

℞.  $\nabla$  flor. papav. err.  $\frac{3}{4}$ j.

syr. papav. simp.

de jujuk. aa.  $\frac{3}{4}$ ℔.

M. pro duabus dosibus: S.

**Lindernde Brust-Caffi auff 2. mal.**

Vesperti unam bihorio ante cœnam, & al-  
teram sub introitum lecti sumendo.

In fine

℞. MP. de succ. Crat. gr. xvj.

extr. agar. gr. viij.

troch. alhand.

scamm. Crat. aa. gr. ij.

c. essens. ligni sassafr. f. pilula. D. S.

**Glus- und Brust-Pillen.**

In tussi sicca chronica, affligente pectus,  
& à lymphæ vicio oriunda, adeoque phthisin  
plus minus minitante, dicta sulphurea balsa-  
mica, noxam eluentia, non sufficiunt, & tus-  
sis fit continua, & postea incipit ejici muco-  
sa materia ex ulcere pulmonum. In tali ca-  
su pro lymphæ correctela optima sunt deco-  
cta lignorum sudorifera, matutino tempore  
usurpanda. Talia præservativa matutina sunt  
decoctum quajaci, imprimis ligni sassafras,  
vel decoctum hujus aut radicis chinæ cum  
passulis, mediantibus quibus & corrigitur  
lymphæ & per sudores evacuato latice morbo-  
so, eosque subinde repetitos & aliquandiu con-  
tinuatos, optimè curantur hæ ipsæ: vid. quæ sa-  
perius dixi de fici. Hæc quantum valeant, vid. Lo-  
tichius obs. 1. 3. c. 10. obs. 1. p. 233. & Pilo de colluv.  
ser. p.



*ser. p. 184.* Vesperi beneficio opiatorum sistatur violentia tussis.

Externè *R. Capit. allii Num. 3.*

c. f. q. pingued. porcin. contundantur in formam unguenti.

D. S.

**Brust-Salblein.**

Hoc vesperi ante lecti ingressum prope ignem plantæ pedum illinantur, quod per tres dies continuandum.

Vel sumatur saltem pinguedo lucii piscis.

Si sit tussis sicca ferina stomachalis, eaque inveterata, curatur præmissio vomitorio, maturè tamen instituta, partim per opiata, partim per temperata, aërem, orificium ejus vellicantem corrigentia: qualia sunt flores  $\Delta$ is, passulæ, & omnia ex passulis, decoctum raparum, liquiritiæ & ejus succus, decoctum heleni unà cum passulis Corinthiacis cum vino Hispanico vel Malvatico paratum: & postmodum saccharum album addatur pro lubitu, & coquatur ad consistentiam aliqualem syrupi.

Pro dosi manè & vesperi detur cochl. j.

Hoc remedium adutorum tussim præmissio vomitorio mirè sedat: in infantibus absque vomitu à Lindano laudatur. Interdum etiam de syrupo diacodii vel pro ratione circumstantiarum essentia opii cuilibet dosi aliquantulum addi potest. Vel

*R. R. compof. 3ij.*

*~Θ \*ci anis. vel alius vol. & si aromat. 3j. Ess. opii 3ß.*

M. D. S.

**Hust-und Brust-Slyrr.**

Dosis 40 gutt. manè, à meridie, & sub introitu lecti, in quocunque vehiculo, expectando sudorem.

Addatur his decoctum raparum, quod certè est egregium remedium, sive rapum sit recens vel exsiccatum, & in tussi sicca omni, vel catarrhali vel pectorali vel stomachali nobilè.

Pertinet huc euporiston: scil. passulæ aut ficus cum spiritu vini combusti vesperi in tussi ferina sicca, ex stomachi vitio cum tussi, superveniente alperitate faucium, phlogosi, vel tædine cum tussi catarrhali & chronica.

Porro convenit glyzyrrhiza, ejusque succus, nec non electuarium heleni cum melle, accetera suprà in tussi sicca laudata. Sic facit huc euporiston Amati Lusitani c. 6. *curat. 90.*

Videatur etiam Rulandus loco citato, qui viro annorum 40. tussi vehementissima & asthmate afflicto pulverem hunc præscripsit. Benzoë sanè rectè vocatur balsamus pectoris, & in morbis aliis pectus affligentibus reverà est egregium remedium; unde essentia croci atque essentia succini mista, in tussi ex pectore affecto orta, erit egregia.

Tom. II.

Vel *R. Pulpa passul. min. 3iß.*

*flor.  $\Delta$ is 3ß.*

c. f. q. *syrr. papav. simpl. F. Electuarium.*

D. S.

**Brust-Katwerge.**

Capiatur pro lubitu.

Loco florum  $\Delta$ is communium quidam commendant flores sulphuris saccharatos.

Quidam omnes tusses curavit per pomum excavatum melle rosaceo impletum, supra prunas positum, & ita sub noctem devoratum. Sed tussis hæc ferina, modò præmissus fuerit vomitus, ut plurimum sponte evanescere solet, tantillis temperatis postea assumtis.

In genere tussis humida ferè ut asthma humidum curatur: Tussis autem sicca simili ferè ratione atque affectus catarrhales levatur.

Superest tussis nervorum seu convulsiva, quæ curatur ut aliæ convulsiones epilepticæ, & imprimis præmissis universalibus per  $\Theta$ ia volatilia & succinata, quæ inter liquor C. C. succinatus est egregius: unde etiam Dn. Boyle in Philos. experimentalis in tussi quacunque, etiam inveterata, sola solet commendare  $\Theta$ ia volatilia, v. g.  $\sim$ um &  $\Theta$ ia, item,  $\sim$ m C. C. aut  $\Theta$  C. C. tanquam singularissima & expertissima.

Cum fauces sint subinde læsæ, & à lymphâ acriori plus minus excoctæ, rubentes, & quodammodo inflammatae, ob id acrimoniâ blandè temperantia & incrassantia dicta, item dulcia plus minus fauces lubricantia & lenientia, conveniunt. Sunt autem talia passulata, succus glyzyrrhizæ, syrupus violarum, rosarum, de jujubis, tussilaginis, scabiosæ, liquiritiæ: item syr. diacod. Montani cum syrupo scabiosæ mistus, & cum baculo liquiritiæ gustatus, subinde lambendo deglutitus. Elæosacchari linctus, rotulæ supra dictæ & similia ex remediis supra recensitis parata:

*R. Syr. diacod. Mont. 3vj.*

*mell. passul. 3ij.*

*extract. liquirit. 3j.*

diluantur cum pauca  $\nabla$  scabios. in consistentiam Loh.

D. S.

**Hust-und Brust-Safft.**

Vel interdum glyzyrrhiza recens continuè maceratur; sic enim oblinuntur fauces & lubricantur.

Pertinet huc liquor seu oleum sacchari ex saccharo & V, uti habet Hartmannus:

Convenit maximè, si tussis affligit ex squalore  $\Delta$ is sicci vel squalidi, & inde orta raucedine. Riverius facit oleum sacchari compositum, dum Vm imprægnat appropriatis pectoralibus. Loco hujus olei sacchari sunt qui recipiunt ovum ad duritiem coctum & exempto vitello albumen induratum saccharo replent, ita nonnihil perforant & in cellam suspendunt, & ita fit oleum sacchari, quod arbitror

(Gg 2)

bitror

bitror non esse inconueniens. Rhumelius in *Herm. p. 137.* saccharum Canarium laudat.

Potest etiam externè aliquid plantis pedum addi, scilicet ante lectum lucii piscis pinguedo, vini spiritus, spiritus menthæ & similes.

Fit interdum, ut cum tussi conjuncta sit hæmoptysis seu sputum sanguinis: in tali casu Forestus commendat syrupum myrtillorum *L. 6. obs. 20. in Scholio*, imprimis si cum decocto pallularum, cum spica aromatizzato, assumatur.

## ARTICULUS IV.

De

### Catarrho Suffocativo.

**A**ffectus ex hæcenus dictis, nempe ex asthma, præsertim sicco, tussi, & rauedine complicatus, diversimodè tamen, ita ut nunc hoc, nunc illud symptoma observari videatur, isque vel subito irruens, vel ex improvise exasperatus, nunc continuus, nunc remittens, & vel periodicè vel incertis intervallis repetens, & quidem suffocationis periculum plus minus inferens, cum stertore, materiz vel paucæ vel nullius rejectione, catarrhus suffocativus *ein Stöckflusß* vulgò dicitur, adeò ut vulgus in genere quancunque respirationem subito difficiliorem redditam & suffocationem minitantem, in specie si cum tussi conjuncta fuerit, nomine catarrhi suffocativi appellare soleat. Hinc fit, ut asthma occulta interdum recurrentia, item asthma humorosa, imprimis vesperi graviter affligentia, sub hunc censum veniant & confundantur; item tusses ferinæ, in specie nocturnæ, gravius affligentes, imprimis cum excretionem copiosiore facta conjunctæ, huc à quibusdam trahantur. Catarrhus tunc dicitur à præconcepta opinione, quasi subito, ex cerebro præsertim, fluat humor serosus plus minus pituitosus, qui bronchia & pulmones replens suffocationis periculum intendat. Sed paucis rem explicat Lindanus *in col. leg. manuscr. super Hartmann. Prax. Chymiatr.* dicendo: *Maxima de nihilo nascitur historia, nil obscurius hæc de catarrho suffocativo doctrinâ: Nam ipsa anatome eam ostendit falsissimam, & quomodo materia vel pituitosa vel serosa, à capite potius in pulmonem, per rimam aspera arteria, & epiglottidem obstantem, transibit, quàm per œsophagum, &c.* Alii igitur verè cautiore per venas à capite deferri tales humores, hinc deponi in pulmones, replere hos & asperam arteriam, & suffocationem ita inferre putant. Sed ridiculas has de catarrhis suffocativis hypothesen non solum discutit & refutat Helmontius *Tract. Catarrhi Deliramenta*; sed &

Vincentius Baronius *Tr. de Pleuropneumonia*; & Schneiderus *de Catarrh. l. 3. cap. 4. p. 276. & 296.*

Uti præ ergo monui, complicatus affectus est, qui vulgo suffocativi catarrhi nomine venit. Unde in vulgi judicio & præconceptis hypothelibus, per ignorantes Medicos confirmatis, hic non inhærendum; propterea triplicem catarrhi suffocativi putatitii, asthma convulsivo contradistincti, differentiam facio, prout in praxi observare eam mihi contigit.

I. Est catarrhus suffocativus ex pulmonibus affectis, ex hostili acido inspirato, vel intus genito, illis profundius se insinuante, irritatis, hinc proprias fibras fortius se stringentibus; unde suffocationis imminet necessitas, non prius cessans, donec lymphæ uberiores irrigatione irritans illud præternaturale, & ex eorum mutuo coalitu concretum mucosum factum, ablutum & abstersum fuerit, cujus expectoratione morbus solvitur. Remanet tamen subinde vestigium in illis fibris, ita ut levi occasione renovatum spasmus & spirituum occlusionem minentur.

Pertinere huc videtur infantum quorundam plus minus robustorum catarrhus suffocativus cum epilepsiæ metu junctus, dum v.g. simpliciter creberrima thoracis systole & diastole cum levi vel nulla tussi continuo suffocari videntur; idque ipsum etiam evenit subinde ita, ut tali spasmodicâ affectione pulmones constringi & thorax coarctari ita videatur, ut & respiratio libera impediatur, & sanguinis per pulmones circulus impediatur: hinc facies eorum rubicunda esse, & præcedere talem affectum per aliquot dies vel raucedo levis vel tussicula solet. Conf. Hildanuse. *3. observ. 10. & cent. 2. obs. 66.* item Schenkus *in obs. pag. 149.*

### C U R A.

Uti itaque talem affectum in adultis opiata & attemperantia, vulgò incrassantia dicta, optimè levant, etiam patoxysmos; ita & talibus infantibus thoracica, item sperma ceti, &c. in vehiculo calido propinata, observantur proficua: cum e contra asthma humida, item tusses humorales, præsertim ex stomacho in infantibus non rari, imprimis per nicotianam, item per blanda emetica, curari debeant.

II. & III. Differentia catarrhi suffocativi vera est catarrhus laryngis,

Ad bronchum pertinens; quando subito respiratio difficilis redditur cum adjuncta sensibili laryngis irritatione, indeque superveniente tussi, eaque satis violenta, cum ex screatu in principio paucio, progressu & in fine copioso, semper tamen cum levamine. Quæ in prin-

principio paroxyfmi ejiciuntur, ferè sunt tenuia, pauca & serola, quæ in progressu fiunt crassa, viscida & copiosa, quæ dicuntur cocta: auditur interdum stertor & sonitus, interdum raucedo adest, aut præcedit, aut sequitur, vesperi & noctu plerumque affligit; dum enim dorso incumbunt patientes, exasperatur: præcedit interdum dolor capitis & partium colli vicinarum, &c.

Ex dictis elicitur: Catarrhum hunc suffocativum propriè loquendo esse affectionem laryngis, in quo hæc & caput asperæ arteriæ, in specie epiglottis, afficitur primariò; hujus enim & epiglottidis & laryngis irritatio, & hanc semper insequens pertinacior strictura ceu clausura, omne id præstat, quod aliàs Catarrhus suffocativus dicitur; ita, ut catarrhi suffocativi formale in arcta & stricta clausura laryngis, ob irritationem hujus, consistat. Jam vero, si in ipsa larynge hæreat malum, & sic erit affectus simillimus broncho cum raucedines siue supra aut extra laryngem, saltim in ambitu aut superficie epiglottidi incumbat causa peccans, eritque tunc catarrhus suffocativus, qui pertinet ad catarrhum membranæ pituitariæ posterioris Schneideri. Nempe notum est, si tantum aquæ aut cerevisiæ guttula aut mica saltim panis sub inspiratione laryngem ingreditur, quod hanc admodum sensilem irritando mox faciat ejus convulsionem seu pertinacem ab epiglottide occlusionem & suffocationem; nisi impetuosior tussis mox insequens illata denuò eliminat: & quò diutius sit ista irritatio, eò plus pituitæ postmodum excernitur. Unde ex quacunque causa interna, si similis fiat in faucibus irritatio, tunc similis subitò imminet tussis, strictura vel suffocatio, & similia pathemata.

*. C A U S A E.*

Causa ergo irritans, quæ infert hujusmodi subitaneum pathema, est respectu laryngis vel interna vel externa. Interna ut plurimum est affectus feri vel lymphæ acrioris, nunc salioris, nunc in specie acidioris ad bronchum delatæ, & tunc ticillatio adest ob acrimoniam lymphæ acidioris ad laryngis interiora latæ, quæ defertur ob læsionem à causa externa, ab inclementia aëris introducta, tuncque pars læsa plorat copiosam lympham, nunc saliam, nunc acidam, estque sic catarrhus suffocativus nihil aliud, quam quasi raucedo subitanea, hinc irritatur larynx, stringitur epiglottis; unde metus suffocationis subitaneus. Periodicè hoc fit interdum, singulis noctibus repetens: quale exemplum appositè huc facit, quod habet Riverius *c. 3. observ. 15.* Hæc, nempe causa externa, talem catarrhum suffocativum inferens, est imprimis lymphæ vi-

scidior, glutinosior & copiosior cujuscunque saporis, ex membrana pituitaria posteriore & inferiore ad fauces copiosius delata, & subitò inviscans quasi laryngem, & epiglottidis liberum motum impediens; unde mox suffocatio imminens, tussis, & copiosus materiæ viscidæ screatus cum sensu læsionis in faucibus: estque affectus reverà catarrhalis, nempe vitio membranæ pituitariæ posterioris, & ejusdem est naturæ cum asthmate humido, cum tussis chronica, imprimis stomachali. Exasperatur hic affectus subinde vesperi & noctu, & frequenter per se subitò ex prægressa causa externa, imprimis ab aëre inclementiore aut maligno, aut variis effluviis spirituum acidorum mineralium imprægnato, facta alteratione, vel ex tussis diuturna & chronica oritur, uti patet in exemplo Hildanic. *6. obs. 8.* Subolevit hoc Platerus, unde catarrhum suffocativum angustiam intra fauces ait, & catarrhum non ad pulmones, sed ad fauces delabi animadvertit *l. 1. obs. 185.*

*C U R A.*

Catarrhus suffocativus à causa externa curatur eodem modo ac raucedo recens seu tussis nocturna sicca, v. g. per vomitoria, & post per opiata ac similia alia temperata, incrassantia dicta, i. e. lympham acrem, in specie acidam, temperantia, vel si minus in principio conveniunt vomitoria, præmissis clymate per sudorifera blanda lymphæ motum & materiam corrigentia, hinc per opiata irritationem faucium tollentia & sistentia.

*℞. ▽ Scabios. ʒiij.  
asthmat. ʒvj.  
~ ♂ \* ci anisat. ʒj.  
syr. papav. alb. ʒj. vel hujus loco  
diacod. Mont. ʒiB.  
D. S.*

*Ruffi-Träncklein.*

*℞. ▽ Menth.  
scabios.  
serpill. āā ʒj.  
asthmat. ʒvj.  
~ ♂ \* ci anis. ʒj.  
flor. Δis ʒB.  
syr. diacod. Mont. ʒj. M.  
℞. Essent. catarrhal. ʒiij. vel ʒij.  
~ ♂ \* ci anis. ʒj.  
M. S.*

*Ruffi-und-Flug-Essenz.*

Si asperior fuerit mistura propter spiritum salis ammoniaci, omitti potest.

Si malum est à causa externa, curatur ut asthma humorosum, vel tussis chronica, imprimis stomachalis, nempe per vomitum, & deinde per attenuantia, & mucum visci.



viscidum incidentia, & consequenter insignem sreatum & rejectionem causantia, vulgò expectorantia dicta.

℞. *hyssop.*

*mentha.*

*nicotian.* aa. ʒj.

*asthmas.* ʒvj.

*oxymel. squillit.* ʒʒ.

*syr. nicotian.* ʒvj. ad ʒj.

M. f. Potio: S.

Resolvend *Puffi-Träncklein.*

Capiatur cochleatim.

Ex dictis patet: Opiata & his cognata anodyna, & hinc attemperantia, aliàs incrassantia, in paroxysmo & sistendo & præcavendo primatum obtinere, etiam ex vulgata aliqua hypothesi: cum enim non, nisi ex humoribus, motu & hinc loco peccantibus, oriri soleant pathemata talia, humores verò locali motu nullo ferantur in corpore, nisi beneficio spirituum animalium, mediantibus fibris illos moventium; à spiritibus autem p. n. moveri non soleant, nisi hi promoveantur ab objecto molesto vel præternaturali, hoc est, nisi pars quædam sensibilis irritetur; manifestum evadit, quod ea, quæ irritationis sensum tollunt, & spirituum impetum sopiunt, etiam præternaturales humorum motus refrænare, & partium inchoatos spasmos curare valeant: in quo puncto primatum ducunt anodyna, ut clarum est. Quid ergò clysteres prosunt, in talibus catarrhis suffocativis supposititiis usitatissimi, iique acriores? Res clara est, quod nil valeant, per accidens saltem, primas vias evacuando, & sanguinis & abdominis viscera in motum concitando, & utroque modo pectoris angustiam nonnihil sublevando, saltem ex indirecto prodesse. Quid V. S. ad quam, tanquam ad sacram anchoram, mox confugiunt? Per se nihil prodest, nisi in graviore paroxysmo, & ubi pulmonum reciproco motu plus minus impedito metus sit, ne gravior circa pulmones sanguinis stagnatio superveniat, pro liberiori sanguinis circulo conciliando hæc interdum instituenda veniat.

Ulterius capiti, nuchæ & vertici balsama, emplastra, cataplasmata, suspensoria dicta, ex mastiche, succino, racamahaca, caranna, elemi & similibus aliis imponuntur: item ex fermento, ex ovis ad duritiem coctis ac similibus pro suspendendo catarrho defluente. Sed conatu sanè inani & ridiculo vexantur ægri sine fructu, cum in capite non sit mali radix: item vesicatoria cervici, scapulæ & similibus locis pro scopo diversorio applicantur, malè itidem, nisi interdum per accidens, ubi asthmatis convulsivi quidpiam adest, in quo casu vesicatoria brachiis applicari possunt.

His IV. loco affectus peculiaris annumerandus venit, & qui modernis, antiquatam istam de feri catarrhalis ex capite defluxu sententiam recipientibus, catarrhi suffocativi nomine venit, estque ille catarrhus suffocativus vitio sanguinis, de quo eruditè tractat Vincentius Baronius *loco allegato*, & Schneiderus *l. 5. de catarrhis c. 4.* ubi de catarrho suffocativo, qui omnes, & cum iis Lindanus, rectè dicunt: catarrhum subito suffocantem aut suffocationem minitantem nil aliud esse, quàm sanguinis quacunque ex ratione in pulmonibus stagnationem, seu quod oriatur ex impedito sanguinis in pulmonibus circulo; dum nempe sanguis copiosius ex dextro cordis ventriculo in pulmones effusus non promoveatur ulterius, sed in pulmonibus stagnet; quæ sanguinis stagnatio non tantùm est origo hujus affectus, sed peripneumonix pariter ac pleuritis; unde etiam quidam sanguinis *stasis* appellant.

Sanguinis hæc *stasis* accidit tam in syncope cardiaca, Veteribus dicto affectu, quàm in syncope ordinaria graviore, in qua tamen deficit movens spiritus. Plerumque ergò, qui hanc syncopen cardiacam ignorant, ad catarrhum imaginarium suffocativum delabuntur. De hac syncope cardiaca, Veteribus sic dicta, imprimè in lectione illorum versatus Casparus Hoffmannus nonnulla refert in *Instit. Med. l. 3. c. 50.* esse eam, cum, cerebro nihil passo, sanguis ad cor tam vehementer adfluit, ut omnis spiritui via ad cerebrum intercludatur. Hinc, infert, non omnes, qui subito moriuntur, apoplexia mori, & sæpius causam frustrà ab anatomicis quæri in capite, cum sit in thorace; ita, ut hic catarrhus suffocativus & syncope cardiaca sint unum idemque, oriantur ex sanguinis impedito motu circa cor in pulmones. Hinc ex his fundamentis Schneiderus *l. 4. p. 297.* definit catarrhum suffocativum, quod sit ille catarrhus, in quo sanguis plerumque copiosus, tum de venæ cavæ trunco ascendente, tum maxime descendente in cor, & hinc in pulmones confertim & celeriter fluit, nec non & interdum in musculos thoracis. Quemadmodum enim in apoplexia imminente sanguis arteriarum, nempe carotidum, in cerebro; ita in imminente catarrho suffocativo sanguis venarum in pulmonibus, tam supernè quàm infernè, cum impetu ac violentia movetur, ac ibidem subsistit. Conf. Wepferus *Tract. de loco affectu in Apoplexia p. 163. & 202.* item Schenckius in *obs. p. 278.* ubi prolixius disseritur de syncope cardiaca, in qua concreto in venis sanguine ægri subito moriuntur. Similes nempe, quoad externam faciem, affectus sunt apoplexia & catarrhus suffocativus, ita ut hi affectus

affectus subito confundantur, aut etiam simul in ægris adsint. Nam ut in catarrho suffocativo sit sanguinis stagnatio in pulmonibus; ita in iis similiter, qui apoplexia moriuntur, tandem similis sanguinis in pulmonibus supervenit stagnatio. Hinc in apoplexia mortuis vasa pulmonum distenta & rupta interdum, ex sanguinis impedito motu, in præcordiis reperiuntur, referente hoc non tantummodo Fracassato in *Epist. de cerebro ad Malpighium*, sed etiam Cornelius Celsus in *Prognosis*. inquit: quod ii, qui moriuntur apoplexia, eodem modo intereant atque strangulati, quod admodum appositè dicitur. Nam in strangulatis laqueo injecto collo subito perit sensus & motus, ex impedito sanguinis in carotides motu, & succedente respirationis abolitione.

Est itaque catarrhus talis affectus ad peripneumonias suo modo accedens. Hujus exemplum videtur repræsentare mulier illa catarrho suffocante interempta, quam refert Platerus l. 1. p. 187. Quin etiam illustrat id exemplum canis, cui olim per chirurgiam infusoriam 3j. spiritus sulphuris per campanam in aqua diluti fuit in venam cruralem infusa, unde canis post hujus injectionem per semihorulam, & successivè admodum anxie respirabat, sensimque difficilius, ita, ut tali catarrho suffocativo tandem moreretur; antequam suffocaretur, & etiam post mortem copiosissima spuma ex ore & naribus effluxit; imò factâ apertione thoracis totum pulmonum parenchyma, omnia vasa asperæ arteriæ, totus ejus truncus, fauces, nares & guttur erant infarcta hac spuma quasi viscida: bullæ extractæ & asservatæ in tabula tandem abierunt in liquorem rubicundum, serosum, loturæ carnum similem. Factâ ulteriori inquisitione, pulmones erant repleti sanguine nigricante & crassiusculo, ita, ut hic canis exactissimè manifestarit tragediam catarrhi suffocativi: nam ab acido sulphuris coagulatus sanguis subsistit, unde ab aëre violentius inspirato crebriori sui respiratione & sanguinis hic factâ concussione, mutatus fuit in spumam, quæ replevit has partes:

Spuma ergo in iis, qui laborant catarrho suffocativo, & quæ tandem supervenit apoplexia graviore affectis, etiam ex pulmonibus esse videtur; Mucus verò & materia viscida non sub forma catarrhi à capite refluit, sed est ex larynge. Fit nempe spuma ex sanguine in pulmonum valis stagnante ab aëre reciproco motu impetuosius hausto, crebriori respiratione non nihil rarefacto & attenuato & ita in spumam resoluta; sicut cerevisia agitata in spumam abit, quâ ipsâ spumâ repletâ aspera

arteria malum potius exasperat, quàm levat. Ubital signum apparet, rectè signum lethale censetur, & rarò, si spuma illa adsit in malis peracutis, evadunt; hinc rectè dicit Hippocrates in *Aphor. allegato*: Quibus strangulatus spuma circa os apparet, ii intereunt.

Quod attinet mucum, qui in tali casu ejicitur, illum dixi ex larynge, & reverà nil aliud est, quàm lympa paulò viscidior, ex larynge tunc uberius emulsa, & in tantis angustiis mediante crebriori respiratione cum aëre elevata.

Inter causas remotas, quæ tali stagnationi & coagulationi aut uberiori influxui in præcordiis seu pulmonibus, hinc catarrho suffocativo, occasionem suggerunt, à Schneidero l. c. allegantur variae; præsertim aëris observandum vitium, ratione cujus & epidemicum ac malignum hunc catarrhum interdum esse, pluribus deducit: Nec ultima est, quod post nimium exercitium aut motum concalfacto insigniter corpore, adeoque sanguine attenuato, subito ingurgitatur haustus aquæ frigida, à qua repentinam incurrunt suffocationem: propterea quoniam in exercitio & motu sanguis attenuatus & rarefactus rapidè acceleriter circulatur & æstuat; à subito verò aquæ frigida potu ingurgitato sanguis subito ad sui coagulationem disponitur, hincque stagnando in pulmonibus & præcordiis facile suffocationis periculum infert: Id quod patet, quia à tali causa non rarò fiunt pleuritides, unde suffocationis periculum. Exemplum tale curiosum habuit aliquando Dn. D. Michaëlis in coquo, qui cum diutius ac vehementius circa focum & ignem incaluisse coquendo, à foco abscedens subito copiosam & frigidissimam cerevisiam hausit, unde in tantam spirituum angustiam, & præsentaneum suffocationis periculum incidit ex coagulo sanguinis: Curavit tamen hunc coquum beneficio succi florum bellidis rubra recenter expressi.

Sed propinquiore causa talis catarrhi suffocativi sunt quadruplices:

- I. Sanguis nimis abundans & turgescens, qui propter rarefactionem & uberiores in pulmonibus majus spatium occupat, adeoque tardius circulatur, tandem verè stagnat.
- II. Est sanguis paulò viscidior seu pituitosus, hoc est, chylocrudior imprægnatus, ad motum tardior, adeoque stagnationi aptior: quo pertinet observatio Riverii r. 1. obs. 82. de suffocatione ex materia viscida pituitosa, in dextra cordis auricula reper-

reperta. Conferatur observatio parallela in Mayovvii *Tract. de Motu musculorum* p. 99.

III. Est sanguis ab acido vitioso aut aëre nimis frigido post æstum subito inspirato, aut denique quacunque alia ratione coagulatus & inspissatus, qui uti peripneumoniam & pleuritidem, ita quoque talem suffocationem infert.

### DIAGNOSIS.

Catarrhus hic suffocativus in specie cognoscitur ex dolore pectoris gravativo, difficultate respirationis, voce ferè intercepta, periculo suffocationis, anxietate ægri, interdum tussi, quando simul vasa laryngis lympham uberius effundunt, pulsu tardiore & rariore ex tarda circulatione sanguinis, & quodammodo formicante seu vermiculante. Nonnunquam membrana pituitaria Schneidero dicta, quæ obducit subjecta corpora glandulosa, plures humores rejicit, quos scretu & sternutatione rejicere solemus.

Coincidunt ferè hæc ipsa cum apoplexiæ signis, nisi quod in hac suffocatione ægri ægerimè spirent; in apoplexia verò liberiori, abolitis tantum actionibus animalibus cæteris; nihilominus plus minus respirant, arteriæ pulsant, utut pulsus sit durus, nec ea spirandi difficultate vexantur: in apoplexia torti verò vix vitæ ullum manifestum adest iudicium, neque deficientis aut exinde malè habentis respirationis adsunt signa: sicut & pulsus subinde frequens & vegetus percipi solet; in syncope verò communis pulsus est ferè nullus.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: res est clara, periculo esse plenissimum hunc affectum; strangulatio enim cum spuma maximè est infesta, uti dicit Hippocrates. In morbis autem acutis omnino jugulat: propterea maturanda est cura.

### CURA.

Totus scopus in curando catarrho suffocativo seu syncope cardiaca est, ut promoveatur sanguis stagnans per pulmones: id quod fit vel imminuendo ejus quantitatem, vel resolvendo remediis internis ejusdem coagulationem, & denique blando sudore eundem attenuando, & fluidiorem perficiendo, sicque liberiores ipsi motum promovendo. Adeoque ex remediis primò se offert V. S. in catarrho suffocativo ut plurimum necessaria, in brachio quantocius instituta, & pro conditione subjecti satis larga: Nam occasio est præceps, & nil citius ac potentiùs sanguinis circularem motum immutare, eundemque accelerare, & stagnationem impedire potest,

quàm hæc ipsa. Hinc etiam cucurbitulæ cum scarificatione hinc inde affigendæ. Obiter moneo hîc, quod vulgò clysteres infundi, sternutatoria & gargarismata, item bechica, linctus adhiberi; frictiones brachiorum & pedum, ligaturæ fortes, &c. institui, atque emplastra & cataplasmata capiti, quoniam à pituita ex capite descendente ortum duxisse credunt, applicari solent: sed hæc certè, ut rectè dicit Lindanus, sunt lusus sciolarum mulierum, anilia inventa ac inania omnia, à Medico rationali non imitanda; quia sæpè feliciter tunc moriuntur ægri; subinde tamen ante aut post V. S. clyisma acius proluenda alvo injectum, non est inconveniens. Vomitoria, quæ hîc à quibusdam insigniter laudantur, pariter sunt inepta, ipseque dubitans Riverius inquit: In vehementi catarrho vix confert vomitorium; & Freitagi in *Aurora Medicorum* dicit: In catarrho graviore esse periculosa vomitoria. Interna remedia sunt aquæ asthmaticæ ac pectorales dictæ spirituosæ, imprimis temperatis & anodynis mixtæ mitioribus. Præ cæteris optimè hic convenit sperma ceti, dosi à ʒβ. ad ʒj. in ∇ hyssopi cum pauca ∇ asthmatica Rudolphi, vel cerevisia calida aut alio vehiculo calido propinatum, quod in deplorato catarrho suffocativo pro sanguine congrumato denudò resolvendo fluxilemque reddendo est nobile, & ab omnibus Medicis laudatum remedium, ad quod tanquam ad sacram anchoram confugiunt: vid. Schenkii, Ranchinus & Schmuck *Th. 2. Secret. Med.* 15. Mirabilia enim facit, cum probè tectus sit æger: Etiam in catharro suffocativo infantum exquisitissimum remedium D. Petri à Castro dicitur, ad pisi magnitudinem, vel anniculo ad ʒβ. in lacte materno dissolutum, propinatum; unde etiam est singulare vulnerarium, ubi est sanguis coagulatus.

ʒ. ∇ Hyssop. ʒj.  
sperm. ceti ʒij.  
ʒjr. de hyssop. ʒβ. ad ʒvj.  
M. D. S.

*Zertheilend Luffi: Träncklein auff animal.*

Potio hæc propinetur pro una dosi, quæ admodum dissolvit sanguinem congrumatum.

Probè etiam convenit mixtura ex lapillis cancrorum cum aceto destillato parata expectando sudorem, quæ promovet liberum sanguinis circulum: item Θia volatilia sanguinem solventia & per sudorem blandum ventilantia, v. g. ʒ diaphoreticum cum Θe volatili C. C. succini; vel ~ C. C. essentifatus, item liquor C. C. succinatus à gutt. xx. ad xxx. Unde conducunt etiam remedia & mixturæ à Sylvio præscriptæ l. 1. *Idea Prax.* c. 20. §. 24.

p. 280.



p. 280. seqq. Quibus addantur cherefolium, scabiosa, bellis minor, veronica & similia. item omnia ferè vulneraria sunt egregia in hoc catarrho suffocativo, propterea, quoniam instar alcalicorum solent absorbere acidum coagulans sanguinem, ac omnia remedia, quæ aliàs in casu ab alto usurpari solent, promovendo simul, quantum possibile, sudorem; quin &, ubi mucilago viscida hæret in stomacho, aut tussis & materiæ per laryngem transsudantis superveniat rejectio declinante paroxysmo. Commodè etiam expectorantia usurpari possunt, inter quæ raphanus, & ex hoc expressus succus cum paucis saccharo, vel alia inde medicamenta parata egregiè conveniunt in hoc casu.

In Melichii *Dispensatorio* p. 168. laudatur semen nasturtii, radix ari, & succus ejus ☉ volatili acri prægnans insigniter convenit: vel +, in quo macerata fuit eadem, commendat Helmontius contra casum ab alto in congruato sanguine resolvendo. In vulgari usu sunt oxymel squilliticum: it. acetum squilliticum, quæ tamen minus sunt potentia; gum-

mi \*cum itidem valdè convenit, si dissolvatur in paucis +ti, & propinetur in ∇ hyssopi unde spiritus gummi \*ci cum ærugine paratus etiam cæteris paribus est egregius.

ix. ∇ Hyssopi

scabios. aa ʒj.

succi ari ʒʒ. vel + infus. rad. ari. ʒvj.

~ gum. \*ci c. ⊕ ʒij.

syrup. nicot. ʒj.

M. f. potio, subinde cochleatim usurpanda.

D. S.

Resolvirend Träncklein.

Zechius etiam in suis *Consult.* & Mercurialis commendat in catarrho suffocativo gummi \*cum, si propinetur cum oxymelle simplici, idque felici, uti dicunt, cum successu. Nota est etiam Potio Brunneri ex gummi ammon. ad ʒj. in ∇ hyssopi & vino Rhenano. His etiam aqua asthmatica Rudolphi, permisceri potest. His remediis commodè etiam adduntur ex croco parata medicamenta. Et certè, uti crocus est anima pulmonum, ita sanguinem fluxilem ac tenuem facit: ut taceam vires insigniter resectivas in croco, &c.

## SECTIO XV.

DE

### CHYLI IN SANGUINEM TRANSMUTATIONE, SANGUINISQUE FERMENTATIONE LÆSA.



Anguificatio læditur partim vitio chyli, partim vitio sanguinis. Vitio chyli læditur:

1. Dum non sufficienter digeritur & attenuatur, nec debitè volatilisatur in stomacho.
2. Quando non ritè tingitur à bile, ejusque sulphure oleoso.
3. Quando non ritè secernitur à scoriis beneficio succorum, fellei & pancreatici.

Massæ sanguineæ vitio: quando ipsa massa sanguinea deficit à naturali ac debita crasi seminali, unicuique individuo propria ac peculiari. Nam certum est unumquemque hominem singularem ac sibi peculiarem obtinere massam sanguineam, quæ proprietates & singularis crasis ex particularum seu principiorum naturalium componentium varietate & crasi resultat: unde tam multæ syncrasis, idiosyncrasis & proprietates emanant. Dependet hæc crasis massæ sanguineæ formaliter à particularum seu principiorum naturalium massam sanguineam componentium ad se invicem habitudine; radicaliter verò & effectivè à parentibus, à quibus sub conce-

Tom. II.

ptione & prima corporis formatione, ratione spiritus genitalis, in fœtum transplantatur. Uti enim dispositio morbosa & crasis vitiosa communicatur à parentibus; ita simili ratione craseos naturalis fundamentum etiam ex semine ejusque spiritu vitali petendum.

Vitiata ergò sanguinis crasi, & salium debitâ alteratâ proportionem, vitiatur etiam & depravatur naturalis ac vitalis sanguinis fermentatio, &c. vitiatur chyli assimilatio, ac denique vitiosi succi massam sanguineam inquinant. Fermentatio hæc læditur ac vitiatur multis modis, in genere nunc

1. Cum quodam excessu, vel periculosa quadam effervescencia: id quod deprehenditur in pulsu magno, celeri & frequente, cum insigni ut plurimum corporis incalescentia & ardore, ut imprimis in morbis acutis aut febribus ardentibus, pleuritide & similibus obvium est.
2. Cum quodam defectu, unde pulsus parvi, rari & tardi percipiuntur: Corpori debitus deficit calor, totum corpus est torpidum & segne, & insignis spiri-

(Hb)

spiri-

spirituum percipitur defectus; id quod in chronicis morbis, cachexiis, & similibus apparet.

3. Variis modis depravatur, quare pulsus tantum non in his mutatur, ut sit in scorbuto, malo hypochondriaco inveterato, paroxysmis febrium intermittentium, passionum hystericarum & similibus; in quibus multiplices pulsuum inæqualitates percipiuntur.

Pro varietate ergo istarum in fermentatione massæ sanguineæ differentiarum quamplurimæ sensiles corporis mutationes oriri solent; unde corpus nunc calet, nunc friget, nunc pallet, nunc rubet; alvus nunc est clausa, nunc laxa; & similia symptomata, quæ hypochondriacos & scorbuticos in horas fatigant.

### DIAGNOSIS.

Signa, quibus suô modô proximè cognoscitur fermentatio sanguinis læsa, sunt pulsus & urina: Ille statum sanguinis fermentantis, & exinde intra arterias ebullientis ostendit, de quo vid. Sylvius *l. 1. Præcos c. 26*. Hæc verò statum sanguinis ex dicta fermentatione resultantis declarat. Fallit tamen utrumque interdum. Nam, ut taceam de febribus malignis, pulsus subinde mutatur ratione spirituum animalium cor moventium; hinc enim in animi affectibus insignis est pulsus mutatio, quatenus immediatè hærent in spiritibus animalibus. Urina verò fallit, quia duplex est: nempe urina potus & sanguinis. Jam urina sanguinis licet monstret signa clara sanguinis, tamen ob admistam urinam potus minus alteratur; item propter admista, varia ex læsione partium urinalium enata.

### CAUSA.

Causæ itaque, à quibus viciatur hæc sanguinis fermentatio, sunt omnia ea, quæ efficiunt, ut salia ista, acidum & urinosum, debitam non observent harmoniam vel proportionem, nec cum reliquis particulis texturam. Quomodo verò, & quibus modis sal volatile urinosum seu biliosum, acidum seu melancholicum in corporis animalis succis, & hinc in sanguine alterentur & vitientur, suprà dictum est, ubi fundamenta generalia tradidi: item patent hinc inde in *libr. 1. Præcos* Sylvii.

Inter causas verò, quæ salia afficiendo sanguinis crasin lædunt, eminent varia contagia, quæ ceu tot præternaturalia fermenta massam

sanguineam inquinant, & imprimis omnia extrinsecus hauriuntur, si vè immediatè cum aëre insporentur, si vè mediante certo fomite corpori admoveantur. Miasmata enim fermentando massam sanguineam turbant, in eaque hoc modo se multiplicant; unde postmodum malorum contagia corpus affligunt, & se ulterius propagant. Quibus & viscerum, sanguinis depurationi aut perfectioni inservientium, labe ac neglecta officia accedunt. Ab omnibus his massæ sanguineæ textura ac crasis plus minùs præternaturalis redditur, quia atteruntur salia, quæ exinde novos quasi sapes adsciscunt, & ita fermentationem turbant.

Quoad causas remotas: Fermentatio sanguinis vitiatur, si præcesserint hæmorrhagiæ; unde non ritè peragi potest. Ex labetactis etiam visceribus potest vitiari sanguis, quando illa se legitimè non habent, obstructions ibi & scyrri, aliaque mala adsunt.

Sanguine ergo his modis ita vitiato, aut vitiolis fermentis inquinato, adeoque salium debitâ proportionem corruptâ, non tantum chylus perversè assimilatur; sed præterea quoque totum corpus ac quælibet ejus partes exinde plus minùs inquinantur: qualis namque sanguis, talis etiam est totius corporis habitus vel status, qui sanguis tunc modò est calidior, modò frigidior. Exinde enim omnia ea fiunt, quæ de temperamento partium vitalium eorumque intemperie vulgò dici solent, ut illorum ratione hic ad hunc vel istum morbum inclinet: v. g. dum quidam ratione temperamenti ad morbos melancholicos, chronicos; alius ad affectus acutos febriles dispositus dicitur. De his temperamentis, quæ originem ex elementis deducunt, nihil dico: Nam temperaturæ & intemperiei fundamenta sufficienter sunt destructa.

### CURA.

Quoad curam, quâ massa sanguinea ejusque crasis læsa, & consequenter ejus fermentatio mutata, propter salia à naturali constitutione degenerantia, corrigatur aut emendetur, ea sit per remedia virtute salinâ operantia; in quo negotio imprimis observetur sapor specificus crasin sanguinis plus minus vitians, ut proximè per specificum remedium curari queat. His de remediis *suprà in generalibus* dictum est; & in specie conferri potest Sylvius *l. 1. Præcos c. 18. 19. 25. & 26*.

### CAPUT

## CAPUT I.

De

*Febribus in Genere.*

**A**D vitia sanguificationis læsæ, seu effectus ejusdem, pertinent suo modo febres quæcunque, quarum doctrina maximè necessaria, & tantum non fundamentalis; cùm nullus detur morbus ferè, qui non sit conjunctus cum febre, adeò, ut in proverbium abierit: Vis sine febre mori? Dicitur autem febris à februo. quod à ferveo deducitur, vid. Sennertus *de febribus cap. 2.* Germanicè dicitur *das Fieber*. Quo communior autem morbus, frequentiorque est febris, eò intricatiorem esse ejus theoriã, & consequenter empiricam in plurimis esse praxin, confirmat scriptorum medicorum dissensus; ita, ut ne binos quidem exactè sibi consentientes in hoc puncto inveniatis, ut propterea ab alio in iisdem erudiri potiùs, quàm sententiam meam proferre, aut alios informare vellem. In qua tamen doctrina pertractanda me ita geram, ut propter amplitudinem materiæ non teram tempus refutatione illorum, quæ auctores hinc inde dicunt; sed eã, quã fieri poterit, brevitate, seposito omnium partium studio, quæ nostra sunt, h. e. practica, imprimis considerabimus, pro theoria hypothesein eligendo talem, quæ mihi videtur probabilis, & praxi faciliùs accommodari potest, adeoque præcæteris Medico utilis existit.

Definitur autem febris, quod sit actio fermentationis massæ sanguinæ depravata, in qua totius massæ sanguinæ crasis depravatur; unde toti corpori multa eveniunt incommoda. Dependet autem à fermento quodam naturalibus planè incongruo: Vid. Kergerus *de Fermentatione S. 3. cap. 3. pag. 332.*

Loco generis posita est actio depravata fermentationis massæ sanguinæ, quo sensu febris non referenda inter symptomata; cui vero hoc genus displicuerit, ille definiat febri per morbum intemperiei. Nam quatenus fermenta à naturalibus aliena subintrant in sanguinem, necessum est, ut hæc ipsa massa sanguinea etiam degeneret in alienam à naturali temperiem. Hinc pro diversitate fermenti febrilis varia etiam est massæ sanguinæ dyscrasia.

Inter omnia febri concomitantia symptomata immediatè nullū magis universale existit, quàm pulsus notabilis mutatio; et speciatim febri præsentia ex nullo melius potest cognosci, quàm ex pulsu nimis frequenti præter-

Tom. II.

naturali. Dico autem: pulsus debere esse p. n. frequentem, nunc magis, nunc minùs, magis scilicet in paroxysmis intermittentis: habemus siquidem & pulsus nonnunquam frequentem in junioribus, sicut & præter hunc nonnunquam frequentem post usum vini generosioris, itemque post motum corporis & nimia exercitia observamus. Ubi verò citra manifestam causam pulsus est nimis frequens, à causa interna præternaturali ortus, rectè signum febrium pathognomonicum quarumcunque statuitur; cui postmodum adjuncta symptomata varia certam febrium speciem determinant. Hæc est sententia Sylvi, quam, licet frustra, rejicere conatur Deusingius, in tract. *Disquisitio Anti-Sylviana de signo febrium pathognomonicis*. Accedit ut plurimum celeritas, unde celerem pulsus ceu inseparabile cujusvis febris signum & quod nunquam abesse potest, statuit Pienus *de febribus p. 1. c. 2. pag. 12.* Magnitudinis & vehementiæ ratione variat, quò major, eò melius signum laudabilis & æquabilis sanguinis fermentativæ turgescentiæ ac spiritualescentiæ, vehemens pariter spirituum influentium vigorem insequens, nunquam rejici debet, adeo ut magnus & vehemens pulsus semper animum reddat Medicum, in quocunque febri citans statu fuerit, sicut parvus & debilis non nisi vel periculosa ægri sub constitutione, vel maligna in febre adesse solet, & insignem virium labefactionem junctam habere assolet. Durus interdum observatur in febribus, sed nunquam fausto omine, quin semper tensionem spasmodicam membranarum, in quodam loco plus minus læsarum aut infestatarum, & hinc arteriarum in dilatatione renitentiam, à fibrarum aliquali spasmō sequitur: unde in febribus cum inflammatione partium membranarum junctis, v. g. in pleuritide ordinario observatur, quin & in febribus quibusdam malignis, in quibus ~ animales & genus nervosum magis afficiuntur, in quibus etiam citra sensibilem, de qua conqueri possint ægri, molestiam, pulsus plus minus durus advertitur, pessimo ut plurimum omine, cum deliria, convulsionēs & mortem sæpius insequi observarim, semper bonus est pulsus mollis, generis nervosi minus mutatū habitū, ac spirituum animalium debitum motum ostendens, & ferè cum madore aut levi sudore junctus esse solet: & tali ex pulsu sæpius fausta in febre sperari possunt: unde & pulsus undosus dictus ex magno, vehementi, & molli compositus, ordinarius imminentis sudoris prodromus esse solet in febribus; cùm in pulsu duro vel nullo, vel talem, qui absque euphoria quasi per vim naturæ prodit, sudorem observavi, scilicet & fibras cutaneas in tali casu tendi,

(Hh 2)

poros-



porosque contractiores hinc esse arbitror; nisi pulsus talis insigniorem partis cujusdam inflammationem sequatur, tunc enim sudores proficuis & ut plurimum pulsuum mutationes inferentes eliciuntur. Communiter statuunt Autores: calorem præternaturaliter auctum esse essentiam febrium, eorumque signum proprium, definientes eandem per calorem in corde accensum, & hinc in totum corpus per arterias diffusum. Verùm rectè hoc negat Sylvius, cum dicit: Calorem nimium nullo modo esse de formali ratione febris, quia nec soli, nec omni nec semper feбри conveniat.

Æstus omnis occasionaliter fit ab acido, sanguinis crasin immutante & inde fermentativum ejus motum, hinc spirituum alterationem, & majorem incalescentiam & fervorem inducente; Cum ipsi spiritus, forsan certi volatilis ac subtilis acoris ratione, caloris sensum in animalibus undique diffundant, quod tamen ulteriori considerationi relinquo. Et quidem ex febres, in quibus sanguis simul alteratur, & ad motum insigniorem fermentativum præternaturalem disponitur, intensiore æstu stipata esse solent.

Peccare autem in intensiore corporis æstu, adeoque in febribus, primariò acidum, probatur partim, partim illustratur sequentibus:

1. In vulneribus & ulceribus, & hinc dependentibus febribus symptomaticis, vinum & quælibet acida nocent; quia inflammationem in vulnere & æstum febrilem in corpore intendunt. Quæ omnia præservantur & curantur internè per lapillos cancerorum & similia, & per externa Saturnina, acidum imbibentia. Est enim Saturnus Chirurgorum Patronus, vulnerum & ulcerum pathemata ab acido enata curans; non secus ac caput mortuum Oli vulnerum corruptionem tollit, ut loquitur Helmontius, acidum imbibendo & corrigendo.
2. Pleuritides, angina, & quælibet inflammationes internæ, tam in principio, quàm dum in progressu ad suppurationem tendunt, febrem continuam acutam junctam habent, h. e. æstum continuum intensum. Jam verò morbi hi extra controversiam ab acido originem ducunt, hinc per acidum absorbentia remedia promptissimè curantur, v. g. dentem apri, maxillam lucii piscis, salia volatilia quælibet, stercus equinum, &c.

3. Erysipelaceæ aliæque sponte suâ & à causa interna enatæ inflammationes cum æstu & ardoris manifesto sensu, & non rarò gravi juncta febre cum externo ardoris & ruboris perquàm sensibili indicio, ab acido originem ducunt; hinc præter interna modò dicta simplicia externè conducunt acidum istud absorbentia, v. g. creta, cerussa, & epithemata Saturnina, lac virginis, &c. ablato per hæc in erysipelate acido, juncta febris pariter evanescit.
4. Intermittentes febres ex acida viscida stomachi cruditate originem obtinent, hinc alcalia etiam, tam fixa quàm volatilia, ut sal absinthii & spiritus salis ammoniaci; quàm testacea, ut ostracoderma, & specificum febrile Crollii & Strobelbergeri, quæ illas curant, & paroxysmi fermentum acidum tollunt: in quartanis speciatim Martialia & Saturnina, intensius acidum absorbendo, conveniunt.
5. Febres catarrhales dictæ à lymphæ acrimonia originem ducunt, quæ quò acidior fuerit, eò intensiorem cephalalgiam, ferinam magis tussim, lancements artuum graviores, & speciatim intensiores æstuationes vespertinas & nocturnas & febriles infert; Unde & volatilibus, spiritu salis ammoniaci, imprimis anisato, liquore cornu cervi succinato, optimè curantur, acidam lympham corrigendo, item opiatum vitiatum lymphæ motum suspendendo.
6. Variolæ, non secus ac morbilli, intensissimum æstum junctum habere solent, qui erumpentibus istis cessare consuevit. Acidum autem in variolis peccare, præter symptomatica ab acidi acrimonia & erosione nata, v. g. suppuratio cutis, in foveas erosio, interdum ossium caries, pulmonum exulceratio; cura per absorbentia, per invertentia salia volatilia, Tincturam Mercurii, &c. abundè confirmat.
7. Arthritis quælibet, vaga, & hinc etiam fixa, nisi hæc nimis inveterata fuerit, cum febrilibus symptomaticis plus minùs ingruit, & præter æstum, in vaga subinde, admodum intensum, pulsus celerem & frequentem excitat; scilicet acidum, uti in arthritide dolores excitat,

- tat, ita & æstus & ardorem infert febrilem; unde & acido devicto, dolore evanescunt, & ardore extinguuntur. Confer. Tacchenius *Hippocrate Chym. pag. 417.*
8. Febres istæ, quæ ex retropulsia vel scabie adultorum, vel achoribus infantum oriuntur continuæ, & subinde admodum periculosæ sunt, in infantibus etiam ut plurimum cum diarrhœa junctæ ab acido falso plus minus viscido originem habent, adeoque superiora confirmant.
9. Febris lenta quasi hæctica, ex ulcere partis cujusdam internæ, speciatim pulmonis nata, & à sanie purulenta originem habens, id confirmat. In sanie autem purulenta acce imprimis considerandum, & hoc non urinosum, sed acido-salsum, hinc læsa sanguinis crasi vitatur ejus fermentatio & æstus.
10. Infantes ferè tormina patiuntur ex acido lactis vitato, cujus testes sunt excreta viridia, item semigrumosa: hæc si diutius durent, sequitur æstus febrilis totius corporis; interdum satis contumaces quoque; interdum occasione acidi excitatæ superveniunt convulsiones: sed destructo acido in primis viis per absorbentia & volatilia, omnia ista cessant.
11. Urinæ videntur id illustrare. Hæc in febribus intensius tinctæ & perquam rubræ observantur, & quod intensior vexat æstus ægros, eò magis flammeum & rutilantem contrahunt colorem, nisi turbentur. Declinante febre, ac defervescente æstu, naturali citrino colore denudò apparent. Intensiorem hunc colorem ab acido esse, mechanica chymica docet, cum ab acidis instillatis, ~u Oli, Mi, Ais, Sais, etiam aceto, urinæ intensius rubescant, quæ ab alcali, deco tartari per deliquium, lixivio cinerum clavellatorum, &c. aut nonnihil pallescunt, aut saltem nullam in colore mutationem pariuntur. Scorbuticorum urinæ subinde intensissime tinctæ sunt absque febrili æstu, ab acido saltim luxuriante, urinam ita alterante.
12. Symptomata, quæ à vini abusu, v.g. Rhenani, accidunt, ex acido tartareo, volatili imprimis originem ducunt: v.g. orexis, æstus corporis, cephalalgia, pulsus febrilis, &c. similia ferè symptomata febrium:
- hinc spiritus Sais ammoniaci, vel pulveres præcipitantes, os sepiz, vel lac ipsum ista compefcit.
13. Æstuationes vagæ & phlogoses, quæ hypochondriacos sæpius affligunt, ex effervescencia in primis viis, ab acido primario excitata, originem ducunt: Hinc præcipitantibus dictis, coralliis, ebore, alcalibus fixis, &c. ferè cicurantur, & correcto acido emendantur.
14. Similia observare possumus in soda seu ardore stomachi; æstus ille ardorque unde, nisi ab acido? hinc acido hoc præcipitantibus correcto, soda etiam evanescit.
15. Considerationem etiam meretur, quod Tacchenius in *Hippocrate Chym. cap. 18.* Remedia vegetabilia calida, acido prædominante; frigida verò alcali superante dotari asserit. Sanè calida omnia resinofam substantiam obtinent, eamque acrem, in qua vis calefactoria residet, adeoque oleosa substantia ab acido concentrato gaudet. Hinc resina vel liquefacta in oleo, vel destillatione resoluta in spiritum ardentem, intense calefaciunt. Porro oleum destillatum cornu cervi aut terebinthinæ in forma propria assumpta, calidissima sunt; per digestionem verò cum alcali fixo in sal volatile mutantur, quod macrum (purum) nec oleosum, nulla caloris vestigia exhibet, calido i. e. pingui acido in sale fixo remanente. Sanè sæpius observavi in febribus intermittentibus æstum & ardorem ex usu ~ Sais ammoniaci simplicis, ante paroxysmum exhibitum multum remisisse.
16. Illustrat negotiū nonnihil, quod ardoris iste sensus, qui post combustionem ab ignitis subjectis remanet, sit ab acidi spiculis, in parte læsa relictis. Unde per Saturnina, per alcali animalium, sperma ranarum, urinam humanam, spiritum salis ammoniaci, &c. promptum levamen & refrigerium istis accedit.
- Videtur ergo æstus oriri occasionaliter ex acido præternaturali, volatili tamen seu tali, quod sanguini commiscibile nonnihil naturalem ejus fermentationem turbare, & cum particulis alcalinis & oleosis præternaturalem quasi effervescencia constitutere possit. Sub qua & ipsi spiritus geniti aciores quasi, hincq; calidiores & fervidiores existunt, à quibus cum sanguine per universum corpus ex præcordiis calor diffunditur.
- Equidem plures ex bile ardoris ratione, tam naturalis quam præternaturalis febrilis, derivare

vare amant. Sed (1) an ex bile oriatur ardor iste? dubium est. (2) Posito, ex bile cum oriri; quæritur, quâ ratione fiat? an magis ab ejus oleo, in recessu acido, volatili imprægnatò, an verò ab alcali (siquid extra artis opem bilis formaliter possidet) ejus origo sit? Unde (3) in febribus intermittentibus, quæ quasi tot continuæ sunt, quot paroxysmos habent, amara, resinosa, bili magis analoga, & hinc alcalia volatilia, tam proficua sunt.

Observetur autem hic caloris duplex in febribus differentia:

1. est vel humidus vel siccus,
2. est vel mitis vel acris.

Humidus seu vaporosus aliàs dictus semper melior est sicco. Oritur à juncta copiosa transpiratione, quæ ferè præsupponit cutem mollem, & cujus fibræ minus sunt tensæ, & ostendit talem febrilem in sanguine commotionem, quâ copiosè secedant, & mediante ferro emittantur particulæ heterogeneæ separatæ seu coctæ.

Contrarium fit in sicco calore, quo cutis arida & quasi squalida deprehenditur, ac inordinatam particularum in sanguine fermentationem & insignem confusionem spirituum, præsertim animalium, præternaturali impetu, fibras plus minus stringente, innuit. Mitis calor, vel acris seu mordax, cras in sanguinis & spirituum sequitur, qui minus acrioribus particulis salinis, præsertim acidis effervescentibus turgidus, mitiorem; si copiosioribus aut acrioribus iisdem sit imprægnatus, acrem, ad tactum mordacem, tanquam si igneæ particulæ tactui se insinuarent, calorem repræsentat.

Frigus, horror & rigor, non nisi gradualiter differunt. Frigus quod attinet: non rarum est, quod febricitantes conquerantur de frigore, & multò magis de horrore, utut ab alio calidi observentur; aut licet extremæ manus partes, pedes & nasus, frigus actuale contrahant, item palleant, ac ungues livescant, corpus tamen ipsum calidum plus minus observetur: nempe membranarum saltem partium pathemata hæc tria sunt, quæ ab acido febrili vellicata motus convulsivos patiuntur. Unde pro horum gradualiter differentia, si leviores sint, & vix tali appellatione dignæ, in quibus saltem fit cutis asserina, frigoris sensu interdum imponunt ægro; si graviores sint, ita, ut sensibili convulsione quatiantur membra, & per consensum simul nonnihil afficiantur muscoli, rigor existit; medio modo si se habeat, horror dicitur. Sanè interdum tam gravis est rigoris insultus, & tanta convulsiva membrorum extremorum & totius corporis

conquassatio, ut epilepticis similes concutiantur.

Afficiuntur autem sub hoc rigore qualescunque sensiles membranæ, non panniculus saltem carnosus, quæ plurimorum est opinio, sed etiam aliæ quævis membranæ, tam abdominis quàm viscerum interiorum, ventriculi nempe, intestinorum, mesenterii, &c. & aliæ quævis. Cum enim sentiendi vi polleant exquisitâ, si ab acri, in specie ab acido, irritentur, rigores fiunt. Hinc in colicis doloribus rigores frequenter accidunt. Abscessus itidem quilibet interni, dum rampuntur, & ita membranas, quæ eas ambiunt, perforant, rigores superveniunt. De hoc vid. pluribus tractans Piens *tract. de febribus p. 1. cap. 7. p. 254. & sequ.* sanè rigores & horrores, qui intermittentium inchoant paroxysmos, non nisi ex præcordiis seu partibus membranosis in primis viis affectis excitantur, ut rectè docet Fernelius *pathol. lib. 4. cap. 10 pag. 248.* quod etiam de iis alludendum, qui in principio febrium continuarum contingunt. Illi verò, qui in continuarum febrium cursu, tam benignarum, quam malignarum, accidunt, & præsertim circa statum morbi affligunt, ex irritatis & hinc quassatis partibus membraneis externis, interdum & subcutaneis, ferè contingunt, & in febribus benignis sudoris, præsertim critici, prænuncii sunt; in malignis verò excretionis intercutaneæ, purpuræ, pustularum & similium sunt indices.

Non ergò est de essentia febrium calor, sed tantummodò symptoma consequens ut plurimum febrium: sicuti rectè hoc urget Helmontius §. 4. *cap. 1. tract. de febribus.* Scilicet nec convenit soli febri calor, cum aliàs etiam multis in affectibus intendatur calor, utut non semper adsit febris; nec omni convenit febri, quia dantur etiam febres planè frigida, quæ frigore & rigore plus minus molestæ sunt absque æstuatione superveniente. Paradoxon hoc videbitur multis; exempla tamen aliquot videb. in Sylvii *disquisit. 9. de febribus §. 13. pag. 167.* frustra se opponente Deusingio *in disquisit. anti-Silvianis §. 52.* Conf. & de tali febre frigida Bartholinus *cent. 3. epist. 293. 296. 302.* Kergerus *de fermentatione sect. 3. pag. 229.* & Helmontius loco jam cit. Nec rarum est, febres intermittentes diuturnas solo frigore, & aliquali rigore statim temporibus invadere sine eo, ut ullum vel levissimū vestigium æstus superveniat. Quinimò in lectione veterū subinde etiam exempla prostant observatarum febriū frigidarum, non tantum in Hippocrate, sed etiam Avicenna; conf. Rolinccius *de methodo curandi & recognoscendi febres in genere c. 13. p. 636. 757.*

Et



Et ipse etiam Galenus jam suo tempore observavit horrores & rigores febriles absque ullo subsequente calore, uti videbitis allegatum in observationibus Schenckii l. 6. *observ. de febribus* p. 636. & 757.

Urinas quod attinet, tinctura harum intensior ab acido dominante, & hinc cæteras particulas magis concentrante originem ducere supra insinuatum fuit; & ab hoc acido plus minù exaltato, aut enervato & saturato, etiam coitionis & cruditatis materiæ morbificæ in sanguine ratio, & in ☐ signa dependent. Nempe coitio in separatione & quasi præcipitatione heterogenei ex sanguine consistit, quod cum sero dilutum per renes transcolatur, & urinæ fundo subsidet; nil autem dum secernitur, & in sanguine intimè plus minus commixta sunt omnia, nil separari potest, cruditas est, cujus signum ☐ clara absque sedimento excreta existit. Quodsi verò mediante fermentativo motu fiat, successivè extrusio & separatio istarum quasi fæculentiarum, ☐ crassiores magis contentis saturatæ, & quæ sponte turbantur, prodeunt, ad eoque inchoatam coctionem ostendunt, quodsi turbidæ maneant, adhuc ingentem motum & inordinatum fermentativum, & confusionem in M. S. innuunt; sin verò turbidæ, clarescere & ad fundum contenta dimittere incipiant, signum progressus ulteriori in coctione ostendunt. Rem exemplo, quasi simili, non nihil illustrabo: In febre continua aut paroxysmo intermittentium massa sanguinea est similis vino, aut musto generoso fermentantibus; nam ut variis constant particulis, ex salibus tamen ejus acido & alcali fit fermentativus motus, quo mediante separantur & ad fundum successivè præcipitantur partes disproportionatæ, non benè miscibiles, sub fæcum nomine, quo facto ex recuperata debita particularum textura vinum quietum, laudabile ac perfectum existit. In turgescencia febrili simile quid occurrere videtur, nam & ibi particulæ heterogeneæ massæ sanguineæ mediante tali fermentatione separantur, & quædam earum præcipitantur, quarum quædā cum urinis sub forma sedimenti rejiciuntur, donec superveniente critico naturæ motu uno impetu vel ejiciantur, vel quendam in locum transponantur. Sed hæ ipsæ separatæ fæculentiæ non sunt solum recrementa morbosa, sed etiam partes ipsius massæ sanguineæ, sub tumultu isto fermentationis febrilis alteratæ, mutatæ, & simul præcipitatæ, ita unà foras emittuntur: non secus enim ac sudore artificiali per motum aut exercitia, non serum purum, aut recrementosis saltem particulis permixtum est, quod emittitur, sed etiam ex ipsa massa sanguinea copiosæ particulæ utiles fermentationis acutæ motu attritæ, hinc in saluum mutatæ, & ita reliquis minù sociabiles

factæ unà excluduntur: ita etiam in sudore intermittentium massa sanguinea sub paroxysmo in totum seu plus minù colliquata propriæ substantiæ unà jacturam facit. In intermittentibus quot sunt paroxysmi, tot sunt febres quasi particulares, in quibus post horrorem turgescencia fermentativa observatur, in qua materiæ coitio, hinc in fine quadam quasi crisi copiosus sudor. Quamdiu ergo sanguinis crasis unicuique homini propria ab acido & urinoso dependens fundamentaliter, naturaliter proportionata est, tamdiu debite fermentatur & spiritualis sanguis, simul verò ac ista læditur, imprimis si se insinuent particulæ facile fermentescibiles, & non tite cum integra massa miscibiles ex primis viis, sunt fomes pro febre. Ab isto negotio cruditatis & coctionis universa crismus dependet ratio, quæ in præcipitatarum fæcum subitanea ex massa sanguinea exclusione, & vel extra corpus excretionem, vel in corporis quendam locum congestionem in tumorem & abscessum consistit: ipsis separatæ fæculentis prius circa exclusionis locum, ex facta ibidem aut in vicinia irritatione varia symptomata occasionaliter concitantibus, dum v. g. sudores criticos rigores repetiti, hæmorrhagias criticas agrypnix, deliria, narium pruritus, oculorum splendores, cephalalgix, obauditiones præcedere solent, nam secundum Hippocratem nox, quæ crisin antecedit, gravis. Hinc semper observavi, quamdiu in febribus, præsertim continuis urinæ sunt crudæ, tamdiu res ægri existit in ambiguo: quando verò adsunt signa coctionis, semper quælibet fausta possumus ominari, ita ut non meminerim, vel legisse me, vel observasse cum coctionis signis quendam interiisse: econtra quæ coctæ jam plus minù apparebant urinæ, si recrudescant denuò, semper periculum portant, si nempe sedimentum, quod primis diebus subsiderat, deficiat, aut si urinæ crassæ intensius tinctæ pallescere aut tenuiores excerni incipiant, id quod nunc per causas externas, vini generosi potum, iracundiam, pastum paulò copiosorem, præsertim carnosarum vel similium, nunc per causas internas ex deficiente naturæ motu, & dominio causæ morbificæ evenit. Curabam puerperam purpura affectam, præcedebant omnia mediocriter: die 9. urina crassa intensè tincta turbari & sedimentum deponere incipiebat, interea enim purpura utcunq; erumpebat, coctionis signa augmentabantur, ipsa ægra commodè se habente, sed die 13. cum nox progressa esset inquieta, manè ☐ excernebatur pallida, tenuis, vix citrina, ex improvise delirium, convulsionem; circa meridiem mors: quod hic subito factum, hoc interdum successivè & per aliquot dies evenire solet. Propterea rectè Poterius lib. 1. *de febribus* cap. 42. *Coctio-*

nem.

nem veram continuam & universalem esse debere, asserit: Vera quidem, quia non raro falluntur Medici, opinantes, veram esse coctionem in ☐s, ex crudo humore in fundo earum subsidente, quasi verum sit sedimentum. Continua etiam debet esse coctio, ut fida sit: sit enim aliquando, cum non ex toto urina à natura separatur, ut manè appareat cocta, vespere verò delitescat coctio. Debet etiam esse universalis, & totius materia morbosica; frustra namq; in parte quapiam coctio suscipitur, morbo in reliquo corpore crudo existente. Hæc Poterius Opus hoc coctionis solius est naturæ, & hanc insequens crisis, quam arte adjuvare non possumus: saltem impedimenta naturam gravantia removeere valeamus.

Motus hic naturæ circa coctionis negotium in eo consistit, ut acidum fermentativum morbosum, unde febris oritur, corrigatur & temperetur, adeoque in falsum aliarum particularum additione mutatum ex massa sanguinea extrudatur, idque fermentationis mediante motu accidit. Cruditas enim & artior omnium particularum in sanguine unio, & hinc procedens acrior effervescencia febrilis ab acido dependet, quo dominante intensior fermentatio, nulla secretio fit, dum verò per mutuam collisionem, quasi acidum febrile fermentum successivè ab alcalibus arreptis saturari, in falsum mutari, & sic ex compedibus sanguinis solvi, i. e. liberari incipit, etiam aliæ particulæ heterogeneæ, nec sanguini debite assimilabiles, ab acido tamen vitioso colligatæ & quasi concentratæ, simul ex sanguine extrudi, & hinc ex ejus liquore fermentationis medio (quæ partes unibiles ritè coeunt, non unibiles secernuntur) præcipitari solet, coctio & copiosorum cum urina contentorum excretio accidit. Conf. Sylv. lib. I. Prax. c. 55. §. 14. & seqq. Hinc malignissimis in febribus etiam sub pessimo ægri statu urinæ sanorum simillimæ excernuntur, signo periculosissimo, ~ influos imprimis esse affectos, & ipsam massam sanguineam à fermento maligno citra insigniorem fermentationis ejus turbationem corrumpi, & in textura sua vitiari, unde & cum minori ardore tales febres junctæ esse solent, summa potius virium prostratio, & nervosi generis symptomata magis urgent: sin tamen in his etiam malignioribus coctionis veræ signa se exhibere inchoent, bene sperare Medicum jubent, & si salubres sunt tales, in fine coctione morbosicæ materiæ ejusque signis in ☐ terminari assolent.

Ex dictis hætenus patet, nec calorem, nec frigus esse de essentia febrium, aut rationem earum formalem constituere, sed esse saltem symptomata febribus supervenientia, non secus ac sitis, aut cephalalgia easdem necessario comitari solet. Idem autem est calor in

statu sano temperatus, qui in febribus nimis corpus calefacit, idem efficiens, idem fiendi modus, idem subiectum recipiens, saltem in majori gradu omnia. Patet etiam, quid de putredine, adeò à Veteribus in febribus, hinc putridis dictis, decantanda habendum; nempe quamdiu viventis corporis sunt partes, putredo locum propriè dicta nullum habere potest, unde & Veterum ista putredo non potest concipi, nisi per fermentationem explicetur; hinc Sennertus, utut statuatur & explicetur adhuc febres putridas, sæpiùs tamen vocabulo ebullitionis, effervescentiæ &c. utitur, conf. etiam Piens de febr. part. I. p. 236. Patet denique non cor, aliamve partem aliquam solidam esse subiectum febrium primarium, nec vasa aut majora aut minora, sed sanguinem & spiritus.

Oritur ergò, seu potius consistit febris formaliter in fermentatione sanguinis præternaturali, eaque insigniter depravata, seu ut alii loquuntur, disproportionata, subinde simul insigniter aucta, adeoque interdum ejus quasi effervescencia, cujus occasione & alterantur spiritus, & rarefacti magis impetuosiores & intensius incalescentes redduntur; inducta à fermento peregrino, nunc sanguinem, nunc spiritus, nunc utrumque immediate afficiente, què depuretur massa sanguinea, aut separetur, quod ipsi hostile & præternaturale existit. Id quod confirmant omnia circa febres observabilia, in specie pulsus, æstus, diarrhœæ in iis frequentes, non nisi per auctum massæ sanguineæ motum explicabilia. Uti enim sanguis naturali fermentatione volatilifatur in spiritus, & restauratur assimilando chylum, & depuratur per fermentationem, scorias excrementitias per urinas ablegando; ita, ubi vitiosè fermentatur, ibi præter naturam ebullit ac effervescit, ut inde motus insignis arteriarum observetur, & crebro pulsu præsens est febris.

Quod autem febris essentia reverà consistat in tali præternaturali sanguinis fermentatione, multa confirmant quotidie circa febres observabilia. Et quidem

- I. Ex abusu fructuum recentium horarum facile oriuntur febres propter insignem horum fermentescibilitatem, & intermittentes simplices fiunt duplicatæ; hinc etiam nonnunquam diarrhœas & dysenterias inducunt: imò liberatus aliquis à febribus, si fructibus horæis, aut eorum embammatis ex eorum succis paratis, aut potulentis facile fermentescibilibus, nimis delectetur, facile pati solet recidivas; unde & scorbutici ex esu prunorum, vel succis crudis expressis simplicium antiscorbuticorum, nasturtii

aut

aut cochleariæ utentes, propter horum fermentationem febres intermittentes incurrunt.

2. Hinc est, quod prohibita transpiratio introducat febres, quia poris clausis vitiosa salia coërcentur, ut nequeant exhalare. Nam id, quod aliàs transpirat, ubi supprimitur, necessàrio regurgitat in massam sanguineam, quæ exinde ad turgescentiam usque infarcta talem fermentationem & effervescentiam concipit, tandem in febrem ardentem erumpit.
3. Plures febres oriuntur ex contagiis extrinsecus inspiratis. Nemo verò naturam contagiorum melius poterit explicare, quàm is, qui naturam fermenti & fermentationis in contagiis concipit. Dum enim istæ febres, quæ foveant contagium multiplicativum, suam vim obtinent beneficio fermentationis, facilè apparet, quod febres productæ in simili fermentatione consistant.
4. Veterum putredo, quam tanquam causam febrilem in febribus hinc putridis dictis adducunt (vid. Sennertus *cap. 2. de febribus*) non potest concipi, nisi cum Willisio, Sylvio: cæterisque innumeris recentioribus per fermentationem massæ sanguinæ explicetur.

#### PARS AFFECTA.

Subiectum febris primarium, seu pars affecta omnis febris, non sunt vasa majora & minora, non cor, non aliud quoddam viscus, sed omnes febres sunt in massa sanguinea & spiritibus influis, qui vitiosâ massæ sanguinæ tam fermentatione, & nunc majori vel minori ebullitione, quàm circulatione alterati, omnia illa pathemata inferunt, quibus febricitantes corripiuntur: vid. Helmontius §. 19. *cap. 1. de Febribus*, qui etiam §. 18. hoc illustrat exemplo suo, desumpto à spina querna digito infixâ. Sanguinem affectum, præter alterationem pulsus suprâ notatam, & sudor, sine quo nulla febris perfectè iudicata seu curata dici potest, & coctio ac cruditas materiæ in sanguine contentæ, perque urinam manifestatæ, & icterus febribus facilè superveniens, & alteratio insignis sanguinis, quæ post absolutas febres observatur, eò major, quò diuturnior febris extiterit, dum indolem acidam exinde acquirere rectè dicitur à Majow *Tract. de corde pag. 157.* confirmat: unde etiam ex urina & pulsibus tam elegantia in febribus benignis habemus signa, diagnostica & prognostica, quatenus scilicet hæc immediatè sanguinis fermentationem, & inde peculiarem ejus statum ostendunt, quod fieri non potest, nisi in febribus simul nas-

Tom. II,

sa sanguinea affecta fuerit. Spiritus verò influos simul laborare, confirmat opii usus, qui spirituum sedando impetum, intermittenti-um paroxylmos nunc penitus sistit, nunc saltem postponere notabiliter, & minus hinc affligere facit. Tandem, quod pariter in continuis obtinet, quorum ferociam & mitigare, interdum penitus extinguere notatum: vid. Bartholinus *Centur. 1. Hist. 84.* Ucut autem palliativum saltem sit remedium subinde; eò ipso tamen, quò insigniter febres mitigari ac mutari ejusdem usu, spiritus saltem alterando & effervescentia, observatur, & spiritus simul affici in febribus manifestum evadit. Ad hæc, qui gravibus, etiam sanissimi, corripiuntur undecunque natis doloribus, aut diutius perseverantibus, febrilia exactè patiuntur symptomata, qualia in continuis mitioribus contingere solent doloris occasione, in motum nimium adactis, & inde alteratis in suis proprietatibus spiritibus influis, à quibus solis tunc febris dependet. Nec obstat: ephemeram aut synocham sine putredine vocari tales febres; eò ipso enim, quo ephemeræ tales unius seu plurium dierum à spiritibus affectis, & undecunque alteratis, unice dependere concedimus, spiritus in febribus aliis quoque multò magis affici, negari non potest. Id quod magis confirmant maligniores, spiritus magis quàm sanguinem alterantes, quæ tunc etiam, ubi urinæ sanorum similes existunt, nec adeò insignis, pro ratione scilicet pessimè habentis ægri, à statu naturali in pulsu mutatio observatur, adeoque sanguis minus alteratus notatur, tamen ægros facillimè trucidare solent, spirituum magis affectorum causa. Imaginatio tandem, quantum in concilianda febre valeat, cum meticulositate aut horrore ægri sanus sibi facilè similem febrem contrahit, aut dum ludicris & ridiculis amuletis intermittentes subinde fugantur, ex sola imaginatione spiritus saltem afficiente, per se notissimum est.

Non ego nego interim, dum massam sanguineam & spiritus pro subiecto habeo, quin alia quædam pars seu quoddam viscus possit esse focus febrilis, in quo hæreat ac latitet causa febrilis; sic enim certum est, focum febrium omnium intermittentium, imprimis quartanæ, ubi nascitur fermentum febrile, esse stomachum: sic viscera exulcerata fomitem continent febrium hæcticarum; sic quoque in febribus symptomaticis ulcerum & vulnerum, utut immediatè afficiant sanguinem, focum tamen habent in parte ulcerata vel vulnerata.

Non confundatur tamè focus morbosus cum receptaculo producti morbosus; sic enim chronicis febribus subinde superveniunt tumores, v.g. Quartanis diuturnis lienis tumor supervenire solet. Interim universalis est morbus fe-

(11)

bris,



bris, cum sanguinis & spirituum ratione totum corpus affligat necessariò, adeoq; ratione partium solidarum ita denominatur, quas tamen nunc æqualiter nunc inæqualiter affligit. Hoc fit ratione circumstantiarum accidentalium, prout fermentum febrile, aut corporis humores sub febrili motu plus minus alterati, aut etiam producta humorum morbosa, &c. aptiora sunt, ut unam vel alteram partem magis vel minus afficiant. Ipsæ etiam partes solidæ, vel connato vel acquisito ex vicio, quò imprimis partium robur inæquale pertinet, magis vel minus disposita sunt ad suscipiendam ex causis prædictis alterationem seu immutationem; pro talium enim circumstantiarum ratione accidentales istæ febrium differentiæ, continuarum quidem in pemphigodem, effæroden, eloden; intermittantium verò in tussiculosam, deliram, asthmaticam, &c. oriuntur. Forſan etiam & huc referenda venit & febris illa continua, in qua lateris sinistri totius æstus, & dextri frigus: Vid. Bartholini *Act. Med. Hassniens. Volum. 2. pag. 137.* item febris ista brachii dextri particularis quotidiana in *M.A.N.C. ann. 3. Observ. 205. pag. 381.*

#### D I F F E R E N T I A.

Quoad differentias febrium reales, febris (1.) ratione conditionis causæ & inde acquisiti moris est vel benigna vel maligna. (2.) ratione modi afflictionis est vel continua vel intermittens. (3.) Continua ratione generationis est vel primaria vel secundaria: hæc vel comitata vel symptomatrica: Primaria verò est vel continua, synochus dicta, vel continua plus minus periodica, synecha appellata. Eadem continua ratione cursus, seu motus febrilis, & vel acuta vel lenta. Tanta tamen varietas in unaquaque febrium classe subinde observabilis est, ut certis cancellis eam includere impossibile sit.

#### C A U S A E.

Cum ergo febris consistat in læsa sanguinis fermentatione, & omnis fermentatio dependeat à motu spirituum ordinato, & duplici sale, acido & urinoso, facile patet, quod causæ febrium in genere erunt omnia ea, quæ dictam salium harmoniam & proportionem lædere, crasin massæ sanguineæ naturalem pervertere, & talem dyscrasiam seu talem heterogeneitatem & disproportionatam texturam particularum componentium plurium aut pauciorum inducere possunt, ut exinde Æium activitate vitata fermentatio præternaturalis excitetur: Unde & mediante tali effervescencia massa sanguinea coquitur, & particulæ salinæ vitioſæ tanquam feculentia excernuntur. Hæc ipsa in genere, qualiacunque fuerint, fermentum febrile, naturalibus planè incongruum, in definitione appellare placuit; cuius occasione nempe sanguis præternaturalem

fermentationem concipit, & spiritus simul insigniter alterantur. Immediatè tale fermentum sanguinem, & hoc mediante spiritus afficit, seu econtra immediatè spiritus, & his mediantibus sanguinem inquinat.

Tale fermentum est, v. g. quod ex insensibili transpiratione prohibita & retenta febrem subinde accendit. Tale fermentum est, quod ex ulcere quodam interno, v. g. phthisi pulmonum, febrem inducit: tale fermentum est, quod in erysipellate aut pleuritide febrem acutam infert: tale fermentum est, quo scabies retropulsa febrem periculosam subinde excitat: tale est lymphæ acidior, febrem catarrhalem inducens: tale fermentum est, quod ex fructuum horarum abusu subinde febre nos mulctat: tale fermentum est, quod contagii sub tegmine nos inquinat: tale fermentum est, quod ex usu rei horridæ ac facile alterabilis in primis viis sæpius febrem intermittentem excitat.

In specie, quoad intus genitum fomitem febrilem speciatim ad primas vias respectus habendus, quarum errata fermento quidem digestivo acido volatili ex ventriculo imprægnata, & interiùs sanguini commiscibilia, defectu tamen debitæ digestionis & perfectionis in primis viis, qua in falsum volatile abire debebant, non ad eò homogeneè assimilabilia existunt, quin inordinatam fermentationem citius vel tardius inducant.

Notum hoc imprimis est ex febribus intermittentibus tertianis, &c. fomitem simpliciter in primis viis habentibus; continuarum verò, præsertim benignarum plurium, par omnino est ratio, si erratum primarum viarum sanguinem seu lympham inquinet, & eatenus fermenti instar continuam fermentationem in sanguine efficiat. Siquidem intermittens febris paroxysmus quilibet integram quandam benignam, per crisin sudoris finientem, febrem continuam repræsentat. Unde non rarum est, ex intermittente tertiana continuam fieri; & contra, ardentem continuam in intermittentem terminari, & complicari hæc duo denuò, ut in continuis periodicis obvium est. De humoribus certis in corpore extravasatis, & hinc fermentantibus, res est comperta penes eum, cui perſpectum, febres traumaticas originem suam tanquam à fermento febrili nancisci ex humoribus extravasatis & putrescentibus in ulceribus & vulneribus, & quocunque sanguine extravasato.

Fermentum hoc in benignis videtur esse acidæ plus minus naturæ (ut ex iis, quæ supra de æstu corporis, rigore & urina, &c. dicta sunt, probabiliter concludi potest) imò etiam in malignis, sed in his acius, volatilius & penetrabilius, ratione quarum proprietatum & spiritibus tam promptè communicabile existit, adeo-

adeoque ad veneni naturam, quæ in intemperatura insigni simpliciter consistere videtur propius accedit. Non autem semper humorum peccantium copia aut moles, seu, ut vocant, laburra hanc fermentationis læsionem inferunt, sed sufficiunt, interdum miasmata quædam fermentativa, vel inspirata, vel aliàs in corpore relicta, quæ quatenus sunt activa & undique per contenta corporis diffusiva, odorum adinstar, facile admodum totam massam sanguineam, motum salum æqualem pervertendo, in fermentationem præternaturalem excitare valent, vel spiritus influos, eorum texturam viciando, inficere possunt; talia enim fermenta, v. g. contagia, sunt spirituosa in malignis, quæ vel spiritibus, vel sanguini, se insinuantia, nunc citius nunc tardius potentiam suam alterativam exercendo, febri occasionem suggerunt: Adeoque minimum subinde est, quod peccat in febribus ceu materialis causa, quod tamen fermentationis medio multiplicabile existit; unde intermittentium insignis diuturnitas, continuarum verò malignarum copia contagiorum spirituosorum. Causæ remotæ varix & multiplices ex rerum n. n. vario usu & abusu sunt derivandæ; notabile tamen est, quod ii qui laborant in q̄ vivi todinis rarò febribus affligantur, & quod ii, qui q̄ unguento peruncti fuerint, ad longissimum tempus vix febribus corripiantur, teste Poterio l. I. Febr. c. 15. Nec obstat, quod Panarollus *Pentec. 5. Observ. 39.* referat febri periculosissimam ob hydrargyri unctionem ad pectus & axillas contra pediculos, nam forsitan febris occasione inflammationis in dictis locis enatæ inducta fuit.

#### DIAGNOSIS.

Quoad signa in genere diagnostica: superius dixi, quod sit pulsus frequens; calor verò qui in febribus interdum adest, tantummodò symptoma superveniens, non verò necessariò ipsis semper conjunctus, utut ut plurimum non minus quàm sitis affligat ordinariò febricitantes: Adest cephalalgia; item interdum adest adjuncta syncope, & alia symptomata varia; appetitus nunquam est naturalis; aut enim est nimius, ut hoc sæpius observari licet in principio quartanarum; aut planè est depravatus, uti hoc experiri licet in mulieribus; aut etiam est planè prostratus, v. g. in ardentibus & malignis nonnullis.

#### PROGNOSIS.

Prognosis febrium in genere ex pulsu & urina desumitur, ille prout vehementior, major, & æqualior, hæc prout coctionis signa laudabiliora ostendit, eò meliora sunt indicia, & contra, si contra; atque ex his etiam principaliter tempus & modus eventus cognoscitur, De quibus supra fufius egimus.

Tom. II.

#### CURA.

Cura febrium in genere consistit in eo, ut

1. Fermentum febrile acidum volatile, specifici tamen saporis, corrigatur, alteretur, & enervetur, seu quasi figatur, & hinc in saporem & texturam minùs activam mutetur.
2. Materia vitiosa peccans fermenti talis, vel vehiculum aut fomes (mediate quo v. g. ex primis viis, fluidis corporis contentis, speciatim sanguini permiscetur, ut in intermittentibus aut continuis benignis) vel productum ab isto fermento ex naturalibus corporis contentis fluidis per horum fermentativam alterationem genitum (v. g. copiosus ichor in variolis) ab iis, præsertim à sanguine, separetur.
3. Utrumque, quâ data porta, imprimis per peripheriam cutis, eliminetur.

Opus hoc est vel solius naturæ, vel solius artis, vel utriusque simul. Solius naturæ opus est hæc cura, dum coctione materiæ morbificæ, & hinc factâ crisi, expedit. Unde in veterum methodo medendi Medici agebant spectatores naturæ, observando coctionis signa & tempora, & hinc expectando crisin, quibus ritè sese habentibus, morbus judicabatur, & salvabatur æger. Solius artis opus est, quando remediis specificis antifebrilibus fermentum febrile enervatur & corrigitur, id, quod superest, sponte suâ & absque morbooso conatu, curante naturâ. Talia sunt v. g. specifica febrilia intermittentium, ut febrifugum Riverii, aut specificum febrile Kergeri, in quartana specificum febrile seu China Chinæ (nempe recipiendo Chinæ Chinæ ʒss. ʒxiij.) aut Helmontii q̄ diaphoreticus Paracelsi quatumvis febrium rhizotomos.

Artis & naturæ opera simul curantur in methodo hætenus communiter recepta, quâ naturæ, fermentationis sanguinis febrilis medio, laudabiliter agenti & coquenti, auxilia trices opes ferimus, impedimenta illius, sordes & fomites primarum viarum removendo. Hinc aut temperantia, aut absorbentia, aut diaphoretica, vulgò præcipitantia dicta, aut appropriata alia, utramque faciunt paginam in febribus: sunt enim talia, quæ in genere fermentationes, aut vitiosè effervescentes humores sui miscelâ compescunt, mitigant, & plus minùs enervant, dyscrasiam sanguinis corrigunt; adeoque nunc acidum destruendo, nunc alcali corrigendo, motum omnem fermentativum supprimunt; sicque vitiosarum & heterogenearum partium exclusionem, & à reliquis separationem promovent, utcunque ejus effectus explicentur, & hinc nata gravia symptomata, motum & impetum naturæ plus minùs frangentia mitigant. In quem finem in genere venæsectionis,

(112)

pur-



purgantium, opiatorum & dietæ usus observandus venit. Præcipationis vox ex chymicis est desumpta.

Auxiliatrices has opes ferimus naturæ rectè agentis, h. e. quæ fermentationis medio coctionem ritè molitur pro futura excretionem. Sed quid agendum Medico, cum vitiosè agit natura? h. e. cum crudâ adhuc materiâ excretionem symptomaticas in principio aut incremento instituit eadem irritata, siue turgeat plus minus materia peccans, ut aliàs dicitur, siue non? Coacta sanè agit natura, unde & subinde debilitant ægrum tales excretionem, & absque euphoria fiunt; quas tamen, ubi supprimerentur arte, periculum est, ne impetu contentorum intra corpus coercito, fiat irruptio in partem aliquam nobilem, adeoq; exitialem vitæ calamitatem inferat: v. g. pono febrim continuam insignem, sed benigniorem (utut malignarum reverà eadem sit ratio, in quibus tamen magis ad malignitatem, præsertim, si spiritus potissimum occupet, respiciatur) cui, crudis adhuc existentibus urinis, die tertia, quarta & quinta supervenit diarrhœa, aut hæmorrhagia narium crebrius repetens: Excretio hæc reverà est symptomatica, debilitatur æger, franguntur vires, periculum est, ægrum vix superaturum morbum, aut ad statum cum ista excretionem perduraturum. Quod si supprimatur hæc ipsa, ex diarrhœa impedita febris intensior, sitis, cephalalgia, deliria &c. metuenda erunt: Si hæmorrhagia narium sistatur, eadem, ac præsertim deliria & convulsiones. Quid igitur agendum in talibus casibus? Variè decertant hic Præctici, an promovendus, an sistendus sit talis naturæ motus? omnium optimè mihi videtur negotium decidisse Stephanus Rodericus Castrensis, *Tr. Qua ex quibus l. 2. c. 10. pag. 109.* Decisionis nucleum paucis comprehendam. Inquit: *Omnis evacuatio symptomatice ratione facta, in tempore peccat. Si enim debito fieret tempore, h. e. in die decretorio, non amplius symptomatica, sed critica diceretur. Nihilominus peccat vel in solo tempore, vel simul cum temporis vitio habet vitium qualitatis, aut quantitatis, aut utriusque. Si qualitate & quantitate simul sit vitiosa, omnino damnanda est. Si quantitate tantum, quantitas vel excedit, & tunc est inhibenda, vel deficit, & tunc an supplenda? Certant artis proceres, & adhuc sub iudice lis est. Si qualitate peccaverit decreto Hippocratis Sect. 1. Aphor. 2. damnabitur. Nam cum non purgantur talia, qualia purgari oportet (quod idem est, ac si diceret, quæ peccant in qualitate) nec conferre, nec leviter tolerari. Profecto si non conferunt, non sunt proficua; si non tolerantur, non sunt cum virium tolerantia. Si tandem solius temporis peccatum sit, non autem omnino qualitatis, neque valde magnum quantitatis, tunc posse aliquid judicare, tam*

*certum est, quam quod certissimum. De deficiente ergo ex quanto excretionem, sub iudice lis est, Hippocratis Consilio Sect. 2. Aphor. 29. cum morbi inchoant, si quid movendum videtur, move. Ubi Galenus esse melius ait, in principiis evacuare, quò minorem jam factam materiam facilius natura possit concoquere. Si igitur evacuatio confert in principio ad futuram coctionem, sanè isthac evacuatio ante coctionem fit. Si autem fieri potest cum utilitate ab arte, aut quò majorem agitationem patitur corpus, multò melius fiet à natura, à cuius operibus minor contingit agitatio. Hactenus Castrensis.*

Hinc & excretionem symptomaticas interdum morbum solvere, observatum refertur in Bartholini *Act. Med. Hassniens. Vol. 4. p. 104.* Interea Medicus, siue sistendas siue promovendas observaverit huiusmodi evacuationes, semper acre peccans temperantibus & invertentibus enervare, sedulus insistat. Siquidem tam materiæ morbificæ turgescencia, quam excretionem symptomaticæ, semper sequuntur nimiam materiæ occasionalis seu fermenti ejusque vehiculi acrimoniam tam benignam, quam malignam. Sive enim ex aucta effervescentia, siue ex irritatione partium sensilium, & hinc nato motu contentorum vitiatum, siue ex utroque oriri dicamus turgescencia aut excretionem, symptomaticam, sanè utique principale peccans erit acrimonia nimia.

Pertinet ad ejusmodi dubios naturæ motus icterus, de quo Hippocrates *Sect. 4. Aph. 62.* Quibus per febres morbus regius supervenerit ante diem septimum, malum. Minus universale hoc esse non solum Sennertus annotat, in *Instit. l. 3. part. 3. cap. 7. pag. 740.* sed etiam ex Horstio *l. 1. Observ. 33.* ubi icterus salutaris quarta die in continua obvenit, & Bartholinus *Cent. 3. Hist. 4.* icterum salutarem in quartana ante septimum supervenientem notat. Ergo præter signa coctionis plus minus jam progressa optimè negotium hoc decidit Castro *pag. 203.* Nempe etiam die quarta ictericiam cum rigore esse bonum signum, quia quasi criticans, item ictericiam sine rigore ante septimam accedentem, utut symptomaticam, si sequatur evacuatio aliqua v. g. per alvum aut urinam ægrum liberari.

In specie superius insinuata auxilia generalia quod attinet: ex fonte chirurgico imprimis se offert venæsectio, de cuius usu quæritur. Ex supra jactis fundamentis per se patet, insignem circa venæsectionem intercedere abutum, cum per se ferè nil in febre curanda conferat venæsectio, utcumque ejus effectus explicentur. Convenit ergo per accidens saltem venæsectio interdum in febribus ardentibus continuis benignis, in subjecto ju-

venili,



venili, & qui laudabili chymo ac generoso victu, præsertim in potu, utuntur, aut subiecto alias vomitus abhorrente, aut in quo confectæ quædam sanguinis evacuationes artificiales sunt suppressæ, tempore verno & æstivo, in subiecto pletorico, tam vero, quam apparente, aut in quibus nimia effervescencia aut ebullitio sanguinis, indeque orta spirituum exandescencia intensius observatur, vel si forte abz circumstantiæ eam suaserint, in primoratum, ut dixi, principio; magis tamen in benignis, minus in malignis, præsertim ubi jam aliquousque progressa sit febris, in quibus non nisi caute & circumspectè eadem locum habet, & quo malignior fuerit febris, eò minus locum habet.

Ex fonte pharmaceutico in genere se offerunt evacuantia, sive sint vomitoria, sive purgantia in specie sic dicta, sive sudorifera, sive diuretica, & hinc symptomatum urgentium sedativa opiata. Equidem & horum omnium usus spontè patet.

Evacuantia quidem purgantia nulla sanè per se febribus conducunt, nisi in declinatione, adeoque correcto fermento febrili & cocta materia, ac sedata ebullitione. Frustra enim alias propinantur, turbabunt magis massam sanguineam, irritabunt partes solidas, & quicquid evacuabunt, absque euphoria erit, cum non evacuetur tunc temporis, quod evacuandum esset, nulla facta inutilis ab utili segregatione. Confirmat hoc experientia, quæ ostendit, post repetitas etiam purgationes eodem tenore pergere, interdum gravius affligere intermittentes. Continuat verò magis exasperantur iisdem: id quod manifestè ostendit, non attingere purgantia radicem morbosam, sed Medicos & agros deducere. Quod si aliquando à purgante remedio cesset febris, hoc uti rarum, ita summè accidentarium est, sub liquaminibus istis, quæ copiosius & evacuant purgantia, una forsan exhausta fermento febrili, aut ab ætioribus amaricantibus solutivis, v. g. scammonio aut colocynthide in alterante correcto eodem, vi solutiva propriè nil operæ conferente. Sanè in omni evacuatione in febribus instar cynosuræ aphorismus observandus Hippocratis. Cocta medicari oportet, non crudè. Hinc si in principio præscribenda propriè purgantia, vomitus saltem tunc convenit. Natura hoc monstrat, quæ nunquam, ubi sui iuris est, instituit evacuationem, adeoque nec crisin, nisi cocta sit materia. Imitemur ergo naturam tanquam ministri, & nunquam evacuationem instituamus, antequam perfectè cocta sit materia morbifica. Interim blanda primas vias abstergentia, & hinc præsertim diaphoretica, quovis fere febris statu & tempore, nisi forsan crisis

quædam instans aliud moneat, optimè adhibentur.

Primas vias evacuantia, in quibus fere statulatur fomes morbosus, sunt vel vomitoria, vel per inferiora laxantia. Illa ex omnibus evacuandi generibus tantum non in omni febre locum inveniunt, imprimis in principio, sanè iisdem vomitoriis interdum etiam mox in principio radix morbofa quasi unâ falce demetitur: id quod restitat febrile, facilius dehinc curatur. Intermittentes febres sine eo difficulter curantur. In continuis acutis & lentis, ibi in principio, hinc etiam in progressu, sunt optima: imò non rarum est, quod malignæ exinde, sed primo insultu adhibitis, multum leventur: Vid. Sydenham in *Tract. de Febris*. Ergo, qui apti sunt ad vomendum, nec in quibus aliquid obstat: item, quibus vel hypochondria suspensa, aut rugitus in iisdem est, aut nausea, vel ructibus tetris amaricantibus; item cephalalgia vel aliquali vertigine vexantur, in febrium principio optimè, imò sæpius necessariò, vomitu evacuantur.

Quæ verò per inferiora lavant alvum in febribus, sunt vel injecta clysmata, vel assumpta pharmaca. Clysmata familiarissima in febribus locum habent, & imprimis pro levando æstu, & aliarum, præsertim capitis, per consensum ut plurimum partium symptomatis, & hinc abdominis pathematis propriis mitigandis conducunt. Binæ saltem conditiones observentur eorum usum prohibentes:

1. Quando natura aliorsum vergere, & evacuationem, præsertim criticam, vel huic saltem analogam, per alias vias instituere tentat, unde v. g. in fine paroxysmorum in intermittentibus, naturâ criticum quasi sudorem tunc moliente, præposterè injiciuntur.
2. Quando excretio cutanea in febribus malignis vel expectanda est, vel imminet, vel jam adest, & facta fuit. Hinc in variolis, morbillis, purpura, petechiis, &c. minus conducunt, nec, nisi summâ necessitate urgente ad eadem, eademque saltem lenissima, & tamen caute, fiat accessus: potius, quantum possibile, dictis in affectibus vitentur.

Per os assumenda sunt blanda laxantia, præsertim salibus digestivis sociata & ac uata, & ultra primas vias haud penetrantia, ex tamarindis, rhabarbaro, infuso sennato, &c. & hæc speciatim in principio locum inveniunt.

Sudoriferorum usum ipsa nobis natura monstrat. Cum enim in febrium fine natura suâ sponte copiosos sudores movere soleat, ita, ut nulla febris perfectè citra recidivæ

metum curari, aut judicata dici possit, nisi sudor in declinatione provocatus fuerit: ob id, apparentibus coctionis signis, sudorifera sunt optima; sicut in toto earum decursu diaphoretica sunt utilissima, quæ cum liberam & copiosam transpirationem promoveant, æqualia non solum effectu sunt sudoriferis, sed propter operandi modum illis etiam præferenda: dum sine insigni virium jactura successivè & citra vel contentorū graviolem agitationem, vel continentium partium molestam irritationem operantur, ac heterogeneas fermentativas particulas in massa sanguinea hærentes discutiunt & excludunt. Nempe, ut suprà insinuatum, minis periculosè illi decumbunt, quibus in febribus cutis humida aut madida percipitur, quàm quidem arida aut sicca est. Cæterum in sudoriferis observetur, quod non semel, sed quoties opus est, propinentur: Nam prima sudatione tantummodò movetur massa sanguinea potius, quam ut integrè evacuetur. Certè vulgus indoctum non rarò imminentes, aut jam incrementales febres, etiam continuas, repetitò sudoriferorum, eoque promiscuo usu non rarò curat. Eligenda autem temperata, non acria, nec aromatica, aut resinosa, sed vel fixa absorbentia, communiter præcipitantia dicta, vel volatilia non oleosa, aut non calida. In malignis vero utramque faciunt paginam alexipharmaca & sudorifera, malignitati in specie resistentia, sequendo nempe naturæ ductum, quæ ferè quartâ quintavè die erumpere facit petechias seu pustulas, nunc bubones, nunc abscessus, &c. Hæc ipsa tamen, prout plus vel minus simul effervescentia febrilis urget, etiam absorbentibus appropriatis, in specie sulphuribus mineralium fixis, socianda sunt; in principio quidem temperatioribus, in incremento & statu fortioribus. Sed de hæcenus dictis remediis vid. Holterhoff *Tract. de Error. Medicor. cap. 11.*

Opiata per se non conveniunt, per accidens interdum ad mitiganda atrociora symptomata, imprimis subindè urgentia, usurpantur, aliàs naturæ motum impediendo febres quidem interdum sistunt, sed aut gravioris cum recidiva, aut chronici alicujus morbi supervientis metu. Unde, quando adhibentur, saltem in incremento fiat, non in statu, ne motus critici plus minus impediatur; non in principio, ne naturæ conatus inchoatus sufflaminetur, & hoc in continuis. In intermittentibus verò præmissis præmittendis vel ante paroxysmum ad inhibendam febrem vel in paroxysmo ad sopiendam graviora symptomata: utrinque non, nisi appropriatis vel absorbentibus, vel diaphoreticis permixta.

Denique ex fonte diætetico petita præsidia quod attinet, dum sitis frequentius urget, potus tenuis, facilè transiens, ventricu-

lo amicus, nec eum lædens, est optimus: aliàs aliquot guttæ ~ vel stigmati  $\Delta$  acidius plus levat sitim, quam integra mensura cujusvis potus.

Vinum vulgò pessimo consilio interdicitur febricitantibus, qui tamen optimus est: nam in intermittentibus haustus vini aciduli, speciatim Rhenani vel Necarini, non nocet; si die intermissionis assumatur; si etiam in rigore paroxysmi, dum vires nimis prostratæ apparent, propinetur; quia hoc reficitur æger: sicut & in febribus continuis malignis, & ipsa peste, vini haustus remediū locum obtinet, quippe quod malignitatem coercet, stomachum languentem mirè recreat, & pro conservandis & restaurandis viribus summè labefactatis est egregium: id quod etiam suo modo in febribus continuis verum est, sed moderatè. Quoad febres verò continuas benigniores: in caulo, tertiana continua, hæmitriteo, &c. vino abstinere tutius est, nisi adsit vomitus, summa virium prostratio, ut & syncope. Hippocrates in omni febre vinum porrigit: habito tamen delectu: conveniunt enim imprimis vina acidula, defecata tamen, alba, debilia & aquosa, ut loquitur Poterius *de Febribus P. 2. cap. 26.* non pro potu ordinario, sed pro appetitu ægri, & ratione virium. nempe vis fermentativa vini, ejusque acidum ardentibus in febribus nonnihil suspecta sunt, nisi in casu, quo medicamenti vires subit. Unicus vini debilis haustus plus sitim sistere solet, quàm dimidia cerevisiæ mensura. Sanè quibus nocet vinum in febribus, mox ab ejus usu nocumenta percipiunt; nempe mox phlogosim & æstuationis incrementum, non ob spiritum ejus inflammabilem; sed ob acidum. Talibus igitur interdiciendum vinum, vel mox superingestis absorbentibus vis ejus refringenda.

Quoad potus alios: cerevisia aut potus aliàs consuetus alius, non rejiciendi sunt; nisi amarior sit molestus, aut æger eos horreat. Omnes ut plurimum febricitantes, in specie in continuis, recusant cerevisiam; quia tunc deficit appetitus, & in stomacho digestio prima: ob id cerevisia talis assumpta in stomacho mox corrumpitur & cadaverisatur, ac nidorem stomacho molestum contrahit, indeque molestiam ipsi excitat, unde mox nausea ejus & abhorrentia sequitur: unde appetunt subindè febriculantes cerevisiam secundariam vel alios simplices aquosos potus, item Rauterling, qui ipsi non denegandi sunt, saltem, quoniam facile status generant, & stomachi tonum lædunt, propterea, ut corrigantur nonnihil, & stomacho reddantur magis grata, blandè acida instillanda erunt; succus citri nempe, cydoniorum, aut alius similis: item tinctura florum bellidis, cyani, rosarum,



rosarum, violarum, cum acido phlegmate vitrioli paratæ; ~ minerales, cum simplices & dulcificati, tum compositi, clysti.

In intermittentibus potus tales aciduli non prius quam post frigus aut horrorem, affligente actu; non tamen una vice, possunt admitti: potius tunc primum potum calidum plus minus medicatum assumant, cætera moderatè frigidè largiùs superbibant, ut largior promoveatur sudor. In febribus continuis malignis optimè inservit pro potu ordinario mistura ex  $\nabla$ æ fontanæ seu cerevisiæ secundariæ part. ij. vini part. j. vel saltem dimidia, quarta, quinta & sexta: quibus ad mens. iij. commistis addatur pomum citrium in taleolas dissectum, & est potus suavissimus & convenientissimus. Cui pro lubitu addatur Gelatinæ C. C.  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ j. sic appropriatus magis redditur. Aliàs quoque serum lactis benè depuratum & succo citri vel aceto nonnihil acidulatum, in febribus continuis benignis, item in intermittentibus scorbuticis & hypochondriacis, potus est optimus, nisi largior alvus inhibeat.

In specie ~  $\Delta$ is cum s. q. aquæ communis propinetur, qui præter alia commodus, & copiosum sudorem movere solet: vid. Riverius *Cent. 1. obs. 19. Picens de Febris Part. 2. pag. 21.*

Quoad victum: ordinariò parum in febribus continuis appetunt ægri, ob id nunquam ad alimenta nimis cogendi sunt, ac nil, quod ipsi nauseant, porrigendum, sed tenuis diætæ est optima. Semper ruminandum illud Hippocratis: Corpora impura (qualia primariò sunt febricitantium) quò plus nutriveris, eò magis læseris: quia alimenta quæcunque in febribus, quæ citra appetitum & cum nausea assumuntur, non digeruntur; sed in stomacho calido & languido potiùs putrescunt, & sordes febriles augent. Laudatissimus est Hippocratis *Aphorismus 65. Sect. 7.* Si quis cibum febricitanti dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus sit: unde in febribus, præsertim continuis, tenuis victus est optimus; & quo magis acuta est febris, eò tenuior ac strictior convenit diætæ. In specie carniū elus ut averfatur febricitantibus, ita nocet iis: item pisces viscidiores, imprimis in febribus intermittētibz, studiosè vitandi. Fruētūs quoque hóræi, exque iis parata fermentescibilia, nociva sunt: nam omnia, quæ augere aut inducere possunt fermentationem præternaturalem in febribus, nocent. Summatim: Diætæ febricitantium sit tenuis, parca, neque plus ægris obtrudatur, quàm ipsi appetunt: frustulum panis vino intinctum, juscula, leves pulcullæ, & ad summum ova sorbilia in febre quacunque, abundè sufficiunt: Juscula inter avenacea, & pulces ex pane & cerevisia, magis conducunt.

Quies corporis, tam externa in vigilantibus, quàm interna in dormientibus, est optima: sanè, quò quietiores sunt ægri, nisi hoc ex omnimoda virium prostratione fiat) & minus anxii, eò melius est signum, & eò mitior est febris, ac benignior ejus conditio: è contrà si anxii sint ægri, jactabundi, membra inordinatè agitantes, suspiriosi, &c. eò pejus.

Somnus semper bonum signum est, nempe naturalis; præternaturalis autem comatosus, qui malignis interdum supervenit, malus & curandus. Aliàs nunquam arcendus somnus ab ægris est; sibi enim in somno relicta natura, nec perturbati spiritus, optimè suo funguntur munere, & coctionem materiæ eò citius absolvunt; unde & arte in incremento morbi, moderatè tamen, provocari potest: ut taceam, uberiores ferè esse insensibilem transpirationem, ac interdum sensibilem sudationem sub quiete somni.

## CAPUT II.

De

### *Febribus Intermittentibus.*

**I**ntermittens febris est, quæ per interval- la diversis redit paroxysmis tempore intercalari ab omni febre penitus vacuo. Hinc pro interstitio diverso febres diversa sortiuntur nomina, ut quotidiana, tertiana, quartana, &c. Nam, si quotidie novus redit paroxysmus præcedenti in proportionem respondens, dicitur quotidiana; si verò hoc contingat alternis diebus, & una dies sit vacua, dicitur tertiana: sin post duos demum intermissionis dies, revertantur paroxysmi, vocatur quartana &c. sicut præter quotidianas, tertianas & quartanas etiam dantur quintanæ, octanæ, nonanæ. Mihi sanè contigit videre febrem octanam singulis diebus Veneris circa vespèram redeuntem, quam, præmissis vomitorio, spiritu salis ammoniaci breviter profligavi. Exemplum talium febrium quintanarum, octanarum & plurium aliarum, videb. in Schenckio *lib. 6. observat. de febribus*: Quinimo dantur etiam febres menstruæ singulis mensibus tantummodò redeuntes; quale exemplum in juvene observatum annotavit Schenckius *citato loco*. Idem exemplum observavit Lindanus in muliere, quæ toties, quoties menstruam patiebatur purgationem, ordinariò per triduum febricitabat: imò dantur etiam febres anniversariæ, seu singulis annis certo tempore redeuntes: Imò febris, quæ die natali quotannis affligebat, fuit observata. Vid. Schenckius *c. l.*

Febres hæc nunc sunt simplices, nunc ex pluri-



pluribus intermittentibus compositæ, quando nempe non uno & simplici paroxysmo, sed duplici aut triplici vice periodus febrilis absolvitur: tales sunt, v. g. quotidianæ duplices, triplices vè, quoties eodem die duo tresvè proportionem variâ successivè sibi respondentes producuntur paroxysmi: dantur tertianæ duplices, triplices; itè quadruplices ex tot tertianis compositæ; sive in tertiana duplici eodem die bini, sive alternis diebus singuli revertantur paroxysmi; sicut in tertiana triplici una die bini, alterâ unus tantum observatur paroxysmus. Id quod etiam de quartanis similiter obtinet: contingit enim, ut æger uno die sit immunis à febre, & diebus sequentibus patiatur paroxysmos singulos, atque tunc est quartana duplex: quin & contingit, ut quotidie novus recurrat paroxysmus, hoc tamen ordine, ut primus in proportionem durationis, afflictionis, symptomatum, &c. respondeat quarto, quartus septimo, secundus quinto, quintus octavo, tertius sexto, sextus nono, & sic consequenter; & tales sunt quartanæ triplices. De his vid. Sylvius *l. 1. Prax. cap. 27. §. 13. & seqq.* & Sennertus *Paralipomen. pag. 175.*

Ex his omnibus de febribus quotidianis dubium est imprimis, an dentur? hoc est, an detur talis febris intermittens, quæ quotidie simili typo recurrat; ita ut paroxysmus tertius secundo, quartus tertio, &c. exactè sint similes; sive in incremento accrescant; sive in statu similiter consistant; in declinatione similiter decrescant. Paroxysmi horum ut plurimum sunt horarum octodecim, intermissio 6. imò sunt qui affirmant, subinde ad horas 24 extendi paroxysmum, ita ut continuæ similis appareat. Multi affirmant, multi negant; quod rarissimè observatæ sint tales febres: quare etiam à Barbette omnis quotidiana creditur tertiana duplicata. Sed verior est sententia affirmativa, utut certum sit, rarò observari quotidianas intermittentes: vid. tamen Rhodius *Cent. 1. observat. 1. & 5.* Sic Gabelchoverus *Cent. 6. pag. 137.* Verum decipiuntur interdum Medici, ut, quando febris quotidie recurrit, putent esse quotidianam; quæ tamen sæpius est tertiana duplex, utut in principio singulis diebus eodem tempore & eadem proportionem recurrant paroxysmi: Sed negotium totum pendet à controversia: unde ordinata ista febrium sit periodus; quæ quamdiu latet in obscuro, etiam præsens de quotidianis controversia ferè in suspensio manet.

Sed præter has febres certa periodo affligentes, observantur etiam febres intermittentes, quæ nullam periodum observant, sed planè incerto tempore redeunt & affligunt; quæ ob id inordinatæ vel vagæ; item erraticæ

communiter, Hippocrati planetæ, dicuntur, & verè ex scorbutico originem ducunt.

Erraticæ sunt, quæ quidem aliquam periodum habent, sed ita, ut videantur non habere: sic v. g. hodie invadit hora duodecima, perendie sexta matutina, rursus perendie vesperti octava, rursus perendie hora decima, &c. Vagæ sunt, quæ planè nullam periodum observant, neque tempus accedendi vel recedendi habent, quin aliquando per noctes diesque aliquot in septimana remittit, & tunc redit, tum fit mox tertiana, mox quartana, &c. utut communiter hæ duæ promiscuè usurpentur.

In genere tamen triplici primario symptomate, eoque insigni, ordinario præcedente, sc. frigore ac horrore vel rigore; unde Germani dicunt: *das Kalte* & subsequente calore plus minus intensio totius corporis, indeque emanante sudore largo, molestæ sunt hæ febres.

Hæc tria verè primaria constituunt symptomata paroxysmorum, quæ fere semper aut ut plurimum in intermittenti paroxysmo percipi solent, utut pro circumstantiarum varietate nunc unum, nunc alterum symptoma, vel abundare vel deficere soleat, & secundaria quasi symptomata superveniant. Percipiunt nempe ægri ante paroxysmos febrium intermittenti (ut totum earum describam periodum) oscitationem & pandiculationem, quin & lassitudo artuum universalis subinde est molesta; hinc non rarò insequi solet in lecto inquietudo corporis: His molestiis subvenit plerumque corporis quædam lenis refrigeratio; quæ sævior aut saltem perceptibilior est in regione lumbari, ita, ut in dorso sursum & deorsum repere videantur: unguesque fiunt lividi aut cærulei: frigus in abdomine sentitur, hinc magis magisque totum corpus, & in specie extrema digitorum, manuum, nasus, mentum refrigerantur, conqueruntur ægri circa regionem lumbarem de sensu lacerationis: frigori junctus est nunc levis horror, nunc gravis rigor concutiens & quatiens membra, ut patientes epilepsia affligi videantur: durante frigore dolores subinde nunc rodentes, nunc lancinantes, nunc vagi artus affligunt, nunc alia tormina & murmura inflant abdomen, donec tandem remittant. Pulsus, uti est frequentior, ita fit insigniter minor, fit etiam debilior, interdum tam debilis & exiguus propter fermentationem sanguinis imminutam, ut vix digitis percipi queat. In hoc frigore, aut remittente jam frigore, subinde anxietates circa præcordia solent affligere ægros, unde tunc sensim sensimque frigus mutatur in calorem, cum quo intenditur sitis, quæ rariùs aut saltem non adeò vehementer, urget in frigore.

Cum

Cum calore pulsus fit continuò frequentior, sensim fit major aut robustior. Calori aucto accedit linguæ ariditas, respiratio aucta, nonnunquam capitis dolor, ac æstus temporum & colli pulsatilis, vigiliæ, non rarò quoque in paroxysmo graviore delirium. Hinc remittente iterum nonnihil calore sudor emanare solet nunc copiosior, nunc parcius, cum quo paroxysmus evanescit, ita, ut hoc cessante nihil amplius morbo si in ægro restare videatur; aut saltem urinæ sequitur copiosa excretio, insequente tunc ferè somno vario, nunc magis, nunc minus quieto, somniis variis molesto, ac turbato. Notandum tamen: in tertianis magis affligere æstum, in quartanis frigus & rigorem, in tertianis majorem sitim, in quartanis majorem artuum lassitudinem, quæ in & post paroxysmum solet affligere. Hic est quidem modus ordinarius, quo solet invadere febris: nihilominus tamen observatur subinde anomalia seu degeneratio in paroxysmis à consueto hoc ordine: sic enim ratione symptomatum dantur febres simpliciter algidæ vel frigidæ, seu tales, quæ affligunt cum frigore aut horrore, quem autem nullus aut omninò levis insequitur calor, uti in febribus frigidis *κατ' ἐξ ἀνάγκης* apparere solet, è contra etiam dantur febres intermittentes simpliciter calentes seu ardentes; idque in specie tertianæ, vix quartanæ, quæ citra frigus aut horrorem ullum, mox à calore & ardore gravi inchoant, qui calor etiam interdum post paroxysmum subinde durat, aut saltem lentè admodum ac pedetentim remittit. Rarum interim est, inverti horum in paroxysmo ordinem, ita, ut calor præcedat, sequatur frigus, &c. vid. *Primerosius de Febribus l. 2. cap. 4. pag. 98.* Unde pro hujusmodi symptomatum variationis ratione in paroxysmo plures accidentales intermittentium differentię emergunt, dum dicuntur febres vomitorię, siticulosę, famelicę, cardiacę, torminosę, anxiosę, tussiculosę, delirę &c. quibus addantur febres hysteriçę, i. e. quæ in paroxysmo conjunctę sunt cum pathematis hysteriçis, imprimis cum suffocatione hypochondriaca; quale exemplum videbitis in *M. A. N. C. Ann. 2. observat. 193. p. 295.* & tertiana soporosa in *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Append. pag. 45.* delira, in qua delirium melancholicum mox in principio paroxysmi adest, eodem verò remittente, & ipsum remittit; vid. *Marcellus Donatus in Hist. mir. lib. III. c. 14.*

Observandum hinc est: diversimodè febres degenerare, & in se invicem quasi transmutari v. g. frequenter observavi febres intermittentes ordinario modo affligentes, quæ post aliquot paroxysmos absque frigore & rigore prævio, solo calore ægris fuerunt mo-

lestæ: e contra occurrerunt tertianæ intermittentes, quæ in principio fuerunt simpliciter ardentes seu calidæ, sed post aliquot paroxysmos revera in typum suum ordinarium frigoris & caloris transmutatę sunt: sicut frequenter occurrit, ut intermittentes chronicę mutant formam, & declinantes solo horrore aut rigore crucient ægros, absque æstuationis superventu.

Dubium quidem hic quibusdam occurrit: An dentur febres intermittentes malignę? Siquidem has ipsas vix ac ne vix quidem natura sustinere posse videtur, quin turbas excitet continuas, vimque inferat corpori, non, nisi ægrè ferendam. Sanè, si grassantibus febribus, malignis etiam in intermittentibus omnia eadem symptomata observantur, quæ in aliis tunc temporis frequentioribus continuis & continentibus occurrunt, ac præterea in cujuscunque intermittentis paroxysmo crescente calore pulsus non est magnus, sed parvus & debilis, celer & frequens, signum ferè solet esse intermittentis malignę, imprimis si reliquæ modò allegatę una conspirent. Reverà non negandum videtur, cum observationes malignitatis in intermittentibus febribus indices non rarò in practicis occurrant, utut ab his murato nomine perniciosę vocentur: Conf. *Julius Cæsar Claudinus Resp. 2. Sennertus de Febribus l. 2. cap. 16. pag. 488. Memotius de Febribus mal. pag. 20.* Exemplum talium tertianarum & aliarum intermittentium malignarum præter Galeni testimonium *Epist. 7. Tom. 81.* videbitis in *Epiphanio Ferdinando Hist. 85* de Febre tertiana primo miti, quæ postmodum omnino maligna & pestilentialis facta fuit: in *Rhodio Cent. 1. observ. 9. & 10.* in qua convalescenti maculæ lividæ proruperunt: sic maculas petechiales in febre tertiana observavit *Marcellus Donatus l. 3. Hist. Med. Mirab. cap. 14.* Quin & Tertianas duplices primò & contagiosas epidemicas, deinde etiam simplices, sudoriferis imprimis curatas, videbitis in *Salmuth Cent. 3. observ. 51.* Item tertianam duplicatam malignam curatam, in *Riverio Cent. 3. observ. 78. Cent. 4. observ. 3. & 15.* Item aliam similem malignam Bezoardicis mineralibus curatam, idem habet *Riverius Cent. 4. observ. 36. & observ. à Pacheco comm. 4. pag. 260.* nec solum tertianæ, sed & quartanæ malignę observatę fuerunt; vid. in *Marcello Donato cit. lib. Item l. 7. cap. 6.* item quartanam malignam habet *Horstius lib. 1. obs. 12. & 15.* Addatur his *Fehrius Tract. de Scor. Cur. p. 72.* ubi intermittentem petechialem malignam recenset: imò de peste Londinensi testatur *Hodges*, ejus febrem nonnunquam per paroxysmos, quavis ut plurimum vagos, afflixisse.

(Kk)

Deni-

Tom. II.



Denique interdum epidemix grassari solent febres, intermittentes, sive vitio aëris, sive alimentorum contrahantur; exempla vid. in Willit. *de Febr. it.* Bartholin. *C. 2. Hist.* 56.

C A U S A E.

Hæ febres omnes intermittentes, cujuscunque sint typi, ejusdem tamen omnes sunt naturæ & essentix in radice; cognoscunt enim eandem omnino causam focum & fiendi modum, diversificantur saltem pro subjectorum, & hinc certarum quarundam circumstantiarum ratione, secundum rerum naturalium, non-naturalium, & præternaturalium varietatem, à quibus etiam causis postmodum tanta diversitas symptomatum in his emergit febribus: unde etiam earundem medendi ratio in omnibus est una, eademque, saltem accidentalium symptomatum differentia nonnihil observetur.

Pater hoc ex eo, quia sunt invicem permutabiles, qualis permutatio non deprehenditur, nisi inter habentia symbolum, seu quæ invicem symbolizantur, h. e. quæ essentia conveniunt: sic non rarum est, febrem primò simplicem fieri duplicem, febrem quotidianam fieri tertianam: quartanæ quoque in tertianam subita mutatio, & vicissim tertianæ in quartanam, iisdem utrobique permanentibus symptomatis urgere videtur, utramque ab eodem humore generari, ut loquitur Piens *P. 2. de Febris pag. 96. & 234.* Nempe præsupposito spirituum motu & impetu, ceu universali efficiente motuum, tam animalium, quam præternaturalium morbosorum, adeoque febrium causa proxima materialis seu occasionalis investiganda, quæ ratione radicalis originis & foci ventriculorum & primas vias, ratione verò alterationis primariæ & inhaesionis massam sanguineam speciatim afficit.

Arbitror ergo causam hanc proximam esse fermentum præternaturale in ventriculo genitum, quod subindè massam sanguineam alterando ratione motus fermentativi immutati, & partes nerveas primarum viarum vellicando, ratione acrimoniæ hostilis occasionem, & præternaturali spirituum motui, & hinc cæteris omnibus symptomatis, quorum complexus paroxysmum constituit, suggerit. Fermentum hoc, ceu admodum activum, salinæ erit profapiæ, ejusque acidæ; conspirant enim in hoc & supervenientia symptomata, & una eademque intermittens cura. Originem ejus, tanquam causam omnium febrium intermittens remotam, fabricari puto in stomacho & primis viis, ex vitiata nempe ventriculi digestionem immutata, vel depravata; sive in fermento digestivo, sive in alimento assumpto, hæreat vitium. Notum namque est, non-nullos antea sanos ex usu rei averfatæ, vel ipsis aliàs horridæ, inci-

disse brevi post in febrem; sicuti è contra ex usu rei appetitæ intensius, ac summè, utut apparenter etiam noxiæ, diuturnis correpti febribus optimè nonnulli sanentur. Confirmat hoc, quod vel levis error in dicta & curatione commissus, aut febres recidivare faciat, aut eadem adhuc durante insigniter exacerbare aut etiam duplicare soleat. Nec rarum etiam est, quosdam se curare in his febribus sola pertinaci ac statuta inedia, è contra alii curantur excessivo potu, sive sequente vomitu, sive sequente largiore & profusione sudore; exempla passim sunt obvia, quædam saltem enarrabo: novi hîc mulierem, quæ ultra tres menses conflictata fuerat cum tertiana, sub longo medicamentorum abusu: ipsa denique correpta appetitu halecis, illum, Medico licet non connivente, avidè devoravit, & exinde præter spem & opinionem febre curata fuit: Novi hîc aliam mulierem, quæ naturaliter averfabatur caseum: huic cum clam, & ipsi nescienti tantillum casei cum aliis cibis fuisset oblatum, ipsa brevi post nauseâ correpta, & vomitu mox subsequente, febre tertiana 17. hebdomades afflictâ, à qua nec ipsa potuit curari, nisi quod aliquando intense similiter appeteret halecem, quò comestò ipsa similiter sana evasit: facit huc exemplum Wieri *in observat.* de quodam, qui, 21. halecibus semitostis esitatis, liberatus à quartana evasit: sic novi hic virum, qui esu anguillæ, quam naturaliter abhorret, & nonnihil invitatus comederat, in febrem tertianam, ultra quadrantem anni durantem incidit.

Non ergò putandum est, ex distinctis visceribus affectis, ut falso quidam dicunt, distinctas etiam exsurgere febres, dum tertianas ex vitio hepatis & bile, quartanas ex vitio lienis ac succo melancholico, quotidianas solum ex stomachi vitio oriri volunt. Nam in principio harum febrium hæc viscera ut plurimum sunt salva & sana, utut diuturnis redditis his febribus, aut pertinaciter resistentibus iisdem, subindè viscerum talium tumores aut scirrhi, præsertim in quartana, nempe per figentia nimis seu paroxysmum cohibentia, superveniant; adeoque non ex causa radicali, sed potius hos tumores & viscerum labefactiones sub diuturno febrium cursu, tanquam producta morbosa ex læsa massæ sanguineæ crasi supervenisse certum est. Interim concedo facilè: infarctus tales quorumcunque viscerum, item alia corporis vitia, v. g. suppressa menstrua, & aggravare aliunde natas febres, & obstinatiores reddere, aut crebriori ac faciliori recidivæ occasionem subministrare, propter cachexiam terè habitualem & dyscrasiam in massa sanguinea regnantem, & etiam sanos ad easdem disponere posse: ita tamen, ut ipse fomes febrilis, & talium morborum autor, fabricetur in

sto-



stomacho. Dum vero materia peccans seu fermentum febrile delitescens, ex errore primæ digestionis genitum, exlerere se incipit, plus minus vellicat partes nerveas & membranaceas ratione aciditatis hostilis, hinc eorum spasmus, frigus, horror & rigor, modò major, modò minor, succedunt: In rigore enim primario vellicatur panniculus carnosus & ferè universum membranarum corporis, in specie abdominis systema, unde & frigus intensum, imprimis in abdomine & lumbis percipitur. Etiam stomachus & intestina, & his connexa vasa cholodocha & pancreatica vellicantur, ut ob id contenta sua quocunque modo constituta convulsivo motu copiosius egerant, ex quorum plus minus naturaliter constitutorum concursu oriunda effervescencia non tantum varia abdominis symptomata contingunt, sed hæc ipsa effervescendo & regurgitando in stomachum, eundem in principio & incremento stimulant ad crebras & violentas istas vomitiones.

Fermentum interim hoc febrile sanguini permixtum simul activitate sua naturalem ejus motum fermentativum pervertere, hinc spirituum vitalium debitam emersionem & volatilisationem aliquantisper sufflaminare, nec non debitam incalescentiam ejusdem primitus impedire potest. (instar vini denuò ebullitionem molientis, turbari tunc videtur massa sanguinea; hinc enim in statu pulsus parvi minusque vehementes esse solent) donec ipso fermento cum sale volatili oleoso sanguinis ad præternaturalem effervescenciam concitato oriatur per totum corpus incalescentia ista insignis, cum sanguinis turgescencia, æstu & ardore, pulsu magno, frequentiore, vehementiore & celeriore, donec materia fermentativa vitiosa omninò subacta, & instar fecum in vino præcipitata, quasi, & à reliquarum partium consortio liberata, seroque copioso per calorem attenuato imbibita, copioso urinae fluxu, aut, quod frequentius, effuso sudore quasi critico excernatur. Hinc etiam in paroxysmo collecta urina sanorum est similis, vigente adhuc fermentationis motu, quæ post paroxysmum collecta crassa, turbida, ac copioso sedimento onusta, solet excerni.

Ex dictis noto: ex acido & sale volatili urinoso, in sanguine quasi effervescente, totam paroxysmorum historiam esse explicandam; ita quidem, ut frigus, horror & rigor; ipsaque febris, primario dependeat ab acido vellicante membranas abdominis particulas, speciatim stomachum & intestina tenuia, quæ convulsivo impetu quatuntur, & in consensum rapiunt cæteras membranas partes. Simile quid observamus in assumptione rerum ventriculo inimicarum, v. g. medicamentorum amarificantium, &c. quibus haustis afficiendo Archeum & hinc genus ner-

volum, rigorem experimur simillimum horri febrili, unde Germani, *Er erschüttert sich davon*. Acidum autem in intermittentibus vellicans testatur talium febrium cura (1) per alcalia vel absorbentia, fixa aut volatilia, rigorem sensibiliter imminuentia: (2) Quod rigor & frigus potentissimè sedentur per olea destillata, tam intus assumpta, quàm extra præcordiis illita; penetrante enim suo sale volatili oleoso, destruunt acidum, vellicans partes membranofas ventriculi & intestinorum, & mirabiliter rigores sopiunt: (3) Opiata, sensilitatem partium, & inde dependentes convulsivos motus sopientia, eodem rigores placant.

Calor paroxysmorum verò est æstus in febribus ordinariò ferè urgens, quod oriatur ab acido fermento in massa sanguinea per vitiosam & inordinatam fermentationem cum ejus sale volatili oleoso, ita quidem, ut acidum minus prædominetur, testatur: quod acida, imprimis nitrata, ut Antimoniatum, Vitriolatum, i. e. arcanum duplicatum, Nitri dulcis, &c. optimè æstuationes compescant, figendo & coercendo tam acidum volatile, quàm sal volatile oleosum acre indeque natam effervescenciam intensiorem, & ita nimios tumultus compescendo.

Certum interim est, à laticibus hepaticis & pancreaticis in principio paroxysmi in intestina effusis, atque vehementer invicem turgescenciam inducentibus, non tantum modò aggravari paroxysmum, sed multa etiam abdominis symptomata induci. Nempe ab utrisque acrioribus vomitus crebrius repetentes originem ducunt: à succo pancreatico acidior, & bile minus oleosa, intenditur frigus abdominis & circa lumbos in latere dextro, ubi intestini duodeni infinguntur ductus: ab utrorumque acriorum intensiori effervescencia æstus ac ardor in abdomine molestus nascitur, ut ægri tales subindè dicant, & monstrent locum sub hypochondriaco dextro: *es breñe sie im Leibe*: Ex iisdem fontibus non rarò flatus hypochondriorum; item ex flatibus subsistentibus intumescencie, inquietudines, & præcordiorum anxietates, & imprimis, si simul afficiatur stomachus & infletur; distentis plus minus hypochondriis difficiles respirationes ac insignes angustia; item dolores sub costis nothis, &c. nascuntur: quibus symptomatis medetur clyisma aut ante paroxysmum, aut in principio paroxysmi applicatum. Acidum in corpore abundans famelicas inducit febres. Cætera symptomata, ut cephalalgia, agrypnia, deliria, sitis, &c. ex sanguine æstuante, spiritibusque animalibus intensius calefactis, indeque fortius agitatibus & perturbatis, originem ducunt; ariditas linguæ ob absorptionem lymphæ salivæ linguam humectantis. Quod si adsit saliva, eaque simul salsa nimis insignitet intèditur sitis.

(Kk 2) Obler.

Observanda etiam hic est differentia febrium intermittentium, v.g. Tertianarum in nothas & legitimas. Legitima seu exquisita ex pura & sincera bile fieri vulgò dicitur, in qua rigor est insignis, corpus veluti pungens, sitis & æstus magnus, vomitus bilioli, &c. accessio longissimè est 12. horarum, 7. circuitibus ad summum judicatur: primus est debilis, secundus fortior, &c. quartus fortissimus, postea paulatim remittit. Tertianæ verò nothæ dicitur, quæ ex bile cum pituita, seu, ut ego interpretor, ex materia acida viscida permixta oritur, accessiones ad 16. vel 18. horas extenduntur, rarò 14. circuitibus solvitur, sæpiùs ad aliquot septimanas excurrit, calor in eâ minus pungens est: Vid. Poterius *de Febribus* l. 1. cap. 27. Uno nomine: tota ratio differentia consistit simpliciter partim in constitutione massæ sanguineæ, partim fermento febrili plus minus libero aut impedito: liberum enim nec impeditum, adeoque acrius, potentiùs quidem agit, & graviora intert symptomata, sed citiùs saturatum & enervatum febrim finem imponit: Impeditum verò vel propter fomitem, aut vehiculum, cui inhæret, viscidius atque tenacius, adeoque, ut vulgò vocant, pituitosum, vel in subjecto, cujus massa sanguinea alique ejus humores temperiores, chylosiores, adeoque viscidiores existunt, minus se exerere potest, adeoque mitiora quidem symptomata, sed diuturniores paroxysmos, febresque etiam magis chronicas solet inducere.

Quicquid sit de differentia febrium in nothas & legitimas, saltem ex diversitate paroxysmorum modò enarrata colligere possumus, quod, quò acrius est, & volatilius, adeoque activius fermentum febrile, eò acutior, h. e. brevior, sive gravioribus symptomatibus stipatam, inducere febrem: contra, quo inertius est & minus activum fermentum tale. Id quod in specie evenit, quando pro fomitem, in quo nidulatur, habet humorem viscidum & glutinosum, eò minus acutam, sed diuturniorem, & mitioribus comitatum symptomatibus fore febrem: ex quo etiam quotidianarum præ tertianarum & quartanarum præsertim diuturnitas æstimanda; ita ut, quò diuturnior sit febris, eò viscosum magis ac glutinosum fomitem fermenti in primis viis existere, putandum est; indeque in acutioribus magis absorbentia, vulgò præcipitantia dicta; in diuturnis verò seu chronicis incidentia & abstergentia magis conveniunt.

Fermentum dum dixi, occasione febrium intermittentium innuo hoc ipso, non magnam materiæ molem, sed interdum minimum quoddam miasma, activum tamen & penetrans, indeque efficaciter alterans. Unde etiam Sennertus vult, quod quoddam miasma fermentativum hæreat in massa sanguinea, quod revocet paroxysmos febriles, &

quod à Poterio dicitur seminarium febrile, ut genuinus focus non sit in sanguine. Hinc, præsertim in febribus diuturnis, non semper videtur adesse talis materiæ morbificæ moles, ut in principio interdum accidentariò simul adfuerit, uti jam etiam Celsus monuit, cui natura tunc ex consuetudine videtur febrem continuare: videturque hoc confirmari experientià ex eo, quod tales febres diuturnæ sint subindè levissimæ, imprimis quartanæ, ita, ut paroxysmus admodum tolerabilis ultra horam unam alteramvè non duret, ægro interea optimè habente, cum interim tales febres non ad annum, non ad biennium, sed ad quinquenniū & decenniū, imò ad 30. annos duraverint. Exemplum tertianæ per 30. annos durantis recenset Spigelius *de Febre semitertiana* l. 2. c. 13. & Balduinus *Ronsseus Epist.* 13. p. m. 50. item Wierus *in suis obs.* aliquot exempla quartanarum ultra 30. annos durantium: similiter mentionem facit febris 3. mensium Riverius *Cent.* 3. *obs.* 49. & sic porro. Quis ergo ex fomitem adeò copioso tantâ febrium diuturnitatē velit derivare? Unde etià subinde tales febres citra notabilem materiæ peccantis excretionē, v.g. per terrorem, aut similem subitanæ alterationem, & motus corporis vel animi curari solent: sic ex terrore subitaneo quartana aliquot annorum & ferè incurabilis fuit curata, ut refert Boyle *in Philos. Exper.* p. 219. Vid. etiam Valeriola l. 2. *obs.* pag. 123. ubi refert: quartanam contumacissimam, multisque remediis etiam non curabilem, quæ subitâ irâ & excandescencia ægri fuit curata, item Schenkius *in obs.* de sene quartanâ afflicto, qui sub aqua demersus fuit curatus. Hinc est, quod opiata tales febres tutò & certò curant, cum consuetudinem talem naturalem turbent: & quomodo quæso subinde curarentur tales febres per amuleta ridicula, aut acria rubificantia, extrinsecus admota? Sic refert Salmuth *Pent.* 3. *obs.* 81. p. 364. de tertianis diuturnis curatis per amuletum, factum ex charta linteo inclusa, cui fuit inscriptum:

Ein Fuchspelz und ein Marder-Hut  
Sind beyde vor das Kalte gut.

item Timæus von Guldenslee *in Cas.* 20. l. 8. de quartana cum schedula curata: *Gett Fleisch glegt gute Suppen.*

Imprimis tamen observetur in regione nostra, ut habeatur ratio semper mali hypochondriaci vel scorbuti, quippe his ut plurimum se jungunt febres: Et uti scorbutus est Protheus, ac omnibus ferè se associat morbis, ita etiam non rarò Febribus intermittens. Nam ubi adest febris erratica intermittens, ibi semper debet esse suspicio latentis scorbuti, adeò, ut dubitem, an febris sit erratica, quæ non sit à scorbuto, & fomitem habeat in stomacho. Scorbuti etiam præsentiam in febribus intermittens, ut & continuis, arguunt anxietates præcordiorum, dolores lancinantes artuum,



artuum, aut etiam dolores vagi abdominis aut convulsivi, ante aut in paroxysmo, aut in frigore aut in calore affligentes; quibus tamen ut plurimum in principio aut in incremento paroxysmi vomitus materiae nunc flavæ, nunc viridis superveniunt; uti etiam maculae quaedam in paroxysmi statu & sine se exhibere solent; quæ quidem rarissime petechiales sunt; frequenter tamen maculae istæ, nunc lividae, nunc rubidae, nunc majores, nunc minores, nunc cum sudore efflorescentes, post sudorem verò denuo evanescentes. Arenulae etiam quasi rubrae, facile tamen friabiles, in fundo maculae hærentes, & undique parietibus ejusdem se affligentes, infallibilè complicati scorbuti sunt signum: Nam sunt salia concretata vitiosa acido salia, crystallisata; sunt friabiles, non duræ, ut calculosorum.

Febres periodicæ nunc statâ redeunt horâ, interdum etiam nunc citius, nunc tardius redeunt, & dicuntur anticipare, ita ut, si hodie paroxysmus febrilis tertianæ intermittens patientem invadit horâ pomeridianâ tertiâ, tertiô die invadat circa meridiem horâ duodecimâ præter propter; quod autem ut plurimum accidit in principio febrium: vel dicuntur postponere, ita, ut hodiernus paroxysmus eveniens circa horam tertiam pomeridianam, redeat circa septimam pomeridianam diei tertiæ, idque ut plurimum in morbi declinatione.

Anticipationis talis vel postpositio 3. ferè habet causas:

1. Robur spirituum validius vel debilius.
2. fermentum febrile magis vel minus activum in volatilitate & acrimonia.
3. fomitem seu vehiculum materiale magis vel minus viscidum, inagis vel minus copiosum, &c.

Ex his recursus varietas deducenda, atque pro causarum modò dictarum ratione etiâ prognosis anticipationis aut postpositionis instituitur.

Præ cæteris typum mirabilem habet Marcellus Donatus l. 3. *Hist. Med. Mirab. cap. 14.* de quadam febre, quæ primâ vice diei hora 1. secundâ vice hora 2. tertiâ vice hora 3. & sic successivè usque ad primam horam noctis: deinde ordine retrogrado à prima hora noctis ad 24. tam diei, hinc à 24. ad 23. 22. dam & usque ad primam horam diei (nam fuit Italus, unde ad horologium Italicorum hos paroxysmos observavit) usque; dū penitus extincta fuit.

Quod autem attinet febrium multiplicationem, quando simplex fit duplicata, triplicata, quadruplicata, &c. oriuntur hæc ipsæ ex duplici fõre:

1. Ex errore curæ,
2. ex errore diætæ,

#### I. Ex errore curæ:

1. Quando Medicus vel adstantes propinant intempestivè specifica febrifuga, imprimis sigentia; intempestivè dico: h. e. non præmissis præmittendis, nec expectatis coctionis signis; adeo ut ante quar-

tum paroxysmum non videantur talia absorbentia vel sigentia propinanda esse. Sic e. g. Becher ex usu pulveris ex ebore l. Δ & δ diaphoretico in medio paroxysmo mox duplicatam incurrit; sigitur ex parte, non ex toto fermentum febrile, unde quasi altera medietas motu inchoato pergit, dum altera sequente demum die volatilis quasi denuo facta naturam irritando paroxysmum stimulat. Nempe bene observandus est progressus fixitatis, ad statum volatilitatis fermenti febrilis in ordinario febrium motu per frigus, æstus & sudorem: quamdiu fixum est fermentum, frigus urget & contumax est febris: quamdiu resolutum & volatilifatum, æstus, donec saturatum mediante sudore dimittatur: hinc intermittentes ardentes omnium brevissimæ rectè tractatæ & quò majus frigus, eò diuturnior paroxysmus. aut febris ipsa, ut in quartanis: hinc aromata in statu profunt attenuando & resolvendo, &c.

2. Inconsideratus opiatorum usus ante paroxysmum, non raro etiâ febres multiplicat.

3. Acriorum, præsertim aromaticorum solventium, item purgantium acriorum ac vehementiorum, præsertim vegetabilium usus ante coctionis signa, quæ ipsa movent quidem causam materiale, sed non promovent, resolvendo exsuscitant, sed non enervant fermentum febrile, facillimè, præsertim in quartanis, multiplicat febres. Verissimum enim est; quartanam in principio blandè esse tractandam, ne simplex in duplicem, aut triplicem, aut etiam continuam lentam mutetur.

#### Actandem

4 Quando ægri volunt, ut subito quacunque ratione abigantur febres, tunc loco simplicis sæpe duplex aut triplex emergit.

II. Errore diætæ exasperantur vel multiplicantur febres, quando ægri, v. g. imminente paroxysmo, non habent stomachum vacuum, vel ante absolutum perfectè paroxysmum præmaturè aut nimis avidè, imprimis carnes, comedunt; vel quando intermissionis die copiosiora alimenta assumunt, cum per vicium intemperantiæ morbo semper nova materia suppeditetur, uti eruditissimè differit Ronsetus l. 4. vel sudorè fluentè supprimunt, vel fructus horæos, aut alia similia facile fermentescibilia quocumque morbi tempore assumunt.

Recidivæ crebriores febrium aut degenerationes in alios morbos plus minus chronicos, ut lentas, icterum, chlorosin &c. fere oriuntur (1.) ex perversa cura, quando fixis vel copiosius vel maturius usurpatis concentratum nimis fuit febrile fermentum. (2.) Quando ægri redeunte appetitu huic nimis indulgent, tam in quanto, quam quali pec-

(Kk 3) cantes,



cantes. (3.) Quando nimio potu frigido, præsertim  $\nabla$  cum vino aut juleporum sub cursu morbi vel paroxysmi tempore nimis refrigeratur ventriculus; tunc enim levi ex occasione ob cruditates morbus recidivat. Hinc Beccherus quater ex hac causa recidivam patiens curabatur per pulverem ex ana lapidum cancrorum, piperis albi gr. xii. cepit in hau-  
 stu vini Hispanici ante paroxysmum; (4.) Quando febres intempestive tolluntur, tum aliud quid agens quasi natura fermento febrili alios affectus, vel recidivam, si potest, excitat.

#### P R O G N O S I S.

In Prognosi primariò attendenda est natura febris, secundariò ratio urinæ.

Quoad naturam febris: quæcunque intermittens maligna & pestilens est pessimæ notæ & periculosa; quamvis enim evidentes habeant intermissiones, ægotantes tamen non rarò è medio tollunt, ut dicit Riverius in *Praxi de Febris*.

Benignæ sunt absque periculo, minusque periculosæ quartanæ, quàm tertianæ, utut contumaciores & diuturniores existant; cum è contra tertiana intermittens sit gravior & brevior: quæ, ut rectè dicit Hippocrates *sect. 4. aph. 57*. si legitima fuerit, septem ad summum circuitibus finitur; modò æger fuerit obsequens, nec hic, nec Medicus errorem committant.

Tertiana, quò magis est notha, quò magis mitis & lenta, eò est diuturnior, curatu difficilior ac periculosior. Legitima 7. circuitibus finitur. Nothæ verò ut sunt frequentiores, sic magis periculosiores, & curatu difficiliores, quæ subindè ultra 14. periodos extenduntur; quando verò nec illo tempore curantur, concludendum est: errorem vel ab ægro, vel à Medico commissum fuisse.

Utut autem benignæ periculosæ non sint, si tamen vel ab ægro vel à Medico error committatur, in lethales morbos degenerare possunt, ut rectè dicit Willisius *de Febr. c. 4. p. 139* Facile enim sunt curabiles, quæcunque ex fuerint, etiam quartanæ, modò tempestivè cura adhibeatur, & viscera interan sint salva.

His præsuppositis: si febris in principio non occurratur, ut plurimum evadit chronica: quò verò diuturnior est, eò magis ad cachexiam disponit.

Speciatim tamen tempus durationis ex urinis aliquo modo cognosci potest, in quibus cruditatis ac coctionis observatio, utut non adeò necessaria sit, ac in continuis acutis, tamen propter evacuationem, & hinc specificorum legitimũ usum imprimis observanda.

Omnis enim urina in principio solet esse tenuis: quo magis successivè crassescit, eò tutior aut etiam brevior innuitur morbus.

Imò dicunt: si in principio urina sit cruda, paulò verò post nubeculam albam habeat seu encorema, bonum esse; quarto enim paroxy-

smo terminari febrim: sin vero urina sit pauca, rubicunda, sine nebula seu encoremate, vel non perfecta coctionis signa se offerant, quod tunc ad septimum usque paroxysmum extendatur febris, aut præter febris longitudinem invita solutio, cum metu nempe recidivæ, vel febris in alium morbum diuturnum generatio metuenda sit.

Observantur hæc in urinis aliquandiu post paroxysmos collectis: nam omnes, quæ in paroxysmo excernuntur, crudæ esse solent; in paroxysmo enim mediante fermentatione fit coctio, quæ eo finito ceu facta in urinis se exhibet.

Si in tertianæ secunda accessione omnia fuerint fortiora, in tertia verò remittant, quarta accessione febris penitus cessabit; sin verò in quarto paroxysmo omnia sint graviora, adeoque morbus sit in statu, & in isto symptomata remittant, septimo morbus finietur.

Febris tertiana, quamdiu anticipat, tamdiu est in incremento; postquam verò postponit, adest ejus declinatio.

Quando copiosi sudores manant post paroxysmos, interdum in urina vix sedimentum apparet, & res est ubique sine suspitione: contra, si contrà.

Convulsiones in paroxysmo febrili non sunt ita metuendæ, uti in continuis & malignis.

Febris intermittentibus quibuscunq; supervenientes viscerum quorumvis scirrhi, vel tumores his cognati (quod sit in febris diuturnis malè curatis) malum innuunt, & ferè hydropem, aut icterum lethalem tandem superventurum prælagiunt, aut chronico quasi cachectico vitio successivè enervantur ægri.

Intermittentes in genere, quo magis in typo sunt constantes, & minus variant, eò diuturniores solent esse; contra, si variant & anticipant, celerioris existunt solutionis.

Vomitibus in intermittentibus benignis, sive in principio sit, sive in statu, optimum signum est; innuit enim valorem naturæ.

Quoad quotidianas: cum longæ sint, & à fomite pertinaci foveantur, interdum non vacant periculo. Nam, cum ventriculus ferè insigniter afficiatur in hac febre, & ipse sanguis crudus, ac ferè aquosus constitutus sit, facile, qui ea detinentur, in cachexiam, hydropem, ac alios periculosos affectus, item in carum ac lethargum, dilabuntur.

Quotidiana diurna nocturna est periculosior, cum tempus medium deficiat.

Diurna est febris quotidiana, & durat dies noctesque 40. nonnunquam ad aliquot menses; quo citius tamen signa coctionis se exhibent, & paroxysmi breviores sunt, ac in principio eorum vomitus adsit, brevior ac salubris promittitur eventus.

Si vires & appetitus in quotidianis valde dejiciuntur, accessiones sunt longæ cum nudo sudore, parva salutis spes superest.

Sol.

Solvuntur quotidianæ frequenter vomitibus & dejectionibus viscidis seu pituitosis, tum per dolores articulorum metastasi ad articulos factâ.

Si æger in quotidiana quotidie somnolentior evadat, ac gravitatem quandam circa caput sentiat, carum seu lethargum affuturum notat: Vid. Forestus l. 3. *Observat.* 21.

Quartana quidem omnium est tutissima propter longa intervalla; ex accidente tamen, quando multiplicatur, vel quando ob errorem ægri aut irritationem medicamenti exasperatur, degenerando in alios morbos periculosa esse solet.

Quartana senibus plerumque est lethalis, iis præsertim, qui sexagesimum annum transgressi sunt.

Quartana longissima est omnium febrium, & sæpe ad aliquot annos extenditur. Masfarias vidit Romæ matronam, quæ 22. annos eâ laboravit. Ut plurimum tamen ultra annum non exporrigitur.

Quartana si est constans in typo, vel ad interitum, vel ad graviora tendit symptomata; si vero fuerit inconstans, ad salutem vergit, & subinde motu veluti critico evacuat.

Quartanæ si fuerint inveteratæ, medicorum scandala fiunt, & raro, nisi circa anni mutationes, nempe circa solstitia & æquinoctia, solvuntur; his enim anni temporibus subinde curantur, tam sponte quàm etiam arte. Primus terminus est proximum solstitium seu initium quarti mensis; quo si non solvatur, extenditur ad proximum æquinoctium seu septimum: mensem imprimis quartana autumnalis extendi solet usque ad æquinoctium vernum, quo præsentem, ut plurimum cessat sponte.

Quartanæ æstivæ sunt breviores autumnalibus; hæ vero sunt admodum longæ, imprimis si ad hyemem vergant.

Mulieres etiam quartanâ diuturnâ correptæ, dum gravidæ fiunt, sponte ferè liberantur.

Diuturnior talis quartana, si ægri non exactum observent regimen, præsertim quoad potum, aut si conjunctus sit, aut superveniat pertinacior cujusdam visceris affectus, ægrotos in hydropem, aut contumacem scorbutum conjicit: sicca corpora ad hecticam & tabem deducit.

In omni intermittente, si intermissionis die constet appetitus, bonus est: si prostratus malum est signum, & raro tales evadere asserit Hofferus in *Hercule Med.* pag. 293.

De urinis quartanariorum refert Joel, quod extra paroxysmum sint aqueæ, ac tenues & pallidæ: sed die paroxysmi magis ad obscuram flavedinem vergant, & ante solutionem febris, ut plurimum turbidæ & nigre excernantur.

Nigræ ergo urinæ in quartanis cum euphoria ægri salutare sunt signum, imprimis sub cursu morbi; innuunt enim coctionem vitiosorum humorum, utut in aliis morbis sit periculosum: si vero huic adjuncta sit virium prostratio, lethale est; labascitenim jam natura.

Modus eventus intermittentium est, quod vel transmutentur in febrim continuam, vel malè curatæ abeant in febrim continuam acutam vel hecticam: interdum, sed rarius, ad mortem deducunt, vel perfectè successivè curantur; nunc per inediam, nunc per sudores, quæ solutio omnium tutissima; aut urinas copiosas: quò etiam suo modo pertinent pustulæ & ulcuscula, subinde in malignis in labiis & naribus, & alibi erumpentia, de quibus vid. Willisius: utut non solvant febrim, fausto tamen ut plurimum omine erumpunt; innuunt enim fermentum eliminari in paroxysmo febrili per recolligentem se naturam. Nam & Salmuth refert l. 2. *Observ.* 2. tertianas intermittentes per inflammationem labiorum criticam aliquoties finitas; seu artificialiter, dum legitimis evacuationibus, aut sudoris educatione curantur: sicut etiam icteri die critico, paroxysmo quarto vel septimo, & cum euphoria ægri supervenientes varii, vel nigri, vel flavi interdum tertianam & quartanam solvunt.

#### C U R A.

In hac eò imprimis respiciendum est.

1. Ut fomes materiæ morbosæ in stomacho & primis viis resolvatur & removeatur incidentibus, abstergentibus, evacuantibus, &c.
2. Ut fermentum febrile, & inde nati paroxysmi febriles, debitis appropriatis, aliàs dictis specificis, enerventur & tollantur, fermentationem inordinatam febrilem corrigendo, & præcipitando; hinc per convenientes vias, quò ipsa vergit natura, in specie tamen per sudorem, evacuetur.
3. Ut symptomata varia, sæpè in cursu urgentia, maturè removeantur aut mitigentur, in specie rigor, calor & sitis. Et
4. Denique dyscrasia sanguinis reliquorumque corporis fluidorum, ac atoniæ viscerum sub cursu morbi supervenientes, alterantibus debitis corrigendæ & restitundæ.

Dictis scopis satisfaciendi conducunt optimè medicamenta salina; tam artificialia lixivialia, nunc acria seu pura, nunc temperata seu composita salia, ex acido & alcali constantia; quàm salia naturalia, in medicamentis febri-fugis insigniter amaris ac acerbis sale volatilif  
nunc



nunc acriori, nunc oleoso turgentibus, latentia. Uno nomine: sufficiunt febribus intermittentibus curandis alcalia, & quæ ad horum naturam propius accedunt: talia nempe, quæ acidum destruere & viscidum incidere valent, sive volatilia, sive fixa. Nempe præmissis quibusdam digestivis salinis, v.g. tartaro vitriolato, aut sale hypochondriaco, instituaturs ante paroxysmum vomitus, isque interdum repetendus, quippe sine quo quartanam curare impossibile est; aut si hoc minus consultum fuerit, die paroxysmum insequentem proximè antecedente fiat purgatio. Præmissis talibus universalibus vel per superiora, vel, ubi opus fuerit, per inferiora purgantibus, usurpentur diaphoretica, tam vulgaria, quàm appropriata specifica febrilia, ante paroxysmum, diebus intermissionis eadem digestiva & primas vias abstergentia, & postmodum appropriata alterantia aromatica, vulgò aperientia dicta, v.g. essentia absinthii, elixyr febrile, elixyr proprietatis, & carminativus de tribus, &c.

Pro talibus ergò scopis legitimè obtinendis observentur quædam cautelæ, quæ instar cynosuræ sint: ante omnia I. observetur, ut maturetur cura. Intermittentes enim omnes incipientes facilè curantur, ut ultra 3. vel 4. paroxysmos non durent; si invalescunt, sunt contumaces. Quò autem diutius duraverint, eò contumaciores ordinariò fieri solent, & eò magis ægrum, ejusque humores ac viscera lædunt, & cachexiam aliæque mala post se relinquunt. Maturetur autem cura secundum dictam methodum, motum naturæ promovendo, non autem eundem impediendo.

Observ. II. Venæsectio est inutilis apud nos ad curandas febres intermittentes: Nam febres tales ferè diuturnæ magis fiunt, ac certè paroxysmus venæsectionem insequens ut plurimum gravior esse solet, & diuturnior reliquis antecedentibus: & cui usui institueretur eadem? sanè quò plus urget æstus, eò celerior promoveretur naturæ opus in sudore, remittit sic æstus, ægerque percipiet levamen. Interim prout casus variant, contingere potest, ut aliquando per accidens necessaria videatur venæsectio, siquidem Ballonius l. 2. *Epidem. & Ephemer. Constit. astru. anno 1579. pag. 269.* & ex illo Bonettus in *Pharo Medicorum* pag. 196. tertianam ob intermissam venæsectionem lethalem superveniente spontè nimia excretionem observavit. Salvatellæ sectio à quibusdam ad quartanam commendatur, incerta tamen ex ratione: interim tamen Ballonius c. l. pag. 194. quartanas diuturnas per salvatellæ sectionem curatas observavit.

Observ. III. Vomitus ac vomitoria in omnibus febribus intermittentibus insigniter sunt proficua, speciatim in quartana, in qua

præ cæteris auxiliantur; unde etiam in gravioribus repeti possunt. Certum namque est, quod radix curandarum intermittantium, imprimis quartanæ, consistat in vomitu, ut dicit Freitagius in *Aurora Medicor.* Propinanda sunt hæc ipsa, vel una alterave, aut tribus horis ante paroxysmum, ut cum natura oppugnent febrim, quo sic ante paroxysmum negotio suo fungantur. Quod si verò vires ægri, bino febris & vomitus labori non videantur sufficientes, die paroxysmum proximè antecedente propinentur. In primo febrium principio præprimis conveniunt, nec nocent interdum in progressu, vel ipsa etiam declinatione; sic enim chronicas ac contumaces febres repetita exhaustiunt. Indicantur in specie, quando ægri conqueruntur de saporibus, aut amaris aut nauseabundis in ore, præsertim dùm manè evigilant: nam tales sapores oriuntur ex stomacho, & sæpe contumaces reddunt febres; aut quando inquirunt, se per sentiscere quasdam angustias aut molestias in præcordiis, wann es ihnen so angst und bange ums Herze ist / & monstrant regionem epigastricam, sectigationes, cardialgias, ructus, &c. aut quando nausæ vel vertigines, tam inquam extra paroxysmum ægros vexant, &c. Interdum in principio paroxysmi moventur humores vitiosi in primis viis ad os ventriculi; & refert Primerosius de *Febribus* l. 3. cap. 2. pag. 195. *Vidimus convulsiones & cardialgias singulis paroxysmis enatas ex bile æruginosa, quæ ejusmodi bilis vomitu sedabantur.* In his & similibus causis vomitoria in specie sunt necessaria. Nec quenquam deterreat, quod ægri sponte sua in tertianis subinde vomant: nam talis vomitus subinde est symptomaticus, acrimoniam succorum in primis viis commotorum & effervescentium insequens, adeoque verè est symptomaticus, ac rarò sufficiens: in quocasu, si cætera respondeant, etiam vomitorio, sed blando, sufficiens vomitus promovendus. Imprimis utilis est vomitus in quotidiana, ita, ut vix sit febris, in qua sit utilior, & quidem si necessarium videatur, per intervalla instituendus. Cautione tamen opus est, ne ventriculus aliàs debilitatus adhuc plus debilitetur. Peractâ vomitione, confortante aliquo, vino generoso, aqua cinamomi cum vino aut cydoniata, aut simili extra vel intra usurpato, stomachus roborandus, aut tumultus ab emetico excitatus sedandus per opiata blanda, electuarium diascordii, theriacam: v. g.

℞. ▽ rubi Idæi ℥i.

cinam. ~ suof. ℥ij.

conf. alcherm. ℥i.

Laud. opiat. gr. j.

Syrup. papav. simpl. ℥ij. vel ℥iij.

M.D.S.



M. D. S.

**Starch-Träncklein.**

Vomitoria desumuntur ex triplici regno : vegetabili, animali, & minerali.

Inter vomitoria vegetabilia primo excellit asarum, quod nulli cedit, & ceu singulare febrifugum antiquarium commendatur à Strobelbergero *Tract. de Februm cura.* Usus ejus est, ut propinetur radix pulverisata mediocriter: (minutissimè enim sudorem tantum movet) à ʒj. ad ʒj. aut scrup. iv. præscribatur cum paucis pipere, aut granis 8. vel 10. salis ammoniaci, in haustu vini calidi, aut ʒ vel decocto centaurii min. aut cardui benedicti hora una aut altera ante paroxysmum: bene se tegat æger in lecto; sic enim & vomitus, & post hunc largus sudor simul sequitur.

Post asarum est aqua nicotianæ, quæ ab ʒss. ad ʒj. propinata ciet vomitus, uti videri potest in Hartmanni *Praxi Chym. cap. 238. de febre tertiana.*

Denique radix vincetoxici & ipsa commendatur tanquam vomitorium in principio intermittentium.

Verum omnibus quibuscunq; vomitoriis præferuntur meritò vomitoria antimonialia ritè parata: in infuso calix vomitorius Rulandi; vel infundatur crocus metallorum ad gr. viii. in vinum Rhenanum aut absinthides ab ʒss. ad ʒj. vel ʒij. prout tamen mitior vel etiam fortior est crocus metallorum plus minus, (nam variant præparationes) vinum probè filtratum potest sumi:

Vel ʒx. *Mercurii vitæ* gr. v. ad vi.

Infund. in *vin. Rhenano* vel *absinthite* q. l.

Stent in loco tepido per ʒ, mane.

ʒx. filtraturæ ʒj. ad ʒx. vel ʒijss. D. S.

**Brech-Wein.**

Item tartarus emeticus Mynsichti & Ludovici potest dari in substantia.

ʒx. *Tartari emet. Myns.* gr. ij. vel iij.

*Ois amm. simpl.* aut *depurati* gr. xii. ad xv.

vel *lapill. 3 præp.* vel *facchar.* gr. vi.

ad ʒss. M. S.

**Brech-Pülverlein.**

Detur in vehiculo calido.

Vel in forma pilularum.

ʒx. *MP. de tribus Ruffi* gr. xv.

*Tartari emet. Myns.* gr. ij. vel iij.

*scammon.* ʒat. gr. j.

cum *ess. cent. min. f. pilula:* S.

**Brech-Pillen auff einmahl.**

Oxyfaccharum vomitorium, seu syrupus vomitivus à ʒij. ad ʒvj. potest propinari in ʒ appropriata, vel vehiculo appropriato ante paroxysmum. c. g.

ʒx. ʒ *card. ben. vel cent. min. vel mentha vel fumar.* ʒij. vel ʒss.

*Syrup. emet. Angeli Sala* ʒij. aut syr.

rubi idæi emet. ʒss.

Tom. II.

*Syr. emitt. Nicotiane* ʒj. ad ʒij.

M. D. S.

**Brech-Safft.**

Capiatur pro dosi.

Multi commendant sal vitrioli vomitivum à scrup. j. ad ʒss: sed ego horreo; quia remanet aliquid subindè, quod in totum destruit ventriculum.

Fortissima vomitoria sunt ramenta unguum humanorum, quæ infunduntur vino: Colatura sumitur, & violentissimos vomitus movet, adeò, ut non nisi militibus & rusticis propinari queat propter nimiam violentiam. Fuit secretum castrense Cnceffeli.

Observat. IV. Purgantia paulò fortiora, præsertim vegetabilia, in principio intermittentium febrium esse nociva: turbant enim massam sanguineam; & dum cruda adhuc est urina, nil noxii expurgant, sed vires debilitant, & febrim efferatorem reddunt: in progressu quidem nonnihil eliciunt, sed simul colliquefaciunt corpus; ideò sunt nociva. Imò febris intermittens in continuam per ineptam purgationem degenerare potest: adeo in genere potenter purgantia, præsertim acriora vegetabilia, in febribus intermittibus sunt vitanda: Confer. Septalius in *animadvers. l. 5. pag. 104.* Imò in statu etiam, ubi copiosa sedimenta onerant urinas, si violentior eadem fuerit instituta, insigniter debilitat ægros, & paroxysmos insequentibus aut graviores, aut certè febres diuturniores reddit. Possunt hæc febres curari sine ulla purgatione per inferiora, dum vomitus in principio ex primis viis, aut sudor post paroxysmos, aut in declinatione universali erumpens sufficienter, quicquid heterogeneum est, ex sanguine expurgant. Quod si in principio aut in progressu morbi, ubi contumacior videtur febris, instituenda videtur purgatio, idque vel, si vomitoria locum non habeant, vel ob vomitionem impeditam, vel ob suspicionem excrementorum in stomacho aut intestinis stabulantium, sit ea lenis, ultra 3. vel 4. aut 6. sedes non proritans: id quod in omnibus, præsertim in quartanis, observandum est.

Genuina purgantia ex antimonialibus aut Mercurialibus desumenda sunt. Nam hæc dum evacuant, simul corrigunt vomitem & fermentum febrile, adeoque appropriatissima sunt, quorum defectu mitiora vegetabilia, in specie sennata & rhabarbarina substitui possunt. Imprimis ab initio leviter tractandæ sunt quartanæ, nullumque forte medicamentum in earum principio adhibendum; quia hæc ex simplici non rarò duplicem & triplicem faciunt quartanam. Imò observatæ fuerunt quartanæ, quæ ab adhibitis remediis diuturniores & contumaciores redditæ fuerunt, iis, qui absque medicamentis relictæ fuerunt,

(L 1)

citius

citius reconvalescentibus. Vid. Ballonius in *Pharo Med. Bonetti pag. 198.* qui optimè usum purgantium in quartanis determinat, nempe levioribus in initio utendum: Cocta quando est materia, ac jam aliqua ex parte mitigari cœpit, locus valentioribus esto; quoniam humores tenaces, crassi, viscosique leniorem vim effugiunt, &c. Propinantur convenientissimè tertio vel quarto paroxysmo absoluto, idque intermissionis die intertitanis, in quartanis verò die ante paroxysmum; vel etiam purgans propinetur ipso paroxysmi die, sed ita, ut effectum suum ante paroxysmi invasionem compleat: de quo vid. notabilis locus in *Deckers Comment. in Bar-bette Praxin, pag. 106.* Imò in contumaciore febre etiam appropriatis salinis incidentibus & abstergentibus remediis permista purgantia ante paroxysmum propinari possunt, in specie scammonium, quod tunc ferè alterantis simul vicem obtinet, speciatim in quartanis ante paroxysmum simul cum aliis propinanda purgantia: vid. Ballonius *cit. l. pag. 195.* Hœferus in *Herc. Med. pag. 291.* Sic etiam in recidivis appropriatis absorbentibus & abstergentibus scammonium additum felici cum successu usurpavi.

Sufficit vel solus tartarus vitriolatus, grano uno vel altero purgantis cujusdam acuat.

℞. *Tartari Olati* gr. xii. ad xv.

*scammon.* ℥at. gr. iij.

*troch. alb.* gr. ss.

℞. *destillati anisi* gtt. ij. vel *caryoph.* gtt. ij.

M. f. *pulvis*, qui 5. vel 6. sedes blandè movet. S.

**Purgier-Pulver auff einmahl.**

Quoad iufula: ex omnibus optimum est blandum iufulum sennæ cum sale tartari, acidum vitiosum corrigente, quod non tantum Riverius *l. 1. observ. 39. 40. l. 2. observ. 66. l. 3. observ. 32. & Cent. 4. observ. 84.* sed & alii quamplurimi Autores, in specie in quartana, commendant; vel solitarium, vel cum helleboro nigro; aut ejusdem extracto in quartanis, aut cum rhabarb. in tertianis sociato; e.g.

℞. *fol. senn. s. st.* ʒiij. vel ʒss.

*sem. anis. contus.* ʒi.

*sal. tart.* ʒj. ad ʒss.

Infund. in f. q. *card. bened.*

Stent in loco tepido per ʒ: manè

℞. *Colat.* ʒiij. adde

*card. cinnam.*

*Syrup. de pom. Reg. Sab.* ʒss.

M. S.

**Purier-Träncklein.**

Quæ potio 4. vel 5. vicibus purgat, est coloris elegantissimi, & saporis minimè nauseabundi.

In tertianis additur rhabarbarum ʒj. & imminuitur dosi sennæ.

Vel ℞. *fol. senn. s. st.* ʒj.

*rad. helleb. nig. crud.* ʒij.

*polypod.* ʒiij.

⊕ *tartari* ʒss.

Ebulliant leniter in sero lactis per subsident. depur.

*colatura* ʒiv. adde

℞ *tartari* ʒj.

*Syrup. fumar. compos.* ʒss. M.

De hoc semper duobus horis ante paroxysmum, nec non diebus intercalaribus, bonus haustus calidè assumatur, imprimis in quartana,

℞. *Com. absinth.* mss.

*fl. cent. min.* p. ij.

*rhabarb. el.* ʒij.

*rad. elleb. nig.* ʒj.

*cinnamom.*

*sal tartari* ʒ ʒj.

Infundantur in *card. fumariz:*

Stent in loco calido per noctem:

manè ℞. *colatur.* ʒiij. adde

*Syrup. rosar. solut.* ʒiij.

M. pro dosi. S.

**Purgier-Träncklein auff einmahl.**

Vel extractum hellebori junctum cum extr. Martiali, in forma potionis præscribi potest.

℞. *card. bened.* ʒj. vel ʒij.

*Extract. helleb. nigr.* ʒj.

*Extr. ois aperit.* ʒss.

*troch. alb.* gr. ij. vel iij.

*syrup. de pomis* ʒvj. M.

℞. *card. bened. vel menth.* ʒvi. vel ʒj.

*cinnam.* ʒss.

*Gumm. anim. cum acet. solut.* gr. xvj. ad ʒj.

*Qi Olat.* gr. vij. vel ʒss.

*scamm.* ℥at. gr. iij.

*extract. troch. alb.* gr. ss. vel gr. j.

*syrup. rosar. vel de pom. solut.* ʒij. M.

Quod si pilulæ placeant, usurpetur extractum Catholicum Andernaci à gr. xv. ad ʒj. item in eadem dosi extractum panchymagogum Crollii; item extractum helleb. nigri, & acuatum cum aliquot granis scammonii pati. Alias etiam pilulæ tartareæ Quercetani, item pilulæ de ammoniaco Quercetani, & similia alia nota convenirent, e.g.

℞. *MP. de Amm. Querc.* vel *Qear.*

*Ejusd.* gr. xv. ad ʒj.

*extracti absinth.* gr. vj.

*scammon.* ℥at. vel *extract. troch. alb.* gr. ij.

M. f. *pilula.*

Omnium optimum purgans, præsertim in febribus chronicis, est ʒ dulcis. e.g.

℞. *MP. de tribus Ruffi.*

*Merc. dulc.* à gr. xv.

*scamm.* ℥at. gr. iij.

*extract. troch. alb.* gr. j. M. f. *pilula.*

Vel in forma Boli:

℞. *Con-*

℞. *Conserv. rosar.* ʒß.

*Merc. dulc.* ʒj.

*scamm. ʒat. gr. v.*

M. f. *Bolus. S.*

**Purgier-Zucker.**

Egregius hic est Mercurius duleis, quia viscida, pituitosa, cruditates chylosas, & inde lymphæ vitia imprimis evacuat; scammonium v. acrioribus, & uti vocant, biliosis, expurgando in primis viis conducit. Pertinet huc, præsertim contra quartanas contumaces, *Merc. dulcis* cum *Merc. vitæ* mistus ad imitationem Hartmanni *Praxi Chym. l. 1. c. 4. §. 1.* Vid. Cardilucius *Officin. Sanit. pag. 25.* sicut & Butyrum Antimonii in substantia sumptum etiam est conveniens purgans in febribus (adeest enim aliquid de Mercurio vitæ.) Nam quidam propinavit gutt. ij. butyri ʒij in haustu vini, & quidem Quartanario, & citra ullum incommodum alvum solvit: rursus sumpsit gutt. v. in vino, & purgatus est, & sudavit, febrisque soluta fuit.

Pertinet huc specificum empiricum pro febribus intermittens, præsertim in tertianis, vel simplicibus vel compositis.

℞. *Mechoacann. alb.* ʒij.

*grana piper. albi no. xxj.*

*lap. ʒ prap. ʒj.*

M. f. *Pulvis.*

Div. in 3. part. aqu. D. S.

**Eröffnende Fieber-Pulver.**

Propinandus in haustu vini calidi, imminente paroxysmo, expectando semper sudorem largum; plures febres diurnæ hoc ipso curatæ fuerunt.

Pertinet huc pulvis Comitæ de Warvvick, præsertim additione ʒis correctus, ante paroxysmum usurpatus, optimè conferens: ad cuius imitationem

℞. *Crem. tartari gr. xv. ad ʒj.*

*scamm. ʒat. gr. iij. ʒß.*

*ʒij diaph. gr. vj.*

M. f. *Pulvis.*

℞. *Corall. rubr. prap. vel lapill. ʒ prap.*

*ʒis absinth. vel Arcan. dupl. Myns.*

à scrup. ʒ. ad gr. xii.

*scamm. ʒat. vel prap. Brendel.*

gr. ij. l. iij.

M. f. *Pulvis.*

℞. *ʒis amm. gr. xv. ad unc. j.*

*pulv. jalapp. scrup. ʒ. ad gr. xv. M.*

℞. *Arcan. dupl. scrup. ʒ.*

*ʒij diaph. gr. v.*

*corall. rub. prap. gr. iij.*

*pulv. jalapp. gr. vj.*

*scamm. ʒat. gr. ij. M.*

Observ. V. Clysteres ad alleviandam paroxysmorum atrociam, ubi copiosi flatus aut borborygmi, aut ardores abdominis, aut dolores in centro mesenterii circa vertebrae lumbares, aut angustia in præcordiis, quæ sudo-

Tom. II.

rem sæpe impediunt, sunt insigniter proficui; item in ventriculi symptomatibus ante vel in paroxysmo, v. g. vomitu nimio, anxietatibus, item gravibus aliis symptomatibus, ex acrioribus & mordacibus æruginosis succis ad ventriculum delatis, difficulter vomentibus, id quod eò magis observetur, ubi alvus aliàs est obstructa, aut excreta indurata sunt, uti istud subinde evenit in hypochondriacis & similibus. Fiunt saltem ex leniter abstergentibus aut carminantibus cum sale tartari acuat. In scorbuto vel febre scorbutica, ubi dolores abdominis convulsivi aut lumborum graviores adsunt: ex lacte iidem salubriter fiunt, vel solo, vel solvatur in eo saccharum aut mel, adjecto vitello ovi; sicuti & in hypochondriacis & hystericis, ubi urgent varia symptomata, clysmata talia ex & cum terebinthina maturè injecta multum conferunt,

℞. *spec. carmin.*

*emollient. ʒ Mj.*

*ʒis cin. clavellat. ʒij. ad ʒijj.*

*scor. red. ʒij. ʒj.*

Coqu. in l. q. ʒ simpl.

Colaturæ ʒviii. adde

*Elect. bacc. laur. ʒj.*

*ʒo destillat. tereb. ʒj.*

M. pro Clystere.

Semper horâ unâ vel alterâ ante paroxysmum Clysteres injiciendi sunt, & sic operantur cum euphoria ægri.

Observ. VI. Rarissimè aut ferè nunquam, nisi interdum per accidens, febres intermittentes solis universalibus, ut purgantibus, vomitoriis, venæsectioni, aut similibus cedunt; quin his administratis, alia insuper alterantia appropriata seu specifica, aliàs febrifuga dicta, requirantur, quæ fermentum febrile corrigunt: malam crasin massæ sanguineæ emendant, & inquinamenta à paroxysmo relicta resolvunt, eaque per diaphoresin blandè excludunt, aliàs in pejus ruit malum. Experientia testatur, diaphoretica in intermittens plus præstare, quàm purgantia, vel quæcunque alia, monstrante hoc naturâ in fine paroxysmi beneficio sudoris finientis tragœdiam: eaque sunt partim communia præsertim salina, tam fixa quàm volatilia, quàm appropriata, quorum vis in destructione fermenti febrilis acidi, ejusque per sudorem exclusionem ferè consistit: uti est v. g. Chyna Chynæ contra tertianas, item Mistura Crollii contra tertianas, &c. quæ vulgò dicuntur præcipitare, figere, effervescentiam sistere, &c.

Eligenda autem sunt diaphoretica pro varietate symptomatum in paroxysmis distincta: in specie aromatica nimis acria, etiam theriacalia, vitanda sunt, ubi intensior æstus affligit ægros, utpote in quo casu fixa magis conducunt: vid. Beccherus *Phys. subterr. l. 1. pag. 393.* (L 1 2) Ac



Ac sanè febris intermittens tutò curata potest dici nulla, nisi per sudorem successivè finierit.

Obs. VII. Quicumque autem febres intermittentes rectè curare velit, eum cavere oportet, ne corpore non prius purgato, per quæcunq; loca id fiat, à diaphoreticis & specificis initium faciat, maximè in principio; quin potius præmissis universalibus hæc exhibeantur; quia aliàs specifica intempestivè adhibita, febres reddunt compositas. Vomitorio semel præmissio tutò possunt ea dein dari.

Obs. VIII. In omnibus intermittentibus febribus, aliisque periodicis morbis, æger ante paroxysmum, & in eo, neque cibum neque potum assumat; sed necesse est, ut stomachus sit vacuus. Quicquid enim paroxysmus in stomacho invenit, hoc omne digestionis primæ in paroxysmo penitus deficientis errato in scorias febriles, novo fomiti inservientes, corrumpit. Alvus tamen utilissimè exoneratur ante paroxysmum, vel per se, vel speciatim injecto, si opus est, Enemate, uti ante monui.

Obs. IX. Medicamenta febrifuga semper, non præsentè, sed instante febre & ita ante paroxysmum exhibeantur, unâ vel duabus vel tribus horis ante eum; vel in vehiculo calido; vel, si non placet, in haustu vini absinthitis, vel alio medicato, promovendus dein sudor (si enim is non sequitur in fine paroxysmi, accedunt cephalalgia) idque repetatur sæpius in duobus, tribus vel quatuor paroxysmis, licet non ampliùs redierit paroxysmus suo tempore, ut sic junctis viribus cum natura operentur. Ingruente autem sudore in fine paroxysmi, non nimis stragulis contegatur æger, ne animi deliquia incurrat, aut vires nimium exhauriantur.

Obs. X. in tertianis perniciosus seu malignis misceantur semper alexipharmaca: qualia sunt antimonialia fixa, item Bezoardicum minerale, maximè Martiale & Joviale; quia magnum periculum subest. Interim tamen, cum febris maligna simulare possit tertianam, cautus sit Medicus, præsertim cum lingua sit aspera & nigra, omniumque virium nimia & subitanea prostratio. Forsan huc respexit Johannes Toll in *Praxi Schenckiana* à pag. 290. dicens: *Cum paroxysmus tertiana est cum malis accidentibus & debilitate cordis, ita, ut putetur à materia venenata esse, dentur infirmo in paroxysmo seminis citri aliquot grana, & videbitis effectum mirabilem &c.* Nempe emullio seminis citri additis appropriatis alexipharmacis & absorbentibus, non foret inutilis.

Observ. X. Spiritus salis ammoniaci volatilis universale est febrifugum, & repetito usu præprimis rarò fallit in quartanis, aliisque intermittentibus; si æstus adsit: unde hic in genere antiquartius vocatur. Sane

Θ\* simpl. uti die intermissionis aut ante paroxysmum usurpatus frigus intendit, aut ardentès in ordinarias mutat: ita in vigore paroxysmi cum potu ordinario propinatus multum remittere facit æstum; sed vix ante statum morbi ita usurpandus est. Loco ejus enim ipsum sal ammoniacum depuratum, seu ejus flores, vel loco ejus Θ catholicum, convenienter præmissis universalibus, seu uno alterovè paroxysmo jam delapso, ʒj. vel ʒʒ. ad summum propinantur. Verùm obiter noto: non facile, nisi pro subitaneo usu, esse præscribendum sal ammoniacum conjunctum cum salibus lixivialibus fixis: ratio, quia aliàs ex Θle ammoniaco avolat omne sal volatile, relicto sale fixo acido, quod se jungit cum lixiviali, & fit sal tertium falsum. Ipsas febres scorbuticas etiam Θis ammoniaci mitigat, in quibus cum ana vel dimidio ~ cochlearia optimè permiscetur. Usurpari potest tam ante paroxysmum, si ritè paratus fuerit à ʒʒ. ad ʒj. prout acrior vel debilior fuerit, quàm etiam die intermissionis ad gtt. xx. xxx. vel xl. bis in die in ~ quadam appropriata. Loco hujus Galenici in simplici febre intermittente & scorbutica succos aut decocta absinthii, cardui bened. centaurei minoris, & similium plantarum febrifugarum amarificantium, Θe volatili oleoso acri præditarum, ad imitationem Rulandi usurpari solent: loco quorum ~ Θis ammoniaci longè melior est.

℞. ~ salis amm. ʒj.

ess. opii gtt. xv.

M. pro una dosi ante paroxysmum.

D. S.

Gieber: Essenz auff einmah.

℞. Aqua card. bened. vel fumar ʒj. ad ʒʒʒ.

spir. salis amm. ʒʒ. ad ʒj.

laudani opiat gr. iʒ. vel ij. vel ess opii gtt. iix.

syrupi card. bened. ʒij. vel ʒʒ.

M. pro dosi.

℞. Aqua card. bened. vel mentha unc. j.

spir. salis amm. ʒʒ.

lapill. canc. præp. vel corall. rubr. præp. vel

ʒii diaphor. scrup. ʒ. ad scrup. j.

ʒo destillat. caryophyll. vel succ. gtt. ii.

syrup. card. bened. l. cortic. aurant. ʒii.

M.

Addi etiam potest laud. opiat gr. j. si frigus urget.

℞. Aqua card. bened. [vel cent. min. vel

menth. unc. j. vel unc. ij.

cinnam. drachm. ij.

spirit. salis amm. drachm. j.

ʒii diaph. gr. xvj.

syrup. card. bened. vel debeson. drachm. ij.

M. D. S.

℞. ~ antiscorbut.

cardui bened. à ʒʒʒ.

spirit.

*Spir. cochlear. sal amm. à ʒi.*

*Lapill. 69. prap.*

*Specif. febril. Strobelbergeri à scrup. j.*

*Laud. opiat. gr. ij.*

*Syrupi sceloryb. Foresti ʒi. M. S.*

Mistur auff etliche mahl in scorbutischen Fiebern.

*R. salis amm. gr. xv.*

*Lapill. 69. prap. scrup. ʒ.*

*Laud. opiat. gr. j. M. S.*

Fieber-Salz.

Detur ante paroxysmum.

Vel præscribatur *Θ ammoniacum cum Θ absinthii* vel aliis fixis, cum absorbentibus acidum.

Obs. XI. Præter *Θ ammoniacum* *Θ is ammoniaci* *Θ ia* fixa seu cineritia vegetabilium, cardui bened., fumariz, centaurii minoris, absinthii, artemisiz, imperatoriz, adeoque quælibet alcalia omnes febres intermittentes, imprimis quartanas & febres scorbuticas, tollunt vi sudorifera, si solitariè à ʒʒ, ad ʒj. imò ad ʒʒ. ante paroxysmum dentur; imò horum ʒj. adjunctum ʒ diaphoreticum, antihecticum Poterii, flores ʒii diaphoretici, aut flores *Θ is*, quos Hoffmannus pro tertiana perfectè curanda in *clave* pag. 370. commendat, bis vel ter ante paroxysmum in  $\nabla$  cent. min. vel vino cum sudoris eruptione propinando; item lapilli *Θ*. præparati, qui & ipsi turgent *Θ* volatiliter temperato, aut corallia, mater perlarum, aliaque concreta terrea, & quidem dimidiata ad illa dosi, pro circumstantiarum tamen varietate variandâ, rarò fallunt. Nempe fit interdum, ut nimis citò propinatus spir. *Θ is ammoniaci*, aut ubi adhuc nimium adest frigus, minùs prosit, & tunc in subsidium vocanda salia fixa, & ante paroxysmum propinanda, continuato spiritu isto intermissionis tempore. Nam ubi magis urget frigus & rigor, quàm æstus, *Θ ia* hæc fixa lixivialia sunt convenientiora, simulque fortiter sudores movent, nec facillè febrium duplicaturam admittunt; sed ubi excedit æstus, spir. salis amm. convenientior, quod per subitaneum sudorem æstum mitigat; item *Θ latus*, potio Crolliana, & similia. Hinc in febribus frigidis fixa utramque absolunt paginam, & Barbette in sua *Praxi* salia fixa incinerata in cura tertianæ & aliarum febrium intermittentium longè præfert usui chinæ chinæ, tanquam tutiora & promptiora sine recidivæ metu: Item volatilia salia animalium, spir. urinæ, aut hujus loco spir. salis *æci*, *Θ volat. C. C.* aut viperar., quæ in quartana à scrup. ʒ. ad gr. xij. propinari, vel commodè aliis permisceri possunt. Præscribendi modus est hic:

*R. corall. rubr. prap.*

*salis absinth. gr. xv.*

*Laud. opiat. scrup. ʒ. ad gr. j.*

*Θ destillat. caryoph. vel bacc. junip. gtt. ij.*

M. f. Pulvis.

Detur ante paroxysmum.

*R. salis absinth. vel card. bened. scrup. j.*

*corall. rubr. prap. vel lap. 69. prap.*

*vel ʒii diaph. scrup. ʒ. l. gr. xij. ad*

*gr. xv.*

*Laud. opiat. gr. j. vel ij. M.*

Hora una vel altera ante paroxysmum in vehiculo calido assumantur, expectando post paroxysmum sudorem.

Item contra quartanam:

*R. salis absinthii scrup. ij.*

*Lapill. 69. prap. ʒʒ.*

*ʒii diaphor. scrup. ʒ.*

M. pro 3. dosibus.

*R. corall. rubr. prap.*

*salis absinth. à gr. xv. ad scrup. j.*

*Θ fulmin. gr. vj.*

M. f. Pulvis.

Detur ante paroxysmum.

De auro fulminante vid. Hæferus in *Herc.*

*Med. pag. 292.*

Helmontius commendat ad vim febrilem salia ex plantis cephalicis: majoranæ, salviæ, rorismarini, &c. sed non fixa, verum volatilia, in *Tract. de Febr. §. 4.*

In forma potionis,

*R.  $\nabla$  card. bened. ʒj.*

*salis absinth. scrup. j.*

*cent. min. scrup. ʒ.*

*julepi rosar. ʒiij.*

M. pro dosi.

*R.  $\nabla$  cent. min. ʒj. vel ʒʒ. ad ʒij.*

*Θ absinth. ben. vel card. gr. xv. l. scrup. j.*

*Lapill. 69. prap. scrup. ʒ. vel gr. xv.*

*Syrupi card. bened. ʒʒ.*

M. f. Potio ante paroxysmum assumenda.

Quod si urgeat rigor, gutt. xij. & ei destillati caryophyllorum vel baccarum juniperi addantur.

Observ. XII. Quod attinet salia falsa fixa ut *Θ latus*, arcanum duplicatum Mynsichthii, sal hypochondriacum digestivum, *Θ ia* tum, item tartarus nitr. Bartholetti, quem vocat suum alexipyretum universale, seu sal tartari imbibitum cum spiritu nitri: mirè in omnibus intermittens conveniunt, imprimis in principio morbi tanquam digestiva & absorbentia ante universalia valde utiliter usurpantur: Imò iis continuatis felicissimè sæpè febres profligantur. Diebus enim intermissionis pro abstergendis primis viis, & removendo paulatim, si quis sub sit, fomite febrili, multum valent bis quotidie à gr. xv. ad scrup. j. & ʒʒ. in appropriato vehiculo usurpata; ideò die intermissionis ante vomitoria danda sunt, maximè sal hypochondriacum digestivum, quod digestivum quartanarium vocat Sylvius:

(L1 3)

*R. Salis*

℞. *Salis hypochondr.* scrup. β.  
*absinth.* gr. v. M.

℞. *Salis xci depur.* ʒj.  
*nitri ʒiati* scrup. j.  
 M. div. in 2. part. aqu.

Manè vehiculo calido, & vesperti in frigido capi-  
 piendo; uti ante paroxysmum commodè et-  
 iam propinari possunt:

℞. *arcan. dupl.* gr. xv.  
*lapill.* 69. *prap.* gr. xii.  
*ʒi de still. bacc. junip.* gtt. ij. M.  
 ℞. *arcan. dupl.* gr. xv.  
*ʒis absinth.*  
*corall. rubr. prap.* a scrup. β.  
*laud. opiat.* gr. j. M.

Pertinet huc potio specifica febrifuga Crollii,  
 cujus Riverius creberrimam fecit experien-  
 tiam, ut videre est in *Obs. ejus C. 1. obs. 20. &*  
*26. item Cent. 4. observ. 2. 12. 15. 25. & Praxi*  
*lib. 17. cap. 3.* Ludovici in *Pharmacia* mixtu-  
 ram hanc extemporaneam loco ʒi ʒlati  
 commendat; & sanè non contemnenda est.  
 Commodè etiam lapilli cancerorum, & dia-  
 phoreticum & similia addi possunt.

Observ. XIII. Salia nitrosa, & cum ʒo  
 parata omnia medicamenta, optimè sistunt  
 ardores nimios cum paucò vel nullo rigore  
 in paroxysmo, aut etiam ante cum admini-  
 strata; imò spirit. ʒi dulcis in declinatione  
 paroxysmi, aut finito jam paroxysmo, sen-  
 sibiliter febres mitigat. Præter hunc ʒi ʒia-  
 tum ʒi ʒlatum, seu arcanum duplicatum,  
 præ cæteris in scorbuto convenit, adeoque  
 febres scorbuticas optimè tollit, hinc in fe-  
 bribus intermittentibus cum nimio æstu

℞. *Nitri ʒiati* scrup. j.  
*arcan. dupl. Myns.* scrup. β. M.  
 ℞. *Nitri ʒiati* scrup. β.  
*arcan. dupl.* scrup. j. vel drachm. β.  
*antibect. Poterii* gr. ix. vel xii.  
 M. pro 3. dosibus.

Propinetur duabus horis ante paroxysmum,  
 aliquot diebus repetendus, præsertim, si ur-  
 gent diebus intercalaribus phlogoses.

℞. *arcan. dupl.* scrup. j.  
*salis volat. succin.* gr. iv. ad scr. β. M.  
 ℞. *Nitri ʒiati* drachm. β.  
*ʒii diaphor.* scrup. β. M.

Observ. XIV. Acida, an qua talia febris  
 intermittentibus convenient, dubito.  
 Sanè ex iis commodum adeò singulare hau-  
 riri vix potui, nec nisi interdum, dum nimis  
 urget æstus, pro hoc nonnihil compescendo,  
 mediante fixatione humorum effervescentiu-  
 um convenire solent: v. g. si in febre inter-  
 mittente rigori intensior superveniat æstus,  
 vel cum clamorosa siti junctus, vel cum diffi-  
 cili sudoris eruptione, vel quando ipsa febris  
 intermittens tota est ardens, vel quando fe-  
 bris intermittens plus minùs ardens, in con-

tinuas degenerare velit, optima sunt, decli-  
 nante non nihil paroxysmo, aut saltem non  
 ante ejus statum, tunc sub ardore paroxysmi,  
 & indè nata gravi anxietate, sequens mistura  
 confert:

℞. *Aqua rubi Idai* unc. iij.  
*succi rub. Idai* ʒiij. ad ʒvj.  
*ʒii diaphor.* ʒj.  
*syrup. rubi idai* ʒβ.  
 ~ ʒi dulc. q. s. pro grato sapore. M.

Hauriatur subinde cochleatim: mirabili-  
 ter ardorem compescit, sitim minuit, sudo-  
 rem provocat.

Præter acida itidem conveniunt in paro-  
 xysmo misturæ ex lapillis cancerorum cum  
 aceto; e. g.

℞. ∇ *card. bened.*  
*cichor.* a ʒiβ.  
*aceti vini* ʒvj.  
 ~ *theriacal. simpl.* ʒiij. ad ʒv.  
*lapill. & pulveris.* ʒβ.  
*syrupi de ʒ. radic.* ʒj. M.

℞. *Aqu. acetos.*  
*fumar.*  
*menth.* a unc. j.  
*aceti rubi Idai vel sambucin.* ʒvj.  
 ~ *theriacal. simpl.* ʒiβ. ad ʒij.  
*lapill. & prapar.* ʒij. ad ʒj.  
*syrup. cort. aurant.* ʒiij.

M. f. Potio cochleatim usurpanda.

Est quoque proficua, quando angustia &  
 anxietates præcordiorum, item flatulentia  
 & hypochondriaca abdominis symptomata  
 nimis urgent.

Observ. XV. Opium, & ex hoc legitima  
 fermentatione paratum laudanum, atque o-  
 mnia opiata, illegitimo usu omnes febres in-  
 termittentes pertinaces reddit, & è contra le-  
 gitimo usu citò tollit, mitigatque continuas;  
 sistit enim sensim vellicationes & motum tre-  
 mulum. Sed in rigore necesse est, usurpetur  
 præmissis universalibus, digestivis & evacua-  
 tivis, idque imprimis duobus in casibus:

1. Quando paroxysmi ex consuetudine  
 potiùs, quàm ex fomite morbofo per-  
 tinacius redeunt.
2. Quando graviora quædam, aut etiam  
 molestiora symptomata, durante pa-  
 roxysmo affligunt ægros.

Nunquam autem opiata solùm, sed sem-  
 per cum febrifugis usitatis quacunque forma  
 admisceantur, aliàs metus est, ne citò nimis  
 & solitariè usurpata simplices febres reddant  
 duplicatas aut triplicatas, aut sopiendo fe-  
 brim, graviolem recidivam postmodum in-  
 ferant:

℞. *arcan. dupl. Mynsichti* ʒj.  
*ʒis absinthii* ʒβ.  
*laud. opiat.* gr. ij. M.

Detur ante paroxysmum in vino ab-  
 sinthite.

℞. Ely-



℞. *Elixyr febril.* ʒij.  
*ess. opii* ʒss. M.

Observat. XVI. Cephalalgia raro post paroxysmum aut intermissionis die sunt molestæ, nisi suppressus in paroxysmo sudor easdem inducat: fit tamen in febribus nonnullis, imprimis scorbuticis, ut in primis paroxysmis nullus omnino sudor promanet, sed declinante jam febre hic vel spontè postmodum erumpat; ita, ut nocte dieque tales ægri interdum cum salute sudoribus quasi diffuant. Ergo pro cephalalgia tali vel sudor patienter expectandus, vel blando epithemate camphorato calido dictus dolor mitigandus.

Observat. XVII. Vesicatoria vel nuchis, vel carpis manuum applicata, febres diuturnas optimè exhauriunt, speciatim rigor ex eorum usu cessare solet; interdum penitus cessat febris. Applicantur die intermissionis, ut ita eorum operatio præveniat paroxysmo: Nam & Strobelbergeri emplastrum febrifugum vim nonnihil causticam, certè intensè rubificantem, obtinet. Sic quoque Poterius l. 2. de Febribus c. 23. pag. 109. refert, quod in quartana diuturna vesicatoria carpo admota interdum sint proficua. Quo etiam facit suo modo salivatio Mercurialis, quartanarios subinde radicatus curans, utur hoc reverà videatur remedium ipso morbo gravius: Confer. Ballonius *Pharo Med.* pag. 626. & 653. item Piens *de Febribus Part. 2.* pag. 273. Notabile est aliàs eos, qui aliquandiu intermittentibus laborarunt, promptissimè salivare, etiam ex aliquot granis ʒii dulcis propinatis. Hinc ad præcavendam talem salivationem purgatio promovenda, vel fortis sudor repetitus imperandus.

Observ. XVIII. Intermittentes diuturnæ, præsertim tertianæ duplicatæ, item continuæ paulò diuturniores, ita videntur alterare sanguinem & inde derivatam lympham, ut crassior, viscidior, & glutinosior eorum evadat textura; unde convalescentes tales adhuc febriculas lentas subindè experiuntur, aut saltem appetitus aliquandiu infauisto omine non debite redit. Febriculæ tali optimè ( præmissio interdum vomitorio, mucum primarum viarum eliminante ) per  $\Theta$  ammon. occurrere possumus: e. g. ejusmodi pulverem ante paroxysmum in diurnis febribus, ubi metus adest hecticæ, summè proficuum inveni, & hecticam averti.

Vel  
 ℞. *arcan. dupl.* gr. xii. ad gr. xv.  
*ebor. f.  $\Delta$ e scrup. ss.*

*Gießer-Pulver.*

Detur duabus horis ante paroxysmum. Anorexiæ verò per absinthii vel centaurei minoris continuarum qualemunque aliquandiu usum tolluntur.

Observ. XIX. Diuturnæ febres, item quæ per copiosa absorbentia, aut calcinata terrea

diutius usurpata, curatæ fuerunt, vix sine insigni viscerum labe, aut multiplicibus hinc resultantibus symptomatis, solent evanescere; unde & colicæ & hydropes, aut pedum saltem tumores, aut cachexiæ, subinde hos insequuntur. Talibus malis & præcavendis & curandis optimè interservit absinthium in decocto, essentia, succo, extracto, &c. frequentius usurpatum, aliaque congrua amara. Sanè crurum tumor oedematosus ordinario chronicis intermittentibus supervenit, præsertim, si copiosius biberint ægri, & parum sudaverint, vel si copiosius post curam febris citò se ingurgitent: sed parum in recessu habet hic tumor; internè etiam multiplici absinthii usu, externè verò chelidonii majoris recentis plantis pedum admotione facilè abigitur.

Observ. XX. Dum jam febris remittit universaliter, aut etiam alio tempore intermissionis die, vel etiam post febres chronicas, maximè profunt alterantia ex febrifugis vegetabilibus, ut præcaveatur vel curetur cachexia sub cursu morbi enata: ut essentia absinthii tartarisata, vel ex absinthio, centaureo minori, radice enulæ, aut cum  $\sim$ u tartarificato composita, cardui benedicti, centaurei minoris, liquor  $\sim$ æ foliatæ tartari,  $\mathcal{R}$  tartari,  $\mathcal{R}$  ʒii,  $\sim$  cochleariæ, elixyr stomachale, elixyr febrile Mynlichthii, vel D. Michaelis, elixyr proprietatis cum & sine acido, item paratum cum  $\sim$  salis amm. elixyr cachecticum,  $\mathcal{R}$  tartari composita,  $\sim$   $\Theta$ is amm. carminativus, similiaque alterantia, quæ acidum infringunt & bilem acuunt, massæ sanguineæ cratin emendant & stomachum corrigunt, propinentur: idque bis in die, manè jejuno stomacho, & vespèri ad 20. 30. vel 40. & 50. guttulas in liquore appropriato; v. g.

℞. *Elixyr. febrilis D. Mich.*

*Propr. à ʒi ss. M. S.*

*Gießer-und Magen-Mixtur 40. Tropfen.*

℞. *Ræ tartari acerr.* ʒii. vel ʒiij.

*Elixyr. propr. f. acido ʒij. M.*

℞. *Ræ tartari acerr.* ʒiij.

*Q. E. absinth. ʒj. M.*

℞. *Ræ tartari acerr.* ʒiij.

*$\sim$  carm. ʒj. M.*

Obs. XXI. Uti in intermittentibus febribus ante paroxysmum & in eo stomachus sic vacuus, ita tempore accessionis abstinendum est ab omni cibo & potu; si enim æger bibat potum frigidum, magis urgebit horror & rigor. In ipso tamen æstu calore urgente, aut paroxysmo jam nonnihil declinante & maximè, quando sudoris eruptio instat, potus paulò largior, non tamen nimis frigidus sed calidus, concedendus venit, isque quò calidior, cò liberalior; promovet enim sic egregiè sudorem, & promptius cedit febris.

Inte-

Interim pro potu singulariter convenit vinum & cerevisia absinthiaca in omni febre intermittente. Quod si metus scorbuti, vinum cochleariz, vel etiam vinum quoddam ex alterantibus aromaticis medicatum cum essentia absinthii, ~u cochleariz & similibus die intermissionis, vel declinante paroxysmo usurpandum. In Quartanis tamen parcissime bibendum est; nihil magis enim febres has contumaces reddit, quam nimius potus in paroxysmo, Crato planè in paroxysmo Quartanario potum interdixit, quod maxime curationi conferre asserit. Certè crebrior, præsertim cerevisiæ, potus diuturniores reddit has febres, mucum in primis viis, & hinc fermentum febrile in fomite augens.

Potus ordinarius sit vel aqua, vel cerevisia tenuis, vel secundaria cum vino absinthite medicata, aut saltem cum simplici vino ita correcta, vel, quod his præferendum, serum lactis probè depuratum, præsertim in scorbuticis, cui etiam commodè de succo citri aliquantulum instillari potest, aut loco horum decoctum tamarindorum cum passulis egregiè convenit. Julapia refrigerantia locum non habent, ubi calor proportionatus est constitutioni ægri, vel qualitati materiæ coquendæ, &c. multò minus, ubi minor est. In tali ergo casu satius est, si sitis adsit, concedere potum alias consuetum: sic qui vino adfuetus, nec in totum interdicens, quia consuetudini aliquid dandum, & magnum peccatum foret, ab uno extremo ad aliud prolabi. Quod si sitis nimis urgeat, simulq; æstus gravior oriatur, commodè potui ☉ vel simplex depuratum vel antimoniatum addi potest, supra quod nil melius desiderari potest, ita, ut aliquot drachmas quotidie ebibere sit licitum. Si accidat, ut, dato ☉ ☐ cum tanto ardore non mittatur, vel æger liberalius mingat, bono sit animo. In intermittentibus purè ardentibus monendi sunt ægri, ne nimium potum ingurgitent, aut quoties lubet. Præstat quidem potum liberiores concedere, modò dein expectent, usque dum sentiant, omnem ex ventriculo abiisse; si verò ægri sint inobedientes in hoc passu, optimum est, ut potum calidum bibant: si enim calidum biberent cum nitro dissoluto, calor magis refranatur & temperatur, à potu autem frigido magis incalescimus, quod videmus, cum ex ambulatione æstuamus & frigidum bibimus, verba sunt Lindani super Hartmannum: & imprimis convenit tunc potus imprægnatus cum spiritu ☉ dulci, aut instar Julepii propinquetur tunc infusum ex floribus cum ~ ☐ is acidulatum, c. g.

℞. flor. papav. errat.  
rosar. a mß.

Infund. in tßiß ☐ comm. aut flor. papav. errat. aut seri lactis depurati: aciduletur le-

niter cum ~u Sulphuris per campanam: stent in loco calido ad extract. Ræ: Colar. adde:

syrup. de jujub. ʒij.  
violar. ʒj.

M. pro Julepo: S.  
℞. Conserv. acetosell.  
flor. ros.  
tunica a ʒj.

Affund, s. q. decoct. rad. scorzonæ, cum C.C. vel ☐ appropri. dissolv. in mortario cum pistillo, vel indantur cucurbitæ clausæ ad unam vel alteram ebullitionem: coletur vel filtretur tepide.

℞. Conserv. flor. rosar.  
tunica.  
viol. a ʒß. ad ʒj.

succi ribium ʒvj. ad ʒj.

Affund, s. q. ☐ simpl. vel destillatæ cujusvis, dissolvantur in mortario lapideo cum pistillo clausoque vase leniter ebulliant. Colatura tßiß. adde

Ræ flor. bellid. q. s. pro grato sapore.  
Vel ad imitationem Hoffmanni in Clave pag. 400. ℞. Radic. acetos.  
tamarind. a ʒj.

Coqu. in l. q. aquæ font.

Colatura tßiv. infundantur,  
flor. ros. rubr. c. ~u ☉ dulci irro-  
rat. miiij.

stent in loco tepido: Ræ colata add.

syrupi ribium  
rubi idæi a ʒij. M.

℞. Aqu. acetos.  
cichor.  
endiv. a tß.ß.

succ. cydon. ʒß. ad ʒij.

Ræ flor. bellid. ʒij.

syrup. violar. q. s. M.

℞. Aqua font. 4b. j.

R. flor. bellid. ʒij.

syrup. ribium.  
rubi idæi a ʒij.

~ ☉ q. s. M.

Observ. XXI. In declinatione paroxysmorum, si spontè sudet æger, cooperiatur leniter: alioquin, nisi beneficio naturæ non erumpat sudor, ante paroxysmum quartum non provocetur, idque in tertianis: postmodum apparentibus coctionis signis in fine paroxysmi cieatur, & calidis linteis fricando abstergatur, ut eò melius fluat. In Quartanis ante coctionis signa nec profluunt; nec arte proliciendi sunt. Quod si ante talia signa sudet Quartanarii, equidem non supprimendū est sudor, aliàs graves dolores ostocopos inferre solet; de quo vid. Ballonius in Bonetti Pharo Medico pag. 199. Et sanè quælibet specifica mediante sudore febrem profligare solent.

Observ. XXIII. Frigora febrium quæcunque, earumque rigores, horrores & tremo-

mores, omnium optimè compescunt aromatica præsertim sub olei vel extracti forma usurpata: v. g. mirabiliter frigus & rigorem curant  $\mathfrak{d}$  destillatum caryophyllorum, cinnam. macis, baccar. juniperi, menthæ, &c. externè regioni præcordii vel stomachi applicata: Specialissimè autem oleum destillatum caryophyllorum & cinnamomi ad guttas v. vel vi. acutissimè penetrant, & sunt ferè nonnihil caustica; unde addita reliquis speciebus mira faciunt: imò intus assumpta cum appropriatis, quàm etiam externè ingruente paroxysmo regioni stomachali, spinæ dorsæ, & plantis pedum probè inuncta, applicato præcordiis latere probè calefacto: vid. Sylvii Praxis l. I. c. 30. §. 143. Oleum petræ quoque prodest contra rigorem febrilem, cujus guttæ aliquot ante paroxysmum propinandæ. Qui usum ejus internum nauseant, externè regioni stomachali illinant. Dicta olea sequenti modo præscribi possunt.

$\mathfrak{R}$ . Bals. Peruv. vel olei destillatibacc. junip.  $\mathfrak{z}$ j.  
Oleum destillat. caryoph.

macis.

succin. à scrup.  $\mathfrak{B}$ .

M. D. S.

**Erwärmender Magen-Balsam.**

$\mathfrak{R}$ . Olei express. nuc. mosch.  $\mathfrak{z}$ j.  
destillat. bacc. junip. scrup. j.  
caryoph.

macis à scrup.  $\mathfrak{B}$ .

M. pro balsamo.

$\mathfrak{R}$ . Olei destillat. bacc. junip.  
ror. mar. à  $\mathfrak{z}$ j.  
caryoph.  $\mathfrak{z}$ ss.

M. D. S.

**Erwärmend Fieber-Dehl.**

Inungatur dicto modo: qualis inunctio etiam interdum regioni lumborum, aut plantis pedum applicari potest: imò solus later calefactus plantis pedum applicatus rigores etiam solet imminuere.

Internè hæc ipsa symptomata optimè corrigunt salia fixa, extracta aromatica amara, extractum centaurii minoris, gentianæ cum aliquot guttis olei piperis, olea destillata acrida, & quælibet opiata: hinc mixtura ex theriaca cum specifico Strobelbergeri egregia, præsertim in casibus, quando intermittentes omnem calorem deponunt, & solo frigore molestæ sunt, seu cum algore fiunt. Item

$\mathfrak{R}$ . Salis absinthii scrup. j.  
matr. perlar. prap. vel test. ostr. gr. xv.  
piperis albi pulveris. gr. vi. vel vij.  
M. pro una dosi hora una aut duabus ante paroxysmum assumenda.

D. S.

**Erwärmend Fieber-Pulver.**

Sic etiam in febribus intermittens chronicis, in quibus ordinatio magis rigor ur-  
Tom. II.

gere solet, vulgus granorum piperis iix. xii. xv. ad xx. in grossa frustula concisa in haustu cochlearis aquæ vitæ simplicis vel anisati assumit aliquot horis ante paroxysmum, fausto cum successu; imò continuato eorum usu, quartanam quoque curant; si autem tardiùs, aut paroxysmo jam instante assumantur, æstus gravissimè intenditur. Juvenem novi 17. annorum, qui 70. grana leviter contusa pro una dosi ante paroxysmum assumpsit, & febris emanavit; utut post aliquot noctes diesque ex haustu cerevisiæ secundariæ frigidæ redierit, piperis tamen usu continuato se iterum curavit: e. g.

$\mathfrak{R}$ .  $\mathfrak{S}$ is absinth. gr. xv.  
lapill.  $\mathfrak{S}$ . prap. vel  $\mathfrak{S}$ is diaph. scrup.  $\mathfrak{B}$ .  
laud. opiat. gr. j.  
 $\mathfrak{S}$ o destillat. caryoph. gutt. ij. M.  
 $\mathfrak{R}$ .  $\nabla$  card. bened.  $\mathfrak{z}$ j.  
extract. gent. c. u vini facti  $\mathfrak{z}$ j.  
salis absinth.  $\mathfrak{z}$ j. vel spir. salis  $\mathfrak{x}$ ci  $\mathfrak{z}$ ss.  
M. f. potio. S.

**Erwärmend Fieber-Träncklein auff einmahl.**

$\mathfrak{R}$ .  $\nabla$  card. bened.  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ ss.  
cinnam. drachm. j. ad drachm.  $\mathfrak{ij}$ ss.  
extract. gent. drach.  $\mathfrak{B}$ . vel scrup. ij.  
sal. vol.  $\mathfrak{x}$ ci gr. xv. vel spir. sal.  $\mathfrak{x}$ ci  $\mathfrak{z}$ ss.  
syrup. card. bened. drachm.  $\mathfrak{B}$ . ad  $\mathfrak{z}$ ijj.  
M. f. Potio.

Propinentur bihorio ante paroxysmum, moderatè tegendo corpus:

$\mathfrak{R}$ . Extract. absinth. scrup. j.  
salis absinth. scrup.  $\mathfrak{B}$ .  
c. f. q.  $\mathfrak{S}$ o destillat. caryoph.  
f. Pilula. S.

**Erwärmende Fieber-Pillen auff einmahl.**

$\mathfrak{R}$ . extract. absinth.  
card. bened.  
Cent. min. a gr. vi.  
myrrh. elect. gr. ij.  
laud. opiat. gr. j.  
M. f. Pilula.

Commodè etiam hiæc febrilibus extractis trochiscorum alhandal gr. ij. ad gr. iij. tam pro alterandi quàm pro laxandi scopo addi possunt; utut sub debita diaphoresi levior laxatio accidere solet.

Observ. XXIII. Ad febres intermittentes ardentes præmissis præmittendis nil melius est, quàm sal amm. vel solitarium dosi scrup. j. ad  $\mathfrak{z}$ ss. ante paroxysmum usurpatum:

Vel  $\mathfrak{R}$ . Salis amm. scrup. j.  
antibect. Poterii scrup.  $\mathfrak{B}$ .  
M. f. Pulvis. S.  
Kühl-Pulver.

$\mathfrak{R}$ . Salis  $\mathfrak{x}$ ci  $\mathfrak{z}$ j.  
corall. r. prap.  
antibect. Poterii a gr. vij. M.

Aliàs aliquot febres ordinario modo affligentes profligavi:

(Mm)

$\mathfrak{R}$ . Sa-



℞. *Salis amm.* ℥j. ad 3℔.  
*corall. r. prap. vellap. S. pr. unc. ℔. ad*  
*℥o destill. bacc. junip.* (gr. xv.  
*mac. aa. gtt. j.* M.

Observ. XXIV. Post rigorem subinde superveniente jam æstu, ægri conqueruntur de insigni virium prostratione, cum respiratione anhela, celeri, frequenti & parva, & gravissimo æstu interno, utut quoad contactum externum minus æstare soleant. Talibus in æstu paroxysmi vel ~ salis amm. quocunq; modo propinatus, vel mistura cum aceto & lapillis cancrosum supra insinuata bono cum successu propinatur.

Observ. XXV. In paroxysmis febrium intermittantium subinde graves cardialgiæ, stomachi rosiones, præcordiorum angustix, suffocatio imminens, fames nimia, similiaq; nimis molesta symptomata, inquietudinem, anxietatem, & insignem corporis jectigationem inferentia, adiunt; idque imprimis in hypochondriacis, hystericis & scorbuticis. Curantur beneficio ~ salis amm. vel simplicis vel oleosi facti; vel externè per linimenta, vel emplastra ex tacamahaca, vel sola, vel cum ladano Cratonis mista, cum oleo quodam destillato subacta, nempe anisi, vel succini, vel menthæ, vel balsamo Peruviano; regioni stomachi applicata.

Observ. XXVI. Notatu dignus est Balilonii locus in *Bonetti Pharo Medicor. pag. 213.* puellæ febre tertiana jam mensem laboranti, ante paroxysmos dextri hypochondrii & cruris dolores, calore extenso quiescebant: quid hoc rei? nisi purgationibus antevertas, hoc minatur abscessum.

Observ. XXVII. In cura quartanarum, uti & quorumcunque morborum chronicorum, Medicus tangat hypochondria, an adsit tumor aut durities, scirrhus cujusdam abdominis visceris, hepatis, lienis, aut etiam mesenterii? in specie inveterata si fuerit. In tali casu ordinario scabies supervenit; quærat etiam, an adsit scorbutus? an multi adsint flatus? ut certus fiat de malo hypochondriaco, & intermissionis die his tumoribus maturè occurratur; nisi enim curantur, vix solent febres curari, vel recidivant: Item an viscera reliqua, imprimis pulmones, sint salva? facto hoc, tunc demum instituat prognosin & curam.

Observ. XXVIII. In quartana contumaci locum habent acidulæ, sed ventriculus & viscera sint robusta, seu in legitimo tono constituta; aliàs enim nimis debilitantur ægri, quod in omnibus acidulis observandum. Quod si nimis debiles sint patientes, conveniunt potiùs remedia Martialia, aut etiam acidulæ artificiales; de quibus videb. Gabelchoverum *Cent. 6. Cur. 8.* sicuti etiam in hypochondriacis, scorbuticis, spleneticis,

hystericis, &c. febre intermittente laborantibus, Martialia ante paroxylum sunt usitatissima; e. g.

℞. *essent. absinth.* 3℔℔.  
*solut. Oris t. succ. pom.* 3j.  
 M. S.

#### Eröffnende R 50. Tropfen.

Observ. XXIX. In febribus chronicis ac diuturnis intermittentibus, ac in specie in quartanis, discussio licet morbo, diu paroxysmi typum ægri probè observent, & præsertim ordinaria diætæ & abstinencia recidivam declinent: vid. Bartholini *Acta Medic. Hassniens. Vol. 1. pag. 191.* Nam interdum etiam post aliquot septimanas recidivant, & quidem graviori paroxysmo. Non mox ergò desistamus à febrifugis, quæ optima sunt præmissis universalibus; ut spirit. salis ammoniaci, sal volat. C. C. sal volatile viperarum & succini.

Hæ & similes cautelæ, si bene observentur, nunquam errorem aliquem observabitis in cura, sed satis eam reddent facilem atque securam. Quod si verò illegitimè & vitiosè curantur atque paroxysmi impediuntur, seu febris suppressitur, id quod fit, quando fixis aut similibus obtunditur fermentum febrile, & in suo fomite quasi concentratur, sanguinis fermentatio febrilis impeditur, & debita ejusdem turgescencia sufflaminatur; unde quidem paroxysmi cessant, sed multa prava insequi solent symptomata. Sanè nil est, quod nocentius possit contingere ægro, quàm ista paroxysmorum inhibicio, quatenus materia ista vitiosa cum fermento concentrato mediante sanguine cumulata, circulata & in turgescencia fermentativa impedita, hinc inde tandem affixa hæret, & gravia infert symptomata, viscera reddit languida, imprimis infarcit lienem & hepar, colicas passiones infert atroces, tumores pedum œdematolos, asthmata & tusses, cachexiam, & subindè hydropem, lassitudines artuum, icteros difficulter curabiles, cephalalgias diuturnas, febres continuas lentas tanquam hecéticas, & similia symptomata. Exempla nonnulla imprimis videb. in Gabelchovero *C. 1. Cur. 43.* item *Cent. 6. Cur. 109. 110. 111. 112.* & sequent. item M. A. N. C. *Ann. 3. Observ. 89. pag. 149.* ubi tertiana per amuletum curata in gravem passionem colicam, & hinc iliacam, degeneravit.

Facta est sæpiùs mentio febrium scorbuticarum intermittantium, quæ vix ullis cedunt remediis, & sunt contumacissimæ, nec aliquid in illis præstari potest, unde sæpiùs subindè recidivant febres. Retulit D. Michaelis, quendam quinquies recidivam passum fuisse ob scorbutum febris junctum, quò curato febris planè cessavit. Talibus in febribus necesse est, ut Medicus aliis cum remediis

diis febrilibus crebrius specifica antiscorbutica propinet, tam die intermissionis, quam ante paroxysmum permista cum specificis; eminet in his calibus imprimis spir. cochlearia cum spiritu  $\Theta$ is amm. vel similia. Inter hæc præstantissimum remedium est arcanum duplicatum Mynsichtii ad scrup. j. vel solum, vel cum lapillis 69. 3ß. ante paroxysmum: vel repetitum subinde die intermissionis, & similia aliis sociata.

℞.  $\nabla$  antiscorbut. Dornereilii l. Quercetani 3j.

spir. salis amm. 3ß.

~ cochlearia scrup. j.

Laud. opiat. gr. j. l. ij.

syrup. scelotyrb. Foresti 3ij. M.D.S.

**Scorbutisch Fieber-Träncklein auff 1. mahl**  
Præmissis universalibus ante paroxysmum propinetur.

Vel cum spiritu salis amm. eleganter permiscetur arcanum duplicatum Mynsichtii in forma liquida: v. g.

℞.  $\nabla$  card. bened.

flor. sambuci a 3ij.

spir. cochlear. 3ij.

salis amm. 3j.

arcan. dupl. Mynsichti 3j.

corall. r. præp. gr. xv.

syrup. scelotyrb. Foresti 3ß. M.

Item in febribus scorbuticis absque frigore invadente, cum summo ardore, extremorum lancinatione cum angustis præcordiorum & anxietatibus cum flatibus conjunctis, cum fructu præscripti hanc potiunculam subinde hauriendam, ubi ad omnia respicitur symptomata:

℞.  $\nabla$  mentha,

faniculi,

fumar.

carminat. a 3j.

~ cochlear.

theriac. f. a 3j.

$\Theta$ i dulc. gtt. xii.

lap. 69. præp. 3ß.

Laud. opiat. gr. iß.

syrup. cortic. aurant. 3vj. M.D.S.

**Scorbutisch Fieber-Träncklein.**

Detur cochleatim in ipso paroxysmo: valde prodest.

Alias etiam antihecticum Poterii cum magisterio coralliorum cum succo citri a 3ß. & arcani dupl. Mynsichtii scrup. 3ß. ad 3ß. & pro una vel duabus dosibus ante paroxysmum usurpata, in febribus scorbuticis sunt egregia: Vel

℞. arcan. dupl. scrup. j.

$\Theta$ is absinth.

lapill. 69. r. præp. a 3ß.

M. f. pulvis. S.

**Scorbutisch Fieber-Pulver.**

Propinatur in tertiana scorbutica, ubi æstus intensior: aliquoties repetatur, donec febris cesset.

Vel

Tom. II,

℞. arcan. dupl. Mynsichtii.

mag. corall c. f. c. à scrup. j.

$\Theta$  volat. C. C. vel viperar. gr. vj.

M. f. Pulvis. D. S.

**Scorbutisch Fieber-Pulver.**

Serum lactis, in specie caprilli, est potus imprimis conveniens, dum talium febrium admodum urget æstus & sitis, vel solum, vel imprimis cum citro acidulatum; nam & hic in scorbuto est egregius: vel & affundature hrbæ cochlearia & nasturtii cum pomo citrio in taleolas inciso, & exprimatur pro potu in paroxysmo. Vel:

℞. Hb. fumar. M. ij.

Macera per  $\phi$  in sero lactis caprilli q. s.

Colaturæ addatur

succ. pomor. Borsd. 3iv.

sacch. parum. M. S.

**Alterativ-Träncklein.**

Hauriatur extra paroxysmum.

Decoctum etiam tamarindorum ad dictas febres sub forma julapii usurpatum est egregium, simul alvum obstructam, quæ sæpissimè in scorbuto solet obserari, blandè laxat, prætereaque crasin massæ sanguineæ vitiosam temperat, v. g.

℞. tamarind. 3iß.

Coqu. in f. q. seri lactis vel  $\nabla$  bordei.

Colaturæ adde

Ra flor. bellid. 3ij.

syrupi rosati sol. vel violar. q. s. pro gratia saporis.

M. D. pro Julapio febrili laxativo, durante æstu. D. S.

**Eröffnender Zulep.**

Vid. Morellus de Mater. Med. pag. 33.

℞. Decocti passul. min. in sero lact. depur. lb. iß. adde

succ. cochlear. per resid. æpur. 3iij.

citr. rec. 2j.

M. f. Zulepus.

℞. Seri lactis depurati lb. j.

Decocti tamarind. lb. 3.

succ. citr. rec. 3vj. l. 3j. ad 3iß.

syr. ex toto citri 3iij. l. q. f. M.

℞. Decoct. scordii c. C. C. lb. 3.

tamarind. 3iij.

Ra flor. bellid. 3iij.

~ Vitrioli Philos. q. f. M.

NB. Potus lactis in febribus scorbuticis valde convenit, si aliquantulum sacchari vel  $\Theta$ is amm. addatur: quotidie assumitur, manè dimidia mensura, ein Mäsel; v. g. si paroxysmus est à meridie; si cessat ante cœnam, in cœna comedenda est frische Milch.

Ægyptii referente Prospero Alpino lib. 10. de Medic. Ægypt. c. 15. potum quendam ex fermento & aqu. rosarum parant, pro febrium, in specie tertianæ, cura.

Alii, ut Silesii, Poloni, & quidam populi vicini, ex Branca ursina & fermento potum conficiunt, & Bartsch appellant: quod sanè potus

( M m 2 )

potius genus non incommodum in febribus ferventioribus videtur: decoctum faciunt ex herba Sina, ut decoctum colorem flavum retineat, non puniceum: decocto fermentum addunt, & in loco tepido aliquot dies fermentari permittunt: Vid. Kergerus *de Fermentatione Sect. 3. cap. 1. pag. 182.*

Ex suprâ dictis patet: quod in cura februm intermittentium, mox in principio, præmisso uno vel altero digestivo, vomitoria ante paroxysmum, aut die intermissionis blanda laxativa propinanda: postea intermissionis diebus alterantia volatilia, vel Martialia, pro ratione urgentium symptomatum; paroxysmi v. tempore remedia fermentativi acidi destructiva &, uti vocant, præcipitantia, primatum obtineant. Unde remedia alcalinæ prolapiz, tam volatilia quam fixa, & his cognata acida quocunque modo destruentia ex omnibus tribus regnis ad curam februm intermittentium adhiberi possunt. Hinc ratione alcali volatilii plus minus, aut oleosi, conveniunt veterum simplicia febrifuga vegetabilia, v.g. quævis amaricantia, plus minus aromatica, qualia in specie sunt absinthium, carduus benedictus, centaurium minus, chamomilla, tertianaria, (hujus enim decocto tam intermissionis die, quam ante paroxysmum propinato, tertiana fuit curata: Vid. Tabernæmontanus) ulmaria, cujus decoctum, item Aqu. destill. insigniter commendatur in tertianis diuturnis; taraxacon, fumaria, nasturtium, cujus succus cum vini albi ʒiij. adhibitus quartanam certò curat, modò in lecto paroxysmum instantem expectet æger, sudorem moveat, & purgetur. Convenit etiam radix plantaginis, taraxaci, chelidonii majoris, gentianæ, zedoariæ.

Ufus horum est nunc in substantia sub forma pulveris, nunc in decocto amarissimo, nunc in succo recens expresso, nunc in extracto, nunc, isque optimus, in  $\Theta$  fixo. In substantia flores centaurii min. ad ʒj. pulverisati adhibiti insigniter commendantur ad curandas febres, quâ ratione Thonerus curavit tertianam duplicem admodum refractariam, pertinet huc & pulvis cardui bened. &c. Decoquendi modum dicta vegetabilia febrifuga ostendit imprimis Rulandus *Theaur. Pract.*

℞. flor. cent. min. M. iß.

rad. asari M. j.

Coqu. in f. q. Aqu. simpl.

Hujus decocti calentis virgo quotidie in lecto benè tecta hausit lb. ß. & diu multumque sudavit, quò ad certum tempus continuatò, à diuturnâ chronicâque febre curata fuit.

Porro

℞. HB. card. bened. M. j. l. ij.

rad. asar. M. j. l. ʒj.

Infund. per  $\infty$  in lb. jv. aquæ: post decoqu. lento igne ad tertias.

Hujus decocti æger omni manè jejunus in lecto arctè coopertus bibat unc. iij. l. iv. calidè: accipiat semper 6. horis ante paroxysmum, & multum sudet, donec febris repetito hujus usu omninò evanuerit.

Et certè hujusmodi decocta ex paucissimis ingredientibus præferenda longè decoctis magistralibus, quæ ex mille speciebus combinatis sunt composita: hinc vel sola herba centaurii min. optimum est ad intermittentes remedium, si ante paroxysmum adhibeatur. Helmontius tardarum februm medicamentum optimum vocat asarum in aqu. decoctum: movet urinam.

Aliàs etiam Chamæmelon, ejus decoctum, item  $\nabla$  decocta ex ejusdem succo ad aliquot uncias adhibita, à multis insigniter commendatur antè paroxysmum.

In succo usurpantur, v. g.

℞. succ. express. absinth. rec. ʒj. ad ʒij. vel ʒiij.

Accipitur in haustu vini absinthitis aliquot horis ante paroxysmum: fiat hoc aliquoties, & evanescet febris.

In extractis usurpantur dicta vegetabilia febrifuga sub forma pilularum; cum enim sint insigniter amara, ut tollatur amarities, cum  $\sim$ u vini paratur extractum. Exinde fiunt pilulæ, quæ capiantur imminente paroxysmo unâ alterave horâ ante eundem. Usurpentur etiam hæc extracta in forma liquida: recipiendo nempe essentiam absinthii, centaurii minoris, cardui benedicti, myrrhæ, & similes, crebrius, tam die intermissionis, quam ad ʒj. usque ad ʒij. ante paroxysmum in vehiculo appropriato. Ad istas essentias ex vegetabilium febrifugis paratas pertinet etiam elixyr febrile Dn. Doctoris Michaelis.

Loco talium vegetabilium longè utilior est  $\sim$ us  $\Theta$ is ammon. cui non cedunt  $\Theta$ ia fixa ex istis febrifugis parata. Pertinet etiam ad hæc vegetabilia China Chinæ seu cortex Peruvianus antiquartius, seu Jesuitarum: Est cortex aromaticus, saporis acerrimi ferè instar cinnamomi, & defertur ex provinciis Peruvianis: vocatur à quibusdam gentiana Indica. Genuinum usurpandi modum videb. in Bartholini *Cent. V. Hist. Anatom.* 50. item in Sydenham *de morbis acutis & Epidem.* pag 98. *Sect. 1. c. 5. D. Mongino Tr. de Cura februm per Chinam China.* Datur à ʒj. ad ʒij. probè pulverisata in haustu vini calidi, v. g.

℞. Chin. China ʒj. ʒij. ad ʒiij.

Pulverisetur minutissimè, infund. in Vini Rhenan. vel Hispan. ʒij. vel vj.

Stent in infusione per  $\infty$ ; manè probè mista hauriantur ante paroxysmum. Curat frequenter quartanas, & hinc etiam tertianas chronicas, aut duplicatas etiam nothas. Vel

℞. pulv. Chin. China ʒvj. ad ʒj.

rad. gentian. ʒiij.

fl. Cent. min. pug. iv.

piper. long. ʒj.



⊖ ʒi ʒß.

Concis. & contus. dentur. S.

Species in Wein.

℞. cort. chin. china drachm. vj.

guajaci drach. ij. ad drachm. iij.

comar. cent. min. mj.

cinnam. drachm. ij.

caryoph.

lap. ʒ a drachm. j.

sal. tartari drachm. iij.

M. f. pulv. includendus nodulo.

Püschel zum Sieber Wein.

Infund in vin. Rhenan. vel absinthite Mens. iß. Dosis bonus haustus una cum pulvere. Rarò fassunt, signa coctionis ubi præcesserunt, Vel:

℞. Chin. China subtiliss. drachm. vj.

rad. gentian.

limat. ʒis puriss. a drachm. iij.

caryoph. drachm. iß.

M. f. pulvis. S.

Alterativ. Pulver in 1. Kanne Wein.

Bibatur post paroxysmum, & diebus intermittibus bis, manè calidè, & à meridie frigidè.

Alii, imprimis Medici Angli, famosum suum febrifugum hoc modo componunt.

℞. Vini rubr. opt. lb. ij.

chin. china in pollin. redact. ʒij.

stent in loco tepido per 3. ʘʘ, dein liquoris decantati dentur ʒiv. præter propter ante paroxysmum horis 4. vel in declinatione ejus. Hæc dosis continuatur per 4. 5. vel 6. ʘʘ quotidie, usque dum febris remiserit.

Quo scopo obtento lenitivum exhibeatur.

Vel ℞. pulv. chin. china subtiliss. scrup. j.

lap. 69. prap. scrup. j.

cardam.

cubeb. a gr. iij.

M. f. Pulvis. S.

Sieber Pulver.

Infidum tamen est remedium, ut reliqua omnia sæpius esse solent; unde necesse est, ut ritè præmissa sint universalialia, & aliquoties usurpandum veniat hoc remedium; itemq; fugata febre ejus usu, corpus adhuc semel vel bis leniter purgandum sit, aliàs post unam alteramve septimanam certè recidivant febres. Loco hujus, cum sit exoticum, arbitror, non ineptè substitui posse gentianam recentem amarissimam nostratem, & ejus succum condensatum, cum vino ad ʒi. hora j. ante paroxysmum assumptum febres intermittentes quascunque feliciter curare. Unde etiam ejus pulvis ad ʒij. vel tres eandem cum chin. chin. efficaciam habere arbitror; Vel

℞. pulv. gentian. subtiliss.

card. bened. a ʒj. M. S.

Sieber Pulver.

Ad hæc vegetabilia febrifuga pertinet meritò etiam myrrha, quæ ipsa ante paroxy-

smum propinata, in specie in febre quartana, à multis solet insigniter commendari: & credo, quod etiam in febribus scorbuticis futurum sit non contemnendum simplex. Propinatur ante paroxysmum a scrup. j. ad ʒß. vel solum, vel etiam secundum veterum methodum cum castoreo, idque non ineleganter. Utrumque, castoreum & myrrha, permiscetur ad scrup. j. & propinatur in haustu vini ante paroxysmum. Alii

℞. myrrhe.

castor.

opoponac.

extract. gent.

absinth. a scrup. j.

Cum Mithridat. & succo absinthii q. s. f. pilulæ no. xxviii. de quibus horis duabus ante paroxysmum æger 7. vel 10. deglutiat, & hinc sudorem expectet.

Aliàs etiam notum est, in quibuscunque febribus intermittibus ante paroxysmum commodè posse propinari misturam simplicem vel Ram Bezoardicam ad gtt. 20. 40. l. 50. pro ratione circumstantiarum in v carduibened. vel vino absinthite præmissis universalibus; curat enim istas per sudorem.

Pertinet huc ulterius & diaphoreticum, in specie ʘiale; quæ etiam ante paroxysmum usurpata febres fugant. item Pulvis febrilis perlatus Timæi.

Item pertinent huc quoque nonnulla fixa terrea, & imprimis calcinata, vi præcipitativâ insigni prædita, febrifuga specificæ nat' ἐξοχῆ dicta, qualia sunt v. g. specificum febrile Crollii ex testis oblongis concharum calcinatis, quale etiam est specificum febrile Mynsichtii. Has testas præparandi modum habet Rolfinccius in Chym. item specificum febrile Strobelbergeri, paratum ex matre perlarum calcinata. Dosis harum est a ʒß. ad ʒj. vel scrup. iv. horâ unâ vel alterâ ante paroxysmum in haustu vini vel v destill. bis ac ter reiteranda, donec cesset febris.

Loco talium etiam C. C. ustum & similia ʘea ac alia marina calcinata commodè substitui possunt.

Speciat huc ~ ʘis coagulatus, ~ ʘli coagulatus, compositum etiam ʘ antifebrile Mynsichtii, & alumen, a non paucis tanquam singulare febrifugum febrium intermittentium laudatum, in specie Magisterium aluminis Schræderi in Pharm. pag. 324. de quo conf. etiam Hoffmannus in Clave pag. 349. Dosis ʒß. ad ʒj. bis vel ter ante paroxysmum propinatum eas profligat. Novi hoc remedium empirico diuturnas in Medici opprobrium febres fuisse curatas;

℞. nuc. mosch.

ʘi depur.

alum. a ʒj.

M. f. pulvis.

div. in 3. part. æqu.

(M m j)

Tri.

Tribus successivè paroxysmis, dum ingruunt, assumatur, expectando sudorem & febris solvitur.

Sic tartarum aluminosum tinctum videbitis in Rolfinccii *Chymia*. Alii aluminis benè depurati, vel aluminis tincti Mynsichtii, quod videb. in Mynsichtii *Armam.* pag. 29. aliquot grana miscent cum aliis febrifugis, & ita propinant. Alii ad usum febrilem, alum. crudi lbj. probè calcinant in vase, ut moris est: frustula calcinata & adhuc candentia immittunt in ✱, quod filtrant per chartam bibulam, & hinc humiditatem maxima ex parte, si non omnem, per alembicum abstrahunt: residuum in loco frigido in crystallos concresecit, quæ à scrup. j. ad scrup. ij. in ∇ cardui bened. horis 2. ante paroxysmum propinata, sunt satis proficuæ. Hæ ipsæ crystallos dum concresecunt, possunt tingi, si addatur succus baccarum sambuci.

Facit huc & Θ δii & sacchari Saturni in tertianis & quartanis, non inelegans euporiston:

℞. Corall. r. præp. l. lapill. 69. pr. 3ß. ad scrup. ij.  
sacch. h. scrup. ß. gr. xii. ad xv.  
laud. opiat. gr. j.  
M. f. Pulvis.

Propinandus ante paroxysmum in quartana contumaci in decocto cardui bened. sicuti continuo pulveris lapillorum cancerorum usu, ad 14. dies in decocto cardui ben. propinatorum, contumax aliquot mensium quartana aliquando curata fuit. Θ δii commendatur in antidoto antipyreto non solutivo à Poterio in *append. pag. 596.* quod Θ definit l. 2. *Pharm. spagy. cap. 12. de gio*: abscondit inibi genuinum modum Autor, ego verò suspicor hunc:

℞. δii diaphor. affund. ✱ cum ~u Qi in tantum acuatum juxta mentem Zvvelferi pag. 380. *Mant. spagy.* factâ diutinâ digestionem in loco calido temperato δ diaphoreticum filtretur, filtratumque evaporet, quo facto reperies Θ aliquod, vel saccharum, vel Q.

Si lubet parare Θem subtiliorem & præstantiorem, solvatur saccharum illud in V. iterumque fiat evaporatio.

Hoc Θ δii, si cum flor. δii diaph. conjungitur, nullum mihi est dubium, quin ex eo sit sperandum medicamentum insigne antipyreticum; siquidem constat ex alcali nitri, δii floribus diaphoreticis, & alcali etiam falso δii, qua de re etiam omninò laudandus est præfatus Antidotus Poterii. Simile quid sperandum etiam est de Auro fulminante, quippe quod in sese continet calcem solarem alcalinam & tartarum Datum; nam utut reverà oleum Qi cum spir. Qi vel Aqu. regia concresecat in verum nitrum, attamen mihi videntur in hoc nitro salia contraria non ita pe-

nitùs concreta, quare talis tartarus Datus adhuc pollet virtute aliqua acidum absorbendi.

Verùm observandum est, quod huiusmodi fixa optimè quidem curent, sed reverà suppressant febres intermittentes; adeoque periculosa sint, nisi cautè, præmissis universalibus ac primas vias probè abstergentibus, administrentur, unde rarissimè, & non nisi cautè, usurpanda sunt specifica febrilia: & si usurpanda sunt, pro dictis incommodis præcavendis propinentur non calcinata, sed saltem vel simplici tritura, vel præviâ cum aceto secundum Mynsichtium in *Armam.* pag. 97. aut cum lixivio forti secundum Rolfinccium l. 4. extractione: nec sola, sed cum aliis sudoriferis, hoc modo:

℞. Aqu. card. bened. 3ß.  
specif. febril. Strobelbergeri scrup. j.  
(vel hujus, & lapill. 69. præp. à gr. xv.)  
~ Salis xci 3ß.  
essent. opii gr. x.  
syrup. card. bened. 3ij. M.  
℞. Specif. febril. 3ß.  
Salis absinth. scrup. j.  
M. f. pulvis pro 1. dosi.

In tertiana hysterica præmissis præmittendis cum successu præscripti:

℞. C. C. usti præp. 3ß.  
Salis absinth. scrup. j.  
corall. r. præp. gr. xii.  
extract. castor. gr. v.  
laud. opiat. gr. ij.  
M. f. Pulvis pro 2. dosibus.  
℞. testar. conch. præp. 3ß.  
δii diaph.  
salis absinth. à scrup. ß. vel gr. xv.  
laud. opiat. gr. ij.  
M. pro 2. dosibus.

Post febrem profligatam dandum est blandum laxans die illo, quò aliàs paroxysmus redire solet: v. g. ex MP. de ammoniaco, addito extracto absinthii cum debito stimulo: Nempe

℞. MP. de Amm. Quercetani gr. xii.  
extract. absinth. gr. vj. l. xv.  
troch. alh. gr. ij.  
M. f. Pilule. S.

Potius ergo salia vegetabilium fixa calcinata, quæ sunt resolubilia, & ex ipsis præparata remedia, quæ etiam, uti antea monui, à Barbette præferuntur Chincæ Chinæ, ceu tutiora loco horum aut calcinatorum commendando. Interim inter fixa calcinata ex marinis parata singularia sunt; sunt enim instar calcis vivæ: affusâ aquâ effervescunt, & sic consequenter alcali fixum occultum gerunt. Calcinata partes animalium terreæ, ut C. C. ustum, pulvis bufonum calcinatorum &c. omni sale sunt spoliata, unde præ his calcinata marina tutiora sunt. Deniq; ♁ minerale etiam inter febris

febrifuga insigniter laudatur; dosi ʒß. ad ʒj. idque aliquoties ante paroxysmum reiteretur; hinc etiam pulvis pyrius febrifugum est militum, quo utuntur in castris ad fugandas febres intermittentes non inepto consilio à dosi ʒß. vel ʒj. ad ʒij. in aceto vel vino acidulo ante paroxysmum; ratione enim  $\Delta$ is, nitri, & alcali carbonum, est egregius. Facit huc pulvis febrifugus egregius D. Salzmanni, descriptio est sequens:

℞.  $\Phi$ i fixi drachm. ʒ.  
 $\beta$ .  $\Delta$ is drachm. iij.  
 Salis amm. drachm. j.  
 Santali r. pulv. drachm. vj.  
 Sacch. albiss. drachm. ij.  
 M. t. Pulvis.

Propinetur ʒj. ad ʒiʒ. antè paroxysmum. Santalum & saccharum possunt sine noxa omitti, & tunc dosi diminuat.

In peste & febribus intermittibus vitriolum Cyprium à Roderico Fonseca in Consult. Medicis Tom. 1. commendatur, & Petrus Borellus Cent. 4. Observ. 77. in febribus vitrioli Cyprii frustum in lb. iv. aquæ infundere docet per horæ quadrantem, & propinandas suadet hujus aquæ ʒvj. manè per 6. dies, duabus horis ante cibum.

Cum febres diuturnæ, imprimis Quartanæ, uti etiam febres alix intermittentes, raro soleant esse tales, quin tandem accedat istis vel tumor, vel scirrhus viscerum, in specie scirrhus lienis, vel etiam mesenterii, tanquam productum morbosum, vel dispositio quasi mali hypochondriaci; ideò tunc in omnibus medicamentis simul ad splenem respiciendum erit, ut feliciùs eradicetur morbus. In tali casu non omittenda  $\sigma$ ialia, vel etiam alix plantæ splenetice cum febrifugis mistæ, idque imprimis die intermissionis, aut ante paroxysmum. Conveniunt ergò extractum Martis cum succo pomorum, vel ex eo parata essentia Martis liquida, mista cum  $\omega$ u cochleariæ, item  $\mathcal{R}$ oli  $\sigma$ is Zvvelfferi, item  $\Theta$  Martis compositum Conerdingii.

℞.  $\mathcal{R}$ oli  $\sigma$ is.  
 $\omega$  fol.  $\Phi$ i ʒ part. æqu.

Sub mistura & tritura liquefcit, exsicceetur blando igne.

Vel usurpatur  $\sigma$   $\Phi$ latus, qui sic paratur:

℞. Crem. tartari part. ij.  
 limat.  $\sigma$ is part. j.

Minutissimè tere in mortario marmoreo, hinc adde  $\nabla$ m ferventem, blandè exsicceetur,  $\nabla$  fervidâ irrota tam diu, donec fiat, Marte absumpto à cremore tartari, pulvis subtilissimus.

Item crocus Jovis aperitivus cum salibus, vel limatura Martis crudè præparata ante paroxysmum sumpta,  $\delta$  diaphoreticum Martiale, & præsertim, ubi æterus supervenire velit.

Nam quartanæ in specie vix sine Martis ope debellari possunt.

De opio suprà monitum fuit, quod etiam ad febrifuga remedia suo modo pertineat; unde & theriaca, maximas sanè virtutes continens ab opio, ad febrifuga referri solet. Facit huc antiquissima Galeni febres curandi methodus, qui suos quartanarios curavit, primùm propinando vomitorium, deinde die sequenti dedit succum absinthii bibendum, denique duabus horis ante paroxysmum dedit theriacam, & sic quartanarios omnes curavit. Plura de hac methodo vid. apud Zacutum Lusitanum l. 4. Medic. Princ. Hist. 33. Verùm cum cautela hac faciendum esse re- $\delta$ è monent Practici, ne intempestivè ante coctionem data febrim multiplicet. Conf. Ballonius Pharo Medic. pag. 200. Horstius Probl. pag. 15. Decad. 1. Qu. 9. Nam modò ritè procedatur, succus absinthii ad ʒß. cum theriacæ ʒj. in haustu vini tribus horis antè paroxysmum, certò liberat à quibusvis febribus intermittibus. Theriaca à ʒj. ad ʒij. in febribus tertianis intermittibus chronicis ante paroxysmum in haustu vini absinthii expectando sudorem experta est: vid. Riverius in Observ. Ego subinde in febribus chronicis cum successu præscripsi cum febrifugo Strobelbergeri ita:

℞. Theriac. Andromach. ʒiʒ. ad ʒj.  
 Specif. Febrilis Strobelberg. ʒi. ad ʒß.  
 $\Theta$ u card. bened. ʒß.  
 $\sigma$ o destill. caryoph. gutt. ij. l. iij.  
 c. l. q. syrupi scelotyrbici Foresti, de artemisia, vel de absinth.  
 F. Bolus.

Propinabatur horâ unâ vel alterâ ante paroxysmum, præmissis præmittendis, & egregiè contulit.

Sic & theriacæ ʒj. ante paroxysmum hausta cum moderato haustu aceti multùm prodest, quando nimius æstus ejus usum videtur respuere, & mediante sudore febrem profligabit.

Dicenda hîc quædam sunt de febrifugis Catholicis, qualia reverà legitima sub mendi methodo plura dantur; adeò ut  $\Theta$ ia fixa & sal ammoniacum non immeritò huc revocari queant: sicuti sub perverso usu & inconcinna methodo etiam optima specifica fallunt. Kergerus Tract. de Fermentat. Sect. 3. de febrib. pag. 250. commendat suum febrifugum  $\omega$ ans, quo felicissimè utitur in quibusvis febribus intermittibus: præparationem autem reticet. Relatum est ab amico, esse nihil aliud, quàm cremoris tartari partes jv. & coralliorum rubrorum præparatorum partes iij. quæ exactissimè miscentur, & pulvis dosi ʒß. usque ad ʒj. aut ʒiv. tam die intermissionis, quàm ante paroxysmum, usurpatur. Pertinet huc Mercurius fixus diapho-



reticus Helmontii, sed cujus præparationem in arcanis sibi reservavit: est autem reverà fixatus, tinctus cum sulphure Veneris fixo, parato beneficio liquoris alcahest, quod extrahit  $\Delta$  Veneris, ut Mercur. ejusdem decurrat: Vid. de hoc Starckey in *Microtechn. Anglica*. Item D. Moebii *Sal Antifebrile* huc pertinet: Nempe

$\mathcal{R}$ .  $\Phi$  i el. part. iij.

$\Phi$  li el. part. j.

Fundantur in crucibulo: fufum solvatur, filtetur, & iterum coaguletur.

Si autem vitrioli Hungarici recipiantur partes iij. &  $\Phi$  i pars j. expulso priùs per retortam Gas sylvestri nocivo, residuum solvatur, filtetur, iterum crySTALLIFETUR, evadet  $\Theta$  ejus emetico-diaphoreticum: Vid. Hoffmanni *Clav. Pharm. Schræderi* pag. 356.

Item pertinet huc antiquarium febrifugum Riverii, etiam quasvis alias febres curans, cujus plures hinc inde circumferuntur descriptiones. Plures parare istud volunt ex  $\Theta$  e, vitro  $\delta$  ii, & Mercurio vivo; quæ invicem viâ siccâ præcipitantur in aurum quoddam vitæ, seu gum præcipitatum  $\Theta$  rem: sed dubito ferè de hac descriptione; nam Mercuriale quidem, sed benignius, remedium esse existimo. Et si rectè operandi ratio in ejusdem operationibus observatur, facilè quis suspicari potest, ex basi Mercurii dulcis procedere, cui  $\Delta$   $\delta$  ii &  $\Phi$  fulminans, interdum de scamonio nonnihil, tanquam quartus athleta additur; hinc etiam vomitum simul, secesum etiam, atque sudorem movere solet. Sed ista supra dicta particularia etiam sufficiunt.

Hæc sunt interna, quæ subindè usurpantur in febribus intermittentibus.

Juxta hæc subindè etiam non incongruè quædam externa, tam pro febribus curandis, quàm pro æstu nimio, aliisque symptomatis in paroxysmo mitigandis, adhibentur. Inter Medicamenta externa, quæ æstum nimium plantis pedum applicata compescunt excellit epithema ex aceto rosaceo, cum succo sedi majoris & nitro, ana q. s. mistis, & ita applicatis; & imprimis convenit, quando urgent pathemata capitis. Convenit etiam fermentum cum aceto & sale plantis pedum adhibitum. Item potentilla seu argentina, & flammula recenter contusa, carpis manuum & plantis pedum applicata, ad leniendum calorem & æstum febrium intermittantium laudatur. Epithema quoque fit ex aceto & succo sedi majoris, à q. s. addito nitri tantillo; quod plantis pedum applicatum admodum laudatur ad temperandum æstum. Illa autem, quæ febres curant, sunt varia: Emplastra, cataplasmata, unguenta, &c. Vel pulsui applicanda, vel amuletorum forma suspendenda. Priora vim habent causticam,

rodentem, & cutim rub. facientem, atque pustulas excitantem, ut ibi beneficio irritationis & vesicularum fermentum febrile foràs eliminetur, ad imitationem naturæ per pustulas labiorum & alibi se levantis.

Aliàs ex allio, cepa, ruta, ranunculo ardente, plantagine vulgari &  $\nabla$  tica, sabina, croco, mastiche, terebinthina, camphora, pulvere pyrio, araneis & earum telis, & oleo harum & scorpionum, & similibus formantur cataplasmata, carpis manuum pro febribus curandis applicata.

$\mathcal{R}$ . *Allium contusum.*

*Cepas confusas.*

*Croci parum.*

Mixta cum aceto, & in formam cataplasmatibus subacta instar magni thaleri ingruente paroxysmo carpis manuum applicentur, ubi vasa venosa & arteriosa magna; & ita per paroxysmum relinquatur, repetendo, donec febris cesset.

His alii etiam piper longum addunt, & non contemnendum remedium est.

Quidam recipiunt sonchum tritum, sambucum & plantaginem, hæcque cum aceto subacta carpis alligant. Iberis planta pedum plantis supposita febres tollit, juxta Borellum *Cent. 1. Observ. 13.* aliud febrifugum amuletum vid. ibid. *obs. 32.* Radix plantaginis appensa commendatur etiam contra febres; hinc Lotichius in *Observ.* hanc radicem commendat, ut applicetur à suis ægris: præ cæteris in fuligine furni non inelegans est remedium, si sc. hæc & salvia contusa recens ana miscentur invicem cum albumine ovi, & applicantur carpis manuum vel plantis pedum, & egregiè æstum compescunt. Alii fuliginem splendentem, Spiegel-Ruß/ ut Willsius de *Febribus*, cum allio, cepis, & albumine ovi miscent, aceti nonnihil affundunt; & ita carpis manuum applicant; vel cum theriaca subigitur & terebinthina, & applicatur pulsibus.

Angli habent Cataplasma febrile ex sale, lupulo recenti, & passulis majoribus. Hoc carpis manuum applicatum in febribus intermittentibus insigniter prodest. Facit huc emplastrum ad tertianas imprimis usurpandum, quod fit ex

*Mell. ʒij.*

*Mastich.*

*Terebintb. a. ʒss.*

Coquatur mel ad debitam consistentiam & cum reliquis f. l. a. emplastrum: extenditur super alutam, & adspargitur nonnihil fursurum, ne nimis adhærescat, & imponitur regioni ventriculi, quando febricitans iturus est cubitum, ac quamdiu placet, relinquatur.

Pertinet huc emplastrum febrile D. Michaelis externè applicandum, quod est egregium:

$\mathcal{R}$ . *fu-*

℞. *futig. furni splend.* ʒjʒ.  
*terebinth.* ʒvj.  
*tel. araneæ.* ʒj. vel *har. & araneæ.*  
*maj.* à ʒʒ.  
*camphor.* scrup. ij.  
*olei araneæ.* vel *scorpion.* q. f.  
*M. f. emplastrum.*

Carpis manuum utrinque magnitudine thaleri applicatur, gestaturque aliquandiu, donec febris evanescat: hoc ipso quendam senem ferè octogenarium quartana laborantem sine alio remedio curavit Author.

Rectè additur camphora: nam hæc ad ʒj. vel ʒij. sacculo lineo inclusa, & in scrobiculo cordis appensa, continuò gestata, donec exhalaverit tota, felicissimè febricitantes tertianarios restituit. D. Schrœckius frequenti in usu habuit in tertianis & quartanis.

Præ aliis usitatum est oleum aranearum, & omnia alia ex araneis parata; nam & vivæ araneæ majores cellulariæ instar amuletorum suspensæ commendantur: mirabile enim in se habent sal Mosum insigniter diureticum, quæ araneæ, & ex iis etiam paratum oleum, basis sunt decantati emplastri Strobelbergeri contra quartanas, quod describitur in Schrœderi *Pharm.* l. 2. cap. 72. Carpis istud applicatum nonnihil vesicat, quod est signum legitimæ operationis, utut successivè evanescant: loco hujus succedaneum non inconveniens est sequens, ad quartanas etiam malignas, expertum emplastrum:

℞. *Terebinth. Veneta* ʒj.

cui liquefactæ in ahenò cupreo injiciantur  
*Araneæ. viv. magnæ.* N. xii. xx.

l. xxx.

Agitentur probè cum spatula lignea, donec araneæ ferè non ampliùs appareant: add. postea:

*pulv. carn. bufon. exsic.*

*rubetæ. exsic.* à ʒʒ. ad ʒijʒ.

*Tartari crudi* ʒj.

*sabina* ʒij. vel ʒvj.

*oleum scorpion.* vel *simpl.* vel *Matthioli*  
q. f. ad justam consistentiam emplastri.

Agitentur probè omnia cum spatula lignea, donec f. emplastrum. Vid. *Thesaur. Pharm.* Hoffmanni pag. 65. no. 2.

Præterea in quartanis aliisque febribus diurnis subindè consultum est, si suspicio sit de tumoribus viscerum aut splene affecto, emplastra quædam splenis regioni applicare. In talibus casibus convenit emplastrum de cicuta, mistum cum gummi ammoniaco, imprimis emplastrum ex nicotiana;

℞. *emplastri de nicot. usit.* part. ij.

*gumm. ammoniaci in +to sol.*

*tacamah.* à part. j.

Mixta malaxentur cum f. q. olei Philosophorum: extendatur super alutam, & detur absque syndone.

Tom. II.

Item emplastrum carminativum Sylvii hîc optimo cum successu applicatur, uti etiam emplastrum de ranis cum Mercurio, quod ibi egregium est. Helmontius mentionem facit emplastri, quo ad splenis regionem applicato, plurimos quartanarios se curasse asserit: compositio & præparatio non adeò constat: quidam volunt, hanc esse; ego verò non credo:

℞. *tabaci* q. v.

Minutissimè inciso affunde vini q. f.

Coqu. per mediam horam in vase clauso, postmodum coletur & fortiter exprimatur: colaturæ expressæ add.

*succi inspiss.* vel *extract. nicot.*

*mell. commun.* cera,

℞. *nicotian. l. olivar.* q. f. ad consistentiam emplastri.

Applicetur tepidè regioni lienis cum oleo capparum. Vid. Hoffmanni *Thesaur. Pharm.* pag. 66. no. 12.

Ubi simul adest dolor:

℞. *Extract. nicot. per decoct. par.* ʒijj.

*Opii* per dissolut. cum vino in extracti consist. redacti ʒj.

cera lʒʒ.

c. *terebinthina* & ℞. *Nicotiana* à q. f.  
f. emplastrum.

Facit huc etiam cataplasma Mynsichtii febrile non inelegans, quod vid. in *Armam. Chym. Sect.* 38.

## CAPUT III.

De

### Febribus Continuis & quidem

De

### Febribus Ephemeris.

Febres continuæ, sunt quæ à primo suo invasionis momento usque ad ultimum durationis finem continuo perdurant. Febris hujusmodi continua quoties blanda fuerit, & una die tantum durat, secundum durationis suæ rationem dicitur ephemera, seu unius dici, naturalis febris, Latinis febris diaria: quemadmodum si eadem per duas, tres, quatuor, quinque vel sex dies ita duraverit, & aliquo critico naturæ motu finitur, diaria seu ephemera plurium dierum: item usitato vocabulo synochus non putris, dici solet.

C A U S A E.

Causa in genere harum febrium emphemerarum est perversus usus 6. rerum non-naturalium, quarum occasione excitatur sanguinis fermentatio naturalis intensius aucta, & plus minus turbata, adeoque non-naturalis, ut corpus eò usque incaleseat. Unde præ-

(N n)

ter

ter functiones leviter læsas pulsus frequentior solito ac major excitatur. Omnes ergo res nonnaturales, quæ sanguinis fermentationem augere, & effervescentiam excitare possunt, sunt febris diariæ causæ. Sponte tandem evanescit, & blando sudore ac madore prorumpente finiri solet: pro quo scopo etiam blandum sudoriferum propinatum, mixtura simplex, vel R bezoardica, semel vel bis usurpata, interdum curationem absolvit. Interim est febris nullius momenti, & vel rarò aut nunquam sub praxin Medicam cadit; pro uberiore tamen ejus explicatione consulatur Sylvius lib. 1. Præcox c. 28. propter res sex nonnaturales benè explicatas, Picens de Febris P. 2. c. 2. pag. 15. Willsius de Febris.

Facile tamen in corpore impuro, sed cujus sanguis à debita crasi plus minus declinat, & heterogenearum particularum miscela ad fermentationem p. n. dispositus, in putridam vulgò sic dictam, seu fermentativam præternaturalem, degenerare possunt. In quo casu sequentia adhiberi possunt:

℞. Decoct. C.C. cum rad. scorz. lb. j.  
succ. citri.

cydon. ʒiij.

Ra fl. aquileg.

bellid. ʒiij.

syr. rubi Idæi ʒij.

℞. Oli q. s. pro sapore.

M. D. S.

Alterirender Zulep.

Vel

℞. Decoct. C.C. lbj.

succ. citri rec. ʒiij.

cydon.

syrup. acetos. citri.

rubi Idæi ʒiij.

℞. Oli dulc. q. s. pro Julepo.

℞. flor. bellid.

papav. errat.

rosar. ʒiij.

tamarind. rec. ʒiij.

Coqu. in lb. iij. l. iv. ▽ comm. vel feri lactis depur.

cum ℞ Oli acidulati.

Decocto ferventi adde

Conserv. papav. errat.

rosar. r. rec.

violar. ʒiij. l. ʒj.

Stent in loco tepido per horas aliquot; Colatur. D.

De quo bibat æger pro lubitu, vel quotidie bis, manè, & bihorio ante cœnam. Item

℞. rad. scorz. ʒiij.

ras. C. C. ʒj.

ligni sassafr. ʒiij.

Coqu. in f. q. ▽, circa finem addendo

Cortic. aurant. ʒiij.

Colatura edulcoretur cum saccharo.

D. S.

Alterativ. Trans.

In ardore corporis cum inflatione abdominis præscripti cuidam:

℞. ▽ fœniculi ʒiij.

carminat. ʒvj.

℞. Oli dulc. ʒiij.

syrup. cort. aurant. ʒiij. M.

## ARTICULUS II.

De

### Febribus Acutis Primariis.

Quoad suprâ factam divisionem, considerabo primò febres continuas acutas, postmodum lentas. Quod attinet febres continuas, quæ suum cursum cum impetu continuant à principio usque ad finem sunt vel primariæ, vel secundariæ seu symptomaticæ dictæ. Primariæ sunt, quæ per se morbum constituunt. Secundariæ superveniunt aliî morbo, à quo complicantur, quales v.g. febres continuæ sunt in Pleuriticis, Peripneumonia, erysipellate, & similibus partium inflammationibus; item quales superveniunt vulneribus aut ulceribus gravissimis partium, imprimis internarum, qua ratione phthisis exulceratione cujusdam visceris nata ordinariò secum febrem comitem habere solet.

Febres acutæ primariæ sunt vel simplices, aliàs continentes seu continuæ κατ' ἐξῆς sic dictæ, utut hoc vocabulum Medicinæ parentibus, in specie Hippocrati, fuerit incognitum; vel compositæ, aliàs continuæ periodicæ seu synochæ. Illæ sunt, quæ eodem tenore, eodem impetu, sine variatione, sine ulla exacerbatione aut remissione à suo principio usque ad ultimam & integram sui cessationem perdurant. Continuæ verò periodicæ sunt, quæ continuo quidem in suo cursu ad finem usque perseverant, nihilominus tamen certo tempore, nunc tertio die, nunc quod rariùs, quotidie, aut quarto die, subinde exacerbationes quasdam & paroxysmos exacerbatos patiuntur, post quas remissio quidem, non autem totalis intermissio febris observatur. Talis continua periodica est inter febres acutas continuas tertianas; inter lentas verò febris catarrhalis omni vespere ferè suas exacerbationes habens. Reverà hæc nihil aliud sunt, nisi febres compositæ, ex febre nempe intermittente suas periodos observante, & febre continente, æquali cursu continuo promota.

### FEBRES ARDENTES.

Die hitzigen Fieber.

C A U S Æ.

Scilicet causa proxima febrium continuarum non periodicarum est nihil aliud, quam talis massæ sanguineæ dyscrasia, qua hæc sale



fale volatili acris, sæpius oleoso simul (eoque præternaturaliter vitiato seu corrupto, & consequenter sanguinis nativam crasin turbante,) quod ab aliis vocatur bilis præternaturalis, adeò est turgida, ut vel levi accedente occasione talem ebullitionem febrilem præternaturalem, instar vini generosi immanius ebullientis, tandem concipiat, dum sal volatile acrius aut oleosius uberius luxurians vitiosè cum acido concurrit, & plus minus intensè fermentat; unde insigniter incallescens partes oleosæ tam efferatam ardorem & æstum in totum corpus distribuunt. Unde ex fale volatili abundante calor acris & insigniter auctus observatur, idque eò magis, quò magis oleosum fuerit sal volatile massæ sanguineæ. Pulsus est admodum celer, frequens, & quò magis oleosa, adeoque occultè acida est massa sanguinea, eò erit major, quatenus acrior, propterea excitatur effervescentia, urinæ simul sunt crassiusculæ & plus minus turbidæ, prout longius vel propius absunt à statu tales febres: & quò magis oleosum fuerit sal peccans, eò simul magis tinctæ; quamdiu verò æqualiter effervescent acidum naturale cum fale volatili oleoso peccante, tamdiu urinæ crudæ seu tenues & intensè tinctæ existunt; quando verò successivè præcipitatur sal volatile oleosum peccans seu bilis ab acido, urinæ crassiores turbidæ, & quæ pederentim sedimentum deponant, excerni solent, unde coctionis signa talia rectè dici solent.

Quando massa sanguinea à fermento planè dissolvitur, ita ut nulla coctionis appareant signa, mors præstò est. Kergerus urinas fermentatas rectè dicit turbidas febricitantium. Nam, quæ fermentescunt acrius ex conturbatione & exagitatione, perspicuitatem amittunt: vid. Kergerus pag. 277. de *Fermentat.*

Causa remota crasin massæ sanguineæ ita alterans, ut occasione levi data hujus organismus febrilis, & spirituum influorum fervor & impetus oriatur, adeoque fermenti præternaturalis vices occupans, hæret imprimis secundum fundamenta suprà in genere posita, & quantum hætenus ex juvantibus & nocentibus judicare potui, in stomacho & primis viis, nempe est vitium chyli; vel sub digestionem plus minus corrupti; vel in duodeno à bile effusa minus perfecti, sed vitiosè alterati, ut sub liquaminis fermentativi nidorosi plus minus amaricantis acris, & plus minus oleosi forma successivè massæ sanguineæ infundatur, easque vices fermentationis, & circulationis leges subit, donec ibidem uberius & copiosius congestum, vel quacunque occasione externa excitatum, tandem ordinariam sanguinis fermentationem & spiritalitatem naturalem turbat, indeque quasi

congestum effervescentiæ febrili præternaturali occasio existat, mediante qua heterogenea ista materia sanguini suffusa, ipsique inimica secernatur, & hinc excernatur, ut in morbo nempe salubri; vel massa sanguinea ita corrupta & inquinata deficiat in effectu secretorio, ut tandem penitus immutata ejus textura & fermentatio vitalis & spiritalitatis, & ipsa vita, ceu illorum effectus, deficiat. Adeoque depuratur massa sanguinea in febre continente salubri, penitus pervertitur eadem in lethali, quemadmodum generosum mustum fermentando se depurat, & fecum secretionem, tanquam quadam coctione, in vinum generosum abit: quod undecunque læsa fermentatione ista in vappam aut situm aut potum ingratum, aliisve modis vitiatum transit. Quod simile intelligibilius saltem reddendæ, non autem explicandæ harum febrium naturæ, inserviat: nempe hoc ipsum chyli vitium est quasi stercus liquidum seu scoria, ex tenuibus intestinis præternaturaliter transmissa in massam sanguineam, ibidem irritando archeum febrium inferens, uti vult Helmontius *Tract. de febribus cap. II.* Sed hoc stercus, licet dicat Helmontius non esse naturale, sed præternaturale, ex chylo corrupto & nidoroso, à bile corrupta in intestinis vitiosè facto oritur. Confirmat hætenus dicta analogia ista, quæ inter febrem intermittentem & continuam talem intercedit, dum non saltem de facili complicantur, aut invicem permutantur, ut infra patebit; sed quod unicus est in intermittente paroxysmus, hoc in continua est integri morbi cursus. Nempe acidum primarum viarum fermentativum, sed sub digestionem aberrans, chyli, non ritè transmutati & consequenter nec debitè perfecti medio in massam sanguineam delatum, præternaturalis fermentationis est occasio; quod aliàs naturali modo chylum perficiens, hanc sanguini permiscibilem, & continuatæ fermentationis adjumento perfectè assimilabilem reddit: adeo nempe secundum Verulamium in *Hist. vitæ & mortis p. 136.* stomachi robur fundamentum est ad reliquas coctiones, & omnes succorum in corpore fermentationes sunt saltem continuationes fermentationis in stomacho inchoatæ, ut loquitur Symon in *Zymologia pag. 50. &c.*

Ex dictis hætenus vis & operandi ratio causarum remotarum promptè elicitur, cum tales febres continuæ ardentes imprimis soleant occupare corpora juvenilia, in quibus notum, quod bilis sit copiosa, seu massa sanguinea imprægnata copioso fale volatili oleoso, idque magis tempore vernali & æstivo, aëreque squalido, quod incallescens corpus agitatur massam sanguineam, ejusque fermentationem intendit; item corpora evsarcæ & evchyma, & quorum massa sanguinea ob

particularum fermentescibilium copiam & volatilem acrimoniam intensius fermentari solet, eos itidem, qui utuntur victu lauto, & potu generoso, spiritu vini & vino generoso: item qui vitam agunt sedentariam aut otiosam, aut somno nimis sunt dediti, & similes: sæpe etenim multum huc facit corporis habitus plethoricus, sanguine existente plus minus oleoso. Quibus subinde accedunt causæ externæ, quæ talem dispositionem movent, ut res procatacticæ in actum secundum prorumpant: quas inter est primariò transpiratio corporis insensibilis prohibita; effluviis enim istis transpirabilibus suppressis massa sanguinea turgescit: iracundiæ fervor, acrium & volatilium abusus: hinc immeritio subitanea in aquam frigidam post æstum corpora disposita in febres ardentes conjicit; quatenus sc. obstruuntur pori, quod observavit Hildanus *Cent. I. Observat. 95.* ( nisi synochus plurium dierum seu non putrida hinc oriatur ) & Valeriola *l. 2. Observ. 6.* item ex nimio usu aquæ theriacalis in animi deliquiis infusæ febris ardens observata fuit à Salmuth *C. I. observ. 51.* sicuti idem observat febrem ardentem ex theriacæ nimia quantitate exhibitæ, &c.

#### FEBRES CONTINUÆ COMPOSITÆ.

Rectè Sylvio dicuntur, compositæ ex continua acuta & intermittente periodica; ita quidem, ut sub febris continuæ cursu subinde affligens, & periodicè recurrens febris intermittens, exacerbationem periodicam plus minus intensam febris continuæ inferre soleat. Continuæ hæ periodicæ ut plurimum sunt tertianæ, æque frequentiores, in quibus nempe sine intermissione febris pergit, utut subinde exacerbetur, & ab ista exacerbatione denuò remittat. Continuæ verò quotidianæ rariùs sunt acutæ, quin ferè sub censum continuarum, sed reverà febrium lentarum aut lymphaticarum veniunt. Febri huic in exacerbatione nonnunquam animi deliquium vel syncope solet imminere, ob quam causam tales febres aliàs syncopales nuncupantur; omnium autem rarissima est continua quartana, de qua, an observata fuerit, multi adhuc dubitant, sicut & Joel *in Praxi*, ( cui veterano practico jam septuagenario, & tamen in Pomerania, ubi ex acido fixo viscido, seu veterum melancholia nati morbi, indeque hypochondriacum malum ac scorbutus frequentiores sunt, & ex quo humore quartanam derivant, viventi nunquam apparuit ) eam aut nullam aut rarissimam esse judicet. Quin &, si aliquando occurrant, ad lentarum naturam eas proximè accedere, asserit Piens *de febribus P. 2.*

pag. 98. aut cum continua lenta complicatæ erunt. Notabile talis complicationis exemplum suggerit Lindanus *super Hartmannum*, dum dicit: *Vidi ego in hac urbe ( nempe Amstelodami ) 3. Quartanas cum hectica ex animi mæore contractas: Primus paroxysmus erat vehemens, secundus lenior, tertius lenissimus, quartus, qui respondebat primo, iterum vehemens, &c.* His quartanis remittentibus remanebat febris continua seu hectica ex mæore orta. Principio non putavi dari quartanam continuam, sed postmodumprehendi; effeci, ut omnes quartana cessarent, sed remanebat hectica. Ego sanè continuas periodicas ( quotidianas & quartanas ) pauci aestimo, nisi tertianas, quæ sunt frequentiores.

Continua in his febribus continuis periodicis est febrilis fermentatio, ejusque effectus pulsus mutatus, & caloris intensio, & certa sua periodo saltem exacerbationem, cujus indicium symptomata præbent, patitur; ita tamen, ut in his exacerbationibus ferè nunquam, aut rarissimè horroris sensus percipiatur ob intensiorem caloris sensum, & motum totum corpus occupantem, quin saltem ex caloris & ardoris augmento exacerbatio tunc solet observari. Confer. Sylvius *l. 1. cap. 31.* Ex intermittente igitur & continue componuntur continuæ periodicæ, speciatim tertianæ acutæ.

Causa complicationis hujus febrium intermittentium & continuarum est, quod in massa sanguinea ad febrem continentem disposita ex sale volatili oleoso copioso ob errorem diætæ & stomachi erratum ulterius vitiosi succi congeruntur, qui intermittentes periodicas inferunt; cum & antea, massa sanguinea ex sale volatili oleoso uberius effervescente, jam febrem continuam patiat.

Huc pertinent febres scorbuticæ periodicæ vagæ, curæ difficilioris.

Complicantur autem tribus modis:

1. Dum febris intermittens in continuam ardentem degenerat, & ita postmodum invicem perdurant, dum, præter fomitem febris intermittentis ejusque fermentum acidum, recementa nidorosa massam sanguineam errore digestionis primæ inquinant.
2. Continens in intermittentem abit, correctæ plus minus massa sanguinea, & successivè succrescente fomite præternaturali intermittentis in primis viis, in specie si minus diætæ subcra febris continuæ operam dent ægri.
3. Dum simul tales binæ febres inchoant & pergunt, idque modo supra dicto,

cto, five simplices fuerint, five compositæ seu multiplicatæ. Notabilis est complicatio, quam refert Panarollus *Pent. 2. observat. 33. pag. 99.* nempe tertianam continuam duplicem cum quartana lethalem.

Jam verò nobiliora quædam his acutis in febribus, tam continentibus quam continuis periodicis, occurrunt symptomata, pro quorum varietate subinde variant, unde varia sortiuntur nomina seu appellationes. Sic quædam harum febrium, ubi fuerit gravior καὺς καὶ ἐξοχὴν seu

### FEBRIS ARDENS

appellatur, cujus 2. sunt quasi pathognomonica symptomata. Aëstus nempe & ardor intensus, & sitis ferè intolerabilis; hinc frequentissimè continua tertiana periodica causi nomen obtinere solet: vid. Sylvius *l. 1. Præcox cap. 29. §. 24. & c. 31. §. 5.* quibus primariis symptomatis subinde accedit & linguæ ariditas, labiorum fissuræ, capitis dolores, delirium, & similia alia symptomata: Horstius verò in *Problem. Dec. 1. Quæst. 4. pag. 5.* Veterum causum hodiernam febrem Hungaricam esse asserit. Urina in talibus febribus est intensissimè tinctæ, rubicundissima, in incremento crassa, turbida, opaca, cum enæoremate, in statu copiosissima sedimenta sunt in fundo matulæ, quæ ardorem significant; si urina prius densa, crassa, aut opaca, & subito intensè tenuis, portendit deliria, jectigationes, anxietates, &c.

### CAUSÆ.

Easdem penitus causas agnoscit causus, sed intensiores, & concitatiores fermentationem excitantes, ac febres continuæ acutæ aliæ: unde ex volatili aciori acido, cum sale volatili oleoso intensiorem sanguinis effervescentiam excitante, intensissimus ille æstus oritur; cum notum sit, nil magis effervescente & fermentando incalescere, quam salia volatilia oleosa: Hinc, dum sub ista effervescencia insigniter turgescit, &, ut sic dicam, ebullit massa sanguinea, non potest non pulsus fieri maximus, & necessariò frequentior, & prout spiritus animales sunt constituti, imprimis in principio, simul robustus. Ardor talis, dum alcalisatur quasi causa febrilis, ut loquitur Helmontius *Tract. Pylorus Rector §. 26.* sitim adeo intensam & cruciantem excitat, h. e. depravatum in febre fermentum stomachale, dum non aptum est ad consuetam digestionem, in excrementum nidorosum facessere finit, quicquid in stomacho

fuerit, quod à calore partis, & speciatim ab intenso æstu febrili magis alteratum, & quasi colliquatum in texturam alcalisatam oleosam, ut quasi empyreuma contrahat, tunicis ventriculi tenaciùs impactum, febrilem sitim infert, non solum irritando & vellicando certo modo membranam stomachi & œsophagi, & per consensum ipsius quoque linguæ; sed præterea massæ sanguineæ insulum simul alterat lympham salivalem, fauces humectantem, eamque subinde sale volatili oleoso imprægnat, ratione cujus taliter ægro- tantibus subindè gustus amarus in lingua obvenire solet: qui amaricantibus, v. g. cerevisiâ lupularâ, ex dictis causis intenditur, nec nisi acidis, præsertim mineralibus, corrigibilis est.

Alia differentia est in febre,

### LIPYRIA

dicta, in qua interiora uruntur, exteriora verò frigent: de qua disceptantes admodum quoad ortum & fiendi modum Autorum sunt sententiæ. Quamplurimi ad secundarias, adeoque vel comitatas vel symptomaticas febres referunt. Instar omnium sit Lindanus, qui super Hartmannum inquit: *Febris lipyria est febris ardens, orta ex inflammatione visceris interioris valde sensilis, de qua loquitur Aphor. 46. Sect. 4. Hippocrates, & Aphor. 72. Sect. 7. de quibus notandum: (1.) Febres has non esse intermittentes. (2.) In talibus algorem esse externorum, & ardorem internorum. Ubi per partes externas non vulgò dictæ, manus, pedes, nasus, lobi aurium, &c. intelligendi sunt, sed universi corporis habitus. Algor autem non est tactu Medici aut adstantium judicandus, sed agri judicio, qui se algere dicit, & tegi jubet. Tepent enim membra, nec est ea vis, qua in aliis febribus ardentibus adesse solet. Hac febris brevi terminum absolvit, plerumque intra triduum, quadriduum, & vix unus evadit, nisi statim ab initio huic malo præveniamus: lien, hepar, viscera alia &c. si qua accenduntur, non tantum periculi importat, quam si partibus membranosis inflammationes accidunt, ut ventriculo, ileo, utero, vesica &c. Solent enim conqueri de summo æstu partis affectæ, lingua crassa nigra, magna corporis adest agitatio, sitis inextinguibilis, delirium, pervigilia, &c.*

Notanter dicit Lindanus, partis sensibilis inflammationem valde sequi Lipyriam. Pars enim non valde sensilis, v. g. mesenterium inflammatum, febrem quidem etiam continuam, sed lentâ ferè plus minus inferre solet. Conf. Sen-

(Nn 3)

nectus



nertus *l. 2. de Febribus c. 16. pag. 206.* Sanè practicae experientiae comprimis consentiens est hæc sententia. Sunt & nonnulli, qui etiam primariam febrem subindè lipyriam esse contendunt, quos inter non tantum est Sylvius *l. 1. Prax. cap. 29. §. 31. & 32. & Primerosius lib. 3. de febribus, cap. 8. pag. 264.* sed etiam ex nimis liberali usu fructuum faginarum (*der Buchecker*) eandem enatam, adeoque apparenter primariam observatam à Borrichio in Bartholini, *Act. Medic. Hassniens. Vol. 2. pag. 160.* Primaria talis, cum rarissima sit, adeoque adhuc nonnihil dubia, & quoad fiendi rationem adhuc intricata, saltem frigoris ratione ad genus nervosum membranosum undecunque irritatum, æstuationis verò respectu ad sanguinem in præternaturalem fermentationem concitatum, hincque alteratos insigniter spiritus, idque ex suprà dictis probabilissimè à sui generis acido, respiciendum erit.

Porro sunt

#### FEBRES CONTINUÆ cum PRUNELLA,

dum in febribus continuis, imprimis in caulo, sitiunt ægri, sæpè lingua & fauces arefcunt, earumque concurrit ardor ac rubor obscurus. Unde tunc temporis simul lingua quoque non tam arida existit, sed præterea crusta nunc albicante, nunc nigricante obducta, colore nigricante puniceo apparet tincta, *Kirschbraun* uti vocant, qui faucium ac linguae affectus vulgò vocatur prunella, *die Bräune* / & omninò distinguenda ab angina, utut vulgo confundantur. Hæc febris cum prunella vocatur febris Hungarica, & non rarò solet esse epidemica: de quibus Sylvius *l. 1. Prax. cap. 29. §. 26. & 33.* Imò dubitant nonnulli: an detur causus, cui non ut plurimum conjuncta sit malignitas? ipsa saliva infecta causa maxima videtur febrium istarum, dum sc. ista alterata, & imprimis mox glutinosa reddita in febribus mucilaginis instar agglutinatur faucibus & linguae, quæ mucilago pedetentim ab æstu febrili calcinata quasi aut exsiccata, indeque istis partibus teneris perquam molesta & hostilis, has irritat & arefcere facit, ita ut mox phlogosin seu inflammatoriam quasi dispositionem acquirant, unde rubedo, ardor, dolor, muci plus minus spissi proventus, tandemque fissuræ faucium & linguae.

#### FEBRES COLLIQUATIVÆ

dictæ etiam huc pertinent, dum scil. febribus his continuis accedit subinde colliquatio corporis, quæ nostris in provinciis sunt frequentissimæ, scil. tales, in quibus corpus brevi tempore insigniter consumitur & emaciatur, dum ros nutritivus chylosus, tam in massa

sanguinea quàm in solidis partibus, dissolvitur, & ipsa pinguedo quasi obtunditur & colliquescit. Accidit hoc, idque crebrius, per alvum, & tunc vocatur diarrhœa colliquescentia, quam certo respectu possumus referre ad Sylvii *Febres Cacatorias*, in qua copiosa, ut plurimum admodum foetida, (qui foetor oleosæ substantiæ, adeoque & pinguedinis pessimam colliquationem notat, cum nil æquè foetere soleat, ac oleosa seu pinguis corrupta, & ad putredinem vergentia) excernuntur: sæpius per sudores, qui vocatur sudor colliquativus, qui copiosus, minùs calidus, interdum plus minus glutinosus excernitur: item per urinam in urinae fluxu colliquativo, in quo urina copiosa cum supernatante propriè dicta pinguedine effunditur: nunc etiam sæpius in certas corporis cavitates humores colliquati effluunt, quo sensu semper oritur hydrops quidam, qui frequentissimus est in abdomine & pedibus, cum superiorum partium marasmo: nunc verò solo ardore febrili, sine ulla excretionem se ostendere solet; idque tardius, dum nempe absumitur ros nutritivus, necessariò corpus emaciatur.

Febres hæ colliquativæ sunt omnium pessimæ & malignis proximæ, quibus tandem in periculoso statu convulsionem superveniunt vel deliria, & sic intereunt ægri.

Definiri autem potest hæc febris, quod sit symptoma fermentationis massæ sanguineæ auctæ, dependens à nimia acrimonia fermenti febrilis, unde oritur notabilis humorum laudabilium profluxus, omniumque partium pinguium resolutio.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta sunt partes totius corporis chylosæ ac pingues: nam reverà impossibile est, ut os, vel cartilago, vel membrana, vel fibræ in corpore corrumpantur, nisi hoc fiat per putrefactionem aliquam, v. g. in carie & pure; hinc etiam omnes fibras in singulis angulorum seriebus reperire licet in cadavere ad extremum maciato: imò, si fibræ quædam annihilarentur, quæro, quomodo possibile sit, ut patientes tales tabidi sceletiformes possint exercere omnes musculos? cum constet, punctâ vel compressâ unâ alterâve fibrâ musculi aliàs vegeti satis, aboleri totam actionem musculi. Interim tamen faciliè largior, quatenus succi pingues aptas reddunt fibras quascunque motui expeditiori, eatenus destructo succo pingui percipere corpora varia incommoda.

#### CAUSÆ.

Causa colliquationis talis partim in subiecto patiente seu succo nutritio chyloso rorido, & inde nata pinguedine, partim in efficiënte etiam, consistit: in patiente quidem, si

si succus iste texturæ rarioris, subtilioris, minusque ab acido concentratæ existit, hinc facilius resolubilis & attenuabilis denuò esse solet: v. g. carni aprugnæ sub assatione nil omnino ut planè minimum est, quod defluit, suis verò domesticæ carni plurimum, eò magis, quò plus adipe vel carne abundat, ut loquitur Gorræus in *definit. Medicina pagin. 319.*

Texturam autem istam plus minus resolvablem à certo contextente acido dependere, illustrat experimentum istud, quo olea per spiritum nitri acidum in pinguedinis consistentiam coagulare possumus, dum alcalia econtrà, & saccharum butyri coactionem debitam penitus inhi beant.

Causa efficiens attenuans, & menstrui instar dissolvens, & hinc seroso vehiculo unibile reddens, non est tantummodò caloris motus, utut hîc pro liquefenda denuò pinguedine multum valeat, sed acrimonia septica seu quasi caustica fermenti febrilis peccantis penetrans, dissolvens, & nutritivum succum ac pinguedinem partium solidarum, cujus coagulatio ab acido occulto fieri assolet, liquefaciens, simili ferè ratione atque acres quasi causticæ particule purgantium, aut sudoriferorum resinorum acrium, &c. dissolvere & liquefacere assolent chylosas & roridas nutritivas particulas, quæ acrimonia, ad quam acrium classem, an acidorum volatilissimorum, an alcalium, an salforum, referenda sit, in medio hoc loco relinquo.

Huc etiam facit nimia succi biliosi acrimonia, quæ longiore tramite in intestinorum cavitatem influens, chylum acrem reddit; quare in massam sanguineam translata, eandem cum nutritivo succo resolvit & colliquefacit, quæ nimium fermentando, & in sua textura fatiscendo, per glandulas intestinales, pancreas & vasa biliaria excernuntur, sicut & ipse bis in talibus cadaveribus fellis vesiculam planè exinanitam, & ad instar folii florum papaveris tenuem observavi.

Si verò nulla oritur humorum extravasatio, oritur demum sudor, qui tamen ut plurimum concomitatur & diarrhœam & hydropem; quapropter, ubi sudor diarrhœam & hydropem non levat, res est maximè desperata.

Causæ remotiores febris colliquativæ possunt esse variae, imprimis autem ex rebus non-naturalibus, multum hîc valet aëris constitutio epidemica. Quoad potum: largior & frequentior potus, qui depravando fermentum ventriculi, adauget per oleositatem suam, & volatile copioso turgidam, & volatile oleosum bilis, eamque reddit acrem: quare

ut plurimum ejus potatores strenui tandem mortem oppetunt ex febre colliquativa. Idem censendum est de fumo tabaci nimium frequenti & copioso: ex haustu nimio aquæ frigidæ, corpore prius nimium commoto, febrim colliquativam sibi aliquando contraxit juvenis 18. annorum. Quoad alimenta: faciliè possunt ad febrim colliquativam disponi nimium quantum appetentes aromata.

Ex rebus præternaturalibus est scorbutus, qui rarò patientem occidit absque colliquatione, imprimis si patiens erit ætate profectior. Febris aliquando colliquativa ex cancro mammarum cum diarrhœa observata est.

Colliquativa enim hæc febris, ubi cum sensibili excretionem est conjuncta, faciliè se manifestat, & suam causam prodit. Verum, ubi sine tali sensibili excretionem subito corpus quasi fatiscit & colliquefcit, signum est massæ sanguineæ admodum acris, ineptæ ad nutriendum; unde pinguedo & ros nutritivus partium solidarum colliquefactus, nunc sensibilibiter mediante sero, nunc insensibilibiter halituum formâ foras successivè excernitur.

Distinguenda autem sunt hîc *das gelinde Abnehmen in Fiebern/und das Verfallen oder Einsinken/in specie des Angesichts.* Illud autem à colliquatione, & hinc sublequente emaciatione oritur: hoc verò à spirituum influorum defectu aut saltem deficiente vi elastica, fibras & stamina partium in debito tono, & hinc interstitia porosa in debita dilatatione, pro fluidorum quorumvis faciliore transmissione, detinente oritur. Hac igitur vi cessante, vel ob spirituum absolutam paucitatem, vel eorundem vitia, tam constitutionem, vel denegatum plus minus eorum influxum, partes molles, præsertim faciei, collabi, nasus acuminari, tempora excavari, oculorum orbitæ profundiores apparere incipiunt, ut in subitanea syncope correptis, aut facie Hippocratica deformibus, manifestum est.

Ut itaque colliquatio subitanea neque bonum signum esse solet, pessimum tamen semper indicium est ista subsidencia partium mollium subitanea, quæ nunc mox in principio morborum, nunc in eorum progressu, interdum horulæ spatio contingere observatur, spirituum influorum affectum gravem omnino innuens. Glutinosus sudor est pessimus, in specie in febribus malignis: ab acido enim fit assimilatio alimenti, hoc si destruat ab acri volatili, veniunt inde

inde sudores colliquativi, quatenus non potest assimilari alimentum, hinc & in talibus febribus decidunt pili ob illorum denegatum nutrimentum; vid. Garmannus *de Miraculis Mortuorum*.

Porro febribus continuis & continentibus hisce sæpius supervenit delirium: idque non leve, quale in intermittentibus scorbuticis interdum observabile est; sed grave, & ad furorem subinde ægros disponens: idque nunc citius, nunc tardius superveniens, & adstantes insigniter turbans. Hæ

### FEBRES DELIRÆ.

Uti vocant, vulgo die Haupt-Krankheit/ non rarò sunt epidemicæ, antecedere solent vigilæ pertinaces, subinde cephalalgia crudeles; sequuntur verò continuata hæc symptomata tandem convulsiones epilepticæ. Vid. Sylvius *l. c. §. 20. & 37.*

Fit hoc, quando ex fermento febrili, ut plurimum tamen maligno, speciatim ipsis spiritibus animalibus, & hinc generi nervoso, circa interiores capitis partes inimico, istorum textura vitiatur, adeoque motus debitus pervertitur, & genus nervosum continuo vellicatur (unde intensior circa frontem, quàm alias corporis partes, æstus percipitur) partim ex calefacto, per sanguinem fortiter effervescentem, cerebro, spiritibusque animalibus fervidioribus redditus, hi ipsi in cerebro & cerebello inordinatè moventur & agitantur.

Apud veteres scriptores Practicos & horum interpretes plures adhuc febrium acutarum differentia annotantur, v.g.

### FEBRIS PEMPHYGODES.

Latine ampullosa dicta, in qua tam facies & os, quàm caput & alia partes corporis, bullulis hinc inde protuberantibus interstincta observantur; cujus notabile exemplum videb. in M. A. N. C. *ann. 8. Observ. 56. p. 93.* & Zacuto Lusitano *Prax. Admir. Observ. 15.* Qualis tamen bullularum elevatio & intumescencia potius fermenti maligni cujusdam critico quali naturæ motu, cum suo vehiculo ad instar variolarum exclusi, effectus esse videtur.

FEBRIS TYPHODES, item ELODES, item HYDRODES.

Latinis sudorifica dicta est, in quibus statim primo die ægri copiosè sudant, sudore ipso parum aut nihil alleviante (quæ an eadem fuerint cum sudore Anglico, ut asserit Langius *Epist. 19. lib. 1.* dubitare licet) sive colliquativus, sive non fuerit talis sudor: illius nempe colliquativi theoria ex suprà dictis; huius verò aliquò modò mutatis mutandis ex Sylvio *lib. 1. Præf. c. 30. §. 40. & 114. item cap. 58.* intelligi potest.

### FEBRIS ASSODES dicta, seu ANXIOSA.

Wann die Kranken Herzens-Angst haben / in qua ob anxietates ægri, decubitus eundem non ferentes, figuram jacendi sæpius variant, adeoque in lecto se jactitant.

### C A U S A.

Inter omnes anxietatis causas frequentissima est oris ventriculi affectus, quando nempe vel ob malignum quoddam fermentum, vel à pravis, utut paucis, humoribus, ejus tunicis immerfis, mordetur seu irritatur, vel iisdem in intestinis, in specie in tenuibus, stagnantibus, qui ad stomachum delati, sub nomine bilis porraceæ tetra symptomata faciunt: hinc vomitoria in principio harum febrium instituta sunt optima. Præter hanc tamen vel *καύμα* intensius, vel orgasmus materiæ ejusdem, vel malignitas insignior, vel imbecillitas in causa esse solet: de quibus in specie vid. Stephanus Rodericus Castrensis *lib. 1. cap. 21. Tract. Quæ ex quibus.*

### FEBRIS LINGODES, seu SINGULTUOSA.

Talis est febris, in qua singultus cum febre permanet, vel cum febre per totum morbum simul exacerbatur; exemplum vid. in M. A. N. C. *ann. 4. Observat. 48. pag. 43.* Ut plurimum est ex ventriculo, sive per essentiam, sive per consensum affecto.

Curatur carminativis, castorinis, cinnabarinis & opiat. Sic Horstius *lib. 1. de febribus Observat. 25.* Laud. opiat gr. iij. cum pauxillo theriacæ & conservæ rosarum cum successu exhibuit: item applicavit cucurbitam scarificatam super os ventriculi.

### FEBRIS PHRICODES seu HORRIFICA.

Cui in toto morbi cursu crebri horrores & rigores superveniunt, quales non solum in supurationibus partium internarum; sed etiam febribus compositis interdum supervenire solent: de quibus omnibus, ne actum agam, vid. Stephanus Rodericus à Castro *c. 1. l. 1. c. 18. 19. 20. &c.* Conferatur etiam Zacutus Lusitanus, qui & earum historiam & observationes pertractat in Medicorum principum *Histor. & Praxi Admiranda.* Plura symptomata, eorumque diductionem, historiam etiam harum febrium exactiorem, videb. in Sylvio *l. 1. Prax. cap. 29. item cap. 31.* Inter febres compositas plus minus acutas primariam sui considerationem meretur.

### FEBRIS SEMITERTIANA, seu HEMITRITÆUS.

De qua tamen variantes sunt Auctorum sen-



sententia, ejus discrepantia, præter generalem febrium theoriam admodum intricatam, hæc ferè est origo, vel nimia veterum veneratio, & in iisdem defendendi studium, vel non rite observata multiplex tam compositionis febrium mutua quam complicationis earum cum aliis affectibus varietas. Vulgatissima de semitertiana fert sententia, esse eam compositam ex duabus febribus, tertiana & quotidiana, quarum una sit continua periodica, altera verò intermittens, in qua ipsa, quoniam sub quovis paroxysmi insultu horror plus minus perceptibilis sit, ob id & horrificam seu phricodem hanc febrem vocasse veteres asserunt. Talis semitertianæ typum ex intermittente quotidiana cum tertiana exhibet Regius in *sua Dissertationibus*. Vir quidam robustus incidit matutino tempore in horrorem totius corporis, quem insocutus est calor multus, pulsus celer & creber perpetuo durans: sub vespere ipsum eadem die invasit refrigeratio totius corporis, post quam sequebatur pulsus justo frequentior & celerior: sequenti die calore illo perpetuo & pulsu celeri ac crebro durante, leve frigus sensit, calorque deinde increvit, & pulsus increbuit: tertio die rursus manè exhorruit, & dein incaluit, & vespere, remittente frigore, rursus increvit calor: quarto vero die leviter sub vespere rursus perpasso frigore incaluit, & pulsus increbuit.

Semitertiana verò composita ex tertiana intermittente & quotidiana continua, vid. in *Timæo l. 8. Cap. 21. & 22. pag. 367. & sequ.* Conferatur etiam *Horstius lib. 1. Observ. 14.* item *Riverius de morbis infrequentibus Observ. 23.* Sic *Hemitritæus* ex continua quotidiana & quadruplici tertiana, vid. in *Riverio Cent. 4. Observ. 23.* *Hemitritæum* ex continua minus acuta & duplici tertiana cum singultu vehementi & tumore in sinistro hypochondrio, observavit *Platerus l. 2. Observ. p. 312.* *Sennertus* hisce duobus modis & alium semitertianæ typum addit, nempe i lam, quæ ex intermittente, præsertim tertiana, vel simplici vel multiplici, conjuncta cum febre symptomatice continua, inflammationem partis cujusdam internæ insequente oritur, persuasus ad hoc ipsum, speciatim per *Observationes Spigeli in Tract. de Semitertiana*: v. g. refert *Spigelius* se in juvene quodam *Belga* ex dysenteria in febrem tertianam lapsa & mortuo, per anatomiam ejus inspectione facta, intestina tenuia inflammata, ileum verò sphacelo corruptum, ubi adhæret colo & cæco, invenisse. Confer. de hoc pluribus *Sennertus lib. 2. de febribus cap. 21.*

Observandum ulterius hic occurrit: non raro febrem malignam esse, quæ semitertianæ typum refert, & quia intermittenti ter-

tianæ quocunque modo complicatur; vel quia ipsa maligna vago nonnihil exacerbationis morfu semitertianæ talis typum repræsentat; ob id *Forestus lib. 5. Observ. 14. & 16.* Semitertianas has suboriri asserit, grassantibus febribus malignis & pestilentibus. Nec refragatur *Spigelius c. l.* qui tempore pestis hanc febrem frequentissimam esse asserit; unde & *Schenckius l. 5. Observationum* hemitritæum pestilentem pluribus describit. Quo facit & hemitritæus malignæ bezoardicis curatus: vid. *Riverius C. 4. Observ. 56.*

*Piens de febribus l. 2. pag. 283.* complicationem istam minus admittit, sed semitertianam nil aliud esse asserit, quàm febrem continuam horrificam seu phricodem cum multis rigoribus ingruentem, vel plures intermittentes sibi invicem succedentes, & quasi subintrantes: id quod subinde evenire omnino posse, probabiliter arbitror.

Observandum & hoc: uti malè curatæ quacunque ex causa febres intermittentes in continuas lentas faciliè degenerant, ita & tali lentæ ipsa intermittens complicata hemitritæi faciem referre potuit: Sic enim tertianam intermittentem exquisitam mutatam in semitertianam refert *Forestus l. 5. Observ. 13. & 16.* & febrem lentam tandem mutatam in hemitritæum, iterum *Forestus Observ. 14. l. 5.* refert.

Sanè omnes modò enumeratæ & observatæ complicationes & aliæ plures, ut faciliè fieri possunt, ita & hemitritæi in genere sic dictæ typum omnino plus minus variare, necesse est. Nempe signum pathognomonicum hemitritæi ferè esse solet, quando febris continuo quidem affligit, sed cum succedentibus rigoribus crebrioribus aut horroribus; ubi rigores cum insequente intensiore æstu tertianæ, horror verò, aut saltem perfrigeratio, cum mitiore incalescentia, quotidianæ febris intermittens typum constituere dicitur. Jam ex superioribus patet: fermentum acidum, aliudvè quodvis acre, membranosum genus vellicans, horroris & rigoris, item massam sanguineam inquinans, ex æstuationis occasionem suggerere. Quibus perpensis, de facili multiplicis typi, & complicationis lentarum acutarum intermittentium priuarum, secundarum, malignarum, &c. in subiecto patiente ratione criscos partium contentarum, & constitutionis partium solidarum plus minus variantium, & modi, & hinc differentia patefciunt; adeo, ut uni cuicunque certæ complicationis generi minus nos præcisè applicare debeamus; v. g. semitertianam cum variolis observavit *Spigelius de semitert. l. 2. cap. 16.* Nullus dubito, recurrentes apparenter cum horroribus aut rigoribus paroxysmos ab acri variolarum fermento, partes membranas vellicante, & in sanguine

æstuante, accidisse, & ita in subiecto patiente ratione specialis contentorum idiosyncrasia quasi typum quendam repræsentasse. Pariter Forestus lib. 5. *Observat.* 22. febris horridæ mentionem facit, cui accessit erysipelas. Horrores hi non à speciali febris typo, sed ab acido erysipelatis, vellicante subinde membranaceas partes, ortum habuerunt.

Pro meliore *δωμωσία* compositionis talium febrium, imprimis notabilis est locus Sennerti de febribus lib. 2. c. 21. pag. 320. dum dicit: *Imprimis compositas arguit reditus rigoris, horroris aut frigoris post ejus quietem. Quod si planè continua & simplices videantur febres, attendendum, an post rigorem sudor subsequatur? Nam si in febre, quæ continua videtur, rigor fiat, & sudor non subsequatur, aut fortè post plures rigores unus sudor, signum est febrem illam non esse simplicem, sed compositam: Nam in synocha rigor non apparet, nisi crisis tempore, quam sudor sequitur. Deinde etiam pulsus febris compositæ indicium exhibet: Nam, quamvis febres quadam continua videantur; si tamen sæpius fiat pulsus contractio, illa novi paroxysmi, motusque materiae novi indicium est.*

#### DIAGNOSIS FEBRIUM ACUTARUM.

Signa febrium continuarum acutarum diagnostica sunt facilia: Nam in genere calor intensus admodum, & sitis insigniter aucta seu ferè intolerabilis, sunt signum quasi pathognomonicum febris ardentis seu causi, sive sit febris ardens ex genere continentium, sive ex genere tertianarum continuarum periodicarum, perinde est. Inchoant hæc febres primitus post præcedaneam aliquot dierum lassitudinem, & aliqualem capitis perturbationem, cum frigore & rigore plus minus intensio.

Pulsus præterea semper deprehenditur frequens, celer, & in benignis magnus; si verò malignitas subest, est celer & frequens, interdum inæqualis.

Color est intensus admodum in his febribus, & ut vocatur, vaporosus, i. e. quando manu tangimus ægrum sub intenso æstu, quasi subtilis mador percipi videtur. Et quidem, ubi massa sanguinea videtur magis temperata, & minus acris salina, calor est blandior; ubi verò eadem est magis salina, solet percipi simul acrior nonnihil, & quodammodo simul morficans. Urina in incremento febrium intensè est crassa, rubra, & successivè turbida, opaca cum eneoremate, in principio sine sedimento, cruda, aut saltem leviter cocta; in statu verò copiosa admodum, & varia sedimenta in fundum matulae secedunt, quæ coctionis signa exhibent, & ardorem significant.

Observandum tamen, quod, quò magis

sudant ægri, eò minor sedimenti copia exinde soleat in urina provenire; sicut etiam eorum urinæ, qui sunt constitutionis biliosioris, ut vocant, aut qui laborant scorbuto, aut qui inclinant ad phthisin, etiam levi febricula intensè rubescunt, ob acriora & acidiora plus minus salia massam sanguineam talium ingredientia: contrà verò, quorum massa sanguinea est magis temperata seu diluta, aut copiosa lymphâ, aut succo dulci nutritio chyloso, eorum urinæ minus intensè, catervis paribus, tingi solent, & crassiores, illorum verò tenuiores, observantur, hinc & pariter in illis naturaliter celeriores & frequentiores, in his rariores & tardiores pulsus observari solent. Semper igitur idiosyncrasia subiecti simul consideranda.

Sitis affligit intensa, saliva pauca, eaque glutinosa observatur, tussis & insignes cephalalgia, quas comitantur agrypnia, ut plurimum juncta esse solent.

Si verò febris continua periodica fuerit, secundum typum exacerbationis eadem se ipsam prodit, an sit tertiana, quotidiana, an quartana? imò observata etiam fuerunt tertianæ continuæ duplicatae: Vid. Poterius C. 1. Cur. 43. de duplici nempe tertiana, concitata à fulgure palatium incendente, &c. quin & Panarollus l. 4. observat tertianam duplicatam continuam cum quintana lethali complicatam.

Pergit tali cursu hæc febris, donec solvatur: id quod fit vel subitanè crisi, vel successivâ λύση. Illa non, nisi in his febribus, accidere solet, idque frequentius in calidioribus climatibus, & generosiore victu potuque utentibus, rarius apud nos, in specie cum alterantibus, absorbentibus & diaphoreticis crisin subinde præveniamus: semper tamen & necessariò motus naturæ probè attendatur, ne eundem impediamus: λύση verò pedetentim solvitur, dum cocta materia, v. g. per successivam urinæ excretionem, vel per sudores nocturnos crebrius repetentes, successivè excluditur. Quod etiam facit, quod eadem, præsertim plus minus acuta, solvantur per copiosam expectorationem, excretionem & excreationem cum mediocri tussi; sicut præsertim in petechialibus, copiosa ex faucibus excretio, & quasi pyralismus morbum solvit; interdum successivè abscessus quodam in loco supervenit, &c. nempe & λύση hæc his in febribus successivam coctionem materiæ morbificæ insequens, criseos cum sit vicaria, tamen excretionem vel translationem materiæ coctæ fiat, necesse est, nisi in lentam, aut hæcticam similem acuta hæc febris degeneret, aut ex materiæ coctæ, sed non debitè, h. e. non sufficienter in salsum mutata, nec fixata renovato fermentationis impetu recidiva sequatur.



In febre colliquativa totum corpus languet, notabiles adsunt evacuationes, sive per sudorem, sive per urinam, sive per alvum, sive in certa cavitate collectio.

Urina est ruffa & gravis; præcipitata verò monstrat copiosissimum sedimentum, in superficie autem ut plurimum pinguedinem aliquam habens.

### PROGNOSIS.

Febris vel continens vel continua tertiana periodica, seu acutæ, sunt ambigui exitus: per se quidem minus periculosa sunt, sed potius salutares, de facili tamen periculum supervenit.

Est sunt periculosa, quæ mox in principio, uti dicunt, extremos habent labores, hoc est, quæ nimis sunt acutæ, & ubi symptomata atrociora confertim, maxime circa regionem stomachi, ac mox in principio ingruunt, & ad finem pergunt.

Subita etiam alleviatio in morbis acutioribus est pessima ac lethalis: sic Medici non raro decipiuntur, nescientes, quid sit extremus naturæ conatus? Vid. Langius in *M.C.* pag. 143.

Quo mitiora pathemata sunt circa primas vias & regionem stomachalem, eo mitior & salubrior est febris; ubi autem urget nausea, adest anxietas præcordiorum, cardialgia & diarrhœa, imprimis ubi adest colliquefactio corporis, affectum plus minus periculosum innuunt: nam illæ proximè accedunt ad febres malignas; Unde quævis malignæ acutæ periculosa censenda sunt.

Probè autem attendendum: an in principio talis febris adsit diarrhœa colliquativa? an verò symptomatologica?

Deinde cum febribus continuis ardentibus quibuscunque sæpius complicatur malignitas, reddens tales febres admodum periculosas.

In febribus ardentibus benignis vomitus est optimum signum, sive in principio sit, sive in statu; innuit enim valorem naturæ.

Uterius fluxus alvi in principio magnus, vires dissolvens, aut ex materia insigniter corrupta, indeque admodum foetens, periculosus est, & interdum mortem minatur; est enim colliquativus & simpliciter symptomatologicus: si verò sine insigni virium labe contingit, & æget aliquod levamen percipit, non adeo est periculosus.

Sudor autem colliquativus, ita ut in habitu corporis ægri post sudorem reperiatür sabulum, vel nonnunquam etiam in lecto sabulum ruffum, aliquoties observata est curatio talium febrium.

Urina, quod citius exhibet signa coctionis, tutus est affectus.

Tom. II.

Urina alba, aut pallida, & admodum cruda, in omnibus febribus ardentibus admodum periculosa est, & plerumque mortem portendit.

Urina alba, tenuis & clara in febre continua ardente cum delirio, lethale est signum, propter imminentes convulsiones.

Quantò rubicundior est in initio, tantò citius terminatur, cum signis bonis ad bonum, cum malis ad malum.

Istæ febres continuæ ardentes, quæ nullius evidentis causæ vi, sed in corporis & animi quiete præter expectationem excitantur, graviore multò sunt & periculosiores, quàm quæ prægressam habent causam evidentem, v.g. motum corporis, æstum solis, &c.

Quæ lethales futuræ sunt, vires indies magis prosternunt citra ullam criticam evacuationem; aut si quidem excernitur die minime decretorio, naturæ fatiscentis signum exhibet.

In omni febre ardente semper adspicienda est lingua, an sit humida? an vero aspera & arida, aut nigra, aut fissa, livida & mucosa, vel alio modo vitiosè constituta; adeoque Prunella immineat? quod magis enim lingua à statu naturali ad dictas qualitates præternaturales declinat, eo gravior æstus Internus, eoque periculosior innuitur febris; quo autem humidior & rubicundior naturaliter est lingua, eo melior spes affulget in omni febre ardente.

Quoad tempus eventus: febris ardens acuta circa septimum interdum, interdum circa decimum quartum finitur apud nos, quin & ad 20. extendi solet: sæpè, ubi sunt magis acutæ, intra diem quartum solvitur, quæ in aliis regionibus ordinariò septimo terminantur, rariùs ad decimum quartum extenduntur. Unde ineffatis Hippocratis & practicoꝝ observatis, regionum ac aliarum circumstantiarum probè habenda est ratio. Quando tirina in principio morbi rubicundior, crassior, & magis vel minus turbida se exhibet, tantò citius terminantur hæ febres: unde si quartà die signa coctionis evidentia apparent, terminantur ferè die septimo; si verò conspiciant talia signa septimo die, terminantur undecimo vel decimo quarto: Nam in acutis imprimis observanda est crisis. Facies turgida & subtumida morbi longitudinem pronunciat.

Hæ febres acutæ continuæ vel à natura curantur, vel arte, & terminantur perfecte vel ad sanitatem, aut mortem, vel imperfectè. Prior curatio, & quidem perfecta fit, quando aut per crisin subitaneam, aut successive convalescunt ægri, de quo supra: sin minus, invalescente quotidie febre, agrypnia, deliria, convulsiones, &c. superveniunt, hinc mors ultimam ducit lineam. Fit

(O o 2)

autem



autem crisis, quando natura secernit ab inutilibus inutilia, & præparat ad excretionem. Versatur enim crisis in terminis cruditatis & coctionis siquidem nulla crisis salutaris, nisi peractâ coctione, speranda est. Natura noxia illa inquinamenta, sive separata, sive separanda, fermenti rationem habentia per varia loca expellit: Hinc ulculculis circa labia & nates erumpentibus febres desinunt; quia ad nasum plures venæ & arteriæ visum effugientes abeunt: & quia labia peculiari sui generis raro & spongioso parenchymate constant, & vel sola epidermide, vel haud densâ cute investita, per quæ fermentum febrile facile expelli potest. Conf. Kergerus *de Fermentatione* pag. 239. unde omnia remittunt accidentia, & nihil restat præter aliqualem virium debilitatem. Interdum per crisin fermentum febrile ad ambitum corporis protruditur, & febre desinente scabies excitatur, quæ propterea etiam, si ad interiora recurrat, recidivam parit.

Si verò imperfecta fuerit, observatum est, ut docet Fernelius *libro de febribus cap. 10.* tertianam diuturnam atque quartanam in atrocem cruciatum colico immaniore desinere, qui nonnunquam & in articulorum dolores, & in paralyin facessat. Atque hic dolor tamen consueto accessionis tempore ferè exacuatur, pristinumque circuitum retinet.

Observavit & Bartholinus *Cent. 3. Hist. Anat. 50. pag. 100.* dolores ventriculi & nauseam post febrem per vices solitis paroxysmi diebus, solitaque febris horâ: multò amplius febrili calore infestare, quos abstergentibus Medicinis, jusculis citratis & acetosis præparavit. Fit hoc, quando abusu nimio præcipitantium seu absorbentium fixorum supprimitur impetus fermentativus humorum & spirituum febrilis, unde natura fermentum febrile non ex toto corpore evacuare valet, sed fixato in tantum acido morbo, imperfecta crisi ad intestina vel ventriculum transponit, & recidiva ut plurimum periculosior denuò insurgit, & febris acuta in lentam, hecticæ similem mutatur.

Dum per crisin finitur, in nostro climate quidem rarius, in locis autem calidioribus, Gallia & Italia, ordinariò per hæmorrhagiam narium criticam, rarius per sanguinis evacuationem per alia loca, solvitur: interdum etiam sudore critico, interdum alvi fluxu critico, interdum urinæ excretionem, terminari solent. Exemplum sudoris critici post febrem talem ardentem notatu dignum habet Hildanus *C. 6. Observ. 77.* de quodam viro robusto cum ardentissima & continua febre conflitante, qui septimo die in sudorem adeò flavum incidit, ac si croco tinctus esset, & quidem copiosissimum, ut contorta subucula v̄ ubertim extillaret, & lintamina o-

mnia croceo colore inficeret. Exemplum vero criseos per hæmorrhagiam singulare habet Zacutus Lusitanus *Lib. 1. Prax. Admir. Observat. 86.* de febre ardente ingenti per sanguinis copiosum fluxum ex venula gingivæ inferioris curatum, & criticè solutum, & *lib. 3. Prax. Admir. Observ. 110.* Observat hæmorrhagiam criticam per porum juxta radicem pollicis pedis dextri; in interna parte spontè apertum. Quin & idem crisin febris ardentis per sputum sanguinis observat *l. 8. Prax. Hist. cap. 6. Observ. 4.*

Curiosum est, quod refert Platerus *l. 1. pag. 94.* dum delirans in febre ardente uxorem per vim comprimit, moxque extinguitur; Uxor verò mox quoque eodem modo correpta à febre quidem sanata est, sed nunquam se bene habuit.

Aphorismus Hippocratis 62. *Sect. 4.* non semper est verus: Vid. Horstius *lib. 1. Observ. 20.* ubi icterus salutaris quartâ die in continua febre obvenit.

Hæmorrhagiam narium subindè præcedere solet tinnitus aurium: in sanguinis nempe turgescencia febrili ex motu vehementiore arteriolarum, & sanguine in locis vicinis stagnante, & aurem interiorem movente.

Signa locorum, per quæ contingit crisis, videbitis in Institutionibus: interim verum est effatum Helmontii *de tempor. no. 53. pag. 509.* Medicum debere negligere crisin, quia prævenire se, melius sit. Verissimum hoc est, qui potest prævenire universalioribus & sublimioribus remediis, faciat, mox in principio vim causæ occasionalis seu fermenti morbofi evacuando; & naturæ turbatæ impetum sistendo. Verùm cum hoc non in omnibus licitum sit, & generosum remedium negotium hoc præsupponat, potius Medicus sit naturæ minister, & expectet crisin, quàm ut naturam præposterè turbet, legitimis remediis illic succurrendo.

#### C U R A.

In cura harum febrium acutarum & continuarum periodicarum, si unquam aliàs, Medicus sit naturæ minister: cum enim depureta massa sanguinea in iisdem, adeoque fiat sanguinis febrilis turgescencia, ob materiam cujusdam heterogenæ, ipsius que naturæ avversantis secretionem, ut ejus coctio & hinc crises testantur, manifestum evadit, indicationes genuinas & veras in eo versari, ut sanguinis præternaturalis fermentatio intra modum naturæ propositum conservetur, eâ nimirum ratione, ut nec hinc plus æquo intendatur, unde periculosa symptomata insequi solent, nec illinc nimium torpeat seu deficiat, quâ ratione materiam coctio & excretio impediretur, ac faciliè lenta chronica febris dubi

dubii eventus superveniret, ut rectè loquitur Sydenham *Tract. Methodus curandi febres, Sect. 1. cap. 4. p. 18.*

Cura igitur febrium talium cum à sola fiat natura, hoc saltem Medici est officium, ut illius conatum debite moderetur & adjuvet. Ante omnia ergo

1. Mature removendus fomes ex primis viis.
2. Corrigenda est dyscrasia massæ sanguineæ, unde oritur febrilis orgasmus.
3. Cicutatâ causâ peccante, hæc ipsa simul per convenientes vias, quo vergit natura, evacuanda, inter quas excellit blandus sudor.
4. Symptomata in cursu morbi magis magisque urgentia mitiganda.

Primum præstat venæsectio, & evacuatio; secundum vero nitrata: tertium Antimonialia fixa, animalium partes duræ, &c. Quartum in genere anodyna, in specie moderate acida, aliavè appropriata: hic notetur probè Ludovici accuratissima methodus medendi, nempe in principio, præmissio vel omisso vomitu, mox volatile aliquod, v. g. tincturam Bezoardicam, mixturam simplicem, spiritum cornu cervi, &c. pro circumstantiarum ratione cum opiatibus exhibendo: in statu fixiora terrea alcalina, in declinatione cancrina, corallina, &c. Hac nempe methodo nec crisin negligit Medicus, nec otiosè eam expectat: hanc verò otiosè expectant non solum veteres, quod præmissa venæsectione aquæ frigidæ largiore haustu saltem curare solebant ægros, motum naturæ criticum observando; sed etiam moderni plures Itali, & Galli præsertim, qui post venæsectionem & clysmata solâ tenuissimâ dietâ & largiore ptisanæ exhibitione sanare suos in acutis satagunt sub spe criseos: Vid. Langii *Miscell. Curios. p. 6.*

Pro his scopis ritè obtinendis observetur:

I. Cautissimum esse debere Medicum, ne pro causo, aut alia febre continua simplici, curet præsentem malignam. Fit enim, ut sæpius febris maligna in primis diebus formam causi tantum præ se ferat, & suâ malignitate latitet. Præter vires autem prostratas pulsus debilis malignam indicat, & frequentissimè sunt complicatæ. Unde tutius est, adhibere mox in principio simul appropriata alexipharmaca malignitati resistantia. Nam dubitant nonnulli: an detur causus verus sine adjuncta malignitate? Si itaque certo constet, malignitatis metum adesse nullum, tunc denuò ad ordinariam ac consuetam methodum tutò accessus fieri potest. Quamdiu verò, levis licet, supersit malignitatis suspicio, Alexipharmacis aut Bezoardicis dictis simul insistendum erit, quæ uti sunt necessaria

in omnibus febribus, ita in continuis laudanda.

II. Dum simul propinantur Alexipharmaca aut Bezoardica, sub horum usu minime æger in principio ad sudorem cogendus erit, nisi facile & quasi sponte sequatur. Addenda simul sunt præcipitantia, & dyscrasiam sanguinis pedetentim emendantia seu corrigentia, talia tamen, quæ corpus ad blandam diaphoresin successivè disponant, antequam perfectus & copiosus proliciatur sudor. Diaphoresis enim, ut in omni febre, ita in specie in continuis conservanda; sic enim calor & æstus mitior, & cephalalgia, vigilia, aliaque symptomata minus defatigare solent ægros; quia sudor tunc temporis sine successu est, & potius vires prosteruntur, dum nempe omnia adhuc sunt cruda, nec quicquam separatum, nisi manifesta adsint signa malignitatis aut contagii. Inutiliter ergo sudor elicitur. Ideòque potius R. bezoardica, aut mixtura simplex seu specificum Paracelsi in peracutis harum febrium evporiston ordinarium est, quatenus disponit corpus ad aliqualem madorem. Compositum est ex sudoriferis blandis, simul præcipitantibus mistis.

Observ. III. In febribus ardentibus, seu continuis imprimis potus concedendus est liberalior, iimò, quò major est sitis, & intensior ardor, eò magis indulgendum genio; rectè enim culpant Panarollus, Lindanus & Langius in *Epistola Medicis* eos, qui ægris febricitantibus omni ferè potu interdiciunt. Observetur hoc saltem, melius esse, ut frequentius & parcius bibant, quàm ut unâ vice multum ingurgitent. Prius enim successivè alterat, simulque madorem continuum conservat: posterius verò tonum stomachi nimis labefactat. Prostant sanè exempla non pauca pulmonum & reliquorum viscerum omnino aridorum & exsuccorum ex ardore febris ardentis, ob denegatum potum: Vid. Panarollus in *Observat. Pentec. 4. Observat. 8.* Idem alio loco habet Observationem febre ardente mortui, in quo cor tanquam semitostum apparuit. Ergò si urget sitis, liberalior potus concedendus est ægris, talisque quem appetunt, & quidem simplex unusque, non modò hic, modò iste, modò non nimia quantitate, nec frigidus ob stomachum ingurgitetur, sed potius tepidus; frigida enim nimis nociva. Interdum enim post nimium potum tumor pedum supervenire solet.

In selectu potionis habenda est ratio effervescentiæ febrilis plus minus temperandæ & sedandæ, & hinc symptomatum, speciatim circa primas vias urgentium, præsertim alvi plus minus clausæ vel apertæ. Hinc serum lactis benè depuratū, & succo citri ad aliqualem gratiam acidulatum, potus reverà medica-

(O o 3)

men-



mentolus existit, modo diarrhoea absit, sed potius intensior sitis urgeat: Conferatur Pians *de febribus Part. 2. pag. 166.* item Septalius in *Animadvers. §. 11. pag. 98.* Tandem & consuetudinis ratio simul habenda est. Aliàs Aqua fontana vel cerevisia secundaria bene pura cum dimidia vini tenuioris, aut quinta vel sexta parte vini Rhenani mista, addendo mensuræ uni succi citri no. j. succi cydoniorum vel ribium q. s. ad gratiam saporis, & Galatinæ cornu cervi super igne dissol. ʒij. & acutè febriculis gratissimum potum suggerit. Acidà enim, imprimis his in febribus, in potu conveniunt, tam mineralia, in æstu nempe nimis, quàm vegetabilia, in æstu nempe moderatiori: Unde Riverius *C. Observat. 19. Aqua simpl. ʒij.* addit ʒij. gtt. xx. pro potu ordinario. Decocto hordei sub nomine ptisanæ plures utuntur, quod minùs approbo; cum cruditates stomachi flatulentas, ejusque atoniam inferat.

Observat. IV. In principio & cursu febrium ardentium, ubi alvus obstructa est, vel non satis libera, conveniunt imprimis clysmata, aut loco horum tamarindorum decocta aut infusa: verum illa saltem lenientia ac blanda, & quæ alvum tantum modò laxant, scorias recrementosas ex intestinis maturè eliminant, eamque continuò fluidam servant, idque præsertim duobus in casibus:

1. Si urgent symptomata præcordiorum & abdominis: item si orgasmus humorum ad caput ferri quodammodò videtur.
2. Si nimia æstus & ebullitio sit sanguinis, tunc commodissimè applicantur enemata. Confer. Sydenham *Secl. 1. cap. 4. pag. 27. & 29.* Quibus & addatur principium morbi præceptum, in quo ante venæsectionem clysmate alvus eluenda venit: e. g.

ʒ. flor. cham. mij.  
hb. card. bened.  
violar. ʒ mij.  
rad. gentian.  
enula ʒ 3vj.

Coqu. in l. q. ʒa.  
Colatur. ʒviiij. adde  
elect. lenitiv. ʒj.  
ʒi ʒiati ʒj.

M. f. Enema alterans & emolliens. D. S.  
Eröffnend Clyster.

Alvus vero, ubi satistecerit quotidie officio suo; nullo modo irritanda venit.

Observ. V. Vomitoria non adeò necessaria sunt, atque in febribus intermittentibus: nihilominus tamen, ubi in principio & in incremento morbi nausea urget, aut inanis vomendi conatus adest, saporvè amaricans aut similes ructus adsint, ut vel ex bilis regurgitatione in stomachum, aut recrementorum

nidorosorum in eodem collectione, lipothymix aut cardialgiæ imminant, vel anxietates præcordiorum insignes exinde accedant, conveniens sanè est, vomitorio in principio aut incremento hæc impedimenta remove- re, nisi vel diarrhoeam, vel gravissima symptomata in cursu morbi experiri velim. Observavi ipse sæpius, quod ex usu vomitoriorum ægri non adeò gravibus symptomatibus conflictati fuerint. Quod si verò accersitus jam incrementum morbi adsit, nihilominus cætera ubi responderint, ac speciatim, si vires à morbo nondum attritæ fuerint, etiam in incremento vomitorium propinari potest: Confer. hic accuratus & elegans Sydenham in *Methodo curandi febres pag. 3. & 23. sequ.* idque eò magis, si certò constet, febrem esse vel benignam, vel eam esse malignam, sed ex contagio extrinsecus hausto stomachum infestante, non tumidus, nec timidus hic sit Medicus. Observandæ tamen sunt vires plùs minùs robustæ, item vomitoria non sint nimis valida, sed blandiora & in dosi minori, nè corpus nimium commoveamus; in talibus enim ægris facilè multum & vehementer solent evacuare, fluidioribus & mobilioribus corporis existentibus contentis. Observatum tamen etiam fuit, quod in ægris, quos aliàs vomitoria non moverunt, illi in febribus talibus impetuosisimè sunt purgati.

Observat. VI. Purgantia, quæ talia, imprimis propriè dicta, seu quæ abusivè eradicatoria vocant, ut plurimum nociva sunt in febribus continuis ardentibus, nec nisi in declinatione morbi conveniunt, coctâ sc. priùs materiâ, & sedatâ maximâ ex parte ebullitione febrili.

Sed tunc ferè est superflua & inanis, cum materia coctâ per urinâs & sudores eliminari soleat. Quod si non fiat, aliqualis & repetita blandior purgatio, & quæ stimulando saltem motum naturæ provocat, locum habet. In principio harum febrium est frustranea; movent quidem seu turbant nimium corporis contenta, sed non ritè promovent nociva, crudis adhuc omnibus existentibus, ac vires nimium prosterunt; In progressu verò morbi est ferè nociva, aut saltem inutilis dictis ex causis: siquid tamen movendum videatur, in principio secundum Hippocratem movendum.

Observanda tamen hic est animadversio Septalii *l. 5. §. 4. pag. 98. uti in continua tertiana respectu sui, aut materiæ illam facientis, nunquam ab initio ante coctionem medicamento purgante evacuandum est; ita, cum quandoque bilis acris ad ventriculum transfundatur, & mordens, gravissima inferens pericula, & sæpè mortem; potissimum, si ager ad vomendum naturâ ineptus fuerit: Illa ut præveniamus respectu sym-*



*Symptomatis cum syrupo rosato solutivum & ferolactis, vel solo, vel cum tamarindi incocti, purgare licebit, &c.* Ut enim in cursu morbi purgantia omnia sunt omittenda, toto tamen morbi decursu eò subinde simul respiciendum est, ut alvus blandè servenur aperta, & quidem imprimis, ubi æstus & cephalalgia urgent, quæ sub alvo clausa magis intendi solent: idque eò tutius fieri potest, quando nulla est suspicio malignitatis. Intempestiva enim purgatio ante materię coctionem instituta magna incommoda vehit, vel enim finem suum non assequuntur purgantia, nihilquo aut parum vitiosorum humorum educunt, utque ita saltem eos agitant, turbant, confundunt (revera fermentant) unde ex materia mota & non evacuata in primis viis hærente, tormina, animi deliquia, vertigines, & alia symptomata oriri solent: vel si medicamentum fortius fuerit, corpus liquetfacit, vires debilitat, ut natura postea facilius succumbat, & morbum vel planè non, vel non nisi longiore tempore vincat. Neque purgantia neque vomitoria febrilem fermentationem tollunt.

Pro scopo igitur alvum apertam servandi convenit imprimis serum lactis, aut simplex, aut cui juxta *Septarium l. 2.* Tamarindorum ꝑj. vel ꝑij. insula fuerit. Quod si verò in principio harum febrium blandè purgare aut primas vias abstergere animus sit, tunc vel solitariò, vel cum passulis, v. g.

*Æ. crem. ꝑj.*

*pulv. rhabarb. ʒj.*

*scamm. præp. gr. j.*

*M. f. Pulvis. S.*

*Eröffnend Pulver.*

*Æ. pulp. tamarind. ʒij.*

*pulv. rhabarb. ʒj.*

*scamm. præp. gr. ij. vel iij.*

*M. f. Bolus. S.*

*Eröffnend Löffelweige auff einmahl.*

*Item infusum blandum ex foliis lennæ cum rhabarbaro in principio harum febrium, ubi non nimis celeriter moventur, turò concedi potest, & g.*

*Æ. rhabarb. opt. ʒij.*

*fol. lenn. f. ʒj.*

*laurind. in sero lactis per ʒ.*

*manè blandè ebulliat: Colaturæ adde*

*syrup. rosat. solut. ʒij.*

*M. D. S.*

*Explic. Tractatus auff einmahl.*

*Observat. VII.* Injecto vel omisso clystere convenit interdum in primo principio venæsectio, eò in principio, eoque primo, quando neque est necessaria viderur, idque saltem, ubi æstus metuendus est æstus in robustis, nimisquam gescantia contentorum corporis, ut in corpore juvenili, plethoricis, generosiori videri solentibus, aut in assuetis

aut quibus suppressa est solennis quædam evacuatio: in talibus commodè vena incidi potest: Conf. Sydenham *Sect. 1. cap. 4. pag. 19.* Nam si est febris, quæ venæsectionem postulat, ea sanè est febris, acuta continua: propterea quando in his observatur pulsus major, aut potius maximus, unde periculum est, ne ex nimia sanguinis rarefactione vasa distenta ac repleta liberiores sanguinis impediant motum, venæsectio mox in principio primo instituenda erit, præmissio vel neglecto, ut dixi, clystere quocunque dici tempore. Nempe rectè hic loquitur Lindannus: *Venæsectio eam ob causam instituitur, ne calor immodicè exardescat. Ut igitur frænctur ille æstus, & circuitus sanguinis liberior fiat, opus est venæsectione, mane, sive vespere. Multis equidem religio est, alio tempore mittere sanguinem, quam matutino: Verum occasio est præcepti, & quandoque graviter peccant, qui hoc observant: accidit enim sæpè, ut sanguis mittatur, cum in furore maximo est febris. Nam ut rectè Celsus monet lib. 2. cap. 10. In ipso furore sanguis non est mittendus, & qui hunc mittit, idem facit, ac si jugularet hominem. Qui itaque matutinum præcise observant tempus, sæpè in hunc errorem incidunt. Ergo dies non oportet numerare, sed in principio primo aut tempore huius proximo, sanguis mittendus, modò hoc observetur, ut in remissione fiat febris tempore. Si verò jam tertia aut quarta dies fuerit, ex quo æger detrahit: aut egrotaverit, periculosum est, secare venam, idque eò magis, si suspicio malignitatis subsit, utpote in quibus etiam in primo principio venæsectio administrari non potest, nisi summà urgente necessitate.*

Quantitas sanguinis mittendi secundum conditionem subiecti ac impetum febris determinanda venit. Interdum in incremento, aut etiam in statu febrium continuarum benignarum, urgente prunella & linguæ ac faucium affectibus subinde consultum est, ut venæ raninæ sub lingua secentur, quæ si largiter fluant, & sanguis exsiliat quasi, faustum solet esse signum: sin verò saltim stillet, aut pedetentim effluat, ominosum. Aliàs ubi hæc & supra dictæ circumstantiæ non adstant, turò intermitteri potest, cum febres ardentes continuæ etiam sine venæsectione optime curari possint. Ipse Galenus monet, cavendum, ne dum febrem jugulare conantur, ægrum simul jugulemus, quod tribus Medicis evenisse scribit libro de curandi ratione per venæsectionem cap. 12. quibus non opinantibus, pro nimis deliquio, mors obrepit. Et cur laticem illum pretiosissimum studio exantlemus, qui à febre heu nimium! depalcitur, ut planè per febrem absumptum fuisse in venis per observationem constat: Refert Johannes Argentæus in Galenum lib. 1. de febris. ad Glaucom, cap. 2. in cujusdam febre extincta

extincti cadavere ne guttam quidem sanguinis in venis fuisse repertam: Andreas Spigelius *de Semitertiana lib. 1. cap. 15.* in quodam febre extincto venas majores circa hepatis sanguine vacuas repertas fuisse; & *ibid. cap. 16.* venam cavam & arteriam magnam sic vacuum fuisse sanguine, ut non opus fuerit filo venam cavam & portæ truncum, dum exenteraretur, intercipere, præterea ex Observationibus constat, quod crebræ sanguinis missiones homines febribus aptiores reddant: Vid. Willisius *de febr. cap. 9. pag. 175.* item *cap. 11. pag. 197.* Id ipsum autem observare debuisset Willisius, ut ipse in febribus venæsectionem non adhibuisset. Testantur siquidem ipsius observationes & curationes febrium parum congruè fermentationi superstruæ, post venæsectionem semper ægros deterius habuisse, etsi in initio aliquid contulisse videretur. Itaque ego cum ejusmodi laniationibus & sanguisugis non facio, qui vitæ thesaurum tam inutiliter abliguriunt, cum præsertim in his septentrionalibus oris homines tam frequentem atque largam venæsectionem non ferant, & alia præsentiora, jucundiora atque tutiora remedia in promptu sint. In principio saltem vel venam secare, aut etiam laxativo primas vias stimulare, concessum esse dixi, minus verò in progressu morbi; id quod erudito discursu pluribus deducit Ballonius in *Bonetti Phar. Medicorum pag. 172.*

Observ. IX. Diaphoresis uti in omni febre, ita in specie in continuis conservanda libera; sic enim calor & æstus mitior, cephalalgia aliaque symptomata minus gravia esse solent. Minus tamen ad sudorem cogendi sunt ægri, præsertim in principio aut in incremento; quia tunc temporis, cum adhuc omnia sunt cruda, sine successu & euphoria debilitantur. Conveniunt autem imprimis diaphoretica salina, Cardui benedicti, absinthii, &c. item terrea, terra sigillata, corallia præparata, antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale, cornu cervi sine igne, pulvis diaphoreticus Ludovici: sic Kergerus *de fermentatione Sect. 3. cap. 3. pag. 351.* semper diaphoreticis soletnectere præcipitantia, quæ fermentum febrile corrigunt. Minus conveniunt volatilia subtilia sulphurea & aromatica vel resinosa, quia hæc *καύμα* nimis incendere solent.

Observ. X. Victus in febribus ardentibus sit tenuis, interdum paucus aut nullus: & cum appetitus ferè semper sit prostratus, minus ad victum cogendi sunt ægri, licet tribus vel 4. diebus nihil comederint. Inter alias rationes, ob quas febres continuæ fiunt chronicæ, vel ob quas hæc recidunt, aut quod curatæ tandem in intermittentes tertia-

nas degenerant, est etiam hæc causa, quando ægri nimis cibantur, vel in cursu, vel in declinatione: nam alimenta assumpta defectu fermenti digestivi à calore febrili in stomacho putrescunt potius, nec debite digeruntur, & ita malum exasperant: imprimis alimenta magis nutritiva aggravant, ac lædunt stomachum. Hinc etiam rectè notat Willisius *Tractatu de febribus*, quod sæpius ex liberiore victu in reconvalescentibus a talibus febribus recidiva inducatur, sc. ex carni & alimentorum evchymorum uberiore ingestione ægri in febrem relabuntur. Optimus est ergo hac in parte Helmontius, qui in *Tractatu de Victus ratione* egregie decidit hanc controversiam, & inquit: *Malo ægros meos sanos, quàm obesos reddere.*

Observ. XI. Opium, opiata & papaverina, uti polychresta in multis morbis sunt; ita in febribus ardentibus continuis sunt optima, & nunquam omittenda: sed urgentibus symptomatibus sedulo, & quidem cautè danda. Observetur tamen in eorum exhibitione tempus legitimum & usus legitimus: tempus est, ut propinentur opiata non in principio, multò minus in statu, quando imminet quædam crisis aut morbi solutio; utrobique enim naturæ sic impediretur motus, sed propinentur opiata in incremento morbi; quia non tantummodo calor febrilis ipse insigniter demulcetur, quælibet symptomata redduntur mitiora, sed etiam calorem febrilem ipsum insigniter imminuunt somnum inducendo, deliria & convulsionem præcavent, & hinc diaphoresin promovendo optima sunt. Nam turgescerent humores placant & sopiunt, & hinc, ut coctio causæ morbosæ melius promoveatur, per accidens juvant, & spiritus blandè figendo absorptionem & dissipationem eorum nonnihil præcavent. Hinc rectè dicit Lindanus: *si organis adsit humorum, ac humor peccans turgeat, seu immanius effervescat, tunc syrupus papaverinus optimè convenit ad 3j. cum aliis exhibitus; nobilissimus enim & blandus est, convenitque in specie in febre, imprimis ardente, si cum tantillo nitri mistus fuerit. In febribus sanè ardentibus motus furibundus optimè sedatur laudano opiato cum tantillo nitri, sed non debemus eo abuti, sed recto tempore adhibere, nempe si spiritus animalis furibundus sit. Deinde in exhibendis opiatis non debemus expectare, donec spiritus planè absorpti sint, & vires consequenter nimis prostratæ; sed in tempore usurpanda, dum vires adhuc constant.* Conf. Willisius *de febribus cap. 10. pag. 127.* In rebus nempe desperatis ad opiata non est refugiendum, sed imitari possumus Poterium & Lindanum, qui aliquot causis laborantes cum dolore ventriculi curarunt hæc mixturâ:



℞. *acetos. vel scabiosa* ʒv).

*succi limon.* ʒß.

*spec. dia-marg. Fr.* ʒj.

*syrup. papav. nigr.* ʒj.

M. f. *Potio.*

quæ ipsi elegantissimos præstitit effectus:  
Vid. *Poterius Cent. 2. cap. 50.*

Vel imitemur Sydenham, ad tumultum ab emetico concitatum sopiendum sub noctem vel horâ somni blandum anodynum propinantem: e. g.

℞. *papav. erras.* ʒij.

*mirab.*

*syrup. de mecon.* ʒ ʒij.

*papav. alb.* ʒß.

M. f. *Hauftus:*

ut habet *cis. loc. pag. 25.*

Propinanda autem semper opiata cum debitis appropriatis mista, tam in benignis quam malignis; aut appropriatis alterantibus, aut appropriatis alexipharmacis, prout necessitas requiliverit, sic feliciter operantur; nunquam vero solitaria.

Remedia ergo, quæ in his febribus continuis ardentibus conveniunt, præter vomitoria & laxativa jam dicta, primariò sunt alterantia, eaque vel ipsum affectum ejusque causam occasionalem materialem respiciunt, vel symptomata primaria. Illa sunt nitrum & quæcunque nitrata remedia, imprimis nitrum fixatum, & nitrum vitriolatum seu arcanum duplicatum Mynsichtii; item cum nitro fixata mineralium quæ, in specie antimonialia, v. g. ʒ diaphoreticum, tam simplex quam compositum aut Martiale Ludovici, aut Joviale Poterii, seu hujus antihæcticum, bezoardicum minerale simplex, hinc Joviale, Martiale, & cinnabaris antimonii. Sulphura mineralium per se sunt egregia in talibus febribus, multo magis metallica per nitrum fixata; nitrata enim, & cum eo parata remedia fixa, figunt sal istud volatile acre peccans, indeque natum organismum, & similiter temperant omnem acrimoniam lixiviale, & ubi sal hoc oleosius fuerit, oleositatem ejus coercunt, simulque blandè per urinam, & hinc per sudorem evacuant. Hinc absorbentia animalia, hisque cognata terrea, v. g. cornu cervi sine igne, hujusque gelatina cujusvis acris temperativa, ebur sine igne, maxilla lucii piscis, unicornu verum crudum & sine igne, lapilli cancerorum, corallia præparata, aut horum cum succo citri magisteria, unicornu fossile, terra sigillata, &c. Hæc semper cum diaphoreticis & alexipharmacis necesse suadet pro fermenti febrilis præcipitatione Kergerus *Tract. de fermentatione pag. 251. f. 3. c. 3.* Quin & talia volatilia animalium illis ipsis commisceri, & moderatâ dosi subinde addi possunt; hinc enim sal volatile cornu cervi, & liquor cor-

nu cervi succinatus, subinde cum aliis fructuose usurpantur. Hisce ex vegetabilibus refrigerantia, & hepatica vulgo dicta itidem accensenda, v. g. cichorium, taraxacum, lactuca, & omnia intibacea, plantago, acetosella, acetosella, portulaca, fumaria, flores rosarum; acaciæ, borraginis, buglossæ, &c. Ex quibus & similibus parata decocta reperiuntur promiscuè in practicum veterum & recentiorum scriptis, e. g. Platero, & Sylvii *Praxi l. 1. cap. 29.* item *Piens de febribus Part. 2. c. 2. & 3.* &c. Quo etiam pertinent remedia blandè pingua, seu temperata oleosa vegetabilia, ut semina frigida majora dicta, exque his paratæ emulsionem, quæ oleosa sua vi istud nimis acre blandè temperant & corrigunt, adeoque effervescentiam acriorem plus minus sustinent.

Remedia, quæ symptomata magis respiciunt, sunt imprimis omnia blanda acida, æstus, sitis, oris squalorem, virium diminutionem &c. mitigantia. Talia vel ex vegetabili regno sumuntur adeoque mitiora; vel ex minerali, adeoque acriora existunt: Illa in æstu minus urgente; hæc ubi intensior æstus, nec subjecto patientis aliisque circumstantiis proportionatus adest, magis locum habent. Illa enim facilius in salum temperatum diureticum in nobis alterantur; hæc econtra fixioris naturæ, & quasi firmioris texturæ, minus alterabilia sunt, quæ ceu acida potentiora bilem & ejus acidum volatile acre præcipitant & corrigunt, adeoque humores nimis effervescentes figunt, & inde natas æstuationes aliaque pathemata mitigant.

Inter acida mineralia præferuntur speciatim spiritus mineralium acidum, tam simplices, primariò sulphuris, hinc vitrioli, salis, nitri. Præ cæteris & cum dictis spiritibus, aut spiritu vitrioli volatili parata mistura simplex seu tinctura bezoardica, quam compositi, cyssi aliàs appellati; per retortam ex sulphure, nitro & antimonio & similibus parati; sic fiunt spiritus acidum volatiles admodum egregii, & tincturæ vegetabilium cum phlegmate vitrioli, spiritu proprio acidulato, tinctura bellidis, rosar. violar. cyani, aquilegiæ &c. Usurpentur talia acida mineralium in julepis, ut & misturis alterantibus. Tincturæ instillantur potui ordinario ad 50. vel 60. guttas pro dimidia mensura.

Cæterum spiritibus istis acidis puris præferuntur meritò spiritus hi ipsi mediante V dulcificati, quia magis sunt temperati, & ita œconomix nostræ animali magis affines.

Ex omnibus illis spiritum sulphuris, hinc spiritum nitri dulcem, eligerem: spiritus vitrioli propter ramenta metallica non semper est tutus. Ex vegetabili regno conveniunt fructus, imprimis succulenti, sapore acido & austero se manifestantes, v. g. citrus, qui pri-

(P p)

matum

Tom. II.



matum obtinet & malignitati resistit, ejusque succus expressus: item succus ribium, berberum & cydoniorum, imprimis in fluxibus alvi nimis, rubi Idæi, granatorum & similes alii. Addatur etiam acetosa & acetosella, quarum succum expressum suavissimum præfero syrupis cum saccharo paratis, quia sunt fermentescibiles. Præ cæteris commendabiles sunt hi ipsi per spontaneam residentiam, post sulphurationem secundum Helmontium depurati, & in loco frigido asservati. Tamarindi quoque hic optimè conveniunt, quia sapore acidulo simul & alterant, æstum leniunt, quatenus sal volatile oleosum destruunt, & præterea alvum obstructam blandissimè laxant: hinc etiam Zacutus Lusitanus in febribus syncopalibus insigniter commendat tamarindos in ∇ simplici decoctos. Præter hæc etiam succus sempervivi majoris, item ex portulaca & plantagine parata remedia commendantur.

Ex his variaz fiunt formulæ; præter usum enim tincturæ bezoardicæ seu mixturæ simplicis in principio morbi, ubi subest metus malignitatis, aguttis 30. vel 40. vel etiam 50. ad 3j. propinata: pro constitutione ægri, ubi adhuc subest metus malignitatis, conveniunt Julepi aut misturæ acidulæ v. g.

℞. Decocti corn. c. simpl. vel cum rad. scorz. ℥b. j.

succ. citri rec. unc. ij.

syrup. flor. nymph.

papav. alb. 3vj.

spiritus Oi dulcis vel spiritus Ois dulcis q. s. pro grato sapore.

M. f. Julepus. D. S.

#### Rübl-und Alterativ-Julep.

Decoctum hordei alii præscribunt: sed minus probo, quia est potus crudus, qui ut plurimum subinde excitat inflationes stomachi: ideo præfero huic vel aquam simplicem, vel decoctum radice scorzonæ;

℞. ∇a font. q. pl.

Vini parum.

succi cydonior. q. s. pro grato acore.

M. D. S.

#### Stärk-Trans.

℞. ∇ font. ℥b. j.

syrup. papav. alb. 3vj. ad 3j.

rubi Idæi 3i℥.

~ Oi dulc. vel Ræ violar. 3j. M.

℞. ∇ font. ℥b. j.

succi cerasor. compos. Ludovici vel alius succi appropri. 3iij. ad 3iv.

syrupi rubi Idæi q. s. M.

℞. ∇ borrag.

bugloss.

rubi Idæi 3j.

cinnam. 3iij.

succi citri rec. 3vj. ad 3j.

confect. alcherm. 3i℥.

syrupi rub. Idæi. 3℥. M.

℞. Conf. acetosell.

pulpa citri 3i℥.

flor. tunic. 3j.

rob. ribium 3vj.

Conf. alchermes 3iij.

c. s. q. syr. acetos. citri l.

rubi idæi s. electuarium.

D. S.

#### Stärk-Rattwerge.

Convenit etiam decoctum herbæ & radice acetosæ elegantis coloris & saporis grati, cui additur vel succus acetosæ expressus & asservatus, vel succus ribium sulphuratus, & syrupus rubi idæi vel violar. q. s. pro gratia & sapore ægri.

Extemporaneæ etiam tincturæ fieri possunt instar juleporum. Saporis elegantissimi, qui egregiè prosunt, ut plurimum sudore blando, sine molestia tamen, ægro convenientes.

℞. flor. bellid.

rosar.

tunic. 3 m. ℥.

Infund. in ∇ commun. acidulata ~a ~is per camp. stent in loco tepido ad extractionem Ræ:

Colatura mens. i℥. adde

Syrup. rosar. vel rubi idæi, vel viol. q. s.

M. pro Julepo S.

#### Rüblender Julep.

℞. Flor. aquilegia, vel cyani, vel papav. errat. vel rosar. vel violar. 3℥.

~a ~is per campan. vel Oli q. s. pro grato acore.

Infund. in ℥b. i℥. ad ℥b. ij. decocti cornu cervi, vel radice scorzonæ, vel roris vitrioli ~ei acidi in vase vitreo benè clauso: stot ad aliquot horas, donec eliciatur R elegans, cui transcolatæ adde

∇a rosar. 3iij.

cinnam. 3j.

syrup. rubi id. vel violar. vel

jujub. 3iij. vel iij. M.

℞. flor. bellid.

papav. errat.

rosar. 3 p. ij.

Irrorati c. s. q. ~a ~is vel Oli infund. in decoct. cornu cervi, vel loco hujus in ∇ flor. papav. errat. scabiosa, taraxaci, &c. ℥b. i℥.

Stent in loco calido, donec extracta R, cui filtratæ adde

Syrup. rubi Idæi.

de jujub. 3i℥. M. S.

#### Rübl-Julep.

℞. flor. papav. errat. mj.

violar. m℥.

Irrorati c. s. q. ~a ~is vel Oli, infund. in

∇a flor. papav. ℥b. i℥.

stent in loco calido per horas aliquot:

Colatura adde

Syrup.

*Syrupi flor. papav. errat.*  
*rubi idæi* ʒij. M.

Loco ~ *ʒis* & *ʒli* succi vegetabiles acidi asservari possunt.

*Rx. pom. citri in taleol. incis. no. ij. l. iij.*  
Macerentur in *∇ a fervida* lb. iij.  
adde

*flor. papav. errat. mj.*  
ebulliant leniter: *Colat.* adde  
*elaosacch. citri* ʒj.

*Syrupi ex toto citro* ʒj. ad ʒiij. M.  
Vel etiam ipsæ tincturæ, v.g. *flor. bellidis*, *rosar. papav. errat.* aut etiam ~ acidi dulcificati, instillantur potui ordinario.

*Rx. Ræ flor. bellid. ʒij.*  
*aquileg.*  
*violar. a ʒj.*

M. S.

**Kühl-Tinctur 50. vel 60. Tropfen in ein Nösel Getränk.**

*Rx. ~ ʒiij. ʒiij.*  
*Ræ flor. aquileg.*  
*bellid.*  
*violar. a ʒj.*

M. D. S.

**Kühl-Tinctur ins Trinken 60. bis 80. Tropfen in ein Nösel.**

Interdum loco juleporum propinatur decoctum tamarindorum, vel solum in *∇* communi, vel quod blandius abstergit, in sero lactis: v.g.

*Rx. tamarind. vel pulpæ eorundem* ʒj. ij.  
ad iij.

Coqu. in f. q. *∇ a comm. vel feri lactis depur.*  
*Colatura* lbj. ad lb. ij. adde

*succ. citri* ʒvj. vel ʒj.  
*Ræ flor. bellid. ʒij. vel ʒiij.*  
*Syrupi acetos. citri vel rubi idæi* ʒiij. M.  
*Rx. Decoct. tamarind. c. pass. lb. ʒ. vel lbj.*  
*Syrupi acetos. citri vel rubi idæi* ʒj.  
~ *ʒi dulc. parum. M.*

*Rx. Decocti tamarindorum c. pass. lb. j.*  
*Syrupi granat. acid.*  
*ribium a ʒiij.*  
~ *ʒi dulc. q. f. M.*

Facit huc elegans tinctura rosarum *Zvvel-feri*, quam parat cum sero lactis acidulato cum pulpa tamarindorum, quæ blandè laxat; vel infusum florum cum tamarindis supra in febre ephemera præscriptum.

Ipsum certè serum lactis est potus admodum conveniens in febribus, imprimis, si melioris depurationis gratia aciduletur cum succo citri vel *R* similiter appropriata: insigniter enim compescit æstum, & alvum blandè servat apertam, ratione salis nitrosi volatilis, quod in se continet. Vel

Tom. II.

*Rx. feri lactis lb. ij.*  
*succ. citri rec. ʒiij.*  
*fl. bellid.*  
*papav. errat. a M. ʒj.*

Ebulliant vase clauso, donec serum lactis tingatur. *Colatura* adde  
Sacchari parum, aut loco florum tingentium aliquot uncias syruporum, florum papaveris erratici & rubi idæi.

*Rx. flor. papav. errat.*  
*rosar. a M. ʒj.*

Infund. in *feri lactis depur. cum ~ u ʒiij.*  
*leniter acidul. lb. ʒj.*

stent in loco calido ad *Ræ extractionem:*  
*Colatura* adde  
*Syrupi de jujubæ ʒij.*  
*violar. ʒj. M. pro julepo.*

Juxta dicta in his febribus optimè conveniunt ulteriùs fixa nitrata, vel cum nitro fixata mineralia & metallica, effervescentiam massæ sanguineæ optimè compescunt, & volatile biliosum peccans corrigentia & fignentia, imperando plùs minùs sudorem, prout minor vel major urget malignitas aut etiam prout intensior vel remissior erit effervescentia febrilis. Usitatissimum est v. g. nitrum præparatum, seu beneficio lixivii acris depuratum, prodest ergò arcanum duplicatum Mynsichtii vel *∇* vitriolatum & ~ *ʒi dulcis*; nil magis æstum febrilem compescere potest, quàm *∇* ipsum solum depuratum: superat hanc laudem, inquit Poterius, & nihil magis desiderat. Sumitur in decocto scorzonæræ, & ita sub forma potus ordinarii propinatur. Loco nitri depurati usitatum aliàs est sal prunellæ, quod nihil valet: optimum est antimoniatum. Nam in tali nitro præparato adest adhuc subtilissima pars sulphuris antimonii, adeò ut ratione hujus simul corpus ad blandam diaphoresin disponat: & simul sal corrigat vitiosum. Propinatur ad ʒj. in *∇* quadam destillata, vel decocto quodam, vel potu ordinario, & assumitur ejus ʒj. spatio 24. horarum. Verum sub forma pulveris propinatur cum antihæctico Poterii, & multi usus est, cum quo ego aliquoties felicissimo cum successu præscripsi, modò absit laxior alvi constitutio. Pertinet huc antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale, tam simplicia quàm composita, cum nitro fixata, maximè antimonium diaphoreticum Martiale, antihæcticum Poterii & bezoardicum Joviale, si per se destilletur cum Mercurio sublimato, butyrum Joviale, quod figitur cum spiritunitri (vid. Schæderus & *Zvvelferus*) est egregium, & loco antihæctici potest substitui; bezoardicum Saturninum,

(P p 2)

ninum,

ninum, cornu cervi sine igne, & omnia supra laudata absorbentia animalia terrea, quæ absorbendo nonnihil, & ad diaphoresin disponendo corpus, auctam effervescentiam corrigunt, c. g.

℞. ▽ rubi Idai ʒij.  
rad. scorzon.  
succ. cydon. rec. ā ʒj.  
Bezoard. Jovial. ʒj.  
syrupi papav. albi, vel rubi Idai ʒj.  
℞. ʒi dulc. q. f.  
M. D. S.

**Alterirende Mixtur Löffelweise.**  
Vel ad imitationem Poterii Cent. 2, cap. 49.

℞. ▽ acetos. lb. β.  
ʒii diaphor. ʒβ.  
succ. citri.  
syrupi papav. nigri ā ʒj. M.  
℞. ▽ taraxaci ʒiv.  
Ra flor. bellid. ʒiiij.  
cornu cervi s. Δe. ʒβ.  
antihect. Poterii ʒj.  
syrupi flor. papav. errat. ʒj. M.  
℞. ▽ rubi Idai ʒij.  
℞. theriac. camphor. ʒiiij.  
ʒii diaphor. ʒβ.  
Bezoard. Jovial. ʒβ.  
syrupi papav. simpl. vel rubi Idai ʒj.  
℞. ʒi dulc. q. f. M.  
℞. ▽ flor. acac.  
sambuci,  
taraxac. ā ʒj.  
gelatina cornu cervi ʒj. ad ʒiβ.  
cornu cervi sine ign. scrup. j.  
antihect. Poterii,  
ʒii diaphoret. ā gr. xii.  
syrupi papav. simpl. ʒvj. M.  
℞. ʒi ʒiati, vel ʒi depurat. ʒj. ʒβ. ad  
scrup. ij.  
Antihect. Poterii, vel ʒii diaph. simpl.  
vel ʒial. scr. j. ad ʒβ.  
Laudani opiat. gr. j. vel ij.

M. S.

**Stärk- und kühlend Abend-Pulver.**

Detur pro 2. dosibus in vehiculo conveniente, imprimis tempore vespertino.

℞. nitri ʒiati scrup. j.  
cornu cervi s. igne.  
Antihect. Poterii vel ʒii diaph. ā  
scrup. β.  
M. f. Pulvis.

cui in suspitione malignitatis, aut imminente delirio camphoræ gr. ij. addi possunt.

℞. Cornu cervi s. igne ʒβ.  
nitri ʒiati scrup. j.  
ʒii diaphor. scrup. β. vel gr. xii.  
camph. gr. ij. vel gr. iv. M. pro 2. dos.

Tempore vespertino loco camphoræ præscribo Laudani opiat. gr. ij. vel iij. ad iv. Detur in vehiculo conveniente aut quocunque.

Blandè mover sudorem, & egregiè compescit æstum.

Pertinet huc sudoriferum maximum Fabri, quod nobile est remedium, item Jupiter diaphoreticus Beguini, cinnabaris ʒii & dulcedo aluminis saccharata, uti habetur arcanum ad omnes febres, etiam hecticas, ita similiter egregium est figens in febribus continuis ardentibus: Vid. Poterius in l. 2. Pharmacop. Spagy. cap. 2.

Juxta dicta, ubi ipsum sal biliosum peccaverit, simul nimia acrimonia, conveniunt subinde emulsiones, paratæ ex seminibus temperatis oleosis cum remediis fixis, quæ blandè temperant & obtundunt acrimoniam istius salis peccantis; sunt ordinariò ex seminibus 4. frigidis, aut majoribus, aut minoribus; item ex hordeo ad crepaturam cocto, ex amygdalis dulcibus; v. g.

℞. sem. 4. frigid. maj. ʒvj.

papav. albi.

amygd. dulc. ā ʒij.

c. l. q. Aqua rosar. f. emulsio.

cui adde

ess. opii. ʒβ.

M. S.

**Temperirende Milch.**

℞. sem. papav. alb. ʒj.

4. frigid. maj. ā ʒj.

c. l. q. Aqu. galeg. vel nymphae, vel rubi Idai & Aqu. sempervivi maj. fiat emulsio: cui pro circumstantiarum ratione adde

ʒi ʒiati scrup. j. vel ʒβ.

Antihect. Poterii vel ʒii diaph. vel Bezoard. min. ʒβ. l. scrup. ij.

(vel ʒii diaph. & Antib. Poterii. ā gr. xv. ʒj. ad ʒβ.) edulcoretur parum cum rotul. Manus Christi perl.

Non tamen crebrius aut copiosius præscribantur hæ emulsiones, quia stomachum nonnihil pessundant, ejusdem tonum lædunt, appetitum destruunt, & ita crebriore usu nocivæ evadunt.

Externè pro symptomatum aliquali mitigatione, imprimis pro compescendo æstu febrili, & ad præcavenda deliria, ac vigilias, dolores, coma vigil, plantis pedum, & volis manuum applicandum est cataplasma ex fermento pistorio, cum aceto & sale imprægnato; vel cataplasma D. Michaelis.

Imò solæ radices raphani in taleolas incisæ stomacho pedibusq; sale & aceto probè prius mundatis applicatæ, insigniter conveniunt: quidam etiam occipiti applicant: Raphanus enim irritando successivè quasi attrahendo derivare videtur. Pauperiores saltem recipiunt limum recentem: hunc aceto probè permistum nudis pedum plantis applicant. Succus cancerorum fluviatilium ex cancris vivis contusis recens fortiter expressus instar cataplasmat. plantis pedum, & volis manuum



manuum applicatur, subinde renovando, egregiè conducit ad temperandum æstum: imò instar epithematis fronti circumligatus egregiè convenit ad cephalalgiam tollendam, & inde imminentes vigilias contumaces, item ad præcavendum delirium.

Sæpius dictum fuit, quod etiam dentur febres deliræ, propter delirium præsens ita dictæ: in tali delirio, ut & agrypnia & cephalalgia, præter blanda apodyna aut opiata, cum aliis, appropriatis cautè & circumspectè usurpata, venarum raninarum apertio subinde proficua existit: ac sanè in morbo dicto Hungarico seu febre castrensi, earum sectio, & ratione junctæ prunellæ, & ratione capitis parthematum, summè proficua existit. Quorum loco & tali in symptomate imminente, aut graviùs urgente, cætera si respondeant, venæ frontis sectio à quibusdam institui solet. Forsan, ubi sub agrypniis aut cephalalgis, item frontis æstuationibus, periculum delirii imminet, hirudinum pone aures applicatio non inutilis foret. Præter dicta istis in capitis pathematis epithemata non rarò fructuosè, sed calidè, aut saltem tepidè fronti applicantur. Observandum autem, quod ejusmodi epithemata tempora simul tegere debeant, ita ut ultra arterias ibidem pulsantes pergant, v. g.

℞. ▽ anethi l. rosar. l. flor. sambuc. l. verben. ʒij.

apoplect. ʒß.

Philonis Rom. l. Requ. Nicolai vel theriac. ʒj.

M. D. S.

**Eusserlicher Umschlag.**

℞. ▽ flor. sambuci

verbenæ ʒijß.

spir. theriacal. camphor. ʒijß.

Philon. Roman. ʒij. M.

℞. ▽ chamom.

flor. sambuci ʒj.

apoplect. vel cephal. ad extr. ʒij. M.

Applicetur cum linteis multiplicibus tepidè fronti & temporibus.

Sed à nimio camphoræ usu in agrypnia abstinendum, quæ alias singulare est in deliriis. Vel hujus loco sequens emulsio, quam aliquoties felici cum successu præscripti, applicari potest.

℞. sem. papav. albi ʒij. l. iij.

hyosc. ʒß.

aqu. sperm. ranar. ʒij.

sempervivi,

solani,

hypnotica usit. ʒj.

f. l. a. Emulsio;

M. D. S.

**Eusserliche Milch ums Haupt.**

℞. nucl. persic. ʒij. l. iij.

sem. papav. alb. ʒij.

aqu. sperm. ran. ʒij.

Aqu. semperviv.

solani ʒij.

f. l. a. Emulsio.

adde

camphor. gr. vij. l. ʒß.

M. pro Epithemate. S.

**Umschlag ums Haupt.**

Dictæ emulsiones aut misturæ solæ in forma epithematis applicantur fronti: vel miscentur his ipsis ana succi cancrorum fluviatilium recentis expressi, & ita subinde fronti applicentur, sæpeque renoventur, & egregiè delirium sistunt: c. g.

℞. aqu. beton.

fl. papav. errat.

sambuci à unc. j.

succi ʒ fluviat. rec. express. ʒij.

✓ camph. ʒij. M.

Vel solam etiam aquam rosarum tanquam eximiam commendat Piens, Tract. de febris.

Item ℞. Unguenti alabastr. vel popul.

somnis. usitat. ʒijß.

ʒo express. nuc. mosch. ʒß.

camph. gr. vj.

M. D. S.

**Ruhe-Salblein.**

℞. Unguenti alabastr. ʒij.

ʒo express. nuc. mosch. ʒj.

Philon. Romani vel theriac. ʒß. M.

Quin & si impetuosior raptus quasi ad caput metuatur, in specie ubi excretio quæcunque, imprimis cutanea, suppressa, dicta capitis symptomata inferunt, vesicatoria femoribus vel brachiis applicata, & enemata acrioria, conducere arbitror.

**PRUNELLÆ CURA.**

Prunellam quod attinet, hanc optimè præcavet & mitigat mucilago seminis psyllii vel cydoniorum, cum aqua sempervivi majoris extracta, subinde linguæ applicata, aut in faucibus detenta: Conf. M. A. N. C. Ann. 8. Observat. 76. pag. 123. Vel

℞. sem. cydon.

malva,

psyllii à ʒij.

c. f. q. Aqua sperm. ranar. f. Mucilago ad lb. ʒ. cui adde

ʒis xci ʒj.

Aqu. semperviv. compos. ʒij.

succi cancr. fluviat. unc. j.

M. D. S.

**Rühlander Mund-Schleim.**

℞. Mucilag. sem. cydon. c. Aqua rubi idai extr. unc. ʒß.

syrupi portulac. ʒvj.

ʒi parum. M.

℞. Aqu. semperviv. maj. unc. ij. vel unc. iij.

mucilag. sem. cydon. c. sperm. ran. extr. ʒj.

ʒi depur. ʒj. M.

(P p 3)

Con-

Convenit etiam speciatim, nisi aliquid obftet, matura venarum raninarum sub lingua sectio, idque tunc imprimis, quando tumores observantur, & metus est supervientis & instantis anginae; sicuti etiam in nimia faucium inflammatione oris lotiones cum nitro, tam cum quam sine gargarisatione, convenienter usurpari possunt, factae ex plantagine, lactuca, solano, ligustro, portulaca, prunella & similibus, aditis post decoctionem succis mororum, berberum, citri, &c. aut similibus.

℞. HB. *prunell.*  
*salvia*  
*scabios.* à mj.  
*flor. ros. rubr.* mß.  
*cort. nuc. jugland.* ʒj.  
 Coqu. in ∇ *simpl.*  
 Colatura viij. adde  
*succi sempervivi maj.* ʒij.  
*rob. moror.* ʒiß.

M. D. S.

Gurgel-Wasser.

Item succus cancerorum fluviatilium contulorum expressus perquam egregius in hujusmodi faucium affectibus est, nempe:

℞. *cancr. fluv.* no. vj.  
 In mortario cum paucis aceto rubi idæi contusi leniter exprimantur: adde  
*succi sedi maj.* unc. iij.  
*rob. nucum* unc. j.  
 Qi *tiati* ʒj. M.  
 ℞. *aqua semperv.* maj. lb. iß.  
*succi S fluv. rec.* unc. iv.  
 Si *s ammoniaci depur.* ʒiß. M.

Alioquin observavi in morbis malignis, dum fauces sunt siccae & aridae, sine crustae pituitosae praesentia, optimum fuisse remedium lb. iß. *aqua communis*, mell. *comm.* *cochl.* j. l. ij. V Rhenani rectificati unc. j. l. unc. ß. Mista usurpentur pro oris collutione.

Si post tales oris collutiones in graviore malo in lingua denuò arefcit, tum nil melius est:

℞. Frustum lardi non saliti, vel si salitum fuerit, in ∇ spermatis ranarum macerati: hujus frustulum unum imponatur linguae, & ita aliquandiu detineatur, emollitur exinde lingua, & interdum crusta quasi coriacea separatur.

Loco frustuli lardi alia pingua, v. g. butyrum non salitum, itidem commodè usurpari potest. Vel:

℞. Rapas; continde; inde vasi ligneo impone grave pondus; liquorem expressum instar syrupi coque.

## FEBRIUM CONTINUARUM PERIODICARUM CURA.

Hæc ipsa remedia & methodus promiscuè tam in febribus continentibus, quam continuis periodicis, usurpari possunt, nisi quod in his ad exacerbationum vicissitudinem magis respiciendum sit, adeoque tempore ingruentis paroxysmi modò dictis, imprimis ðialibus fixis, simul ratione complicatae febris intermittens, præmissis præmittendis, subinde adjungenda sunt absorbentia illa & alterantia, supra laudata, in specie Corallia, lapilli cancerorum, antihecticum Poterii, & cardui benedicti: item ∅ vitriolatum Mynsichtii, quod solum ante paroxysmum in periodicis est egregium. Imprimis conducunt mixturæ ex subcontrariis paratæ, i. e. ex acidis & terreis, conservando corpus in diaphoresi blanda, alvumque liberam retinendo, aliaque pro symptomatum varietate debite præstando.

## SEMITERTIANARUM CURA.

Eadem ferè de semitertianis aliisque similibus compositis & complicatis variè febribus dicenda veniunt, attendendo: an benigna magis, an maligna fuerit eadem? an simpliciter febris composita sit? an verò cum inflammatione partis cujusdam vel nobilioris vel ignobilioris, sensilioris vel minùs sensilis juncta? Lenta itidem si intermittenti juncta fuerit, pro ratione originis lentæ cura non nihil modificanda; adeoque ea, quæ de febribus intermittens & continuis jam dicta, ea & semitertianis, prout ad unam vel alteram talium prius accedant, accommodanda erunt.

In genere rigorem & horrorem tollent absorbentia, alcalia, &c. æstus verò eadem diaphoresi & alvi libertate juncta. Si statura periodo recurrant paroxysmi, ante exacerbationem possunt remedia propinari.

Vomitoria in plerisque sunt optima; sicut, si cum inflammatione juncta, diaphoretica & sudorifera; cum lentis verò ∅ia abstergentia, & incidentia, ut ∅ ammoniacum, arcanum duplicatum, &c.

## CURA CAUSI

nil singulare requirit, saltem, quod nitrata tam sitis quam æstus ratione imprimis convenient, si in forma sicca in potu dissoluta usurpentur, sive spiritus nitri simplex, aut potius dulcificatus ad guttas ʒo. in mensura semis potionis allumatur.

Quod si accadat, ut datò nitro non cum tanto ardore mittatur urina, & liberalius accadat mæjere, bonò animò esto, dicit Lindanus.

danus. Spiritus nitri usurpatur in julepis ,  
item in potionibus ,

Vel præscribatur decoctum quoddam al-  
terans :

℞. rad. scorzonæ. ʒj.  
liquir. ʒss.  
fol. acetos. m. j.  
flor. violar.  
rosar. rubr.  
borrag. a p. ij.  
Hordei m. j. l. ij.  
ras. C C. ʒj. ad ʒss.  
passul. min. ʒj.  
Coqu. in f. q. *∇ a simpl.*  
Colatura t̄biv. adde  
℞ i. l. vitrioli q. s. ad  
aliqualem saporis gratiam.

M. D. S.

Alterirender Kuhl-Transf.

In hoc passu bonum etiam est remedium  
laudanum opiatum , si tempestivè & pru-  
denter exhibeatur , omnem caloris vim re-  
frænabit.

#### CURA FEBRIS LIPYRIÆ

instituitur per diaphoretica , tam absorbentia  
quàm volatilia alcalia penetrantia & dis-  
cutientia ; quam medendi rationem infra ,  
ubi de inflammationibus , in specie de pleu-  
ritide , habebimus. Quoad

#### CURAM FEBRIUM COLLI- QUATIVARUM:

In his ad acre colliquefaciens imprimis respi-  
ciendum , ut hoc corrigatur : Si enim hoc ne-  
glecto excretiones saltem , quæ tantum sunt  
producta morbosa , respicere , hasque suppri-  
mere velimus , retentis iisdem mille malis  
multabitur æger. Ad acre autem illud tem-  
perandum , vix aliquid convenientius esse  
videtur , quàm absorbentia , v. g. *∅* diapho-  
reticum Martiale , *∅* sigillata , unicornu fos-  
sile , &c. Quæ eò videbuntur efficaciora , si  
sociatione blandorum acidorum , ut succi ri-  
bium , berberum , cerasorum , citri , cydo-  
norum , &c. aliqualem quasi austeritatem  
contraxerint : hinc enim Sylvius spiritum sa-  
lis dulcem c. 29. §. 92. laudat. Unde & in  
excretionem nimia adstringentia , v. g. tinctu-  
ra hæmatitis , &c. manè & vesperi ad gutt.  
16. vel liquor stypticus ad gutt. 20. adhibe-  
ri possunt. Forsan & camphora , quodvis  
acre temperans , hic locum habebit. Inter  
composita electuarius discordii Fracastorii ,  
juncto succo citri propinatum , præ aliis con-  
ducibile videtur.

## CAPUT IV.

De

### Febribus Acutis Sympto- maticis.

**F**ebres secundariæ dicuntur aliàs etiam  
symptomaticæ , per quandam similitu-  
dinem ; quia

1. Ut symptoma morbum sequitur ; ita  
& febres tales alium morbum.
2. Sicut remoto morbo removetur sym-  
ptoma , ita & hæc febris.

Sunt equidem , qui febres has in comitatas ,  
& symptomaticas strictiùs dictas , dividunt ,  
ut Sennertus de febribus , illo nomine eas indi-  
gitans , quæ inflammationibus partium jun-  
guntur ; hoc cæteras.

Sed non opus est scrupulum in talibus fa-  
cere. Sunt autem hæ ipsæ secundariæ nunc  
acutæ , idque crebrius , nunc lentæ , pro affe-  
ctuum , quos sequuntur , & partium affe-  
ctarum conditionibus : dum illi vel gravio-  
res vel leviores sunt ; hæ verò , nempe par-  
tes affectæ , vel sensiliores vel minus sensiles ;  
item vel nobiliores , seu quæ magis cum san-  
guine & spiritibus commercium habent ; vel  
ignobiliores.

Has ergo inter symptomaticas se offerunt  
illæ , quæ vulnera quædam insigniora sequun-  
tur , die Wund-Fieber / ab acido in vulnere  
oborto , doloris , inflammationis , & hinc et-  
iam febris autore.

Præterea , quæ extrinsecus vulnere condu-  
cibilia sunt , internè egregia mistura est in ca-  
libus Chirurgicis polychresta , v. g.

℞. *∇ hyssopi* ʒij.  
fenic. ʒj.  
spirit. theriac. ʒiij.  
+ ti vini l. simpl. l. destill. ʒiij. ad ʒss.  
lap. *∅* flux. ʒj.  
syrup. card. bened. ʒij.

M. D. S.

Zertheilend Wund-Träncklein.

Vel in forma sicca :

℞. lap. *∅* præp. ʒj.  
extract. theriac. gr. ij.

M. D. S.

Zertheilend-Pulver.

Quibus etiam pro partium affectatum ra-  
tione , vel symptomatum variorum syndro-  
me , simul alia appropriata addi possunt.

II. Febres , quæ adsunt inflammationibus  
gravioribus , occasione acidi vitiosi sangui-  
nem coagulantis , & ad stagnationem , inde-  
que ortam inflammationem disponentis , ex  
vitiosa cum sale volatili effervescencia in san-  
guine ut plurimum causantur. Febres hæ nunc  
sunt acutæ , v. g. in pleuritide , inflammatione  
epatis ,



epatis, angina, erysipelate; nunc lentæ, ut in inflammatione prope fundum mesenterii &c. Curantur hæc febres simul & eadem ratione, quâ inflammationes ipsæ, per attenuantia, acidum absorbentia, volatilia, alcalia, diaphoretica &c. Hac ratione etiam lactuca, endivia, serum lactis, sempervivum, & alia refrigerantia dicta, alcali volatili blando constantia valent, quæ phlogoses & incallescencias, ab effervescencia acidi ortas, corrigunt, & ita per accidens refrigerant.

III. Quæ sanguinem intra corporis cavitates, aut in ipsis solidis partibus, effusum & coagulatum insequi solent, & ex acore, putredinalem corruptelam antecedente, oriuntur. Conducunt sanguinem congruatum resolventia, & putredini resistentia, qualia præter misturam supra laudatam sunt bellis minor, scabiosa, flores hyperici, chærefolium, papaver rhæas, & diaphoreticum, non negligendo simul potiones vulnerarias.

IV. Pertinent huc febres istæ: quæ in principio paroxysmorum arthriticorum usque ad statum ferè observantur: de quibus vid. Sylvius l. 1. *Prax. cap. 30. §. 36. 110. & 161.*

Sed de febribus symptomaticis videbitis in specie pluribus agentem Sennertum l. 2. *de febribus cap. 16. pag. 202. seqq.*

## CAPUT V.

De

### *Febribus Lentis.*

**I**uxta febres continuas acutas biliosas observantur etiam febres continuæ minus acutæ, plus minus lentæ, ita dictæ, quod continuò quidem affligant ægros, sed tardiore motu sua absolvant tempora, hinc magis diuturnæ, minusque urgentibus stipatæ sint symptomatis, nec ardore adeò intenso seu vehementi molestæ, plus tamen minus acrimordaci: idque nunc magis, nunc minus tales, prout variat ægri constitutio. Illæ magis propriè ita dictæ, Germanis, *eine schleichende Hitze* / & à comite frequentiore, nempe contabescencia corporis, *ein schwindsüchtig Darr- Fieber* / vocantur; hæc verò minus lentæ, & nonnihil ad acutæ naturam accedentes, graviora ferè symptomata juncta habent, adeoque brevius tempora sua, absque tamen critico motu, successivâ saltem solutione percurrunt, quales continuæ quotidianæ in specie dictæ. Sunt enim lentæ omnes benignæ; malignæ autem acutæ esse solent, utur petechiales præceteris lentæ esse videantur. De febribus his apud Practicos pauca prostant. Interim à lymphâ imprimis continuò sanguini infusâ ori cum Sylvio arbitror, quæ vitiata efferve-

scenciam massæ sanguineæ præternaturalem infert; unde & à Sylvio *cap. 29.* lymphaticæ dicuntur: quas inter eminet imprimis hæctica febris, ex multis causis producta.

## ARTICULUS I.

De

### *Febribus Catarrhalibus.*

**P**Ræ cæteris considerabiles sunt febres catarrhales, *die Fluß- Fieber* / quæ in principio & incremento catarrhorum, v.g. coryzæ, tussis, raucedinis; &c. subinde molestæ sunt, dum lymphâ glandularum primariò quidem conglomeratarum, secundariò etiam globatarum, circa caput & pectus confitarum, quacunque ex causa acrior & acidior ac falsior, ac quasi muriatica, aliòve modo vitiosa reddita, copiosius circa dicta loca effunditur, occasionem crebrius suggerente ambientis aëris inclementia, aut alio objecto externo dictas partes irritante.

Talem catarrhalem lymphæ motum comitatur febris ex alteratione sanguinis à lymphâ & irritatione spirituum influorum, cum ardore, rodente magis quàm magno molesta, accedentibus simul hinc inde lassitudine, & lincinationibus corporis variis: lassitudo itidem contundens & plus minus lincinans ex lymphâ derivanda venit, cum lincinationes hæc in artubus non raræ sint, & sequantur ferè semper lymphæ vitiatæ in artubus activitatem, & hinc inde stagnationem: ac sanè lymphæ constitutio ac motus plus minus naturalis, præsertim glandularum plus minus conglomeratarum, probè observandus venit pluribus in febribus, tam in intermittentibus, quàm in continuis.

Certum enim est, quod omnes febres catarrhales, tam cum quàm sine coryza aut tussi, semper sint ex lymphâ nimis acida. Febres hæc catarrhales interdum sunt mitissimæ, circa vesperam autem ordinariò exacerbari solent; unde etiam tales febres sunt febris continua periodica quotidiana veterum, quam ipsam etiam Fernelius jam suo tempore sub lentæ febris nomine descripsit.

In his febribus lymphaticis lentis ac catarrhalibus, cum capitis perturbatione & dolore gravativo seu gravedine, subinde levis horror & facile transiens, sed crebrius repetens, molestus est, *es ist / als wenn ihnen kaltes Wasser über den Leib gegossen wäre* /isque imprimis interdum subinde repetit. Pulsus est continuò frequens & celer, vehementia & magnitudine moderatus, sub exacerbatione in dictis conditionibus acutus: urinæ excernuntur intensius tinctæ ac rubentes, sed quæ unò alteròve die clapsa mox crassescunt, hinc conturbantur & flavescunt, viden-

denturque copiosum admodum deponere sedimentum: lassitudo gravis ac lancinans subinde occupat artus. His subinde conjunctus est calor, sive ardor rodens sive acris, circa vespertam ingravescens, ad mediam usque noctem ferè durans, interdum satis intensus, interdum paulò remissior: post mediam noctem autem successivè denuò remittit, manèque ægri sunt debiles; durat tamen continuo lentus, sed obscurus calor, qui omni vespertà intendi, & insigniter subinde exacerbari solet. Lympha enim acidior vitiosè in massa sanguinea effervescebat, unde caloris intensio, non tamen semper adeò insignis, & quidem circa vespertam, quoniam tunc coniventibus nonnihil poris corporis, uberior lymphæ laticisque serosi impeditur transpiratio, hæc nempe circa vespertam ex aëris ob solem occidentem alteratione inductâ & copia ejus & acrimonia augetur, aut textura seu constitutio ejus plùs minùs vitatur, unde etiam febris tunc exacerbatio levis usque ad mediam noctem sentitur. Durant ista symptomata sub coryza & tussi gravioribus usque ad statum morbi, dum nempe lympa temperari & crassescere incipit, seu, ut vocant, materia catarrhalis cocta fieri, & spissior mucus emungi, & glutinosioris pituitæ expectoratio incipit, acrimonia enim lymphæ si correctâ est, cessat etiam febris.

#### CAUSÆ.

Quoad causas remotas febrium lentarum, in specie catarrhalium: illæ sunt, quæ ad affectus catarrhales disponunt; interdum, sed rariùs, febres hæ catarrhales, ac ipsi catarrhi, sunt lentæ epidemicæ seu communes, & in vulgus grassantes, ab aëris communi impressione natæ, nunc, idque frequentius, benignæ, rariùs malignæ, & tunc subinde acutæ: quæ malignæ, uti per contagium suum lympham & corporis humores in specie afficiunt, ita hoc consequenter facillè anam dat fermentationi sanguinis præternaturali, & sic se propagare, & insigniter exacerbari videntur, sc. pertinere huc videtur morbus ille epidemicus, cujus mentionem facit Riverius de morbis infrequent. Observat. 9.

#### DIAGNOSIS.

Diagnosis febrium dictarum ex hætenus dictis symptomatis patet: cum quibus conf. Sylvius.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Febres hæ non multum in recessu habent, uti febres continuæ acutæ seu biliosæ dictæ: facillè curantur aut evanescent, utut insigniter molestæ, interdum & vehementes sint.

Febres tamen catarrhales epidemicæ, &  
Tom. II,

in specie malignæ, subinde non sunt sine periculo. Equidem extenduntur nonnunquam ad 14. dies noctesque; raro tamen salutariter, sed convulsionibus supervenientibus ægri moriuntur.

#### CURA.

Quod attinet methodum medendi: febres lentæ catarrhales, in multis cum cura catarrhorum vulgarium conveniunt. In specie eò dirigenda est cura, ut lymphæ corrigatur vitium, eaque per blanda sudorifera ac diaphoretica imminuatur: idque eo magis, si epidemicæ ac contagiosæ febres catarrhales non carent malignitate; uti ex debilitate virium, ex facili contagio, ex vigiliis, interdum levibus deliriis supervenientibus apparet. Ut ordine procedamus, curantur per ea, quæ

1. Irritationem partium solidarum affectarum, indeque natum spirituum impetum ac copiosorem lymphæ effusionem sistunt.
2. Lymphæ præternaturalem acrimoniam temperant. Et
3. lympham temperatam per convenientes vias evacuant.

Pro priori scopo conveniunt imprimis opiata: pro secundo autem Sia volatilia alcalia aut marina absorbentia & temperantia, & vulgò incrassantia dicta, ut etiam appropriata contra catarrhos remedia, v. g. ligum saffras, ejus decoctum, & ex eodem parata remedia, essentia catarrhalis cum spiritu serpilli, succinum præparatum, & destillatum & omnia succinata, flores Sais, antihecticum Poterii, aliaque Sialia fixa. Myrrha similiter est elegans remedium, ejus enim aliquot grana sapore suo balsamico acorem lymphæ nimium temperant. Camphora quoque hîc imprimis est usitata, quæ & blanda diaphoretici vitia lymphæ imminuit; & similia. Præceteris tamen Svolat. cornu cervi, succini, & ex his paratus liquor cornu cervi succinatus, item ~ & S volat. sanguinis humani, Sais amm. anitatus, nisi æstus sit nimius, & similia opiatas mista: v. g.

℞. ∇ saliv. vel scabios.

serpilli ā ʒi.

~ salis amm. anis. l. succin. ʒi.

Syrupi diacod. Montani l. pap. albi ʒj.  
(vel loco hujus laud. opiat. gr. ij.)

M. D. S.

Glus: Träncklein auff etliche maßl.

Capiatur ante exacerbationem vespertinam, & in hac ipsa, & excitetur blandus sudor.

℞. liqu. C. C. succin. l. ~ Sais amm. anis.

l. eff. succin. ʒij.

essent. opii ʒß.

M. S.

Glus: Essent.

Dosis gutt. 30. 40. ad 50. aliquot horis ante exacerbationem, & iterum ingruente nocte.

(Q q)

℞. theriac.

℞. *theriac. Andromachi* ʒj.  
*sal. volat. C.C.* gr. vj.  
*succin.* gr. iij. l. jv.  
 M. f. *Bolus. S.*

### Schweiß-Lattwerge auff einmahl.

℞. *succin. præp.* ʒß.  
*myrrh. elect.* gr. v.  
*sal. volat. succini* gr. jv.  
*extracti croci* gr. ij.  
*laud. opiat* gr. j.  
 ʒo *destillati succini* gtt. j.  
 M. f. *Pulvis. S.*

### Fluß-Pulver auff einmahl.

Si fuerit lymphæ nimis salsa, ea, quæ edulcorant, sunt usurpanda: v. g. ex glycyrrhiza, ficubus, jujubis, hordeo, &c. item emulsiones papaverinæ, opiata, & cum opio paratæ pilulæ de styrace, aliaque, quæ in tussi catarrhali allegata sunt.

Si loquelæ difficultas & raucoedo urgeat:

℞. *Aqu. mentha* unc. ij.  
*cinnam.* unc. ʒ.  
 ~ ʒi *anif.* ʒj.  
*laud. opiat* gr. iij.  
*syrupi de passul.* l. *de liquirit.* ʒvj.  
 M. D. S.

### Lindernd Fluß-Träncklein zum Halße.

Urgente tussi siccâ adhuc in principio, pro lymphæ acrimonia temperanda, faucium & asperæ arteriæ dolorosa irritatione sistenda, & materia incrassanda,

℞. *Aqu. scabios.* unc. ij.  
*asthmat.* ʒvj.  
*syrup. diacod.* l. *papav. alb.* ʒj.  
 M. D. S.

### Hust-oder Fluß-Träncklein.

Pro faucium, pharyngis & laryngis levi excoriatione conveniunt Loh passularum, syrupus diacodion Montani, violarum &c. cum baculo liquiritiæ.

Hæc cura cum decocto ligni sassafras tamdiu continuetur, donec perfectè sistatur febris.

Sufflaminata sic febre, & impetu spirituum ac lymphæ sedatô, si opus fuerit, blanda laxatio institui potest, v. g. ex MP. de ammon. Quercetani, aut MP. de succino Cratonis, acuatæ cum ʒ dulci &c.

℞. MP. *de succin. Cratonis* ʒj.  
*sal. volat. succini* gr. vj.  
*res. jalapp.* gr. iij.  
*extracti trochisc.* alb. gr. j.  
 ʒo *destillati succini* gutt. ij.  
*c. essent. ligni sassafras* f. *pilula.*  
 D. S.

### Haupt-und Fluß-Pillen.

Quibus factis, reliquiæ jam incrassatæ expectorantibus, incidentibus ac similibus sunt evacuandæ: e. g.

℞. ▽ *hyssopi* ʒij.  
*asthmat.* ʒß.

~ ʒi, l. *asthmat.* l. *Gummi ʒci de pur.* ʒij.  
*syrupi Nicot.* ʒß. l. ʒvj.  
*emet. Angeli Sala* ʒj.  
 M. D. S.

### Resolvirend Fluß-und Brust-Träncklein.

Locô hujus misturæ succus raphani expressus, cum paucis saccharo temperatus, egregiè incidit mucum.

Lympha correctæ evacuatur, aut universaliter per diaphoretica & diuretica; aut particulariter per nares & os, atque hoc saltem in statu, cessante febre, & costâ materiâ. Ubi ergo diuresis magis intenditur:

℞. *liqu.* ▽ *fol.* ʒi ʒß.

Dosis 40. l. ʒo. guttula bis indie.

## ARTICULUS II.

De

### Febribus Lymphaticis Glandularum conglomeratarum.

PRæter hæcenus dictas observantur quæque febres lymphaticæ vitio lymphæ glandularum conglomeratarum, quæ in certam cavitatem suam effundunt succum: inter quas eminent parotides & pancreas, quæ similem ferè lympham in os & intestina, consequenter quoque in massam sanguineam evomunt. Peccat hæc ipsa lymphæ, imprimis quando est plus minus viscida, ac sæpius salior & acrior, aliove simili modo vitata; tunc enim saliva viscida ac salior blandam quidem continuam febrem, lentam tamen, calore non ita forti molestam, infert.

Febres hæc lentæ nunc sunt primariæ, nunc secundariæ: Illæ, quæ per se incipiunt, & nullum alium morbum sequuntur: hæc verò, quæ ex alio sunt morbo, sive ab alio, tanquam à sua causa, immediatè dependent, v. g. vulgò corruptionem partis cujusdam internæ sequuntur; sive ab alio morbo malè tractato per illius degenerationem fiant: adeoque tunc tanquam primariæ per se subsistant: quales sunt, quæ continuas acutas, item intermittentes malè curatas sequuntur, suntque omnes febres lentæ ferè periodicæ, h. e. quæ suis plus minus periodis certis exacerbari solent: idque vel (frequentius quidem) vespertinò tempore, sicque quotidianæ typum repræsentant; vel ab omni pastu, nuncque ad hæcticas febres revocantur. De his singulatim.

## MEMBRUM I.

De

### Febribus Lentis Primariis.

Quoad febres lentas primarias: horrore levi, sed diuturnò ferè, ægros apprehendunt,



dunt, insequente quidem calore continuo, sed non adeò intenso seu vehementi, prout in acutis; utut subinde in extremis mordaci plus minus acri, interdum tolerabili seu mediocri, sed qui vesperi intenditur, & usque post medium noctis graviter urit, & absque sensibili quasi excretionem solvitur: appetitus est prostratus, alimentorum assumptorum insequitur dolor gravativus stomachi, hujus & intestinorum inflatio ac distensio, adest simul interdum quidam torpor ac somnolentia. Febres hæc circa vespertam, interdum post cœnam demum, exasperantur cum pulsu frequentiore, non tamen adeò magno, propter lympham sanguinis fermentationem depravantem, per noctem ferè durant ad meridiem sequentis diei, & tunc solent cessare; interdum tamen mitius affligunt. Salivæ huic hoc modo viciatæ si junctus fuerit succus pancreaticus viscidus aut salsus, aut alio modo vitiosus factus, simul adesse solet anxietas circa præcordia, interdum tormina obscura, & lancinationes ventris. Pulsus est continuo celer, frequens, magnitudine & vehementia moderatus, ad parvitatem tamen & debilitatem declinans. Sitis in his febribus interdum satis urget, & in specie ubi saliva peccat, os est glutinosum: quia fauces & lingua lentâ materiâ subinde sunt obducta. Urinæ sunt crassæ, intensius tinctæ, quæ facile turbantur, & subinde multum crassamenti seponunt. Adest simul lassitudo totius quasi contundens, cum lancinationibus artuum subinde junctæ; interdum etiam cephalalgia tensiva & gravativa molesta esse solet.

Pluribus ad acutarum naturam accedere hujusmodi febres lentas, non solum ex hætenus facta relatione patet; sed in specie, quod acutæ continuæ, & etiam intermitteutes, in lentas, tam has quam alias, facillimè degenerent; quin & in hæcticas transeant. Nempe acutæ illæ ex concitatore fermentationis febrilis impetu occasione acrioris & volatilioris acidi in sanguine aciore (cæteris hinc inde derivatis humoribus, & ipsis acrioribus existentibus) originem ducunt: lentæ e contra ex remissiore illo impetu ab acido minus acri, aut in subjecto seu vehiculo viscidior ac glutinosior hærente, ipsis corporis humoribus, cæteris temperationibus plus minus ac glutinosioribus, vel naturaliter vel præternaturaliter, existentibus.

Observandum enim est probè axioma: chronicos contumaces, diuturnos ac lentos morbos ex viscida, glutinosa tenaci materia, vel tanquam proxima occasionali causâ, vel tanquam fomite dependere; acutos verò, & cum corporis perturbatione junctos, ab aciore causa occasionali materiali originem ducere.

*C A U S A E.*

Origo ergo lentarum harum febrium  
Tom. II.

primariarum est imprimis in stomacho, vel ex vitio & defectu digestionis primæ, dum ex hebetato aut alterato plus minus fermento stomachali (undecunque id vitii ortum fuerit) & bile quoque mitiori magisque acri chylus minus volatilis, sed viscidus, vitioso tamen, aut acido aut salso acri sapore inquinatus, massæ sanguinæ instillatur: quo ipso successivè fomes febrilis talis congeritur, cujus occasione tandem fermentationis & commotio sanguinis febrilis supervenit (unde à sanguine pituitoso, seu à pituita acida, oriri continuas quotidianas asseruere veteres) salubriter cessans, dum illo fermentationis motu depurat se massa sanguinea, & quicquid heterogenei permixtum fuerit, coxerit & præcipitaverit, ut cum urina vel successivis sudoribus eliminari queat. Cum verò chylus talis juxta sanguinem etiam lympham totius corporis vitiare & insigniter alterare soleat, utpote in qua lymphâ naturaliter gelatina lactea seu chylosa deprehendi solet, &c. Sanè talis plus minus alteratio, ac debitis usibus exsequendis hinc necessaria ineptitudo lymphæ, fovere tales febres, & ita caloris nonnihil auctioris, pulsus ex irritatione cordis frequentioris, propter sanguinem verò pituitosum, hinc imminutam & depravatam ejus fermentationem parvi & debilis, ac reliquorum in eadem symptomatum originem esse, probabile admodum videtur, si per se & primariò oriatur, si alios demum affectus consequantur: adeoque revocanda huc veniunt ea, quæ de febribus lymphaticis disserit eruditè Sylvius *l. i. cap. 29.* Sanè exacerbatio vespertina, & calor circa id tempus ibidem gravior, ex lymphæ alteratione illa primariò oriri videtur, cum quilibet à lymphâ orti affectus circa vespertam & appetente nocte ferè magis intendi soleant, ut in febribus catarrhalibus, simpliciter ex lymphæ vitio natis, manifestum est, cujus exacerbationis ratio intricata huc revocanda, quam supra de febribus catarrhalibus dedi.

*P R O G N O S I S.*

Quoad Prognosin: Febres hæc lymphaticæ seu febris continua quotidiana, quò magis vel minus lentæ fuerint, eò diuturniores vel minus diuturniores esse solent; difficiles tamen ferè curatu, nec semper omni periculo vacant.

Quò pejora etiam habent symptomata, eò periculosiores esse solent.

Paroxysmi vespertini si sint longi, cum interdum ad 16. horas extendantur, vires sint debiles & appetitus prostratus, ingens periculum subest.

Salubris hæc febris, nisi cautè & probè tractetur, nunc in cachexiam, si nempe acuta magis nonnihil fuerit; nunc in hæcticam, cum

(Q q 2)

qua

qua magnam affinitatem habet, si lenta magis extiterit, terminari solet.

## C U R A.

In cura febrium lentarum

1. Stomachus curandus ejusque digestio restituenda.
2. Visciditas, ac acrimonia falsa lymphæ corrigenda.
3. Lympha correctæ, ac cruditas pituitosa blandè evacuanda.
4. Symptomata mitiganda.

Pro his scopis consequendis.

1. tam in principio quàm in incremento hujus febris mitius vomitorium optimè locum invenit, imprimis si anxietates præcordiorum adsint, & vires simul constent; aut evacuantiæ per alvum mitiora.

℞. *MP. de tribus Ruffi* gr. xv.

*aur. fulm.* gr. iij.

*scammon. præp.*

*troch. alband.* ā gr. j.

℞. *R. Si compos. f. Pilula. S.*

**Resolvirende Purgier-Pillen.**

II. Diuretica, quia simul sunt alterantia, optimo cum successu applicari possunt. Nempe, ut loquuntur Practici, præmissis præmittendis, fundunt atque attenuant sanguinem, & ita restaurant plùs minùs naturalem ejus fermentationem; simulque crassa crudaque excrementa, si quæ circa primas vias aut aliis in locis restiterint, dissolvendo abstergunt, & remotioni aptiora reddunt.

Remedia itaque quæ corrigunt, resolvendo & attenuando viscida, & temperant falsa, sunt imprimis spir. salis dulcis, spir.  $\Phi$ i dulcis; item  $\Theta$  amm.,  $\Theta$   $\delta$ iatum,  $\Theta$   $\Phi$ i essentielle, arcanum duplicatum Mynsichtii, tartarus vitriolatus Tachenii, & foliata tartari, ejusque liquor, R tartari acerrima & composita, essentia myrrhæ tartarifata, spir. carminativus de tribus, & spir. salis amm. anisatus; cum quibus antihecticum Poterii commodè misceri potest. Hinc præmissis vel blando vomitorio, vel laxativo,

℞.  $\Theta$  amm. puri l. depur. scrup. j. ad 3℞.

*Antihect. Poterii* scrup. 3. l. gr. xv. aut xvj. ad 3j.

M. f. *Pulvis pro una aut duplici dosi. S.*

**Resolvirende Magen-Pulver.**

quarum una mane, altera vespere propinetur, præsertim ante exacerbationem.

℞. *Salis amm. depur.* scrup. j.

*galang.*

*zingib.* ā gr. viij.

M. f. *Pulvis*, pro 2. dosibus.

℞. *arcan. dupl.* 3. l. ad scrup. ij.

*℞ii diaph.* scrup. j.

M. f. *pulvis*, pro 2. dosibus.

Una sumatur ante prandium, altera à meridie hora 4.

Sic quoque nitri antimoniatum & salis amm. ana conducunt etiam insigniter.

Item hæc mixtura egregiè profuit:

℞. *Aq. menth.* l. *card. bened.*

*sanic.* l. *hyssopi* ā 3℞.

*spirit. theriacal. simpl. vel compos.* 3℞. ad 3iij.

*Qu. dulc.* scrup. j. 3℞. l. 3j.

*antibect. Poterii* scrup. j.

*syrupi de hyssopo* 3℞. 3vj. ad 3j.

M. pro 2. dosibus,

aut subinde cochleatim hauritur pro lubitu. **S. Resolvirende Fieber-und Magen-Tränckl.**

Pro muco viscido, fauces & linguam incrustante, resolvendo & excernendo convenit cerevisia secundaria cum tantillo mellis rosati; vel aqua, acerum & nitrum depuratum; vel infusum florum malvæ arboræ in aqua communi, acidulato cum paucis spir.  $\Phi$ is vel salis, addito modico syrupi appropriati, &c.

## MEMBRUM II.

De

**Febre Epiala.**

**A**D has lentas febres pertinet & ista, quam veteres Galeni sectatores epialam vocarunt, in qua ægri simul calent & frigent, vel, ut alii, in qua interiora algent, & exteriora frigent. Hanc cum quotidianis coincidere, & ex cruditate pituitosa primarum viarum oriri putat Ballonius in *Bonetti Pharm. Medic. pagin. 203.* Sed meritò fætitiam his modis definitam epialam Galenicorum asserit Lindanus, qui hoc nomine nihil aliud, quàm febrem mollem seu continuam, homotonon, cum calore leni humido ac molli, intelligit: Id quod & appellationis ratio insinuat, de quo vid. *Piens de febribus Part. 2. pag. 91.* Quod si unquam talis observetur febris, in qua calor & febris coincidunt, placet præ aliis Plateri assertio: epialam non constituere febris peculiarem speciem, sed esse symptoma vel intermittentium copulatarum, cum horror alterius febris supervenit calori alterius, antequam dissolvatur, quod per subintrantiam vocant; vel intermittentium cum continuis junctarum, cum calori continuo misceatur horror intermittentium: vid. *Piens c. l.* Simile quid interdum apud puerperas, aliosvè ægros purpura affectos, videre est apud nos, in quibus ante purpuræ eruptionem urgente licet æstu, tamen si tantillam partem quandam extra lectum proferant, mox horroris sensum in corporis peripheria, interdum in ipsis quoque lecti integumentis percipiunt dum sc. aciores particule salinæ sub corporis communibus involucris delitescunt, & jamjam excernendæ, vellicatione sua talem horroris sensum circa panniculum carnosum inferunt.

PRO-

**P R O G N O S I S.**

Epiala lenis est absque periculo, sed diuturna est periculosa: quia facile in hæticam transire potest.

**C U R A.**

Epialæ specialis cura ex ejusdem origine aut generatione facile haberi potest.

**MEMBRUM III.**

De

*Febribus Syncopalibus.*

**A**D febres lentas referuntur etiam à quibusdam febres syncopales, in quibus ægri animi deliquio frequenter corripuntur. Symptoma tamen hoc non continuis plùs minùs lentis adèd proprium est, quin & malignis non rarò superveniat; imò in intermittentium paroxysmis subinde observetur; Unde etiam ad intermittentium differentiam hanc referre vilum fuit Sylvio *l. 1. Prax. cap. 30. §. 104.* De cætero quibuscunque etiam febribus syncopæ, tales supervenientes videntur hæc esse stomachicæ, atque vel occasione mucii vitiosi, superius ventriculi orificium obfidentis, & vitioso sapore illud crebriùs irritantis; vel ex aliquali humore plùs minùs æruginoso in ventriculo contento originem ducere: de quibus inferius plura, ubi de Lypothymiis.

**P R O G N O S I S.**

Febris syncopalis, qua talis, non est absque periculo: considerandæ tamen & cæteræ circumstantiæ.

**C U R A.**

In hac curanda adhibenda est ratio causæ: Hinc unicornu verum maximè Foresto *lib. 3. Observ. 19. Schol.* prodesse dicitur, cum vino in paroxysmi principio tempore syncopes propinatum: Nempe, ubi acres, aut æruginosi succi ventriculum lancinarint: Sic Zacutus Lusitanus *lib. 3. Praxeos Observ. 22.* febrem refert syncopalem minutam seu mollem, obstinatam, cum nulla proficerent medicamenta, per aquam cum tamarindis decoctam, aliquandiu continuatam refert curatam; nempe, ubi nidorosi acres succi similiaque contenta in ventriculo hæserint. Alias nota sunt spirituosæ volatilia, vel alcalia, vel sulphurea, seu inflammabilia ad syncopes curam, ubi nempe viscidum plus minus flatulentum in causa fuerit. Non inconcinnum tamen est hinc monitum Ballonii *in Phar. Medic. pag. 211. §. 85.* *lypothermia interdum præcedit febrem; Medici territi isto symptomate ad cardiaca properant, cum potius ad purgans medicamentum statim sit deveniendum.*

**MEMBRUM IV.**

De

*Febribus Lentis Secundariis & Symptomaticis.*

**N**ON rarò tales in praxi occurrunt, & frequentius febres vel continuas acutas, vel intermittentes insequuntur, quando nempe præcipitantium, ut vocant, seu absorbentium abusu nimio (*oder wann sie bald vertrieben werden*) acidum morbosum fermentum præmaturè figitur, ac quasi retunditur, & hinc cessante sanguinis ebullitione febrili heterogeneæ copiosæ particulæ, aliàs præcipitandæ seu concoquendæ, retinentur in ejus massa: quibus ipsis & obtunduntur particulæ ejus salinæ activæ fermentativæ, & inertes quodammodo evadunt, & lymphæ simul, speciatim salivalium & pancreatis, vitiatæ, & glutinosior subindeque salior evadit. Quibus occasionibus febres continuæ lentæ oriuntur cum calore mediocri, ægro interdum vix adèd sensibili, nisi, ubi suas exacerbationes habent; cæque ut plurimum vespertinæ, in quibus subinde intensior & mordax satis percipitur: Pullus est cont. nud celer, frequens, mollis, magnitudine ac vehementia moderatus, ad parvitatem declinans, vires prostratæ, appetitus nullus, os glutinosum, ex quo copiosa viscida subinde rejiciuntur, molestia præcordiorum gravativa, fluxus alvi subinde materiæ liquidæ, quasi pituitosæ, nunc cum nunc sine lancinationibus intestinorum molestus: Urinæ crassæ copiosum crassum albidum seponentes sedimentum, excernuntur, &c. & plura observantur symptomata, quæ eruditè Sylvius sub febre lymphatica salivali & pancreatica explicat *l. 1. Prax. cap. 29. §. 13. & 14.* Superveniunt quoque tales febres lentæ supra dictis febribus, si post has curatas ægri avidius alimenta ingerant, quo medio ut non rarò recidivam sibi conciliant, ita, ubi depauperata magis fuerit massa sanguinea, ex copiosiore, & crudiore chylo non ritè assimilabili, lenta saltem febris gignitur. Nec solis febribus, sed etiam aliis affectibus, ex acido viscido plus minus natis, in quibus vel intempestivè movetur camarina, & hinc in massam sanguineam & lympham derivatur, vel non debitè evacuatur, de facili lentæ tales, quasi hæticæ plus minus superveniunt febres: pro quarum tamen omnium cura acido-salti peccantis correctio temperando, viscidæ attenuatio incidendo, & ejusdem excretio per vomitum, alvum, urinam, vel sudorem indicatur, prout hoc ipsum exemplis clarius patebit.

Pertinet ad hujusmodi lentas etiam febris virginea, chlorosi seu cachexiæ virginæ juncta,

(Q93)



juncta, hecticæ interdum quodammodo similis, ex cruditatibus ut plurimum primarum viarum viscidis, hinc bilis inertia cum mensum suppressione enata.

Dum pus fit, major calor & dolor, quam facto pure, adest, ut dicit Hippocrates: Adeoque in quovis apostemate dum suppuratur, febris lenta juncta esse solet; interdum etiam acuta: v. g. ex lacte coagulato, dum apostema fit; vel dum apostema fit in auribus &c. febris juncta esse solet, tamdiu durans, donec facta sit perfecta suppuratio. Unde hujus promovenda maturatio, & remediis sanguinem congruatum solventibus, acidum absorbentibus, & diaphoresi & diuresi sanguinem depurantibus, insistendum: v. g.

℞. ▽ *cherefol.*

*scabios.* ʒiſſ.

*ess. myrrha* ℥iſſ. drachm. iij.

+ *i vini* vel *simpl. l. destill.* ʒiij. l. ʒiſſ.

*lapill.* ʒiſſ. *prep.* scrup. j.

*flor. ʒiſſ.*

*syr. scabios.* drachm. iij.

M. D. S.

#### Matutirend Fieber-Tränkein Lösungsweise.

Ulcera insigniora externarum, aut quælibet internarum partium insequi solent febres symptomaticæ lentæ, ferè hecticæ, adeoque diuturnæ, & ad tabem ac mortem tandem deducentes, à sanguinis infectione, à pure falso-acri viscido, ut notissimum est, in ulcere pulmonum phthifico. Nec curari hæc possunt, nisi removeatur partis corruptela, & mundificetur & consolidetur ulcus: id quod absorbentia suprâ laudata, potiones vulnerariæ alcali divites, ex lapillis cancerorum, hedera terrestri, cherefolio, bujula, pulmonaria, veronica, scabiosa, ut & lignorum decocta, item sulphurea balsamica, flores ʒis, & diaphoreticum, antihecticum Poterii, myrrha, balsamus ʒis, saccharum Saturni, Rantiphthifica, balsamus Peruvianus, terebinthina, præstabunt: de quibus infrâ, *ubi de Phthisi*. Ac sanè quamplures lentæ, diuturnæ, ac tabificæ febres, ex occulta, nec à priori benè cognoscibili corruptione, aut putredine ac latente ulcere seu abscessu partis cujusdam internæ, mesenterii, pancreatis, renis, epatis, vesicæ, uteri, &c. originem habere solent, & difficilè curabiles, ac sæpius lethales ægris existunt: Vid. Schenckius l. 3. *Observ.* Bartholinus C. 2. *Histor.* 19. & C. 4. *Histor.* 18 Hinc in M. A. N. C. *Ann. 4. append.* pag. 50. febres lentæ perpetuæ abscessuum latentium comites esse dicuntur.

Pertinent & huc fistulæ diuturnæ, quæ etiam hecticæ similem febrem inducunt.

Quò etiam facit fœtus mortuus; aut secun-

dina, vel integra, vel parte sui retenta, hinc putrescens, & in saniem plus minus purulentam abiens, tam sanguinem inficiens, quam per contactum simul uterum inquinans: haud curabiles sunt tales febres, nisi illis remotis, ac putredine, ne latius serpat, suprâ dictis remediis maturè prohibita, ac parte læsâ consolidatâ.

Rari sunt insigniores aut diuturniores dolores quarumvis partium, quin febrem symptomaticam comitem tandem adsciscant, continuo pulsû, celeri, frequenti, in principio vehementi, in progressu debili ac parvo, interdum, dum membranoræ partes magis afficiuntur, duro, calore lento seu miti, non adeò magno; siue acidum vel acre dolorificum massam sanguineam simul alteret, & p. n. fermentativum motum inducat; siue simpliciter ex spirituum animalium concitatore imperu, hinc vigiliis, inedia, &c. commoto sanguine intensius, febris quasi synocha simplex plurium dierum conciteretur: sic v. g. colicas contumaciores, aurium dolorem, odontalgiam graviolem, &c. tandem febriculatales sequitur; quæ tamen consumpto saltem dolore etiam evanescit, & ferè blandâ sudatiuncula terminatur.

## MEMBRUM V.

De

### Febribus Hecticis.

**A**D febres lentas etiam suo modo pertinet febris hectica, quæ cum iis magnam habet convenientiam, & frequentissime esse solet symptomatica, aut saltem, aliarum febrium respectu, quæ in illam terminantur, secundaria: adeò ut negent quidam, dari hecticam primariam, ac per se incipientem: Vid. Piens P. 2. *de febribus* p. 49. Quod tamen ita universaliter vix concedendum videtur, quin & ex perverso usu rerum non-naturalium, v. g. tristitia aut mœrore diutius protractis, excernendis p. n. retentis, vitiosis assumptis, aut saltem malè digestis, hecticam oboriri posse, Practici observarunt.

Est aliàs hectica lenta admodum febris, & interdum ægro vix sensibilis: nam calor ejus est admodum lenis, & quasi occultus, qui etiam primo tactu vix est perceptibilis, unde etiam rarò de calore conqueruntur ægri, utur, si diutius contineatur manus, calor mortificans & rodens se manifestet, post assumpta tamen alimenta duabus vel tribus demum horis se prodit calor, isque nonnihil acrior, & vehementior: deinde corpus successivè & insensibiliter emaciatur, & tunc, si ulterius progreditur, consumptio seu hectica marasmodos vocari solet, à Græco nomine ἱστὶς vel habitus; partim, quia veteres crediderunt, utut falso, hanc febrem inhærere ipsi corporis habitui;

bitui ; partim , quia hæc febres ad habitum , seu summum gradum pervenerunt , ut aut planè nunquam , aut rarissimè , curam Medici admittant. Denique pulsus equidem est vehementior solito , ac frequentior , parvus tamen & debilis , simul & celer , & inæqualis , cum successiva & clandestina virium prostratione. Et hæc sunt tria quasi signa pathognomonica , & primaria symptomata , quibus præsentibus hectica primaria conjicitur & ponitur : nempe

1. Calor ipsi ægro occultus , vix sensibilis , ab omni partu post aliquot horas actus ;
2. absumptio & extenuatio corporis successiva seu marasmus ; &
3. pulsus celer , parvus , frequens , debilis , & subinde durus.

De febre colliquativa supra dixi , quæ summus gradus est febris hecticæ.

Symptoma , quod maximè vexat ægros , præter virium debilitatem est marasmus seu consumptio , & marcor succi nutritii partium solidarum , cujus ratione hectica in tres gradus vulgò solet subdividi :

Primus hecticæ febris gradus est , dum ipsa saltem torida , mucilaginosa & nutritiva partium substantia , quæ in nutrimentum partium proximum abire debet , successivè absumitur , & quasi dispergitur.

Secundus gradus est , quando hæc ipsa substantia torida jam in pinguedinem , aut etiam in succum nutritivum partium solidarum mutata , & reliquis partibus nonnihil assimilata , pedetentim liquefacta quasi denuò consumitur.

Tertius gradus est , cum absumptio omnino isto rore roscido , ipsis nonnihil assimilato , ipsa stamina partium fibrosa seu ipsæ fibræ atrescunt tandem & exsiccantur , & hinc siccitatem ac ariditatem sensibus manifestam contrahunt , ægrique tandem sceleta representant pelle induta.

De his videantur Præctici , in specie Sennerthus & Riverius.

Modus generationis hujus febris est duplex : nunc enim est primaria , & per se incipit ; nunc est secundaria , & instar symptomatis supervenientis alios morbos tandem insequitur , & ita hectica symptomatice seu complicata dicitur. Ista febris hectica , quæ per se incipit , est , quæ successivè oritur vitio rerum 6. nonnaturalium , ut dictum est ; quæ verò aliis supervenit morbis instar symptomatis , ac cum iis complicatur , est , quando observatur supervenire febribus continuis , aut intermittentibus contumacioribus ac vehementioribus , in specie perverso modò curatis : Sic namque inter alia Horstius l. 1. *Observat.* 34. observat hecticam lethalem , obortam ex febre intermit-

tente , per specifica ineptè & empiricè curata. Supervenit etiam hectica sæpissimè viscerum plerorumque , specialissimè pulmonum , inflammationi , uti his inflammationibus in abscessus & ulcera degenerantibus , cum quibus partium internarum ulceribus , sicuti interdum etiam cum partium externarum abscessibus gravioribus , ordinariò jungitur hectica ; quâ ratione Phthisici semper sunt hectici : Sic Lindanus super Hartmannum observavit hecticam contumacissimam ex abscessu mesenterii prognatam ; item ex utero , qui in carcinoma inciderat : item hecticam ex ulcere renum : item hecticam in scemina , ortam ex multitudine fonticulorum corpori inustorum , qui omnem humiditatem ac rorem nutritium absumpserant , quæ tamen curata fuit clausis & sanatis istis fonticulis. Quin & lui veneræ subinde febris lenta , hecticæ plus minùs similis , sociari solet , aut sub febre , quæ hecticam simulat , latet morbus Gallicus : Vid. Zacutus Lusitanus lib. 2. *Prax. admir. Observat.* 119. item Fonteca lib. 1. *Consult.* 40. pag. 264.

#### P A R S A F F E C T A.

Vulgò dicitur : hecticam in habitu corporis fundatam esse , & radicaliter consistere ; unde definitur calor præternaturalis in partibus solidis ac continentibus incensus & residens , qui tamen non est : quin potius instar febrium aliarum radicitur in massa sanguinea ejusque fermentatione , unâ cum lymphâ vitiatâ. Prout enim se habent hi duo liquores , in specie sanguis , ita se habet universum corpus : unde etiam particularia ulcera insigniora tibiæ , renum &c. quatenus inquinant massam sanguineam circa loca ulcerosa circulatam , inferunt hecticam : Vid. Piens *de febribus Part.* 2. pag. 46. & 51. Unde etiam calor hecticorum , lentus imprimis , circa loca arteriarum manifestior ac magis perceptibilis sentitur.

Has inter causas , quas modò numeravi , remotas ista hectica , quæ per se incipit , adeoque perversum usum rerum nonnaturalium sequitur , semper est proximè & originaliter ex vitio stomachi ac alimentorum , nempe quando stomachi fermentum loco nativi saporis acquirit saporem falsum acremvè , & ad digestionem plus minus ineptum ; hinc enim itidem alimenta in succum viscidum , falsum acrem fatiscunt.

#### C A U S Æ.

Causa proxima hujus febris in massa sanguinea est dyscrasia sanguinis nimis acidofalsa & acris , cum nimia ejus viscositate seu glutinositate conjuncta ; quatenus nempe in hoc lymphâ glandularum conglobatarum redditur acris & falsa : unde simul & lymphæ facilis

facilis viscositas & glutinositas, idque sensibilibiter in glandulis conglomeratis, adesse solet. Hinc in hecticis omnibus saliva non tantum pauca cum ariditate linguae & faucium, sed & viscida nonnihil, simulque plus minus glutinosa percipitur, (qualis saliva, talis ut plurimum est succus pancreaticus) simulque sentiunt stomachi pathemata propter lympham vitiosam deglutitam. Ab ista ergo acrimonia salina non blanda & æquabilis fit fermentatio sanguinis, sed potius depravata insigniter, simulque quodammodo imminuta, ac consequenter calor acris, lentus, ac quasi obscurus excitatur: Confer. Willisius de febris. Unde & spirituum in corpore defectus, nec non languor totius corporis, & successiva virium debilitas superveniunt, cum particulae salinae urinosae & acidæ non debite invicem intestino motu concurrant, sed potius paucae & inertes factæ interitum falsum coaluerint partim, partim adhuc liberae ab ista falsedine impediuntur, quo minus debite fermentent, quin potius ex vitiosa fermentatione massæ sanguineæ calorem nonnihil auctum quidem, non tamen intensum adeo, sed tantum acrem & quasi asperum inducant. Hæc ipsa omnia augentur adhuc insigniter à visciditate falsæ lymphæ, sæpius à nimia laticis aquosi absorptione orta unde magis vitiosa & plus minus oppressa sanguinis fermentatio pulsus parvum, celerem, frequentem, & ex virium defectu debilem efficit. Sanguis hinc & simulque viscidus ineptus est, ut nutriat partes; quin potius asperitate suâ rorem nutritium vitiat, eumque acri ac lento calore successivè colliquat, inde corpus necessariò tandem absumitur.

Post pastum ergo dum novus chylus & fluidior, facileque digestibilis alimentorum pars per ordinarias vias sanguini infunditur, dilutus nonnihil sanguinis fluxus redditur, & ob resoluta magis salia etiam attenuata ipsius massæ, simulque alterata supplementa, fermentationem nonnihil acriorem inducit; unde aliquot horas post pastum calor auctus cum pulsu frequentiore, & nonnihil majore percipitur, efflorescente simul nonnunquam calore faciei plus minus rubicundo. At non diu durat, quin successivè iterum deficiat, & postea præternaturalis quidam supermanet. Sed cum hoc ipsum chylosum excrementitium supplementum minus commodè assimiletur sanguini, multò minus aptum est ut assimiletur partibus solidis; propterea subinde tempore nocturno sub specie sudoris copiosi denuò per poros cutis confertim emanat, unde sudores nocturni in hectica confirmata sunt satis frequentes. Propter istam verò lymphæ salivalis visciditatem, simul imminuitur & omnino prosternitur appetitus,

superveniente nonnunquam alimentorum istorum fastidio. In vitiis enim stomachi semper habenda est ratio salivæ, utpote quæ multum valet: nam ex huius ratione non raro impeditur & labefactatur plus minus alimptorum fermentatio, ac tandem ipsa sanguificatio, unde necessario massæ sanguineæ salia fermentativa magis magisque obtunduntur, ac fiunt interiora, ac hectica sic lentè ac successivè fit gravior, & tandem incurabilis: aut quando ex nimia acrimonia lymphæ & massæ sanguineæ idem chylus novus pervertitur, hinc non potest nutrire corpus, sed ineptus fit assimilationi, ut ita inde exarescant & marcescant partes corporeæ.

Hæc quæ dicta sunt de causa proxima, confirmantur per omnia ea, quæ tanquam causæ remotæ febrem hecticam inducunt: hæc enim omnes huc collimant, ut aut visciditatem sanguini & in specie lymphæ inducant, aut in sanguine & lymphæ acrimoniam acido-salam generent. In specie, quando à nimio corporis motu ac defatigatione oritur hectica, tunc non tantummodò absumuntur spiritus animales, sed quoque pars sanguinis aquosa, vehiculum reliquarum partium, subinde dispergitur, ac ros nutritivus simul attenuatus exhalat. Unde necessariò lymphæ & massa sanguinea viscidiores, & unitis salibus acriores seu falsiores fiunt. Quoties ira intert hecticam, toties sale volatili massæ sanguineæ oleoso seu bile, ut vocant, acrimoniam excedentem nacto, fortius afficit acidum, & uniendo cum eodem acrimoniam salinam insignem generat; quoties tristitia aut mœrores diuturni hecticam inferunt, toties acidum immoderatum cum urinoso conjunctum in falsum iners degenerat: quoties à vigiliis & curis protractis oritur, toties spiritibus animalibus insigniter absumptis, ac tenuibus massæ sanguineæ partibus exhaustis, reliqua massa spissior ac necessariò acrior evadit: denique in diem diuturniorem insequitur hectica; quoties defectu alimentorum temperaturum acidum & urinosum intimiore unionem concurrente tertium falsum acre generant: id quod fit eò magis, quoties alimenta pravi succi aut minus nutritiva hecticam inferunt; unde subinde fit ut picæ superveniat hectica vitio malæ diætæ: Conf. Sylvius l. 1. Prax. c. 32. §. 8. sequ. Certum interim est, quod asserit Lindanus hecticam propriè sic dictam, & quæ non aliis supervenit morbis, ut plurimum vitio alimentorum, horumque in stomacho vitiatâ digestionem oriri; asserit enim, se vidisse plures hecticos ex stomachi vitio, tum ex vitio aliarum partium; & omnes istas hecticas, quæ oriuntur cum dolore ventriculi, aut quibus talis dolor superveniat, oriri ex stomachi cruditate vitiosa, quæ sit talis, ut neq. sit acida neq. nidorosa, sed potius sit talis alimentorum corruptela,



*ptela, quæ alimenta in crassiore chylum ac viscidiorum salum acrem degenerant: Unde tales hectici conqueruntur subinde de sapore cinereo seu sapore singulari, & non inexplicabili in ore, imprimis tempore matutino. Unde ut plurimum in hectica sit respiciendum ad stomachum, quò corrigatur ejus cruditas: Imò reliqua etiam causa non naturales vix sufficiunt inferre hecticam, nisi simul stomachus ita afficiatur, ut hujus vitio alimentorum deficiat digestio.*

Porto continuis febribus superveniens hectica fit, quando per cursum morbi, aut copioso sudore exhaustus & omnis latex aquosus, & cum eo ros nutritivus partium: aut, quando in deflagratione, ut sic dicam, febrili massa sanguinea fuit perversa in dyscrasiam acrem nimisque salum: quò etiam pertinet perversus curandi modus per medicamenta nimis acria. Id quod eò magis fit in febribus intermittentibus propter nimios sudores, qui ordinariò in fine paroxysmi sequuntur, si tales febres cum talibus sudoribus sint contumaciores ac chronici, & propinentur subinde ante paroxysmum medicamenta salina acriora fixa, aut terrea calcinata, tunc facile fieri potest, ut tandem intermittentes degenerent in periculolas & difficiliore hecticas: hæc enim partim augendo massæ sanguineæ acrimoniam, & absumendo laticem aquosum eam diluentem, sit viscidior; partim destruyendo fermentum stomachi, adeoque inhibendo omnem digestionem, ansam hecticæ dant. Ipse observavi febricitantes, si in cursu morbi crebrius usurparunt terrea, sæpius evasisse hecticos. Quoties denique viscerum primariorum, v. g. renum, imprimis pulmonum inflammationi, in apostema aut ulcus aut empyema degeneranti, supervenit hectica, tunc à pure lympham & massam sanguineam inficiente salso-acri (cùm omne pus sit salum per effervescentiam ex acido & urinoso) & glutinoso massa sanguinea fit acrior, salior & viscidior, unde consequenter fermentatio ejus naturalis impeditur: quæ vitia reliquis humoribus communicata hecticam magis confirmatam reddunt. Uno verbo: in quibusvis exulcerationibus internis & externis profundis, v. g. in cancro mammæ exulcerato, oriuntur tales febres.

### DIAGNOSIS.

Quod ergo attinet signa diagnostica: tria pathognomonica signa fuerunt suprâ enarrata, omni, soli & semper hecticæ convenientia: nempe calor lentus post pastum exacerbatus; pulsus frequentior, celerior, minor & debiliior; ac denique consumptio corporis; cui tandem sudor nocturnus cum capillorum defluvio supervenit: quibus si accedant circum-

Tom. II,

stantiæ præcedentes ad eam disponentes, e. g. ructus cinerosi, confirmatur eò magis conjectura artificialis Medici: in toto corpore adest lassitudo, frequens etiam lipothymia: patientes conqueruntur de æstu interno, sequitur atrophia, somnus horis matutinis est rarus.

Hectica incipiens difficillimè cognoscitur, facillimè curatur: confirmata autem facillimè cognoscitur, difficillimè curatur.

Urinæ hecticorum in principio sanorum sunt similes, quod etiam observatur in febribus lymphaticis, à saliva & succo pancreatico nimis viscidis, & hinc urinæ sanis simillimæ observantur. Sin verò, quod sæpius fit, insigne concurrat stomachi vitium, tunc urina alba, pallida, crassa & turbida subinde excernitur; cessante postmodum appetitu & deficiente digestionem urinæ tenues, perspicuæ, intensè tinctæ, &c. excerni solent; hecticâ postmodum ad marasum progrediente, urina progredi solet copiosa intensè tincta, sed in superficie crustâ quasi oleaginosa, id est, pinguedo aranearum telis similis, ipsi supernat: qualis urinæ facies tamen etiam in duobus casibus observare licet, quam agyrtæ stolidi ac Pharmacopolæ inspicientes, arbitrantur pinguedinem internam resolutam. Crusta enim hæc non confundenda est cum urina oleaginosa, reverà tali, quæ in febribus acutis ardentibus, item in febribus intermittentibus, nimio calore conjunctis, interdum excernitur; quoniam liquefactâ corporis pinguedine parum ejus cum urina excernitur; unde tales ægri subitò emaciantur; neque cum urina oleaginosa apparenter tali, qualis in hypochondriacis & scorbuticis confirmatis subinde apparere solet, quæ tamen non pinguedo, sed potius salia vitiosè concreta sunt.

Ut distinguantur hæc, observetur: quod, ubi est vera pinguedo, quæ urinæ supernat, semper sit uniformis, & ad latus aspecta nullum colorem, nullum splendorem, &c. acquirat: in scorbuticis verò, & hypochondriacis hujusmodi pinguedinis quasi crusta innatans, ad latus matulæ aspecta, varios colores, instar candæ pavonis mentitur, vel instar viridis elegantissimè coloratæ apparet. Prius est vera pinguedo: posterius sunt salia vitiosè concreta. Non raro, imprimis autem, ubi in corpore internæ exulcerationes, urinæ est additum sabulum copiosissimum.

Excrementa alvi in hecticis sunt diversa: Fæces quandoque sunt duræ, imò sæpius in principio & incremento hecticæ interdum difficulter egeruntur; postmodum verò fiunt admodum liquidæ, & redduntur copiosè, dum nempe stomachus omnino labefactatus nec ritè continet, nec debitè concoquit assumpta: In ultimo hecticæ gradu fluxus alvi ferè

(R r)

est

est continuus, quæ omnium pessima est, & sudores<sup>s</sup> colliquativi singulis noctibus ubertim prorumpunt, capilli etiam pedetentim defluunt, unde magis magisque corpus emaciatur, ut isto alvi fluxu ut plurimum hæctici intereant.

#### P R O G N O S I S.

Quod attinet signa prognostica: in principio hæctica facile curatur; quæ verò magis est chronica, quò propius accedit tabi, eò difficilius curatur, i. e. quò propinquior est primo gradui, eò facilius: quò propinquior tertio, eò difficilius curatur: tertius gradus planè incurabilis est.

Deinde hæctica per se morbum constituens, & ex perverso sex rerum nonnaturalium usu genita, facilius curatur, quàm quæ à labe visceris interni orta est; sin verò supervenerint exulcerationes internæ, periculo est plenissima.

Hæctica febri putridæ, uti vocant seu intermittenti, aut continuæ, vel alii morbo chronico conjuncta, aut istas curatas immediatè insequens, curatu est difficillima, & plerumque lethalis, ægris contabescensibus.

Hæctica in juniorum visceribus validis, cæteris paribus, facilius, in adultis tardius, & difficilius in senibus, quocunque se habeant modo, ferè nunquam curatur.

Si adsit facies Hippocratica, quam vocant, res ferè est desperata: Vid. Garmanus *de Miraculis mortuorum*, ut & *Disputatio D. Langii de facie Hippocratica*: Adhæc si accedat lienteria ac alvi fluxus, aut pili decident, aut pedes infientur, mors est præ foribus.

Quoad tempus eventus: notum est, quod morbus per se admodum chronicus ac contumax sit hæctica, tardus ac difficilis, lentus, & qui subindè diutius solet cruciare ægros, cujus longitudo ac difficultas ætate & corporis constitutione est merienda.

#### C U R A.

In cura eò primùm respiciendum est: num hæctica dependeat à partis alicujus morbo, adeoque sit symptomatice? tum enim cura ad istum morbum, à quo dependet, est dirigenda: deinde considerandum: an hæctica sit simplex, an complicata cum quadam febre putrida? & in hoc casu tollenda prius putrida, & hinc removenda hæctica.

Sin in se sit morbus primarius, attendendum est, ut

1. Acrimonia sanguinis & lymphæ acidofalina temperetur ac corrigatur,
2. Ut humorum reliquorum, in specie lymphæ, aciditas & visciditas emendetur.
3. Stomachi digestio restauretur.

Hæc ut commodius fiant,

Observ. I. In hæctica simplici seu sine febri putrida, quam vocant, seu fermentativa, complicata, nec evacuationes, nec venæse-

ctiones, nec purgationes sunt instituendæ; hæc enim semper vires debilitant, & nutrimentum corporis plùs minùs deprædantur. Sed potiùs mediis diæteticiis ac pharmaceuticis corpus reficiendum.

Observ. II. Si tamen prima regio corporis, nempe stomachus & intestina, excrementis referta sit, propter cruditates à debili ventriculo productas, tutò purgatio una alteravè lenis absterforia in principio institui potest. In hæcticiis copiosissimè purgantia evacuant, sed plerumque in perniciem ægrotum; deficit enim fermentum acidum stomachi.

Observ. III. Imò si vitio stomachi oritur hæctica, convenit ante omnia vomitorium blandum instituere, si vires adhuc sunt validæ. Audiendum hic est Lindani consiliùm, dum inquit: *In curatione hæctica statim ad parvis affecta cognitionem incumbere oportet, quæ cognita, ego facilius hæcticam quàm quartanam curabo; oriuntur enim plerumque ex vitio stomachi*: Sic, inquit, curavi uno vomitorio, & hinc cum elixyr proprietatis hæcticam intra 4. dies: sicuti elixyr proprietatis in hæctica ex stomacho singulariter commendat idem Lindanus.

Observ. IV. Inter symptomata, quæ huic superveniunt morbo, præcipuum est & quasi funestum alvi fluxus, ægros faciliè ad interitum producens; colliquativus enim est. Refrænandus ergò erit, maturè & debitè remediis ex cydoniis, rosis rubris siccis, lacte chalybeato, unicornu fossili & similibus; uti etiam sudoris uberior effluxus optimè compefcitur per opiata in parva & probè subducta dosi, vespertinò tempore usurpata.

Observ. V. Dulcia, uti saccharata, & maximè mellita; vitanda sunt: talia enim sunt viscida & glutinosa, obtundunt succos corporis, stomacho nocent, & istos viscidiores & glutinosiores, hinc inæqualem fermentationem, & ita hæcticam deteriore reddere solent.

Si ergò hæctica fuerit symptomatice, ad primarium morbum respiciendum esse dixi, considerando ante omnia simul stomachum. Quod si superveniat febri intermittenti, vel continuæ acutæ, malè curatis, præmissio aut omissio vomitu blando utilissimum est sal ammoniacum cum antihectico Poterii mistum.

Sic abscessum, aut ulcus, aut simile vitium partium internarum insequitur hæctica, isto rectè curato per vulneraria, sulphurea & antimonialia fixa; item per balsamum sulphuris & similia, faciliè hæctica curari potest, utpote spontè interdum evanescens.

Balsamus tamen sulphuris præparandus est non cum oleis destillatis, v. g. oleo terebinthinæ, baccarum juniperi, &c. hæc namque olea nimis sunt acxia, & febrim adaugent, sed potiùs elaboratur cum oleis expressis, v. g. oleo amygdalarum dulcium recens expref-



expresso, pinearum, &c. quæ insigniter sunt nutritiva. Huic balsamo jungi poterunt aliquot partes oleorum destillatorum temperatorum, ex quibus laudo oleum destillatum anisi, & hoc modo forsân paratur etiam balsamus vitæ archiatri Hallensis Keilingii. Porro conveniunt etiam pinguedines animalium, quo sensu axungia canina multum præstat: cui tamen præterenda est humana; item butyrum majale, &c. Ex resinis multum hic præstat ipsa terebinthina, si solvatur in vitello ovi, uti & decocta plantarum temperatarum, quæ vulgò vocantur herbæ pulmonariæ, v.g. tussilago, plantago, pulmonaria, galiopsis, aliàs scrophularia, &c. vid. Schræderus *Pharmac. Medico-Chym. lib. 4. pag. 154.*

Curato ergo primario morbo, unde hectica dependet, & rectificato stomacho ipsa hectica curanda venit. Id quod etiam tentandum est, si ipsa per se morbum constituerit, idque imprimis per remedia Pharmaceutica, & præcipuè dietetica. Fons chirurgicus nihil hic suggerit, nec venæsectio, neque fonticuli, neque scarificationes, nec aliud quid conducunt. Ex Pharmacia conveniunt temperata, quæ salsum temperant, viscidum attenuant, & blandè corporis partes solidas humectant. Hæc inter eminet ros majalis quocunque modo propinatus. Sunt qui ex eodem spiritum & sal essentialē parare volunt, idque in hectica valdè prodessè asserunt: commodè in spiritu rosis majalis aut ipso rore infundi flores violarum, borraginis, buglossæ, & exinde parata tinctura sub forma juleporum largiter usurpari possunt. Hujus vicarius est ros vitrioli volatilis, istud nempe phlegma volatile roridum occultè æcum, quod in destillatione spiritus vitrioli priùs erumpit, uti & sine aciditate sensibili progreditur: hoc insipidum licèt ferè, sulphure tamen volatili vitrioli singularum virium est imprægnatum. Hoc subinde rectificatum, aliquoties à capite mortuo cohobatum, intercedentibus quibusdam digestionibus fit remedium ad hecticam egregium, in specie, si oriatur ab exulcerationibus partium internarum: Confer. Marcus Marci à Grœnland in *Philos. Veter. restituta Part. 5. sub Sect. 9.* Commendant alii & istam aquam, quæ rorellæ seu herbæ rosis solis innatare solet, utpote quam quidam spiritum mundi concentratum appellant, & phthysicis commendant.

Vulgò commendatur aqua ex carne porcellorum, ostreis, cancris fluviatilibus, & similibus: laudet easdem qui vult, ego sanè minimi facio. Subinde conveniunt herbæ, quæ succo pingui sunt plenæ, v.g. althea, lymphitum majus, plantago, cichorium, endivia, lactuca, portulaca, nymphæa, borrago & buglossa, radices althææ, symphyti, cicho-

ril, &c. exque his parata remedia, nuclei pinearum, pistaciæ, scabellæ, amygdalæ dulces, semina pingua, 4. frigida majora, semen papaveris albi & similia mucilaginosâ & electuarius formâ, non tamen nimis copiosè usurpata: unde & cerevisiæ primario triticæ, hinc & hordeacæ, sunt nutritivæ: In specie passulæ Corinthiæ sunt perquam egregiæ: nempe, ut aliàs dicunt, non datur melius hepaticum ac melius nuticiens, quàm rob seu pulpa passularum, blanda & perquam temperata, cujus respectu vulgò calicæ & humidæ dicuntur. Et putarem ego in his perfectam curam hecticæ consistere; singulariter enim nutriunt, & temperant omnia acria, maxime salsa: unde etiam à Riverio tam in *Praxi*, quam in *Observ. Cent. 4. Observ. 43.* non secus atque aliis autoribus multum extolluntur ad curam phthysicos & hecticæ. Sic etiam Joel in *Praxi* mirè commendat passulas ad corpus pinguefaciendum & incrassandum; sicut etiam aliàs in dyscrasia sanguinis temperanda ac corrigenda, & sanguine quasi renovando, perquam sunt egregiæ: hinc decoctum passularum cum rasura ligni sassafras, & radice chinæ, helenii, &c. hecticis perquam est proficuum. Fit etiam ex passulis vinum per fermentationem admodum elegans, instar vini Malvatici seu Petri Simonis, addendo parum sacchari: quod si præparatum fuerit cum succo pomorum Borisdorphanorum, quod obiter moneo, in malo hypochondriaco est egregium, forsân etiam in hectica. De lapillis cancerorum, & de perlis res nota est, quod reverà in se contineant hecticorum solamina: sed observetur, hoc verum esse eo sensu, quo notanter dicit Helmontius, quod perlæ & lapilli cancerorum, si resolvantur in primum suum rorem lacteum, unde concreverunt, tunc sufficiant pro cura hecticæ & phthysicos absoluta. Aliàs mixturæ ex aceto destillato cum lapidibus cancerorum vel cum perlis utiles observantur in hecticis. Juxta hæc & foliata  $\text{F}$ , ejusque liquor ritè præparatus, nobilis est pro hecticis; item antihecticum Poterii, ita nominatū ab usu contra hecticam à  $\text{E}$ , ad  $\text{D}$ . Item  $\text{D}$  diaphoreticum ritè fixatum, vel bezoardicum minerale, aliaque sulphura fixa; lapilli cancerorum, lapides percarum, ebur sine igne, corallia præparata, mater perlarum, similiaque acrimoniam temperantia cum appropriatis mista optimè conducunt, continuando usum in hecticis, imprimis quos æstus paulò intensior affligere solet: quibus subinde aut  $\text{A}$  ammoniacum depuratum, aut arcanum duplicatum, magisterium Saturni Mynsichtii, item species dia-Saturni Mynsichtii, commodè addi & unâ distribui possunt. Post hæc etiam est saccharum Saturni, quod est egregium in hectica re-

(R r 2)

medi-

Tom. II.



medium, in specie si ex ulcere interno oriatur, vel per se, vel quando ex hoc cum vitriolo & is paratur & antiphthifica. Dosis gutt. xx. xxv. ad xxx. De alumine & ejus dulcedine saccharata notum est, quod ab omnibus Practicis commendetur ad hecticam: Sunt qui & adjungunt ~maluminis, unde fit ~Ois dulcis, quo ipso chymicus quidam in Polonia familiarissimè in hectica utebatur. Faber commendat arcanum sanguinis humani vel cervini ad 3ß. Hoc revocat in mentem, quod habet Boyle in *Philos. experim. pag. 331.* qui ~um sanguinis humani (ex sale volatili dissoluto) & oleum sanguinis humani diversis in locis insigniter ad hecticam commendat. In hectica incipiente ex mœrore animi, & animi pathematis & coralliorum cum ~u cordis cervi egregiè contulit, bis in die 30. ad 40. guttulas.

Formulae sint tales:

℞. *Amygd. dulc. vel nucl. pinear. rec. 3ß.*  
*sem. 4. frig. maj. 3j.*  
*c. f. q. ▽ borrag. l. nymph. f. l. a. Emulsio:*  
 cui adde  
*lapill. Sr. prap. 3ß.*  
*antihect. Poter.*  
*magist. corall. c. succo citri 3j.*

Edulcoretur parùm cum julepo rosar. vel manibus Christi perlatis.

M. D. S.

**Stärk-Milch öftters des Tags darvon zu trinken.**

℞. *Cons. ros. rubr. antiqu.*  
*flor. borrag.*  
*tunica 3j.*  
*rad. cicchorii condita,*  
*amygd. dulc. excortic. 3ß.*  
*nucleor. pinear.*  
*cortic. citri condit. 3ij.*  
*antihect. Poterii 3j.*  
*matr. perlar. prap.*  
*corall. r. prap. 3ß.*

c. f. q. *fr. flor. tunic. & rad. symph. ana f.*  
 Elektuarium: D. S.

**Sonderliche Lattwerge wider das Abnehmen/ des Tages 3. Messerspißen groß zu gebrauchen.**

℞. *Antihect. Poterii*  
*specif. cephal.*  
*mag. corall. c. f. c. 3ß.*  
*sacch. Fni gr. vj.*

M. f. *Pulvis:* pro 2. dosibus.  
 Prodest, ubi hectica imminet post febrem ardentem.

℞. *cancr. fluvial. viv. no. jv.*  
 ▽ *rosar.*  
*borrag.*  
*flor. papav. err.*  
*cinnam. borrag. 3ij.*

Contund. in mortario marmoreo, exprime, & adde

*Syrupi fl. pap. err.*  
*tunica 3vj.*  
 M. S.

**Sonderlicher nehmender Trank/ alle zwey Stund davon zu nehmen.**

Externa:

℞. *Ungu. refriger. Gal. 3j.*  
*axung. hum. 3vj.*  
*sacch. Fni 3j.*

M. f. *Unguentum.* D. S.

**Eusserliche Salbe zum Rückgrad.**

℞. *Unguenti resumpt. usit. 3j.*  
*carn. & fluv. viv. optimè contus. 3vj.*  
*axung. human. 3ß.* M.

Sed ultra Pharmacia maximam partem pro cura hecticæ constituit diæta, præmissis necessariò præmittendis, primas vias sc. abstergentibus & mundificantibus, alimenta succulenta & probè nutrientia subministrans, quæ inter excellunt lac & quævis lacticia atque emulsiones. Convenientissimum est lac muliebre, imprimis si ex ipsis uberibus nutritis sanæ sugetur, ne ab aëre alteretur. Exemplum habet Forestus l. 5. *Observat. 10.* Aliàs lac asini præ ceteris in hecticæ cura salubre est, cum sit ex animali longævo: in nostro climate lac bubulum ex bestia sana, & sanis pascuis gaudente, commodè hecticis ordinatur & præscribitur; sive ipsum lac usurpetur, quæ communis est sententia; sive in specie sumatur lac ebutyratum, à Piens de febribus P. 2. pag. 61. laudatum. Interdum etiam serum lactis substitui potest: vid. Barbatus de sanguine & sero pag. 110. Usurpetur autem maturè, nec nimis tardè, sed necesse est, vires adhuc nonnihil consent, & etiam stomachus adhuc digerendo nonnihil valeat; his enim deficientibus non multum proderit. Lac caprillum etiam est egregium, quod à quibusdam non sine fructu usurpatur.

In usu verò lacticiniorum observetur:

1. Ne hecticæ adjuncta sit alia febris putrida dicta: item, nè adsit capitis dolor: item, ne ventriculus scateat excrementis & sordibus acerbis, ex digestionis vitio natis: item absit hypochondriorum tensio.
2. Ut nihil ferè aut bibatur, aut comedatur aliud.
3. Ut paucò addito saccharo lactis coagulatio impediatur: ob id etiam sub usu lactis acida quævis fugienda sunt.
4. Ut assumatur lac jejunè & calidum, adeoque vel immediatè ex ipsis mammis sugatur, vel recentissimè multum adhuc calidum hauriatur, ne alteretur ab aëre lac; facillimè enim est alterationis.

Primarium etiam lac alimentum sub tali lactea cura constituat, cæteris non, nisi levioribus & facillè digestibilibus, iisque paucis assumptis.

sumptis. Ante omnia verò exploret Medicus, an æger lactis usum ferre queat? medium docet Joel in Praxi, ubi de hectica: nempe ventriculo prius leni purgatione evacuato, exhibeantur ægro initio 3ii. vel iv. lactis, videlicet si probè concoquat, & nil molestiarum ex eo sentiat, nec post assumptum lac gravitas in ventriculo sentiatur, aut singultus excitetur, aut nausea vomitusque sequatur, nec calor in corpore, nec pulsus intendatur, tunc potest integra libra manè & vespere propinari; post assumptum autem lac nec violentius se commovebit, nec dormiet æger.

Confer. Sennertus de febribus N. 3. C. 3. pag. 351. Joel in Praxi Tom. 5. pag. 37. & M. A. N. C. Ann. 1. Observat. 141. Alimenta reliqua sunt omnia temperata & boni succi, unde pultes, v. g. ex oryza, item juscula avenacea temperata, & hordeacea in statu hectico conducunt: de quibus Borellus Cent. 4. Observ. 89. qui multos hecticos tantum non desperatos usu hordeatorum frequenti restitutos esse affirmat: item chocolata, amygdalata, nuclei pinearum, pistaciarum, semina 4. frigida majora, &c. carnes pullorum porcinorum, vitulorum juniorum, caponum, gallinarum & anatum, imprimis ranis & cochleis nutritorum: sunt enim, qui insigniter commendant ranas, earumque coxas, quæ frequentius esitantur in Italia: etiam testudines laudantur ad curam hecticæ, imprimis quidem, quando prius nutritæ fuerint saccharo & farina, & postmodum coquantur in brodio gallinarum non admodum salito: Confirmat hoc Amatus Lusitanus Cent. 2. Curat. 53. qui curavit quendam per pullorum gallinaceorum testudinibus nemoralibus saginatorum esum, & potum lactis asinini.

Canceri recentes fluviatiles solent esse admodum usitati, imprimis eorum caro est insignis: certè canceri fluviatiles, rore alcalino nutritivo turgidi, modò à stomacho digerantur, quocunque modo usurpati, imprimis si ex confusis succus eliciatur, conveniunt: subactus cum decocto aut succo amygdalarum, nobile sunt alimentum medicamentosum: vel cancerorum succus expressus cum butyro recenti majali non salito mistus dat butyrum antihecticum, quod compositum matres familiæ vocant die Krebs-Butter / egregium restaurativum consumptorum: conf. Sachsus in Gammarol. Sunt, qui commendant etiam ostreas in hectica, quæ simili ratione benè conducunt, si eas feret stomachus: sic Lindanus super Hartmannum notabile habet exemplum hecticæ, ostrearum usu curatæ: dicit namque fuisse Amstelodami virginem 20. annorum, quæ ex ulcere pulmonum in hecticam inciderat & iam desperatâ salute per aliquot annos decubuerat: huic ægræ obvenerat voluptas comedendi ostreas, unde cum ipsi gratificatum fuerit 12.

præparatis ostreis, his avidius consumptis totidem iterum concessæ fuerint: postero, die cum ægra senserit, quod ex harum usu se habeat melius, plures fuerint oblata, & intra breve tempus magnam earum quantitatem comederit, ac ita brevi in totum ab hectica liberata fuerit, nupserit, & 8. liberos pepererit. Nempe in talibus habeatur ratio stomachi, ejusque quoad appetitum dictamen, & quoad digestionem operatio.

Langius commendat anguillam, ut comedatur ab hecticis, nec hoc videtur absonum: Vid. ejus Miscellan. pag. 41.

Quod si fluxus alvi adsit, imprimis crassa alimenta conducunt, ut de oriza, pultes farinacei, lac chalybeatum propinetur.

## CAPUT VI.

De

### Febribus Malignis.

UTi alius affectus quivis, ita in specie illa febris nomen malignæ acquirit, quoties subitò ac inexpectato vires ægri prosternuntur, aut symptomata occurrunt majora seu longè graviora ac insolentiora, ac aliàs in affectu simili, aut ex causa ordinario modo constituta oriri possunt. Ex quibus sequitur fundamentum diagnosticon febrium malignarum, tales scilicet morbos maximè esse periculosos, aut speciatim febres acutas malignas, adeoque subinde brevi ad mortem terminari, vel repentina symptomatum truculentia, vel subitanea virium sine causa manifesta prostratione, qua ratione idem ferè cum venenoso erunt. Sic v. g. febristalis ex vitio digestionis primæ sub nato fermento febrili est tertiana intermittens, si more aliàs solito omnia procedant, est benigna; si autem in hac tanquam in ardente subinde immineant vel crebra animi deliquia, convulsiones, deliria; vel ægros anxios admodum cum pulsu parvo in vigore paroxysmi existere videmus, aliaque symptomata in tertianis gravius longè, quàm conditio morbi requirit, & planè insolentia affligunt, tunc latet anguis in herba; significat enim fermentum febrile ejusque fomitem depravatum & corruptum, subest malignitas, diciturque tertiana maligna: item in tertiana ardente, si nulla adsit sitis, utut naturaliter esse debeat, suspecta est res, & malignitas subesse dicitur: si in continuis adsit sitis clamorosa cum crudis fecibus, rubra & squalida lingua, præsumptio est febris malignæ: item si homo adhuc in neutralitatis statu est constitutus, seu apparenter sanus, aut quoque febre apparenter miti correptus, secundâ aut tertiâ die conqueritur de maxima & subitanea vi-

(R r 3)

rium

rium prostratione citra causam manifestam, hoc subinde solet innuere & prædicere morbum malignum.

Vires autem primariò prosterne solitæ sunt imprimis vitales, successivè etiam animales dictæ, utut pro affectuum varia ratione nunc hæ, nunc istæ magis, nunc utraq; simul affligi soleant. Differentia tamen, ut in principio malignas cognoscamus, non adeò est cognita; latent subinde febres malignæ in principio, & levioris morbi speciem repræsentant, exercitioresque interdum fallunt, unde etiam malignæ & mali moris dicuntur, nimis quantum tamen viribus & vitæ insidiantur: si enim tertiâ vel quartâ die se prodit malignitas, hoc nimiû fit tardè, & occasio medicinam parandi præterlapsa est. Unde sim9cauti in febre maligna maturè cognoscenda, ne in perniciem abeant symptomata, quæ affligunt.

Cognoscuntur imprimis ex pulsu, vel mox in principio nimis debili, vel subito nimis debilitato & parvo, qui vires animales & vitales prostratas denotat: quando acidum est forte, pulsus magnus; quando verò acidum depresso est, & regnare incipit, fit pulsus parvus. Pulsus magnus fit à sanguine omnes arterias dilatante, & hoc est à nimia turgescencia & fermentatione, quæ fermentatio ex majori concursu salium est.

Symptomata illa, vel majora vel insolentiora, quæ ordinariò in malignis affligunt, sunt multiplicia, adeò, ut nullum ferè sit symptoma extraordinarium, quod non subinde in una alterave maligna febre observatum fuerit: v.g. hydrophobias in febribus malignis observavit Salmuth *Centur. 2. Hist. 52.* item Sanchez in *Observat. Medicis*. Interdum malignitas est tanta, ut partes nunc internas, nunc externas sphacelo ac gangrænâ correptas observare liceat: Conf. Hildanus *l. 3. Observ. 93. & 95.* item Salmuth *Cent. 1. Hist. 7.*

Sed quæ frequentius ac ordinariò magis in febribus malignis observavi symptomata, sunt: subitanea virium sine causa manifesta, eaque ferè omnimoda prostratio, quæ suspecta est Medico; & nunc in principio febris, nunc subinde tribus ac 4 diebus ante decubitus, ac imprimis in brachiis ac cruribus, percipitur talis virium successivè defectus: appetitus mox in totum prosterne, cui interdum nausea & fastidium ciborum succedit, & quamdiu aliquid iusculi, vel tantillum alimenti sine nausea, aut insigni adstantium persuasione ægri assumunt, semper bonum est signum, imprimis, si adhuc saporem percipiunt genuinum, & non dicunt: *es schmecke / wie saul Holz*: quod etiam valet, si potum ordinarium, v.g. cerevisiam lupulatam ferre valeant, nec illam aversentur. Calor non eam habet acrimoniam, quam aliæ febres benignæ fermentativæ seu putridæ, si nempe ejusdem generis benignas & malignas confera-

mus. Symptomata tamen sunt graviora: tarò foris adeò intensus, atque in febribus continuis benignis, sentitur calor, potius interiora uruntur, exterioribus moderatè calidis: interdum ægri dicunt, *es brennet im Leibe* / & monstrant regionem stomachi seu præcordialem. Certè quando ægri conqueruntur de nimio calore interno, & tanto causo partium internarum, utut externè parum aut mediocriter saltem caleant, prævum malignitatis, & ut plurimum viscerum inflammatorum, tandemque sphacelatorum signum esse solet, ut è cadaverum sectionibus notum est. Unde facile patet: quare febres malignæ sine exanthematibus nonnunquam peiores sint, ac ex, in quibus talia copiosissimè erumpunt?

Sitis citra æstus rationem intensissima est, cum ardore faucium, lingua arida, scabra, &c. tantum nempe urget in febribus malignis sitis, ut communium febrium conditionem longè superet, & cum æstus in malignis non soleat esse tantus, quantus in ardentibus, imò interdum adeò mitis, ut ægri de eo non conquerantur, nihilominus tamen gravissimè urgeat. Sitis cum viribus prostratis signum est, subesse malignitatem. Ægri qui insigniter calent, & tamen de nulla siti conqueruntur, similiter malignitatem adesse monstrant. Hoc an sit periculosum? vid. in Langii *Miscell. Cur. p. 38.* item in epistolis. Quod si potus restinguendæ sitis gratia porrectus non solum nihil proficit, verum etiam simul fluctuationem & anxietatem pariat, & lingua vix abluta scabra & arida denuò reddatur, suspiciendum est de latente malignitate.

Somnus brevi post deficit, & graves agrypnæ ægrum affligunt, eaque nunc sunt anxiosæ, nunc absque anxietate. Hæ ex affecto nervoso genere & spiritibus animalibus: Illæ ex stomacho & præcordiis malè habentibus originem ducunt: quibus deliria & convulsionem infallibiliter supervenire solent: interdum etiam citius, quàm febris fert conditio, deliria adesse solent, quæ semper innuunt malignitatem, & sic adrept tandem mors. Rarum est, quod somnolenti observentur ægri: quod si corripiantur somnolenti, est coma vigil. Pulsus in talibus febribus, imprimis initio, sæpius naturali est simillimus, aut non multum ab eo discrepare videtur: postmodum tamen subito debilitatur, fitque parvus, celer, debilis & frequens; subiade, imprimis in statu talium febrium, pulsus est inæqualis: interdum mox ab initio formicanti similis, i. e. minimus & frequentissimus: durus etiam subinde. In genere, uti in febribus continuis, quæ plus minus simulant ardentem benignam, pulsus est parvus, celer & debilis, certò colligendum est, malignitatem subesse, adeò ut, quamdiu nonnihil magnus existit, vel quantocyus ex parvo nonnihil major evadit, semper bonum esse soleat. Præterea

reà



eà ægri sunt inquieti sine manifesta causa & anxii, & interdum jectitatio insignis & major longè, quàm ratio febris infert, adesse solet. Inquietudo illa anxiosa non semper toto sit corpore, sed nunc brachium unum vel alterum movent, nunc pedem agitant, aut extra lectum exserunt, nunc integumenta hinc inde trahunt, nescii, quare hoc faciant. In febribus his frequentissimè etiam sunt anxii & inquieti ægri, ut plurimum mox in principio morbi citra causam legitimam, frequentius in incremento & statu: sedem habent in stomacho, & ibidem angunt ægros, atque tunc conqueri solent: *sie hätten solche Menschen Angst*; interrogati: *wo denn ihnen so angst sey?* monstrant scrobiculum cordis, respiratione liberâ tamen, & non impeditâ existente: sed tunc vitium hæret in recrementis variis, nunc pituitosis, nunc, idque frequentius, nidorosis aut biliosis, stomachi orificium superius afficientibus: & si simul à contagio fuit malum, nauseant ægri, & sæpius vomitum patiuntur.

Interdum quicquid medicamentorum porrectum fuerit, denuò evomunt, & cæterò quin contentorum nihil. Subindè conqueruntur in istis anxietatibus: *wenn ich mich nur übergeben könnte*; hinc sæpius observavi, quibuscunque vomitorium in primo malignarum insultu dedi, hi omnes morbi cursum, siue salutaris siue lethalis fuerit, quieti & tranquilli, summâ etiam prostratione virium existente, transegerunt, in specie si contagium haustum fuerit, adeò, ut hoc in casu unum ex primariis videatur auxiliis vomitus maturè provocatus. Anxietates istæ, etsi per sudores leventur, tamen sudoribus cessantibus redeunt. Nempe hoc in casu non semper copiosa materia peccans aut sordium saburra adest, quæ stomachum afficiat; sed effluvia illa fermenti febrilis maligna, quæ dum sudoris medio diffillantur, primæ viæ ac præcordia liberiora sunt: sed illo suppresso, eadem interiora versus ruunt, & anxietates inferunt; non secus scilicet ac diarrhœa ex suppressa diaphoresi interdum oritur, & contra hæc auctâ illa cessare solet. Alvus ut plurimum pertinaciter constipatur: id quod ferè melius est, præsertim quando excretio cutanea expectanda, quàm si frequentius sit fluida, quod interdum fieri solet, & tunc excreta liquida instar fecum, sunt conspicua, ut plurimum pessimè olentia; estque uno nomine semper fluxus talis colliquativus. Urinæ ut plurimum sanorum simillimæ, ita, ut hæc in febre maligna, quâ tali, nullas patiat alterationes, quin ægri interdum intereant cum urinis optimis; vid. Schenckius l. 2. *Observ. p. 278.* idque tum temporis imprimis, quando, primaria febris ardentis concurrant symptomata. Unde tales urinæ, præsentibus aliis pravis signis, certum malignitatis indicium præbent. Quod si

verò mutatz appareant, id non tam ratione febris ut malignæ, quàm ex medicamentis aut alimentis, aut ipso statu massæ sanguinæ, ante morbum id evenit. Interdum urinæ in statu turbidæ fiunt, sed sunt tenues & c. crudæ, indeq; vel paucò vel nullo sedimento: simul etiâ color talium dilutior est, qui tamen nil boni denotat. Unde malignis in febribus coctionis & cruditatis ratio ex urinarum inspectione non habetur tanta, quanta in benignis. Interim tamen, etiam si pessimè habuerint ægri, modò tamen in summa virium prostratione urinæ excernantur crassæ, ac fiant turbidæ, & sedimentum plus minus copiosum, vel candidum, vel lateritium simileve, sed æquale, deposuerint, tamen semper bonum signum est, & neminem cum tali urina intereuntem observavi: quin & sudores antea impossibiles, aut similes huic excretionibus cutaneæ, spontè prodire solent. E contra in febre maligna, etiam melioribus signis præsentibus, urinâ tamen crudâ & perspicuâ, licet crassâ & intensè tinctâ existente, & ita perdurante, tamen nihilominus intereunt ægri, ut ut etiâ in tali clara urina aliquid quasi sedimenti flavescentis seorsim natâre videatur; hoc enim chyli portiuncula est, ex assumptis cum urina secreta. Excreta hæc velicæ & alvi insigniter foetentia, aut gravi foetore imprægnata, malignitatem pestilentialem interdum denotant. Facies taliter ægrotantium solet interdum esse tetra, & à statu naturali multum mutata, livida interdum aut plumbea. Cerebri & partium nervosarum morbidæ seu malæ affectiones subitò inductæ, neque legitimam inter se proportionem obtinentes, malignitatem denotant.

Capitis dolor intensus, in specie in capitis summitate, affligit. Dum sudant ægri, sudoris odor, imprimis in progressu, est quasi dulcis, *es riecht recht süßlich und edelich*/qualem odorem spirant cadavera vel carnes animalium, dum putrescere incipiunt, uti frequenter animadverti. Ego observavi in muliere, tertianâ duplicatâ cū arthritide vagâ laborante, quod acidissimum sudorem sudavit. Dubito autem, an unquam apud ægrum febre malignâ periculosè correptum acidus sudor observatus sit? ulterius non rarò adest difficilis respiratio, idque speciatim in iis malignis, in quibus excretio cutanea vel imminet, vel conjuncta est, hæc enim vel impeditâ, vel suppressâ, respirationis supervenit difficultas; *wenn sie sagen/es stecke ihnen in dem Halse/es wolle ihnen nicht hinunter*/quæ ferè ad mortem appropinquantibus supervenire solent; unde ab adjunctis symptomatibus variis varias tunc sortiuntur appellationes febres malignæ, ut nunc febres petechiales, nunc variolæ, nunc morbilli, nunc purpura rubra vel alba. Maculæ varicæ superficiales in toto corpore, ac præsertim in lumbis, dorso ac pectore apparentes; vel etiam bubones aut tubercula, simul

mul ac carbunculi erumpentes, malignitatē maximè denotant, ad naturam febrium pestilentialium accedentem. Variant subinde hæc symptomata in febribus malignis, ut nunc plura, nunc pauciora adsint: sed sæpe latent tales febres, ut non, nisi tardè, Medicus eas valeat internoscere. Sed suspicio earum oritur, si in specie hæc septem adsint, nempe

1. Subitanea virium prostratio, citra manifestam causam.
2. Appetitus penitus dejectus citra causam ordinariam & manifestam, licet omnes functiones sint naturales.
3. Vigilæ pertinaces mox à principio morbi, etiam citra quamcunque causam ægrum vexant.
4. Quod urinæ tales sanorum similes sint.
5. Pulsus plus minus debilis.
6. Wenn sie flagen / es stecke ihnen im Halse / es wolle nicht hinunter.
7. Quod citra calorem sitis admodum sit aut intensa, cum aridura linguæ & faucium, aut interdum planè nulla.

Talia ut plurimum febrem malignam gravem innuunt, idque eo magis, quò anxii magis & inquieti sine causa manifesta ægri extiterint.

Quia etiam critica symptomata nonnunquam malignitatis signa mentiuntur, eadem distinguere docet Poterius l. 1. de febribus cap. 18. nempe omnia symptomata gravia, quæ apparent ante signa coctionis, morbi maligni ratione fiunt; quæ autem post coctionem, dependent à conflictu naturæ & morbi, nilque maligni habent, præter speciem & apparentiam.

Quoad afficiendi modum: febres hæc malignæ nunc, ut ut rariùs, privatæ sunt, unum alterumvè hominem ob causam singularem internam saltem invadentes, nunc, idque crebriùs, epidemicè grassantur in plures, causamque communem habent aërem, vel alimenta vitata.

Porro febres malignæ sunt vel contagiosæ, quæ adstantibus aliis nullam noxam inferunt. Frequentissimè autem simul sunt contagiosæ, aliosque inquinare solent. Rarum est, febrem propriè dictam malignam, si gradus sit excellentior, non esse contagiosam. Hinc observanda venit febrium malignarum differentia, à Lindano super Hartmannū insinuata.

1. Febris maligna simpliciter, v. g. quando κατὰ φύσιν, aut tertiana continua, vel intermittens, suâ naturâ benigna, ex degeneratione causæ occasionalis seu fermenti febrilis, ex parte acrioris & subtilioris, pessima inferentis symptomata, facta est maligna.
2. Maligna contagiosa, v. g. petechialis, febris castrensis, vel morbus Hungaricus: quò ut plurimum etiam pertinent jam dictæ epidemicæ malignæ.
3. Febres pestilentes: quarum summus gradus est.

#### 4. Pestis ipsa, Rex morborum.

Quoad malignas contagiosas: Fundamentum harum consistit in tali fermento maligno spirituofo (h. e. quod ob acrimoniam malignam summè activum, adeoque sui mediante intestino quasi fermentativo motu apta in materia, multiplicabile existit, ob volatilem verò & spirituosam naturam spiritibus nostris imprimis communicabile, & hinc absque activitatis impedimento in distans quoque diffusibile & summè penetrabile est) quod auræ seu odoris instar, adeoque in minima mole contentis nostris, præsertim spiritibus nostris, sociatum assimilationis modo se multiplicans, effluviis spirituosorum medio disseminatum spiritibus sibi symbolizantibus se sociat, sicque etiam sanum inficit huius massam sanguineam fermentando, aut potius ad putredinem disponendo. Ut enim tantillus fermenti odor sæpè integram cellam cerevisiæ & vini potest turbare; ita simili ratione vel tantillum contagiosi miasmatis fermentativâ potestate sæpiùs afficere potest multos homines. Nempe contagium hoc ex ægri corpore exspiratum non solitariè, sed cum substantia spiritus influi unâ exhalantis sociatum, videtur se imprimis associare mumiæ nostræ spirituali vitali, unde hoc appropriatum est ad corpora humana, & hinc v. g. in peste humana saltim homines, non verò alia animalia, inficiuntur. Propter hanc mumiæ contagiosam fit morbus contagiosus in consanguineos, quatenus inter eos est convenientia spiritus vitalis, seu radicis mumialis, undè faciliùs ab ægris consanguinei, quam alii homines, affici solent.

Contagium duplici modo afficit, nunc per contactum corporalem, nunc in distans: per contactum corporalem fit vel immediatè per ipsum contactum corporis sani vel ægri; vel mediatè, mediante certo fomite, v. g. mediamentibus vestibus, alimentis & similibus: in distans seu virtualiter mediante aëre per inspirationem se multiplicare solet. Contagium hoc virtuale, quod cum aëre hauritur, & se nobis insinuat, sæpissimè febres malignas ac pestilenciales constituit, hoc, præter sanguinem aut ipsos spiritus per pulmones circulatos, in specie orificium stomachi superius graviùs affligere solet. Quod immediatè afficiatur stomachus, etiam patet ex eo, quod tales infecti, ubi aliàs nullam alterationem senserint, conquerrantur tamen mox de quâdam molestia in orificio ventriculi superiore, quam molestiam sæpiùs sequitur nausea, quæ nausea si superveniat, bonum est signum; innuit enim stomachū insurgentem contra malignitatem, nec statim fuisse nimis alteratum: si modo massa sanguinea à nullo miasmate alterata sit, & rectè dicit Lindanus: in constitutione epidemica hoc observandum esse, neminem spontè & sine causa manifesta nauseare (nisi fortan hoc sit



ex ingluvie ) nisi qui miasma contagiosum susceperit, à quo ventriculus irritatus nauseat; unde etiam subito præsentē tali nausæ provocandus est vomitus, ut succurratur naturæ nauseanti. Multi statuunt partem affectam in febribus malignis esse stomachum: quò facit Helmontius, qui dicit: febres malignas consistere in convexo stomacho; Modus, quò contagia stomachum afficiant, non adeò est clarus: Probabile est, afficere contagium stomachum, quatenus aer haustus contagio plus minus inquinatus, & imprægnatus salivam inquinat, quæ ita imprægnata subinde per gulam descendens stomachum afficit, & contagium ibi deponit; hinc optimum præservativum habetur salivæ exspitio, quamdiu nobis cum personis infectis vel loco suspecto res est: vid. *M. A. N. C. ann. 9. obs. 170.* Non enim possum consentire Helmontio, qui dicit: cribrari aerem per pulmones, & ex iis transire per diaphragma, & hinc ad stomachi ambitum pertingere; sunt siquidem viæ nimis dubiæ, id quod videtur confirmari per opinionem Bartholini, qui asserit: quod in febribus malignis affectus locus primarius semper sit stomachus, ex eo, quod in quibusdam, febribus malignis ardentibus demortuis, in ventriculo vel inflammatione, vel escharea, vel sphacelus, vel similes affectus observati fuerint; utut præter ventriculum, intestina aliæque viscera interna reperiantur interdum similiter sphacellata, postquam ægri in cursu morbi de nulla molestia conquesti fuerunt, quàm de causa interno: vid. Bartholinus *Cent. 3. Hist. 68. & 80. Cent. 3. Epist. 42.* item Helmontius *tumulo pestis p. 843.* & Panarollus *Pent. 4. obs. 3.* Sicut enim aliàs ventriculi orificium valde sensibile est, ita etiam à contagio, systema nervosum afficiente, illa ventriculi molestia oriri potest, quatenus miasma malignum intra corpus inspiratum spiritus & systema nervosum semper aggreditur, adeoque nil obstabit, quin allegatæ ventriculi erosiones interdum etiam pro producto morbo habebantur, simili modo, ac carbunculi & bubones in partibus externis conspicui.

Quoad febres epidemicas, malignis privatis, & quæ ex particulari contentorum corporis, præsertim in primis viis, discrasia, & hinc maligna volatili acrimoniâ oriuntur, oppositas hæc vel vitio atmospheræ, vel vitio victus generari, & his mediantibus in plures grassari solent. Quod si contagii simul accedat violentia, eò latius diffundere se solent. Atmospheram quidem multiplicia effluvia inquinant, vel ipsa nobis in se hostilia & maligna, vel mutuo halitu & associatione nobis contraria facta, vel (quo inclinatur Hodges *Tract. de Peste Londinensi pag. 39.*) spiritus nitro æreus alterativus, & quali cor-

ruptivus, quominus usui vitali nobis amplius inservire queat.

#### CAUSÆ.

De ratione formali venenositatis in specie 4. primariæ prostant opiniones:

I. Opinio docet: consistere malignitatem in febribus malignis in singulari quadam putredine ac corruptione humorum, quæ humores afficiantur, & ita totum corpus putridum quasi reddatur. Verum eò ipso, dum non explicatur, in quo consistat talis putredo seu corruptio? aut quid per eandem intelligant? sententia hæc neminem sapientiore reddidit.

II. Opinio est Willisii *Tract. de Febr. c. 12.* & aliorum quorundam modernorum, qui volunt: in febribus malignis sanguinem disponi ad coagulationem præternaturalem, ita ut hinc inde semi grumosus hæreat, sicque circulum naturalem turbet; unde etiam tam tetra superveniant symptomata: quam sententiam apprehendit D. Johannes Daniel Major in *Tr. de Chirurg. infusoria*, & huic chirurgiam suam infusoriam superstruit. Conf. etiam Riolanus *Encheir. Anat. l. 2. c. 27.* qui in febribus ardentibus malignis aliquoties vidit sanguinem concretum intra venas instar medullæ sambucinae, quod etiam observatum à Fernelio *lib. 6. Physiol. cap. 7.* & Simon Pauli in *Parecbasi de febribus malignis §. 8.* Verum quodraro aut non semper adsit talis sanguinis coagulatio, non solum per experientiam refutari asserit Sylvius, qui se observasse affirmat, sanguinem venæsectione aut per nares evacuatam vix concreescere aut coagulari, quin potius nimis fluidum, liquidum ac tenuem apparere, à qua sanguinis fluiditate potius, quàm coagulatione, febres malignas deducendas esse putat, sed etiam non inertè rejecit Carolus la Font. *Tr. de veneni pestilentialis natura & cura Diff. 1. c. 15.* qui potius venenum corrosivum de natura arsenici causam pestis, hinc &, mutatis mutandis, febrium malignarum statuit.

III. Propterea ipse Sylvius in *Praxi malignitatis* cujuscunque naturam & causam materialem in acrimonia nimia, nunc lixiva seu urinosa, nunc acida, consistere asserit: vid. *Tract. de Lue Venerea §. 130.* in specie autem in febribus malignis peccare acrimoniam salis volatilis alcalici nimis acris, acidum nostri corporis destruentis, atque sanguinem & lympham dissolventis, & nimis fluidum reddentis, atque ejus consistentiam naturalem destruentis; adeò ut ex deperdita consistentia, ejus turgescencia & rarefactio in corde impediatur, quin & spirituum animalium generatio imminuatur, unde stillicidia sanguinis, hæmorrhagias, esse signa sanguinis nimis fluidi à sale volatili acris dissolvente:

(Ss)

Confer.

Tom. II.



Confer. etiam Simon Pauli *l. 4.* qui salacre in sanguine radicum & fundatum statuit febrium malignarum proximam causam: Confirmant ex eo, quod acida curent & præferrent à malignis, & quod sulphurea in febribus malignis profint.

IV. Opinio est eorum modernorum, qui malignitatem febrium consistere volunt in verminatione, seu, uti vocant, putredine & corruptione animata, cujus sententiæ Patronus est imprimis Kircherus *Tract. scrutinium pestis*. Consentit eidem Langius in *Præfatione* hujus scripti, & *Dissertatione de Morbillis*, uti & Augustus Hauptmannus *Tract. de viva mortis imagine*, item in epistola de hac materia ad Petrum Johannem Fabrum scripta, & *Tract. de thermis Wolkensteinensibus*. Nec deest experientia: in variolis sanè minutissimos vermiculos refert Borellus in suis *observationibus per microscopium factis*: Sic Petrus à Castro in peste Neapolitana bubones vermiculis scaentes, & emplastra bubonibus applicata vermiculis innumerabilibus referta fuisse observavit. Sanè Kircherus non solum in *Scrutin. pestis*, sed etiam in *Arte magna lucis & umbræ l. 110 part. 2. pragmat. 2.* innumeros vermiculos minutissimos in quavis febre putrescente, in plantis putridis, aceto, lacte, cadaveribus, lignis, fructibus, nec non in sanguine febricentium, in cerebro hominis, aliisque ejus partibus ex putredine ortos per microscopium observavit: vid. etiam *Mundus subterr.* Kircheri *lib. de veneno pag. 107.* Quin imò & Hauptmannus per microscopium in sphacelo ex lue Venerea oborto observavit quamplurimos vermes ad instar limacum, sed minutissimos, qui carnem, non secus ac vermes caseum, morficantes erodissent ac consumpsissent, & unicus ejusmodi vermiculus chartæ impositus brevi spatio & alios extra corpus rejecerit. In peste sævissima, quæ totam Lusitaniam depopulatam reddidit, principio morbi omnibus vermium nigrorum rotundorum copiam per nares manasse, observavit Zacutus Lusitanus *l. 4. Medic. Princ. Histor. 46. Quest. 42.* Zapfius in *Dissertat. de morbo Hung.* inquit: Ipse in nupera dysenteria laborantibus per microscopium aliquoties observavi innumeros vermiculos, albos & rubros, acaros magnitudine aquantes, cum rostellis hamatis. Item, in puerpera hujus loci sinistra mamma, quæ laborabat ulcere, multa remedia, sed incassum, fuerunt adhibita: tandem in suspicionem vermiculorum ex lacte putrescente incidit, cremorem crassiusculum effluentem per microscopium examinans, tunc aderant innumeri vermiculi minimi, quales in caseo apparent, postea adhibito busonum pulvere cum pauxillo oleo arsenici, vermiculus enecatus ulcus brevi fuit consolidatum: Sic habitum

corporis verminosum cum variolis & pustulis vidit Rhodius *centur. 3. observat. 64.* Conf. etiam *M. A. N. C. ann. 1. observ. 50. pag. 147. & append. ad hunc annum, ann. 2. annex. pag. 23. ann. 6. & 7. observat. 188. & ann. 9. & 10. observ. 130. pag. 305.* Sed hanc opinionem, & hinc malignitatem derivatam, optimè ventilat Marcus Marci in *Tract. Philosoph. veterum restit. Part. 4. Sect. 8.* dum dicit: *Autores oriri putant ex vermibus, cum igitur corruptio non adsit, unde putredo & vermes? qui non nisi putredine præcedente generari possunt?* Idem est, ac si dicat: vermes non nisi præcedente putredine seu corruptione sanguinis & humorum posse generari, adeoque potius effectus esse corruptionis malignæ, quàm ejusdem formalem rationem, ut revera æger possit corripi febre maligna, & etiam mori, antequam tales superveniant.

Ex his hypothesibus certi quid determinare in tanta rerum obscuritate, difficile est. Ut tamen id, quod magis mihi probabile videtur, dicam, arbitror: febres malignas consistere in acrimonia intensissima & simul volatili; sive acerrimum fermentum & spirituosum, adeoque intimè penetrans, & tam fluidorum corporis texturam insigniter immutans, quàm solidarum sensibilitatem singulariter irritans, esse causam formalem malignitatis; vel, ut Sydenham loquitur *observat. de morbis acutis sect. 5. cap. 5.* malignitatem in epidemicis morbis in particulis calidissimis & spirituosissimis consistere, ita ut malignitas ad venenorum naturam, quorum vis in acrimonia summa, sub minima mole insigniter activa, consistit, accedere videatur.

Sed cum alcalia potius passivè sese habeant, quàm activè, & ubique acidorum ductum sequi soleant; nervosarum etiam partium symptomata, v. g. deliria, vigilia, &c. in plurimis perquàm frequentia, potius ab acido acri quàm urinoso videntur oriri, & constitutio partium vitalis quarumvis, tam solidarum quàm fluidarum, seu veterum calidum nativum, quæ in malignis in specie oppugnantur in acido volatili, potissimum fundata sit, quæ non, nisi à symbolizante, sed vitioso, & illud quasi subjugante, vitiari potest acido; remedia quoque in febribus malignis, imò ipsa peste usitata, ut salia volatilia, camphora, summum alexipharmacum, myrrha, & alia resinosa, quatenus acidum acre pinguedine balsamicâ temperant & corrigunt; animalium partes duræ, ut cornu cervi, ebur, unicornu; item terræ medicatæ pingues, sulphure metallico plus minus imprægnatæ, hinc plus minus temperando absorbentes, ut terræ sigillatæ, bolus Armena, quæ habent sulphura metalla

tallica fixa, ut cinnabaris, & diaphoreticum, Bezoardicum minerale, Joviale, & omnia Bezoardica, remedia solaria, diaphoretica, &c. quæ speciatim acidum volatile temperant & corrigunt, ac plus minus figunt, destruunt & absorbent, istudque fixatum & quasi cicuratum mediante sudore, unâ cum parte cruoris alterata, foras amandant, probabile reddunt, acidum acerrimum volatile seu spirituosum potius malignum istud in febribus constituere, quàm urinosum seu lixiviosum: Unde etiam causus, aliæque fixiores continuæ febres, tam vicinæ sunt malignis, ut hæc subindè sub illarum regimine lateant, & illa quoque promptissimè in has degenerent, quatenus facile fermentum febrium harum benignum, seu mitius, acrius & volatilius reddi, indeque malignitatem veram contrahere potest. Ut taceam variolas, pleuritides ac similes manifesto ex acido natas febres, sæpè malignas simul existere. Sed si ritè hæc consideremus, malignitas hætenus explicata non nisi istas febres attingit, quæ ex contentis corporis humoribus, maligno tali fermento inquinatis, oriuntur, quæ mitiores saltem esse videntur, cum graviores ex infectis, & maligno afflatu quasi vitiato spiritibus, primariò oriri videantur, qui infecti exinde notabiliter immutati, & plus minus syderati, seu ex parte mortificati, contenta corporis, in specie sanguinem, pessimè viciantes, malignarum febrium, & in specie pestilentialium, ipsiusque pestis, fundamentum existunt.

Nempe afficiuntur in febribus malignis primariò quidem spiritus & contenta corporis, utut secundariò etiam acres malignæ particulæ generis nervosi partes quasdam, v.g. ventriculum, plus minus affligere soleant.

Prout autem particularum fermentativarum non est differentia in proprietatibus & activitate, ita etiam malignitas quibusdam in febribus magis humores, præsertim sanguinem, inquinat, in aliis vero spiritibus maxime infecta est, quorum prævio inquinamento & massam sanguineam plus minus afficit. Ut hoc pateat, observandum, quod symptomata illa inter graviora & insolentiora primum ducat nimia & subitanea virium prostratio, tam ex ægri narratione, quàm ex ægri pulsu cognoscenda. Cum verò omnis vis corporis, viriumque robur in spiritibus situm sit, non poterit in malignioribus febribus tantus virium collapsus tam repentinus esse, nisi malignitas seu venenum primò spiritus occupet, hosque immediatè destruat, & his mediantibus contenta cætera fluida, speciatim sanguinem inquinet, ejusque fermentationem, & spiritualescentiam lædat: id quod ulte-

rius cætera concurrentia symptomata febrium malignarum confirmant: Pulsus nempe frequens, celer, parvus, uti in febribus petechialibus observari solet corpore adhuc ad sudorem disposito, qui deficientem turgescientiam & fermentationem sanguinis defectu spirituum moventium, qui non sufficienter vibrantur in corde, & nimiam ejus confusionem, & in fermentatione inordinationem ostendit, unde potius per cor fluit, quàm ex eodem turgescendo ebullit: Urinæ in malignioribus, aut pessimo ægri statu naturalibus similes subinde; item agrypnia ac delirium, convulsionum cum omnimodo ferè sudoris defectu, in talibus febribus citò ac frequenter affligentia, contagium efficacissimè & latissimè in distans non rarò se diffundens, quod saltem subtilissimis ac spirituosissimis particulis competere potest, adesse testantur. Confer. hinc in specie Velthufius *de usu lienis* p. 134. & sequ. ac sanè plures contagiosiores, & speciatim pestilentes, ipsaque pestis in specie, spiritibus inimicæ sunt.

Sunt autem spiritus, virium fundamentum, duplices: vel vitales, vel animales; qui tamen mutuo nexu & functionum circulo mutuas opes sibi conferunt, & ad conservationem sui ac totius corporis intimè conspiciunt. Probè itaque attendendum: utrum in maligniore febre magis spiritus vitales cum massa sanguinea à malignitate inficiantur? an verò spiritus animales & genus nervosum magis afficiantur?

Spiritus vitales, & hinc massam sanguineam, primariò affectam esse, persuadent

1. Æstus intensus cum pulsu celeri, frequenti, & parvo.
2. Sitis clamosa, fauces aridæ, lingua scabra, nigra & fissa.
3. Calor moderatus cum pulsu celeri, frequenti, & inæquali, mox sub ingressu morbi apparentes.
4. Anxietates & inquietudines, propter bilem porraceam vel æruginosam, quæ in stomacho delitescens maximas molestias infert.
5. Colliquatio, speciatim fluxus alvi colliquativus, ad instar purgantium malignorum ex simili acido volatili acerrimo originem ducens. Hoc opprimit spiritus vitales, & cum bile commistum massam sanguineam attenuat, & plus minus colliquefacere solet.
6. Sudor subdulcis & nauseosus odoris, qui putredinis inchoatæ est comes, similis odori cadaverum ex inchoata sanguinis corruptione, ab acido volatili acri orta.

(Ss 2)

7. San-

Tom. II.

7. Sanguis nimis fluidus, tenuis & admodum dilutus; difficilius aut planè non congrumescens, qualè Sylvi<sup>9</sup> observavit: sicuti & Simon Pauli, qui etiam ex acrimonia volatili derivat febres malignas, in *parcebas de febribus malignis, libro elegantissimo, pag. 14. & 21.* sanguinem norentissimi coloris venâ sectâ emissum, pessimum morbi maligni signum asserit: Simile etiam fateretur Bruno in *Jessen. p. 89.* Veteres dixerunt: si sanguis venâ sectâ non con-crecit, malû est; innuit enim defectum fibrarum ex putredine. Sufficit, veteres statuissè talem defectum esse signum inchoatæ putredinis in sanguine. Observatum sæpius fuit in febribus malignis, quod partes solidæ dispositæ fuerint ad putrefactionem, teste Hildano *c. 3. obs. 93 & 95.* Panarolus *pentec. 8. obs. 48.* Horstius *decur. 5.*

Huc etiam 8. pertinet stillicidiû sanguinis per nares, per uterum, &c. in febribus malignis interdum observatum, vid. Hæchstetterus *decad. 1. cas. 3.*

Spiritus verò animales ac genus nervosum primariò magis affectum ostendunt,

1. Ardor capitis circa frontem continuus, & longè intensior, quàm in reliquo corpore.
2. Pulsus durus citra partis cujusdam membranosa in quadam corporis regione notabilem affectum, simul frequens, celer, &c. Tales pulsus cum duritie semper suspecti esse solent.
3. Si cum pulsu laudabili, h. e. magno, vehementi, æquali, frequenti, æstu plûs minûs intenso, tamen summa virium prostratio, aut stupor, aut facultatum animalium defectus se exerat.
4. Si urina parum à statu naturali recesserit, aut tenuior, quàm morbi ægrique conditio requirat, fuerit, adeoque pertinaciter cruda extiterit.
5. Agrypnia pertinet sine causa manifesta.
6. Appetitus prostratus, nausea & vomitus; hinc & ventriculus subindè escharâ, tanquam vesicatorio aut caustico, affectus deprehenditur, vid. Bartholinus *l. 4.*

Foras & 7. huc pertinet, si arida, scabra, vel plûs minûs squalida cutis ægri fuerit absque vaporoso calore, vel blandi madoris vestigio.

Talium, adeoque malignarum febrium malignitatis, quâ spiritus afflando quasi adeo pellunt, ratio à priori hætenus imperscrutabilis extitit, ipsâ spirituum naturâ & existendi ratione nondum exactè exploratâ. Sane contagia magis activa seu spirituosiora &

potentiora in spiritus imprimis agere, præter modo dictas rationes persuadet imaginatio, quæ non, nisi spirituum ministerio peragitur, & tamen efficacissimè contagiorum receptionem promovet.

Ex hætenus dictis lucem sceneramur: unde æstus & febrilis sanguinis ebullitio ut plurimum remissior in febre maligna observari, & vix unquam ad gradum ardentium assurgere soleat, pessimo licet ægri statu: Unde notatu dignissimum est assertum Sydenhami *de Methodo Med. p. 43.* quamvis malignitatem, quæ sanguinem adiuvitur, sine insigniore febrili ebullitione periculosiorem longè esse: aut enim spirituum magis affectorum & quasi syderatorum, quàm turbatorum humorum, est indicium: aut saltem in humoribus, præsertim sanguine, à fermentativis malignis miasmatis confusionem, & in textura & motu intestino eorum inordinationem indicat, & ita incalescentia quidem, sed internè saltem gliscens, non verò ad exteriora pergens, accidit; unde natura quasi oppressa non potens est symptomata illa magis regularia exercere, quæ morbo competunt: Conf. etiam ejus *observ. de morbis acutis sect. 5. cap. 5. pag. 362.* Sanè in istis malignis, quæ cum excretionem cutanea contingunt, v. g. petechialibus, variolis, purpura, &c. tantum abest, ut æstus & sanguinis ebullitio gravioris morbi sit indicium, ut potius, modo non nimius fuerit, promoveat insigniter & separationem & excretionem producti illius morborum sub cute defixi; cum hiè contra periculosius se habere soleant, in quibus deficit magis calor & æstus corporis febrilis; unde & parcius & tardius excretio talis cutanea procedere solet. Equidem in malignis febribus, quæ ex interna contentorum degeneratione oriuntur; item in variolis, morbillis &c. massa sanguinea magis affici, & hinc etiâ febrili acuta sanguinis effervescentia agitari solet: sed in acutiorib<sup>9</sup> pestilentialibus, peste ipsa, spiritu influos imprimis affici & quasi mortificari, aut necrosi affici videntur.

Causa ergò proxima febrium malignarum videtur esse acidum volatile acre seu spirituosum aut malignum, spiritus corporis nostri vitales & animales enervans, & plûs minus destruens.

Causæ malignitatis remotæ, præter contagium corporale, sunt admodum variae: nunc externæ, nunc internæ, prout nunc epidemicè, nunc non epidemicè grassantur. Externæ sunt, quæ forinsecus accedunt, vel inspirata, vel assumpta: Hæc sunt corrupta putrida inquinata, tam vegetabilia, quàm animalia ægrotantia: illa sunt aër, isque vel contagio putrefactivo ab alio ægro inquinatus; vel effluviis aliis malignis undecunq; exhalantibus infectus, uti fit in constitutione epidemica plus minus



minus pestilentiali; vel aër ab anni diversa tempestate, imprimis austrina, i. e. calida & humida, ita alteratus, ut sale ejus universali balsamico omnium rerum conservativo plus minus hebetato aut enervato corpora nostra ita disponantur, ut facile & quasi sponte in putredines inclinent, & tales semper sunt epidemicæ; vel denique aër nimis quietus, aut in loco minus apto conclusus, qui subindè insigne vitium contrahit, ut talem aërem inspirantes postmodum quasi veneno afflentur. Singulare exemplum aëris maligni habet Rulandus *tract. de febre Hungar. cap. 8. pag. 231.* de febre maligna ex attractione auræ, ex ventilatione frumenti per aliquot annos quieti, obortâ: Sic ex fœtore paludum & rerum injectarum putrescentium febrim malignam pestilentialem paucos ante annos Lugduni Batavorum notat Helvetius *in diribitorio p. 65.* Et sanè frequentissimam febrium pestilentialium originem rerum talium corruptarum fracedines esse, jam diu observatum est: confer. du Hamel *de affection. corporum p. 438.* Unde & post magnas hominum strages, & corporum putrescentium aut minus debite sepulcorum putredinales exhalationes, & in diuturnis obsidionibus aut castris non mutatis, ex varia colluvie putrescente exhalantes fracidi odores, febres epidemicas malignas quasi pestilenciales suscitant febres. Ut nihil hinc dicam de antris subterraneis, antea diu clausis, apertis, de terræ motibus, &c. crebrius febres malignas comites trahentibus. Quoad victus errata: nil notius est, quam famem sequi pestem; item esus alimentorum non nihil putridorum, præsertim carniū absque his condimento, subindè etiam solet esse causa, ut oriantur febres malignæ: Sic Borellus *cent. 2. observat. 32* febrem malignam epidemicam ex esu carniū bestiarum ægrotantium obortam notat: Item potus aquarum putridarum, aut usus fructuum horarum corruptorum, aut malignam auram afflatorum, foecundæ matres febrium malignarum epidemicarum esse solent: Sic Epiphanius Ferdinandus *hist. med. 11* notat febrem malignam lethalem ex esu fungorum: vid. Schenkii *in obs.* Item pecthalem ex esu cicutæ cum oleribus recensibus subortam notat Simon Pauli *in digressionem de febribus malignis p. 3.* Et quæ sunt iuniles alix causæ remotæ, quæ malignæ censentur: de quibus vid. Kircherus *in Scrutinio Pestis.*

Interna causa remota multis videtur dubia, an & quomodo stante humanâ vitâ possit aliquid putridi & maligni & quasi veneni in corpore gigni? quod tamen non, nisi ex natura veneni non ritè intellecta originem duxit. Sed qui considerat varias & subindè inconcepribiles alterationes humo-

rum in corpore nostro secundum res non naturales, præsertim varia assumpta; & præternaturales, in specie in primis viis, ubi naturaliter feces segregatæ putredinem, & inde certum fœtorem contrahunt, & multiplices miscelas, & per medicamenta quoque factas eorum mutationes, & exinde mirabiles textura, s ac hinc proprietates novas, ac planè singulares saponos ortos; itemque qui perpendit, quod in vivente corpore gangrænæ, sphacelique fiant, is non dubitabit etiam, quin tam in sanguine, quam in solidis partibus putredo, adeoque ut ardentiores, ita & malignæ mitiores, in corpore, in specie ex primis viis, suscitari possint: Nam & irati hominis morsus venenosus non absque ratione quibusdam putatur. Sic v. g. succus pancreaticus & felleus naturaliter constituti tertium temperatum succum constituunt, quorum alteratio, præsertim pancreatico aciore aut acidioris existente, bilis æruginea dicta, plus minus hostilis, prout acrior seu mitior eadem fuerit, & ob pessima symptomata, quæ interdum inferre solet, plus minus maligna oritur. Unde qui vitæ tenacioris, qui abundant acido, ut melancholici, scabiosi, &c. non adeò periculosè corripuntur malignis febribus, propter acidum potentius, acidum volatile acre figens. Sed tales saltem sunt privatæ. Nam quæ ab extra communicatur malignitas, aut à contagio, aut epidemica quadam aëris & alimentorum alteratione, nobis insinuat, adeoque in plures simul & epidemicè observatur grassari, plus in recessu habere videtur.

Cavenda autem in genere sedulo contagii seu fermenti maligni, seu causæ febris malignæ, confusio cum alterationibus sanguinis aliorumvè humorum notabilioribus, in malignis febribus obviis, seu productis morbo- sis, ut plurimum spirituum influorum, præviâ alteratione & affectione à contagio seu fermento maligno inductis: hinc enim nec sanguinis coagulatio à Willisio asserta, nec ejusdem nimia dissolutio, quam Sylvius urget, ad rationem malignitatis formalem explicandam inserviunt; dum hæc alterationes producta morbosa mediata, non secus ac bubones & carbunculi putandæ sunt: v. g. in ægro variolis aut morbillis correpto, & per totum corpus iisdem incrustato, non putandum est, exstitisse in corpore tales sordes, quæ febrim induxerint, & postmodum sub cute depositæ variolarum pustulas & sanem constituent; siquidem sanissimus subindè ex improvviso iisdem copiosissimis obducitur; sed à fermento seu miasmate maligno, interdum sub forma odoris contagiosi hausto, spiritus inquinante, & horum medio humores afficiente, generantur ista in corpore, donec

donec unâ cum multiplicato fermento contagioso, sed istorum humorum, licet alteratorum, medio temperato & correcto secerantur, & circaglandulas intercutaneas defigantur. Qui igitur novit leve fermentum moderare, subigere citò, & dum adhuc in herba delitescit; is etiam feliciter uberiores exanthematum proventus potest præcavere. Par ratio petechiarum, purpuræ, bubonum & anthracum esse videtur: sunt horum colores rubri, lividi, nigri, non quidem à maligno fermento plus minus caustico seu urinoso præcisè; sed à majore vel minore mortificatione & necrosi humorum vel partium solidarum, ob spirituum extinctionem, cujuscunque etiam naturæ miasma malignum fuerit.

### DIAGNOSIS.

Quando aliquis incipit laborare febre malignâ, horror levis ac tardus præcedit, quem calor mox subsequitur, qui in maligna, quâ tali, sæpius est parvus vel nullus, adeò, ut de eo vix conqueri soleant ægri: subitò verò virium ingruit prostratio inopinata: interdum oriuntur deliria, jectigationes ac inquietudines corporis, maculæ subinde ac vesiculæ coloris & magnitudinis variæ in corpore efflorescunt: Imò nulla sunt symptomata febribus solennia, quæ non in hac vel in illa febre maligna observentur. Subinde malignitas est tanta, ut partes nunc internas nunc externas sphacelo ac gangrænâ correptas observare liceat: id quod interdum in variolis malignis contingere solet. Salmuth post variolas non rectè expulsi observavit gangrænâ. *Pentec. 1. observ. 70.*

Non autem una eademque malignitatis in quibusvis morbis malignis vel venenosis est ratio ac conditio, tam subjecti patientis, quàm symptomatum hinc enatorum varietate; sed specialis ratio in singulis morborum malignorum causis distincta est. Alia enim est dysenterix malignæ, alia febrium petechialium, alia febrium malignarum sine petechiis, alia morbillorum aut variolarum, alia pestis, alia purpuræ puerperarum, alia in catarrhis epidemicis, alia morsus canis rabidi, alia luis Venereæ, alia scabiei ferinæ, alia in scorbuto ad gradum malignitatis devecto; adeò, ut de quâ maligno ferri vix possit judicium, quin singulare quid subesse videatur. Sanè etiam non levis inter ipsam malignitatem est differentia, dum febres malignæ quædam sunt acutiores, ob id pestilentialia dictæ, quartâ vel septimâ die ad summum interimentes; quædam contra minus acutæ, ut quæ ad decimum quartum, interdum etiam vigesimum, extenduntur: cujus differentix ratio partim est in causæ agentis majore vel minore activitate, vel in subjecti patientis apta vel inepta susceptibili-

tate; prout enim utrumque magis vel minus dispositum, eò acutior quoque & malignior existit febris. Hinc ob earum rationem fit, ut febres malignæ tales nunc mulieres, nunc viros, nunc pauperes, nunc divites, nunc juvenes, nunc adultos, nunc infantes, &c. solum affligant.

Ratione symptomatum adjunctorum, in specie in excretis, magna est febrium malignarum varietas, dum quædam cum certis & insignibus cutis efflorescentiis, quædam sine iis, vel paucis admodum, quædam aliis symptomatis stipata est.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: auditâ febre malignâ pavescit Medicus, contremiscunt ægri: siquidem omnes febres malignæ per se sunt molestæ, & sæpius pessimi ominis & periculosæ: & quò periculosiora cum virium imbecillitate concurrant symptomata, eò majus portendunt periculum. In genere tamen unanimis Practicorum est consensus, prognosin malignarum esse incertam, & cautum atque prudentem in prognosi requirere Medicum; cum mox & inopinatò nunc ad vitam, nunc ad mortem terminentur: Nempè verissimum est, quod dicit Hippocrates: *In acutis sunt incertæ prædictiones vitæ & mortis*: unde & Galenus malignas febres statuta ad judicandum non habere tempora, asserit; plurimi enim subitò cum periculosissimis evadunt signis; alii subitò cum salutaribus è medio auferuntur.

Pulsus, quò magis magnus & æqualis est, & consuetum eundemque tenorem servat, eò est melior.

Inordinatus verò, inæqualis, debilis, seu quasi retractus periculosus est, in specie in principio morbi; quò major etiam est pulsus, eò melius; quò minor, eò deterius.

Si celer & parvus simul, aut formicans contigerit, admodum pravum omen est, ex quo vix emergunt ægri. Nihilominus tamen pulsus parvi non sunt tam mali ominis in febribus malignis, quàm in benignis.

Sic etiam pulsus intermittens aut deficiens in febre ardente benigna ordinariò est periculosissimus: Interdum tamen in malignis cæteris paribus non adeò malum, sicut dicit Riverius, qui observavit in juvene pulsum intermittentem quidè per multos dies, morbo tamen tandem desinente. Nec pulsus parvus, rarus, ac debilis, sed etiam similis sano cum aliis pravis signis portendit malignum morbum.

Ulteriùs malignæ febres habent ut plurimum agrypnias & deliria comites.

Delirium si à somno, vel spontaneo, vel per medicamenta excitato, compescatur, non est metuendum, imprimis conjunctum simul cum copioso sudore: post somnum autè perseverans

verans delirium, admodum periculosum est; innuit enim convulsiones, aut mortem ægri.

Varii colores ante oculos apparentes, ac objecta peregrino colore vestita, convulsiones, deliria, &c. innunt. Visitavi ægrum malignâ febre correptum, licet aliàs bene se haberet, dicebat: me indutum esse pallio & veste cœruleâ; imo omnis niger color cœruleus illi videbatur: Signum hoc aderat manè, à meridie subsequabantur delirium & convulsiones, & tandem interibat.

Surditas seu potius obauditio in morborum acutorum principio periculosissima; in statu autem apparens salutem portendit, præcipue in malignis: & multos observavimus, dicit Riverius, quibus in his febribus in statu supervenit surditas, aliis licet periculosus cum symptomatibus, omnes tamen evaserunt: Nam interdum delirium solvitur, interdum criseos per hæmorrhagiam narium futuræ est indicium. Quare autem surditas in statu salutaris sit? nondum determinatum est; forsân ad parotides glandulas decubitus quasi quendam criticum, & successivam hinc discussionem materiæ peccantis innuit: siquidem & parotidum tumores in febribus malignis & purpuratis lethales in augmento & statu morbi; si vero tantillum declinante morbo appareant, salutare.

Urinæ in febribus malignis sanorum sunt simillimæ, vel etiam perturbatæ & crassæ, tales permanentes malæ. Multi, coctionis signis in urina apparentibus, sed denuo recrudescentibus, sublatis sunt è medio. Urina tamen cocta, laudabile habens enæorema, per aliquot dies continuans, & in sedimentum sensim abiens, salutem certam perpetuò pollicetur.

Rarum est, quod cruda urina metastasin materiæ peccantis seu producti morborum in morbis malignis felici eventu insinuet: Vid. Bartholini *Acta Medica Hassniens. volum. 4. pag. 156.*

Quò magis à statu naturali declinat urina, in specie si fœtet, eò majus periculum subest: item urina pinguis & oleaginosa, nigra aut livescens, cum sedimento vel livescente vel nigro, nisi hoc sit ex medicamentorum usu, certum exitum portendit.

Narium stillicidium semper malum signum est, præsertim si cum agrypnia sine manifesta causa, ardore capitis, aut continuo magis aut intenso nimis sit conjuncta, præsertim si præ reliquis corporis partibus facies excessivo rubore tingatur, raro tales evadunt: nempe spina peculiaris (fermentum malignum) capiti quodam in loco aut ejus membranosis partibus infixæ est, cujus occasione hæc symptomata excitantur. Hinc velicatoria brachio aut cruribus admota, item raninarum sectio, aut hirudinum pone aures applicatio, subinde necessaria est.

Alvi fluxus quocunque tempore febribus malignis supervenientes pessimi sunt, & quo magis fœtent excrementa, & fluus sit colliquativus, eò major malignitas, & gravius periculum adest: in specie, si in febre maligna post excretionem cutaneam obveniat diarrhœa, summum periculum est, cum retrocedat malignitas, & massæ sanguineæ fermentatio penitus conturbetur; hinc eadem semper ferè lethalis existit. Hinc quoque sanguinis dejectiones quæcunque in febribus malignis, si ægri mingant si deiciant cruenta, semper sunt admodum periculosæ; imo omnes lethales eas esse, pronunciat Hœchstædterus *Dec. 1. Cas. 2.*

Gravæ colentiam feri ac cruoris, licet raram, certam mortem denotare, observavit Schenckius *in observ. pag. 418.* ex Foresto; utut aliquomodo contrarium exemplum habeat Pauli *l. 4. c. 1. p. 13.*

Si in vola manus ægri percipiunt tensiones, titillationes, & subultus tendinum; item si circa carpum, dum pulsus tentat Medicus, tendines, etiam quietis digitis, moveri aut subsultare videntur, signum sunt, certo imminere convulsiones.

Muscarum venatio, aut floccorum collectio in malignis ferè semper lethalis. Rarissimè tales evadunt, quale exemplum vid. in *M. A. N. C. ann. 3. obs. 269. p. 484.*

Tempus eventus quod attinet: acuti sunt morbi febres malignæ, quæ tamen in nostro climate à septimo usque ad decimum quartum ferè suos terminos habent. Quoad modum eventus: ferè motu quasi critico judicantur, nempe per sudores: quò pertinent excretiones cutaneæ pustularum, petechialium, &c. nunc per metastasin producti, nempe morborum, à fermento quidem maligno geniti, ipsum tamen fermentum cicuratum & correctum in se continentis, ad loca glandulosa transmissi, unde bubones, anthraces, &c. originem habent.

Interdum bubones circa genitalia apparent, quibus die undecimâ erumpentibus omnia symptomata levantur, & febris evanesceat; fit enim hæc tumoris eruptio per metastasin seu translationem.

### C U R A

Est duplex: præservatoria & curatoria.

Præservacionem in febribus malignis & epidemicis optime præstant acida blanda, ut acetum, in specie acetum destillatum, bezoardica & alexipharmaca, infusione simplicium alexipharmacorum, radicis angelicæ, &c. parata: quibus si addatur camphora, melius succedit: item citrus ejusque succus; item haustus largior vini: de quibus quotidie manè ante egressum è domo haustus sumtus egregie præservat, in specie si cum tantillo camphoræ fuerit



fuerit junctus: item essentia citri, zedoariæ, &c. hinc quando Medici ægros in febribus malignis visitant, in ore zedoariam gestent.

Præmissis ergò interdum vomitorio, detur R bezoardica, & hinc:

- ℞. *conserv. pulpa citri* ℥j.  
*elect. diascord. Fracast.* ℥℔.  
*theriac. Androm.* ℥ij.  
*flor. Citri* ℥℔.  
*℥ii diaphor.* ℥j.  
*costi Arab. veri* ℥℔.  
*rosar.* ℥j.  
*syrupi rubi idai* q. s.

M. f. Electuarium: S.  
 Præservitende Lativerge.

- ℞. *Conserv. flor. anthos,*  
*pulpa citri*  
*scordii* ā ℥ij.  
*theriac* ℥℔.  
*℥ii diaphores.* ℥iij.  
 ☞ *sigillat.*  
*C. C. f. Δe* ā ℥ij.  
*Bezoard. mineral.* ℥℔.  
*camphor.* ℥℔.

c. f. q. *syrupi idai* f. Electuarium, irrorandum cum oleo pestilentiali Heinisii.

- ℞. ▽ *cardui bened.*  
*fl. sambuci* ā ℥℔.  
*cinnam.* ℥℔.  
 + *ti vini* ℥vj.  
*elect. diascord. Fracast. vel theriac.*  
*Androm.* ℥ij.  
*℥ii diaphor.* ℥j.  
*Bezoard. mineral.* ℥℔.  
*syrupi card. bened.*  
*rubi idai* ā ℥℔. M.

- ℞. *Conserv. pulp. citri* ℥j.  
*theriac.* ℥iij.  
 ☞ *sigillat.*  
*C. C. f. Δe*  
*℥ii diaphor.* ā ℥ij.

c. f. q. *sacchari in* ▽ *scordii solut. f. mor-*  
*fuli, irrorandi tempore usus aliquot guttulis*  
*olei pestilentialis Heinisii.*

In metu febris ardentis malignæ ex nimia ira, hinc forti motione & potu,

- ℞. *ebor. f. Δe* gr. xv.  
*specif. cephal.* ℥℔.  
*camph.* gr. ij.

M. f. pulvis. S.

Præservitend Stärf-Pulver.

Vesperi sumatur.

Cura febrium continuarum malignarum, quæ talis, per medicamenta est instituenda,

- I. Quæ per convenientes vias, speciatim sudores, febris malignæ causam & fomitem morbi, maturè & quantocyùs expellant & corrigant, bezoardica aut alexipharmaca aliàs vocata,

2. Quæ spiritus & humores corroborant, ne tam facilè à fermento maligno alterari, sed hoc potius subigere queant.  
 3. Quæ symptomata, tam ratione violentiæ malignæ, quàm ratione febris continuæ plus minùs ardentis, urgentia mitigant.

Nam quoad primam indicationem: modò vel acce acidum volatile malignum in humoribus correctum, vel odor aut fracedo venenosa in spiritibus suscepta, alterata & extincta fuerit, quod superest, facilè ab hoste liberata natura supplet, dum spontaneo ductu in malignis per excretionem cutaneas, bubonum, anthracum, pustularum, macularum &c. venenum, correctum priùs, & vehiculo serosi humoris involutum, optimè excludit.

Quoad secundam indicationem: modò spiritus & humores in sua naturali crasi & constitutione conserventur, sivè prætereà per remedia ipsis sociabilia, fermento autem maligno hostilia, tanquam quodam balsamo condiantur, quo symbolizatio aut convenientia eorum cum aliorum hominum sanguine & spiritibus hoc modo plus minùs immutetur, & ita tam facilis fermenti maligni, præsertim epidemici aut contagiosi, susceptio impediatur, aut suscepti licet, confermentatio cum iisdem, mutuaque earum alteratio ita præcaveatur: in quo optima consistit præservatio, quia potius ita dispositi spiritus & humores vincere illud queant, h. e. corrigere & temperare, & hinc excludere, in quo curationis versatur cardo, res omnis de facili impediatur. Nempe, ut rectè Paracelsus *Tom. 3. Operum fragmento de peste* hoc verum regimen præservativum asserit, *die virtutem attractivam stillen / daß nichts ein läßt gehen /* hoc est, ita alterare corpus ejusque contenta, ut inepta fiant ad veneni aut contagii susceptionem. Conferatur idem Paracelsus *de peste lib. 2. c. 3.*

Hiscè modis nempe vel fermentum malignum corrigendo, vel balsamicà vi mumiam nostram spiritualem condiendo operari videntur remedia alexipharmaca, eaque pro sui varietate nunc saltim alterutro, nunc simul utroque modo. Præ cæteris decantata sunt sulphurea, v. g. ex minerali regno sulphur commune, cujus usu Hippocrates ipse pestem istam famosam Græciæ abegit, & suffitus ejus pro aëris emendatione & pro potus medicatione perquam laudatus existit, non secùs ac ejusdem in substantia usus. Sanè suffitus seu odor sulphuris uti quasvis corruptiones & alterationes, ipsamque, Helmontio teste, sanguinis putredinalem alterationem præcavet; ita simul odores & fracedines malignas, contagiosas, pestilentes, ignis instar tollit & extinguit. Con-

Concreta antimonialia sulphurea, debito & appropriato venenoso halitu per ignis & niti vim exhausta, in febribus malignis saturantur quasi denuò, dum absorbent similem malignum & venenosum halitum, febris malignæ authorem. Terræ pingues temperando & absorbendo fermentum malignum acre, & illud ita corrigendo se exserunt. Camphoræ penetrantissima substantia & odor efficacissimus, uti balsami instar condit corpus nostrum, etiam mortuum, & acre spirituosum quodvis temperat; ita simul odorem malignum & pestilentem sui miscelâ alterat & enervat. Acetata quælibet, aut horum loco succi vegetabilium acidî, præsertim citri; item clysti minerales sulphurei, penetrando & permiscendo se undique, certo modo alterant contenta corporis, & firmiorem suo modo texturam iis conciliant, quo modo tam præservationi inserviunt, idque eò magis, si alexipharmacis aromaticis infusis balsamicam vim majorem acquisiverint, quàm pro vehiculo plurium remediorum, præsertim aromaticorum calidiorum optimè conducunt: quò etiam vina generosa acidula pertinent. Animalium partes duæ, absorbent non saltem acidum, partibus animalium hostile malignum & acre, sed simul & potissimum Sialia corundem volatilia & crassi sanguinis conservandæ, & per diaphoresin ac diuresin depurandæ, & ita suscepto maligno evacuando, simul conducunt; unde Kergerus *Tract. de Ferment. Sect. 3. c. 3. p. 250.* Præcipitantia alexipharmacis necesse consuevit. Alexipharmaca cætera aromatica, amaricantia, &c. exque his & similibus concinnatas compositiones theriacales, per opium imprimis animatas, quod attingit, præter usum sudoriferum modò laudatum, dum æstum corporis, mediante sui constitutione resinosa & oleosa intendunt, hoc ipso sanguinis balsamicam vim, & spirituum vigorem acrobur, conservare, impetum verò eorum undecunque intensiorem factum societate opii debite refrænare, ac contra malignum virus ita defendere ostendunt, acido præsertim cum vehiculo usurpata.

Circa alexipharmaca hæc, ut supra dictis indicationibus ritè applicentur, observentur sequentes cautelæ:

I. Vomitoria in primo principio febrium malignarum, idque eò magis, quo magis sunt malignæ, & quidem tunc temporis, quando à causa epidemica externa, adeoque à contagio extrinsecus hausto, stomachum imprimis inquinante & inficiente, oriuntur, præcæteris omnibus maximè conducunt, ut peccante saburrâ evacuatâ, & contagio sublato, stomachus non affligatur à morbo, & multa symptomata maturè præcaveantur; sicut eadem etiam in pestilentiali constitutione ordinari solent. Pariter conveniunt eadem vomitoria,

Tom. II.

si ex privato contentorum vitio febris maligna orta fuerit. Imprimis in febre maligna, de morbo Hungarico seu de morbo castrensi participante, in principio provocatus vomitus sæpissimè est salutaris: vid. Rulandus *Tract. de morbo Hungarico*. Sed observetur, ut maturè fiat, nempe in principio, antequam quamcunque excretionem aliam, imprimis per cutim, molietur natura.

Ex vomitoriis præ reliquis præferuntur Sialia, in minori tamen dosi propinanda, ne corpus nimium moveamus.

II. Sudorifera primatum obtinent in cura malignarum, utpote quæ optimè malignitatem expellunt: interdum tamen & hic debitis determinantur regulis, ne quid nimis. Quò major est malignitas, eò frequentius & copiosius provocandus est sudor, adeò ut in febribus malignis pestilentialibus, i. e. in summo malignitatis gradu, aut etiam in aliis malignioribus, ad minimum ter in 24. horis sint propinanda medicamenta sudorifera alexipharmaca, teste experientiâ Practicorum; semper tamen habitò virium respectu, ne hæ ipsæ nimis exsolvantur: neque etiam linteis vel aliis superimpositis æger nimium est contegendus, quoniam experientia docuit ægros interdum nimio sudore expirasse; nimia enim & profusa sudoris effusio subinde minùs tuta, serum aquosum nimis exhauriendo sanguinem incrassat, & ejus motum debitum inhihet. Unde, ubi cum mitiore malignitate conjuncta est febris ardens, potentioribus sudoriferis locus non est, sed potius in principio absorbentibus ac mitioribus sudoriferis, in progressu fortioribus, insistendum. Considerandum autem simul in sudoriferorum usu: an corpus sit perspirabile? & an ad sudorem dispositum, an vero non? si illud, tutius & potentiora propinari possunt sudorifera; si hoc, cautius & mitiora, ne turbetur magis massa sanguinea, interpositis ubique blandis acidis.

Sed sudorifera inter non levis delectus est habendus. Tutissima omnium sunt salia volatilia, hinc volatilia aromatica. Sed hæc ipsa saltem in principio morbi & incremento conveniunt, in statu fixiora tutius usurpantur: id quod præsertim in volatilibus sulphureis ac remediis theriacalibus observandum, periculum aliàs est, ne in statu novas turbas, in massa sanguinea intensiorem æstum & ebullitionem, indeque varia capitis symptomata inferant. Videatur hic elegans locus Ludovici in *Pharmacia* p. 237. 243. 261. 280. 284. 328. &c. Nempe volatilia inter sudorifera, ubi febris paulò intensior fuerit, macra convenientius locum habent; ubi verò hæc febris remissior fuerit, oleosa seu aromatica adhiberi possunt. Et sicuti hæc aromatica propter æstuationes nimias & phlogoses circumspicte usurpanda; ita Sialia volatilia propter nimiam sanguinis

(Tt)

guinis fusionem, & nimiam facile supervenientem hæmorrhagiam moderatè usurpanda: videantur Bartholini *Acta Med. Hassniens.* vol. 4. p. 166. Nocumētis omnibus inedentur interposita subinde analeptica blandè acida, nempe ex succis vegetabilium, in specie citro ac cydoniis; item ex clyssis mineralibus sulphureis; aut denique mistura cum paucò ~u nitri dulci, & in specie compositiones theriacaes cum vehiculo acido propinatae & meliùs ac tutiùs operantur. De theriaces genuino usu vid. Septalius in *animadvers.* l. 5. §. 53. p. 130. Post sudorifera talia volatilia in principio & augmento aliquoties repetita fixiora ex animalibus aut gñalia usurpanda & continuanda erunt.

III. Post omnem sudorem provocatum, ut & in ipso fluente jam sudore, ne ægri nimis debilitentur, blandis acidis viribus deperditis prospiciatur, cum massa sanguinea nimis sic, uti & à miasmate maligno acri, dissolvatur, sub juleporum & misturarum moderatè acidularum, imprimis cum & ex citro aliisq; paratarum forma usurpatis, quæ malignitati resistūt, ac corpus blandè ad diaphoresin disponunt; qualia sunt succus citri, cydoniorum, acetum, ac ~Di dulcis, qui reliquis acidis palmam aufert; quin & in ipsa sudoris tortura acida spirituosis mista naribus subinde applicanda, quæ ægros debiles nonnihil animant; sic vinum generosum, acetum theriacale cum ~ carbunculi temperatum, ~ apoplectica acida vel spirituosà, cum succo citri aut aceto diluta & similia naribus subinde ab adstantibus admovenda sunt, quæ etiam sub ipso sudore cochlearis dosi possunt propinari; hinc aceti theriacalis ac similis parum propinetur, unde & veteres acida, ceu putredini aut malignitati resistentia, frequenter his in febribus laudantur, & idè acetum & spiritum vitrioli allegant, ut ut spiritui huic meritò præferendus sit ~ nitri dulcis; e. g.

℞. Decoct. citri Mynsichtii lbj.  
syrup. rubi idai q. s. pro gratosapore.  
~Di dulc. parum. M. D. S.

#### Bezoardischer Stärck-Zulep.

℞. Decocti C. C. l. citri Myns. lbj.  
succu citri, vel ribium  
granator. acid. ā 3j. ad 3jß.  
elect. diascord. Fracast. 3ij.  
syrupi rubi idai 3ij.  
~Di dulc. parum. M.

℞. ~ galeg.  
scorzoner.  
cordial. Hercul. Saxon. ā 3j.  
succu citri,  
cydonior. ā 3vj.  
~ theriacal. camph. 3ijj.  
Ra flor. aquileg.  
pæon. ā 3jß.  
syrupi acetos. citri 3ß.

~Di dulc. q. s. M.

Et ejusmodi mistura acidulata cum electuario diascordii præsertim locum invenit, quando per Sia volatilia paulò profusior sudor fuerit prolektus.

℞. ~ borrag.  
bugloss.  
rub. idai ā 3j.  
cinnam. 3ijj.  
succu citri 3vj. ad 3j.  
confect. alcherm. 3jß.  
corall. r. præp.  
lapill. & r. præp. ā 3ß.  
syrupi cinnam. vel alius 3vj. M.

Item mixtura Sylvii in *Prax.* l. 1. c. 9. §. 20. c. 13. §. 53. & c. 17. §. 13. c. 30. §. 135.

Item ℞. conserv. acetosill. vel rad. scorzon.  
pulpa citri ā 3j.  
robribium 3vj.  
confect. alcherm. 3jß.

c syrup. acetos. citr. l. rubi idai q. s. f. Electuarium.

IV. De opio & opiatis expertum est Horstii judicium in *Judicio de chirurg. infusoria*, p. 83. Ea nempe, uti revera sunt remedia polychresta, ita etiam in malignis febribus quibuscunque utramque faciunt paginam, rectè siquidem administrata, & alexipharmacis mista, sudorem promonent, imprimis ubi propter nimiam inquietudinem aut anxietatem ægri prohibentur ab eodem. Ut ergò talia præcaveamus, exhibemus opiata cum sudoriferis, ut sic meliùs proliciatur sudor, & magis quieti reddantur ægris & quidem in incremento solùm, dum ad statum properant, non in statu ipso, vel ubi deficiunt vires, conveniunt; unde & opium tam insigniter extollit, & quibusvis compositionibus alexipharmacis addendum suadet Ludovici in *Pharmac. sua modern.* p. 276. sicuti etiam Verulamius in *histor. vita & mortis* p. 96. §. 21. Opiatorum eximiū usum in febribus malignis prædicat. Nempe excretionem egregiè promovet opium: spiritus quoque, ne tam citò resolvantur, quasi coërcet; & graviora in malignis symptomata mitigat: vigilias ac deliria præcavet, ac impetuosos humorum interdum effervescentium motus impedit & compescit, in specie horrendum ac metuendum sæpiùs sanguinis per nares profluvium sistit. Præter alia exempla huc facientia videndus Timæus à Guldenslee in *Cons.* l. 8. cas. 25. p. 377. ubi maligna febris ardens cum sanguinis ex naribus profluvio tandem aliis irritis laudano opiato curata: Tale exemplum etiam habetur in Horstio in *obs.* 1. p. 18. de milite, febre ardente maligna & morbo Hungarico pertinaci afflicto, aliis irritis laudano opiato curato. Post sudores etiam cum julepis vel misturis opiata propinata conducunt, ut quasi roboretur magis & quietior fiat æger; & magnum



magnum est commodum, si inducatur somnus, hinc & theriaca, Mithridatium, &, quod in febribus malignis his præfertur, electuarium diascordii Fracastorii, ab autoribus tam veteribus, quàm modernis, adhuc suam meretur laudem. Theriaca sola quidem absque acido adjuncto propinata in principio febrium malignarum, in specie cum fervore excessivo, seu effervescencia nimia junctarum, nonnihil est suspecta, quoniam theriaca per se sola nimiam sanguinis turgescenciam, & per consequens nimium æstum, excitare solet. Optimum ergo est, ut tales compositiones opiatæ & theriacales aromaticæ, e. g. theriaca, Mithridatium, &c. à ʒj. ad ʒij. propinentur cum vehiculo acido, v. g. cum aceto vini. vel cum aceti rutacei, vel cum aceti bezoardici aliuvè similis cochleari uno vel altero; sic enim longè melius ac potentiùs sudorem movebunt, & minùs debilitantur ægri: propter quam causam, nempe æstum, theriaces & Mithridatii loco elect. diascordii Fracastorii seu temperatum magis adhibetur, in specie in alvi aliisque excretionibus præternaturalibus. Moderni vel laudanum opiatum, vel essentiam opii, aut hujus loco essentiam theriacalem usurpant. Observandum tamen, nè opiata adhibeantur tempore criseos; nā criticas motiones impediunt.

V. Camphorata sunt alexipharmaca & sudorifera optima, quæ præter vim veneni correctivam simul aliqualem vim spirituum fixativam obtinent; unde imprimis in inquietudinibus, vigiliis & metu delirii conveniunt. Sed cautè ob volatilitatem nimiam usurpentur, cum non omnia subjecta ejus usum ferre possint; præsertim quorum caput debile est.

VI. Observetur, quod febrium malignarum non semper nec in omnibus sit una eademque ratio, attendendum igitur semper ad appropriata malignæ febris specialia remedia: prout enim hæc diversis se produnt symptomatibus, & nunc continuæ, nunc intermittentes videntur, atque peculiari malignitatis gradu differunt; ita etiam earum causas in ipsa radice nonnihil diversas esse probabile est: adeoque eadem curandi non planè eadem est methodus, sed pro varietate dictarum circumstantiarum subindè alexipharmaca varianda & specificanda sunt. Sic illa maligna febris, quæ à contagio oritur, magis requirit alexipharmaca & potentiora sudorifera; quæ verò à causa interna, magis temperantia, absorbendo alterantia, & successivà diaphoresi resolventia: Sic attendendum quoque: an massa sanguinea, an verò spirituum animalium ac nervorum systema magis affligantur: posteriore enim in casu volatilia, subtiliora ac penetrantiora opiatibus mista magis conducunt; priori verò non, nisi volatilia aut fixa, acidis

Tom. II.

blandis subinde temperata conducunt: item propter specialem febrium malignarum differentiam semper observandum, ut in specie huic malignitati simul appropriata per experientiam cognita opponantur remedia: v. g. in variolis, morbillis & purpura, myrrha aut castoreum; in petechiis semina expulsiiva; in dysenteria epidemica hepata viperarum & similia.

VII. Observetur: nunc massam sanguineam, nunc spirituum animalium & nervorum systema magis affligi: ibi excretionibus cutaneas ut plurimum, item per alia loca expulsionibus, contingunt; hæc verò vigiliarum, deliriorum, convulsionum & similium symptomatum, cum pulsu ut plurimum apparenter bono, est impetus.

VIII. Observetur: ad illud præsertim quod magis urget, esse respiciendum. Nempe interdum febris est purè aut simpliciter maligna; interdum verò est complicata plùs minùs cum febre continua ardente: ut ut verum sit, raram esse febrem ardentem, cui non subsit modò major, modò minor malignitas. In tali ergo casu complicati quasi sunt morbi. Propterea attendendum simul sedulò est ad sanguinis motum fermentativum, ejusque ebullitionem febrilem, & inde dependentem æstum, cephalalgiam pulsatoriam, ac alia symptomata febribus ardentibus communia, ut pro varietate circumstantiarum possimus variare medicamenta: Quò magis enim æstus urget, eò minus sudoriferis alexipharmacis volatilibus oleosis utendum est, ne deliria concitentur; quo minùs verò, eò tutius ista, præsertim in principio & augmento usurpanda, id est, ut vulgò practici dicunt: attendendum esse, an major putredo febrilis seu ebullitio in sanguine, an verò major malignitas urgeat?

In genere tamen semper, quantum fieri potest, utrique prospiciendum: Sanè semper in turgescencia febrili intensiore magis usurpantur absorbentia & ebullitionem corrigentia, aut salia volatilia alexipharmacis juncta, interponendo simul blanda acida; malignitati per generosiora remedia volatilia, & æstuationem corporis nonnihil intendentia theriacalia, & similia alexipharmaca; utrinque per moderata acida, aut sulphurea metallica fixa, v. g. antimonialia, est succurrendum.

IX. In cura febrium malignarum diligenter Medicus inspiciat oculos, linguam, & manus ægrorum: Oculos quidem, ut de futuro delirio & convulsionibus sequentibus possit judicare; quando enim oculi sunt fulgidi, rutilantes & quasi ignei, aut quando aspectus ægrorum est ferox, delirium plùs minus furiosum certò imminet: linguam vero consideret ac fauces, ut internum ardorem in præcordiis, indeque ortam prunellam, vel

(Tt 2)

lia.

linguæ & faucium excoriationem & exulcerationem, & alia similia symptomata in morbo Hungarico frequentia, cognoscat: Manus denique seu carpos consideret, an sint metuendæ convulsiones? ubi enim percipit Medicus, tangendo pulsum, quasi tractionem quandam, aut subultationes tendinum in carpis, licet manus quieta sit, certus sit imminere convulsiones.

. Observ. X. nihil esse exitius, & hominem febre malignâ correptum, præsertim si intensior fuerit malignitas, certius ac citius ad interitum trahit, quam quæcunque, in specie ingens & superflua, purgatio per alvum. Uti enim non, nisi funesto omine, laxa in talibus observatur alvus, & diarrhææ symptomaticæ aut colliquativæ perniciosæ admodum sunt in febribus: ita quælibet etiam artificialiter instituta purgatio, idque in specie, ubi à contagio natum est malum; item, ubi suspicio est, cutaneam affuturam excretionem: item ubi minus urget effervescencia febrilis ac æstus, quàm malignitas.

Quod si in primis viis obstructis aperiendis aliquid moliendum necessarium sit, blanda clysmata, eaque temperata, adhibentur. Et hæc ipsa etiam, ubi excretio cutanea se offert, non nisi cautissimè applicanda. Declinante autem morbo, aut devictâ perniciæ, post 14. dies, &c. blanda laxantia non incommodè conveniunt. Si quidem externè, pro primis viis abstergendis, in febribus malignis necessarium videatur, hoc vel serum lactis, præsertim cum succo citri non nihil acidulatum, vel decoctum tamarindorum julepis in debita quantitate additum, vel  $\Phi$ giatum in potu dissolutum optimè complebit: Rectè hic dicit Ballonius *Pharo Med. p. 175. In malignis potius alterandum per alexipharmaca, quàm per purgantia evacuandum.*

X. Venæsectio in febribus malignis, quæ talibus, nullum omninò locum invenit, adeò, ut quò magis febris sit maligna, eò magis noceat venæsectio, idque eò magis, quò tardius instituitur. Quid enim prodest, sanguinem & spiritum detrahendo fores apertiores maligno fermento pandere? Cum enim in malignis natura sæpè per sudorem se soleat exonerare, certè venam secando impediemus hunc naturæ motum, & ad perniciem detru-demus ægros. In specie in febribus cum excretionem cutanea conjunctis, venæsectio instituta lethalis, quia impedit motum naturæ quasi criticum per cutim factum, qui minimè turbandus est. Equidem practici vulgares aliud suadent: dico tamen eam in quacunque febre maligna administratam plus nocere quàm prodesse, præsertim nisi in primo morbi insultu instituatur: cum ficta illa refrigeratio ex sanguinis detractioe noceat: è contra æ-

stuat talium ægrorum, modò non sit excessivè nimia, excretionem tales promoveat. Cauti proinde hac in parte sumus, & caveamus à missione sanguinis, præsertim si à contagio febris maligna fuerit nata, ubi pessima est; hac ratione enim porta contagio aperitur, ut integram massam sanguineam afficiat, & vires magis labefactet. Sanè multorum annorum practicus, B. D. Michaelis, nemini in febribus malignis venam secuit, plurimis funestorum experimentis cautior factus.

Sunt equidem, qui in plethoricis petechiarum, morbillorum & variolarum eruptionem venæsectione maturè promoveri asserunt: sed hoc non, nisi rarò evenit. Ubi tamen minor est malignitas, adjuncta verò febris ardens intensior in subjecto plethorico ac juvenili, & in primo ætatis flore constituto, vel aliàs sanguinis missioni adfecto, in talibus casibus interdum, sed mox à primo principio; vanesectio, cautè tamen & in parca quantitate, institui potest. Conferantur hic simul istæ circumstantiæ, quas insinuat Willisius *Pharm. Rat. p. 389.*

Objiciat quis: largas nonnunquam in principio petechiarum & variolarum malignarum accidere narium hæmorrhagias, quæ vel morbum postmodum leviores reddunt, & impetum variolarum sistunt. Verum interdum est: consideretur tamen, an hæmorrhagia talis sit critica? an vero symptomatica? si hoc, quod testantur symptomata capitis concomitantia, & nullum levamen morbi percipiat æger, hac in parte naturam sequi non licet; sin verò critica fuerit, & cum euphoria ægri fiat, probabile quidem videtur, ut in sanguinis orgasmo imitemur naturam, & sic venæsectionem administrandam jubere possimus. Verum nec dum hoc licet facere, cum naturam non assequi possimus; ubi enim natura instituit hæmorrhagiam, ipsam levat; etsi adest stillicidium narium sanguinolentum in febribus malignis, pessimum habetur signum & funestissimum: unde neque tunc motum naturæ perversè agentis affectare conceditur. Ego nulli autor ero, ut venam secet: & quidem in specie contra venæsectionem & purgationem in febribus malignis acriter dimicantes videbitis Timæum von Guldensee in *Resp. 104. p. 126.* item Brunnerum in *Consiliis de febre Hungarica*, & Rulandum de *Morbo Hungarico seu castrensi.*

XII. Cantharidum & vesicantium ulus in statu febrium malignarum est etiam usitatus & commendatus, carpis & femoribus applicata: vid. Hoeferus in *Herc. Med. p. 282.* qui horum utilitatem insigniter commendat, & imprimis in Italia & Gallia usurpantur. Usus verò legitimus & applicandi ratio consistit in eo, quod vesicatoria imprimis con-

veni-

veniant in incremento vel principio status, dum vel graviora, imprimis capitis & animalis facultatis, imminet aut urgent symptomata, quæ vel præcavent, vel certò levant; vel naturam aliquam excretionem moliri ex erumpentibus hinc inde, sed imperfectè, maculis, à doloris sensu in quadam parte suspicio erupturi abscessus est; vel quando facta jà excretio quacunque ex causa denuò retrocesserit, tum imitemur Italos, subito vesicatoria applicantes, & ita opus naturæ promoventes. Locum etiam habent iis in febribus malignis tunc, quando extrema frigent, interiora verò uruntur: item quando veterius aut alii soporosi urgent affectus, adeoque, ubi suspicio est, ne vel fermentum malignum magis spiritus animales & genus nervosum afficiat, vel quacunque ex causa raptus sanguinis aliorumque contentorum ad caput fiat: vid. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 214.* In talibus casibus optimè cruribus suprâ vel infragenua, vel brachiis propè carpos, aut prope axillas, tandem etiam circa nuchâ applicantur: sed hoc vix, nisi in affectibus soporosis, aut ubi jà aliis in partibus applicata fuerint. Sanè talibus in casibus, tam in benignis quàm in malignis febribus, conducunt, idque eò magis in his, quorum parcius sudor aut diaphoresis observatur. Arbitror, quod in miasmate maligno evocando, mediante spiritu ad locum dolentem concitato impetu, singulare quid obtineant: sic enim & bubonibus aliisvè tumoribus, ut melius erumpant, optimo consilio applicantur.

Remedia inter vesicantia optima sunt, vel emplastrum vesicatorium in Pharm. Augustana, vel Emplastrum istud vesicatorium Schrœderi. Interim notetur, si per vesicatoria pustulæ excitari nequeant, desperatum malum esse. Cæterum audiat Stephani correctio, qui malè putat agere Medicos statim ad vesicatoria properantes, cum ea tunc adhibenda demùm sint, quando quidem excretio sit critica, sed impedita, ita, ut his ipsis juvetur natura.

XIII. Quoad dietam in febribus malignis observandam: tenuis hæc sit necesse est; & cum sæpius summè fastidiant alimentorum odorem, nullo modo ad eundem cogendi sunt, quin juscula aut similia abundè, licet in parva quoque dosi, sufficiant. Potus sit vel cerevisia secundaria, vel etiam ∇ simpliciter, quæ leviter ebullierit, cum parte tertia vel dimidia vini temperata, & infuso pomo citri cum cortice, in taleolas inciso, vel succo citri expresso medicata, quinetiam gelatina C. C. recens parata, & super carbones liquefacta, largiter cum potu isto, aut cerevisiæ, aut alii ordinario, partim scopo analeptico, partim scopo alexipharmaco sudorifero, admisceri potest: c. g.

℞. ∇ font. ℔j, β. l. ℔ij.

vini Rhenan. ℥jx.

Mistis his addatur

pomum citrium nonnihil dissect. & express. N. j.

gelatin. C. C. super Δem dissol. ℥ij. M. D. S.

**Sonderlicher stärckender Citronen-Julep.**

Hinc etiam decoctum citri Mynsichtu, additâ ℥j. vel ℥ij gelatinæ C. C. ad ℔j. convenientissimum in malignis est potus loco Julepi. Vinum generosum acidum non nocet in malignis, quin moderato usu remedii confortantis vices subeat: Conf. Riverii praxis, & Bartholinus cent. 6. hist. 7. Convenit etiam pro potu serum lactis acidulatum cum succo citri. Nec inconveniens est fumo sulphuris medicaripotum quemvis ordinarium, cum tale sulphuris gas ad extinguendam malignitatem, & condiendos balsamicâ vi humores, mirè conducat: cujus loco etiam clysti giales sulphurei, vel — Qi dulcis, vel roris mineralis 50. ad 60 guttas in mensura dimidia cerevisiæ, vel cujusvis ordinarii potus utilissimè instillari possunt: qualem potum sulphurandi, & clystos hos proficuos præparandi modum, videbitis in Cnoëllii M. M. *febres malignas epidemicas seu pestilenciales* p. 96. Aliàs & — Qi atum à ℥j. ad ℥ij. in mens. j. potus ordinarii dissolutum egregiè convenit, nisi vel alvi liberior fluxus, vel stomachi nauseabundi imbecillitas obstiterit.

In specie quod alexipharmaca & sudorifera attinet, sunt hæc vel volatilia vel fixa, volatilia inter alia sunt vel macra seu salina, ferè frigida, vel aromatica seu oleosa, ferè calida: Macra illa sunt — & — Oia volatilia urinosa ex animalibus desumpta, — Ois amm. — & — O volatile C. C. viperarum, tartari, urinæ, liquor cornu cervi succinatus, — & — O volatile succini, &c. item acetum, succus citri, clysti sulphurei; qui tamen magis in potu usitati, &c. oleosa volatilia sunt camphora, quæ omnium optima, omnia aromatica sudorifera, ut zedoaria, centaurium minus, &c. rob. baccarum juniperi & sambuci: item olea destillata, ut succini, citri, camphoræ, exque his concinnatum oleum pestilentielle Heinisii, ½ destillatum cornu cervi, Qi, &c. essentia, infusa, & spiritus theriacales camphorati vel crocati: vid. Zvvelferi *Mantissa Herm.* p. 430. essentia theriacalis anodyna, elixyr alliatum, pestilentielle Crollii, proprietatis, essentia zedoariæ, scordii, absinthii, cardui bened. croci, baccarum juniperi, cinnamomi, myrrhæ, succini, viperarum, castorei, tormentillæ, gentianæ, rutæ, vincetoxici, melissæ, &c. acetata bezoardica, R bezoardica. Fixa sunt vel mineralia, vel animalia: Mineralia, ut sulphura metallica cum nitro fixata, in specie ∫ diaphoreticum, ⊙ diaphoreticum, cinnabaris nativa, ∫ij, quæ nobilissima, & à Poterio sudori-

(T r 3)



doriferi pestilentialis nomine venit; & bezoardica mineralia quælibet, tam simplicia, quam cum aliis composita, in specie Bezoardicum Joviale Riverius in febribus malignis commendat; & hinc bezoardicum solare: terræ minerales sigillatæ, unicornu fossile, terra solaris, corallia, flores sulphuris, item ☉ & ☽ data; animalia suggerunt partes duras ossæas, tam temperatas quam uistas, ut C. C. velebur cum vel sine Δc, cornu cervi solare, unicornu verum præparatum, lapides animalium bezoardici, pulveres viperini, & bezoardica animalia.

Temperata, & mediæ quasi naturæ, sunt gelatina cornu cervi, & semina ista expulsiua dicta, quæ in omni casu, speciatim in febribus malignis, in quibus natura expulsionem ad cutim moliri incipit, polychresta sunt in forma emulsionis; qualia sunt cardui benedicti, napi, aquilegiæ, nasturtii, citri &c. quibus ad-dipotes myrrha.

Ex modò dictis sexcenta alia concinnantur composita: v. g. pulvis bezoardicus Sennerti vel D. Michaelis, rubeus Pannonicus, imprimis conveniens, ubi fluxus alvi simul adest; pulvis Saxonius, species de hyacintho, &c. quorum largissimam segetem videbitis apud omnes scriptores. Pertinent huc compositiones theriacales aromaticæ, ut theriaca & Mithridatum, electuarium de ovo, orvietanum Kegleri camphoratum, confectio de hyacintho, &c. & præ his temperatum magis electuarium diascordii Fracastorii ad ʒj. vel ʒij. propinatum; & quod magis laudandum, à Sylvio correctum: quæ ipsa propter æstuationis incrementum, quod inferunt, convenientissimè cum vehiculo acido, in specie aceto, vel simplici vel theriacali, aut succo citri miscentur & ita in ♀ scabiosæ, calendulæ, cardui benedicti, & similibus propinantur. Est enim theriaca mistura ☿ina oleosa volatilis anodyna & sudorifera, quæ & spirituum influentium impetum sopit, & sudorem potenter movet. Jam verò, si loco theriacæ reciperetur ~ C. C. essentificatus à ʒß. ad ʒij l. ʒj. & imprægnaretur gr. j. vel altero laudani opiat, vel essentia opii guttis x. remedium habebitur ejusdem valoris, ac compositio illa theriacalis. Subinde consultum est, ut fixa volatilibus non nihil acuantur ad promovendam sudoris excretionem.

Ex regno ergò vegetabili conveniunt radix galangæ, scorzonæ, zedoariæ, gentianæ, allii, aristolochiæ rotundæ, angelicæ, succisæ, chelidonii majoris, Valerianæ, enulæ, vince-toxici, bistortæ, olsnitii, levistici, ulmaræ, petasitidis, pimpinellæ, pentaphylli, contrayervæ, anthoræ: folia diptamni Cretici, galegæ, cardui benedicti, acetosæ, scabiosæ, scordiï nostratis & Cretici (quod ferè omnibus præfertur in curatione malignarum) uvæ inversæ, rutæ, galegæ, summitates absinthii,

centaurii minoris, cardui benedicti, scabiosæ, acetosæ, & similia: flores quatuor cordiales, flos calendulæ, hyperici, salviæ, betonicæ, aquilegiæ, crocus, &c. semen acetosæ, cochleariæ, angelicæ, melissæ, aquilegiæ, napi, citri: cortices citri & aurantiorum; baccæ juniperi, uvæ inversæ, &c. Omnibus palmam præripit in regno vegetabili caphora cautè usurpata, quæ & alcalicis subjectis & acidis se sociat; alexipharmacum omnibus superius, & verum balsamum, tam in præservatione quam curatione febrium malignarum. Propterea omnibus sudoriferis & alexipharmacis ad resistendum malignitati, quoties fieri potest, semper addenda, totam massam sanguineam suo balsamo tingit, potenter sudorem movet, ac vel in præcavendis vel mitigandis deliriis, agrypniis, & convulsionibus, somnoque introducendo, vix par habet remedium.

Ex his ergò varia sunt remedia, præter aquas destillatas istorum simplicium, v. g. melissæ, &c. imprimis infusione horum simplicium aceta fiunt bezoardica: de quibus postmodum, ubi de peste. Exemplum aceri bezoardici sit Timæi von Guldenslee in *Consil. l. 8. casu ultimo*.

Citrus totus est alexipharmacus, unde cortices, succus, & ex eo parata remedia quæcunque, imò acidulæ ex citro paratæ, nunquam omittendæ. Pertinet huc syrupus acetositatis citri, item syrupus de citro compositus. Decoctum citri Mynsichtii, &c.

De sambuco res nota est, quod ejusdem flores, ~ florum sambuci, item rob ex baccis & rob juniperinum, sint egregia sudorifera pro pauperibus, imprimis si cum C. C. sine igne propinentur; sic enim potenter sudores movent; lignum sassafras, decoctum ejus, ut & decoctum florum sambuci pro corpore juleporum etiam egregii usus est in febribus malignis.

Ex regno animali offert se imprimis cervus, qui similiter totus est alexipharmacus & anti-pestiferus, imprimis cornu ejus, & ex hoc parata gelatina, hinc sanguis ac cor primatū obtinent, & ex his præparata in frequenti sunt usu; unde aut C. C. sine igne, aut quod melius est, ~ C. C. ☿ volatile, cornu cervi, ☿ volatile & ~ sanguinis atque cordis cervi, &c. præ cæteris sunt in usu: hinc etiam liquor cornu cervi succinatus potentissimum est alexipharmacum & sudoriferum in febribus malignis, speciatim ubi mox in principio aut incremento affectus nervini, convulsionibus aut epilepsia imminet: Sal volatile cornu cervi rectè sublimatum à gr. v. ad xij. vel xv. usque ad ʒj. propinatur: ~ cornu cervi à ʒß. ad ʒj. liquor cornu cervi succinatus ad gutt. 2c. l. 30. Post cervum est vipera, cujus sal volatile, item pulveres viperini ritè parati, sub nomine bezoardici animalis sunt optimi.

De

De lapide Bezoar ex damarum genere desumpto, tam orientali quam occidentali, res nota est, quam decantatus sit in peste & febribus malignis ob insignem vim sudoriferam: de quo observetur, quod habet Zacutus Lusitanus & Hildanus, quod non adeo in parva dosi ad aliquot grana tantum, sed ad minimum ad ℥j, vel ʒß. sit propinandus, ut in virtute alexipharmaca & sudorifera ipsi nihil cedat calculus humanus, bezoardicus & sudoriferus, qui eadem dosi exhibitus longe melior est.

Ex regno minerali in febribus malignis reliquis palmarum præcipiunt ðialia sulphurea, eaque reddita fixa; quoniam ðii sulphur, de natura solari non nihil participans, malignitatem salis volatilis peccantis figit, & fixatam mediante sudore educit; hinc & diaphoreticum, aliàs notum, est singulare & usitatum remedium, omnia quoque, quæ basin ðii agnoscunt. Unde etiam ðio diaphoretico nobiliora bezoardica mineralia, tam simplex à gr. vj. ad xij. quam solare & lunare, aliaque composita, in eadem dosi sunt optima. Bezoardicum Joviale est usitatum Poterio cum camphora, si propinetur in ∇ appropriata. Sed nescio, annon hisce cum nitro fixatis præferendum sit potius ∆ ðii fixum: hinc cinnabaris ðii, ut ea non planè fixa sit, tamen ob ∆ suum, in specie ubi convulsi impetus simul urgent vel imminet, à gr. vj. ad ʒß. l. xv. vel aliud genuinum ðii ∆, ritè cum ∅ ammoniaci sublimando paratum, sub nomine Ræ ðii sicca, vel ∆ ðii fixum ex scoris reguli ðii occulto artificio præcipitatum, in sistenda malignitate & epilepsia utramque faciunt paginam; ac reliqua ðialia sulphura fixa, utpote ad panaceas maximè accedentia: vid. Basilii Valentini in *curru triumph. antimonii*. Facit etiam huc sulphur commune seu minerale, quod pro pauperibus in locum ðialis sulphuris suo modo substitui potest, cum magnam inter se habeant cognationem, idque vel crude, vel cum camphora assumptum: unde etiam conclavia ægrotantium sulfure ac pulvere pyrio suffumigenda sunt: indusium etiam & vestimenta in graviore malignitate hoc ipso fumo imprægnanda. Potum etiam sulphurare jubet in cura febrium malignarum Cnæselius l. c. Pertinent huc etiam terræ alexipharmacæ minerales, bolus Armena, terra sigillata & similia, quatenus hæ ipsæ de sulphure minerali plus minus participant. Succinum & ejus sal volatile est singularissimum, ubi genus nervosum à malignitate simul est affectum: spiritus mineralium aciduli commodissimè propinantur cum julepis: eminet præ cæteris spiritus nitri, nunc solus, nunc, quod melius est, cum spiritu vini dulcificatus, & hinc ∼ ∅ is & ∼ ∆ is. De R bezoardica seu mistura simplici, cujus basin cum salso volatili constituit camphora,

& de spiritu theriacali camphorato, res nota est, quod egregiè prosint, à ʒß. ad ʒj. propinata. Spiritus fuliginis urinosus à ʒß. ad ʒj. quibusdam in secreto habetur in morbis malignis.

Ex his variæ & mille formulæ præscribi possunt: v. g. in principio & incremento præmissis præmittendis.

℞. *mixt. simpl.* ʒj.

*liqu. C. C. succin.* ʒß.

M. pro 2. dosibus: S.

**Bezoardische Mixtur auff 2. mal.**

Item in forma potionis:

℞. ∇ *rute*

*rad. scorzon.* ā ʒj.

*mixtur. simpl.* ʒj.

∼ *fulig. rectif.* ʒß.

*syrupi scordii* ʒß.

M. pro 2. dosibus.

℞. ∇ *card. bened.*

*scordii* ā ʒj.

*liqu. C. C. succin.* ʒj.

*pulv. diaphoret. Ludovici*

*ðii diaph.* ā ʒj.

*syrupi scabios.* ʒß. M.

℞. ∇ *rubi idæi*

*scordii* ā ʒjß.

*ðii diaph.* ʒß.

*cinnab.* ðii gr. xv.

∅ *volat. C. C.* gr. xij.

*camph.* gr. ij. l. iij. aut *laud. op.* gr. j. l. ij.

*syrup. card. ben.* ʒj.

M. pro 2. dosibus.

℞. ∇ *flor. sambuci* ʒij. l. ʒiij.

*C. C. f. ∆* ʒß.

*cinnab.* ðii gr. xv.

∅ *volat. C. C.* gr. jx. l. ʒß.

*syrupi fenic.* ʒiij.

M. pro 3. dosibus.

℞. ∇ *flor. sambuci*

*scordii* ā ʒjß.

*C. C. f. ∆*

*ðii diaphor.* ā ʒj. ad ʒß.

∅ *volat. C. C.* gr. xv.

*succini* gr. vj.

*syrup card ben.* ʒj. M.

Capiatur pro 3. dosibus, expectando sudorem: cui, ubi gravius ægent symptomata, commodè *laud. opiat* gr. jß. vel essent. *anodynæ* ʒß. potest addi.

Ubi delirium imminet:

℞. ∇ *cord. Herc. Sax.* ʒj.

*cinnam.* ʒß.

∼ *theriac. camphor.* ʒij.

*C. C. essentif.* vel loco hujus potius

∅ *vol. C. C.* ʒj.

∅ *volat. succini* ʒß.

*syr. fl. tunic.* ʒß. M.

℞. ∇ *scord.*

*rad. scorzon.*

+ *ti vini* ā ʒj.

*theriac.*

*theriac. Androm.* ʒij. (ubi æstus urget; *el. diascord. Frac.*)

ʒii diaphor. ʒj.

*camphor.* gr. vj.

*syr. rubi idai* ʒj. M.

℞. ∇ *card. bened.*

*scabios.* ā ʒj. l. ʒjβ.

*cinnam.* ʒvj.

✕ *i bezoard.* l. *rutac.* aut *sambuc.* l. *vini acerr.* ʒvj. ad ʒj.

*theriac. Andr.* ʒjβ. ad ʒij.

ʒii diaphor. ʒβ. ad ʒj. M.

Addi possunt etiam gr. iij. præter propter camphoræ: capiat æger hauriendo cochlearim subinde, ita, ut corpus in blando maneat madore; vel ubi major urget malignitas, capiatur pro tribus vicibus, expectando semper sudorem.

℞. *theriac. Androm.* ʒj.

ʒii diaphor. gr. xv.

Θ *is absinthii* ʒβ.

M. pro una vel duabus dosibus: D. S.

**Bezoardische Schweiß-Latwerge.**

Capiatur in duobus cochlearibus aceti vini.

Effervesceit quidem, sed optimè sudorem promovet, maximè in principio febrium malignarum.

Vel, si theriaca minùs conveniat,

℞. *conf. ex toto citro.*

*ros. r. vitriolat.* ā ʒjβ.

*rob juniperi* ʒβ.

*elect. diascord. Frac.* ʒij.

*camph.* ʒj.

c. l. q. *syr. ex toto citro* f. Electuarium.

℞. ∇ *rad. scorz.* ʒij.

*tenell. C. C.* ʒj.

✕ *l. simpl.* ʒvj.

*succi citri rec.* ʒjβ.

*el. diascord. Frac.* ʒij.

*syr. rubi idai* ʒj. M.

Commodè hujusmodi misturis etiam myrrha potest addi.

In statu cum delirio:

℞. ∇ *ulmar.*

*cordial. Herc. Sax. frig.*

*carbunc.* ā ʒj.

*cinnam.* ʒvj.

*Bezoard. min.*

*cinnab.* ʒii ā gr. xv.

Θ *i ʒiati* ʒj.

*camph.* gr. iij. M.

℞. *C. C. f. Δe* ʒβ.

ʒii diaphor. ʒj.

*cinnab.* ʒii. gr. xv.

*Bezoard. Car.* ʒβ.

M. pro 2. dos.

Capiantur in sequenti vehiculo:

℞. ∇ *cord. Herc. Saxon. frig.* ʒjβ.

~ *ther. camphor.* ʒij.

*syr. rubi idai* ʒvj. M.

℞. ʒii diaphor. ʒj.

*cinnab.* ʒii. ʒβ.

*camph.* gr. v.

M. f. pulvis in graviore malignitate.

℞. *pulv. diaphor. Ludov.* ʒj.

ʒii diaph. vel *bezoard. min.* vel *cinnab.* ʒii. ʒβ. l. gr. xij.

*laud. opiat.* gr. j. vel *camph.* gr. ij. l. iij.

M. f. pulvis.

Quod si convulsionem imminere velint,

℞. *pulv. bez. Mich.* l. *epilept. diaph.*

*Schræd.* ʒj.

*cinnab.* ʒii gr. xv.

Θ *volat. C. C.* ʒβ.

M. pro 2. dosibus pro eliciendo sudore:

D. S. ut antea.

Mihi in febribus malignis cum delirio aut imminentibus convulsionibus familiaris est sequens pulvis:

℞. ʒii diaphor.

*cinnab.* ʒii ā ʒβ.

Θ *volat. C. C.* gr. iv. l. v.

*succini* gr. ij. ad iij.

*camph.* gr. ij. M.

Potentissimè sudorem movet, ac simul malignitati potenter resistit. Hauriatur in sequenti vehiculo:

℞. ∇ *flor. sambuci*

*scabios.* ā ʒj.

~ *theriac. camph.*

*syr. card. bened.*

*fl. papav. errat.* ā ʒβ. M.

Quando ægi sunt inquieti, & anxietates habent nimias, cuilibet dosi laudani opiat gr. j. l. ij. addi possunt, vitandum tamen tempore criscos.

Vel præscribatur pulvis ex tribus salibus Rosencreuzeri ex omnibus tribus regnis, quem commendat in sua astronomia:

℞. *Bezoard. mineral.* gr. vj.

Θ *volat. C. C.* gr. iv.

*card. bened.* ʒβ. M.

℞. *C. C. sine Δe.* l. *unicorn. v. præp.*

ʒii diaph.

*cinnab.* ʒii ā gr. vj. l. viij.

*myrrh.* gr. iij.

Θ *volat. C. C.* vel *viperar.* gr. viij. M.

℞. *ebor. f. Δe f. pulv. diaph. Lud.* gr. xv.

ʒii diaphor. ʒβ.

Θ *volat. C. C.* gr. v. M.

Capiatur in sequenti vehiculo:

℞. ∇ *fl. samb.*

*scabios.* ā ʒj.

*syrupi papav simpl.* ʒvj.

*card. bened.* ʒij. M.

Wenn es bey innerlicher Hitze dem Patienten hart im Kopff lieget / und er nicht wohl schlaffen kan:

℞. *ebor. f. Δe*

*cinnab.* ʒii ā ʒβ.

Θ *volat. C. C.* gr. v.

*camph.* gr. j. M.

℞. *C. C.*



- ℞. C.C. f. Δe ʒj.  
Bezoard. min. ʒij.  
☞ sigillat.  
unic. fossil. ā gr. xv.  
land. opiati ferm. gr. jv. M. pro 4 dof.  
℞. Conserv. pulv. citri ʒjβ.  
elect. diascord. Fracast. ʒiij.  
ʒii diaphor. ʒj.  
c. l. q. succi citri f. Electuarium.

Juxta cum dictis remediis alexipharmacis propter sitim, etiam interdum propter æstum, item propter debilitatem ægrorum in & post sudorem, subinde scil. pro scopo alexipharmaco & alterativo, julepi blandè aciduli confortativi commodè propinantur, inter quæ eminet citrus, succus citri, & omnia cum citro parata, & ~ nitri dulcis. Ordinetur ergo decoctum citri Mynsichtii suprâ insinuatum pro julepo, aut julepus ex decocto citri cum radice scorzonera, quem habet Fehr de scorzonera p. 61.

- ℞. Pom. citri rec. N. ij.

Incide cum corticibus in talcolas tenues;

adde  
sacch. albiss. ʒiij.  
rad. scorzon. ʒij. l. ʒiij.  
▽ fons. lbvj.

Coqu. ad tertias, & colentur.

Vel julepus ex decocto citri, cum quo Rosarum elicienda, ad imitationem Tilemanni de Mat. Med. pag. 9.

- ℞. Pom. citria N. ij.

In talcolas dissecta conspergantur cum  
saccharo albo:

Coqu. in f. q. ▽ x ad mens. β.  
Colatura frigida detur sola.

Vel etiam cum ea, & succo citri Rosarum extrahatur, & cum syrupo de toto citro, omisso saccharo, edulcoretur.

- ℞. Decoct. C. C. c. rad. scorz. lbj.  
℞ fl. aquileg.  
pæon. a ʒj.  
syr. acetos. citri ʒjβ.  
rubi idai ʒvj.  
~ Di q. f. ad gratum saporem.  
℞. Rasur. ligni sassafr. ʒβ. ad ʒvj.  
Coqu. in f. q. ▽ lbjβ.

adde  
succi citri rec. ʒjβ. ad ʒij.  
syr. extoto citro ʒjβ.  
~ Di dulc. q. f. M.

- ℞. Decoct. rad. scorz. c. C. C. lbj.  
gelat. C. C. ʒj. ad ʒjβ.  
succirubi idai ʒij.  
citri ʒj.  
syr. acetos. citri q. f. pro grato sapore. M.  
℞. Decoct. C. C. lbj.  
succigranat. ʒj. l. ʒjβ.  
ribium ʒvj. l. ʒj.  
elect. diascord. Frac. ʒjβ. l. ʒij.

Tom. II.

- syr. rubi idai ʒj. ad ʒij.  
~ Di dulc. parum. M.  
℞. ▽ fonsan. lbj.  
gelat. C. C. ʒjβ. ad ʒij.  
syr. rubi idai. ʒj. l. ʒij.  
pap. albi ʒj.  
~ Di dulc. ʒj. M.

Egregiè etiam convenit infusum ex floribus cum ~ u ʒis sub forma julepi propinatum.

Quibus placet, etiam decoctum tamarindorum usurpare possunt, quando nempe alvus nonnihil liberanda venit, v. g.

- ℞. Decoct. tamarind. c. passul. lbj.  
syr. acetos. citri  
rubi idai ā ʒj.  
~ Di dulc. parum. M.

Pro viribus refocillandis:

- ℞. ▽ rubi idai ʒij.  
cordial. Herc. Sax. frigid. ʒj.  
succi citri rec. ʒvj.  
conf. alchem. ʒj.  
syrupi acetos. citri l. rubi idai ʒj. M.

Inter externa ad promovendum sudorem non inconsultum est, ut eo tempore, quo in febribus malignis & pestilentialibus internè propinantur remedia sudorifera alexipharmaca, simul imponatur panis parvus recens, & calens ex furno extractus, qui ablatâ crustâ inferiore paululum excavetur, & in cavitatem theriaca imponatur, hinc vinum generosum infundatur, & ita calidè umbilico imponatur; fit enim exinde, ut panis, dum æger sudat, venenum malignum se insinuet: adeoque interdum ubi umbilico adhæserit, colore cæruleo imprægnatus repertus fuit, utpote quod dicunt certum malignitatis signum. Panis remotus sepeliendus, ne aliàs homini vel bruto nocere possit.

Quod si funestum illud symptoma, hæmorrhagia nempe narium, urgeat in febribus malignis, epithemata fronti applicata conveniunt. Sed inter alia remedia confert bufo exsiccatus in umbra, contusus, & sub axillis applicatus:

Diarrhœa si urgeat, pulvis Pannonicus ruber ā ʒj. ad ʒij. item theriacalia & opiata cum sudoriferis fixioribus usurpata sunt convenientia.

- ℞. C. C. usti præp. ʒj.  
boli Arm. l. unic. foss. ʒβ.  
M. f. pulvis. S.  
Anhaltend Stärck = Pulver.  
℞. ☞ sigillat.  
C. C. sine Δe ā gr. xij. ad xv.  
Θ volat. C. C. gr. vj. M.  
℞. ▽ fl. samb. ʒiij.  
~ theriac. simpl. vel camph. ʒiij.  
C. C. f. Δe ʒj vel usti præp. ʒβ.  
☞ sigillat. l. unic. fossil. ʒj.  
syr. acetos. citri ʒjβ. M.

(Uu)

Quando

Quando stomachi symptomata, vomitus, cardialgia, &c. urgent:

℞. *tacamah.* p. iij.

*bals. Peruv.* part. j.

Blando Δe liquefacta malax. c. f. q. theriac, extendantur super alutam in forma scuti stomachalis:

D. S.

*Magen-Pflaster.*

Ad præcavendas cephalalgias & deliria, epithemata capiti applicari possunt:

℞. ∇ *verben.* ℥iij.

∇ *camphor.* ℥j.

*opii* gr. v.

M. f. Epithema.

cum linteis multiplicatis tepidè applicetur.

Quando fauces sunt siccae & aridae, sine crustæ pituitosæ præsentia, optimum observavi remedium:

℞. ∇ *comm.* ℥j.

∇ *rectif.* ℥j. vel ℥jss.

*mell. cochl.* j. l. ij.

Mista usurpentur pro oris collutione.

## CAPUT VII.

De

### *Morbo Castrensi.*

**U**bi in febre maligna observatur intensissimus capitis dolor, unâ cum affectibus ventriculi anxiosis, in specie cardialgia horrenda, vocatur morbus Hungaricus seu febris castrensis, cum imprimis in castris inter milites ex squalore castrorum oriri soleat. Est maligna admodum & contagiosa præcæteris, trigâ symptomatum acerbius affligentium stipata; nempe

1. Gravi cardialgia & anxietate; hinc
2. Intolerabili cephalalgia, agrypnia, indequæ gravissimis deliriis; ac denique
3. Graviore prunella.

Quibus & dolor f. lassitudo artuum & ostocopos, & subinde alvi fluor se solent sociare. Germanis *die Haupt-Krankheit / die Ungarische Krankheit / die Hirntobende Eucht* / appellari solet. De hoc morbo tractavit Martin. Rulandus, aliique plures.

### C U R A.

Præmissio vomitu supra dictis remediis curari debet, sudorem subinde imperando. Hinc etiam venarum raninarum sectio, respectu nempe prunellæ; loco quarum venam frontis quidam secare amant, respectu habito ad cephalalgiam & deliria.

Remedia inter pro julepo commodè intervit decoctum C. C. cum succo citri; pro diaphoreticis ~ theriacalis camphoratus, li-

quor cornu cervi succinatus, electuarium diascordii Fracastorii, cinnabaris nativa & antimonii, pulvis Pannonicus rubeus à ℥ss. ad ℥ij. imprimis hic pulvis Wittichii laudari solet, sudorem foetidum pellens:

℞. *fl. Δis* ℥j.

*succini albi*

C. C. f. Δeā ℥ss. ℥ss.

∇ *sigill.* ℥ss. l. ℥ij. M.

Propinetur cum ∇ card. bened. vel cum vino absinthite, præprimis, si cum rigore invaserit affectus.

Quibus & ∇ antimoniatum, præsertim in potu, subinde addi potest.

Hungari sequenti utuntur Euporisto:

℞. Alliibulbum, quem ∇ imbibunt & contundunt, & hac puliculâ corpora ægrorum fortiter fricando inungunt, ac deinde linteaminibus benè cooperiendo ad sudorem componunt: quò peracto statim levamen acquirunt.

Contra prunellam, quæ imprimis urget morbo Hungarico affectos:

℞. *semperviv. maj.* qu. v.

Contund. ac pro singula ℥ss. adde

∇ *\*ci* ℥ss.

Reponantur loco humido subterraneo, donec ∇ liquefactus sit, hinc l. quior expressus & filtratus, vel idem prius per alembicum destillatus pro eluendis faucibus & collo adhibeatur.

Vel ℞. *aqu. semperviv. maj.* ℥ss.

*succi ejusdem* ℥ij.

∇ *\*ci* ℥ss. M. pro gargarismate.

## CAPUT IIX.

De

### *Febribus Petechialibus.*

**Q**uando in febre maligna hinc inde se manifestant maculæ corporis cutim tingentes, propriè petechiæ & febris petechialis dicta, Germanis *das Fleckfieber* / præ aliis frequens; aliàs etiam febris pulicaris, lenticularis, pedicularis, puncticularis vocatur.

Observerur tamen primariò, quod sæpius quidem in morbis malignis erumpant maculæ, quæ constituunt febrem petechialem, non tamen præcisè sunt signa pathognomonica febris malignæ; multi enim sunt morbi, in quibus apparent maculæ symptomaticæ, utut non præcisè sint morbi maligni. Sic interdum in febribus tertianis sub fine paroxysmorum subinde maculis coloratur corpus ante sudorem, quæ post sudorem evanescent, utut non adsit febris maligna: ita etiam in scorbuto, leviori licèt, subindè rubicundis maculis tingitur cutis, utut ægri nihil de malignitate conquerantur. Habent hoc singulare imprimis febres scorbuticæ, ut

macu-

maculæ pulicum moribus similes, interdum etiam graviores, in partibus erumpant, absque tamen malignitatis nota: κατ' ἐξοχήν tamen maculæ istæ maximè apparent in febribus malignis, petechialibus idè dictis, quales interim febres cum maculis comitatæ copiosissimis, præ aliis malignis, cæteris paribus, magis videntur lentæ, minùsque acutæ, periculosa tamen esse solent, ægrique ad tertiam usque crisin seu ad 20. diem jacent, & nesciunt, utrum convalescant, an verò pereant?

Symptomata harum febrium, præter reliqua cæteris malignis communia, sunt insignis lassitudo totius corporis, dolor ejus contundens & lancinans universalis. Vires simul mox insigniter prostratæ, febre nihilominùs miti adhuc existente: Nam calor non adeò vehemens est in toto corpore, minùsque mordax, quàm in ardente etiam mitiore: ferè tamen vespertino tempore intendi observatur; imò interdum in principio tam mitis est, ut æger vix se ægrotare sentiat. Hinc supervenit intensissimus & continuus dorsii ac capitis dolor gravativus, agrypnia, anxietates, & jetigationes, in principio facilè, in progressu difficulter, in statu planè non sudant, vel spontè vel medicamentorum ope: interdum interdum quietiores, noctu anxiosi magis redduntur, & graviùs affligi solent. Inde, præter ea, quæ suprà de causa febrium malignarum dixi, lymphæ simul ab acido volatili acri peccante insigniùs inquinari, colligo & existimo: hinc enim est exacerbatio vespertina & nocturna, sicut & difficultas sudoris inde derivanda venit. Subinde alvi fluxus variorum spumosorum, utpote foetidissimorum, excretorum supervenit, quæ omnia & aliis malignis sunt communia: saltim quod maculæ raro quarto, sæpius circa septimum, erumpere soleant, præsertim circa pectus & scapulas; hinc & abdomen, & crura: tandem etiam brachia iisdem tinguntur; facies ordinariò libera esse solet. Maculæ hæ non solum externas, sed etiam internas partes affligere solent, teste Castro *de Peste* p. 76. Interdum non maculæ solum, sed etiam vibices in his febribus apparent: vid. Major *Dissert. de Chirurg. Infus.* p. 260. Deliria quoque & convulsiones frequentissimè in statu superveniunt, quo tempore etiam in morbo salubri, & multo magis in declinatione, quasi ptyalismus quidam observatur. Continua ferè esse solet hæc febris; hinc rarum est, intermittentem eandem fuisse observatam à Fehr *de Scorzon.* pag. 72.

Confundi interdum solent pulicum morsus cum petechiis, sed notandum: quod pulicum morsus seu maculæ in centro suo habeant punctum ruberrimum, morsus vestigium, quod deficit in petechiis: Præterea pulicum morsus appositâ farinâ lupinorum, cum aceto aut

Tom. II.

oxymelite subactâ subito evanescent; maculis verò malignis seu petechiis applicata, nequaquam, autore Zacuto Lusitano *lib. 3. Prax. Admir. Obs.* 14. Maculæ hæ in morbo salubri intensè rubent instar pulicum morsuum, hinc pedetentim pallescunt, flavescent, sicque evanescent; & quò magis rubicundæ sunt, eò melioris sunt notæ; è contra, quæ ex rubore livescunt, seu, ut aliàs loquuntur, plumbei coloris sunt, vel quæ nigrescent, à Belgis *Peperforis* dictæ, hæ ipsæ omnium pessimæ sunt; & quo magis tales, eo deterioris sunt conditionis, quia hæ extinctionis seu destructionis spiritus insiti notitiam ingerunt: Nempe, sicut acida corrosiva partes mortificando, vegeto adhuc spiritu, colorem primo rubrum, hinc spiritu deficiente album efficiunt, penitus vero extincto spiritu & putrescente parte nigrum colorem inferunt; ita quò major est virulentia malignitatis, indeque superficiei cutis major vel minor mortificatio, eo etiam color magis vel minùs lividus aut nigricans esse solet. Unde & petechiæ veluti inustæ escharam simul inducentes observatæ fuerunt: vid. *M. A. N. C. Ann. 6. Observ. III. pag. 148.*

#### C A U S A E.

Petechiales hæ febres ferè primitùs ex corruptela interna contentorum oriuntur, adeoque tam massam sanguineam aliosque humores, quàm spiritus, virulentia suâ afficiunt: sanguis nempe corruptus, & à fermento acido volatili acri putredine inquinatus, & ob id à reliquo sanguine separatus, feròq; imbibit, hujus vehiculo (dù expirationi omnimodè ineptus est) subcuticula circa glandulas miliares defigitur, & ibidem hærendo maculas infert; contagiosa tamen admodum sunt, ipso tamen contagio minus spirituofo, minùsque activo existente, ut latere aliquandiu queat, antequam se exferat. Interdum epidemice grassari observantur: Vid. Fehr *l. a.*

#### PROGNOSIS.

Febris petechialis, quo magis blanditur, eo magis nocet: sæpè cum omnia pacata apparent, mors imminet: sæpè morti vicini præter expectationem evadunt. Aliàs periculosus valdè est morbus, quò plures moriuntur, quàm evadunt, annotante Horatio Augenio *T. 1. l. 5.* & Sennerto *de Febribus, pag. 537.*

Maculæ purpureæ quò plures, quò majores, & quò benigniores, item si criticè erumpant, naturæ victoriam præfagiunt; contrà verò, si contrariò se habent modò.

Quod si fiat, ut retrocedant, ingens periculum imminere solet.

Quò magis latæ, copiosæ, & bonè coloratæ, nempe rubicundæ seu sanguineæ sunt maculæ, eò est meliùs signū: virides enim & flavæ maculæ sunt deteriores; cæruleæ, lividæ & nigrae sunt omniū pessimæ, cū viriū debilitate magnum periculum portendunt, malignitatis mortis-

(Uu 2)



mortificantis indices; colore autem cicerum minus sunt periculosa.

Maculae paucæ, febre magis ingravescente, & urina cruda existente, ferè sunt lethales. Maculae, quæ subito disparent, aut recurrunt, periculosissimæ.

Criticè dixi erumpere deberemaculas & pustulas: Nam, quæ ante signa aliqualis coctionis erumpunt, aut quæ inordinate paucæ, neque benè coloratæ prodeunt, ex periculosa sunt; motum enim naturæ coactum innuunt, sæpiusque recurrunt. Quò magis cum macularum eruptione coctionis signa apparent, eò melius. Erumpere ergo debent copiosè & bene coloratæ, die 7. 1. 10. 11. 12. &c. præcedentibus aliquilibus coctionis signis.

Hæmorrhagia parca suspecta: larga in incremento die critico, aut indicatorio, erumpens, bona; post maculas vero jam efflorescentes suspecta.

Excrementa alvi nigra & foetida, sunt periculosa.

Quoad tempus eventus: minus quàm alia maligna acuta esse solent, sed lentè quasi sua tempora percurrunt, ita, ut *in statu* 6. 8. & plures dies eodem tenore persistant ægri, antequam vel in melius, vel in deterius fiat mutatio: Vid D. Burser, de febre petechiali.

Quoad modum eventus: Qui morbum non negligunt, & statim sub initium utuntur remediis commodis, faciliè interdum liberantur, nonnunquam 11. 12. aut 14. die; qui vero curationem differunt, & aërem liberiores non devitant, diutius decumbunt, sæpius succumbunt. Interim tamen, si omnia ritè procedant, nec vires adeo sint prostratæ, ferè intra 14. dies acutorum more cessant.

Solvitur equidem interdum per criticam hæmorrhagiam narium, vel sudationem, vel urinam, quod tamen raro apud nos contingit, quin successivè apud nos per diaphoresin autem evanescere soleat. Interdum etiam metastasi producti morborum seu materiarum coctæ in quendam locum finitur: sic per apostema in testibus febrem petechialem terminari aliquoties observavit Rolsnecius.

Recurfus seu retrocessio macularum & pustularum fit ita: Miasma malignum volatile cursu morbi figitur & quasi præcipitatur, & intra cutim ac cuticulam deponitur: sed ex sanguinis effervescencia ferociore, dum nondum sit perfectè fixum, fit, ut retrocedat, & præsentaneam mortem interdum insinuat, ad quod multum simul contribuit ambientis aëris frigus.

### C U R A.

Nihil singulare obtinet, sed eadem Indicationes atque suprà circa febres malignas in ge-

nere insinuatæ fuerunt, etiam hinc speciatim observari aut applicari debent vel possunt: Saltim observentur hæ cautela:

I. Vomitoria in petechialibus præ aliis malignis maximè proficua esse: cum mox à priori principio graves anxietates soleant prehendere ægros, quas curare, earum incrementum præcavere, & ita longè quietiores reddere possumus ægros, propinato maturò vomitorio: purgatio, nisi in primo ferè principio, nocet, experientiâ teste, quòd aliàs ad diarrhæam de facili proclives sint petechiis laborantes, quæ maximè est lethalis: Quin & apparentibus jam petechiis, aut maculis, à quocunque stimulo abstinendum, & ne quidem ad clysmata aut suppositoria faciliè est accedendum, ne impediatur naturæ motus.

II. Venæsectio nullius usus est, cum febris ipsa minoris sit conditionis, magisque urgeat malignitas, utut Menjotius *de febr. mal.* eam tanquam remedium, naturam oneris aliquâ parte levans, commendat; lethalem eam docet esse Forestus *in Schol. Observat.* 36. 1. 6. Novam verò ostendunt Bartholini *Acta Med. Hassniens. Volum. 2. pag. 290.*

III. Sudorifera ergò primatum ducunt, speciatim in principio & incremento, dum adhuc sudare possunt ac solent ægri; unde subito tempore volatilia, in specie theriacalia, tutissimè adhibentur: in progressu verò morbi ac statu fixioribus saltem indulgendum, devictâ jam prioribus malignitatis atrocità, jamque, quod reliquum est, naturâ operante. Quod si gravior sit malignitas, ad minimum ter in 24. horis porrigenda sunt remedia. Observanda tamen hinc cautela, quod pro varietate circumstantiarum possimus variare medicamenta, propinando nunc absorbentia, nunc sudorifera volatilia; nunc sola, nunc mista invicem cum acidis. Sudor autem non excitetur nimis, quin virium semper habeatur ratio, propter quem respectum nec linteis nimis vel stragulis opprimendus est æger, sed tolerabiliter saltem contegendus.

IV. Observandum: an petechiarum eruptio sit morbus? an productum morbosum? an excretio symptomatice, an verò critica? quod petechiis intèpestivè, h. e. symptomatice potius quàm criticè erumpentibus non insistendum sit nimio perè sudoriferis, sed potius effervescentiam nimiam sistentibus, adjunctis simul alexipharmacis, utendum. Hinc enim rectè Johannes Stephani *in Operibus Medicis Decad. 9. Conf. 6.* inquit: *Minus sunt tolerandi ii, qui quamcunque cutis efflorescentiam petechiarum nomine dignantur, etiamsi aut febris sit intermitiens, aut in se mitissima.* Petechiæ enim genuinæ sunt symptomata febris pestilentialis, con-

jun-

junctæ cum fervore sanguinis. Hæ ergò, dum criticæ sunt, id quod fit cum ægri aliquo levamine, promoveri debent blandis sudoriferis, quæ inter nihil melius est emulsione istâ ex seminibus suprâ nominatis expellentibus propinata. Ubi verò petechiæ in principio vel in incremento quidem erumpunt, sed sparsim & spontè evanescent, itemque debilitetur æger, tunc excretio erit symptomatrica, ubi neglectis sudoriferis validis potius cum temperatis acidis alexipharmacis fervor sanguinis refrænari debet, neque prius excretionem promoveamus, nisi factâ sufficiente præcipatione sanguinis, sudoriferis debitis earum proventus promovendus.

V. Apparentibus jam petechiis, abstinendum non solum est à fortiter laxantibus, sed etiam clysmata cautè, nec nisi blanda, atque non, nisi necessitate urgente injicienda. Maculis autem jam apparentibus superveniens forte alvi fluxus, hic cautè est tractandus, & non adeo subito, nec simpliciter supprimendus, nisi aut copiâ excesserit, aut maculas retrocedere faciat, aut sensibilibus ægrum debilitet: Est enim interdum quodammodò naturæ motus evacuationem materiæ sensibilis molientis, & ob id non incautè supprimendus; idque præsertim, si affectus non tam ex contagio, quàm interno spontaneo vitio contentorum ac corruptela originem duxerit, ita tamen regatur, ut macularum expulsio, quantum possibile, promoveatur, non verò ab isto alvi fluore cohibeatur. Verùm, licet non sistatur talis alvus fluens, sedulo tamen insistendum & sudoriferis & alexipharmacis, quo ita magis derivemus naturæ motum ad exteriora, ac ita sponte cesset fluor iste. Contrà cum tales alvi fluxus alio tempore venientes sint symptomatrici, & subindè lethales, propterea cum alexipharmacis miscenda simul interdum adstringentia blanda, ut ita successivè fluor sufflaminetur, ac omne malum præcaveatur.

VI. Si ulla est febris, in qua vesicatoria conveniunt, est imprimis petechialis, speciatim quando retrocesserint maculæ: raro enim aut nunquam denuò apparere solent, sed vel supervenientibus nervosi generis symptomatibus, nempe deliriis & convulsionibus, ægri intereunt, vel successivè per auctam diaphoresin saltem morbus solvitur. Ut ergò anticipitali in casu ægrum levemus; item si aliàs graviora nervosi generis symptomata imminuant, ut ordinariò in statu harum febrium assolet fieri, consultissimum est, maturè applicare vesicatoria in pedibus ac brachiis, prout plus minus urgent symptomata: Vid. Sanctorius in *Meth. visandorum errorum* pag. 841. M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 214 p. 315.

VII. Quoad dictam: in æquali calore naturali conservandi sunt ægri, vinum imprimis moderato usu conducibile est. Sic enim Henricus ab Heer *Obs.* 5. refert, mulierem in febre petechiali pro desperata habitam, vini usu restitutam. Confer. etiam Bartholinus *Centur.* 6. *Hist.* 7. *Fehr descorzon.* p. 173. Potui ordinariò instilletur R. Horum aquilæ, quæ præ cæteris convenit ad expellendas petechias.

Quoad remedia ipsa: nil singulare, quod non suprâ de febribus malignis in genere dictum fuerit, monendum occurrit. Saltem in principio magis sudoriferis, præsertim volatilibus, in statu verò fixioribus, blandè temperantibus & absorbentibus, magis utendum: ut C. C. Oare, bezoardicum Vialæ, cinnab. ʒij vel nativa, utendum. Hinc in principio;

℞. C. C. f. Δe  
ʒij diaph. à ʒj.  
S volat. C. C. gr. xij.  
M. f. Pulvis pro 2. dolibus.

D. S.

Ausstreibend Schweiß-Pulver.

℞. ʒij diaph.  
cinnab. ʒij à ʒj.  
Sis vol. viper.  
C. C. à gr. jv.  
camph. gr. iij. M.  
℞. pulv. diaphor. Ludov. l C. C. f. Δe  
ʒij diaphor. l. bezoard. Car. a ʒj.  
S volat. C. C. gr. v. l. vj. M.  
℞. ∇ cord. Herc. Sax. ʒj.  
Mixt. simpl. ʒij.  
C. C. essent. ʒj.  
Syr. ex toto citro ʒij. M.

Item aliquoties in principio & incremento proficuum expertus sum hanc potionem:

℞. ∇ fl. samb l. mensha. ʒij. l. iij.  
+ i acerr. l. simpl. l. destill. aur flor.  
samb. ʒj. l. ʒj. ad ʒj.  
Theriac. l. Mithridat. ʒi. l. ʒij. ad ʒij.  
ʒij diaphor. ʒj. l. ʒj. ad ʒj.  
myrrh. gr. vj.  
Syr. card. bened. l. rubi Idæi l. acetos.  
citri ʒij. ad ʒvj. l. ʒj. M.

℞. ∇ fl. samb.  
ceras. nigr. ʒj. ʒj.  
theriac. ʒj. ad ʒij.  
C. C. f. Δe ʒj.  
specif. cephal.  
ʒij diaphor. à ʒj.  
S volat. C. C. gr. xij.  
Syr. ex toto citro ʒvj. M.

Postmodum verò in & prope statum convenienter usurpari potest emulsio, supra de febribus malignis in genere ex seminibus expellentibus præscripta.

(Uu 3)

Item

Item *℞*.  $\nabla$  fl. samb.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 ceras. nigr.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\nabla$  camphor.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 C. C. f.  $\Delta$ e  $\mathfrak{z}$ ij.  
 Bezoard. min.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\odot$  volat. succini gr. ix.  
 syr. fl. tunica  $\mathfrak{z}$ ss. ad  $\mathfrak{z}$ vj. M.

*℞*.  $\nabla$  scabios.  
 mentha.  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ijss.  
 gelat. C. C. rec.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\mathfrak{z}$ ii diaphor. gr. xv.  
 syr. card. bened.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
*℞*. Decocti rad. scorz. c. C. C.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 succi citri rec.  $\mathfrak{z}$ j.  
 elect. diasc. Frac.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\mathfrak{z}$ ii diaphor.  $\mathfrak{z}$ j.  
 bezoard. min.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 syr. card. bened.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
*℞*. ras. ligni sassafr.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 rad. scorz.  $\mathfrak{z}$ vj.

Coqu. inf. q.  $\nabla$  simpl. vase clauso: Colat.  $\mathfrak{z}$ ss. j.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 adde

Vini Rhenani  $\mathfrak{z}$ vj.  
 gelat. C. C.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 syr. rubi idai  $\mathfrak{z}$ ss. M.

In statu, dum summa urget virium prostratio, usurpari possunt potiones analepticz.

*℞*.  $\nabla$  scabios.  $\mathfrak{z}$ ijss.  
 cord. Herc. Sax.  $\mathfrak{z}$ vj.  
 cinnam.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 Conf. alcherm.  $\mathfrak{z}$ j.  
 Bezoard. Car.  $\mathfrak{z}$ j.  
 syr. rubi idai  $\mathfrak{z}$ ss. M.

Ubi petechiæ cum hæmorrhagia, dysenteria, aut diarrhœa conjunctæ, D. Michaelis usus est solutione terræ solaris. Convenit quoque terra sigillata:

*℞*.  $\mathfrak{z}$ ii diaphor.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\mathfrak{z}$  sigillat.  $\mathfrak{z}$ j.  
 Extract. theriacal.  $\mathfrak{z}$ vj. M. pro 1. dos.

Capiantur cum vehiculo calido, expectando blandum sudorem:

*℞*.  $\nabla$  menth.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\times$   $\mathfrak{z}$ j.  
 elect. diascord. Frac.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 syr. cydon.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\sim$   $\odot$ i dulc. gtt. xv.

Misc. pro Potione: S.

### Anhaltende Schweiß- und Störck-Mixtur/ Löfelfweise.

Externè pro hæmorrhagia narium sistenda, optimè appenduntur, aut sub axillis alligantur bufones.

In adjuncta dysenteria, aut alia diarrhœa theriaca cum vino generoso fervidè stomacho & hypochondriis sæpius applicari potest.

Sæpè in febribus petechialibus stomachi urgent symptomata, ad quæ conveniens remedium est, laterem leviter coctum ignire,

& aceto vini optimo ac  $\nabla$  menthæ eundem extinguere, & hinc linteo involutum ad dorsum, aut etiam è regione ventriculi applicares: sin exaruerint, secundâ vice ignitus, & solo aceto vini adpersus applicetur.

Commodè etiam scutum stomachale potest præscribi:

*℞*. cerat. de lad. stomach.

Theriac. Androm. q. s.

Malaxata inducantur super alutam.

*℞*. tacamah. part. ij.

cerati stomach. p. j.

Liquefacta subigantur largiter cum theriaca Andromachi q. s. & applicetur. D. S.

### Magen-Pflaster.

Sunt, qui epithemata fronti, præcordiis, &c. applicare solent: sed malè. Quia enim de facili refrigerantur, clausuræ pororum occasionem suggerunt, & ita petechiarum eruptionem impediunt, aut eas faciliùs retrocedere faciunt. Tutius balsamo oleosa usurpantur, v. g. oleum araneorum compositum Mindereri, scorpionum, &c.

*℞*. & scorp. compos. Matth.  $\mathfrak{z}$ j.

destillat. melissa,

ruta,

citri  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ss.

M. pro linimento scrobiculo cordis & pulsui applicando.

Vel idem cum oleo nucis moschatæ expresso misc. in formam Balsami: S.

### Euserlicher Balsam.

Veteres in usu habuerunt litum externum, quando petechiales maculæ, aut similes excretionem cutanæ, nolunt convenienter prodire: Instituerunt frictiones seu inunctionem externam cum nitro. Unguentum sit tale:

*℞*.  $\mathfrak{z}$ ci amygd. amar.  $\mathfrak{z}$ ij.

Vini Rhenan.  $\mathfrak{z}$ vj.

$\nabla$  cham.  $\mathfrak{z}$ ss.

$\odot$ i  $\mathfrak{z}$ ij.

Bulliant ad consumptionem  $\nabla$ x, & colaturæ.

D. S.

### Euserlich Gäßlein.

Linimentum hoc toti corpori affricetur, in specie dorso, ad evaporandam materiam malignam è corpore, in febribus malignis & petechialibus, præsertim, quando non bene procedere vult sudor: factâ enim corporis inunctione, & propinatis hinc sudoriferis, sufficienter admodum sudorem promovere solent.

Paulò aliter præscribit hanc inunctionem Brunnerus in Consil. 42. sequenti modo:

*℞*.  $\mathfrak{z}$ oci chamom.

amygd. amar.  $\bar{a}$   $\mathfrak{z}$ ss.

$\odot$ i



℞i pulveris. ℥iij.

℥ chamom. ℥j.

M. & coquantur.

Cui substitui potest oleum scorpionum simplex; Vel

℞. ℥ chamom.

ruta,

scorp. ā ℥℥.

℞i ℥iij.

Misc. f. Linimentum.

## CAPUT IX.

De

### Febre Purpurata.

**A**D malignas hujusmodi febres pertinet etiam nostra febris purpurata, *der Griesel* dicta, qui alias morbus & febris miliaris dicitur in M. A. N. C. ann. 3. obs. 281. p. 397. à pustularum exilissimarum, milium magnitudine æquantium, efflorescentia; item morbilli ignei quibusdam vocatur: vid. M. A. N. C. ann. 6. obs. 42. quo loco etiam obs. 145. p. 205. Purpuræ epidemicæ malignæ infantum fit mentio.

Febris hæc est vel benigna, seu scorbutica, vel maligna, febri continuæ malignæ juncta: quosvis quidem adurit, mares & fœminas, infantes & adultos, frequentius tamen apud nos puerperas, quibus & malignior magis & funestior in specie existit, forsan mensium retentorum occasione; & infantes recens natos. Estque vel rubra, quæ forsan illud morbi genus est, quod rubeolam, *Rötheln* dicunt; vel alba, instar hydatidum plenæcentium: unde vocatur *der rothe und weisse Griesel*: Interdum etiam extra puerperium febris maligna purpurata accidit. Propter symptomatum vehementiam, morbi brevitatem & periculum, commodè inter febres acutas refertur; utut purpura rubra in plethoricis & scorbuticis, nec non aliis morbis cum multo sudore, & quovis alio tempore sine omni febre & symptomatis, excepto pruritu molesto, frequentius observetur.

Incipit autem febris hæc sub specie synochæ, ut plurimum cum rigore, quem mox insequitur incalescentia totius corporis, anxietas præcordiorum, inquietudo summa, oculorum rubor, interdum cum dolore capitis, semper cum agrypnia, & levissimo circa caput, pectus atque dorsum sudore. Urina ut plurimum in principio sanorum est similis, aut parum admodum à statu naturali recedit: in puerperis verò lochia notabiliter satis imminuuntur, aut planè cessant. Temporis progressu & sub morbi incremento ad sextum usque diem ægri circa præcordia, scapulas, cervicem, denique totum corporis habitum, de ardore cum lancinationibus, acuum pun-

cturis similibus, interdum pruriginosis, conqueri solent, cutisque simul asperior redditur cum aliquali rubore. In statu verò morbi omnia symptomata cum febre exacerbantur, urina est cruda, & quidem vel tincta & pellucida manet, vel cum sedimento multo turbatur, & asperitas illa in efflorescentias miliares attollitur, nunc copiosiores, nunc pauciores, quæ levi accedente aurâ, & levi denudatione in lecto evanescent, cum anxietatibus, difficili respiratione, summa virium prostratione, frequentius cum delirio, convulsionibus epilepticis, & catarrho suffocativo. Solvitur tandem morbus hic raro per diarrhœam, interdum insensibiliter ferè & per madorem, in puerperis sæpè per lochia, ubi exanthemata hæc sensim sensimque evanescent, & cuticula cum pruritu quodam in squamas seu furfures abit.

### CAUSÆ.

Originem debet hæc febris salis volatili acri, massam sanguineam turbanti: quod tamen subactum, & acido sui generis maligno saturatum, in forma salis tertii sero involuti infra cuticulam sub poris apponitur: hoc enim, ubi secretum & devictum fuerit, atque ad loca intercutanea propullum, horum ardor, pruritus insignis, hinc cuticulæ excoariatio & desquamatio, &c. excitatur. Nasci videtur purpura simul ex radice scorbutica: nam scorbutus, uti talem affectum purpuræ benignum sine febre interdum infert, ita si tales plus minus scorbutici malignâ corripiantur febre, tandem in purpuræ efflorescentiam abeunt.

### PROGNOSIS.

Subinde acutus, non raro præceps, est affectus, qui dum maximè videtur blandiri, etiam ex levissimo errore subito jugulat: easdem enim cum febribus malignis circumstantias observat, ita tamen, ut excretio hæc cutanea non sit critica, sed symptomatica, & pro morbo seu febre solvenda sola vix sufficiat, dum nunc sub purpura copiosiore, nunc parciori, ægri intereunt. In specie periculosior est purpura alba, & quæ in puerperis cum lochiorum suppressione & diarrhœa symptomatica contingit.

### CURA

In cura purpuræ ac febrium purpuratarum, præter generalia ista, quæ suprà de febribus malignis in genere dicta fuerunt, observandum in specie:

I. Quod, licet alvus ad aliquot dies notesque pertinaciter adstricta sit, non solum fortiter laxantia, sed & clysmata lenissima sint periculosissima, nec nisi blanda, atque non, nisi necessitate urgente, injicienda.

Irr-

Irritata enim alvo transpiratio cessat, efflorescentiæ cutis evanescunt, & dein mors sequitur. Quod si alvi fluxus symptomaticus & subinde lethalis superveniat, cum alexipharmacis simul miscenda adstringentia blanda, ut ita successivè fluor in hoc casu periculosus sufflaminetur, & omninò malum præcaveatur.

II. Si purpura est alba, cautè est tractanda, neque extra lectum, dum sterni fortè debet, promovenda est ægra; si enim se extra lectum conferat, vel à levissima saltem aura frigida affletur, retrocedit purpura. Unde jubeo, ut ægræ continuò contextæ maneant, utut lectus intro 3. vel 4. dies noctesque sterninequeat, cum si retrocesserit purpura, ut plurimum moriantur: In purpura verò rubra, cum ea sit mitior, magis possumus connivere.

In principio ergo morbi conveniunt absorbentia, feri ebullitionem compescuntia, imprimis pulveres bezoardici; quibus myrrha cum aliis fixis antimonialibus addenda: in specie rob sambuci cum cornu cervi sine igne. In statu ergò, ubi jam apparere incipit purpura, emulsio seminum expulsiworum; item liquor cornu cervi succinatus, castoreata, R coralliorum cum spiritu cordis cervi, & antiscorbutica, essentia myrrhæ, &c. v.g. in principio morbi,

- ℞. C. C. f. Δe  
 ℥ii diaphor. ā gr. xv.  
 Ssr card. bened. ℥℥.  
 myrrha gr. vj.  
 M. f. pulvis.  
 Div. in 2. part. æqu. S.  
**Ausstreubende Pulver.**  
 ℞. Specif. cephal. ℥℥.  
 bezoard. min. ℥j. M.  
 ℞. ▽ Galeg.  
 fl. samb. ā ℥j℥.  
 pulv diaph. Ludov. ℥ij  
 ℥ii diaphor. l. antih. Poterii ℥℥.  
 syr. card. bened. ℥℥. M.

Item quando diarrhœa conjuncta, addatur  
 sigillata.

- ℞. ▽ card. bened.  
 fl. samb. ā ℥j℥.  
 ~ theriac. simpl. ℥iiij.  
 C. C. nsti prap.  
 ℥ii diaphor. ā ℥j.  
 ~ sigill. l. boli Arm. prap. gr. xj.  
 syr. flor. tunic. ℥iiij. M.

Reflexio quoque sæpè ad scorbutum facienda est, unde in tali purpura sequentem misturam præscribo:

- ℞. ▽ scabios.  
 scordii ā ℥j℥.  
 ~ cochl. ℥j.  
 ℥ii diaph.

Mag. corall. c. f. c. ā ℥℥. ad ℥j.

syr. card. bened. ℥vj. M.

Tempore excretionis:

℞. Mixt. simpl. l. R bezoard. camphorat. l.  
 essent. myrrhæ ℥ij. ℥iiij.

~ cochlear. ℥j. M.

℞. liqu. C. C. succin. ℥ij.

~ cochlear. ℥ij. M.

## CAPUT X.

De

### Variolis & Morbillis.

**V**ariolæ & morbilli singulare quid obtinent præ febribus malignis: nam ex se sunt saltem symptomata febris continuæ, seu synochi sui generis, nunc benignæ, nunc, & quidem sæpiùs, malignæ. Observatæ sc. sunt absque ulla malignitate, aut etiam quæ adfuerunt sine insigni effervescencia febrili in infantibus; dum hi potissimas functiones ritè exercent, per domum ac plateas decurrunt, &c. qualia exempla observat Schenkius l. 6. *obs. de febribus malign. & de variolis.* Interdum quoque adeo mites sunt variolæ, ut licet cum febre ardente junctæ fuerint, paucos tamen interficiant, ut potiùs quasi sponte convalescant. In hoc puncto Sydenham *de variolis benignis* est prolixus, ut ostendat, variolas & morbillos esse febres benignas. Opinio equidem vulgaris fert: omnes homines necessariò variolis corripì, sed ita, ut qui iisdem semel affectus fuerit, vix easdem de nuò patiat: ex qua præconcepta opinione hypothesis Arabum, in specie Avicennæ & Rhafis, nata est, sc. variolas nobis in utero materno ingenerari, ex relicto inquinamento sanguinis menstrui, à fœtu in utero attracti; quæ hypothesis multos hætenus habuit Patronos: sed antecedens est falsum, consequens irrationale. Nam quoad priùs: multi homines moriuntur, qui nunquam variolis & morbillis laborarunt; sicut è contra sunt exempla, quisc. aliquoties iisdem afflicti fuerunt; vid. Borellus *cent. 3. obs. 10.* de muliere, quæ septies variolas passâ fuit, & tandem anno suæ ætatis 118. his ipsis variolis tandem mortua fuit. Quod autem posterius sit contra rationem, patet ex eo, quod fœtus in utero non sanguine menstruo, sed potiùs nutrimento lacteo vel chyloso sustententur: deinde (2.) quod non omnes mulieres sint adeò morbolæ, ut necessariò exinde pro variolis fomitem contrahant infantes: (3.) si sanguis maternus corruptus esset causa certa variolarum, fieret, quòd aut lochiis suppressis, aut etiam mensibus, & sic necessariò corruptis, semper generentur in puerperis variolæ. Labilis ergò est hæc opinio, utut non sit negandum, natos esse fœtus morbillis & variolis affectos in utero mater-

materno, qualia observat exempla Schenckius *l. 6. observ.* & Bartholinus *cent. 2. epist. pag. 682.* Hildanus *cent. 4. obs. 55. 56.* & Platerus *Pr. tom. 3. pag. 250.* Hoc tamen certum est, plurimos homines, in specie infantes, iis corripere. Sed radicem obtinent reverà in sanguine fundatam, suntque nihil aliud, quàm sanguinis depuratio & quasi despumatio, mediante fermentatione febrili, quâ sanguis se depurat à remanentibus lacteis matris aut nutricis vitiatis, & plus minùs ab acido coagulatis, sanguinem inquinantibus: Unde talia inquinamenta fermentando separata unà cum sanguine tunc simul infecto præcipitantur per fermentationis modum, & intra cutim & cuticulam cum sanguine hinc inde deposita, acrimoniâ suâ parvulas inflammationes inferunt, & tandem suppurantur.

Observandum autem, (1.) quod non differant variolæ & morbilli, quàm secundum magis & minùs: (2.) peccent imprimis particulæ fermentativæ, lactis acore corruptæ, à qua acrimonia acida (3.) dolores lancinantes dorsi, ubi nempe partes membranaceæ & nervæ locum habent, quæ in principio vellicantur; convulsiones partium nervosarum, & paroxysmi epileptici, urinæ cruentæ ex erosione viscerum, aut etiam, quod sæpiùs contingit, ulcera, phthises seu exulceratio pulmonum, ossium caries & spina ventosa, notante id Hildano & aliis, de acido acri peccante, testantur: sicut hepar & alia viscera etiam interdum pustulis corripuntur, etiam variolis, unde phthisis. Conf. Sylvius *de morb. infant. cap. 9.* (4.) Acidum istud ex lactis inquinamento ortum, uti effervesceat imprimis cum sanguine, unde febris acuta continua ardenti similis oritur, donec præcipitetur, ut ambo abeant in falsum tertium, ita excitatam simul lympham inquinat singulariter, cujus ratione in principio variolarum ut plurimum tusses siccae, unà cum faucium asperitate, & earum plus minùs raucedine adfunt, & oculi lacrymantes, &c. vid. M. A. N. C. *ann. 4. pag. 302.* Acidum illud ita ex sanguine secretum ac in pustulas congestum intercutaneas, sanguinem in parvis, quas acrimoniâ suâ excitant, inflammationibus in pus acido-falsum mutat per præcipitationem sulphuris sanguinis ab acido. Idem illud acre excoriat cutim, pruritum infert, carnem exedit, & inde ex fibris ejus profundè erodit cicatriculas efficit, donec tandem cuticula erosa à dicta acrimonia squamarum formâ decidat. Confirmantur ex iis, quæ curant variolas, nempe castoreo, myrrha, asa foetida, sale cornu cervi, &c. acidum enim hæc destruunt, & lac corruptum corrigunt. Hinc (5.) in variolis & morbillis, ut melius cursus & motus illarum observetur, observanda sunt duo tempora:

Tom. II.

nempe tempus ebullitionis seu effervescentiæ febrilis, aut massæ sanguineæ despumationis; & tempus depurationis seu expulsionis. Tempus ebullitionis febrilis est, dum febris urget, & hoc tempus absolvitur primo quaternario, i. e. primis quatuor diebus, quod rarò extenditur ad septimum diem: depurationis verò, dum pustulæ erumpunt, & successivè ad maturitatem pergunt, absolvitur sequenti septenario, nempe à die tertio vel quarto ad undecimum, rarò à septimo ad 14. diem terminatur, ita ut circa diem decimum tertium curatio absoluta sit. Utut suppuratio non fiat sine æstus recrudescencia nova, seu febre secundaria ac suppuratoria, cum dolore atque ardore per totum habitum molestissimo, symptomatisque aliis, pro diversitate partium, quas ulcuscula hæc plus minùs obsident. Interim pro circumstantiarum varietate subinde variolæ non præcisè tertiâ aut quartâ die, sed etiam septima vel octava, vel etiam vigesima die erumpentes observantur. Hinc variolæ etiam desperatæ post diem decimum septimum demùm suppuratæ notantur in M. A. N. C. *ann. 3. pag. 380.*

(6.) Acre illud acidum, nunc volatilius & acius existens, malignitatem interdum adjunctam habet, ita, ut dum acre malignum massæ sanguineæ consistentiam destruit, & spiritus inquinat, tali occasione & fermentum lacteum latitans præternaturaliter simul excitetur, quod suo impetu fermentativo variolas infert, sed sæpiùs impeditur propter spiritus nimis inquinatos, ut heterogeneum à massâ sanguinea turbata separari & erumpere nequeat subinde expulsum: Et sic conjunguntur febribus malignis variolæ, quæ sunt variolæ malignæ. Malignitas hæc patet ex eo, quod interdum sint admodum lethales, & dum grassantur, communiter interimunt infantes; item, quod observatum fuit, sæpiùs pestem præcessisse variolas, aut variolas secutas pestem, quæ tunc temporis non fuerunt sine malignitate.

Cauti ergo sumus in variolis dijudicandis, an benignæ, an malignæ sint? ne has invicem confundamus.

Multiplikes autem solent esse variolæ & morbilli, prout videre est in Sennerto *de febribus, ubi de variolis*; hinc & Schenckius *lib. 6. observ.* præter variolas & morbillos tertium pustularum genus crystallinum refert. In pueris etiam observantur variolæ exiliiores, seu tubercula parva, pellucida, plus minùs alba, variolis æmula, sparsim tamen, & ferè sine febre, aut tantùm cum ephemera erumpentia, quæ ut plurimum sine multa sanie citissimè exsiccantur & sanantur: Germani vocant *Spitzbocken / Windbocken / Schafsblattern / und Steinbocken.* Parum, nisi

(Xx)

mole



mole majore, à veris differunt, & intra tri-  
dum ad summum excitantur; utut earum  
nam vel alteram aliquando suppurare, cu-  
tim erodere, & cicatrices inducere, experien-  
tia testetur. Affligunt nunc solitariè, nunc  
fociatæ petechiis prodeunt, aut hæ post va-  
riolas sequuntur: vid. M. A. N. C. *ann.* 3.  
*obs.* 203. *pag.* 378.

Afficiuntur autem in variolis & morbillis  
non solum partes externæ, sed & internis ear-  
dem copiosius insidere solent, vid. Paræus *l. de*  
*variolis cap.* 2. item Schenckius aliique, ac in  
specie pulmonibus non leve periculum ab iis  
imminet, ut rectè observavit Bartholinus *cent.*  
3. *epist.* 38. ac Kerkringius *Spicil. observat.* 62.


### C A U S Æ.

Quoad causam occasionalem: probabilissi-  
mū videtur, firmitus & altius radicum prin-  
cipium querendum esse, præsertim cum non  
videatur eorum sententia probabilis, qui di-  
cunt, quod oriantur ex repetito coitu post fa-  
ctam jam conceptionem, cum post concep-  
tionem uterus firmissimè claudatur, nec quic-  
quàm amplius embryoni ab extra communi-  
cari queat. Ac proinde suspicor: fundamen-  
tum variolarum & morbillorum consistere in  
lacte, quod haurit fœtus nunc in utero, nunc  
extra uterum; ita, ut lactis vitiosi inquinati,  
aut vitiosè coagulati recrementa acido visci-  
da sint quasi radix, ut per mutuam efferve-  
scentiam febrilem oriantur variolæ & morbil-  
li. Occasionem in hanc descendendi senten-  
tiam dedit analogia achorum & favorum, *des*  
*Ansprungs / & tineæ capitis, des aufge-*  
*schlagenen Kopffs /* & ipsarum ex lactis vitio  
fere nascentium, cum excretionem cutanea  
variolarum: scilicet utraque notoriè prima-  
riò infantum faciem affligunt, deinde & ca-  
put & reliquum corpus, quando nempe idem  
vitioso lacte nutriuntur, eoque vel in ipso in-  
fantis ventriculo inquinato, vel in nutricis  
corpore in acidum vitiosum transmutato; ex  
hoc enim postmodum oriuntur achores, pu-  
stulæ sc. in facie, imò rubicundæ, cumque  
pruritu conjunctæ, quæ consequenter abeunt  
in desquamationem cutaneam, ac disparen-  
tes ut plurimum relinquunt tineas capitis &  
oculorum affectus. Ut proinde tam acho-  
res seu favi, quàm tineæ ex acido lactis pec-  
cante originem ducant, ac ipsas quoque va-  
riolas & morbillos ab acido lactis, quod talem  
effervescentiam febrilem excitat, dependere  
testentur symptomata adjuncta. Propter  
hanc in sanguine fundatam originem consan-  
guinei in specie mutuò afficiuntur, uti D.  
Doct. Michaëlis plura retulit exempla, quod  
fratres duo longè distiti, quorum unus erat in  
Italia, alter in Germania, uno eodemque  
tempore variolis laborarint, quorum nemo  
alterius novit conditionem seu morbum, ad-

cò, ut per longa etiam intervalla deprehen-  
datur hæc inter consanguineos conspiratio:  
Sic scio exemplum hîc Lipsiæ gemellorum ad-  
ultorum, fratris & sororis: frater cum degeret  
Wittebergæ studiorum gratiâ, soror autè ge-  
mella, cum hîc ex improvviso incurreret vario-  
las, ecce! frater hujus germanus eodem  
tempore iisdem Wittebergæ, utut nemo ibi-  
dem locorum aliquid de morbillis sciverit, et-  
iam corripiebatur: Similiter novi tres Nobi-  
les, quorum duo adulti ante paucos annos  
Gießæ studiorum gratiâ morabantur, tertius  
cum sororculis domi degebat. Sed cum hic  
tertius cum sororculis hîc domi apud matrem  
laboraret variolis, isti duo Gießæ simul iisdem  
& quidem eodem tempore correpti morie-  
bantur, utut tunc temporis nil aliàs ibidem  
de variolis innotuisset: imò gravida sana eni-  
titur puerum variolis correptum, cum antea  
filio ex variolis ægrotanti sedulo assedisset, re-  
ferente hoc Morisonio *de morbis mulierum*  
*pag.* 66.

Seminarium autem illud fermentativum in  
sanguine delitescens non, nisi accedente cau-  
sa externa, speciatim certâ aëris alteratione,  
in actum ducitur, unde sæpè epidemicæ ex-  
istunt. Ad causas externas spectat etiam ter-  
ror ex conspectu ejusmodi morbidorum, &  
contagium, ita quidem, ut ne cadavera va-  
riolosorum ejusmodi effluviis activis destitui  
Panarollus *Pentec.* 1. *obs.* 18. perhibeat. Non  
tamen putandum, prætextitile in corpore sa-  
no tot & tantas sordes, quæ postmodum in  
ambitum corporis copiosissimè sæpè protru-  
duntur, sed fermentum acidum, fermentan-  
do se multiplicans, ex naturalibus nutritivis  
corporis contentis eas generat: unde quò  
magis quis est cacochymicus, seu cujus san-  
guis alterabilis magis existit, eò copiosioribus  
iisdem afficitur: unde nec scabioli ab iisdem  
sunt immunes, uti observavit Fehr *de Scor-*  
*xonerap.* 78. item Henricus ab Heer *obser-*  
*vat.* 6.

Inutiliter dubitatur: an veteribus Græcis  
eædem etiam fuerint cognitæ? Nam sunt, qui  
per Græcorum ecchymata variolas, per exan-  
themata morbillos intelligunt: vid. Paræus *de*  
*variolis cap.* 1. Sed res præcisè determinari  
nequit, cum *ἐξανθήματα*, & *ἐκθύματα* Græcis  
vox generalis & universalis sit, quamvis in  
cure efflorescentiam denotans: vid. Castro  
*Quæ ex quibus lib.* 3. *cap.* 14. 15. 16. *pag.* 187.  
197. & 201. Sanè, utut essentia variolæ aut  
morbilli convenire videantur, differunt ta-  
men hæ ipsæ pro ætatum, nationum, alia-  
rumque rerum nonnaturalium varietate di-  
versimodè: sic enim morbilli in Italia & Hi-  
spania periculosiores, quàm variolæ, quæ in  
Germania: vid. Thiermayer *Consil.* 1. *p.* 88.  
Sic morbillos in Gallia semper cum febre;  
variolas verò sine febre esse observatur: cum  
è con-

è contrà in Germania semper febres acutas comitentur, exque ferè graviores variolas: sic variolas in Indias primitus Hispanos intulisse refert Schoonkiius *de Ferm. p. 468. & seq.* item Riverii *Praxis*, ubi *de variolis*. In Islandia vigesimo quovis anno periodicè observantur variolæ, teste Bartholino *cent. 3. epistolar. pag. 390.* Frequentes variolæ solent esse in Japonia: vid. *Acta Societatis Regiæ volum. 1. pag. 825.* Eadem variolæ in Æthiopibus distinctæ sunt à variolis Europæis: vid. Bartholini *Acta Med. Hassn. volum. 2. pag. 235.* Unde & mirabilis earum ab Æthiopibus curavid. in *M. A. N. C. ann. 8. obs. 68. p. 116.* Sic morbilli Amboinenses planè peculiares observati à Saar in *denen Ost-Indianischen Kriegs-Diensten pag. 30.* Nec minus curiosum est, quod D. Michaëlis aliquando curavit mulierem in una corporis medietate variolis, in altera verò morbillis affectam, quam natura ita mirabiliter in 2. quasi partes diviserat: Cura tamen fuit eadem. Adultos gravius laborare, & difficilius ferre variolas ac morbillos quàm pueros, per experientiam innuit. Densior nempe adultorum cutis, & firmiter ejus textura, neque despumationi materix adeò apta est, & sub suppuratione sensibilius longè dolere solet. Maligniores etiam variolæ frequenter verminosæ observatæ fuerunt: conf. *M. A. N. C. ann. 3. obs. 20. p. 44.* ubi etiam vermiculi post variolas cum  reje-cti allegantur; sicut & sudorem verminosum in variolis videbitis in *M. A. N. C. ann. 6. obs. 3. p. 8.* item vermes in variolis observavit Rhodius *e. 3. obs. 64.* & Bartholinus *cent. 5. hist. 20.*

### DIAGNOSIS.

Variolarum & morbillorum imminentium historia ita se habet; Prægresso horrore plus minus insensibili insequitur æstus intensus, gravitas totius corporis, dorsii, præsertim lumborum dolor lancinans, & quasi pulsatio in spina cum qua subinde conjungitur insignis dolor capitis gravativus, oculi tumidi & sub rubentes, dolor eorum tensivus, *es drückt sie in denen Augen* aut quasi involuntaria lachrymatio ex aciditate sc. lymphæ occulta, oculos vellicante; quod si adsit tussis sicca simul, seu potius nimius tussendi conatus, cum pulsu celeri frequenti, vehementi, duro, plus minus magno vel parvo, prout mos febris est, atque reliquis signis, res eò magis confirmatur. Respiration non nihil impedita, aut plus minus læsa, cum voce interdum rauca, & faucium asperitate, similiter adesse solet. Urina sanorum non est dissimilis; natura nempe ad ambitum corporis serum imprimis propellente. Ubi ergo adsunt symptomata febris ardentis, cum urina parum aut nihil à statu naturali immutata, variolas portendunt, uti

Horstius rectè observavit in *observ. pag. 346.* præprimis in juniore statu seu ætate. Interdum tamen turbida est, quod magnam contentorum ebullitionem & agitationem significat: interdum alba cum sedimento fufuraceo apparere solet. Ægri sunt inquieti & agrypni; terrores, insomnia prava, deliria, aut leviculi epileptici insultus antecedere solent eruptionem variolarum: interdum etiam in primo morbi insultu vomitus, nunc verò saltem inanis vomendi conatus, hæmorrhagia narium subinde admodum copiosa, occasione nempe sanguinis nimium ebullientis & ferventis adesse solet, quæ in principio morbi levioris spem reddit, in statu verò morbum longiorem, vel funesti eventus innuit. Diarrhæa subinde ægros corripit; interdum diabete, & mictus cruentus ægros fatigat.

Hæc ipsa omnia eò magis confirmant, quando epidemicè grassantur variolæ, quod bene etiam debet observare Medicus. Præ cæteris tamen tria primaria signa variolarum sunt: dolor in dorso & lumbis, oculorum involuntaria illachrymatio, & dolor tensivus in oculis.

Hæc & similia symptomata ægros vexant plus minus, donec tertiâ & quartâ die maculæ rubræ apparere incipiant: quibus ritè & copiosè prodeuntibus, ferè mitigari solent omnia prædicta symptomata. Ipsæ variolæ per se patent ex pustulis & maculis, nempe foras prorumpentibus. Maculæ istæ nunc simpliciter tales sunt, ita manent, ac sensim post aliquot dies evanescent, ac morbilli appellantur; nunc successivè in pustulas rubras elevantur, quæ albescunt pedetentim in centro, cum circulo ambiente purpureo, livido, &c. ibique in medio sui in pus abeunt, hinc in crustas & squamas, tandem decidunt, atque hæc variolæ dicuntur.

Maculæ tales potissimum ac primitus in facie ac manibus apparent, hinc & reliquis in partibus, quæ tumidæ omninò fiunt, ac quasi tumore inflammatorio & œdematoso misto affliguntur; præsertim caput, sub suppuratione ista dum occupant, non rarum est, quod ulcera gravia variis in locis relinquant, ipsæque omnia carie afficiantur: in specie malè aut non ritè expulsæ variolæ, indeque per metastasin ad internam quandam partem delatæ, successivè mille mala, pro partium affectarum varietate, inferunt; adeò, ut non arbitrer, reperiri morbum, qui tot mala post se queat trahere, atque variolæ & morbilli non benè judicati: quorum catalogum vid. in *Fehr de Scorzonera*, item Schenckio in *obs. l. 6.*

### PROGNOSIS.

Signa variolarum & morbillorum prognostica quod attinet: si sint benignæ variolæ, nihil refert.

(X x 2)

Melius

Melius est variolas & morbillos citò quàm tardè, confertim quàm successivè erumpere; materiæ enim obedientiam, & naturæ robur ostendit.

Post eruptas variolas & morbillos febres & symptomata remittere debent: sin minùs, res periculosa est; aut enim insufficientem expulsionem, aut defectum virium ostendit.

Porro in variolis observatum est, quod ii, quorum parentes morbo Gallico laborarunt, antequam easdem genuerunt, variolis tandem correpti gravius fuerint afflicti, uti observat Horstius in *observ.* pag. 308.

Maculæ purpureæ, an in variolis mortis prænunciæ? vid. Sydenham *de morbis acutis* pag. 180. & *de variol. confluent.* pag. 12. Lipsius pag. 9. Hæchstetterus *Dec. 1. cas. 9.* & Riverius *Prax. l. 17. sect. 3. c. 2.*

Stillicidium sanguinis ex naribus est ominosum, præsertim in principio: sed si in principio variolarum sanguis largiùs è naribus effluerit, & spontè cessaverit, variolæ & morbilli pauciores erumpere solent, ægerque faciliùs liberatur; si non, pejus signum est. Novi exemplum familiæ cujusdam, cujus individua grassantibus variolis omnia patiebantur symptomata ebullitionis; superveniente verò hæmorrhagia ab eruptione omnibus temporibus posthac liberabantur.

Variolæ meliores sunt rubræ, & citò albescentes cum circulo rubro, magnæ, plures, molles & eminentes, acuminatæ, rotundæ, disjunctæ, & sine continuitate propinquæ; quæque loca externa & ignobiliora occupant, faciliè maturantur, & decidunt.

Porro variolæ acuminatæ sunt salutare; duræ verò depressæ (utut in facie & in variolis confluentibus sine noxa contingat,) sunt lethales; & in specie foveam in medio monstrantes, *wenn sie Grübgen bekommen* / & nonnihil sunt nigricantes: si rubræ, & tamen in medio habent foramina, pessimum est signum.

Variolæ vel ipsæ discolores, vel ad livorem declinantes, aut saltem quæ habent circum lividum aut violaceum, aut nigricantem, & quæ sunt duræ, & verrucis similes, depressæ, &c. admodum sunt periculosæ, præsertim si in earum medio maculæ nigrescentes appareant.

Si variolis maculæ petechiales inspergantur, admodum periculosum est.

Variolæ cum petechiis nigris lethales: vid. M. A. N. C. *ann. 6. obs. 53.*

Lividæ, cæruleæ, & nigricantes maculæ post variolas periculosæ, imò ferè lethales sunt: vid. M. A. N. C. *ann. 3. obs. 203.*

Variolæ duplices, aut tardiùs erumpentes, & maturantes, admodum periculosæ sunt.

Non terrere debet Medicum epilepticas adesse convulsiones antehorum exanthema-

tum eruptionem; expulsis enim his pustulis subito & spontè evanescent, nec ampliùs redeunt: sed si continent symptomata, in specie motus convulsi post expulsionem, aut redeant, admodum periculosum est, sæpiùs lethale; deficientem enim expulsionem hoc innuit.

Si ante eruptionem fuerit febris acuta, intensa, & variolæ erumpunt copiosiores, bonum; sin verò febris intensa, & tamen parçè erumpunt, pessimum est, quia viscera interna variolis inquinantur.

Post eruptionem jam factam alvi fluxus, aut hæmorrhagia superveniens, malum est indicium; aut enim retrocedere pustulas faciunt, aut inquinamenti humorum insignis ab istis pustulis inducti indicium sunt. Rarum igitur est, quod hanc cum ægroti levamine observavit Willif. *de febribus* pag. 261.

Hæmorrhagia ergo salutaris si debet esse, contingat

1. In principio aut incremento;
2. Sit sufficiens, aut moderatè copiosa;
3. Continua, unâ vel alterâ vice non interrupta; &
4. Per anastomosis fiat.

Urina sanguinea seu mictus cruentus in variolis & morbillis signum ferè est lethalissimum; uti etiam si sanguis purus & sincerus supra & infra excernatur, nunquam evadunt morti, notantibus Foresto *lib. 6. observ. 45.* Schenckio *lib. 2. observ. pag. 761.* Sydenham *de variol. confluent. pag. 13.* & *observationibus morb. acutorum* pag. 182. & 212. item Riverius *Prax. lib. 17. sect. 3. cap. 2. & Cent. 1. observat. 71.* Salmuth *c. 2. obs. 70.* M. A. N. C. *ann. 3. obs. 76.* unde etiam Hæchstetterus *Dec. 1. cas. 7. 8. & 9.* non tantum urinas cruentas seu sanguinè per urinam, sed omnes omnino sanguinis tam per superiora quàm per inferiora dejectiones, lethales asserit. Frequenter observavi, quod semper fuerit lethale signum. Rarum igitur est, mictionem cruentam salutarem in variolis observatam esse, cum sanguinis per gingivas excretio suppressa esset: vid. Schenckius *l. 6. observationum.*

Interim hæmorrhagia ex naribus & gingivis simul lethalis vid. in Hildano *cent. 6. obs. 77.* sicuti etiam rarum est, quod variolæ cum dysenteria fuerint curatæ à Riverio *cent. 1. observat. 71.*

Res desperata, si manuum cutim assiduus mador, siccis tamen brachiis, occupet; nisi fortè tales madidas manus naturaliter soleat habere æger.

Sin in variolis & morbillis adest tensio & rugitus ventris, cum anxietate & agitatione ægrotum huc atque illuc, intra paucos dies obeunt, præsertim si adjunctus sit dolor, qui innuit inflammationem intestinorum: videtur Riverius in *observ. communicatis*, & Hæch-



Hæchstædterus *Observationum Anatomicarum* paginâ 22.

Si variolæ appareant, comitante solummodò levi febre, ex pulsu aut urina, aut etiam calore externo vix notabili, tum vel materiam expellenda pauca est, benigna, & natura robore pollet; vel suspecta res est, præsertim si magnus sit dorsi dolor, & insolita virium oppressio advertatur, latitante febre admodum malignâ, & quarto subinde die lethali.

Quoad tempus eventus: pertinent hi morbi ad febres acutas; nam ut plurimum intra decimum quartum diem totus cursus absolvitur.

Qui ex variolis pereunt, vel ex angina moriuntur, vel suffocantur propter faucium vel pulmonum oppletionem, vel alvi profluvio, præsertim dysenteria, vel denique convulsionibus intereunt.

Maximè infestæ sunt oculis variolæ, in quibus lippitudinem, ophthalmiam, suffusionem subinde & cæcitatem inducunt.

Tandem hæ variolæ licet non statim jugulent ægros, interdum tamen, quia vel malè curatæ, vel quia partem quandam nobiliorē gravius læserint, diuturna & lethalia inducunt mala, in internis præsertim corporis partibus, maximè exulcerationes earum, speciatim pulmonum phthisin, interdum dysenteriam, mictum cruentum, item hydropem: vid. Lipsius pag. 11. & Fehr de *Scorzonera* pag. 83. Interdum ulcera mala partium externarum, caries ossis, paralyse, tremores, ac similes artuum imbecillitates, post variolas & morbillos non adeò infrequentes sunt: vid. Lipsius *L. A.* & Bartholini *Acta Med. Hassniens. volum. 1. obs.* 88.

### C U R A.

Quoad variolarum & morbillorum curationem:

1. Fermentum acre acidum temperandum.
2. Correctum per diaphoresin, naturâ monstrante viam, ejiciendum.
3. Symptomata urgentia mitiganda.

Pro his scopis ritè obtinendis observetur:

1. Tempus ebullitionis & tempus excretionis seu expulsionis probè discernendum esse: his enim temporibus ritè distinctis magna pars curæ innuitur. Nam nec ebullitio nimis evahenda, nec nimis suppressenda: Conferatur Sydenham *M. M. febres contin. pag.* 97. Nec expulsio variolarum & morbillorum nimis provocanda, teste eodem in *observ. de morbis acutis* p. 177. & 193. item de *variolis confluent. pag.* 24. 25. & 27. Sed in principio, ubi variolarum & morbillorum elementa, i. e. pustulæ & maculæ nondum apparent, haud protinus ad expellentia dilabendum, sed naturæ conatus ita expectandus. Quamdiu ergo effe-

vescit massa sanguinea, & tempus ebullitionis adest, abturbentibus debitis & figentibus est insistendum, quæ non tantummodò primordia morbigeni fermenti, indeque ortum nimium sanguinis orgasmum compescere ac mitigare, sed etiam, quæ corruptioni sanguinis, à malignis miasmatis perficiendæ, obstaculum ponere possunt. Quod si subjectum pituitosum, aut prægressâ quâdam evacuatione debilitatum fuerit, alexipharmacis generosioribus ebullitio despumatoria intendatur: vid. Sydenham de *febris contin. p.* 104. Ubi verò jam erumpunt seu jam erumpere incipiunt, tunc Medicus convenientibus alexipharmacis & sudoriferis subinde repetitis, & in specie emulsione seminum earum proventus promoveatur, continuando eadem, donec bonâ fide exarescant & decidant: imprimis faucibus, oculis, & naribus prospiciendum, ne lædantur. Magnâ tamen hîc cautione opus est, ne, dum exiguis consulimus, magnum naturæ opus turbemus: Etenim toto hoc tempore una & continuata est crisis, quare nihil temerè tunc audendum erit.

II. Semper post sanatas variolas & morbillos corpus purgandum est, sanguisque purificandus (quod tutò etiam in ipso variolarum vigore fieri potest, cum sanguinem purificantia putredini resistent) ne eorum hinc inde hærentes reliquæ acido-salæ aut febres intermittentes, aut alia mala inferant. Pro minora ergò morbi mortificata, ne reviviscat, auferenda. post duas vel tres septimanas à curatione purgetur patiens sedulò: pro quo scopo Mercurius dulcis præ cæteris excellit. Sed an in principio purgandum? quæritur. Equidem variolis & morbillis, quâ talibus, nihil conferunt purgationes; quatenus tamen corpus cacochymicum est, & primæ viæ sordibus obsessæ, ne supervenientia exinde varia symptomata naturæ motum turbent, blandissimum primas vias abstergens, cautè tamen, & saltem in primo variolarum principio, propinetur, ne occasio detur periculo isti, quod ex alvi fluxu in variolis imminet: adeoque tamarindorum decoctum aut blandum laxans passularum, subinde usurpandum ad imitationem Horstii *observat. anatom. 27.* vel Mercurius dulcis parca dosi propinetur, tanquam appropriatum contra variolas remedium, qui aut impedit omnimodam earum invasionem, aut facit ut facillimè & citò erumpant, parcissimeque proveniant: vid. hac de re M. A. N. C. *ann.* 3. *obs.* 9. & 56. p. 13. & 56. ac proinde vel ante vel post variolas purgandi sunt ægri cum Mercurio dulci cui pro stimulo addi potest gr j *scammonii* *Qati*: nunc in forma pulveris e cochleari ligneo, nunc c. conserva rosarum in forma boli, nunc in forma pilularum c. MP. de tribus.

Sed in progressu morbi, præprimis in variolis &

(X x 3)

lis & morbillis malignis, item ubi pustulæ plus minus eruperint, licet alvus ad 6. vel 8. imò 10. vel 12. dies adstricta fuerit, à quolibet tantillum alvum stimulante, etiam levissimo clysmate aut suppositoio, studiosè abstinendum, nec, nisi summâ urgente necessitate, alterutrum eorum usurpandum: vid. Riverii *Praxis* l. 17. pag. 187. & *Miscell. Langii App. de Morbillis* §. 97. & *seqq. pag. 139.* Si irritatur alvus, fit cum periculo vitæ, licet jam omnia fuerint in salvo; utpote, quod antea erat expulsum, facile retrocedit, ac consequenter anxietates lethales superveniunt. Nam subinde in variolis in apparente jam morbi declinatione supervenit alvi fluxus non absque periculo, quod etiam interdum dysenteriam infert.

III. Pustulis jam apparentibus superveniens fortè alvi fluxus hîc cautè tractandus, & non adeò subito, nec simpliciter supprimendus est: idque præsertim, si affectus non tam ex adjuncta febre maligna, quàm interno contentorum spontaneo vitio ac corruptela originem duxerit, ita tamen regatur, ut variolarum & morbillorum expulsio, quantum possibile, promoveatur, non verò ab isto alvi fluore cohibeatur. Verùm licet non sistatur talis alvus fluens, sedulò tamen insistendum erit sudoriferis & alexipharmacis, quò ita derivemus magis naturæ motum ad exteriora, ac ita sponte cesset fluor iste. Contrà verò, cum tales alvi fluxus alio tempore venientes sint symptomatici, & subinde lethales, propterea cum alexipharmacis expellentibus miscenda simul interdum adstringentia blanda, ut ita successivè fluor in hoc casu periculosus sufflaminetur, & omne malum præcaveatur.

IV. In variolis & morbillis sanguis mittend<sup>9</sup> haud venit in nostro climate, nil enim prodest, sed naturæ motum turbando multùm nocere valet. Interim tamen in principio in adultis plethoricis aut habitioribus, ac phrenitide superveniente, vena aperta haud adeò nocere solet, præsertim cum subinde instituenda veniat in casu, quò de variolis nondum est suspicio, sed in primo fiat principio. Dum enim jam apparere incipiunt pustulæ, periculosissimum, modò non lethale, existimo venam aperire; hinc vix imitandus Grassius in *M. A. N. C. ann. 3. obs. 55.* qui sparsim jam tum erumpentibus variolis venæ sectionem cum levamine ægri administravit: vid. Riverii *Praxis* l. 17. pag. 696. & Sydenham *de febris Sect. 4. pag. 101. de morbis acutis pag. 187. 196. 199. & 207.* Hoc tamen non obstat, quin in aliis regionibus, aliis in casibus, subinde ante aut etiam post pustularum eruptionem vena salubriter secta fuerit; exemplo tamen apud nos non imitando: videatur Ballonii *Pharos Medicorum* p. 179 & 185, Horstius in *operibus*

*Medicis in observat. pag. 39. l. 1. observationum.* Item Filius Horstii in *observationibus Anatom. pag. 23. & 24. & Septalius in Animadvers. pag. 111.*

Opiata in variolis & morbillis perquàm proficua sunt, debitis cum cautelis adhibita, quæ vid. in *M. A. N. C. ann. 8. obs. 68. p. 115.* cum pro mitigandis urgentioribus symptomatibus, & promovenda excretionem cutanea, persistendo alvi fluxu, & præcavendis nervosæ generis symptomatibus, multùm conferant, in specie vesperi exhibita. Adhæc ab earum usu in faciei & manuum intumescencia, quam insignem in hoc morbo natura habet, evacuatio rectius procedit, dictusque tumor eorum ope ad debitum naturæ terminum protrahitur, ut loquitur Sydenham *observ. pag. 203.* Hinc puer in variolis per 5. dies ex abusu syrupi papaveris innocuè dormit: vid. *M. A. N. C. l. 4. p. 114.* unde infantibus granum j. vel alterù theriacæ, adultis laudani opii concisam dosin, commodè propinare possumus.

VI. Sanati curâ peractâ interrogandi sunt, ægri postmodùm: an sint rauci, difficulter respirantes, aut ulcerosi? aut an in quibusdam partibus internis, vel certis locis, in pectore, aut abdomine, aut cavitatum harum visceribus, præsertim in pulmonibus, symptomata quædam sentiant adhuc? & tunc maturè dentur parti affectæ appropriata remedia, ne aeris fermentatione reliquæ variolarum in uno aliove loco graves turbas excitent. Sæpius enim post variolas non sufficienter expulsas vel excretas facile ægri in phthisin incidunt, aut pleuritidem, aut diuturnum periculosissimumque alvi fluxum.

VII. Externa in variolis ad tollendas maculas & delendas cicatrices sint nulla, aut cautiissimè applicanda; ante maturationem enim nihil juvant, imò potius pessundant ægrum, & tetra interdum inferunt symptomata: vid. Forestus *lib. 6. observ. 45.* item Borellus *c. 1. obs. 64.* Beckerus *de Culi rivoro Prussiacop. 48.* Cum ante biennium variolæ hîc essent epidemiales, virgunculæ cuidam in principio morbiante earundem eruptionem brachialia ex succino parata carpo imposita fuerunt; cumque à sinistra manu deciderent læpe, dextræ verò semper admota manerent, variolarum immensa copia ibidem loci prorupit, ita, ut non sine molestia ardorem illarum ferre coacta fuerit. Cum his conferantur ea, quæ quoad succinum habet Helmontius in *Tumulo pestis pag. 881.*

IX. In variolis & morbillis aër studiosissimè cavendus, quin potius in loco tepido seu moderatè calido ægri asservandi, & debitis stragulis custodiendi sunt. Ne tamen quid nimis in hoc puncto! Passim in hoc erratur, dum ægri in locis nimis calidis custodiuntur, atque copio-

copiosis stragulis tantum non suffocantur. Ut hoc regimen fiat rite, tempore ebullitionis observetur æstus in ægro febrilis: qui si excedat, nullô modô per integumenta, aliisve modis est intendendus; è contra si est debilior, aut saltem videatur minor, quam qui sufficiat fecernendæ & expellendæ materiæ variolarum & morbillorum, in mediocri calore sustentandi sunt ægri. Conf. Forestus *l. 6. obs. 44.* Johann. Daniel Horstius *observat. anatom. 9. pag. 25.* Sydenham passim in ejusdem *methodo curandi febres* itemque in *observat. circa morbos acutos, & de variolis confluent.* pag. 19. 20. &c.

IX. Diæta tenuis convenit imprimis his ægris, præsertim ebullitionis tempore, ne impediatur naturæ motus. Lentium decoctum earumque esus à Sennerto, Riverio, aliisque Practicis in his affectibus laudatur: sed sine fundamento, cum legumina ejusmodi flatulenta diæta tenuiori variolarum non sint congrua; nec decoctum, alvum laxando secretionem turbans. Vinum nocet his ægris; ebullitionem enim intendit, cephalalgiam ac deliria excitat, hæmorrhagiasque periculosas movet: vid. Forestus *l. 6. obs. 46.* & Fehr *de Scorzonera pag. 87.* & Sydenham *l. 2. pag. 192. & 198.* Gelatina cornu cervi dissolvatur in cerevina tenui cum R aquilegiæ, quæ præ cæteris convenit ad expellendas variolas; vel nodulus ex semine aquilegiæ & napi contuso infundatur cerevisiæ tenui, instillaturque de super liquor coralliorum pro infantibus.

Quoad remedia duobus scopis prioribus satisfaciendi eadem sunt vel generalia, absorbentia & volatilia: vel specifica magis variolis & morbillis imprimis conveniëntia. Absorbentia & volatilia simul & acre acidum temperat, & per diaphoresin auctam illud ejici faciunt. Sed illa fixiora magis temperant, volatilia magis sudorem & urinam movent. Illa potius conducunt, ubi circa primas vias urgent symptomata: Hæc, ubi acrius & volatilius peccaverit acidum, adeoque graviora præsertim nervosi generis symptomata inferat: Illa magis tempore ebullitionis; hæc excretionis conducunt, dum difficilem aut tardam eruptionem admodum promovent: Illa magis conveniunt, ubi primarum viarum urgent symptomata; hæc, ubi pectoris, aut pulmonum metuuntur à variolis mala. Remedia fixiora sunt unicornu fossile, antimonium diaphoreticum, cinnabaris antimonii & nativa, corallia: item cornu cervi cum & sine igne, unicornu verum, quod tempore ebullitionis in variolis ante eruptionem insignem efficaciam obtinet: item semina expulsiiva ista, speciatim variolis & morbillis dicata: sic namque non tantummodò ex semine napi, carduibenedicti, nasturtii, & aquilegiæ fit

emulsio egregia ad curandas variolas; sed etiam ipsa semina pulverisata sufficiunt. Pertinet huc pulvis contra variolas Timæi.

Volatilia autem sunt quælibet salia volatilia, speciatim: ~ & Θ volatile C. C. viperarum, sanguinis humani, & in infantum variolis ob epilepsiam nunquam satis laudatus, liquor cornu cervi succinatus. His ipsis pro urgentium symptomatum ratione & opiata, ut suprâ monitum, quolibet morbi tempore possunt sociari.

Semper autem ante variolarum eruptionem cæteris remediis nonnihil de cinnabari antimonii, vel simili antiepileptico addendum est, propter metum convulsionum aut epilepsiæ, quæ ante variolarum eruptionem subindè imminent; sicuti in pueris supervenientes convulsionem & epilepsiam liquor cornu cervi succinatus optimè sistit, imprimis si jam jam prominere variolæ incipiant.

Præter suprâ autem in febribus malignis laudata alexipharmaca observandum, ut in variolarum & morbillorum curatione acida cautè usurpentur; sicut è contrâ specialia magis remedia sunt: myrrha, castoreum, tinctura tartari benè acris; item stercora animalium, crocus, milium & succinum. Myrrha in specie optimum est præservativum, & curativum variolarum, balsamicâ vi alterationem horum à fermento maligno inhibens, adeoque, nè copiosè nimis affligant, præservans; Unde ad præcautionem variolarum nonnullis optimo usu commendata est pulicula myrrhata: Vid. Velschil *Mistomim. cent. 1. no. 29. annexa ann. 4. M. A. N. C.* Sic quoque D. Langius habebat essentiam salutis ex myrrha cum R tartari extractam, & essentiam anonymam ex castoreo & asa fœtida cum R tartari seu spiritu vini tartarato paratam, quæ in præservandis & curandis his affectibus, uti & passione hysterica & colica, piura præstitit; sicut & ipse essentiam hanc tam præservare ab incurusione variolarum, adeo ut nullatenus iisdem corripiantur, quàm etiam correptos minùs graviter laborare, experientiâ probavi. Zwelferus etiam habet ex castoreo essentiam contra morbillos. De croco refert Lipsius *de variolis*, eum mirabilem esse in expulsionem variolarum & morbillorum, dolorem sedando & venenositati resistendo. His accedunt antimonialia diaphoretica, itemque remedia ex cornu cervi parata, quæ tempore ebullitionis in variolis ante eruptionem insignem efficaciam obtinent: quibus pro adultis admisceantur cinnabarina antimonialia, ac pro infantibus liquor cornu cervi succinatus ob epilepsiam. Itaque ante eruptionem in principio variolarum tales formulæ præscribi possunt:



℞. *℞ii diaphor.* ℥j.  
*myrrh. el.* gr. v.

M. f. pulvis. S.

**Blutreinigend Pulver.**

℞. *Pulv. diaphor. Ludov.* ℥j.  
*laud. opiat.* gr. j.

infanti

*theriac.* gr. ij. l. plura M.

℞. *C. C. f. Δe.*

*℞ii diaph.* ā gr. xv.

*myrrh.* ℥ss. M. pro 2. dosibus.

Quando variolis mox erumpentibus ægri de horrore aut rigore conqueruntur, optimè conveniunt salia fixa.

℞. *C. C. f. Δe* ℥ij.

*unic. foss.* ℥j.

*Θis card. bened.* gr. xv.

*myrrh. el.* gr. xij.

M. f. pulvis pro 3. dosibus.

Porro in progressu variolarum, & tempore excretionis, salia volatilia usurpari possunt;

℞. *Ebor. f. Δe* ℥ss.

*myrrh. el.*

*℞ii diaph.* ā gr. vj.

*Θis card. b.* gr. vij. M.

℞. *C. C. f. Δe* ℥j.

(vel *hujus & cinnab.* ℞ii ā ℥ss.)

*castor.* gr. iij.

*myrrh.* gr. ij.

*Θ volat. viper.* gr. jv. l. v. M.

Qui licet linguam nareque offendant, tamen egregius est in difficili cura variolarum.

Item in majore malignitate cum fluxu alvi, vel ubi inquieti sunt ægri:

℞. *C. C. f. Δe* ℥ss.

*Bezoard. min.* ℥j.

*camph.* gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. *C. C. f. Δe* vel *pulv. diaph. Lud.* ℥ss.

*Bezoard. min.*

*specif. cephal.* gr. xv. M. pro 3. dosibus.

℞. *▽ scabios.* ℥ss.

*essent. myrrh.* ℥j.

*C. C. f. Δe* ℥j.

*Bezoard. min.* ℥ss.

*laud. Ferm.* gr. ss. vel gr. j.

*fyr. card. bened.* ℥iij. M.

In specie emulsionum ex seminibus expulsi-  
vis confectæ, quas antea commendavi, &  
quas Crato adeo laudat, proderunt. Crato-  
nis emulsio ad petechiales febres, variolas &  
morbillos est hæc:

℞. *sem. card. bened.* ℥ss.

*napi* ℥j.

*citri* ℥ss.

*▽ card. ben.* ℥iij. ss.

M. f. l. a. emulsio.

cui adde

*fyr. acetos. citri* q. s.

℞. *sem. aquileg.* ℥ss.

*nasturt.* ℥j.

*card. bened.* ℥j.

Cum *▽ quadam appropriata* f. emulsio.

D. S.

**Austreibende Milch.**

Vel secundum methodum modernorum  
prescribitur hoc modo:

℞. *sem. aquileg.*

*napi* ā ℥iij.

*▽ ulmar.* ℥vj.

F. emulsio: adde

*C. C. f. Δe*

*℞ii diaph.* ā ℥ss.

Edulcoretur cum *rotul. manus Christi perlatis.* M.

His, quando ægri sunt inquieti, commo-  
dè semen papaveris albicum essentia castorei  
addi potest; illud enim sudorem etiam simul  
prolicit, quem papaver non cohibet. In ra-  
li ergo casu:

℞. *sem. card. bened.* ℥ij.

*napi,*

*aquileg.* ā ℥j.

*papav. albi* ℥ij. l. ℥iij.

c. l. q. *▽ card. bened.* f. emulsio:

cui adde

*essent. castor.* ℥j.

*myrrh.* ℥ss.

*℞ii diaphor.* ℥j.

*unic. foss.* gr. xv.

Edulcoretur parum, f. emulsio sudori-  
fera.

℞. *sem. napi,*

*aquileg.* ā ℥j.

*papav. albi* ℥ss. l. ℥ij.

c. l. q. *▽ fenic. & scabios.* fiat emulsio:

adde

*C. C. f. Δe*

*ebor. f. Δe*

*pulv. Marchion.* ā ℥ss. ad gr. xv.

*Bez. min.* gr. vj.

M. & edulcora cum *Rot. manus Christi perl.*

Circa statum & dum remittunt symptoma-  
ta, & copiosæ jam pustulæ efflorescunt:

℞. *Ra* ℥ij. *q. is.* vel *q. acerr.*

*essent. myrrh.* ā q. v. M.

Imprimis ad expellendas variolas nobile est  
stercus equinum in nodulo potui ordinario in-  
fusum, expressum, & ita propinatum; aut et-  
iam in cerevisia calida succus expressus exhi-  
bitus scopis omnibus in cura variolarum &  
morbillosum satisfacit, & in specie ab angina  
ac pleuritide, ac cognatis in variolis periculo-  
sis malis præservat. Aliàs etiam ad variolas  
stercus ovillum, tanquam infallibile Anglo-  
rum deprædicatur remedium, quod stercore  
equino quoad efficaciam non cedit: vid. Dig-  
by *Recept. p. 1. pag. 69.* sicut ad morbillos sin-  
gulare experimentum est stercus caprinum,  
ita præparatum, aut in potu datum, mirabiliter  
simul expellit. Decoctum ficuum, milii, scæni-  
culi & similia sunt admodum appropriata in  
vario.

variolis, ubi jam incipiunt nonnihil erumpere, imprimis decoctum ficuum ad expellendas has pustulas multum laudatur, & rectè quidem: ficus enim temperant quamcunque acrimoniam, de quibus notatu digna est observatio Foresti, qui lib. 6. refert, quod in variolis & morbillis epidemicè grassantibus, ut vix puer aliquis in urbe ab illis immunis esset, omnes insigniter, qui decocto ficuum in cerevisia utebantur, facillè fuerint curati, quoniam facillimè prodierunt variola. Hinc etiam decoctum ficuum Mynsichtii contra variolas in usu est, quod etiam laudat Michaelis in Collegio Jonstoniano. Videtur etiam faucibus & pulmonibus conducere, quicquid unà laborant. Verùm in hoc decocto observetur, ne nimis fiat dulce & crassum, quoniam ficus laxant alvum: Commodè ergò ficus milium additur, ad imitationem Salæ in append. mirotechn. pag. 825. cum decoctum milii per se vulgare quidem, sed admodum egregium remedium sit in his affectibus, & aliquantisper alvum constipet.

Quod si ergò partim ebullitio sanguinis se data, partim excretio procurata fuerit, optimum erit, ut suppuratio promoveatur, externè autem nihil adhibeatur, quicquid etiam aniculæ contrà suadeant. Pro suppuratione hac promovenda, ac ne lædantur præsertim partes internæ, optimè conveniunt lapilli cancerorum cum myrrha crebrius usurpatis, v. g.

℞. *Lapill. 69. præp. 3j.*  
*myrrh. gr. xv.*  
 M. f. Pulvis pro 3. dosibus.

D. S.

Temperitend Pulver.

℞. *Lapill. 69. præp. 3j.*  
*C. C. sine igne 3j.*  
*myrrh. gr. xv.*  
*Os cardui b. ned. gr. v.*  
 M. pro tribus dosibus.

Sic egregiè suppuratio promovetur, sine insigni fovearum vestigio.

Jam ad sistenda symptomata, quæ affligunt vel ante eruptionem, vel post eruptionem. Ante eruptionem sunt:

I. Anxietates præcordiorum & jectigationes, ad quas, quando vel vomitus spontaneus præcessit, vel per medicamenta nauseosa provocatus fuit, omnium optimè confert liquor cornu cervi succinatus, infantibus præsertim singulariter conveniens; quin etiam extractum theriacale aut laudanum opiatum in parva dosi.

II. Vomitus in principio urgens non statim suppressendus: aut si nimius fuerit, theriaca extractum theriacale, theriaca cœlestis, syrupus papaveris, gr. j. vel jß. laudani opiatum, unà cū absorbentibus optimè curant. His non sufficien-

Tom. II.

tibus, accedendum ad liquorem C. C. succinatum, qui præsertim infantibus optimus est, & eosdem quietos reddit, in potu ordinario assumptus.

III. Diarrhœa in incremento & statu superveniens ut plurimum funesta est, nisi in infantibus succulentis, præsertim si in statu occasione vel potus nimii vel frigidiusculi oriatur, & imprimis, si murmuraciones abdominis conjunctæ fuerint, & excrementa spumosa. Hæc diarrhœa aut alius alvi fluxus per terram sigillatam curatur, si nempe hujus pulveris largiter cerevisiæ injiciatur, & sub quolibet haustu probè invicem agitentur, & ita assumantur; sic brevi sedatur diarrhœa, & variolæ progerminant: item electuarium discordii Fracastorii, cornu cervi ustum, unicornu fossile, theriacalia, &c. conveniunt. Vid. Sydenham de morbis acutis pag. 195. 203. & 205. nec non Bonettus Mercur. Compitat. pag. 682. §. 69.

IV. Vigiliæ, deliria, imprimis convulsiones epilepticæ, quæ infantes mox primo in morbi principio aut incremento cum abdominis duritie affligunt; optimè curantur vel pulvere epileptico antimoniali, vel liquore cornu cervi succinato, cinnabari antimonii; & si necessarium videatur, in morbi principio clymata levia injiciantur; simul externè, si dolor abdominis tensivus adfuerit, Linimentum ex olei destillati succini 3j, spicæ gutt. v. excipiendum cum corpore pro balsamo, regioni umbilici & scrobiculo cordis inungatur, idque aliquoties; sic enim epilepsia evanescere solet.

V. Hæmorrhagia narium moderata aliquandiu sinenda: præstat ut plus fluat sanguis, quàm minùs. Videatur Horstius Observ. Anatom. pag. 95.

Quod si non sufficienter procedat, potius promovenda venit, vellicando nares; aut cum seta porcina; aut per radicem crocodili: vid. Lipsius pag. 41. aut crebrius & fortius eosdem emungendo, aut aliis modis hæmorrhagiam narium provocando: quod cum fecissem, sanguis benè fluxit, & febris desuit, & brevi sanata est, dicit Forestus lib. 6. Observat. 48. Quod si excesserit modum, optimè hæmorrhagiam narium curant bufones appensi, aut sub axillis alligati, vid. Willisius de febribus pag. 266. Id quod & in aliis malignis obtingit. Aliàs cum in variolis nimia hæmorrhagiæ ex ebullitionis sanguinis nimio impetu orientur, easdem etiam opiata cum absorbentibus seu præcipitantibus dictis compescunt: Conf. Willisius Pharm. Rat. P. 2. Sect. 3. cap. 2. & 217. vitando tunc volatilia.

VI. Tussis. Tussim siccam subinde molestatam & pectoris affectus in principio optimè sistunt temperantia acrimoniam lymphæ, &

(Yy)

leni-

lenientia, vulgo incrassantia; in statu vero incidentia & expectorantia. Ibi syrupus de jujubis, violarum, papaveris, diacodium Montani, pulpa passularum in  $\nabla$  scabiosæ, tussilaginis, &c. hic verò syrupus Nicotianæ, de erysimo, cum  $\nabla$  menthæ, hyssopi, &c. In omni tempore remedia ex scabiosa præsertim, vel sola, vel cum  $\sim$  u  $\Theta$  s ammoniaci anisato, mista, speciosè præservant & curant partes respirationi dicatas.

VII. Virium prostratio. Si in statu ob symptomatum syndromen vires fuerint prostratæ, optimè convenit  $\Re$  coralliorum cum spiritu cordis cervi sæpius propinata; item vini Rhenani haustulus, vel panis similagineus, vino intinctus & ita propinatus, optimum est analepticum, speciatim, quando vires prosteruntur à nimio sudore, & ægri inde imbecilliores fiant.

IX. Supervenit interdum aphonía, quæ duplex, vel non possunt formare sonum, quod fit vitio laryngis & nervorum ejusdem, vel licet edant sonum, tamen loquelam formare nequeunt, quod fit vitio linguæ & ejusdem nervorum. Primus casus reperitur in Hildano cent. 6. observat 14 sed estratus. Secundus casus curatur per interna volatilia antiparalytica; imprimis essentia castorei linguæ in parte prima circa frænum crebro affricetur, Vid. Horstius observ. lib. 1. observ. 29.

Post eruptionem symptomata sunt,

I. Retrocessus, quibus deliria ac convulsiones superveniunt, & vocatur communiter raptus materiæ excernendæ ad caput; rectius autem diceretur, raptus materiæ ad systema nervosum. In hoc casu nil melius est, quàm vesicatoria pedibus applicata, Vid. Bartholini *Acta Med. Hassniens. Vol. 2. pag. 200.* sicut alias, ubi in variolis gravioræ erumpunt symptomata, nec ritè eadem erumpunt, non absque fructu vesicatoria applicantur. Vid. Fehr de *Scorzonera pag. 88.* item Bartholinus *l. a. Vol. 3. pag. 72.* epilepsias & deliria ex earum retrogressionem oriunda præcavent, interdum & curant. Internè optimè convenire dicitur, quando particula panni rubri Anglici, roth Scharlachstuch / in cinerem seu crassamentum nigrum comburitur, & aliquoties in vino propinatur. Aliquando cum recessissent morbilli, & varia excitassent symptomata:

$\mathfrak{R}$ .  $\xi$  ii diaphor.  $\mathfrak{z}$  i.

cinnab.  $\mathfrak{z}$  ii  $\mathfrak{ss}$ .

$\Theta$  vol, C. C. gr. xij.

campb. gr. ij.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus: S.

Auftreibende Pulver.

II. Cicatrices & foveæ, quæ oriuntur ab erosione, ab acido acri salso. Unde conveniunt

1. Maturantia & temperantia.

2. Nævus & maculas tollentia.

3. Cicatrices & foveas implentia.

Pro primo scopo, ut temperetur & mitigetur pus, oleum amygdalarum dulcium, vel oleum nucum recens & sine igne expressum cum penna calidè illinatur, quando jam maturaverint, & in medio oculi quasi albicantes apparuerint, hoc sæpiusculè fiat in die: Vel: Wenn die Bockenanfangen sich zu erzeigen / nimmt man Nierenfett von einem Schweine / schmelzet es / und nehet Tüchlein damit / und bestreichet mit solchen das Angesicht 6. 7. oder 8. mahl des Tages / das thut man solange / biß die Bocken oder Blattern außstrucknen / so wird kein Mahl bleiben. Frustulum item lardi impositum, ac sæpius renovatum, est egregium. Præstantior est pinguedo lardi incensæ super flores lactis destillans: Vid. Cnæffelius in *M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 192.* ut ut Sydenham de morbis acutis pag. 706. pinguis ideo rejiciat, quod turfures cumulent, ac cicatrices potius urgeant. Pulvis ad variolas Mynsichtii vid. in *Arman. pag. 134.* Decoctum malvæ aut ficum cum gossypio aut linteolo tepidè sæpius applicandum commendat Mercurialis de morbis puerorum lib. 1. cap. 3. Unum ex optimis est spiritus vini aromaticus cum salibus volatilibus leviter acuat, & subindè calidè variolis applicatus: Vid. Sylvius de morbis infantum cap. 9. vel observetur elegans illa methodus *M. A. N. C. Ann. 4. pag. 50.* ut sub eruptione variolarum spiritus vini myrrhatæ calidè per 2. dies repetitis vicibus illinatur. Hinc saccharum Saturni  $\nabla$  rosarum mixtum, calidè pennâ faciei applicetur: hujus loco etiam emplastrum de spermate ranarum cum saccharo Saturni imponi potest: Vid. Hoffmanni *Clavis pag. 249.* Sed cautè talia fiant, ne repulsioni variolarum superveniat mors, qualia exempla suprâ ex Borello & Foresto allegavi. Sunt, qui acu aureâ vel argenteâ pustulas ad maturitatem perductas seu dealbatas perforant, nè materia purulenta cutim subjacentem erodat: sed super hoc legi meretur consilium Mercurialis *l. a.* qui molestam æquè ac supervacaneam hanc operationem credit.

Ne autem facies variolis obsideatur, Viennæ dorso seu scapulis imponunt vesicatoria: Vid. Thiermayerus lib. 1. *Consiliorum pag. 106.* Alii pro hoc vaporem ex decocto herbarum emollientium pedibus suscipiunt: vid. *M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 186. pag. 247.* aut lacti calido pedes immergunt, variolas ad extremitates has derivando & revellendo, Autore Sylvio loco suprâ cit. §. 76. Facit huc, quod retert Forestus lib. 6. *Observ. 42.* In pruritu manuum & plantarum pedum, dum erumpunt pustulae, ponant



ponantur dicta membra assidue in aqua calida & multum confert: pruritus & punitiones cessant, meliusque morbilli erumpunt. Quæ remedia quidem tuta satis videntur: sed habeatur tunc pedum ratio, ne à copia variolarum dolores diuturni aliave gravia mala iisdem concilientur. Conferatur Hildanus *Cent. 3. Observat. 99.*

Secundò nævos tollunt imprimis sperma ranarum, hinc Δ florum fabarum cum paucio oleo tartari per deliquium temperata; item ∇ omnium florum, cui misceatur cosmeticum clavii cum pauca tutia, &c. Vel

℞. ∇ calcis viv. ℥ij.  
pulv. Quercitrini ʒj.

Coqu. invicem: Colatura adde  
∇ rosar. ʒj.

M. D. S.

Reinigend Wasser.

Facit huc etiam cataplasma sequens:

℞. farin. fabar.  
lupinor. à ʒij.

M. cum □ bovis ad consistentiam cataplasmatum, quo ipso vesperi tota inungatur facies.

Relinquatur ita per noctem, mane tunc cum ∇ florum fabarum abluatur.

Tertiò pro cicatricibus mediante nutritione debite implendis inservit axungia ascie piscis cum oleo ligni Rhodii mixta & illita: Vid. Wedelius *de Medicam. Compos. pag. 186.* & pinguedo anguillæ, unguentum de cerussa camphoratum, oleum ovorum, &c. An verò cicatrices relictæ adeò facile deleri possint, meritò dubitatur.

III. Ptyalismus, rarum equidem post variolas apud nos est symptoma; observatum tamen sæpius à Sydenham. Hic igitur variolis malè tractatis, interdum auspiciatò superveniens, ut sit tractandus, videb. *in citato Autore de methodo medendi febres pag. 108. item in ejus Observat. pag. 174. & 201.* Cessans ptyalismus promovetur per cerevisiam tenuem, decoctum hordei, aut alium liquorem fermentescentem, nec ad sudorem cogentem. Ubi propter salivæ visciditatem suffocatio metuenda, conveniunt gargarismata ex cerevisia secundaria, aut decoctum hordei cum melle rosarum.

Quoad IV. indicationem: læsionis partium adhuc habenda est ratio, quas inter sæpius ac periculosius affligi solent imprimis oculi, & quidem duplici modo:

1. Quando variolæ oculi bulbum occupant, non tantum cæcitas, sed & interdum albugo, ulcera oculorum, & pannus relinquitur.

2. Palpebras obsident, quibus suppurantibus oculus non possit aperiri.

Ad præservandos oculos in variolis commendatur Sapphirus & Smaragdus, ut & succinū, si nimirū circulus circa oculos ducatur. Optimum est collyrium ex infuso vitri anti-

Tom. II.

monii in ∇ plantaginis, rosarum, cyani, & calcatrippæ; vel dictis aquis addatur parum tutiæ, & nonnihil sacchari Saturni: nam & si hæc instillantur oculis, præservantur à variolis.

Si jam incipiunt prominere vel in oculo, vel eos affligunt, quod ex rubore & pruritu patet, frustrum crudum carnis recentis, sive bovinæ sive vitulinæ, si magnitudine & crassitie thaleri tepidè applicetur, ut hoc ipsum salsam infestantem oculos humiditatem absorbeat; hinc, ubi ferè ad quadrantem horæ adhæserit, removeatur, novumque denuò applicetur.

Aut mulier quædam sana allium masticer, & halitum oris oculis inflet, manè jejuno stomacho crebrius repetat; vel accipiatur crocus, infundatur ∇ sceniculi, & infusum hoc (non tamen sit acre) instilletur; Vel

℞. HB. ruta rec.

ex qua contusa exprimatur succus: filteretur, & cum ∇ quadam ophthalmica mistus instilletur.

Succus cherefollii cum ∇ sceniculi instillatus variolas oculorum curat: Videatur Sylvius *l. 4. §. 83.*

℞. ∇ plantag.  
solan.

rosar. à ʒj.

In quibus ebulliant:

sem. sumach. ʒj.

plantag. ʒss.

Ex colatura fiat collyrium, sæpè oculis instillandum, idque in principio, ut defendantur oculi à pustulis, in quo oblinendo tale me nunquam fecellit, dicit Renealmus *in Observat.*

Aliquando cum jam jam humor ad partem appulerat, admiscui, detractis ∇ solani & semine sumach, mucilag. sem. altheæ in ∇ sceniculi extractæ ʒjss. Quibusdam minori in copia, pro ratione morbi: Confer. Horstius *lib. 6. Observat. Append. pag. 301.* loco seminis sumach malicorium recipi potest, v. g.

℞. Cort. granat. ʒijj.

Infund. in f. q. ∇ rosar. & plantag.

stent in infuso in loco calido, postea trituretur, & adde

Margarit. præp. gr. jx.

Croc Orient. gr. iij.

M. S.

Mixtur zum Augen.

℞. Q. de Cypro:

dissolve tantillum in

∇ euphras. q. f.

adde

Tutia quantum ferunt oculi sine dolore.

Instilletur guttatim oculis.

℞. ∇ euphras.

plantag. à ʒj.

tutia præp. ʒss.

(Yy 2)

camph.

*camph. gr. v.*

*croci gr. ij.*

Mista aut instillantur, aut applicentur oculo, ne variolæ possint oculo nocere.

Item

℞. ∇ *plantag. ʒj.*

*euphras.*

*rosar. ā ʒʒ.*

*smaragdi prap. gr. xij.*

*margar. prap. gr. vj.*

*camph. gr. iij.*

*Croci gr. jv.*

M. D. S.

**Eufferlich Augen-Wasser.**

Vid. Timæus von Guldensee in *Epist. pag. 318.* aut pro collyrio extemporaneo

℞. ∇ *plantag.*

*sperm. ran. ā q. s.*

In quibus parum sacchari Saturni misceatur, & ita oculis instilletur pro præservatione.

Loco hujus sacchari Saturni etiā tutia præparata cū pauco viriolo albo adhiberi potest.

Quod si nihilominus palpebræ progressu morbi sint obsessæ & intumescant, ita, ut nequeant aperiri, vel etiam glutinosis sordibus inviscentur, blando decocto semen lini, fœnugræci, cydoniorum, malvæ; aut fotu, vel ex floribus meliloti, vel ex malva & semine cydoniorum in ∇ comm. decoctis, aperiantur, cum linteo calidè oculis applicando, idque tamdiu, donec inviscatio & tumor cessent. Malè à quibusdam usurpatur lac, utpote quod facilè acorem contrahit.

Nebulæ postmodum in oculis apparentes pulvere sacchari candi in oculos inflato curantur: Hoc enim saccharum non solum præservat oculos, sed & nebulas detergit, si cum ∇ rosacea adhibeatur. Sin his omnibus non obstantibus variolæ tamen oculos occupant, ita ut istis curatis vel lippitudo, vel ophthalmia, vel nebulæ aut suffusiones, vel visus hebetudo, aut similes visus obscurationes, post variolas supersint, proficua est ∇ ophthalmica Rulandi, vel ∇ ophthalmica ex croco metallorum: sed simul nuchæ applicetur vesicatorium. His non sufficientibus, hoc clauso bina vesicatoria pone aures applicentur, quæ impedimenta remonent, ut melius oculi curari possint per reliqua remedia.

Quò vero diutiùs servetur apertum:

℞. *Empl. de sperm. ranar. part. v. l. vj.*

*Vesicator. part. j.*

M. D. S.

**Eröffnend Pflaster.**

Pertinet huc, quod retert Lipsius de variolis: In einem alten Buch habe ich dieses Experiment gefunden: Ein Knäblein sah nach denen Blattern ein ganzes Jahr nicht / waren zwar ihm die Augen noch ganz / aber mit Wust überzogen. Endlich nahm einer Entian-Wurzel / schnitzte diese klein / sodess in halb Wein und halb Wasser / und sprütz-

te ihm das Wasser drey oder vier Morgen in die Augen / das bißte wohl / doch genas ihm das Auge. It. das Del von den Lebern der Altraupen ein oder zwey Tropffen in die Augen gethan / biß die Gelle weg / ist eine edele Arhney. *Pinguedinis viperarum gutta una vel altera oculis instillata, vel siminis recens aut mucida, palpebris saltem illita, oculorum vitia curat. Conferatur quoad pretygion post variolas curatas Forestus lib. 6. observ. 55.*

Nares defendendi sunt, ne intercipiatur respiratio, nec fiant ulcera & ozæna, quæ difficilis curationis. Optimū est odor acetirofacei, vel solitarii, vel camphoræ imprægnari; Vel

℞. *flor. rosar. r. p. iij.*

*camph. gr. viij.*

F. Nodulus crebrius naribus admovendus, vel solitariè vel aceto rosaceo intinctus.

Quod si in variolis crustæ subindè circa nares concrecant, ita ut per eas spiritus trahi nequeat, butyrum recens non salitum, vel cum ∇ rosarum sæpiùs lotum, blandè inungendum est, quousque crustæ decidant.

Aures. Ubi in variolis auditus læsus fuerit, imprimis vesicatoria pone aures applicanda; hinc essentia cardui benedicti, aut castorei, cum bombace crebrius auri immittatur: Vel fiat suffitus ex castoreo, myrrha, colocynthide, semine fœniculi, & pauco croco in vino coctis, ac per tritorium auribus immittatur.

Funestæ imprimis sunt variolæ faucibus, in quibus suffocatoria pathemata, atque adeo agrypniā quasi inducunt. Ad præservandas hinc fauces ab angina optimū est procolutione oris & faucium stercus equinum, quod cerevisiæ secundariæ vel potui ordinario infunditur, & sæpius usurpatur; item gargarisma ex succo cancerorum fluviatilium, cum ∇ sempervivi majoris, omittendo vel addendo sal prunellæ; item gargarisma ex ∇ is appropriatis cum rob nucum & nitro depurato vel gato: e. g.

℞. ∇ *prunell. ʒiij.*

*Rob diamor.*

*nuc. ā ʒij.*

*syrup. granat.*

*de succ. scabios. ā ʒʒ.*

M. S.

**Gastt zum Halße.**

℞. ∇ *prunell.*

*scabios. ā ʒij.*

*mucilag. sem. cydon.*

*fœnugr. ā ʒj.*

M. S.

**Gurgelwasser zum Halße.**

Convenit quoque decoctum vel R florum papaveris erratici cum succo cancerorum fluviat. Vid. Sachlii *Gammamol.*

Quod si nihilominus fauces & lingua oblideantur, idque cum magno dolore & calore, imitemur Forestum *lib. 7. observ. 17.* qui jubet,

bet, ut continuo cum lacte caprino, &  $\nabla$  plantaginis simul mistis, tepidè se gargarizent; ægri; aut si gargarisatio molesta sit, saltem aliquandiu in ore detineantur, hinc exspuantur, quod miraculi instar prodesse ait. Item gargarisma ex decocto hordei, passulis minoribus, & similibus temperantibus adhibeatur, idque ad faciliorem maturationem: pustulis verò jam aperientibus, huic decocto mel rosaceum cum pauxillo aluminis admisceatur ad meliorem purificationem, ne ulceura sordida remaneant. Quod si nihilominus fauces & nares exulceratæ fuerint:

℞. HB. veron. l. salu.  
bord. à M.B. l. Mj.  
passul. min. M.B.

Coqu. in l. q.  $\nabla$  plantag. ad  $\text{z}$ viii. l. lbj.

Colaturæ adde  
Mell. rosac.  $\text{z}$ j. ad  $\text{z}$ jB.  
alum.  $\text{z}$ B ad  $\text{z}$ j.

M. S.

Gurgel-Wasser.

Quod si lingua exulcerata fuerit, siquidem hæc non rarò tota putrescit, eroditur, & exspuitur (vid. Schenkii lib. 1. *Observat.* Bartholinus *Cent.* 2. *Hist.* 22. M. A. N. C. *Ann.* 1. *Obs.* 35. in *schol.* p. 119. & Rolandus *aglossograph. annex. ann.* 3. M. A. N. C. *pag.* 448. Hæc est difficilis curatu. Contra talem tamen linguæ exulcerationem egregium est & expertum linimentum Horstii, quod habet in *Observat. suis lib.* 6. *Append. de Morbillis & Variol. pag.* 310. cujus descriptio est hæc:

℞. fl. malv. arbor.  $\text{z}$ B.  
balauft.  $\text{z}$ ij.  
myrrh. el.  $\text{z}$ j.  
alum.  $\text{z}$ B.

Excipiantur hæc omnia c. f. q. mellis de-  
spum. f. Electuarium molle.

Quòtæpius illinantur partes vel locus exulceratus. Si hoc non sufficit, accipe mel rosatum, tantillo  $\sim$  u Ois acidulatum; sic sæpè eluantur ulcera oris, quæ egregiè mundificantur & consolidantur.

Quod si variolæ labia obducant, adeòque ingentem dolorem inducant, mucilagine seminis cydoniorum eadem inungantur & curentur.

Quod si dysenteria vel corripiat vel subsequatur variolas, internè electuarium diascordii Fracastorii, C. C. ustum, terra sigillata, tormentilla, &c. conveniunt. Externè, si ferat morbi conditio, clyster ex lacte cum radice symphyti usurpari potest. Adhiberi etiam possunt remedia Riveriana, quæ in C. I. *Obs.* 71. & *Cent.* 2. *Obs.* 2. legipossunt.

In mictu cruento remedia ex plantagine sunt optima. Sanguinem post variolas per digitos pedum transsudasse, videbitis in M. A. N. C. *ann.* 3. *Observ.* 27. & vermiculos per

□ nam excretos, *ibid Observ.* 28. leni purgatione ablatos: Pollutionem nocturnam, *ann.* 9. *Obs.* 15.

Paralyfes, nunc particulares, nunc universales, non rarò insequuntur variolas: Vid. Velschius *Micromim. no.* 30. quam curandi rationem videbitis in *jam dicto anno Obs.* 9. *pag.* 13. Item quoad loquelam post variolas amissam, vid. Hildanus C. 6. *Obs.* 14. & M. A. N. C. *ann.* 2. *Obs.* 201. Ulcera variolosarum partium subinde pessimi moris, adeò ut Salmuth *Cent.* 2. *Obs.* 50. ulcera mammarum maligna admodum orta notet ex paucis latentibus variolis corruptis. Ulcera talia cautè, & non adeò vulgari modo tractanda sunt: Conf. Fehr d *Scorzonera pag.* 88. In gravioribus autem malis in subiecto robustiore, si alio modo curari nequeat, per salivationem cura erit optima, cum non secus atque in lue venerea in variolis pathemata partium nervosarum soleant esse communia, quibus Mercurius dulcis egregiè prodest.

Gangræna non rarò variolas uno alterove loco insequitur: quæ pars quomodo tractanda, & ægra à corpore separanda sit? exemplo gangrænæ genarum à variolis ortæ docetur in M. A. N. C. *ann.* 4. & 5. *Obs.* 60. p. 50. & *anno* 2. *obs.* 2. *pag.* 2. Facit huc curiosa observatio Thiermayeri *Conf.* 1. *pag.* 106. *scrotum* nempe in variolis sphacelatum per Mercurium præcipitatum rubrum, cum unguento rosato digestivo mixtum, separatim & resarcitum.

Denique articulorum tumores & ulcera post variolas curanda sint? videb. in M. A. N. C. *ann.* 6. & 7. *obs.* 100. *pag.* 139.

Variolæ nothæ curantur ut veræ, nisi quod blanda diaphoretica usurpentur; sicut & ægri post peractam sanationem blandis laxativis evacuandi sunt.

## CAPUT XI.

De

### Febre Scarlatina.

FEbris hæc scarlatina à Sydenham *observ. de morbis acutis* §. 2. *cap.* 2. ita dicta, quam Ingrassias de tumoribus à Neapolitanis Rossianam seu rossiam vocat, ad morbillos vulgò refertur; sicut & cum variolis nothis hoc commune habet, quod sæpè infantes tantum invadat, & quidem cum febre plus minus acuta: post 2 vel 3 dies noctesque primo circa collum, scapulas, & pectus, hinc faciem atque totum corpus rubor quidam, cum aliquali, sed vix notabili, intumescencia, nunc sub macularum

(Yy 3)

disper-



dispersarum, nunc expansi continui forma, erysipelati similis observatur, qui tumor post 2. vel 3. dies sensim subsidet, & in maculas saltem latiores abit, donec & hæ circa diem septimum planè evanescant, & cuticula in squamas secedat.

### CAUSÆ.

Febris hæc juxta Sydenham non tantum æstatis, sed & quovis alio tempore se exerit, cujus causa peculiaris lymphæ ebullitio videtur, unde cum symptomatis catarrhalibus, v.g. tussi, & Aris catarrhalis epidemica constitutione, frequentius oritur. Levem hanc Sydenham l. 2. Sennertus verò gravem, & sæpius lethalem pronunciat; sicuti etiam experientia docet, eam gravibus ut plurimum conjunctam esse symptomatis. Sub declinatione hoc singulare habet, quod facies & crura ut plurimum tumores œdematosos contrahant: imò crura simul obscurè satis rubescunt, qui tumor interdum ad oediduum, interdum diutius perseverat: interdum abdomen & hypochondria simili modo affliguntur, cum præcordiorum angustia, tussi & respiratione difficili, ægrique tandem, ut Sennertus annotavit, moriuntur.

### CURÆ.

Quoad curam: febris hæc tractatur, ut febres purpuratæ, variolæ, & morbilli, blandis tamen diaphoreticis: in fine morbi lymphæ viscidior blandè evacuetur, & simul primis viis, & massæ sanguineæ dyscrasie occurramus per absinthia & antiscorbutica.

## CAPUT XII.

De

### *Peste & Febris Pestilentialibus.*

**S**UPEREST adhuc summus febrium malignarum gradus, pestis & febres pestilenciales. Pestis consideratio & theologica & medica esse potest. Theologi eandem flagellum Dei dicunt: Medici ejus naturam, quantum possibile est, & indagant, & per medicamenta malignitati ejus succurrere satagunt. Est autem & vocatur pestis, quando in morbis suprema adest malignitas, quæ, quoniam quibuslibet ferè morbis conjungi, adeoque varia symptomata inferre potest, quibusdam non peculiarem morbum constituere, sed tantum conditionem morbi pessimam designare creditur. Unde pestilens febris dicitur ma-

ligna vehementior, proinde ac alii quoque morbi pestilentes vocantur, qui, præterquam quòd valdè acuti sint, malignitate etiam suâ adjunctâ terribiles sunt. Conjungitur enim pestis cum omnibus aliis morbis particularibus quidem, populariter tamen grassantibus, quibus multi interficiuntur; unde etiam diverso tempore diversæ pestes observatæ sunt. Sic enim ab Ægineta prodita est colica pestilens; Peripneumonix pestilentialis meminit Fracassatus; Pestis pleuritica est descripta à Johanne Wiero in observationibus; sic angina pestilentialis, phrenitides, dysenterix, hepatitides pestilenciales, &c. non sunt raræ; Mercurialis meminit cujusdam pestis, quæ pedes, tibias, & ossa ita infestabat, ut intra triduum peste correpti plerumque interirent; Georgio Agricola nota fuit pestis, quæ homines velut stupefacti ac siderati, omnibus membris tantum non mutilabantur: sic ab eodem observata alia, quæ totum ferè corpus in putredinem vermiculosam resolvebat: nec ignota fuit olim pestis illa superioris seculi, & quod excurrit, sudoris Anglici nomine appellata. Sed, utut febres pestilenciales variis se associare aliis affectibus possint, pestis tamen bubonaria propriè sic dicta peculiare morbi genus constituere videtur, h. e. ista, in quibus nunc bubones, nunc parotides, nunc carbunculi, subinde etiam petechiæ, erumpere solent. Omnes ergò hi affectus distincti, præter suam ordinariam, ut sic dicam, naturam seu constitutionem, summam habuerunt conjunctam malignitatem. Undè si eos appellare velimus morbos cum malignitate summa conjunctos, siue dicere velimus eos esse pestes, tales morbos imitantes, perinde est: cum in peste adsit causa, quæ tales morbos producere, & præterea singulari malignitate præsentaneum vitæ periculum inferre potest: In posteriori consistit pestilentialitas; unde morbus, cui hæc conjungitur, pestis postmodum vocatur.

De peste verò multi scripserunt, præ cæteris tamen meretur legi quoad theoriam quidem Kircherus *de scrutinio pestis*, & Helmontius *in tumultu pestis*. Quoad praxin verò ordinariam felicius imitandam, arridet Barbette *de peste*; item Diemerbroecius *Tract. de peste*; quibus & societur Sylvius *de peste*: utpote qui præsentis pestis interfuerunt.

Pestis ergo nomine nihil aliud intelligitur, quàm morbus maximè contagiosus & epidemicus, qui ortum ducit ex miasmate venenato, ab aëre primùm suscepto, & ita per contagiū ulteriùs propagato, quod occultè & latenter homines plures aggressū, eos in sum-

summum vitæ periculum conjicit, & ferè bubones, carbunculos, nonnunquam & petechias, comites secum trahit.

Miasma istud contagiosum summè est subtile, admodum activum, & quaqua versum virulentiam suam exserit, adeoque quasi multiplicabile est; unde ob summam sui subtilitatem à quibusdam dicitur spiritus pestilentialis, ab aliis aura venenata, Helmontio vocatur gas fracidum in aëre, quò innuit & ejus subtilitatem: Substantiam & naturam Gas vocans, innuit materiam subtilissimam, spiritum incoercibilem, adeoque spiritui vitali facilè sociabilem: Fracidum vocans, originem designare vult, quod ex putrilagine, & odore spirituali fracido oriatur. Gas hoc tanquam spiritus subtilis, quasi incorporalis, adeoque, similis ferè est cæco isti odori, quo mediante canes heros suos agnoscunt. Illustrat verè hoc curiosum observatum Borelli *Cent. 1. Obs. 74.* de quodam eremita, qui miasma pestilentialiale latitans solo odore, uti retulit, cognoscere potuit, percepit odorè fœtidū calceorū ustorum similem. Summè contagiosum est miasma, quod miris modis inficere ac se multiplicare potest, cum non tantum immediatum contactum corporalem, sed per intermedia quæcunque, per vestes, per nummos, per litteras hinc inde transmissas, &c. propagatum, & in alias regiones translatum fuerit, adeoque juxta Diemerbroecium *l. 1. cap. 7. Annotat. 1.* & annotante Sennerto, pestis primò, & antequam epidemica evadit, adeò furtim & clandestinè irruit, ut sensu internosci nequeat.

### C A U S Æ.

Natura hujus miasmatis pestilentialis contagiosi, cum hætenus à nemine cognita, aut exactè & scientificè explicata sit, propterea etiam controversiam hanc in medio relinquo. Illustrarunt negotium hoc, qui naturæ arsenicalis esse asserunt, imprimis Kircherus *l. 4.* qui egregiè ventilat hanc controversiam, eam tamen suæ putredini animatæ applicat: Hinc imprimis legendus Helmontius, Sylvius, & Peuli *de febribus malignis*, qui præcipuè de peste statuunt, quod ex contagio salinæ volatilis substantiæ oriatur; unde cochlearj, acetiaque acida, quotidie manè porrecta in peste Lugdunensi mirè profuisse, Sylvius expertus testatur. Helmontius in eo præ cæteris est sollicitus: quomodo subinde animi affectus, imaginatio, terror ac pavor, ad pestis propagationem conferant, ut iidem afficiant corpora antea sana? Nam inter causas, quæ corpus disponunt ad pestis fomitem promptius suscipiendum, vix una est potentior imaginatione, & hinc natis animi affectibus, terro-

re, metu, pavorè, & similibus. Exempla miranda animi affectuum prostant hinc inde, in specie vid. Deusingius *Dissert. de peste*, item Galbelchoverus *Cent. 5. Observat. 67.* speciatim Hœchstedterus *Decad. 7. Cas. 21.*

Post istos tamen animi affectus imprimis etiam aër inquinatus multum in propaganda populariter peste confert; Æ enim ejus vitale hebetatum aut inquinatum a veneno pestilentiali videtur, unde aëris medio venenum tale pestilens, quod ceu fumus instar gas exsuscitati ex fermentescibilibus subjectis, aut gas ex puteis profundis inspiratum mox partim spiritus vitales afficit, partim etiam cruorem plus minus inquinat; hinc illius ratione virium omnimoda prostratio & vitæ periculum; hujus verò bubones & carbunculi: unde spiritus animales & vitales ab animi pathematis, maximè à terrore vel metu ac pavorè, percussi & plus minus suppressi, eò facilius contagium suscipiunt.

Causæ remotæ, seu quæ miasma istud venenosum possunt producere, sunt varix ac distinctissimæ. Præ cæteris terræ motus considerandi sunt, utpote quos passim gravissimæ pestes infecutæ sunt; quorum causa non ineptè rejici videtur in effluvia mineralia arsenicalia, sulphurea cruda & immatura, & Mercurialia ex cryptis exhalantia, ac similia. Den Schwaden / cujus halitu toties jugulantur metallifolliores, quæ aërem inquinando promptissimè pestem induxerunt: item cadavera animalium sine sepultura jacentia, putrescendo miasmata maligna exspirantia, ad pestem disponunt. Pertinet huc fames, quam sæpius sequitur pestis, item hominum strages in bellis, quorum cadavera non sepulta, & putredine resoluta, aërem corrumpunt, & pestem inferunt. In specie mumialis conspiratio & confermentatio hic observanda est, ratione cujus inter consanguineos seu eos, qui habent symbolum seu convenientiam cæteris paribus facilius & potentiùs propagatur; unde sæpè integras familias devastat pestis, ut alios homines cum his frequenter conversantes non attingat; sicuti & quædam magis homines, quædam magis bruta afficit: Vid. Diemerbroecius *l. 4. Annotat. 6.* ubi annotavit filios in Hollandiæ civitatem, in qua tunc nulla pestis, transmissos, patre ac fratre pereuntibus, ac matre lethaler decumbente, quamvis eluctante, ibi pariter ex eodem morbo decubuisse.

Fundamentum consistere videtur in archeo seu spiritu vitali infuso, cui cum miasma pestilentialiale inspiratum arctius se junxerit, eatenus disseminatur & determinatur, ut facile alium

aliud huic symbolizantem, i. e. sibi similem archetypum inficere & inquinare possit: Contingit enim, ut pestis saltem determinata affligat bruta, boves, &c. nã bruta diversa diversos habent spiritus. Rarissimum est, quod pestis humana bruta affligat, quod observandum sedulo; quia in hoc ratio præservationis consistit.

Plures aliæ aëris alterationes undecunque natæ ad pestes quoque plus minus disponunt: hinc enim morbi maligni populariter grassantes nunc acerbius affligunt, nunc denuò remittunt, pro aëris sc. alteratione varia: unde & tales morbi maligni gravius grassantes, imprimis variolæ, febres petechiales, dysenteria epidemica, &c. interdum prodromi solent esse admodum frequentes infecuturæ pestis. De beneficiis pestem inducentibus non opus est, ut multa dicam, cum exempla passim prostent apud autores: Confer. *Garmanus de Mirac. Mortuor. pag. 40.* & *Hercules Saxonia Tract. de Plica Polon. cap. 11.*

Quoad affligendi modum: pestis, uti superius monui, est admodum varia; non semper enim una pestis, sed diversæ sunt: In genere nunc est cum febre complicata, nunc, utut rarius, sine febre affligit. Sunt equidem multi, qui existimant, pestem non esse absque febre; verum contrariatur experientia: Vid. *Diemerbroecius l. 1. cap. 12. Annotat. 2.* *Hodges de Peste Londin. pag. 57.* *Sorbait de Peste Viennensi Quest. 12.* & imprimis *Barbette l. 4.* qui, cum duabus pestibus interfuisset Amstelodami, refert: se multos observasse, quibus citra febrem sub axillis aut prope inguina bubones eruperint, quod satis testatur, illos peste correptos & affectos fuisse; quos ipsos etiam tumores absque febre in peste longè difficiliores esse curatu, quàm reliquos, observavit. Imò in genere pestis absque febre periculosior est ista, quæ fit cū febre; febris enim est motus naturæ irritatæ. Dum ergo mox prosternitur spirituum exercitus, ut siderati quasi intereant, & hinc primum naturæ robur deficiat, absque febre, periculosissimè tamen decumbent ægri. Sæpè licet adsit febris, tamen est lenta, utut de interno causo conquerantur.

Pro varietate ergo pestis etiam symptomata, quæ ægros affligunt, sunt varia, & in qualibet peste ferè variant. Frequentius levis horror corripit peste infectos; hunc insequitur æstus seu ardor intensus: Hic æstus interdum est admodum insignis, cum siti tamen parva vel nulla conjunctus; è contrà sitis interdum est admodum ingens, &, uti vocant, clamosa, utut ardor quoad externa sit exilis: ut plurimum, sive parvus sive magnus sit ardor corporis, lingua percipitur arida seu sicca, urinâ existente sanorum simillimâ: interdum

inclinant ad somnum: sæpius tamen caput insigniter dolet, & tunc oculi insigniter rubent, fulgidi sunt & ignei, atque taliter ægri nullo modo somnum capere possunt: Adsunt interdum anxietates cordis, cum pulsu parvo ac debili, à primo attractu pulsus magnus apparet, nihilominus tamen, ubi vehementius paulo applicantur digiti, mox suam parvitatē prodit. Vires imprimis in principio subito ex toto prosternuntur. Supervenit interdum alvi fluxus, qui nullo ferè remedio sisti potest; quidam sæpius vomunt, quidam vero tantummodo ad vomitum inclinant: Multi habent tumores prope axillas, prope aures, & prope inguina, aut in locis, ubi adsunt glandulæ, aut majores, aut frequentiores: quibusdam erumpunt pustulæ rubæ seu albæ: quibusdam anthraces seu carbunculi, maxime in digitis, naribus, oculis, labiis: quibusdam petechiæ, æque nigræ, quæ sunt omnium pessimæ, & frequentissimè necant. Plura videantur in *Barbette*, *Sylvio*, & *Diemerbroecio*.

### DIAGNOSIS.

Signa, quæ futuram pestem innuunt, hæc inter vel maxime consideranda sunt insecta, ubi sc. varia ac multa insecta, aliàs insueta, aut admodum copiosa observamus in aëre. Nam ex his insectis aut portendi, aut etiam inferri pestem, multi existimant autores. Exemplum sunt nota ex *Kircheri* præ cæteris, præter hunc ex *Riveri Observat. 10 morborum infrequentium*, item *Hildano Cent. 4. Observ. 23.* Hæc & reliqua signa prognostica pestis imminentis à *Kircheri l. 1.* assignata, e. g. quæ dicuntur de capra, de panemundo, de *Uli* crustam contrahente, &c. Omnia sunt vana, & saltem simpliciter conjecturæ superficiales; propterea non amplius attingo.

Signa vero præsentis pestis etiam non æquè sunt facilia: Nam antequam pestis grassatur, vix ejus signum pathognomonicum haberi potest. Plerumque tamen in omnibus pestium generibus cum signis quibusdam febrium ardentium seu continuarum acutiorum ac periculosiorum concurrere solent bubones, carbunculi, & macularum varietates, uti etiam interdum ulcera maligna.

Quod si verò jam in loco quodam familiariter grassari incipiat pestis, non difficulter cognosci potest ex eo:

1. Quod multos invadat, ac plerisque subito jugulet, in specie cum bubonibus & anthracibus. Vel
2. Quod virium subitanea adsit prostratio, & symptomata facultatis vitalis insigniter læsæ sine manifesta causa: Pulsus subinde in principio appareant magni ac celeres; sed mox sint parvi, languidi,



guidi, frequentes, intermittentes, inæquales, in progressu jungatur febris, calor extrinsecus appareat moderatus, intus verò sit insigniter ardens.

Ipsū ægrum peste correptum innuit nausea sine manifesta causa, id quod contagii suscepti indicium est: punctiones in locis bubonum, vel in fonticulis: item prægressus terror: item capitis dolor sine manifesta causa, vel similis corporis præternaturalis alteratio subitanea: ægri interdum halitum foetidum expirant, vel sudant, aut etiam totum corpus malè olet; vel etiam dicunt, in cibo & potu putridum esse odorem, quasi fracidum: ægris varii colores subinde ante oculos versari videntur, qui vel deliria, vel certè epilepsiam innuunt; tunica enim retina convellitur, qui spasmus mox continuatur ad reliquum systema. Ego observavi in aliis febribus malignis, si ægri non possunt discernere colores, imminere convulsiones. Observavi quendam febre malignâ petechiali laborantem, qui dicebat: me indurum esse cœruleâ veste; prædicebam de epilepsia lethali, quæ subsequuta est in meridie. Et denique si grassante peste æger sentiat in locis bubonum, v. g. sub axillis, circa parotides, aut circa inguina, puncticulam seu puncturam, plures vel pauciores, vel etiam unicam, instar aciculæ candentis, tunc solet esse infallibile pestis signum, tum temporis, ubi aliàs eadem grassatur: & Lindanus dicit: nunquam eum fefellisse, si nempe alia conspiraverint, qui tamen tribus pestibus interfuit. Quando igitur tale quid in bubonibus sit, statim oportet evocare, quia punctio illa est conatus paturæ, volentis huc deponere venenum. Quæ ipsa confirmantur ulterius, si præcesserit metus vel terror, & jungatur capitis dolor insignior, vel similis præternaturalis subitanea corporis alteratio.

Chronologiam pestium insignium à diluvio ad nostra usque tempora videbitis in *Piens de febribus part. 2. pag. 189.*

### PROGNOSIS.

Quoad signa prognostica: in prognosi cautus sit Medicus, utut minùs possit in peste errare, quàm in febribus malignis, ex eo, quoniam sæpius in peste infecti moriuntur. Pestis enim omnis acutissima, & periculosissima est: interim sua est inter illas differentia. Quædam enim magis, quædam minùs acuta est: quædam pestis, intra 24. horas, quædam intra 2. vel 3. aut 7. dies noctesque jugulat: intra quartum summum est periculum.

Sanè si ullius morbi, certè pestis incerta est prognos, ita, ut Johannes Morellus *de febr. pestil. cap. 5.* in hæc verba erumpat: *Fis, ut in pestem fallat sensus, fallat ratio, fallant Hippocratis aphorismi: & ut ipse puto, in his fallere.*  
Tom. II.

tur Hippocrates; quatenus nec mutationes critica, diebus criticis incidentes, nec urina & pulsus laudabilis aliquid certi promittunt, sed potius fallaces sunt: vid. Diemerbroccius *l. 1. cap. 15. §. 1. & annotat. 1.* Sennertus *de febribus pag. 419.* Hodges *de peste Londinensi pag. 162.* & Thomsonius *Experim. Admir. p. 20.* Saltem observandum, quod scabies tempore pestis sit salutaris; item lue Venereæ correpti, aut qui laborant affectibus melancholicis, minùs solent affligi, vel afflicti minùs solent periclitari, vel planè non peste affligi, uti rectè observat Forestus *lib. 6. obs. 24.* In talibus enim peccat acidum. Pestem tamen libenter seise lue Venereæ associare asserit Hodges *de Peste Londinensi.*

Porro ii, qui ob pestis horrendum metum, vel post exercitationem nimis vehementem, peste corripuntur, in vitæ periculum adducuntur, licet maximè sedulò curentur, uti observavit Gabelchoverus *Cent. 5. cur. 71.*

Tumores, bubones, & carbunculi, si citò & confertim erumpant cum symptomatum levamine, salutarem promittunt eventum.

Bubonaria pestis quocunque in loco erumpat, est omnium mitissima & securissima, & tutior istâ, quæ cum anthracibus conjuncta.

Pessimæ omnium ac lethales dicuntur pestes, quæ petechiis corpus inquinant, cujus maculæ in stigmata facile abeunt, ac ferè semper symptomaticæ existunt: vid. Hodges *pag. 143.* Diemerbroccius *l. 1. c. 15. annot. 33.* & Thomsonius *Experim. admir. pag. 21.*

Pustulæ seu vesiculæ pestilenciales pisum majus, aut fabam minorem ad summum æquant exsurgunt cum dolore lancinante & exquisito, humore intus seroso, ut plurimum citrino, imò livido, & ad suppurationem inepto, modò plures, modò pauciores: aliàs prodeunt sine ullis fere symptomatis, aut certè levioribus, omniumque mitissimam sœvent pestem, vel quæ venenum mox secedere patiatur, vel quæ crasin firmiorem offendant; quibus scemellam, totam scatentem vidit Hodges *pag. 120.* quamvis idem *pag. 121.* & Barbette *pag. 33.* easdem aliquando in carbunculas degenerare annotaverit.

Stigmata, die Pfefferkõrner / certissima mortis signa observantur, suntque nihil aliud, quàm minutissimæ ac discretæ sîderationes, quarum radices intrinsecæ latiores quasi in pyramides assurgunt, & habitum mortificant: imò etsi non rarò sine ullis ac gravioribus symptomatis compareant, nihilominus enecant, prout exempla ab Hodges *pag. 144. & 145.* allegata docent, nisi superficialia admodum, & quibus aliquid sensibilitatis remansit.

(Zz)

Vibices

Vibices diversi coloris nunc solitarii apparent, nunc carbunculis adjuncti sunt; utrique tamen pessimi moris observantur, imprimis, si sine febris incremento albescant.

Carbunculi, quamvis indigitatis vibicibus minoris periculi sint, bubonibus tamen ut plurimum peiores observantur; quatenus non tam gangræna videatur in fieri, quam in sphacelum degenerans.

Præterea sicut bubones plures & boni coloris paucioribus sunt magis salubriores; ita carbunculi, quod plures, eò res est periculiosior.

Si per sudores largiores materia discutitur, bonum signum; si verò frigidus sit sudor, aut etiam extrema frigida, in specie nares, est malum.

Tumores delitescentes & imperfectè erumpentes, seu, uti vocantur, ad interiora recedentes, summum vitæ periculum portant.

Eminentibus bubonibus seu exanthematibus superveniens singultus, malum est periculosum.

Anthraces quæ erumpunt in digitis, utut videantur tutiores, propter nervos tamen ac multos concurrentes tendines periculosiores sunt, quam in aliis partibus carnosis.

Si super bubonem erumpat anthrax seu carbunculus, lethale est signum, præsertim in locis tendinosis.

Si bubones & anthraces ante febrem erumpant, minus est periculum, quam si post febrim denuò appareant.

Tumores aliquantisper inflammati, unà cum circulo rubicundo inflammatorio, cæteris paribus non sunt adeò insigniter periculosi; ubi verò eos circumdat circulus plumbeus seu lividus, gangræna pessima imminet, & sæpè ægri ante biduum intereunt.

Cantharides vel vesicatoria applicata super bubones, si excitant amplam vesicam bonum est; sin minus audacter pronunciandum: ægrum difficulter convaliturum. Infallibile hoc est in omnibus morbis.

Si post applicatum vesicatorium & apertum, vel etiam post cauterium actuale, intra 12. vel etiam ad summum 24. horas anthracis augmentum seu ejus progressus ad vicina non potest coliberi, æger interit. Id quod etiam fit, quando post cauterium, sive potentiale sive actuale, applicatum locus aridus & siccus permanet; sicut in moribundis fontanellæ non effluunt.

Si eschara excitata sit candida, infallibile signum mortis est; sicut & quibus fontanellæ in prima morbi invasione exarescunt: vid. Diemerbroccius *l. a.* §. 27. & *l. 4. hist.* § 1. sin verò applicato cauterio erumpant pustulæ vel vesiculæ, quod majores, eò melius; & si postmo-

dum conveniens & laudabilis materia in illis generatur, æger erit extra periculum.

Anthrax aut carbunculus cum vibice, communiter flavo vel rubeo, est admodum periculosus: quod si verò vibex albescat, cærulescat, aut live scat, citra febris decrementum, pauca spes salutis superest.

Si bubones in collo aut prope aures inducant dolores gutturis, & deglutitio citra insignem internam inflammationem impediatur, tunc patiens vix ultra 12. vel 15. horas supervivet.

Febris insignis citra anxietatem cordis minus periculosa est, quam cordis anxietates citra insignem febrim.

Quò arida magis & sicca est lingua, eò magis imminet periculum: vid. Barbette *de peste* pag. 9.

Mox insignis in principio virium prostratio, crebra animi deliquia, cordis palpitationes, & præcordiorum anxietates compressivæ, lethalia ut plurimum sunt symptomata.

Delirium in peste cum oculis igneis & lingua arida, squalida, prævum est signum.

Pulsus in principio inæqualis valde & intermittens, semper ferè lethalis est.

Sopores in principio ac statu semper lethales sunt: vid. Dodonæi *Prax.* l. 1. c. 18. Diemerbroccius *l. a. annotat.* 6. & Hodges *p.* 163. & rarissimum est, ut tunc cum surditate parotides salutares prodeant.

Singultus, utpote qui ut plurimum à carbunculo ventriculi ac diaphragmatis videtur ortus, lethalis: vid. Diemerbroccius *cap.* 13. §. 5. & 6. *cap.* 15. *annotat.* 15.

Vomitus pertinax, seu qui per tempestivum & legitimum alexipharmacorum usum sedari non potest, utpote qui similiter carbunculum ventriculi pro causâ agnoscit, lethalis est.

Suppressio alvi rarò sine omni salutis spe solet esse; è contra diarrhœa, præprimis in principio, summum minatur periculum: vid. Diemerbroccius *lib.* 1. *cap.* 15. *annotat.* 16. & 17. & Hodges *pag.* 157. imprimis, si excrementa varia, nigra, viridia, & insigniter fœtida rejiciuntur.

Urina crassa, turbulenta, ac enormiter fœtida; item pinguis, nigricans, aut hypostasin lividam deponens, non sine periculo est: vid. Sennertus *pag.* 419. Diemerbroccius *l. a.* §. 21. & 23. ac Hodges *pag.* 162.

Sternutationes crebriores mortis sunt prodromi, secus ac Riverius *de febribus pestilent.* asserit: vid. Diemerbroccius *l. a. annotat.* 7.

Motus artuum ac linguæ tremuli ac convulsi, nec non vigilæ; item rauco & dolor gutturis sine tumore, aphthis, similivè causa evidente, certissimum mortis imminens signum

signum observantur : Vid. Diemerbroccius *l. 4. Annotat.* 10. nec non anhelitus foetor enormior : vid. *Fracaſtorius de morbu Contag. lib. 2.* & Diemerbroccius *l. 4. Annot.* 12. Similiter, si æger omnia sibi foetere dixerit : vid. *Senertus de Febris pag. 420.*

Si propinatis sudoriteris ægri parùm vel nihil sudent; si sudores mox in principio morbi sine euphoria promanent; si justo fervidiores, aut frigidiores, aut foetoris cadaverosi sint, facillimè interire possunt; utut sudores aliquantùm graveolentes, interdum salutare sint: Vid. *Hodges pag. 158.*

Hæmorrhagiæ semper ab omnibus Medicis tempore pestis statuuntur periculosa, imprimis per vesicam & sputum : Vid. Diemerbroccius §. 24. & 25. & Barbette *l. 4.* utut hic narium hæmorrhagiam ac mensium fluxum, ut plurimum etiam mictum cruentum, salutare annotavit.

Gravidis, puerperis, vel abortientibus, si peste corripiantur, multum periculi imminet, & plerumque pereunt. Sed, qui per nares habent legitimam hæmorrhagiam, aut quibus supervenit mensium fluxus, subinde convalescunt; quibus verò supervenit mictus vel alvi fluxus cruentus, subito intereunt.

Interdum fit, ut anthraces oriantur in oculis, in naribus, in stomacho & intestinis, idque citra spem vel minimæ convalescentiæ.

Anthraces etiam oriuntur in vesica urinaria, & tunc ægri cum summis torminibus intereunt.

Quidam tanquam certum hoc habent experimentum prognosticum in peste : sc. projiciunt lac mulieris, lactantis masculum, in urinam peste infecti, unde, sicadat in fundum, ante sextum vel septimum diem ægros interire; si verò non cadit, dicunt, eundem supervivere. Sit fides penes experientiam.

### C U R A.

Quoad curam in peste, duo sunt observanda:

1. Ut præservetur corpus ab insultu.
2. Ut curetur jam peste infectus homo.

Præservativum propriè dictum & optimum est fuga, eaque cauta: Fuge citò, recede longè, tardè redi. Sed hæc præservatio non semper est licita, interdum contra conscientiam & rationem, & sic proditur propria incertitia. Unde inter Medicos & Politicos disputari solet: an domus infectæ occludenda, ac homines infecti sequestrandi? multi negant ex sequentibus rationibus:

1. Quod ægri à societate liberiori præscripti maximè consternantur.
2. Sani cum infectis orci faucibus exponantur : Et

Tom. II.

3. Quod vicini arceantur, à quibus tamen nihilominus infecti consilium & solatium expectare possunt.

Verùm, sicut pars corrupta amputari solet ac debet, ne pars sincera trahatur; ita non melior est præservatio, quàm tempestiva sanorum ab infectis seclusio, cum alias infectorum malitia & fraudulentia vix coerceri possit.

Tempestivè ergo, & maximè principio, ædium infectarum separatio hæc & exclusio prudenti cum regimine instituenda erit, aliàs, si contagium hoc propter moras se jamdum latius explicuerit, occlusio hæc respectu tanti periculi impar esset remedium, nec ærarium publicum sufficeret, pro tanta segregatorum & occlusorum multitudine sustentanda. Simul tamen contagio infectis & inclusis de alimentis, medicamentis, aliisque necessariis prospiciendum est, ne fame potius quàm peste pereant: nec sani cum ægris secludendi, sed firmiores & sani extra urbem ædificio, ab omni contagio libero, ad certum tempus excipiantur, antequam ipsis in publicum prodire concedatur; semovendo interim pariter illic eos, qui contagio forsan afficiuntur.

Præterea cum pestis afflictio in duobus consistat, nempe in causa agente, i. e. in malignitate ubique grassante, secundò in subiecto patiente seu corpore humano, malignitatis insultus sustinente: propterea genuina præservatio consistit in duobus:

1. In causæ malignæ aversione & vitiatione.
2. In subiecti patientis ad resistendum malignitati roboratione, ne contagium malignum suscipiat, h. e. ut loquitur *Helmontius de Xenechtho*, h. e. amuleto: quod debet tollere appropriatorem & adaptationem munitalem, extra quam nulla fit contagii susceptio; vel spiritum nostrum vitalem roborant, ne per metum aut terrorem afficiatur & in contagio munitalem dispositionem delent, hinc massam sanguineam alterant; & certo quasi balsamo condiunt, sic ymbolizatio munitalis hoc ipso imminuitur.

Scilicet non adeo promiscuè in quosvis grassatur pestis, quin certas familias, certum sexum, certam ætatem, certos homines, &c. saltim affligat gravius: Conf. *Boyle suspic. de aeris qualitat. pag. 3*; item *Velthufius de Liene pag. 171.*

Pro quibus scopis notandum est: quòd jejuni facilius à peste, uti etiam à morbis malignis, afficiantur; quod etiam in metallifossoribus observatur; item qui in Ætio vel Mercurio occupati sunt. Ideoque jejuni non si-

(Zz 2)

mus



mus, sed semper, antequam exeamus domo, fumamus aliquot buccellas panis cum butyro & ruta, & assumamus haustum vini absinthitis bonum vel alium medicatum, vel, quod melius est, præcipiunt quidam haustum vini Rhenani aut alius generosi camphorâ imprægnati, i. e. fumatur camphoræ quantitas pisi, eaque leviter accensa immittatur haustui vini, ut supernatando successivè comburatur; sin extinguatur, denuo accendatur, pergendo, donec tota consumpta sit; hoc enim modo vinum redditur camphoratum, quod, antequam exeamus, hauriamus. Est enim vinum veneno pestifero contrarium, adeoque singulare pestis præservativum, partim ratione acidi generosi, nostro corpori amicissimi, partim quod animosos & minùs pavidos & meticulosos reddat, adeoque graves animi affectus & curas ad pestem disponentes pellat, si nempe ingurgitetur ad aliquam mentis hilaritatem: Vid. Willisius *de Febris*, ubi *de Peste*. Semper autem addatur camphora, quia hæc in peste est optima. Vinum Hispanicum magnis encomiis extollit Hodges *de Peste Londin.* pag. 228. 233. 243. & Diemerbroccius *l. 2. cap. 6. Annot. 14.* Potest etiam fieri vinum medicatum infusione vegetabilium aromaticorum alexipharmacorum, nunquam omittendo myrrham & camphoram, & tale vinum medicatum hauritur singulis mane, antequam exeamus. Sic pestis & febrium malignarum præservativum optimum est salivæ exspitio, quamdiu nimirum nobis in loco affecto, vel cum personis ac rebus aliis suspectis, res est: Vid. M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. Obs. 170.*

Purgantia ad præservationem nil valent; sed si adhibenda, sint rara, parca & cauta, ne sæpiùs vires debilitentur, & massa sanguinea ab ipsis exinde vitietur. Ergo illa propriè sic dicta fugiamus, & mitissima demus. Ubi opus est laxatione, præscribendus est haustulus Barbette *Tract. de Peste* pag. 603.

Potus spirituosus simplices tales, Brandwein/ ut & in specie  $\nabla$  vitæ theriacales,  $\nabla$  theriacalis aromatica,  $\nabla$  apoplecticæ, & ipsæ compositiones theriacales solæ, ut theriaca vel Michridatium, non adeo sunt convenientes in pestis præservatione, quia ad phlogosin disponunt; Unde si talibus subjectis supervenerit pestis, ardentibus admodum corripuntur febribus, & in his pertinacia admodum inducunt deliria: Aut ergo parum sunt usurpanda talia, aut intermixtis acidis temperanda, monente Sylvio.

Fonticuli corpori inusti sunt unum ex optimis præservativis, quos omnes autores, pariter & experientia, comprobant: Vid. præcæteris Primerosius *lib. 4. de febribus c. 10.* Hil-

danus *Cent. 4. Observ. 23.* Riverius in *Observ. communicatis* Horstius in *Obs. pag. 359. & 360.* Bartholinus in *Actis Med. Hassniens. Volum. 4. pag. 152.* aliique. Confirmat hoc ipsum etiam Lindanus, qui optimo consilio dicit: Nil melius esse ad præcavendam pestem, quàm fonticulos: Avunculus meus, dicit, vixit in Marocco Africa, ubi suo tempore, spatio 5. septimanarum, 85000. hominum fuerunt à peste interempti: ipse se præservavit, & suasisit Judæo Medico, ut inureret fonticulos, unde omnes ii, quibus excitati fuerunt fonticuli, manserunt liberi ac immunes. Ipse expertus sum, pergit Lindanus, fonticulorum insignem usum, & ii, qui inscii ad infectos, aut locum infectum accedunt, statim puncturas, & quasi morsificationes in fonticulus persentiunt, quò ipso percipiunt, locum esse peste affectum: idque etiam confirmat Hodges *de Peste* pag. 241. Unde rarum est, quod interdum fallat, sicut contrarium habet Hæchtstedterus *Dec. 7. Cas. 1. pag. 2. & Cas. 31.* qui observavit nonnullos, quibus fonticuli inusti, & tamen in peste demortui sunt: de quo vid. etiam Horatius Augenius *lib. 3. Præservat. pestilent. cap. 35.* Fridericus von der Wiene *de Peste Bredana*, & Thomsonius in *Epilogismo*.

Præservatio ipsa in specie instituitur vel per medicationem aëris, vel per medicationem corporis. Aerē medicari solem per suffitus, ut nempe fracedo ista aëris inquinata corrigatur & tollatur, ubi suaveolentia, ut moschus, zibethum, &c. minùs conveniunt: Vid. Diemerbroccius *lib. 2. cap. 2. Annotat. 9.* Quin potiùs sulphurea, nitrosa & omnia acida pro aere medicando sunt aptissima, quæ isti putredini resistunt; unde etiam talia miasmata exhalantia solent destruere. Sic sulphur accensum insigniter aërem corrigit; si adjungatur  $\Phi$ , est eò melius: hinc pulvis pyrius, qui constat ex nitro & sulphure, accensus est unum ex optimis remediis pro corrigendo aëre, in ædificium inflatus. Unde etiam optimo consilio commendantur crebriores tormentorum bellicorum, pulvere pyrio probè infarctorum, explosiones super civitates. His tamen, nempe sulphuri & nitro, & alia subjecta sulphurea addi possunt, succinum, benzoë, baccæ juniperi, thus, pix, myrrha, camphora, ac galbanum, similia sulphurea. Pix, ut notum est, fuit secretum Hippocratis pro aëre corrigendo: Confer. hîc Kircherus in *Scrutin. de Peste* pag. 362. & Helmontius in *Tumulo pestis*: e. g.

$\mathcal{R}$ .  $\mathcal{Z}$ ii pulveris.  $\mathcal{I}$ bij.

$\Phi$ i  $\mathcal{I}$ bj.

M. f. Pulvis grossus: S.

Räucher-Pulver die Häuser zu räuchern.

$\mathcal{R}$ .  $\mathcal{Q}$ i  $\mathcal{Z}$ viiij.

$\mathcal{Q}$ is  $\mathcal{Z}$ ij.

myrrh.

succin.

*succini* ā ʒi.

M. f. Pulvis grossus:

D. S. ut antea.

℞. *Œis* lbj.

*olibani* lbʒ.

*myrrh.* ʒij.

M. f. Pulvis grossus:

Cujus ℞. p. j.

*bacc. junip.* part. ij.

*succini* part. ʒ.

M. D. S. ut supra.

Præterea etiam vitriolum, alumen, nitrum, sulphur, & in specie horum spiritus superfusi lateribus ignitis, insigniter aërem corrigunt: item acetum tam simplex, quam rosaceum, & rutaceum, vel acetum vitriolaceum Angeli Salæ affundatur lateri ignito, ut fumus exinde exurgens corrigat aërem, purificet vestimenta, & domus peste infectas: Vid. Vallesius *de Epid. c.* 19. vel aceto rutaceo addatur *Œli* q. f. & hoc ipso dicto modo suffitus instituitur: Vel virideas maceratur in aceto, quò lateribus candefactis manè, meridiè & vesperti affuso, aër corrigatur: In quibus omnibus tamen camphora subinde addenda venit. Trochisci efficaces, sed paulò suaviores, pro fumo possunt parari ita:

℞. *Œi* lbj.

*Œis* ʒij.

*benzoes*

*styracis* simul liquati ā q. f.

Ut formentur trochisci sub usu carbonibus dentariis injiciendi: S.

**Räucher-Küchlein.**

Fætores & odores graviores atque ingrati, nempe hircorum, quos Grulingius *de Pestep. 24.* commendat, cloacarum, stercoreum jumentorum, & porcorum exhalationes seu fracedo à Cardilucio *de Peste pag. 65.* & *Append. cap. 5.* magni æstimatæ, cornu quoque, imprimis hircini & ungularum equinarum, suffitus, hincque suffimentum de cornu hircino Mynsichtii moderatè, & non nisi sub personarum selectu admittantur, cum præter vim miasmata pestilentialia enervandi spiritus animales simul figunt & obfuscant: Vid. Diemerbroccius *de Pestel. 2. cap. 5.* Non inepti sunt, qui lac calefactum in conclavi suspecto reponi jubent; hinc enim fieri, ut infectio omnis lacti se insinuet, ita, ut crusta viridiuscula lacti supernatare appareat: Vid. Kircherus.

Medicatio corporis in præservando fit per remedia vel externa, vel interna. Interna sunt imprimis acida, & hinc sulphurea.

Acida volatilia ab omnibus autoribus commendantur in præservando corpore à peste: unde præter vinum acidum, commendantur inter fructus aciduli imprimis, citrus, berberes, ribes, & similes; item cydonia & au-

rantia, exque his parata. Reliquis verò præfertur acetum, in specie aceta theriacalia ex simplicibus alexipharmacis, præsertim diaphoreticis, e. g. zedoariâ, radice contrayervæ, cinnamomo, zingibere, radice petasitidis, scorzonera, serpentaria, floribus calendulæ, rosarum, &c. infusa, quæ, sive cum sive sine theriaca parata fuerint, egregium sunt præservativum. De talibus manè cochlear unum vel alterum, jejuno stomacho vel post jusculum assumatur, præservationis gratia. Talia sunt: acetum bezoardicum Kircheri *de Pestepag. 176.* Timæi *in Cas. 32. l. 8. pag. 393.* & aqua prophylactica Belgarum, quam Sylvius & Barbette in peste Amstelodamensi felicissimè usurparunt.

Sanè acetum solum, in quo soluta camphora, vel rob juniperi, vel infusa myrrha, vel sola, vel baccis juniperi, myrrha, zedoaria, carduo benedicto, & paucis aliis selectis adhibitis, instar mille aliorum compositionum sufficiunt pro præservatione, quibus semper tempore usus l. q. camphoræ vel V camphorati addenda est. Vel

℞. + infus. Theriacæ: huicque post filtrationem addatur camphora.

Vel

℞. *baccar. juniperi.* l. *heder. arbor.* part. jv. *myrrh.* part. j.

Infund. in aceto: hinc filtretur & imprægnetur cum camphora.

Hoc erit præservativum & alexipharmacum nobile, omnibus compositis theriacalibus præferendum.

Vel theriaca q. v. assumatur in vehiculo aceti, additâ myrrhâ & camphorâ, pro præservatione.

Et sanè compositiones theriacales nunquam usurpandæ sunt, nisi in vehiculo acido, aut aceto. De virtute aceti alexipharmaca & præservatoria, præter Sylvium *Tract. de Peste*, vid. Bartholinus *Cent. 4. Histor. Anat. 13.*

Post acida sunt sulphurea, tam mineralia quam vegetabilia, balsamicâ vi corpus defendentia. Hæc inter eminet sulphur commune, quod est τὸ θειον, quò curavit Hippocrates pestem: vid. Helmontius; sulphuris quoque flores legitimè sublimati. Cum pulvere sulphuris si miscere quis myrrham & camphoram velit, erit pulvis eò convenientior in peste: vid. in Kircheri sulphur bezoardicum egregium præscriptum; hinc sulphur, & omnia ex eo parata ab Hippocrate, Helmontio & aliis omnibus laudantur in præservatione. Quibus etiam annumerandum venit succinum pulverisatum, vel solum, vel cum aliis in vehiculo acido mistis & assumptum; singulare enim pestis est præservativum, interno & externo usu: nam quanta succini

(Zz 3)

septem

septem planetarii pulvis, nimirum utrisque temporibus, carpis, malleolis, & sinistrae mammae affixi, & ejus olei sit vis amuletica contra pestem, docet Helmontius in *Tract. Magnetica Vulner. Curat.* §. 37. & in *Tumulo Pestis*. Certè sulphur, succinum, myrrha, & camphora reliquis ferè præcellunt: Conf. Sorbait de *Peste Quæst.* 24. nam camphora omnibus alexipharinacis in peste palmam præripit: de quo plura inferius, unde & Elixir propr. cum  $\Delta$ is plus solito acidulatum egregiè convenire solet; vel fiant composita præservativa:

℞. fl.  $\Delta$ is 3ij.  
myrrh. el. 3ij.  
aloës 3j.  
croci 3℔. l. 3ij.  
camph. 3j. ad 3℔.  
M. f. Pulvis. S.  
Præserviend Pulver.

De quo omni mane allumatur 3℔ in aceto simplici, vel rutaceo, pro præservatione.

Ex hoc varia fieri possunt remedia. Cum addito saccharo q. s. f. Bolus præservativus: Cum succo & conserva pulpæ citri largiter f. electuarium præservativum, cujus dosis 3j: vel quantitas castaneæ: Cum addito aceto usus tempore semper agitando potest fieri acetum præservativum.

Tinctura bezoardica seu mistura simplex, ratione spiritus vitrioli in debita dosi assumpta, etiam præservationis loco usurpari potest. Hisce etiam opium addendum venit, quod spiritus figendo, & animi pathemata nonnihil coercendo, inter præservantia non ultimum meretur locum: hinc & theriaca, Mithridatium, electuarium de ovo, vel, quod his præfertur in præservatione, electuarium diascordii Fracastorii, & similes opio divites compositiones in vehiculo acido, in specie, aceto medicato, vel aceto vini simplici assumentur.

Parantur quoque morsuli præservativi, e.g.

℞. Conserv. pulpæ citri 3j. l. 3j℔.  
theriac. Androm. 3ij. l. 3ij.  
= sigill.  
C. C. f.  $\Delta$ e  
3ii diaphor. a 3ij.

c. f. q. sacchari in  $\nabla$  scord. solut. f. Morsuli, irrorandi tempore usus cum aliquot guttis socii pestilent, Heinisii:

D. S.

Præservativ Morsellen.

℞. C. C. f.  $\Delta$ e.  
= sigill. a 3j℔.  
Bezoard. anim. 3j.  
sacch. hni 3j.  
fl.  $\Delta$ is 3ij.  
elect. diascord. Fracast. 3vj.  
camph. 3℔.

c. f. q. sacchari in  $\nabla$  angel. solut. f. Morsuli, irrorandi cum  $\phi$  socii pestil. Heinisii.

D. S. ut antea.

Quò etiam pertinent electuaria & morsuli præservativi suprà, ubi de febribus malignis, præscripti.

Denique saccharum huius à gr. jv, v. ad 3℔ etiam singulare à morbo Saturnino seu peste & febribus malignis habetur præservativum & curativum, crebrò usurpatum, quò aliquot mille personæ Augustæ Vindellicorum in peste præservatæ dicuntur. Si additur camphora, magis tutum erit. Cautè tamen usurpanda, ne nimio ejus usu propter volatilitatem malum acceleremus.

Pauca hæc sufficiant ad præservationem internè.

Quod attinet externam corporis medicationem: fit per linteam aut spongiam, aceto vel simplici, vel theriacali, aut  $\nabla$  camphorato imprægnatam, naribus subinde admoveendam, omnibus pomambris, balsamis, oleis, linimentis reliquisque suaveolentibus præferendam; vel ad imitationem Zvvelfer *Pharm. Reg. pag.* 137. fiat pyxis tornatilis perforata, cui indatur spongia, aceto bezoardico madida, & admoveatur naribus, quibus camphora & myrrha addi possunt pro lubitu. In ore masticeatur radix zingiberis vel zedoariæ, quæ præfertur reliquis in præservatione à peste, aceto nonnihil imprægnata. Rulandus *Tr. de morbo Hungarico* experimentum fecit in febre hungarica præservanda. Quò facit, quod Schenckius in *Observ. l. 6 pag.* 793. ex Fallopio refert: nebulones, qui interfuerunt peste correptis, non præservasse corpora sua, nisi zingiberis & zedoariæ esu, ea ore mastigando: mastigarunt mane zingiberem, postea ebiberunt haustulum vini generosi, & totâ die zedoariam manducarunt. Commendantur præ cæteris etiam radices angelicæ, helenii, imperatoricæ, cortices citri in aceto macerati, cujus aut radicis alius maceratae semper frustulum in ore detineatur, & subinde masticeatur. Acetum camphoratum sæpè in ore detineatur, & subinde masticeatur continuò myrrha & mastix; uti etiam trochisci sublinguales cum tragacantha in aceto soluta ex myrrha & camphora fieri possunt, qui in ore continuò volvantur; vel myrrha in aceto soluta incrustetur cum saccharo, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci; vel saccharum teratur cum corticibus citri vel aurantium tenuissimè incisis, sic illud sub tritura imbibit oleum.

℞. hujus sacch. 3j. ad 3ij.  
adde  
myrrh. 3j.  
camph. 3j.

c. mucil-



℞. *mucilag. tragac. f.* pastilli:  
irrorandi cum

℞. *destillat. succ. gutt. x.*  
*cort. citri vij.*

*angel.*

*Zedoar. ā gutt. vj.*

D. S.

**Præservirende Kuchlein.**

Quod ipsum omnibus electuariis oleosis saccharatis præfero, radicē zedoariæ, corticibus citri, ac quoque costo aromatico vero, licet hæc aliàs insignem usum habeant, quod se. masticata debeant præservare ab infectione.

Quod si quis prætereà tempora, carpos, & præcordia oleo aut balsamo illinire velit, is balsamum apoplecticum paulò copiosius cum camphora imprægnat; vel oleum destillatum baccarum juniperi societur probè cum camphora.

Vcl ℞. ℞. *℞. Olati bacc. junip. 3ij.*

*angel.*

*cort. citri.*

*ruta.*

*succini ā 3j.*

*camph. ʒj. ad gr. xxvj.*

M. D. S.

**Præservirender Pest-Balsam.**

Sunt qui amuletis, quæ idiotismo Paracelsico xenechtha vocantur, multum tribuunt, imprimis globulis ex arsenico metallico cum albumine ovi & gummi tragacanthi confectis, & similibus. Sed cauti simus in his, ne periculosa adhibeantur; arsenicalia enim cruda non tantum escharam in cute, sed & internè gravissima inducunt symptomata. Præ cæteris egregius est magnes arsenicalis Angeli Salæ.

Faciendum ergò tale amuletum:

℞. *Magnet. arsenic. 3j. l. 3ij. ad 3iij.*

*benz. c. ʒj. solut. & ad debitam consist. evaporat. q. s.*

F. Rotulæ majusculæ, quæ syndone rubro inclusæ circa regionem cordis appendantur.

Item Mercurius vivus probè depuratus, & cum fumo Saturni calcinat<sup>9</sup>, qui in placentulas seu trochiscos formatus 3ij. pondere in sacculo amuleti instar appendatur: Confer. Hæferus *Herc. Med. pag. 104.* Fumus Jovis hoc etiam præstat: vid. Poterius in *Pharmac.* Nota etiam est vis bufonum, & quantum hi valeant in curanda & præservanda peste; sive ad Helmontii methodum de *Tum. pest. pag. 76.* formentur trochisci ex ipsis bufonibus, pedibus posterioribus suspensis, eorumque vermiculis rejectis, cum cera & tragacantha, pro amuletis appendendi. Cum Helmontio conf. Zwelferus in *Pharmac. Regia.* Alii ex ossibus bufonum vel etiam bufonibus integris, ichthyocolle exceptis, ad collum gestandum amuletum parant, veneni attracti-

vum & præservativum. Alii bufones integros contulos coquunt in aceto rosaceo & rutaceo, materiam cum mucilagine tragacanthi redigunt in trochiscos, qui collo appenduntur; vel ipsemet bufo simpliciter tempore Junii & Julii per caput transfossus vel suspensus, & ita arefactus, pro amuleto cordis regioni appendatur.

Verum à quodam experto Medico mihi narratum fuit, quoad bufonum applicationem faciendam distinctionem pestis: si sit pestis, quæ oritur ex gas terrestri seu sylvestri, ex terræ mineris exhalantibus, in tali peste convenire amuleta ex bufonibus; quoniam bufo tanquam alimentum attrahat tale gas sylvestre: ubi verò sit pestis ex vitioso siderum influxu, aut ex perverso aëre citra gas sylvestre aut terrestre, optimum remedium esse in araneis, utpote quæ vitia aëris attrahant.

Ipsius pestis curationis cardo in eo consistit, ut miasma venenosum ab extra in massam sanguineam & spirituum consortium receptum, potenti sudorifero foras excludatur. Methodum hanc medendi suggerit ipsa natura, quæ curatura pestem deponit venenum, & per hoc corruptam materiam in bubones & carbunculos, nec non maculasque quascri-ticè, & ita pestem curat, quia venenum extra corpus eliminat. Adeoque si peste afflicti curandi, invocato Divino Numine, mox in principio ad sudorifera alexipharmaca est confugiendum, quibus ob summam penetrantiam semper & ubique addenda est camphora.

Cæterum in omni cura pestis legitimè instituenda observentur cautelæ sequentes:

I. Alexipharmaca repetenda esse singulis 8. horis: Vid. Barbette *pag. 18.* Rolinccius *Meth. §. 485.* & Sydenham *de morbis acutis pag. 153.* Neque enim putandum, quod ubi semel vel bis sudet æger, periculum jam sit evitatum; nam vel minima veneni particula instat fermenti mirandas & stupendas exserit vires. Totum ergo, quantum quantum est, eliminandum; nec metuenda nimia virium prostratio, cum verè melius habeant, dum sudant ægri. Et quamvis bubo & anthrax egregiè eruperint cum ægri levamine, aut petechiæ copiosæ effluerint, sudorifera tamen sedulò sunt continuanda, ut eò tutius malignitas profligatur, ne fiat recidiva. Cæterum in sudore proliciendo texturæ ægri raræ vel densæ, virium infirmatum vel validatum, malignitatis vel majoris vel minoris, semper habenda est ratio, ne, dum venenum eliminatur, vires penitus deiciantur; nec nimis contegatur æger, ne suffocetur: ad unam alteramve horam sudor prolicitus sufficit, peracto sudore dentur analeptica cum acidis spirituosis mista, quæ & malignitati resistunt, & sanguini nimis diluto debitam consistentiam conciliant; Si bubo jam dum compareat, aut matureseat, non ad

adco

adeò frequentes, nec adeò copiosos sudores æger urgeatur, ne materia maligna exterminata resorbeatur, viresque frustra dissipentur; cum illi, quibus bubones sine notabili symptomate prorumpant, sine ullo quoque non rarò Medici regimine reconvaleant. Incarbunculis autem & reliquis metastasibus sudor potentiùs urgeatur, utpote in quibus secretio minùs perfectà videtur, hinc per sudorifera magis juvetur. Sudorifera tandem, si vomitu rejiciantur, toties eadem vel alia reassumantur, donec retineantur.

II. Observandum: æger sudans à somno debet arceri, quia somnus impedit convenientem veneni maligni per sudorem expulsionem. Quod si somno nimis infestetur æger, subinde spongiola vel linteum aceto vini, vel aceto rosaceo seu rutaceo imbutum naribus admovendum, aut acetum ejusmodi camphoratum, ut & castoreum cum aceto.

III. Dum sudat æger, sudor verò nolit sufficienter prodire, promovebitur hac encheiresi:  $\mathfrak{x}$ . Panis parvus è furno calens. Detrahatur huic crusta inferior, excavetur circa medietatem aliquantulum, cavitas theriacæ in  $\mathfrak{V}$  camphorato dissolutæ  $\mathfrak{z}$ ij. repleatur, ac ita panis fervidus stomacho vel umbilico imponatur.

Venenum enim à pane, ut vocant, attrahitur; quod alii faciunt, si æger peste correptus abhorreat à remediis: vid. Paschalius & Morellus. Vel ad imitationem Kegleri.  $\mathfrak{x}$ . Panis secalinus adhuc recens calidus, in crusta inferiori fiat foramen magnitudine Imperialis, infundatur  $\mathfrak{V}$  camphoratus, & ita dictus panis imponatur abdomini, ut foramen respondeat umbilico. Sic æger incipiet intensè sudare, & per eum malignitatis extractio optimè procurabitur: venenum verò pani se insinuabit, qui propterea defodiendus est. Aliàs de pane calido, quod is ex aëreat trahat venenum, vid. Kircherus *Tr. de peste*.

IV. Quod si in peste adsit agrypnia, vel etiam delirium ex hac immineat, aut si adsit nimia inquietudo, & similia symptomata sudorem impediencia, in talibus casibus subinde necessarium videtur, ut sudoriferis de laudano opiato aliquid addatur, præsertim in principio, ut symptomata affligentia coercantur, & simul post abstersum sudorem blandus ac requisitus somnus sequatur. Quando æger sufficienter sudaverit, abstergendus est linteis siccis benè mundatis & calefactis, quæ si priùs sint probè suffita cum pulvere pyrio, vel sulphure, succino, thure, & myrrha, eò magis proficua est absterfio, & convenientior. Absterfo sudore mutanda etiam stragula, ne, dum sudore expulsa malignitas, denuò versus corpus properet. Diemerbroccius quidem *Tract. de peste cap. 4. §. 5. & 6.* Barbette *pag. 18.* hoc prohibent,

præcipuè indufiorum permutationem: Verùm per se non nocent, sed quatenùs frigida poros occludendo insensibilem transpirationem impediunt. Unde etiam Sydenham *pag. 155.* absterfionem dissuadet, & indufium spontè exsiccare permittere jubet, sine dubio, ut æger aërem frigidiorum, & miasmata pestifera exhalantia, evitet.

V. Pestis, ut & febres pestilenciales, subinde conjunctæ esse solent cum ardore intenso vel febre ardente. Hæc ergò si adsit, & insignis ebullitio totam massam sanguineam conturbet, in tali casu minùs commodè theriaca aut Mithridatium, & similia theriacalia, quæ & ipsa fermentare solent, concedi possunt, quæ nisi cum aceto vel acidis temperentur, acrimoniâ aromaticâ febrem intendunt: vid. Hildanus *cent. 6. obs. 29.* & Sydenham *de morbis acutis pag. 132.* Loco horum ergò potiùs fixa  $\mathfrak{z}$ ialia &  $\Theta$ ina lixivialia & similia usurpentur, sicut & electuarium diascordii Fracastorii tutiùs tunc usurpatur; aliàs enim periculum est, ne, dum veneno resistimus, febrem nimis intendamus, adeòque tandem ægrum interimamus. Sin verò cum peste vel febris mitior aut omnino nulla adsit, convenientius ista theriacalia aromatica denuò usurpari possunt, ut sopita quasi fermentatio denuò restauretur, & debita sanguini & corpori æstus restituantur, hujusque medio expulsio promoveatur.

VI. Acida in peste non secus ac in malignis nunquam omittenda, quin eadem temperata & sudoriferis addenda, & in sudoris declinatione & post sudorem tempore quietis propinanda, cum hæc ipsa ægrum post sudorem debilitatum reficiant, & præterea, simul malignitati aliquo modo resistant. His ipsis tamen acidis, ad æstum compescendum propinatis, semper simul aliquid de sudoriferis permiscendum, ut corpus, si non in perpetuo sudore, saltem in perpetua blanda conserveatur diaphoresi.

VII. Quibusdam in locis, ægris peste affectis, non secus ac in febribus malignis, interdum fausto cum successu applicantur vesicatoria ex cantharidibus præparanda; quæ vesicæ tali casu ad evacuationem malignitatis præferuntur fonticulis, cum hi potius in præservatione, ista etiam curativè magis conducant, & potentiùs eliciant ipsi fonticulis. Conveniunt etiam, ubi natura bubonem aut anthracem, imperfectè licet, extrudere molitur, ad promovendum naturæ motum. Admoveri possunt partibus variis, vertebrae colli, versus humerum & carpum, cruribus & suris internis; quin imò & bubonibus, subinde applicantur cum fructu. Talia enim vesicatoria, aut cujuscunque generis calefacientia, liquores reddunt magis fluxiles, naturæ segnitiam extimulant, & unà cum serosa collu-

colluvie & noxiis humoribus, per ulcera miasmata pestilentialia educunt; ut à partibus nobilioribus revulsionem, & à vicinis derivationem taceam. Sed ut celeriter operentur, acerrima sint hæc ipsa. Sequens massa in ultima peste Londinensi fuit experta:

℞. *pic. naval.* ℥v.  
*galban.* ℥j.  
*cera* ℥j℔.

Quibus simul liquatis, & ab igne semotis, adde

*pulv. cantharid. præp.* ℥j.  
*ferm. acerr.*  
*sem. ammeos* ℥jij.  
*euphorb.*

c. *† si scyllitici* q. s. incorporentur, assidue agitando, quousque cogatur in emplastri massam.

Pars autem ad ruborem prius fovenda, quò vis emplastri se potentiùs exferat. Excitata ulcera aperta diu relinquantur, emplastro de meliloto, pulvere cantharidum insperso, locum iterum atque iterum sauciando. Inflammationibus dolorificis opportunè succurrendum foliis brassicæ, ulceribus superimpositis. Existimo tamen in peste morbisque inalignis hujusmodi epispasticis semper de magnete arsenicali aliquantulum addendum esse. Utut autem multum profint hæc ipsa, non tamen indiscriminatim omnibus admoveantur. Propterea, ubi in peste urget urinæ ardor ejusque incontinentia, sphincteris vesicæ inflammatio vel ulceratio, si mulier sit gravida, vel si instent menses, aut motus naturæ ad vias urinarias inclinet, aliàs in peste lethali minùs excitentur; nec applicanda in nimia virium prostratione.

II X. Satiùs est in peste planè omittere venæsectionem, quàm eadem vires labefactare, quarum conservandarum maxima est necessitas: cujus exempla videbitis apud Verzascham *observat. Med.* 58. Præterea nullum indicans venæsectionis adest, è contra quò plus eruptionem impedit, eò plura incommoda venæsectionem sequuntur, quæ omnia prohibent, eamque interdicunt; idque eò magis, ubi pestis cum alvi fluore prorumpit, aut etiam, ubi bubones vel carbunculi, vel exanthemata petechialia se manifestent: vid. Hodges *de peste pag.* 157. & 168. Piens *de febribus pag.* 179. Unde cautè legendus, nec facilè apud nos imitandus Septalius in *Animadv. p.* 112. dum quibusdam casibus, apparentibus jam bubonibus & anthracibus, venæsectionem instituit: ut taceam, paradoxam videri venæsectionis necessitatem, quam in peste persuadere conatur Sydenham *obs. pag.* 39.

IX. Observandum: In principio morbi, ubi natura maligna seu miasma venenosum adhuc est in primis viis, vel sub primo pestis insultu, quæ noscuntur per nauseam, vomitu-

tum, vel conatum vomendi, tunc in principio primo commodissimè adhibentur vomitoria, appropriatis alexipharmacis simul mixta. Certè purgatio nulli, vomitio pluribus salutaris, dicit Lindanus: & ubi jam mox in principio incipiunt apparere bubones vel anthraces, necessitas verò vomitorium suadeat, tunc, ne naturæ conatus per tales tumores expellentes venenum impediatur, & tamen utrique scopo satisfiat, consultiùs est buboni & anthraci maturativum, attractivum dictum, remedium applicare, dum propinatur vomitorium, ut horum medio venenum foras derivetur, & vomitorium præster suum officium. Aliàs enim, si imminuatur tumor, subinde scirrhii instar indurescit, ita ut ad aliud quod tempus postmodum durities ista remaneat. Vomitoria ergò in principio pestis conveniunt cum regimine. Purgatio verò nullo tempore salutaris est, sed semper nociva in peste, imo nec clysmata semper præscribi tutò poterunt.

X. Si vomitus adeo vexet ægros, ut remedia retineri nequeant, mox sub primo insultu imitandus venit Hodges *de peste pag.* 196. & Sydenham *observat. p.* 152. Nempe tunc solo tegumentorum pondere & custodia (nisi quod lintheaminis pars subinde ad colligendos halitus vultui superinducatur) item applicato pane calefacto, aliisque similibus modis, sudor provocandus: nam, ut dicit Sydenham, *cum materia morbifica radii versus ambitum corporis se exporrigant, illic alvi profluvium & vomitiones ab iisdem introrsum reflexis, ac in ventriculum & intestina decumbentibus, provenientes ultro sedantur, adeò, ut quantumcunque stomachi subversio præcesserit, assumpta deinceps medicamenta probè retineantur, ac ad sudores ex voto prolificandos conducant.*

Quoad remedia pro scopo sudorifero & alexipharmaco usurpanda: observandum est universale alexipharmacum pro quacunque peste vix dari, nisi quis camphoram & bufones hic substituere velit, quæ tamen non videntur sufficere. Deprehensum etiam fuit diversis temporibus, pro diversitate nempe constitutionis pestilentialis, diversa etiam remedia peculiare obtinuisse vires. Quod si ergo specialia in peste tali ac appropriata remedia non sint inventa, generalibus istis in febribus malignis usitatis, & alio tempore probatis, utendum erit, quibus in symptomatum cura subindè symptomati appropriata sunt addenda, hoc saltem observando, quod illorum generosiora præprimis, eaque in majori dosi, propinari debeant.

Vehicula talium remediorum ut plurimum sunt ☿ destillatæ, aceto tam simplici, quàm rubi idæi, sambucino, rutaceo, florum tunicæ, scordii, aut compositis theriacalibus imprægnatæ.

(Aaa)

Præter

Tom. II.



Præter ea ergò, quæ de febribus malignis recensentur; item quæ ad præservationem suprâ laudabantur, ex regno vegetabili superemipet suprâ laudata camphora, quæ & cum ea parata remedia, certè in peste curanda ab omnibus Practicis extolluntur, sive in substantia assumatur, sive in oleum redacta propinetur. Unde nobile & expertissimum est in peste oleum pestilentielle Heinisii, qui mira præstitit cum hoc in peste Veronensi, ut & ipsi post mortem Veronæ statua fuerit erecta. Compositum est ex ana olei destillati succini, olei corticum citri & olei camphoræ: quæ olea invicem benè juncta constituunt hoc mirabile remedium, idque pro præservatione à guttis 5. ad 6. pro curatione à guttis 6. 12. ad 15. pro circumstantiarum varietate, expectando desuper sudorem exhibeatur. Hinc Mindererus *de peste* inquit: *Meo judicio camphora plus virium in peste obtinet, quàm vel pretiosa qualibet medicamenta bezoardica*: vid. *Anatom. camphora* D. Mœbii cap. 13. pag. 50. Interim, ubi complicati sunt morbi maligni cum febre intentiore, aut symptomatis, deliriis, agrypniis, &c. oleosa ista minùs sunt tuta. Sunt, qui

℞. camph. ʒj.

album. ov. ʒvj.

Lento igne per retortam liquorem destillant in ʒs, quod cum V aliquandiu circulant & cohobant pro alexipharmaco pestilentiali.

Imò vel solus V camphoratus; seu in quo soluta fuit camphora, aut ~theriacalis camphoratus, egregii sunt usus in curanda peste; hinc etiam mixtura simplex & R bezoardica ritè parata, propter additam camphoram in spiritu theriacali solutam non contemnenda venit. A nonnullis duo remedia, ab Unzerro *de peste* descripta, insigniter extolluntur, quorum basis est camphora: unum est potio, alterum electuarium.

Facit huc elegans electuarium, quod ipsum B. D. Michaëlis tam præservativè, quàm curativè, in febribus malignis & pestilentialibus cum successu frequenter usurpavit.

Deinde semen seu baccæ nigræ hoderæ arboreæ, jam ab antiquissimis Autoribus commendatæ, ab Helmontio etiam & multis aliis tanquam proficuum in peste remedium expertæ sunt, ad ʒj. in V carduibenedicti l. vino, expectando sudorem, & repetendo eisdem: vid. Kircherus in *Scrutinio pestis*, & Palmarius in *Tract. de morbis contagiosis* pag. 453. Imprimis in peste Hybernæ Medicus quidam frequentissimo in usu habuit has baccas, quibus sæpiùs in die repetitis quamplurimos liberavit. Hodges cum aceti part. ij. & vini part. j. propinat. Baccæ juniperi etiam in peste sunt commendatissimæ, unde & earum rob seu succus inspissatus ab Italis, baccis his carentibus, theriaca Germanorum optimo jure vocari solet, quod, sicuti & ex

sambucino elicited rob, cum aceto assumptum est nobile; tam in potionibus solet dissolvi, quàm etiam in forma electuarii propinari. Unde quidam commendant electuarium Rosencreuzeri in *Astrologia Inferiorum* ex hoc rob ceu basi paratum, tanquam in peste præservativum & curativum remedium.

Rob juniperi dicto vix cedit rob baccarum sambuci rectè paratum & usurpatum. Huc facit theriaca seu electuarium tam curativum quàm præservativum Ludovici à ʒj. ad ij. propinandum, ut & electuarium camphoratum Kegleri. Allium similiter & suam meretur laudem, dum communiter theriaca rusticorum appellatur, cum certum sit, confusa capira allii cum aceto vel vino assumpta sudorem potenter movere, & malignitatem per sudorem expellere.

Inter animalia imprimis eminet cervus & ciconia, utpote quæ tota sunt alexipharmaca. Unde antidotus Paracelsi ex anguibus, cujus basis est sanguis ciconiæ, adeò est commendata in peste, utpote quæ vescitur ranis & similibus animalibus, pesti curandæ dicatis. Non minùs ergò ciconia inter volatilia, quàm cervus inter quadrupedia, est alexipharmaca. Ex his parata omnia, in specie volatilia salia, pro scopo sudorifero sunt nobilissima. Spiritus C. C. ritè paratus, ac Θe volatili proprio probè acuatus, ad ʒj. exhibitus egregius est in curanda peste. Crebrâ experientiâ in peste Londinensi confirmatus hoc deprædicat Hodges *de peste* pag. 184. Verùm omnibus præfertur vipera & remedia ex vipera, quæ inter eminet Θe volatile à gr. xij. ad ʒj. spinæ viperinæ præparatæ exsiccatæ, oleo succini irroratæ, ac denique camphoræ q. s. permixtæ, sunt egregiæ à ʒj. ad ʒij. Hinc alexipharmacum Crollii ex anguibus paratum egregium est. Post vyperas egregii sunt bufones, qui externè ceu Xenechthon appensi, à peste præservant. An verò pulverisati internè assumi queant? quæritur. Hoc quidem verum est, Θeorum volatile & spiritum egregium esse remedium, insigne diaphoreticum, & probatissimum diureticum; quod etiam confirmat Petrus Joannes Faber. An verò ii specificam vim antipestilentialem habeant? dubito. Interim exemplis potest confirmari, multos eosdem internè sine periculo, exemptis intestinis, sumpsisse, aliosque sal volatile & spiritum usurpasse, ut adeò consulenda sit experientia. Alii recipiunt bufones vivos, quos in V submergunt, & ita suffocant, & tunc acquirunt V alexipharmacum: bufones ita maceratos per retortam destillant pro spiritu, sale volatili, & oleo, qui spiritus cum sale volatili rectificatus mirè laudatur ad pestem. Quibus tædiosi sunt hi labores, recipiunt bufones ab interioribus

ribus purgatos, exsiccant eos, & hum hepate proprio similiter exsiccatō mistos pulverisant, & ita à 3℔. ad 3j. propinant pro remedio antiloimico; qui pulvis in peste penultima Londinensi propinatus multum profuisse refertur.

Huc facit quoque lapis microcosmicus, qui à 3j. ad 3j. in ∇ card. bened. in peste Londinensi, ubi uno die 1000, mortui sunt, expertus observatus fuit. Stercus humanum etiam est egregium alexipharmacum. Refert Poppius, & confirmatur à Langio in comment. manuscripto, quod stercus proprium cum urina propria dissolutum & haustum, per alvum, per vomitum, & sudorem pestem curet: de quo conf. etiam Riverius in *Observ.* 38. *communicat.* à Samuele Fomio. Et certum est, quod stercus humanum buboni pestilentiali applicatum omne venenum eliciat, idque potentius, quàm quodlibet cataplasma aut emplastrum à chirurgo applicatum. Non mirum ergo est, si & stercus humanum intrinsecus assumptum sit adeo potens in curanda peste.

Ex regno denique minerali vix potentius remedium habetur sulphure, tam minerali quàm, quod excellentius est, antimoniali, si nempe hoc sit legitimè fixatum; sive communi modo per nitrum figatur in antimonio diaphoretico, & omnibus bezoardicis mineralibus, tam simplicibus, quàm cum Marte & Saturno compositis, seu quod melius est, ipsum ∆ genuinum fixum sublimiori ratione ex antimonio eliciatur in cinnabari antimonii, aut in R antimonii sicca, beneficio salis ammoniaci elevanda; unde cinnabarim nativam Poterius specificum antipestilentialia vocat. Omnia hæc antimonialia & sulphura antimonii totam absolvunt paginam in cura pestis: & certè in sulphure perfecta cura pestis videtur latere. Sulphur nempe aut ejus flores à 3℔ ad 3j in vehiculo acido propinati sunt expertissimum in peste remedium, & ab accuratioribus autoribus, Hippocrate & Paracelso, extolluntur: Conferatur Kircherus & Helmontius. Ratione pinguedinis balsamicæ corrigat sal acre pestilentialia; ratione verò aciditatis massam sanguineam nimis dissolutam temperat, & quodammodo coagulat: ut taceam quæ habet Helmontius tract. de arbore vitæ circa finem. Hinc etiam vinum Hippocratis ad pestem curandam nihil aliud fuit, quàm vinum commune, mistum cum sulph. depurato & sale decrepato, in vase pice obturato asservatum; unde etiam potus quicunque in peste sunt sulphurandi: vid. Polemannus, & Cnæfilius de *epidem. febribus*, ubi potum habet sulphure imprægnatum, quem in ultima peste Londinensi probatum repere-runt. Modus hic est: Recipiebat fila sulphurea: hæc incendebat, fumum capiebat in lagenam, & huic infundebat potum, & agitando probe propinabat ægris.

Tom. II.

Sulphuri quoque quodammodo cognatum suocinum est, unde aut hoc aut præparatum, aut oleum, aut Oalii mistum, in peste sunt egregia remedia.

De theriacalibus compositionibus aliisque similibus pharmaceuticis nihil dico, quoniam hinc inde circa febres malignas fuerunt monita, & omnibus sunt nota. Præterendum tamen reliquis omnibus electuarium diascordii Fracastorii, vel correctum à Sylvio, propinatum à 3j. ad 3ij. in ∇ appropriata, cum aceto bezoardico mista. Noti etiam sunt pulveres in officina prostantes bezoardici compositi: pulvis Saxonicus ad 3℔ pulvis Pannonicus rubeus ad 3j, imprimis ubi sunt alvi fluxus; constat enim ex adstringentibus: pulvis Cæsareus, & similiter alii.

Formulæ & compositiones ex his possunt fieri varix: v. g.

℞. Vnic. veri vel 2 ii diaphor.  
℥. 4 is à 3℔.  
Ois volat. viperar. 3j.  
camph. gr. viij.  
M f. Pulvis: pro 2. vel 3. dos.

℞. ∇ card. bened. 3j℔.  
+ i vini acerr. 3vj.  
elect. diascord. Frac. 3j℔.  
camph. gr. vj.  
syrup. acetos. citri 3℔. M. S.

Schweiss-Träncklein auff einmahl.

Pertinet huc potio Barbette pag. 23. quâ in peste sævissima Amstelodami læpissimè usus fuit.

℞. ∇ card. bened. l. ruta. angel. l. enula, vel  
bacc. junip. l. tenell. C. C. 3j. ad 3j℔.  
liqu. C. C. succin. 3℔. l. 3j. ad 3j℔.  
camph. gr. v.  
syr. de scordio l. rubo Idæo 3℔. M.  
℞. Theriac. Androm. 3j.  
Ois absinth. 3℔.  
M in Haustulo vini aciduli.  
℞. Elect. diascord. Frac. 3j℔.  
2 ii diaph. 3j.  
C. saccharos Bolus: D.

Conferatur Barbette de Peste pag. 16. Item Bolus alexitericus Willisi in *Pharm.* pag. 529. Item ℞. Theriac. Androm. 3j.

bezoard. min. 3℔.  
camph. gr. vj.  
+ i bezoard. q. s.

M. f. Bolus pro una vice, expectando sudorem.

℞. R bezoard. l. mixt simpl. 3j.  
~ C. C. 3j.  
M pro una dosi.

Loco Ræ bezoardicæ quibusdam secretus habetur ~ pestilentialis seu antiloimicus:

℞. ⊕ bene calefacti lbj.  
irrosa cum  
✕ i 3ij.

(Aaa 2)

82

Na per retortam in arena igne intensiore: Jam

℞. — *Qirellif.* part. iij.

His modo *prap.* part. jß.

Mistis his adde singulis unciiis camphoræ 3ß, ponantur vitro benè obturato in digestionem, donec camphora uniatur liquori.

Sicum aliqua particula opii digeratur, & filtretur, dat elixyr antiloimicum egregium.

Pertinet huc etiam elixyr pestilentielle Crollii.

### SYMPTOMATA.

cæterum frequentissima pestis sunt:

#### I. BUBO.

In bubone curando tria præ cæteris attendenda sunt sedulo; nempe externè sunt applicanda:

1. Attractiva.
2. Maturativa.
3. Mundificativa & consolidativa.

Utut enim sunt, qui discussioni bubonum operam dare volunt, minùs tamen consultum hoc arbitror, nisi simul copiosus sudor provocetur: siquidem & bubones sponte recurrentes, vesicatoriis extrinsecùs admotis, sudoriferis verò internè propinatis, denuò proliciendi erunt. Equidem sunt, qui suadent etiam bubones crudos mox scalpello esse incidendos & aperiendos, quod tamen minùs commodum videtur: quin potiùs aliqualis saltem materiæ coctio & maturatio expectanda plùs minùs perfecta, pro circumstantiarum ratione: quamdiu sc. apparent rubicundi, non aperiendi: quod si verò bubo sit vel lividus, vel niger, ita ut gangrænâ minetur, tunc nullâ expectatâ maturatione protinùs etiam crudus scalpello est aperiendus.

Ea vero, quæ applicantur pro attrahendo veneno, & maturando simul plùs minus tumore, sunt varia. Quidam recipiunt cepas sub cineribus coctas, easque contusas & cum sinapi albo pulverisato mistas, applicant bubonibus. Loco sinapi etiam, ubi præsertim dolor intensius urget, theriaca & fuligo furni dicto modo cum cepis per aliquot dies applicetur bubonibus. Forestus *lib. 6. Observat.* 19. refert, fuisse experimentũ cujusdam chirurgi:

℞. *cepa cavam*, immitte *Theriacam*, & applica. Bufones certo tempore capti & exsiccati, in vino aut aqua tepida macerati, usque dum probè mollescant, buboni calidè impositi dolorem sistunt, & ardori resistunt, & potenter malignitatem temperant; vel pulvis bufonum cum emplastro permisceatur, & ita applicetur buboni pestilentiali. Faciunt huc omnia emplastra cum & ex bufone parata, quæ in principio, cum bubo apparere incipit, optimè conducunt. Tale emplastrum expertum vid. in Hildani *Cent. 6. Observ.* 30. vel solus pulvis bufonis exsiccati cum ▽ scorzonæ, ac ▽ rutæ capraræ in forma cataplasmatismatis imponitur, & insigniter conducit. E-

gregium remedium est stercus proprium adhibitum. Pertinet huc emplastrum attractivum magneticum Cnæselii.

Quod vid. in *Methodo medendi febres epidemicas malign.* pag. 60. 61. &c. item pag. 104. Cæterum reliquis emplastris magneticum arsenicale A. Salæ præfertur.

Loco hujus emplastri D. Michaelis noster in peste pro curandis bubonibus & carbunculis pestilentialibus ante annos 50. sequens emplastrum magneticum usurpavit. Nempe

℞. *Empl. diachyl. c. gumm.* 3iv.

*pulv. fol. urvæ invers.* seu *Parid.* 3j.

*Magnet. arsenic.* 3ß.

c. 8. scorpionum & aran. Mindereri f. emplastrum.

Hæc ipsa emplastra magnetica, bubonibus admota in pueris, item in cute tenuiore & textura rariore, optimè sufficiunt, & malignitatem extrahunt, ut eadem sub forma crustæ & escharæ, super bubonem hæreat: hac apparente, auferatur vel sponte, vel blando emolliente, ac si subsederit, maturativis ac consolidantibus ei succurratur: si non, de novo adaptetur. De emplastro magnetico Angeli Salæ refert Barbette, quod, si applicetur cuti duriori ac spissæ, aut buboni duriori, & profundius latenti, aut non satis prominenti, adeoque difficulter tractabili, nullam faciat crustam, & nihilominus tamen malignitatem potenter extrahat: ita ut intra 4. vel quinque dies tumor dispareat. Sed quoniam hoc non semper fit adeò citò, proptereà tutiùs illi agunt, qui suasu Hodges & Diemerbroccii priùs vesicatorium parti bubonis inferiori, vel ipsi buboni juxta Keglerum & Barbette applicant, quòd promoveat & aditum faciat, ita, ut factâ escharâ & scissâ, postmodum emplastrum magneticum eò meliùs queat operari: qualia vesicatoria pro bubonibus aperiendis videb. in *Append. pag. 32.* & Horstii *Observationibus pag. 356.* Convenit quoque sequens:

℞. *ferm. acer.* 3ß.

*cantharid.* 3jß.

*sem. sinapi.*

*staphisagr.*

*rad. pyrethri.*

*euphorb.* ā 3ß.

+ i vini fortiss. q. s.

M. f. Pasta vesicatoria: S.

**Blasenziehend Pflaster.**

Vesica post 7. 8. vel 10. horas facta aperienda, eisque vel primis horis folium brassicæ rubræ aut betæ, butyro veteri aut oleo raparum inunctum, postmodum emplastrum & cataplasma attrahens atque emolliens applicandum: c. g.

℞. *Empl. diachyl. c. g.*

*compos.* ā 3ß.

*unguenti basil.* 3iv.

*sem. sinap. cond.* 3iij.

Mista



Mista sub forma emplastri imponantur vesicæ apertæ; hoc enim maturat promptè, & suppurat tumorem.

Longè autem melius est dictum emplastrum magneticum, super quod cataplasma emolliens applicandum, donec malignitas sufficienter extracta, & crusta remota fuerit.

In hac crusta, quam emplastrum excitat, hæret imprimis venenum, & ob id insigniter densa ac spissa est; unde etiam longè facilius removetur sine prægressâ necessariâ scarificatione. Ungitur locus ungento basiliconis cum theriaca misto, quod super crustam admoveatur: nam hoc eam decidere facit. Quod si crustâ primâ factâ tumor non sufficienter imminutus appareat, denuò est applicandum emplastrum magneticum, & nova crusta est elicienda, donec sufficienter disparuerit bubo. Quod si fiat, ut bubo aut nimis altè promineat, aut rectè super tendine consistat, tunc vesicatorium est nimis debile; cauterium verò actuale est periculosum propter tendinem. In tali casu admovendum est ruptorium seu cauterium potentiale, quod fit ex calcis vivæ ʒj. & saponis Hispanici q. s. quæ mista dant emplastrum, quod applicatum, foraminulum exedit.

Alii præmissio vel omisso vesicatorio:

ʒj. HB. Parid. Mij. l. iij.

rad. lil. alb.

alib. a ʒij.

ficum ping. no. ij. l. iij.

Coqu. c. f. q. ʒa & ʒo lil. alb. ad consistent. cataplasmatiss: Pulvæ trajectæ adde

Theriac. Androm. ʒij.

buse. pulveris. ʒj. b.

fulig. splendent. ʒj.

sapon. Venet. ʒvj.

ʒoramar. ʒij.

M. f. Cataplasma.

D. S.

### Ausziehender Brey.

Herbæ Paridis folia vel sola, vel cum fuligine in formam cataplasmatiss impastata, suppurare & maturare bubones dicuntur: vid. Schræderus lib. 4. pag. 119. item decoctum herbæ Paridis. Alii fermentum recipiunt, ex quo cum scrophularia, additis baccis herbæ Paridis, cataplasma faciunt, & ita imponunt ad maturandos bubones & extrahendum venenum: item radix symphyti majoris sub prunis cocta, & cum Mithridatio ac butyro in modum cataplasmatiss imposita, bubonem coquit, maturat & aperit. Aliàs etiam cataplasma ex scabiosa contusa cum fermento acri & sapone Veneto applicatum, tumorem maturat; Vel fiat emplastrum, seu cataplasma ex foliis sambuci contusis, cum pulvere sinapi contuso subactis, quod applicatum maturat & promptè rumpit abscessum seu bubonem.

Emplastrum diachylon cum gummis, cum æquali parte theriacæ Venetæ videb. in Horstio pag. 354. Observ. 356. Emplastrum de bufonibus Hildani, quod Diemerbroccius lib. 3. cap. 12. §. 17. describit. Quibus, si dolor valdè urgeat, cataplasma, quale Barbette pag. 32. describit, substitui potest.

Hiscæ remediis nonnihil mitigatus bubo aperiendus venit; quia periculum est, si perfectæ suppurationis expectetur, & spontè tumor rumpat, ne propter dolorem ac ardorè, subinde atroces, spiritus dissipentur, vires prosterantur, ac sanies pestilens retrorsum regurgitet; unde vel scalpello aperiendus est, vel cauterio potentiali applicato exitus materiæ patefaciendus. Vitanda autem sunt vesicatoria, quando bubones ad suppurationem vergunt, & talium loco sequens emplastrum ab Hodges expertum applicari potest:

ʒj. Empl. oxycroc. ʒij.

galbani colat.

g. carann a ʒj.

piceis naval. ʒij.

Liquatis simul cum ʒo chamom. l. lil. alb. f. massa pro emplastro, quod plus millies chirurgicæ manus vicem supplevit.

Apertio tamen bubonum artificialis auspiciatior ipsi habetur. Aperto bubone, vel sponte vel scalpello usurpentur mundificantia, & hinc consolidantia. In mundificatione maxime eminet infusum ex radice aristolochiæ rotundæ, scordio, myrrha, aloë & croco, cum V tartarificato factū; vel balsamus Peruvianus, Balsam<sup>9</sup> sulphuris anisat<sup>9</sup> vel terebinthinat<sup>9</sup> mist<sup>9</sup> cum unguento basilico & theriaca, & cum lana carpta immittantur in ulcus apertum, imponendo desuper emplastrum de minio, emplastrum album coctum, emplastrum diaphopholygos cum ʒoco Nicotianæ, donec ita mundificetur, & successivè consolidetur ulcus, observando, ne consolidatio adeò citò promoveatur. Sed ulcus, quamdiu possibile, apertum servetur, ut ita omnis fomes & gas pestiferum commodè eliciatur, ac removeatur: postmodum cum emplastro diasulphuris Rulandi consolidetur.

De cætero probè attendendum, ne acetum buboni applicetur, teste Hildano in suis Observat. Sic pariter nec opiata propter dolorem, nec Saturnina propter ardorem, applicanda veniunt, ne venenum pestilentielle interiora repetere cogatur, vel talium abusu sphacelus parti introducatur. Quod si bubones cedematosi aut rebelles fuerint, quomodo tractari debeant, vid. in Horstio Observat. pag. 350. & 351. Nec Mercurius unguentis aut emplastris contra bubones addendus est, ut rectè monet Barbette. Exinde enim mortem observavit Schenckius in suis Observat.

(Aaa 3)

Quoad

Quoad curationem bubonum : imitari licet Barbette ; caveamus nobis saltem , ne mox , uti ipse , ad vesicatoria properemus , cum hæc non adhibenda sint , nisi bubo vel fuerit profundus , vel cutis dura , vel tumor durus . Interim post vesicatoria theriacalia in usum vocanda jubet Helmontius .

Internè danda sunt diaphoretica , imprimis sulphura antimonialia , ut in cura pestis generali jam monui . Post sudorem julepi moderate aciduli propinandi cum in finem , ut malignum fermentum acre his ipsis corrigatur , & emendetur , simul tamen corpus , quantum fieri potest , in diaphoresi blanda conservetur & retineatur .

## II. PAROTIDES.

Parotides eodem modo tractandæ sunt ac bubones .

## III. CARBUNCULI.

### Die hitzigen Blattern und Geschwäre.

Quoad carbunculos & anthraces : cognoscuntur faciliè , si cum colore purpureo & puniceo emergant , & circumcirca circulus rubicundus , quasi inflammationis , qui melior ; aut lividus & ater , qui deterior , se repræsentat . Carbunculus talis faciliè serpit , & gangræne instar vicinas partes inficit , donec tandem pars mortificata excidat . Interdum saltem pustula quædam plùs minùs alba apparet , materiam quasi coctam continens , quæ aperta aut compressa nan tantummodò , sed etiam dura & sicca , ac profunda in partibus subcutaneis carnosis radiata apparet . Interdum pustulæ plures quasi hydatides emergunt , sub quibus durities inflammatoria apparet . Bubonis & carbunculi seu anthracis differentia vid. in Sennerto *de Peste* .

Carbunculus talis quicumque nihil aliud est , quàm incipiens partis mortificatio . Unde in cura

1. Mortificationis vicinas partes inficientis progressus inhibendus.
2. Substantia mortificata separanda.
3. Ulcus relictum mundificandum & consolidandum.

Notandum autem in genere : quod , dum in carbunculo ardor summus est , abstinendum sit in topicis ab oleis & pinguibus , quia quandoque sphacelismi periculum inducunt , ac proinde anthracibus non secus ac bubonibus applicandus est bufo exsiccat , aut in vino maceratus . Quidam expiscaturi , utrum lethalis vel curabilis sit carbunculus ? emplastrum ex molli galbano imponunt : Quod si tenacissimè anthraci adhæreat , ita , ut non , nisi cum crusta avelli queat , salutis spem esse asserunt ; sin verò non adhæreat , incurabi-

lem plerumque atque lethalem esse . Item emplastrum ex theriaca Andromachi imponi suadent carbunculis : Quod si theriaca citò areseat & aduratur , ipsa verò carbunculi constitutio nihil immutetur à theriaca , lethale esse signum portendunt . Verùm hoc in posteriori sumus cauti , quoniam observatum fuit in peste Mantuana , quæ anno 1529. superiori seculo grassata fuit , quod theriaca carbunculo imposita attulerit mortem ; salutem verò , ubi bubonibus fuit applicata : uti refert Rhodius in *Analectis* pag. 129 .

Pro primo igitur scopo saphirò in cute ducatur tamdiu circulus circa carbunculum , donec locus fiat lividus . Præcaver enim non tantummodò , ut ulterius non serpat carbunculus , sed paulò post aperitur & excidit , & præterea etiam vis veneni tota extinguitur : uti hoc non tantum affirmat Hartmannus in *Praxi Chimiæ* . & Helmontius *Tractatu de Magnet. Vulnerum Curatione* ; sed etiam Marcus Marci in *Philos. Veter. restituta Sect. 5. cap. de Magnetismo Sapphiri* . Hinc apex carbunculi illinatur seu tangatur butyro  $\xi$ ii quantitate nummi : tunc , ubi escharam apparuerit , applicetur raptorium ex oleo lini & chamomillæ cum croco Hartmanni , ubi *de Peste* §. 15. vel loco talium butyro  $\xi$ ii extremitates anthracum attingantur , sive circumducatur circulus : hoc enim ob acidum concentratum non solum progressum ulterioris mortificationis inhibet , & in gangræna partem mortuam à viva secernit ; sed etiam totum carbunculum excidere facit . Talibus factis , vel mitiori in malo sine his , applicandum est emplastrum magneticum arsenicale Angeli Salæ , vel ad suppurandum & aperiendum carbunculum emplastrum de fuligine , cujus descriptionem videb. in Horstio *Observ.* pag. 349. & 356 . Alii non ineptè mox applicant cauterium ætiale , utpote in parte plùs minùs mortificata minùs dolorosum , quod tanquam omnium efficacissimum à Barbette & Hodges prædicatur , ubi simul applicandi rationem *posterior* pag. 215. tradidit : hoc factò , escharam raptorio , vel in corpore tenello , solo emplastro magnetico arsenicali , successivè separant . Pinguis & oleosa , antequam escharæ secretionem molitur natura , maximè vitanda . His factis , ubi promptè exciderit carbunculus , & factum sit foramen , pergatur cum emplastro magnetico arsenicali .

Ut suppuretur eò melius crusta , Sennertus , Diemerbroccius , Barbette & Hodges cataplasmata attrahentia atque emollientia describunt ex allio , scordio , uva inversa , althæa , farina lentium , fimo columbino , saponenigro , melle , &c . Si dolor valde urgeat , emplastrum de cynoglossa , aut de pomis granatorum laudatur . Postmodum eti-

etiam herbæ Paridis baccæ vel uvæ ad maturandum carbunculum, & ad mitigandum dolorem laudantur. Sunt, qui insigniter commendant cataplasma Barbette supra descriptum. Ubi substantia suppurata probè educta fuerit, unguentum basilicum cum emplastro tetrapharmaco & theriaca usurpandum, balsamo vero sulphuris terebinthinato aut anisato, item oleo  $\Phi$ i fœtido, ulcus probè est mundificandum & abstergendum, atque conveniente emplastro consolidandum. Ad absolvendam consolidationem, ne remaneat ulcus sordidum, insigniter laudatur cataplasma ex radice symphyti majoris, confusa intra 2. lapides & repetitum applicetur; hoc enim intra paucos dies carbunculum consolidare & curare perhibent.

## IV. ÆSTUS.

Ea, quæ æstum in genere mitigant, sunt in specie nitrata, v.g. pro usu interno  $\Phi$ gmatum in potu ordinario dissolutum, 3j. ad mens. 8. aut etiam

℞.  $\Phi$ i  $\Phi$ iati 3ij.

℞ii diaph. 3j.

M. pro 2. dosibus.

D. S.

## Kühlende Stärck-Pulver.

Item arcanum duplicatum, ~  $\Phi$ i dulcis, &c. conveniunt.

Externè dissolvatur  $\Phi$  in succo sempervivi major. & aceto rosaceo, quibus intingantur lintea, & applicentur pulsibus, item fronti & temporibus. Sed observandum: non semper opus esse refrænare calorem, nisi ubi modum nimis excesserit: Deinde in febribus cum excretionem cutanea conjunctis calor haud facilè sufflaminandus venit, ne motus excretorius impediatur.

## V. CEPHALALGIÆ, VIGILIÆ ET DELIRIA.

In cephalalgia notandum: sæpiùs dolorem capitis febrium continuarum, imprimis benignarum, esse saltim per consensum stomachi, vel primarum viarum saltem in principio. Cujus ratio exinde desumitur, quod vomitorio in principio morbi dato, ut præcaventur omnia ferè præcordiorum symptomata, ita speciatim cephalalgia, quàm intensâ etiam antea fuerit, remittat. Quin & quod clysmata injecta in febrium cephalalgias subinde eandem notabiliter levant. Sunt tamen & febres, præsertim malignæ, quæ genus nervosum, adeoque & caput, primario affligunt: hinc æstu corporis utcunque moderatò caput, præsertim circa frontem, intensè ardet, agrypnix adsunt plus minus, interdum planè non dolet. Febres hæ sunt pessimæ notæ, quibus correpti rarò evadunt. Quoad vigilias: hæ pertinaces in febribus, vel hypochondria & præcordia malè affecta sequuntur; & tunc inquieti & plus minus jactabundi solent esse

agri, vel capitis seu cerebri malè habentis sunt pedissequæ, & tunc intensior incalescentia circa frontem, oculi fulgidi, capitis plus minùs perturbatio; item subinde dolor per essentiam adesse solet, agri minus quieti sunt. Hæc ipsa symptomata diutiùs si durent, & graviùs affligant, delirium post se trahunt, cujus comes sunt convulsiones.

Dolor igitur capitis si in principio est, adeoque non portendit judicationem vel crisin, curandus venit. Sin verò febris sit admodum intensâ, adsuntque salutis signa, supervenerit verò capitis dolor, cum ipsa prope judicationem venerit, nil oportet tentare, quia interdum talis cephalalgia solet esse signum decretorium, vomitum vel hæmorrhagiam præfagiens. Par ratio est quoad vigilias, in quibus criseos tēpore, vel præsentis vel instantis, anodyna aut pl<sup>o</sup> minùs somnifera min<sup>o</sup> tutò applicari possunt. Internè verò mala hæc in genere curat papaver, & quælibet ex eo parata opiata. Externè verò in febribus in usu est unguentum alabastrinum, cum oleo papaveris expresso, temporibus subinde illitum; item emulsio ex nucleis persicorum, v.g. 3ij. & sem. papav. albi 3j. c.  $\nabla$  florum sambuci aut verbenæ aut solani parata, ac fronti tepidè applicata; nunc cum, nunc sine camphora: camphorata enim semper non conveniunt.

Pariter & cataplasmata ex foliis rutæ, radice raphani &  $\Theta$ e communi, cum fermento susceptis, & plantis pedum applicata. Denique  $\Phi$  in  $\nabla$  appropriata quavis dissolutum, cum linteis multiplicatis fronti ac temporibus applicatum convenit. Observandum tamen hic: dolorem in parte capitis anteriore à febre oriri; in parte verò posteriori à proprio capitis affectu: conf. Primerosius *de febribus* pag. 321. Deinde quoad epithemata humida: hæc minùs conveniunt, quando nempe corpus est in continuo calore. Talia enim dum frigida applicantur, strictionem pororum capitis, adeoque & per consensum universæ cutis diaphorescos impedimentum, inferunt.

Hæc ipsa verò & vigiliis medentur. Prætereà tamen & medulla crurum vituli recens, temporibus crebriùs illita, vespertino tempore, somni beneficium adfert. Emulsiones ex seminibus 4. frigidis majoribus, papav. errat. &c. ut interno usu, temperando sanguinis æstum, & acrimoniam fermenti febrilis, vigilias subinde compescunt; ita & externè epithematis formâ applicata non inutiles sunt. Internè

℞. *Essent. castor.* 3ij.

*opii* 3ij.

M. S.

*Rube bringende Essent.*

℞.  $\nabla$  fl. papav. errat. 3ij.

C. C. f.  $\Delta$

℞ii diaph.



℞ *℥ii diaph. ā 3j.*  
*laud. op. gr. j. l. ij. l. eff. opii gutt. xij.*  
 ad xv.

*syr. corall. 3vj.*  
*M. pro 1. vel 2. dosibus.*  
 D. S.

Rube-Träncklein.

Barbette de peste scribit: opio, licet sudoriferum sit, isto pestis tempore se valde parum fuisse usum, quod somnus primis duabus vel tribus diebus non adeo conferat. Quando verò patientes 6. vel 7. diebus continuo insequentibus nullum somnum capere possunt, & virium defectus inde sequitur, hac ratione, quod sequitur, præscriptum & assumptum egregie contulit:

℞ *∇ prophylact. Barb. 3j℔.*  
*borrag. 3j.*  
*cinnam. 3iij.*  
*Conf. de hyacintho 3j.*  
*sacch. perlat. 3iij.*  
*laud. op. gr. iij.*  
 Misc.

Exhibuit cochleatim singulo horæ quadrante, donec somnus redeat, hinc æger somnum bene naturalem cepit. Idem tamen Autor temerarium opii usum dissuadet, nec impuro ventriculo ægrisque nimis debilibus dandum esse monet; quod plus nocimenti quàm emolumenti in his ab eo sit expectandum. Econtrà neminem meticulosum nimis esse jubet, ne ejus usum se ignorare prodeat. Prius verò quàm ad laudanum opiatum deveniat, capitis dolorem sequenti more sedare studet Barbette: Hederam terrestrem contusam capiti, plantis pedum, ut & volis manuum hoc vel simile admoveere jubet.

℞ *fol. ruta M. j℔.*  
*fermenti aeris 3ij.*  
*fimi columb. 3j.*  
*℥is comm. 3℔.*  
*+ sambuc. q. s.*

M. f. cataplasma, plantis pedum & volis manuum applicandum.

℞ *Boli Arm.*  
*℥ sigill.*  
*creta alba ā 3℔.*  
*+ calendul. q. s.*  
 Misc.

Usurpavit eod. modo.

## VI. SOMNUS NIMIUS.

Interdum profundior somnus ægros febri-  
 citantes quasi stupidos reddit, quo in casu vi-  
 tanda theriaca, Mithridatium, & electuarium  
 diascordii, ac similia, cum hæc ipsa opium  
 contineant; potius somno nimio resistunt ace-  
 tum rutaceum, sambucinum, &c. mixtura  
 simplex, castoreum & castoreata: c. g.

℞ *Essent. card. bened.*  
*castor. ā 3j℔.*  
 M. S.

Schweiss-Essenz in 40. à 50. gutt. in + rutaceo.

℞ *liqu. C. C. succin. 3j℔.*  
*essent. card. bened.*  
*castor. ā 3j.*  
 M. S.

Schweiss-Mixtur 50. Tropffen in vino  
 Rhenano des Tages dreymal.

℞ *Decoct. C. C. cum rad. scorz. ℔℔.*  
*∇ prophylact. Sylv. 3x.*  
*mixt. simpl. 3iij.*  
*essent. castor. 3ij.*  
*C. C. f. Δe, 3j℔.*  
*℥ii diaphor.*  
*flor. ℥is ā 3℔.*  
*bezoard. 3ial. 3j. M.*

Externè vesicatoria cervici, item carpis aut malleolis applicata, sunt optima: conf. Horstius in *observat. pag. 483. in Probl. p. 26.* Nari-  
 bus applicetur + rutaceum, sambucinum, vel etiam succus rutæ aceto mistus; item castoreum aceto intinctum, &c.

Vel ℞ *rhuris*  
*bacc. lauri*  
*piper. nigr. ā 3℔.*

Subigantur probè c. albumine ovor. im-  
 ponatur fronti q. s. & somnolentiam arcebit.

## VII. NARIUM HÆMORRHAGIA.

Hæmorrhagia narium varia est, pro varie-  
 tate febrium. Circa hanc notandum est: an  
 hæmorrhagia sit critica? an verò symptoma-  
 tica? Critica intempestivè suppressa quæ ma-  
 la intulerit? & quomodo ipsa correctæ sit? vi-  
 deb. apud Heinricum ab Heer in *observ. p. 70.*  
 Hæmorrhagia talis febrium sistitur, vel san-  
 guinis fluxum prohibendo, vel locum aper-  
 tum occludendo; illud prius, hoc posterius;  
 illud imprimis vellicantia aut derivantia, aut  
 internè refrigerantia præstant. Quod si se-  
 data fuerit hæmorrhagia, placet consilium  
 Sydenhami in *methodo medendi febres pag. 61.*  
 Laxationem alvi esse instituendam, si nempe  
 alia non impediunt. Inter interna excellit  
 laudanum opiat. & omnia papaverina etiam  
 & præsertim in malignis, præmissis præmit-  
 tendis, vid. Timæus in *cas. pag. 378.* Horstius  
*observ. l. 1. observ. 27.* hinc & ∇ papaveriser-  
 raticum cum syrupo de portulaca & papavere;  
 hinc & succi aciduli, cydoniorum, ribium,  
 syrupus portulacæ, aut plantag. ac denique  
 ℥ sigillatæ, lapis hæmatites, corallia, be-  
 zoardicum Martiale, aut ℥ diaphoreticum  
 3iale, &c. Inter externa autem imprimis  
 confert, si hoc ipso abluantur manus ac pedes;  
 vel epithemata ex aceto collo applicentur;  
 vel creta cum aceto in forma cataplasmatum  
 temporibus ac fronti; aut ex argilla & bolo  
 com-

communi cum aceto subactis, in forma cataplasmatidis fronti ac nuchæ applicentur. Bufo vel vivus sub alis applicatus, vel exsiccatus simili ratione sub axillis derentus, vel pugno compressus, ut probè incaleseat, potenter hæmorrhagias sistit. Denique ☉ ad ʒiʒ. in in ∇ frigida dissolutum ac propinatum hæmorrhagias sistit: Confer. Riverius *cent. 1. obs. 48.* Quò facit Julepus Prinerosii, quò sæpè usus fuit ad compescendam hæmorrhagiam, aliis irritis.

- ℞. ∇ *symphyt.*  
*plantag. ʒiv.*  
*syr. de ros. sic.*  
*plantag.*  
*cydon. a ʒiʒ.*  
 + *vini albi ʒiij.*  
 ☉ *diati aut depurati ant. ʒj.*  
 ~ *℥i gutt. x.*  
 Misc.

## IIX. SITIS.

Sitis, molestum perquam symptoma, sedatur convenientissimè per ☉ata, & per acidulas. Nitrata inter excellit ☉iatum in quovis potu dissolutum: quò etiam facit serum lactis depuratum, imprimis succo citri acidulatū. Acidula inter, tam vegetabilia quàm mineralia, excellit julepus ex ∇ communi, acidulatus cum ~u ☉is & syrupo citri, additur gelatina C. C. sudorem simul movens: vid. Riverius *cent. 1. obs. 19. cent. 4. obs. 83.* Piens *de febribus part. 2. cap. 29.* Ex vegetabilibus acidis vulgò notis, tamarindorum pulpa aut decoctum conveniens est. Ubi alvus simul aperienda venit; item Julepi citrati blandè acidi.

## IX. CARDIALGIA ET VOMITUS.

Sal absinthii valdè prodest in vomitu & nausea febrium: confer. Riverius *cent. 1. obs. 47.* item conserva menthæ, extractum tormentillæ, &c. sunt egregium.

- Vel ℞. *Conf. menth. ☉lat.*  
*pulp. citri a ʒiʒ.*  
*condit. cort. citri*  
*elect. diascord. Frac. a ʒvj.*  
*conf. alcherm. ʒij.*  
 ☉ *is absinth. ʒj.*  
 c. *succo cydon. l. citri f. Electuarium.*  
 Præscribi potest in nausea, fastidio cibi, & singultu. Item  
 ℞. *Mixt. simpl. ʒij.*  
 ~ *☉i dulc. camph. ʒij.*  
 M. S.

## Magen = Spiritus.

De quo sæpius guttæ 20. 30. ad 40. in vino sunt exhibendæ.

Conferantur etiam remedia Barbette usitata in vomitu febrium pestilentialium.

Interea parcus potus conceditur; sedato  
 Tom. II.

verò vomitu mox sudoriferum exhibeatur. Egregium quoque est emplastrum de caranna, aut quod Barbette *in Prax. lib. 4. c. 2.* commendat; item ex tacamahaca & balsamo Peruviano cum theriaca malaxata; vel sacculus stomachalis interpassatus ex mentha crispa, absinthio, rore marino & rosis rubris; vel ex fermento cum baccis juniperi, caryophyllis, nuce moschata, mace & aceto rosaceo cataplasma paratum calidè applicandum.

Præsentanei ferè effectus est epithema illud ex ∇ rectificato, ∇ apoplectica, theriaca & camphora.

## DIARRHOEA ET TORMINA ABDOMINIS.

Alvi fluxus, uti & tormina abdominis, curat in specie electuarium diascordii Fracastorii a ʒj. ad ʒij. propinatum, v. gr.

- ℞. ∇ *plantag. ʒj.*  
 + *sambuc. ʒij.*  
*elect. diascord. Frac. ʒj.*  
*extr. torment. gr. xij.*  
*syr. plantag. ʒij.*  
 M. pro 1. dosi.  
 ℞. ∇ *plantag. ʒj. l. iij.*  
*cinnam. ʒij.*  
*elect. diasc. Frac. ʒij.*  
*C. C. f. Δe ʒj.*  
*ʒii diaphor. gr. xv.*  
*syr. portulac. ʒij.*  
 ~ *☉is dulc. ʒj. M.*  
 ℞. *Essent. menth. ʒij.*  
*℥. E. cinn. ʒj.*  
*essent. opii ʒʒ. M. 50. gutt. pro dos.*  
 ℞. *C. C. usti præp.*  
*extr. tormentill. a ʒj.*  
*ʒii diaph. gr. xv.*  
*camph. gr. vj. M. pro 2. dosi.*

Item essentia theriacalis ad gutt. xxx. vel xl. item extractum theriacale ad gr. iij. vel jv. aliaque similia: anodyna autem & opiata sunt optima, quibus adduntur & absorbentia, nempe C. C. ustum, bolus Armena, terra sigillata, crystallus præparata, cum conserva rolarum antiqua propinata. Cydoniata denique quælibet sunt usitatissima.

## XI. SUDORES NIMI.

Rariùs equidem sudores nimis vexant sub febrium motu, quia moderati sunt exoptati: interdum tamen post febres continuas, aut graviores, aut paulò diuturniores, crebri sudores nocturni ægros vexare solent, atrophiam minantes, ex deficiente nutrimenti chylosi assimilatione, ob sanguinem depauperatum nati. Hos ipsos & emulsionem temperantes, vel absorbentia corallata, interdum Martialia, cum aromaticis subjunctis amaris, v. g. absinthio, curant: Confer. etiam  
 (Bbb) Syden-

Sydenham *in observ.* pag. 335. De cætero corpore adhuc pleno in febribus non eliciendi vi, quia facile translatio fieri potest ad caput, ut rectè monet Ballonius *Phar. Med.* pag. 215.

## XII. URINÆ SUPPRESSIO.

Quoad urinarios affectus: suppressio hujus interdum supervenit, quæ interdum criseos per sudores imminens indicium est, præsertim si prægresso sudore superveniat. Conferatur Henricus ab Heer *observat.* p. 62. Interdum in statu sine criseos indicibus supprimitur, vel in delirantibus, vel alio modo affectis. In talibus regio pubis illinenda venit sequenti linimento:

- ℞. *ungu. de alth.* ʒʒ.  
*scorpion. simpl.* ʒj.  
 M. D. S.

*Eröffnend Sälblein.*

Applicetur crebrius. Velicatoria vitentur.

## XIII. SYNCOPEN, CORDIS PALPITATIO ET ANXIETATES.

Ad syncopen, palpitationem cordis, & anxietatem à sanguinis nimia ebullitione, aut symptomatis spasmodicis, aut etiam sanguine coagulato oriundam, præter externa, spiritus animales torpidos excitantia, convenit aliquid confectionis alchermes, castoreum & castoreata, ~ carminativus de tribus, liquor C.C. succinatus, ~  $\Theta$ is \*ci succinatus: &c. Quando verò ex ventriculi cruditatibus originem trahunt, ante omnia conveniunt absorbentia, vel sola, vel cum volatilibus sociata, c. g.

- ℞.  $\nabla$  *theriac.* ʒij.  
*R. bezoard.* ʒʒ.  
 ~  $\Theta$ is \*ci *theriac.* ʒj.  
*pulv. viperin.* f. *bezoard. anim.* ʒj.  
*syr. cort. citri.* ʒij. M.  
 ℞. *Corall. r. præp.* l. *ebor.* f.  $\Delta$  ʒj.  
*cinnab.* ʒii ʒʒ.  
 $\Theta$  *volat. C.C.* gr. xvj.  
*succin.* gr. viij.  
*camph.* gr. jx. M. pro 3. dof.

Inter externa pro temporibus & facie irrorandis:

- ℞.  $\nabla$  *hyrond. c. castor.* ʒj.  
*carbunc.*  
 ~ *meliss.* l. *citri.* l. *rosar.*  
 $\Theta$  a ʒij. M.  
 ℞. *HB. serpill.*  
*major.*  
*fl. lavend.*  
*castor.* ʒj.

F. Nodus vel sacculus pro pulsibus, + o rofaceo vel  $\nabla$  *hyrond. c. castoreo*, vel mixturâ præscriptâ irrorandi.

## XIV. PRUNELLA.

Ad prunellam seu anginam, & incipientem oris nigredinem gargarismus ex prunella, salvia, scordio, cum rosis rubris mistis, &c.  $\nabla$  hordei decoctis paratus, addito  $\Theta$ .  $\Theta$  \*co, unâ cum syrupo papaveris rhæados, & diamorum confert: c. g.

- ℞. *HB. scord.*  
*prunell.* ā Mj.  
*veron.*  
*fl. scabios.*  
*malva arbor.*  
*rosar.* ā Mʒ.

Incis. dentur ad chartam, S.

*Vermischte Species zum Gurgel = Wasser.*

Simul quoque externè collo sacculus integro croco, floribus sambuci, & ~ u  $\Theta$ is \*ci irroratus, & interpassatus, ita siccus calidè applicetur.

## XV. TREMOR MEMBRORUM ET TENSIONES.

Ad tremorem & membrorum tensionem vesicatoria suprâ allegata pulsibus manuum & supra genua in parte interiore, imò contra nimias anxietates præcordiorum, etiam sub axillis, & supra umbilicum cautè applicari, vesicæ inde ortæ maturè aperiri queunt.

## XVI. MACULÆ.

Ad maculas non rarò diebus criticis, quarto, septimo vel nono, in corpore hinc inde, præsertim dorso, brachiis & cruribus seu morsus pulicum, quandoque ut vibices longiores provenientes, sudorifera suprâ nominata continentur: inter quæ myrrhata & castoreata excellunt cum salibus volatilibus; hinc electuarium sequens:

- ℞. *Elect. diascord.* *Frac.* ʒʒ.  
*C.C. f.  $\Delta$  e*  
 $\Theta$  *iscard. bened.* ā ʒj.  
*myrrh. elect.* ʒʒ.  
 c. f. q. *syr. rubi idai* f. *Electuarium.*

Item pulvis sequens:

- ℞. *C.C. f.  $\Delta$  e* ʒij.  
 $\Theta$  *ii diaphor.*  
 $\Theta$  *iscard. bened.* ā ʒʒ. M. pro 6. dof.  
 ℞. *Pulv. diaph. Ludov.* ʒʒ.  
 $\Theta$  *ii diaph.* ʒj.  
*camph.* ʒʒ. M. pro 6. dof.  
 ℞. *C.C. f.  $\Delta$  e* ʒij.  
 $\Theta$  *iscard. bened.* ʒʒ.  
*camph.* gr. xv. pro 4. dof.  
 M. f. pulvis. S.  
*Austreibend Pulver.*

Caveatur sedulò frigus, & fricetur quotidie corpus sacculo,  $\Theta$  e calido vel  $\Theta$  e petra repleto, & præterea de decocto sequenti sæpè bibendum detur.

℞. *raf.*



℞. *raf. C. C.*  
*rad. scorz. ā ʒij.*  
*flaved. cort. citri. ʒij.*  
*sem. acetos.*  
*anisi ā ʒj.*

Misc. & contus. coqu. in f. q. ∇x:

Colatura edulcoretur instar julepi.

Vel mediante hac f. emulsio ex seminibus expellentibus c. myrrha ad imitationem Zwelferi in *Pharm. Reg. pag. 209.*

Vel ℞. *flav. cort. citri ʒij.*  
*sem. galeg. rec.*  
*aquileg.*  
*card. bened. ā ʒij.*

*myrrh. el. ʒʒ.*

C. decocto jam præscripto f. Emulsio:  
 adde

*C. C. f. Δe ʒij.*

*ʒii diaph. ʒj.*

Edulcoretur parum.

Sed etiam cucurbitæ siccæ passim in dorso, brachiis & cruribus calidè affigendæ, & sæpiùs detrahendæ, vel dictis facculis, & vel nitro refertis, & lixivio calido humectatis, corpus calidè benè fricandum, ut eò meliùs cutis aperiatur, & maculæ excernantur, nec retrocedant.

## SECTIO XVI.

DE

### SANGUINIS EX CORDE IN PARTES MOTU, ADEOQUE CORDIS, HINC ET AR- TERIARUM, PULSU LÆSO.

**V**T pateat connexio cum prioribus, superiùs habuimus in genere de sanguificatione læsa, & inde natis febribus, & fit, quando sanguis non rectè fermentatur, & in præcordiis ab aëre inspirato non rectè resolvitur, unde tunc simul fit vitiosa chyli assimilatio: Quæ vitia sanguificationis ex læsa particularum, massam ejus componentium, crassioriri diximus; siue hæc crassitudo vitietur vitio chyli, siue vitio massæ sanguinæ, aut hæreditario aut adscititio. Verùm inter utrosque intercedit alteratio ab aëre inspirato & expirato: hujus ergo vitia inferenda fuere.

Vitiatur cordis motus seu pulsus, & hinc consequenter sanguinis distributio, variis modis:

1. Quando eadem augetur, simulque depravatur in palpitatione & tremore cordis.
2. Quando eadem plus minùs imminuitur aut deficit ferè in syncope, & virium prostratione.
3. Quando eadem est nimis frequens & celer, nempe in febribus, de quibus egimus.

#### CAPUT I.

De

#### *Cordis Palpitatione, & Tremore.*

**P**alpitatio cordis est, quando cor impetuosè admodum & vehementer subsultat & pulsar. Est enim reverà cordis palpitatio motus ejusdem nimis inordinatus & convul-

Tom. II.

sivus, coactus & vehemens, quò forti systole se contrahit, ut nunc vehementior, nunc mitior, nunc major, nunc minor, nunc verò mediocris. Palpitatio hæc cordis vix sufficienter ex arteriarum pulsu cognosci potest: sæpiùs enim necesse est, regioni sterni circa latus sinistrum admoveere manum. Non verò opus est semper, cum interdum sit adeò vehemens, ut solò auditu possit percipi, vel visu cognosci, adeò ut prostant exempla cordis palpitationum, in quibus sonitus ad distantiam percipi potuerit, qualia videbitis exempla in Tulpio, qui convulsivam cordis palpitationem in platea dissita audivit; & Bartholino *hist. anatom. 18. cent. 1.* sicut Epiphanius Ferdinandus *hist. 79.* culcitras superstratas amovisse observavit, vel etiam costæ distractæ, & ferè diffractæ fuerunt: vid. Schenckius *l. 2. observ.* Horstius *lib. 3. obs. 17.* Hæchstetterus *Decad. 9. p. 361.* Mayow *de motu musculorum pag. 96.* Et Piso *de colluvie serosa pag. 166.* notat palpitationem cordis, in qua indumenta quasi flabello mota inæqualem cordis motum æmabantur, & thorax & sternum ab illo motu à sede naturali dejecta mediocriter extubabant.

Contrarium quodammodò cordis palpitationi est vitium

#### TREMOR CORDIS.

Motus scil. ejus quodammodò deficiens, vibrans & tremulus, imminutam ac vitiosam cordis constrictionem insequens, in qua fibræ musculorum cordis celerrimè & quasi semicontractè systoles & diastoles vices obeunt. Confunduntur communiter hîc cordis tremor & palpitatio, & vix reperietis quendam

(Bbb 2)

Practi-

Practicum, qui hæc non confusè tractet, cum tamen toto cælo differant: palpitatio enim est immoderata & vehemens cordis concussio, impetuosissima systole ac diastole molesta, in qua cor violenter concutitur & quatitur, & dicitur hic motus rectè ab Hippocrate, cordis convulsio: id quod uberius confirmat Lowerus *Tract. de corde pag. 132.* sicut modum, quo fit cordis palpitatio, optimè descripsit Mayovv *de motu musculorum pag. 95.* Tremor cordis verò dicitur, cum minores sunt pulsus & crebriores, & quasi tremuli, pulsui languido & crebro similes. Oritur equidem à muscoli cordis irritatione. Verùm in hoc est differentia, quod cor agitata palpitet, quando vires adhuc sunt robustæ & constantes; dum verò sunt imbecilles ac prostratæ, cor irritatum tremulo motu vibratur, adeò ut tremor cordis pertineat suo modo ad symptomata virium imbecillium, & etiam quodammodò ad lipothymias. In palpitatione cordis fibrarum vehementia; in tremore verò crebritas earum imprimis observatur, ut rectissimè hæc distinguit Willisius *Pharm. Ration. p. 1. pag. 260.*

Illustrari potest per experimentum anatomicum, si nempe ex cane vivo cor extrahatur, quod aciculâ punctum convellatur aliquoties; si verò ejus pulsus penitus languescat, tunc si denuò attingatur, tremorem exhibebit, & motum vibratorium. Quidni ergò palpitatio & tremor similis in corpore vegeto adhuc excitari poterit?

### PARS AFFECTA.

Pars affecta in palpitatione & tremore primariò est cor, quippe cujus substantia musculoſa præternaturali motu in convulsionibus & motibus convulsivis movetur. Jam verò, cum omnis motus convulsivus in machina corporis nostri præsupponat sensationem nimiam, cujus occasione sequatur spirituum influentium impetus, proindè facile patet: proximam causam palpitationis consistere in tali sensatione molesta aucta; uno nomine: in irritatione. Sicut verò sensationem nimiam limitat vis cordis movens in spiritibus consistens: ita si cordis vis motiva sit nimis valida, oritur ejus palpitatio; si debilior, fit tremor, aut cordis motus vibratorius, inæqualis & varius.

### CAUSÆ.

Causa convulsionis cordis in ejus palpitatione, & motus ejus convulsivi tremuli in ejus tremore, est omne id, quod quacunque ratione aut musculos cordis, aut nervos ad cor derivatos, irritare & vellicare, adeoque ex impetu spirituum ad convulsionem stimulare potest.

Causæ tales irritantes investigandæ sunt vel in ipso organo moto, nempe in corde ipso, vel in motus medio, i. e. in nervis. Ratione cordis causa irritans est respectu ejus parenchymatis, vel extra cor in ejus ambitu, eaq; frequentior, vel intra cor & ventriculos ejus.

Inter causas extra cor subindè observata fuit ∇ pericardii nimis abundans, unde fit hydrops pericardii, cujus occasione pericardium distenditur, cor irritatur; & palpitatio molesta ac diuturna cordis oritur: vid. Amatus Lusitanus *cent. 3. cur. 43.* item Piso *Tr. citato pag. 186.* quod Galenus jam observavit *lib. 5. de locis affectis.* Sed dubium videtur quoad hanc causam, annon acrior lymphæ potius impediat motum cordis? imò lymphæ hujus copia non tam causa, quam affectus palpitationem cordis insequens, seu productum morbosum sit? vid. Lovverus *tract. de corde pag. 104.* ubi à glandulis basi cordis adnatis eam derivat; siquidem in homine vivente paucior, quam in mortuo, hujus reperiatur quantitas, de quo vid. Schneiderus *l. 2. de catarrhis p. 93.* sicut in iis, qui morte violenta, & imprimis cum sanguinis profusione perierunt, vix guttula ejus; è contra in hecticis & phthisicis, nec non suffocatis, major ejus quantitas reperiatur.

Tubercula itidem & excrescentiæ verrucalæ, cordi vel pericardio adnatæ, etiam sunt causa palpitationis cordis admodum vehementis. Exempli horum post mortem in dissectionis repertorum, videbitis in Schenckio *l. 2. obs.* item Bonetto *sepulchret. p. 651.* Zacuto Lusitano *lib. 8. Medic. Princip. hist. cap. 8. obs. 3.* Sic ex trunco arteriæ magnæ prope cor officio palpitationem cordis gravem observavit Willisius *in Pharm. Rat. pag. 264.* Ob venæ pulmonalis cartilagine adnatam palpitationem cordis notat Mayovv *de musculorum motu pag. 97.*

Præter tubercula vermes etiam, *ver Herp-  
turm* / tam in corde ipso, quam in pericardio contenti, aut eidem adhærentes inter alia symptomata periculosas subinde dant palpitationes. Affectus rarus habetur vermis pericardii, & paucis, & ferè nulli cognitus. Ego tamen puto, quod non sit rarustalis vermis, sed admodum frequens. Symptomata taliter ægrotantium, & Medicamenta contra eum videbitis in Gabelchovero *cent. 3. curas. 1.* & in Hartman. *Prax. Chym. pag. 3.* Præcæteris ægri patiuntur palpitationem cordis subindè recurrentem sine manifesta causa, insignes rosiones & vellicationes, puncturas & dolores, præsertim in interiore pectoris loco, ex improvviso interdum lipothymia imminet, interdum etiam epilepticæ convulsionis supervenire observantur, facies pallet, ægri inquieti sunt, pulsus intermittens & inter-

intercurrentensest, & similia adfunt symptoma-  
ta: vid. Foresti *lib. 21. obs. 26. in Schol.* Pa-  
ræus *lib. 1. cent. 3.* Schenckius *l. 2. obs. 194.*  
Curiola est historia, quam habet Petrus à Ca-  
stro, Medicus Veronenlis, in suis *Manuscri-  
ptis practicis*: *Mihi*, inquit, *contigit, dirum*  
*morbi genus in Cantabria observasse, sub epide-*  
*mica constitutione, in qua post ingentem agro-*  
*tantium stragem, qui omnes convulsi cum fre-*  
*quentissima & ferè continua cordis palpitatione*  
*moriebantur. Dissectis quibusdam cadaveribus*  
*invenimus in singulis vermem, magnitudine fe-*  
*rè minimum digitum aquantem, capsula cordis*  
*affixum. Non valuerunt præstantissima alexi-*  
*pharmaca vermem occidere, non Bezoar Orien-*  
*talis, nec theriaca, nec confectio alchermes, nec*  
*scorzonera aut alia, itemque nec allium, à quo ta-*  
*men magis, quàm ab aliis omnibus angebatur, & la-*  
*di videbatur. Solus succus scabiosa mox vermẽ occi-*  
*dit, unde hæc experientia observata scabiosã impo-*  
*sterũ uti jussimus languentes, tam in jusculis exco-*  
*ctã, quàm in decoctis & syrups & ex ea fabricatis.*  
*Tandem nulla auxilia agrotantibus apponebantur*  
*absque hoc specifico alexipharmaco, & certè mi-*  
*rum fuit, ab eo tempore nec ullum agrotantium*  
*perisse. Itaque non cordialibus hic affectus cu-*  
*rari potuit, sed succo allii, scabiosa, & scabio-*  
*sa, in qua agitatus fuit per aliquot horas Mercur-*  
*ius crudus: item & dulcis ad gr. ix. exhibitus*  
*cum bolo ex conserva florum scabiosa magnopere*  
*profuit.*

Vid. etiam hujus Petri à Castro *Tract. de pe-*  
*ste Neapolit. Rom. pag. 137. & 138.* ubi etiam  
vermis ejusdem mentionem facit.

Cataplasma externum contra vermem pe-  
pericardii expertum vid. in Loweto, *Tr. de*  
*corde pag. 107.* ex foliis cinaræ, tanacetii, & ab-  
sinthii vulgaris, aceto vini incoctis, & cum  
paucis Mitridatio mixtis, regioni cordis ad-  
motum.

Causæ internæ respectu cordis sunt varæ:  
Rariores sunt ipsi affectus cordis, ut abscessus  
in corde, aut simile quid; sed potius omnia  
ea, quæ sanguinis localem motum quacunque  
ratione per cor impedire valent: unde circa  
radices vasorum & cordis basin aggestus, cre-  
briores & validiores contractiones, adeoque  
palpitationem concitat, cujus sanguinis in cir-  
culo suo plus minus impediti non leve argu-  
mentum est, quod pulsus in carpo minus cor-  
dis motui respondeat, sed languidus & dimi-  
nutus subinde percipitur, quasi sanguine  
non sufficienter distendente arterias. Has in-  
ter causas sunt tam ipse sanguis non ritè se ha-  
bens, quàm etiam alia sanguinis rectè con-  
stituti motum impediencia. Sanguinem  
quod attinet: ipse vitiosus minus turgescibilis  
& fermentescibilis, indeque ad stagnationem  
pronus, ad palpitationem disponit. Uti

enim à sanguine rarefcente naturaliter expan-  
sum cor irritatur ad sui constrictionem, ita ubi  
præternaturalis est fermentatio, etiam per  
consequens præternaturalis irritatio, ibi etiam  
præternaturalis & violenta erit contractio.  
Hinc in iis, qui sanguinis menstrui patiuntur  
suppressionem, frequentes sunt palpitationes  
cordis, quas ex levi motu tunc contrahunt;  
non secus: c cacheeticis confirmatis, ictericis,  
spleneticis confirmatis, aliisque affectibus  
chronicis non raræ sunt: quod ex Glyssonio  
*Tractatu de cordis palpitatione, & Foresto l. 17.*  
*obs. 1.* est notum. Præ cæteris tamen hypo-  
chondriacis, hystericis, & scorbuticis fami-  
liare est malum hæc, ita ut in palpitatione  
cordis semper suspicio sit de affectu scorbuti-  
co: idque duplici modo; vel ob sanguinis in-  
trinsecam constitutionem; vel propter nervos  
cor moventes convulsos. Ratione sanguinis  
frequens est palpitatio cordis, triplici ex causa:  
vel ob anomalam sanguinis in præcordiis tur-  
gescentiam; vel ob acidum vitiosum tunc in  
sanguine peccans & cor vellicans, vel ob gru-  
mulos sanguinis ex acido condensatos in cor-  
de relictos, qui inter cordis valvulas hærentes  
illic denique impacti palpitationem inferunt  
non raro. Dico tamen grumulos: si enim  
maiores grumi & polyporæ concrecentiæ ad-  
essent, syncopes ac suffocationis metus insta-  
ret, cujus rei examen observatum est in M. A.  
N. C. *ann. 2. obs. 197. p. 298.* Nec mirum est,  
quod tales grumuli in hypochondriacis pal-  
pitationem cordis inferant, cum & calculo-  
sæ concretiones in corde existentes, item po-  
lypi cordis, idem subinde inferant malum:  
de quib. vid. Horstius *in obs. & Hæferus in*  
*Herc. Med. pag. 89.* Gremb. *Arbor. l. 2. c. 1. §. 8.*  
quod etiam bilis illa retortida in tophi nigri  
speciem redacta facit, cujus Fernelius *Pathol.*  
*l. 5. obs. 17.* meminit. In scorbuticis autem  
communter gravissima cordis palpitazione  
afflictis hoc mirabile est, quod si ipsi quieti in  
lecto jaceant, nihil mali sentiant; contra verò  
ex levissimo motu gravissimas incurrunt palpi-  
tationes cordis, lipothymiis sæpè superveni-  
entibus. Inò, quando hypochondriaci &  
scorbutici obnoxii sunt spasmus nervorum, im-  
primis rami intercostalis & paris vagi, fit ex-  
inde, ut in talibus confirmatis, quando v. g.  
lieni incumbunt, subinde contingat cordis  
palpitatio, propter ramum splenicum ner-  
veum satis insignem tunc spasmò correptum;  
qui spasmus plexui mesenterico nervorum  
communicatus, nervum paris vagi afficit:  
quod uti ad quæcunque viscera interna, ita  
& copiosè ad splenem derivatur, à cujus  
furculis movetur cor, & ita affecto hoc  
nervo cor palpitat. Patet hoc ferè ex eo,  
quod in talibus hypochondriacis & spleneti-  
cis ingruente cordis palpitatione percipiatur



murmura & rugitus in abdomine, & spasmo mesenterii, & intestinorum inordinata contractione & agitatione.

Quid de flatibus? Communiter quidem putant: flatus aut exhalationes ex liene ad cor ascendentes, aut metastasin materiæ in tali casu subesse, à quibus cordis palpitatione excitetur; quod tamen minus verisimile, aut rarissimum videtur: & posito, quod sint, vix tamen continuam cordis palpitationem inferre possunt. Dubitant equidem nonnulli: an dentur flatus in vasis majoribus sanguifluis, & per consequens arteriis? Verum vix possunt negari in vasis flatus sub certis casibus; prostant namque exempla horum: sic Sylvius in Belgio in quodam cadavere in Nosocomio reperit flatus, vix divisâ summâ abdominis cute erumpentes: quin & arteriam aortam, præcipuè verò sinistram cordis ventriculum ita distendentes, ut sinister ventriculus dextro longè capaciior apparuerit. An autem hi flatus semper aut ut plurimum sint causa palpitationis cordis? vix credo: sed semper dubito, cum stante eorum forma nativâ cum impetu ad cor deferri non possint.

Si sanguis in suo motu locali non nihil impeditur, adeoque minus commodè per cordis ventriculos circulatur, etiam cordis palpitationem dare potest. Hanc frequentissimam causam asserit Willisius in *Pharm. Rat. P. 1. pag. 263.* sanguinis nempe in cordis basi remoram & aggestionem. Conf. M. A. N. C. ann. 2. *observat. 197. p. 299.* id quod confirmat etiam Forestus *l. 17. obs. 1.* ubi palpitatione cordis observata in quodam, qui somnum meridianum capiendo tibias habebat nimis constrictas; laxatis verò tibiis sine ulla palpitatione propter debitum sanguinis motum dormiebat. Schulzius in *Cons. 103. & 104.* de iisdem tibiis constrictis simile quid refert: Quo etiam ex crescentia carnea in cordis basi 3vj. pendens, & alterum corculum repræsentans, pertinet: vid. Schenkii *l. 2. observat. pag. 214.* item polypi graviores in corde, tubercula in cordis ventriculis: vid. Bonetti *Sepulchretum pag. 639. & 640.* Sic Schulzius in *Consil. 103.* refert inventum lapillum quandam nigricantem in eo, qui tali morbo sæpius fuit correptus; sic Horstius habet exempla calculorum in corde repertorum, ex quibus vehemens ac diuturna oborta fuit palpitatione: & ex Horstio Hæferus *Herc. Med. pag. 89.* refert palpitationem cordis lethalem, ex tribus lapillis in corde repertis.

Quoad nervos affectos: si isti, qui ad cor derivantur, ejusque aut viscerum vicinorum motui inserviunt, irritentur, similem cordis convulsivum motum inferunt, ubicunque etiam causa occasionalis latuerit. Unde præter ea, quæ suprà de hypochondriaco spleneticò dixi, contingit, quod animi pathemata,

præsertim ira & terror, odores fortes in notu assuetis, & similia, quæ spiritus animales in motus perturbatos & irregulares ciere, ac nervos irritare atque concitare possunt, cordis palpitationem inferunt: imprimis mulieres hystericæ, ubi cessante paroxysmo odore tantum quodam ex improvviso afficiantur, mox in palpitationem exinde incidunt, ex solo odore. Item spiritus animales in motus inordinatos & convulsivos redacti palpitationem cordis excitant, dum palpitatione alios affectus spasmodicos sæpius comitari solet: e. g. in subjecto illo simul epileptico, quod Platerus *obs. 226.* adducit, & à Venere juxta eundem Platerum *Pr. T. 1. p. 486.*

Tremoris cordis causa, vel in musculo cordis vel in nervis investiganda, cum pariter convulsi quid sapiat. Quod ipsos cordis musculos attinet: equidem in his aliquid vitiosum seu præternaturale contineri videtur, quod fibras motrices parenchymatis eorum continuo vellicare, & hinc ad contracturas irritare valet. Cum verò necessariò diastole cordis à sanguine influente superveniat, hæc vix sufficiens conceditur, quin ex dicta causa subito contractio repetita superveniat, & ita continuus, sed interruptus, adeoque tremulus, sic fiet motus. Quoad nervos; Scorbucici etiam ac hypochondriaci, ex his ipsis affectis, & ab aliorum viscerum nervis, per consensum in spasmos coactis, leviores licet, tremores in corde pati observantur. Pauca aliàs de hoc cordis tremore prostant apud Authores & Scriptores Medicos, cum ordinariò cum palpitatione ejus confundatur, aut circa pulsuum vitia, vel lipothymias, subinde tremoribus supervenientes, tractari soleat, &c.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica ex observatione differentiarum & aliorum symptomatum syndrome seu contingentia ferè colligenda sunt; non ex pulsu in carpis manuum, vel aliis locis, ex quo parum certi, imprimis quoad causarum differentiam, imò planè nihil, cognosci potest; quin potius requiritur imprimis applicatio manus ad ipsum cor. Facit huc Timæus in  *suis Epistolis Epist. 23. pag. 140.* ubi observat palpitationem cordis mirabilem, insignem & validam, in qua nullus in carpis pulsus observari potuit.

Quod attinet signa causarum; in his totius rei cardo vertitur promeliori praxi.

Signa aquæ pericardii abundantis, calculorum, polypi, vasorum pulmonarium obstructionis &c. sunt pauca & admodum fallacia, interdum ferè nulla. Pulsus non est adeò magnus, nec adeò vehemens aut concitatus, cum cor in impedita capsula liberè moveri nequeat, affectus est contumax & pertinax; conjuncta simul est febricula, referens hædicæ speciem,

speciem, accedit & tabes corporis, & tandem quoque spirandi difficultas. Signa verum in pericardio habuimus. Si verò malum, quod frequentissimè fit, oriatur ex affectione hypochondriaca, tunc non solet esse continuum: ante paroxysmos verò vel cum iis percipiuntur murmura subinde & rugitus abdominis, in specie juxta regionem sinistri hypochondrii. Præterea, cum tales paroxysmo afficiuntur, cor quasi constringi, & cum ambabus manibus comprimi videtur: concurrunt simul, & quidem nonnunquam, vertigines aliaque abdominis capitisque mala, ex anomalo motu spirituum animalium dependentia. Scorbuticis etiam malum hoc est admodum familiare, & ferè hoc habet peculiare, quod sæpè ad levissimum corporis motum, si vel brachium vel manus tantummodo moveatur, paroxysmus palpitationis invadat, & subindè pravas lipothymias conjunctas habeat. Exemplum palpitationis cordis talis scorbuticæ mirandum vid. in Horstii *observat. l. 17. obs. 35. p. 380 & 383.*

Tremor cordis verò cognoscitur ex pulsu inæquali, debili ac languido: subinde etiam virium ingens prostratio & imbecillitas juncta esse solet.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: palpitatio cordis per se non est malum contemnendum; ut plurimum enim difficulter curatur.

Si palpitationi cordis superveniat pulsus sensim remittens, aut etiam nonnunquam intermittens, cauti sint adstantes; imminet enim syncope.

Ulterius qui in juvenili aut declinante ætate sani, sine ulla manifesta causa corripuntur gravi cordis palpitatione, rarò ad senectutem perveniunt, sed citius moriuntur. Aphorismus est Galeni, & per experientiam Practicorum comprobatus.

Palpitatio cordis ex malo hypochondriaco frequentior quidem est, ac sæpius recidivans, levior autem & curatu est faciliior reliquis speciebus, præsertim per *idiopathiam* cordis aut partium vicinarum accidentalibus. Ea verò, quæ ex scorbuto, ferè gravior, & propter lipothymias conjunctas periculosior, nec curatur, nisi affectu ipso sublato.

Sin palpitatio cordis continua vitio pericardii, aut vermium, aut arteriarum cordis ossæarum, aut polypi ejus, aut calculorum aut aliarum causarum non cognitarum contingat, incurabilis est, atque instar Hæcticorum lentè ac successivè ad mortem deducit homines.

Si tandem malignitatis & veneni suspicio adest in palpitatione cordis, res est periculo plenissima, & rariùs ægri evadunt.

#### C U R A.

Quod ergò attinet curam: in genere ea

ante omnia eò dirigenda, ut saltem causa peccans, seu id, quod musculus irritat, aut ejus nervum moventem vellicat, maturè removeatur, quo ipso spontè cessabit dicta convulsio. Nam irritationem ipsam sistere opiatum non æquè nec semper tutum est; si enim sistitur sensus irritationis, periculum est, ne totaliter cesset cordis motus ac pulsus: itemque cum palpitatione cordis laborantes soleant insignem virium imbecillitatem comitem habere, caveamus nobis ab opio, ne sc. hujus usu eas penitus prosternamus, utut interdum, ubi gravior affligit paroxysmus ejus in hypochondriacis & scorbuticis, opium appropriatis additum ad coercendum impetum non sit inconveniens. Aspicienda ergò hinc est origo mali, & ubi est à scorbuto, vel cachexia, vel malo hypochondriaco, vel affectu splenetico, aut hysterico, vel venenis, verme pericardii, &c. semper appropriatis his ipsis varianda est cura. Unde mox patet, ut suprà dixi, palpitationem cordis ex  $\nabla$  pericardii, excrecentiis, & conformatione læsa esse incurabilem, & solam eam, quæ à cachexia, scorbuto, & malo hypochondriaco, similibusque affectibus provenit, venire sub praxin medicam.

Quoad punctum venæsectionis in palpitatione cordis, res est dubia: Nam expertissimi Practici eam cum cautela administrandam monent, ne vires prosternamus, & nã ad sit summa plethora, planè omittendam; Habeatur tamen ratio causarum antecedentium cum usu venæsectionis. In graviore enim cordis palpitatione à subitaneo & nimio terrore aut timore, aut suspitione grumorum sanguinis, aut à suppressione sanguinis aliàs solenniter fluentis, contracta, aut si ex prægressa insigniore corporis commotione supervenerit, aut in junioribus sanguine fervido præditis eveniat palpitatio, aut alia circumstantia occurrant, in quibus suspicio adest sanguinis circa cor aggregati, vel impetuosius circa vasa moti, tunc subindè necessitate coactus Medicus venam aperire necesse habet, ut sanguinis stagnationi ejusque impedito motui, aut præsentati aut imminenti, afferatur aliqualis medela, ut depleto sanguinis quanto faciliior ejus circulus fiat, nec tam insigniter aut copiosè, item in uno loco subsistere queat. Eò magis hæc convenit, sive subjectum sit plethoricum, sive reverà tale sit apparens; aliàs minùs tutam eam existimo. Prostant etiam exempla practica quædam palpitationis cordis per venæsectionem in paroxysmo levata in Horstii *l. 3. obs. 16.* item in Fontani *Consil. & Responsis p. 66.* Ad miraculum eam cessasse observavit Hæchstædterus in *observat.* Quin & hirudines applicatæ posterioribus ani venis, vel etiam applicatæ supra cor, interdum sedarunt paroxysmum

xygium palpitationis cordis. Exemplum habet Zacutus Lusitanus *lib. 2. Medic. Princip. hist. 39. obs. 2.* de palpitatione cordis per hircines supra cor admotas curatâ. Imò, quod mihi magis adhuc videtur paradoxon, Zacutus Lusitanus observat palpitationem cordis validam, curatam per scarificatam cucurbitulam supra cor admotam, *lib. 4. Prax. Admir. pag. 136.* Proinde in puncto venæsectionis experientia, & hinc circumstantiarum varietas ubique probè attendenda.

Cùm verò inter palpitationes cordis curabiles frequentissima sit ista, quæ ex affectibus hypochondriacis, scorbuticis, & hinc oriundis pathematis convulsivis oritur, propterea semper in palpitatione cordis hîc reflexus est faciendus: & ratione peccantis acidi, tam in primis viis quàm in massa sanguinea fermentationem turbantis, in paroxysmo trium remedium genera, Martialia, hinc terrea, quò in specie pertinent margaritæ, corallia præparata, magisterium coralliorum cum succo citri paratum; item Ræ eorum & omnia coralliata, cinnabarina, ac tandem salia volatilia, utramque faciunt paginam. His simul analeptica, & virium ac spirituum refocillativa jungenda sunt, de quibus vid. Willisus in *Pharm. rationali*, quæ inter tamen analeptica & spirituum confortativa, quæ semper sunt volatilia & penetrantia, observandum est, salia volatilia sulphurea seu fortiter olentia non æquè omnibus subjectis talia convenire, sed interdum, uti in mulieribus hystericis, ita in quibusdam hypochondriacis & doctioribus viris, qui ordinariò systema nervosum delicatum & sensibile obtinent, hoc fortius afficiendo paroxysmum exasperare; quod pariter in aliis affectibus convulsivis attendendum est. Talibus ergò potius salia volatilia maera, ut  $\sim$  S. ammoniaci, & simpliciter penetrantia, sine eo, ut fortiter nates afficiant, conducunt, v. g. essentia ambrae egregia est in lypothymis & cordis palpitationibus, quæ tamen mulieri affectum hystericum exasperabit; loco cujus simplex quoddam sal volatile potius adhibendum erit: cinnamomum & omnia ex eo parata egregia sunt, non secus ac in lypothymis; sicut &  $\oslash$  cinnamomi  $\oslash$  natum omnibus præferendum monet, & mirè laudat Lindanus. Nihilominus tamen ab ejus usu in quodam viro palpitationem cordis excitatam fuisse refertur in *M.A.N.C. ann. 3. obs. 134. p. 244.* quod dudum etiam notarat Mœbius in *Institut.* Quod si verò à volatiliis sulphureorum & fortiter oleosorum ac odoriferorum, aut à Martialium usu ex improvise inductus & exasperatus jam fuerit paroxysmus, acidula penetrantiora, ac speciatim  $\sim$  nitri dulcis, fi-

gendo & sistendo humores commotos optimè enim compescit. Cùm ergò cordis palpitatione sit saltem symptoma aliis superveniens affectibus, pro horum varia differentia etiam hujus symptomatis nonnihil varianda cura; quod autem in specie attinet analeptica in palpitatione cordis, semper reliquis remediis addenda sunt melissa, ejusque essentia & spiritus per fermentationem paratus, quæ insigniter reficit: idque imprimis, si hoc spiritu paretur essentia ambrae, de qua postmodum plura. Item hæc ipsa melissa etiam vino irrorata, & externè regioni cordis vel sola, vel cum foliis borraginis in sacculo calido applicata, admodum conducere solet. Experimentum hoc primus fecit Helidæus Paduanus felici successu: conf. Forestus *lib. 17. obs. 1.* qui Lælium à Fonte in *Conf. 47. l. 2.* imitatus est, & in thoracis vulneribus ex sanguine concreto excitatas palpitationes cordis ingentes hoc modo curavit. Post melissam sunt caryophylli & citrus, item rosmarinus. Imò ferè omnia aromatica & nervina conveniunt, quæ inter est etiam radix zedoariæ: item radix enulæ campanæ, uti & semen anethi atque dauci. Crocus etiam & ejus essentia, tam externè quàm internè commendari solet. Internè ejus essentia seu Ræ; externè, si fiat nodulus ex croco & camphora, & in regione scrobiculi cordis suspendatur; De ambra & moscho res nota est, quod insigniter reficiant cor, uti dicunt, id est, quod spiritus vitales & animales roborent: de qua tamen ambra notandum est, quod habeat vim inebriativam instar V, adeòq; tandem nonnihil stupefactivam: hinc nimio ejus usu pro juvenanda memoria quidam, imprimis senes, redditi sunt insipidi. In hac tamen cordis palpitatione vis hæc ambrae inebriativa minimè metuenda; nam, qui palpitatione cordis laborant difficillimè inebriantur. Facit ergò huc essentia ambrae & croci cum spiritu rosarum vel melissæ parata,  $\sim$  rosarum ambratus. De cinnamomo, ejusdemq; oleo, vid. Zwelferus, & Lindanus. De tinctur. solis cum oleo cinnamomi Mynsichtii; vel alia res nota est. Quæ vulgò communiter de R.  $\odot$ ari, item hujus extinctione in  $\nabla$  rosarum Burthius de *oculis* ad Bartholinum refert, menstruo potius quàm auro in acceptis referenda erunt. Conducunt etiam cortices aurantiorum, item citri. Notum est, quod multi insigniter commendent aquas destillatas & alia medicamenta ex corde, pulmonibus, epate, & aliis animalium partibus; quæ tamen, meo quidem judicio, sunt nullius pretii. Aqua verò composita ritè destillata, spiritus etiam & sal volatile cordis cervi, & imprimis R. coralliorum cum spiritu cordis cervi parata, egregia est, in specie in palpitatione cordis hypochondriaca,



driaca, & senili. Præterea spiritus & salia volatilia ex animalium partibus parata magni æstimantur, non quod hæc singulare quid obtineant præ spiritu & sale volatili sanguinis, sed quod à Practicis soleat observari prærogativa, hinc ~ & ⊖ volatile C. C. in specie, item sal volatile viperinum, erunt egregia. Ex baccis juniperi parata R seu essentia cum spiritu proprio, vel Malvaticum juniperinum Rolfincii in sua Chymia, & similia ex baccis juniperi parata, multum laudantur à Fonseca l. 1. Conf. 11. Quinta essentia seu elixyr vitæ Matthioli notum est, imprimis sale volatili viperarum acutum: Camphora etiam non solum internè ad aliquot grana remediis appropriatis permista, sed etiam externè, nunc cum nunc sine croco, in sacculo appensa; hinc spiritus theriacalis camphoratus, non minus quàm castoreum, à Ferdinando Hist. 79. aliisque quam plurimis in palpitatione cordis commendatur. Unde essentia castorei cum camphora ad palpitationem cordis insigniter, uti & essentia castorei cum essentia croci & ambræ mista, in paulò largiori dosi usurpata conferunt: unde castoreum, uti & camphora & crocus cum ~ ⊖is ammoniaci vinoso vel cum spiritu carminativo soluta, & in essentia formam redacta, per consensum hypochondriorum palpitantibus conveniunt, in quibus corallia, salia volatilia, & Martialia ritè præparata, in paroxylimo sunt optima. Insigniter etiam in palpitatione cordis hypochondriaca commendatur syrupus de limatura chalybis Mercati, cujus descriptionem vid. in Horstio l. 3. Observ. 6. Aliàs serum lactis in palpitatione cordis melancholica commendatur à Rhodio l. 2. Observ. 40. Succinum etiam huc facit, imprimis sal ejus volatile, & cum hoc paratus ~ C. C. succinatus nobilissimus: imò oleum destillatum succini ad gutt. iij. iv. l. v. in ∇ florum nymphæ seu florum aurantiorum, vel alia ∇ appropriatâ expertum fuit remedium Fosseæ Conf. 24. Huc etiam oleum pestilentielle Henisii pertinet ex oleo succini, citri, & camphora.

Ex hisce formulæ fiunt variz in palpitat. cordis:

- ℞. ∇ meliss. c. vino.  
 fenicul. a 3ij.  
 ~ theriac. campb. 3ß.  
 corall. r. præp. 3j.  
 syr. flor. tunic. 3vj. M.  
 ℞. ∇ cinnamom. cydon.  
 cordial. H. S. a 3j.  
 fl. samb. 3ij.  
 ~ C. C. c. ⊖e volat. acuat. vel carminat. de tribus 3j. ad 3ij.  
 syr. fenic. 3ß. M.  
 ℞. ∇ cinnam. cydoniat. 3j.  
 ~ cordial. H. S. 3ij. l. 3j.

Tom. II,

essent. bacc. junip. 3iß. l. 3ij.  
 croci 3j.

~ theriacal. campb. 3j.

℞. destillat. cinnam. l. succini pro mulieribus gutt. iv. M.

℞. R corall. c. ~ Cord. Cerv. 3ij.

essent. ambr. c. ~ u meliss. aut ros.

l. ~ rosar. ambrat. 3j.

M. S.

Seressârænde Essens.

Dentur pro dosi gutt. XXX. ad XL. in haustulo vini. ∇æ cinnam. temperatæ, vel simili haustu appropriato.

℞. testar. conchar. præp. l. corall. r. præp. cinnab. nat.

3ii diaphoret. l. l. dial. a gr. viij. ad 3ß.

℞. destillat. caryoph. gutt. j.

M. f. Pulvis:

cui etiam ⊖is volat. C. C. gr. iij. pro lubitu addi possunt.

A conformatione læsa si sit vitium, ferè incurabile malum erit, ac saltem per exactam dietam, & minimum animi & corporis motum, quantum possibile, sustentandi tales ægri.

Quod attinet externa, aquam carbunculi, ~, balsama & olea regioni cordis illinenda: interdum aliquid præstant, sed parum; saltem ~ reficiendo graviora symptomata inhibent; unde quilibet potest abundare suo sensu; si tamen vitium sit ex hypochondriis cum rugitibus & borborygmis intestinorum, speciatim ex affecto splene, aut ex passione hysterica natum, tunc in his casibus ad spasmos coercendos ea remedia quæ aliàs in hysterica passione, ex asa fætida v. g. & ex galbano usitata sunt, nempe emplastrum matricale de galbano cum oleo succini vel oleo spicæ malaxatum, vel abdomini, vel splenis regioni, & in specie huic emplastrum de Nicotiana, pro varietate symptomatum commodè applicari possunt.

## CAPUT II.

De

### Palpitatione Arteriarum Particulari.

PRÆTER cordis palpitationem subinde etiam particulares arteriarum palpitationes molestæ sunt ægris, ita ut modò in hac, modò in illa parte cum impetuosa vehementia arteria pulsant. Splenica interdum, interdum temporum arteria pulsat: quò facit exemplum Bartholini Cent. 1. Histor. 18. de Pulsu arteriarum carotidum, ut etiam strepitus & sonitus exinde possit audiri.

C A U S Æ.

Tres imprimis causæ sunt particularistalis pulsationis seu palpitationis tentus:

(C c c)

1. la-

1. Inflammatio ejusdem loci; exinde enim arteriæ tenduntur, & ex fibrarum aliquali contractura, dilatationi renituntur, unde semper dolor pulsatorius supervenit.
2. Est impedimentum quoddam in sanguinis circulo; hujus enim nonnihil in quadam parte sufflaminato transitu, distentâ nimis arteriâ, manifestum pulsationis sensum exhibent.
3. In specie hypochondriaci ex dicta causa pulsationem arteriarum percipiunt, nunc in toto corpore, nunc & in regione hypochondriorum aut lumborum infra costas nothas proximè, ubi nempe arteria cœliaca, & in specie insignior ejus ramus splenicus situs est. In his arteriæ tunica per consensum splenis aut partium vicinarum ad spasmodum seu convulsivum motum disponitur, unde rigidiores propter fibras sensibiliter pullant, cujus occasione sanguinis motus in particulari quadam arteria impeditur, utut non penitus tollatur; hinc enim est, quod paroxysmum eundem hypochondriacum, aut melancholicum, aut vomitum cruentum splenicorum subinde palpitantes tales in istis locis præcedere soleant. Præter hæc etiam taliter affecti sanguinem spissum ac crassum, & ob id difficulter mobilem habere solent: unde & varices in venis talium ægrorum observavit Bartholinus *Cent. 6. Observ. 24.* de pulsatione per universum corpus cum varicibus copiosis.

## C U R A.

Verùm taliter affecti optimè per Martialia curantur, cum ut plurimum ad malum hypochondriacum inclinare soleant, sicut priores duo modi imprimis per sudorifera.

## CAPUT III.

De

*Lipothymia, Syncope & Virium Prostratione.*

**P**ulsui cordis & hinc arteriarum nimio aucto oppositum est vitium pulsus parvus, rarus, debilis, myurus vel vermicularis, idque frequenter in imbecillitate ac languore virium plus minus intenso, hinc animi deliquis: de quibus optimè tractat Sylvius *l. 1. Prax. c. 34.* Languor hic aut imbecillitas partium, functionum & virium non solum à nativitate quibusdam contingit, sed etiam variis ex causis supervenit: atque est vel suc-

cessivus, qui vel ipsis morbis supervenit, vel eas antecedit, vel etiam post eos curatos subinde superest; non raræ enim sunt virium imbecillitates, quæ post morbos diuturnos observantur accedere: vel languor virium hic est subitaneus, cum ex improvise penitus prostratis viribus lipothymia seu lipopsychia, syncope aut asphyxia, ægrum corripunt. Cum hac virium imbecillitate semper conjunctus est pulsus tardus & minor: item pulsus debilis ac justo languidior, tunc præterea plerumque rarior quandoque, imò sæpius per intervalla certa aut incerta intermittens, interdum secundum arteriæ ductum magis magisque deficiens, qui tunc vocatur pulsus myurus; qui ubi fit minor, dicitur pulsus formicans seu vermicularis. Concurrit simul sensuum tam in-quàm externorum torpor, & deficiens plus minus corporis motus observari solet, quod in languore successivo saltem lassitudinis spontaneæ nomine, Germanis *die Mattigkeit*/appellari solet: in qua ægri conqueruntur de vigore corporis debito deficiente, sunt tardi admodum, membra ponderosiora videntur, & ad quaslibet actiones torpent.

Differunt saltem gradualiter, non essentialiter, lipothymia, syncope & asphyxia. In omni animi deliquio seu lipothymia, præter pulsus minorem & debiliorem plus minus, prout lipothymia est magis minusve periculosa seu gravis, simul sensus interni omnino obfuscantur, & motus animalis, tam voluntarius quàm etiam quodammodo naturalis, nonnihil deficit, adeo ut respiratio etiam aut nonnihil obscura aut fere nulla reddatur; quæ symptomata tamen omnia denuo evanescent, & æger in antiquum statum restituitur, nempe sanum. Quoad Syncopen: ita vocatur à *συνκρίω*, concido, quod ægri concidant; est gravior ac singularis animi deliquii species, & ab apoplexia parum differt. In hac enim atrociora hæc ad sunt symptomata: subito ac inopinato fere concidunt ægri, pulsus vix vel nullus observatur, sensus externi & interni abolentur, motus corporis est nullus, uti etiam nulla fere respiratio: interim ad sunt anxietates præcordiorum, sudor frigidus & glutinosus per poros erumpit, partesque corporis omnes frigent ac pallent: & in hoc differt syncope à lipothymia, in qua nequidem corporis universi frigus semper observatur, quamvis perpetuus sit syncopi: vid. Sylvius *l. 1. Prax. c. 34 §. 65.* Imò urinae & alvi excrementa interdum sponte effluunt, ita ut mortuis tales syncopizantes, quàm vivis existant similiore.

Syncopizantes vitam agunt mediam resurgentem, non descendentem. Ejusmodi vitam mediam resurgentem vivunt etiam insecta omnia per hyemem abscondita, cochleæ, ranæ, hircines forsitan & leucomoriæ populi

puli, de quibus Liber Baro de Herberstein, *Rerum Moscov. Comm.* p. 82. quod sint homines syncope detenti, & quasi mortui: vid. Kergerus *de Ferm. Sect.* 1. c. 6. pag. 59. Quomodo verò insecta ad vitam iterum perveniunt? vid. pag. 56. l. a.

Observatæ etiam interdum fuerunt syncope in morbis malignis, quæ sine anxietate fuerunt, quando neglexerunt vomitoria, imprimis qui his obnoxii fuerunt.

Omnia hæc sunt adhuc graviora in asphyxia, ita ut cum pulsu planè abolito & aliquandiu ad sensum cessante, ægri tales instar mortuorum jaceant.

In omnibus his affectibus, tam imbecillitate virium quàm etiam lipothymia speciebus, observetur, mutationem insignem, tam imminuentem quàm præsentem, cognosci ex pulsu & respiratione, ita ut pulsus plus minus deficiat in robore & magnitudine, nunc sit parvus, debilis, nunc magnus, interdumque planè nullus; quo cessante, cessant motus thoracis & respiratio. Cæterum sudor frigidus & glutinosus, in omnibus lipothymia speciebus plus minus observabilis, non est ordinarius & serofus sudor ex sanguine per poros cutis evaporans, sed est nihil aliud, quàm ipsum nutrimentum partis roridum, & spermaticum, quod sub syncope resolutum ac dissolutum ex partibus subcutaneis sub forma glutinosi ac frigidi sudoris erumpere & effluere solet. Unde & hic sudor singulares habet vires delendi verrucas excrescentiasque, item inflammationes hæmorrhoidum: de quibus vid. Helmontius.

#### C A U S Æ.

In sanguine remotè, & fundamentaliter, in spiritibus proximè, & quasi formaliter & effectivè, debilitas virium, tam successiva quàm repentina, investiganda erit. In sanguine quidem, quatenus hic minus aptus est, ut debita fermentatione volatilifari, ac in debitos spiritus exaltari possit: id quod fit, vel quatenus sanguis assumptus vel exhaustus est, vel quatenus idem deficit in sua acrimonia salina fermentativa, i. e. dum in sanguine deficit acrimonia salium, in specie inertia salis volatilis utinosi & oleosi seu bilis, disponit sanguinem, quò minus aptus sit ad spiritualcentiam suscipiendam; è contrà non rarò vitiosè peccat acidum, idque in subjecto subinde plus minus viscido radicum, quorum causæ antecedentes ex primis viis à chylosi vitia, & ejus perfectione in duodeno, à debili fermento bilis, unde cacochylia & cacochymia investigandæ erunt.

Spiritus verò repentinam inferunt virium prostrationem vel lipothymiam, quatenus vel deficiunt in cordis motione vel constri-

ctione, & regendæ corporis machinæ non sufficiunt, vel quatenus sunt minus mobiles, volatiles ac activi, sicque quasi obruti & compressi, vel quatenus sunt nimis mobiles, adeoque facilè dissipabiles, ita ut texturâ eorum luminosâ interruptâ intercant operationes vitales, adeoque ut omnis repentinæ virium debilitatis causa vel vitio spirituum vitalium in sanguine, vel vitio spirituum animalium in systemate nervoso contingat: Unde in omni virium imbecillitate pulsus notabiliter alteratus, in magnitudine quidem & parvitate vitium sanguinis & spiritus vitalis innuit, alteratus verò in robore majore vel minore, vitium spirituum animalium ostendit.

Successivus ergò virium languor ex sanguinis deficiente in præcordiis turgescencia oritur, unde etiam hujus respectu pulsus minores, rariores, & tardiores; sicut hinc dependentes spirituum animalium defectus, debiliores existunt: idque frequentissimè ex præternaturali sanguinis glutinositate aut visciditate, unde partes ejusdem salinæ activæ obrutæ minus concurrere inter se ac fermentare possunt; vid. Sylvius c. l. Quod si in hac sanguinis glutinositate, uti non rarò fit, peccet simul p. n. acidum, tam in sanguine quàm lymphæ, malum hoc evadit eo deterius, cum sic magis magisque inspissetur, ac tantum non coaguletur massa sanguinea, exindeque vitalis ejus fermentatio tantum non omnino aboleatur: hinc est, quod post morbos acutos, curatos, si tantillum, in diætâ peccarint ægri, speciatim in alimentorum assumptione excedant, languores adhuc superveniant: hinc post morbos chronicos non ritè curatos, in quibus spiritibus exhausta massa sanguinea spissior quasi ac crassa reddita fuit, virium languores sæpius sunt diuturni, quod nondum restitutus sit completè sanguinis motus vitalis; hinc & cachectici, hypochondriaci & scorbutici subinde sunt adeò imbecilles ex vitiosa & anomala sanguinis fermentatione, propter vitiosum & rancidum acidum in massa sanguinea tunc abundans, & massam sanguineam inspissans. Unde, quando horum sanguis nimium spissescit, minus expanduntur ventriculi cordis, pulsusque sic fiunt rariores, tardiores ac minores: quibus his positis necessarò etiam deficiunt spiritus vitales & animales, ex quorum defectu majore vel minore etiam reliquæ functiones plus minus solent imminui. Quare in virium imbecillitate sensus sunt hebetes: imò vix sufficientes aut motui voluntario, vel motui naturali, speciatim legitimo cordis motui; unde pulsus est tenuis & simul tremulus ac languidus, aut ubi sufficiunt quodammodo spiritus movendo cordi, ubi tamen a



gravioribus objectis in motu distrahuntur, vel perturbantur vel figuntur, uti fit ab opiatibus & narcoticis, tunc necesse sequitur talis virium prostratio & languor.

Hæc de virium imbecillitate satis clara. Subitanei verò languores seu lipothymia, radicatae sunt in spiritibus vitalibus aut animalibus, nunc conjunctim, nunc separatim, ita ut in suo circulo uno deficiente, alter labefactetur quoque. In vitalibus quidem, quando subito deficiunt, ob cessantem in præcordiis quacunque de causa sanguinis fermentationem vitalem. Hinc enim evacuationes quævis nimia per quæcunque loca, v.g. sanguinis, item geniturae, & similium humorum abundantes effusiones, cum absumantur spiritus vitales, sequitur lipothymia & syncope; sive sanguis reddatur per nares, sive per uterum, sive hæmorrhoides, venæsectionem, aut alio modo: item nimia aquarum hydropicarum evacuatio, puris contertum facta ex thorace emissio, nimius sudor &c. syncopen inducunt: uti etiam crebriores purgationes, balnea nimia aut diuturnior in his mora, ob dissipationem spirituum animalium subinde syncopes inferunt: mutatio item subitanea ex aere fervido in nimis frigidum, aut etiam ingurgitatio potus intense frigidi post insignem corporis incalcescentiam, lipothymias inducunt: exempla habet Schenckius *lib. 2. Observat.* 219. ex Benivenio *cap. 17.*

De venenis res nota est, quod eadem, sive extrinsecus applicata per morsum ac puncturam animalium venenatorum, sive intrinsecus assumpta quæcunque, graves ac periculosas dent lipothymias.

Pertinent huc vitia ipsius cordis, præsertim abscessus, & partium ei vicinarum, qui subito rupti dant periculosas syncopes: sic præter Tulpium *lib. 2. Observat. cap. 16.* qui habet lipothymiam ex abscessu in sinistra cordis auricula Sangez *in Observ. pag. 273.* refert de Bibliopola longo tempore lipothymia sæpè correpto, quò mortuò, maximum in corde apostema, mediam eius partem occupans, inventum fuit: *Alius Venetus*, refert idem, *in suo corde apostema dimidii ovi magnitudinis habuit, unde & hic ipse quoque subinde syncope correptus fuit.* Sanguinis quoque habenda est ratio, qui aut nimis parcus post copiosas excretiones, aut purè vitiatus, aut subito coagulatus, v.g. ex haustu frigida post æstum, aut alia quavis ratione inspissatus ac incrassatus, & ob id fermentationi ac spirituaescentia debita ineptus, aut in debito circulo impeditus v.g. in syncope cardiaca, funestam & periculosam lipothymiam & syncopen comitem ducit: Quod verò sanguine spissescente & coagulato in corde subito to-

tum corpus corruat, fit, quod non tam sanguinis circulus necessarius sit ad sustinendum totum corpus, sed imprimis, quod requiratur continuus radius spiritus vitalis ex corde cum sanguine in totum corpus: hinc sanguine in syncope ita in corde stagnante & non fermentante, adeoque deficiente plus minus ejus motu, tam locali quàm intestino, intercipitur simul necessariò spirituum animalium & vitalium commercium, hinc necessariò omnes facultates, & ægri mortuorum instar corruunt. A vermibus syncopen notant Zacutus Lusitanus *l. 2. Prax. Admir. Observat.* 40. Bonettus *l. 1. Medic. Septent. S. 16. cap. 4.* Schenckius *lib. 3. Observation.* 218. Panarollus *Pent. 4. Observat.* 29. Spiritus verò animales lipothymias inferunt, quando subito deficiunt ex eorum ataxia & confusione, ab objectis externis inducta: unde omnes causæ remotæ ad syncopen disponunt, afficiendo vel spiritus vitales, vel fermentationem sanguinis impediendo, vel spiritus animales in ipsis sensoriis; ita quidem, ut in genere vel iidem oppressi & quasi concentrati in sua activitate impediuntur, ceu fit in syncope ab externis orta, v.g. in subitaneo terrore, vel iidem dissipati & subito resoluti evanescant quasi, ac ita in operando deficiant, v.g. in nimio gaudio. Pertinet ergo huc, quod ab odoribus fortibus, gravibus, ingratis & similibus, ægri in lipothymiam & syncopen incidunt: Sic refert Amatus Lusitanus *Cent. 2. Observat. Curat.* 36. de Monacho, qui ab odore, imò vel solo aspectu rosæ in gravem lipothymiam incidit: Funestius exemplum est, quod habet Hæserus *in Herc. Medic. pag. 311.* de puerpera, quæ noviter pepererat, & ex odore strophili, in quo involuta fuerunt rosæ, subito lipothymia lethali fuit correpta. Hinc est, quod sceminae hystericae ex odore zibethi, molchi, cinnamomi, &c. cum passione hysterica seu hypochondriaca simul in syncopen corruant. Nec solus odor, sed sæpius etiam præsentia rei horridæ, infert lipothymiam ac syncopen.

Pertinet huc idiosyncrasia nativa, secundum quam quidam certa animalia horrent, eorumque præsentiam ferre nequeunt, quin subito patiantur lipothymias.

De animi affectibus, vel fortioribus vel magis subitaneis, in terrore subitaneo & gravi tristitia, nuncio insperato, iracundia nimia, &c. res nota est, utpote quæ immediate systema nervosum ac spiritus animales afficiendo, & insigniter perturbando, inferunt syncopes & lipothymias: Ita de gaudio subitaneo, quo evanuerunt quasi spiritus animales, syncopen lethalem obortam, præter Livium, Lotichius *in Observat. Medicis,* & Mar-

& Marcellus Donatus in *Histor. Mirab.* habent: ex timore obortam syncopen Fontanus in *Conf. & Resp.* pag. 63. Imò sola fortior ac intensior rei cuiusdam horrendæ imaginatio & cogitatio quosdam syncopticos reddidit: exemplum habet Hildanus *Cent. 1. Epist. 34.* ubi refert de suo servo equo insidente, cui cum narrasset calamitosas strages bellicas, ex sola narratione in syncopen incidisse. Nimiùs corporis motus, ac extrema defatigatio, similiter interdum in lipothymias inducit ægros; uti etiam graviores dolores, in iis præsertim, qui sunt rarioris texturæ: adeoque spiritus rariores & faciliùs dissipabiles habent.

Denique epilepticis paroxysmis subinde superveniens symptoma est syncope, uti etiam aliis affectibus convulsivis gravioribus: sive convellantur saltem partes internæ, quæ dicitur à mulierculis *die schwache Noth im Leibe*; uti v. g. fit in passionibus hysteris, aut in doloribus nephriticis subinde gravioribus: sive simul etiam externæ partes afficiantur, quæ spirituum animalium perturbatissimum innuunt motum. Plura de causis proximis & remotis languoris virium & syncopes videb. in Sylvii *Praxi cap. 34.*

Imprimis sui considerationem meretur syncope stomachica, quæ ex causa interna oritur, & spontè quasi subinde ægros frequentissimè invadere videtur, de qua vid. Gorræus in *Defin. Medic. pag. 157.* Hæc ordinatio solet habere causam affectionem orificii ventriculi superioris, quo malè affecto, ab objecto ipsi inimico ex consensu ejus cum universo systemate nervoso syncopes supervenire solent. Manifestum hoc est non solum in mulieribus hysteris; sed & in viris, qui aliquid hypochondriaci patiuntur; his enim levi occasione lipothymia superveniunt, sub quorum insultu ordinatio dicunt: *Es kommt allmählig ans Herze / und wird weichlich vorne ums Herze*;

Ex lacte coagulato lipothymiam observavit Henricus ab Heer *Observat. 15.* Ex esu fungorum syncopen Zacutus Lusitanus *lib. 5. Med. Princ. Histor. 23.* Amatus Lusitanus *Cent. 1. Curat. 39.* Acres succi, præsertim æruginosi, orificium dictum graviùs infestantes, præter anxietates, crebras lipothymias, præsertim in subjectis tenerioris & rarioris texturæ, inferunt.

Uti frequens est hæc syncope stomachica, ita etiam nunc per essentiam ex contentis stomachi, nunc per consensum affectis partibus, aut nerveis abdominis, stomachum simul plus minus afficientibus,

accidere solet. Imò vix lipothymia quæquam corripit, quin sub eadem imminente alterationem quandam notabilem, vix etiam explicabilem, circa stomachi regionem percipiat, in quo stomachus vel mucoso humore, vel aliis vitiosis succis, per pylorum ad orificium superius regurgitantibus, eidemque impactis laborer.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa syncopes & debilitatis virium: per se manifesta sunt factis. Causæ tantummodò probè distinguendæ. Meliùs autem has non potest quis percipere, nisi ex adstantium relatione & circumstantiis.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Distinctio facienda subitanei & successivi virium languoris, ac quidem in iis, qui sine causa manifesta sunt languidi, ac decrementum virium patiuntur, in morbos inclinant, in specie adscobutica mala.

Reconvalescentes, præsertim à morbis gravibus acutis, diu adhuc languidi, vel recidivam, vel cachexiam, & tandem hydroperem vel febres intermittentes, in specie tertianam intermittentem incurrunt.

In morbi cujuscunque principio præter manifestas causas mox summa virium proveniens prostratio maligni morbi signum est, adeoque morbus talis febris maligna appellari solet.

Syncope & lipothymia quæcunque est periculosa, plus minus tamen, prout magis vel minùs aut est durabilis, aut deficit cordis motus: item prout causæ antecedentes graviores vel leviores fuerint. Unde quando syncopizantes post exhibitionem spirituosorum aut aliarum rerum volatiliùm, item post irrorationem faucium cum liquoribus spirituosis & fortiter odoratis & stimulantibus, aut faciei cum  $\nabla$  frigida, non resuscitantur, nec post ptarmica etiam ad se redeunt, in talibus signum est gravissimæ, & ob id periculosissimæ syncopes.

Syncope ex affecto stomachi orificio sinistro minus funesta est.

Si adsunt anxietates præcordiorum & inquietudines, omnes sunt ex stomacho.

Syncope, quæ est ex effusione sanguinis, genituræ, aut aliorum humorum quorumcunque minùs periculosa est eâ, quæ oritur à causa interna, & non rarò abdita.

Quò magis affligitur massa sanguinea, eò periculosior est syncope: hinc post purgationes, venæsectiones nimias, ut & hæmorrhoides, solet esse funesta.

(Ccc 3)

Tan-

Tandem sudor frigidus syncopizantibus superveniens, quò magis glutinosus & copiosior, cò gravior & periculosior syncope est.

## C U R A.

Quoad Curam: In languore virium successivo seu paulatino omnia ea conveniunt, quæ vitalem sanguinis fermentationem & spiritualescentiam promovere, bilem plùs minùs peccantem acuere, & ita sanguinis glutinositatem attenuare, simulque vim stomachi digestivam suo modo restaurare valent: id quod uno nomine faciunt volatilia & aromatica, diutius continuanda. Aromatica enim sunt stomacho amica, acuunt bilem, & sanguinem ad volatilem naturam & spiritualescentiam promovent. Pertinet ergò huc  $\Psi$  & vina generosa, imprimis clareta seu vina Hippocratica dicta, vel ex vegetabilibus aromatibus ordinentur talia vina medicamentosa, quæ subinde hausta vires ac sensus reparant, & similia alia analeptica recentia.

*℞. HB. rorismar.  
menth. crisp. ā M. j.  
salvia,  
melissa ā Mß.  
rad. acori veri,  
enula,  
faniculi ā ʒj.  
sem. 4. calid. min. ā ʒj.  
cinnam.  
cubebar.  
caryoph.  
macis ā ʒij.*

Incisa & contusa includantur sacco.

D. S.

*Püschel zum stärkenden Kräuter-Wein.*

Affundatur vinum, de quo subinde hauriat ager jejunos, item omni pasto, poculum: Quoniam vinum imbibit successivè vires simplicium aromaticas, & vires ex morbo vel etiam senio prostratas restaurat: Vid. Sylvius l. 1. Prax. cap. 34 pag. 613. & sequ.

Quod si adsit malum scorbuticum vel hypochondriacum, volatilia acria, ut cochlearia, nasturtium, armoracia, piperitis, &c. commodè possunt addi; ac ut melius operentur, singulo haustui certa dosi ~ cuiusdam volatilis, v.g. Spiritus  $\Theta$   $\times$ ci anisati guttæ aliquot, instillari poterunt.

Item essentia & elixyria stomachica, aquæ vitæ, apoplecticæ, epilepticæ, &c. salia volatilia oleosa, elixyr proprietatis sine acido, & sexcenta talia, locum inveniunt, ter quotidie usurpando, manè, à meridie, & sub introitu lecti: quin imò non inconsultum videtur, etiam sub ipso pasto talibus uti.

Quod verò attinet syncopen & lipothymiam subitanæ: in hujus paroxysmo opera danda est, ut ægri quasi revocentur in vitam. Extra paroxysmum autem recidiva præcavenda.

In paroxysmo ad revocandum ægrum ordinariò generosiora paulò & spirituosiora remedia quò magis talia, cò meliora, quæ nempe penetrant, & volatili spirituositate spiritibus deficientibus facillè applicabilia sunt, simulque sensuum organa, fortius vellicando spiritus animales, aliquantulum resuscitant activosque reddunt, & eorum in motu ataxias restitunt. Et quidem penetrantia salina volatilia alcalina vel acida primatum obtinent, habitâ tamen semper ratione causarum præcedentium: Illa, ubi spiritus quasi obruti concentrantur, & à debitis expansionibus impediuntur, ut  $\sim \Theta$ is  $\times$ ci, liquor C. C. succinatus, &c. Hæc, ubi iidem facillè dissipantur & exsolvantur: hinc e.g. in lipothymia ex purgatione nimia, in syncope ex venæsectione, ex vomitu, balneo, æstu nimio, corporis motu, &c. contracta, haustus vini Rhenani, & acetum forte, liliorum convallium, calendulatum, &c. ori infusa, aut naribus admota, sunt admodum convenientia. Accedunt etiam his spirituosæ volatilia oleosa, & salia volatilia oleosa: quæ tamen cautè usurpentur, quia non omnia subjecta promiscuè talia ferre possunt.

Remedia ergo ad 3. classes revocari possunt:

I. Spirituosæ sulphureæ seu oleosæ, quò pertinent omnes spiritus inflammabiles aromatici per fermentationem parati, olea aromatica destillata, tam simplicia, quam aquæ apoplecticæ compositæ, plus minùs suaviter olentia. Quoad hoc punctum tamen cautè nonnihil usurpentur; cum non solum mulieres omnes talia spirituosæ oleosæ, fumosa ineptè vulgò dicta, quòd caput replere putentur, commodè perferre nequeant, sed etiam mares plures, præsertim literati, aut lucubrationibus dediti, propter rariorem ac subtiliorem spirituum texturam fortius odorifera, sive suaviter sive malè illa oleant, non commodè ferant; cum talia nimis spiritus vel sanguinem afficiant, unde vel cephalalgiam vel capitis gravitatem quasi ebriosam inde contrahunt.

II. Spirituosæ alcalina, spiritus volatiles acres urinosi, & omnia  $\Theta$ ia volatilia, cò præstantiora, quò magis oleosa prius redita fuerint.

III. Acida volatilia acria, in specie acetum, quæ partim sensuum organa potenter afficiunt, partim spiritus dissipabiles, ne nimis exsolvantur, præcavent.

In



In horum tamen omnium usu sedulò ratio causarum antecedentium habenda est : sic enim, ubi syncope erit, v. g. ex veneno, appropriata alexipharmaca addenda erunt, in quo casu itidem convenit vomitus, ubi venenū in primis viis adhuc latuerit. Ubi est ex passione hysterica aut uterina, appropriata hysterica, v. g. zedoaria, castoreata, omnia salia volatilia, spiritus cornu cervi succinatus, spiritus melissæ, carminativus de tribus, & his \*ci, Q. E. Matthioli, præsertim cum castorinis, si ferre queat æger, cum ▽ appropriata, e. g. artemisiæ propinentur; aut etiam opiatas additis malum præcaveatur: uti etiam tunc naribus admoventur appropriata; ut plurimum quidem naribus in syncope hysterica fœtida ex castoreo & asa fœtida, fumus sulphuris, pennarum accensarum, &c.

Imo in syncope vitio stomachi & orificii sinistri, aut etiam abdominis orta, vomitus interdum tutò potest provocari, si nempe adsint indicationes excrementorum evacuandorum; cum & hunc motu spontaneo ortum conduxisse observaverim: sic Forestus lib. 17. observ. 7. refert syncopen ex utero ex defectu mensium, afflicto simul stomacho, per vomitum curatam: Faber Curat. 86. refert syncopen desperatam, per vomitum cum ▽ cinnamomi curatam, confert ergò vomitus maturè adhibitus in syncope stomachica, ac ubi fomes mali circa primas vias hæret, præsertim ubi nausea & similia symptomata urgent: in casu, quò non tam resoluti quàm oppressi aut inordinate agitati spiritus videntur, excitat quoque tales ægros vomendi conatus, ac quasi in vitam revocat: & licet adstantibus terribilis videatur, Medicus tamen hoc in casu se nec timidum nec tumidum exhibeat: non illud, ne morâ inconsideratâ ægrum pessundet; non hoc, ne ægrum spiritus evomere cogat.

Hoc ipso vomitionis actu, ne animo delinquant, odores penetrantes, imprimis vini generosi, naribus admovendi. Quod si vomitus non æquè tutus videatur, clyσμα paulò acrius injicere non verabit; & propinentur præcipitantia ita dicta, quæ figendo effervescentiam humorum sistunt; quibus tamen adjungantur aromatica. Hinc corallia, magisterium coralliorum cum succo citri paratum, lapis bezoar, ebur præparatum cum vel sine Δe, additis aliquot guttis olei cujusdam destillati, vel succini, vel anisi, vel cinnamomi. His enim syncope imminens præcavetur, donec opportunè saburra vitiosa ex primis viis exacuari possit.

IV. Adduntur his opiata mediocri dosi, in scopo nempe ultimo suprâ memorato, spirituum nempe aut dissipabiliorum, aut in imperus convulsivos proniorum; subinde e-

nim fit, ut ex irrequieto nimis spirituum animalium motu, indeque ortis deliriis, aut agrypniis, aut etiam motibus convulsivis, ingens virium immineat prostratio. In tali calu ex opio ritè parata remedia sunt divina auxilia, si appropriatis aliis remediis misceantur.

Quæ ergò conveniunt in syncope resectiva & analeptica dicta, præ cæteris sunt primariò vinum generosum, cinnamomum, ▽ & ♂ destillatum ejus, ac omnia ex eo parata, in specie ejus oleum: vid. Helmontius de Potest. Medic. aquæ spirituosæ, v. g. aquæ apoplecticæ quælibet, spiritus liliorum convallium per fermentationem paratus, ~theriacalis, tam simplex quàm compositus, ♂ destillatum caryophyllorum; item balsama apoplectica & cordialia; item salia volatilia quæcunque, ~cordis cervi, liquor cornu cervi succinatus; nam succinum, sal volatile & oleum destillatum succini, aliquot guttularum vel granorum pondere exhibitum, admodum potenter roborat syncopticos, imprimis simul concurrentibus insultibus epilepticis, aut hystericis, spiritus rosarum per se est egregium resectivum item spiritus rosarum ambratus. Ambra enim, & omnia ex eadem parata remedia, summum sunt restaurativum spirituum animalium: unde non tantummodo usurpantes in Venerem armat, sed præterea quoque senibus decrepitis moderato usu mirè conducit: unde confectio alchermes, quàm ingreditur ambra, potenter reficit, imprimis si aliquot guttæ olei destillati cinnamomi addantur: item essentia ambra cum ~u rosarum, aut, quod melius, cum spiritu melissæ parata ad guttas viij. vel x. in ▽ melissæ exhibita; cui tamen præfero spiritum rosarum ambratum. Quod si his sal viperarum aut succini probè depuratum addatur, vix relinquet Medicum & ægrum. In specie Rudolphi II. Imperatoris constantissimum medicamentum cephalico-cordiacum ipsi ab Elisabetha, Angliæ Regina, communicatum fuit ex ambra, moscho & zibetho: affudit spiritum rosarum, vitrum sigillavit hermeticè, quod æstivo tempore in terra foditur.

Præterea quoque citrus, elixyr citri, vel ~citri acuat. Se volatili C. C. in aqua appropriata exhibita similiter conveniunt: in specie Q. E. melissæ, angelicæ. Quibus notæ sunt encheireses chymicæ parandi ex vino oleum seu Q. E. vini, cujus minutissima gutta linguæ admota totum corpus quasi fulmine penetrat, & est sal volatile subtilissimum vini in oleiforme corpus concentratum, ii habebunt melius levamen in syncope. Essentia cordialis D. Michaelis ex vegetabilibus spiritualibus cum ~cordis cervi est egregia. Essentia croci, rectè Paracello dicta sum-

ma

ma cordis lætitia, insigniter laudatur. Paratur hæc essentia croci per aquam vitis, mense Martio ex pampinis incisis destillantem, vel etiam cum spiritu appropriato melissæ, aut rosarum parata est efficacior: huic essentia, si gr. j. vel alterum salis volatilis addatur, fit medicina præstantissima. R seu essentia castorei, speciatim in syncope hysterica & hypochondriaca, convenit. R coralliorum cum  $\sim$ u cordis cervi parata est elegans, imprimis post sanguinis, aut alius utilis succi excretionem, unde etiam puerperis post partum exhibetur pro reparandis viribus. R etiam solares, e.g. R  $\odot$ is cum oleo cinnamomi, tam Mynsichtii in *Armamentario*, quam etiam D. Ganzlandi, egregia sunt. Inter salia volatilia imprimis spiritus salis ammoniaci benè rectificatus, coniunctus cum  $\Psi$  rectificatissimo aromatico, & sic oleosus factus, dat  $\Theta$  volatile oleosum admodum elegans in syncope, aut virium subita prostratione. Fuit Medicus, qui frigidus, & calore nativo jam quodammodo destitutos, haustulo elixyris vitæ Matthioli, in quo grana aliquot  $\Theta$ is volatilis viperarum dissoluta fuerit, se recreaturum confidat: vid. Sachsus in *Ampelographia* pag. 511.

In genere vehicula horum remediorum sunt aqua melissæ cum vino, aqua pulegii, cinnamomi, simplicis vel cydoniatæ, aqua vitæ sive Q.E. aut ut alii vocant, elixyr vitæ Matthioli, item  $\nabla$  cordialis *Herc. Saxon.*  $\nabla$  carbunculi,  $\nabla$  cordis cervi,  $\nabla$  vitæ alba Dresden-  
sium,  $\nabla$  cordialis calida Mynsichtii, in mulieribus  $\nabla$  hyrundinum cum castoreo, &c. quibus etiam camphora, spiritus theriacalis camphoratus, & similia, pro meliori stimulo commodè addi possunt.

Quoad acida: spirituosum ac generosum vinum, succus citri, succus aut syrupus rubi idæi, conserva pulpæ citri cum electuario diascordii, acetum simplex vel acetum bezoardicum, florum calendulæ, liliorum convallium, florum tunicæ, sambuci, caryophyllatum, rutaceum, &c. in aceto infusum castoreum, &c. usurpari possunt. Hæferus externè commendat olfactum panis recentis, cujus odorem omnibus aquis perlatis longè præfert Beccherus. Regioni cordis admoveat Hartmannus sacculos ex melissa, irroratos cum spiritu vini.

Quoad opiata denique: præter laudanum opiatum Helmontii, ex opio cum succo cydoniorum fermentando paratum, in parva dosi, theriaca, Mithridatium, extractum theriacale, aut his cognatæ compositiones, administrari possunt: v. g.

R.  $\nabla$  meliss. c. vin.  $\mathfrak{z}$ ij.  
Q. essent. Matthioli  $\mathfrak{z}$ ij.  
confect. al-cher.  $\mathfrak{z}$ j.  
Syr. fl. tunica  $\mathfrak{z}$ vj. M.

R.  $\nabla$  cordial. H. S.  
cinnam. borrag.  
meliss. c. vino  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\sim$  theriac. simpl.  $\mathfrak{z}$ ss.  
elixyr. l. succ. citri  $\mathfrak{z}$ vj.  
essent. ambra  $\mathfrak{z}$ j.  
syr. decort. citri  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
R.  $\nabla$  rubi idæi  $\mathfrak{z}$ ij.  
cordial. H. S.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\sim$  lil. convall.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\Theta$ is  $\mathfrak{x}$ ci  $\mathfrak{z}$ j.  
syr. borrag.  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
R.  $\nabla$  meliss. vel rosar.  
fenic.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$ ss.  
liqu. C. C. succin.  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ ss.  
syr. fenic.  $\mathfrak{z}$ ij. M.  
R.  $\nabla$  rubi idæi  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\dagger$  si theriac.  $\mathfrak{z}$ ij. ad  $\mathfrak{z}$ ss.  
 $\sim$  citri  $\mathfrak{z}$ j.  
syr. rubi idæi  $\mathfrak{z}$ ss. M.  
R.  $\nabla$  fl. samb.  
borrag.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$ ij.  
succ. citri rec.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\sim$  rosar.  $\mathfrak{z}$ ij.  
syr. rubi idæi  $\mathfrak{z}$ ss. M.

Quoad externa, naribus, temporibus, pulsibus, labiis, & scrobiculo cordis affricanda: sunt ferè similia, spirituosas,  $\nabla$  carbunculi, liliorum convallium, balsamus apoplecticus, &c. & carbunculi, cinnamomi, citri, &c. Præteris utile est  $\odot$  succini, caryophyllorum & similia. Item admoventur naribus  $\sim$   $\Theta$ is  $\mathfrak{x}$ ci, aut similis acrior, acetum vini, florum tunicæ, ac similia naribus adhibentur. Succinum solum sub forma suffitus, naribus excipiendi, adhibetur à Rulando.

In specie etiam syncope & lipothymia ex evacuationibus quibusvis, speciatim nimis purgationibus, imprimis conveniunt acida quæcunq; in specie succus cydoniorum, theriaca in  $\nabla$  cinnamomi usurpata, item extractum theriacale in  $\nabla$  cinnamomi, & mixtura ex  $\nabla$  menthæ,  $\sim$ u theriacali simplici & camphorato, & confectio alchermes: aut  $\nabla$  cinnamomi, in qua theriaca & confectio alchermes fuit soluta, conveniunt: Spiritus vini rectificatus cum ambra & moscho aromatizatus commendatur imprimis à Fabri in *Pathologia*.

In syncope ex nimio sudore, æstu, labore, exercitationibus, iracundia, gaudio nimio, aut odoribus ingratis, conducunt acida, acetum, succus citri, vinum, succi vegetabilium, aut julepi aciduli, elixyr citri acidulatum.

Vel  
R. Conf. acetosell.  
pulp. citri  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$ j.  
fl. tunica  $\mathfrak{z}$ ss.  
rob. ribium  $\mathfrak{z}$ vj.  
confect. al-cher.  $\mathfrak{z}$ ss.

syr.

*fyr. acetos. citri, vel rubi Idai q. l.*

M. D. S.

**Hergstärkender Zucker.**

Imprimis contra alterationem ab ira, præmisso, si opus sit, vomitorio, in specie sin post iracundiam alimentorum facta sit assumptio, convenit mixtura Sylvii *Prax. l. I. c. 28. §. 22.* item in metu febris ardentis malignæ ex nimia ira, hinc forti motione, & potu, aliquando præscripti:

*℞. ebor. f. Δe gr. xv.*

*specif. cephal. ℞.*

*camph. gr. ij.*

M. D. S.

**Herg-und Haupt-stärkendes Pulver.**

Vespert accipiebatur.

In syncope febrium malignarum, ex irrequieto nimis spirituum animalium motu, indeque ortis deliriis, aut agrypniis, aut etiam motibus convulsivis, camphora in pauca quantitate cum laudano opiato conjuncta, & aliis appropriatis addita, spiritus animales nonnihil figit, & ad debitum motum redigit; quò pertinet & syncope ex fumo gas narcotico, e. g. opii, liquorum effervescentium, carbonum, &c. orta, quo casu acetum castoreo imprægnatum præprimis pollebit.

In syncope ex terrore, nimis hæmorrhagiis, tristitia nimia, &c. cinnamomum, spirituosâ oleosa, V, ▽ vitæ, aqua carbunculi cum salibus volatilibus, ut ~ C. C. &c. acuata, in specie salia volatilia oleosa, conducunt. Eriam graviore in syncope venam aperire, & aliquantulum sanguinis detractio liberum motum huic conciliare, non inconsultum est: Nam non semper syncopticis nocet sanguinis detractio: id quod confirmat Zacutus Lusitanus *l. I. Prax. Admir. Observat. 135.* ex mentium nempe suppressione syncope gravis venæ saphenæ sectione curata: Conf. Sylvius *l. 3. Prax. cap. 3. §. 288. & cap. 10. §. 69.* Contra mœrorem, subitaneum terrorem, &c. confert mixtura Sylvii *Prax. l. I. c. 28. §. 24.* item

*℞. ▽ fl. samb.*

*ceras. nigr. à ℥i℥.*

*lil. convall. c. vino ℥j.*

*ebor. f. Δe ℥℥.*

*⊖ volat. C. C. ℞.*

*fyr. card. bened. 3vj.*

M. D. S.

**Herg-stärkendes Tränckl. auff etliche mal.**

Quod si ex nimia sanguinis excretionē, v. g. humio mensium fluxu, syncope imminet, opiata v. g. acidis sociata sunt optima, additis coralliis præparatis.

In syncope cum epilepsia, passione hysterica, &c. juncta, conveniunt imprimis salia volatilia, uti jam dictum.

In syncope ab apoplexia prodest ~ cornu cervi.

Si syncope sit ex venæsectione, ut in hæmophobis, &c. acida proderunt; imponatur æger supinus pavimento, ac sale communi affricentur ejus labia & lingua; vel granula quædam ori imponantur; & pro præcavenda eadem ante venæsectionem capiatur ovum sorbile, vel haustus vini aromatici, vel jusculum, & hinc in dorso cubantibus vena aperiatur. Loco salis communis aut aliorum remediorum, suadente Hildano, urina humana vel bovina utiliter usurpatur; ita enim restitui hoc in palli agros expertus fuit; vel acetum applicetur naribus, & affricetur linguæ.

Ista & similia, interna pariter & externa, usurpari possunt.

Ad syncopen senum, imprimis ad lipothymiam & virium imbecillitatem ex defectu spirituum sedibus obviam, Timæus habet egregiam misturam sub forma opiata:

*Vel ℞. ambra gris. l. moschi gr. viij. l. viij.*  
solve in

*℞. Stat. cinnam. gutt. xj.*

*cardam. gutt. viij. ix. ad ℞.*

*margar. præp. ℞.*

*sacch. candi albiss. ℥j. ad ℥ij. M.*

*℞. conserv. flor. anthos,*

*tunica,*

*salvia, ʒ ℥.*

*confect. al-chem. 3j.*

*ambr. gryf. gr. v.*

*mosch. gr. iij.*

*laud. opiati gr. ij.*

*c. fyr. flor. tunica f. Electuarium,*

irroretur c. aliquot guttis ♂. Stat. cinnam. M.

In lassitudine pedum, wenn man müde ist.

*℞. fol. vitis,*

*salicis,*

*nymph. ʒ Mij.*

*cap. papav. c. sem. no. viij.*

Incis. D. S.

Species zum Fußbade.

Decoqu. in ▽ simplici.



## S E C T I O XVII.

D E

## NUTRITIONE LÆSA.

**S**anguis ex sinistro cordis ventriculo distribuitur ad omnes partes, ut easdem nutriat. Hæc nutritio tribus læditur modis: (1.) Quando deficit, in atrophiam, tabe, &c. (2.) Quando augetur, in corpulentia nimia. (3.) Quando depravatur, in cachexia, anasarca, ictero, &c.

## CAPUT I.

De

*Nutritio Partium  
Læsa.*

## TITULUS I.

De

*Atrophia, Tabe, & Macie.*

**A**trophia, tabes & macies, sunt deficiens nutritio, non tantum quando corpus non nutritur amplius, sed præterea plus minus hæc ipsa etiam deficit: & quidem imminuitur nutritio manifestè ratione carnis musculosæ, & ratione pinguedinis, non item ratione cartilaginum, ossium aut parenchymatum membranarum ac fibrosarum partium. Hæc enim non absumuntur, ut ut subinde plus minus exsiccentur & arefcant; adeoque habitus carnosus & pinguedinis absumptio in genere atrophiam, das Abnehmen/constituit. Et quidem pinguedo sola deficiens vocatur macies; quando verò caro simul, ipsæ nempe partes roridæ musculosæ absumuntur, nec restituntur, tabes, die Schwindsucht/appellari solet.

Atrophia ista in genere nunc est universalis, eaque frequentior, quando totum corpus non nutritur, sed successivè contabescit; nunc est particularis, eaque rarior, quæ unum alterumvè tantum membrum ac viscus internum plus minus occupat: sic enim nunc pulmones flaccidi, nunc lien corrugatus & tabidus observatus est, pariter sicut nunc manus altera, nunc pes in atrophiam incidit; quod ipsum vitium in specie aridura, die Glied-schwundung/dicitur.

C A U S A E.

In genere causa atrophiae universalis est in efficiente, vel in objecto: efficiens sunt spiritus animales influi, qui cum spiritu insito confermentati nutritionem efficiunt; undecun-

que verò deficientes atrophiam inferunt: Objectum, seu id, quod nutrit, sunt alimenta, quorum vel defectus in massa sanguinea, vel vitium, imprimis viscositas seu corruptio, nutritioni inepta, existit.

Quoad spirituum animalium defectum: sunt, quando vel non generantur in abundantia, vel geniti absumuntur in motionibus corporis aut animi. Non generantur, ex sanguinis variis vitiis, quæ ex vitiis cerebri aut in textura, seu, ut aliàs vocant, temperatura, aut conformatione læsa scaturiunt. Absumuntur in iis, qui fortius aut crebrius laborant; hinc rarò crassi aut obesi sunt rustici; item qui crebrius Veneri indulgent, unde ex parte tabes dorsalis; item qui indulgent intensioribus meditationibus, hinc literati frequentius macilenti, non secus ac qui mœrore aut tristitiâ diuturnâ sunt affecti, ut quando virgo ob amassii discessum tabe perit, ex observ. Panarolli *Pent. 5. Observat. 18.*

Quoad nutrimenti vitium: deficit nutritio,

1. Quando non generatur alimentum in stomacho, v.g. in inedia, vel coacta vel voluntaria; aut etiam, quando alimenta parum nutriencia aut vitiosa assumuntur, uti fit in picantibus, carbones, cretam, &c. comedentibus.

2. Quando chylus genitus quidem, non tamen distribuitur usque ad sanguinem; idque vel vitio vasorum lacteorum in intestina hiantium obstructorum, v.g. in passione cæliaca, quam supra habuimus; vel vitio pylori à tumore scirrroso obstructi, ut annotarunt Salmuth. *Cent. 1. Observ. 20. & Hechstedterus Dec. 5. Obs. 3. 26. & 28.* vel vitio glandularum mesenterii obstructorum, hinc insigniter tumefactarum, ac tandem scirrhorum, & plus minus strumolarum chylo transitum non concedentium; unde necessariò corpus emaciatur. Exempla hujus non sunt pauca: Sic Hildanus *Cent. 1. Observ. 7.* curavit puellam tabescentem appetitu minimè privatam, idque ex mesenterii vitio, tumoribus scirrhis & strumosis multum referto: & Horstius *lib. 2. Observ. 5.* similiter exemplum habet atrophiae ex obstructione glandularum mesenterii. Facit huc etiam, quod refert Bonnius *de Medic. Indorum c. 12.* quod nempe atrophia seu extabescencia Indis regionibus quoque familiaris & epidemica sit quasi, idque ex vitio mesenterii, nempe ejus abscessibus

cor-

corruptis: nec tabes adeò decantata in Anglia aliunde habet originem, quam ex mesenterii glandulis scirrhis & strumosis: id quod anatome taliter affectorum confirmat, utut Garenzier in *Tractatu de Tabè Anglica* aliam suggerat originem. Infantulis imprimis & junioribus satis frequens est atrophia ex hac causa, nempe vitio mesenterii: vid. Sylvius *lib. 1. Prax. cap. 14. §. 56.* Horstius *lib. 4. observat. 24.* Hildanus *Cent. 1. observ. 70. & Cent. 2. observ. 44.* Sennertus *lib. 3. Prax. Part. 5. Sect. 1. cap. 3.* Panarollus *Pentec. 5. observ. 19.* & Barbette in *Prax. Part. 3. cap. 2. item in Anat. Pract. Part. 1. cap. 14. pag. 87.* Sicut etiam maciem à receptaculi lumbaris, & ductus thoracici angustia & compressione, testantur Fernellius *lib. 5. Patbol. cap. 11.* & Bartholinus de *Lacteis thorac. cap. 14.* Quò etiam pertinent lumbrici chylum in intestinis consumentes; item quando cum vel sine sanguine chylus extravasatur aut consumitur, uti v. g. in vulneribus ac ulceribus majoribus lactatione nimia & diuturna; nec non de mictione chylota, qualem Dravvizi *Tract. scorbuti Sect. 9.* & Timæus von Guldenslee *lib. 3. Consil. 43.* annotarunt.

3. Deficit nutritio, quando chylus, licet sanguini permixtus, & plus minus assimilatus, nimis tamen eò evacuatur: quò pertinet nimia quæcunque sanguinis effusio, sive fiat per nares, sive fiat per uterum, sive, quod sæpius fit, per hæmorrhoides, sive per nimias venæsectiones: nam tales sanguinis evacuationes & excretiones multum depauperant de rore nutritio, ut non possit non sequi atrophia. Nec excludenda sunt medicamenta purgantia & sudorifera fortiora, cum massam sanguineam nimis solvant, evacuent, & sic corpus emacient. Facit huc motus corporis nimius, per glandulas cutaneas sub forma sudoris rorem nutritium etiam exhaustiens; item ob eandem causam æstus nimius, qui liquefaciendo succum nutritium eundem successivè deprædatur: item fluxus alvi nimis copiosi huc pertinent, vid. Borellus *Cent. 2. observ. 64.* ubi refert de atrophia & macie post sumptum pharmacum, indeque ortà hypercatharsi, abortu, &c. item fluxus febrium colliquativi; gonorrhœa virorum, tam vera quam notha; fluor uterinus albus mulierum, aut copiosior aut diuturnior, mulieres tandem ad atrophiam ac maciem disponit, uti exemplum habet Guarinus *Consil. 105.* Ulcera cariosa & fistulosa in artubus, v. g. in genu, atrophiam inferunt, abscissione partis curandam: Vid. Horstius *lib. 9. observ. 20.* nimia denique Venus tabidos reddit mares, quia cum spiritibus mediante geniturâ succum nutritium exhaustit: quale exemplum habet Zacutus Lusitanus *lib. 3. Prax. admir. observ. 120.* quò etiam pertinet affectus no-

vorum maritorum, qui vocatur tabes dorsalis, vel alio modo hæctica novorum maritorum, quando hi ipsi nempe ad rem Veneriam nimis sunt intenti, tandem succum seu rorem nutritium nimis exhaustiendo successivè ad talem dorsali atrophiam deducuntur. In tabe tali dorsali, quæ frequentiore insequitur Venerem, successivè mariti dorso extenuantur, processus spinales prominent, & sensus vermiculationis cum aliquali titillatione subito per dorsum medium decurrente percipitur. Exemplum non sunt rara, videbitis apud Solenandrum *Consil. 5.* item, apud Tulpium *lib. 3. observ. cap. 24.* item, Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. admir. observ. 122.* Sed in specie de hac lumbagine & tabe dorsali, vid. Sennertus *lib. 2. Prax. Part. 2. cap. 23.* & hinc Willisius *Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 1. cap. 2. pag. 82.* De hac tabe dorsali ex Veneris abusu orta singulare est, quod habet Lemnius *observ. pag. 100.* quod hæc licet semel curata, soleat tamen subinde per periodos septenniorum recurrere, & maritos insigniter affligere.

Altera causa erat atrophia orta ex vitio nutrimenti. Vitium nutrimenti atrophiam inferens est, quando hoc vitiosum est, minus temperatum, sed nimis asperum, aut acre, aut salum acidum & quasi muriaticum, aut alio vitio peregrino inquinatum, hinc ineptum est, ut nutriet corpus: Id quod sit dupliciter;

1. Propter vitiosam nutrimenti in stomacho & primis viis digestionem.
2. Propter vitiosam nutrimenti geniti, vel per se boni, in massa sanguinea tamen, antea plus minus vituata, corruptionem.

Conspirant hæc duæ causæ non raro, ita, ut in tabe confirmata per circulum quendam se mutuò intendunt, & ita malum eò gravius reddant, v. g. animi affectus diuturni corpus similiter emaciantes, ut sunt: iracundia, terror, & in specie tristitia, potus frigidus post nimiam incalescentiam, esus post iram, &c. Nam hæc pathemata partim sanguinem turbant, partim ex improvise obvenientia & digestionem primam alterant & vitiant: Stomachum quod attrinet: in hoc, uti fundamentum legitimæ digestionis, ita & sæpissimè causa tabis & atrophie hæret, quando scilicet alimenta sub digestionem corrumpuntur, eaque non in chylum sub-dulcem nutritium, sed in vitiosè salum acrem ac muriaticum, ac plus minus viscidum aut ferosum immutantur: quod vitium sæpissimè aut ipsa vitiosa assumpta, v. g. in pica, insequitur, aut sæpissimè vitio lymphæ salivæ stomachi digestionem turbantis, & fermentum ejus vitiantis, oboritur tabes: aut denique accidit ex ipsius fermenti, vel etiam succorum

(Ddd 2)

corum

corum in primis viis labe successivè contractâ, & tandem vix amplius emendabili, quatenus ea, quæ naturaliter fluida, istud constituere debent, imprimis spiritus, sanguis & lymphæ in crasi sua vitiata existunt. Quod frequentissimè fiat tabes, etiam phthisis, ex vicio stomachi malè digerentis, fidelissimè inculcat Lindanus *in Comment. ad Praxin Chymiatr. Hartmanni*, qui dicit: quod ista tabes, quæ vulgò à catarrho oriri dicitur, aut à destillationibus capitis produci, sit simpliciter ab acrimonia & visciditate sanguinis & lymphæ nata, propter errata digestionis primæ in stomacho, vel etiam succorum in primis viis, quod vitium vocat cruditatem putridam, ad differentiam cruditatis acidæ & nidorosæ: vid. Barbette: quando nempe per hanc alimenta corrumpuntur, & in chylum acidofalsum seu muriaticum, simulque viscidiorum, degenerant. Nec desunt exempla alios apud Practicos talis ortæ tabis vel phthiseos ex vicio stomachi: vid. imprimis Solenander *Conf. 8. Sect. 1. & Conf. 15. Sect. 2.* Bartholinus *Cent. 5. Histor. 38.* item in Poterio non pauca exempla reperietis tabis & phthiseos ex affecto ventriculo subnatæ, *Cent. 1. cap. 61. & 93. Cent. 2. cap. 3. 70. 71. & 78. Cent. 3. cap. 82. & Barbette Prax. lib. 3. cap. 2.*

Vitio sanguinis, cujus occasione etiam necessariò vitiatur distributus chylus, aliàs laudabilis fit atrophia seu tabes, quando sanguis quocunque modo à debita crasi deficit, in specie falsus, aut acidofalsus acris, & plus minus muriaticus redditur, aut alio quocunque vicio inquinatur, adeoque ineptus est, ut nutriat: & hinc pòst febres, tam continuas ardentis, quàm intermittentes malè curatas, insequuntur lentæ & hecticæ, tabem inferentes, partim ex acrimonia acidofalsa, partim juncta visciditate sanguinis & lymphæ. Hinc scorbutici sæpiùs laborant tabe & atrophia, ex acrimonia salis scorbutici, nutrimentum corporis inquinantis: id quod etiam in malo hypochondriaco confirmato familiare est, ut hi ipsi malo progrediente in atrophiam incidant, partim ob vitiolam digestionem primam, partim propter vitium ipsius sanguinis. Pariter & menses retenti, ut & lochia suppressa, vel hæmorrhoides retentæ, aut imprudenter sanatæ, atrophiam subinde inducunt: Confer. etiam Bartholinus *Cent. 2. Histor. 35.* & quæ sunt aliæ causæ plures, massam sanguineam diversimodè inquinantes, quæ nutritionem impedire valent.

Imprimis tabes oriri solet, quando massa sanguinea ad dyscrasiam degenerat, vitio partis cujusdam solidæ nobilioris, propter sui malam constitutionem in functione solita deficientis, aut etiam abtcessu aut ulcere affectæ. Tali in casu non solum ipsum pus, sed & viscus ulceratum, non amplius sufficiens debet

functioni circa conservationem, malum eò deterius reddit: quod etiam facit pus ex ulcere cujusdam partis genitum: & cum massa sanguinea permixtum: quod ipsum sanguinem vitiat, putredine inficit, eumque salum, acrem, & glutinosum reddit, unde talis ex visceris cujusdam vitio quovis insigniore, ac speciatim ex ulceratione, massaque sanguinea infecta, nata tabes in specie phthisis appellari solet.

## ARTICULUS II.

### De Phthisi.

PHthisis significat omnem corporis consumptionem, à quacunque causa, & in quacunque parte fiat, strictius tamen jam usitatè phthisis dicitur omnis ea contabescencia, quæ corruptelam, ac speciatim ulcerationem alicujus visceris nobilioris, sequitur. Ita si quis contabescat ob purulentum hepar, purulentos renes, corruptos pulmones, & similia viscera corrupta, tunc phthisi dicitur laborare: quæ dicitur à Græco  $\phi\theta\iota\varsigma$  seu  $\phi\theta\iota\omega$ , corrompo, consumo, perdo, vel  $\phi\theta\iota\omega$  corrompo, quia sc. in phthisi totum corpus emaciatur. Hanc phthisin Paracelsus aliquando appellat ariduram, Germani vocant: *die Lungenoder Schwindsucht*.

Interim licet phthisis ex ulcere varia sit; quoniam verò pulmo præ reliquis omnibus partibus internis maximè expositus est injuriis aëris externi, à quibus insigniter lædi potest ac solet, ipse etiam talem sortitus est texturam, ut facillimè ex sanguine luscipere queat varia recrementa, à quibus facillimè alterabilis existit: hinc etiam ex omnibus partibus frequentissimè pulmo vitiatur & exulceratur, propterea  $\kappa\alpha\tau' \epsilon\lambda\epsilon\chi\omega$  phthisici dicuntur ii, qui ulcere pulmonum laborant, sive ulcus, sive induratio, sive materia gypsea in hoc aut alio viscere collecta fuerit: Vid. Bartholinus *Epat. Exautor. S. 6. pag. 666.* Fernellius *lib. 5. Pathol. cap. 11.* Severinus *de Recond. Absc. Nat. S. 2. cap. 36.* Timæus à *Gildenslee / lib. 6. Epist. 8.* Whartonus *Adenogr. c. 11.* & Wepferus *de Apoplexia p. 114.* Cum phthisi hac semper simul conjungitur febris hectica, in quacunque parte sit ulcus; qualis hectica, & inde tabes, conjungitur etiam interdum ulceribus partium externarum insignioribus. Si pulmo suppuratus est, sequitur sordidum ulcus, quod magis magisque inquinando sanguinem, tabem admodum exasperat: quæ etiam valent in phthisi renali, jecorali, &c. Cum enim per viscera continuò circuletur sanguis, hinc facilè is, labe quadam notatus, eandem visceribus in specie pulmonibus, affricare potest; sicut etiam ex suppurato mesenterio, vel abtcessu mesenterii observata fuit phthisis ab Horstio *lib. 2. Observ. 5.*

Phthisis



Phthisis pulmonalis & vomica pulmonum, cum qua sæpius confunditur, in eo saltem differunt, quod vomica sit ulcus pulmonū clausum seu abscessus; è contra phthisis pulmonū est ulcus sordidum, ex abscessu jam aperto genitum. Nam in vomica pulmonum seu eorum abscessu est pus purum, album, crassum, laudabile, leve & æquale, quod ipsum interdum suis membranis inclusum citra excretionem in pulmonibus hæret. Verum, ubi pus tale non expurgatur, degenerat variè à propria naturâ in varios sordes ac sanies acido-viscidas, & tunc supervenit ulcus sordidum, quod confirmatam dat phthisin.

Probè autem hic observandum: quod inter phthises, uti frequentior est pulmonalis, frequentior esse solet ejusdem exulceratio, ast præter hanc & aliæ causæ, viscus pulmonum vitiantes, phthisin inducere valent; adeoque non solum exulcerationem pulmonum, sed etiam quamvis eorum labem insigniorem, ob usum eorum ad sanguinis eversionem & constitutionem vitalem summè necessariam, ad phthisin disponere certum est. Ut adeò rectè phthisis pulmonalis definiatur in genere: Contabescencia, totius corporis & vitio pulmonum nata, sic & pulmonum corrugatio tabem potest inferre, non secus ac si aliquid peregrini, in asperam arteriam fuerit illaptum, & in bronchiis hæserit, tunc eadem irritando ad tussim continuam, successivè constitutionem, & hinc functionem pulmonum ita lædere potest, ut tabes demum cum febre lenta instar phthiseos superveniat, unde hæc phthisis nothia appellatur, quod extra pulmones existat: sic ex nucleo avellanæ in pulmonem illapso tussim continuam cum emaciatione totius & imminente phthisi videb. apud Bartholinum C. 1. *Observ.* 11. & Cent. 2. *Obs.* 27. pag. 157. Pariter ex nucleo pomi in asperam arteriam illapso phthisin perfectam lethalem videb. in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. *Observ.* 24. pag. 26. Plura exempla ad instituendas cautelâs circa phthisin observanda videb. in M. A. N. C. Ann. 2. *Observat.* 31. pag. 58. & Ann. 3. *Observ.* 111. pag. 181. Sylvi Pr. lib. 1. cap. 24. & Hæchstædero; item Marco Aurelio Severino *Tract. de Abscess. nothis* pag. 269. sicut è contra pulmones exulcerati sine phthisi observati fuerunt: vid. Kerkringius in *Spicileg. Anat. observat.* 72. item Ann. 1. *Observat.* 94. pag. 223. & Bartholinus C. 2. *Hist.* 14.

Pars ergo affecta sunt pulmones, sive cum sive sine ulcere.

Frequentiores autem causæ remotæ hujus ulceris phthisici, in specie phthiseos pulmonalis, sunt variæ; nempe vel internæ vel externæ. Ex internis sæpius est nimia san-

guinis, & exinde nata lymphæ acrimonia ac falsedo muriatica; falsedo autem hæc sæpius in digestionem ventriculi vitiata originem ponit.

Acrimonia hæc probatur per gustum: nam quotiescunque laboramus ulcere in ore, toties maturo ulcere disrupto, percipimus saporem æmulantem casei antiqui; & hæc ipsa materia purulenta demum producit symptomata recitata in definitione.

Inter causas verò externas remotas fortuita plura non rarò ulcerationem pulmonum, & hinc phthisin inducunt: v.g. vulnus thoracem & pulmones penetrans, hinc in ulcus degenerans, contusio seu casus ab alto, indeque sanguis in quodam thoracis loco grumosus, pulmones opplens, eosdemq; acrimoniâ suâ facile erodens, ut fiant ulcerosi; luxationes vertebrarum, clamores fortiores, sanguinis sputum, & similes affectus, &c. sæpius ulcus pulmonum & phthisin pedissequam post se trahunt.

Ulterius phthisis pulmonalis aliis morbis non rarò supervenit; sicut id videmus post pleuritidem & peripneumoniam suppuratam seu malè curatam & hæmoptysin: variolæ etiam & morbilli non rarò phthisin in pulmonibus inferunt. Porro aer inclementior, vapores acidi & corrosivi mineralium, & res, &c. hausti ab operatoribus chymicis vel metallicis, vapor calcis vivæ, &c. non raro ad tabem ac phthisin disponunt, unde & odor adeò virulentus ab Helmontio dicitur, ut sæpius inspiratus tabem & phthisin pulmonalem inferat: unde gypsum & calcem præparantes pleurumque phthisici moriuntur, ut rectè observat Lusitanus C. 4. *Observ.* 41. Potus vini nimis acidi & tartarei crebrior ad phthisin disponit: hinc enim teste Hæfero in *Herc. Med.* pag. 112. in Moraviæ & Austriæ provinciis propter vina acido-tartareâ crebrius hausta phthisis quodammodo endemica existit: item aceti nimius usus corrugationem pulmonum inducit, cum respiratione difficili & dolore punctorio circa asperam arteriam. Faciunt huc acidulæ & omnia vitriolata, quorū frequentior usus eos, qui debiliorum sunt pulmonum, ad phthisin disponit. Fumus nicotianæ copiosius haustus, ad phthisin pulmonalem disponit: potus frigidus post incalcescentiam corporis pariter eandem infert: vid. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. *Observat.* 210. pag. 309.

Denique hæreditarium malum est phthisis pulmonalis, quod à parentibus per traducem seminalem in fœtum transplantatur. Contagiosa quoq; admodum est exulceratio pulmonum phthisica confirmata, si sc. phthisicus

anhelat sanum, dum fermentum ulceris corruptivum, aut per halitum quoque corporis ex præcordiis exspiratum, aut per sputum & saniem expectoratum se propagat, & pulmonem aliàs sani similiter inficit, & ad abscessum vel ulcus disponit. Hinc liberi cum parentibus, consortes & conjuges cohabitantes, sibi invicem facillè hoc malum communicant, potissimum si in his vel minima ad phthisin dispositio naturalis fuerit, aut diætæ erroribus vacent. Exempla contagii phthisici videbitis in Riverii *Prax. l. 17. c. 17. C. 1. Observ. 35. & 99.* sic etiam *C. 4. Observ. 92.* item Bartholinus *C. 1. Hist. 46.* item Sylvius de phthisi §. 70. nec non Schenckius in *observ. p. 256.* ex Baptista Montano refert, adeò contagiosa esse phthisicorum confirmatorum sputa, ut Medicus subinde olfaciens eadem, prunis injecta, exinde factus sit phthisicus: idem ex Fracastorio *l. 2. de Morbù contag. c. 9.* refert phthisicorum vestes ab aliis gestatas, post biennium etiam idem contagium propagasse in alios. Ac sanè non mirabile hoc videri potest, si verum est quod refert Panarollus *Pentec. 2. Observ. 49.* expectoratum sputum ex confirmato ulcere pulmonum excretum adeò virulentum & malignum esse, ut muscas illud gestantes instar arsenici interimat.

### DIAGNOSIS.

Signa atrophix seu tabis jam factæ diagnostica sunt facillima, & per se clara: incipientis verò difficulter cognoscibilis. In tabe incipiente corpus sensim atque sensim emaciatur ac tabescit, hincque virium imbecillitas sensim ac sensim supervenit, donec in confirmata successivè tabe, præter faciem dictam Hippocraticam, costæ in thorace protuberant: cartilago ensiformis incurvata apparet, scapulæ alarum ac claviculæ arcuum instar prominent, dorsû spina se exerit, venter collapsus constrictusque apparet; clunes pendulæ sunt, vel omninò consumptæ; crura, brachia, pedes, manusque cum digitis arida spectantur, & circa articulos protuberantiæ attolli videntur; ungues curvantur, pili excidunt, cutisque flaccida & corrugata existit; venæ interim prominent undique conspicuæ & lividæ: corpusque universum tantum non transparens & pellucidum in quibusdam observatur: uti historia hæc graphicè à Sylvio *l. 1. Prax. cap. 37. in specie 17.* exhibetur.

Præ cæteris dignoscendæ sunt causæ phthiseos seu tabis: & (1.) quidem ex spiritu animalium vitio & alimenti defectu tabem inferri per se facillè patet, imprimis ex examine causarum antecedentium, & adjunctorum symptomatum syndrome: e.g. ea tabes, quæ quodam glandularum mesenterii vitio, & consequenter ex denegata chyli distri-

butione accidit, abdomen inflatum ac tumidum cum dolore in ejus profundo obtuso ac plus minus gravativo; itemque cum renitente hinc inde sparsa duritie, circa umbilicum observabili, habere solet; Excreta liquida, aut chylosa excernuntur, & sensim corpus emaciatur: quæ omnia innuunt, vitio chyli denegati oriri atrophiam. Sed (2.) longè magis negotium est cognoscere labem ac subsequentem phthisin, ex vitio interno, circa quam ad (3.) causarum fontes imprimis attendendum erit:

1. An tabes sit ex vitio digestionis stomachi?
2. An ex vitio sanguinis ad nutritionem inepti?
3. An ex corruptela ulcerosa cujusdam partis internæ, in specie pulmonum?

Equidem causæ externæ, vel affectus varii præcedentes, qui alterando sanguinem, vel vitiando chylum, ad talem tabem disponunt, ut & symptomata concomitantia & similia, partim ab eorum signis specialibus, partim ex ægri relatione, aut ex ejus vitæ genere patent.

Præ cæteris tamen inquirendum: an vitio stomachi oriatur tabes? nam utut hæc causæ subinde se insequantur, ita ut vitium stomachi, sanguinis & lymphæ sequatur acrimonia, & hanc tandem pulmonum ulcus; interdum tamen etiam separatim existere observantur.

Ex stomacho esse & dependere tabem, innuit: si præcesserunt causæ ex rebus non-naturalibus, quæ ad digestionis primæ labefactionem dispositæ fuerunt, v. g. curæ nimix, iracundia nimia, &c. item si in principio inflationes stomachi, tumefactio abdominis, angustix præcordiorum, ructus cinerosi, quando sc. ita depravatum est ventriculi fermentum, ut ejusmodi odorem spirantes ructus percipiantur, & alia symptomata stomachi quoad appetitum aut quoad digestionem præcesserint.

Alia, quæ immediatè sanguinem afficiunt, hujus læsionis conjecturam faciunt, v. g. quando ulcus in quodam loco sanatum committatur phthisis pulmonalis: sic ex ulcere pedis sanato phthisin lethalem observavit Thiermeyer *Consil. lib. 2. pag. 85.* Nempe à fermento ulceris unà cum sanie acri per istud evacuari solitâ retentis, cum sanguine hinc inde circumraptis, & in pulmonem dispositis, malum originem cepit.

Facit huc ipse habitus ægrotum plus minus ad phthisin & atrophiam dispositorum: nempe quotidianâ constat experientiâ, succulentos aut obesos minus evadere phthisicos, benè autem macilentos, à natura plus minus attenuatos. Horum nempe sanguinis

nis minus temperatus, minus dulcis, & minus olivaceus existit, adeoque minus nutrit; è contra acrior, asperior & falsior esse solet, facileque incalescens, unde tales minus bene nutrirì observantur.

Phthisis, quæ à visceris interni exulceratione vel alio vitio dependet, facilius quam ejus causæ, cognosci potest, cum in horum vitiiis nulla occurrant signa pathognomonica, aut plures plurium eorum anomalie concurrant; adeoque causa harum primaria & prima determinari non possit, imprimis si excreta affectum non manifestent: e. g. quando phthisicus conqueritur de dolore, tensione, aliisque abdominis symptomatis, colligi quidem potest, quod aliquod abdominis viscus affectum sit; incertum tamen adhuc manet, an intestina, an mesenterium, an pancreas, &c. nec, licet pars affecta dignoscatur, de morbi formalitate mox constat, an nempe scirrhus, vel hydrops; vel ulcus, &c. subsit? Nec excreta morbum ejusmodi occultum semper manifestant, dum e. g. pulmo, qui propter frequentiore cruoris aut puris rejectionem suppuratus putabatur, integer; epar verò maxime consumptum deprehensum fuit: vid. Schneiderus de Catarrhis lib. 4. cap. 3. pag. 103. Interim tamen, ut probabilis conjectura de phthiseos hujus causa nobis constet, pars affecta colligatur ex symptomatum ipsi adjunctorum præsentia & loco affecto seu dolente, utut nec symptomata ejusmodi semper generis, quæ nos ad partis affectæ cognitionem ducant, imprimis cum de hujus & illius visceris usu primario nihil certi adhuc nobis constet, dentur? An verò hoc vel illud viscus exulceratum sit? concludere possumus ex puris rejectione, qualis, si non observetur, de scirrhus vel alio simili vitio, e. g. hydrope, conjecturandum, utut nec omnium viscerum exulceratio, propter situm profundiorē & viarum excretoriarum defectum, puris rejectione se prodatur. Frequentissima phthisis est pulmonalis, circa quam inquirendum: an à causa externa, v. g. inspiratis; an ab interna oriatur? & si ab hac, an affectus secundarius sit? i. e. an pleuritidem aut sputum sanguinis sequatur, affectus antecedentis ratio imprimis habenda est; si verò est affectus primarius, tunc ista est phthisis pulmonalis, quæ ab ulceratione ejus ex defluxu catarrhali, ut vocant, oritur. Hujus malè sic dictæ phthiseos catarrhalis radix seu ortus est in ventriculo malè digerente, progressus in sanguine aut lymphæ exinde acido-salis factis in pulmonibus, unò alteròve ejus lobo, ejusque vesiculis & cellulis plus minus erosio. Unde in loco eroso ulcus supervenit seu suboritur, cujus fermentum nutrimenti proximi corruptivum existit, unde sordium, saniei & puris generatio, ac mediante tussi successiva

excretio, donec vel ab istis sordibus suffocentur ægri, vel erosio & absumptis maximam partem pulmonibus sanguis debita in crassi deficiens nunc mediante diarrhœa colliquativa, nunc mediantibus tumoribus pedum œdematosi mortem inferat.

Hinc, ut maturè præcognoscatur hujusmodi phthisis ex vitio stomachi oriunda, quippe quæ communissima est, & à veteribus catarrho à capite defluenti falsò adscribitur, ejusmodi historiam, ne fiat confusio in lectione practicum, enarrare placet, & est talis: In tali tunc nempe ægri ordinariò, nunc cum præcedente errato aliquo in rebus non naturalibus vel cura nimia, vel iracundia, ab ingurgitatione potùs, aut simili, vel etiam absque tali manifesto errato, de virium labe factatione conqueri incipiunt, cum appetitu plus minus dejecto, aut saltem carnes abhorrente: hinc tempore matutino, dum ex lecto se levant de sapore in ore peregrino conqueruntur, qui tamen primò solet esse extraordinarius, nec adeo sensibilis, postmodum verò saporem salum in ore percipiunt, sub quo ipso magis magisque prostermitur appetitus, successivè titillationes fauces affligunt, quas subinde levis tussicula, sed arida & sicca, insequitur, ideoque negligitur, sentiuntque flaccescantiam substantiæ carnosæ in artubus: malo magis progressu conqueruntur de sapore putrido cinereo, *es schmeckt ihnen alles wie faul Holz oder Asche*/aut de sapore carniū & piscium putridorum, tussis sicca, sed in qua tenuia saltem aut aquosa rejiciuntur, successivè fit aspera, imprimis noctu, aut saltem post lecti introitum, quæ sanguinis & lymphæ inquinamentum ostendit; cui tussi siccæ difficilior plus minus respiratio supervenit, unà cum febricula lenta, ipsis ægris ferè insensibili, saltem ab omni pastu, præter angustias & gravationis sensum circa præcordia, levem quendam calorem, specialiter in manibus, extraordinariò percipiunt. Interim tamen, quocumque tempore tenetur pulsus, semper celer, frequens, plus minus parvus, observari solet: incipiunt exspuere candida tenuia, quæ successivè diu in copia augentur. Precedente malo exasperatur hectica, dum non tantum calor post pastum augmentatur notabiliter, sed etiam sudores nocturni copiosi supervenire solent, tussis augetur in die, supervenit excretio copiosæ materiæ variæ, primitus viscidæ albidæ, hinc successivè viscidæ flavæ, interdum viridis, hinc materiæ lividæ, retum saporem exhibentis, tandem genuinum pus, nunc cum nunc sine vestigio sanguinis unà excreti: quo in casu jam exulceratio partis cujusdam, imprimis pulmonis, supervenit: quatit continuò pectus hæc tussis, præsertim vesperi & mane, vesperi minus, ma-

ne



nè plus materię corruptę ejicitur; hinc hectica, difficilis respiratio, corporisque intabescencia magis magisque intenduntur, unà cum virium omnium successivâ labefactione.

Observandum autem hîc ulterius: quòd tussis phthycorum non statim sit pulmonalis, sed sæpe in principio sit stomachalis, cui tandem acrioris lymphę occasione per glandulas asperę arterię aut pulmonum excretę tussis pulmonalis supervenerit: deinde attendendum est, non in quavis phthysi aut exulceratione pulmonum tussim adesse, quin interdum citra insigniorem tussim insignis pulmonum erosio aut exulceratio observata fuit: vid. Kerkringius in *Spicilleg. Observ.* 72. tunc tantum est tussis, quando exulceratione pulmonum facta à purulenta materia acri bronchia solent irritari, licet vomica pulmonum sine tussi existere queat, sicut exemplis probat Schneiderus. Sic quoque rejectum pus frequentius quidem est ex pulmone, non tamen semper, etiam si cum tussi fiat; quin etiam pus in ulceribus aliarum partium, pulmonibus salvis & illæsis, per sputum expurgari potest. Exemplum aliquod habebitis in Schneidero *lib. 4. de Catarrhis*, pag. 103. de quodam pro phthifico habito, qui copiosum pus & sanguinem tussiendo rejecit: aperto corpore post mortem pulmo omninò sanus. hepar verò exulceratum & purulentum repertum fuit. Nec mirum hoc esse debet: uti enim pus ipsum, v. g. pleuriticorum suppuratorum, interdum per alvum, interdum per urinam rejicitur: & uti pus ex ulcere brachii per urinam excretum observavit Paræus; ita simili ratione hepatis, renum, & aliarum partium suppurationes etiam excrementa purulenta mediante sanguinis circulo in pulmonibus secernuntur, ut mediante sputo ac tussi ejici possint. Sic puris sputum menstruum sine phthysi videbitis in *M. A. N. C. Ann. 1. Observat.* 94. pag. 223. item Bartholinus *Cent. 4. Histor.* 17. Alias non mox præsentē febre, difficulti respiratione, rejectione materię copiosę viscidę &c. pronuntiandum, ægrum esse phthysicum. Nam prædicta mala sæpius etiam in depravata chylosi, aliisque affectibus ventriculi, reperiuntur.

Si dubius sit Medicus, utrum materia viscida, an verò pus exspuatur? jubent patientem exspuere in aquam frigidam, quo facto, observant: an materia fundum petat? an verò aquę innatet? Prius si accidat, patiens exspuit pus: si posterius, solum materiam viscidam rejicit; nam visciditati materię pituitosę magna inest porositas, unde aër huic porositati irretitus in causâ est, ne materia viscida fundum petat.

Potrà distinguenda est tussis in phthysi incipiente. Sonitus, locus doloris, rejecta, &c.

facile hæc discernere decet, ac tunc demum sumus de labe pulmonum certi, quando toti pulmonum lobi consumpti, aut etiam eorum frustula successivè ejiciuntur; sicut interdum furculi venarum & arteriarum corrossi expectorari observantur. Sic namque furculum venę arteriosę expectoratum observavit Tulpius *lib. 2. cap. 12.* & pulmo integrè ferè per pus rejectus observatus fuit à Salmuth *C. 1. Observat.* 14. Omnibus his tabidis, & phthysicis commune est, ut copiosos sudores nocturnos patiantur, ita ut simul atque oculos claudant ægri, sudore diffuant; sicuti in malo confirmato defluvium capillorum supervenit: sed tunc viribus exhaustis cessante tussi, aut deficiente ejus expectoratione materię, ægri suffocantur, aut superveniente diarrhœa colliquativâ, ad quam maximè proni sunt phthysici, pedumvè tumore œdematoso ægri jugulantur. Quod si ex visceris cujusdam præcedente inflammatione vel abscessu, aut etiam pleuritidi suppuratę, aut sputo sanguinis superveniat phthysis, in talibus minus stomachus est inculandus, qui tunc potius insons apparet, sed ad primarium morbum est respiciendum. Quę pars pulmonum afficiatur, an dextra? an sinistra? præter sensum doloris non nihil obscurum cognoscitur ex decubitu ægri: siquidem æger non potest decumbere in latere sano, sed in latere affecto, alias imminet suffocatio; cum contra si in latere ægro decumbat, talia ipsi non accidunt, uti rectè observat Salmuth *C. 1. observ.* 14. urina est flammea, & præcipitatur in sabulum rubicundum, & materiam pinguem urinę innatantem.

Plura qui de tabis & phthysicos natura desiderat, addit in specie Willisium *Pharm. Rat. Part. 2 Sect. 1. cap. 5. & 6.* item Sylvium *lib. 4. Prax. & Tract. de phthysi*: denique Benedictum in *Theatro tabidorum*.

#### P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: notum est, tabem omnem ac phthysin esse malum chronicum, & difficillimum curatu: imò confirmata, quia sine insigni viscerum & humorum dyscrasia, & læsione fieri nequit, sæpè nullius est curationis, nisi sublimiora negotia accedant.

Imprimis tres isti gradus phthysicos, nempe imminentis, incipientis & confirmatę, quas Willisius *insinuat c. l. pag. 106.* probè observandi sunt.

Primus enim facilè; secundus difficilior; & tertius planè non curatur. Et quidem in gradu secundo vulnerariis & laudabili diata uti interdum curari, ita ulterior progressus interdum per plures annos retardari potest. Sed necesse est, cautissimè & rigorosè ægri observent omnia, aliàs impossibile est, ipsis succurrere.

Quò

Quò melior & sanior est stomachi constitutio, eò uberior sanitatis spes superest: unde tabes incipiens à ventriculi dyspepsia, vermibus, &c. aliquid salutis promittit.

Tabes à cicatrice intestinali, scirrhis ac ulceribus viscerum, scorbuto, fluore albo, gonorrhœa, hydrope, & mensium suppressione, nisi removeantur, difficulter aut nunquam curantur: Conf. Hippocrates 2. *Predict.* 13.

Qui ex pulmonū ulcere vult evadere, cum 6. Hippocratis signa eder e decet, quæ videb. in Sennerto l. 2. *Pr. c. 2. de Phthisi* p. 207. eaque prolixius explicat Sylvius, una cum aliis, *Tract. de Phthisi* §. 87. & sequ.

Diarrhœa spontè superveniens phthisi, aut tumor pedum œdematosus, aut denique deficiens tussis, mortem in propinquo denunciant. Tamdiu, inquit Galenus, Phthisici vivunt, quamdiu extussire, & sputa pulmonem expurgare possunt; ubi verò sputa intus manent, obstruuntur viæ & suffocantur.

Si sputum phthisicorum vel per se, vel carbonibus injectum graviter olet, & capilli defluunt, periculosum est signum.

Phthisis denique, quæ à tuberculis & indurata pulmonum compage, nunquam curatur.

#### C U R A.

Quod attinet curam atrophix, tabis & phthisicos: hæc consistit in eo, ut

1. Causa, quæ vel alimentum exhaurit, vel primarius morbus, qui massam sanguineam inficit, removeatur. Hæc causæ remotio variat equidem pro earum varietate suprâ recensitâ. Sed in tabe, quæ frequentius curæ subijcitur, vel stomachus rectificandus, vel acrimonia ac lymphæ acido salia temperanda, vel deniq; visceris læsio aut exulceratio plus minus perfecta, in specie, pulmonis, sananda, aliavè ejus corruptela corrigenda.
2. Symptomata graviora mitiganda, qualia sunt: tussis ferina, præsertim nocturna, excreatio difficilis, inde respirationis difficultas; febris lenta, sudor nocturnus, vel diarrhœa.
3. Corpus nutriatur: id quod dixta laudabilis præstat, quam stomachus appetit & facile digerit; in specie lactea, quæ & chylum subdulcem & subpinguem & probè divitem suggerit, simulque sanguinem temperatum & quali chylosum reddit.

Pro cura hac ritè instituenda

Observ. I. Quod vomitoria in omni tabe ac atrophia, item in phthisi tam primariò incipientè, quam confirmata, idque secundariò, sint optima, in specie, ubi malum est

Tom. II.

ex vitio stomachi, & inde nata acrimonia massæ sanguineæ salso-muriatica: uti rectè hoc inculcat Lindanus, Hartmannus in *Prax. Chym. cap. 99.* Bartholet. *de diffic. respirat.* & Sylvius in *Praxi.* Interim in tali casu, ubi phthisis est confirmata, habeatur ratio sputi sanguinis imminenti, quo præsentè cauti sumus in vomitoriorum usu: contrà si non adsit, tutò illa propinemus, & certum est, quod vomitorium potenter ac copiosè evacuet fomites saniosos ex pulmonibus, propter quam causam in empyemate etiam commodè vomitoria usurpari possunt. Curavi aliquando ancillam desperatè phthisicam ex ulcere pulmonum, cui inter alia remedia duo valida præscripsi vomitoria; non tamen unâ vice: & vix credibile est, quàm variæ & copiosæ sordes cum præsentissimo levamine rejectæ fuerunt, quæ promptissimè facilitabant curam.

Observ. II. Post vomitoria, quantum possibile, cavendum est à purgantibus quibuscunque: nam etiam lenè purgans phthisicos & tabidos maximè & copiosè evacuare solet cum insigni virium noxa, ut ipse observavi; ita ut quod aliàs in statu naturali nil effectus præstaret, in phthisicis cum summa noxa per totum morbi cursum inemendabili assumptum fuerit, & tales ægri post purgationem semper pejor habent, ac vesperi crebrius tussunt. Penitus ergò non sunt purgandi, nec vena est aperienda, nisi quædam sanguinis evacuatio suppressa in causa sit, ubi venæsectio conceditur, sed post vomitum reliqua cura consistit in mitigatione acrimoniæ salinæ. Et quidem, quam noxia sit purgatio, uti & venæsectio in phthisi, videbitis apud Borellum *Cent. 4. Observ. 15.* & Prosperum Martianum in *Hipp. Sect. 4. Aph. 8.* Saltim ergò, si aliquid tentandum, primæ viæ, & quidem lenissimis purgantibus in principio abstergendæ sunt: vid. hac in parte Bartholinus *Cent. 10. Observ. 15.* Hippocrates *lib. 2. de Morbis Text. 46. §. 27. & Text. 47. §. 13.* cui scopo rhabbarbarum optimè inservit. Vulgò etiam solent inurere fonticulos phthisicis, seducti à catarrho, quem ex capite in asperam arteriam depluere existimant: sed nil profut, modò non noceant.

Observ. III. Dulcia, saccharata, & mellita crebrius sub forma syruporum linctuumvè usurpata plus nocent tabidis ac phthisicis, quam profunt; fermentativa enim sunt saccharata & putrefactiva, adeoque stomacho, ut & visceri cuidam eroso, speciatim pulmonibus insigniter sunt hostilia, digestionem primam turbant, ac imprimis quosvis corporis succos viscidiores, ac inertiores reddere solent: unde etiam syruporum aliorumque dulcium nonnisi moderatus usus in phthisicis & tabidis tolerandus, nisi in quantum ad lubricandas fauces interdum,

(Ecc)

dum,

dum, sed cautè, pro scopo expectorationis usurpanda sunt. Quantum noceat mel & saccharum, vid. Garenzier *Tract. de Tabè Anglica*, & Helmontius *Tract. de Dispens. Modern. §. 30. pag. 371.*

Obierv. IV. In phthisi scorbutica, si quacunque occasione ad tussim disponantur, & lymphâ scorbuticorum admodum acri existente, præ cæteris optima erunt lacticia, quibus spiritus cochleariæ, vel balsamus sulphuris anisatus, vel essentia vulneraria vel spiritus salis ammoniaci, & similia instillari possunt: imprimis lac caprinum herbis antiscorbuticis & vulnerariis prius nutrita capra præ cæteris ad talem phthisin scorbuticam confert; item potiones vulnerariæ, quibus spiritus cochleariæ permiscendus.

Quod attinet causarum remotionem, lactis usui præmittendam: convenit ratione stomachi imprimis vomitus. Hinc in tabe adhuc incipiente appropriata stomachica, imprimis blanda subacida, conducunt, quæ ceu experta commendat Barbette *in sua Praxi pag. 107.* quæ ipsa tamen sub moderata dosi blandiora etiam sub cursu morbi, ut ita stomacho prospiciamus, haud adeò inconcinna sunt. Talia blanda subacida sunt v. g. liquor terræ foliatæ tartari, tartarus tartarizatus, spiritus aperitivus Penotti, spiritus talis dulcis, R vitrioli Martis Zvvelferi,  $\text{O}$   $\text{Z}$ iatum, arcanum duplicatum,  $\text{O}$   $\text{X}$ , tartarus vitriolatus Tacchenianus, elixyr proprietatis cum & sine acido, lapilli cancerorum cum aceto destillato juxta Barbette, & similia:

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  scabiosf.

card. bened.  $\bar{a}$   $\text{Zij}$ .

prophyl.  $\text{Zß}$ .

Laud. opiat. gr. j.

Syrup. papav. errat. q. l.

M. f. Mixtura cochleatim singulis horis capienda.

D. S.

#### Beitheilende Magen-Mixtur.

Quò etiam videtur facere pulvis Conerdin-gu ad phthisin singularis:

$\mathcal{R}$ .  $\text{O}$ is  $\text{xci}$  puri

$\text{O}$ i puri  $\bar{a}$   $\text{Zß}$ .

rad. liquirit.

ireos Florent.  $\bar{a}$   $\text{Zj}$ .

M. f. Pulvis.

De quo omni mane & vespere capiatur, quantum cuspidis cultelli capit.

In tabe verò quacunque confirmata, in specie ea, quæ jam in ulcus pulmonum transiit, fugienda sunt acida, imprimis vitriolata, cum hæc phthificis sint admodum inimica, quia aggrediuntur pulmones, quibus debilitatis phthisis confirmata redditur: Vid. Langius *Dissertat. de Acidulis §. 18. Thes. 10. & sequ.* Et tanè ipse novi quosdam ad phthisin inclinantes, qui vel propter scorbutum,

vel malum hypochondriacum, visitarunt acidulas, & in ipso earum potu, aut brevi post certè phthisin confirmatam vel hydro-pem contraxerunt.

Ratione sanguinis ac lymphæ, hujus acrimoniæ salis temperandæ præ cæteris conducunt remedia ex sulphure, succinum, myrrha, & diaphoreticum, antihecticum Poterii papaverina & opiata: item tragacantha, amygdalæ, helenium, liquiritia, betonica, russilago, passilæ, sperma ceti, & ex his & similibus parati compositi varii pulveres, pectorales dicti, etiam pulvis Haly contra phthisin, & species dia-ireos, dia-tragacanthi, conserva rosarum, & chocolata: quibus adjungantur decocta talia ex lignis, quæ aliàs in lue Venerea usurpantur, aut contra catarrhos laudantur, in specie ex ligno sassafras, ac radice chinæ, hinc ex ligno guajaci. Nam ex his lignis parata decocta resinolam sulphuream substantiam unà colliquatam obtinent, indeque temperant acre, resolvunt hinc inde hærentes sordes, imprimis in progressu phthiseos seu tabis, speciatim ubi jam dyscrasia sanguinis præcesserit longius, aut pulmones aliudvè viscus jam erosa, & exulcerata sint, conferunt: quibus optimè Helenium glyzyrrhiza, & omnia ex his parata sociantur, & crebrius, idque absque sudore, talia lignorum remedia usurpantur: quin & fumarina his ipsis mista & sæpius usitata dicitur conferre. Adeoque conveniunt hæc in phthisi, quæ vulgò à catarrho seu destillationibus originem ducere asseritur, & adhibentur commodissimè præmissò vomitu. Præscribendi modum & usum videb. in Lotichii *Observat. pag. 23.*

Ratione visceris læsi imprimis vulneraria simplicia, in specie veronica, scabiosa, hederæ terrestris, cheresolium, &c. conferunt: item balsamica, sulphura quacunque, in specie antimonialia, fermentum ulcerum corruptivum emendantia, substantiam puris ejusque proventum corrigentia, & ulcus consolidantia; item balsamus sulphuris, Peruvianus, terebinthina, &c.

In specie hæc ut illustrentur, pro tali scopo præmissis præmittendis universalibus, primas vias imprimis respicientibus, conveniunt, v. g. pulveres pectorales: e. g. pulvis pectoralis D. Michaëlis; qui manè, vespere ante cœnam, & sub introitum in lectum, assumptus dosi  $\text{Zj}$   $\text{Zß}$  ad  $\text{Zj}$ , egregius est. acrimoniam sanguinis ac lymphæ temperat, & tussim nocturnam quodammodo cohibet: Vel loco hujus usurpetur pulvis Lindani ad phthisin seu atrophiam, seu acrimoniam sanguinis, admodum commendatus: de quo sumatur ter in die  $\text{Zj}$  ad  $\text{Zij}$  cum decocto rad. chinæ, sed non debent alio potu, quàm hoc decocto, uti; nisi enim phthifici semetipsos arde ad-

strin-



stringant diætæ, non curabuntur, etiamsi optimas habeant medicinas. Manè & vespere simul instituantur suffitūs ex succino & thure naribus hauriendos. Item

℞. *nucl. pin.* ʒiʒ.

*sem. papav. alb.* ʒij.

c. f. q. ▽ *scabios. & ruffilag.* f. Emulsio:  
adde

*ebor. f.* Δe ʒʒ.

*lapill.* ℥ *prap.*

*Matr. perlar. prap.* ā ʒj.

Edulcor. c. *rotal. manus Christi perlat.*

D. S.

### Temperirende Stärck, Milch/ des Tages über außzutrinken.

Præ cæteris se offerunt mineralia: quæ inter sulphur, tam commune, utpote quod aliàs balsamum est pulmonum, quam sulphura antimonialia fixa, flores sulphuris & remedia ejusdem generis sulphurea, sunt optima in atrophia & tabe, ex acrimonia sanguinis enata, quam, uti etiam lympham, optimè temperat pinguedo illa mineralis sulphuris, unde R  $\Delta$ is, extractum sulphuris solidum, præprimis balsamum sulphuris crassum, quod habet Boyle in *Philos. Experiment. Part. 2. Sect. 1. pag. 166.* item quod *pag. 386.* describitur: item balsamum sulphuris vulgaris tam insignis est commendationis, tam in phthisi pulmonali incipiente, quam in quacunque tabe alia, ex acrimonia imprimis sanguinis, & hinc corruptione & exulceratione visceris cujusdam interni, v. g. pulmonum aut aliarum quarumcunque partium. Præsertim puris acrimoniam non tantum corrigit, sed & nimium ejus proventum optimè coërcet, dertergit atque consolidat. Olea, cum quibus præparatur hoc balsamum sulphuris, ordinariè sunt ℞ *Nat. terebinthinæ balsamicum*, ℞ *anisi*, aut ℞ *juniperi* renibus exulceratis appropriatum, aut ℞ *succini*. Usurpantur hæc balsama sulphuris ā gtt. vj. viij. & x. ad xii. In liquore appropriato vel decocto chinæ aut *sassafras*, aut etiam in decocto quodam vulnerario vel lignorum, aut ex his misto decocto pectorali, ubi ex pulmonum labe in specie oritur atrophia. Misceri etiam possunt hæc balsama cum syrupo de liquiritia & similibus, quæ egregiè temperant nonnihil ejus acorem. Verum cum ignea vis sit in hoc balsamo, ob id in iis, quibus manifestior & gravior est hæctica & nimia sudatio, cautè aut planè non usurpandus; cum observatum fuerit, quosdam ex nimio balsami sulphuris usu hæcticam lethalem contraxisse, quem in finem præparetur cum ℞ *expressio* quodam, & cum tantillo olei *Nati anisi* acuetur.

Etiam cum tali balsamo sulphuris optimo cum consilio jungantur Medicamenta Satur-

Tom. II.

nina, quæ & ipsa effrænatum balsami sulphuris ardorem refrænant. Hinc vel saccharum Saturni, vel *crystalli mineræ Saturni* conjungantur cum balsamo sulphuris, & ita aptius ac convenientius usurpari possunt. In specie autem species dia-Saturni Mynsichtii à quamplurimis contrā tabem singulariter laudari solent; hinc & R antiphthifica D. Michaelis dicta hoc in passu usitata est, in specie ubi adest corruptio viscerum, ulcus pulmonum aut renum, aut similis cujusdam partis, sanè multæ est laudis & efficaciz, dosi xx. gtt. manè & vespere, virtuteque sua adstrictoriā robur simul & firmitudinem pulmonibus conciliat. Post hanc R *lapid. hæmatitis* ā ʒi. guttis & R  $\Delta$ is vitrioli ā guttis xv. xx. xxv. ad xxx. subinde usurpetur, egregium erit remedium antiphthificum. Denique phlegma ℞ *li roridum*, quod nihil participat de spiritu acido corrosivo, cohobatum & digestum cum proprio capite mortuo aliquoties, experimentum est singulare ad phthises & corruptiones viscerum internorum, uti hoc refert Marcus Marci in *Philos. Vet. Restit. pag. 550. §. 1.*

Cæterum locò sulphuris communis legitima remedia sulphurea antimonialia præferenda sunt; unde etiam ℞ *diaphoreticum* à quibusdam insigniter contra phthisin laudatur, imptimis si quotidie cum conserva rosarum manè & vespere usurpetur: Nam & hoc ipsum ad partium exulcerationes, item ad vomicas pulmonum, ad corrigendum & prohibendum pus, laudabiliter administrari solet. Quod si ergò ℞ *diaphoreticum* solum est tam egregium, multò magis conveniet, si combinetur cum  $\Delta$ e  $\Delta$ is, in legitima præparatione antihectici Poterii, quod ā gr. xii. ad ʒj. cum conserva rosarum usurpari potest, cujus continuato usu aliquot phthificos & hæcticos feliciter curavit Poterius, *Cent. 3. Curat. 20.* In specie Pulveres pectorales dicti, quorum basis ut plurimum sunt flores sulphuris, ac pro communi sulphure etiam ejus balsamum, cum *lap. cancerorum*, ℞ *diaphoretico*, antihectico Poterii, & omnibus ex antimonio cum  $\Delta$ e &  $\Delta$ e fixato compositis, præsertim in phthisi confirmata, sunt egregii, v. g.

℞. *lap. ℥ prap.* ʒiʒ.

*flor. Δis* ʒij.

℞ *Nat. terebinth.* gtt. viij.

*anisi* gtt. iv.

*sacchari* ʒʒ. M. f. *Pulvis.*

Item sequens pulvis ad acrimoniam massæ sanguineæ temperandam, utut videatur simplex:

℞. *lapill. ℥ prap.*

*rad. ari cruda vel prap.* ā ʒj.

*ireos Flor.*

(Ecc 2)

*sem.*

*sem. papav. albi* ā ʒß.

*Mastich.* ʒij. M. f. *Pulvis.*

Assumantur quotidie in decocto hederæ terrestris & cherefolii.

*℞. rad. ireos Florent.* ʒiß.

*lap. & prap.* ʒj.

*antib. Poterii* ʒß.

*croc.* ʒj.

M. f. *Pulvis* pro aliquot dosibus.

Vel c. sacch. fiant Rotulæ: S.

### Temperirende Brust-Rüchlein.

*℞. Spec. dia. ireos* ʒiij.

*bol. Armen.* ʒj.

*succ. liquirit. Hisp.* ʒß.

c. sacch. ʒiij. l. iv. in  $\nabla$  *papav. errat.*

solut. f. Rotulæ.

D. S.

### Hust-Rüchlein.

In phthisi contra tussim siccam nocturnam, faucium asperitatem, conceptam earum phlogosin, &c. conducunt.

Item pertinent huc suo modo Rotulæ Cnöffelii contra phthisin; item pulveres Cnöffelii ex sulphure & aliis parati: quorum usum videb. in M. A. N. C. *ann. 6. append. pag. 81.*

Vel *℞. rad. liquirit.* ʒij.

*ari* ʒiß.

*ireos Florent.*

*symp. maj.* ā ʒj.

*gumm. xci in  $\nabla$  sol.*

*benz.* ā ʒj.

c. l. q. in  $\nabla$  *scabios.* sol. f. Rotulæ.

D. S.

### Temperirende Brust-Rüchlein.

*℞. bals. sulph. anisat.*

*terebinth.* ā ʒj.

excipiantur c. l. q. *Conf. scabiosa, & c.*

*sacch. in  $\nabla$  feniculi sol. f. Rotulæ.* l. Morfili:

D. S.

### Brust-Rüchlein.

Hiscæ sanguinis & lymphæ acrimoniam corrigentibus pro scopo temperandi tussim, præsertim diurnam sistendi, & hinc copiosum nimis puris proventum coercendi etiam papaverina & opiata fuerunt anumerata, quæ sunt optima ad temperandam acrimoniam saltem muriaticam. Hinc veteres pilulas de cynoglossâ usurparunt, quæ tamen admodum sunt crudæ, & cum pilulis de styrace coincidunt: moderni verò pilulas de styrace adhibent, quas videb. in Schrederi *Pharm. lib. 2. pag. 252. item* Sylvii pilulæ de styrace *in l. 1. Pr. cap. 20. §. 36.* qui ambram omittit; ubi etiam ex ejusmodi ingredientibus rotulas habet. Succinctæ sunt compositiones, & non contemnendæ in tussi nocturna sicca, & quando ex inclementiore aëre tempore hyberno tussis excitatur, tunc in principio affectus propinentur, & erunt elegantes. Propinantur etiam in sicca tussi

gravidis; temperant enim lympham saltem: Conveniunt quoque opiata optimè in principio tabis & atrophie, ubi nempe præmissus fuerit vomitus, uti etiam in ejus progressu mirabiliter valent sedare tussim nocturnam, uti & sudores nocturnos colliquativos. Largas opii, legitimè per fermentationem parati, doses præ aliis ægris diu sine nocu- mentis ferre possunt phthifici: vid. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Observat. 207. pag. 291.* ejusque usu imprimis diu conservari. Sic aliquando phthifico dedi sequentia:

*℞. Conserv. rosar.*

*heder. terr.* ā ʒj.

*fl.  $\nabla$  is,*

*antibell. Poterii.*

*lap. cancr. prap.* ā ʒj.

*bals. Peruv.* ʒij.

*laud. opiat.* gr. xvj.

c. l. q. *syr. diacod. Montani, vel syr. dia-*  
*ctis Villis.*

f. Electuarium.

De quo æger intra octiduum semper ac- sumpsit, capiendo bihorium ante cœnam bo- nam dosin; cujus usu semper habent melius ægri, tussis remittit, melius dormiunt, manè facilius magisque cocta exspuunt. Sanè hæc opiata quotidie, item essentia opii liquida, successivè ultra tres menses continuata, ci- tra ullam sensilem noxam irritationis sensum sistendo, tussim, item humorum acrium in parte læsa decubitus, & hinc ulteriorem cor- ruptelam & ulcerosum progressum inhibent.

Observandum tamen est, quod in statu, quando difficilior est anhelitus, aut etiam eo in casu, quò multa materia viscida expecto- randa est, uti etiam, ubi purulentia rejicien- da venit per os, cautius usurpentur opiata, aut penitus intermittantur, ne impediatur materię rejiciendæ motus, & ita difficilior respiratio, aut suffocationis inducatur metus.

Tandem ad hæc ipsa remedia alterantia, crasin sanguinis & lymphæ corrigentia, in in- cipiente præsertim phthisi pulmonali, perti- nent etiam decocta lignorum, nempe radi- cis chinæ, ligni lassasras, &c. qualia aliàs in morbis chronicis lymphæ vitio, & inde natis malis seu affectibus catarrhalibus in usu sunt, quibus eò magis felici successu utimur, si morbo ulterius procedente, similia vegeta- bilia vulneraria, fermentum ulcerationis in- choatæ corrigentia, simul addantur.

Præ cæteris hic radix chinæ eminet. De horum decoctorum usu vid. Garanzier *Tract. de Tabæ Anglica*, Alphonsus Ferreus *lib. 2. de Ligno Sancto*, qui etiam hujusmodi decoctis phthificos tantum non desperatos denuò sa- nitati fuisse restitutos refert. Confer etiam Riverius *in Praxi l. 2. cap. 7. item Cent. 1. ob- serv. 35. & 99. & observat. à Fomio Commun. 27. item Cent. 2. observ. 61. & 78.*

Modum propinandi hujusmodi lignorum deco-

decocta optimè docet Arceus *Tract. de Vuln. capitis & febris*; ac Erasius in *Consil. Schol. zii No. 88*.

Præ cæteris tamen, præter radicem chinæ, lignum sassafras eminet propter vim aromaticam, & quod in affectibus à lymphâ viciosa ortis specialiter convenit. Sed si ritè sibi volunt consulere tales ægri phthistici, alio potu non debent uti, quàm ejusmodi decocto. Huc facit etiam decoctum elegans ex sassafras & vulnerariis Poterii *C. 2. Cur. 99*. Quibus tamen lignis ulum santalorum, speciatim rubri & citrini, quidam substituunt: quorum decocta eodem modo atq; decocta Guajaci parata, & remove pulmonum erosionem, & eandem factam tollere, asserit Fonseca *lib. 1. Cons. 58*. & conveniunt tam in tabe ex acrimonia sanguinis & lymphæ simplici, quàm quæ jam cum ulcere pulmonum conjuncta est.

*℞. ras. ligni sassafr. benè odor. ʒij.*  
*rad. china in taleol. incis. ʒj.*

Macerate in l. q. ▽ in MB. per ʒ 8, & ebulliant ad consumptionem tertiæ partis:

Colatura adhuc calenti infund.  
*passul. min. contus. ʒij. l. iij.*  
adde

*syr. fl. papav. errat. vel papav. simpl.*  
*l. de jujub. q. s. pro grato sapore.*

D. S.

### Trankt gegen die Schwindsucht.

De hoc calidè semper manè, à meridie & circa vespertam cubitum iturus capiat haustum. Optimum est in phthisi non admodum confirmata.

*℞. rad. china in taleol. incis. ʒij.*  
*fl. papav. errat.*  
*beton.*  
*scabios. à MB.*  
*passul. maj. enucl.*  
*min. à ʒj.*

c. s. q. ▽ comm. coqu. colatura edulcoratur, addendo

*syr. papav. rhaad. parum.*

D. S.

### Brust-Trankt auff etliche mahl.

Aliquândo in tussi pulmonali phthisin minitante cum successu præscripsi:

*℞. ligni sassafr. ʒj.*  
Maceretur in  
▽ comm. mens. ij. adde  
*HB. hedera ʒstr.*  
*scabios.*  
*pulmon. maculos. à Mij.*  
*sem. anisi.*  
*feniculi à ʒß.*  
*rad. liquirit. ʒij.*  
*passul. min. conquassat. ʒj.*

Coqu. ad tertias:

Colatur. D. S.

### Hust-und Brust-Trankt auff etliche mahl.

Edulcorationis gratia sint syr. consolidæ maj. agrimonie, chærefolii, scordii, nicotianæ, liquiritiæ, enulæ &c.

Item cuidam perfectè phthifico præscripsi:

*℞. lign. guajac. ʒij.*  
*cor. jussd.*  
*rad. chin. incis. à ʒj.*  
*rad. enul.*  
*bardan. à ʒij.*  
*bacc. junip. ʒij.*  
*HB. veron. Mij.*  
*heder. ʒstr. Mj.*

Incisa macerentur in lb. xij. ▽ simpl. per 24. horas: coqu. ad dimid. addendo in fine coctionis

*sem. anis.*  
*fenic. à ʒß.*  
*rad. liquirit. ʒj.*

Colatura detur.

Capiebat omni manè bonum haustum in lecto, expectando aliqualem sudorem, addendo simul gutt. xij. bals. ʒis terebinth. unicuique haustui: vespertinò verò tempore remedia cum opio usurpabantur, sed minus, cum hecticâ æger affligebatur.

Melius fit, si cum ligno guajaco santalum decoquatur, vel etiam loco illius lignum sassafras sumatur; egregiè enim alterat lympham nimis acidam scorbuticam.

*℞. rasur. ligni juniper. ʒij.*  
*sancti ʒijß.*

Macer. per 24. horas in l. q. ▽ & manè coqu. ad consumpt. medietatis, in fine addendo: *passul. min. conquassat. ʒj.*

De colatura clarificata ter in die bibatur bonus haustus absque sudore.

Parant quidam essentias pectorales ex his vegetabilibus, quò pertinet elixyr pectorale D. Michaelis, essentia helenii, quibus addenda essentia croci; sperma ceti à ʒß. ad ʒß in ovo sorbili, omni manè assumptum, admodum convenit in temperanda acrimonia massæ sanguineæ, & curanda phthisi.

Cætera huc facientia, nempe species diatreos, dia-tragacanthi, pulvis Haly contra phthisin, ceu ubivis nota, in medio relinquo. Pertinet huc electuarium illud expertum antiphthiticum, quod M. A. N. C. *Ann. 6. Observat. 95. pag. 134.* habent. Pertinet & huc denique conserva, seu ut alii vocant, saccharum rosatum inveteratum, *der Rosenzucker* à pluribus adeò decantatum: ac sanè alcali nonnihil stypticum in floribus rosarum rubrarum est egregium, pluribus scopis, ad acrimoniam præsertim succorum corrigendam, & viscerum tonum conservandum, inserviens. Præ cæteris convenit ea, quæ exstat in dispens.

(Ecc 3)

Lon.



Londinensi, & in tabe ac phthisi incipiente egregiè convenit. Sed saccharum junctum non æquè omnibus proficuum, & hujus ratione nociva quibusdam observata fuit conserva: vid. Sylvius ubi *de phthisi* §. 187. Aliàs à pluribus expertum est remedium, de cuius efficacia vid. Forestus *l.* 16. *Observ.* 58. Valeriola *l.* 5. *Observ.* 5. & Sylvaticus *Cent.* 2. *Conf.* 40. Usus est, ut conserva antiquissima vel crebrius pro lubitu usurpetur, vel vespertino præsertim tempore ad ʒj. cum ʒss. ʒæ sigill. vel lap. hæmatit. hora j. ante cœnam usurpetur. Peculiare quid etiam in bolo Armena later, unde nec inconvenienter permisceri potest cum floribus sulphuris, terra sigillata, ʒio diaphoretico, radice ireos Florent. aliisvè similibus pectoralibus, & cum conserva rosarum electuaria parari possunt. Nasturtium Indicum cum conserva rosar. assumptum admodum commendatur, & dicitur fuisse remedium Doct. Mœbii Jenensis. In usu quoque sunt conserva vegetabilium vulnerariorum, v. g. hederæ terrestris, quæ potenter expectorat: item herbæ costæ. Decoctum pulegii à quibusdam tanquam expertum contra phthisin commendatur, cui additur simul succus hederæ terrestris, & infusum nasturtii Indici. In specie pulveris fungorum salicis in plenilunio mense Maji collectorum ʒss. cum hac conserva crebrius usurpata, tanquam expertum arcanum à quibusdam singulariter laudatur. Nempe spongiæ istæ viridiusculæ in salice superius interdum adnascens exsiccantur in sole, pulverisantur, & ita cum conserva majoranæ vel veronicæ sub forma electuarii contra phthisin usurpantur: Vid. Velschius *Mistomim.* C. 2. *Observat.* 60.

Quæ læsionem partis, præsertim ulceratæ, respiciunt, sunt ea, quæ fermentum acidum partis plus minus ulceratæ corruptivum corrigere; & ita puris ulteriorem proventum inhibere valent, adeoque detergentia & mundificantia appellantur. Hinc usurpentur ea, quæ naturæ opus in consolidando loco læso adjuvent, quantum possibile. Hæc inter excellent vulnèria dicta, quorum alcali pluribus usibus in phthisi curanda inservit, si præmissis præmittendis usurpentur, in specie si ventriculi, ac primarum viarum & his in locis, principalioris assumptorum alterationis, habeatur ratio. Hinc decoctum bugulæ seu consolidæ mediæ admodum commendat Poterius in *Pharmacop. Spagyrica* ad ulcera pulmonum curanda. Decoctum verò symphyti & prunellæ cum china & Guajaco laudat Lindanus, assumendo in quolibet haustu dosin ʒ diaph. florum ʒis, antihectici Poterii, &c. De ulmaris vi traumatica, ejusque ʒ Natæ in phthisi usu, vid. Velschius *Mistomim.* C. 1. *Observat.* 60. Rorem ʒis, ac ejus

guttulas non pauci specificè commendant. cum hæc plantula rore limpidissimo referta sit, illius etiam sub ardentissimo solis ardore; unde etiam eam humectare & rorem nutritivum restituere putant. Hinc & scabiosa, hypericon, helenium, sanicula, consolida major & minor, prunella, veronica, hederæ terrestris, pilosella, cherefolium, plantago, vinca pervincæ, equisetum, flores rosarum, & similia, tam in decoctis, quàm inde paratis pulveribus, aut cum saccharo & melle electuariis, in usu sunt. In specie, ubi acrimonia pulmones erodere incipit, 4. hæc vulneraria, ut scabiosa, veronica, hederæ terrestris, & cherefolium, vel solitariè, vel cum decoctis lignorum, usurpata & crebrius hausta partim possunt diu conservare, partim & restituere phthificos. Quibus in scorbuticis, apud nos familiaribus, sub finem decoctionis infundendæ sunt plantæ antiscorbuticæ, quæ sunt nasturtium, plantago aquatica, trifolium aquaticum, & similia. In specie si læsio pulmonum facta sit à causa externa, sola decocta vulneraria sufficient, si sc. omni haustui aliquid additur balsami sulphuris, vel spermatis ceti ʒss. Exempli gratiâ sequenti decocto Chirurgus quidam Stetinensis gravi phthisi laborans per multos annos se sustentavit:

ʒ. HB. alchimill.  
pulmonar. macul.  
sanic.  
cent. min.  
Veron.  
auric. mur.  
vinca pervinc.  
flor. hepat. à Mj.

Coqu. in cerevisia benè defacata.

De colatura bibit manè jejunè, item ante prandium, & ante cœnam cubitum iturus.

Vel ʒ. HB. veron.  
alchimill.  
heder. ʒss. à Mj.  
scabios.  
cherefol. à Miß. l. Mj.

Coqu. inf. q. cerevis. defecata.

D. S.

Brust-Tranf.

De quo decocto æger omni manè bonum haustum capiat, cujus haustibus addatur semper vel elixyr proprietat. tam simplex, vel antiscorbut. gtt. 30. l. 40. vel gtt. viij. de balsamo sulphuris, vel sperm. ceti ʒj. ad ʒss.

Vel ʒ. ess. g. ʒci ʒiiij.

R ʒis ʒj.

M. D. S.

Brust-Essenz.

Continuandæ sunt hæc doses aliquandiu, donec exactè immutetur dyscrasia lymphæ.

Vel in phthisi pulmonali nondum inveterata,

ʒ. HB.

℞. HB. heder. ʒssr.  
 charesfol.  
 veron. ʒ Mj.  
 rad. enula ʒiʒ.  
 Ireos Florent. ʒj.  
 sem. anisi ʒiij.  
 fanic. ʒij.  
 ficum no. iv.  
 passul. min. ʒiʒ.  
 rad. liquirit. ʒvj.  
 M. D. S.

## Species zum Brust-Tranf.

Potest ex his fieri infusum, vel decoctum, ex decocto cum saccharo syrupus, aut cum melle hydromel pectorale, & similia alia.

Apud nos pluribus in frequenti usu est sequens farrago, quæ feliciter pluribus cessit, magis tamen ad phthisin pulmonalem inclinantibus, quam perfectè phthisicis: siquidem ob alcali herbarum vulnerariarum aliorumque ingredientium vis alterativa in corrigendis corporis contentis & confirmandis visceribus non contemnendi usus est:

℞. HB. pulmonar.  
 veron.  
 fol. senn. ssi. ʒ M. j.  
 HB. salv. rec.  
 hepat. nob.  
 hyssopi ʒ M. ʒ.  
 flor. hepat. nob.  
 rad. polypod.  
 torment.  
 liquirit. ʒ M. j.  
 sem. anisi  
 fanic. ʒ Mij.

Incis. & contus. coqu. in f. q. ∇ fontan. additis cochlearibus duobus mellis:

De colat. lbvj. l. viij. mane & vespri bonus haustus assumitur.

Faciunt huc pulveres antiphthisici, imprimis pulvis antiphthisicus D. Erbenii:

℞. visc. pyror.  
 salv. ʒ ʒj.  
 pulmon. maculos. l. *Consolida med.*  
 veron.  
 fl. tussilag. ʒ ʒʒ.  
 rad. enula ʒij.  
 sacch. cand. allif. ʒij.

M. f. Pulvis. Dosis ʒj.

Pertinent huc electuaria quorundam, imprimis tamen exsecrationi inservientia, expulvere scordii, salviz, rad. Helenii, &c. cum melle ad electuarii consistentiam redactis. Sed cum his vulnerariis modò recensitis in specie simul usurpanda sunt balsamica, quantum hæctica plus minùs juncta eorum usum ferre potest, adeoque in præservatione phthiseos conducunt: qualia sunt aloë, myrrha, balsamus sulphuris terebinthinatus, & similia; item ʒ diaphoreticum, vel antihecticum Poterii, &c. c. g.

℞. HB. salv.  
 scordii ʒ Mj.  
 Pulverisatis adde  
 Myrrh.  
 ʒii diaph. ʒij.

c. f. q. mellis, vel pulp. passul. rec. f. Electuarius spissum, irrorandum cum balsamo ʒi l. terebinthinato, vel anisato.

D. S.

## Brust-Lattwerge.

Vel balsami Peruviani gutta, aut plures cum saccharo aut floribus ʒis in pilulas redactæ, aut etiam guttatim ad gutt. viij. l. x. manè in jusculo, vel vehiculo calido, aut vitello ovi sorbilis dissolutum balsamum, & quotidie usurpatum, multum laudatur in phthisi & tabe, & ad qualvis partium læsiones & exulcerationes: Vid. M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 77. Huc pertinet balsamus Peruvianus Domini D. Dolæi in *Encyclopædia Medica de phthisi* descriptus; hinc & Riverius multum commendat has pilulas contra phthisin cum balsamo Peruviano:

℞. MP. Ruffi ʒj.  
 ʒii diaph.  
 g. Guajaci ʒ ʒʒ.

c. f. q. Balsami Peruviani, f. Massa.

Dosis ʒj. capiatur per mensem integrum.

De terebinthina res nota est, quantum vi balsamicâ in quibusvis partium internarum exulcerationibus valeat, quâ detergit & purificat; optimè datur in ovo sorbili jeuno stomacho, à ʒʒ. ad summum ʒj. vel sola, vel addito modico florum sulphuris, ut sit convenientior in ulcere, continuando aliquandiu; item permisceri solet eadem cum melle violato, recipiendo

terebinth. ʒʒ.  
 mell. violat. ʒij.

M. cum paucis vitello ovi.

de quo capiat æger omni mane quantitatem castaneæ in jusculo calido.

Alii terebinthinæ ʒʒ. cum melle rosato & syrupo heder. ʒssris vel nicotianæ miscent, & in forma boli subinde assumendam suadent.

Sed nimis ingratus hic ejus est usus; omnium optimè in vitello ovi dissoluta capi potest: Vid. Velschius *Micromim. l. a.*

His peractis demum ad lac accedendum, vid. Lotichii *Observ. pag. 239. & 253.* Rodericus à Fonseca l. a. & Marcellus Donatus *Histor. Med. Mirab. lib. 3. cap. 10.*

Quidam in phthisi salia volatilia commendant, in specie sal volatile & spiritum sanguinis humani rectificatum, quem in phthisi hæreditaria & desperata mira præstitisse Boyle testatur; sicut Monsi. le Febvre in *sua Chymia P. I.* commendat sal volatile cornu cervi ejusque spiritum, supra balsamum sulphuris digesta & tineta. Alii spiritum formicarum, alii Mercurium microcosmicum,

ut

uti vocant, id est, spiritum & sal volatile urinæ, contra phthisin commendant: imprimis si moderatè acido in tertium ammoniacale mutetur, & ad guttas vj. vel viij. propinetur. Sed verum ut fatear, in tabe confirmata & exulceratis visceribus nullo modo convenit, nisi saltim in ea, quæ ex defectu distributionis chyli, ac post morbos chronicos; verum in inveterata hæc non sufficiunt, nec tamen nobiliora prostant remedia.

Quoad symptomata, in phthisi mitiganda: Tussim quod attinet, præsertim ferinam, hanc mitigant optimè suprâ laudata opiata, quæ ipsa etiam sudores nocturnos colliquativos satis molestos cohibere solent, absorbentibus appropriatis juncta: hinc aliquando phthifico perfecto seu confirmato præscripti sequentes pilulas:

℞. *Antihæc. Poterii* gr. xv. ad ℥j.  
*sacch. hni* ℥ss.  
*extract. croci* gr. iv. v. l. vj.  
*laud. opiat.* gr. ij. l. iv.

c. f. q. *Balsami Peruviani* f. de *Capaybe*, f. Pilulæ pro duabus: quarum una quæq; dosibus: vesperi duabushoris ante cœnam sumatur: sub usu earum æger semper hilarior reddebatur, sudore nocturno & tussi istâ nocte cessante:

℞. *arcan. dupl.* ℥ij.  
*lapill.* 69. *prop.*  
*antihæc. Poterii* ℥ss.  
*laud. opiat.* gr. iv. l. v. M.

Div. in 4. partes, singulis diebus duabus horis ante cœnam capiendas.

Tussim catarrhalem siccam, & à tenuitate aut acrimonia humorum, in specie vesperinam aut nocturnam plus minus siccam, mitigant lenientia, aut si à materia tenaci & firmius impacta fuerit, expectorantia. Quibus & jungi possunt papaverina & opiata, v. g. pilulæ de styrace ac cynoglossa, utpote quallium usu sæpius satis diu conservari possunt phthifici, earumque etiam dosin satis largam sine damno ferunt: vid. M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *Observ.* 207. ita tamen, ut cum expectorantibus alternent.

Vel pro usu vespertino:

℞. *succin. prop.* ℥ss.  
*Myrrh. elect.*  
*volat. succin.* ℥ gr. v.  
*laud. opiat.* gr. j. l. ij.

c. ess. *myrrh.* l. 30. *Nat. succin.* f. *Pilula. D. S.*  
*Abend-Pillen zum Husten.*

℞. *Extr. Æis pulveris* gr. xii.  
*myrrh.* gr. v.  
*extract. croci* gr. iij.  
*laud. opiat.* gr. i.

c. essent. *Myrrh.* f. *Pilulæ vesperi* capiendæ.

℞. *scabios.* ℥ij.  
*syrup. scabios.* vel *veron. l. ros. fol.* ℥j.  
*diacod. Montani* ℥ij. M.

℞. *rad. ireos Florent.*

*fl. Æis* ℥ 3j.

*℥ii diaphor.* ℥ss.

*laud. opiat.* gr. ix.

*Nat. fœnic.* gtt. xii.

M. f. *Pulvis* pro aliquot dosibus.

℞. *lapill.* 69. *prop.*

*fl. Æis* ℥ ℥ss.

*laud. opiat.* gr. ix.

*30. destillat. fœnic.* gtt. j. M.

℞. *sperm. ceti* ℥j.

*fl. benz.* ℥ss.

*30. destillat. succini* gtt. iij.

M. f. *Pulvis* pro 2. dosibus.

Theriacam autem fugiant patientes: nam utut opium in theriaca fermentetur, attamen, quia medicamenta acria copiosa ex seminibus & aromatibus habet admixta, excitat fas sudores nocturnos.

Quoad symptomata in scretu, equidem nicotiana, & quævis ex ea parata, sunt optima. Heurnius in *Praxi* solo syrupo ex succo ritè parato quosdam tabidos phthificos restitutos fuisse memoriæ prodidit. Certè ad ulcus pulmonum abstergendum & sordes acres plus minus viscidas pectori inhærentes eliminandas, optima sunt ex tabaco remedia, quæ præter vim expectorandi vulnerariam quoque possident. Nam proxima via pulmonibus curandis est per asperam arteriam; hinc tot fermè prostant electuaria antiphthifica, quot ramuli arteriales & venales, qui tamen sunt innumeri. Formulæ fiant tales:

℞. *HB. botrys*  
*malva* ℥ Mj.  
*rad. liquirit. ras.* ℥j.  
*alsh.*  
*cichor.* ℥ ℥ss.

Coq. in f. q. *Colat.* *℥biß.* adde  
*Lob. de farfar.*  
*syr. de Nicotian.* ℥ ℥ij. l. iij.  
M. S.

*Rösender Brust-Trans/Röselweise.*

℞. *Conserv. heder.* ℥str.  
*scabios.* ℥ ℥ss.  
*rad. cichor. cond.* ℥vj.  
*pinear. rec.* ℥ss.  
*ebor. f. Æe* ℥j.  
*antihæc. Poterii*  
*fl. Æis* ℥ ℥ss. l. ℥ij.

c. f. q. *syr. Nicot.* f. *Electuarium:*  
D. S.

*Rösende Brust-Lattwerge einer Castanien*  
*groß auff einmahl.*

Pariter si sputum multum ac fœtidum fuerit, mel & myrrha scretum promoventibus semper addenda erunt.

Adjuncta febris, curatur per absorbentia, imprimis terrea: Sic ex mineralibus est antihæcticum Poterii, & diaphoreticum, crystal- lus præparata, & absorbentia nota: c. g.

℞. *rad.*



℞. radic. altheæ  
cichor. ā ʒj.  
flor. malv.  
scabios. ā M. j.  
tamarind. ʒvj.  
sebesten. No. viij.  
Coqu- in f. q. ▽ bord.  
Colaturæ adde  
lapill. ʒ. prap. ʒij.  
ʒii diaphor. ʒij.  
ʒyr. violar. solut.  
flor. papav. errat. ā ʒij.  
M. D. S.

Kühlender Lungen-Trank.

℞. Lapill. ʒ. prap.  
Antihel. Poterii ā ʒij.  
M. f. Pulvis.

Div. in 3. part. æqu. S.

Kühlendes Pulver auffdrey mahl.

Diarrhœa colliquativa, si quæ supervenerit, utut ferè mali sit ominis, absorbentibus, & sigillata, cornu cerviusto & similibus inhibetur, vitando tunc, quantum possibile est, mellita, faciliè alias alvum moventia. De suffitibus, odoramentis & similibus nil attinet dicere. Conferatur suprâ laudatus Bonnetus.

Quoad dietam, ut ritè formetur, imprimis ventriculi, ejusque virtutis digestivæ & hinc dictaminis appetitus habenda est ratio. Hinc alimenta probè nutrientia, copiosum alcali, quodvis acre temperans, suggerentia, & quæ succum minus alterabilem, sed potius glutinosum, roridum, necfaciliè exhalabilem suggerunt; hinc cancri, ostreæ, &c. subinde utiles phthisicis, observatæ fuerunt. Præ cæteris lac, & quælibet lacticia, ubi cætera ritè præmissa fuerint, & dyscrasia contentorum maximam partem correctâ, convenientissima sunt.

Præterea ad dietam, passularum earumque rob crebrior usus, & ova sorbilia, sunt optima: à potu quoque copiosiore, quantum fieri potest, ægri abstineant, ne serum copiosius generetur: vid. Willisi *Pharm. Rad. Part. 2. Sect. 1. cap. 6. pag. 105.* Ex vinis verò dulciora seligant, v.g. Malvaticum & Alacanthinum: vid. Sylvius *de phthisi* §. 222. Ipse potus ordinarius phthisicorum hectico- rum commodissimè conditus sit fumo ʒis, ad imitationem Helmontii; qui potus sulphurati ad curam phthiseos sunt singulares: Imò & fumus ʒis cum aliis per os attractus singulare est experimentum cujusdam Medici Hybernici, quò aliquot desperatos phthisicos curavit, uti refert Boyle *in Philos. Experiment. pag. 277.*

Ratione aeris saluberrimus videtur phthisicis siccus & serenus, nisi planè emaciati & exsiccati fuerint; vid. Sennerti *Praxis lib. 2. Part. 2. cap. 12. pag. 215.* & Mayerne *de Arthritide pag. 24.* aut si crassius, exhalationibus

tamen sulphureis refertus fuerit; quamvis non omnibus æquè phthisicis idem aer proportionatus observetur: Vid. Willisius *l. 4. pag. 85. 86. &c.*

Sunt qui etiam transplantationis medio curare satagunt atrophias. Modus vid. in Hartmanni *Praxi Chymiatr.* ubi de atrophia. Nempe ovum in urina ægri coquitur, post nonnihil apertum in acervo formicarum sepelitur; sic atrophiam laborantes curantur. Quod & non tantum D. Michaelis aliquoties cum successu expertus fuit; sed præterea quoque Medicus veteranus in Anglia atrophiam correptus se ipsum curavit hoc modo; uti refert Boyle *in sua Philosoph. Experiment.* Item cum unguento armario, vid. Schmuckius *in Curat. Magnet. pag. 59. item Paracelsus de Rebus materialibus.* Plinius *l. 8. cap. 32.* dicit: si quis tussiculofus in parvæ ranae, arbores scandentis, os exspuat, ipsamque dimittat, à tussi liberatur. Simile est, quod de equi saliva Sextus Marcellus scribit: si equi salivam phthisici biberint, aut qui male tussunt, sani efficiuntur, equus autem moritur: Vid. Caspar à Reyes *in Campb. Elys. Quæst. 53. pag. 666.*

### ARTICULUS III.

De

#### Aridura Partium.

**A**Trophia seu tabes particularis cujusdam partis seu membri determinati; quæ aliàs aridura partium, das Glieder-schwinden/ dicitur, ea est nunc internarum, nunc externarum. Internarum partium aridura, uti cognitu est impossibilis, ita sub curam nunquam cadit, nisi suspicio fortè sit pulmonum aridorum: de quibus Sylvius *in Praxi cap. 20.*

#### C A U S Æ.

Externarum verò partium aridura seu atrophia particularis externa duplicem causam agnoscit: nempe quod defectus sit sub nutritione; vel in ipso nutrimento, quod deficit in parte; vel in errore ipsius partis nutriendæ, quæ nec recipit, nec agglutinat nutrimentum. Rarius observatur in quadam parte à causa interna, sed ut plurimum præcedentem quandam occasionem ea sequitur externam. Deficit nutrimentum, quando nempe tam sanguis propriè dictus, quam chylus, non affluit in partem nutriendam determinatam, propter quoddam impedimentum, propter vasorum, arteriarum in specie ad eam tendentis læsionem & compressionem ex distensione, luxatione, fractura, tumore duro, vinculis & similibus impedimentis. Rarissimè tamen ex hoc principio oriuntur atrophie particulares, vel ariduræ: motus enim massæ sanguineæ per arterias est vehemens, ejusque insignis per tenues porulos quosvis & angustias penetratio, ut in vasis capillaribus manifestum est.

(F ff)

Po-

Potius ergo fit aridura vitio ipsius partis debilitatæ: nempe vitium subest vel partis non recipientis, vel non retinentis, vel non assimilantis, vel non agglutinantis nutrimentum: Id quod frequenter fit, si pori nimis angustantur, & fibræ exarescunt ita, ut pars fiat inepta, ut nequeat alimentum aut recipere, aut retinere, aut commodè agglutinare. Debilitas hæc dependet à spiritu vitio, animali nempe influo, & hinc insito, qui ceu agens se habet in nutritione, & alimenti appositione. Debilitatur autem spiritus insitus in manifesta partis & membri cum vulnere ac ulcere læsione, quando v. g. in vulneribus vasa ad ea tendentia rumpuntur, nutrimentum partis copiosius effluit, aut per ulcera id copiosè in pus mutatur, & ita cum succo nutritio influo simul spiritus influus absumitur, à quo spiritus insiti conservatio & vigor dependet, pars arefcit, ac difficulter postmodum restitui potest. Usu hoc venit præsertim in articulorum profundis vulneribus, & hinc aliarum partium nervosarum similibus læsionibus, quibus copiosior sinoviz fluxus sæpius supervenire solet, ita enim intercipitur nutrimentum, & sub forma puris vel sinoviz excluditur. Nam sinovia nihil est aliud, quam liquor chylosus nutritius, in parte nutrienda occasione vulneris, plus minus ad ulcus tendentis, degenerans in liquorem saniosum & aquosum, sub qua degeneratio- ne acorem occultum contrahit, ut exinde vulnera ista partium non solum insigniter contumacia, ac simul, periculosa fiant, sed simul partes istæ læsæ, dum destituuntur convenienti nutrimento, necessariò arefcant. Unde fibræ exsiccantur & contractæ poros partis angustant, eosque magis connivere ceu quasi subsidere faciunt; ipso verò spiritu insito plus minus labefactato, nutrimenti convenientis assimilationi impar redditur. Unde sanato licet vulnere seu ulcere, nihilominus tamen pars difficilè & tardissimè denuò nutriri potest, quin potius sæpius pertinax & contumax aridura sequitur. Quin & cum debilitata dicto modo pars minus robusta sit, atque alia ipsi respondens, propterea facilius ac sensibilius ferè externorum objectorum impressiones recipit, unde tales ægri, restituti licet, tamen qualvis aëris mutationes in loco antea læso mox perferunt. Dein alterum vitium latet in spiritu animali, qui per nervos ad partes distributus agentis vicem sustinet, ita, ut mediante hoc nutrimenti agglutinatio & assimilatio peragatur; si enim debilitantur in aliis partium nervosarum læsionibus, sine aperta licet continui solutione, his tamen debitus motus spiritus influui plus minus inhiberi potest; hinc paralyces apoplexiam sequentes, convulsiones articulorum, & hinc compressiones &

distorsiones nervorum ac tendinum, item horum ipsorum dislocationes, post luxationes & fracturas ossium, &c. Vid. Hildanus *Epist.* 90. & *Ichor. ac Melicer. c.* 24. à quibus ipsis, externis licet, & apparenter parvi momenti læsionibus, propter spiritus animalis influui impeditum plus minus radiosum influxum pars in motu successivè debilior, cum sensu quodam stuporis ac formicationis successivè flaccidior, & plus minus tabida quasi redditur, postmodumque atrophiam particulari corripitur: uti & cicatrices in locis articulorum factæ ad eam disponunt, quatenus per has partes nervosæ & tendinosæ non rectè coeunt, adeoq; spiritus animalis intercipitur; unde à gangliis atrophiz particulares observatæ fuerunt: vid. Plateri *Praxis Tom.* 3. pag. 208. & 221. Wurzii *Chirurgia Part.* 2. *Observ.* 79. Quò faciunt casus ab alto, contusionesque partium, imprimis circa articulos, & quæ sunt aliæ causæ successivè inferentes ariduram partium, pertinent huc denique defluxus catarrhalis, quando videlicet sine ulla causa manifesta, saltim ob lymphæ catarrhalis decubitus in quandam partem, ejusque articulationem, & inde fibrarum ac tendinum paralyticam plus minus resolutionem, cum sensu doloris obtuso, præsertim vespertino ac nocturno tempore ingravescente, pars successivè ad atrophiam particularem disponitur. Qua ratione non rarum est, in arthritide vaga scorbutica, aut etiam in aliis arthritidis speciebus, partem, quæ sæpius aut gravius affligitur, debilitari successivè, flaccescere plus minus ac tabescere.

### DIAGNOSIS.

Signa hujus ariduræ particularis per se patent: causæ, cum semper aut ut plurimum sint externæ, ex relatione ægri expiscandæ.

### PROGNOSIS.

Omnes hæc ariduræ difficiles sunt curatu, idque eò magis, quò magis confirmatæ ac inveteratæ. Præ cæteris tamen optimè de hoc negotio scripsit Felix Wurzius in *der Wund-Ärney/Tract. von den Zufällen der Wunden/c.* 19. & 23. p. 580. Post hunc vid. Agricola in *Chirurgia parva* pag. 315.

### CURA.

Quoad Curam: hæc eò sit directæ, ut promoveat spirituum animalium, & hinc simul massæ sanguinæ ad partem læsam influxum, quò reparetur sufficiens nutritio, sanguinis quidem, & mediante eo nutrimentum advectum agglutinetur.

netur. In specie habenda est ratio causæ occasionalis, quæ introduxerat atrophiam: sc. attendendum est, an cum solutione continui, & effluxu spirituosæ nutritimenti inducta fuerit aridura? an verò à sola læsione, sine continui solutione, sive hæc à vi externa, aut paralytica passione facta fuerit, sive ab interno lymphæ acidæ decubitu? nam si prius obtinet, si v. g. successivè ex vulnere subsecuta sit atrophia particularis, remedia magis temperata, pingua, adeoque, uti vocant, moderatè calefacientia, sed probe humectantia, & humore roscido oleoso partem perfundentia, adhibenda hic sunt: sin posterius, actiora, & partem læsam irritantia, ut vocant communiter, calefacientia & facultatem attracticem simulantia, hic conducunt, ut ita sensibilius afficiendo sensum tactus, spirituum uberior radius, humorumque copiosior affluxus, ita in parte conservetur, & inducta conviventia pororum cum blanda frictione restituantur; unde in atrophia post vulnerationes artuum membrum in sanguinem bovis modò macerati immittitur. Posterius verò si fuerit, si nempe sine vulnere contigerit, cum internis seu sudoriferis externa discutientia & resolventia conveniunt. Cæterum catholicum ad quasunque particulares ariduras remedium arcanum aluminis, quod specialiter commendat Felix Wurzi in *Chirurgia citato loco*, uti etiam Agricola. Wurzius describit hujus arcani præparationem clarè quidem, interim selectus in alumine habendus, quod non vulgare illud rupeum, sed plumeum sumendum. Aliàs vocatur Germanicè *das Federweiß* / uti vocat Wurzius aliquo in loco, quod ipsum amianthi species est. Hoc plumeum, minusque pungens accipiat, juxta illius descriptionem, & cum ana salis fusi fundatur forti igne in crucibulo, ut refrigerata condensentur in lapidem, cui affundatur postmodum ∇ fontana, à qua resolvitur sal, alumen verò ad fundum subsistit. Hoc arcano feliciter omnes ariduræ possunt curari, si nempe illud debitâ dosi misceatur tuo linimento, vel unguento, & cum pinguedine humana, aut aliis appropriatis, vel oleo laurino, vel spicæ subigatur in formam linimenti; vel destillatur oleum ex pinguedine humana vel ursina, quod fit, quando mista cum cineribus vitis destillatur. Addantur hujus ℥iv. Agricola docente, ℥i℥ olei Philosophorum, & misceantur hæc cum arcani istius aluminis ℥iij, illoque fricentur membra arefcentia. In specie autem, si ab effluxu nutritimenti aut sinoviarum post vulnera insigniora sit aridura, conveniunt foci partis cum decoctis emollientibus, malvæ, althææ, seminis lini, capitis & pedum vervecis, aut ex animalium partibus, v. g. ex capite, pedibus, pulmone & hepate ovi & agni, &c. donec ab

Toni. II.

ossibus abscedant caro & omnia, quæ adherent, quæ separata ulterius in ∇ ipsa coquantur, & cum hoc decocto membrum lavetur & foveatur. Postmodum fiat litus ex pinguedine hominis, vulpis, castoris, equi, cati sylvestris, ursi, canis, lupi & taxi, &c. Vel in specie fiat unguentum ex

*pingued. ardeæ.*

*ranar. ʒij.*

*porcellor. ℥iij.*

& facto litu calido applicetur emplastrum ex cera & pinguedine porcina: Conf. Felix Wurzius.

Item convenit succus lumbricorum cum oleo amygdalarum dulcium mistus, si membrum eodem fricetur. Quod si verò ex paralyti, contusione, &c. sequatur aridura, remedia externè irritantia & vellicantia convenient, quæ nempe partem læsam variè vellicando, spirituum sanguinisque & consequenter nutritimenti affluxum promoveant. Hinc ordinariò laudantur frictiones cum urticis recentibus, quod evporiston succedit, si nempe aridura est citra læsionem manifestam à vulnere factam, sed ex compressione saltem tendinum; sicut ipse exempla hac ratione curatorum pedum aridurâ laborantium novi. Post frictiones partium deorsum versus institutas, arcanum aluminis Wurzi cum linimentis & pinguedinibus appropriatis subactum usurpetur, ut jam dictum. Quod si verò deficiat arcanum hoc aluminis, linimentum ex alumine plumoso, pulvere sabinæ, oleo laurino, juniperino, & similibus dictis, prout à Wittigio sequenti modo describitur, usurpetur: c. g.

*℞. pingv. taxi*

*℥o laurin. ℥iv.*

*bacc. junip. ℥j.*

*spica ℥j.*

*pingued. porcine. ℥iv.*

His omnibus ad ignem probè calefactis adde

*sem. urs. ℥j.*

*pulv. sabin. ℥ij.*

*alum. plumos. ℥℥. M.*

Quibusdam tanquam secretum commendatur hæc ∇ cum vino destillata ex semine urticæ, radice armoraciæ, & similibus, prout describitur ab Agricola *l. c. item* à Schmuckio *Thesaur. Med. Secret. 50.*

Et hæc quidem conveniunt, si affluxus nutritimenti impeditur.

Præter quæ remedia, si non confirmata aridura, etiam sufficiunt pro fricatione medicamenta ordinaria, nempe ex lumbricis terrestribus paratus spiritus ac litus, aut succus eorum cum oleo amygdalarum dulcium subactus: Quæ ipsa etiam locum habent, si ex defluxu catarrhali doloroso aridura superveniat. In quo casu, præter sudores internis concitatos, optimi sunt spiritus formicarum & lumbricorum terrestrium cum paucis spi-

(Fff 2)

ritu



ritu vini, addito alcali fixo per retortam destillati & rectificati; vel aquæ articulares cum pauco spiritu  $\Theta$ is  $\times$ ci cum calce viva, aut cum oleo saponis imprægnata, ita applicentur imprimis liquor lumbricorum terrestrium p. d. in clibano paratus, prout describitur à Mœllen-Broccio *de Varis*, pag. 270. cum usu applicari potest. Item conveniunt oleum lumbricorum terrestrium, nardinum & costinum, & omnia olea nervina composita, cum oleis  $\delta$ atis juniperi, lauri, ceræ, saponis, unguentis nervinis, e. g. Agrippæ, nervino Augustanorum, &c. juncta. Linimentis verò his semper præmittantur balnea aut fomenta, donec membrum probè incaluerit, hinc idem ad incalescentiam novam deorsum versus fricetur, & emplastrum denique appropriatum, v. g. de galbano crocatum, oxycroceum, vel aliud nervinum quoddam, applicetur, quotidie repetendo, donec æger in membro, vel ruborem vel fornicationis sensum percipiat; postea enim ad aquas vel spiritus articulares, similesque penetrantiores, accedendum. Pro scopo hoc conveniunt etiam frictiones cum pannis asperioribus, & cucurbitulæ vasis majoribus admovendæ, imprimis illæ suctoriæ, quales, post Hildanum C. I. *Observat.* 80. Tulpium lib. 3. *Observat.* 49. commendat.

## CAPUT II.

• De

### *Nutritione Aucta.*

**Q**UOD auctam attinet nutritionem: fit hæc vel universo in corpore secundum carnem musculosam, & huic annexam pinguedinem, in corpulentia dicta nimia & obesitate; vel particulatim, secundum partium nonnullarum & viscerum parenchymata, qua ratione observatæ fuerunt nimia & stupendæ magnitudines hepatis, lienis, renum & similium partium: sicut de magis lienibus jam suo tempore locutus est Hippocrates. De hac particulari auctione quorundam viscerum sufficienter actum fuit in *Physiologicis*.

## ARTICULUS UNICUS.

De

### *Corpulentia Nimia.*

**Q**UOD attinet universi corporis augmentum in corpulentia nimia, ea est, quando habitus corporis musculosus insigniter augmentatur; sicuti quando pinguedo copiosè, & in specie partes subcutaneas, infarcit, & incrustat, dicitur obesitas nimia. Quò pertinet habitus corporis vocatus succi ple-

nus, corpus quadratum, dum nempe omnes partes in omnes dimensiones ita abundanter nutriuntur, ut exinde conveniens robur atque firma consistentia corporis concilietur; item facit huc veterum habitus athleticus dictus, cujus apud veteres in specie Aphor. Hippocratis *Sect.* 1. subinde injicitur mentio, quando nempe carnes musculosæ nimis augentur, & ita postmodum tale robur conciliatur iisdem, quale veteres athletæ habuerunt, qui invicem congregientes exercitia athletica suscipiebant. Hic habitus athleticus, & succi plenus sunt quasi affines corpulentia nimia, ut adeò corpulentia nimia sit, quando corporis totius, tam ventris quam artuum, peripheria in tantum convenienti nutrimento est aucta, ut actiones, imprimis motus, isque vel thoracis respiratorius, unde corpulenti sunt anhelatores; vel & motus artuum apprehensivus, sive totius corporis progressivus, aut impediuntur, aut insigniter viciuntur. Cum enim fiat motus per fibras musculorum; hæc autem, dum omnia intercepta musculorum spatiosa succo nutritio in tantum sunt repleta & infarcta, ut nullo modo in se ipsum cedere possit musculus, hinc fibræ nimis distensæ, & per consequens membrum ipsis annexum, non possunt contrahi, aut abbreviari: Aliàs non raro prostant exempla corpulentorum ac obessorum suffocatorum, de quibus vid. Schenckius lib. 2. *Observ.* speciatim Sennertus *Pr.* l. 5. *Part.* 1. *cap.* 4. *pag.* 21. mulierem refert 36. annos natam 450. lb. item virum lb 600. pendentes; præterea *pag.* 23. Nobilem post febrem malignam adeò obesum redditum, ut vix loco suo se movere potuerit: Sic etiam Timæus in *suis Casibus* l. 6. *Cas.* 1. 2. & 3. *pag.* 262. *sequ.* notat mortem repentinam ex pleniori corporis habitu. Stupenda super sunt obesitatis nimia exempla, cum inter alia referat Panatollus *Pentec.* 4. *Observat.* 31. de muliere adeò obesa, ut pinguedo ad genua usque laberetur, 30. circiter & amplius librarum: Sic stupendum abundantis pinguedinis exemplum in abdomine puellæ recenset Bartholinus *Cent.* 2. *Epist.* 81. Plura qui cupit, videat Marcelli Donati *Historiam Med.* lib. 5. *cap.* 2. Platerum lib. 3. *Observ.* *pag.* 584. Tulpium lib. 3. *Observ.* *cap.* 55. uti etiam *Acerram Philolog.* *Cent.* 2. *Histor.* 92.

## C A U S Æ.

Causa proxima corpulentia & obesitatis nimia in sanguine, eoque laudabili, copioso, pingui, temperato, & quod parcè admodum absumitur, seu per habitum corporis non dispergitur, sed in partes distribuitur, ibique quodammodo affligitur, consistit.

sistit. Hinc enim est, quod omnia ea, quæ sanguinem temperant, pinguem ac minùs acrem reddunt, atque minùs absumunt, disponunt ad corpulentiam: ac sicut in sanguine temperato ac dulci, minùsque salino, minùs aucta est fermentatio: ita fit, ut chylus non adeò subito assimilatur, neque ex massa sanguinea multùm adeò dispergatur; quin potius sanguis emergat magis nutritivus, adeoque magis lacteus, aut copioso chylo turgidus copiosè nutriat partes.

Causæ corpulentiae remotæ sunt variae: nempe præter res nonnaturales, ut corporis motus deficiens, aut exercitiũ admodum moderatum, vita curis vacua, somnus mediocris aut protractior, aliae concurrunt materialiter, aliae efficienter. Tanquam causas materiales se habent assumpta, quatenus ea sunt naturæ temperatae, i. e. medii saporis inter acidum & urinosum; & suggerunt copiosum chylum pinguem, & planè nutritivum. Hinc passulae, tam majores quàm minores, dicuntur pinguefacere etiam tabidos, quod remperent quodcunque acre, de quibus vid. Riverius & Joel. Faciunt huc olea, lacticia, & lacti similia temperata, qualia sunt: amygdalæ dulces, sem. 4. frigida majora & minora, pineæ, pistaciæ. Hæc enim blandâ sui oleositate uti temperant massam sanguineam, ita copiosum subministrant chylum, ratione cuius etiam Venerem stimulant, & sic postmodum nutrimentum copiosius & temperatius exhibent. Unde etiam cerevisiæ triticeæ uberius nutriunt, quàm cerevisiæ hordeatæ: illæ enim copiosum suggerunt chylum: hæc verò sunt absterlivæ, & præterea lupulo diuretico conditæ; unde quatenus nonnihil urinam movent, corpus minùs nutriunt. Nam sanè in obesitate nimia, aut concilianda aut curanda, potus imprimis maxima habenda est ratio; potus enim est vehiculum nutrimenti, ut latice aquoso chylus dilutus transferatur ad partes eas, ut nutriat.

Unde etiam lactis usus impingat, quoniam est temperatum, & in se ipso nutritivum. Panis etiam habenda est ratio, quatenus in eo, quoad digestionem primam, multùm residet; hic enim non tantum per se admodum nutrit, sed etiam in cremorem liquefcens, propter acidum fermentativum in panificio susceptum, & beneficio salivæ in masticatione resuscitatum, instar fermenti appositi aliorum alimentorum digestionem, ut magis nutritiva evadant, insigniter faciliat; unde etiam panis rectè theriacæ alimentorum audit: Vid. Helmontius *Tr. Viæ Ratio*. Hinc est, quod refert Cattierus in *Observationibus*, Borello annexis, 12. & 13. ibi quidem quantum panis dosis aucta ad corporis habitum laudabiliorem disponat: hic

verò, quod quidam, diminuto panis antea nimis copiosè assumpti usu, in loco ejus substitutâ tantummodò carne, insigniter tenuis redditus sit. Unde etiam genituræ excretio maciat homines, quatenus subtrahitur succus chylosus nutritivus; è contrà castrati pinguescunt, quoniam materia seminalis blanda, dulcis & oleosa, retinetur in corpore, quæ & temperat massæ sanguineæ acrimoniam, & ita eandem disponit ad uberiores nutritionem, ratione chyli assimilandi partibus.

Tanquam causæ efficientes ad corpulentiam nimiam se habent digestiones, quæ hic concurrunt; siquidem videmus alimenta non tam constitutivè ad nutritionem facere, quàm chylicationem. Ergò non nutrimentum ut sic, valet nos nutrire, nisi accedat chylicatio in ventriculo, & separatio in duodeno. Ac proinde, sicut in digestionem primum fundamentum sanitatis consistit, ita & nutritionis universalis corporis, adeoque alimenta vulgaria optimè nutriunt, modò fiat laudabilis chylosis. Ipsa verò chylosis fit à fermento ventriculi acido volatili, quo mediante alimenta liquefcunt & disponuntur, ut facile possint coagulari sub nutritione partium solidarum; sicut ii, qui habent fermentum stomachi acre, rarò solent pinguefcere ob defectum acidi volatilis, partim in prima, partim in secunda digestionem. Rectè igitur Helmontius exclamat: digestionem primam esse fundamentum omnium reliquarum digestionum. Hæc enim, prout diversimodè præparat chylum, etiam idem diversimodè disponitur pro nutritione corporis, aut uberiori, aut pariori. Unde est, quod in digestionem prima & rudimenta obesitatis, & prima principia atrophie, consistant.

#### DIAGNOSIS.

Signis diagnosticis non est opus, quia per se patent.

#### PROGNOSIS.

Ratione Prognoseos observandus Hippocratis *Aphorism. 44. Sect. 1.* Corpulenti brevioris, macilenti longioris vitæ sunt: pinguedo enim extraordinaria junioribus subjectis non saltem periculosa existit, iisq; non rarò mortem conciliat: sive quatenus hac ratione sanguinis motus, in quo vita consistit, ob vasorum angustiam & compressionem impeditur, & simul spiritibus materia detrahatur; sive quatenus partes solidæ justo crassiores & pinguedine copiosiore infarctæ sensationes atque motus naturales minus commodè præstant, sed sterilitatem quoque inducit; sive materiam commodam genituræ detrahendo: vid.

(Fff 3)

Hip-

Hippocrates *Aphor.* 46. S. 5. siue meatus spermaticos comprimendo, prout ex Timæo von Gilden & Klee / 1. 6. *Cas.* 2. & Betto de ortu & natura sangu. cap. 2. *Secl.* 5. videre licet.

De cætero propter corpulentiam Medici auxilium rarò imploratur; imò difficulter eadem sanatur.

#### C U R A.

Quoad curam corpulentia nimia seu obesitatis: nitamur

1. Ut impediatur copiosus alimenti laudabilis proventus, quod ipsum fieri potest per inediam & moderatam dietam.
2. Ut nutrimentum jam genitum ante sui assimilationem maturè removeatur, quod faciunt diuretica & sudorifera primariò, hinc purgantia & venæsectiones: quemadmodum Zacutus Lusitanus l. 3. *Prax. Admir. Obs.* 12. prodigiosam obesitatem scarificatione ac hirudinum suctu; ac Bartholinus *Act. Hassnien. Part. 1. Obs.* 74. per salivationem, curatam testatur. Unde rusticos ob continuos labores, adeoq; sudores rarò pingues ac obesos videmus, sicuti qui ex vita sedentaria laboriosam subito ineunt, successivè emaciantur.
3. Ut nutrimentum partis jam assimilatum plus minus resolvatur ac liquefiat, & ut resolutum, & sero alluente imbibitum, evacuetur; serum enim, uti primo est vehiculum alimentorum, ita postmodum vehiculum est excernendorum.

Quoad indicationem primam: corpulenti & obesi temperent sibi à cibis *ιυχίμους* largiùs assumptis, & omnibus iis, quæ ad maiorem corporis molem causam aliàs præbere possunt: Cæna sit parca ac somnus brevior. Contra profunt cibi solidiores & pauciores, probè Siti; nec non olera, ratione Sinitrosi alvum & Cœm moventia. Probè autem observandum, ne mox in principio, aut intempestivè nimis, corpori nimium, sed singulis saltem diebus aliquid, subtrahatur; cum vires aliàs debilitarentur.

Dubium equidem oriri potest: an nempe possibile sit, ut corpulentia jam facta nutrimentum semel assimilatum denuo resolvatur, & foras eliminetur, adeoque augmentatio ita cesset? sed respondeo affirmando. Videmus enim, quod febrium ardor corpora antea crassa & obesa soleat insigniter emaciare: item quod scorbutus confirmatus corpus succi plenum breviter reddat emaciatum, unde atrophia scorbutica. Ad hæc viscerum ulcera, dum hæticam inferunt, ita massam sanguineam inficiendo phthisicos & macros reddunt, uti idem fieri cernimus per diabetelem & salivationem, itemque per nimias purga-

tiones: ac in specie lymphæ copiosioris ac urinæ fluxus insignior emaciat, sicut hoc confirmat Helmontius *Tract. Jus Duum-Virat.* §. 59. & *Tract. Latex Humor.* Negl. §. 44. Schenckius in lib. 3. *Observ.* pag. 356. Nec minùs efficax est copiosa salivæ excretio: notum enim est, quod lue Venereâ laborantes, curati per inunctiones Mercuriales ubi continuam ac copiosam excernunt salivam, exinde admodum attenuentur: Conf. Borellus C. 2. *observ.* 11. ubi refert, quendam per crebriorem masticationem fol. nicotianæ extenuatum fuisse redditum: hæc enim cum sit forte masticatorium, & uberrimam proluciat salivam hinc gelatina nutritiva necessariò simul expellitur: Id quod etiam cum foliis lauri indicat Borellus, quod multas aquas educant; hæc & similia persuadent, quod corpora pingues facta post resolutionem jam assimilati nutrimenti, à latice aquoso partes ambiente imbibiti, & sub forma urinæ aut salivæ copiosè & ubertim evacuati emacientur. Convenit ergò & dulcis cum extracto catholico aut panchymagogo Crollii, pilulis aloëticis aut aliis lenioribus purgantibus commixtus, quotidie præmissis præmittendis propinando, donec salivatio largior subsequatur: qualem methodum videbitis in Bartholini *Actis Hassniens. Tom. 1. Observat.* 74. Quo etiam pertinet nicotianæ fumus, mane ac vespere haustus.

De cætero inter remedia emaciantia in specie eminet acetum, & omnia ex eo parata; imprimis acetum scylliticum allegatur à Cattiero, l. 1. Id quod confirmat Stephanus in *Oper. Med. Tract. Cosmetice*; ad obesitatem tollendam nihil melius esse, quàm acetum scylliticum jejuno stomacho haustum, hinc acetum rutaceum, aut etiam potus ordinarius ex V chalybeata aceto temperata, item acetum scylliticum, in quo absinthium est maceratum, & omnia acida sæpiùs usurpata, profunt. Hæc enim faciunt, ut alimenta ingesta admodum dissolvantur & liquecant in serosiorum & asperiorum minusque nutritivum chylum, qui porrò tam sub digestionem in stomacho, quàm extra eum induendo, attactu fellis, abit in sal tertium plus minus volatile acre, ac sit insigne absterfivum, tam sordium nocivarum quàm etiam nutrimenti laudabilioris, & diureticum: unde nutrimentum chylosum extenuatum & resolutum tunc sub urinæ forma solet emitti, adeoque habitus corpulentior successivè imminuitur. Sic quoque acetum supra nitrum ac sal aliquoties cohobatum, uti acrius & magis diureticum fit, ita corpus magis ad emaciationem disponit, si assumatur. Post acida huc etiam spectant purgantia; hæc enim semper aliquid de viribus deprædando corpus



corpus macidam reddunt: Hinc etiam Celsus inquit: crebris purgationibus adflescere, est corpus non nutrire. Nam purgantia etiam nutritium succum putrilagine afficiunt, & sub forma stercoreum exhauriunt. Verum cum purgantia fortiora ceu venenata non semper tuto in usum vocari possint, propterea aloëtica abstergentia mixta conducunt imprimis. Hinc Fernelius *Conf.* 14. ad obesitatem exhibet pilulas ex rhabarbaro, aloë & agarico paratas, quibus aliquandiu continuatis corpulentia dempta est. Præ cæteris hoc in casu pollet aloë ob amarorem, & hinc ob vim acidum abstergendi; unde etiam Gruelingius pilulas aloëticas & Francfortenses obesis commendavit. Elixyr proprietatis, uti etiam omnia amaricantia, myrrha v.g. pilulæ de tribus, MP. hieræ cum agarico, vel de aloë cum agarico, congrua sunt remedia: ac Prædici communiter & recte dicunt, elixyr proprietatis exsiccare corpus; quæ exsiccatio tamen consistit in colliquefactione succorum nutritivorum. Huc pertinent alia amaricantia, v.g. centaureum minus, nasturtium, mentha, absinthium, & ejus essentia, essentia myrrhæ, gentianæ, & similia: quæ omnia vulgò exsiccare dicuntur, cum tamen reverà corporis nutrimentum attenuent & dissolvant, ac sero involvant, quod interdum excernitur sub forma urinæ, interdum sudoris. Ulterius diuretica quæcunque fortiora per copiosum urinæ fluxum solent extenuare, copiosius usurpata: quæ inter eminet radix asparagi, sceniculi, petroselinii; item alliata ac cepacea omnia; syrupi dicti de duabus, item de 5. radicibus, decoctum cicerum rubrorum, item cappares, olivæ, amygdalæ amaræ, & similia condimenta diuretica. Ad hæc in specie pertinet tartarus, cujus volatilis aciditas potenter abstergit, ac vi attenuativâ, simul interdum blandè urinam movet; hinc enim Forestus *lib.* 3. 1. *Observ.* 13. talem habet pulverem:

℞. *Qi crudi* ʒj.  
*cinn.* ʒiij.  
*zingib.* ʒj.  
*facch.* ad pondus omnium.

M. f. Pulvis.

*Conf.* Epiphanius Ferdinandus *Consil.* 82. Alii commendant pulverem compositum ex ana tartari & cymarum seu julorum coryli, qui crebrius ante pastum, & hinc sub introitu lecti assumatur, idque eò magis ʒj. vel ʒiij. irroretur cum aceto ʒato, idque continuo, donec corpus egregiè emacietur.

Quæ dico de tartaro simplici, etiam intelligenda de sale volatili, & nobilioribus præparatis, quod præsuppono.

Pertinet huc etiam tartarus vitriolatus, qui & ipse ad emaciandum aptus: sic quoque nitrum obesitatem impedire vi suâ diureticâ

observatum fuit, ac in specie ̄ crudum copiosius usurpatum & nitrum ̄ latum. Imò per ʒs nitrum, alumen, & Martem continentes, pinguedinem nimiam in quodam solutam Timæus à *Gulden-Klee/ lib.* 3. *Caf.* 3. testatur. D. Langius ceu singulare habuit arcanum species diapoliticon Galeni ex nitro & cumino, pertinet huc tartarus vitriolatus Bartholetti ex ̄ ʒi, & spiritu nitri invicem mistis paratus, item gummi juniperinum hinc etiam elegantes sunt pilulæ contra obesitatem nimiam Mynsichtii, quæ basin gummi dicti agnoscunt, & multum valent: dosis ʒj. est, singulis mane jejuno stomacho. Vel

℞. MP. de sandar. ʒij.

̄ volat. viperar. ʒj.

c. elixyr. propr. f. Pilula instar pili min. D. S.

**Zehrende Pillen.** pro 4. dosibus.

℞. sandarac. ʒij.

Myrrh. elect.

res. lign. sancti

extract. absinth.

aloës ʒj.

— ̄ li coag. ʒiij.

M. f. Pilul. pro 7. dos.

Semen fraxini ad ʒj. mane in haustu vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat, & emaciat crassos. Secretum D. Erbenii est semen esulæ pulverisatum, & omni mane, quantum cultelli cuspide capitur, usurpatum & continuatum; nec omittenda terebinthina ratione virtutis diureticæ: refert Forestus *c. l.* de viro valde crasso, qui insigniter extenuatus per pilulas ex terebinthina cum saccharo paratas, assumendo earum majuscularum 5. & 7. per 2. horas ante prandium.

Denique per sudorem etiam corpus emaciatur, sive per interna elicietur, sive externe per exercitia. Atque hinc omnia decocta lignorum, in specie guajaci & ligni sancti, exsiccare dicuntur, quatenus sudorem copiosorem provocant. In specie autem sudorifera cum & ex salibus alcalibus parata, item salia theriacalia expectando sudorem egregia sunt. Aliis salia viperarum, item alia remedia viperina, sunt commendata, item salivatio Mercurialis mirabiliter corpus emaciat, ita ut illud sceleti formam repræsentet; Mercurius enim acrimoniam suâ nutrimentum corporis dissolvit.

Tandem ex fonte Chirurgico huc spectant crebriores venæsectiones, & plures inusti fonticuli: venæsectio enim cum sanguine simul nutrimentum exhaurit; unde subtracto nutrimento emaciat: Ex fonticulis verò sub forma putis nutrimentum partium resolutum evacuat, massa sanguinea depravatur, & ita necessario emaciatur. Ex-

Externè à Mynsichtio commendatur decoctum nucum cupressi compositum, quod sine dubio ratione virtutis adstrictoriae effluxum alimenti uberiores reprimat.

De evacuationibus adhuc notetur: has in obesis parciores esse debere, quàm in carnosiss seu musculosis, ne corpus jamdum torpidum magis enervetur.

Quidam febrem artificialem excitare jubent, de qua integrum tractatum Johann. Daniel Major conscripsit; sicut & hoc ipsa sæpe natura nobis monstrat.

## CAPUT III.

De

### *Nutritione Depravata.*

## ARTICULUS I.

De

### *Cachexia in Genere.*

**Q**ualitate peccans corporis nutritio in genere vocari solet Cachexia. Hactenus equidem à pluribus descripta per tumidam totius corporis molliem, & via quasi ad hydropem credita fuit: ast generaliori conceptu opus est, cum sine corporis intumescencia cachexia quoque contingere possit. Est affectus iste, in quo natus & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor, perit, mutaturque in pallidum, lividum, luteum, virescentem, intensè rubicundum, &c. in diversis corporis partibus exanthemata & pustulæ emergunt, ac partium consistentia durior juxta ac asperior cum squamarum decidentia interdum in molliorem mutatur: nonnunquam sudor foetidus exhalat, cutis unguosa observatur cum pruritu notabili, pilorum contingunt defluxia, dolores diversi partes diversas infestant, ita tamen, ut corpus nonnunquam simul intumescat. Cachexia talis est reverà fructus cacoehymiae; hæc verò est pedissequa cacoehyliae. Nempe dependet omnis cachexia ab effusione vitiosi & depravati nutrimenti, i. e. humoris visceris, loco nutrimenti hinc inde distributi in habitum corporis ac partes molles; unde dum nutrimentum non ritè assimilatur, ob debitas proprietates deficientes emergit cachexia, adeoque prout variant nutrimenti vitia, variat etiam cachexia. Hinc humor iste, qui ita habitui corporis affunditur, si est albus, dicitur cachexia in specie; si flavus, dicitur icterus; si viridiusculus seu luridus aut lividus, aut alio tetro colore tinctus, ut plurimum icterus niger audit.

Datur etiam cachexia scorbutica & cachexia hypochondriaca, item scabies, elephantiasis, &c. in mulieribus ex uteri vel mensium vitio febris alba. In specie tamen usus obtinuit, ut vitium istud tantum cachexia appelletur, quando corpus à nativo colore in pallidum & lividum, plus minus viridem & habitum subhumidum & flaccidum degenerat & à sanguificationis defectu in specie dependet.

Ægri successivè pallescunt, ac colorem plus minus lividum contrahunt, postmodum facies nonnihil intumescit, & tandem quoque habitus corporis; hinc dicunt: *Er wird so fett/ es ist aber keine natürliche Fettigkeit.* Præter cutis mutatum colorem juncta simul solet esse in plerisque dyspnœa, quæ præsertim magis urgetur, quoties corpus, imprimis adscensu in altum, tantillum & leviter movetur, quæ ad motum corporis concitationem augetur, quin tunc sæpius cordis palpitatio, arteriarumque circa jugula temporaque inconsueta pulsatio, observatur; accidit quoque universi corporis, præ cæteris partibus crurum, lassitudo spontanea & tensio, animæ corporis: urget non rarò compressivus & anxiosus præcordiorum dolor, qui post alimenta assumpta intendi solet: appetitus in principio constat, in progressu verò prosternitur, ac non rarò tales ægri sitiunt: adest sæpe etiam febris lenta, ægro vix sensibilis, & quidem modò continua, modò intermittens, quotidiana ferè periodica, pulsus sunt inæquales, parvi, frequentes & debiles, urinæ sæpius etiam sunt crassæ, aquæ seu pallidæ, tenues & saltem minus tinctæ, rarò, nisi in progressu morbi, prodeunt crassæ & turbidæ cum copioso sedimento albo. Observata tamen fuit cachexia cum urinis lacteis, uti hoc habet Sylvaticus C. 1. Conf. 29. Tandem malo ulterius procedente corporis habitus fit turgidus, tumidus, crassus, & pallidus, foveamque post impressionem digiti ostendit, adeoque tunc vocatur Leucophlegmatia; si verò evadit turgidus cum quodam splendore & livore, quasi aquæ essent collectæ, vocatur anasarca, seu aqua intercus, tam universalis, quàm subinde particularis crurum, & est hydropis species. Antequàm Leucophlegmatia vel anasarca erumpat, fit ut pedes saltem intumescant, ulteriusque, morbo incrementum capiente, & abdomen intumescit, & sic in perfectum ascitem abdominis, seu hydropem in specie sic dictum, degenerat. Nullis ac nulli ætati parcat cachexia, licet scæminas ob vitam sedentariam frequentius, & ob supervenientia menstruationis vitia contumaciùs ac pejùs afficiat: Quin & sæpius comitem habet affectum scor-

lcorbuticum aut hypochondriacum. In principio morbi ciborum digestionem impediuntur, manente appetitu; tandem etiam anorexia accedit, corpusque summè imbecille redditur. Alvus sæpius est obstructa. Plura huc facientia videb. in specie in Sylvio lib. 4. Prax. & Tract. de Cachexia.

PARS AFFECTA.

Pars affecta seu subjectum in hæsiōis est habitus corporis, seu partes ejus solidæ molliores, in specie carnosæ, in ejus ambitu extrinsecus sitæ, quæ primariò afficiuntur; Subjectum verò radicationis, seu pars affecta à causa, est massa sanguinea cacochymica facta.

CAUSÆ.

Causa proxima cachexiæ est nimia cacochymia vel cruditas massæ sanguinæ, indeque dependens deficiens ac imminuta ejus fermentatio, unde chylus & ipse plus minus vitiosus non ritè assimilatur, sed tota massa eodem crudo repleta, cruda & vitiosè fermentans manet, particulæ ejus salinæ obruuntur, morbus magis magisque confirmatur, unde tali crudo sanguine, vel, ut vocant, pituitoso per partes circulato, hæ chylo & sanguine non ritè alteratis nec volatilifatis infarciuntur potius, quàm debitâ appositione aut aliquâ assimilatione nutriuntur, ita ut rectè proindicat Forestus: corpus ita inflatum non aliter se habere, ac pastam non ritè fermentatam, in qua digiti impressi vestigium hæreat.

Causa remota est multiplex. Observandum enim cachexiam nunc esse affectum primarium, & qui per se incipit; nunc secundarium, aliosque insequitur morbos, v. g. qui quasvis sanguinis nimias effusiones, aut ejusmodi consuetas suppressas insequitur, in specie mensium suppressio, uti & nimius eorum fluxus, cachecticas reddunt mulieres: sic gonorrhæas diuturnas, aut fluores albos, item febres chronicas ordinariò insequitur: Mola aut foetus mortuus retentus etiam cachexiam inferunt: Videatur Forestus lib. 19. Observ. 26. in Schol. Hortlius lib. 5. Observ. 21. Urinæ suppressio hepatis ac lienis aliorumque viscerum vitia, uti sunt atoniæ, obstructiones & tumores faciliè scirrhescentes, renum ulcera, &c. cachexias inferunt.

Causa remota cachexiæ primariæ est deficiens chylosis, dum nempe alimenta in stomacho nec ritè fermentando volatilifantur, nec in subdulcem aut salum volatilem abeunt liquorem, sed in pituitam viscidam ac acidam degenerant, adeoque vitiosum in primis viis acidum quasi fixum, nec volatile, primum fundamentum cachexiæ ponit, quod fovet ulterius semper simul conjuncta bilis inertia, seu deficiens ejus acrimonia salina volatilis, quæ nec corrigit, nec perficit debitè chylum

in duodeno, nec ritè feces separat. Ac in cachexia quidem semper peccat cruditas acida, quâ alimenta non transmutantur in chylum volatilem, sed viscidum: Unde ex vitio digestionis primæ orta cruditas acida ad massam sanguineam delata fermentationem ejus inhibet, hæmatosin turbat, & successivè cachexiam inducit. Massæ sanguinæ enim particulæ salinæ fermentativæ succo isto crudo atque incongruo obrutæ debitam chyli alterationem & sanguini assimilationem ritè perficere nequeunt; quin hic exinde crudus, plus minus viscidus, & quasi occultè acidus remaneat, unde de facili stagnans sanguis in præcordiis, dum levi corporis motu celerius movetur ad pulmones & cor, dyspnoeam & anxietates infert; Quin & massæ sanguinæ debitâ fermentatione vitiatâ & imminutâ imminuitur quoque in fœminis menstrua sanguinis fermentatio. Unde cachexiæ incipienti, multò magis confirmatæ, supervenit etiam mensium suppressio, quæ ipsa malum postmodum & gravius & contumacius reddit. Porro si sanguis crudo chylo inquinatus circulatur ad partes, tunc nutrimentum illud crudum appositum & congestum, necessariò leucophlegmatiam, summum cachexiæ gradū, post se relinquit, unde depravatur nutritio, adeoque habitus corporis tumidus insigniter inflatur, & exinde ob fibrarū musculosarū & nervosarum laxatum tonum flaccidus fit. Quod si ex retento qualicunque occasione sero aut lymphæ (cachectici enim non, aut difficillimè sudant, & parum quoque mingunt) ferosior quoque simul fuerit sanguis, necessariò oritur vitium, quod dicitur anasarca, seu habitus corporis copiosâ aquâ suffusus; quæ eò erit major, si tali succo crudo aut obstructantur glandulæ partium musculosarum, aut etiam vasa lymphatica, ita ut lymphæ, aut saltem ferositates, non ritè ex partibus per vasa lymphatica revehi queant, sed debitus earum motus inhibeatur; unde sub cute aquositates congestæ necessariò habitum tumidum inferunt, & vulgò pro tertia hydropis specie, nempe totius corporis hydrope, habetur. Hinc Borellus Cent. 3. Observat. 66. observat corpus cachecticum crystalli instar translucens. Sive ergò copiosum serum in massa sanguinea peccet, sive motus impeditus lymphæ in causa sit, utroque modo generari potest anasarca. Quod si humorum istorum ferosorum plus minus chylosorum seu pituitosorum ex proprio impetu decubitus fiat magis ad inferiora, unde crura, scrotum, ac tandem abdomen intumescant, erit ordinarius sic dictus hydrops.

Confunduntur equidem subinde leucophlegmatia & anasarca, sed malè; Differunt enim variis modis, & non, nisi subjecto, nempe habitu corporis inter se conveniunt. Nam

(Ggg)

in



in leucophlegmatia est habitus corporis pituitosus (i. e. crudus chylosus; ) anasarca verò est ab ichoroso & crudo sero, in habitum corporis deposito, concurrente forsan plus minus vasorum lymphaticorum ruptione: distinguere autem facile est leucophlegmatiam ab anasarca: in leucophlegmatia nempe minus est splendoris ac nitoris, quam est in anasarca, sed habitus corporis pallet; in hac verò corpus plus justo splendet ac nitet: Deinde vestigia foveæ digito impressæ in leucophlegmatia diu durant, tandem successivè pereunt, quæ in anasarca facilè & brevissimo tempore disparent. Interim sæpius evenit, ut leucophlegmatiam sequatur anasarca, si nempe impediatur seri & lymphæ transcolatio.

Causæ remotissimæ seu occasionales seu procatacticæ, ad cachexiam, leucophlegmatiam & anasarcam disponentes, sunt imprimis errata quædam in sex rebus non naturalibus: quo pertinet vita desidiosa, & sine motu peracta; sicut contrà sub motu corporis homines malis hisce minimè soleant infestari, quàm curari potiùs, notante Panarollo *Pent. 1. Observ. 30.* item ira, mœror, tristitia, & curæ protractæ, non raro inferunt cachexiam, quia non rectè volatilifatur sanguis, & intumescunt viscera. Huc pertinent errata in victu: sic enim intemperatè viventes subinde cachectici evadunt. Somnus nimius & labor deficiens promptè ad cachexiam disponit: & quæ sunt aliæ causæ externæ. Quò facit imprimis observatio Panarollie, *l. de muliere cachectica*: multis obstructis parenchymatibus, magis exercitio quam alio quocunque remedio curata: Unde vi oppositorum exercitium & motus deficiens disponunt ad cachexiam.

Quoad cachexiam secundariam: nascitur hæc talibus occasionibus, quæ sanguinem immediatè afficere, vel, idque frequentius, mediante læsione digestionis primæ eundem alterare possunt. Sic ea, quæ spiritus nimis exhauriendo aut dissipando, & hinc fermentationem stomachi lædendo, ut hæmorrhagiæ nimix, gonorrhœæ, &c. vel fermentum digestivum alterando, ut menses suppressi, & febres chronicæ & malè curatæ, mediatè sanguinem alterant. In specie tamen post nimiam sanguinis effusionem progerminare solet cachexia, & hæc quidem frequentissima est causa, attestantibus omnibus autoribus, cachexiæ, & hydropis ascitis: vid. Forestus *lib. 19. Obs. 25.* Nam depauperatur massa sanguinea, & spoliatur principiis salinis, unde cruda manet, ut exinde minus fermentari, aut chylus assimilari possit. Immediatè afficit sanguinem lues Venerea, semper cachexiam comitem adsciscens, uti hoc refert Sennertus *lib. 3. Prax. pag. 704. cap. de Cachexia.* Urina suppressa, viscera, abdominis præsertim, affecta, sanguificationis aliàs perfectio-

ni inservientia, foetus mortuus diu in utero retentus, aut secundinæ retentæ, vel & mola diutius gestata, cachexiam non rarò interire solent. Sic cachexiam post foetum mortuum observat Horstius *Tom. 2. lib. 1. observ. 20.* item ex mola Forestus *lib. 19. obs. 26.* Sanguinem enim inquinando debitam quoque ejus spiritaliscentiam impediunt.

### DIAGNOSIS.

Signa cachexiæ in specie sic dictæ ex suprâ dictis facilè patent.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Cachexia, uti notum, ordinariò malum est admodum chronicum, & tardæ curationis: Imo, quo magis inveterata, & firmitus radicata, eò difficilius curatu, & nisi ei maturè occurratur, sæpius in anasarcam, leucophlegmatiam, & hydropem ascitem degenerat.

Sin occurrat scirrhus visceris cujusdam, hepatis aut lienis confirmatus, vix cachexia curabitur, sicut & illa, quæ sequitur morbum acutum & febrem ardentem, aut intermittentem chronicam, malè à Medico, vel crebriori potu ab ægro tractatam, difficilis est admodum, imo nullus curationis: Item si cachexia superveniat mulieribus, quibus jam ordine naturæ menses deficiunt, iis difficulter, aut admodum lentè curabitur, exque gravius reliquis laborare solent.

### C U R A.

In cura cachexiæ eo attendatur:

1. Ut corrigatur stomachus, ac ejus digestio prima & cruditas acida emendetur: quod ipsum post vomitoria imprimis præstant Martialia.
2. Ut corrigatur cruditas, & inde certa dyscrasia massæ sanguineæ, unà cū inertia ac deficiente acrimonia bilis.

Unde in cachexia primaria

1. Acidum vitiosum primarum viarum removendum per absorbentia, in specie Martialia, partes animalium duras, terrea, alcalia, tum fixa tum volatilia.
2. Viscidum incidendum & attenuandum per gummata, salia tam falsa, quàm alcalia, item per simplicia stomachica aromatica, ac salina volatilia.
3. Bilis inertia acuenda aromaticis seu resinosis volatilibus urinosiis, præsertim amaris, quæ aliàs hepatica dicuntur.
4. Cruditates primarum viarum & sanguinis plus minus correctæ evacuantur vomitu & secessu ex primis viis; ex massa sanguinea verò per sudorem & urinam.

In

In secundaria verò cachexia morbus primarius curandus, aut lationes ab illo inductæ seu relictæ eliminandæ, semper digestionis primæ negotium, quantum possibile, observando. Hos scopos ut felicius obtineamus in cachexia curanda, rectè monet Lindanus, quod cachectici, quò leniùs tractentur, tantò citiùs curentur: hinc fortioribus purgantibus, ab initio statim adhibitis, nos nil efficere, nisi sint vomitoria; sed ut malum sensim crevit, ita successivè saltem digestiva, aliaque leniora remedia propinanda esse, quæ crassos & viscidos humores incidunt & attenuant, acorem vitiosum corrigunt ac temperant, atque ita successivè evacuationi aptiores reddunt. Unde imprimis in usu sunt noduli ex aperientibus, ut vocant, i. e. resolventibus & incidentibus, blandis purgantibus mistis, compositi: quibus subinde Martialia remedia sunt interponenda. Et cum cachexia sit initium hydropiseos, commodè methodus & medicamenta, quæ in principio hydropis conveniunt, etiam in cachexia adhiberi possunt, & contra ea, quæ in cachexia usurpantur, validiora tamen & magis diuretica, in leucophlegmatia & anasarca quoque profunt. Item illa medicamenta huc pertinent, quæ suprà Sect. 13. in morborum chronicorum cura recensita sunt, ac in sequ. de Ictero, Scorbuto, Scabie, Lue Venerea, &c. occurrent. Illud saltem adhuc observandum: ut in medicamentorum appropriatorum usu aliquandiu perseveremus, ubi præprimis radicatum magis malum est, i. e. tamdiu illis inhærendum, quamdiu ab ipso benè, aut ad minimum non pejus, se habeat æger, ac medicamentum absque nausea singulari hic admittat; quamprimum verò hujus fastidium subrepat, aut prodesse desinat, gratum atque optimum licet medicamentum, statim de alia illius formula Medico cogitandum, vid. Sylvius *Praxi App. tract. 5.* In specie tamen conveniens regimen dicitur secundum sex res non-naturales observandum, & præsertim motus suadendus: id quod confirmat Panarollus *supra c. l.* de muliere cachectica, exercitiò plus quam aliò auxilio sanata.

Principium autem curæ à vomitu, interdum repetendo, faciendum est, & præter asarinam propinata conserva gratiolæ ad ʒj. vel ʒij. egregiè vomitus movet, & specificè in anasarca commendatur; vel si coquatur in vino ad ʒij. gratiola, egregium etiam & blandum est vomitorium. Ante tamen vomitoria consultum erit, ut digestiva ̄ina præmittantur, cruditates solventia, & ad motum disponentia; nunc cremor tartari, nunc liquor terræ foliatæ tartari: vid. Rolfinceius, Zvvelferus, tinctura ̄i simplex, R ̄i ̄iata, arcanum duplicatum, ̄i ̄iatus, ̄i centaurii minoris, Tom. II.

absinthii, ̄i ̄i, ̄i digestivum, hypochondriacum, dosi à ʒj. ad ʒʒ. bis in die, manè & meridiè aliquot diebus ante usum vomitorii assumantur: quibus pro acido absorbendo terrea adjungi, e. g. corallia, lapides 69. mater perlarum, Martialia, bezoardicum Martiale, terra sigillata rubescens, & diaphoreticum Martiale, antihect. Poterii ex part. iv. reguli ʒii & part. V. Jovis, cum triplo ̄i detonatis, bezoardicum Joviale, & similia fixa ̄i alia, Hinc

ʒ. ̄i ̄i ̄i Tacchen. ʒij.

̄i ̄i absinth. ʒj.

M. div. in 2. part. æqu. S.

Digestiv - Pulver.

ʒ. Lapid. ̄i præp.

̄i ̄i digest. hypoch. ʒʒ. M. pro 2. dos.

ʒ. crem. ̄i ʒj.

Lapid. ̄i præp. ʒj. M. pro 2. dos.

Duobus diebus manè in vehiculo calido assumendis.

ʒ. matr. perlar. præp. ʒj.

̄i ̄i ̄i.

̄i ̄i ̄i depur. à ʒʒ. M.

Dosis quantum cultelli cuspidè capi potest, vespèri usurpanda:

Mane verò

ʒ. R ̄i ̄i acris, l. ex ̄i ̄i & ̄i calcinatis, vel ex scoriis reg. ʒii ʒij.

̄i ̄i ̄i ʒj. ad ʒʒ.

M. S.

Gröffnende R.

Dosis 40. vel 50. gutt. bis l. ter in die in vehiculo calido.

Quibus præmissis unâ vel alterâ vice propinetur vomitorium. Aut si hoc minùs conveniat, instituatur purgatio per alvum, inter quæ est radix esulæ legitimè præparata, vel ejus extractum, quò sæpissimè & frequentissimè usus fuit Rulandus in *Curat.* Abstinendum tamen à fortioribus & frequentioribus, cum magis noceant, quàm profint: vid. Hoffmanni *M. M. l. 1. c. 7. & l. 2. cap. 6.* Pilulæ ex extractis panchymagogis cum Mercurio dulci sunt admodum utiles, v. g.

ʒ. Extr. panchym. Croll. gr. xij. ad xv.

̄i ̄i dulc. ritè præp. gr. xij. l. xv. ad ʒj.

extr. troch. alb. gr. j. l. ʒʒ. ad gr. ij. & iij.

c. essent. absinth. f. Pilulæ.

Aut etiam potio laxativa cum gummi ammon. usurpetur, aut infusum rhabarbari, Riverius in purganda anasarca utitur succo ireos recenti per residentiam depurato ad ʒij. cum ʒʒ. mannæ invicem permistis, ad serositates abundantes evacuandas.

His præmissis fit accessus ad Martialia: hinc tot pulveres & medicamenta anticachectica prostant, qui basin Martem agnoscunt. Martialia hæc diversimodè præparantur: interim, quò simplicior præparatio, eò melior, & quo minùs ab acidis saturatur

(Ggg 2)

Mars,

Mars, eò efficacior erit, unde pulvis cachecticus Quercetani nullius est pretii, quoniam illius primum ingrediens est crocus Martis saccharinus; cuius tamen nullus est usus. In specie tamen Martialia, prout nunc acida magis nunc acria peccant, disponuntur: in subiectis enim non delicatis locum invenit sufficientem limatura Martis, minutissimè trita & pulverisata, præprimis ubi acidum fortius peccat. Parili ratione pulvis cachecticus Hartmanni usurpari potest, & in specie de pulveribus antecachecticis vid. Hartmannus in *Praxi Chym.* p. 204. & 206. c. g.

℞. limat. ♂ is part. j.  
cinnam. pulveris. part. ij.  
sacch. ad pondus omnium.  
F. pulvis.

Quidosi ʒj. frequenter usurpetur. Vel

℞. ʒii diaph. ♂ ial.  
♂ is absinth. ā ʒß.  
♂ o ♂ as. ligni sassafr. gutt. j.  
M. prodoli. S.

#### Größfneud Pulver.

Ubi verò acidum non adeò excessivum, ac stomachus sensibilis, in his casibus Martialia præparanda sunt, aut imprimis vina Martialia conveniunt.

℞. limatur. ♂ is ʒiiß.

Affundantur vini mensuræ tot, quot illius uncia sunt, stent invicem per 40. dies noctesque, postmodum de hoc uncias aliquot hauriat æger, cui si addantur aromata, majorem efficaciam acquirat.

Quò facit Claretum Martiale Mynsichtii, item vinum Malvaticum Martiale Hartmanni, quod habet in *Praxi Chimiæ* pag. 204. & 206. Loco vini Malvatici commodius assumitur Rhenanum, quod est acrius, & potentius rodit Martem; nec non extractum ♂ is cum succo pomorum Borsdorffianorum, vel musto vel decocto Tamarindorum, uti etiam extractum ♂ is Mynsichtii, deque tali extracto, quantum culpis cultri capit, vel ad quantitatem castaneæ, in vino Martiali propinatur. Huc spectat R vitrioli ♂ is Zwelfferi & Ludovici, ♂ diaphoreticum ♂ iale: loco V communis sumitur ~ baccarum juniperi, vel menthæ, cochleariæ, &c. Bezoardicum Martiale, quod etiam in anasarca, & incipiente hydrope est egregium. Pertinet huc etiam ♂ ialis ex affusione solutionis ♂ i super limaturam ♂ is; sic enim fiunt crystalli ♂ iales.

Vel in subiecto paulo robustioris stomachi usurpentur acidulæ naturales & artificiales: vid. Platerus *Observat. lib. 3. pag. 608. & Prax. T. 3. pag. 114.* Vel:

℞. liqu. ♂ is ♂ ar. ʒij. l. iij.  
D. S.

#### Gauer-Brunnen-Essenz.

De quo primò die gutt. vj. capiantur, secundo viij. tertio xij. ascendendo, ad 15. 20. vel 30. guttulas, ad modum acidularum in morbis chronicis:

℞. ∇ fumar.

genist. ā ʒiß.

Mag. i. Extr. ♂ is Myns. vel c. succ.

pom. ʒiß. ad ʒij.

M. D. S.

#### Größfneud Träncklein/ Köffel-Weisse.

Capiat quotidie bis cochl. j. l. ij.

℞. pulp. passul. per setac. traj. ʒvj.

Extract. ♂ c. s. p. ʒvj.

rhab. el. ʒij.

c. f. q. syr. rosat. sol. l. pomor. f. Electuarius.

D. S.

#### Größfneude Lattwerge.

Capiatur quotidie manè dosis magnitudine castaneæ. Et consultum est omni septimana, ad minimum semel, blanda laxativa interponere, ut ita, quod cicuratum est, ab illis evacuetur: e. g. vespertino tempore usurpentur pilulæ, ut dosis pilularum usualium, v. g. Glassianorum, aut F. F. de \*co & ♀ ex Quercetani, aut quales describit Sylvius in *Prax. c. 7. §. 52. p. 69. &c.* & ita interpolatis vicibus cum istis ♂ ialibus adhibeantur.

Item ℞. Galban. c. + o sol. ʒß.

extract. troch. alhand. gr. ix.

diagrid. gr. iij.

F. Pilulæ pro 3. dosibus.

Martialibus his ad aliquot septimanas continuatis, fiat progressus ad alterantia volatilia, plus minus aromaticam, quæ vulgò vocantur hepatica, i. e. quæ sunt saporis amaricantis & acris plus minus, & omnia imprægnata sunt sale volatili urinoso, nunc magis nunc minus temperato, blandè laxantibus mista, ut ita acuetur bilis, alteretur sanguinis dyscrasia, resolvantur cruditates acidæ, & succi vitiosi sensim & per epicrasin simul evacuentur. Aromatica illa in genere sunt omnia simplicia amara & acria. Ut enim acida stomacho sunt amica: ita amara hepatis grata, quatenus incidunt, & bilem corrigunt. Inter acria illa, ♂ c volatili plus turgida, eminent eichorium, radix nempe ejus, radix ari, helenii, centaurium minus, carduus benedictus, & maximè ablinthium & agrimonia, cujus decoctum insigniter laudat Poterius; rosmarinus, hyssopus, salvia, mentha, & similia; item omnia antiscorbutica, ut radix armoraciæ, nasturtium, cochlearia, &c. locum inveniunt in curanda cachexia & anasarca: quæ laudantur à Bacone de Verulamio in *hist. vita & mortis*; flores genistæ, bellidis, centaurii minoris, epaticæ nobilis: quibus porro aromata omnia, quatenus sunt stomachica, & imprægnata sale volatili oleoso, præ cæteris tamen cinnamomum, galan-



galanga, zedoaria, caryophylli, zingiber, &c. adduntur. Ex his confici possunt noduli vino infundendi, nunc solis, nunc cum laxantibus junctis, nunc antè, nunc post Martialia: v. g.

℞. HB. absinth.  
menth. ā Mj.  
rad. enul. ʒj.  
gentian. ʒʒ.  
rhab. el. ʒvj.  
fol. senn. f. st. ʒj.  
rad. helleb. nigr. non prap. ʒvj.  
cort. esul. prap. ʒij.  
⊕ ʒʒ.

Includantur nodulo, qui indatur vini mensuris aliquot.

℞. HB. rorismar.  
salvia ī Mʒ.  
absinth.  
fl. centaur. min. ā M. j.  
genista p. ij.  
rhabarb. el. ʒʒ.  
cinnam.  
galang.  
zingib. ā ʒij.  
umat. ʒ is rec. ʒʒ. M.

Nam rhabarbarum non tam propter usum laxandi, quam alterandi, acidum corrigendi, bilem in naturali statu conservandi, urinam movendi, & atoniam hepatis corrigendi, adhibetur. Sanè præmissis præmittendis in virginibus, in specie cachecticis, egregium usum observavi tam rob juniperi solius, subinde usurpatum, quam ex rob juniperi cum rhabarb. pulverisato facti electuarii.

℞. rob. juniper. ʒij.  
pulv. rhabarb. el. ʒij.  
cinnam. el. ʒj.

M. f. Electuarium: S.

### Eröffnende Lattwerge.

De quo omninane capiat bonam dosin.

Huc etiam pertinent cerevisia & vina anticachectica, quorum formulas videb. in Timæo von Guldens Klee in epist. p. 428.

Pertinet huc elixyr anticachecticum D. Reinesii. Compositio est magistralis, quam nemo facile imitabitur; nam tria ingredientia interdum plus præstant.

In officinis prostant species diacurcumæ, & dia-galangæ: hinc Rondeletius ceu expertissimum remedium in omni cachexia habet has pilulas:

℞. spec. dia-cure. ʒiv.  
rhab. el. ʒj.  
spec. dia-rhod. Abbat.  
dia-galang. ā ʒj.  
c. f. q. syr. de absinth. f. l. a. pilulæ, ex ʒj.  
no. 30.

Dos. 20.

Tandem passulæ mirè conveniunt in ca-

chexiis quibuscvis, & loco rob juniperi usurpari possunt, quæ egregè conveniunt in temperanda sanguinis discrasia, quia sanguinem laudabilem ac temperatum reddunt, bilem optimè in statu naturali conservant, & sanguinis motum fermentativum nonnihil restitunt. Sunt enim quasi mustum concentratum. Joël & Riverius pinguefaciendi vim eis adscribunt.

Præscribi etiam potest electuarium Augennii, aut electuarium ex passulis Horstii in obs. pag. 201. aut electuarium molle sequens:

℞. pulp. passul. Corinth. ʒvj.  
Rhabarb. el.  
crem. ʒi ā ʒij.  
⊕ ʒʒ.  
cinnam. acerr. ʒj.

c. f. q. syr. de pomis f. Electuarium molle.

In fine adhibentur omnia talia volatilia, plus minus oleosa, ~ urinosi volatiles, tam simplices quam compositi, ~ ʒi volatilis, carminativus, liquor C. C. succinatus, lumbricorum urinosus, urinæ, ʒis \*ci simpl. & oleosus, R nephritica Ammelungii, &c. Quibus pro circumstantiarum ratione nunc tefrifuga, nunc antiscorbutica, nunc emmenagoga, permiscenda, elixyr proprietatis sine acido, imprimis illud rubineum, quod paratur cum spiritu urinæ, vel ʒis \*ci, elixyr præcipitans, cachecticum polychrestum, vel solitarium, vel cum essentia absinthii, agrimonie, rorismarini, juniperi, R tartari composita, &c. Donec ex aëre reconvalescat æger: Hinc

℞. R ʒi compos. aut elixir. anticachect.  
aut elix. propr. f. acido ʒj.  
essent. absinth.  
cent. min. ā ʒij.  
M. D. S.

### Eröffnende Essenz.

Dosis 40. l. 50. gutt. bis vel ter in die, manè in vehiculo calido, hora quinta pomeridiana, in cerevisia, & sub introitu lecti.

Vel æ. talia matutino tempore, à meridie verò recipiatur ~ ʒis \*ci, vel hujus loco spiritus carminativus de tribus, vel R nephritica, vel liquor C. C. succinatus:

℞. ~ carminat. de tribus ʒij.  
ʒis \*ci ʒʒ.  
M. D. S.

### Resolvirender Spiritus.

Dosis 50. gutt.

℞. R nephrit. ʒʒ.  
liqu. C. C. succin. ʒij. M.

Tandem balsamum sulphuris terebinthinatum vel juniperinum commodè aliquandiu continuandum venit. Item cum aromaticis istis interdum usurpatis capiat sub introitu lecti elixyr. menthæ, cochleariæ, &c. parva dosis, aut hujus loco ~ baccarum juniperi, menthæ, salviæ, &c.

(Ggg 3)

ARTI.

I. Ex febribus intermittentibus chronicis, quibusvis malè tractatis, speciatim ex quartana diuturna: præsertim quando ægri in paroxysmo nimis bibunt, pro quo præservando diebus intermissionis amara ex vegetabilibus febrifugis, præsertim absinthio, sedulò usurpanda sunt, pro conservanda bilis & sanguinis crasi, debitoque viscerum tono: vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 322.

II. Ex asthma (præsertim orthopnoëia) non solum humoroso, sed etiam convulsivo: item ex aliis pectoris pathematibus; siquidem aliquando empyema, phthisin & sanguinis sputum hydropem hunc insecutum observatum fuit.

III. Ex renum vitio vix credo: an possit ascites universalis supervenire sine renum præternaturalium defectu, præterea, quæ Helmontius *Tract. Ignotus Hydrops* §. 16. & 20. habet, Platerus confirmat in observationibus, ubi ex renibus exulceratis Hydropem ortum allegat. Hinc renum, ceu adæquatum artificem omnis hydropis, asserit Helmontius *l. a.* vel ex eo imprimis, quod totus hydrops per urinæ fluxum solvatur, *l. c.* §. 3. & 20. Totum enim fundamentum, propter quod supervenit cachexiæ hydrops, consistit partim in renibus, partim in defectu virium vitalium, humores non amplius regere valentium. Sanè ex renibus obstructis & debilitatis, aut ab iisdem ulceratis, crebrior hydrops observatus; sicut pariter nephritica pathemata, & renes exulcerati frequenter hunc affectum inferunt. Mictus quoque sanguinis diuturnus hydropem infert, teste Schenkio in *Observat.*

IV. Ex vitio visceris cujusdam nobilioris, aut usus necessarii in abdomine, hepate, liene, mesenterii glandulis affectis, utero, &c. Rondeletius in *Praxi* l. 3. c. 35. de scirrhus hepatis inquit: se ex frequenti corporum dissectione observasse, omnes hydropicos vel scirrhus, vel glandulas mesenterii induratas, habere, aut pancreas similiter constitutum: Item ex ulcere mesenterii observatus fuit hydrops, quod confirmat Rondeletius *l. a.* c. 36. Tulpi<sup>9</sup> *lib.* 2. *Obs.* 32. Hæchstetter<sup>9</sup> *Dec.* 6. *Cons.* 6. & ex vulnere hepatis, sclopeto inflicto, suppurato hydropem natum, *videb.* in M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Obs.* 106. p. 145.

V. Ex ictero, & aliis quibusvis cachexiæ speciebus confirmatis: in specie scorbutum hydrops sui generis insequi solet. de quo vid. optimè differentem Eugalenum *Tr. de Scorbuto*.

VI. A sanguine, vel præter-naturaliter excreto vel retento. Sic suppressæ hæmorrhoides aquæ intercutis metum injiciunt: sic propter menstrua consueta suppressa hydrops non rarò supervenit; e. g. post quamvis hæmorrhagiam, aut nimiam, aut crebriùs repetentem, semper cachexiæ & hydropis metus imminet: sic post vomitum sanguinis post im-

modicum sanguinis sputum, hydropem insecutum, &c. observatum fuit: Vid. Riverius in *Observ. communicatis*.

VII. Imò ex aliis nimis excretionibus, præsertim per alvum, tam artificialibus (sic enim leucophlegmatiam & ascitem à variis catharticis malè adhibitis, crebrioribus aut fortioribus, notat Poterius *cent.* 2. c. 29.) & non-naturalibus, quam præternaturalibus: sic ex alvi profluvio diuturno observat Ferdinandus *Hydropem*, *Hist.* 98. item succedentem ptyalismo diuturno & pertinaci Thonerus in *Obs.* Idem de dysenteria, ac similibus excretionibus observatū, necnon de Veneris abusu.

VIII. Crebriori & copiosiori aut intempestiva potus, præsertim frigidi, post nimium æstum, aut corporis exercitium, aut æstum febrilem, ingurgitatione: qualium exemplum, præter Pisonem *Tract. de Colluvie serosa*, etiam refert Sennertus l. 3. pag. 711. Sic intemperantia ebriosa ad hydropem disponit: Ex haustu copioso frigidiæ post nimium æstum hydrops post tertianam genitus in M. A. N. C. *Ann.* 6. *Obs.* 52. p. 85. Potus nocturnus in specie ad hydropem disponit. Vid. *Acta Med. Hassniensia* Vol. 2. pag. 260. & 262. In paroxysmo febrium, qui copiosius potant, præsertim frigida, facillimè hydropem incurrunt: item ex copioso frigidiæ potu in æstate hepatis scirrhus & hydrops, vid. in Fonseca *lib.* 2. *Cons.* 39. item Riverio *Cent.* 2. *Obs.* 65. Alius frigidam quotidie ante prandium bibens hydropicus factus, Autore Panarollo *Pent.* 3. *Observat.* 42. Idem confirmat Henricus ab Heer *Obs.* annotans quendam ex assidua ebriositate ictero & hydrope laborasse: acidulas indispositis hydropem accelerare posse, vid. in M. A. N. C. *Obs.* 180. *Ann.* 3. Quo facit V nimius abusus, & similium potuum aromaticorum aut generosiorum ingurgitatio nimia, colliquationem nimirum inducendo, & lymphæ acrimoniam augendo. Spectant huc esus fructuum pituitosorum nimii, v. g. lactucæ, endiviæ, &c.

Juxta has causas magis particulares observandum: sensibilis urinæ excretionis, & sensibilis transpirationis defectum, ut plurimum, si non semper, adesse in hydropicis.

Urinam quod attinet: sanè hæc non unusmodi excernitur in hydropicis, quando ut plurimum crassa, intensè tineta, & perquam lixivialis, pauca tamen, quæ in aliis econtrà pallida, tenuis, cruda & pauca, prodire solet. Sanè in omnibus parciore & longè minor copia, quam assumptorum potulentorum fert ratio, excernitur, quæ in aliis econtrà, utut rarius. Et ferè primam occasionem suggerunt hydropi renes; imò frequenter ex solis renibus affectis, atque lotium non emittentibus hydrops supervenit. Hinc etiam est, quod optima & tutissima hydropicis cura in

uri-

urinæ provocatione consistat, quâ denuò copiosius fluente subito evadunt. Hinc est, quod id serum, quod aliàs sub forma urinæ emittendum erat, in abdomine verò coactum exhaustum arte, nullas tamen proprietates urinæ, nec odore, nec sapore, nec colore exhibeat, cessante nempe renum functione. Schenckius in cive Altenburgensi decollato & publicè dissecto renalem adipem maxima ex parte aqueam, defluere vidit, indeque hydropis initia visceribus & testibus inducta observavit; & Bartholinus omentum in hydropicis computruisse vidit.

Quoad insensibilem transpirationem, huius penuria colligitur ex eo, quod licet multum feri colligant hydropici, nihilominus tamen difficulter sudant: ideoque & citra madorem illorum corpus est, nec in balneis facile sudore madescunt; Hinc si sudor hydropicis supervenerit, adeo, ut æger alleviari se senserit, bonum. Forlan observationem hinc meretur, quod Smetius *Miscellan. lib. 8.* asserit, illos præcipuè difficulter sudare, quibus jecur & lien ætate morbòve inaruerit, vel obstructione magna aut scirrhus obduerit.

Præmissis hisce, symptomata necesse erit considerare, quæ præsentia sui hydropem vel præsentem vel plus minus imminentem, designant. Incipiunt ferè pedes in inferioribus locis circa talos intumescere, tumore quidem œdematoso plus minus seroso, impressi digiti vestigia aliquandiu retinente, qui noctu quidem imminuitur, ita ut matutino tempore multò exilior videatur: Interdum augetur, adeoque vespertino tempore major longè apparet. Idem tumor paulatim ascendens transit ad ventrem, quem successivè occupat: ut plurimum in scrotum sibi parat viam, & tunc simul quandoque intumescunt testes, præputium & colon, quandoque penitus occultatur, quandoque quadruplo major & translucidus fit. Dum æger de latere in latus convertitur, murmur & fluctuationem aquæ quasi sentit, quinimo moto corpore & ita movetur, ut impetus ejus conspici possit, ut habet Celsus. Intumescit autem abdomen plerumque sensim & vix animadvertentibus ægris, & interdum quasi subito & brevi temporis intervallo. Præterea nunc unum tantum latus tumor occupat, nunc utrumque, ita ut venter quandoque in duas partes divisus videatur, nunc verò aliquantulum distenditur venter ab hypochondriis ad pubem usque; erecto autem corpore sensus ponderis procumbentis in regione inguinum percipitur. Plerumque quidem venter etiam post mortem tumidus manet, raro verò detumescit, quod tamen observavit Ballonius *l. 2. Epid. Eph. pag. 270.* Dum sic inferiores corporis partes accrescunt, superiores decrescunt & emaciantur, præcipuè ju-

Tom. II.

gulum, cervix & pectus, quibusdam tamen & facies, præsertim matutino tempore à somno, intumescit, interdum & ad extremum manus inflantur, colore in facie ut plurimum subpallido plus minus ac livido. Multi pruritu admodum molesto vexantur; quidam enim scabie sicca laborant. Abscessus quoque & maculæ in cruribus quibusdam erumpunt, sæpius tamen lethales. Plerumque febris comitari solet hydropicos, estque continua lenta, circa vesperam manifestior. Pulsus est parvus, crebrior, subdurus, cum quadam tensione. Sitis imprimis ægros miserè vexat, quæ indulgendo crescit, & quò plus sunt potæ, plus sitiuntur aquæ: simul etiam cibi fastidium adest insigne: quod si, quod rarissimum tamen est, sitiant parum, e contra commodè plus minus appetant, melius omnino signum putandum est. Hinc magnam angustiam circa præcordia sentiunt & spirandi difficultatem, maximè cum loca alta scandunt vel decumbunt, estque unum ex præcipuis, de quo conqueruntur ægri, quæ etiam nondum apparente tumore incipit, hydropemque præfigit, eoque emergente incrementum sumit, adeo, ut sæpius à media nocte orthopnoicorum more erecti spiritum ducere cogantur, Hinc dyspnœiam nocturnam prænunciam hydropis ascitis esse asserit Platerus *in Obs. &* tum plerumque etiam tussis sicca, seu inanis ad tussendum irritatio, eaque mali ominis, accedere solet. Conf. M. A. N. C. *Ann. 8. Obs. 27.* Alvus nunc clausa est, nunc quibusdam idque non absque *ὑδρωπία* subito liberior esse solet. Quandoque & epilepsia asciti supervenit, & grave periculum plerumque minatur: interdum eadem in apoplexiam lethalem convertitur. Refert enim Ballonius *lib. 1. Epid. Eph. pag. 27.* piscatorum quendam hydropem laborantem epilepticum factum, sæpius convulsam, abscessu circa testiculos & femora facto liberatum fuisse ab hydropem & epilepsia.

Observandum autem, ne obesi nimis habeantur interdum pro hydropicis, de quo vid. Hœchstetterus *Decad. 10. pag. 418.* Probè quoque observandum est, ne confundantur hydropicæ & gravidæ. Discernuntur autem invicem:

1. Ex colore faciei vivido, & bono habitu.
2. Ex tumoris specie. In gravidis tumor abdominis ad præcordia sursum vergit, estque inæqualis: In hydropicis autem inferior pars abdominis intumescit, mammae detumescunt, & tumor undique est æqualis, & quasi œdematosus; ut nil dicam de motu fœtus.
3. Certum signum est fluctuatio, nempe ad



Hippocrates *Aphor.* 46. S. 5. five meatus spermatricos comprimendo, prout ex Timæo von Gilden-Ree / 1. 6. *Cas.* 2. & Betto de ortu & natura sangu. cap. 2. *Seçt.* 5. videre licet.

De cætero propter corpulentiam Medici auxilium rarò imploratur; imò difficulter eadem sanatur.

### C U R A.

Quoad curam corpulentiz nimiz seu obesitatis: nitamur

1. Ut impediatur copiosus alimenti laudabilis proventus, quod ipsum fieri potest per inediam & moderatam dietam.
2. Ut nutrimentum jam genitum ante sui assimilationem maturè removeatur, quod faciunt diuretica & sudorifera primariò, hinc purgantia & venæsectiones: quemadmodum Zacutus Lusitanus l. 3. *Prax. Admir. Obs.* 12. prodigiosam obesitatem scarificatione ac hirudinum suctu; ac Bartholinus *Act. Hassnien. Part. 1. Obs.* 74. per salivationem, curatam testatur. Unde rusticos ob continuos labores, adeoq; sudores rarò pingues ac obesos videmus, sicuti qui ex vita sedentaria laboriosam subito ineunt, successivè emaciantur.
3. Ut nutrimentum partis jam assimilatum plus minus resolvatur ac liquefiat, & ut resolutum, & sero alluente imbibitum, evacuetur; serum enim, uti primo est vehiculum alimentorum, ita postmodum vehiculum est excernendorum.

Quoad indicationem primam: corpulenti & obesi temperent sibi à cibis *ἐὺχρηστοί* largiùs assumptis, & omnibus iis, quæ ad maiorem corporis molem causam aliàs præbere possunt: Cæna sit parca ac somnus brevior. Contra profunt cibi solidiores & pauciores, probè Siti; nec non olera, ratione Sitis nitrosi alvum & Cæm moventia. Probè autem observandum, ne mox in principio, aut intempestivè nimis, corpori nimium, sed singulis saltem diebus aliquid, subtrahatur; cum vires aliàs debilitarentur.

Dubium equidem oriri potest: an nempe possibile sit, ut corpulentia jam factâ nutrimentum semel assimilatum denuo resolvatur, & foras eliminetur, adeoque augmentatio ita cesset? sed respondeo affirmando. Videmus enim, quod febrium ardor corpora antea crassa & obesa soleat insigniter emaciare: item quod scorbutus confirmatus corpus succi plenum breviter reddat emaciatum, unde atrophia scorbutica. Ad hæc viscerum ulcera, dum hæcticam inferunt, ita massam sanguineam inficiendo phthisicos & macros reddunt, uti idem fieri cernimus per diabetelem & salivationem, itemque per nimias purga-

tiones: ac in specie lymphæ copiosioris ac urinæ fluxus insignior emaciat, sicut hoc confirmat Helmontius *Tract. Jus Duum-Virat.* §. 59. & *Tract. Latex Humor. Negl.* §. 44. Schenckius in lib. 3. *Observ.* pag. 356. Nec minùs efficax est copiosa salivæ excretio: notum enim est, quod lue Venereâ laborantes, curati per inunctiones Mercuriales ubi continuam ac copiosam excernunt salivam, exinde admodum attenuentur: Conf. Borellus C. 2. *observ.* 11. ubi refert, quendam per crebriorem masticationem fol. nicotianæ extenuatum fuisse redditum: hæc enim cum sit forte masticatorium, & uberrimam proliciat salivam hinc gelatina nutritiva necessariò simul expellitur: Id quod etiam cum foliis lauri indicat Borellus, quod multas aquas educant; hæc & similia persuadent, quod corpora pinguetacta post resolutionem jam assimilati nutrimenti, à latice aquoso partes ambiente imbibiti, & sub forma urinæ aut salivæ copiosè & ubertim evacuati emacientur. Convenit ergò & dulcis cum extracto catholico aut panchymagogo Crollii, pilulis aloëticis aut aliis lenioribus purgantibus commixtus, quotidie præmissis præmittendis propinando, donec salivatio largior subsequatur: qualem methodum videbitis in Bartholini *Actis Hassnienf. Tom. 1. Observat.* 74. Quo etiam pertinet nicotianæ fumus, mane ac vespere haustus.

De cætero inter remedia emaciantia in specie eminet acetum, & omnia ex eo parata; imprimis acetum scylliticum allegatur à Cattiero, l. 2. Id quod confirmat Stephanus in *Oper. Med. Tract. Cosmetice*; ad obesitatem tollendam nihil melius esse, quàm acetum scylliticum jejuno stomacho haustum, hinc acetum rutaceum, aut etiam potus ordinarius ex chalybeata aceto temperata, item acetum scylliticum, in quo absinthium est maceratum, & omnia acida sæpiùs usurpata, profunt. Hæc enim faciunt, ut alimenta ingesta admodum dissolvantur & liquecant in serosioris & asperioris minusque nutritivum chylum, qui porro tam sub digestionem in stomacho, quàm extra eum in duodeno, attactu fellis, abit in sal tertium plus minus volatile acre, ac sit insigne abstersivum, tam sordium nocivarum quàm etiam nutrimenti laudabilioris, & diureticum: unde nutrimentum chylosum extenuatum & resolutum tunc sub urinæ forma solet emitti, adeoque habitus corpulentior successivè imminuitur. Sic quoque acetum supra nitrum ac sal aliquoties cohobatum, uti acrius & magis diureticum fit, ita corpus magis ad emaciationem disponit, si assumatur. Post acida huc etiam spectant purgantia; hæc enim semper aliquid de viribus deprædando corpus

corpus macidam reddunt: Hinc etiam Celsus inquit: crebris purgationibus adfuescere, est corpus non nutrire. Nam purgantia etiam nutritium succum putrilagine afficiunt, & sub forma stercoreum exhauriunt. Verum cum purgantia fortiora ceu venenata non semper tutò in usum vocari possint, propterea aloëtica abstergentia mixta conducunt imprimis. Hinc Fernelius *Conf.* 14. ad obesitatem exhibet pilulas ex rhabarbaro, aloë & agarico paratas, quibus aliquandiu continuatis corpulentia dempta est. Præ cæteris hoc in casu pollet aloë ob amarorem, & hinc ob vim acidum abstergendi; unde etiam Gruelingius pilulas aloëticas & Francofurtenses obesim commendavit. Elixyr proprietatis, uti etiam omnia amaricantia, myrrha v. g. pilulæ de tribus, MP. hieræ cum agarico, vel de aloë cum agarico, congrua sunt remedia: ac Practici communiter & rectè dicunt, elixyr proprietatis exsiccare corpus; quæ exsiccatio tamen consistit in colliquefactione succorum nutritivorum. Huc pertinent alia amaricantia, v. g. centaurium minus, nasturtium, mentha, absinthium, & ejus essentia, essentia myrrhæ, gentianæ, & similia: quæ omnia vulgò exsiccare dicuntur, cum tamen reverà corporis nutrimentum attenuent & dissolvant, ac sero involvant, quod interdum excernitur sub forma urinæ, interdum sudoris. Ulterius diuretica quæcunque fortiora per copiosum urinæ fluxum solent extenuare, copiosius usurpata: quæ inter eminet radix asparagi, fœniculi, petroselinii; item alliata ac cepacea omnia; syrupi dicti de duabus, item de 5. radicibus, decoctum cicerum rubrorum, item cappares, olivæ, amygdalæ amaræ, & similia condimenta diuretica. Ad hæc in specie pertinet tartarus, cujus volatilis aciditas potenter abstergit, ac vi attenuativâ, simul interdum blandè urinam movet; hinc enim Forestus *lib.* 3 1. *Observ.* 13. talem habet pulverem:

℞. *Qi crudi* ʒj.  
*cinn.* ʒiij.  
*zingib.* ʒj.  
*sacch.* ad pondus omnium.  
*M. f. Pulvis.*

*Conf.* Epiphanius Ferdinandus *Consil.* 82. Alii commendant pulverem compositum ex ana tartari & cymarum seu julorum coryli, qui crebrius ante pastum, & hinc sub introitu lecti assumatur, idque eò magis ʒj. vel ʒʒ. irroretur cum aceto ʒato, idque continuo, donec corpus egregiè emacietur.

Quæ dico de tartaro simplici, etiam intelligenda de sale volatili, & nobilioribus præparatis, quod præsuppono.

Pertinet huc etiam tartarus vitriolatus, qui & ipse ad emaciandum aptus: sic quoque nitrum obesitatem impedire vi suâ diureticâ

observatum fuit, ac in specie ̄ crudum copiosius usurpatum & nitrum ̄ latum. Imò per ʒs nitrum, alumen, & Martem continentes, pinguedinem nimiam in quodam solutam Timæus à *Gulden-Klee/ lib.* 3. *Cas.* 3. testatur. D. Langius ceu singulare habuit arcanum species diaspoliticon Galeni ex nitro & cumino, pertinet huc tartarus vitriolatus Bartholetti ex ̄ ʒi, & spiritu nitri invicem mistis paratus, item gummi juniperinum hinc etiam elegantes sunt pilulæ contra obesitatem nimiam Mynsichtii, quæ basin gummi dicti agnoscunt, & multum valent: dosis ʒj. est, singulis mane jejuno stomacho. Vel

℞. *MP. de sandar.* ʒij.  
*̄ volat. viperar.* ʒj.  
*c. elixyr. propr. f. Pilula* instar  
*pili min.* D. S.  
*Behrende Pillen.* pro 4. dosibus.  
*℞. sandarac.* ʒij.  
*Myrrh. elect.*  
*res. lign. sancti*  
*extract. absinth.*  
*aloës a ʒj.*  
*~ Colicoag.* ʒʒ.

*M. f. Pilul.* pro 7. dos.

Semen fraxini ad ʒj. mane in haustu vini propinatum insigniter commendatur ad evacuandam urinam, ratione cujus & hydropicos curat, & emaciat crassos. Secretum D. Erbenii est semen esulæ pulverisatum, & omni mane, quantum cultelli cuspidē capitur, usurpatum & continuatum; nec omittenda terebinthina ratione virtutis diureticæ: refert Forestus *c. l.* de viro valdè crasso, qui insigniter extenuatus per pilulas ex terebinthina cum saccharo paratas, assumendo earum majuscularum 5. & 7. per 2. horas ante prandium.

Denique per sudorem etiam corpus emaciatur, sive per interna elicietur, sive externe per exercitia. Atque hinc omnia decocta lignorum, in specie guaiaci & ligni sancti, exsiccare dicuntur, quatenus sudorem copiosorem provocant. In specie autem sudorifera cum & ex salibus alcalibus parata, item salia theriacalia expectando sudorem egregia sunt. Aliis salia viperarum, item alia remedia viperina, sunt commendata, item salivatio Mercurialis mirabiliter corpus emaciat, ita ut illud sceleti formam repræsentet; Mercurius enim acrimoniam suâ nutrimentum corporis dissolvit.

Tandem ex fonte Chirurgico huc spectant crebriores venæsectiones, & plures inusti fonticuli: venæsectio enim cum sanguine simul nutrimentum exhaurit; unde subtracto nutrimento emaciat: Ex fonticulis verò sub forma puris nutrimentum partium resolutum evacuat, massa sanguinea depravatur, & ita necessario emaciatur. Ex-

Externè à Mynsichtio commendatur decoctum nucum cupressi compositum, quod sine dubio ratione virtutis adstrictoriæ effluxum alimenti uberiores reprimat.

De evacuationibus adhuc notetur: has in obesius parciore esse debere, quàm in carnosius seu musculosius, ne corpus jamdum torpidum magis enervetur.

Quidam febrem artificialem excitare jubent, de qua integrum tractatum Johann. Daniel Major conscripsit; sicut & hoc ipsa sæpe natura nobis monstrat.

## CAPUT III.

De

### *Nutritione Depravata.*

## ARTICULUS I.

De

### *Cachexia in Genere.*

**Q**ualitate peccans corporis nutritio in genere vocari solet Cachexia. Hactenus equidem à pluribus descripta per tumidam totius corporis mollitiem, & via quasi ad hydropem credita fuit: ast generaliori conceptu opus est, cum sine corporis intumescencia cachexia quoque contingere possit. Est affectus iste, in quo natus & floridus cutis color, ac imprimis faciei nitor, perit, mutaturque in pallidum, lividum, luteum, virescentem, intensè rubicundum, &c. in diversis corporis partibus exanthemata & pustulæ emergunt, ac partium consistentia durior juxta ac asperior cum squamarum decidentia interdum in molliorem mutatur: nonnunquam sudor foetidus exhalat, cutis unctuosa observatur cum pruritu notabili, pilorum contingunt defluvia, dolores diversi partes diversas infestant, ita tamen, ut corpus nonnunquam simul intumescat. Cachexia talis est reverà fructus cacoehymix; hæc verò est pedissequa cacoehyliz. Nempe dependet omnis cachexia ab effusione vitiosi & depravati nutrimenti, i. e. humoris visceris, loco nutrimenti hinc inde distributi in habitum corporis ac partes molles; unde dum nutrimentum non ritè assimilatur, ob debitas proprietates deficientes emergit cachexia, adeoque prout variant nutrimenti vitia, variat etiam cachexia. Hinc humor iste, qui ita habitui corporis affunditur, si est albus, dicitur cachexia in specie; si flavus, dicitur icterus; si viridiusculus seu luridus aut lividus, aut alio tetro colore tinctus, ut plurimum icterus niger audit.

Datur etiam cachexia scorbutica & cachexia hypochondriaca, item scabies, elephantiasis, &c. in mulieribus ex uteri vel mensium vitio febris alba. In specie tamen usus obtinuit, ut vitium istud tantum cachexia appelletur, quando corpus à nativo colore in pallidum & lividum, plus minus viridem & habitum subtumidum & flaccidum degenerat & à sanguificationis defectu in specie dependet.

Ægri successivè pallefcunt, ac colorem plus minus lividum contrahunt, postmodum facies nonnihil intumescit, & tandem quoque habitus corporis; hinc dicunt: *Er wird so fett/ es ist aber keine natürliche Fettigkeit.* Præter cutis mutatum colorem juncta simul solet esse in plerisque dispnoea, quæ præsertim magis urgetur, quoties corpus, imprimis adscensu in altum, tantillum & leviter movetur, quæ ad motum corporis concitationem augetur, quin tunc sæpius cordis palpitatio, arteriarumque circa jugula temporaque inconsueta pulsatio, observatur; accidit quoque universi corporis, præ cæteris partibus crurum, lassitudo spontanea & tensio, animæ torpor: urget non rarò compressivus & anxiosus præcordiorum dolor, qui post alimenta assumpta intendi solet: appetitus in principio constat, in progressu verò prosternitur, ac non rarò tales ægri sitiunt: adest sæpe etiam febris lenta, ægro vix sensibilis, & quidem modò continua, modò intermittens, quotidiana ferè periodica, pulsus sunt inæquales, parvi, frequentes & debiles, urinæ sæpius etiam sunt crudæ, aquæ seu pallidæ, tenues & saltem minus tinctæ, rarò, nisi in progressu morbi, prodeunt crassæ & turbidæ cum copioso sedimento albo. Observata tamen fuit cachexia cum urinis lacteis, uti hoc habet Sylvaticus C. 1. Conf. 29. Tandem malo ulterius procedente corporis habitus fit turgidus, tumidus, crassus, & pallidus, foveamque post impressionem digiti ostendit, adeoque tunc vocatur Leucophlegmatia; si verò evadit turgidus cum quodam splendore & livore, quasi aquæ essent collectæ, vocatur anasarca, seu aqua intercus, tam universalis, quàm subinde particularis crurum, & est hydropis species. Antequàm Leucophlegmatia vel anasarca erumpat, fit ut pedes saltem intumescant, ulteriusque, morbo incrementum capiente, & abdomen intumescit, & sic in perfectum asciten abdominis, seu hydropem in specie sic dictum, degenerat. Nullis ac nulli ætati parcat cachexia, licet scæminas ob vitam sedentariam frequentius, & ob supervenientia menstruationis vitia contumaciùs ac pejùs afficiat: Quin & sæpius comitem habet affectum scor-



Icorbuticum aut hypochondricum. In principio morbi ciborum digestiones impediuntur, manente appetitu; tandem etiam anorexia accedit, corpusque summè imbecille redditur. Alvus sæpius est obstructa. Plura huc facientia videb. in specie in Sylvio lib. 4. Prax. & Tract. de Cachexia.

PARS AFFECTA.

Pars affecta seu subjectum in hæsiōis est habitus corporis, seu partes ejus solidæ molliores, in specie carnosæ, in ejus ambitu extrinsecus sitæ, quæ primariò afficiuntur; Subjectum verò radicationis, seu pars affecta à causa, est massa sanguinea caco-chymica facta.

CAUSÆ.

Causa proxima cachexiæ est nimia caco-chymia vel cruditas massæ sanguinæ, indeque dependens deficiens ac imminuta ejus fermentatio, unde chylus & ipse plus minus vitiosus non ritè assimilatur, sed tota massa eodem crudo repleta, cruda & vitiosè fermentans manet, particulæ ejus salinæ obruuntur, morbus magis magisque confirmatur, unde tali crudo sanguine, vel, ut vocant, pituitoso per partes circulato, hæ chylus & sanguine non ritè alteratis nec volatilifatis infarciuntur potius, quàm debitâ appositione aut aliquâ assimilatione nutriuntur, ita ut rectè proin dicat Forestus: corpus ita inflatum non aliter se habere, ac pastam non ritè fermentatam, in qua digiti impressi vestigium hæreat.

Causa remota est multiplex. Observandum enim cachexiam nunc esse affectum primarium, & qui per se incipit; nunc secundarium, aliosque insequitur morbos, v. g. qui quasvis sanguinis nimias effusiones, aut ejusmodi consuetas suppressas insequitur, in specie mensium suppressio, uti & nimius eorum fluxus, cachecticas reddunt mulieres: sic gonorrhœas diuturnas, aut fluores albos, item febres chronicas ordinariò insequitur: Mola aut foetus mortuus retentus etiam cachexiam inferunt: Videatur Forestus lib. 19. Observ. 26. in Schol. Hortius lib. 5. Observ. 21. Urinæ suppressio hepatis ac lienis aliorumque viscerum vitia, uti sunt atoniæ, obstructions & tumores faciliè scirrhescentes, renum ulcera, &c. cachexias inferunt.

Causa remota cachexiæ primariæ est deficiens chylosis, dum nempe alimenta in stomacho nec ritè fermentando volatilifantur, nec in subdulcem aut salum volatilem abeunt liquorem, sed in pituitam viscidam ac acidam degenerant, adeoque vitiosum in primis viis acidum quasi fixum, nec volatile, primum fundamentum cachexiæ ponit, quod fovet ulterius semper simul conjuncta bilis inertia, seu deficiens ejus acrimonia salina volatilis, quæ nec corrigit, nec perficit debitè chylum

Tom. II.

in duodeno, nec ritè feces separat. Ac in cachexia quidem semper peccat cruditas acida, quæ alimenta non transmutantur in chylum volatilem, sed viscidum: Unde ex vitio digestionis primæ orta cruditas acida ad massam sanguineam delata fermentationem ejus inhibet, hæmatosin turbat, & successivè cachexiam inducit. Massæ sanguinæ enim particulæ salinæ fermentativæ succo isto crudo atque incongruo obrutæ debitam chyli alterationem & sanguini assimilationem ritè perficere nequeunt; quin hic exinde crudus, plus minùs viscidus, & quasi occultè acidus remaneat, unde de facili stagnans sanguis in præcordiis, dum levi corporis motu celerius movetur ad pulmones & cor, dyspnœam & anxietates infert; Quin & massæ sanguinæ debitâ fermentatione vitiatâ & imminutâ imminuitur quoque in fœminis menstrua sanguinis fermentatio. Unde cachexiæ incipienti, multò magis confirmatæ, supervenit etiam mensium suppressio, quæ ipsa malum postmodum & gravius & contumacius reddit. Porro si sanguis crudo chylo inquinatus circuletur ad partes, tunc nutrimentum illud crudum appositum & congestum, necessariò leucophlegmatiam, summum cachexiæ gradû, post se relinquit, unde depravatur nutritio, adeoque habitus corporis tumidus insigniter inflatur, & exinde ob fibrarû musculosarû & nervosarum laxatum tonum flaccidus fit. Quod si ex retento qualicunque occasione sero aut lymphæ (cachectici enim non, aut difficillimè sudant, & parum quoque mingunt) serosior quoque simul fuerit sanguis, necessariò oritur vitium, quod dicitur anasarca, seu habitus corporis copiosâ aquâ suffusus; quæ eò erit major, si tali succo crudo aut obstructantur glandulæ partium musculosarum, aut etiam vasa lymphatica, ita ut lymphæ, aut saltem serositates, non ritè ex partibus per vasa lymphatica revehiqueant, sed debitus earum motus inhibeatur; unde sub cute aquositates congestæ necessariò habitum tumidum inferunt, & vulgò pro tertia hydropis specie, nempe totius corporis hydrope, habetur. Hinc Borellus Cent. 3. Observat. 66. observat corpus cachecticum crystalli instar translucens. Sive ergò copiosum serum in massa sanguinea peccet, sive motus impeditus lymphæ in causa sit, utroque modo generari potest anasarca. Quod si humorum istorum serosorum plus minus chylosorum seu pituitosorum ex proprio impetu decubitus fiat magis ad inferiora, unde crura, scrotum, ac tandem abdomen intumescant, erit ordinarius sic dictus hydrops.

Confunduntur equidem subinde leucophlegmatia & anasarca, sed malè; Differunt enim variis modis, & non, nisi subjecto, nempe habitu corporis inter se conveniunt. Nam

(Ggg)

in

in leucophlegmatia est habitus corporis pituitosus (i. e. crudus chylosus;) anasarca verò est ab ichoroso & crudo sero, in habitum corporis deposito, concurrente forsàn plus minus vasorum lymphaticorum ruptione: distinguere autem facile est leucophlegmatiam ab anasarca: in leucophlegmatia nempe minus est splendoris ac nitoris, quam est in anasarca, sed habitus corporis pallet; in hac verò corpus plus justo splendet ac nitet: Deinde vestigia foveæ digito impressæ in leucophlegmatia diu durant, tandem successivè pereunt, quæ in anasarca facilè & brevissimo tempore disparent. Interim sæpius evenit, ut leucophlegmatiam sequatur anasarca, si nempe impediatur feri & lymphæ transcolatio.

Causæ remotissimæ seu occasionales seu procatacticæ, ad cachexiam, leucophlegmatiam & anasarcam disponentes, sunt imprimis errata quædam in sex rebus non-naturalibus: quo pertinet vita desidiosa, & sine motu peracta; sicut contrà sub motu corporis homines malis hisce minimè soleant infestari, quàm curari potius, notante Panarollo *Pent. I. Observ. 30.* item ira, mœror, tristitia, & curæ protractæ, non raro inferunt cachexiam, quia non rectè volatilifatur sanguis, & intumescunt viscera. Huc pertinent errata in victu: sic enim intemperatè viventes subinde cachectici evadunt. Somnus nimius & labor deficiens promptè ad cachexiam disponit: & quæ sunt aliæ causæ externæ. Quò facit imprimis observatio Panarollie. *I. de muliere cachectica*: multis obstructis parenchymatibus, magis exercitio quam alio quocunque remedio curata: Unde vi oppositorum exercitium & motus deficiens disponunt ad cachexiam.

Quoad cachexiam secundariam: nascitur hæc talibus occasionibus, quæ sanguinem immediatè afficere, vel, idque frequentius, mediante læsione digestionis primæ eundem alterare possunt. Sic ea, quæ spiritus nimis exhaustiendo aut dissipando, & hinc fermentationem stomachi lædendo, ut hæmorrhagiæ nimix, gonorrhœæ, &c. vel fermentum digestivum alterando, ut menses suppressi, & febres chronicæ & malè curatæ, mediatè sanguinem alterant. In specie tamen post nimiam sanguinis effusionem progerminare solet cachexia, & hæc quidem frequentissima est causa, attestantibus omnibus autoribus, cachexiæ, & hydropis ascitis: vid. Forestus *lib. 19. Obs. 25.* Nam depauperatur massa sanguinea, & spoliatur principiis salinis, unde cruda manet, ut exinde minus fermentari, aut chylus assimilari possit. Immediatè afficit sanguinem lues Venerea, semper cachexiam comitem adsciscens, uti hoc refert Sennertus *lib. 3. Prax. pag. 704. cap. de Cachexia.* Urina suppressa, viscera, abdominis præsertim, affecta, sanguificationis aliàs perfectio-

ni inservientia, foetus mortuus diu in utero retentus, aut secundinæ retentæ, vel & mola diutius gestata, cachexiam non rarò interire solent. Sic cachexiam post foetum mortuum observat Horstius *Tom. 2. lib. 1. observ. 20.* item ex mola Forestus *lib. 19. obs. 26.* Sanguinem enim inquinando debitam quoque ejus spiritus ascentiam impediunt.

### DIAGNOSIS.

Signa cachexiæ in specie sic dictæ ex suprâ dictis facilè patent.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Cachexia, uti notum, ordinariò malum est admodum chronicum, & tardæ curationis: Imo, quo magis inveterata, & firmitus radicata, eò difficilius curatu, & nisi ei maturè occurratur, sæpissimè in anasarcam, leucophlegmatiam, & hydropem ascitem degenerat.

Sin occurrat scirrhus visceris cujusdam, hepatis aut lienis confirmatus, vix cachexia curabitur; sicut & illa, quæ sequitur morbum acutum & febrem ardentem, aut intermittentem chronicam, malè à Medico, vel crebriori potu ab ægro tractatam, difficilis est admodum, imo nullus curationis: Item si cachexia superveniat mulieribus, quibus jam ordine naturæ menses deficiunt, iis difficulter, aut admodum lentè curabitur, exque gravius reliquis laborare solent.

### C U R A.

In cura cachexiæ eo attendatur:

1. Ut corrigatur stomachus, ac ejus digestio prima & cruditas acida emendetur: quod ipsum post vomitoria imprimis præstant Martialia.
2. Ut corrigatur cruditas, & inde certa dyscrasia massæ sanguineæ, unà cū inertia ac deficiente acrimonia bilis.

Unde in cachexia primaria

1. Acidum vitiosum primarum viarum removendum per absorbentia, in specie Martialia, partes animalium duras, terrea, alcalia, tum fixa tum volatilia.
2. Viscidum incidendum & attenuandum per gummata, salia tam falsa, quàm alcalia, item per simplicia stomachica aromatica, ac salina volatilia.
3. Bilis inertia acuenda aromaticis seu resinosis volatilibus urinosiis, præsertim amaris, quæ aliàs hepatica dicuntur.
4. Cruditates primarum viarum & sanguinis plus minus correctæ evacuantur vomitu & secessu ex primis viis; ex massa sanguinea verò per sudorem & urinam.

In

In secundaria verò cachexia morbus primarius curandus, aut læsiones ab illo inductæ seu relictæ eliminandæ, semper digestionis primæ negotium, quantum possibile, observando. Hos scopos ut felicius obtineamus in cachexia curanda, rectè monet Lindanus, quod cachectici, quò leniùs tractentur, tantò citiùs curentur: hinc fortioribus purgantibus, ab initio statim adhibitis, nos nil efficere, nisi sint vomitoria; sed ut malum sensim crevit, ita successivè saltem digestiva, aliaque leniora remedia propinanda esse, quæ crassos & viscidos humores incidunt & attenuant, acorem vitiosum corrigunt ac temperant, atque ita successivè evacuationi aptiores reddunt. Unde imprimis in usu sunt noduli ex aperientibus, ut vocant, i. e. resolventibus & incidentibus, blandis purgantibus mistis, compositi: quibus subinde Martialia remedia sunt interponenda. Et cum cachexia sit initium hydropiseos, commodè methodus & medicamenta, quæ in principio hydropis conveniunt, etiam in cachexia adhiberi possunt, & contra ea, quæ in cachexia usurpantur, validiora tamen & magis diuretica, in leucophlegmatia & anasarca quoque prosunt. Item illa medicamenta huc pertinent, quæ supra Sect. 13. in morborum chronicorum cura recensita sunt, ac in sequ. de Ictero, Scorbuto, Scabie, Lue Venerea, &c. occurrent. Illud saltem adhuc observandum: ut in medicamentorum appropriatorum usu aliquandiu perseveremus, ubi præprimis radicatum magis malum est, i. e. tamdiu illis inhærendum, quamdiu ab ipso benè, aut ad minimum non pejus, se habeat æger, ac medicamentum absque nausea singulari hic admittat; quamprimum verò hujus fastidium subrepat, aut prodesse desinat, gratum atque optimum licet medicamentum, statim de alia illius formula Medico cogitandum, vid. Sylvius *Praxi App. tract. 5.* In specie tamen conveniens regimen dicitur secundum sex res non-naturales observandum, & præsertim motus suadendus: id quod confirmat Panarollus *supra c. l.* de muliere cachectica, exercitiò piùs quam aliò auxiliò sanata.

Principium autem curæ à vomitu, interdum repetendo, faciendum est, & præter asarina propinata conserva gratiolæ ad ʒj. vel ʒij, egregiè vomitus movet, & specificè in anasarca commendatur; vel si coquatur in vino ad ʒij. gratiola, egregium etiam & blandum est vomitorium. Ante tamen vomitoria consultum erit, ut digestiva ̄ina præmittantur, cruditates solventia, & ad motum disponentia; nunc cremor tartari, nunc liquor terræ foliatæ tartari: vid. Rolfinccius, Zvvelferus, tinctura ̄i simplex, R ̄i ̄iata, arcanum duplicatum, ̄i ̄iatus, ̄i centaurii minoris, Tom. II.

absinthii, ̄i\*, ̄i digestivum, hypochondriacum, dosi à ʒj. ad ʒʒ. bis in die, manè & meridiè aliquot diebus ante usum vomitorii assumantur: quibus pro acido absorbendo terrea adjungi, e. g. corallia, lapides 69. mater perlarum, Martialia, bezoardicum Martiale, terra sigillata rubescens, & diaphoreticum Martiale, antihect. Poterii ex part. iv. reguli ʒii & part. V. Jovis, cum triplo ̄i detonatis, bezoardicum Joviale, & similia fixa ̄i alia. Hinc

ʒ. ̄i ̄i Tacchen. ʒij.

̄i absinth. ʒj.

M. div. in 2. part. æqu. S.

Digestiv - Pulver.

ʒ. Lapill. ̄i præp.

̄i digest. hypoch. ʒʒ. M. pro 2. dos.

ʒ. crem. ̄i ʒj.

lapill. ̄i præpar. ʒj. M. pro 2. dos.

Duobus diebus manè in vehiculo calido assumendis.

ʒ. matr. perlar. præp. ʒj.

̄i ̄i lat.

̄i ̄i \*ci depur. à ʒʒ. M.

Dosis quantum cultelli cuspidè capi potest, vespèri usurpanda:

Mane verò

ʒ. R ̄i ̄i acris, l. ex ̄i ̄i & ̄i calcinatis, vel ex scoris reg. ʒii ʒij.

̄i ̄i \*ci ʒj. ad ʒʒ.

M. S.

Gröffnende R.

Dosis 40. vel 50. gutt. bis l. ter in die in vehiculo calido.

Quibus præmissis unâ vel alterâ vice propinetur vomitorium. Aut si hoc minùs conveniat, instituatur purgatio per alvum, inter quæ est radix esulæ legitimè præparata, vel ejus extractum, quò sæpissimè & frequentissimè usus fuit Rulandus in *Curat.* Abstinentium tamen à fortioribus & frequentioribus, cum magis noceant, quàm prosint: vid. Hoffmanni *M. M. l. 1. c. 7. & l. 2. cap. 6.* Pilulæ ex extractis panchymagogis cum Mercurio dulci sunt admodum utiles, v. g.

ʒ. Extr. panchym. Croll. gr. xij. ad xv.

̄i ̄i dulc. ritè par. gr. xij. l. xv. ad ʒj.

extr. troch. alb. gr. j. l. jʒ. ad gr. ij. & iij.

c. essent. absinth. f. Pilulæ.

Aut etiam potio laxativa cum gummi ammon. usurpetur, aut infusum rhabarbari, Riverius in purganda anasarca utitur succo ireos recenti per residentiam depurato ad ʒij. cum ʒʒ. mannæ invicem permistis, ad scrofitates abundantes evacuandas.

His præmissis fit accessus ad Martialia: hinc tot pulveres & medicamenta antica-chectica prostant, qui basin Martem agnoscunt. Martialia hæc diversimodè præparantur: interim, quò simplicior præparatio, eò melior, & quo minùs ab acidis saturatur (Ggg 2) Mars,



Mars, cò efficacior erit, unde pulvis cachecticus Quercetani nullius est pretii, quoniam illius primum ingrediens est crocus Martis saccharinus; cuius tamen nullus est usus. In specie tamen Martialia, prout nunc acida magis nunc acia peccant, disponuntur: in subjectis enim non delicatis locum invenit sufficientem limatura Martis, minutissimè trita & pulverisata, præprimis ubi acidum fortius peccat. Parili ratione pulvis cachecticus Hartmanni usurpari potest, & in specie de pulveribus antecachecticis vid. Hartmannus in *Praxi Chym.* p. 204. & 206. c. g.

℞. limat. ♂ is part. j.  
cinnam. pulveris. part. ij.  
sacch. ad pondus omnium.  
F. pulvis.

Quidosi ʒj. frequenter usurpetur. Vel

℞. ʒij diaph. ♂ ial.  
♂ is absinth. ā ʒʒ.  
♂ o Rat. ligni sassafr. gutt. j.  
M. prodoli. S.

#### Eröffnend Pulver.

Ubi verò acidum non adeò excessivum, ac stomachus sensibilis, in his casibus Martialia præparanda sunt, aut imprimis vina Martialia conveniunt.

℞. limatur. ♂ is ʒiij.

Affundantur vinimensuræ tot, quot illius uncie sunt, stent invicem per 40. dies noctesque, postmodum de hoc uncias aliquot hauriat æger, cui si addantur aromata, maiorem efficaciam acquireret.

Quò facit Claretum Martiale Mynsichtii, item vinum Malvaticum Martiale Hartmanni, quod habet in *Praxi Chymiæ* pag. 204. & 206. Loco vini Malvatici commodius allumitur Rhenanum, quod est acrius, & potentius rodit Martem; nec non extractum ♂ is cum succo pomorum Borsdorffianorum, vel musto vel decocto Tamarindor. paratum, uti etiam extractum ♂ is Mynsichtii, deque tali extracto, quantum cuspis cultri capit, vel ad quantitatem castaneæ, in vino Martiali propinatur. Huc spectat R vitrioli ♂ is Zwelfferi & Ludovici, ♂ diaphoreticum ♂ iale: loco V communis sumitur ~ baccarum juniperi, vel menthæ, cochleariæ, &c. Bezoardicum Martiale, quod etiam in anasarca, & incipiente hydrope est egregium. Pertinet huc etiam ♂ iale ex affusione solutionis ♂ i super limaturam ♂ is; sic enim fiunt crystalli ♂ iales.

Vel in subjecto paulo robustioris stomachi usurpentur acidulæ naturales & artificiales: vid. Platerus *Observat. lib. 3. pag. 608. & Prax. T. 3. pag. 114.* Vel:

℞. liqu. ♂ is Car. ʒij. l. iij.  
D. S.

#### Sauer-Brunnen-Essenz.

De quo primò die gutt. vj. capiantur, secundò viij. tertio xij. ascendendo, ad 15. 20. vel 30. guttulas, ad modum acidularum in morbis chronicis:

℞. ∇ fumar.

genist. ā ʒiij.

Mag. l. Extr. ♂ is Myns. vel c. succ. pom. ʒiij. ad ʒij.

M. D. S.

#### Eröffnend Träncklein/Rössel-Weise.

Capiat quotidie bis cochl. j. l. ij.

℞. pulp. passul. per setac. traj. ʒvj.

Extract. ♂ c. s. p. ʒvj.

rhab. el. ʒij.

c. f. q. syr. rosat. sol. l. pomor. f. Electuarium.  
D. S.

#### Eröffnende Lattwerge.

Capiatur quotidie manè dosi magnitudine castaneæ. Et consultum est omni septimana, ad minimum semel, blanda laxativa interponere, ut ita, quod cicuratum est, ab illis evacuetur: e. g. vespertino tempore usurpentur pilulæ, ut dosi pilularum usualium, v. g. Glassianorum, aut F. F. de \*co & Qæz Quercetani, aut quales describit Sylvius in *Prax. c. 7. §. 52. p. 69. &c.* & ita interpolatis vicibus cum istis ♂ ialibus adhibeantur.

Item ℞. Galban. c. + o sol. ʒʒ.

extract. troch. alhand. gr. ix.

diagrid. gr. iij.

F. Pilulæ pro 3. dosibus.

Martialibus his ad aliquot septimanas continuatis, fiat progressus ad alterantia volatilia, plus minus aromaticam, quæ vulgò vocantur hepatica, i. e. quæ sunt saporis amaricantis & acris plus minus, & omnia imprægnata sunt sale volatili urinoso, nunc magis nunc minus temperato, blandè laxantibus mista, ut ita acuetur bilis, alteretur sanguinis dyscrasia, resolvantur cruditates acidæ, & succi vitiosi sensim & per epicrasin simul evacuentur. Aromatica illa in genere sunt omnia simplicia amara & acria. Ut enim acida stomacho sunt amica: ita amara hepatigrata, quatenus incidunt, & bilem corrigunt. Inter acria illa, ♂ c volatili plus turgida, eminent eichorium, radix nempe ejus, radix ari, helenii, centaurium minus, carduus benedictus, & maximè ablinthium & agrimonia, cujus decoctum insigniter laudat Poterius; rosmarinus, hyssopus, salvia, mentha, & similia; item omnia antiscorbutica, ut radix armoraciæ, nasturtium, cochlearia, &c. locum inveniunt in curanda cachexia & anasarca: quæ laudantur à Bacone de Verulamio in *hist. vitæ & mortis*; flores genistæ, bellidis, centaurii minoris, epaticæ nobilis: quibus porro aromata omnia, quatenus sunt stomachica, & imprægnata sale volatili oleoso, præ cæteris tamen cinnamomum, galan-

galanga, zedoaria, caryophylli, zingiber, &c. adduntur. Ex his confici possunt noduli vino infundendi, nunc solis, nunc cum laxantibus junctis, nunc antè, nunc post Martialia: v. g.

℞. HB. absinth.  
menth. ā Mj.  
rad. enul. ʒj.  
gentian. ʒʒ.  
rhab. el. ʒvj.  
fol. fenn. (s. st. ʒj).  
rad. helleb. nigr. non præp. ʒvj.  
cort. esul. præp. ʒij.  
⊕ ʒʒ.

Includantur nodulo, qui indatur vini mensuris aliquot.

℞. HB. rorismar.  
salvia ī Mʒ.  
absinth.  
ʒi. centaur. min. ā M. j.  
gentian. p. iij.  
rhabarb. el. ʒʒ.  
cinnam.  
galang.  
zingib. ā ʒij.  
limat. ʒi. rec. ʒʒ. M.

Nam rhabarbarum non tam propter usum laxandi, quam alterandi, acidum corrigendi, bilem in naturali statu conservandi, urinam movendi, & atoniam hepatis corrigendi, adhibetur. Sanè præmissis præmittendis in virginibus, in specie cachecticis, egregium usum observavi tam rob juniperi solius, subinde usurpatum, quam ex rob juniperi cum rhabarb. pulverisato facti electuarii.

℞. rob. juniper. ʒij.  
pulv. rhabarb. el. ʒij.  
cinnam. el. ʒj.  
M. f. Electuarium: S.

**Eröffnende Lattwerge.**

De quo omnimanè capiat bonam dosin.

Huc etiam pertinent cerevisiæ & vina anticachectica, quorum formulas videb. in Timæo von Gilden. *Klee in epist. p. 428.*

Pertinet huc elixyr anticachecticum D. Reinesii. Compositio est magistralis, quam nemo facile imitabitur; nam tria ingredientia interdum plus præstant.

In officinis prostant species diacurcumæ, & dia-galangæ: hinc Rondeletius ceu expertissimum remedium in omni cachexia habet has pilulas:

℞. spec. dia-cure. ʒiv.  
rhab. el. ʒij.  
spec. dia-rhod. Abbat.  
dia-galang. ā ʒj.  
c. f. q. syr. de absinth. f. l. a. pilulæ, ex ʒj.  
no. 30.  
Dof. 20.

Tandem passulæ mirè conveniunt in ca-

chexiis quibusvis, & loco rob juniperi usurpari possunt, quæ egregiè conveniunt in temperanda sanguinis discrasia, quia sanguinem laudabilem ac temperatum reddunt, bilem optimè in statu naturali conservant, & sanguinis motum fermentativum nonnihil restituant. Sunt enim quasi mustum concentratum. Joël & Riverius pinguefaciendi vim eis adscribunt.

Præscribi etiam potest electuarium Augerii, aut electuarium ex passulis Horstii in obs. pag. 201. aut electuarium molle sequens:

℞. pulp. passul. Corinth. ʒvj.  
Rhabarb. el.  
crem. ʒi ā ʒij.  
⊕ ʒʒ.  
cinnam. acerr. ʒj.

c. f. q. syr. de pomis f. Electuarium molle.

In fine adhibentur omnia talia volatilia, plus minùs oleosa, ~urinosa volatiles, tam simplices quam compositi, ~⊕ volatilis, carminativus, liquor C. C. succinatus, lumbricorum urinosus, urinæ, Ⓢis \*ci simpl. & oleosus, Rnephritica Ammelungii, &c. Quibus pro circumstantiarum ratione nunc febrifuga, nunc antiscorbutica, nunc emmenagoga, permiscenda, elixyr proprietatis sine acido, imprimis illud rubineum, quod paratur cum spiritu urinæ, vel Ⓢis \*ci, elixyr præcipitans, cachecticum polychrestum, vel solitarium, vel cum essentia absinthii, agrimonie, rorismarini, juniperi, R tartari composita, &c. Donec ex alle reconvalescat æger: tunc

℞. R ⊕ compos. aut elixir. anticachect.  
aut elix. propr. f. acido ʒj.  
essent. absinth.  
cent. min. ā ʒij.  
M. D. S.

**Eröffnende Essenz.**

Dosis 40. l. 50. gutt. bis vel ter in die, manè in vehiculo calido, hora quinta promeridianâ, in cerevisia, & sub introitu lecti.

Vel ~. talia matutino tempore, à meridie verò recipiatur ~Ⓢis \*ci, vel hujus loco spiritus carminativus de tribus, vel R nephritica, vel liquor C. C. succinatus:

℞. ~carminat. de tribus ʒij.  
Ⓢis \*ci ʒʒ.  
M. D. S.

**Resolvirender Spiritus.**

Dosis 50. gutt.  
℞. R nephrit. ʒʒ.  
liqu. C. C. succin. ʒij. M.

Tandem balsamum sulphuris terebinthinatum vel juniperinum commodè aliquandiu continuandum venit. Item cum aromaticis istis interdum usurpatis capiatur sub introitu lecti elixyr. menthæ, cochleariæ, &c. parva dosis, aut hujus loco ~baccarum juniperi, menthæ, salviæ, &c.

(Ggg 3)

ARTI.





puncturas, &c. pro anasarca cura vide in Willisii *Pharm. Ration. Part. 2. pag. 369. sequ.* Præterea in anasarca conveniunt folia bardanæ viridia, si leviter contusa applicentur plantis pedum & juncturis: Nam mirum est, quantam fuliginem extrahant ex toto corpore, cum sensibili ægrorum levamine, oleum scorpionum inunctum per diuresin anasarca laborantem sanasse vid. Willisius *l. a. cap. 5.*

In principio ac declinatione balnea, tam humida quam vaporosa, conveniunt: Illius generis efficaciora sunt thermæ naturales ac artificiales, & ac  $\Theta$  imprægnatæ: Hujus verò vapor  $\nabla$  æ mineralis, in  $\Theta$  decoquenda, prope furnos salariorum excipiendus. Spectant huc Laconica, vel sicca cum  $\nabla$  accenso instituta, quæ non tantum poros reserant, sed elasticitatem quoque humorum excitando visciditatem horum corrigunt, hinc duplici modo ad sudorem disponunt. Sed balnea hæc vix, nisi in principio ac declinatione locum habent, cum in statu adhibita asthma, apoplexiam, &c. inducere possunt, quatenus corpore nimis calefacto serum ex habitu vasa, hincque ad præcordia & cerebrum, cogunt. Quidam corpus anasarca laborans immergendum suadent in  $\ddot{\alpha}$ m calidam, ut eò promptius absumentur humiditates, quod etiam Ferdinandus *Hist. 30 p. 94.* tanquam suum experimentum refert.

### ARTICULUS III.

#### De *Hydrope Universali.*

**C**Achexiam modò explicatam frequenter sequitur hydrops, non secus ac reliquas ejus species, ut cachexiam ictericam, hypochondriacam, scorbuticam, & febrilem tandem insequi solet. Hydrops nomine intelligitur aquarum seu humorum serosorum extravasatio atque p. n. collectio, quam necessariò tumor & distensio partis, cum ejus tamen mollitie, & non rarò fluctuatione, comitantur. Hydrops vox convenienter Latinis aqua intercus redditur. Jam verò hydrops vel totum corpus tumefacit, & dat hydropem universalem; vel determinatam corporis partem, unde hydrops particularis: Ille est vel simpliciter talis, & dicitur anasarca, & leucophlegmatia; vel secundum quid talis, & est illa ascitis species, quæ successivè post crura tumefacta totum abdomen & thoracem occupat: Hic pro partium varietate, quas affligit, varius est, unde specialia sortitur nomina: sic quando aqua colligitur in capite, dicitur hydrocephalus: quando in pectore, hydrops pectoralis: si in pericardio hydrops pericardii: si in solo abdomine, ascites; quia instar utris abdomen repletum & tumefactum est; in utero hydrops uteri: in testibus hy-

drocele: in partibus externis, uno alterove membro, tumores serosi aut aquosi generali nomine appellantur: Imò in omenti bursa copiosa aquæ inclusæ in insignem tumorem abdomen attollunt, quale exemplum videb. in Horstii *Observ.* item in peritonæi duplicatura conclusæ aquæ hydrops abdominis speciem præbent, vid. Meekren *Observat. Chirurgica.*

Ex his patet: Hydropem non esse propriè alium morbum, quam ubi est aqua. Hinc tympanites impropriè est hydrops, cum flatuum tantummodò, non verò aquarum, in abdomine collectio sit: Unde saltem propter similitudinem tumoris cum ascite ad hydropes refertur: Eodem modo curatur, ac de inflatione stomachi suprà dictum, in specie  $\sim$ u  $\Theta$ i dulci, &  $\sim$ carminativo de tribus.

Hydrops universalis ut plurimum cachexiam confirmatam insequitur, ita tamen, ut nunc sit genuinus, ubi simpliciter serum peccat; nunc nothus, ubi simul cum sero materia plus minus viscida est, adeoque ascitem cum anasarca instituit.

#### C A U S Æ.

Causa hydrops non est hepar frigidum ob hæmatoleos defectum, cum à modernis hepar dejectum sit ab imperio sanguificationis, ipsiq; publicæ ductæ exequiæ. Deinde adversantur huic sententiæ omnes, qui per experiètiâ anatomicam observarunt, sæpissimè hepar insons in hydropicis, in specie asciticis, fuisse repertum, de quo vid. præter Helmontium *Tract. Ignotus Hydrops §. 10.* Sennertus *lib. 3. Prælexos.* Unde in principio hujus seculi Sylvius Lancæanus, Medicus Romanus, peculiarem edidit libellum, cujus titulus: *Hydropem non semper à jecore fieri, excusum Roma An. 1603.* licet negari nequeat, bilis defectum simul concurrere. Non nego equidem, hepatis & lienis scirrhus fuisse subinde inventos in hydrope demortuis, sed hoc habent commune cum aliis visceribus. Viscerum enim quorumvis varia & multiplex observata in hydropicis constitutio præternaturalis, ita ut hætenus nil certi de parte solida, primariò in hydrope affecta, colligi queat. Imò fieri potest, ut sine vitio alicujus visceris hydrops nascatur, quando ab errore externo, aut potu frigido confertim ingesto,  $\nabla$  in abdomine colligitur.

Propiùs verò nunc ad causas accedamus: Est ergò hydrops, non secus ac suprà memorata cachexia, nunc morbus primarius, qui per se ex vitio rerum naturalium aut non-naturalium successivè nascitur; nunc secundarius, qui ex vitio quodam morbo præternaturaliter præcedente originem ducit. Nempe oritur hydrops frequentissimè

i. Ex

I. Ex febribus intermittentibus chronicis, quibusvis malè tractatis, speciatim ex quartana diuturna: præsertim quando ægri in paroxysmo nimis bibunt, pro quo præservando diebus intermissionis amara ex vegetabilibus febrifugis, præsertim absinthio, sedulo usurpanda sunt, pro conservanda bilis & sanguinis crassi, debitoque viscerum tono: vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 322.

II. Ex asthma (præsertim orthopnoëia) non solum humoroso, sed etiam convulsivo: item ex aliis pectoris pathematibus; siquidem aliquando empyema, phthisin & sanguinis sputum hydropem hunc insecutum observatum fuit.

III. Ex renum vitio vix credo: an possit ascites universalis supervenire sine renum præternaturalium defectu, præterea, quæ Helmontius *Tract. Ignotus Hydrops* §. 16. & 20. habet, Platerus confirmat in observationibus, ubi ex renibus exulceratis Hydropem ortum allegat. Hinc renum, ceu adæquatum artificem omnis hydropis, asserit Helmontius *l. a.* vel ex eo imprimis, quod totus hydrops per urinæ fluxum solvatur, *l. c.* §. 3. & 20. Totum enim fundamentum, propter quod supervenit cachexiæ hydrops, consistit partim in renibus, partim in defectu virium vitalium, humores non amplius regere valentium. Sanè ex renibus obstructis & debilitatis, aut ab iisdem ulceratis, crebrior hydrops observatus; sicut pariter nephritica pathemata, & renes exulcerati frequenter hunc affectum inferunt. Mictus quoque sanguinis diuturnus hydropem infert, teste Schenkio in *Observat.*

IV. Ex vitio visceris cujusdam nobilioris, aut usus necessarii in abdomine, hepate, liene, mesenterii glandulis affectis, utero, &c. Rondeletius in *Praxi* l. 3. c. 35. de scirrhus hepatis inquit: se ex frequenti corporum dissectione observasse, omnes hydropicos vel scirrhus, vel glandulas mesenterii induratas, habere, aut pancreas similiter constitutum; Item ex ulcere mesenterii observatus fuit hydrops, quod confirmat Rondeletius *l. a. c.* 36. Tulpius *lib. 2. Obs.* 32. Hæchstædterus *Dec. 6. Conf.* 6. & ex vulnere hepatis, sclopeto inflicto, suppurato hydropem natum, videb. in M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Obs.* 106. p. 145.

V. Ex ictero, & aliis quibusvis cachexiæ speciebus confirmatis: in specie scorbutum hydrops sui generis insequi solet, de quo vid. optimè differentem Eugalenum *Tr. de Scorbuto*.

VI. A sanguine, vel præternaturaliter excreto vel retento. Sic suppressæ hæmorrhoides aquæ intercutis metum injiciunt: sic propter menstrua consueta suppressa hydrops non rarò supervenit; e. g. post quamvis hæmorrhagiam, aut nimiam, aut crebrius repetentem, semper cachexiæ & hydropis metus imminet: sic post vomitum sanguinis post im-

modicum sanguinis sputum, hydropem insecutum, &c. observatum fuit: Vid. Riverius in *Observ. communicatis*.

VII. Imò ex aliis nimis excretionibus, præsertim per alvum, tam artificialibus (sic enim leucophlegmatiam & ascitem à variis catharticis malè adhibitis, crebrioribus aut fortioribus, notat Poterius *cent. 2. c.* 29.) & non-naturalibus, quam præternaturalibus: sic ex alvi profluvio diuturno observat Ferdinandus *Hydropem*, *Hist.* 98. item succedentem ptyalismo diuturno & pertinaci Thonerus in *Obs.* Idem de dysenteria, ac similibus excretionibus observatū, necnon de Veneris abusu.

VIII. Crebriori & copiosiori aut intemperativa potūs, præsertim frigidi, post nimium æstum, aut corporis exercitium, aut æstum febrilem, ingurgitatione: qualium exemplum, præter Pisonem *Tract. de Colluvie serosa*, etiam refert Sennertus *l. 3. pag.* 711. Sic intemperantia ebriosa ad hydropem disponit: Ex haustu copioso frigida post nimium æstum hydrops post tertianam genitus in M. A. N. C. *Ann.* 6. *Obs.* 52. p. 85. Potus nocturnus in specie ad hydropem disponit. Vid. *Acta Med. Hassniensia* Vol. 2. *pag.* 260. & 262. In paroxysmo febrium, qui copiosius potant, præsertim frigida, facillimè hydropem incurrunt: item ex copioso frigida potu in ætate hepatis scirrhus & hydrops, vid. in Fonseca *lib. 2. Conf.* 39. item Riverio *Cent. 2. Obs.* 65. Alius frigidam quotidie ante prandium bibens hydropicus factus, Autore Panarollo *Pent. 3. Observat.* 42. Idem confirmat Henricus ab Heer *Obs.* annotans quendam ex assidua ebriositate ictero & hydrope laborasse: acidulas indispositis hydropem accelerare posse, vid. in M. A. N. C. *Obs.* 180. *Ann.* 3. Quo facit V nimius abusus, & similium potuum aromaticorum aut generosiorum ingurgitatio nimia, colliquationem nimirum inducendo, & lymphæ acrimoniam augendo. Spectant huc etiam fructuum pituitosorum nimii, v. g. lactucæ, endiviæ, &c.

Juxta has causas magis particulares observandum: sensibilis urinæ excretionis, & sensibilis transpirationis defectum, ut plurimum, si non semper, adesse in hydropicis.

Urinam quod attinet: sanè hæc non uniusmodi excernitur in hydropicis, quando ut plurimum crassa, intensè tincta, & perquam lixivialis, pauca tamen, quæ in aliis econtrà pallida, tenuis, cruda & pauca, prodire solet. Sanè in omnibus parciore & longè minor copia, quam assumptorum potulentorum fert ratio, excernitur, quæ in aliis econtrà, utut rarius. Et ferè primam occasionem suggerunt hydropi renes; imò frequenter ex solis renibus affectis, atque lotium non emittentibus hydrops supervenit. Hinc etiam est, quod optima & tutissima hydropicos cura in

uri-



urinæ provocatione conſiſtat, quâ denuò copioſius fluente ſubitò evadunt. Hinc eſt, quod id ſerum, quod aliàs ſub forma urinæ emittendum erat, in abdomine verò coacervatum exhaustum arte, nullas tamen proprietates urinæ, nec odore, nec ſapore, nec colore exhibeat, ceſſante nempe renum functione. Schenckius in cive Altenburgenſi decollato & publicè diſſectò renalem adipem maxima ex parte aqueam, deſluere vidit, indeque hydropis initia viſceribus & teſtibus inducta obſervavit; & Bartholinus omentum in hydropicis computuiſſe vidit.

Quoad inſenſibilem tranſpirationem, huius penuria colligitur ex eo, quod licet multum ſeri colligant hydropici, nihilominus tamen difficulter ſudent: ideoque & citra madorem illorum corpus eſt, nec in balneis facile ſudore madescunt; Hinc ſi ſudor hydropicis ſupervenerit, adeo, ut æger alleviari ſe ſenſerit, bonum. Forſan obſervationem hinc meretur, quod Smetius *Miſcellan. lib. 8.* aſſerit, illos præcipuè difficulter ſudare, quibus jecur & lien ætate morboſe inaruerit, vel obſtructione magna aut ſcirrhò obduerit.

Præmiſſis hiſce, ſymptomata neceſſe erit conſiderare, quæ præſentiâ ſui hydropem vel præſentem vel plus minus imminentem, designant. Incipiunt ferè pedes in inferioribus locis circa talos intumeſcere, tumore quidem œdematoſo plùs minùs ſeroſo, impreſſi digiti veſtigia aliquandiu retinente, qui noctu quidem imminuitur, ita ut matutino tempore multò exilior videatur: Interdum augetur, adeoque veſpertino tempore major longè apparet. Idem tumor paulatim aſcendens tranſit ad ventrem, quem ſucceſſivè occupat: ut plurimum in ſcrotum ſibi parat viam, & tunc ſimul quandoque intumeſcunt teſtes, præputium & colon, quandoque penitus occultatur, quandoque quadruplo major & translucidus fit. Dum æger de latere in latus convertitur, murmur & fluctuationem aquæ quaſi ſentit, quinimo moto corpore & ita movetur, ut impetus ejus conſpici poſſit, ut habet Celfus. Intumeſcit autem abdomen plerumque ſenſim & vix animadvertentibus ægris, & interdum quaſi ſubitò & brevi temporis intervallo. Prætereà nunc unum tantum latus tumor occupat, nunc utrumque, ita ut venter quandoque in duas partes diviſus videatur, nunc verò aliqualiſter diſtenditur venter ab hypochondriis ad pubem uſque; erecto autem corpore ſenſus ponderis procumbentis in regione inguinum percipitur. Plerumque quidem venter etiam poſt mortem tumidus manet, raro verò detumeſcit, quod tamen obſervavit Ballonius *l. 2. Epid. Eph. pag. 270.* Dum ſic inferiores corporis partes accreſcunt, ſuperiores decreſcunt & emaciantur, præcipuè ju-

gulum, cervix & pectus, quibuſdam tamen & facies, præſertim matutino tempore à ſomno, intumeſcit, interdum & ad extremum manus inflantur, colore in facie ut plurimum ſub pallido plus minus ac livido. Multi pruritu admodum moleſto vexantur; quidam enim ſcabiæ ſiccâ laborant. Abſceſſus quoque & maculæ in cruribus quibuſdam erumpunt, ſæpius tamen lethales. Plerumque febris comitari ſolet hydropicos, eſtque continua lenta, circa veſperam manifeſtior. Pulſus eſt parvus, crebrior, ſubdurus, cum quadam tenſione. Siſis imprimis ægros miſerè vexat, quæ indulgendo creſcit, & quò plus ſunt potæ, plus ſituuntur aquæ: ſimul etiam cibi ſatiſdium adeſt inſigne: quod ſi, quod rariffimum tamen eſt, ſitiant parum, e contra commodè plus minus appetant, melius omnino ſignum putandum eſt. Hinc magnam anguſtiam circa præcordia ſentiunt & ſpirandi difficultatem, maximè cum loca alta ſcandunt vel decumbunt, eſtque unum ex præcipuis, de quo conqueruntur ægri, quæ etiam nondum apparente tumore incipit, hydropemque præſagit, eoque emergente incrementum ſumit, adeo, ut ſæpius à media nocte orthopnœicorum more erecti ſpiritum ducere cogantur; Hinc dyſpnœiam nocturnam prænunciam hydropis aſcitis eſſe aſſerit Platerus *in Obſ. &* tum plerumque etiam tuſſis ſicca, ſeu inanis ad tuſſiendum irritatio, eaque mali ominis, accedere ſolet. Conf. M. A. N. C. *Ann. 8. Obſ. 27.* Alvus nunc clauſa eſt, nunc quibuſdam idque non abſque inſupportabili ſubitò liberior eſſe ſolet. Quandoque & epilepſia aſciti ſupervenit, & grave periculum plerumque minatur: interdum eadem in apoplexiam lethalem convertitur: Refert enim Ballonius *lib. 1. Epid. Eph. pag. 27.* piſcatorum quendam hydropem laborantem epilepticum factum, ſæpiùs convuſum, abſceſſu circa teſticulos & femora factò liberatum fuiſſe ab hydropem & epilepſia.

Obſervandum autem, ne obeſi nimis habeantur interdum pro hydropicis, de quo vid. Hœchſtedterus *Decad. 10. pag. 418.* Probè quoque obſervandum eſt, ne confundantur hydropicæ & gravidæ. Diſcernuntur autem invicem:

1. Ex colore faciei vivido, & bono habitu.
2. Ex tumoris ſpecie. In gravidis tumor abdominis ad præcordia ſuſum vergit, eſtque inæqualis: In hydropicis autem inferior pars abdominis intumeſcit, mammae detumeſcunt, & tumor undique eſt æqualis, & quaſi œdematoſus; ut nil dicam de motu fœtûs.
3. Certum ſignum eſt fluctuatio, nempe



ad tactum sentiunt fluctuationem in hydrope.

4. Vivacitas & vigor oculorum significat gestationem : sed ubi hydrops est, perit oculorum nitor, sunt lividi, &c.
5. Urinæ in gravidis non sunt ita constitutæ, ut suprà de hydrope dictum.
6. Hydrops valdè membrum gravat, in gestatione non item.
7. Quò se vertant hydropici, eò labitur  $\nabla$  ; id quod non fit in gestatione.
8. Sitis in hydrope juncta est: in gestatione non.
9. Denique sub hydrope menses sæpe fluunt, in gestatione non, &c.

Porro aquæ istæ serosæ non semper unius generis observantur : Plerumque aqua est pallida & citrina, & urinam ferè refert. Interdum lutea, interdum viridis, interdum flava in nigrum vergens, interdum loturæ carniū similis: Exempla allegata videb. in Sennerto *lib. 3. Prax. ubi de Ascite pag. 717*. Eisdem exemptas, & leni igne tractatas, in gelatinam albam abire observavit Boyle in *Philos. Experim. p. 83*. ut & Willisius *Pharm. Rat. Pars. 2. p. 29*. In gelatinam viridem abiisse observavit Simon in *Hydrol. pag. 370*.

Acris quoque est humor ille falsus ferè, aut acido-salsus, quia lii aquæ permixtus spumam instar saponis excitat. Ita refert Gabelchoverus civem quendam Augustanum hydropicum alterius consilio dolio (in cinem *Gass mit Wasser*) insidentem, aquæ se immeruisse quotidie, & post 15. lotionis diem ruptum esse umbilicum, &  $\nabla$  omnem, quæ in ventre continebatur, effusam in aquam balnei, hanc verò inde spumofam totam redditam fuisse, ut speciem aquæ multo sapone agitatz referret. Unde etiam acrimoniæ illius ratione subinde interanea erodit & exulcerat. Sicuti & subinde ulcera in externis partibus, præsertim cruribus, excitat, difficulter curabilia; Unde & quod per alvum excernitur, non sine morfu intestinorum, præsertim recti, evenit. Speciatim acescentiæ cujusdam participem illam aquam esse collectam, non immerito suspicatur Willisius *Pharm. Rational. Part. 2. p. 364*. Et confirmatur ulteriùs ex eo, quod sudor hydropici acidus lac coagulans observatus fuerit: Vid. *Acta Med. Hassniens. Volum. 4. p. 172*. & quod internè pariter, quàm in specie externè discutiendo tumori dicata, ad alcalium naturam accedant, v. g.  $\nabla$  calcis vivæ, limaces cochleæ, lixivium stercorum animalium, &c.

Sanè ex acrimonia hac, præsertim occultè acida, duo explicanda veniunt phænomena ab autoribus minùs animadversa: I. Quod intumescencia illa crurum, scroti & abdominis, sit quidem à contento liquore, sed tamen fortis ista tensio & juncta quasi inflatio non ab eo,

quà tali, simpliciter proficisci videatur, sed arbitror potiùs vim fermentativam habere hunc ipsum liquorem, sive ipse in se fermentet, sive cum contentis cæteris liquoris, speciatim nutritio succo ad partes istas distributo, motum turgescentiæ proximum fermentationi, concipiat.

II. Dum acre istud contentum acido-salsum undique à partibus membranosis, v. g. cute, peritoneo, &c. concluditur, vix fieri poterit, quin ab eodem vellicentur & irritentur plus minus fibræ illarum partium, qua occasione illæ tendi, & quasi spasmo affectæ obrigescere plus minus incipiunt, quo ipso occludi poros, & angustari quosvis cæteros meatus contingit, adeò, ut non tantum insensibilis transpiratio, & sensibilis transsudatio eò magis impediatur, sed & tensio hoc modo fibris, & membranis renalibus, etiam uberior urinæ excretio eò magis sistatur. Ad spasmodicam hanc affectionem declarandam faciunt, quæ habet Helmontius *pag. 411. 412. 413*. Aliàs sanè non video, quare tam parum transpirent aut sudent hydropici, aut saltim guttarum formâ non copiosius aliquid transmittant per cutim, nisi hæc prius in pustulas erosa fuerit, aut alio modo fibris læsis transitus aquis pateat. Adhæc angustia ista præcordiorum in hydropicis, & impedimenta illa respiratoria, quæ non solum circa pectus, sed ferè maximam partem circa hypochondria sentiunt, quasi cingulo ibidem constringerentur, non à sola videntur esse repletione abdominis, ex eo, quod gravidæ fœmellæ gestantes, ut ut ventre maximè tumido, de simili non conquerantur pathemate, quin mollia omnia & tactui cedentia in iisdem ibidem deprehenduntur, cum hydropici tendi circa ista loca, & constringi ita soleant, ut ne digitus quidem infra costas nothas possit adigi.

His ita præmissis ad causam proximam, collectionis nempe & extravasationis illorum humorum, est dilabendum, in ascite nempe, quæ ad anasarcam proximè accedit, sive in anasarca sic dicta particulari Willisii, in qua pedes, scrotum & abdomen, ad pectus usque & diaphragma intumescunt, & ab ascite propriè sic dicto, seu particulari abdominis hydrope, multum differt (quæ differentia in historiæ & observationum monumentis probè attendatur.) Præsuppono autem hic: humorem istum esse maximam partem serum; & quidem vel naturale tam alimentitium quàm excrementitium; vel præternaturale. Naturale enim pro contentorum seu mistorum ratione nunc chylosum, nunc pituitosum, nunc cruentum, nunc alio modo affectum, v. g. in ictero & scorbuto, deprehenditur.

Serum laudabile omnium frequentissimè peccat, & post hoc præternaturale; quatenus utrum-

utrumque (in ascite particulari) vel per disrupta vasa lymphatica & lactea excernitur, vel sanguinis per venas ac seri per vasa lymphatica motu retrogrado impedito, per substantiam partium idem exsudat.

Vasorum lymphaticorum ac lacteorum ruptura præter læsiones externas dependet vel à lymphæ acrimonia erodente, aut crassitie distendente ac rumpente, vel ab illis, quæ vasis dictis circumstant aut adjacent, v. g. glandularum mesenterii intumescencia præternaturali, atque harum ulceribus: vid. *Tulpius lib. 2. Obs. 32.* & in scemina quadam ante triennium in femore per puncturam vulnerata suspicor, quæ consolidato ulcere, totius pedis tumorem œdematosum patiebatur, forsan à cicatrice, notabile aliquod vas lymphaticum ita comprimente, ut à stagnante lymphâ illud disruptum fuerit: quo etiam spectat casus in abdomen, aut ex motu corporis nimio ascites, qualis *Platerus Prax. Tom. 3. pag. 242.* & *Bartholinus C. 2. Obs. 74.* meminerunt.

Seri autem transcolationem per partium substantiam auctam facit

1. Ejus abundantia, hinc ex suppressa urina potu copiosiore hydropem fieri, & potus abstinentia sanari, testatur experientia.
2. Seri fluiditas & aquositas nimia, qualem Mercurii vivi inunctione produci posse *Bonettus Anat. Pract. lib. 3. S. 20. c. 18.* perhibet.
3. Ejus motus retrogradus impeditus: vid. *Lovverus de Cord. pag. 118.*

Huc spectat viscerum substantia lacerata & erosa.

Coacervatur hoc in corpore ad hydropem disposito ob deficientem insensibilem transpirationem, & imminutam urinæ excretionem. Generatur autem primitus (adeoque hujus hydropis causa proxima erit) ex insigni & notabili vitio in hæmatosi contingente, ac plus minus deficiente, ratione cujus assumpta in chylum mutata cum juncto vehiculo seroso assimilari debite maximam partem nequeunt, quin hic ipse successivè in sanguine, continuato hujus circulo, alteratus, magis magisque attenuatus & resolutus, tandem certis in locis decumbit, & extra vasa cum vehiculo seroso subsistens tumorem talem infert: quod pluribus explicatum videb. in *Willisii Pharm. Rat. Part. 2. Sect. 2. cap. 3. p. 298. & 348.* Hinc hæmorrhagias nimias hydrops frequentius excipit. Errorem quoque externum, v. g. insuetum partium refrigerium, huic morbo occasionem præbere docet *Schenckius Obs. lib. 3. pag. 434.* Seri autem & sanguinis crasis vitiatur ab errore externo, primam digestionem lædente, quod docet, præter appetitus prostrationem præcedantem, frigida potus

Tom. 11.

immoderatus, præprimis autem ex febre exstuant corpore assumptis, item spiritus vini abusus, tonum ventriculi destruens. Unde remotæ causæ omnes erunt eadem, quæ cachexiæ, cum, ut supra monitum, hæc frequentissimè in universalem, nunc particularem cum ascite junctam degeneret: Unde dum per se incipit hic hydrops, ferè vitium læsæ in primis viis digestionis subesse solet. Dum autem alios morbos insequitur, pro horum læsione, corporis ejusque partium solidarum, & sanguinis alteratione multiplici etiam multipliciter ad hydropem disponent: de quibus remotioribus causis superius pluribus actum. Unde pro causarum harum remotarum diversitate subinde tanta diversitas humorum in toto corpore hydropicorum nata fuit. Extravasatur verò idem serum multiforme, non ex vitio vasorum lacteorum & lymphaticorum, nisi saltem per accidens & secundariò; sed revera ex vasis arteriosis in hydropem universali oriri, omninò probabilissimum est. Nempe pro hujus notitia 3. hic supponenda erunt:

1. Sanguinis texturam & mixtionem in hydropicis ita esse alteratam, ut minùs exactè cum coacervata uberius colluvie serosa plus minus chylota miscibilis sit, adeoque serositates istas faciliùs separari, & hinc inde extra se quasi diffluere permittere: cum aliàs serum à sanguine faciliùs separabile existat, ut in sanguine venâ sectâ emissio manifestum evadit.
2. Contentos corporis humores, in specie sanguinem & serum, naturaliter non moveri proprio impetu, quia aliàs omnis motus fieret ad inferiora, nullus verò ad superiora; sed more mechanico à cordis impetu per vasa pelli, adeoque se purè passivè habere, ac superius & inferius nescire: simul verò ac vis ista vitalis seu animalis movens in corde plus minus debilitatur, proprio impetu gravitatis ac ponderis eodem ferri, adeoque deorsum ruere.
3. Firmo stare talo experimenta ista *Lovveri de corde cap. 2. pag. 123. 124. 125. seq.* quod ligatâ venâ cavâ propagine canis infra cor, brevi post tanquam ascite artificiali laboret ut animalis abdomen  $\nabla$  repleatur: & ligatis jugularibus tumor aquosus hydrocephali supervenit, utrumque saltem ex impedito sanguinis ex arteriis in venas circulo; sicut & eadem allegat *Willisius in Pharm. Rat. Volum. 2. pag. 299.*

Adeoque ex impedito plus minus sanguinis arteriosi in venas transitu separationem & extravasationem seri facillimè contingere.

(Hhh 2) Quæ

Quâ ratione etiam videntur oriri hydropes subitanei à causa externa sine prægresso interno vitio, v. g. dum hydropem ascitem subitaneum ex gestatione oneris gravioris notat Bartholinus *Cent. 2. Hist. 74.* vel dum è compressione circa os stomachi hydropem notat Borellus *Cent. 2. obs. 24.* Quod si ergò contingat, ut successivè ex cachexia deficient vires vitales motrices, fit ut cessantis impellentis regimine dicti succi proprio impetu moveantur, & agentis vicem sustineant. Hoc inculcat Helmontius *Tract. de Terra*, licet hujus sententiæ vestigia apparent in Sanctorii *Comment. ad Fen. Avicenna.* Et certè, quandiu vires valent sanguinem movere & alios humores, neque leucophlegmatia, neque anasarca apparebit; quæ inflationes interdum apparentes nocturno tempore iterum evanescent.

His ita præmissis, dicendum videtur: In iis ægris, quibus quocunque ex vitio hydrops supervenit, v. g. in cachecticis confirmatis, ex virium aliquali defectu, & massæ sanguinæ serosioris laboriosiori & difficiliori circulo, hanc ipsam proprio impetu ac mole magis deorsum ferri, ac hinc difficilius ascendere, indeque impulsam in arterias factam in venis haud leviter imminui, ut difficilius ex illis in has ob id pleniores respectivè fiat transitus, sub quo transitu juxta osculorum extremitates sanguis quidem ceu spissior, & qui impetum moventem a corde impressum & per arterias continuatum facilius, quam fluidius serum suscipit ac retinet, in venulas tandem ex arteriis intruditur; ipsum verò fluidius serum, quæ data porta, suo pte impetu fertur, à sanguine secedit, & ad inferiora, præsertimque circa loca, ubi notabilius langue/cit à corde impressus impetus, congeritur, donec pedetentim magis magisque coacervatus superiora versus tandem vergat. Hinc enim magis vespere quàm mane, magis stantibus aut sedentibus quàm jacentibus, tumor incrementum solet: ad quod ipsum & supra insinuata fibrarum strictura non parum facere poterit. Hinc ratio reddi potest, unde fiat, quod morbis chronicis ægri convalescentes tumores pedum patiantur, qui tamen iterum evanescent? item, quare insueti stantes tumores pedum incurrant? item, quæ ratione subinde post dyspnœiam & asthma superveniant tumores pedum œdematosi? qui hecicis & phthisicis infesti, eosdem ad mortem deducunt. Vivit hic aurifaber, qui ex quartana contumaci per annum malè tractata anasarca partium inferiorum cum incipiente ascite laborat, ex qua ipsa suo quoque tempore morietur: Hic quoties quavis ex causa, in specie iracundia vel erysipelate, vel pleuritide notha, quod sæpius evenit, corripitur, (idque semper cum motu febrili, gravissimo rigore, intensissimo aliquot dierum

æstu, & hinc sudore uberrimo superveniente accidit) toties mox primo hujus affectus die omnis tumor hydropicus evanescit, pedibus flaccidis & extenuatis apparentibus; dum verò febrilis impetus post aliquot dies remittit, pedetentim etiam decumbenti adhuc crurum & scroti tumor redit. Nempe febrili sub impetu cum alteratione sanguinis in specie rapidior ejus circulus & validior impulsus, quo retruduntur in vasa evacuatæ serositates, considerandus venit.

Idem extravasandi modus obtinet in anasarca universali, hac saltem cum differentia, quod in anasarca virium contenta corporis moventium robur adhuc validum sit, quod æqualiter sursum deorsum eadem qualitercunque constituta movet; quod in anasarca particulari partium inferiorum cum ascite complicata debilius, adeoque regendis iisdem corporis contentis minus sufficiens, hæc ex parte sui motu spontaneo ferri permittit, quæ ob id deorsum magis ruunt, cum aliàs undique æqualiter distribuenda forent. Sed dum sub transvasatione ista ex capillaribus arteriis in venosam ob pororum & meatuum angustiam, per quos trajectio fieri solet, difficilius suo modo, adeoque tardior fiat sanguinis motus, hinc serum faciliè à reliqua sanguinis massa recedere, partium vicinarum poros subire, & ita undique plus minus stagnando, anasarcam universalem inferre potest. Forasan & chylo seu bituitoso isto feri contento quædam venulæ capillares, ut & vasa lymphatica obstrui aut angustari plus minus poterunt: quæ occasione & difficilius sanguinis circulus, & facilius copiosiorque feri secessus fieri potest.

Summatim hydrops fit ex cacochymia, quando hæc ex defectu chyloscos, tamque vitio fermenti ventriculi, quàm perfectionis à bile fiendæ inducitur; unde ulterius morbo ingravescente vires deficient, quibus deficientibus non sunt pares regendis humoribus. Adeoque hi, quò remotior circulus à corde est, eo procliviores pondere suo inferiora petunt.

Atque hæc quoad theoriam hydropis ordinarii sufficiunt. Nam observatur quoque præterea hydrops magis extraordinarius, à colliquatione natus, dum non tam coacervari, quam ex contentis aliis humoribus per colliquesactionem generari serum hydropicum observatum. Docet experientia in febribus acutis & hecicis, ut aliàs excretiones colliquativæ sunt familiares, ita etiam his subito aquâ abdomen intumescere, ita ut præter chylum & sanguinem ipsa etiam pinguedo colliquesacta in serum abire videatur, uti hoc ipsum in diabeticis quoque fieri solet. Hinc in hydropicis subinde observatur, aquam heri evacuatam arte per paracentesin hodie æqualiter



liter demum abdomen repleviſſe, de quo vid. Helmontius *Tract. Ignotus hydrops* §. 14. Sed in hoc hydropo colliquationis primaria ratio eſt habenda, utpote cujus affectus ceu productum ſaltem eſt iſta hydropica intumefcentia.

### DIAGNOSIS.

Ratione diagnoſeos in paucis ſaltem partibus hydrops adeò manifeſtus eſt, ut in tempore appareat: Describitur equidem vulgò hydrops per tumorem, ſed ille

1. Interdum tales partes occupat, quæ non facilè diſtendi poſſunt, v. g. cranium, thoracem, & quæ, utut diſtendantur, tumorem tamen nobis palpare, aut oculis cernere non concedunt, v. g. pulmones, uterus, &c. Nec

2. Partes ſenſibus magis obvias & extenſiles, abdomen v. g. hydrops non ſemper attollit, niſi ingreſcente demum malo. Tumor quidem ſi a deſt cum aliis ſignis, præſentiam hydropis augurari ſuadet; abſens verò non ſtatim eam negat. Nihilominus hydrops in genere dignoſcitur, ſi in ſubjectis in quibus nulla de renum aut veſicæ vitiis eſt ſuſpicio, urina pauca admodum, i. e. potulentis aſſumptis non proportionata, ſimulque ſaturatius tincta reddatur, ideò quod parum admodum ſeri ad organa hæc ablegatur.

3. Si ſanguinis excretiones naturales diutius ſupprimantur.

4. Si hæmorrhagiæ præternaturales moderate contingant; Ac

5. Tumor alicujus viſceris obſervetur: vid. Piſo de *Morbis Scroſis* §. 4. cap. 3.

Sed præſentem magis manifeſtant

1. Tumor pedum cedematoſus, niſi morbus aut difficilior, aut diuturnior, vel error in diætâ præceſſerit, licèt noctu evaneſcat: cujus rationem vid. in Sylvio *Tract. de Hydropo* §. 3 I.

2. Si color faciei hætenus vividus abſque cauſa evidente in pallidum & luridum mutetur.

3. Si dyſpnœa ægrum ſimul, aut ſine aliorum morborum ſignis, utut ſine tumore, adhuc angat: quæ omnia à lymphâ viſcida, ejusque circulatione turbata oriuntur: &

4. Si ſitis intenſa ſuperveniat, à ſeri extravafatione præternaturali ortum ducens.

### PROGNOSIS.

Prognofin noſtri hydropis egregiè tradit Hippocrates *lib. 2. Prædictio*. quem locum Celfus *lib. 2. cap. 8.* ita vertit: *Aqua inter cetera minimè terribilis eſt, quæ nullo antecedente morbo capit: dein quæ longo morbo ſupervenit. Utique ſi firma viſcera ſunt, ſi ſpiritus facilis, ſi nullus dolor, ſi ſine calore corp. eſt, æqualiterq; in extremis partibus macrum eſt, ſi venter mollis, ſi nulla*

*tuffis, nulla ſitis, ſi lingua ne per ſomnū quidem areſcit, ſi cibi cupiditas eſt, ſi venter medicamentis movetur, ſi per ſe excernit molia & figurata, ſi non extenuatur, ſi urina ex vini potatione, & non potius aliquibus medicamentis mutatur, corpus ſine laſſitudine eſt, & morbum facile ſuſtinet: ſiquidem in quo hæc omnia ſunt, is ex toto tutus eſt: in quo plura ex hiis ſunt, ut in bona ſpe eſt.*

In ſpecie tota prognofeos ratio conſiſtit ſaltem in accurata conſideratione cauſæ remotæ & conſtitutione viſcerum abdominis, horumque collatione, imprimis renum.

Omnis hydrops periculofus ſatis eſt, ejus contumacia naturæ vires, omnemque artis induſtriam eludere videtur: quam tamen curationis difficultatem moderatur atque intendit.

1. Tempus durationis, quatenus hoc longius non ſolum cauſæ pertinaciam, viriumque defectum, ſed viſcerum quoque indurationes atque corruptelas, quarum cauſa non rarò hydrops exiſtit, teſtatur; cum minus inveteratus hæc conditiones probabiliter detrectet, adeoque plus ſpei concedat.

2. Cauſæ diverſa vis, utpote quæ, quò magis mobilis atque ſanabilis, eò plus ſperare, quò potentior & firmior, deſperare jubet. Hinc qui à ſolidarum partium conformatione læſa, v. g. obſtructione, induratione ſeu ſcirrho viſceris cujuſdam inſignioris, aut lienis, &c. difficulter admodum ac ferè nunquam curatur, aut curatus licet, facilè renaſcitur, qui recidivans ordinariò lethalis eſt; quod obſervetur in paracenteſi judicioſè inſtituenda: econtra minus periculofus eſt, qui à fluidorum tantum diſpoſitione præternaturali, v. g. ſeri copia, aut craſſitie dependet. Nihilominus, qui à craſſi ſanguinis notabiliter depravatâ ac difficulter emendabili, v. g. ſcorbutica, dependet hydrops, pro periculofò maximè habendus eſt; qui à vaſis lymphaticis majoribus aut pluribus ruptis evenit, difficilioris videtur curationis, cum vaſa hæc lacerata non adeò facilè coaleſcere queant.

Qui à tranſcolatione ſeu diapedeſi aucta, modo hujus cauſa ſolubilis ſit, v. g. ob menſes ſuppreſſos, difficilè curatur.

Qui ſupervenit morbis chronicis & ætate graveſcentibus, rariùs curatur: qui à junioribus, febribus acutis laborantibus, obvenit, non adeò eſt periculofus, nec curatu difficilis, ſed præ reliquis faciliùs curari poteſt.

Aliàs ex febre, præprimis acuta, mali omnis eſt: vid. Hippocrates *Prognofic. Text. 8. §. 1.* quod vel ſingularem ſanguinis dyſcratiâ, vel viſcerum labem, vel utrumque denotat. Quibus accedit, quod vires gravi ejusmodi morbo à priore fractæ impares ſint, quarum intuitu quemlibet alium morbum

(Hhh 3)

excipi-

excipiens hydrops ut plurimum lethalis est: vid. Hippocrates *lib. 4. de Morbis Text. 34. §. 7.* Quod si verò febris à potu frigido astatim hausto superveniat, interdum solvitur. Hydropem magis minusve periculosum reddunt symptomata conjuncta supervenientia, horumque conditiones. Quippe Hippocrates *Secl. 6. Aphor. 14. de judicat. Text. 11. §. 20. & 25. Coacar. Pranot. Secl. 3. §. 285. 289. & 326.* hydropis equidem solutionem contingere ait, si  $\nabla$  ad ventrem confluxerit, seu per alvum evacuetur, in principio verò, citra cruditatem tamen, dum *Coacar. Pranot. § 85.* allegata, hoc fieri debere asserit, fluxus alvi progressu morbis hydropicis contingentes maxime lethales observantur, ita quidem, ut juxta eundem Hippocratem *lib. 4. de Morb. Text. 34. §. 10.* sentientes & loquentes, illi moriantur.

Hydrops ex perverso purgantium abusu, admodum periculosus est.

Urina pauca, rubicunda & crassa, malum admodum signum est: vid. Hippocrates *Coac. Secl. 3. §. 284.* & Willisius *Pharm. Ration. Secl. 2. cap. 3.* Urina enim, quo minus redditur, eò deterior est hydrops: ut proin rectè moneat Celsus, tunc affulgere spes ejus, quando plus per urinam excernitur, quam potu fuerit assumptum.

Hydropicis tussis vexans malum & desperatum signum est, juxta Hippocratem *Secl. 6. Aphor. 35. & Secl. 7. Aphor. 47. & M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 148. pag. 168.* nisi scilicet hæc à catarrho, sed ab acrimonia massæ sanguineæ, quam hanc ex defectu feri contrahere, superius dictum; aut à feri copia contingat.

Hydrops cum febre colliquativa, conjunctus cum copiosæ materiæ viscidæ rejectione per asperam arteriam non semper habet comitem phthisin, uti & hoc aliquando observatum.

Abcessus ac ulcera non facile in hydropicis sanantur, sæpè propter supervenientem sphacelum lethalia evadunt, juxta Hippocratis *Secl. 6. Aphor. 8. & l. 7. Epidem. Text. 13. §. 7. 8. &c.* item maculæ rubræ ac lividæ in cruribus erumpentes gangrænam minantur, mortemque præ foribus esse innuunt.

Ulteriùs, quando in hydrope, ex cachexia aliisque morbis diuturnis similibus orto, apparent dejectiones nigræ, quæ non sunt à medicamentis Martialibus assumptis, lethale & desperatum malum est.

Hydropicis convulsiones periculosæ sunt, annotante eodem Hippocrate *3. Coac. Pran. 287.*

Tandem recidiva hydropicis interdum lethalis ab Hippocrate *Secl. 3. Coac. Pranot. 288.* pronunciatur: vid. Schenkii *Obs. pag. 436.* & Sennertus *Pr. lib. 3. pag. 723.*

## CURA HYDROPI.

In hac

1. Humorum colluvies seu aqua, removenda.

2. Eorundem scaturigo sistenda.

Hoc principale, illud minus principale. Quoniam verò collecta colluvies impedit potiore intentionem, propterea quantum possibile & quàm citissimè removenda; metuedum enim, ne hujus retentione viscera erodantur, indurentur, aut quocunque modo lædantur, adeoque horum corruptiones hydropem non tam pariant, quam sequantur. Poterit hoc fieri duplici ratione, imò combinari utraque, scilicet tam per potus abstinentiam, quàm evacuationem.

Potus abstinentia, quantum hydropem moderetur & curet, testatur Dodonæus *Obs. pag. 116 117.* Panarollus *Pent. 4. Observ. 38.* Hildanus *Cent. 4. Observ. 41.* Hollerius *de morbis internis cap. 39.* Riverius *Prax. l. 11. cap. 6. ac Observ. commun. pag. 323. & Willisius Pharm. Rational. Part. 2. Secl. 2. cap. 5. pag. 297.* Quibus minimè refragatur, quod Schenckius *Observ. pag. 437.* Panarollus *Pent. 2. Observ. 24.* & Dodonæus *l. 4.* notarunt, quosdam nimio potu ab hydrope liberatos fuisse. Per accidens quidem & non sine suæ vitæ periculo hoc factum, quatenus per rupturam umbilici, diarrhœam, & hæmorrhoidum fluxum, ab uberiore aquæ haustu excitatum præter omnem expectationem, causa hydropis conjuncta eliminata fuit.

Sed manifestius hoc præstant evacuationes, siue pharmaciæ siue chirurgiæ adornandæ. Prioris generis sunt evacuatio sensibilis per alvum, & hinc per urinam, vel quod rarius est, insensibiliter per sudorem. Sudor enim vix proficius est, nisi in anasarca; in hydrope autem ascite plus nocet quàm prodest, quia sitim intendit, ac vires exhaurit.

Posterior indicatio obtinetur in genere, massæ sanguineæ crasin, & inde vitiatam hæmatosin emendando & restituendo, stomachum roborando, digestionem primam corrigendo & promovendo; aliàs enim radicitus curare hydropicum impossibile est. Imò quantum bilis correctæ hoc in casu habeat in recessu, vel hoc solum testatur, quod solo absinthio hydrops quandoque fuerit curatus. In specie pro antecedentium causarum varietate, quam secutus est hydrops & relictæ noxæ aliquis ratio & varietas subinde observanda, ut & his ipsis maturè occurratur; nisi enim fomes eliminetur, hydrops non poterit curari. In hoc proinde puncto consideretur: an hydrops icterum, an morbos chronicos secutus sit? Si hoc, aut ex abusu fortiorum medicamentorum purgantiū obortus sit, ut & his ipsis maturè occurratur, optima erunt Martialia adhibita. Adeoque omnia ea, quæ supra de cachexia monita fuerunt, hic repetenda. Pro

Pro his ſcopis ritè obtinendis cautela ſequentes in curando hydrope ſunt obſervanda:

I. Purgantia, quæ aquam evacuant, in hoc hydrope quidem benè conveniunt, cùm experientia conſtet, eadem copioſam aquam ex abdominis cavo eliminàſſe. Interim tamen notandum, quod uti purgatio crebra in omnibus morbis non eſt neceſſaria, ita & hic eſt admodum nociva, accuratioribus id teſtantib⁹ Præcticis. Nā dū purgantia evacuant ſeroſitates, ſimul utiles ſuccos pl⁹ min⁹ colliquant, vires ac viſcera debilitant, ac ita plus nocent quàm⁹ proſunt, quaten⁹ ſerū ſanguinis ut cauſa mali antecedens per illa exagitatū atque fuſum in loca affecta, unde non facilè remeabile eſt, uberius adigitur, ſicque cauſa continens evadit, hancque auget: vid. Sylvius de hydr. §. 154. Riverius Pr. l. c. 6. Poterius Cent. 3. Obſerv. 34. & Willifius l. a. Sect. 2. cap. 3 & 5. Conter. hic ea, quæ habet Bruno in Noſis ad Jeſſenii judicium de ſanguine è vena ſectæ emiſſo pag. 147. qui Jeſſenius fuit Medicus Bremenſis. Obſervandum etiam, ut purgans exhibitum operationem ſuam ritè aſſequatur: quod ſi fiat, bonum; ſi minus, malum; cùm colliquando ſolūm contenta corporis, aſt non evacuando, malum augeat. In principio tamen, & ſi nimis debilis ſit æger, ideoque non par ſit validiori purganti, lenia ſaltem primas vias abſtergentia, & per epicraſin blandè evacuantia conveniunt, ut ita meliùs diſponantur primæ viæ ad ſubſecuturas fortiores purgationes. Ulteriùs commodiſſimè inſtituuntur purgationes luna decreſcente; creſcente enim lunâ & ipſū malū accreſcere, decreſcente verò eadē etiam malū decreſcere, experientia teſtatur. Verūm hæc purgatio tunc tantummodò convenit, quando in cavo abdominis fluctuat aqua; ſi enim hæc ipſa aut in omenti buſa concluda, aut in peritonæi duplicatura, aut in veſiculis meſeraicis incluſa fuerit, omnis omninò purgatio ſolet eſſe fruſtranea.

II. Vomitoria in hydrope rariùs in uſum vocari debent, niſi fortè in principio, dum adeſt cachexia confirmata; in hydrope autem confirmato rariùs conducunt, licèt certum ſit, quod interdum fructuoſus obſervatus fuerit eorundem uſus. Meminit enim Celfus, in ſuis ſcriptis Metrodori philoſophi, qui fuit diſcipulus Epicuri, qui hydropticus cùm plurimum biberet, ſed mox plus evomeret, ſucceſſivè ſic convaluìt; cujus exemplo, inquit Celfus, Medici vomitum probant, & laudant in iis, qui facilè, & ſine moleſtia vomunt. Facit huc, quod refert Foreſtus Obſerv. 32. lib. 19. in Scholio, ubi quidam hydropticus pro deſperato habitus adſcendit naviculam, & petiit mare, hinc provocato largo vomitu navigationibus primum conſueſto, & poſt vomitum

exercitio creberrimo utens, ſic fuit curatu.

Interdum ergo, ubi adeſt vomendi inclinatio, aut etiam ubi gravior dyſpnœcia urget ægrum, commodè inſtitui poteſt vomitus; ſic enim ſubitò liberius respirare ſolent. Sed neceſſe eſt, ut larga doſi propinentur vomitoria, cūm in hydropticis, præſertim confirmatis, rariùs vomitum procreare ſoleant exhibitæ remedia. Sic enim Mercurii vitæ gr. ij. vel iij. quæ aliàs abundè ſufficiunt pro vomitorio, hydropticum non movebunt, idque aut ob ventriculi atoniam, aut ob remediorum à contentis ſeroſitatibus acido-ſaliſ alterationem, & quaſi fixationem.

III. Diuretica in hydropis cura omnium ſunt optima. Hæc nempe revera ſunt hydragoga, cūm naturæ ſit mos & conſuetudo per vias urinarias ſuperfluum ſerum naturaliter expurgare: unde præmiſſis neceſſariis univerſalibus hiſ imprimis inſiſtendum. Dico præmiſſis univerſalibus: Hoc enim omnes præcipiunt præctici, ut diuretica non priùs exhibeantur, quàm univerſalia attenuantia, aperientia & laxantia fuerint præmiſſa, aliàs non tuto ad diuretica acceditur. Intempeſtivo enim eorundem abuſu impeditur urinæ fluxus potiùs, quàm ut hic promoveatur & adjuvetur, quippe omnia ſpecifica anti-hydroptica vi diuretica inſignia ſunt. Aliàs multis ſatiſ faciunt ſcopis, præſertim quæ ſunt ex numero volatiliū, v.g. quæ ex urina, lumbricis, buſonibus, &c. petuntur, quia ſalina virtute incidunt, penetrant, & vias abſtergunt, viſcera aperiunt, & ſcirrhos induratos reſolvunt, &c.

IV. Obſervetur: Opiata ac ſimilia narcotica, qua talia ac per ſe, hydropticis exhibitæ ut plurimum eſſe necrotica & lethalia; uti eorum noxam per experientiā confirmat Moellenbroccius de Arthritide vaga cap. 14. pag. 254. & 255. Id quod verum arbitror, cūm opiata in morbis chronicis, ac propemodum ad extrema deductis, ut ſit in hydrope, quando vigiliæ accedunt, minus proſint, quàm in acutis, quin vires ulterius deſiciant, & viſcerum tonum ulterius labefactent, & laxent. Imò poſt chronicos aut acutos morbos, dum languent adhuc ægri, & quædam adhuc ſymptomata ſuperſunt, ſi iſdem opio ſuccurrere velimus, periculum eſt, ne hydroptici exinde ſiant, quod fieri obſervatum. Saltim per accidens vi ſuâ, ut vocant, anodynâ ſpirituum impetum non nihil refrænando, & fibrarum nervorumque renalium irritatorum ſpaſmum demulcendo, ſicque per meatus apertiores redditos ſudorum & urinarum fluxum promovendo, prodeſſe obſervata fuerunt. Conter. Bartholinus Cent. 3. Epiſt. 46. & 49. pag. 192. & 201. Sed hæc exempla, uti



uti eadem admiratur Bartholinus scribens, & Langelottus respondens, ita ea minus audacter imitanda; quia sedulâ curâ & non, nisi summa circumspeditione, administranda veniunt, cum affectus hic sit rarissimus & accidentarius: vid. Bierlingius *Cent. 1. Advers. 5. pag. 16.* Quò pertinet mirabilis observatio Willifii *Pharm. Ration. P. 1. pag. 302.*

Auxilia igitur, quæ priori scopo conveniunt, sunt evacuantia, tam interna quàm externa: Interna sunt purgantia, diuretica, & interdum quoque diaphoretica: Externa sunt paracentesis, vesicatoria, escharotica, &c.

Quoad purgantia: plura hic & varia passim in usu sunt. Inter multiplicia appropriata, selectiora saltem proponere est animus: quæ inter est primò gratiola, cujus infusum ad ℥iij. aut si ad ℥ij. decoquatur, vel etiam conserva ad ℥ij. usurpetur, eleganter solet evacuare aquas hydropicorum. Porro sambucus, ejusque cognatus ebulus: & quidem in specie horum cortex medianus, ex quo expressus succus cum oxymelle squillitico propinatus insigniter aquas evacuare solet: sed ita, ut autore Foresto *lib. 19. obs. 37.* in scholiis cortex iste sursum à ligno abradatur, vomitus concitet; sin verò deorsum versus per inferiora abradatur, etiam per inferiora purget: de quo experientia consulenda. Aliàs folia sambuci decoctis addita, egregiè etiam solent aquas evacuare. Præcæteris semper appropriatum & simul violentum purgans est radix ireos nostratis flore cæruleo. Purgat sanè validè: sed in sapore ejusdem acerrimo simul vim hydropicam alterativam specificam latere existimo. Usurpari potest vel radix recens in caleolas incisa, & ad ℥iij. infusa in vino vel sero lactis cum cinnamomo: vel ex radice rasa exprimatur succus, & per residentiam spontaneam sine calore depuretur, qui abjecto sedimento ab ℥ss. ad ℥j. propinetur. Ne verò acrimonia sua fauces lædat ac noceat, cum syrupi violarum ana mistus propinetur, ac ne ventriculum nimis labefactet, cum aqua cinnamomi parùm addita exhibeatur; vel radix recens incisa blandè ebulliat in jussculo carnis pulli vel gallinæ, de quo ægro, præsertim debiliori existenti, tantum propinetur successivè, donec sufficiens subsequatur evacuatio. Quidam propinant succi hujus ℥ss. cum ℥j. pulveris soldanellæ marinæ, nam & ipsa soldanella, est decantata ad hydropicos purgandos. Dosis pro decocto est à Mj. in substantia datur pulvis à ℥ss. ad ℥j. ad summum ℥ss. admisto simul ℥j. pulveris rhabbari, cum quo lubentissimè jungitur. Aliàs flores acaciæ, item flores persicorum ex benignioribus sunt purgantibus in hydropicis usitatis: In specie flores acaciæ nostratis vino infusi, vel, quod melius, ad Mj. in sero lactis decocti, blandissimè & copi-

osè tamen aquas evacuant. Quidam parant syrupum florum acaciæ, qui tamen pro usu purgationis debent esse recentes, alias enim virtute purgante privantur, syrupus etiam florum persicorum ad ℥ij. propinatus suaviter evacuat hydropicorum aquas: quo etiam facit syrupus de spina cervina ad ℥j. usurpatus; item syrupus hydragogus Mynsichtii, qui ad ℥ss. præscribitur. Radix jalappæ, à ℥j. ad ℥ss. propinatur commodissimè ad evacuationem aquarum hydropicarum; aut etiam ejus resina, de qua vid. Borellus *Centur. 2. Observat. 23.* ad gr. xv. vel ℥j. cum vitello ovorum dissolutus, & in forma emulsionis propinatus; aut essentia ejusdem citrata ad ℥ss. vel ℥vj. exhibeatur; vel etiam recipiatur hujus essentia cum V paratæ ℥iij. ad ℥ss. vel ℥vj. misceatur cum syr. rosar. solutivo; vel dicta resina, cum stimulo leni colocynthidos commodè præscribitur, e. g.

℞. ℞i Olati gr. xij.  
resin. jalapp. ℥ss. ad gr. xij.  
Extract. troch. alb. gr. j. l. ij.  
℞i Olati macis gtt. ij.  
cinnam. gtt. j. M.

℞. Sem. melon. ℥ss. ad ℥j.  
res. jalapp. gr. xv.

c. ∇ mentha & cinn. f. emulsio:  
D. S.

Laxier-Milch.

℞. Resin. jalapp.  
℞is ℞i à gr. vij.  
syr. rosar. sol. q. s. M.  
℞. Jalapp. pulveris. gr. xv. ad ℥j.  
℞i depur. ℥ss.  
scamm. ℞at. gr. j. l. ij.  
℞i Olat. anisi l. bacc. junip. gtt. ij. M.  
℞. Rad. jalapp. gr. xvj.  
crem. ℞i gr. xij.  
extr. troch. alb. gr. j.  
℞i Olat. cinnam. gtt. j. M.

Gummi guttæ his accensetur, ac hujus R cum R ℞i paranda, aut resina, quæ etiam solet præscribi cum salibus digestivis, potenter evacuat hydropicos. Dosis est in substantia ad gr. xvj. Mag. gr. xij. miscentur cum ℞ibus digestivis, ut facilius & securius operetur. Est sanè expertum remedium ad educendas aquas, sed cautus sit gummi guttæ usus, tùm, quod incognita sit ejus progenies, tùm, quod autore Lindano sæpius ab illo exulcerentur pulmones; quin potius omnibus his palmam præripit elaterium seu succus inspissatus cucumeris asinini, quò vix datur tutius & præstantius remedium: loco cujus & essentia ex radice exsiccata parata elegans est remedium purgans. Item confici potest extractum cum V ℞ato, quod frequentissimè & feliciter exhibuit B. D. Michaelis. Potest propinari à gr. xij. ad gr. xv. & ex eo parari possunt pilulæ unæ cum aliis, imprimis Mercurio dulci: e. g.

℞. Extr

℞. *Extr. elater.* gr. xv. l. ʒj.  
*resin. jalapp.* gr. ij.  
 (vel ubi evacuandum serum craſſum & pi-  
 tuitoſius,

*troch. alhand.* gr. j. l. ij.)  
 ʒo *Sat. bacc. junip.* gutt. ij.  
 c. f. q. *essent. absinth.* f. pilulæ.  
 ℞. *Extr. elater.* gr. xv. ad ʒj.  
*ʒii dulc.* gr. xv.  
*extract. troch. alh.* gr. j.  
 ʒo *Sat. bacc. junip.* gutt. ij.  
 c. *essent. absinth.* f. pilulæ.  
 ℞. *Extract. elater.*  
*panchym. Crollii.*  
*ʒii dulc.* gr. jx.  
*res. jalapp.* gr. j.  
 c. *essent. absinth.* f. pilulæ.

Sanè Lindanus dicit: *Elaterium per se esse nobiliſſimum remedium. Credo meum parentem eodem centum hydropicos ſervasse: nempe præſcripſit aliquando ruſtico gr. viij. elaterii in pilulis, quicquid Pharmacopæo perſolvens in præſentia ejus ſtatim degluſiit. Sed poſtmodum domum tendens, motu illo pilula cæperunt operari, detrahensque caligas in via deſecit, & per ſuperiora aquam rejecit, ſicque ventrem ſuum tumidum amiſit.* Denique radix bryoniæ tanquam purgans ſuo modo ab Helmontio commendatur in hydrope: ſed, ut dicit, correcto primò ejus veneno corroſivo. Infuſum ergò bryoniæ cum ſale tartari paratum, vel decoctum, ad evacuandas aquas commendari ſolet. Ac ſanè bryonia hæc in hydrope curando tanquam evacuans & alterans ſingulariter convenit: in ſpecie in hydrope uteri ſingulare quid obtinere videtur. Doſis ʒiſſ. in infuſo, vel ſyrupo ad ʒiſſ.

Colocynthis denique & ipſa, ubi craſſiores & viſcidiores ſunt aquæ, commodiſſimè uſurpatur. Aliàs ſpiritus vitæ aureus Rulandi, ſeu eſſentia trochiſcorum alhandal, eſt ordinarium purgans hydropicorum: ſic loco iſtius trochiſci ad ʒj. bulliant in ʒiij. vini.

His ex regno minerali imprimis adnumeratur luna, è qua excellunt pilulæ lunares: nempe cryſtalli ex luna puriſſima cum ſpiritu nitri vel aqua forti paratæ, ſapore amariſſimæ, ſed mirabiliter aquas hydropicorum evacuant. Cryſtallorum talium gr. j. l. ij. ad iij. cum mica panis in pilulas redactarum aquam copioſam, ſine ullo tamen ſymptomate, evacuat reſolent. Aliàs & Mercurialia decantata ſunt in cura hydropiſeos; unde imprimis ʒius dulcis ſtimulo appropriato acuatus convenit, imprimis in hydrope ſcorbutico. Huc pertinet ʒius vitæ, quem ſine vomitu in hydrope operari plures teſtantur, & Bulten *Medic. Mag. pag. 77.* cum oleo ſalis circulatum, tanquam ſpecificum in hydrope purgans, commendat; unde ʒ dulcis miſtus cum ʒio vitæ perquam conveniens laxativum eſt. Hujus remedii &

Tom. II.

mixturæ proportionem docet Hartmannus in *Praxi Chymiatrix*, p. 5. Siquidem ſub benè facta iſta miſcela, ʒia ʒii dulcis figunt ʒium vitæ, ut vim vomitoriam amittat, & evadat remedium maximam partem per inferiora purgans:

℞. *Conſerv. fl. Perſic.* l. *gratiol.* ʒj.  
*ʒii vitæ. ʒ dulc. miſt.* gr. xii. ad xv.  
*Extract. elater.* l. *troch. alhand.* gr. j.  
 l. ij.  
 c. f. q. *Syrupi fl. Perſic.* l. *de ſpina cerv.* f.  
 Bolus pro doſi j.

Denique ſegmenta unguium humanorum vino infuſa, fortiter etiam purgant. Hartmannus præcipit, ut imprimantur umbilico hydropicorum pro iſdem purgandis.

Cæterùm his purgantibus ſemper interponenda ſunt ſtomachica, & maſſam ſanguineam reſpicientia, quæ vulgò vi aperiendi prædita dicuntur, & ferè ſunt omnia amara, acria, & quodammodò ſalina, quæ & ſanguinis craſin corrigunt, obſtructiones & infarctus reſerent, & imprimis urinam ſtimulant: inter quæ eminet abſinthium, quod quacunquè ratione vel in cereviſia vel in decocto, vel ſub extracto aut eſſentia uſurpatum nobile eſt, nec uſquam omittendum.

Diureticorum autem, hydropi appropriatorum, quatinvis ingens farrago, apud Scriptores obſervetur, non ſine ratione tamen à Præcticis haud levioris momenti eorum alia præ aliis ſeliguntur ac laudantur. Inter alia excellunt poſt abſinthium ex aſaro, helenio, & gentiana petita remedia, marrubium, in ſpecie, ubi ab ictero ortus ſit hydrope, laudatur à Foreſto *lib. 19. obſervat. 10. in Schol.* item chelidonium majus ejuſque radix ſpecificum dicitur Helmontii in hydrope. Addatur radix vincetoxici, quæ vel per ſudorem, vel per urinam operando, à multis laudatur, ſi ſc. ejuſdem decoctum cum vino crebriùs & ſæpiùs uſurpetur. Alii parant eſſentiam vel extractum ejus, & hoc ipſum cum ſuccellu propinant hydropicis: hinc eſt deſtillatum Paracelli commendatiſſimum ad hydropem, cujuſ deſcriptio habetur in Hartmanno *cap. 107.* ſine tamen ſpiritu vitrioli, ut vult Hartmannus, aſſumendum venit.

Huc pertinet & radix acori veri, caryophyllatæ, curcumæ, item rubiæ tinctorum & ſimiles, ac imprimis capitula alliorum. Præter exemplum Bartholini *cent. 2. hiſt. 74.* Hydropici per decoctum allii in lacte curati. Facit huc, quod Foreſtus *lib. 19. obſ. 37.* refert, hydropem, aliis in vanum adhibitis ex continuata comeſtione allii, multum aquoſitatis per urinam reddendo, inſperatò fuiſſe curatam. Porro cortices capparum & tamarici, item citri aut aurantiorum aliis convenienter adduntur. Eupatorium admodum commendatur à Lindano: uſurpatur ſemper tempore

(lii)

pore intermissione à purgantibus: item anserina, flores cyani, & flores calcatrippæ; quorum Ræ solent laudari ab Agricola.

Hiscæ præ cæteris addenda sunt juniperus, tam lignum, quàm specialiter ejusdem baccæ aromaticæ, & omnia juniperina. Unde baccæ conducunt in vino, vel rob baccarum juniperi, quod simul egregium alterativum existit; essentia & ~ baccarum juniperi, hinc Malvaticum juniperinum ex spiritu baccarum & rob juniperi, mistum cum R nephritica, in hydropse egregiè prodest: v. g.

℞. *Malvat. juniperin.* ℥iv.

R *nephrit.* aut hujus loco ~ *carm. detrib.* ℥j. M.

pro dosi cochl. j. l. ij. pro lubitu.

Sanè decoctum ligni juniperi longè magis appropriatum sudoriferum existimo, præsertim in anasarca, quàm decoctum ligni guajaci & sassafras: unde & decoctum baccarum juniperi in vino generoso experimentum est Rulandi. Conf. M. A. N. C. *ann. 9. obs. 18.* Ulteriùs ad diuretica pertinet herba kali dicta, quæ recens & contusa exprimitur, postmodum addendo parum cinnamomi bis quotidie ad ℥ss. usurpatur in haustu cerevisiæ, vel vini calidi. Præter hæc salia, alcalia sunt, quæ pro usu diuretico hydropicis propinantur, & quidem in hydropse anasarca magis fixa, ubi reliquis diureticis plus præstare observantur: In ea verò, quæ ad ascitem propius accedit, aut, ubi ex urina crassa, parca, intensè tinctæ, atque lixiviosa strictam nimis sanguinis crasin, adeoque serum in renibus haud decenter secerni suspicari licet, hæc potius noxia existunt, adeoque in ejusmodi calibus salia volatilia, aut nitrosa conveniunt: Fixa inter Θia sunt lixivialia, sarmentorum vitium, juniperi, genistæ, stipitum fabarum, fimi columbini, cardui fullonum, Qi, absinthii, cardui benedicti, &c. & Qi calcinatus. Hæc ipsa salia diluuntur in vino, aut aqua appropriata, quæ imbibunt sal diureticum: lixivium filtratur, & ita propinatur ægris.

℞. *Θis sarment. vit.*

*fimi columb.*

*juniperin.* ā ℥j.

Solvantur in

*Vini Rhenan.* t℥ss.

De hoc subinde hauriatur.

Sed ratione saporis adduntur interdum quædam aromata, ut firmetur melius tonus stomachi: Vel

℞. *Ciner. genist. ad albed. calc.* ℥ss.

Ponantur in vase vitreo ad digestionem cum t℥ij. vini albi, vel V appropri. per aliquot horas. Colentur. Dosis ℥vj. ad ℥viij. bis in die.

Pertinet huc etiam sal essentielle Qi, flores salis ammoniaci, lixivium diureticum Myn-

sichtii, lixivium ejus benedictum, ab ℥ij. ad ℥iij. aliquoties successivè propinata; vel quod fuit experimentum D. Ellenbergeri.

℞. *Ciner. tamarisci*

*juniperin.*

*sarmentor. vitium*

*salicis*

*genist.* ā Mj.

rad. *vincetox.*

*valerian.* ā ℥ij.

*urtica* ℥ss.

*angelica*

*enul.*

*ireos nostrat.* ā ℥ij.

*liquirit.* ℥j.

*baccar. juniper.* ℥ss.

*rhabarb. elect.* ℥ij.

M. pro nodulo:

Qui infundatur vino, vel ana Vx & +i vel vini, & de colatura post infusionem crebriùs bonus haustus bibatur.

Modò laudatus Practicus lixivio ex stipitum fabarum cineribus, vetulam curavit hydropicam, quæ postea 4. adhuc liberos peperit. Post dictos cineres in specie Θ lixiviale juniperi, item ex arbore betulæ aut quoque tiliz in vino Malvatico sub forma lixivii est admodum laudandum. Interim ex hisce præferenda sunt salia volatilia diuretica, in specie ex Q elicita, ut ~ Qi volatilium cum ~u sambuci mistus, R Qi, ~ carminativus detribus, R nephritica ~ & flores Θis \*ci simpl. ~ Θis \*ci succinatus, & o, eo nato juniperi oleosus redditus, Θ succini volatile, item elixyr proprietatis cum ~u Θis \*ci paratum. Ellenbergeri arcanum fuit ~ aperitivus Penoti, cum ~u baccarum juniperi mistus ad gutt. 40. vel 50. Sic quoque ex regno animalium conveniunt urina humana, ejus ~ per putrefactionem, ejusque Θ volatile: Nam ita per fermentationem parata urina, dat spiritum admodum volatilem & acrem; qui benè rectificatus ceu summum arcanum commendatur multum à Poppio in *Thesauro Chimico*, dum nempe spiritum volatilem urinæ cum ana V rectificati, addito pauco ambra & moschi, digerit, postmodum destillando probè unit. Dosis ℥j. ad ℥ss. mane & vesperi propinando. Sic urinæ caprarum ac vituli natæ, & aliquoties, usurpatæ egregiæ sunt. Ac certè lotiū humanū & ovinum aliquot dieb<sup>9</sup> calidè potum vi diuretica sunt euporiston pauperum ad hydropem: id quod in pauperibus, & aliquot opilionibus, expertus est Petrus in *Dissertat. harmonicis*. Pariter Crollius excrementum anserinum viridiusculum ad ℥j. cum cochleari j. urinæ natæ commendat, vel etiam pulvis scarabæorum unctuosorum laudatur à Glauberto.

Impri-



Imprimis lumbrici & lumbricalia ceu specifica se offerunt: nempe vel decoctum lumbricorum in vino propinatur, vel, quod melius est, si iidem putredine colliquescant, & ~ volatilis urinosus cum ~e volatili ex his ~atur, quod in haustu vini Malvatici, aut Malvatico juniperino, & quocunque vehiculo assumptus, egregius est in cura hydropis:

Vel ~. ~ lumbric. ~str. ~os. 3ij.

volat. ~a 3j. l. 3ij.

M. S.

### Harn-treibender Spiritus.

Dosis 3ß. vel gutt. 60. bis vel ter in die in haustu vini cum baccis juniperi medicati, vel decocto rad. tænic. & baccarum juniperi cum vino assumatur. Item, quod melius adhuc, paretur liquor ex lumbricis terrestribus p. d. in clibano ad imitationem Crollii in *Basilica Chim.* p. 349. Quidam etiam propinant pulverem lumbricorum terrestrium. Eadem de asellis valent. Infundi etiam possunt millepedes cum R~i, pulvis scarabæorum unctuosorum laudatur à Glauco in *eiusdem scriptis*. De cantharidibus vid. Sennertus *Prax.* l. 3. pag. 787. Bufones præ cæteris singulare quid obtinent in hydropis cura, & quidem quando contingit vicio renum; siquidem primum casu inventum hoc remedii genus, dum leviter calcinati & hydropico propinati eundem leviter per urinam curarunt; uti in Solenandro, Hildani *epistolis*, & Horstio in *observ.* pag. 532. Riverio *Prax.* l. 11. c. 6. & Wiero *observ.* p. 8. potest videri. Dicitur tamen fuisse secretum experimentum Kyperi, nempe:

~. Bufones q. v.

Exsicca in umbra, post abscinde capita, & exime intestina, quod reliquum, redige in pulverem subtilissimum.

De hoc vel solo, vel cum pulvere hepatis proprii misto, dentur gr. xv. usque ad 3j. Potest dari pulvis hic 3. vel 4. vicibus, donec proveniatur in fluxus; ita tamen, ut 3. vel 4. dies post assumptiones semper interponantur, ne nimia fiat urinæ excretio. Alias bufones vivi contusi lumborum regioni applicati per copiosum urinæ profluvium hydropem solvere dicuntur. Differentia hæc inter alcalia hæc diuretica fixa & volatilia probè observanda, nec promiscuè usurpanda. Conf. Wedelius in *Pharm.* pag. 150. & Willsius in *Pharm. Rat.* p. 1. pag. 316. & 363. Ulterius lapis fulminaris cum aqua quadam appropriata, in alcohol tritus erat specificum ad hydropem & icterum B. D. Michaëlis, quod ipse habebat à Tilemanno & D. Hartmanno.

~. lapidis fulminaris p. iij.

exuviar. serpent. spontè decident.  
pulverisat. p. j.

Miscebat hæc, & ita à 3ß. ad 3j. familiariter pro hydropem & ictero curando exhibebat.

Tom. II.

Denique pertinent quoque huc opercula testarum cochlearum, quæ ob singularem vim urinosam, quâ turgent, ritè parata, ceu probatum contra hydropem remedium laudantur. Unde benè depuratorum & simpliciter pulverisatorum manè & vespèri larga dosis in haustu vini vel liquore conveniente propinetur; vel quod melius, alii cum spiritu salis resolvunt hæc opercula pulverisata, ita fit solutio urinosa, quæ coagulatur: quo facto ponitur in locum frigidum, ut ita per deliquium fluat, eodem modo atque R vel liquor nephriticus paratur, & sic liquorem nephriticum egregium diureticum antihydopicum acquirunt: vid. M. A. N. C. *ann.* 9. obs. 79. Liquor iste per deliquiū parat' ad gutt. xx. xxv. & xxx. in quocunque vehiculo, si fieri potest, calido, aut & decocto radicum tæniculi vel petroselini ad curandos hydropicos est insignis. Loco ~e ~is in vino acidulo vel acetosolvantur, & idem erit. Huc facere videtur Rumelii diureticum ex ~u ~is cum sale volatili succini coagulato.

Circa diureticorum usum adhuc notetur: Ut corroborantibus ac moderatè adstringentibus, e. g. Martialia, &c. illa semper temperentur, aut saltem cum his frequentius commutentur; non quod talibus, ut veteres docuerunt, epatis tonus confortandus sit, sed ut impediant, ne sanguinis crasis seu textura fusione nimia penitus dissolvatur.

Juxta hæc diuretica interdum etiam procedendum est ad Diaphoretica & Sudorifera; testatur enim experientia, quoddam largo sudore fuisse curatos: præmissis nempe præmittendis, in specie diureticis, & quidem conveniunt magis in hydropem ad anasarcam accedente, quàm in ascite: vid. Sylvius; imò intempestivè exhibita nullum levamen adferunt. Horum enim potestas ultra tertiam corporis regionem non extenditur, sed causam saltem antecedentem in secunda & tertia movent; sub hoc tamen periculo, ut diaphoretica massam sanguineam fundendo, ac serum præcipitando, hoc æquè ad interiora & cavitates, ac per habitus externi poros, depellant: ut taceam, aquas in illis fluctuantes ab horum usu magis exæstare, spirituumque ac humorum motum variis modis turbari. Hinc experientiâ manifestum est, sudores ejusmodi subjectis semper in deterius cedere, quatenus iis febres, dolores capitis, vertiginem, lipothymias, aliaque cerebri & cordis symptomata movent, abdomine v. g. interim non collabescente, sed magis magisque intumesciente: vid. Platerus *Prax. som.* 3. pag. 286. Atque hoc non paradoxon videri poterit illis, qui ex topicorum calidorum, v. g. sacculorum & fortuum, saltem applicatione angustias majores, animi deliquia, similiaque symptomata

(lii 2)

mata

nata ex tempore ægris oboriri observant, mox rursus expirantia, locabilibus illis remotis.

Non nego quidem experientiam illam, quam nonnulli de curatis per sudorifera hydropicis allegant, v. g. Bartholini in *Actis Hassniens. tom. 1. obs. 85.* nec illorum, qui sudoribus ipse oboritur & quasi criticis hydrorem non rarò solum testantur, v. g. Hollerii *Scholiographus de morb. intern. cap. 39.* & Bartholinus *cent. 3. hist. 33.* Diversæ tamen in allegatis observationibus restant circumstantiæ, quæ dubitandi ansam insignem subministrant. Scilicet

1. Concedi debet, in anasarca & hydrope cavitatum tali, ubi seri extravasari non adeò multum est, sed major ejus portio intra glandularum ac viscerum substantiam & vasa adhuc stagnat, sudorifera maximè prodesse; cum per sudoris excretionem, vasis in habitu exinanitis, serum, quod interiora infarcit, ad illa commodè devolvi valeat, paucò illo, qui forsàn in cavitate fluctuat, vel per naturam, vel per medicamenta, dissipabili: quale quid in hydrope illo vesicario, quem in asciticis interdum Schenckius ex Cordæo, & communicatione Eichholzii, ac Salmuth *cent. 1. obs. 38.* testantur, & ex Bartholino *cent. 3. epist. 28.* & *cent. 4. epist. 58.* suspicari licet, pariter interdum contingere posse probabile fit, quatenus vesiculæ hæc cum fluido intrinseco vel immediatè, vel mediantibus parenchymatibus, communicant, eorumque contenta huic manifestius continua existunt.

2. Longè alia ratio videtur sudoris illius, qui hydropicis quibusdam criticus accidit, & qui arte excitatur: in illo siquidem blandus ac lentus fit seri à sanguine secessus, ut aequali augmentum nullum veniat metuendum; In hoc verò non, nisi impetu & exæstuatione aliqua secedere ac prodire jubetur illud.

Tandem ac 3. qui ab autoribus nominatis allegatur sudor asciten solvens, extraordinariam pororum dilatationem supponit, dum *Scholiographus* Hollerii inquit: Per destillantem quasi aquam aliquando hydropem sublatum fuisse; & Bartholinus aquam per poros cutis in immensum dilatata patulos stillasse perhibet.

Ex sudoriferis atque diureticis, quorum farrago amplissima deprehenditur, seligantur, quæ incidendi atque resolvendi vi maximè pollent: qualia sunt in specie dicta juniperina, decoctum lignorum, milii, aliorumque vegetabilium aromaticorum, cum salinis præsertim volatilibus, sale volatili urinæ, vel viperarum, & sub forma liquida magis, propinandis; modò sudore violentiâ propulso æger ad languorem non debilitetur, sed is lentè ac repetitis vicibus cicatur; cum nihil ab assum-

ptis sudoriferis periculi ægris immineat, quamvis nullus sudor promanet. Sed partitis vicibus exhibita humores viscidos solvunt, poros obstructos referant, sicque ad sudorem secuturum omnia blandè disponunt. Occasionem primam, ut aliàs, casus suggellit. Refert nempe Langius *suprà citatus*, ut & Lipsius *de hydrope*, de rustico hydrope laborante, cibarium pistorium adhuc calidum ingrediente, & mediante largo sudore ita curato.

Foras & Salivatio Æialis interdum cum fructu institui poterit, quam commendat Sylvius *de hydrope §. 155.* in anasarca scilicet & reliquarum hydropum specierum initis adornanda, præprimis cum salivatio interdum spontanea aut cum euphoria in ejusmodi casibus contingat, potissimum in Belgio inferiore. Confer. Grembsius *Tr. arbor integra & ruinosæ hominis lib. 2. cap. 1. §. 6.*

Externorum utum ipsa docuit natura, quæ nunc per spontaneam in umbilico abdominis tumidi apertionem, nunc per vesicas in cruribus excitatas, nunc foramine in pollice pedis spontè aperto, successivè collectam colluviem evacuando hydropicos curavit. Quando ergo dictis modis urina & aqua hydropicorum evacuari nequeunt, subinde ulu venit, ut per varios modos chirurgicos expertos extrahatur aqua. Modi sunt varii.

Quoad umbilici apertionem: non pauca prostant exempla ita restitutorum, qualia exempla videbitis in Schenckio, item Amato Lusitano *c. cur. 37.* Unde si tumidus promineat umbilicus, tutissimum est, ut in medio instituatur punctio: aut applicentur umbilico aperientia, ut promoveatur apertura. Ad hujus imitationem instituta fuit primitus paracentesis, h. e. abdominis artificialis apertio, quæ in majori copia & celerius aquas hydropicorum evacuat; & hujus vicaria scarificatio: quorum posterior illis, quæ habitum corporis externum inundant; prior aequaliculis tantum curandis inservit; quamvis per hanc toti abdomini applicatam asciticis quoque curatos Horstius *Cent. Problem. Decad. 7. quest. 8. §. 6.* perhibeat. Instituitur nunc veterum methodo, pertundendo abdomen per lancettam, imponendo hinc cannulam; nunc, idque melius, recentiorum methodo per acum argenteam perforatam. Nec refert, si per scarificationem chirurgorum, si per aculeum saltem communi, quam Willsius *cap. 5.* commendat, aut stilo argenteo adornetur, modò præceptis ac nimius aquarum profluxus præcaveatur; sic enim, si illuvies hydropica non satis exhauritur, certè in hydrope etiam deplorato vita ægrorum aliquandiu prorogatur. Locus convenientissimus est umbilicus tumefactus, hinc à latere umbilici aliquot

aliquot digitorum transversorum latitudine, notando simul membranam peritonci in hydrope valde crassescere: vid. Barberte *Chirurg. & Anatom. Pract. item Observationes, cultro anatomico* Lyseri annex. pag. 283. & Hornius *Microtechnæ* pag. 99. Emittere autem venit  $\nabla$  successivè: nam ex subitanea ejusdem extractione mors subinde sequitur: vid. Timæus von Guldens *Klee in responsis* pag. 35. uncia verò vj. vij. l. x. pro virium ægrotatione evacuentur. Conferatur Tulpus *lib. 3. observ. 38. item lib. 4. observ. 42.* Hildanus *centur. 1. observ. 47. centur. 2. observ. 58.* Panatollus *Pentec. 2. observ. 17.*

Verùm utut præsentissimum non raro fit remedium; quia tamen intempestivè atque incautè adhibita sæpius quoque aut ægrum interimit, aut certè non curat, hinc multis Medicis ejus usus maximè suspectus est: summâ igitur cautione hoc remedii genus tam suaderi quàm administrari debet, ne prostituamus hoc nobile remedium. Nam in duobus imprimis fallit calibus:

1. Quando ea nimis tardè adhibeatur: sic enim fit, ut nimis profundè radicato malo, & priùs corruptis aut labefactatis plus minùs à colluvie visceribus internis, ob præterlapsam occasionem malum non cedat. Et sanè magis in ascite, ceu hydrope abdominis particulari, quàm univèrsali & anasarca locum habet.
2. Quando cum hydrope ipso conjunctus est scirrhus, vel aliud vitium singulare visceris cujusdam nobilioris, tunc evacuatur quidem aqua; restitente tamen scaturigine palliativum saltem est remedium; sic enim hydrops semel curatus recrudescit iterum.

His probè observatis, innoxia planè & salutaria evadent hæc operatio: vid. Sylvius *Prax. lib. 1. cap. 17. de Hydr. §. 128. & 129. ac de Affect. Epidem. Leidens. §. 534.*

Præterea juxta abdomen & scroti nimis tumidi, ad naturæ imitationem interdum fit apertio, vel ferro, vel cauterio, atque sic optimè spongiâ admotâ successivè evacuatur aqua. Probè igitur hic observandum, ne, quod facilè evenit, in loco aperturæ gangrænâ concipiat. Labefactatur nempe partium membranarum continentium tonus & spiritus insitigior à contenta colluvie, quæ magis per loca aperturæ jugiter destillans facilè mortificationem inferre potest. Hæc ipsa igitur sedulò præcavenda, defendendo partem circa locum apertum, non communibus Saturninis ac similibus remediis, defensivis dictis, ad inflammationem aliàs usitatis, sed additis in specie balsamicis, resinosis, amaris, ad gangrænâ curam aliàs usitatis: hinc em-

plastro de minio Paracelsi adaptatur emplastrum dia-sulphuris Rulandi. Interim tamen, si gangræna scroti invalescat, ut penitus decidat, aquis successivè evacuatis, postmodum carne quadam testes involvente, & instar pilæ eos continente, scroti defectus sponte naturæ refarcitur: vid. Timæus von Guldens *Klee in cas. pag. 296.* Id quod pariter & in lue Venerea post scroti sphacelum obvenire observavi.

Post scrotum & crura subindè scarificari solent, nempe circa loca carnosâ, & circa furas instituendo scarificationem lenem, ita ut incisiones à se invicem aliquantisper distent, defensiva suprà & infrâ admovendo. Promptè enim levi factâ cutis læsione copiosum serum transudat, linteolo molli citra frictionem abstergendum, vel apposita spongia excipiendum, ac præterea loca vicina propter facilem gangrænâ metum defendenda, nempe fovendo subinde cum  $\nabla$  simplici, aut theiicali aut crocato, & imponenda desuper emplastra balsamica defensiva.

Præterea vesicæ spontaneæ subinde in cruribus se aperiunt, quibus disruptis multa aqua evacuatur, unde iisdem folium brassicæ est applicandum, utpote quod multum seri extrahit. Observatum fuit, quod plantago aquatica contusa, & pedibus nimis tumentibus applicata, vesiculas copiosas satis excitaverit, quæ postmodum apertæ multum aquæ reddidere cum insigni ægri levamine. Ad hujus imitationem quidam vesicatoria locis crurum carnosâ applicant, nempe vel prope furas, vel in parte carnosâ femorum, & humeris; his enim apertis copiosa colluvies evacuatur, & loca ista carnosâ minùs facilè gangrænâ concipiunt, quàm nervosa. Aquam autem intercutem saltem, non intra cavitates collectam, nisi ex abdomine serum ad crura ruat, educunt, ut, præter Riverium observat. à Jacoz *commun. 21.* Willisius testatur; modò sub tali cautela applicentur, ne, quia magnam sæpè post se illuviem ex tota vicinia trahunt, spiritusque enervant, ac calorem partium extinguunt, sphacelum inducant, prout inter alios Septalius *Animadvers. Medicar. lib. 7. §. 56.* Hildanus *cent. 1. obs. 49.* & Sydenham *de hydrope*, animadvertunt: qua de causa non tantum artuum extremitatibus, quàm femoribus & humeris, ac in hydrocephalo, externè pone aures ac in nucha admoveantur. Quod si sponte fiant, optimum est.

Cæterum, quoniam confertim nimis per vesicatoria fit evacuatio, & majus de gangrænâ imminet periculum, potiùs escharotica seu cauteria, vel actualia vel potentialia, circa loca carnosâ applicant, quæ vesicatoriis ideò anteponenda, quod in principio lentè magis operentur, & ratione escharæ contra



gangrænam partes firmiùs muniant: vid. Willisius *l. 4.* His ipsis enim successivè per parvum foramen cum minori gangræne metu fit evacuatio. Quibus tamen pariter serum saltem intercutaneum, minimè quod in cavitatibus fluctuat, educitur, nisi forsan paracenteseos vicem in ventre gerant, aut ex cavitatibus serum ad habitum, v. g. pedes, ruat. Modum applicandi cauteria unà cum defensione crurum à gangræna, optimè refert Willisius *Pharm. Ration. p. 2.* Hisce succedit denique profundior paululum unguium abscissio, in specie in digitis pedum, qui modus tutissimus est; hæc enim occasione successivè quasi aqua transudans & destillans hydropicos deferit, idque sine periculo, potius cum emolumento: videatur Schenckius *in observat. & Sennertus l. 3. Prax. p. 8. f. 2. c. 7.* Remediis chirurgicis quoque accensentur ligaturæ expulsiæ, quales non saltem in tumoribus pedum œdematosi interdum magnæ efficacix observantur, sed Riverius quoque à Fomio *commun. observat. 6.* in hydrocephalo quoque recens nati infantis, sine ullis aliis remediis effectum singularem præstitisse perhibet: sine dubio, quatenus in partibus compressis influxus seri ulterior inhibeatur, ut reliquum ejus vel à venis ac lymphaticis vasis resorbeatur, vel per emunctoria solemnina eliminetur.

Hæc interim dum fiunt, & postquam facta, antecedentis etiam causæ habenda est ratio. Quoad secundam igitur indicationem: In usu sunt alterantia in genere sic dicta, varianda subinde pro causarum remotarum differentiis. Quæ tamen ordinariò ferè locum habent, sunt imprimis Martialia & amara, aliàs epatica & aperientia, calefacientia dicta, humorum visciditatem corrigentia, incidentia: quæ inter excellit absinthium, adeò ut existimem, potissimam hydropis curandi vim sitam esse in Marte & absinthio. Juxta hæc sunt & veronica, ceterach, satureja, scolopendria, cortex fraxini, vincetoxicum, chelidonium majus, rhabarbarum, marrubium, rubia tinctorum, allium, hederæ terrestres, bellis minor, rob juniperi & sambuci, tartarea quævis, lapis ceraunius: quæ omnia eò nobilioris sunt effectus, quo ipsorum usu, vel additorum aliorum ratione, copiosior urinæ fluxus supervenit. Hinc quælibet Martialia aperitiva, pulveres & extracta anticachectica, præsertim cum  $\varphi$ o præparata, aut sociata, tartari Martiales, croci Martis aperitivi, eff. Martis liquidæ & similia, sunt convenientissima, iisdem temporibus cum aliis alterantibus usurpanda, quibus à purgantibus vacamus. Martialia magni ab omnibus in his casibus æstimantur, quatenus non saltem acrimoniam humorum temperant, sed eosdem quoque in fermentationes novas cient, prout Wil-

lisius *de morbis convulsivis c. 11. & Pharm. Ration. part. 2. sect. 2. cap. 5.* docet: sic vinum Martiale hydropicum Cnæffellii videb. *in M. A. N. C. ann. 6. app. pag. 107.* Quò referenda quoque cura hydropis, quæ recensetur in Bartholini *Actis Hassniens. volum. 5. observ. 119.* Solius absinthii usu plures hydropici curati observati fuerunt: vid. *M. A. N. C. ann. 3. obs. 322. & ann. 9. & 10. obs. 18.* Rhodius *cent. 3. observ. 12. & Fehrius de absinthio pag. 116.* Unde quidam coagulant spiritum talis cum sale absinthii, & hoc tanquam  $\Theta$   $\Theta$  sum tertium seu expertum ad hydropem commendant, cum potenter aperiat. Borellus *cent. 2. observat. 53.* decoctum veronicæ laudat. Vincetoxicum à pluribus decantatum specificum est, cujus decoctum per sudorem & urinam specificè hydropicis confert: vid. *M. A. N. C. ann. 1. obs. 57.* Rhabarbarum alterans quoque specificum ad hydropem, ita ut existimem, electuario facto ex rob juniperi cum rhabarbaro multum præstari posse in hydropicis: e. g.

$\mathcal{R}$ . Rob. juniper.  $\mathfrak{z}$ ss.  
 extract.  $\mathcal{O}$ is c. succo pom.  $\mathfrak{z}$ ss. l. 3vj.  
 pulv. rhabarb elect.  $\mathfrak{z}$ ij. l. 3iij.  
 c. cinnam. f. electuarium.

Confirmat Riverius *in Observ. commun.* dum refert, post vomitum sanguinis ortum ascitem per infusionem rhabarbari pro potu ordinario curatum.

Chelidonium majus, item marrubium specifica sunt ad hydropem, præsertim si icterus insequatur. Allium quoque vi alterativa & diuretica hydropicis multum confert.

Ferdinandus essentiam toris marini singulartiter commendat. Rob juniperi & sambuci vi alterativa bilis & sanguinis, diaphoreticæ, ac diureticæ multum valent in hydropicis, adeòque pro corpore electuorum aut aliarum formularum commodè inservire possunt. Ex tartaro  $\mathcal{R}$   $\varphi$ i acris, vel sola, vel in scorbuto cum  $\sim$ u cochleariæ mista, & foliata tartari,  $\mathcal{R}$   $\mathcal{O}$ is  $\varphi$ sa-ta Ludovici,  $\mathcal{R}$   $\mathcal{O}$ li  $\mathcal{O}$ is Zwëlseri,  $\sim$  tartari probè rectificatus,  $\Theta$   $\varphi$ i, & c. polychresta sunt, & tanquam digestiva purgantibus præmittenda optimè conveniunt. Pariter hujus loci erit, quod Marcellus Donatus *hist. mirab. l. 4. c. 21.* refert: quendam hydropicum assiduo labore sine ullis aliis remediis fuisse curatum. Illud de digestivis ac incidentibus adhuc notetur, quod Sylvius sæpiùs inculcat, ut, dum illa assumantur, in lecto se contineat, & ad blandum sudorem corpus disponat æger; sic enim faciliùs præstant, quæ præstare debent: quatenus hac ratione illorum motus ad partem affectam, æque ac operatio in humorem peccantem, notabiliter promovetur.

Ex his variæ fieri possunt formulæ contra hydropem. In principio imprimis nodulus cum  $\Theta$   $\varphi$ i convenit, v. g.

$\mathcal{R}$ . Rad.

℞. Rad. vincetox. ʒiʒ.  
 HB. chelidon. maj.  
 marrub.  
 abſinth. ā Mj.  
 cortic. citri  
 aurant. ā ʒvj.  
 ſem. fraxini,  
 ſeniculi ā ʒiij.  
 bacc. junip. contuſ. ʒiʒ.  
 galang.  
 caryophyll.  
 Zingib. ā ʒj.  
 ☉ ʒiʒvj.

Incif. & contuſ. infund. vino, pro repetitis pro lubitu hauſtibus.

Idem facile poteſt fieri purgans, addendo radicem rhabbari, hellebori nigri, etulæ non præparatæ, &c.

Item ℞. Rob juniper. ʒiʒ.  
 Extr. ſ. c. ſ. p. ʒiij.  
 ʒ rhab. ʒj.

c. ſ. q. ∇ cinnam.

F. Eleſtuarium.

Item fiat vinum chalybeatum ad imitationem Hartmanni: ubi de cachexiis, in quo coquitur abſinthium, rubia tinctorum, carduus benedictus, &c. quod commodè pro potu ordinario uſurpari poteſt.

Seri acrimoniam, quam cauſam interdum eroſionis vaſorum eſſe dixi, corrigunt diverſa diverſitati acrimoniæ reſiſtentia, præprimis tamen lentore notabili notata, v. g. tragacanthum, maſtix, radix cynogloſſæ; & oleaginoſa, ut ſemen violarum, & hyoſcyami, ac nucleorum emulſiones; item terrea & teſtacea, baſamica ſeu vulneraria. Quamvis negandum non ſit, ejuſmodi acrimoniam rariùs in principio ſubeſſe, ſed cum ſero demum evacuato contrahi; aliàs in hydropicis frequentiores viſcerum eroſiones ſorent. Quod ſi verò vaſorum & viſcerum obſtructiones atq; indurationes circulationem ſeri turbent, hinc hydropi occaſionem præbeant, harum medellæ incumbendum per illa, quæ diuretica, diaphoretica & attenuantia ſuperiùs dixi; quamvis parum admodum ſpei in poſteriore caſu ſubeſſe ex prognòſi conſtet.

Tandem etiam fibrarum cutanearum laxitatis & imbecillitatis cura habenda eſt, qualem & per eam hydropem frigida induxiſſe videtur apud Bartholinum *cent. 6 hiſt. 17*. adeòque ſæpè copioſioris ſeri aſſluxus cauſa exiſtit. Scopo huic ſatiſfaciunt nervina ſpirituosa, balnearum, pediluviorum, ſortuum & lituum formæ applicatæ: e. g. in cruribus & lematofiſis optimè applicatur V. ~ vel ∇ articularis, baſamus Anglicus, ∇ vitæ Saxonica, &c. item emplaſtrum de alcalibus Tacchenii *in morbor. Principe. Adſtringentia*, quæ Riverius *obſ. communic. 9. pag. 369*. Marcellus Donatus

*lib. 4. cap. 21.* aliiſque commendant, meritiò reſicio, cum ex pororum occluſione & hinc tranſpirationi inſenſibili impedito, plura mala oriri, imò ipſe hydrops regenerari poſſit.

Denique ſi eroſio atque ruptura vaſorum ſimiliumque organorum ſubſit, conſolidantia ſeu vulneraria propinentur, quatenùs agrimoniam, chærefolium, veronicam, verbenam, vincetoxicum, &c. hydropicis multùm prodeſſe, experientia comprobatur.

De extraordinariis ejus curis, quando per continuam ſitim, vel per eſum halccis ſine omni potu, quale exemplum in *Paraliſipomen.* habet Sennertus *pag. 149.* item quando æger hydropicus rept in furnum piſtorium, ita ut caput ſaltem promineat, nihil ampliùs monco.

Porrò in hydropo duo ſymptomata maxime urgent, nempe difficilis reſpirationis & clamoſa ſitis.

Quoad reſpirationem difficilem: ſuprà ſub puncto anafaræ curandæ dixi convenire vomitum. Interim uſitatum quoque eſt ſperma ceti ā ʒʒ. ad ʒj. in vehiculo fervido vel vino Malvatico uſurpatum.

Quoad verò ſitim clamoſam urgentem, cum nimia potus ingurgitatio noceat, opera detur, ut ſallatur, & palliativè ſiſtatur; quod ſit per maſtichen, ſi nempe grana hujus in ore teneantur, & ſedulò maſticentur; ſic enim blandus ſapor ex iis proleſtus ſitum compediſcit. Quò magis enim abſtemii ſunt à potu hydropici, eò facilùs curantur. Siquidem plura proſtant exempla hydropicorum ſolâ potuſ abſtinentiâ curatorum: vid. Hildanus *cap. 4. obſerv. 41.* Quod ſi verò neceſſe ſit, ut bibat æger, imitemur Rulandum, qui meliore inventionis:

℞. bacc. junip. contuſ. M. ij. l. iij.  
 Decoqu. in ſeri lact. lbvj.

Nitrum optimè purificatum continuò in ore retentum ut liqueſcat, proficuum eſt hydropicis; aut etiam potui eorundem cuique additum ſitim temperat, urinam ciet, & optimè iſdem conſert: ſic quoque radix liquiritiæ cum paſſulis & ſimilibus in ore detineatur, aut aſſumatur, temperando acre ſalium, ſitim excitans, hanc mitigat. Vinum ſeu ſuccus granatorum, aut julepus cum ſucco granatorum temperatus, non immeritiò ab Hartmanno commendatur, vel ſpiritus ſalis dulcis parva in doſi ſubinde propinatus ad ſitim egregius eſt, ſimulque diureticus, item ſpiritus ☉is coagulatus Rhumelii. Acetum aquâ chalybeatâ dilutum, abluendo os uſurpatum, etiam ſitim ſallit. Subinde etiam R. florum bellidis potui additur.

Præter hæc interna etiam clyſmata multis uſibus hydropicis inſerviunt, præſertim cum pectore.

pectoris ac capitis urgent symptomata, utpote serum è valis atque substantia intestinorum ac mesenterii sine totius massæ sanguineæ exagitatione prolicientes, ita ut illâ depletâ serum extravasatum aliquantulum imbibant. Enematum ejusmodi ingredientia sunt hydragoga cum aromaticis mixta, quæ majoris efficaciæ erunt, si in urina decoquantur, v. g.

℞. *Decocti fl. chamom. lbß.*

☐ *hum. ℥iij.*

*el. lenitiv. ℥vj.*

☉ *℞at. tereb. ℥j.*

M. pro clysmate.

℞. *Cortic. interior. frangula*

*sambuci a Mj.*

*HB. absinthii. M. ij.*

*rad. bryon. ℥j.*

*ireos nostrat. rec. ℥vj.*

*baccar. junip.*

*lauri a ℥iij.*

*sem. cumini*

*feniculi a ℥ij.*

Coqu. in f. q. ☐ *a puer. vel ser. lact.*

℞. *Colatura ℥viiij.*

in qua dissolve

*Electuar. hieræ c. agar. ℥ß.*

*vitell. ovor. no. j. l. ij.*

M. f. clysmapro 2. dosibus.

Muriam halecis cum passulis loco clysteris injici potest. Clysmata autem ex urina humana, in specie pueri, perquam sunt egregia, idque in specie, ubi flatus simul adfuerint, quos dispellit urina. Nam rarò sola aqua in hydropo peccat, sed ferè simul ex uligine ista simul flatus generantur exasperantes malum: in quo casu salutari cum successu applicantur clysmata cum & ex urina pueri, in qua modicum fermenti ac semen carminativorum coctum cum melle; vid. Valeriola lib. 1. obs. 2. M. A. N. C. ann. 2. obs. 219. in schol. p. 320. & Sennertus l. 3. Prax. cap. de hydropo quorum ad imitationem

℞. *Sem. anisi*

*fenic. a ℥iij.*

*ferment. comm. ℥ß.*

Coqu. in f. q. ☐ *a pueri:*

*Colatura adde*

*mell. despum. ℥j.*

☉ *℞at. terebinth. ℥ß. M.*

Non immeritò terebinthina hîc commendatur, cum clysteres ex mera urina pueri, in qua aliquid terebinthinæ, & nitri dissolutum fuerit, admodum laudentur à Willisio l. 4. pag. 318. & 321. utpote qualis clyster non talem intestina ad deponendum serum vellicaret, sed hujus etiam aliquam portionem virtute suâ diureticâ ad renes moveret; e. g.

℞. ☐ *a human. lbj.*

*terebinth. Vanetæ c. vitell. ovi solut.*

*℥j. ad ℥iij.*

☉ *depur. ℥iij.*

M. f. Enema, quotidie applicandum.

Præterea externa quoque abdomini asciticorum, ut & scroto tumefacto, vel labiis vulvæ nimis tumentib⁹, & pedibus ipsis inflatis & tumidis, varia applicanda sunt, ut nempe successive resolvatur tumor illorum œdematosus, & ipse liquor contentus attenuatus, partim insensibiliter, partim sensibiliter, discuti queat, nunc per fomenta, nunc cataplasmata, nunc sacculos interpassatos in vino vel lixivio. In leviori malo herba chelidonii majoris aut etiam Geranii Robertiani, contusæ, plantis pedum applicantur. Singulare quid obtinet radix bardanæ, vel folia recentia contusa plantis pedum alligata. Petroselinum recens contusum & scroto applicatum etiam conducere observatum. Externa hæc scroto, abdomini & pedibus applicanda, in genere sunt in duplici differentia: nempe vel aromatica attenuantia & discutientia, vel salina nitrosa dissolventia: aromatica discutientia sunt folia & flores sambuci, folia ebuli, folia & semen chamomillæ, folia lauri, menthæ, origanum, absinthium, radix & succus cucumeris alinini, radix bryoniæ, asari, baccæ lauri, & juniperi, semina milii, carminativa calida minora & similia: in specie chelidonium majus, quod ipsum in tumoribus pedum œdematosi, supervenientibus morbis chronicis aut acutis, ac etiam ex errore dietæ, aut dyscrasia bilis subortis, plantis pedum applicatum eisdem solet resolvere & insigniter minuere. Nam furfures, & furfuribus decoctis parati sacculi, unâ cum pulvere cumini, ventri applicati, admodum commendantur à Stœckero in Praxi. Omnium optima sunt stercora animalium pro externa emplastratione, quæ ratione Ætis Æoli miram vim obtinent discutiendi insensibiliter hydropicorum colluviæ, in specie stercus caprillum, hinc columbinum & bubulum. Stercus humanum quidem aliàs præferunt: sed applicatum nimis ferit nares. Sanè stercus caprillum contusum prius, vel columbinum, bulliat cum ∇ simplici vel calcis vivæ, probè subactum instar cataplasmatidis liquidi applicetur: item stercus bubulum subactum cum pulvere cumini cum successu applicatur: fortius est stercus caprillum cum urina humana subactum, & cataplasmatidis instar abdomini instratum, aut pedibus aut scroto applicatum mirificè tumorem discutit: aut quoque stercus vaccinum aut equinum cum farina hordei mistū, cui ✕ addatur, invicem subacta sub forma cataplasmatidis, præsertim ibi conveniet, ubi inflammatio, quam discutit, imminet. Inter salina convenit sacculus ex cineribus ac sale tosto paratus: vid. Sylvius de hydr. §. 125. cum urinis puerorum facta ex vegetabilibus cataplasmata insigniter commendantur. Præ reliquis aqua calcis vivæ seu benedicta chirurgorum



gorum ſingulariter in tumoribus ſeroſis diſcutiendis, vel ſolitaria, vel imprægnata V, ſpongiâ vel linteo applicata crebrius, & quidem calidè ſcroto vel toti abdomini inſternitur. In ſpecie ſi immineat pedibus œdematoſis gangræna, quod ipſum ex maculis conſtat, hæc ∇ erit convenientiſſima, tam quod diſſolvat tumores, tam quod à gangræna præſervet. Cum ∇ hæc ergò reliqua jam dicta in cataplaſmatis formam coqui, & ita imponi poſſunt: c. g.

℞. *Fol. ſambuci.*  
*fl. chamom.* a Mj. l. ij.  
*ſterc. caprill. contuſ.* lbjſ. ad lbj.  
*rad. bryon. rec.* ʒijſ. ad ʒij.  
Coq. in f. q. ∇ l. ☐a pueror. ad conſiſtent. cataplaſmatis: S.

*Zertheilender Bren.*

Applicetur abdomini vel ſcroto.

Cataplaſma expertum ex radice cucumeriſalini cum pulvere cumini commendat Riverius c. 1. *obſerv.* 70. & *Prax. lib.* 2. *cap.* 6. Spectat huc cataplaſma ex ramentis coriariorum recenter ex calce viva paratorum, quod Riverius *de morbis infrequentibus obſerv.* 33. commendat: item cataplaſma ex ſtercore bovino, ſulphure, ſemine cumini & urina; aut ex raphano contuſis; vel quod Riverius *Prax. l.* 2. *cap.* 6. deſcribit, cuiusque efficaciam *cent.* 1. *obſ.* 70. & *cent.* 2. *obſ.* 90. confirmat.

Præceteris ſingulare quid obtinent contra tumores ſcroti & pedum cochleæ recentes, cum ſuis teſtis contuſæ, & ventri hydropicorum ac ſcroto tumentis ad modum cataplaſmatis applicatæ: quæ ſi ſiccæ fuerint, aliæ rursus imponendæ. Hinc plures parant cataplaſma ex cochleis cum teſtis contuſis, adſperſo pulvere ſtercoris caprilli & ſeminis carvi; aut

℞. *flor. chamom.* M. ij.  
*farin. fabar.* ʒvj.  
*cochl. c. teſtis contuſ.* ʒiv.  
*ſterc. caprill.* ʒij.  
*pulver. ſem. cumini l. carvi* ʒj.  
Coquantur in  
∇ ſimpl.  
+ i a part. æqual.  
(vel ∇ a part. iv. & + i part. j.  
vel etiam in ſola ∇)

Pro cataplaſmate:

D. S. ut ſuprà:

Et applicentur in exceſſivo tumore pedum, vel ſcroto tumente.

℞. *cochl. c. ſuis teſtis contuſ.* lbj.  
*pulv. ſem. carvi* ʒij.  
*ſterc. caprilli* ʒj.

M. pro cataplaſmate. S.

*Zertheilender Umſchlag.*

Quod tepidè imponendum eſt in reſolventis tumoribus ſeroſis, in hydrope tam univer-

Tom. II.

ſali quàm particulari. Et ſanè huiusmodi cochleas vel limaces cum teſtis contritas & applicatas abdomini, ceu ſecretum ſingulare commendat Petrus à Caſtro, quo ipſe etiam uſus fuit in cura hydrocephali. Item:

℞. *bacc. juniperi* part. jv.  
*lauri* part. ij.

Pulveritata & melle excepta inſternantur abdomini; quo curatus fuit hydropicus, qui ex nimio V abuſu hydropem contraxerat: cujus loco cataplaſma ex foliis rutæ & abſinthii ana cum melle ſubactis, abdomini applicari poteſt.

Quibus moleſta forent hæc cataplaſmata, illi uſurpent inunctiones per olea aromatica, quæ ſimul etiam urinam movent, prout exemplum à Willifio *l. c.* 5. de inunctione olei ſcorpionum anafarcâ laborantis, & per diureſin ſanati, teſtatur: qualia ſunt v. g. linimenta ex oleo laurino, ſambuci, anethi, ſcorpionum ſimplici & composito, in ſpecie buſonum, & deſtillati juniperi, carvi, roriſmarini, & ſimilibus: cum quibus unguentum Agrippæ, vel de artanita, vel Martiatum, vel emplaſtrum de baccis lauri, hydropicum Auguſtan. vel diaphoreticum Mynſichtii & ſimilia malaxentur, & ita locis tumidis inſternantur. Item unguenta ex ſulphure & calce viva cum vegetabilium acrium extractis mucilaginoſis: hinc v. g. unguentum de calce viva Auguſtan. & unguentum, quod Riverius *cent.* 2. *obſ.* 97. deſcribit, conveniunt:

℞. *o. de cappar.*  
*samarisc.* a ʒij.  
*succ. ebul.*  
*cucum. agreſt.* a ʒijſ.  
Bulliant ad ſuccorum conſumptionem.  
Colaturæ adde  
*ſem. agni caſti*  
*petroſ.*  
*macis pulveriſ. ſubtiliſſimè* a ʒjſ.  
*o. nucis* ʒjſ.  
*cera* q. ſ.  
M. f. Linimentum.

Quo illinatur totus venter calidè in introitu lecti. Aliàs etiam locum invenit inunctio partium tumentium cum ſpiritu vini, vel ſimplici, vel juniperino, addendo parum de oleo carvi.

Alii olea buſonum, ſcorpionum, juniperi, laurinum ana, ſimiliter abdomini illinunt,

Vel ℞. *Unguent. de artanit.* ʒj.  
*Agrippæ*  
*dialthea* a ʒjſ.  
*o. ſcorpion. ſ.* ʒij.  
*chamom.*  
*aneth.* a ʒjſ.  
M. t. unguentum.

Crebrò tepidè abdomini illinendum: S.

*Zertheilende Salbe.*

(Kkk)

℞. Vm

4. *Unguent. de artanita* ℥j.

*agrippa* ℥℔.

℞ *scorpion. f.* ℥℔.

*destillat. bufon.* ℥iij.

M. invicem & illinantur abdomini.

Balnea à quibusdam commendantur: sed vix, nisi in anasarca, locum habent.

Quod si gangræna aut ulcera pedum vel scroti in hydropicis adsint, topica pro his selecta vid. in M. A. N. C. *ann.* 6. & 7. *Append. pag.* 110.

De curis magneticis ad hydropem usitatis, nempe dum vesica suilla urinâ ægri impletur, in fumo suspendenda; vel dum sanguis ægri putamini ovi includitur, &c. nil attinet dicere. Item, dum rasura unguum manuum ac pedum cum sindone rubra & vivo in dorso alligantur, & ita in aquam fluentem projiciuntur.

## ARTICULUS IV.

De

*Ictero flavo, nigro, & albo.*

**I**cterus seu morbus arquatus totius corporis cachexia, partibus solidis flavedinem inducens, urinam obscuriore rubedine tingens, ut plurimum cum cardialgia, dolore hypochondriorum, præprimis dextri, torminibus ventris, alvi segnitie, interdum diarrhœa biliosa ac lassitudine membrorum, item lipothymia conjuncta, est multiplex, ejusque tot sunt species, quot colores in corpore efflorescentes observantur: nempe datur icterus niger, plumbeus, viridis, qualem Petrus Faber *Cur.* 28. & 71. *pag.* 344. §. 6. recenset. Licet autem varii sunt quoad colorem, in radice tamen omnes conveniunt, & sunt unus idemque morbus, ac saltem graduali causæ morbosæ differentiâ à se invicem distinguuntur. Quando ægri colore flavo, in corporis peripheria efflorescente, tincti observantur, vocatur icterus flavus: quod si flavedo ista nunc ad viriditatem, nunc ad cœruleitatem, nunc obscurum livorem inclinet, icterus niger vocari solet.

Quoad historiam affectus hujus: icterus præsens quidem se facillimè manifestat, imminens verò difficulter à priori cognoscitur. Aliàs omnes icterici, præsertim primarii, de dolore compressivo præcordiorum & stomachi, interdum vix tolerabili, miserè conqueruntur: vid. M. A. N. C. *ann.* 4. & 5. *obs.* 99. *p.* 102. item *ann.* 6. *p.* 302. quas præcordiorum inenarrabiles angustias icterus ferè comitari solet, licet cor planè sit innocens: hinc supervenit fastidium ac nausea alimentorum; subinde cephalalgia admodum intensæ, vertigines & scotomix conjunguntur, ita ut ægro syncope & lipothymia immineat. Adest præterea lassitudo totius corporis & omnium membrorum, sæpiùs dolores gravativi in re-

gione lumbari: subinde difficiles admodum respirationes anxietatibus istis præcordiorum junguntur, ita ut spiritus defectu vix verbum proferre queant; urina imprimis icterum flavum manifestat, non quod lutea appareat, sed potius, ut vocat Zacut. Lusitanus, passæa, i. e. crassè tincta, rutilante colore, obscura, crassa, opaca, magis magisque rubicunda, cui linteam candidum immersum flavissimo colore, tanquam si croco tinctum esset, imprægnatum extrahitur, quod si subsederint, sedimentum quasi argillaceum seponunt; interdum ex viridi nigricantes observantur urinæ. Hinc successivè habitus corporis mutatur, & primariò in oculorum albo solet vel flavedo vel nigredo apparere; cujus rei ratio nulla est, quàm quod album oculi sit rete mirabile, ex variis minutissimis arteriis intertextum, per quæ vasa distributum contentum flavum istud sensibilibus magis tingit, cum minùs sit coloratum. Jam ergò cum tanta recrementa in massa sanguinea contineantur, fit, ut successivè vitiatus color emergat, donec magis magisque corpus tingatur, quæ Radeò intensa observata fuit, ut linteamina sudor prorumpens colore flavo intecerit. Sapor ut plurimum, idque in confirmatis, amaricans, aut etiam varius in ore percipitur, ex lymphâ corrupta, cui ferè semper sitis clamosa jungitur, unde & cerevisiam horrent ægri, alium appetentes potum. Imò ictero cum febre conjuncto alvus nunc est fluida, nunc diarrhœa quasi biliosa est juncta; sicut talem etiam observavi in puero, feces tinctas excernente, nunc è contrà pertinaciter clausa, & quæ nullis purgantibus reserari potest, excrementis tandem prodeuntibus albicantibus; idque contingere solet, quando ductus fellei in intestinum hiantes undecunque sunt obstructi, & sic quasi fluxus cœliacus affligit. Febris interdum juncta est, interdum penitus abest, interdum adest ante icterum, cui quidem icterus supervenit; nunc criticè, prægressis signis coctionis diebus criticis obveniens, nunc symptomaticè sine coctionis signis prorumpens, per se tamen icterus sine febrili insultu solet emergere; nunc cum ictero simul advenit febricula levis, orta ex fermentatione sanguinis aucta, quæ præcipitantur feces massæ sanguineæ. In quibusdam dolor in hypochondrio dextro obtusus in profundo percipitur; subinde facilè curatur, subinde autem est nimis contumax, aut semel curatus facillimè recidivans; quo in casu sæpiùs calculi in vesica fellea observati fuerunt.

Icterus nunc est morbus primarius, nunc morbus secundarius. Hic, quando vel febris supervenit, idque tam continuus, quàm intermittentibus chronicis, sive sit criticus, post prægressa coctionis in urina signa die judicatorio superveniens, sive sit symptomaticus,

ticus, vel quando à nonnullis venenis assumptis, & imprimis à morfu animalium venenatorum, icterus oritur. Exempla nonnulla curiosa refert Marcellus Donatus in *Hist. Med. Mirabil.* l. 1. c. 7. & post morfum araneorum irritatarum icterum flavum observavit Joël in *Praxi* p. 126. ex viperæ morfu suboriri ordinario terè icterum jam Veteres annotarunt: sicut Zacutus Lusitanus l. 5. *Medic. Princ. hist.* 29. refert: nec tantum viperæ, sed & canis rabidi morfu ortus fuit icterus contumacissimus: icterum lethalem à manducatione seminis staphisagriæ notat Loffius in *obs.* l. 3. *obs.* 38. p. 259. Vel denique affectus convulsivos intestinorum, præsertim tenuium, sequitur: sic à patru laborioso subinde observatur superveniens icterus: passioni hysteriæ quoque sæpius in muliere quadam supervenire vidi: colicis torminibus subinde icterus supervenit: quò pertinet, quod refert Bartholinus *cent.* 5. *hist.* 62. Icterum provocatum per medicamentum sudoriferum in colica assumptum: sic icterum vulnerato capiti supervenientem die 4. notat Hæchstetterus *Dec.* 8. p. 198. Nempe sicuti vulneribus capitis gravioribus tertiâ die aut etiam quartâ vomitus biliosus supervenire solet; ita & consensûs istius ratione etiam icterus.

Quoad icterum primarium; causæ remotæ sunt variæ: non ultimum locum obtinet tristitia, quæ nunc inchoat, nunc fovet icterum, teste Helmontio *Tract. Sextuplex Digest.* §. 56. sic icterum curatum à tristi nuncio recidivantem referunt Bartholini *Act. Med. Hassniens.* vol. 3. p. 82. Iracundia etiam non raro icterum provocat; nempe Riverius *cent.* 2. *obs.* 9. icterum mirandum in gravida ex ira refert, in qua feces alvi erant biliosæ, & in lecto exiguum, extra illam intensam patiebatur flavedinem. Obstructiones ductus choledochi subinde in ictericis observatæ fuerunt. Ac sanè in pluribus ictericis vel bilis viscida, amurcæ similis, vel calculi plures vel pauciores, majores vel minores in cysti fuerunt inventi: vid. Bartholini *Acta Med. Hassniens.* vol. 3. pag. 59. & Panarollus *Pent.* 5. *obs.* 27. & *observ.* 22. Deodatus in *Valet.* pag. 250. refert icterum lethalem cum pruriginosa lallitudine, & vagis hinc inde erumpentibus tuberculis: In cadavere 3. lapilli in vesica fellea reperti fuerunt, pariter ac Timæus von Guldenslee in *Cas.* pag. 144. icteritiam post arthritidem diuturnam, superveniente hydrope lethalem, ex calculo magno in vesicula fellea notat. Ac sanè ad icterum proni sunt calculosi, ut observationes Practicorum testantur. Vid. le Rhyne de *Ict. Med.* pag. 222. & M. A. N. C. *ann.* 2. *observat.* 189. pag. 164.

Dividitur aliàs icterus in flavum (qui viri-  
Tom. II.

descens interdum) & in nigrum, quem communiter vitio lienis fieri contendunt, & ab humore melancholico derivant: sed hoc tantum ex Veterum præconcepra opinione & hypothese de 4. humoribus in massa sanguinea contentis oritur. Nam dixerunt: sicut sanguis corpori dat floridum colorem, & suaviter rubicundum; pituita verò habitum cachecticum: ita necessariò bilis vitiosa icterum flavum, & humor melancholicus vitiosus icterum nigrum inducat: hinc usque præsuppositum falsum præter alias, quas dedit turbas, tanquam antecedens falsum & alia consequentia falsa produxit. Nam quia bilis in folliculo felleo ex hepate seu excrementum colligitur, è folliculo hoc obstructo, aut ductibus felleis infarctis, saltem icteros flavos fieri voluerunt, quoniam nempe, uti dixi, bilem tanquam excrementum per hepar transcolandum non ritè per vasa choledocha expurgari crediderunt. Et quia lien fuit statutus bursa humoris melancholici, ob id necessariò in liene saltem icteri nigri fontem quæriverunt, quod nempe hic ipse non sufficienter separaret ac expurgeret scorias sic dictas melancholicas, quin potius hæ ipsæ in massa sanguinea congestæ ab ejus facultate expultrice, tanquam è matula furiosè ad habitum corporis deponatur & detrudatur. Hæc autem hypothesis refellitur partim modernorum theoriâ, partim experienciâ, ac ex suprâ annotatis manifestum est: icterum, in specie flavum, sæpius oriri citra impeditum bilis motum ad intestina, aut citra insufficientem secretionem ex hepate, sicut etiam Riverius *cent.* 2. *obs.* 9. observavit, sed etiam post febres, mentes suppressos, & ferarum morsus natus icterus flavus sine obstructione tali observatur. Nec à copia & abundantia bilis propter defectum excretionis oriri potest icterus; sequeretur enim, eandem debere curari per medicamenta bilem præcipitantia & corrigentia, ut acida: contrarium tamen testatur praxis.

Nigrum icterum quod attinet: hunc non oriri ex obstructo aut affecto liene, patet inter alia ex eo, quod icterus flavus diuturnior semper in icterum nigrum degeneret, unde & nigrum essentialiter non differre à flavo, asserit Willisius de *urinâ* pag. 355. & humores biliosos aut bili analogos icterum nigrum producere probabile fit, quatenus sc. ab acido p. n. interdum in primis viis effuso, frequentius in massa sanguinea abundante, illorum flavedo in virorem, modò pallidiorem, modò obscuriorem, nigredinis æmulum, mutatur, & mediante hoc color partium naturalis vitatur. Biliosos siquidem humores materiam quasi primam huic producto morbozo suppeditare constat ex eo, quod Platerus l. 3. *obs.* 575. observavit icterum nigrum,

(Kkk 2)



nigrum, in quo excrementa alvi minùs naturaliter tineta, sed omninò alba apparuerunt, in quo tamen hepatis potiùs ac valorum choledochorum, quàm lienis vitium subesse videbatur, hinc *Pr. Tom. 3. pag. 96.* eundem à bile intra vesiculam coacervata deducat. Unde probabile fit: icterum nigrum quandoque vitio epatis generari, modò si biliosæ moleculæ à sanguine intra epar non secernantur: sive hoc fiat in vitio hepatis, aut valorum angustia; sicut in ictero nigro laborantibus epar aliquando scirrhum Vesalius *l. 5. c. 15. & M. A. N. C. ann. 1. obs. 87.* testentur: sive vitio lienis, materiam bilis ad secessum non ritè disponentis, utpote à cuius aberrationibus similiter interdum icterum nigrum contingere asserunt Forestus *l. 19. c. 20. & ex obs. Fabricii ab Aquapendente & Bonetto Sepulchr pag. 1007.* nunc vitio ventriculi atque ejusmodi fuscum producentis, vid. Walæus *Prax c. 8.* nunc vitio bilis crassioris & fuscæ magis, intra vasa biliaria congestæ: vid. Platerus *obs. pag. 612.* Acidus autem humores ejusmodi colorem aruginosum atque porraceum bili inducere, multa modernorum experimenta confirmant. Accedit, quod fatente eodem Platero, nec in liene, nec in alia corporis parte, atratus ejusmodi latex melancholiæ Veterum æquiparandus observetur: Item quod Thonerus *obs. l. 3. pag. 154.* in ictero nigro laborante oris amarorem biliosum testetur: sic quoque rectè notat Lindanus, se in Frisia multos curasse, ob lactis usum copiosum & casei, scirrhus ac similes tumores duros lienis habentes, in quibus tamen nunquam vel minimum icteri nigri observasset vestigium. Interim tamen quoad bilem & vasa fellea, & inde oriundum icterum, non adeò omnia sunt plana. Suprà dictum fuit: icterum sæpiùs observari, dum lapides folliculum felleum replent: verùm non semper sequitur icterus hos lapides. Memini enim ante plures annos dissectam hinc fuisse mulierem capite mulctatam, quæ in folliculo fellis copiosos lapides majores & minores collegerat, sine tamen icteri vestigio, nec unquam illum passa erat: & eodem ferè tempore dissectimus corpus masculinum, in quo principium erat anasarca; erat enim subrumidum, & aperta ejus cuticula cum cultello copiosum serum effluebat, in cujus folliculo felleo ne gutta bilis inveniebatur, in quo tamen nullum icteri vestigium: sic canibus folliculum felleum posse excindi sine vitæ aut sanitatis incommodo, notum est; sicuti per literas nuperrimè mihi communicatum fuit ab amico, in Universitate Batavo-Lugdunensi quendam Medicinæ candidatum ante 3. menses cani totum excuisse folliculum felleum, & abdomen denuò consuisse, qui

ipse adhuc vivens omnes operationes perficiat sine omni incommodo. Egregium experimentum, quod adhuc potest dare occasionem meditandi ulterius de usu folliculi fellis. Sed moneo, quod porus choledochus & reliqui fuerint adhuc salvi & integri. Quo supposito, nihilominus cum veteribus conciliare licebit recentiores, ita ut his biliosos equidem humores in ictero nigro concedamus, non tamen, nisi ab acido, quod Veteres melancholiam vocabant, immutatos & præcipitados, adeoque & lienem suo modo ad icterum nigrum producendum interdum concurrere statuentes: Confer. Fernelius *lib. 19 obs. 20. & 23.*

Hinc ita prae nullis ad causam proximam propius accedamus, quæ est serum nutritium flavedine præternaturali imbutum, adeoque corruptum: cujus corruptionis triplicem causam concipere licet: aliam nempe in ventriculo, aliam in vasis biliaris, & aliam in massa sanguinea.

Ut ergò jam potiùs ad scopum accedamus, notum est, secretionem fecum alvinarum in intestinis fieri per concursum bilis & succi pancreatici; qui duo succi per modum præcipitationis separant à nutritio chymo alvi excrementa, & simul certo modo alterant chylum ad futuram promptiorem sanguificationem; Si ergò ritè fiat chyli digestio in stomacho, & ejus præcipitatio in duodeno, & consequenter perfecta hæmatosis, rubicundo florido sanguine conspersum corpus viger, dum utilis chymus suggeritur massæ sanguineæ, per quem eadem in continuo flore conservatur, cæteris tamen paribus; simul ac verò hæc ipsa secretio vitætur, necessariò chylus corrumpitur, qui massæ sanguineæ permiscetur, & inquinatur variis recrementis: quæ ipsæ particule excrementitiæ variis salibus imprægnatæ minùs erunt unibiles cum toto liquore, unde necessariò sanguinis mistura ejusque crasis vitiabitur, & in varias ac insignes dycrasias eadem degenerabit pro varietate læsæ separationis fecum à chylo, & hinc natorum variorum excrementorum sanguini permistorum.

Jam verò uti liquor bilis ceu liquor balsamicus naturaliter in intestinis tingit chylum (utut invisibiliter propter acidum pancreatis) sulphure suo rubicundo, ut promptiùs sanguificari possit; & juxta hanc Ram sanguinis simul chylum balsamico suo sulphure tingit & præservat, quò minùs corruptioni, verminationi & putredini sublit; & tertio cum succo pancreatico eadem conjunctim chylum utilem separat ab excrementis alvinis: ita necesse erit, ut his duobus succis vitiatis, in specie bile insigniter depravatâ, excrementa heterogenea & copiosa in massa sanguinea colligantur, & dum

& dum à bile depravatâ vitiosè sunt tincta, exinde etiam massam sanguineam varios colores, nigrum vel ex nigro viridescens vel flavescens acquirat, idque pro varietate concretionum, præcipationum, ac separationum, quæ serò imbibitæ hinc ad extimam partium solidarum superficiem deponuntur. Ceterum ut à posteriori incipiam, separatio hæc recrementorum fit nunc cum, nunc sine effervescencia febrili, & hinc icterus nunc per semorbum constituit; sive ea jam ab extra sanguini infundantur, sive vitio digestionis primæ eidem communicentur. Utrôque autem modò mediante sero in extimam superficiem partium solidarum deponuntur, tam externarum quàm internarum, cujus rei historiam videbitis in Zicuto Lusitano *hisor.* 3. *Prax. Admir. obs.* 56. qui in icterico mortuo non extimum saltem corporis habitum, sed etiam interiora viscera flava deprehendit: sicut similiter Hildanus fœtum ab ictericia matre editum quoque ictericum vidit. Quod autem impuritates istæ magis ad cutem deponantur, ratio est, quia ibidem sunt glandulæ miliares minimæ copiosæ, quæ imbibentes serum simul cum eo excrementa imbibunt.

Jam ergo ubi massa sanguinea in corpore vivo tam variis sctoris excrementitiis & salibus ex vitata in intestinis separatione, est turgida, necessariò factâ istâ separatione & præcipatione excrementorum varii & novi colores, quos antea non habebant, exinde emergunt, eadem ratione atque ars imitatrix naturæ ex diversa præcipatione diversis coloribus liquores tingere & pingere solet, dum antea permixta inconspicua, jam præcipitata, & aliquantisper separata reddit conspicua, adeoque ex diversa luminis refractione colorata.

His præmissis, in specie tres occasiones illas ad icterum disponentes evolvemus: quarum prima latet in stomacho, nempe in hujus corruptione, aut si assumpta in liquamen flavum amaricans degenerant. Ventriculum interdum solum cruditates felli æmulas loco chyli laudabilis producere inde constat, quod non tantum ejusmodi biliosa sub dyscrasia ventriculi vomitu aliquando rejiciantur, sed sæpè mox à commissis diætæ erroribus icterus cum appetitu prostrato & præcordiorum angustia observetur: c. g. à potu frigido, item à deglutito nicotianæ fumo, vid. Borellus *Cent.* 4. *observ.* 81. & à Saturni devoratione, vid. Fernelius *de Cur. luis Venereæ cap.* 7. & quadrat huc Horstii *observ.* 36. *lib.* 4. recidivæ in icterum &

febrem ab immodico pomorum & castanearum esu: item hujus loci videtur icterus, quem Riverius *Cent.* 2. *observ.* 9. præter rationem epati accenso attribuit, ita ut fel in ictericis omnibus per manifestas æquè ac ignotas vias ex folliculo suo ad ventriculum deferri Coiter *observ. Anatom. Chirurg. pag.* 222. suspicetur, & maximam partem in hoc productum videatur. Jam verò in omnibus ictericis, paucissimis casibus exceptis, observatur urgere primariò symptomata ventriculi circa digestionem, & ægri circa istud negotium ordinariò vitium quoddam sentiunt; imo, si juvantia consideramus, post vomitoria præmissa, Martialia, & hinc amara, totam absolvunt paginam: adeoque in omni ictero acidum austerum in primis viis activè peccare observatur. Saltem dubium est: an hujus occasione secundum Helmontii hypothesin ex vitio digestionis primæ, indeque natis scoris nidorolis plus minus flavescens, plus minus amaricantibus, in massa sanguinea distributis & in peripheriam corporis diffusis, icterus oriatur? an vero præfactum vitiosum fermentum, acidum, austerum, bilem inquinando, & hinc ejusdem secretionem debitam in hepate impediendo icterum inferat? Sanè quod ex digestionis primæ vitio, & inde cruditate nidorosa, generentur loco chyli amara recrementa, aut dulcia, flava, & sic porro, docent vomitus flavescens matutini post crapulam: quæ non dependent à bile, cum hæc non nisi in vehementiori vomitu reddatur; sed sunt reverà ex stomacho, tunc nempe per pylorum non rectè fuerunt transmissa, sed retenta, adeoque corrupta. Confirmant quoque excreta copiosa flava ab infantibus reddita, quæ ipsa nil aliud sunt, quàm lac in stomacho, & hinc in intestinis corruptum, quæ similiter non sunt derivanda à bile, quia non sunt amara, sed quia à catellis appetuntur, ideò potius dulcia sunt. Ad hæc fructus horæ, cucumeres, &c. pingua, pisces, &c. in stomacho nidore corrupti similes sordes suggerunt, unde chylus ejusmodi in stomacho corruptus, nec ritè in duodeno perfectus, sed vitiosè à bile & succo pancreatico alteratus, adeoque ad massam sanguineam adductus, necessariò eam corrumpit, & variis præcipationibus & separationibus demum istos colores & ras acquirit, & sic icterum constituit. Quid igitur obstat, quò minus occasione talis fermenti austeri, dolores stomachi aut præcordiorum inferentis, vitietur digestio prima, & inde geniti sordes nidorosi in corpus distributi, icterum inferant? Et sic est intelligenda illa allegati Helmontii sententia, ubi icterum ex hac causa

natum graphicè delineat: in hoc saltem ipse hallucinatur, quod omnem icterum hoc modo gignistatuat, quod tamen veritati minime responderet. Existimo sanè, omnem icterum, qui supervenit febribus, non bilis aut folliculi fellei vitio, sed diætæ, & digestionis primæ vitiatæ occasione supervenire; non secus ac istum, qui post venæsectionis abusum crebrius nasci observatur.

Juxta hunc tamen icterum, eumque frequentissimum, etiam secundò oritur icterus à vario modo corruptis succis, felleo & pancreatico, chylum non perficientibus, nec tingentibus, nec debitè à fecibus alvinis in intestinis secernentibus, unde denique massa sanguinea tota vitiosa redditur. Vasorum enim biliariorum obstructione, compressione, aut quavis obturatione, bilem naturalem, (cùm modo dictus icterus ex vitio bilis vitellinæ p. n. in stomacho genitæ oriri, ex jam dictis patet) istam nempe, quæ in hepate secernenda, & per vasa cholodocha excernenda venit, ad massam sanguineam regurgitare, quotidiana docet, experientia. Hæc enim vel vitiata, vel in debita distributione impedita, icterum infert; illa, causa frequentior, graviolem dat icterum; hæc, rarior, leviolem inducit. Bilem vitiatam quod attinet, occurrit ejus inertia, seu deficiens acrimonia salina. Iners verò redditur vel à modo dicto vitioso acido austero primarum viarum, quod imprimis bilis activitatem infringere, vitiare, texturam ejus immutare, ac plus minus inspissare valet, cùm, ut supra monitum, in graviore ac pertinaciori ictero spissior ac tenacior bilis subinde inventa fuerit. Acidum hoc vitiabit bilem, aut dum in hepate est generanda aut secernenda, aut eandem in folliculo felleo jam secretam non solum inficiet, hebetabit, increpabit, & simul ejus sal volatile oleosum in calculos degenerando coagulabit; sed etiam, ejusdem vitiabit, istudque ineptum reddet pro tinctura chylo legitimè communicanda: quibus occasionibus nec debitè excerni poterit; quin facile ex mutata consistentia ductus cholodochus obstruere, & ita transitum sibi ipsi intercludere poterit. Hinc in quibus copiosi calculi in folliculo fellis reperti fuerunt, imprimis ictero obnoxii deprehensi sunt, de quo vid. Panarollus *Pent. 5. obs. 22.* Vel quoque quando bilis est nimis serosa vel aquosa, ac nimis pinguis, & in specie nimis oleosa, ita ut oleositas fixa obtundat ejus sal volatile acre balsamicum primæ digestionis correctivum. Ac hinc est, quod ex abusu V icterum obortum observavit Sylvius; sicuti ex abusu pinguium simile ego notavi. His ergò modis bile labefactatâ fit, ut eadem non sufficiat perficiendo chylo, eundem à fecibus separando, & tingendo pro futura sanguificatione;

unde chylus non ritè separatus vitio bilis, nec ritè ab eadem tinctus necessariò inquinabit massam sanguineam, ejusque consistentiæ inducet crasim vitiatam. Deficit quoque bilis, quando vel planè non generatur, vel non defertur ad intestina. Hoc declarant obstructiones in ductu cholodochi repertæ; sicuti & excrementa tunc temporis alba, glutinosa, chylosa & vitiosa, defectum bilis: non delatæ ad intestina, sufficienter confirmant; quin imò in talibus sæpius lumbrici generantur, propter defectum condituræ balsamicæ bilis, unde & in tali ictero dolores colici percipiuntur ob acidum tunc temporis abundans, ubi vulgò quidè dicunt, esse colicam biliosam, sed malè; potiùs enim est ex acido non temperato à bile: Et anatome detexit, fuisse in talibus omnem transitum in intestinis præclusum.

Causa verò, ob quam obstruitur folliculus felleus, est, quando bilis debitâ acrimoniâ caret: quod si enim eadem eam debitam habeat, quascunque obstructiones removeret, ac ferè impossibile est, supervenire ductus cholodochi obstructionem, quamdiu ipsa naturaliter constituta est. Unde denique ex sola distributione bilis læsa, & inde genita cum sanguine commistione, oritur icterus, quando calculi meatus obstruunt, aut quando aliunde quavis ex causa ductus hepatici communes obstruuntur; vel quando occasione partium vicinarum, e. g. intestinorum tenuium, ac speciatim duodeni, convulsionum, vasa biliaria in consensum trahentium, ac eorum motum peristalticum invertentium, in specie orificium ductus fellei constringentium & condensantium, icterus oritur: cujus exempla in partu laborioso, passione hysterica, &c. *suprà* annotata fuerunt. Nempe non rarum est, in ictero alvi excrementa hodiè pallida, cras denuò flavedine tincta conspici, & ita subinde evacuari, non, quod nunc obstruatur, nunc denuò referetur ductus, sed quod occasione spasmus intestinalis nunc constringatur idem, nunc denuò aperiatur, idque diversimodè pro occasionum varietate. Sic Hæchstedterus *Dec. 8. obs. 3.* ac Marcellus Donatus *hist. mir. l. 1. vulneri capitis*, Bartholinus *Cent. 6. hist. 85. vulneri ventriculi sclopeti globulo inflicto*, & *C. 5. hist. 62.* & Rhodius *C. 3. obs. 19.* ac Forestus, *l. 19. c. 17.* Colicæ ac iliacæ passioni icterum supervenisse testantur, & à vomitu nimio mihi observari, nec non à partu difficili, contigit. Atque hoc quidem vasa biliaria arctata, tam radicalia quàm distributoria, præstant, quod bilem secretam aut non admittant, aut non emittant; utrâque verò ratione ad massam sanguineam illam remeare faciant, hinc intestinorum contentis tincturam naturalem subtrahant.

Ex di-



Ex dicto igitur acido fermento vitioso primarum viarum, & bile, vel ex nidore p.n. genita, vel bile hepatis naturali, eâque aut viata, aut saltim malè distributa, omnis ictericorum varietas in colore, ac differentia in symptomatibus deducenda, nempe, prout ab acido præfato in textura diversimodè mutabitur bilis, qualiscunque etiam ista colorum varietas emergat, cum prævalente potentiâ bilis, vel quantitativè vel qualitativè, sequetur icterus flavus; prævalente verò acido hoc, nunc simpliciter acido, nunc austero seu vitriolaceo primarum viarum (sive ex stomacho secundum Helmontium, sive ex pancreate secundum Sylvium, derivare velimus) icterus nunc viridis, nunc plumbeus, nunc niger oritur; quatenus nempe vel oleum bilis concentrat, vel quatenus non tantum vitiosâ effervescentiâ in intestinis scybalarum à chymo separationem naturalem depravabit, sed præterea quoque chylum non ritè à bile perfectum depravatione & præcipitatione in varium, obscurum ac tetrum colorem tingit & transmutat. In horum ergo duorum succorum vitiis investigandæ sunt omnes icteri causæ. Sanè observavi aliquando in urina icterici, cui spiritum salis instillaveram, sedimentum viride exinde præcipitatum fuisse. Certè dum istas insignes ictericorum cardinalias consideramus, bilis in folliculo notabilem alterationem, per acidum austerrum explicabilem, ut & juvantia, Martialia, acidum corrigentia, quatenus sc. hæc, primaria tanquam aliàs remedia contra icterum, acida vitiosa imbibunt & destruunt; amara, aut volatilia, bilis dyscrasiam emendantia facilè ad acidum tanquam primarium agens deflectere possumus: ut adeò inertia bilis, & imprimis ejus oleositas dispositivè; acidum verò activè, concurrat ad icteri genesis, & quidem prævalente bilis vitio vel quantitativè vel qualitativè, sequitur icterus flavus; prævalente verò acido, aut vitioso succo pancreatico, imprimis icterus niger, ejusque species oriri videntur. Hactenus dicta confirmat tristitia & mœror, item iracundia, ad icterum, ut supra dictum, disponentia; nempe tristitiâ & mœrore omnes humores incrassari, acidum fixum augeri, & ita effectus naturæ bilis contrarii induci solent. Iracundia omnes humores tenuiores ac mobiliore, ac acido volatili aciores, reddere solet.

Ad tertiam occasionem, sanguinem nempe, contribuunt venena; vel assumpta, vel inflicta ex morfu venenatorum animalium, v. g. viperarum; vel etiam fermenta peregrina, v. g. ulcerum occlusorum, cum aliis symptomatis icterum inducentes; quale quid, post Galenum *de loc. aff. l. 5. cap. 7.* Marcellus Donatus *hystor. mirab. l. 1. c. 9.* & Bartholinus *c. 2. hist. 39.* annotarunt. Hæc enim suo fermento

putrefactivo subito immutant & corrumpunt massam sanguineam, & præternaturalem ac singularem fermentationem ac præcipitationem inducunt; unde ex mutata ejusdem particularum figura mutatur ejusdem color, donec tandem talia recrementa diversimodè tincta, à massa sanguinea separata, & hinc serò imbibita, ad extremas partes delata, in glandulis cutis miliaribus deponantur, & ibidem alienum colorem inferant. Huc pertinent febres tam symptomaticè quàm criticè in icterum degenerantes; item icterus à seminis staphisagriæ masticatione, observante Loffio *l. 4.* item à scorbuto sine felleorum vasorum angustia, de quo vid. idem Loffius *l. 3. obs. 38.* ac denique à mensium suppressione, vid. Henricus ab Heer *obs. 6.* Bartholinus *cent. 5. hist. 62.* item Willisius *Pharmac. Rational. P. 2. Sect. 2. cap. 1. pag. 240.*

Imprægnatâ ita massâ sanguineâ loco chyli vitiosis recrementis, hoc ipso naturalis ejus fermentatio necessariò turbatur: unde anxietas in præcordiis, dolor præcordiorum compressivus, lipothymix, virium dejectiones, & similia symptomata in principio icteri, sunt frequentissima, donec ita excrementa à fermentatione sanguinis naturali, aut effervescentiâ ejusdem febrili separata, & sero involuta, dum cum massa sanguinea circulari motu rapiuntur per partes solidas, in horum porulis tanquam filtris & colatoriis hæreant, ibique loco succi nutritii subsistant, ac successivè densius agglutinata partes solidas colore adeò peregrino inficiant vario, prout varia excrementa variâ præcipitatione in massa sanguinea varias acquirunt colorationes, simul quoque excrementa ista præcipitata & separata, à sero imbibita, per urinas excernuntur. Unde in principio morbi urinæ sunt claræ, aut saltem simul opacæ, ingruente sc. sanguinis fermentatione, & excrementitiarum particularum separatione. Tandem verò, ubi præcipitata & separata fuerunt excrementa, urinæ saturatæ, & copioso sedimento onustæ, claræ evadunt ac naturales, aperto signo, fermentando separari & segregari in massa sanguinea excrementa, quæ aut per urinam excernuntur, aut in habitu corporis desiguntur.

Hæc tragœdia luditur tamdiu, donec succi hi correcti, & correctâ massa sanguinea, ad naturalem crasim redeant, & quicquid in habitu corporis hæret, nunc per sudorem, nunc per insensibilem transpirationem dissipetur.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta ratione declarationis sunt tam partes extremæ solidæ, ac imprimis corporis habitus, quàm etiam interna thoracis & abdominis viscera: sic enim Zacutus Lusitanus *lib. 3.*

*lib. 3. Prax. Admir. Observat. 136. & 156.* refert ictero mortuum, qui omnia interna viscera, imprimis hepar & intestina, colore flavo totaliter infecta habuit. Rarum autem est, quod ossa etiam flavescencia fuerint reperta. Pars verò affecta à causa proxima est massa sanguinea heterogeneis recrementis imprægnata, sicut horum focus & fomes sunt primæ viæ quandoque.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica: icterus præsens facile in genere cognoscitur ex habitus & urinæ colore, qui imprimis in oculorum albo se manifestat; sicut urinæ linteum vel charta albicans si intingatur, hæcque colore croceo inficiantur; quamvis urinam ictericorum non semper linteum tingere Riverius *cent. 2. observ. 9.* annotât; aut si urina succulsa spumam flavam ostendat, & sedimentum ochreum post horas aliquot dimittat. Causarum verò signa dignoscenda majoris difficultatis sunt. Ventriculus nihilominus affectum esse patet: si mala diæta ventriculum immediate gravans mox præcesserit, qualem v. g. ex Horstio *suprà* allegavi: si cardialgia adsit: si absentibus bilis p. n. effervescentis indiciis ructus, vomitus, ac fluxus alvi nidorosi ac biliosi observentur, aut fæces colore naturali tinctæ sint.

Sanguinem verò hujusque texturam in icterolæsam monstrat:

1. Causa evidens, si v. g. à morfu animalis venenati is contigerit; si febris, mensium suppressio, similesque circumstantiæ, quales superius allegatæ, præcesserint, aut adsint.
2. Ventriculus mediocriter, aut bene constitutus; Ac
3. Vasorum biliariorum angustia, bilisque turgescentiæ extraordinariæ nullæ adsint notæ, ac internorum contenta naturaliter tincta sint.

Vasorum denique biliariorum, & epatis angustias, aliaque vitia, monstrant

1. Dolor circa hypochondrium dextrum molestus, nunc cum tensione ac pondere, nunc cum lincinationibus obscuris.
2. Fæces alvi semper albicantes, aut cineritii coloris, hincque difficillimè & nullo labore solvi potest alvus; ac
3. Convulsiones viscerum abdominis antecedentes, aut adhuc præsentis.
4. Bilis viscidioris signa.
5. Calculorum per alvum interpolata excretio antecedens.

An icterus superveniens sit criticus, an symptomaticus, signa coctionis urinæ monstrant,

Urinæ in principio sunt tenues, nonnihil lactææ; in progressu fiunt turbidæ, obscuræ & crassæ; in statu copiosa deponunt sedimenta, & colore naturali flavo plus minus tinctæ apparent. Et quando urina fit crassa, turbida ac nigra, tunc signum est solutionis morbi, cum victoria naturæ: sic namque huc facit exemplum Schenckii *lib. 3. Observ.* de post mictum cruentum seu sanguinis aterrimi excretionem subitò curato ictero: magis huc facit exemplum Hœferi in *Herc. Med. pag. 142.* de ictero nigro, in quo ex usu lapidis bezoar urina nigra & instar atramenti fuit excreta.

### PROGNOSIS.

Prognosis omnis nititur causarum antecedentium consideratione. Est morbus, si quis alius, contumax, si illegitimè tractetur. Per se periculum quidem, non tamen lethalitytem, involvit, nisi ratione causarum, aut supervenientium interdum symptomatum.

Hinc icterus, qui sequitur vitium quoddam visceris cujusdam, hepatis ac lienis, confirmatum, scirrhum, &c. ferè chronicus, immedicabilis & lethalis esse solet, & nunc immediate, nunc mediate, quippe cui ordinariò hydrops lethalis superveniens, ægrum jugulat.

Icterus quò magis flavus existit, eò facilius est curatu: quo verò magis niger, difficilior; cum hic causam complicatam magis, aut certè alteratam, sc. humorum aciditatem satis pertinacem, foveat.

Icterus flavus, qui est à ventriculi cruditatibus, facillimè, & sæpè uno vomitorio aut purgante, curatur.

In specie niger icterus quartanis superveniens solet esse contumacior: sicut Forestus *lib. 19. obs. 22.* observat, quartanæ per 12. annos duranti icterum nigrum contumacem & diuturnum supervenisse. Interim Aphorismus Hippocratis 62. *Seç. 4.* non semper est verus, vid. Horstius *lib. 1. obs. 20.* ubi icterus salutaris quartâ die in continua febre evenit: & Bartholinus *cent. 3. hist. 4.* observat icterum in quartana salutarem, ante diem septimum supervenientem.

Icterus à veneno externo productus periculo non vacat, ob symptomata maligna ipsi communicata.

Icterus à fermento sanguinis intrinseco vix, nisi discrasia illâ ablatâ, tollitur, v. g. scorbuto, mensium suppressione, &c.

Ex ictero flavo securissimus est, qui in febre est criticus; symptomaticus verò malus observatur, & non rarò periculum infert; vid. Hippocrates *Epidem. Seç. 2. text. 120.*

Post hunc facilius est curationis & securior, qui ex impedito bilis per meatum felleum motu hujusque obstructione oritur, modò non nimis pertinax fuerit obstructio.

Icterus

Icterus ab angustia vasorum felleorum, si fixiorem & pertinaciorem causam hujus angustiae foveat, v. g. callum, calculum, &c. semper difficilius curationis observatur, quam quae mobilem magis, v. g. obstruentem humorem agnoscit.

Icterus à scorbuto vix, nisi hoc curato, sanatur; qui verò ex corruptela humorum, est incurabilis.

Calculi in folliculo felleo & inde natus icterus difficillimè, rarò ac nunquam, curantur; cum non prostant remedia, calculos alterantia, utut ~Di dulcis aliquid praestet: aut curatilièt, crebrius recidivant, & mortem inferunt.

Nec qui è mensium obstructione, nisi hac sublata, sanatur.

Pariter icterus, qui à lienis vitiis, non semper eandem habet prognosin: nam qui ab ejus scirrho oritur, incurabilis est; qui verò à leviori lienis affectu, curari potest.

Ast intuitu supervenientium, & concomitantium symptomatum, ictero saepius succedit hydrops lethalis: non saltem, quod ille epati vel lieni scirrhum inducat; sed quatenus chylus bile haud sufficienter tinctus, hincque viscidior vasorum lacteorum & lymphaticorum obstructiones, hinc rupturas parat: & rara satis est avis icterus cum hydropse curatus, qualem Platerus *observat. pag. 598.* annotavit.

### C U R A.

In icteri cura

- I. Fermentum acidum austerum corrigendum.
- II. Bilis vitiata emendanda, & in naturalem crasin restituenda; quae verò emendari nequit, per urinas & sudores evacuanda.
- III. Distributio ejus debita promovenda.

Hinc ratione primae indicationis conveniunt absorbentia, praesertim Martialia; post stomachus per vomitorium purgandus, & per stomachica aromatica roborandus erit.

Secundae indicationi remedia salina acrida & amara plus minus resinosa & volatilia, praesertim appropriata, bilem restituentia, quibus pro laxanda alvo rhabarbarina, sennata, &c. pro diuresi lumbricalia, &c. simul inferviunt.

In tertia praestant incidentia, aperientia, & tonum hepatis conservantia, hepatica vulgò dicta, simul blandè adstringentia, ut fermentum fibræ, earumque tonus. Quod si malum sit à veneno, tunc hoc assumptum vomitorio rejicitur, si ore haustum adhuc in primis viis hæreat, ubi etiam clysmata prosunt; vel animalium morfu communicatum per appropriata alexipharmaca corrigatur, & quidem modo per fixa, modo per volatilia, v. g. & diaphoreticum, & bezoardicum minerale, & vo-

Tom. II,

latile CC. viperarum, rob juniperi, theriaci, &c.

℞. Theriac. ℥ij.

Bezoard. miner. ℥ss. ad gr. xv.

⊖ volat. C. C. gr. v.

M. f. bolus: S.

### Ausstreibende Lattverge auf einmal.

Summatim in ictero nigro primatum obtinent Martialia, in flavo alcalina volatilia oleosa, alcali bilis amarum restituentia, utut utraque conjunctim saepius propinentur. In specie verò pro antecedentium causarum varietate specialis cura nonnihil varianda, de quibus hinc inde.

Pro his scopis obtinendis semper vomitus instituitur, cum ferè impossibile sit, sine vomitu perfectè curare icterum: ac in specie, si in principio morbi urgeant symptomata stomachi, anxietates praecordiorum, appetitus prostratus, &c. in specie vitrum ℥ij, vel crocus metallorum vino infusus, cujus ℥j. ad ℥iiss. filtratum propinandum; Vel

℞. aloës hepat.

extracti cent. min. ā ℥j.

troch. alhand. gr. vj.

℞ vitæ gr. ij.

F. pilulae pro 4. dosibus.

Quoad venæsectionem: ea planè non juvat in ictero, utpote quae potius nocet, ac non rarò malum exasperat, quàm ut idem tollat.

Similiter purgationes propriae dictae in principio morbi administratae sunt admodum nocivae, ac ut plurimum majorem discolorationem in superficie corporis inferunt, nisi sint lenia, primarum viarum saltem absterfiva, ut ☿-latus, acuatus cum stimulo purgantis cujusdam; vel quoque gummi ammoniacum, quod solutum, ac in mixtura adhibitum, appropriatum est ad icterum: aut si adsit tantummodo lenis obstructio meatus fellei in intestinis, tunc talis obstructio vel unicâ purgatione potest tolli. Locum enim purgantia habent in ictero à vasorum biliariorum obstructione, minimè ab eorum compressione, nisi hæc à talibus, quae faciliè à catharticis remove licet, v. g. fecibus alvi induratis, contingat, quatenus per purgantia æquè ac vomitoria magna pars bilis ad intestina & ventriculum emulgetur, ut Pechlinus *de purgantibus cap. 36.* aliique annotarunt, ac illud observatum Kyperi testatur, dum *Institut. lib. 2. cap. 16.* viro cuidam ob frequentius ea propinata non tantam bilis copiam restitasse, quanta alvinis fecibus tingendis sufficeret, eumque hinc debilitatum post annum obiisse refert. In hoc tamen casu non semper à purgantibus erit incipiendum, cum saepè sola aperientia, & digestiva, stimulo purgantis acuata, item salia fixa & volatilia, hanc obstructionem simulque icterum tollant. In progressu verò morbi purgationes sunt frustraneae, nisi saltem in fine, appropriatis imprimis pra-

(LII)

missis,



missis, conveniunt, quin potius in morbi statudiuretica & sudorifera sunt optima.

Quoad alterantia verò & specifica anti-icterica: inter ea primatum obtinet Mars, isque crudus; bis enim in die, manè & vesperi, ad ℥j. radicem & fomitem morbi tollit; & cætera ex coparata, vulgò aperientia dicta, v. g. Essentia ☉is liquidæ, & croci ☉is, paucò vel nullo acido parati, & omnia Martialia. Hinc etiam hæmatites præparatus, seu experimentum in ictero à quibusdam laudatur, quatenus est hic totus ☉alis. Henricus ab Heer *in obs.* 6. describit pulverem compositum ad pallidos virginum colores, quem laudat in ictero mensium obstructioni superveniente, cujus basin limatura Martis cruda, cum aliis aromaticis mista, constituit. Hinc pulvis specificus ad icterum est nil aliud, quàm limatura ☉is exactissime pulverisata, & substituta cum oleo destillato aromatico ligni sassafras irrorata, ne sc. rubiginem contrahat; quod à ℥j. ad 3℔. commodè & cum successu, nunc solitarius, nunc cum crystalli præparatæ dimidio propinatur, sc. ad imitationem pulveris cachectici, imprimis Hartmanni *in Praxi Chymiatrica cap.* 171. §. 5. item & diaphoreticum Martiale Ludovici expertum, quod vid. *in ejus Pharm. pag.* 330. & alia Martialia &c. nam hoc vel solum ritè administratum sufficit ad curam icteri: item vina Martialia, vel quoque vinum, in quo sæpius aurum extinctum, Poterio commendatum. Rationem dat Burrhus *in epist. ad Bartholinum*, quoniam sc. ramenta subtilissima auri communicantur istis liquoribus. Facit huc & experimentum Gesneri *l. 3. epist. p.* 105. Platerus *cap. de Ictero* commendat infusum chalybis cum carbonibus de quercu in vino. Acidulæ huc pertinent, quæ desperatos icteros interdum curant: conf. Willsius *Pharm. Rational. part. 2. pag.* 284. Stœckerus *in praxi*.

Post Martialia fiat accessus ad specifica ante-icterica, inter quæ primatum obtinet in ictero flavo chelidonium majus, nobilissima planta, & optimum in ictero remedium, præsertim quando ex viciato bilis motu, indeque fecibus alvinis griseis aut candicantibus existentibus icterus oritur; de cujus usu vid. Forestus *lib. 15. obs.* 21. & 40. Usurpatur autem variis modis: vel ut ex planta recenti contusa exprimatur succus, qui, licet nauseosus, in vino aut quocunque vehiculo mistus, quotid. manè hauriatur; qua ratione ancillam ictericam multosque ictericos nunc præmissis, nunc omisso vomitu, paucos intra dies curavi; vel fiat secundum methodum à Castro præscriptam infusio radicis chelidonii majoris, in vino, quod intenso colore flavo tingitur. Item decoctum hujus chelidonii in vino aut quocunque modo paratum, bis quotid. usurpatum, optimum est remedium. Hinc Joël decoctum chelidonii majoris cum granis

juniperi tanquam expertum meritò commendat & laudat: videatur Willsius *Pharm. Ration. Part. 2. pag.* 280.

℞. rad. chelidon. maj. M. ij.  
bacc. juniperi M. j.

Cum vino in mortario trita, & validissime expressa propinetur.

Post chelidonium majus, martubium, hujusque decoctum, essentia & extractum, similiter remedium expertum est, de quo vid. Forestus *lib. 19. obs.* 19. & 40. in scholio.

Huc spectat centaurium minus, quod internè quocunque modo sumptum, ob amaritatem ad icterum egregium est: ejus decoctum cuponiston est Rulandi in cura icteri; imò sunt, qui dicunt, quod centaurium minus recens contusum in calceos immisum, ut nudis pedibus inter ambulandum ita teratur, curet icterum; fieri enim plantam omninò flavam, ob id quotid. esse repetendam: item taraxacum, flores chamomillæ, herba agrimoniz, abrotanum, anserina; cujus succus vel decoctum hauriatur, appropriata sunt icteri remedia, vid. Riverius, Fonseca, & Petrus. Huc pertinet fomaria, cujus solus succo Riverius *cap. 3. obs.* 73. icterum & vomitum biliosum curatum refert; salvia, de qua vid. Platerus *Prax. Tr. 3. p.* 141. & rosmarinus, vid. Fonseca *l. 4.* Hæc simplicia omnia, quibus & cochlearia addi potest, operantur, corrigendo bilis oleositatem, & sal volatile ejus auendo. De succo capillorum Veneris vid. Velschius *Mistom. cap. 13. obs.* 13. Facit huc fragaria, quæ etiam est remedium expertum Rulandi, decoctum nempe ejus aliquandiu continuatum, aut pro potu ordinario propinatum: nam quod etiam infantes fiant icterici, observat Panarollus *Pent. 4. obs.* 44. Magis adhuc convenit, si fragaria simul decoquatur cum passulis, & ita decoctum hauriatur, teste Rulando *in Thesauropag.* 168. item Fonseca *l. 2. Conf.* 34. qui dicit, fuisse secretum cujusdam religiosi, qui ictericos curavit decocto herbæ & radicis fragariæ quotid. hausto. Vid. etiam Bartholini *Acta Med. Hassniens. volum. 1. observ.* 120. v. g.

℞. HB. fragar. c. toto m. ij. l. iij.  
passul. min. 3ij. l. jv.

Hæccoqu. in f. q. ∇ font. pro potu ordinario.

Fit potus gratus sæpius usurpandus, quem etiam Hartmannus commendat *in Praxi Chymiatrica*. IctERICI enim, utut intense sitientes, malè ferunt cerevisiæ potum, partim propter amarorem, partim quod oneret ventriculum, cum non benè digeratur, sed in mucum degeneret. Hinc sitientibus maxime ictericis, convenientissimus potus erit vel modò dictum decoctum, vel si fragariæ amaror molestus sit, solum decoctum passu-

larum.

larum. Passulæ sanè multum in recessu habent, unde non possum non laudare electuarium Digbæi p. 1. *Experiment.* ad quemvis icterum, paratum ex passulis minoribus & rhabarbaro.

Conveniunt etiam radices ꝑ. aperientes, cichorii, rubiæ tinctorum, urticæ, lignum assafras, radix hirundinariæ seu vincetoxici, ejusque essentia, appropriatum est antiictericum, & à Simone Pauli *Qu. Botan. p. 117.* extollitur, præsertim in progressu & declinatione morbi, si vinum decoctionis ejusdem hauriatur, tam per sudorem quam per urinam egregiè operans, ex l'bj. radice urticæ majoris & ꝑj. croci. Gesnerus cum vino albo extrahit Ram, quam tanquam celebre antiictericum per ꝑ. dies dosi ꝑij. assumendum commendat. Ulteriùs flores hyperici & calendulæ hoc in casu etiam sufficiunt, in specie croci flores. Flores hyperici commendat Stæckerus in Praxi, si sc. cum herba hyperici coquantur in vino, vel aqua, & detur continuò bonus haustus manè: prætereaque herba & flores ponantur in calceos. De floribus genistæ res itidem certa est, id quod confirmat observatio Borelli *Cent. 4. obs. 31.* ubi icterus à fumo tabaci obortus curatus per conservam florum genistæ & calendulæ. Nec absinthium, hinc negligendum est; cujus virtutem in ictero cum aliis cachexiæ symptomatis annotavit Solenander *Sect. 5. Conf. 25.* Icteri diuturni curationem per decoctum musci pulmonarii quercini videb. in M. A. N. C. *ann. 3. obs. 290.* Pertinet huc decoctum euporiston Camerarii ad icterum, quod describit Fehr *de absinth. pag. 29.*

Aliàs semen aquilegiæ nobile est specificum expulsum in ictero, quod promovendo expellendove excrementa icterica massam sanguineam purgat, estque Timæi euporiston, unde est basis pulveris Timæi ad icterum experti:

Vel convenienter potest fieri emulsio ex hoc semine, e. g.

℞. *sem. aquileg.* ʒß. ad ʒvi.

c. f. q. ▽ *flor. aquileg. & chelidon. maj. f.*  
Emulsio:

adde

*ebor. f. Δe vel rasur. eboris pulver.* ʒj. ad ʒiß.

Edulcoretur parum & uturpetur pro lubitu.

D. S.

**Blutreinigende und austreibende Milch.**

Benè confert hæc emulsio; frequentius enim usurpata blando sudore expellit icterum, & Ram optimè delet: inter alia puerperæ, mox à partu fœtus mortui ictericæ, cum successu dedi. Ebur certè, ceu appropriatum absorbens, ut & corallia, à multis ad icterum commendantur.

Juxta hanc emulsionem pariter quoque experta est emulsio Cnæffellii ex seminibus

Tom. II.

frigidis majoribus, &c. quam vid. in M. A. N. C. *ann. 4. & 5. obs. 49. pag. 43. & 44.* Sylvius laudat semen cannabis in lacte ad crepaturam coctum, vel fiat ex hoc emulsio cum aqua appropriata.

Hiscæ accensenda venit radix curcumæ, sive solitaria; sive cum Martialibus in forma sicca, e. g. ðio diaphoretico Martiali conjuncta. propinetur, v. g.

℞. *rad. curcum.*

ðii diaph. l. *bezaard. miner.* ā gr. xv.

Θ *volat. C. C. vel viperar. l. succini*  
gr. vj.

M. f. pulvis.

D. S. ut antè.

℞. ðii diaphor. ðial. *Lud.*

*rad. curcum.* ā ʒj. ad ʒß.

Θ *volat. C. C.* ʒß.

M. pro 2. dosibus;

D. S. ut suprà.

In specie, si à calculis in folliculo felleo fuerit icterus, radicem hanc ceu experimentum commendat Hoffmannus in *Clave Schræderiana pag. 365.* de quibus calculis exturbandis etiam vid. remedia ordinaria in M. A. N. C. *ann. 4. & 5. obs. 99. p. 103.*

Hæc ipsa specifica ex regno quidem vegetabili optimè sunt juncta in essentia contra icterum D. Michaëlis.

Nec omittenda sunt ex animalibus, quæ sale volatili, nunc diuretico nunc sudorifero, constant: hinc aselli, & lumbrici terrestres, seu eorundem blandè in MB exsiccatorum pulvis ad ʒj. sæpiùs propinetur: vid. Thoner. & Lotichius. Nam hic pulvis bilem insigniter acuit; aut more antiquorum subigendi cum sero lactis vel cerevisiæ: vid. Maroldus *Pr. p. 171.* vel infundendi vel coquendi cum vegetabilibus aperientibus sic dictis, aut specificis, vel mensis moventibus &c. aut per putrefactionem vel fermentationem spiritus urinosus ex his paratus ad ʒß. subinde exhibetur, propter sal volatile nitrosum abstergens, incidens, & saporem icteri specificum corrigens, urinamque ciens, ab omnibus Practicis laudatur: Quibus vix cedit ~ tartari probè rectificatus urinosus, ~ carminativus de tribus, ~ urinx humanæ, ad modum Zwelferi in *Mant. Herm.* traditum paratus, liquor cornu cervi succinatus ad guttas xxx. R̄x̄i acerrimæ, gutt. xxx. aut loco spiritus urinx spiritus salis ammoniaci efficacior erit; hinc pauperculi □æ potu ab ictero se curare solent, vel quod in multis probatum euporiston, utut foetidum.

℞. *succ. absinth. l. chelidon. & marrub.* q. v.

Misc. c. □ *agri:*

De quo bibat bonum haustum, contineat se in lecto & sudet, sudorque sæpiùs abstergetur; hoc enim aliquoties repetito subinde restituitur.

(LII 2)

Certè

Certè præmissis præmittendis (i. e. vomitu & Martialibus) post specifica salia volatilia sunt optima icteri remedia. Unde propter hujusmodi volatilem salinam nitroso-ammoniacalem texturam stercora quorundam animalium tantopere ad icteri curam tam Paracelsus, quàm alii Prædici, commendant; qualia sunt stercus caprillum, gallinaceum, columbinum, equinū, in specie sterc<sup>o</sup> viridescens anserculorum juniorum, imprimis chelidonio & anserinā nutritorum, ad ʒj. Nam propter ammoniacalem vim & anserinam, ceu specificum in hoc morbo, qua vesci solent, illud stercus specificum antiicterum fuit Bartholeti: vid. Fonsæca *l. a.* ac Grulingius *Prax. l. 3. pag. 307.* recipitque stercus anserinum & lumbricos terrestres, aut pulverem ictericum, quem Lotichius *lib. 4. cap. 2. obs. 6. & 7.* describit: quibus Willisius stercus ovillum substituit; item stercus canis ossa rodentis; item stercus album pullorum exsiccatum & pulverisatum. Quò facit Tragea stercoraria Quercetani *in Pharm. pag. 451.* ex solis animalium stercoribus parata: vid. Finckius *Chim. pag. 145.* Sicut & quidam commendant succum stercoris capræ expressum cum lacte ceu egregium in ictero remedium. Pediculi tres, vel quatuor vivi deglutiti commendantur à quamplurimis, & experimento comprobavit Zacutus Lusitanus *lib. ultimo Med. Princip. cap. 2.* Hisce annumerandi veniunt lapides in fellibus animalium reperti, præsertim lapis in felle bovis, utpote cum sit nihil aliud, quàm bilis naturalis coagulata ab acido, cujus pulvis à ʒss. ad ʒij. imò ad ʒj. mirè laudatur; extra quem & lapis ex felle porci egregius est: Conf. M. A. N. C. *ann. 3. observat. 283. pag. 499.* loco quorum etiam capi solet lapis bezoar, sive orientalis, sive occidentalis, ex cujus usu urinas nigras instar atramenti redditas fuisse, observatum fuit in ictero nigro: vid. Hæferus *in Herc. Med. pag. 140.* Vel calculus humanus, tam per urinam quàm per sudorem, icterum pellens. Item spectat huc lapis ceraunius præparatus à ʒj. ad ʒss. qui est specificum ad icterum D. Michaelis, quo ipso aliquoties curavit, qui quotannis hoc morbo afficiebantur: in cujus defectu lapis in folliculo fellis tauri repertus commodè substitui potest: Tilemannus & Agricola ex lapide cerauniopulverem contra icterum præparant. Hartmannus & D. Michaelis cum exuviis serpentum aut viperarum spontè depositis miscuerant, & dosi ʒj. propinarunt: vid. *suprà, ubi de hydropse art. 3.* Ex quibus varix fieri possunt formulæ; v. g.

ʒ. rad. rubia tinct.

• chelidon. maj. ā ʒj.

HB. marrub.

summit. absinth. ā m. j.

⊖ ʒij.

Includ. nodulo vino infundendo:

D. S.

Blutreinigender und austreibender  
Püschel.

ʒ. Extr. chelidon. maj. gumm. ʒj.  
lap. bezoar. occident.

ʒi diaph. ♂ ial. Lud. ʒ gr. xv.

M. f. bolus S.

Blutreinigende Lattwerge.

Diluatur in haustu vini, capiatur.

ʒ. ∇ tarax. ʒj.

extract. chelidon. maj. ʒss.

⊖ volat. C. C. gr. jx.

syrup. card. bened. ʒj.

M. S.

Blutreinigend Träncklein auff einmal.

ʒ. croci ♂ is aperit. ʒss.

Extr. rhabarb.

rad. curcum.

fumar.

absinth.

cent. min. ā ʒss.

& destillat. major. gutt. vj.

F. pilulæ no. 197.

Dosis iix. ad xij. manè & vesperi.

Pro turgescencia biliosa mitiganda opio locus concedi potest: potui ordinatio instilandus ~⊖is dulcis, & ~⊖i dulcis, item ~⊖is \*ci acidus: vid. Grimmus *Compendio Medico-Chim. l. 3. c. 1. obs. 26. & 27.*

Cæterum in fine interdum, blanda laxantia adhiberi convenit pro evacuatione primarum viarum, inter quæ huic scopo inservientia hætenus enarratis, aut subjungenda, aut interdum etiam permiscenda, semper sint moderata & blanda. Præ cæteris commendantur flores pruni sylvestris, qui blandissimè & appropriatè laxant per alvum, si infundantur in potum ordinarium cum nodulo, qui crebrius bibatur; vel manipulus horum florum acaciæ intundatur in vinum, maceretur per diem & noctem in loco calido, quod vinum ita hauriatur: Dicitur Kauffingeri experimentum, laxat blandè, & ad crasin sanguinis confert. Convenit hîc etiam infusum foliorum sennæ cum sale tartari in aqua specifica.

In specie laudem meretur rhabarbarum, & rhabarbarina, quod appropriatum est, utur vulgò bilem evacuet. At hoc non solum præstat, sed potiùs partim alterat, partim evacuat, ideò vim specificam antiictericam habere dicitur, nec sine causa à Paracelso commendatur. Nempe rhabarbarum electum pulverisatum optimè in substantia usurpatur à ʒss. ad ʒj. propinetur in jure vel vino calido manè jejuno stomacho, æger non nihil contactus insigniter sudabit, & à meridiè alvum laxam habebit; Vel

ʒ. Rha



℞. *Rhabarb.* ʒß.  
 ʒi ʒlat. l. *arcan. dupl.* gr. xij.  
 M. f. pulvis: S.

**Blut-reinigende Laxier-Pulver.**

Unde infusum rhabarbari cum marrubio est egregium remedium ad curam icteri: Quò pertinet essentia alexipharmaca laxativa Clauderi ex rhabarbaro, vel elixyr cachecticum polychrestum laxativum cum essentia absinthii; vel

℞. *passul. min.* aut *earund. pulp.* tßß.  
*rhabarb. el.* ʒij.

ʒi ʒlat. *Tach.* ʒij.

c. l. q. *syr. de cichor. c. rhabarb.* f. Electuarium.

D. S.

**Eröffnende Blut-reinigende Laxtwerge.**

Vel infunditur rhabarbarum in ʒ specifica cum foliis fennæ, addito ʒi: Vel

℞. *fol. fenn. f. st.* ʒijß.

*rhabarb. el.* ʒi.

*rad. curcum.* ʒß.

ʒi ʒi.

Infund. in ʒ fumar. per ʒ.

Colaturæ ad te

*syrup. de cichor. c. rhabarb.* ʒij.

M. D. S.

**Blut-reinigende Träncklein.**

℞. *summ. centaur. min.* p. ij.

*rhabarb. el.* ʒij.

ʒi ʒi.

Infund. in l. q. *vin. absinthit.* stent in loco calido, per ʒ.

Colaturæ adde

*syr. de cichor. c. rhabarb.* ʒvj.

M. S.

**Purgierender Bermuth-Wein auf einmal.**

In ictero nigro autem infusum hellebori nigri in sero lactis confert, aut pilulæ ex extracto hellebori nigri cum extracto ʒis concinnatz: quibus, quantum possibile fuerit, gummi ammoniacum sociandum, quod optimum aperitivum, & mucis visceri incisivum. Præcipitata Mercurialia pro purgandis ictericis ad curam icteri à quibusdam commendantur: sic ʒ præcipitatus rubeus cum ʒo ad aliquot grana commendantur à Finckio: ʒ præcipitatus luteus ad gr. v. vel. viij. commendatur à Schneidero in *Pharmacopœa*: sed transeant, cum tutiora prostent. Pertinet huc decoctum Lindani, quo quemvis icterum curat, præsertim, quod probè notandum, præmissio vomitorio;

Decoctum est tale:

℞. *rad. cichor.* aut *tarax.* ʒij.

*chelidon. maj.* ʒvi. ad ʒij.

*HB. endiv.* aut *cichor.* m. j. l. ij.

*fragar.* m. iß.

*marrub.* mß.

ʒi alb. ʒß. ad ʒvj.

*fol. fenn.* ʒij.

Coq. in l. q. ʒa, aut ʒa ʒ *viniana* q. l. in vase clauso: decocti ʒ. tßij.

Detur pro usu: addendo, si præstantius desideretur singulo haustui ʒi rectif. ʒij. ad ʒß. sumantur 3. diebus, & omni manè duo haustus. interpositâ horâ, continuando, donec malum sit curatum.

In hujus usu attendendum, ne sint secessus ultra tres vel duos in die: si contingat liberius purgari prima die, aliis sumatur tantò minus. Tali decocto Amstelodami curavi mercatorem ex ictero nigro: tribus septimanis nihilum quidem profeci, urinæ manebant crudæ & splendidæ, post dies paucos, apparente coctionis signo, aberat splendor, & turbidæ erant urinæ; prædixi ergò solutionem morbi.

Convenit quoque apozema Sylvii *cap. 46. §. 68. p. 452.* & potio sequens Barbetæ, quam habet in *Exercitat. Practicis.*

Vel ℞. *HB. marrub.*

*cuscut.* ʒ m. ij.

*fl. genista*

*acacia*

*calend. l. cartham.* ʒ m. j.

*rad. scorzon.*

*filicis*

*cichor.* ʒ ʒij.

*erem.* ʒi ʒß.

Coqu. in l. q. ʒa.

Colaturæ adhuc ferventi infunde per noctem *fol. fenn. f. st.* ʒvj. l. *rhabarb. el.* ʒß. ad ʒvj.

Colatura ad tßj. D. S.

**Blut-reinigender Tränck.**

Quoad icterum nigrum, saltem notetur: in præscribendis remediis semper acidum absorbendi simul habeatur ratio; sive hoc fiat illa eligendo, quæ utrique humori simul dicata, v. g. per terrea, urinosa & Martialia; sive hæc aliis & hætenus dictis commiscendo; sive modò hæc, modò illa diversis vicibus propinando.

Hæc fuerunt interna, de quibus adhuc in genere moneo; In medicamentis antiictericis esse insistendum ad tempus, quia est morbus chronicus & contumax; & quidem quamdiu urina mingitur tenuis & splendida, tamdiu illis insistendum, donec signa coctionis appareant, & aut fiant crassæ & turbidæ, & cum sedimento repletæ; his enim apparentibus solutio imminet, & spes salutis est in propinquo.

Hisce internis interdum externa quoque remedia accedunt, quæ in icteri cura subinde plantis pedum applicari solent, qualia sunt; centaurium minus, item radix chelidoni majoris, & hypericonis, de quibus suprâ dictum; Sic mittantur colore peregrino infecti, sani licet sint ægri, in B. ʒa tepidæ, ut ita relaxentur cutis pori, fricetur corp' cum sacculis, repletis

(LII 3)

farinâ

farinâ hordei & fabarum, aquæ calidæ immerfis, vel fiat balneum ex solventibus, v.g. scabiosa, saponaria, chelidonio, chamomilla, parietaria, origano; de quo vulgò dicitur, quòd colorem ictericum eò usque evocet, ut ∇ balnei inde tingatur; beta, anetho, marrubio, abrotano, radice lapathi, sigillo Salomonis, lupinis, nitro, sulphure, calce viva & similibus, quibus corpus abluatur: v.g. usurpetur balneum ad cutem detergendam Mynsichtii, vel

℞. HB. saponar.  
parietar. ā m. ij. l. iij.  
rad. bryon. t℞℞.  
sigilli Salom. ℥iv.  
pulv. pisor. nodulo inclus. t℞℞.  
Incisa D. S.

#### Species zum Bade.

Balneis hujus decoctionis aliquoties æger insideat, novam semper aquam recipiendo: tunc pisorum pulvis nodulo laxiori inclusus sit.

De tinca pisce, umbilico vel dextro hypochondrio imponenda, aut plantis pedum supponenda, quæ exinde flagescere dicitur, ac de potu è poculo cereo flavo, rem in dubio, ceu incertam, relinquo.

Pertinent huc externa ad icterum quemcunque mulierum gravidarum convenientia, quibus propter metum abortus non semper tutum est propinare interna, aut imbecillioribus: in talibus expertum est cataplasma Joëlis, quod habet:

℞. fol. marrub. virid.  
rad. chelidon. maj.  
visci quercin. ā m. ij.

Hæc cum aceto, vel vino subacta plantis pedum applicentur: vid. Rondeletius.

Aut si tutum videatur, potest ex his fieri infusum in vino, & propinari internè pro sudoris prolectione. Forestus l. 19. obs. 21. gravidæ ictero laboranti, cum jam instaret partûs tempus, claretum cum successu propinavit.

Pertinent huc etiam curæ magneticæ, uti in aliis morbis chronicis, ita & in specie in ictero proficua; v.g. urinam ægri miscent cum farina hordei, exin formant placentas, quas in aquam piscibus projiciunt, aut cani vel feli devorandas præbent; sic icterus evanescet. Innuit hoc Helmontius pag. 595. & in Angliâ in duabus personis à se expertum refert hoc Dn. Boyle in *Philos. Experimental.* Dicunt, si æger quotidie urticas vivas permingat, exinde arescere urticas, ægrum verò successivè curari: vid. Keslerus *Proceff. cent.* 5. pag. 84. vel infundatur ægri urina supra acervum formicarum, vid. M.A.N.C. ann. 3.

obs. 89. pag. 146. sic urina icterici supra ster-cus equinum, dum calet, excreta curat icterum, annotante Platero & Gruelingio: vid. Willisi *Pharm. Rat. Part. 2. pag. 285.* Vel permisceatur urina cum cineribus fraxini, & in globulos redacta prope fornacem exsicce-tur: confer. Willisius l.c. Vel quod fuit expertum à Castro,

℞. Ovum gallinæ, suo luteo & albumine per mediocre foramen orbatum, ita ut sola testa remaneat integra, quæ impleatur urina patientis, & factâ scrobiculâ in hypocausto sinatur ibi, donec lento calore exsicceetur urina; parigradu & exsicceatur urina, & tollitur icteritia.

Potest fieri etiam citius in digestionem cinerum; si verò per incuriam contingat aduritesta, icteritia abit in nigram icteritiam immedicabilem.

Vel sanguine ex mediana ægrotantis extracto, & ovi gallinæ testæ artificiosè incluso, & ita ovo 14. dies gallinæ pro fotu supposito, postmodum cum carne quadam misto, & cani, vel sui famelicæ exposito, ut comedatur, icterum & morbos ex vitioso sanguine oriundos transplantando averruncare fatagunt: vid. Burggravius in *Biolychnio.* Item ex urina ægri & lacte, & addito pane similagineo, fiat jusculum, propinetur cani; qui si non moritur, ne homo morietur, sed convalescet.

## ARTICULUS V.

De

### Lue Venerea.

**L**ues Venerea ita dicta, quòd ex concubitu & usu cum subjecto impuro frequentissimè & facillimè contrahatur, & est nihil aliud, quàm contagiosa totius corporis cachexia, cum insignibus & crudelibus artuum & locorum quorumlibet nerveorum doloribus, pluribusque symptomaticis stipata, à corruptis, malignis, & quasi virulentis humoribus dependens; ita quidem, ut prius semper membrum afficiatur, per cujus contactum virus illud corpori primò & immediate affricatur.

Innotuit hic morbus Europæis non nisi ante duo circiter secula, & quidem circa annum Christi 1493. Dubium ergò mox oritur: an Veteribus cognitus fuerit hic morbus, an non? Prius qui defendunt, non pauci sunt, quos inter est Lindanus, qui super Hartmannum asserit; quod Guilielmus de Palazeto, qui floruit

runt annò 1470. accuratè de hoc morbo scripserit; item Bernhardus Gordonius, qui floruit an. 1305. in *Lilio suo Medicina* de hoc scripsit; item Valescus de Taranta annò 1417. imò quod & alii antiquiores citari possint perhibet, qui de hoc affectu scripserunt, cum de morbis pudendi scribunt. Alii è contrà Veteribus incognitum volunt, asserentes: eundem in India Occidentali endemium existere, illumque milites Hispanos ex istis locis redeuntes anno 1494. reportasse, & hinc in Italia ab iisdem disseminatum, & in specie in castris Gallorum in obsidione Neapolitana à scortis urbe exclusis longè latèque propagatum fuisse; unde ab Italicis morbus Gallicus, à Gallis morbus Neapolitanus, ab aliis Syphilis, quod nomine apud Veteres veniat, appellata fuit. Vid. Sennertus *lib. 6. Prax. part. 4. c. 1. pag. 121.* Manardus *lib. 7. epist. 2. pag. 99.* item Monardus *de simpl. Med. histor. pag. 312.* Helmontius *de peste.* Fracastor<sup>us</sup> *Tr. Peregrina Lues nova &c.*

Exactam ejus historiam enarrare terè difficile est; nam, ut inquit Lindanus; *si Prothema est, lues Venerea est, & credo, non esse morbum, qui tam difficilis sit cognitu, quam lues Venerea; nullus enim morbus est, cujus pallio tegi non possit, adeò ut ex multis hoc morbo laborantibus vix duo sint, qui eodem modo afficiantur.*

Symptomata enim, quibus morbus hic se manifestat, non semper eadem sunt: quibus tamen innotescere solet, aut primaria aut frequentiora hæc deprehenduntur:

1. Effluxus humoris spermatici virulenti ex pene in maribus, ex genitalibus in mulieribus, quem gonorrhœam virulentam seu veneream appellant, congressum cum persona plus minus suspecta paulò post, interdum tertiâ vel quartâ die, interdum paulò tardiùs, insequens. Cum verò sanies, quæ profluit, acris sit, & in confiniis præputii, ubi glandi connectitur, subinde retineatur, acrimoniâ suâ irritante inflammationem præputii & tumorem insignem excitat, ita ut glans phymosi quasi affecta detegi non possit; dum interiùs sanies ista acrior facta glandem potentiùs arodat: nunc verò præputium tumorem quasi flatulentum contrahit, ita ut in immensum intumescat, & quasi transpareat, & glandem inferiùs stringat. Quod si intempestivè supprimatur, aut non ritè corrigatur hic fluxus, universum corpus lues ipsa brevi post perfectè inquinabit.
2. Bubones in inguinibus saltem exorti, vel post Veneris usum, vel etiam aliquo tempore post, duri, dolentes, præsertim noctu, qui si evanescant, aut saltem incisione aperti ad suppurationem & mundificationem producantur, res in

meliori erit statu: interdum non suppurantur, sed potiùs indurantur.

3. Lassitudo insignis ulcerosa & torpor gravis quælibet membra occupat, quasi fistibus contusa essent.
4. Pustulæ variæ multiformes & scabræ, in corporis partibus se offerunt: in pene quidem pustulæ parvæ, præsertim in glande apparent, item circa coronam; quæ paulatim rumpuntur, & in ulcera alba degenerant, hinc successivè fiunt profunda & callosa, glandis substantia successivè exedentia & absumentia. Si ex congressu impuro malum sit, ferè in pene primitus, idque ut plurimò cum gonorrhœa, apparent ulcera. Alias quoque pustulæ hinc inde in corpore, præsertim tamen in fronte, facie, faucibus, & naribus, hinc cute capitis pilosa, erumpunt, nunc plus nunc minus protuberantes; item circa pubem & coxas, interdum densè labia vulvæ obsident, suntque squamosæ, scabiosæ, inæquales, coloris rarò intensè rubri, ut plurimum lividi, aut ex livido flavescentes. Nunc aridæ sunt & exsuccæ, & squamas saltem suggerunt, aliquando sanies quædam acris exinde emanat, ipsis pustulis hinc latius serpentes & se dilatantibus.
5. Procedente malo pustulæ hæc tandem abeunt in ulcera, quæ etiam sine illis non rarò accidunt sordida & maligna, nec pus, sed saniem acrem, vicina loca exedentem, suggerentia, nunc materiam tenacem, lividam, viscidam, &c. simul exsulantia. Loca occupant imprimis glandulosa, penem & pudenda muliebria, nares, labia, fauces, palatum & papillas. Sanè exulceratio spontanea & diuturna, nec facilè curabilis, aut curata licet, subito tamen denuò recidivans, in palato & faucibus sine alia causa cognita eveniens & perdurans, unum ex primariis (si alia tamen simul respondeant) ex hujus luis indiciis subministrat.
6. Ulcera hæc ossa frequenter quoque adoriuntur, & cariota eadem reddunt, in specie ossa palati, narium, & propter perpetuum pituitæ virulentæ affluxum, ac illorum spongiositatem, & crani maxime, quin & partes internæ ulceribus obiectæ observatæ fuerunt.
7. Dolores adsunt atrocissimi, & hi etiam primarium quoddam symptoma luis constituunt; dolor nempe nunc artuum solum, nunc simul etiam capitis, & quidem non articulorum, sed saltem artuum mediorum, nempe mediorum humerorum, mediarum tibiæ, frontis, temporum, item sterni dolores. Hi sunt saltem nocturni, qui circa vesperam horâ nonâ vel decimâ, aut etiam citius incipiunt exacer-



exacerbari, & inter tertiam & quartam matutinam solent discedere, totâque die aut nulli aut tolerabiles esse: Sunt ostocopi fixissimi, subinde etiam simul lancinantes. Rarum est, quod subinde etiam circa articulos observentur iidem; sicut etiam rarò lumbos & os sacrum occupant. Observavi tamen in foemina morbo hoc inguinali, per sudorem copiosum, quem frequenter deterferat, infecta, quæ graves dolores nocturnos in dorso & lumbis, & circa os sacrum patiebatur aliquandiu, antequam ipsa lues perfectè se manifestaret.

8. In dictis locis, medietatibus nempe ossium, item in capite, fronte, &c. observantur quoque tuberositates & tumores, dicti gummata, nodi, tophi, &c. plani, minùs elati, ad medii ovi & ulterius magnitudinem excrecentes, secundum ossis situm ferè formati, insigniter nocturno tempore ut plurimum dolentes, rarò indolentes. Hos ipsos sub periostio oriri plures asserunt, unde si diuturniores sint, non rarò ossa ab iisdem arroduntur, & cariola evadunt.
9. Calor in volis manuum & plantis pedum insignis, harumque rhagades, fissuræ & excoaratio, sine manifesta causa.
10. Verrucæ, tam depressæ quàm elatæ; item ficus, condylomata & cristæ in partibus pudendis muliebribus, & utriusque sexus ano succrescunt.
11. In morbo inveterato pili defluunt, tam in capite & barba, quàm superciliis præsertim cum pustulis, ulceribus, aut scabie sordida junctis, sine alio morbo præcedaneo.
12. Maculæ rubescentes, flavescentes, aut livescentes, nonnunquam satis latæ, præsertim in pudendis, pectore ac dorso, item in abdomine, subinde comparent, quas pressas albicans vestigium, mox ad pristinum colorem rediens, exhibere Platerus *Prax. Tom. 3. p. 384. testatur*: vid. Sylvius *lib. 4. Prax. Tr. 3. §. 18.*
13. Supervenit inflammatio testium; raucedo, atque uvulæ laxatio & erosio.
14. Tinnitus aurium.
15. Inveterato denique malo pro majore vel minore partium solidarum affectione, fluidarumque alteratione, surdi, cæci, tabidi, scabiosi &c. fiunt infecti.

Omnia hæc prolixè explicata videbitis in Sennerto *l. 6. Prax. Pars. 4.* Sylvio *lib. 4. Præxos Tr. 3.* & Botallo *Tr. de lue Venerea*: qui tres instar aliorum omnium sufficiunt.

Atque hæc quidem symptomata non cuivis

contingunt, nec omnibus hujus luis gradibus, nec etiam, utut frequentiora, solitaria observantur; sed alia insuper his complicantur, imò non cuncta eandem vim diagnosticam habent. Quatenus v. g. non omnis, sed virulenta saltem Gonorrhœa luis Venereæ suspicionem movet; pilorum decidentia sine aliis signis & per se pariter nihil tale arguit; bubones Venerei ab illis, qui extra hanc luem geniti, haud differunt, sicut contra communem sententiam Platerus *l. 4. pag. 387.* & Sylvius *l. 4. §. 134.* per experientiam testantur, ac condylomata non tam luem Veneream, quàm præposterum & frequentiorẽ Venereis usum, familiarem illis, qui hoc morbo laborant, sequuntur, hincque hujus luis signa propria haud existunt. Ita, ut symptomata hujus morbi primaria maneant gonorrhœa virulenta, pustulæ, ulcera, ossium caries, tophi & dolores enormes, nullisque anodynis cedentes: quibus Platerus *pag. 384.* maculas cutaneas quoque addit, quatenus ex his solis, si de nulla alia earum causa, præter coitum impurum, constet, luem Veneream incipientem concludit.

#### C A U S Æ.

Afficiendi modus hujus luis simpliciter est per contagium, isque frequentissimus per congressum Venereum; non quidem frequentiorẽ, sed vel unicus levior actus sufficit, sicut hujus respectu rarissimè aliis modis afficere solet. Pertinet huc etiam hæreditarius character, quo liberi à parentibus infici solent: Sic Forestus *lib. 32. obs. 2.* refert luem Veneream, qua maritus affecit uxorem, hæc infantem in utero; hic nutricem; hæc tres liberos proprios: simile vide in Amato Lusitano *Centur. 1. Cur. 49.* item Schenckius in *Observ.* refert mulierem, quæ foetum edidit Gallicis ulceribus scatentem, cum conjux hoc morbo afficeretur, illâ sanâ. Reliqui ergo modi præter congressum, quibus contagium Venereum se propagat, sunt varii. Omnes autem fomitem materiale minùs spirituosum fundamento agnoscunt, ut sunt v. g. lectus communis: sic enim Horstius *lib. 7. obs. 3.* refert luem Veneream à communi lecto contractam, cum condylomatibus & ulceribus pudendi. Sed hoc ita absolutè minùs probabile videtur, nisi lectus vel copiosis sudoribus, vel sanie ulcerum, ab inquinato fuerit infectus. Sudores certè multum valent. Exemplum novi ancillæ pudicæ, cuidam Venereo ad sopiendos artuum dolores balneo fornicarum subinde utenti inservientis, & hinc sudores abstergentis, quæ horum contactu & halituum inspiratione infecta fuit. Sic post scarificationem in balneo publico, instrumento non benè absterfo, luem Gallicam contractam novit idem Horstius *lib. 7. observat. 8.* Par ferè

Parferè ratio, quando Cornarius *Obs. cap. 25.* notat morbum Gallicum ex cucurbitularum impositione, quæ infectæ erant, contractum. Sic hypocaustû huc pertinet: Hildanus refert *C. 5. Obs. 99.* de muliere sana, aliquandiu in hypocausto, in quo ægri lue Venerea laborantes per litus Mercuriales sanati fuerunt, adeoque vapore Mercuriali infecto degens, quæ gravissimum morbum Venereum hinc contraxit. Pertinent huc vestimenta, de quibus idem Hildanus *Cent. 1. Curat. 100.* refert luem ex veste hominis hæc infecti tactam. Communia pocula etiam hinc accusantur, ut quando Botallus *de Lue Venerea pag. 472.* historiam infecti ex communi poculo cum veneno refert: Nempe tunc per pocula malum communicari arbitror, quando à sanie ulcerum in palato aut faucibus vel potus vel poculum inficiantur, quod tunc contagiosum malum sit. Per solum osculum luem Veneream à viro infecto puellæ communicatam refert Forestus *Obs. 2. Schol. lib. 32.* sed tamen, modò osculum tale non sit malitiæ pallium, vix ejus medio contagium communicabitur, nisi ulcera faucium & oris insigniora adfuerint, & hinc vel salivâ, vel linguæ intrusionem, malum multiplicetur. Per ophthalmiam in distans contagiosum morbum Gallicum refert Zacutus Lusitanus *Prax. Admir. l. 7. obs. 125.* de quo tamen reverà dubito, an ita fieri possit? Notabile est, quòd diu admodum seminarium morbi Gallici latere queat, cum teste Schorero *in Obs.* post 20. vel 30. annos demùm pullulescere queat. Par ratio est, quando Amatus Lusitanus *Centur. 1. Cur. 49. & 50.* refert, viros lue Gallicæ correptos sanatos, post 7. item 15 annos, pueros eadem infectos ex sanis mulieribus suscipientes.

Afficiuntur autem partes inter solidas primariò loca glandulosa, hinc nervea, nec, nisi mediantibus istis affectis, & partes sanguineæ. Ac sanè potentiùs locis glandulosis se virulentia Venerea insinuare, & hinc eorundem ulcerationes, corrosiones & tumores malignos penitus & contumaces, aut, nisi radicitùs curetur, facillimè recidivantes, efficere solet.

Quoad contenta liquida: inquinat primariò chylosum corporis rorem, & hinc derivatos succos, eorumque vehiculum, nempe serum purius ac lympham: Hinc genituram in gonorrhœa; ossium nutrimentum in tophis, & carie glandularum quarumvis, lympham in bubonib<sup>9</sup> & ex ulcerationibus faucium & narium, pustulis cutaneis; membranarum rorem in doloribus nocturnis ostocopis, &c. ordinariò inficit: In quibus omnibus acrimonia acida singulariter corrosiva, cum nutrimenti roridi chylosi in viscidiorum & glutinosiorem consistentiam alteratione, deprehenditur. Inquinantur autem imprimis conten-

Tom. II.

ta ista, & horum medio partes solidæ, à contagione acidi specifici fermentativo, & contentorum sui multiplicatione immutativo, ratione verò subjecti cum parvo seu exili viscido & glutinoso, nunc halitus, nunc saniei forma, vehiculo communicato: parili ferè ratione ac scabiei exile admodum fermentum nobis communicari, & tamen totum corporis habitum inquinare solet.

Ex quibus causa efficiens materialis proxima hujus morbi vel spontè patet: nempe consistit hæc in acido sui generis peccante (cujus tamen natura specifica à priori non adeò exactè determinabilis est) fermenti instar lentè se multiplicante, & contenta corporis pedetentim destruyente, functionesque primò naturales lædente: quæ ipsa latius explicata vid. in Sylvio *lib. 4. Tr. 3. de Lue Venerea §. 29. & 63.*

### DIAGNOSIS.

Ratione diagnoseos, quamvis morbum hunc adultiorem cognoscere facillimum sit, quamdiu tamen adhuc latet, & sub cineribus saltem gliscit, ejus dignotio difficilior est; præprimis cum teste Poterio non rarò sub larva scorbuti & arthritidis latitet, imò ipsius naturam assument omnes morbi, si illi jungantur. vid. Velsch *Dec. IX. cur. pag. 621.* sed etiam ipsi ægri honoris atque dignitatis tuendæ gratiâ rem cum infectis se habuisse constanter negent, & à consortio humano exclusionem metuant. Cautus ergò sit Medicus in judicio, ne infontem accuset, neque reum absolvat, nec se ipsum prostituat.

Quòd si verò tale quid se perpetrasse fateantur, simulque de uno vel altero lui Venereæ appropriato symptomate conquerantur, de morbi specie ulteriùs dubitandum non est. Interim in priore, & abnegationis casu, in mariti vel uxoris, si in conjugio vivat æger, conditionem, & mores inquirendum, utpote ex quibus non leves interdum de infectione conjecturæ hauriuntur: aut porrò investigandum: an cum morbi talis infecto in eodem lecto dormiverit? cum eodem ex uno vase biberit? infantem impurum lactarit? &c. Aliàs & si ex neutro horum aliquid certi de morbo hoc determinari valeat, ægri status præsens potiùs attendatur, qui quidem variat pro temporum diversitate, aliisque observatur in morbi principio, alius in augmento, alius in statu seu morbo inveterato.

Quod si igitur ex congressu impuro malum hoc propulset, paulò post eundem aut circa penem & vulvam æstus quidam extraordinarius seu inflammatio exoritur, aut ardor urinae, quem intra biduum aut triduum gonorrhœa excipit, observatur: Inflammationem dictam mox sequuntur pustulæ, hinc excoriatio

(M m m)

atio

atio atque exulceratio partium dictarum can-  
crosa; imò si inflammatio vehemens vel negle-  
cta fuerit, hæc in gangrænam degenerat, crys-  
tallinis vesiculis se manifestantem. Inter-  
dum nulla succedit gonorrhœa, sed virus per  
cutè potius ad inguina mox fertur, & bubones  
excitat, qui pro diverso malignitatis gradu  
aut facillè curantur, aut temporis tractu in ul-  
cera phagedæna degenerant: quo ipso princi-  
pii tempore callosa quoque scroto atque pe-  
rineo contingunt ulcera. Quibus dictis phæ-  
nomenis non comparentibus interdum ulcus  
cancrosum atque callosum exile intra præpu-  
tium & glandem, aut in orificio urethræ,  
conspicitur, cui ulceri interdum callositas sine  
ulcere substituitur. De cætero quamvis nul-  
la de coitu nefando suspicio sit, modò bubo-  
nes atque gonorrhœa complicantur, infalli-  
bile lues Venereæ signum existunt; ita quidem,  
ut uno cessante, alterum invalescat: quibus-  
dam intumescunt testes: in sexu verò sequio-  
re fluor albus valdè dolorosus, quique partes  
externas erodit, affligit. Sin verò absque  
congressu hic morbus contrahatur, semper,  
ut superius dictum, magis afficitur pars, quam  
virus seu miasma venereum immediatè tangit:  
v. g. si ex lactatione infantis impuri, circa pa-  
pillas & mammas pustulæ, excoriationes, in-  
flammationes, ulcera depascentia & callosa;  
sin ex vestimentis, & concubatione, in cute  
pustulæ atque efflorescentiæ varii generis ex-  
citantur.

Sub incremento autem mali, quacunque  
occasione contracti, quoniam ipsa massa san-  
guinea tunc virulentia hac contaminatur,  
nutritio totius depravatur, unde & sanguinem  
cæruleum seu subviridem apparere, Prædici  
testantur. Bubones etiam in illis, quibus si-  
ne coitu tale quid contingit, protuberant,  
habitus totius maculis & pustulis defædatur,  
in impetiginem atque scabiem ulcerosam aut  
crustosam abeuntibus: quæ tamen pustulæ at-  
que ulcera frequentiora sunt modò his modò  
illis membris, v. g. faciei & capiti, & quidem  
non rarò sub eminentia notabili, brachiis, pe-  
dibus, pubi, pudendis, uvulæ, tonsillis &  
musculis laryngis, unà cum partibus carnis  
reliquis circumstantibus deglutitioni dicatis,  
sunt erosæ, inde deglutitio est difficillima:  
quare res deglutiendæ ad œsophagum trans-  
latæ rursus per nares prouunt: capilli deci-  
dunt, in volis ac pedum plantis rhagades &  
fissuræ, circa podicem & pudenda verrucæ  
nomine condylomatum propullulant, ac gra-  
vissimi dolores capitis atque artuum obser-  
vantur, frequenti serpi pituitosi & acris eructa-  
tione in faucibus, maximopere in palato,  
quod interdum cum naribus penitus eroditur,  
ita ut in os assumpta per nares mox effluant.  
Præterea adest totius corporis lassitudo, res-  
pirandi difficultas, & fœda ozæna. Urinis

supernatat crusta livida, plus minus cærulea.  
Ubi tandem inveterata magis lues Venerea,  
ulcera patiuntur nares, harumque tubuli car-  
tilaginei; item polypos: pariter tumores in  
pectore atque artubus congeruntur, in ulcera  
cancrofa, callosa ac sinuosa degenerantes:  
Dolores ostocopi, præprimis nocturni, &  
partium fixi magis fiunt, adsunt dolores con-  
tinui in ossibus nasi & oculorum, tophi & no-  
di in partibus emergunt, ossa corrumpuntur,  
imprimis cranii, palati, &c. Refert Ferne-  
lius, quod in lue Gallica ossa valida fiant fran-  
gibilia, ut levi ex causa confringantur instar  
ligni aridi: Ratio est acidum, quod ita cor-  
rodit os, ut fiat friabile. Caro dictorum os-  
sium intumescit, & ex livore rubescit ad instar  
partium frigore læsarum. Superveniunt sur-  
ditas, cæcitas, febris hæctica, diarrhœa, ta-  
bes, &c. ut aliorum minus frequentium phæ-  
nomenorum ac symptomatum taceam: v. g.  
epilepsiæ à sanie, ex carioso cranio, ad cere-  
bri membranas depluente, qualem Vidus Vi-  
dus l. 2. *Curat membran. cap.* 18. vermi-  
um super eadem meninges decumbentium,  
quales Forestus lib. 32. *observ.* 23. *in schol.* ipsi-  
us cerebri tandem per os eieci; sicut Schen-  
ckius *Observat lib.* 6. *pag.* 811. cæcitatibus, sur-  
ditatibus atque loquelæ perditæ, quam Plate-  
rus lib. 1. *Observ. pag.* 119. allegavit.

Interim & illud hoc in loco monendum,  
quod à Wiesemannò *de Lue Venerea cap.* 1.  
observatum, allegata hæcenus symptomata  
 sæpius quorundam phantasiâ ita subiisse, ut  
postquâ coitum nefarium perpetrarunt, mox sibi  
persuadeant, se lue Venereâ, à qua tamen im-  
munes, laborare, i. e. ridiculè satis sibi imagi-  
nantur, omnes dolores atque symptomata,  
de quibus unquam legerunt aut audiverunt, se  
afficere, ita quidem, ut si Medici ejusmodi  
ægrorum querelis non auscultent, hoc ægrè  
ferant, atque ab his recedentes ad impostores  
abeant, usquedum sanitatem cum nummis  
perdiderint.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: lues Venerea lentus &  
diuturnus morbus est, qui tardè procedit, &  
difficulter admodum curatur; & quidem tam  
ratione ipsius virulentia ac malignitatis, quàm  
ægrorum morositatis, præsertim, si invetera-  
tus & confirmatus morbus fuerit, ac præter  
genitalia plures partes glandulosas & ipsa ossa  
inquinaverit; ita quidem, ut quamvis ejus  
symptomata interdum cessent, ut videatur  
omne malum eradicatum, quin tamen recur-  
rant, impedire, adeoque virulentiam plena-  
riè extinguere, ut plurimum magni laboris  
videatur.

Nihilominus morbum pertinaciorē aut  
leviorem reddit virulentia vehementia atque  
imbecillitas.

Faci.



Facilius quoque in uno quàm in altero curatur: nam cujus contenta corporis magis temperata sunt, minùs acria; & quorum corpus undique permeabilius ac perspirabilius est, facilius curantur, quàm qui contrà habent.

Curatu facilior observatur recens, quàm inveteratus morbus, utpote, qui tardè & difficulter curatur: unde Panarollus *Pent. 3. Obs.* 3. testatur, hujus curam ante sextum mentem non adornatam, nullius efficaciz esse.

Quod si semel sanati iterum lue inficiantur, aut malum redeat, aut nunquam aut non sine insigni difficultate curari, præter Epiphanium Ferdinandum moderni perhibent: quali fato quoque gaudent, quibus hæreditario jure malum hoc contingit.

Si incidat lues Venerea in corpus calidum & siccum, in illud fermentum virulentum potentiùs agit, & difficiliùs longè curatur; & contra corpora humidiora faciliùs. Unde in corpore robusto & sano ille faciliùs curatur, quàm in tali, qui aliis morbis chronicis laborat, & vitiosis humoribus jam tumescat, v.g. scorbuto.

Qui curam Mercurialem sine successu passi, illi difficulter sanantur, & qui post salivationem denuò inficiuntur, nunquam forsan, utpote quorù corporibus Mercurii usus familiaris nimis redditus, hi verò diuturnitate morbi & evacuationibus multis jam tùm emaciati fuerunt.

Adjuncta symptomata etiam malum vel faciliùs vel difficiliùs curatu reddunt.

Quod si autem viscera se malè habeant, ac æger hecticus extiterit, omnia desperata sunt.

Gummata pariter, denique tumores, quò magis inveterata sunt, & quò magis jam ossa carie affecerint, eò difficiliùs malum curatu erit: adeo ut, etiam si curatus appareat morbus, si tamen caries in quodam osse remaneat, licet occulta, nihilominùs tamen recidivat morbus: videatur Hildanus *Cent. 5. Observ.* 95.

Bubones retrocedentes ordinariò sequitur lues ipsa: quò verò faciliùs suppurantur & meliùs, eò præstantior erit curandi ratio.

Ossa nasi interiora erosa, aut etiam si ossa interiora capiti sint inquinata, malum incurabile est; cùm cerebro & ejus membranis faciliè communicetur.

Affectus catarrhales si in lue Venerea superveniant, mali sunt; cùm faciliùs partis affectæ erosionem secum ducat.

Quod si lethale sit malum, tandem febri quali hecticâ intereunt ægri, aut tabes corporis sequitur, aut ex eis partibus respirationi dicatis, suffocati intereunt.

Devictæ luis & curatæ indicia sunt, si sanguis venæsectione emissus sit floridus, & elegantis consistentiæ, cum paucò vel nullo sero

supernatante; quòd aliàs ferè maculis lividis, aut colore quasi cæruleiscente in superficie conspici solet, prout nempe malum plus minus inveteratum fuerit.

### C U R A.

Quibus suppositis cura est vel universalis, ipsius mali, id est, quæ in massæ sanguineæ purificatione consistit, & indicationi præservatoriæ satisfacit; vel particularis, seu quæ multiplicibus ejus symptomatis in specie debetur, & indicationem curatoriam respicit.

In cura universali acidum illud virulentum specifici saporis corrigendum & extinguendum, viscidum ejus subjectum dissolvendum & attenuandum, utrumque verò extra corpus evacuandum.

Obtinemus hos scopos duobus modis: vel per sudationem mediantibus decoctis lignorum; vel per salivationem mediante sio: Qualis horum magis conveniat, tam ratio morbi minus vel magis inveterati, quàm corporis naturalis constitutio magis vel minùs rara, & contentis vel acrioribus vel temperatis prædita, docebit: Nam lucem confirmatam sine salivatione Mercuriali radicitus evellere perquam difficile est, cùm Mercurius illius veneni genuinum sit alexipharmacum; sicut econtrà in corpore bilioso & melancholico salivatio periculosior est, cùm mala gravissima subinde inducat; sanguinei verò, & omnium optimè phlegmatici, salivatione curabiles sunt, utut cum majore molestia, citiùs tamen, & cum minore recrudescentiæ metu. Hinc pro corporum constitutione, & ratione climatum & victus, faciliùs longè salivant Galli, citiùsque curantur, quàm nos Germani. Nostro in climate præstat ut plurimum utrumque modum conjungere: Decoctis nempe sudoriferis liquare contenta, & permeabile ac transpirabile undique corpus reddere; hinc per Mercurium salivationem instituere; quâ factâ, demum per decocta illa sudorifera repetita, quicquid per Mercurium relictum fuerit, expellere, sordes hinc inde adhuc residuas abstergere, & contenta corporis in debitam ac naturalem crasin restituere: v.g. præmissò digestivo ex tartaro vitriolato, lapidibus cancerorum & sale viperarum, & hinc usurpatis pilulis purgantibus Mercurialibus unâ alterâve vice, paratur decoctum ex lignis, de quo æger quotidie bis bibat manè haustum bonum calidè, expectando blandum madorem; non nimis sudent, ne tenuiori diffusio sero relinquantur visciditates crudæ, difficulter per sium mobiles; sed sufficit, si liqueant saltem contenta corporis per decocta, cujus signum est mador blandus: alterâ vice bibatur vesperti sub introitu lecti sine madoris provocatione. Quibus præmissis per octiduum instituuntur inunctiones siales in

externis, vel horum loco ☿iale remedium intrò propinatur, hauriendò desuper juscum calidum. Quod si ab hujus usu primis diebus sequantur vomitus, semper ceterissecundariâ os eluatur, ne aliquid ☿iale in faucibus hærendo ulcera oris pertinacia & periculosa inferat. Continuat remedium; nam successivè cessant vomitus, donec superveniat salivatio. Peractâ sufficiente salivatione, cum æger nonnihil vires recuperavit, maturè repetendæ potiones sudoriferæ lignorum, præmissâ, si opus fuerit, adhuc purgatione, aut ipso decocto radicis hellebori, vel pulpa colocynthidis quasi incoquatur, ut ita cum sudoribus alvus simul aperta sit. Continuatis his per 8. 10. vel 12. dies cura ferè absoluta erit; sed hæc in malo inveterato. Minus inveteratum potius simpliciter decoctis sudoriferis curetur, quod, utut sit paulò diuturnius, non tamen adeò periculosum est, atque cura, quæ fit per ☿ium, in specie apud nos, qui subinde scorbutum sumus affecti, in quibus periculosa est salivatio, quibus quocunque modo depuratus ☿ nocivus est. De cætero sunt ex recentioribus, qui quamvis salivatio notabilis non intendatur, salivantium nihilominus usu humores ad purgationem & diaphoresin feliciorè disponunt.

Quod ergo attinet in specie curam per sudationem: sudorifera interdum mox primum locum inter evacuantia gerunt, frequentius tamen non, nisi purgantibus præmissis, adhibentur, & quidem talia præprimis, quæ specificè huic virulentix resistunt, simulque visciditatem atque aciditatem humorum corrigunt: scilicet primatum obtinent inter remedia sudorifera usitatiora, in subjectis quidem frigidioribus guajacum, cui libenter jungo lignum juniperinum; in calidis verè sassaaparilla est optima, quinimo ut plurimum utrumque sociatur augendo nunc hoc nunc illud pro circumstantiarum ratione. Optimè guajacum, item sassaaparillam propinandi, & horum medio curandi litem Veneream modum docet Arcæus lib. 4. de Vuln. cap. pag. 158. & 164. de quo dicit Lindanus, quod eodem modo feliciter curaverit, & pater ejus etiam desperatissimos restituerit. His etiam adnumerantur radix chinæ, smilacis asperæ, petalidis, saponariæ & radix bardanæ, de qua vid. Riverius observat. commun pag. 342. Cortex guajaci, ligni sassafras, quercus, buxi, cupressi, & lentisci; imò Fallopius solo ligno fagi quoddam curat testatur. Herba perficariæ, juxta Paracellum, secundum alios perforata, saponaria, ac nucum putamina, de quibus vid. Borellus Cent. 2. Observ. 96. Simon Pauli Quadrip. Botan. pag. 363. & Riverius Cent. 4. Observ. 29.

Ex quibus omnibus, utut varia in officinis prostent præparata, diversæ etiam queant concinnari formulæ pro curatione luis per sudorem, frequentiora tamen & commodiora hætenus observantur decocta, & quidem tam primaria seu potentiora pro sudore movendo, quam secundaria seu dilutiora, alterandis humoribus inservientia, & pro potu ordinario & toto curationis tractu sumenda: quorum hæc ut plurimum ex remanentia priorum parantur. Sicut autem iisdem medicamentis alterari, simulque evacuari possunt humores peccantes: ita in principio sine sudoris excitatione quoque propinanda sunt eorum decocta, quatenus ad sudorem nunquam cogendus est æger, nisi postquam humores dispositi, & ad eum præparati fuerunt; Quod si negligatur, non rarò contingit, ut sudorifero assumpto æger sub stragulis frustra, ad lipothymiam usque, angatur.

Quare si ad sudoris excitationem transeundum sit,

1. Ex dicta præcedanea aliisque signis humorum conditio eruatur.
2. Pro horum diversitate sudorifera, modò hæc, modò illa, seligantur; nec
3. Sudor valdè urgeatur, sed æger mediocriter saltem tegatur, & observare jubeatur: an ad sudorem sensim inclinet? tunc enim aut juscum, aut regumentorum plurimum impositione, idem promoveatur: sin secus, à sudoriferorum ulteriore usu humorum præparatio prius expectetur: vid. Sylvius Tr. de Lue Venerea §. 223. & 228.

Decoctis his sudoriferis non incommodè additur & crudum, quod Borellus Cent. 2. Observ. 96. & Riverius Cent. 4. observ. 22. commendat; item specifica parti affectæ, ac symptomatis maximè urgentibus appropriata.

Præterea liquor horum ut plurimum eundem aquam constituit: in subjectis nihilominus, quorum ventriculi vis digestiva vacillat, vini dimidium, plus aut minus, sub coctionis finem adjiciendum; aut hoc statim, & in principio affundatur, diutius saltem cum eo ingredientia solidiora infundantur, aut in cucurbita alembico clausa coquantur, liquorem prolectum decocto addendo. Pro corporibus emaciatis in lacte quidam cocturam instituunt: Verùm lignosis ejusmodi substantiis extrahendis ineptum est menstruum, cujus loco tamen serum lactis magis aptum erit. v. g.

℞. Rasura ligni sancti ℥iij.

cort. ejusd. ℥jss.

rad. sassaapar. ℥ij.

ras. ligni sassafras. ℥j.

℞ viv. in petia ligand.

℥iij grosse consus. & in petia ligat.

ā. tbs.

Infun-

Infundantur in

▽ *commun.* mens. vj.

Macerentur per 24. live 48. horas in MB hinc coqv. ad remanentiam tertiæ partis.

Colatura D. S.

**Blut-reinigender Schweiß-Trancß.**

Dosis ʒiv. ad tbiß.

℞. *Remanentiam decocti hujus:*

Infundatur denuo in

▽ *commun.* Mens. ix.

Macer. per 12. horas : decoqu. ad consumptionem tertiæ partis, in fine addendo

*Passul. min. conquass. ʒiß.*

*sem. coriandri cont. ʒvj.*

*rad. liquirit.*

*polypod. ā ʒvj.*

*cinnam. ʒiij.*

Colatura D. pro Bocchetto: S.

Ordinari-Trancß.

Vel ℞. *Rasur. ligni juniper. ʒvj.*

*cortic. ligni guajac.*

*rad. bard. in taleol. diss. ā ʒiij.*

*china,*

*ligni sassifr. ā ʒi.*

*ʒu viv. in pet. lig.*

*ʒiicrudi in pet. lig. ā tbiß.*

Macerentur in MB in

▽ *commun.* Mens. xij.

Ebulliant ad tertias.

Colatura D. S. ut *suprà.*

De qua capiantur ʒv. l. ʒvj. calidè pro dosi.

℞. *Remanentiam decocti prioris,*

adde

*rasur. ligni sassifr. ʒj.*

*rad. liquirit. ʒvj.*

*sem. coriandr. ʒiß.*

*pass. min. ʒij.*

affundantur

▽ *commun.* Mens. vj.

Decoqu. ad consumpt. tertiæ partis: co-

lentur per H. M. fiat Bocchetum:

Item cum appropriatis:

℞. *Ras. ligni guajac. c. cort. ʒiv.*

*sassifr.*

*rad. sarsapar. ā. ʒiij.*

*china ʒj.*

*ʒiicrud. in pet. lig. tbiß.*

Infund. per ʒ in

▽ *commun.* Mens. xij.

Manè coqu. ad tertiæ partis consumptionem, sub finem addendo

*HB. saponar. c. toto. M. ij.*

*hyssopi.*

*veron. ā M. j.*

*rad. liquirit. ʒj.*

*pass. min. ʒvj.*

*sem. fanic. ʒvj.*

*cinnam. ʒß.*

Colatura detur pro usu.

Assumuntur remedia hæc ( dum nempe iis

solis curatio per sudorem intenditur absque salivationis adjumento ) manè aliquot dies tantum, donec in curæ principio corpus advescat paulatim remedio: quo facto etiam vesperti. vel 3. horis ante cenam haustus repetitur, & semper pro virium, & constitutionis plus minus succulentæ ægri ratione sudor plus minus largus expectatur. Ut verò salubrius fluat sudor, non statim ab assumpto sudorifero arte promoveatur, sed post horam, intercedente, si fieri potest, somno. Sudor per horam plus minus protrahatur in principio, postea verò etiam ultra ascendat. Sudandi modi sunt varii: optimus autem pro eradicatione morbo modus est, ut stuphas seu æstuarium ingrediatur, quibus æger insidere potest, intendendo & remittendo balnei calorem pro necessitatis ratione, paretur vel sic cum spiritu vini accenso in succulentioribus aut paulò habitioribus, vel humidum cum evaporatione aquæ calidæ scoris metallicis candefactis vel silicibus ignitis superaffusæ, idque ferè in calidioribus, & siccioribus naturis. Quod si æger bis sudare nequeat, saltem manè assumpto decocto illo sudorem expectet, à meridie verò decoctum bibat absque sudoris superventu, ut saltem alterando hoc ipsum prolicet, corpusque disponat, quò insequente manè eò melius provocari possit sudor. Ubi sudor aliquandiu profluxit in æstuario, & æger haud amplius benè ferre queat, lecto calido immittatur, ibique sudor ulterius spontè fluere permittatur, hinc sudor probè abstergendus, & æ frigidus, quantum possibile, vitandus: mutanda autem sæpiùs lintamina illa aliaque imprægnata sudore, exlixivio acri probè eluenda, & acri libero exponenda, antequam denuò adhibeantur, ne iisdem denuò infectionem contrahat corpus, quod confirmat Hildanus *Cent. 5. observ. 95.* Continuandæ autem sudationes hæc, aut simplices aut duplices tamdiu, donec morbi malignitas victa, venenumq; correctum & exclusum fuerit: id quod omnium symptomatum, potissimum gonorrhææ & condylomatum, remotio ostendit, ultra quàm tamen aliquandiu adhuc sudatio continuanda venit, quousque quælibet vestigia, aut virulenti saltem odores, in corpore forsitan hinc inde hærentes, omnimodè & sine recidivæ metu discussi fuerint, adeoque subinde à 4. ad 6. septimanas cura hæc continuanda plus minus pro morbi vehementia, & sudorum emanantium copia.

Quod si autem contingat, sudorifera superius enarrata simul per urinam operari, ægerque difficiliùs sudet, ac urinam crassam cum sedimento multo & laudabili excernat, nullam sibi hinc difficultatem fingat Medicus, cum pleraque sudorifera diuresin simul excitare palàm sit: Imò in hoc casu intermixtis

(Mmm 3)

poten-



potentioribus diureticis ad urinarias vias virulentia Venerea urgeatur, viscidiori pituita, utpote cum lotio commodius excernenda, involuta, donec successu temporis ad habitum demum humores vergere constet: vid. Sylvii *l. 4. §. 250. & 254.*

Victus sit moderatus, potius siccus: v.g. in principio ex carnibus magis assatis quam coctis; in progressu parcior instituitur victus, aut si à meridie carnosius utatur, vesperti passulis aut similibus loco cœnæ sit contentus. Potus sit decoctum secundarium.

Quoad curam salivatoriam: in usu saltem est Mercurius, nunc vivus externè cum unguentis illitus, nunc præparatus pro usu interno. Casu primitus, ut plurima alia medicamenta, inventa fuit à chirurgis, quæ nunc ex instituto administratur in curatione luis Venereæ, aliisque chronicis morbis. Ex Arabum nempe monumentis didicere veteres, ad ulcera contumaciora maligna, ad gangrænâ declinantia, commendatum fuisse Mercurium: adhibuere ergo illum cum emplastris & unguentis in ulceribus Gallicis, hinc ex accidente & casu copiosa subsecuta est salivatio, & per hanc tam ulceris, quam ipsius primarii morbi, curatio: vid. Johannes Carpus Italus, Medicus Bononiensis, qui primo hæc lue Veneream curandi methodo multa milia scutatorum lucratus fuit. Mercurius dulcis quidem rarius pro usu salivatorio usurpatur, sed potius pro usu laxativo, utut continuatus diutius, aut etiam crebrior sublimatus, sicque fixior redditus, etiam salivationem satis fortem inferat. Et quidem non adeo inveteratum malum solo Mercurio dulci per purgationem sæpius repetitam, interpolitis subinde lignorum decoctis, curari potest, modo ferè, quem docet Hartmannus *in Praxi, ubi de Lue Venerea §. 5* sicut Rhodius *C. 3. obs. 84.* lue Veneream per Mercurium dulcem tantum sine decocto lignorum curatam refert. Notandum tamen, utut ab hujus usu dolores remittant, ulceraque coalescant, mox tamen recurrunt, & nova excitantur, modo salivatio imminuatur, aut cesset. Qui verò Mercurio dulci pro scopo salivatorio uti volunt, imitari possunt modum, qui docetur in Horstio *l. 7. obs. 12.* Vel

℞. *℞ii dulc. ʒi. ad ʒʒ.*

*Conf. rosar. violar. l. conf. al. cherm. ʒʒ.*

M. D. S.

**Blut-reinigender Purgier-Zucker.**

Singulis 8. diebus continuis exhibeatur horâ matutinâ, haustus prius aut post aliquot cochlearibus cerevisiæ calidæ.

Frequentissimè autem internè usurpatur arcanum corallinum, seu ꝥ præcipitatus rubens, si Mercurius cum nitro præparatur; sive fiat præcipitando, adeoque in via humida cum spiritu nitri, & quem Mercurium corallatum

vocat Schrœderus *in Pharm. de Mercurio no. 6.* Vel

℞. ~ *℞i*, ex *℞o* & alumine paratum: & in hoc solve ꝥum vivum benè purificatum, & abstrahendo spiritum denuo præcipitatus relinquatur, qui *v* probè edulcorandus.

De hoc 4. ad 5. grana dentur unâ vice, repetitis tamen dosibus, donec præterpropter ʒi. pondere assumptus fuerit, plus minus tamen, ac probè succedet salivatio.

Melior est hæc præparatio, quam præcipitatus cum spiritu, aut oleo vitrioli paratus, cum oleum vitrioli haud adeo separabile existat, metallicæ magis cum sit prolapiæ.

Sive fiat idem arcanum corallinum sublimando, adeoque in via sicca, cum nitro & vitriolo addito, & præter Crollium describitur in Schrœderi *Pharm. de Sublimatis Mercurii no. 8.*

Propinquantur hæc arcana corallina cum conserva rosarum, aut paucis Mercurio, pilulari formâ deglutienda. Mercurius dulcis verò, si pro salivationis magis quam purgationis scopo propinetur, cum vitello ovorum exhibeatur; quia sic facilius longè salivationem movet.

Quod si pro usu externo Mercurius vivus addatur unguentis, sumi solet ferè Mercurii vivi quadruplum aut triplum, aut dimidium, plus minus pro ætate & viribus ægri; item pro ratione morbi additur pinguedinibus & oleis convenientibus, ac invicem in unguenti formam rediguntur. Pinguedines inter primatum obtinet axungia porcina, loco cujus propter majorem vim anodynam etiam pinguedo humana recipi potest, quibus tertia vel quarta pars terebinthinæ additur. His, ceu primariis unguentorum Mercurialium ingredientibus, pro circumstantiarum ratione aut Medici intentione ꝥ. Natum salviæ, terebinthinæ, guajaci, rorismarini, ligni Rhodii, item spiritus vini additur; item à quibusdam unguentum Martiatum: qualia in convenientibus adduntur, in frigidis præsertim naturis, & quando viscidior veneni fomes est, & qui loco vix moveri aut dissolvi potest. Sufficiunt autem pro integra curatione ʒii ʒiv. vel v. Nam minus, quâ ʒi ad ʒv. & magis quàm vj. ad vij. ʒias vix licet assumere: pro circumstantiarum tamen ratione, & celeriore vel tardiore, copiosiore vel parciore salivatione superveniente, dosis limitari potest. Adsumantur autem de unguento pro singulo litu ʒij. ad ʒiij. prout plus vel minus imprægnatum fuerit. Formulam talis litus non inconcinnam videb. in Sennerto *l. c. pag. 202.*

℞. *℞ii vivi purif. ʒvi.*

*adip. suilli non saliti lbj.*

Extinguatur cum adipe suilla ꝥ, & exactè misceatur in mortario lapideo: Jam adde

*medull.*

medull. crur. bovis ℥℔.

terebinth. ℥ij.

℞. Oat. terebinth. ℥j.

lign. Guajac. ℥℔.

M. f. unguentum.

Vel ℞. ℞ii viri ℥v.

pingued. suill. non salita ℔j.

In mortario lapideo pistillo ligneo contundatur pinguedo, eique sensim misceatur ℞, donec planè sit absorptus: adde

mastic. pulveris. ℥j.

fol. salvia

rorismar. ā. ℥ij.

℞o laurin.

destill. terebinth. ā. ℥j.

pulp. pom. dulc. coct. & à cortice ac nucleis mund. no. ij.

M. per dimidiā horā in mortario ducendo.

Vel componatur unguentum ad imitationem Hildani Cent. 5. Observ. 95. Hujusmodi unguento inungantur plantæ pedum ac volæ manuum, in malo scilicet recente, hinc quoque tali, carpi, genuum, cubitorum & humeri flexuræ, interdum etiam regiones inguinum, quod si gravius aut pertinacius malum sit, aut salivatio non ritè succedat, etiam integra hæc membra, lumbi, & tandem tota spina dorsii, ab osse sacro ad cervicem ascendendo, inungenda. Tutiùs tamen procedunt, qui artuum flexuras, inguina & alas sufficienter fricant. Abdomen, pectus & caput non inungenda, aut rarissimè, propter gravia & periculosa nervosi generis, quæ ordinariò superveniunt, symptomata: saltem Zacutus Lusitanus lib. 2. Prax. Admir. Obs. 138. inunctionem capitis commendat, quando nempe hoc à causa morbifica magis gravetur, & omnia frustra tentata fuerint, exemplumque refert feliciter inuncti capitis. Post quartam vel quintam inunctionem ferè sequitur salivatio. Inunctio pro virium ratione nunc fit bis, manè & vespere, tribus primis diebus, assumpto priùs jusculo aut ovo sorbili; si salivatio verò non procedat, addere etiam diem quartum licebit: Quod si procedat, unica inunctio die quartâ sufficit. Quod si salivatio legitimè & liberaliter procedat, inunctionem remittere oportet; si verò non sufficiens, sed aut planè non, aut potiùs sputum moveri videamus, post diem unum intermissum iterum unâ vel alterâ inunctione excitetur: interdum inunctio saltem matutina sufficiens est. Instituatur autem hæc in loco calido, aut prope fornacem: quâvis inunctione peractâ membra linteis obvolvantur, & æger sublecto assumptò jusculo calidò post bihoriū, recubet probè tectus absque sudore, levis saltem madore, ut ita æius se poris benè insinuare queat; promovebitur enim sic multum salivatio. Et quidem si plura ista inungantur loca, sufficit saltem unica inunctio quotidie: Quod si verò solæ plantæ, aut secundum alios

saltem tali & genua inungantur, bis quotidie tres vel quatuor diebus inunctio continuanda venit.

Inunctiones hujusmodi ferè salivationem excitant, ut in principio subinde etiam diarrhœas torminosas inducant, imò interdum magis per alvum, quàm per os moveant, qualis diarrhœa non statim aut violenter sistenda, cum ferè perinde sit, an per glandulas salivales, an verò per glandulas pancreatis & intestinorū, æius evacuando operationem exerat?

Salivatio ipsa nunc in principio, nunc in progressu, promoveri potest per trochiscos sublinguales, aut pilulas majores, factas ex gummi tragacanthæ in ∇ rosarum solut. q. s. cum ℞ dulc. ℥j. Vel

℞. Mastic. ℥j.

℞ii dulc. ℥℔.

gumm. \*ci c. + sol. & insp. q. s.

F. Trochisci.

De quibus unum masticet per horæ quadrantem & ultrâ. Propter dentium tamen læsionem masticatoria ex Mercurio in praxi selectiore & tutiore magis exulcent.

Alii alias compositiones unguentorum habent pro cujuscvis laubitu. Suffituum cinnabarinorum pro salivatione excitanda mentionem haud faciam, cum eosdem plura symptomata secuta fuerint, ut ferè in desuetudinem abierint. Internè aliàs hoc modo penetrat, & efficaciter satis operatur æius, cujus rei exemplum curiosum refertur: nempe præbuerat pharmacopœus quidam viro robusto & juveni pulverem hydrargyri præparati rubicundum, quò ternis ex ordine vel peris dextri testiculi sarcoma nuper ortum suffumigandum censuit, corpore toto nudo, lodice saltem tecto: post secundi pulveris fumum haustum saliva fluere cœpit, sed pauca, largissima verò tertium excepit, ut aliquot pelves majusculas unâ die impleverit, satisque copiosè ita manarit. Uxor, quæ maritum lodicibus contexerat, vel per semestre spatium nullam sitim sensit, tantam liquoris aquei copiam continuo in ore habuit. Lodices quamvis spatio bienii quater quinquiesque sapone fuerint elotæ, & in sole siccata, nihilominus quoties lecto fuerunt instrata, salivam utrique conjugii denudò moverunt, ut eas prorsus abjicere coacti fuerint.

Potioris ergò usus sunt inunctiones æiales ultra dies tres vix continuandæ, semel aut bis in die, prout plus vel minus unguenti, aut plures vel pauciores artus ita tractantur, quarta præter propter salivatio expectanda, quâ imminente cessandum. Præmittatur autem evacuatio ventriculi aut primarum viarum vel per vomitus vel per secessus, ne excrementorū colluvies maligna angustias præcordiorū, suffocationes, aliaque symptomata excitet: vid. Hildanus C. 5. Obs. 92. & Riverius C. 1. Obs. 77. Imminentis salivationis indicium est, si alvus

alvus supprimatur, labia incipiant tumere, gingivæ vel tonsillæ, alixque in maxillis glandulæ, intumescere ac dolere, odor gravis & fœtidus ex ore exspirare incipiunt, quod tertio, quinto vel sexto ad summum die contingit: Quoties verò nil tale intra triduum eveniat, inunctionum usu denuo pergendum, donec prædicta signa, eorumque monstratus eventus salivatorius, superveniat. Hinc mirandus potius Massa, quam imitandus, qui *lib. 4. cap. 20.* quendam jamdum frustra inunctum per 37. dierum inunctionem (interpolatis quamvis vicibus) demum à lue Venerea liberavit: quorum etiam Paræus spectat, quando *de lue Venerea. l. 2.* die uno aut altero interjecto decies, quinquies & septies perfricto, convalescere perhibet, nisi quantum quidem intervalla interjecta concessa, segniorem minusque violentam reddiderunt salivationem. Audiendus potius Zacutus Lusitanus *Pr. Adm. T. 2. Obs. 135.* dum si per aliquot dies noctesque continuata inunctio, non salivationem, sed anxietates tantum, lipothymias, &c. movent, ab hac desistendum, & cum sudoriferis pergendum esse monet: quæ tamen symptomata neminem deterreant, modò salivatio sequatur, aut cum aliis, quæ hujus imminentis quasi indices & prodromi sunt, combinetur. Continuanda salivatio pro morbi & constitutionis ægri ratione: 20. dies ordinariè sufficiunt, interdum & ad quatuor septimanas continuare licet: in specie eò usque procedat salivatio, donec post salivam fluidiorem & tenuiorem, qualis primis diebus fluere solet, ultimo viscida, fœtida & glutinosa perquam materia ejiciatur, quæ muci spissioris formam fundum vasis petat, *wie zehet Leim* / aut parietibus ejus agglutinata hæreat; *deinde ist die rechte Grundsuppe.*

Sub salivationis cursu attendere oportet ad exulcerationes oris; propterea ut præcaveatur, convenit gargarismus ex lacte tepido, raparum decocto aut eorum succo: si verò perfectæ exulcerationes fiant, fiat gargarismus ex decocto Guajaci, plantaginis, &c. cum paucis aluminis & melle rosato; quo ipso etiam subinde exulcerationes cum penicillo tangantur. Si verò de alumine metus sit, ne sufflamine tur salivatio, ejus loco sal commune addatur, quod potius fluxum promovebit.

Istis temperantibus & mundificantibus etiam hæmorrhagia oris præcaveri potest; sit enim interdum, ut salivatione, si nimis excite tur, ex acrimonia succorum & impetuosiore eorum motu ingens hæmorrhagia oris excite tur.

Victu inter salivandum æger utatur parco & moderato: quò plus comedunt ægri, dum salivant, eò tardius curantur, cum non tam ros nutritivus solidarum partium acido vene-

reo infectus sub salivæ forma tunc prodeat, quam potius alimenta assumpta & in chylum digesta excernantur; utut, si paulò copiosior procedat salivatio, propter oris exulcerationem, dentium stuporem & vacillationem, gingivarum & linguæ erosionem, præcordiorum anxias molestias & nauseam, parum comedere queant ægri. Optima alimenta hîc sunt juscula ex pane bis cocto parata. Potus sit decoctum lignorum non adeò fortè aut solitarium, quod melius, aut saltem eodem probè cerevisia diluatur. A vino penitus est abstinendum; nam salivatio eò faciliè sistitur. Nil æquè hostile est salivantibus, quam frigus & acidum: illud in aëre ambiente & potu: hoc in assumptis. Utrumque mox salivationem imminuere, angustias præcordiorum inferre, & artuum musculorumque partium varia pathemata molesta inducere solet.

Accidit interdum contumax alvi obstructio: nam si præter panem bis coctum in jusculis, aut ovum sorbibile, nihil assumitur, corpusque prius benè evacuatum est, & copiosa salivatio sequitur, faciliè præsumere licet, alvum iri constipatum; In hoc autem casu alvus intacta relinquatur.

Quod si magis affatim & cum impetu præcipitari ad os materiam, periculumque subesse aut faucium atque gingivarum inflammationis nimix, aut totalis erosionis, aut suffocationis videmus, inhibenda est salivatio, & medicamento aliquo ad inferiora per secessum erit ducenda, aut enemate injecto evacuanda, & os gargarismate nocte dieque sæpius ablucendum; item vesicatoria blanda, aut similia epispastica, variis in locis applicanda: in specie omne hîc punctum complent opiata internè exhibita. Aurum etiam singulari amicitia Mercurium ex corpore evacuat, & ita salivationem sistit. Applicatur affricando externè, vel in ore detinetur, detentum albescit ex attracto Mercurio, injicitur igni, depuratur, & iterum in os immittitur.

Quod si crebrius licet factis inunctionibus tamen non sequatur salivatio, sed ex Mercurio, partes internas afficiente, sequantur plura tetra aut gravia symptomata, cum reperiantur certæ quædam horum crases, quæ Mercurii vim salivatoriam aut eludunt, aut non suscipiunt; In tali casu, dubiæ alex pleno, aut sudoribus repetitis virulentia per Mercurium inunctum inducta, correctæ unâ cum Mercurio ejicienda, ad imitationem Zacuti Lusitani *lib. 2. Prax. Admir. observ. 135.* Cum interdum salivationem cessantem ex humorum ineptitudine sudor promoveat, id quod notabili observatione docet Schraderus *pag. 229.* aut per vomitorium ex Mercurio vitæ in largiore dosi symptomata præcordiorum removenda, interea inunctionibus repetitis continuan-



nuandum, ut salivationis defectus compen-  
setur frictionum crebritate, donec intensibi-  
li transpiratione virus pederentim evanescat,  
ad imitationem notatu dignissimi casus Hor-  
stii *lib. 11. observ. 14.* Quò etiam facit sin-  
gularis Riverii *Observatio* de horrendis ptya-  
lismis sub incipiente ptyalismo ex inunctio-  
nibus Mercurialibus natis, aliis irritis, vo-  
mitorio curatis, *C. 1. observ. 77.*

Observandum autem probè, quare non  
succedat salivatio, ac unde ista symptomata  
supervenientia? an contentorum viscidorum  
immobilitate, & circa præcordia stagnatione?  
(nam per mercurialem salivationem ex peri-  
pheria & artubus ad centrum moventur con-  
tenta maligna; sicuti econtrà per sudores ex  
centro ad periheriam eadem distribuuntur)  
an verò ex viriù ægri debilitate salivatio non  
procedat? necesse enim est, ut ægri salivandi  
habeant adhuc vires utcunque firmas; nam  
salivando ordinariò debilitantur. Quod si  
nimis reddantur debiles, cessare, aut saltem  
admodum imminui solet fluxus spirituum  
debilitate, non ritè commotis ac circulatis  
humoribus; unde redeuntibus viribus tubin-  
de repetere aliquo modo, sed imminutè, so-  
let fluxus. Ægri tales inuncti, sed in qui-  
bus ex virium defectu nimis citò cessat sali-  
vatio, sin post laxatam alvum & aliquot die-  
rum moram æquè debiles persistant, fit hoc  
ex Mercurio intus adhuc delitescente, hinc  
progressus fit ad sudorifera, successivè tamen.  
Nam talium usu redeunt vires, ægri saltem  
mox meliùs exinde habere observantur. Cu-  
riosum est, quod venereis talibus, quibus post  
salivationem peractam, sed non sufficienter,  
ob virium imbecillitatem absolutam, propi-  
nantur sudorifera, ab horum usu cum omnia  
symptomata Venereà antea apparuerint qui-  
era, denuò dolores artuum redire solent, a-  
cido viscido à Mercurio soluto, & cum fluidis  
corporis denuò unito, sed non excreto,  
sudoriferorum vi ad extimos artus horumq;  
loca nervèa secreto; quæ non nisi repetitis  
sudoriferis, applicando simul levem litum  
Mercurialem, vel imponendo simul empla-  
strum de ranis cum gïo, iisque repetitis, cu-  
rari possunt, nisi recollectis viribus denuò sa-  
livationem instituere velimus. Probè tamen  
hoc in casu attendere oportet: an vires de-  
ficient? quia sunt resolutæ seu exhaustæ; nam  
de his hætenus dicta intelligenda; an verò  
sint oppressæ ex malignitate per Mercurium  
commotæ? nam de his intelligendi sunt ca-  
sus isti ex Horstio, Riverio, &c. allegati.

Quod si symptomata quædam ex saliva-  
tione à gïi malignitate nervis inimicissima,  
aut non sufficiente ejus expulsionem, relicta  
fuerint, præter remedia solaria, tam internè  
quàm externè adhibita, convenit in specie  
decoctum guajaci, de quo vid. Thiermaye-  
rus *l. 2. Conf. pag. 149.* sicuti de remediis so-  
Tom. 11.

laribus, tam internè adhibitis, quàm externè  
litus formâ applicatis, pro corrigenda gïi ma-  
lignitate: conf. in specie Zacutus Lusitanus *in*  
*l. 2. Prax. Admir. observ. 134.* item Riverius  
*Cent. 2. observ. 91. & observat. 13. commun.* à  
Jacotio, ubi cephalalgia diuturna, post cura-  
tam per Mercurii litum luem Veneream re-  
sidua, ex Mercurii malignitate nata per num-  
mum aureum in ore detentum fuit curata;  
aurum enim Mercurium allicie, & ita è cor-  
pore secum rapit. Commendatur etiam ab  
Hæchstedtero *Decur. 3. pag. 231.* decoctum  
helenii & fœniculi, expectando sudorem.

Mercurius scorbutus est hostilis & inimicus;  
illis præsertim, qui ex scorbutico gingivarum  
& oris ulcerationibus sunt obnoxii. Dubius  
propterea fui, an, quibus copiosa quasi saliva  
scorbutica urinas imprægnant, utque quoad  
cætera parum de scorbutico perceperint, tuto  
salivatio possit institui, metuendo dentium,  
faucium & gingivarum pathemata? sed tali-  
bus non nocuisse observavi? Imò fauces an-  
cillæ, luis Venereæ contagio inquinatæ, cum  
talibus urinis amplo foramine, ex lue propè  
uvulam exulcerato, salivando meliùs habuit;  
& admotione unguenti Ægyptiaci cum mel-  
le rosato curatum fuit ulcus.

Quod si gravida lue Venereà infecta fue-  
rit, etiam hæc ipsa, modò alià respondeant,  
præsertim vires, salivatione tractati potest;  
cum sic simul & fœtus sanetur, qui alias simi-  
liter infectus prodiret. Exemplà videb. in  
Hildano *C. 5. Cur. 97. & 98.* item, Viardel  
*in Anmerkungen de Partu p. 93.* item Mau-  
riceau de morbis mulierum, item Sarthez  
*in Observ. pag. 377.* ubi refert mulierem lue  
Venereà laborantem, fortissimis inunctioni-  
bus Mercurialibus usam & curatam, paulò  
post puerum sanum peperisse: Conf. Botal-  
lus de lue Venerea: sicut etiam infantes per  
Mercurium, tam foris illitum quàm intus pro-  
pinatum, nunc saltem purgando, nunc sali-  
vando, à lue hac liberari possunt. Quoad us-  
um illinitionis, & hanc secutam salivatio-  
nem, vid. Botallus *de lue Venereà p. 546.* Quoad  
usum Mercurii internum, vid. Horstius *lib.*  
*7. observ. 11.* qui refert puellum sex mensium  
toto corpore, & imprimis circa podicem, à  
lue Venerea pustulosum, per repetitum usum  
Mercurii dulcis ad ʒss & ʒi nato lignorum  
curatum: sic Faber luem Veneream in infan-  
tulo unius anni per repetitam Mercurii dulcis  
solaris dosin curavit *Cur. 39.* item Riverius  
*Cent. 1. Observ. 95. & Cent. 2. Observ. 94.* Lu-  
em Veneream in puero per Mercurium dul-  
cem & decoctum lignorum curavit. Suspe-  
ctum tamen in pusionibus litum thieritò ha-  
bet Ballonius: vid. Bonetti *Pharm. pag. 650.*

Cæterum antequam vel sudatoria ista, vel  
hæc salvatoria cura instituitur, priùs scruten-  
tur viscera lue Venereà infectorum, an ad-

(Nnn)

huc

huc robusta? an simul infecta? nam si hæc jam fuerint suppurata, perperam instituitur, cum mors magis acceleraretur. Probè etiam examinanda sunt ossa carie jamjam infecta; si enim hæc ossa secundi paris maxillæ inferioris, vel ossa inferiorem oculi cantum constituentia, item ossa cranii, cariosa fuerint, à salivatione est abstinendum, aut ægroto prius id indicandum, & in animū inducendum: utrum oculum amittere? an verò lue Venereâ ulterius infectus esse mallet? dictis enim ossibus oculorum cariosis & separatis, oculus ut plurimum amittitur. Si ossa cranii sint cariosa, salivatione simplici negotium non succedit, sed pericranii apertura necessaria est, quo partes cariosæ aliæque festucæ separatæ eximi possint: id quod sine cruciatibus summis peragi non potest. Ulterius ossa palati, septum narium, imò ipsa etiam nasi ossa, multoties pereunt; hæc enim jamjam arrosa in juncturis suis non faciliè con- crescent, nec ulcus sanatur, priusquam omnes particulæ arrosæ separatæ & semotæ fuerint. Hinc nonnunquam post salivationem & curationem vox cum loquela, & facies etiam dehonestatur, quorum omnium ægrotantes prius benè sunt monendi.

His itaque præmissis, prius corpus ritè præparandum venit, & primæ viæ mundificandæ, tam per superiora, si circumstantiæ permiserint, quàm per inferiora; quia aliàs vel medicamentorum potentiam eludunt congestæ ibidem sordes, vel commotæ ab iisdem gravia præcordiorum & abdominis symptomata, in specie anxietates, inferunt, quod in specie fit à Mercurio, si universalia ista aliquoties non fuerint præmissa.

Venæsectio, quam quidam præmittunt chirurgi, penitus est frustranea; benè autem digestiva & præparantia, i. e. succorum corporis vitalium dyscrasiam corrigentia, ex tartaro vitriolato, terra foliata tartari, sale absinthii, lapidibus cancrorum, sale volatili viperarum, elixyr proprietatis sine acido, R ʒii tartarificata, R ʒi composita, R coralliorum sassafrata, essentia fumarizæ, &c. pro circumstantiarum ratione præmitti, & hinc purgatio una alterave institui potest; aut certè purgantibus talia digestiva admiscenda, præcipuè si per epicrasin evacuare animus sit, nunquam negligendo specifica.

Quod si peracta sit salivatio, præmissa per alvum purgatione blandâ procedatur adhuc eo ordine, quem docet Hartmannus §. 38. v. g.

℞. Ligni Guajaci lbj.  
cort. ejusd. ʒvj.

Infunde in

▽ comm. lbvij.

Macerentur non tam 24. quàm potius 48.

horas, ut vult Lindanus: Coqu. ad medieta- tem. D.

Magmati relicto affunde denuò

▽ simpl. lbxij. ad xv. l. xvj.

& aliquantum coque, circa finem addendo rad. liquirit. ʒiij.

passul. min. cont. ʒiij.

factæ colaturæ adhuc tepidæ adde cinnamom. acut. ʒiij.

F. Bocchetum: S.

Ordinar. Transf.

Priori decocto utatur ad ʒiv. vel v. pro su- dore manè eliciendo; posteriori verò pro potu ordinario: quo nimirum, si particulæ malignæ in massa sanguinea nova concre- rent, ex mox eliminantur.

Probè etiam est notandum, quod peractâ salivatione omnis amictus, unâ cum lectulis ægrotantium, sit innovandus, ne miasmata pristina instar novi fermenti maligni in mas- sam sanguineam subeant.

Pro scopo purgandi Mercurialia primum obtinent, utpote quibus ritè præparatis nul- lum præstantius in hoc morbo remedium exi- stit; vid. Horstius lib. 2. observ. 5. v. g. Mer- curius dulcis, qui reliquis faciliè palmam præ- ripit, annotante Sylvio de lue Venerea §. 257. arcanum corallinum, de quo pariter vid. Syl- vius l. 4. §. 283. Mercurius cum Venere præ- cipitatus, item Mercurius præcipitatus albus, quem Riverius Observation. Commun. pagin. 321. 337. & 346. commendat. His non im- merito addenda colocynthis, de qua vid. Sylvius §. 252. v. g.

℞. Extract. cathol. l. panch. Croll.

MP. coch. min. a gr. xij.

ʒi dulc. gr. xv. ad ʒj.

Extracti troch. alb. l. mag. jalapp.  
gr. j. l. ij. l. iij.

ʒo Stat. lign. Guaj. l. terebinth. gr. ij.

c. f. q. essent. lignorum, l. ligni sancti, f.  
Pilula.

D. S.

Blut-reinigende Pillen auff einmahl.

℞. ʒii dulc. ʒj.

scamm. ʒat. ʒß.

M. f. Pulvis.

℞. Spec. dia-turb. c. rhabarb. ʒj.

scamm. ʒat. gr. vj.

troch. al hand. gr. j.

M. f. Pulvis.

℞. Conserv. fumar. ʒiij.

pulv. cathol purg. ʒj.

ʒii dulc. gr. xij.

c. conf. fum. f. Bolus.

D. S.

Purgier-Zucker auff einmahl.

℞. Pulp.

℞. *Pulp. passal.* ʒj. l. ʒij.  
*ʒii dulc.* gr. xij. ad xv.  
*scamm.* ʒat. gr. iij. ad v. M.  
 ℞. *Conf. fumar.* ʒj.  
*mag jalapp.*  
*scamm.* ʒat. ʒ gr. vi.  
*turbith. miner.* gr. jv. M.

Observandum autem quoad purgantia talia, quod ubi lues Venerea adhuc est in fieri, & genitalia saltem occupet, ut in gonorrhœa, bubonibus, &c. quod tunc vel unica talis præmissa purgatio sufficiat: vid. Platerus *Pr. Tum.* 3. pag. 420. ne virus commotum ad loca interiora, occasione irritationis in primis viis factæ, commoveatur, & in specie buboni sub purgatione tali emplastrum, ut vocant, attrahens, seu ex gummatibus acrius vel siccans admovendum. Quod si lues sit inveterata, & in externis præcipue partibus hæreat, non temerè purgantibus fortioribus aut repetitis materia peccans intrò revocanda, sed unâ alterâve tantum præmissâ ad ipsam curam accedendum. Potius ergo in lue nondum adeò confirmata, & ejus inquinamenta adhuc maximam partem fluida corporis occupant, purgatio repetita & fortior, addito Mercurio instituenda. Sub ipsa salivatione, nisi sit nimia, à purgatione penitus abstinendum, nec sub sudationis cursu eadem adeò convenit; benè autem finitâ salivatione & sudatione unâ alterâve vice institui potest, si necessarium videatur; sicut ante salivationem vomitus proficius est, à quo salivatio sequitur facilius: interdum tamen, si symptomata & indicationes promiscua fuerint, qualibet quartâ vel quintâ die sub sudatione purgatio institui, aut ipso decocto sudorifero purgans quoddam, præsertim colocynthidis, incoqui potest, ut ubique, quorsum natura vergit, succurramus. Si vel à morbo ipso, vel à purgantium frequentiore usu exciteretur dolor, his unum vel alterum granum laudani opii admiscere conveniet. Si purgationes per Mercurialia institutas & frequentius repetitas salivatio sequatur, à catharsi ulteriore desistendum, hæcque vel permittenda, si sufficiens fuerit, vel juvanda, quod tamen primis quatuor diebus, utut salivatio compareat, non attendendum.

Quoad vomitoria: horum assumptionem indicant

1. Ventriculi cruditates, atque sordes eliminandæ.
2. Excrementorum colluvies maligna à salivantibus magis aut simul ad ventriculum commota, atque in hoc molestias, aut anxietates excitans: qualem casum Riverius *Cent.* 1. *Observ.* 77. refert.

Præter dicta hætenus remedia commodè etiam alia usurpantur; ut quando sudorifero  
 Tom. II.

ris decoctis vel salia volatilia & spiritus urinosi, vel essentia lignorum, vel sulphur auratum diaphoreticum secundum Horstium, vel spiritus theriacalis camphoratus, vel mixtura simplex, vel ipsa theriaca, permiscantur, vel hæc & similia tempore meridiano & vespertino à sudoribus vacuo propinantur, aut etiam ante & post salivationem exhibentur: quò etiam cinnabarina remedia, viperina, & diaphoreticum, cerussa ʒii, extractum ligni sancti cum sale volatili mistum, rob juniperi aut sambuci, olea Nata lignorum, & similia polychresta, & ex his composita pertinent, v. g. electuarius massæ, quod pulvis subtilissimus ligni guajaci, & syrupus de fumaria ingreditur: Aut

℞. *Rasur. ligni guajaci* ʒj. l. ʒiv.  
*ʒii diaph.* ʒj.  
 ⊖ *vol. C.C. l. viperar.* gr. xij.  
 M. pro 2. dosibus: S.

**Blut-reinigendes Schweiß-Pulver.**

℞. *Ceruss. ʒial.* l. ʒii *diaph.* ʒj.  
*cinnab.* ʒii ʒß.  
 ⊖ *volat. C.C. l. viperar.* gr. xv.  
 M. f. *Pulvis*, pro 3. dosibus.  
 ℞. *Mixt. simpl.* ʒij.  
 ~ *ligni Guajaci,*  
*sassifr.* ʒ ʒj.  
 M. D. S.

**Blutreinigende Schweiß-Mixtur.**

Dosis 40. ad 60. guttas. Aut  
 ℞. *Ess. lignor.* ʒß.  
*viperar.* ʒij.  
 M. S. ut antè.

Quod si vel malum sit levius, & spes sit, idem facile curari posse, vel æger tam strictæ curæ se subicere nolit, sequentia aliquoties plus minùs proficua observata fuerunt:

℞. *Cort. ligni sancti* ʒßß.  
*rad. sarsaparill.* ʒiv.  
*fol. senn. s. st.* ʒißß.  
*rad. liquirit.*  
*belleb. nigri* ʒ ʒj.  
*pulp. colocynth.* ʒj.

Incis. & contul. infunde in  
*vini*  
*cerevis.* ʒ Mens. iij.

Coqu. in lagena stannea, vel in cucurbita probè clausa in MB. per 5. vel 6. horas:

Colaturæ adde  
*Mithridat.* ʒij. l. iij.  
 D. S.

**Größnender Alterativ-Trank.**

De quo bibat æger bis in die 3. vel 4. ʒias, manè & vespri aliquot horas ante cœnam, viscida mucaginosa cum euphoria evacuat.

Cum hoc decocto purgante æger omni tertîâ, vel quartâ die usurpet hoc sudoriferum:

℞. *Rad. sarsaparill.* ʒvj.  
*ligni sancti* ʒßj.

(Nnn 2)

cors.



*cort. ligni sancti* ℥iv.

*ligni sassafr.*

*rad. china*

*liquirit.* ʒij.

*hermaetil.*

*sem. anisi* ʒj.

Infundantur & coquant. in

▽ *commun.* Mens. x.

Ad remanentiam Mens. vi.

Colatura detur pro potu sudorifero.

Ex utriusque decocti remanentia etiam decoctum secundarium fieri potest, quod usurpatur unà cum illis.

In decocto sudorifero, si placeat, cuilibet haustui pro excitando sudore simul permisceri potest.

℞. *Q. E. Matth.* ʒß.

~ *theriac.* ʒj.

*elysi* ʒij ʒß.

~ *ligni Guajaci* ʒij.

Misceantur pro dosi: S.

**Blut-reinigende Mixtur.**

Pergendum jam ad curam particularem symptomatum, in quibus se offert.

## I. GONORRHOEA GALLICA.

Aliàs virulenta dicta, item maligna, est: quæ saltem illa, quæ ex coitu impuro cum femina lue Gallicæ infecta contrahitur, effluit in hoc cum acerbo dolore circa penis radicem, ubi sunt prostatae glandulosæ, primo seminalis aquosus liquor, qui hinc successivè flavescit, tum citrinescit, & magis acrescit, tandem viridescit aut cœrulecit, imò subinde purulentia permiscetur, non raro graviter foetet. Talis gonorrhœa interdum adeò acris est, ut nunc prostatas glandulosas, nunc meatum urinarium corrodat & exulceret, ex quibus ulcusculis succrescit postmodum caro præternaturalis instar cujusdam verrucæ, quæ canalem urethræ tandem obstruendo urinæ excretionem impedit, & vulgò caruncula meatûs urinarii vel penis appellatur.

## CAUSA.

Causa hujus gonorrhœæ est simplex contagium fermentativum Venereum per coitum ex muliere infecta, & quæ ulcera Gallica plus minus in vagina uteri habet, haustum. Malum enim prolificum est hæc ipsa gonorrhœa Gallica, adeò ut referat Ballo-  
nius *L. 1. Conf. 9.* de quodam viro, qui ex coitu impuro gonorrhœam virulentam contraxit; unde postmodum non tantum propriam uxorem inquinavit, sed cum eadem filium quoque generavit, mox à primo ortu eodem malo affectum.

## PARS AFFECTA.

Subjectum sunt eadem prostatae glandulosæ (ratio enim ulterius repit, ut etiam ipsos

testes arripiat) id quod confirmat experientia anatomica, vid. Bonettus *Anat. Pr. l. 3. S. 31. observ. 5.* Spigelius *de Humani Corp. Fabr. l. 8. c. 17.* Bartholinus *Anat. Reform. l. 1. c. 23. & l. 2. Histor. Anat. 36.* unde etiam tali gonorrhœa infecti urinam emissuri acerbissimum dolorem in radice penis, ubi istæ prostatae sitæ sunt, imprimis percipere solent: id quod signum nunc tuinescit, nunc exco-  
riatæ vel exulceratæ prostatae glandosæ esse solet. Nam dum in coitu intensius incallescunt partes genitales, tunc ulcuscula Gallica vaginæ uterinæ exhalant & expirant miasmata fermentativa acria, quæ post excretum semen virile se insinuant in urethram penis, ibique se affigunt, & per meatus adhuc patulos in prostatas glandosas se insinuant, & fermentatione corruptivâ inquinant ibidem lympham seu liquorem elaborandum & secernendum, eumque in acrimoniam acidam corrosivam malignam, qualis in lue Gallica prædominatur, corrumpunt. Unde postmodum exinde talis succus acris acidus corruptivus profluens non tantum in similia ulcera corrodit has prostatas, sed etiam meatum urinarium & præputium excoriat, unde saniei foetidæ & ulcerosæ aut ichorosæ continuus profluent, atque quidem dolorosus, & tam dira & atrocitas ac dolorifica symptomata oriuntur, qui fluxus gonorrhœæ virulentæ seu Gallicæ nomine venire solet, fluxus Ludovicianus vocatus aliàs. Promotum ulterius & altius serpens contagium, ita ut per vasa deferentia testes ingrediatur, horum tumorem & dolorificam inflammationem infert.

## DIAGNOSIS.

Diagnosis hujus gonorrhœæ ex primò dicta historia est clara.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: observandum, quod gonorrhœa hæc in principio leve malum sit; quò citius ipsi occurritur, eò facilius curatur.

In senibus ut plurimum ad mortem terminatur.

Nisi brevi isti occurratur, in progressu excoriat glandulas, & quandoque absumit.

Interdum non ritè curata, sed saltem oppressa, ulterius serpit, & testes inquinat, in quibus tumores, & subinde bubones infert.

Tandem ipse perfectam luem Veneream terminari solet, fermento maligno successivè partes vicinas, & cum sanguine universum corpus tandem inficiente, & ita perfectum Gallicum morbum inferente.

Optimè notandum est, frequentius supervenire bubones glandularum in inguinibus, quod malum est; si enim hoc fiat, certum est, universum corpus correptum esse; malum etiam signum est, si spontè iterum dispareant.

## CURA.

C U R A.

Quod attinet Curam: in hac fermentum illud Gallicum virulentum appropriatis, partim Mercurialibus, partim acidum corrigentibus, destruendum, & quâ datâ portâ, speciatim sudores & vias urinarias, ex corpore & massa sanguinea evacuandum, remediis aliis addendo semen violarum, lapides cancrorum, radices & ligna superius nominata, utpote, præter vim specificam atque sudoriferam, diureticam pariter habentia. Hinc partes læsæ balsamicis abstergantur & consolidentur.

Alia autem instituitur cura, si fluxus hic principium morbi existat, nec ab ipsâ adhuc infecta sit massa sanguinea; alia si eadem simul contaminata, & lues Venerea universalis magis jam tùm juncta fuerit. Quippe in priori casu ante omnia pro ulcere prostarum & vesicularum seminalium mundificando humor acris contemperetur & corrigatur per emulsiões in gonorrhœa alias conſuetas; præprimis ex semine cannabis paratas, os sepiæ, succinum, terebinthinam, hujus oleum, & balsamum Indicum, si verò reliquis luis Venereæ symptomatis gonorrhœa superveniat, aut hujus virulentia massa sanguinea jam tùm notabiliter inquinata fuerit, univèrsali cura opus erit.

Quod si cui lubeat se præservare ab hac gonorrhœa, quem nempe Venus vexat, interim tamen non certus esse potest, an cum infecta coëat? is præſervationis loco mox ante aut post coitum assumat spiritus seu olei terebinthinæ guttas vj. vij. vel viij. in haustu vini generosi: hujus enim sal volatile oleosum meatum urinarium abstergit, ac corrigit contagium virulentum forsitan haustum.

Quod si verò quis jam affectus sit hoc malo, & laboret gonorrhœâ, ante omnia purificetur corpus per univèrsalia purgantia, Mercurialibus sociata: v.g. fiant pilulæ ex extracto hellebori nigri, aut ex extracto catholico Andernaci, aut panchymagogo Crollii, cum ana Mercurii dulcis: His pro stimulo addantur aliquot grana extracti trochiscorum alhandal; colocynthidis enim efficacia mirè commendata est ab Helmontio in cura luis Venereæ, prælata usibus lignorum.

Convenit loco Mercurii dulcis, Mercurius præcipitatus viridis Venereus cum calce viva paratus, qui hîc est specificus; ast usus hujus Mercurii præcipitati viridis primitus quidem videtur augere malum, sed bonum est signum; si enim continuatur, tandem cessat: e. g.

℞. Extr. panchym. Croll. l. cathol. gr. xv.  
 ℞. ti virid. gr. v. l. vj.

extract. troch. al-hand. gr. ij.

c. essent. lign. f. Pilula: S.

Blut-reinigende Pillen.

Aut Pilulis de terebinthina, vel terebinthinæ coctæ misceatur Mercurius dulcis, e. g.

℞. Terebinth. opt. 3j.

℞. ii dulc.

℞. sis sepiæ præp. ā 3℞.

c. 80 Qato succini pro 3. dosibus.

f. Pilula.

Non tantum laxant, sed & gonorrhœam respiciunt. Vel fiat Bolus ex terebinthina Cypria cum rhabbaro ac Mercuriali remedio, vel dulci, vel alio, in subjectis fortioribus:

℞. Turbith. miner. Crollii gr. vj. l. viij.

c. f. q. conserv. rosar. l. alio appropr. f. Bolus.

D. S.

Blut-reinigender Zucker.

Vid. Sydenham in Epist. Respons. 2. de lue Venerea pag. 76.

Evacuato ita corpore cum ℞io dulci, sive semel, sive repetitis vicibus, præ cæteris conveniunt balsamica appropriata, dicta loca abstergentia: inter quæ eminet terebinthina, 80 Natum terebinthinæ, in specie balsamus sulphuris terebinthinatus ad guttas xij l. xv. ad xx. bis quotidie assumptus; aut juniperinus. Continuetur aliquamdiu. His ipsis commodè subjungatur ∇ Quercetani contra gonorrhœam virulentam, quam se centies expertum esse gloriatur: Videatur etiam Scultetus in Armam. Chirurg. observat. 79. Loco hujus balsamus Saturni terebinthinatus, ex saccharo Saturni & 80eo terebinthinæ blando igne paratus, vid. in Zvvelſero in Mantissa Hermet. ubi de Saturno; egregiè conducit, ubi ardor nimius circa renes & genitalia jungitur, vel solus, vel mistus cum 80eo juniperi, additâ camphorâ; non absumendo semen, ut vulgò putatur, sed absorbendo acidum vitiosum in hac gonorrhœa peccans: qua ratione etiam camphora conducit, non quod castræt per nares, ut putant, sed tanquam sal volatile oleosum detergit & corrigit acidum Venereum; Vel

℞. 80 terebinth. 3ij.

camph. ʒi.

sacch. hni 3℞.

M. D. S.

Blut-reinigender Balsam.

Item tinctura antiphthisica ardores renum post gonorrhœam optimè compescit: Vel

℞. Off. sep. præp. 3j.

sacch. hni 3℞.

M. pro tribus dosibus.

Juxta hæc convenit extractum tormentillæ cum hni saccharo, & 80eo Qato terebinthinæ in formam pilularum redactum, v. g.

℞. Extract. tormentill. ʒj.

sacch. hni 3℞.

camph. ʒij.

c. f. q. 80 Nat. tereb. f. Pilula.

Item conveniunt pilulæ de terebinthina contra gonorrhœam Zvvelſeri in Pharm. Reg. p. 70

(Nna 3)

Hilce

Hiscæ addatur infusum cantharidum in vino, quod expertum est remedium cujusdam Medici Belgæ; quatenus cantharides acerrimo sale volatili abundant. Bartholinus *Cent. 5. Epist. 54. & 55. pag. 343. & Hist. Anat. Cent. 5. Observ. 82.* decocta lignorum, essentias aut extracta lignorum, ceu per se nota, & ad lue[m] Veneream & ejus prodromum gonorrhœam, commendatissima sicco pede prætereo. Tinctura coralliorum cum spiritu lignorum parata est egregia, sed crebrius usurpanda. Resina ligni guajaci expertissimum est remedium ad hanc gonorrhœam, item essentia ac extractum guajaci cum R. *℞il. ~u vini ℞lato paratum, in ∇ plantag.* subinde propinatum, summum etiam specificum est in hoc casu; nam in resina hac perfecta consistit cura gonorrhœæ malignæ. Aliàs etiam balsamus de Peru ad aliquot guttas assumptus, vel, qui omnium est præstantissimus & longè excellentior balsamus de Capaibe, præter usum externum chirurgicum, ex fida Belgarum experientia specificum est remedium in gonorrhœa virulenta, uti etiam stranguria, à guttis ij. iij. ad v. vj. l. viij. in vitello ovi dissolutus, vel cum saccharo in forma pulveris assumptus, & fuit experimentum Lindani: aut ejusdem cum V *℞lato parata essentia in quavis gonorrhœa est proficua.* Antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale & Martiale & similia laudantur; item succum limonum cum spiritu terebinthinæ & camphorâ ex Fabro jam propositi; uti hujus experimentum videre est in Sculteto *Observ. 79. Armam. Chirurg. cit. loc.* singulare cujusdam Medici experimentum est ∇ Mercurialis vel Hermetica; qui recipit *℞ vivum, coquit in ∇ simplici per aliquot horas, decantat aquam, & remanet Mercurius in eodem planè pondere, quo fuerat ante ebullitionem; hinc aquam istam propinat aliquandiu manè & vesperti bonum haustum, & est egregium remedium, quò successivè sedatur gonorrhœa virulenta.*

In Bartholino refertur cura gonorrhœæ virulentæ per pulverem sympatheticum, id quod eatenus verum est, quatenus eò processit exulceratio prostatarum, ut corrolis vasis sanguis quoque effluat; unde talis sanguis purulentus quoque effluens pulvere sympathetico satis notò exceptus in distans curavit gonorrhœam.

Quod si fiat exulceratio in prostaticis glandulis, indeque dolor & ulcus in meatu urinario, tunc conducunt injectiones per siphonem in penem, quæ fiunt ex succo plantaginis cum melle rosato, quæ diluuntur cum aquis appropriatis; vel injicitur liquor ex stercore gallinæ, quem Hartmannus pag. 264. in vesicæ ulcere commendat: aut parentur injectiones ex  $\nabla$  calcis vivæ, in qua ebulliant

summitates hyperici, flores meliloti & ver-  
basci; aloë, melle & Mercurio dulci, & si-  
milibus.

Quod si præputium insigniter tumore ferè inflammatorio cum phimosi afficiatur, convenit phlegma vitrioli insipidum ferè cum linreis multiplicatis applicare : vel aqua calcis vivæ cum saccharo Saturni quovis modo applicari potest. Quod si insignis dolor ardens adsit, camphora in oleo amygdalarum dulcium soluta egregia est.

Quod si tumor præputii flatulentus plus minus serosus adsit cum *σφαιρίωμα*:

℞. ▽ calc. viv. ℞j.  
in qua ebulliant  
fl. chamomill.  
sambuci ā M. j.  
fol. hyoscyam. M℞.  
sem. anisi.  
fœnic. ā ʒij.  
bacc. lauri ʒij. ad ʒvj.

Coletur, cum qua foimentetur pars affecta.

Quod si suspicio sit, longius progressum fuisse, & jam massam sanguineam nonnihil contraxisse inquinamenti, instituat<sup>ur</sup> cura aliqualis sudorifera per decocta lignorum, omni matutino tempore ad aliquot uncias assumenda, expectando sudorem, idque ad aliquot dies noctesque continuando: quorum loco etiam in leviori malo essentia lignorum, R coralliorum cum spiritu lignorum, &c. aliquandiu usurpari possunt: Vel

R. HB. agrimon.  
 fumar. ā M.).  
 ras. lign. sanct.  
 sassafr.  
 rad. sarsapar. ā 3vj.  
 sem. coriandr. ʒij.

Incis. & contus. infund. in  $\nabla$  *simpl.* per  $\rho\rho$ :  
mane coqu. ad tertiam, circa finem addendo

HB. cochlear. M. j.  
passul. min. contus. 5j.

Colatur. Rñj. addatur.

*Syr. scelotyrb. Forest. q. l.*  
M. D. S.

Blut-reinigender Trank.

Vel R. ▽ card. bened.  
fumar. ā ʒiʒ.  
essent. ligni guajaci ʒi.  
theriac. ʒʒ.  
camphor. gr. vj.  
syr. scelotyrb. Forest. ʒvj.  
M. D. S.

Blut-reinigende Mirtur Löffel-weise.

## II. FLUOR MULIEBRIS GALLICUS,

A contagio maligno Gallico oriundus, & exulcerationem cujusdam partis internæ, aut in vagina, aut in orificio uteri, aut prostaticis gland.



### DIAGNOSIS.

### PROGNOSIS.

CUR A.

### III. BUBONES.

D. S.

**Erweichend Pflaster.**

M. f. Emplastrum, malax. c. 30. ʒi fort. Qui-

Quibus etiam magnes arsenicalis addi potest, de quo vid. Sala in *Annat. Vir. Tr.* 2. p. 385. & 386. nec non Barbette *Tr. de Peste* p. 247. item emplastrum descriptum à Sennerio, ubi de *lue Venerea*, pag. 214. vel emplastrum magneticum Angeli Salæ secundum descriptionem Hoffmanni. His ipsis, modo protuberare magis incipiat bubo, nonnihil emollire sufficit; non opus enim est perfectam, quæ rarò, aut nunquam fit, expectare suppurationem, sed tunc aperiatur maturè apertione largâ, & tractetur ad modum reliquorum bubonum.

Quod si verò simul cancerialiaque symptomata concurrant, à suppurantibus abstinendum, & purgantibus potiùs materiâ peccans evacuanda erit.

Si in bubonibus his simplicibus non procedat alteratio suppuratoria dictis remediis, aut pus benè coctum profundè nimis lateat, aperiatur lanceolâ profundius intrusâ, aut applicetur cauterium potentiale, ne ad interiora pergere queat venenum. Factum inde foramen diu apertum teneatur, ut saltem fonticuli instar esse queat. Sanè Zacutus Lusitanus l. 2. *Prax. Admir. observ.* 131. fontanellis in inguine spontè apertis quendam à sævo morbo Gallico immunem evasisse asserit.

Aperto tumore vel spontè vel scalpello, suppuratio & mundificatio instituenda balsamo hyperici, mixto cum oleo Qato ligni Guajaci, vel tartari vel unguento de apio, cui additum sit parû de Mercurio præcipitato, vel arcano corallino, superimponatur emplastrum dia-chylon, malaxatum cum oleo tartari rectificato exterius, vel applicetur emplastrum magneticum, quod ulcus apertum coire non patitur, donec satis emendatum fuerit. Conf. Barbette in *Chirurgia*, Diemerbroek in *Tract. de Peste*, & Nicolaus de Blegny *Tract. de lue Venerea Gallicè conscripto*. Cardilucius l. c. hufonem ☿o madefactum & buboni impositum, quo intumescere alium applicandum, aut emplastrum de cicuta, cum oleo philosophor. vel saponis malaxata, commendat; tandem sculpello aperiendum, saniem c. pure exprimendo, postea emplastrum opoteldoch applicandum, quod nunquam coalescere sinat ulcus, priusquam omnia fundamentaliter sanata fuerint. Quod si nihilominus suppuratio aut mundificatio tardè ac difficulter, aut planè non, quod sæpiùs accidit, succedat, eadem emplastra continuanda; quin & cucurbitæ applicandæ, ut viscidissimum hoc serum, in glandulis hisce quasi congelatum, sensim sensimque tandem resolvatur. Internè usurpantur primò lignorum decocta, postea purgantia, in fine ☿ & ~ viperarum, quæ curam bubonum absolvent. Quibus etiam irritis infectionis uni-

versi sanguinis periculum subest, adeoque cura generalis instituenda venit.

### III. PUSTULÆ & TUBERCULA.

Pustulæ & tubercula, præter luis Veneræ curam universalem, foveantur, & abluantur subinde decocto lignorum, & oleo ☿i illinantur: sed cùm hæc rarò sufficiant, optimus est ☿ & dulcis, simpliciter cum butyro non salito mistus & illitus; loco cujus etiam unguentum de nicotiana, diapompholygos, item de helenio, vel aliud appropriatum capiatur; aut unguentum pomatum, subactum cum paucis arcane corallino, præstans est: vel oleo vitrioli, ☿is, butyro ☿ii, aut liquore ☿ii saccharato turgentur pustulæ & tubercula quotidie, donec corrolæ decidant; in quem finem etiam mistura composita ex aluminis rochæ & ☿anti ʒj. in ∇ plantag. aut rosar. aut alius appropriatæ tñj. solutis, quam cum lintecolis admovendam describit Sennertus de *lue Venerea* pag. 216. adhiberi potest. Melius est sequenti modo:

℞. ∇ plantag. ʒvj.

☿anti ʒjv.

alum. ʒi.

Dissoluta invicem M. D. S.

Reinigend Wasser.

Liquore hoc cum penna intincta turgentur verrucæ; sic emarcidæ pedetentim decidunt. Sylvius *Tract. de lue Venerea* §. 349. laudat ~ & ☿lia, cupri tinctura imprægnata, quo pustulas fœdas & planè malignas, reliquis frustra tentatis, præter spem sustulisse testatur. Hæc ipsa quoque in pustulis penis, ani, faciei, &c. proficua sunt. Spectat huc quoque lac virginis, cujus singulis uncis ☿anti ʒj. addendus, item liquor Hartmanni, ac ☿is in *Pr. Chim.* pag. 322. & 333. descripta. In specie in pustulis faciei.

℞. Sperm. ranar. lbv.

☿anti ʒj.

Digeratur in vitro benè clauso, & ita cautè hoc ipso turgentur pustulæ.

Nec inconcinna est mistura Fortskii l. 32. *observ.* 6.

℞. Album Ovi no. j.

agita, donec spumescat: adde

☿anti

campb. ʒ gr. jv.

M. f. unguentum.

### IV. CONDYLOMATA.

Ad condylomata ani ☿ in ∇ plantaginis aut persicariz solutus cum paucis aluminis con-

convenit. Imò si condylomata fuerint majora, quæ non nisi longo temporis tractu per ejusmodi caustica tolli queunt, ligaturis potius, sin radices angustiores habeant, ferro secante extirpentur: postquam verò hæmorrhagia sopita, reliquæ Mercurio sublimato absumantur, & ulcera Mercurio sublimato, aut arcano corallino detergentur ac mundificentur.

## V. VERRUCÆ.

Verrucæ Gallicæ si in extremitate oleo viatrioli tangantur, exsiccantur & decidunt: loco cujus etiam  $\nabla$  fortis, aut solutio  $\text{¶}$  in  $\nabla$  facta, s. q. aquæ simpl. diluta adhiberi potest: item pulvis sabinæ inspersus eas absumit: vid. Wedelius *de Medic. Facult. pag. 62.*

## VI. ULCERA.

Quoad ulcera quarumvis partium, in horum cura semper primò ad cacœtheam seu malignitatem Veneream respiciendum, quâ non extinctâ perfectè nec mundificari, nec consolidari possunt; aut consolidata licet, semper recrudescunt; imò à relicto occulto eorum, non perfectè mundatorum, sed præmaturè consolidatorum fermento, lues curata licet, denuò in universum corpus propagari potest: id quod notabili exemplo docet Hildanus cum occulta ossis carie Venerea *Cent. 5. Histor. 95.* Pro qua malignitate expugnanda primatum obtinet  $\text{¶}$ , tam sublimatus quàm præcipitatus, & hic vel corrosivus, vel in specie dulcis, qui semper mundificantibus addi debet. Abluenda igitur sunt ulcera decoctis lignorum, hinc applicandum unguentum ex melle & vitello ovi cum Mercurio sublimato Hartmanni in *Prax. Chym. §. 28.* vel unguentum de cerussa malaxetur cum  $\text{¶}$  nicotianæ, & imprægnatum cum Mercurio dulci usurpetur; vel unguenta cum Mercurio sublimato, quæ describit Sennertus *l. 4. pag. 211.* Itali cum bono successu in quibusvis Venereis ulceribus utuntur hoc unguento:

$\text{℞.}$   $\text{¶}$  commun.  $\text{℥iix.}$

ceruss.  $\text{℥j.}$

minii cribrat.  $\text{℥ss.}$

Coqu. lento  $\Delta$ e ad unguenti mollioris consistentiam: post addunt

$\text{¶}$ ti opt. l.  $\text{¶}$ ti, s. Turbith. Min.  $\text{℥ss.}$

cera alba  $\text{℥j.}$

Miscent pro unguento.

Vel unguentum Basilicum cum sufficienti quantitate Mercurii dulcis misceatur & applicetur, quod ulcera Venerea maligna etiam quasi cancrofa curabit. Vid. Digby *Recept. P. 2. pag. 12.* unguentum Ægyptiacum itidem subinde applicari potest, sed

Tom. II.

vitentur loca ossibus nudata; hæc enim nigro ore illud inficere asserit Hartmannus *l. 4. §. 28.* Huc pertinet  $\nabla$  divina Fernelii:

$\text{℞.}$   $\nabla$  plantag.  $\text{℥vj.}$

$\text{¶}$ ti. gr. xij.

Misc.

Quod si mundificata fuerint hæc ulcera, h. e. ubi pus laudabile suggerant, & labia undique rubra & naturaliter tincta, & pro natura partis ulceratæ constituta fuerint, sarco- tici incarnanda & conglutinanda sunt: pro quo scopo vel emplastrum Hartmanni *l. 4. §. 29. 30. & 31.* vel emplastrum de lithargyrio, aut emplastrum Norimbergense Zvvelferi, cum dimidio emplastri diasulphuris Rulandi misceri & applicari possunt.

In specie ulcera penis si fuerint externa, abluuntur cum decocto scabiosæ, marrubii, saponariæ, ligni Guajaci, plantaginis, &c. in quibus aliquantum sacchari Saturni & Mercurii dulcis potest dissolvi; aut decocti calcis vivæ  $\text{℥j. c. 3j.}$  Mercurii dulcis exhibeatur externè. Si sordida fuerint, unguentum Ægyptiacum, aut unguentum ex Mercurio sublimato Sennerti *l. 4. pag. 212.* aut linimentum ex pulvere sabinæ, croco metallorum, & butyro recenti Horstii *l. 4. observ. 54. pag. 257.* adhiberi potest. Pro consolidatione verò decoctum lignorum cum saccharo Saturni cum linteis applicatum convenit. Si verò sint ulcera interna intra glandem quidem & præputium tumefactum & constrictum, injectio ex iisdem fiat, & hinc cum filamentis carptis, unguento debito imbutis, cum stilo loco affecto auxilium applicandum.

Si ulcera sint in ipso membro, aut glandis molliorem substantiam occupant, aut meatum urinarium affligunt, utroque in loco difficilis perquam sunt consolidationis: sed in specie ex posteriore periculum est, ne crescat caruncula, quæ meatum oppleat. Injections cum prædictis similes fiant, aut cum candela cerea, unguento suprâ citato illinenda, meatui immittenda est. Si enim postmodum ex meatu extrahatur candela, facile lues, ubi fit in membro exulceratio, ex puris in candela vestigio, observari poterit.

Quod si in utero, nempe in vagina ejus, sint ulcera talia, injiciantur decocta lignorum, aut  $\nabla$  calcis vivæ cum plantis vulnerariis ebullita & injecta, in quibus parum aluminis solutum sit; hinc cum digito aut pello immittantur unguenta aut emplastra appropriata, linteo inducta, & ita relinquantur: v. g. præter illa, quæ supra in genere allegata fuerunt,

(Ooo)

$\text{℞.}$  Un-



℞. Unguenti albi camphor. ʒss.  
 ʒ dule. ʒi.

M. D. S.  
 Reinigend Sälblein.

Oris ulcera præ aliis curatu difficilia sunt, quia ex continuo salivæ affluxu copiosasordes generant, & loca glandulosa afficiunt, in quibus etiam ordinariò ulcera sunt graviora. Curantur per gargarisationem ex decocto sarsaparillæ, corticis Guajaci, foliorum plantaginis, scabiosæ, rosarum rubrarum, Veronicæ, &c. cum melle rosato & poco luminis: v. g.

℞. HB. plantag.  
 prunell.  
 scabios. ā M. j.  
 fl. rosar. r. p. ij.  
 rad. sarsap. ʒj.  
 ligni Guajaci.  
 santali rubri ā ʒvj.  
 sem. sumach. ʒss.

Coqu. in s. q. ∇ hordei:  
 Colaturæ tbiiss. adde  
 syr. de ros. siccis.  
 dia-mor. ā ʒiss. l. ʒij.  
 M. D. S.

Reinigend Gurgel-Wasser.

Hoc decoctum, si ulcus ponè palatum, aut in superiore ejus parte existat, per nares injiciatur; ita tamen, ut æger pro tussu & vomitu vitando os ∇ repletum teneat.

Imprimis, si ulcera sordidiora, convenit illis viride æris; unde v. g. unguentum Ægyptiacum cum melle rosato applicatum confert; vel hoc Horstii lib. 7. observ. 4.

℞. Mell. rosat. ʒij.  
 rob. diamor.  
 nuc. ā ʒi.  
 unguent. Ægypt. ʒiij. M.

Vel aquæ virides sic dictæ, quales e. g. describit Hartmannus l. a. cap. 52. §. 4. & 5. cum penicillo subinde applicatæ conferunt: item mel rosatum cum u & li acidulatum applicari potest: Videatur Riverius Cens. 1. observ. 95. aut solutione ʒti & aluminis, aut solutione illâ solari, quam Sennertus commendat, contingantur; aut

℞. Θ\*ci  
 ~Θi ā ʒss.  
 R ʒiss. M.

Quo ipso ulcus Venereum ingens in palato juxta uvulam contactum, successivè curatum fuit.

Quidam butyrum ʒii cum gossipio ulceri applicant.

Cavendum tamen, ne causticorum horum aliquid deglutatur.

Narium ulcera per similia curantur, sub forma pulverum aut injectionum; quæ tamen, quia mucum exsiccatum, aut simul crustam junctam habent, in principio emollientibus sunt tractanda.

℞. Hord. mund. M. j.  
 rad. alth. ʒvj. l. ʒj.  
 liquirit. ʒss.  
 sem. cydon. ʒij.

Coqu. in s. q. ∇ simpl.  
 Colaturæ tbi. adde  
 ʒ amygd. dule. ʒiss.

M. pro injectione.

Hinc crustâ remotâ injiciatur sequens:

℞. Rad. sarsap. ʒiss.

Intund. per q in ∇ plantag. l. ∇ ferrar. manè coquatur; in fine coctionis adde

HB. agrimon.  
 salvia,  
 plantag. ā M. j.  
 flor. rosar. rubr.  
 balauft. ā p. ij.

Colaturæ tbi. adde  
 alum. crud. ʒiss. M.

Aut ℞. Succ. beton.

scroph. maj.  
 pimpinell.  
 plantag. ā ʒjv.  
 mell. rosar. ʒvj.

Coqu. ad consistent. linimenti; cui adde  
 ∇ Ψa part. jv.  
 Misc. & injiciatur.

Omnia hæc ulcera hætenus enarrata sponte confanescunt, sicuti alia quælibet symptomata Venerea sub litu Mercuriali per salivationem: nec metuenda hæc ipsa in oris ulceribus; nam & hujus ope ea ipsa citius sanantur: Conf. Zacutus Lusitanus lib. 1. Prax. Admir. Observ. 78.

## VII. FISSURÆ MANUUM ac PEDUM.

Fissuræ seu rhagades manuum ac pedum abluantur decocto Ψa, cum Mercurio dulci imprægnato, præprimis si simul aliquid ligni Guajaci, ejusque corticis, radicis chinæ, sarsaparillæ, herbæ scabiosæ, &c. decoquatur. Si callositas aliqua simul subsit, emollientia, v. g. radix althææ, malvæ, cucumeris agrestis, &c. addantur. Post quorum usum applicetur iisdem unguentum enulatum cum ʒti pauco; vel butyrum, pinguedo porcina, anserina, gallinacea, &c. cum ʒi p. d. aut arcano corallino, aut cremore Ψa, &c. prodest, vel denique unguentum diapompholygos cum pauco ʒti, item

item unguentum renovativum Wedelii, vid.

Tract. de Comp. Medicam. pag. 187. Vel

℞. Unguent. enulat. ʒiʒ.

℞. dulc. ʒj.

℞. ʒi p. d. ʒij.

M. D. S.

Reinigend Sälblein.

### VIII. CARIES OSSIUM.

Caries ossium difficillima est curatu, cuius ratio ex Sylvio de lue Venerea §. 364. petatur, sine cuius tamen remotione impossibile est vel curare luem, vel consolidare ulcera sine recidivæ continuo superventu. In cura hujus, quicquid ossis cariosum ac corruptum fuerit, maturè removendum, nisi vicinam quoque partem successivè infici velimus: Ergò ossi carioso nudato applicandum oleum Netum ligni Guajaci cum ʒo nato caryophyllorum, vel inspergatur tutia præparata, pulvis cerussæ, lithargyrii, radice ireos Florentinæ, pulvis euphorbii, &c. quibus potentiora observantur salia fixa & volatilia, item aqua divina Fernellii; sed omnium optimum est vel ferramento debito radere cariem ossis, si levior fuerit, eamque ita remove; vel si profundior fuerit, ferramento ignito aut hinc inde perforare, aut totum os cariosum probè urere, & hinc V largiter irrorare, ut ita promoveatur separatio mortui seu cariosi à vivo. Quod si hoc modo fieri nequeat, malum ceu immedicabile existimandum, & quod ægrum vel ad mortem usque comitabitur.

Quia verò, inter reliqua, palati ossa frequenter carie eroduntur, necessarium erit, aut locum laminâ argenteâ, vel ex auro confectâ, tegere, aut ulcus pastâ quadam, quæ in laminas redigi ac parti affectæ recenter applicari debet, consolidare; v. g.

℞. Mastich. ʒj.

olibani,

sandarac.

sangu. Dracon.

myrrh. cl.

ras. ligni Guaj.

succini.

rad. ireos Florent.

C.C. usli præp. ā ʒj.

Ex subtilissimè pulverifatis, c. s. q. mucilag. tragacanthæ in mortario calido f. Pasta in lamellas redigenda, & ad formam ulceris extendenda.

Huic, si caries nondum planè extincta, appropriata admisceri possunt: v. g.

℞. Pasta jam præscr. ʒj.

pulv. rad. aristol. rot. ʒj.

gentiana rubra.

euphorb. ā ʒʒ.

caryoph. ʒij.

Tom. II.

Cum pauco terebinthinæ misc. pro usu jam dicto.

Sin verò ulcus planè non occludere liceat, laminâ, ex lunâ vel sole confectâ, & spongiolis instructâ, illud obturetur.

### IX. DOLORES.

Dolorum cura primaria consistit in ipsius luis remotione universali: Interim pro his in specie internè saræparillæ decoctum laudari solet; papaverinis vespertino tempore ante dolorum recrudescentiam non omittis. Externè optima sunt primò quidem fomenta ex ligno Guajaci, juniperi & hujus baccis, radice saræparillæ, foliis pulegii, salvix, rorismarini cum persicaria, hinc inunctiones cum oleo scorpionum, viperarum, præsertim lumbricorum, & ranarum viridium cum pinguedine humana; hinc theriaca, vel sola, vel cum addito oleo Guajacino, prodest ad dolores tibiæ, usitata Amato Lusitano C. 5. Curat. 72. Aut recipiatur V seu ~ lumbricorum, in quo aliquid croci & opii dissolutum, & cum linteis applicetur. Item

℞. Pingued. hum. ʒij.

℞. scorpion. ʒj.

petra alb.

spica ā ʒiʒ. 1. ʒij.

ʒat. ligni guajac. ʒj.

rorismar.

salv. ā ʒʒ.

Opii c. vino sol. ʒj.

M. D. S.

Reinigernde Salbe.

Sed raram est, quod his remediis cedat dolor, nisi cura universalis perfecta jam præcesserit, & saltem vestigia quædam læsionis à malignitate Venerea relicta adhuc eisdem foveant in partibus, quæ his & similibus removeri possunt. Non enim novum est, quod perfectè curatâ lue, & omnibus ferè remotis symptomatis, nihilominus tamen quædam adhuc earum supersint, pro quibus tamen removendis non statim nova cura repetenda: Conferatur Riverius Observ. 16. communicata à Pomaret. Speciatim ergò unguenta & emplastra Mercurialia appropriata pro his doloribus sunt remedia: hinc cerotum de Ranis Vigonis cum Mercurio convenit, imprimis ad cephalalgiam; item nervinum cum illo Vigonis mistum: e. g.

℞. Empl. de ranis c. quadruplo ʒiʒiʒ.

℞. express. nuc. mosch.

opii c. acet. sol. ā ʒʒ.

succi nicot. inspiss.

cinnab. vulg. ā ʒj.

croci ʒvj.

c. s. q. terebinthinæ misc. in emplastrum.

D. S.

Reinigernd Plaster.

(0002)

℞. Em.

℞. *Emplastr. de ranis cum g<sup>o</sup> ʒj.*  
*polychresti Ludov. ʒiij.*  
 Malax. c. q. f. & *Nat. ligni sancti.*  
 D. S.

### *Zeitheilend Pflaster.*

℞. *Unguent. aur. officin. ʒiʒ.*  
*Extracti vel succi inspiss. nicotian. ʒj.*  
*g<sup>o</sup> ʒiij. M.*

Quod si dolor evanuerit, sed aliqualis tumor super sit, recipiatur butyrum infusum, lique scat cum vino, & blandè ebulliat ad vini absorptionem; in hoc madescant lintea, & imponantur.

Emplastro huic, si in capite usurpandum sit, addendum venit balsamum Peruvianum.

## X. GUMMATA seu TOPHI.

Gummata & tophi, qui sunt tumores duri, tactui renitentes, in ossum medio enati, & iis immediatè incumbentes, duplicis observantur gradus: vel recentiores sunt, ossa superficietenus afficientes, adeoque tractabiliore; vel inveterati, adeoque magis coagulati, & parti cui insident, incamerati: suntque vel indolentes; vel subinde misere dolentes, qui dolor secundum membranarum, periostiorum nempe, ductum subinde longius diffunditur, ac totam partem occupat, noctu imprimis, molestissimus ferè intolerabilis ostocopus, *als wenn mit Hämmeren auff die Beine geschlagen würde*; unde tandem partes molles subjacentes & ossa subiecta eroduntur & cariota redduntur.

Ex acido maligno Venereo originem ducunt, quod aggreditur partes nerveas, in specie ossa, in quibus se firmius implantat, eorum alimentum corrumpit, quod acore inquinatur, successivè in medio ossium coacervatur, & porro coagulando ista gummata induratur, donec acidum vicina loca erodendo ulcera pessima excitet.

Recentes, aut saltem minùs inveterati si fuerint, adeoque nondum ossa & partes molles infecerint, prosunt sudorifera ex lignis aliaque lui Venereæ appropriata; in graviore salivatio Mercurialis, quibus etiam semper viperina & antimonialia fixa remedia sunt intermiscenda.

Præter interna, gummatibus emollientibus & resolventibus potentioribus, speciatim tamen Mercurialibus additis, curandi veniunt: emplastrum diachylæ simplex, item cum gummatibus, & emplastrum diaphoreticum Myntichtii, in specie oleo g<sup>o</sup>ato ligni Guajaci malaxata; quod oleum cariem imprimis conservat & curat: quibus tamen semper Mercurius cum terebinthina subacta mixtus fuerit, tanquam specificum alexipharmacum; item sæpiùs allegatum emplastrum

Vigonis de ranis cum Mercurii duplicata, triplicata vel quadruplicata hujus dosi, ex Plateri *Observationibus* pag. 728. cum oleo Guajaci malaxatum; vel emplastrum Sennerti p. 215. aut poterit Mercurius tritus cum axungia saltem porcina & cera in cerotum redigi: quibus addere convenit gummata aromatica emollientia & resolventia communiter dicta. Quidam ceu cerotum summè probatum ad tophos Venereos dissolvendos commendant:

℞. *G. xci c. x<sup>o</sup> acerr. sol. lbj.*  
*pulv. rad. bryon.*  
*alib. ʒ ʒij.*  
*surpethi min. ʒiʒ.*  
*cera alba ʒij.*  
*butyri rec. q. f.*  
 M. fiat Cerotum.

Interdum in summa dolorum vehementia theriaca admisceri potest.

Alii sequenti feliciter utuntur:

℞. *Emplastr. diachylæ c. gumm.*  
*o<sup>o</sup> olivar. ā ʒjv.*  
*cera nova ʒj.*  
*piperis nigri ʒiʒ.*  
*o<sup>o</sup> comm. ʒij.*  
*cantharid. ʒj.*  
*sem. sinapi ʒj.*  
*mell. insp. ʒij.*

Pulverisanda pulveriscentur, hinc liquefacta cerâ cum emplastro diachylæ in oleo, & ubi medium refrigerint, reliqua exactè incorporentur.

Ufus tempore tumori applicetur syndon subtilissimus, supra quem cerotum applicetur, & benè ligetur, quorum quotidie bis mutetur syndon, qui semper erit humidus, & ita pauco tempore extrahetur tumor sine cutis vel carnis læsione.

Adhiberi etiam potest unguentum Hartmanni ex ungu. aur. officin. part. ij. cum g<sup>o</sup>ti part. j. in *Praxi Chimiæ* §. 21. & Wieselmanni de lue Venerea p. 20. utpote quod per aliquot dies noctesque linteum inductum, ac parti affectæ, quam priùs vino rubro lavare decet, applicatum, tophos tollit. Quod si autem tumores ac dolores ab usu hujus medicaminis cessarint, pars affecta butyro non salito, & in vino rubro loto aliquandiu foveatur pro reliquiis absumendis: vel fiat emplastrum cum Mercurio vivo & opio, ad imitationem Barbette *Anat. Pract. P. I. cap. 3.* vel miscendum est oleum terebinthinæ cum o<sup>o</sup> g<sup>o</sup>ato Guajaci, cui addendum est opii q. f. pro doloribus nonnihil leniendis una cum Mercurio vivo, & instar linimenti illinendum gummatibus dolorosis. Vel recipiatur emplastrum de hyotcyamo Ludovici, misceatur

cum



cum Mercurio, pinguedine subactō. Lamina quoque Saturni cum Mercurio illita applicetur, si scilicet adhuc sunt in principio; vel etiam Mercurius à Saturni fumo coagulatus extendatur in bracteam, & ita applicetur, qualis & hinc prætertophos etiam ad ulceram cancerosa aliaque similia adhiberi potest.

℞. Huius ℥j.

Dissolvat in cratere, & liquefactum ab igne remove, & subito palum ferreum in medium Saturni immitte, donec incipiat concrefcere: Hinc in ferri vestigium immitte

Mercurii vivi ℥j.

unde congelascere videbis: Congelatum cultello separa, & oleo communi ad ignem coque, donec conflagravit, idque ter repete, & reddetur malleo sequax: duc in laminas, plagæ vel tophe imponendas.

Ad ℥j. Mercurii requiritur, ℥j. olei.

Forfan quoque hic non inutile erit emplastrum Saturninum Clossæi, quod describit Schræderus in *Pharm. lib. 2. cap. 53. no. 12. pag. 198.* & emplastrum ad tophe & gummiata Venerea Clossæi *no. 19. pag. 201.* in quo loco cinnabaris prius vivus admiscendus.

Si his non cedant Exostoses, hæc vesicatorio admoto tractari, & istud aliquoties repeti poterit, ad imitationem Riverii *Cent. 4. observ. 22. & 29.* Sed in casu posteriore, si inveterati magis sint tophe isti, & viscidiores ex coagulo concentrati, adeoque ipsa ossa profundius, plus minus tamen, infecerint, necesse est, aperiatur tumor, tum per caustica potentialia, tum actualia immisericorditer premendo ignem, ut loquitur Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. observ. 130.* aperti quovis modo diu aperti servandi sunt, ut ichori maligno & exitus fiat, & os subiectum pateat, quo huic in tempore mederi queamus: Conf. Botallus de *lue Venerea cap. 15.* item Fallopius de *lue Venerea pag. 95.* Sed summa habenda est ratio musculorum atque tendinum in cruribus, ne hi lædantur. Quod si verò hisce modis tractari nequeant, sed, præmissa licet cura universali, etiam salivatoria, obstinate persistant, præsertim dolorosi, Fonticuli in regione iis superiori excitandi sunt; his enim libere fluentibus hoc habetur commodi, quod dolor mitior nonnihil fiat, & ipsi nodi sensim tractabiliores fiant, ita ut post aliquot tempus vel emplastro diachylæ simplici plus minus cedant & evanescant.

Internè, præter generalem curam radix sarsaparillæ in specie laudatur, ejusque decoctum, pro absumentis hujusmodi tophe.

## XI. ATROPHIA.

Tabes & atrophia lue Venereæ superven-

niens præter universalem curam, aut si hæc locum minus habeat, levatur imprimis decocto radicis chinæ cum passulis, vel decocto sarsaparillæ à Septalio in cautioribus Medicis adeò laudato, & quod etiam laudatur à Sennerto *lib. 6. pag. 218.*

## XII. SCABIES, SERPIGINES, LICHENES.

Scabies, Serpignes & Lichenes Gallici removen- tur cum axungia porcina, cum o. Pri p. d. in unguenti consistentiam redacta. Quod si debilius fuerit, o. & addatur: Vel

℞.  $\nabla$  persicar. aut plantag. ℥ss.

in quibus solve

℞.  $\nabla$  i ℥ij ad ℥ss.

D. S.

Reinigend Wasser.

Hoc ipso liquore subinde blandè cum pluma illinantur dicta mala. Valet etiam ad mariscas; item condylomata in locis obicenis.

## XIII. AURIUM TINNITUS.

Aurium tinnitus symptoma pertinacissimum est; ejus tamen remedia observanda sequentia:

℞. Ligni sassafr.

flor. lavend. aa. ℥j.

cort. lign. sanct.

castor. aa. ℥ss.

caryophyll. ℥j.

Vl. R. i ℥ij. vel ℥ss.

Digere per dies aliquot, & essentia filtrata tepidè cum bombace indatur:

D. S.

Essenz zum Ohren.

Eundem in finem Septalius commendat Em alini, in qua per noctem aliquid ligni Guajaci, castorii & menthastris infusum.

## XIV. CEPHALALGIA.

Dolor tandem capitis iisdem mitigari solet, quæ superius de doloribus artuum dicta; potissimum tamen laudatur emplastrum de ranis cum Mercurio Vigonis; aut quod Platerus *Observat. pag. 723.* describit, potissimum si aliquid castorii & opii i. sis addatur, vel laudanum opiatum simul cum aliis appropriatis internè propinetur. Hinc in casibus pertinacioribus trepanationem adhibere convenit, ut exemplo comprobatur Amatus Lusitanus *C. 1. Curat. 4.* & Forestus *lib. 32. observat. 23. in Schol.* si scilicet virulentiam Veneream maximam partem extinctam esse ex aliorum symptomatum cessatione constet.

## ARTICULUS VI.

De

*Malo Hypochondriaco**Et ejus summo gradu**Scorbuto.*

**M**alum hypochondriacum utut sit cachexia communissima in nostris regionibus propter multorum diversorum ac diversimodè complicatorum symptomatum syndromen, proprio tamen nomine caret, adeoque mali hypochondriaci nomine innuitur affectus, ratione multorum symptomatum diversimodè complicatus, ex cruditate acida plus minus viscida in primis viis natus; cujus superior & quasi eminentior gradus vocari solet scorbutus. Quoniam verò symptomata frequentissima, quibus hoc malum vexare solet ægros, in specie partim circa regionem hypochondriorum utramque & in regione hypochondriaca imprimis percipiuntur, partim quod causa in hypochondriis videatur stabulari, propterea in specie isto nomine appellatur: ab aliis malum flatulentum; sicut chymicis causam morbificam nonnihil respicientibus simul ꝑ hypochondriorum vocari solet. Germanis ut plurimum *Miß-Beschwehrung* dicitur, interdum etiam *Verstopfung des kleinen Gedärms* / utut sæpissime lien innoxius deprehendatur; vasorum verò mesaraicorum obstructio causa saltem palliativa sit. Perfectior gradus, ut dixi, & consequens affectus hypochondriaci, scorbuti nomine venit, appellatione originaliter Germanicâ inferioris Saxoniz; quæ tamen in forum Medicum translata & ita retenta fuit, & ob id imprimis hæc vox scorbuti est recepta, quia adhuc multi admodum Autores inter se digladiantur, an morbus hic etiam veteribus fuerit cognitus? ratio dubitandi est, quod videatur novus morbus; sicut & malum hypochondriacum. Nihilominus tamen multi eum ab Hippocrate *lib. de affect. intern.* sub nomine lienis magni exactè descriptum esse asserunt; alii stomacacem & scelotyrhem Plinii eum existimant, qui affectus Plinii ætate in exercitu Imperatoris Germaniz plurimum grassatus fuit. Sed lis hæc est admodum inanis, cum parum referat, an veteribus fuerit cognitus scorbutus, an secus? arbitror tamen, eundem omnino iisdem fuisse admodum cognitum, utut non adeo clarè, quin locis septentrionalibus quasi proprius videatur, nec adeo atrocibus stipatus fuerit symptomatibus. Nam sicut crescentibus delictis crescunt peccata; sic etiam crescentibus luxuriæ & diætæ erroribus, quid mirum, atrociore furore etiam nos aggredi morbos, veteribus non

adeo graves, ita ut nec eorum descriptiones tanquam nonnihil mitiores exactè cum nostris conveniant. Hippocrates clima subtilius habuit, propterea scorbutum non tam exactè cognovit.

## P A R S A F F E C T A

*Mali Hypochondriaci.*

Malum ergò hypochondriacum & ejus non degener filius scorbutus, cum ex varia ista symptomatum complicatione, adeoque mirabilis & variabilis sit affectus, ita ut tantum non omnes actiones diversimodè pro subjectorum varietate lædantur, propterea factum est, ut tot diversæ sententiæ & litigationes de loco seu de radicali foco ipsius morbi, exortæ fuerint. Hinc alii nullam determinatam partem in malo hypochondriaco affici, sed vagum esse, existimant; quod tamen non est: alii vasa mesaraica obstructa; alii intemperiem siccam & calidam stomachi: alii intemperiem intestinorum calidam & siccam: alii lienem vitiatum, ejusque aut intemperiem aut obstructionem esse nidum hypochondriaci mali, & hinc dependentis scorbuti, asserunt. Præ cæteris phantasiæ mirè indulgent ii, qui spacium istud vacuum inter stomachum & diaphragma, hepar & splenem, pituita refertum pro sede primaria mali hypochondriaci, aut saltem pro nido, ubi tot stabulantur flatulentiz, existimant. Hos inter fuit imprimis Henricus Levinus Fischerus, qui edidit peculiarem *Tractatum de loco & foco mali hypochondriaci*: permotus ad hoc Aphorismo Hippocratis 54. S. 7. Verum consideratis vel obiter variis mali hypochondriaci symptomatibus, sponte suâ hæc opinio vacillare & corruiere videtur. Quomodo enim tam pertinaciter istæ sordes in eodem cavo hære, totum corpus afficere, & diversimodè excruciare valeant? vid. Sennertus *lib. 2. Prax. pag. 518. & 520.* Sed miror in re adeo clara tam varios esse autores! Nam qui unquam malum hypochondriacum, vel incipiens vel confirmatum, examinauerit, ejusdem nexum symptomatum consideraverit; aut qui aliquando curationi cujusdam hypochondriaci præfuerit, tantum non manu palpare potest, radicem morbi veram & unicam hære semper in stomacho, & quidem in vitio ejusdem fermenti, non ritè scilicet digerentis alimenta; unde, ex læsa digestionem & inde nata cruditate acido-pituitosa, & chylus, & M. S. & lymphæ, & speciatim bilis, & consequenter reliqui etiam corporis machinam regentes humores, cum spiritibus vitiantur plus minus & depravantur, & sic demum totum illud, quod malum hypochondriacum vocamus, oritur. Quam ipsam de foco hujus mali sententiam primario

riò defendit acriter Hæchstædterus in tota *Decade 5. observationum*, in specie observat. 1. & 2. & Sylvius lib. 4. *Prax. Append. Tract. 7.* Highmorus in Tr. de malo hypochondriaco & passione hysterica.

Sed hæc ut pateant clarius, saltem consideremus symptomata, quorum nunc plurimum, nunc pauciorum syndrome malum hoc constituit. Symptomata hæc utut variant & ferè infinita sint, ex quibus ceu signis ejusdem præsentia dignoscitur, sunt sequentia: In omnibus hypochondriacis primariò ma è se habet stomachus, aperiens subinde laborant, utut frequentius in morbi progressu, avidè tales ægri appetant & comedant, interdum nimia & canina quasi appetentia laborent: tales aliquot horis post comestionem subinde dolores stomachi compressivos, gravissimos convulsivos percipiunt. Hypochondriaci ergo & nimio acido laborantes semper instante & adhuc urgente appetitu prandium debent finire. Germani dicunt: *Wenn es am besten schmecket / soll man aufhören / etc.* Appetunt acida, quæ tamen assumpta insigniter eos lædunt: stomachi, tam vacui quam repleti, frequentes inflationes adsunt, tam sub jejuniò, quam præsertim ab omni pastu frequenter eructare solent: ructus, qui erumpunt, dum sunt jejuni, sunt acidi; dum verò saturati, nunc sunt acidi, qui meliores, nunc insipidi, qui deteriores: Hinc abdomen sæpe post assumpta alimenta inflatur & ab his flatibus præter vagam intumescientiam abdominis, murmura, borborygmi & variæ agitationes frequentissimè sentiuntur in eodem, & in omnibus his copiosissimus nec unquam deficiens flatuum adest proventus, quorum activitas in specie hypochondria, præsertim sinistrum, affligit; ibi enim facile compressione manus subsultuum sensus & fluctuationes crebrius recurrentes, & murmurationes percipiuntur, ex flatibus in colo, ibidem locorum partim angustato, partim incurvato conclusis, ubi ex litu coli simul dolorificæ lancinationes, distensiones & punctiones admodum molestæ, lieni equidem vulgò, sed falsò adscriptæ, persæpè sentiuntur, quibusdam & fluctuationes in cavo abdominis, in mesenterio & similibus locis se conjungunt: Accedit ut plurimum alvi pertinax obstructio, ita ut inter 100. hypochondriacos vix duobus aut tribus alvus quotidie respondeat; quin intra quatrimum aut triduum aut biduum demum, aut stimulo quodam irritata alvus; aut sponte, interdum suum officium facit, in quo ipso tandem dura, pauca, eaque interrupta, globulorum forma, nigra subinde & non absque insigni conatu, interdum etiam non absque dolore, excernuntur. Et quidem hypochondriaci in hoc malo fortioribus purgan-

tibus parum aut nihil evacuare solent, cum econtra blandiora laxantia, emollientia, passulata, prunata, & similia tales solent satis copiosè, respectivè tamen, evacuare; si verò fortius purgentur, semper læduntur; sin forsan talibus ægris vomitus contingat, qui non sunt rari, vel sponte vel arte rejiciuntur ut plurimum aut aquosa, aut sæpius plus minus viscida pituitosa, sed semper plus minus acida; ita ut etiam dentibus subinde stuporem inferant & vasa orichalcea in æruginem corrodant, nisi interdum sub fortiore conatu aliquid de bile ex folliculo felleo se admisceat, ut excreta porracea & æruginosa compareant, & aliqualem amarorem gustui repræsentent. Interdum etiam cardialgiæ & ventriculi adsunt dolores quidam, qui frequentissimè ad regionem spinæ dorsæ usque se extendunt juxta situm gulæ, ubi nempe est orificium stomachi sinistrum, & ignaris subinde pro nephriticis doloribus imponunt: Et sæpius hi ipsi post cibos ingestos se exerunt, idque pertinaciter subinde, ut etiam vix nisi post ingestorum vomitum remittant, interdum enim conqueruntur: *Es drucke sie uns Herze* / observavi quosdam ægros in hoc affectu de dolore compressivo in loco colli anteriori conquerentes, qui revera ex stomacho ratione gulæ, & hujus spasmò & constrictione circa laryngem, originem duxit: phlogoses & æstuationes hypochondriorum, hinc rubor malorum & faciei, item calores vagi, modò remittentes, modò accedentes, è primariis nempe signis, præsertim dimidia à pastu hora, vel etiam dum adhuc assident mensæ, sunt frequentes, hinc malæ insigniter rubent, qualis rubor interdum etiam ex unico vini haultu, similive minus congruo assumpto, supervenit, dolores abdominis lancinantes cum contorsionis sensu seu colici & iliaci sunt frequentissimi, iiq; sæpius acerbissimi, in quibus interdum abdomen contrahi & umbilicus interiora versus velut revelli solet; ut plurimum quidem sunt convulsivi, & oriuntur à spasmodis intestinorum: præter hos subinde etiam iliacos & colicos convulsivos dolores patiuntur, interdum dolores terebrantes, nunc in sinistro, nunc, quod rariùs, in dextro latere, qui sunt sæpius à pituita, ut vocant, vitrea, vel à mucò acido viscido in cellulis coli sub hypochondrio sinistro, ubi incurvatur, & dextro, ubi etiam angulum facit; unde hi dolores subinde nunc vomitum, nunc dolores iliacos convulsivos, per consensum faciunt. Anxietates mentisq; perturbationes citra manifestam causam; palpitationes cordis graves, frequenter & subinde per paroxysmos, hypochondriacos affligunt: non secus ac difficiles respiraciones, imprimis à pastu, quarum subinde observatur differentia triplex.

1. Cum



1. Cum rejectione viscidorum, & est asthma stomachale humidum.

2. Cum tensione hypochondriorum, qua imprimis difficulter respirant, partim propter impeditum diaphragmatis deorsum versus motum, partim propter tensionem in regione hypochondriorum, qua thoracis debita circa costas nothas impeditur dilatatio: hinc quando volunt respirare, impedimentum & dolorem insignem gravativum & tensivum percipiunt in abdomine & circa hypochondria, quæ ipsis quasi cingulo abdomen circa hypochondria cinctum videtur; idque imprimis nocturno tempore, quatenus supini jacentes dormiunt, & hinc ita evigilant, estque à spasma membranarum in dictis locis.

3. Cum respiratione depravata decumbunt ex asthma sicco convulsivo, quod vitio diaphragmatis aut musculorum thoracis convulsivo subinde eveniet.

Porro in confirmatis hypochondriacis interdum tumores viscerum abdominis, imprimis lienis duri & scirrhusi, non sunt rari, sicuti etiam hepatis infarctus ejusque pertinaces scirrhi & tumores interdum superveniunt: suntque tamen revera potius productum morbosum, utut falsò à quibusdam pro causa & radice morbi habeantur. Nam & malum hypochondriacum & scorbutus infante omnino liene aliisque hypochondriorum visceribus, observata fuerunt, teste Horstio *lib. 9. observ. 4. pag. 442.* quicquid etiam in contrarium dicat Velthusius *Tract. de liene.* Percipiunt præterea tales agri non rarò molestas pulsationes in hypochondriis, uti etiam in regione dorsi, imprimis circa lumbos & regionem lumborum superiorem, è regione pancreatis, ubi sunt dispersi rami arteriæ cæliacæ; quin tales pulsationes percipiuntur interdum etiam in aliis corporis partibus, ubi aliàs nullus naturaliter sentitur pulsus, & ferè duritiem arteriæ ex strictura fibrarum convulsiva insequitur. Malo ulterius procedente vertigines graves frequentissimè superveniunt: omnes ferè hypochondriaci, præsertim jejuno stomacho, sunt vertiginosi, quod signum rarò fallit; quæ ipsæ vertigines, saltem assumpta v. g. panis buccellâ, brevi post denuò sistuntur.

Cephalalgia subinde affligunt, in specie tensivæ, & hinc capitis obnebulationes, imprimis à pastu, & tandem ingenii torpor & memoriæ lapsus: ut hypochondriaci confirmati interdum necesse habeant, valedicere studiis; tandem interdum memoria planè deficere incipit. A pastu solent esse quasi ebrii & facillè terre fiunt hypochondriaci; subinde anxietates frequentes, gravior cordis

palpitatio, tristitia & mœrores citra manifestam causam, atque sic tandem ipsa melancholia, à foco hypochondriaca specialiter dicta, superveniunt, quam insomnia varia & turbulenta & terrifica aut præcedunt aut etiam comitantur: vid. Timæus von Guldensee *Casu 16. lib. 1. pag. 34.*

Pulsus sunt varii, & interdum admodum inæquales, subinde intermittere videntur & in paroxysmo mali confirmati ferè omni momento mutantur. Nam ubi confirmatum fuerit hoc malum hypochondriacum, utut symptomata stomachi & hypochondriorum, seu potius intestinorum, nunquam omnino remittant, tamen subinde per paroxysmos affligunt, & suas exacerbationes habent, rariùs certas, frequenter vagas; ac ipsæ palpitantes & anxietates cordis & capitis & sensuum symptomata, item dyspnœia, atrociter interdum affligunt; quin etiam interdum viri in graviore paroxysmo ea patiuntur pathemata, quæ evenire solent mulieribus hysteris: adeo ut revera passio hysterica mulierum sit certa quædam species mali hypochondriaci; & ipsi ægri dicunt: se percipere ascendere fumos ex abdomine ad cor & caput, item ex liene subinde ascendentes, & postmodum ita tales paroxysmos inferentes, quo ipso vulgi hypothesein de fumorum ex dictis locis adscensu non parum confirmant.

Urina hypochondriacorum est varia, extra paroxysmum ferè sanorum est simillima; dum paroxysmus gravior urget, interdum effluit cruda & tenuis, interdum etiam turbida, pallida, plus minus aquea & crassa, sedimentum habet subinde farinæ laterum analogum, speciatim ubi jam malum in scorbutum degenerat; interdum crusta salina eidem urinae supernatat, aut corpuscula salina lateribus vasis adhærescunt, sed ad fundum præcipitantur: interdum corpus puriforme, moto vase in liquorem lacteum dissiliens, observatur, qualem describit Dravvizijs *de Scorb. pag. 376.* & Timæus von Guldensee *lib. 3. Cas. Medic. 48.* & Platerus *lib. 3. Observat. pag. 784.* interdum in talibus deprehenditur, post nimias nempe vigilias, intensè tincta. Quod si urina antea claræ & tenues usu medicamentorum sunt crassæ & turbidæ & subnigricantes cum copioso sedimento, bonum signum est rectæ operationis medicamentorum.

Ex symptomatibus his multiformes ægrorum querelæ emergunt. Omnia tamen hæc, quorum complicatio malum hypochondriacum constituit, rarò in uno subjecto omnia existunt; quædam enim in hoc, quædam in alio

alio subiecto se manifestant : Sufficiat nihilo minus pro malo hoc determinando, si stomachi non ritè digerentis adsint signa cum torminibus & flatibus abdominis, alvo adstricta, & hinc capitis perturbationibus : quibus tanquam primariis, si alia quædã ex recensitis accedunt, eò facilius malum determinatur, huiusque præsentia certior redditur. Exempla, quæ pro idea huiusmodi ægrorum sufficiant, vid. in Horstii *lib. 4. observat. 27. & seqq.* item Hæchstædterus *Decad. suprâ citata.*

### CAUSÆ MALI HYPOCHON- DRIACI.

Causa proxima horum malorum complicatorum est stomachi cruditas acida seu acidum ventriculi vitiosum, plus minus austerrum, in subiecto plus minus viscido ex stomachi vitiata digestionem enatum, à quo pro varietate subiectorum omnia reliqua symptomata facillimè deduci possunt, modò ea, quæ alio tempore & alia occasione de similibus affectibus dicta fuerunt, ruminentur : adeoque subiectum seu pars affecta in malo hypochondriaco (à causa quidem) seu radicationis est ventriculus, ejusque vitiata digestio primæ à morbo verò seu inhalationis sunt sanguis & bilis : sed non excludendi sunt spiritus influi, præsertim in malo confirmato & inveterato, & qui ad scorbuti naturam quasi accedit, unde etiam hæreditarium existit.

His tanquam productum morbosum superveniunt ipsarum partium corporis continentium seu solidarum multiplices alterationes ; & quidem magis affecta sunt viscera abdominis, quorum consensu subinde & alia afficiuntur ; unde palpitationes cordis, cephalalgia, vertigines, melancholia hypochondriacæ, &c. Scilicet jus digestionis primæ in ventriculo est universale in totum corpus, adeoque tam in theoria quàm praxi morborum maximam semper sui postulat considerationem.

Ex his quasi quinque punctis, nempe :

1. Cruditate acida in primis viis,
2. Sanguinis crasi depravata,
3. *Πρωκτάσι* deficiente,
4. Lymphæ aciditate & acrimonia : &
5. Bile inerte

omnes lineæ deducendæ sunt, quæ depingunt malum hypochondriacum, cujus centrum sit stomachus.

Causa ergo efficiens mali hypochondriaci est vitium acidi spirituosissimi fermentativi, vitiosè acidi, nec debite volatilis ac spirituosissimi, ratione cujus avidius appetit quàm digerit ventriculus : quo ipso fermento assumpta quidem promptè plus minus dissolvuntur, sed eadem dissoluta minus fermentantur ac volatilifantur ; unde in pastam acidam aut acido-austerram plus minus viscidam flatulentam degene-

rant, quæ aliàs in chylum salsum volatilem transmutari debuissent ; unde copiosissimi flatus p. n. fermentativa turgescencia erumpunt, hinc ructus acidi & stomachi inflationes, & ex materia viscida acida ejusdem graves dolores, aut vomitus materiæ viscidæ insigniter acidæ ; delapsa tandem hæc massa cruda ex stomacho, & occurrens bili in intestinis, vitiosè effervesceat, unde copia flatuum. Et speciatim, si paulo volatilior ac spirituosior fuerit bilis, incallescencia seu subitanæ phlogoses ex hypochondrio dextro subito in totum corpus se dispergunt, (ad imitationem quasi olei Oli vel spiritus nitri, vini spiritui rectificato commisti) quod vulgo quidem, sed falsò, hepaticum adscribitur. Unde etiam ruit imaginaria ista ventriculi frigida & epatis calida in affectu hypochondriaco quibusdam accusata antipræxia, cum tamen potius præsens flatuum proventus continuus, & hinc multiplex intestinorum nata irritatio, continua murmura, & nunquam intermittentes borborygmi abdominis semper ex materia acida viscida oriuntur. Cum verò fecestales secretæ sint plus minus viscidæ in cellulis intestinorum, coli imprimis, hæc pertinacius hærent, quorum acore p. n. pertinaces dolores, lincinationes & terebrationes pituitæ vitreæ vulgo descriptæ generantur : Hinc est, quod subinde conquerantur ægri, se sentire nonnunquam infarctum in abdomine, & monstrando locum istius infarctus situm coli sub stomacho exactè delineant.

Hypochondriacorum excreta sunt pauca & indurata, quia coagulantur ab acido plus minus austero : sicut enim bilis, tanquam alcali volatile fluidas reddit feces ; ita acidum easdè coagulat, quare quia firmiores redduntur in cellulis, diutius retinentur, & segnitie alvi inferunt : Hinc quando ventriculus & vicinæ partes membranaceæ, qui chylo nutriri solent, acido austero succo irritantur, tunc spasmis contrahuntur, fibræque earum stringuntur, sicque tensionis & quasi infarctus sensus circa hypochondria, præsertim sub inspiratione, percipi solet. Quin & aliquorum viscerum nervi ac membranæ nunc in radice, nunc in suo progressu, præsertim mesenterii, eodem sapore malè affectæ spasmos & convulsivos motus patiuntur, per consensum alias corporis partes afficientes : hinc varii hypochondriorum & abdominis dolores, iliaci, lancinantes & tensivi ægris inducuntur ; sicut & palpitatio cordis non rarò in hypochondriacis non tam sanguinis transvasati, quàm nervorum moventium vitio, ut plurimum nasci videtur. Et tensiones capitis circa tempora sunt nihil aliud, quàm spasmi membranarum in dictis locis ab acido p. n. irritatarum.

Crudior talis chylus per intestina transcolatus, & M. S. instillatus, & hujus crasin, acore suo vitioso & p.n. in subiecto nonnihil viscido hærente inquinando, ipsam M.S. plus minus crassam & spissam & difficulter fermentescibilem minusque spiritua scibilem reddit; unde anxietates, cordis palpitationes & similia cordis pathemata derivantur à grumoso sanguine plus minus coagulato, circa aurículas in ventriculis cordis hærente; unde sanguis & spissus & crassus observari solet: Conf. Sylvi<sup>9</sup> *Prax lib. 1. cap. 3 §.* Sin verò sub colatura sanguis per viscera, in specie per hepar & lien, de tali crudiore chylo sanguini infuso nonnihil in eorum porulis hæreat, irritatis fibris illorum contractura meatuum, hinc subsistentis materię firmiter retentio, tandem à vitioso suo acido coagulatio, sicque tumores & infarctus viscerum superveniunt, & ita his denique scirrhi pedetentim nascuntur. Minus dum spiritua scit sanguis jam depravatus, etiam spiritus minus volatiles minusque subtiles, nec satis lucidos, minusque naturaliter temperatos, sed asperiores & ut sic dicam, ad acetosum saporem declinans, producet, qui facile in motus anomalos, & exorbitantes prorumpent, adeoque stomacho affecto vertigines, item cephalalgias, &c. inferunt, donec ex dictis, tristitia, mœror, anxietas, cogitationes fixæ, & tandem melancholię symptomata superveniant.

Disponunt ad hoc malum ex causis remotis præter ea, quæ suprâ de apepsia dicta sunt, speciatim tres:

1. Errata in victu,
2. Deficiens motus corporis; & tandem
3. Vitæ genus studiis & curis nimis occupatum.

Quæ omnia disponunt ægros ad cruditates in primis viis.

Quoad dietæ errata: hæc vitiosum pedetentim chylum suppeditant. Nam alimenta aut nimis acida, aut fumo indurata, aut sale condita, aut difficulter digestibilia, & sale volatili destituta, &c. multum hic conferunt: Se condita, imbibent non parum de spiritu acido salis; fumo indurata de spiritu acido fuliginis multum continent. Facit huc potus facile acescens non ritè defecatus, vel qui ad acescentiam inclinât, itque non adeo diureticus, vel in + vergens, ad malum hypochondriacum disponit.

Motus, qui aliàs instar stimuli & chylosin & hæmatosin adjuvat, & distributiones succorum promovet, dum deficit, has omninò impedit, ad cruditatem colligendam non parum confert, & excrementorum separationes, tam per utinam, quàm in specie per sudores, minus promovet.

Curæ denique & studia, nocturna præfer-

tim, spiritus animales absument, & vires ita exhauriunt, indeque digestionem primam defectuosam, & M. S. minus spirituosam minusque volatilem reddunt; unde inquinatus ita sanguis, & consequenter etiam lymphæ ipsa, tam glandularum conglobatarum, quàm etiam conglomeratarum, v. g. pancreatis, acrior & acidior reddita, successivè symptomata stomachi, abdominis & intestinorum, & tandem hoc malum infert. Hinc lucubrationes nocturnæ statim post cœnam notoriè ad malum hypochondriacum disponunt.

Inquinatus itaque sanguis ipsa quoque lymphæ, & consequenter reliqua corporis contenta, ipsique adeò affecti spiritus, tandem corporis habitum successivè ita immutant, ut exinde malum nascens ad gradum sublimiorem exasperatum & deductum, scorbutus appelleretur; qui tamen haud adeò frequens est, quàm vulgò haberi solet, ut optimè monet Sydenham in *Observ. de Morb. acut. pag. 411.* quin morbis vel minus cognitis, vel nondum sufficienter confirmatis, pallium esse soleat. De cætero rectè quidam dicunt, quod malum hypochondriacum exaltatum, & quasi malignius redditum, constituat scorbutum, utut præterea & alias causas antecedentes agnoscat. Hunc multi, in specie Petrus in *Dissertat. Harmonicis*, non ineptè inter species cachexiarum referunt, dum scilicet à vitioso sanguine aut atrophia, aut cacotrophia, depravata nempe nutritio tandem necessariò sequitur; quin tandem exaltatum, & successivè quasi volatilatum nonnihil istud vitiosum acidum hypochondriacum in M. S. & lymphæ, indeque penetrativum & fermentativum factum, tandem miasmata fermentativa & contagiosa de se spargit. Adeò ut scorbutus confirmatus per oscula, per halitum, item per pocula communia aliaque media, uno nomine per contagium se multiplicet, in quæ contagioso fomite præ cæteris efficacissima est saliva in scorbuticis admodum inquinata: qualia contagia, aut cum aere inspirata, aut cum saliva hausta, fermentationem, & hinc chylosin & hæmatosin, tandem inquinant, ac ita se subinde multiplicant, quin etiam scorbuti fomites, ubi confirmatas egerit radices, seminali medio à parentibus in liberos traducitur.

Symptomata scorbutica præter ea, quæ modò de malo hypochondriaco fuerunt explicata, ex eo imprimis oriuntur, quod (1.) fermentum scorbuticum imprimis glandulas quascunque afficere, harumque lympham inquinare & inficere soleat; quodque (2.) istud ipsum, prout contradistinguitur malo hypochondriaco, in specie nervis insigniter infectum & hostile esse soleat; unde etiam scorbuticos tam varia nervosi generis pathemata solent



solent affligere, & quidem graviora & frequentiora, quam hypochondriacos.

Res ut pateat, quod inquinet glandulas, & aciditas ejus sit infesta nervis, specialiora scorbuti symptomata consideranda sunt: Nempe percipitur lassitudo totius corporis spontanea, & ad motum nunc major nunc minor impatientia, sensus gravitatis in cruribus, ut & aliorum membrorum debilitas, & dolor obtusus, patiens inclinatur ad somnolentiam, nisi adsit febris scorbutica; appetitus ut plurimum est auctus, aut planè destructus, conjunctus cum nausea: semper ferè adesse solent gingivarum laxationes unà cum vaga seu varia earundem nunc excrecentia & intumescencia, nunc exesione & exulceratione, itè cum insequente dentium vacillatione ac erosione, atque oris fœtore, & fricata gingivæ nunc sanguinem stillant, cumque intensè salsum, nunc liquamen quoddam serosum; in talibus saliva frequenter admodum est salsa, interdum, imprimis matutino tempore, manifestè acida deprehendi solet, ut in juvene scorbutico observavi. Præterea frequentes sunt in scorbutico phlogoses vel sudores etiam nocturni, in quibus sudor spargit subacidum odorem; imprimis in habitu corporis, in cruribus, in brachiis, malo procedente varix erumpunt maculæ, nunc majores, magnitudine interdum thaleri, nunc minores, pulicum moribus similes, quales videntur in purpura, interdum manus superant; imò sæpè totos in artus, præprimis tibias, ita diffunduntur, ut quasi una sit macula livida, cum elephantiasis aut sphaclimetu: vid. *Eugalenus de Scorbut. pag. 7.*

Diversi sunt coloris, nunc rubicunda, nunc flavescences, nunc atropurpureæ, lividæ, &c. Cum quibus alternant frequenter exanthemata in artubus, eaque varia, modò lævia, protuberantia, aspera & squamosa. Scorbutici subinde patiuntur corporis pruritus, sed dum incipiunt se leviter scalpere, locus intumescendo totus insigniter rubet, sed breviori tempore evanescit; in alio loco iterum pruritus & talem intumescenciam infert, de novo tamen cessat: Rarum est, quod tumores sint constantes, & si sunt constantes, ut plurimum occupant glandulas artuum, quæ forma scrophularum solent tumescere. Sæpe pruritus hic, si scalpatur, dat ulcuscula graviora, & in varia ulcera degenerantia, quæ plorant serum adeo acre, ut quodocunque calceamenta ægri fuerint exinde erosa.

Urinæ scorbuticorum admodum sunt varix, intensè subinde tinctæ & flammeæ, absque febre tamen & ictero, & rutilant instar spiritus nitri, etsi nulla febris adsint indicia, cum sedimento copioso & crasso subinde lateritio, ita tamen, ut exterius inspectus matulæ fundus suberuentum ferè carneum quid re-

præsentet. Urina hæc flammea est nihil aliud, quàm latex citius nimis salibus contentis saturatus, instar acerrimi lixivii. Interdum tales urinæ flammeæ subinde immutantur, & fiunt naturaliter sine tali sedimento tinctæ, sed ita, ut copiosæ arenulæ rubræ faciliè friabiles, quæ sunt salia crystallisat à vasis lateribus, incrustent matulæ fundum & latera, & hæ arenulæ sunt unum ex certissimis signis scorbuti. Præterea interdum flammeæ tali urinæ crusta quasi pinguis seu quædam pinguedo instar pelliculæ supernatat, quæ pellicula ad latus adspecta solet esse admodum variegata, & pavonis caudam aut eleganter coloratam iridem repræsentat. Est autem nil aliud, quàm salia coagulata, & signum scorbuti infallibile: sic in chymicis si aliquid evaporetur usque ad pelliculam, ea apparet variegata, ut plurimum autem in citiali reperitur, citi effusâ, color quidam cæruleus, qui vix ac ne vix quidem primâ vice abstergi potest. Et si forsân contingat tenuem, limpidam & planè aqueam nonnunquam excerni urinam, hoc fit, vel à recrementis aqueis hætenus in corpore congestis & retentis, nunc verò cum impetu excretis, propter particularum salinarum deficientem aut nullam secretionem: unde etiam hæ urinæ sæpè malorum symptomatum prodromi existunt.

Respirationis insignes læsiones valdopere scorbuticos affligit, exque non humorales, sed ferè convulsivæ, cum gravissimis anxietatibus & pectoris angustiis junctæ. In specie dolorum variorum torturis crudelis est scorbutus crurum & surarum, nunc vagis nunc fixis, præ cæteris ventriculi, dorsi, lumborum, pectoris atque abdominis; qui abdominis dolores scorbutici sunt omnium crudelissimi, & subinde in dorso & regione lumbari incipiunt, & cum gravissimo contorsionis sensu hinc inde in abdomine observantur; & ita anteriora versus, ad regionem umbilicalem, & dictas partes convellendo, contorquentur, ut nephriticis interdum doloribus simillimi sint, absente licet omni calculo; Verum quidem est, quod abdomen intumescat & indurescat, non à flatibus, sed à spasmo, & tensione membranarum. Dolores hi nunc solitarie affligunt, nunc in variis corporis partibus tubercula varia non rarò erumpunt, quæ subito increscunt, at subito etiâ denuò disparent; nunc copiosa parva tubercula, rubra, pl<sup>us</sup> min<sup>us</sup> pruriginosa, hinc inde protuberant, quæ denuò de facili evanescunt, & in quocunque ægro tam vaga & varia observantur symptomata, scorbutus latet; unde etiam scorbuticorum febres erraticæ existere subinde solent. Præter dictos dolores, qui constituunt Nephritidem notham, sæpius dolores nunc fixi, præsertim nocturni, nunc vagi, artus excruciant,

(Ppp 2)

dum

dum acerbo dolore nunc crus, nunc brachium, nunc alia pars mutatis vicibus affligitur; nulla tamen aut leviter sensibili in parte industria alteratione, quod symptoma in specie arthritidis vaga scorbutica seu vari, *die reißende Gicht* / appellari solet. Dolores hi artuum sunt vel leviores vel graviores, subinde sensus vermiculationis seu formicationis in extremitatibus artuum percipitur, similis ferè sensui isti, quando dicunt: *Es gieble ihnen in den Gliedern / als wenn Ameisen drinnen herum ließen / oder: die Glieder seyn eingeschlaffen*; & est species tactus depravatus unde affectum hunc quidam vocant: *Die Scharlockische Griebel-Krankheit / oder die gieblende Gicht*. Sapius membra stupida plus minus sunt paralytica aut saltem dolorosa, idque imprimis post colicas seu post tormina & dolores abdominis, quibus pareus supervenire solet, in qua motus perit sensu integro aut saltem doloroso. Interdum motus adest, & sensus deficit, ut si quid in manu teneant, illud non sentiant. Interdum ex tali paralyti contracta membra fiunt rigida, contracta, & tamen non immobilia. Loco paralyseos e contra frequentes admodum convulsiones, motusque convulsi scorbuticos insigniter vexant, sive internas occupent regiones, sive externos agitent artus. Sanè sæpissimè epilepsia & similiter convulsi morbi, quin & hysterica passio ex fomite scorbutico originem suam aut saltem malitiam obtinent & morborum virtutem: Præter vagos suprà dictos dolores scorbutus etiam interdum infert fixos, tam in artubus lacerantes & lancinantes, præsertim nocturnos, quàm cephalicas immanes atq; habituales contumaces, tam vagas quàm periodicas, item odontalgias ferè intolerabiles. Interdum stomachum pertinaciter affligit, unde vomitus admodum contumaces oriuntur, non nisi antiscorbuticis curandi; interdum occupant extremitates artuum, qui sunt gravissimi: Hi interdum silent, noctu verò affligunt, & sic magnam habent convenientiam cum dolore in lue & rea occurrente. Præter dicta crura subinde intumescunt constanti tumore, haud quidem cedematoso, sed duro plus minus rubicundo; nunc cum nunc sine doloribus nocturnis interdum exulcerantur, ita, ut elephantiasin Arabum repræsentent. Quin etiam tumores duri, Gallicos nodos æmulantes, tam in locis glandulosis, quàm etiam in locis musculosis, præsertim cruribus, protuberant doloris expertes, dum quiescunt ægri; dum verò ambulant, aut dum crura pendentia habent, insigniter dolere solent. Subinde stomachum affligit scorbutus, unde vomitus pertinaces oriuntur, non nisi antiscorbuticis curandi.

Interdum quoque cruentas dejectiones plus minus dolorificas falsò à quibusdam dys-

entericæ, ab aliis hæmorrhoidibus apertis tributas, inducunt; aut si non sponte sua accedant, facillimè saltem purgantibus acrioribus provocantur. Nam ægri tales, quando emittunt cruenta, non sunt dysenterici; fit enim sine torminibus: non sunt hæmorrhoides, quia post stercora prodeunt: sed est hæmorrhagia intestinorum; unde interdum leves purgationes scorbuticis diarrhœam cruentam, interdum atrocia symptomata dysenterica inferunt, præsertim si pilulari forma propinantur purgantia. Signa tamen, quibus hujusmodi cruentæ dejectiones scorbuticorum discernuntur à dysenteria & fluxu hæmorrhoidali, descripta videb. in Horstio *lib. 7. Obs. 25. pag. 393. & 394.*

Nec solum per alvum, sed etiam per alia loca, pertinaces hæmorrhagias, e. g. narium, sputum cruentum, &c. inducit scorbutus; sanguis interdum cœruleus vel subviridis apparet: interdum infert erysipelata in artubus cautissimè tractanda; nam facillimè gangrænescent, aut saltem in ulcera admodum cæcæthea degenerant; sicuti gangrænam artuum, præsertim circa pedum digitos, sponte sua exque causa interna oriundam, infert semper lethalem: qua de re vid. imprimis Sennertus *lib. 5. Prax. P. 2. cap. 19. circa finem.*

Tandem à malo confirmato frequenter atrophiam ut plurimum corpus tabescit, aut superveniente phthisi emaciatur. Catarrhis quoque & catarrhosis affectibus, iisque frequentissimè circa caput, collum, fauces & regiones glandulis magis obsecas; item excoriationibus & exulcerationibus non ita facilè curabilibus obnoxii sunt scorbutici.

Pulsus est admodum varius, inæqualis, subinde parvus & debilis, interdum formicans ac subinde planè intermittens, cum animi deliquis frequentioribus: adeo, ut qui scorbuti naturam ignorant, facile à tali pulsu terreantur, ut sit mos scorbuti, ut interdum pulsus tetros vegeto adhuc corpore soleat inducere.

Symptomata hæc multiplicia ut plurimum plus minus convulsiva & similia scorbutica, ex acido specifico sapore aut odore fermentativo scorbutico, spiritus & hinc contenta corporis inquinante, peculiariter nervis & fibris motricibus infesto, interdum plus minus falsedine juncto, deduci optimè possunt; conjungendo ut plurimum utrumque, tam acidi specifiici activitatem, quàm ex fibrarum sensillum ac motricium irritatione affectum plus minus spasmodicum.

Nempe acidum istud M. S. & hinc etiam lympham inquinans, bilem verò pessundans, hæmorrhagias, deficientem nutritionem, partium exulcerationem, & vitiatam fermentationem, pulsus diversimode inæquales, &c. infert, dum lymphæ acris & corrosiva in variis locis nervosis multiplices torturas dolorosas,

fas, contentorum varios motus, eorumque nunc stagnationem, unde tumores, nunc excretiones &c. excitat. Oris exulcerationes, gingivarum ac dentium plus minus corrosiones, stomacace dictas, contumaces catarrhorum acrium passiones, vagos partium dolores & lancinationes, &c. infert. In mesenterii glandulis coacervata, & vitioso acore suo membranas & nervos irritans, istud in spasmos convellendo, atrocissimos abdominis cruciatus infert: item motus convulsivos, pathemata hysterica, epileptica, etiam pareses, paralytes, & similia symptomata. Hinc quo largior copia lymphæ talis acris, eò etiam frequentiores sunt convulsiones in corpore: Ut taceam nonnullos de salivæ & oris fædine valdè conqueri. Quando verò in tali lymphæ acrimonia est vis destruendi partes animalis duras, uno verbo, ossa, accidit, ut ossibus partibus multa creet mala: sic v.g. dentibus summè est exitiosa, quippe quos sensim atque sensim resolvit, atque destruit horum carnem vicinam, nempe gingivas; unde vulgus partem affectam credit solas gingivas; item artuum juncturis inimica est hæc lympa, quare in illis collecta producit arthritidem, dum nimirum membranas, ossa cingentes, acrimoniâ suâ pungit: item in quibusdam scorbuticis serum adeò corrosivum fuisse observatum, ut ex naribus eorum profluens linteamina intincta eraserit; aliis serum inter dormiendum per os stillans in gena; in verum sal coagulatum fuit. Quæ alleruide lympa nimis acris, ea tribuit Willisius succo suo nervoso acris, qui proinde facile potest corrigi, & in lectionibus Autoris hujus observandum. Quo supposito,  $\Theta$  non tam fixum sive alcalicum, quale non, nisi fortissima calcinatione, fit, neque acidum, utpote quod sincerum siderationes ac coagulationes mox lethales introduceret, cum sanguis scorbuticorum fluidior justo observetur; sed acido-salsum potius existere puto: ita tamen, ut in falso hoc sale modò urinosum, modò acidum, prævaleat, quamvis illius portio notabilis humorum massæ semper naturalis & connata, hoc verò toto genere ipsi p. n. observetur. Atque ab eodem acido, à compari alcali in falsum plus minus commutato, turgida & imprægnata urina intensius rutilat absque crusta & sedimento salino; quin & interdum coloris dilutioris conspicitur, quando salia hæc crystallifata sub arenularum forma in fundo subinde subsident, aut in superficie in cremorem seu crustam illam salinam concresecunt. Illud quidem ab acido parciore minusque potente, sale urinoso magis saturato, ita ut ratione hujus saturationis uberiores sulphureas sanguinis particulas commodius imbibere, hincque urinam rubicundiorum & lixiviosam magis reddere possit; cum econtrà, quo plus acidi, minusque

alcalici volatilis, acidior feri scorbutici portio sibi relicta urinæ in-ac super-natet, quod urinoso ejus uberius atque intimius junctum, hujus vim agendi in sulphuream portionem sufflaminet, hinc tincturam minus rubicundam urinæ concedat.

Maculæ denique, quæ hinc inde corpus tingunt, è primariis signis sunt partes sanguinis corruptæ & quasi gangrænatae, ut sic dicam, quæ à reliqua massa separatæ per sanguinis circulum hinc inde defiguntur sub cute, donec ita successivè insensibiliter exhalent; unde earum eruptio bonum est signum, depurantis scilicet M. S. Cætera symptomata ex suprà & aliis dictis facilè explicari poterunt. In specie tamen consulendi adhuc veniunt Autores, qui ex professo de scorbuto scripserunt, v.g. Sennertus tam in praxi, quam peculiari *de Scorbuto Tract.* Salomon Albertus Horstius in *Observat. & Tr. de Scorbuto*, Willisius in *Specim. Patholog. Cerebri*, ubi de morbis convulsivis & scorbuto, Dravvitz *de Scorbuto*, & recentissimè Mællenbroeck *de Arthrit. vag. Scorb.* Protheus interim etiam est scorbutus, dum ordinariò pathemata ex aliis morbis quibuscunque sese associant, omnesque istos graviores aut deteriores aut certè contumaciores simul reddunt, adeò ut tales morbi præter hoc, quod circa symptomata multum varient, vix citra recidivæ metum sint curabiles, nisi simul appropriatis scorbuticis infringantur. Imprimis febres periculosis stipatæ symptomatibus ex societate scorbuti nascuntur, sicut intermittentes ex scorbuto ferè erraticæ fiunt.

Si consideramus causas ad scorbutum disponentes, ex sunt variae; imprimis res non-naturales, inter quas

1. Locorum ratio ac regionum, quarum quædam terræ aquarum & alimentorum causâ magis præ aliis ad hoc malum dispositæ sunt. Aeris præsertim summoperè hic habenda est ratio, cum ab eadem crasis tam sanguinis quam spirituum multum dependeat. Ratione hujus enim hypochondriaci saltem septentrionales, & maris Balchici imprimis accolæ, tandem evadunt scorbutici, ita ut morbus endemius in inferiori Saxonia, Belgio & Anglia, reliquorumque locorum maritimorum, sit scorbutus; cum econtrà orientales & meridionales, Gallia, & imprimis Hispaniarum aut planè nihil nominetenus de scorbuto sciunt. Hoc autem inquinamentum aeris est aura marina nostras falsa admodum, & cum noster aer aquilonaris perflet loca paludosa & lacustria, effluvia ista putrida secum

(Ppp 3)



secum aufert: vid. Rontæus *Epist. ad Hadrianum Junium*, & Hortius *de Scorbuto*: sic ratione talis aeris & mali victus omnes navigantes, quo diutius in libero oceano errant, ordinariè conflictantur scorbuto, dum aer marinus effluviis acidis ex mari elevatis inquinatus, respirando attrahitur; & præ aliis Belgæ & Angli fiunt scorbutici, dum navigant. Conf. Willisius *de scorbut. cap. 2.* Quin & qui jam conflictantur cum malo hypochondriaco, si peregrinantur in loca puro aere prædita, solent sponte ab istis malis purgari: Iste ergo aer nostras effluviis salinis acidis est præditus, & secundum Hartmannum  $\Delta$ e temperato destitutus est, hinc malum hypochondriacum exasperat, istud acius reddit, & sic in scorbutum degenerare facit; atque vel hoc quidem ratione crassitiei, ventilatione sanguinis hujusque effluviis heterogeneorum secretioni minus congruæ, vel salia atque sulphura anomala corpori inspirando.

2. In specie victus ratio ad scorbutum maximè disponit, cum multorum locorum in se salubrium incolas scorbutus enormiter affligat; contra maritimis quibusdam locis planè incognitus sit: quatenus hi victu salubriore vitium ab aere contractum sensim emendant; illæ verò vel solo victu inconvéniente levissimum aeris influxum juvant. Qualem præprimis suggerunt cibi nimium acidi & visceri, sale conditi ac fumo indurati, caro porcina, pisces maritimi lacustres & testacei, item cerevisiæ nimium viscidæ & non ritè fermentatæ, aquæ corruptæ, vinum & vini spiritus copiosius hausta.
3. Otium excrementorum cunctorum secretiones atque excretiones sufflamina: Hinc fæminæ aut studiis vacantes scorbuto magis obnoxii observantur, quàm viri, rustici atque operarii.
4. Contagium absentibus reliquis causis scorbutum producat, ita quidem, ut annotante Dravvizio *de Scorb. p. 100.* conversatio cum scorbuticis frequentior causa videatur, quare apud nos malum hoc adeò commune sit; siquidem per salivam, adeoque per communia pocula, it. per sudores, alios inficere solent.
5. Dispositio hæreditaria.
6. Viscerum primæ & secundæ digestionis dyscrasia: Quibus
7. Accedunt alii morbi chronici, febres

diuturnæ, imprimis quartanæ, & omnium maximè malum hypochondriacum.

Quibus præmissis vel spontè patet: M. S. & spiritus influos esse subjectum scorbuti; hos quidem in hæsiōis, illam radicationis; adeò ut mutuo circulo malum magis magisque confirmet. In specie spiritus influi à sua crasi degeneres in acrem specificam diathesin defleunt: deinde serum ac lymphæ specialiter hoc ipso sapore imprægnata deprehenduntur, sanguine ob texturam salino-volatili-oleosam non nihil obtundente eundem, quod manifestius in illis humoribus percipitur; propter quas causas effectus scorbutici partes inter solidas, præcipuè in partibus nerveis, se exerunt, & hinc in glandulosis locis: unde atrophix, spasmi, convulsiones, paralyces, stupores, dolores varii ac multiplices ipsaque adeo arthritis: it. dolores vagi & fixi, ulcera oris, catarrhalia pathemata, &c. frequenter adesse solent.

Causa ergo proxima erit sapor seu odor (vocet quis ut lubet, modò minimum fermentativum in hujusmodi morbis, licet chronicis, ubique consideretur, quod in contagio & hæreditaria multiplicatione manifestum est) specificus acidus, spiritus influos & M. S. imprimis inquinans, specificum saporem voco, utpote à priori à nemine dignè explicatum; de acidi verò natura esse, symptomata confirmant. Dum verò spiritus inquinat, fermentum digestivum ventriculi, ejusque protopepticum acidum simul, idque ferè primariò, alterabit; unde primo digestionis exerrato continuatus morbi semel inchoati progressus vel sponte sua patescit.

Distinctio scorbuti in eum, qui est ex sanguinis ranciditate  $\Delta$ rea, qui à sale fixo, & à quibusdam scorbutus calidus dicitur; & qui ab acido, & hinc frigidus salutatur; quam habet Charleton *Tr. de Scorbuto*: aut duplex ista sanguinis diathesis scorbutica, vel sulphureo-salina seu calida, vel salino-sulphurea seu frigida, quam habet Willis. non videtur essentialis, sed ex eo saltem nata, quod pro varietate constitutionis nativæ ægrorum seu craseos sanguinis partium solidarum, ac seminalis diversitate, fermentum seu odor scorbuticus symptomata plus minus diversa inferat: Eum in finem tamen differentix tales saltem observandæ sunt, ut remedium selectus eò concinnior fieri & methodus medendi exactior institui queat, quatenus in priori remedia magis temperata & V. S. neutiquam acriora & volatilia oleosa conveniunt, in posteriore verò remedia magis activa & sale volatili oleoso abundantia, item Martialia, quæ acidum uberiùs temperant ac destruunt, commendari solent.

DIA-

DIAGNOSIS

MALI HYPOCHONDRIACI

&

SCORBUTI.

Signa tam mali hypochondriaci, quàm scorbuti, ex superius recensitis symptomatibus per se sunt clara & manifesta; magis tamen specialiter, ubi stomachi non ritè digerentis adsunt pathemata, cum symptomatis circa abdomen, cū torminibus & flatibus intestinorū, alvi obstructione, & hinc corporis perturbatione, aliisque symptomatis, nullum dubium est, adesse tum malum hypochondriacum. Quod si his tanquam primariis alia etiā suprā enumerata superveniant symptomata, diagnosi mali hypochondriaci eò est certior.

Signa scorbuti autem diagnostica sunt vel externa quædam, vel interna, symptomata nempe corpori in hærentia: Illa sunt parentes scorbutici, conversatio cum scorbuticis intimior, commoratio, in locis maritimis ac paludosis, febres diurnæ, vel alii morbi chronici, ab antiscorbuticorum usu levamen, ac si quis absque alterius morbi certis indiciis sæpius valetudinarium agat. Hæc verò seu interna majoris ponderis sunt, & jam sunt recensita; quamvis eorum alia frequentiora, alia rariora observentur; rarissimè autem cuncta in uno subiecto concurrunt. Scorbutus enim nisi inveteratus sit, est difficulter cognoscibilis: interim tamen cū scorbutus sit protheus, & se quibusdam morbis associet, semper pejora symptomata atque in morbo simplicia adsunt.

Ut igitur cognoscat latens scorbutus, consideret Medicus urinam, quæ est vel nimis flammea, vel etiam cum arenulis istis rufis imprægnata, vel & cauda pavonis est instrata.

Præter urinam attendat Medicus symptomata dolorosa: si patiuntur dolores partium ultra naturam talis morbi, si in alio morbo superveniat dolor lancinans in lumbis, nisi adsit nephritis, signum est adesse scorbutum: quibus si nervosi generis pathemata superveniant, de scorbuti præsentia vix amplius dubitandum erit. Confirmatur, si æger conqueratur de doloribus gingivarum & dentium, si hinc inde maculæ excrescant, quæ quò majores sunt, imprimis in crutibus, eò magis malum manifestum est.

Præter maculas pruritum scorbutus interdum solet inferre, pruriginosam quoque purpuram, quæ certum signum est scorbuti latentis.

Porro jejuno stomacho, frequens est ptyalismus.

Signa scorbuti primaria, & quibus tantum non infallibiliter cognosci potest scorbutus,

recenset sequentes Lindanus; nempe (1.) *Ar-dorem & titillationem in gingivis cum subsequente cruentatione, adeo ut si parum fricentur, cruententur, ubi sanguis aquosus & salsus effluere solet, qui postea fit fetidus.* (2.) *Sub concavo oculorum apparet color purpureus, qui est quasi semilunaris,* (3.) *Macula instar morsuncularum pulicum, præsertim in femoribus & inferioribus tibiæ partibus, subinde apparent.* (4.) *Signum admodum singulare & multum conducens ad cognitionem scorbuti est vacillatio genuum, ita ut eorum robur corpus fulciens pereat, & ægri quasi sint lapsuri.* (5.) *Adest intensus & insignis factor oris, isque præsertim jejuno ventriculo.* (6.) *Sentiunt crebro phlogosin & exastuationem per totum corpus.* His addo ego (7.) *an-nulas rubras & facile friabiles, si nempe hæ ipsæ fundo & lateribus matulæ adhærere videantur.*

PROGNOSIS

MALI HYPOCHONDRIACI

&

SCORBUTI.

Hi duo affectus recentes adhuc, & nervoso generi aliisque partibus solidioribus nondum impressi, idoneis medicamentis accuratiori victus ratione possunt facile curari.

Malum hypochondriacum incipiens solus motus corporis curat, ritè institutus.

Verum quò magis inveteratum fuit malum, & nisi simul exacta & cauta observetur diæta, hinc firmiores egerit radices, in specie in negotio digestionis primæ œconomiam systematis nervosi turbaverit, gingivas ac dentes eroderit, viscera notabiliter contaminarit, maculas & exanthemata projecerit, impossibile est, ægrum perfectè curari; sed palliativè tantum iisdem occurrimus, præprimis cū maxima medicinæ opera urgentibus symptomatis tollendis, neglecta causa continente, non rarò impendantur. Accedit & hoc, quod ejusmodi chronici affectus continuatum etiam remediorum postulant usum, ne denuo semel mitigati recrudescant ulterius, donec perfectè eradicentur: in quo ipso tamen maximè inobedientes sunt ægri remediorum tædium percipientes, subito enim, ubi paulò melius se sentiunt, ab ipsis ut plurimum desistunt.

Scorbutus enim est lerna malorum atque morborum; haud enim facile reperitur morbus, qui non possit originem trahere ex scorbuto.

Imprimis autem producit obstructions varias ob visciditatem sanguinis, omnis generis convulsiones, v. g. colicas, hystericas, hypochondriacas, artuum omnis generis dolores, v. g. odontalgiam, dolores arthriticos, cephalalgiam, lippitudines, &c. Adeoq; vel

vel singulis annis, vel longiore aut breviori intervallo scorbutus excitat tumultus, nunc his nunc aliis stipatus symptomatibus, sæpè-que ad plures annos protrahitur, donec tandem aut perpetuo languore ægri contabescant, aut hydropici aut phthisici evadant, aut sphacelo hujus vel illius membri corripantur. Scorbutus enim inveteratus interdum in cachexiam universalem, interdum etiam in hydropem, terminatur; sapissimè verò in atrophiam & tabem transit, lentaque morte hominem jugulat.

Periculosa contingit scorbuticis dyspnœa, utpote ex qua ægri non rarò pereunt; non quidem in se, sed si non statim commodis solvantur remediis: vid. Barbette *Prax. pag. 145*. Maximè observatu dignum est prognosticon Sennerti, quod habet *lib. 3. Prax. cap. de Scorbuto pag. 604*. *Respirationis*, inquit, *difficultas & pectoris angustia periculosum malum est obquam, si Medicus & adstantes suum officium non faciant, sæpè ægri syncope præter expectationem intereunt. sin verò fortior natura morbum diutius tolerare possit, plerumque in hydropem ægri incidunt, præcipuè ii, qui purgantibus fortioribus subinde uti solent.*

Quibus alvus pertinax, morbus hic gravi-or evadit.

Porro hæmorrhoidum & mensium fluxus aut similis quædam solennis hæmorrhagia periodica, uti hæc mala insigniter leniunt, ita earum suppressio aut naturalis emanatio non parum ista aggravat.

Urina in malo hypochondriaco hæctenus tenuis & clara, si vel sponte vel ab usu medicamentorum crassior evadat, melior est, cum illa crassos humores in corpore detineri arguat. Nigræ quoque urina sine febre post usum remediorum antiscorbuticorum sæpè hunc morbum solvunt; indicant enim excrementorum præcipitationem ex M. S.

De cætero hypochondriaci non rarò hydropici & hectici, interdum melancholici & maniacy, evadunt.

Maculæ scorbuticæ, æquè ac in febribus petechialibus, quò magis rubent, & quo sunt grandiores, sunt eò meliores & sine periculo: tamen quò magis ad cæruleum & lividum atque atrum colorem tendunt, non secus ac febrium malignarum petechiæ, eò sunt peiores; qui ægri rariùs evadunt & in aperta si abeant ulcera, difficulter sanantur: semper tamen bonum signum est, cæteris paribus, maculæ rubræ.

In omni scorbuto levant nocturni sudores symptomata, nisi sint nimium frequentes, apprimè verò sudores cum efflorescentia maculari.

Porro observanda etiam est mira & conti-

nua symptomatum scorbuticorum inter se metamorphosis: Nam dolores vagi transeunt in pertinacem cephalalgiam, nunc in paresin, nunc colicam convulsivam; colica subinde mutatur in paralytin & paresin; & contra: Item convulsionones scorbuticæ subinde etiam in paralytin nonnunquam terminantur, aut etiam in cataphoram: Nunc transeunt in tumorem modò evanescentem, modò denuò emergentem; nunc in asthma convulsivum, subinde & epilepsiam.

Quando scorbutici atrocissimis doloribus artuum laborant, subito lethargo correpti in alium statum mutantur.

Difficilioris curationis observatur scorbutus calidus dictus, quàm frigidus, cum in illo particulæ Sino & Præ sanguinis massæ intricatius junctæ videantur, in hoc verò laxè magis ipsi adhærescant.

Scorbutus morbis diuturnioribus superveniens, aut valetudinarios ex quacunque causa invadens, ægriùs curatur, utpote in quibus & sanguis & viscera jam tum vitiata sunt.

Cujus etiam ferè generis est scorbutus mala victûs ratione, & imprimis potus generosioris frequenti usu contractus; cum e contra, qui per contagium, aeris insalubritatem, aut vitam sedentariam excitatur, minorem curandi difficultatem foveat.

Sic difficulter compescitur scorbutus hæreditarius, aut qui lacte materno aut nutricis fuerit instillatus.

Quò fixior est scorbutus, eò difficilior curatur; si vagus, meliùs curatur.

Præcæteris gingivarum habenda est ratio, quarum cruentationi & exulcerationi interdum gangræna supervenit, interdum etiam livor & putredo palatum occupat & corrumpit; vid. Sennertus: id quod quibusdam ansam dedit, ut putarint esse lue veneream, cum tamen tantum fuerit scorbutus: Alias certum est, nullum morbum magis cognatum esse lue Præ, quam scorbutum, cum etiam dolores in scorbuto æquè nocturno tempore magis affligant, sicuti fit in lue Præ.

Humorum per superiora atque inferiora rejectio parum levaminis scorbuticis creat, sed hi potiùs doloribus & cruciatibus ventris diuturnioribus conficiuntur: vid. Eugalenus *de Scorb. p. 7. & 8.* imprimis scorbutus cum diarrhœa est periculosissimus.

Hoc tamen circa prognosin scorbuti adhuc notetur: illam cautè esse applicandam, cum plurimi pro desperatis habiti reconvalescant; E contra etsi symptomata mitiora videantur, si abdominis viscera indurata, & pulmones corrumpi incipiant, vix successus laudabilis promitti poterit: vid. Willisius *de Scorb. cap. 6.*

CU-



Quod attinet curam mali hypochondriaci & scorbuti : in hac ad mali scaturiginem præsertim est respiciendum. Propterea

1. Acidum viscidum peccans & vitiosæ cruditates, tam primarum viarum, quàm in M. S. & succis corporis corrigantur: idque vel cum generalibus acidum temperantibus, vel specificis, in specie antiscorbuticis, acidum scorbuticum emendantibus.
2. Correctum acidum peccans, & ita in serosam materiam transmutatum, evacuandum, imprimis per vomitum, urinam, & sudores.
3. Stomachi semper exacta habenda est ratio, ejusque fermentativus liquor volatilibus temperandus & volatilisandus, & digestio naturalis, quantum possibile, promovenda, & in naturalem statum restituenda.
4. Lacticiniis sanguinis crasis in scorbuto corrupta, seu cacochymia, emendanda & quasi renovanda. Ac
5. Si quæ subsint evacuationem solennium suppressiones, tollantur.

Corrigentia acidum sunt vel generalia, nempe metallica absorbentia, & alia, Inna, & quæ de salium fixorum alcalium sunt natura, omne acidum destruentium; item vegetabilia acra & aromatica, animalium partes duræ, Marina, & ex omnibus his parata multa remedia artificialia: Vel sunt specialia, ut salia volatilia acra & oleosa antiscorbutica ex vegetabilibus, tam nativa, quàm arte facta, & animali regno ab appropriatis desumpta, nempe lumbricis, &c. Crasin M. S. sensim alterantia, & ita nunc per sudorem, nunc per urinam heterogenea excludentia. Hæc vulgò hepatica, item splenetica, & stomachica appellari solent: quibus commodè elegantiores Ræ & les aut Oares sociandæ sunt. In quibus scopis simul observanda semper symptomata varia, ut additis convenientibus remediis & horum ferocia mitigetur. Cumque ex superioribus constet, causam scorbuti proximam in duplici falsedine p. n. consistere, utraque etiam sui emendationem postulat; & quidem tam in primis visis, si in culpa fuerint, quàm in M. S. ratione primarum viarum, quia in his vel occasione assumptorum, vel dyscrasie propriæ, cruditates, tanquam scorbuti prima rudimenta, cumulantur, illorum selectum pars diætetica, hujus emendationem pharmaceutica docebit. Scilicet: alimenta euclyma

Tom. II.

atque eupepta simpliciora, & facultate incidendi atque resolvendi pollentia, assumantur; crassa, viscida, & condita, fumo indurata, legumina fructus immaturi, pisces, & alimentorum farrago, evitentur: saccharum & saccharata ratione salis acris & corrosivi à plurimis in tantum vituperantur, ut ex recentioribus sint, qui eorum abusum scorbutu hujus seculi adeò frequenti, hujusque augmento multum contribuere autumant: vid. Horstius *libr. 7. Observat. 34.* Mcellenbrocc. *de Vasis cap. 8.* & Willisius *de Scorbuto pag. 303.* Potus sit vinum generosum & ventriculo gratum, cerevisia probè defecata, item lac, falsedinem scorbuti quidem eluens atque temperans, ventriculo tamen cruditatibus reposito non adeò faciliè exhibendum; cui etiam substitui potest serum lactis primas vias magis laxans, ac per urinam evacuans, adeoque rusticis, Frisiis ac Batavis hujus quotidianus usus commodum à scorbutu vernaculo existit præservativum. Quibus præter aquam nihil potulenti concessum, aut hanc cum vino temperant, seliguntque fontanam pellucidam minusque limosam, aut chalybeatam bibunt; cui tamen acidulæ meritò præferuntur; vid. Horstius *l. a. p. 80.*

Pro meliori curæ directione observandum:

I. V. S. quamcunque in his affectibus per se nullius esse usus, neque in malo hypochondriaco, neque in scorbuto; utut sint, qui in adjuncto splenis affectu salvatellæ sectionem mirè laudent in manu sinistra: & certum est, quod multi insignes practici aliquot observationibus inducti hujus salvatellæ sectionem in manibus commendent: sed tamen re ipsa constat, quod hæc ipsa vena præ aliis venis nullam habeat prærogativam in brachio, unde hujus sectio ridicula est, de qua vid. in specie Marcus Aurelius Severinus *in Castigata pseudo-plebotome*: Unde mirari subit, quomodo secuta sint subinde tam prosperæ curationes post hujus sectionem. Interim tamen, utut per se non convenient, tamen interdum indirectè & saltem per accidens, v. g. in dolore crurum scorbutico fixo incipiente V. S. brachii interdum egregiè confert: sic etiam in cephalalgia scorbutica incipiente, aut sæpiùs recurrente, & similibus, in principio V. S. in brachio confert, per accidens autem, non secus ac etiam fonticuli per se nihil conferunt, à posteriori tamen in affectibus scorbuticis catarrhalibus crebriùs affligentibus, per accidens sunt proficui, cruribus inusti.

II. Diuretica imprimis, & hinc sudorifera blanda, sunt optima & naturalissima mali hypochondriaci & scorbuti evacuantia: Certum est, si in malo hypochondriaco largiter

(Qqq)

fluit

fluit urina, maximum esse levamen : sint autem in principio blandiora, ne ex primis viis ad vasa rapiant saburram morbificam. Inter diuretica conducunt præsertim remedia salina, de alcalium profapia, non terrea, nec acida, sed alcalia vel fixa vel volatilia. Osa ex insectis; speciatim arcanum duplicatum Myns. perquam egregium est, ~ Qi volatilis, ~ lumbricorum terrestrium, &c. ~ Stipitum fabarum, Ra Qi si ritè parata, vel ~ Qi vel ex scoris ~ ii, vel sola vel cum dimidio ~ ~ \*ci mista: v. g.

℞. arcan. dupl. Myns. 3j.

~ centaur. min.

genista aa. 3ß.

M. pro tribus vel 4. dosibus.

D. S.

**Harn-treibende Pulver.**

℞. lapill. ~ præp. 3j.

~ a fol. Qi 3ß. M.

℞. Ra Qi 3ij.

~ ~ \*ci 3j.

M. D. S.

**Harn-treibende Tinctur.**

Dosis 30. guttulæ.

℞. Ra Nephrit. Sulzb. 3ij.

~ carminat. de tribus 3ij. M.

℞. ~ Qi volat. 3j.

cochlear. 3ß.

~ vol. succini gr. vi.

M. pro duabus dos.

Sudorifera dixi debere esse blandiora, cum subinde scorbutici plus debito sudoribus diffluant, sunt vulgaria & usitata cum Antiscorbuticis mixta. Dravvizi *de Scorbuto* p. 159. commendat spiritum sequentem:

℞. ~ Qi opt. lbj.

cochlear. 3jv.

Mistis irrorentur

~ Oli ad rubedinem mediocri igne exsic. lbij.

Diger. in MB per aliquot dies, dein per retortam destilletur ~, in fine Δe fortissimo, donec ~ Oli transeat. Cujus misturæ 3ß. l. 3j. pro dosi sudorifera sufficit, & conducere astringit.

Conveniunt optimè, quando in scorbuto partes nervæ externæ graviter affliguntur, observando tamen constitutionem ægri habitus plus minus rarioris, item magis vel minus sudoribus colliquativis affectorum; pro horum enim consideratione vel copiosiora, aut rariora, vel fortiora aut blandiora, usurpanda sunt sudorifera: v. g.

℞. Bezoard. ~ ial. gr. xv. ad 3j.

~ card. ben. 3ß.

M. D. S.

**Scorbutisch Schweiß-Pulver.**

℞. ~ ii diaphor. gr. xv. ad 3j.

cinnab. ~ ii gr. xij.

~ destillat. cochlear. gutt. j.

M. f. pulvis.

℞. ~ fumar.

flor. samb. aa. 3ß.

~ cochlear. 3j.

syr. card. ben. 3ß.

M. D. S.

**Wässerlein zum Pulver.**

℞. Conserv. cochlear. 3j.

Bezoard. ~ ial. 3j.

~ is absinth. 3ß.

M. t. Bolus: S.

**Scorbutische Schweiß-Lattwerge auff einmal.**

℞. ~ fulig. 3ß.

cochlear. 3j.

M. D. S.

**Scorbutische Schweiß-Mixtur auff einmal.**

℞. Rabexoard.

~ cochlear. aa. 3ij.

M. D. S.

**Scharbockischer Spiritus 30. Tropffenauff einmal.**

℞. ~ fumar. 3j.

Ess. lign. compos. c. antiscorbutic extract. 3j.

~ ii diaph. ~ ial. gr. xv.

syr. de fumar. 3ij.

M. S.

**Scorbutisches Schweiß-Träncklein auff einmal.**

Potest etiam loco fumarizæ ~ adhiberi ~ scordii, cardui benedict. &c.

℞. ~ antiscorbut. Dornier. 3iß.

mixt. simpl. 3ij.

~ ~ \*ci sassaf. 3ß.

rob. juniper. 3j.

syr. fumar. 3ij. vel 3ijj.

M. pro duab. dos.

III. Basis curandi mali hypochondriaci est vomitus, præmissis digestivis; & si alvus constipata, enemate appropriato provocanda, eaque interdum post mensem repetenda, vid. Hartmannus in *Prax. Chym. cap. 184. §. I.* Unde dicunt, optimum esse, si Hypochondriaci literati omni spatio menstruo ad ebrietatem bibant & vomant. Si ventriculus cruditatibus refertus est, nauseam & vomendi conatum patitur, vomitus optimus est, imprimis absente dolore abdominis. Observandum tamen, (1.) ut ventriculi habeatur ratio, isque debilis fortioribus vomitoriis non nimis enervetur. (2.) Ut præscribantur in majori dosi, cum interdum dupla, imò tripla requi-

requiratur, & quidem potius in forma sicca, quam liquida. In scorbuto, qua tali, raro convenit vomitus, nisi forsan primæ viæ saltem mundificandæ: nam periculum est, ne vomitoriorum vi acriores scorbuticorum succi commoti varia ac deinde periculosa symptomata primarum viarum inferant, cum ipsi scorbutici subinde à vomitionibus enormibus aut saltem inanibus, utut pravissimis vomendi conatibus, misere vexentur.

IV. Purgantia fortiora & propriè dicta quæcunque semper & maximè nocent aut saltem non profunt hypochondriacis, & deteriorem reddunt scorbutum, imprimis si adest dolor stomachi, quin & intestinorum atque abdominis gravia inferunt symptomata, disponuntque ad dysenterias, tormina, & diarrheas, &c. Confer. Sennertus *lib. 3. Prax. pag. 608.* Timæus *Epist. p. 235.* Mollenbroccius *de Varis pag. 55.* Speciatim si dolores in scorbuto urgeant vel abdominis vel artuum, sedulo caveamus à purgantibus propriè dictis, quia augent malum. Ad hæc in hypochondriacis purgantia subinde parum aut nihil operantur propter tormina, semper lædunt, saltem pareses aut contracturæ hinc excitantur; laxantia e contra optimè profunt, interitum cum euphoria largiter evacuant. In mulieribus hypochondriacis vel hystericeis ex levi usu purgantium facilè dysenteria sequitur.

V. In malo hypochondriaco semper sedulo habenda est ratio mucaginis viscidæ aut pituitæ vitreæ, seu familiaris fomitis saporis hypochondriaci, à quo ferè diuturnitas ipsius mali ac symptomatum in primis viis pertinacia dependet. Simus ergo semper in ejus cura solliciti, viscidum pituitosum ut incidatur & attenuetur, hinc blandè & successivè potius quam confertim per primas vias evacuetur. In quem finem gummata, & ex his parata potiones ac pilulæ acuendæ cum extracto trochiscorum alhandal repetitis vicibus assumendæ sunt optimæ, id quod pariter in quibusvis ferè morbis chronicis ac cachecticis observandum.

VI. Inter præcipua curationis in his duobus affectibus, & imprimis in malo hypochondriaco hoc observandum est, ut alvus semper servetur aperta: nisi enim fluida est, solent insigniter exasperari symptomata, capitis perturbationes & symptomata melancholica; si in scorbuto non est aperta, dolores artuum & abdominis exasperantur. Ideo æger subinde habere debet aliquot medicamenta familiaria, quibus crebro utatur, modò hoc, modò illo. Ne autem unius superveniat fastidium, aut ne natura uni assuescendo sine alteratione id accipiat.

VII. Notabile est, quod monet Hartmannus *Prax. Chymiatr. cap. 184. §. 9.* ubi dicit: *Notaverò, subinde usu evenire, ut ab exhibitione*

*aperientium & similium, solutis jam viscerum obstructionibus, ita alvus proritetur, ut quasi dysenteria subsequi videatur, tunc providendum erit corroborantibus appropriatis, in specie elyxir. proprietatis, & coralliorum, & similibus viscerum tonum conservantibus.*

VIII. Alterantia, vulgo aperientia dicta, non semper fortia aut sicciora, v. g. absorbentia vel Martialia, æque conducunt, sed interdum leniora & quasi humectantia, præstantiora observantur. Huc facit, quod dicit *Wædelius Tr. de Medic. Facultat. pag. 50.* *Observavi sæpius, contumaces hypochondriacas, cum fortioribus & siccioribus aperientibus frustra & diu fuissent vexati, optimè habuisse ab humectantibus hujusmodi, unde & Galenica medicamenta cum chymicis hic commodè miscentur, & in infuso commodè dantur, indecoctis etiam obeandem rationem.* Item ut summam hæc repetamus: Aquea & liquida magis diluunt & temperant, terrea magis absorbent, salina magis per urinam pellunt, alcalia magis incidunt, acria magis attenuant & resolvunt, dulcia magis abstergunt, amara simul magis roborant. Pertinet huc quoque notabilis cautela Tachenii de usu Galium, in iis, in quibus viscera tumida & infarcta jam ad scirrhosam naturam degenerant, minus proficua. vid. *Clav. Med. Hippoc. pag. 181. & 192.*

IX. Compertum est, quod in malo hypochondriaco etiam medicamentorum antiscorbuticorum aliorumque volatilium optimus sit usus, imo vix sine alterantibus scorbuticis curari possit, quod aliis remediis non cedit. Quod si malum altius prosectum sit, antiscorbutica vel sola conveniunt: Non solum in scorbuto propriè sic dicto, sed etiam in malo hypochondriaco paulò molestiore. Præceteris spiritus carminativus in hypochondriorum affectibus mirabilis existit.

X. Specificorum antiscorbuticorum magna est varietas, utut propriè sic dicta antiscorbutica omnia de Æe volatili acri participant; nunc enim sunt acriora, nunc temperata, nunc aromatica & Ærea. Ob id attendant Medici ad constitutionem ægri, semper delectum quendam inter remedia antiscorbutica habendo, cautèque observent, quæ & qualia imprimis uni alterivè subjecto magis sint familiaria: Nā antiscorbutica acriora & volatilia subinde magnā scorbuticis inferunt noxā sinistrè usurpata; si in biliosis subjectis, si etiam in subjectis, in quibus alcali non nihil volatili & acrius peccat. In talibus enim effervescentias acres, & phlogoses, symptomata multiplicia & vaga non raro excitari solent. Quo in casu antiscorbutica acria non conveniunt, sed fixa præmittenda aut temperatis aliis vulgò refrigerantibus appellatis, v. g. cichorio, endivia, acetosa, acetosella, it, acidis blandis,



dis, succo citri, ribijum aut berberum, ~tu  
 Ois dulci & similibus temperanda & emen-  
 danda. Quò etiam serum lactis pertinet, ceu  
 optimum antiscorbuticorum nimis acrium  
 correctivum.

Selectum antiscorbuticorum quod spectat,  
 vid. Helvetius *Tr. Vit. Aur. p. 50.* dum in scor-  
 buto cum maculis cæruleis discoloribusque  
 cochleariam; cum maculis verò rubris aceto-  
 sam; cum tumoribus artuum quasi hydropi-  
 cis fumariam; cum atrophia beccabungam  
 imprimis commendat. Par ratio est in hy-  
 pochondriacis, quippe ubi phlogoses adsunt;  
 non adhibenda o,sa aromatica, quibus potius  
 exacerbantur, sed potius volatilia macra, seu  
 salia volatilia macra, seu salia volatilia non o,sa,  
 uti est ~Θ\*ci, carmin. de tribus, &c. Adeoq;  
 in subjectis, ubi alcali volatile acre, & hinc de-  
 pendent phlogoses adsunt prius fixa o,alia  
 acidum absorbentia, propinanda sunt, vel vo-  
 latilium acrium loco substituantur.

XI. Acetum nocet tam hypochondriacis  
 quam scorbuticis; succi tamen vegetabilium  
 acidi non nocent, nisi in quantum fermenta-  
 tiones p. n. excitare queant. Nempe magna  
 est differentia inter aciditatem succorum fru-  
 ctuum, v. g. pomorum aut pyrorum, ab aceto  
 ex istis succis per fermentationem parato:  
 quo etiam faciunt succus citri, aurantiorum,  
 &c. hypochondriacis ac scorbuticis non adeo  
 hostiles; qui licet acidi, tamen in talem, quæ  
 spiritibus sociabilis est aciditatem terminan-  
 tur, adeoque minus nocua existunt.

XII. Hujusmodi antiscorbutica appropri-  
 ata seu volatilia acia non sunt usurpanda mox  
 in principio curæ, sed consultum est fixa, pri-  
 marum viarum acidum temperantia & abster-  
 gentia, o,alia scilicet, vel salia alcalia præmit-  
 tere horum usui, aut etiam eadem ipsa subinde  
 interponere, ut cicuratis istis succi peccantes  
 minus exasperari per volatilia, minusque ef-  
 fervescere queant: Hisce præmissis tandem  
 appropriata volatilia subungi possunt. Quæ  
 ipsa quoque si effervescentias aut phlogoses  
 excitare observentur, lacte vel sero lactis, aut  
 additis acidulis succis, temperanda.

XIII. Lac & omnia lacticinia in scorbuto,  
 præmissis universalibus & vitiosum acidum  
 corrigentibus, quamdiu stomachus adhuc di-  
 gerendo aliquid valet, sunt optima. Singu-  
 lare enim quid obtinet lac in corrigenda crasi  
 sanguinis à scorbuto vitiata, omne vitiosum  
 acidum temperat, falsedinem acrem emendat,  
 partes solidas imprimis nerveas nutritio re  
 humectat; unde in scorbuticis, qui nimium  
 sudant, & ad tabem inclinant lacticinia nobi-  
 lissima sunt remedia, & atrophie ac phthise-  
 os metum tollunt, imprimis si legitimo modo  
 cum antiscorbuticis appropriatis misceantur.  
 In specie commodè propinatur in lacte ~Θ  
 \*ci mistus cum ana ~ cochleariz, de quo

capiatur omni mane & vesperi semper bonus  
 haustus. In hypochondriacis autem cum fa-  
 cilius coaguletur, cruditates & obstructions  
 metuendæ sunt. Appropiatum verò iis ma-  
 gis erit serum utpote potentiore virtute ab-  
 sterforia pollens, præprimis si ipsi vegetabilia  
 appropriata, hepatica & splenetica dicta, in-  
 fundantur aut incoquantur, vel hoc cum illo-  
 rum succis & essentiis temperetur ac ventricu-  
 lus illud ferat.

XIV. In cura scorbuti monent practici, ut  
 à Mercurialibus quibuscunque omninò absti-  
 neamus, aut saltem cautè eadem usurpemus;  
 quia metus est, ne o, ad salivationem dispo-  
 nens, pessima ac periculosissima symptomata  
 faucium & oris inferat: it. Dolores nocturnos  
 in artubus solent exasperare o,alia, & etiam  
 graves phlogoses, æstuationes & angustias  
 excitare in tali corpore. Interdum, ubi hu-  
 mores acidi sunt in corpore, o,antur, uti cum  
 aqua fortificari solet; antimonialia ideoque  
 scorbuticis sunt optima. In malo verò hy-  
 pochondriaco Mercurius dulcis commodè  
 admodum usurpari potest, miscendo cum cæ-  
 teris laxantibus, quia fomitem materiz visci-  
 dæ optimè incidit & abstergit.

Quòd attinet ergo rem medicam in cura  
 mali hypochondriaci & scorbuti proficuum:  
 imprimis digestiva dicta & præparantia, sor-  
 des viscidas atque acres primarum viarum in-  
 cidentia & detergentia, simulque vi diuretica  
 materiam ad liberiores urinæ excretionem  
 disponentia, præmittenda sunt & subinde re-  
 petenda; aliàs enim levioribus evacuantibus  
 cruditates hæ non cedunt, potentioribus ve-  
 rò cum magnis torminibus ejiciuntur. Talia  
 sunt ex vegetabilibus illa aromatica mitiora,  
 quæ digestiva, incidentia & aperientia com-  
 munitè dicuntur, v. g. herba scolopendrii, ce-  
 terach, centaur. min. hyssop. marrubii, roris  
 marini, radix gentianæ, polypodii, cichorii,  
 chinæ, petroselin., liquiritiæ, ligr. saffras, myr-  
 rha &c. illorumque Oia fixa per incineratio-  
 nem parata.

Ex mineralibus conveniunt terrea, marina  
 & metallica; quæ tamen non tam in viscidum,  
 quam in acidum videntur operari, unde etiam  
 absorbentia vocantur. v. g. creta, Mars & hu-  
 jus o, aliaque o,alia & o,alia. Ex marinis  
 succinum præparatum, corallia præparata,  
 margaritæ præparatæ. Ex lapidibus possunt  
 hic adhiberi varii generis medicamenta usua-  
 lia, crystallus præparata, &c. Saltem note-  
 tur hic, non esse adhibendos lapillos, parti-  
 cipantes de o, e; nam hi lapides constant ex  
 multis partibus terrestribus, & paucis o, ali-  
 bus, v. g. lapis hæmatites, magnes, &c. hinc  
 absorbent quidem acidum, interim tamen ob  
 copiam partium terrestrium nimis adstrin-  
 gunt. Jam verò notum est, acidum excessi-  
 vum ventriculi in scorbuto & malo hypo-  
 chon-

ehondriaco coagulare excrementa, utinde frequens sit malum hypochondriacis & scorbuticis alvi obstructio; & reverà non alio modo accidit obstructio alvi, quàm quatenus acidum excessivum, concurrens cum partibus excrementitiis terrestribus, degenerat in corpus stypticum.

Ex animalibus conveniunt lapilli cancrorum, percarum, carpionum, castoreum, illorumque volatilia.

Ex compositis vero magis ☿ ☽ latus, ☿ ☽ atus, ☽ digestivum hypochondriacum, ☿ foliata ☿ ri, ☿ ☽ latus, liquor ☿ x foliata ☿ ri, seu sal essentialiale Zwelfferi, quod videb. in *Apol. contra Tacch. p. 73.* Porro conveniunt extractum Martis, R ☽ ☽ is Zwelfferi & Ludovici, liquor ☿ x Mart. Oaris, ☽ ☽ is compositum, R ☿ i acris, antimonii ex scoriis reguli ☽ ij, R ☽ ii. sicca, pulveres Martiales, crocus ☽ is aperitivus, limatura pulverisata, tartarus chalybeatus, antihæcticum Poterii, ☽ diaphoreticum ex regulo ☽ ali, bezoard. ☽ ale, minerale; ex ☽ re flores ejus, Elixir proprietatis sine acido & cum dicto ☽ e essentiali paratum, & similia. Præ cæteris omnibus arcanum duplicatum Mynsichti, quod in specie destinatum est scorbuto à Mynsichtio, Schroedero & Langelotto. Hæc sedulo ad unam vel duas septimanas præmittantur; capiantur quotidie bis bona dosi, v. g. salis digestivi hypochondriaci quotidie bis ☽ j. ad ☽ ß. liquoris ☿ x fol. ☿ j. gutt. 30 40. l. 50 manè jejuno stomacho in vehiculo calido, à meridie in frigido. Aliàs equidem acida quoque in visciditate primarum viarum corrigenda magni usus sunt; quia tamen acor quidam ut plurimum in malo hypochondriaco combinatur, cautos nos esse decet in talium propinatione. Igitur non imitandus Sennertus C. 2. *Epist.* 30 & 35. ubi spiritum ☽ li ☽ is & Elix. proprietatis ratione ☽ ☽ is commendat. Salia dicta essentialia, de quibus vid. *Chymiat.* Rolsinecii, etiam non perperam adhibentur. Porro quæ ex ☿ ro recentiores pollicentur nonnulli, v. g. Langelortus ☽ volatile amaricans, ☽ um ☿ i ☽ sum, de quo vid. *supplementum* 2. Becheri, suam mereri laudem. Ex ☽ a, excreta in loco publico, v. g. in cauponis, elaboratur per blandam calcinationem & elixivationem ☽ multarum virium, id quod Dresdæ à nonnullis commendatur, tanquam in signe antiartheticum.

Pro corrigendo acido hypochondriaco:

- ☿. ☽ cicher.  
fumar. ā ☽ ß.
- Solut. Mart. c. succo pom. ☽ iij.
- Syr. de ☽ rad. ☽ j.
- M. F. Mistura.
- ☿. ☽ fenicul. l. fumar.  
menth. āā. ☽ ß.

sol. ☽ is c. succo pom. ☽ ß.  
mag. corall. c. f. c. ☽ ß ad ☽ j.  
syr. cort. aurant. vel san. ☽ ß. ad ☽ vj. M.

- ☿. R. ☿ acerr.  
ex scoriis reg. ☽ ij. āā ☽ ß.
- ☽ ☽ ci ☽ j.
- M. Dos. 40. gutt.
- ☿. R ☽ is aperit. ☽ ij.
- ☽ cochlear. ☽ j.
- ☽ ☽ ci ☽ ß.

M. D. S.

Größfnde Tinctur/ 50. Tropffett.

- ☿. Limat. ☽ is crud. pulverisat.  
☽ chalybeat. āā ☽ j.
- ☽ lati ☽ ß.
- mag. corall. c. f. citri ☽ j.
- M. f. Pulv. pro 5. dosibus.
- ☿. Sol. ☽ is cum succo pom. ☽ vj.
- ☽ cochlear. ☽ ß. ad ☽ iij. M.
- ☿. R. ☽ li ☽ is Zwelfff.
- Ess. fumar. compos. āā ☽ ij. M.
- ☿. arcan. dupl. ☽ j.
- oc. 69. prepar. ☽ ij.
- M. f. Pulv.
- div. in 4. part. xqual.

D. S.

Größfnde Pulver.

- ☿. Arcan. Dupl. Mynf.  
corall. rub. prep.  
antihect. Pot. āā ☽ ß.
- M. f. Pulv. pro 4. dosibus.
- ☿. limat. ☽ pulverisat. ☽ ß.
- ☽ destillat. sassaf. gutt. ij. M.
- ☿. Corall. rub. prepar.  
ebor. f. Δe āā ☽ ß.
- ☽ ☽ is ad alb. calc. ☽ ß.
- M. f. pulv. pro 2. dosibus.
- ☿. croc. ☽ is aperitiv. ☽ ß.
- arcan. dupl. ☽ j.
- ☽ absinth. ☽ ß.
- M. f. pulvis pro 3. dos.
- ☿. croc. ☽ is ☽ ß.
- corall. rubr. prep.
- ☽ is fumar. ana gr. v. vel vj.
- M. f. pulvis pro 2. dos.
- ☿. Croc. ☽ is aperit.
- crystall. ☽ i
- pulv. rad. ari āā ☽ ß.
- mag. cochlear. ☽ j.

M. S.

Digestiv - Pulver auff 3. mahl Morgens in warmer Suppe.

Præmissis his digestivis usurpentur vomitoria primas vias potenter emungentia, eaque reiteranda: inter quæ eminent infusa ☽ ialia, vel ☽ emet. Mynf. qui in malo hypochondriaco optimè conducit, à gr. jv. vel mistus cum  
(Qq q 2) anti-

antiscorbuticis, vel ubi viscidum incidendum, cum Sinis. v. g.  $\Theta$ \*co depurato, &c. His simul temper appropriata scorbutica vel antihypochondriaca misceantur: v. g. si fiat infusio croci metallorum in vino, tunc filtraturæ addendum ~ cochlearia.

℞.  $\nabla$  antiscorb. Dorncr.  $\mathfrak{z}$ ij.

~ cochlear.  $\mathfrak{z}$ ℔.

¶emet. Mynf. gr. iij. l. jv.

extr.  $\sigma$ is.  $\mathfrak{z}$ ℔.

M. S.

### Brech-Traneß auff 1. mahl.

Post hæc vel loco horum usurpentur blandè evacuantia per alvum, & quidem in scorbuto sic dicto calidiore, in frigidiore verò per paulò potentiora: utraque tamen non sæpius reiteranda, vid. Eugalenus de Scorb. 233. 243. 248. & Salomon Albertus de Scorb. §. 254. Inter hæc conveniunt pilulæ non tam præcisè evacuant, quam saltem laxantes, primas vias abstergentes, aliàs usuales dictæ. Quoad pilulas purgantes, MP. de gummi ammoniaco Querc. MP. ¶eat. Querc. & Bontii, item pilulæ de fumar. & aperientes Tilemanni c. ¶io dulci, &c. usurpentur; item Extract. catholicum cum gummi ammoniaco, bdellio, galbano & similibus in pilulas redactum, & cum trochiscis alhandal acuatum: quales formulas Sylvius Pr. libr. 1. cap. 2. §. 34. c. 7. §. 52. c. 14. §. 50. c. 30. §. 138. &c. 34. §. 102. cap. 35. §. 16. describit, & commode hypochondriacis propinari possunt. Gummi enim ammoniacum laxat & promptè abstergit quascunque sordes in primis viis stabulantes. Facit huc MP. antiscorbuticarum Timæ.

Saltem hîc notetur: subinde pilulis talibus esse adjungenda medicamenta aut  $\sigma$ ialia, aut  $\mathfrak{z}$ ialia aut  $\mathfrak{z}$ lia, ne alvum post purgationem relinquant adstrictum. Præ cæteris pilulis usuales sunt communiter quidem aloëticæ, ex extracto aloës gummoso, quâ ratione pilulæ rosacæ Francofortenses & Glassianæ, singulis 8 vel 14. diebus vesperi semel usurpatæ hypochondriacis sanè perquam proficue sunt; Item pilulæ aloëticæ ad imitationem Ludovici in Pharmacia, it. in Tr. de Volatili  $\Theta$ ¶, Francofortenses præprimis cum ¶ro  $\Theta$ lato, simili vè salino stimulo addito, acuatæ. Ipsa aliàs aloë in se hypochondriacis aut scorbuticis plus nocet, quam prodest, propter virtutem adstrictivam, quam altero die post se relinquunt ordinariò ratione partis resinosa, ut ut primo die laxent; his enim resinæ purgantium & extracta resinosa minus commode propinantur, nisi forsan habitioribus & succulentioribus; propterea si aloë volumus usurpare, usurpemus substantiam gummosam, quæ potest separari, terendo aut extrahendo  $\nabla$  simplici, menstruo aqueo, quæ substantia gummosa potest redigi in formam pilularum, & tales pilulæ dosi granorum ij. vel iij. blandè laxant al-

vum, & in tali casu hypochondriacis confirmatis omnibus tribus vel quatuor septimanis in usu sunt, egregia cum euphoria. Omnes hæc vel per se usurpari, vel cum aliis appropriatis specificari, & cum tantillo resinæ scammonii aut jalappæ, vel extracto trochiscorum alhandal acuari possunt. Et sane ab hujusmodi pilulis usualibus primas saltem vias abstergentibus longè plus commodi sentiunt hypochondriaci, quàm à fortioribus etiam propinatis purgantibus.

℞. MP. de Ammon. Querc. gr. xv.

gumm. Ammon.  $\dagger$ o sol.  $\mathfrak{z}$ ℔.

scammon. ¶rat. gr. ij.

troch. alhand. gr. j.

c. Ess.  $\sigma$ is f. pilulæ. S.

D. S.

### Laxierende Pissen auff einmal.

Item evacuantia appropriata mista alterantibus sunt optima, ut blandè & successivè per continuatum usum evacuentur & alterentur viscositates acidæ, quod faciunt imprimis noduli vino infusi, qui ut in omnibus morbis chronicis, ita in specie in malo hypochondriaco, & hinc scorbuto, sunt optimi. Et quidem ingredientia laxativa sunt imprimis omnia sennata, tam infusum herbar, quàm pulveres sennati compositi. Post sennata sunt helleborata ex helleboro nigro desumpta remedia; sive extractum ejus; sive essentia radice hellebori nigri, quæ extra scopum laxativum commode aliis alterantibus in his malis addenda venit; sive alia ex eodem remedia; Denique his stimuli loco aliquid de colocynthide ejusque extracto potest addi, quod non est inconveniens remedium: quod si fortior jam stimulus his addendus sit, radix esulæ præparata recipiatur.

℞. Herb. persicar rec. Mij.

absinth

roris mar. ana Mj.

fol. sen. f. st.  $\mathfrak{z}$ j.

rhabarb. el.  $\mathfrak{z}$ ℔.

helleb. nigr.  $\mathfrak{z}$ ij.

sem eruc.  $\mathfrak{z}$ j.

Cinam.  $\mathfrak{z}$ ij.

caryophyll.  $\mathfrak{z}$ j.

$\Theta$ ¶i  $\mathfrak{z}$ ij.

Incis. & contul. includantur Nodulo.

Hisce in subjectis siccioribus commode passularum minorum  $\mathfrak{z}$ ℔ addi potest. Rhabarbarum ipsum ad curam mali hypochondriaci tanquam optimum, præsertim paulò succulentioribus, à quibusdam laudatur alterando simul & evacuando: vid. Rhodius C. 2. obs. 100. quia ad obstructionem inveteratam commendat decoctum vel infusum rhabarbari. Spectat huc etiã syrupus de spina cervina seu domesticus, it. syrupus florum acaciæ & de carthamo, qui sunt blandi; aut cremor ¶i cum tantillo radice jalappæ acuatæ, c. g.

℞. Crem.



℞. *Crem. ꝑi* vel *ꝑi* *lati.*  
*pulv jalap.* āa gr. xv.  
⊙ *destillat. mac. gutt.* ij.  
M. f. pulvis S.

*Exier-Pulver.*

℞. *ꝑi* *lat.* vel *arcan. dupl.* gr. xvj. ℥j.  
*scammon.* *ꝑrat.* gr. iij.  
*troch. alhand.* gr. ij. M.

℞. *croci* *is aperit.* ℥j.  
*scammon.* *ꝑrat.*

⊙ *ꝑi* āa gr. v. M.

℞. *fol. fenn.* sst. ℥iij.  
*rad. hellebor. nigri crud.* ℥j.  
*zingib.*  
⊙ *ꝑi* āa ℥j.

Infund. in f. q. *calid.* per noctem.

Colaturæ manè addantur.

▽ *cinam.* ℥iij.

*extract. troch. alb.* gr. j.

M. D. S.

*Exier-Träncklein auff einmal.*

℞. *Strob. pini tenell.* Mj.

*Tamarind.* ℥iij.

*rad. helleb. nigr.* ℥iij.

Coq. in f. q. *cerevis.* secund. in vase clauso & Δe  
lenissimo:

Colaturæ ℥v. adde:

▽ *antiscorbut. Dorncr.* ℥ij.

*crystall. ꝑi* ℥iij.

*succ. cochl. rec. expr.* ℥j.

*Syrup. scelotyrb. Forest.* ℥ij. M.

Verùm alvus obstructa aut saltem contumaci-  
or quotidie laxa servetur, etiam remedia quæ-  
dam domestica sedulo in usum vocanda sunt:  
quæ inter primatum obtinent passulæ, quæ  
admodum conveniunt in malo hypochondri-  
aco, scorbuto etiam, cum alia dulcia, ut sac-  
charum, mel, omniaque saccharata & mellita  
hypochondriacis & scorbuticis propter facil-  
limam acescentiam & propter contentorum  
ex effervescencia concitata turbationem, tetra  
inferant symptomata, & affectus recrudescere  
tanciant. Passulæ autem, quatenus sunt  
temperatæ, potius quamcunque acrimoniam  
in corpore temperant, emolliunt & nutriunt,  
& blanda ac naturali fermentatione vitiosam  
sanguinis fermentationem restitunt & reno-  
vant, conducunt imprimis viris, mulieribus  
non semper. Poma etiam Borsdorffiana alia-  
que dulcia seu cruda bene matura comesta, seu  
eorum succus usurpatus, medicamentum sunt  
laxativum, & admodum temperativum in  
malo hypochondriaco. Hinc succo depura-  
to commodè alia remedia alterantia & laxati-  
va infundi, & ita propinari possunt, qui po-  
tus admodum conducit in malo hypochon-  
driaco. Quo etiam faciunt pilulæ domesticæ  
seu usuales jam dictæ omnibus 8. vel 14. diebus  
semel capiendæ; Item terebinthina manè de-  
glutita, ad quantitatem nucis parvæ, quam  
Horstius l. 4. Obs. 28. singulariter commendat.

Conveniunt ergo hîc passulæ laxativæ,

item pruna laxativa: Item decoctum passula-  
rum laxativum cum & sine tamarindis; nam  
& ipsi tamarindi utilissimi sunt hypochondria-  
cis ac magis scorbuticis, illis præsertim, in qui-  
bus phlogoses & æstuationes vagæ subinde  
observantur.

℞. *passul. min.* ℥iij. l. ℥ij.

probè conquass. coqu. in f. q. *▽ simpl.*

Colat. adhuc ferventi infunde

*fol. sen. sst.* ℥iij.

*flor. violar.* P. ij. ad iij.

*Crem. Tartari* ℥j.

Stent aliquandiu in loco calido, postmodum  
coletur & asservetur prout.

D. S.

*Exier-Tränck.*

Capient hypochondriaci haustulum vitri uni-  
us, & intersit etiam pro vehiculo reliquorum  
remediorum, blandè servat alvum apertam.

℞. *passul. min. conquass.* ℥iij.

coqu. in f. q. *▽ simpl.*

Colaturæ ferventis ℥ij. infunde

*fol. fenn. sst.* ℥iij.

*rad. helleb. nigr. non prapar.*

*cort. aurant.* āa. ℥ij.

*galang.*

*zingib.* āa ℥j.

*crem. ꝑi* ℥ij.

Stent in loco tepido per noctem, vase clauso.

Colaturæ adde:

~ *cochlear.* ℥iij. M.

℞. *pulp. passul. min.* ℥ij. l. iij.

*arcan. dupl. Myns* ℥j.

⊙ *\*ci depur.*

*spec. dia-3 piper.* āa ℥iij. l. ℥ij.

*syr. de pom. Reg. Sab.* q. l.

M f. Elect. pro aliquot dosibus usurpan-  
dum, quod sufficienter alvum apertam servat.

Siverò alvus nimis contumax sit, aliquot  
granis trochiscorum alhandal vel horum ex-  
tracti facillè potest acui. Melius autem est in  
forma liquida propinare.

Præter dicta clysteres quoque in malo hy-  
pochondriaco & scorbuto magnæ sunt effica-  
ciæ pro alvo aperta servanda, præsertim in pa-  
roxismo, quando æstuatio corporis, phlogo-  
ses &c. urgent, in abdominis affectibus minu-  
endis, palpitatione cordis, anxietate melan-  
cholica, dolore abdominis scorbutico; & qui-  
dem saltem emollientes & blandè abstergen-  
tes sufficiunt; vel, quod melius est, ex urina  
pueri, quæ conveniunt in malo hypochon-  
driaco cum copiosis flatibus juncto: Si con-  
tumacius sit malum, conveniunt clysmata  
cum lixivio diluta, additis aliquot uncis mel-  
lis depurati. Talia clysmata mirè conveni-  
unt intestina abstergendo, in specie si crassio-  
ri mucositate sunt oblecta. In doloribus abdominis  
conveniunt clysmata ex sero lactis, aut ex la-  
cte; vel simplici, cui parum sacchari sit addi-  
tum; vel cui incoquantur plantæ quædam car-  
minativæ.

In spe-

Inspecie, si urgeant dolores nephritici nothi, conveniunt clysmata ex lacte cum terebinthina. Quin etiam clysteres, qui vesperi injiciuntur sub introitum lecti, & per totam noctem retinentur, admodum commendantur in *Obs. Horstii*, & ferè ex lacte præparantur, in scorbuto summè proficui: Imò sunt, qui alternis diebus illorum injectionem commendant, v. g. Riverius *l. 12. Pr. c. 5. c. g.*

- ℞. *Lact. bubul.* ℥ix.
- Elect. lenitiv. ℥j.
- de bacc. laur. ℥℞.
- vitell. ovi. Nj.

M. f. Clysma sub introitu lecti injiciendum. S.  
Lindernd Clystier.

- ℞. flor. Sambuc. Mij.
- fol. hyoscyam. M. j.
- Coq. in l. q. *lactis bubul.* vel *caprill.*
- Colat. ℥x. adde,
- Vitell. ovor. ij.

M. f. Clysmia in doloribus scorbuticis.

Præmissis his universalibus, aut primis viis ritè mundificatis, fiat accessus ad *stomachalia*, *Stia* fixa, aliaque similia, acidum peccans in primis viis emendantia: quibus vel subjunguntur vel simul cum iis subministrantur alterantia, acrida quidem, amara, aromatica quodammodò diuretica in malo hypochondriaco, nempe conveniunt hîc ingenere omnia vulgò dicta aperientia & hepatica amara, & hinc stomachica aromatica, & virtute in specie diuretica insignita. Vel horum loco volatilia spirituosissima, spiritus ac *Stia* volatilia usurpantur, pro varietate nempe constitutionis subjectorum. Nam ista phlegmaticis, sanguineis, frigidis, &c. & in quibus bilis stimulo indiget, conveniunt; hæc verò *Stia* volatilia cholericis, junioribus, melancholicis, & iis, qui crebrius æstuationes patiuntur, magis conferunt *Stia*. Hæc inter eminent nunc *Stia* crudus, nunc præparata varia plus minus cruda, prout plus minus acidum infringendum venit. Hinc in usu sunt omnes croci *Stia* aperitivi, qui, quo sunt simpliciori & acido minus concentrato parati, eò sunt meliores. Croci *Stia* cum *Stia*bus, item limatura *Stia* subtilissima trita. Facit huc etiam *Stia* præparata, quæ in ferri fodinis reperitur, laudata insigniter à Zacuto, item omnes pulveres cachectici, quorum basis solet esse *Stia*, adjectis tamen etiam aliis; pulvis cachect. Hartmanni simplex cum cinamomo, vitriolum *Stia* ad pulveris consistentiam calcinatum, liquor *Stia* Oaris, *Stia* compositum, c. g.

- ℞. Conf. fumar. ℥℞.
- Conf. alcherm. ℥℞.
- Crudi pulverisat. ℥ij.
- mag. corall. c. f. c. ℥j.
- c. l. q. syr. pom. l. fl. papav. errat.
- t. Electuarium.

D. S.

Eröffnende Latwerge auffestliche mabl.

- ℞. pulp. passul. min. ℥j.
- lim. & is pulverisat. ℥j.
- & destillat. cinam. gutt. j.
- M. pro dosi.
- ℞. Conserv. fumar. ℥ij.
- cochlear. ℥℞.
- & is ℥ij. l. Extr. & c. f. pom. ℥℞.
- corall. rubr. præp.
- ebor. f. Δe.
- lap. 69. præpar. āā ℥j. ad ℥℞.
- c. f. q. syr. pom. l. Electuarium.

De quo capiatur omni mane dosi 2. castanearum magnitudinis, subjungendo vesperi Elix. vel essentiam quandam appropriatam.

- ℞. R. is *Stia*. ℥ij.
- cochlear. essent. ℥j.
- M. l. S.

Eröffnende Stahl Tinctur.

Dosis 40. ad 50. gutt. bis in die.

Ratione *Stia* ipsæ acidulæ naturales, quæ originem ducunt ex vena *Stia*li, soluta ab acido *Stia*, in his morbis præmissis præmittendis sunt egregiæ, in quibus præponderat acidum forte: de qua virtute & efficacia vid. Helmont. *Parad & Tachenius in Hipp. Chym. Sylvaticu. C. 1. Conf. 63. & C. 3. Conf. 36. ac Riverius Pr. l. 12. c. 5.* Utum videbitis in Langio *de Usu Therm. Carol. & Acidularum Egranarum*; loco quarum liquor Martis Oaris tanquam acidulæ concentratæ, commodè substitui possunt. Aliis autem acidulis artificialibus vulgò dictis, quales clystus *Stia*, &c. nihil tribuo: Siquidem adeò certum est, quam quod certissimum, acidulas naturales, uti præmonitum est, operari respectu partium sibi junctorum *Stia*lium, quæ defunt dictis acidulis artificialibus. In refræmandis autem æstibus febrilibus, etiam malignis, laudes suas his ultro decerno, præprimis clystio *Stia*. Ex talibus acidulis elaborat Ram suam florum bellidis D. Hornius. Quorum stomachus est nimis sensibilis iis loco acidularum naturalium sufficit tinctura Oli *Stia* Zvvelff. solutio *Stia* cum succo pomorum Borsdorffianorum, item extractum *Stia* cum succo Tamarind. vel succo pom. Borsd. extractum. Hoc extractum succo pom. Borsd. extrahitur cum *Stia* cochleariæ antiscorbutico composito in essentiam seu Ram *Stia*lem, & est egregia Ranthypochondriaca, vid. Dravvizijs; Vel solutio *Stia* cum succo pomor. miscenda cum *Stia* cochleariæ. Dosis 40. vel 50. gutt. bis vel ter in die.

Martialia hæc aliquandiu continentur, & post eorum usum blandus instituatur motus, alvusque servetur aperta.

Huc quoque facit *Stia* diaphoreticum *Stia*le, Bez. min. *Stia*le, & in genere quivis pulveres, electuaria, essentia ac tinctura *Stia*les, anticachectica, &c. Et deniq; laudatur lapis bezoar tan-

tanquam expertum in malo hypochondriaco, ex eo, quoniam quodcunque acidum promptè absorbet.

Observandum autem, ne semper Martialia propinentur in siccioribus subjectis, utpote in quibus blandiora & liquida non rarò majorum virium observantur. In specie v. ubi viscerum infarctus ad scirrhum inclinans, subinde & alia non conveniunt, sed malum potius intendunt; vid. Tachenius *Clav. Hippocr. pag. 181. & 192.* In usu medicamentorum Martialium, in specie acidularum, etiam stomachi habenda est ratio: unde externè emplastrum de ladano Cratonis, item emplastrum de tacamahaca, malaxatum cum oleo chamomillæ, in forma leuti stomachalis applicantur: item corium cervinum cum oleo destillato chamomillæ & menthæ illitum commodè adhibetur. Vel

*Rx. So express. nucist. ʒiʒ.  
destillat. bacc. junip. ʒij.  
cumin. ʒj.  
macis ʒj.*

M. D. S.

**Magen Balsam.**

Alterantia hypochondriaca, quæ veteres consueverunt usurpare præmissis & alibus, imprimis sunt vegetabilia amara plus minus aromatica, hepatica & splenetica dicta, it. stomachica, v.g. herba absinth, agrimonia, cent. minus, rad. armoraciæ, aronis, filicis, poly-podii, helenii, &c. Præ cæteris fumaria, cent. minus, baccæ junip. & omnia ex his parata, ut infusa, decocta, quæ tamen in desuetudinem abierunt, & vina medicata. Magni etiam à nonnullis æstimantur cappares, de quibus audiendusest Sennertus *Pr. l. 3. P. 1. S. 1. c. 7.* qui difficilis non saltem coctionis, sed ratione +i quoque, quo communiter condiuntur, eas suspectas pronunciat, ideòque cum passularum Corinthiacarum tertia parte, saccharo, & tantillo tantum +i eas præparare jubet. Insigniter autem ex his vegetabilibus quæcunque fixa lixivialia per calcinationem parata in malo hypochondriaco conveniunt, quia sunt simul diuretica, ut sal absinthii, cichorii, centaurii minoris, sal stomachale Mynsichti: item & digestivum hypochondriacum, & similia, &c. Faciunt huc etiam vegetabilium essentia; nempe fumarie simplex & composita, & omnia ex fumarie composita remedia, quæ egregia in malo hypochondriaco: essentia splenis bovis, ess. absinthii ad imitationem Dravvizii parata, aliaque similia: item essentia aperitiva D. Mich. èlis.

Elixyr proprietatis commune, vel paratum sine acido, vel paratum cum ~&ci vinoso, vel mistum cum ~&ci, aut etiam cum spiritu cochleariæ, vel solum sufficere dicit Lindanus in malo hypochondriaco, it. in scorbuto in subjectis paulo habitioribus: sic etiam eli-

xyr stomachale D. Michaëlis mistum cum dimidia parte ~ cochleariæ, mirè conducit hypochondriacis. Quin etiam omnia remedia &ea &ina, aliaque volatilia uberius penetrantia, nunc per sudorem, nunc per ~m evacuantia, præ cæteris est egregia. Hæc inter eminet & volatile & ~&ri, isque ritè paratus & volatilis: item & &olatus, & chalybeatus; item suprâ laudatum arcanum duplicatum Mynsichti, quod usu diuretico omnibus pal-mam præripit in malo hypochondriaco & scorbuto, præsertim quando crebriores phlogoses ægros fatigant; R &ri acris ad 40. gutt. mista cum ~u &ci, it. R &ri &ciata, item mistura simplex, pertinet huc imprimis ~ carminetivus de tribus, qui vel solus vel mistus cum ana ~ &ci potens est remedium ad malum hypochondriacum. Dosis sunt gutt. xx. xxx. ad l. usque; melius non habebitis remedium in paroxysmo mali hypochondriaci, quod nunquam me deseruit, & hypochondriacos mirabiliter levat. Nam ~ & per se egregius est ad curam mali hypoch. isq; non tam simplex, sed & compositus oleosus, si mixtura ~ & &ci addatur & infusione aromatum imprægnatus, & hinc forti de per & am destilletur, prodit sic spiritus vim aromaticam referens, dosi gutt. xxx. l. xl. Quò etiam pertinet R nephritica Amelungi, & sexcenta alia, à gutt. xx. xxx. ad xl. ut hæc volatilia cò magis reddantur diuretica, consultum est, ut imitemur Zvvelferum, qui miscet ~m &ci cum ana liquor. ~æ sol. ~, sic est forte diureticum, & tanquam quoddam secretum à quibusdam habetur in cura mali hypochondriaci: aut etiam hic ipse ~ &ci miscetur cum spiritibus antiscorbuticis, cum spiritu cochleariæ aut cum spiritu antiscorbutico composito, & singulariter confert in cura mali hypochondriaci. Ex dictis formulæ fiunt variæ.

*Rx. Ess. absinth. vel Ess. absinth. ~fat. ʒij.  
~ cochlear. ʒj. M. D. S.*

**Eröffnende Essenz.**

Dosis 40. gutt. bis in die.

*Rx. Ess. g. ammon. ʒʒ.*

~ &ci saffr. ʒij. M.

*Rx. Elix. propr. sine acido, l. R &ci compos.  
vel Ess. absinth. ʒij.*

~ &ci ʒiʒ. M.

*Rx. Elix. propr. sine acid. ʒʒ.*

~ &ci caryoph. l. alius ʒos. ʒij.  
cochlear. ʒiʒ. M.

*Rx. Ræ &li & Zvvelf.*

Ess. fumar. compos. ʒʒ. M.

*Rx. Elix. cachect. alterat. ʒvj.*

~ cochlear. ʒij. M.

*Rx. Elix. prop. sine acido ʒʒ.*

ess. fumar. comp. ʒij.

~ cochlear. essent. ʒj. M.

*Rx. Elix. cachect. alterat. ʒvj.*

~ cochlear. ʒij. M.

(R r r)

*Rx. ~ car-*



- ℞. *~ carminat.*  
*Θ\*ci.*  
*cochlear. ana ʒj. M.*  
 ℞. *Arcan. ʒi ʒij.*  
*~ Θ\* ʒj. ʒiʒ. ad ʒij. M.*  
 ℞. *▽ fumar.*  
*flor. Acac. ā ʒiij.*  
*Ess. aperit. comp. ʒʒ.*  
*~ cochlear. ʒj.*  
*ʒyr. de rad. ʒ. vel ʒenic. parum. M.*  
 ℞. *▽ fumar. ʒij.*  
*borrag.*  
*bugloss. ā ʒj.*  
*~ carm. de trib. ʒij.*  
*corall. rubr. præp. ʒj. |*  
*ʒyr. papav. err. ʒʒ. M.*

Ratione salium horum & ipsum  $\Theta$  depuratum aut  $\delta$ iatum, non incongruum est remedium in cura mali hypochondriaci, præsertim ubi flatus urgent, aut phlogoses crebriores affligunt. Et hinc etiam species diaspolicæ Galeni ex  $\Theta$ o & cumini semine in malo hypochondriaco cum cruditate stomachi non contemnendum est remedium. Cujus usu desperatos hypochondriacos ad extremam fere maciem deductos aliquando feliciter curavi, inquit Bartholetus *de Dyspnæia l. 5. cap. 4. pag. 431.* Compositionem vid. in *Zvvælfæro p. 179.* Et certum est, quod quidam etiam famosus Medicus, D. Jahn, asserit; quod nulla sit compositio in tota pharmacopœa usitata, quæ magis conveniat in malo hypochondriaco & ventriculi affectibus, quam istud, utpote quo quamplurimi hypochondriaci restituti sunt: ubi non prostat, potest ex tempore describi ita:

- ℞. *Θi depur.*  
*ʒpec. diacumin. ana ʒʒ.*  
*ʒo destillat. cumin. gutt. iij.*  
*M. div. in 3. part. æquales.*

His ac similibus accedente motu fere curari solet malum hypochondriacum.

Ab externis nonnulli incrassationem & condensationem humorum aut partium laxitatem metuunt, v. g. Sanctorius *Meth. l. 2. c. 8.* & Solenander *S. I. Conf. 10.* Ast urgente dolore hypochondriaco, anodyna & dyscutientia temperativa haud omittenda, v. g. Unguentum Agrippæ, aut Martiatum cum  $\rho$ o eo de capparibus vel chamomillæ, unguent. & emplastrum de cicuta, nicotiana, carminativum Sylvii.

Sed præter dicta in malo hypochondriaco & scorbuto, tam incipiente quam confirmato, adhuc alia sunt in usu, nempe specifica alterantia antiscorbutica, quæ istis præmissis specificū & morbū scorbuticū emendare & tollere possunt. Hæc imprimis postea alia usurpanda, sunt in duplici differentia, nempe vel quæ

1. respiciunt saltem dyscrasiam sanguinis & inde oriundorum succorum ab acido

scorbutico factam, & sunt volatilia plus minus acria; vel

2. respiciunt noxam systemati nervoso & partibus continentibus simul illatam, & sunt temperata balsamica seu oleosa Area, nempe ex pino, junipero, & horum succedanea ex lignis & corticibus.

Pro utroque scopo convenit lac & quælibet lacticia.

Antiscorbutica ergo specifica volatilia sunt ferè seqq. cochlearia, nasturtia quæcunque, imprimis  $\nabla$ ticum, chelidonium majus & minus, flammula  $\mathcal{Z}$ is, quam mirè laudat Hildanus, sedum vermiculare, de cujus egregiis viribus vid. *M. A. N. C. An. 6. & 7. obs. 22.* persicaria, piperitis, cujus  $\nabla$ a ex cucurbita destillata mirabilem obtinet acrimoniam, nummularia; radix raphani rusticani, armoraciæ, ari, chelidonii maj. semina sinapi, nasturtii, crucæ, cochleariæ, aquilegiæ; hæc ferè sunt primaria acria volatilia scorbutica, inter quæ tamen excellit cochlearia, hinc flammula  $\mathcal{Z}$ is, & tandem trifol. aquaticum seu fibrinum, de quo vid. in specie Simon Pauli *in Quadr. Botan. it. Acta Med. Hassn. Vol. 3. p. 123.* Conf. etiam *M. A. N. C. A. 4. & 5. obs. 123. p. 133.* Ac sanè in tumoribus pedum scorbuticis, & ubi metus est hydropis scorbutici, multum trifolio tribuit Pauli, cui ceu artificii experto in regione, ubi scorbutus est endemius, meritò credendū. Quibus acrioribus volatilibus, quæ non semper omnibus subjectis, in specie junioribus aut acido volatili præditis conveniunt, pro murua temperatura commodè vel acetosa & acetosella, beccabunga, chelidonium minus, vel citrus, vel succus citri aurantiorum, & acetosellæ addi possunt, juxta observationem Norvvegicam in *Act. Hassn. Bartholini Volum. 2.* Mala enim citria, it. mala aurantia acida, mirè conducunt in præservando & curando scorbuto imprimis navigantium.

Posteriora quod attinet: sunt in specie summitates & cortices abietis seu pinastri, imò tota abies alba, quæ propter egregiam virtutem vocatur arbor antiscorbutica, in specie sunt coni seu strobuli teneriores in usu, loco quorū substitui possunt ligna, & aliàs nota remedia ex lignis parata, speciatim ex ligno juniperi, lassastras, Guajaco & rad. china; sarsaparillæ, cortice Winterano: Item scordium, absinthium, ceterach, chamedrys, chamæpitys, fumaria, betonica, thee, radix helenii, gentianæ, & aperientes, chelidonii maj. scorzon. tarax. angelicæ, perasitidis, levist. zedoariæ, galangæ, &c. cortices fraxini, tamarisci, aurant. & citri, &c. Sunt similiter convenientes fructus chamæmori Norvvegici, de quibus præ aliis vid. Sennertus *Tract. de scorbuto*, quorum electuarium ex Norvvegia Daniæ cum magna quantitate infertur; It. Cacao, de quo vid. Willsius *de Scorbuto p. 260.* Porro flores genistæ, aqui-

aquilegiz, hyperici, sambuci & croci huc pertinent; item sem. anisi, aquileg. fœniculi, &c. baccæ juniperi, sunt admodum egregiæ, ac denique ex regno animali lumbrici, stercus anserum mense Majo collectum, & ad 3j. in vino haustum; vienim Gola præa bilem mirè corrigit. Ulus horum antiscorbuticorum est nunc crudorum nunc præparatorum. Cruda imprimis usurpantur in infuso: nam plurima decoctionem non ferunt citra virium jacturam, propter ̃ volatile, nisi levissimam ebullitionem, & quidem in vase probè clauso, nunc duplici; vel antiscorbutica cum talibus inter coquendum sunt miscenda, qui illorum particulis volatilibus ligandis ac retinendis apta, v. g. folia cochleariæ aut nasturtii cum acetosella, quorum decoctum cum lacte caprillo Sennertus ac Joel adeò commendant: quod tamen ad antiscorbutica posterioris generis, seu minùs propriè sic dicta, haud extendendum, utpote quorum decocta potentis satis virtutis observantur. Singularem enim habent texturam, videntur abundare ̃ volatile, simul tamen acido in recessu satis penetranti, quod demonstrant ructus acidi. Menstruum infusionis est vel vinum, vel lac, aut serum lactis: quibus cum hoc selectu utendum; nempe quibus vinum fuerit acrius, aut qui vinum ob acorem ferre nequeunt, & in quibus sal acrius & magis efferatum dominatur & phlogoses excitat, it. tempore æstivo, it. in calidis & biliosis corporibus, commodè vel serum lactis vel ipsum etiam lac præsertim in subjectis macilentis magis & ad atrophiam plus minus declinantibus, & in ipso infundi & aliquandiu continuari possunt. Hinc enim rancidus acor corrigitur & nova fermentatio sanguinis reconciliari potest; e.g. si ab usu succi nasturtii ̃ tici cum sero lactis maculæ prorumpant, dicitur bonum signum esse. quia iterum fermentationis habetur signum: è contra propinantur in vino in subjectis contrariis, tempore hyemali in constitutionibus frigidis & magis succulentis. Modum propinandi & administrandi hujusmodi remedia cruda pro cura scorbuti optimè docet Horstius l. 4. *observ.* 40. it. l. 7. it. Timæus von Guldensee/ in *Epist.* 28. l. 3. p. 425.

℞. *Herb. rec. cochlear.*

*fumar.*

*nasturt.* 22. Mj.

*rad. armorac.* ʒiʒ. l. iij.

*enul. rec.* ʒj.

*passul. min.* ʒvj.

Incisa & contusa includantur nodulo, quibus infundatur vel vinum l. serum lactis depuratum l. lac ipsum. D. S.

**Sonderlicher Wein oder Milch zum Scharbock.**

De hoc infuso ægri omni mane jejuni, & ante prandium vel à meridie, bibant bonum haustum cum levi expressione; ita tamen ut primo minorem dosin accipiant, successive eandem augendo & sic continuando aliquandiu. Vel ℞. *Herb. recent. cochlear.* M. ij.

*rad. rec. armorac.*

*enula*

*bacc. junip.* ana ʒj.

*passul. min.* ʒiʒ.

Incis. & contus. infund. *vino*

Quod si metuatur aciditas hypochondriacis & scorbuticis nociva semper singulo haustui addantur, vel post unum quemque haustum *lapilli* 69. *præparati*, à ʒj. ad ʒʒ. aut quantum cutelli culpis capit; hi enim omne vini acidum absorbent & in salsum diureticum abstersivum egregiè ita transmutantur;

℞. *Herb. cochlear. rec.*

*nasturt. aquas. rec.* ana Mj.

*rad. enul.* ʒiʒ.

*acori nostr.* ʒj.

*ras. lign. sassifr.*

*lim. ʒiʒ.*

*cost. aurant.*

*citri*

*galang.* ana ʒij.

Incisa & contusa includantur nodulo:

D. S.

**Püschel wider den Scharbock in Wein zu thun.**

Capiatur quotidie ter haustus, manè post assumptum jusculum, à meridie, & à cæna. Vel simplicia dicta acria antiscorbutica contundantur & conquassentur; affundatur serum lactis vel vinum, exprimatur succus, qui blando calore depurandus, colandus, & pro usu quotidiano in vitris parvis ̃ tatis asservandus, & quando necesse est, aliquando unciz aliquot in sero lactis vel vino propinentur.

℞. *Succ. cochlear. rec. express.* ʒj.

*vini Rhenan.* ʒij.

~ *cochlear.* ʒʒ.

*Rosul. manus Christi perlat.* ʒiij. M.

Commodè autem nasturtium aquaticum vel cochlearia cum acetosellæ contusæ ana vel dimidio sociatur, & cum lacte caprino, si febris absit, vel cum sero lactis, si febris, phlogoses & æstuatio vaga adsit, propinatur, & aliquandiu continuatur: vid. Sennertus l. 3. *Prax. pag.* 616. item Bartholini *Acta Medic. Hassn.* vel ad imitationem Horstii:

℞. *Succ. cochlear.*

*nasturt.*

*fumar. l. piperis.* ana ʒiij.

*cichorii*

*acetosell.* ana ʒiʒ ad ʒij.

*seri lact. depur.* in specie caprill. ʒiij.

seponantur nonnihil, ut depurentur per residentiam, hinc coletur & servetur pro usu,

Dosis pro una vice sint ʒiv. l. v.

Capiantur mane nunc cum nunc absq; sudore: potest etiam repeti haustulus à meridie, (Rrr 2) po-

potest etiam cuilibet haustu instillari Ess.  $\sigma$ is  
cui succo pomorum.

*℞. Serilact. ℥ij.*

*succ. citri rec. ℥ij. ad ℥iij.*

Ebulliant cum album. ovi clarit. & pauco  
sacch. edule.

Vel, quod melius, loco succi citri recipiantur  
succi pom. Borsdorff. ℥jv. ad vj. imprimis ubi  
obstructa alvus adest.

*℞. Herb. flammul. ℥is.*

*fumar.*

*nasturt. ana M. ij.*

Infund. per noct. in vitro clauso: mane ex-  
primatur & coletur.

Continuatur potus talis præmissis præmitten-  
dis subinde per aliquot septimanas, nunc, præ-  
sertim matutino tempore, cum blando sudore,  
nunc præsertim à meridie absque sudore.

*℞. fol. rec. cochlear. Mj.*

Incis. & contus. affund. per  $\mathcal{C}\sigma$ .

*\nabla scorbut. Dorner. ℥ij.*

*Vini Rhenan. ℥j.*

mane exprim. adde

*ess.  $\sigma$ is liquid. ℥j.*

*\nabla cochlear. ℥℔.*

*maslich. ℥j.*

edule. c. f. q. *rot. man. Chr. perl. M.*

Plura videbitis in Horstio p. 384. 392. &  
442. Tales succi puri etiam possunt affundi  
limaturæ  $\sigma$ is recenti, stent aliquandiu; sic  
dicti succi reddit  $\sigma$ iales simili modo usurpa-  
ri possunt. Vel loco talium ex  $\sigma$ e paretur ex-  
tractum, quando succus  $\sigma$ alis inspissatur, &  
tunc extrahatur  $\mathcal{R}\sigma$ is scorbutica: vid. Hor-  
stius, Sennertus & Eugalenus.

Huc pertinet decoctum herbæ thee pro  
cura scorbuti, à modernis, præcipuè Belgis,  
admodum commendatum: cui tamen qui-  
dam præferunt decoctum granorum Coffee  
in Anglia admodum usitatum: it. syrupus sce-  
lotyrb. Foresti, syrupus essentific. cochlear.  
& fumariz, syrupus scelotyrb. Mynsichtii. Ve-  
rùm syrupi ob rationes suprâ dictas nihil va-  
lent, nisi forsan ad imitationem Zvvelferi pa-  
rati sint, quem modum *in animadv. in Pharm.*  
*Augustan.* ad syrupum scelotyrbicum Foresti  
exponit. Ut taceam, quævis dulcia scorbuti-  
co esse infesta, ut superius de saccharatis &  
mellitibus monitum fuit. Dicti succi tamen de-  
licatis, vel qui proni ad effervescentias, minùs  
conveniunt. In forma pulveris D. Michaelis,  
multum laudat contra scorbutum sequentem:

*℞. Aloës.*

*myrrha.*

*succin. prepar. ana ℥i℔.*

*Croci ℥j*

*sem cochlear.*

*nasturt.*

*synapi ana ℥ij. ℥j. ad ℥iv.*

*Dosis ℥j. M. f. Pulvis.*

*℞. Pulv. cachect.  $\sigma$ ial. ℥ij.*

*rad. ari crud.*

*arcan. dupl. Myns. ana ℥j.*

*\mathcal{C}\sigma* destill cochlear. l. ligni sassafr. gtt. viij.

*M. f. Pulvis.*

Ex hætenusdictis simplicibus varia sunt præ-  
parata,  $\nabla$  destill. tam simplices quam compo-  
sitæ, spirit<sup>9</sup> Essentiz, &c. Spiritus parantur vel  
per simplicem cohobationem, & ab istis sim-  
plicibus l. per fermentationem ipsorū simpli-  
ciū l. simul per utrumq; modum, si nempe spi-  
ritus fermentando paratus affundatur specie-  
bus recentibus, & ita ab iisdem cohobetur, ob-  
servando, quod antiscorbuticorum  $\sim$  volati-  
les in rectificatione attendendi sint, ut mox  
prima vice  $\sim$  à phlegmate seorsim blando  
igne provocetur; quia intimiùs commistum  
phlegma vix separabile aliàs existit, & quo sæ-  
piùs rectificatur, eò magis ferè enerventur.  
Hac namque ratione elaboratur  $\sim$  odore &  
sapore plantam referens. Mediante hoc spiri-  
tu præparantur etiam essentiz ex foliis recen-  
tibus, vid. Simon. Pauli Quadrip. Botan. Spi-  
ritus isti affunduntur extractis variis, unde es-  
sentiz compositæ, v. g. Ess.  $\sigma$ is antiscorbuti-  
ca, & Corall. antiscorbutica, &c.  $\sigma$  cum suc-  
co pomorum extrahitur, cui inspissato ad ex-  
tracti formam redactò  $\sim$  cochleariz antiscor-  
buticus affunditur, sic fit egregia essentia  $\sigma$ is  
antiscorbutica. Spiritus cochleariz omnibus  
notus est, cum quo interdum commodè  $\sim$   
lumbricorum terrestrium permiscetur. Ad  
fermentata hæc pertinent etiam cerevisiz  
medicatæ per fermentationem, qualis est v. g.  
cerevisia antiscorbutica Timæip. 428 *in Epist.*  
In usu est quibusdam  $\sim$  antiscorbuticus B. D.  
Michaelis compositus ex his simplicibus  
commistis per cohobationem.

Spiritibus tamen talibus tam simplicibus  
quàm compositis, convenienter essentiz ex  
extractis antiscorbuticis, it. ex extracto  $\sigma$ is,  
parari possunt, sicut & ess. strobilorum pini  
antiscorbutica & elix. proprietatis antiscorbu-  
ticum, acuendo tamen spiritū antiscorb. cum  
 $\sim$  aperitivo Penoti. Nam revera ingredien-  
tia elix. proprietatis in scorbuto sunt optima,  
balsamica vi resistunt contentorum corrupti-  
oni, & multa symptomata partium solidarum  
præcavent, ac in specie humidioribus aut se-  
rosioribus subjectis conducunt: Item ex gio  
cum  $\Theta$ ibus per incinerationem paratis para-  
tur Ra quædam egregia in depuranda M. S.  
Præstat tamen juxta Møellenbroccium parare  
hanc cum spiritu quodam antiscorbutico,  
cum quo etiam  $\mathcal{R}$  coralliorum antiscorbutica  
commodè parari potest. Tinctura hæc con-  
venit, quando corpus est tinctum maculis, pu-  
stulis & similibus affectibus, ubi opus est ex-  
pulsionem.

Per fermentationem dubitant multi, an ex  
scorbuticis debeant parari spiritus? quia sub  
fermentationis negotio maxima pars  $\Theta$ is vo-  
latis solet evanescere, quod testatur odor, qui  
tunc exhalat. Certum est pati aliquam jactu-  
ram,



ram, non tamen omnem; quia per fermentationem cautè parati spiritus antiscorbutici adhuc sunt satis penetrantes.

Hiscæ addantur olea destillata ex dictis remediis penetrantissima, in specie ex cochlearia, quando jam incipit referari ejus crasis in semine, tunc & ex destillatione per vesicam prodit penetrantissimum, & in largiori copia, quam alias sine semine; quod cum saccharo in formam & sacchari antiscorbutici redactum est egregium. Dravvitiu vocat magisterium cochleariæ, Zvvelferus verò essentiam siccam. Hiscæ volatilibus nativis non incommode adduntur remedia volatilia magis artificialia, nempe Eli & Sia volatilia ex animalibus supra laudata, v g spiritus & S volatile, Suci, Qi, &c. cum spiritu antiscorbutico composito misti, vel cum ~u cochleariæ saltem sociati, &c. Congruum est, ut paretur spiritus salis Suci compositus, ita ut mixturæ pro ejus præparatione infundatur spiritus cochleariæ, vel spiritus antiscorbuticus quidam compositus. Interim ~ & S volatile lumbricorum ~estrium per putrefactionem hiscæ volatilibus annumerandum venit, tam propter vim diureticam, quam quod affectibus scorbuticis dolorosis conveniat; imprimis egregius est in symptomatibus sensus & motus scorbuticorum corrigendis. Quidam etiam elix. propr. cum ~u Suci, essentiam myrrhæ cum R ~i, vel cum spiritu Suci vinoso cum ~u parato &c. ad scorbutum commendant. De ~u Suci vid. Barbette in sua praxi, qui dicit; quod solus, sufficiat, pro scorbutico, ubi elegans observatio paralyticos scorbuticæ ingentis, solo decocto rad. armoraciæ in sero lactis curatæ: Coquit ~ij. in sero lact. & colaturæ propinat ~ij. Huc etiam pertinet R nephritica Ammelungi, & essentia contra arthritidem vagam D. Michaëlis, quæ extrahitur cum spiritu lumbricorum, cornu cervi, & antiscorbutico composito: sic quidam succum citri inspissatum cum spiritu cochleariæ extrahunt pro essentia antiscorbutica temperata.

Ex dictis etiam subinde mixturæ variæ præscribuntur in cura scorbuti, quando decocta aut infusa sunt nauseosa.

R. ~ antiscorb. Dorn. l. Myns. ~iv. solut. ~ c. s. pom. ~ij.

~ cochlear. ~ij.

Syr. de fumar. l. scelot. For. ~ij. M. D. S.

Scorbutische Blut-reinigende Mixtur köffelweise.

R. ~ cochlear.

fumar. ana ~ij.

~ cochlear. ~ij.

S ~ simpl. l. aff. afr. ~ij. ad ~ij.

Syr. scelotyrb. For. ~vj. ad ~ij. M.

R. Elix. propr. antisc. ~ij.

Ess. pini.

citric ~ cochlear. par. ~ij. M. D. S.

Scharbockische Mixtur 20. bis 30. Tropfen.

R. Ess. fumar. comp. ~ij.

Ess. pini ~ij.

~ cochlear. l. antiscorb. comp. ~ij. M.

R. Elix. propr. sine acido, vel R ~ri. compos. ~ij.

~ carminat. de tribus vel R nephrit. cochlear. ~ij. M. (Ammel. ~ij.)

R. R ~ri compos. ~ij.

~ antiscorb. ~ij. M.

R. Solut. ~ is c. s. p. l. antiscorb. ess. fumar. ana ~ij. M.

R. R ~li ~is Zvvelf. vel sol. ~ is c. succ. ~ cochl. ~ij. vel ~ij. M. (co pom. ~ij.)

R. ~ carmin. de tribus. l. R neph. Amel. Suci cochleariat. ana ~ij. M.

Quod attinet antiscorbutica resino-balsamica, non tantummodò acidum acre scorbuticum temperantia, sed etiam noxam systema nervoso inductam, & inde natos varios dolores emendantia: eminet hic imprimis lignum sassafr. radix chinæ, præceteris omnibus abies alba picea & pinaster, strobuli pinaltri Mense Martio collecti; tunc enim tactu sunt pingues, & resinosi, vid. Simon. Pauli in Quadrip. Botan. item surculi seu germina vel strobuli etiam adhuc resinosi usurpantur, vel crudi vel præparati: Crudi recipiuntur vel recentes vel exsiccati, & usdem v. g. ad earum ~ij. l. ~ij. infunditur cerevisiæ vel coventi Mense. is. coqu. aperto leniter vase & ebulliant ad tertiæ partis consumptionem plus minus, in fine dum omnia fervent infund. patul. min. contul. q. s. pro edulcoratione; ubi refrigerit, coletur. De colatura omni mane imprimis haustus bonus calide capiatur, ac sudor blandus expectetur, repetatur in die semel vel bis; mirabile, quantum doloribus vagis, pareli. contracturæ, ac similibus affectibus scorbuticis, partes nerveas & membra externa magis affligentibus, præmissis præmittendis, conveniat, & præsertim in decocto, minus in essentia;

R. Summit. pinastr. ~ij.

rad. chin. in taleol. incis. ~ij.

affunde his

Aqu. & cerevis. ana lbij.

Coqu. blando de ad medietatem. D. S. Blutreinigender Trank.

Colatura bibitur quotidie bis, manè calidè, blandum expectando sudorem; item vesperi sub introitum lecti. Residuum denuò coqui potest paulo diutius & dicto modo continuari. Egregiè proliunt in arthritide vaga, pareli, doloribus partium scorbuticis: Vid. Moellenbrocc. Interdù quoq; bacca juniperi recentes, rasura ligni sassafras aliq; similib. decoctis addi possunt.

Extractum granorum juniperi resolutum cum ~u cochleariæ est egregia Medicina in cura scorbuti. Loco horum etiam cortex abietis minutim ralus simili modo, diutius tamen, coqui & usurpari potest; hujusmodi decocta ispirant odorem terebinthin. tum, unde forsitan nec terebinthinæ usus est incongruus in scorbutico. Summitates abietis concitæ, & vel in aqua, vel in cerevisia, vel etiam simili vehiculo decoctæ & usurpata, in dolorosis affectibus egregiè conducunt:

R. Cymar. abiet.

bacc. juniper. rec. ana c. v.

contulis adde

rad. chin. incis. minuti in ad alterutr. di. midiu.

(R 11 3)

Affunde

Affunde  $\nabla$ m vel cerevis. coqu. ad tertiz partis consumptionem.

Qui gratiam saporis desiderant, sub finem decoctionis, dum omnia fervent, optimè passulas minores conquassatas pro lubitu addere possunt.

Neque mihi est dubium, quin aliz arbores plures simile quid præstare valeant.

Quod attinet præparata, est  $\nabla$ cimarum abietis, ~ & *Ess. Strobil. Pini* vel *abietis*, quæ mirabilia sunt in dictis symptomatibus scorbuticis:

*Re. Essent. cochlear. l. scorbut. compos. ʒʒ. pini ʒij. M. D. S.*

**Blut-reinigende Essenz.**

Dosis 40. vel 50. guttulæ.

Verum in hisce remediis de pino observandum est: primò quod eadem non conveniant omnibus, quia nonnihil appetitum lædunt; 2dò quod junioribus & calidioribus subjectis propter oleositatem volatilem non nimis diu propinanda sint, aliàs affectus externos varios, varos, pustulas in facie, erysipelata & febres ardentes inferre solent. Loco horum possunt substitui lignorum decocta & essentiz, una cum specificis antiscorbuticis permixta, expectando sudorem; imprimis quando pathemata catarrhalia scorbuticos affligunt, sunt optima temperata, additis simul specificis antiscorbuticis.

Ex lumbricis parata remedia quæcunque mirè conveniunt, unde eorum ~ & cum eo parata essentia contra arthritidem vagam magnæ est laudis in cura scorbuti. De  $\nabla$ ialibus, *Rvtrioli* & *Zvvelf.* & similibus, item de  $\nabla$ inis nihil dico: nam ex supra dictis satis clarum est, quod etiam conveniant in scorbuto. It. de *Rois* cum *Ess. pini* vel ~u cochleariz: quo etiam pertinet essentia  $\nabla$ is *Dravvizii* & exinde parata tinctura elegans antiscorbutica, cum succo pomorum, vel acetosæ, vel cochleariz vel nasturtii, vid. *Tr. de scorbut. p. 334.*

Dixi lac & omnia lacticia esse optima in cura scorbuti, unde cum dictis vel post hæc, in specie post universalia & primas vias purgantia &  $\nabla$ ialia, usurpentur lacticia, in specie verò lac caprillum ejusque serum pro remedium antiscorbuticorum vehiculo modo supra insinuato; qua ratione etiam *Forestus lib. 20. observ. 2.* usu lactis dulcis, cum cochlearia & beccabunga decocti, multos, qui non febricitant, scorbuticos curavit. Serum usurpatur in scorbut. febricitantibus, vel qui borborygmis in hypochondriis sunt obnoxii, ut & phlogosis vagis. In reliquis verò melius est, si usurpetur diæta lactea; eaque vel stricta ista contra arthritidem usitata; vel laxa, in qua nempe cum lactis vehiculo remedia antiscorbutica propinquantur, ut quando v. g. quotidie semel omni manè, interdum & bis vespere stomacho vacuo ante cœnam larga dosis lactis calidè hauritur, cum tantillo sacchari, vel

singulis haustibus ~  $\nabla$ ci & cochleariz aa mistorum gutt. 20. 30. 40. ad 50. usque instillantur, continetur aliquandiu, successivè ascendendo & tunc etiam descendendo, modò ventriculus æquè ferre queat, multum in recessu habet lactis usus ad curam scorbuti; macilentioribus verò, & ubi sapor scorbuticus acrior existit, convenit diæta lactea.

*Re. Lactis caprill. Mens. ʒ.*

*Herb. fumar. rec. incis. Mʒ. ad Mj.*

Hæc ipsa bulliant invicem aliquandiu recto vase, trahantur postmodum per linteum, & vel pro simplici vel duabus dosibus lac ita paratum ita hauriatur, addendo parum sacchari, quod semper observetur, ne tam promptè coaguletur, simulque singulo haustui instillando gutt. xij. xv. vel xx. ~ cochleariz, & ita quotidie manè usurpetur, qualibet 4ta vel quinta die blandum infusum laxativum interponendo.

Lac ita paratum scorbuticis est admodum proficuum, in specie ubi laborat genus nervosum & ad sunt dolores artuum, & quando multum sudant: quin & succi simplicium antiscorbuticorum expressi & depurati vehiculo lacteo optimè usurpantur:

*Re. Rad. china minutiss. incis. ʒij.*

bulliant in

*seri lactis capril. lbij.*

Colaturæ ferventi infunde

*Herb. rec. cochlear.*

*fumar.*

*nasturt.*

*trifol. aquat. ana Mj.*

*rad. rec. armorac. ʒjv.*

*enul. ʒij.*

*Sem. eruca contus. ʒvj.*

stent in digestionem vase clauso per 20: mane detur colatura.

Eligitur ex omni lacte imprimis caprillum & ejus serum, speciatim si capra appropriatis antiscorbuticis fuerit nutrita. Et hoc vehiculum lactis imprimis tempore verno & æstivo convenit; tempore verò autumnali frequentius cum vino propinantur alia remedia, sive sub forma infusi, sive decocti, sive alia sub ratione. Sub diæta lactea cavendum est ab omni vino & acido potu, haustoq; lacte instituat aliquoties ambulatio, ut proliciat  $\square$ . Novi juvenculas ex scorbuto ejusque ferrosa acrimonia steriles, ab usu lactis bubuli aliquandiu manè hausti fecundas redditas esse. Novi quæ fluore albo, ex radice scorbuti nato laborarunt, liquamine affluente acri erodente partes vicinas, præmissis  $\nabla$ ialibus ex usu lactis commodius habuisse.

Hæc ferè cardinalia ordinario ita sunt observanda in scorbuti cura.

Sed præ cæteris in scorbuto urgent symptomata, eaque multiplicia, quibus mitigandis etiam prospiciat Medicus, respiciendo scorbutum

butum uno oculo, altero verò ad symptoma-  
ta affligentia. Et ista congeries symptoma-  
rum, quæ adeò longè se per scorbutum diffun-  
dit, etiam hypochondriacos infestat. Hæc  
symptomata, utut sint varia, in genere tamen  
hoc habent commune, ut in eorum medela  
semper habeatur respectus ad acidum specifi-  
cum corruptum primariò peccans, & secun-  
dario hujusmodi remediis semper simul ad-  
denda appropriata symptomati & parti affe-  
ctæ convenientia.

Symptomata talia inter, primo loco ma-  
ximè conspicua sunt

## DENTIUM & GINGIVARUM PATHEMATATA.

Nempe triplicia mala vexant scorbuticos  
circa gingivas & dentes.

1. Gingivarum laxitas & mollities, hinc  
dentium in suis alveolis laxis vacillatio,  
quin interdum digitis vacillantes pos-  
sunt extrahi.
2. Earum intumescencia, cruentatio, &  
exulceratio, cum quâ sæpè & dentium  
caries complicatur.
3. Gingivarum gangræna & putrefactio  
serpens.

Omnium horum pathematatum origo est sali-  
va, sale acri scorbutico imprægnata & inqui-  
nata, gingivarum texturam fibrosam laxans,  
destruens, & dentes rodens, unde gingivarum  
mollities; hinc ex sale acri excoriatio, tan-  
demque putrefactio cariola.

Pro his gingivarum affectibus curandis  
conveniunt,

- (1.) Collutiones oris.
- (2.) Ræ gingivis affricandæ.
- (3.) Pulveres; vel
- (4.) Linimenta cum antiscorbuticis juncta.

Quoad collutionem oris: in his, si quid  
aliud, eminet salvia, quæ est specificum ap-  
propriatum, ros marinus, flores ligustri, aq-  
uilegiæ; hypossus, quercus cum specificis an-  
tiscorbuticis, ut cochlearia, nasturtio, vermi-  
culari, nicotiana & similibus decocta, &  
collutionis instar in ore usurpata. His simul  
adstringentia, radix bistortæ, aristolochiæ, tor-  
mentillæ, ireos Florentinæ, balauftiorum, ro-  
sæ, & similia addi possunt; item malva ar-  
borescens rubea. Nam pulvis florum malvæ  
arborescentis rubeæ est secretum Horstii in  
his gingivarum affectibus, & quidem cum a-  
lumine permixtus. Sicuti etiam lacca, myr-  
rha, alumen, item phlegma aluminis, spiri-  
tus salis, &c. utramque faciunt paginam in  
gingivarum scorbuticis affectibus; item suc-  
cus cochleariæ vel aliorum antiscorbutico-  
rum; item succus salviæ & cochleariæ, quæ  
duo reliquis palmam præripiunt pro collutio-  
ne & absterfione gingivarum imprimis sunt  
commendata. Decoquantur salvia & co-  
chlearia, it, nasturtium, vel in aqua, aut quod  
melius est, in lacte aut ejus sero, aut in vino;

si vinum est acrius, interdum etiam ipsius  
loco coventum sumatur, & decocto dicto  
gargarisetur os; & purificentur & abluantur  
gingivæ; item decoctum lignorum ligustri,  
& summitatum pini in  $\nabla$ , addito pauco alumi-  
ne in dentium morbis præ cæteris est in usu:  
Imò si exulcerantur gingivæ, hoc decoctum  
pini easdem consolidat: item decoctum sum-  
mitatum pini & nasturtii in vino abluendis  
gingivis mirabiliter prodesse dicitur, garga-  
rismatis forma subinde usurpatum: item de-  
coctum florum ligustri in  $\nabla$ , addito pau-  
co aluminis, tanquam expertum gargarisma  
commendatur à Minderero in *Medic. Militari*  
p. 376. Item gargarismus de tormentilla Myn-  
sicht. & decoctum ad gingivas roborandas Po-  
terii *Pharm.* p. 12. vel sequens dentiluvium  
antiscorbuticum:

$\mathcal{R}$ . *Herb. salv. opt.* Müss. l. iij.  
nasturt. l. cochl. Mj. vel horū āā. Mß  
flor. malv. hortens. M. j. ad ij.  
rad. polypod.  $\mathfrak{z}$ ß. vel  $\mathfrak{z}$ vj.  
f. decoctio in  $\mathfrak{t}$ bj. ad ij.  $\nabla$  font.  
Colaturæ adde  
mellis rosat.  $\mathfrak{z}$ iß.  
alum. usti  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\Theta$ i depur.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\Theta$ a sigillat.  
lacc. Florent. aa.  $\mathfrak{z}$ j.

M. pro dentiluvio seu gargarismate oris.

Vel  $\mathcal{R}$ . *Herb. salv.*  
cochlear. aa. M. iij.  
coqu. in f. q. *seri lactis*:  
Colat.  $\mathfrak{t}$ bj. adde:  
succ. cochlear.  $\mathfrak{z}$ ij.  
fyr. flor. aquileg.  $\mathfrak{z}$ ijv. M.

Retineatur aliquandiu in ore, ut suam ope-  
rationem melius exercent.

M. pro gargarismate in gingivarū putredine.

Præter cæteris optimum est  $\Theta$  mirabile  
Glauberi in f. q. beccabungæ solutum. Qui-  
busdam placet pro gingivis scorbuticis hæc  
Mistura:

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  plantag.  
prunell.  
rosar. ana  $\mathfrak{z}$ ijv.  
 $\mathcal{R}$  rosar.  
 $\sim$  cochlear. ana  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\Theta$ is  
 $\Theta$ li ana  $\mathfrak{z}$ j. M.

Qua mistura fricentur gingivæ; vel

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  salvia.  
plantag.  
roris mar. ana  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\sim$  cochlear.  $\mathfrak{z}$ ij.  
fyr. flor. aquileg.  $\mathfrak{z}$ vj.  
 $\sim$   $\Theta$ is dulc. q. l. pro subtili acore. M.

Vel etiam fiunt gargarismata ex tempore ex  
 $\nabla$  cochleariæ, nasturtii, beccabungæ, sedi mi-  
noris, addendo insdem rob dia mori, syrupum  
florum aquilegiæ, syrupum nicotianæ cum  
melle rosato, aut etiam cum melle rutaceo,  
aut similibus.

Post



Post collutionem oris Ræ dentibus sunt adfricandæ, quas inter eminet præ cæteris R lacca Myns. ritè parata, singularissima in scorbuticis dentium aut gingivarum affectibus in laxitate, mollitie, exulceratione & gingivarum gangræna: In his ista R mirabilia facit & infallibile est medicamentum probè gingivis cum linteis applicata, vel sola, vel mixta cum dimidio Ræ florum aquilegiæ: c. g.

R. Ræ lacca Myns. ʒij.  
flor. aquileg.

— cochlear. ana ʒj.

M. D. S.

**Zahn-Tinctur.**

Potest tamen meliorari, si lacca addatur myrrha, aut si loco phlegmatis aluminis phlegma Di, in quo aliquid aluminis solutum, pro illa conficienda adhibeatur; vel hujus defectu ex tempore potest præscribi mistura, quæ est similis Ræ lacca.

R. lap. medicament. Croll. ʒj.

▽ sedi minor.

cochlear. ana q. s.

Post solutionem leni & blanda digestionem filtrentur:

Colaturæ infunde

G. lacca ʒiʒ. ad ʒij.

myrrha ʒj.

alum. usti ʒij. ad ʒj.

flor. aquileg. p. iij.

Stent in digestionem, donec tingantur, tunc filtrentur.

Et hæc præscriptio idem valet, atque Ræ lacca; quæ imbuatur linteum & affricetur gingivis & dentibus scorbutico correptis.

Facit etiam huc sequens singulare in scorbutico oris: nempe ▽ calida affunditur Ψx, & coquitur post massæ subsidientiam, filtretur lixivium & abstrahatur ad remanentiam Ois quod parum est.

R. hujus Ois seu crem. Ψ ʒiij.

g. lacca, ʒj. ad ʒij.

Oi de cypro gr. vj.

▽ roris mar.

salvia. ana ʒiʒ.

Mista invicem solve calore leni, & hoc ipso ablue scorbutum oris & dentes scorbuticos.

Post Rs sunt pulveres pro dentibus, qui sunt varii: hos tamen non ingrediantur lapides vel ꝑea; gingivas enim lædunt. Præ cæteris elegans est pulvis pro dentibus & gingivis scorbuticis Bartholini Cent. 6. Hist. 54.

Vel excipi potest unguento aquilegiæ, vel saltem melle.

Vel

R. pulv. rad. bistort. ʒiij.

rosar. rubr.

balauſt. ana ʒj.

alum. usti ʒij.

Hæ misceantur & irrorentur aliquot guttis Ois destillati caryoph.

M. pro pulvere dentifricio, & ita usurpetur.

R. Ois toſti.

ciner. nicotian. ana ʒij.

fol. aquileg.

salvia.

nuc. moschat. ana ʒj.

M. f. pulvis pro gingivarum intumescencia.

R. Sangv. Dracon.

alum. usti ana ʒiʒ.

summ. hyperic.

fol. salv.

rad. ireos Flor. ana ʒj.

Ois destillat. cochlearia gutt. vj.

M. f. pulvis pro gingivarum cruentatione.

R. rad. bistort.

tormentill.

cort. granator. ana ʒj.

hemast.

thuris.

alum. usti.

Oxi ana ʒʒ.

M. f. pulvis in gingivar. putredine.

Denique linimenta conveniunt imprimis in graviore gingivarum exulceratione & fetore scorbutico. Conveniunt etiam in ulceribus oris & faucium scorbuticis, c. g. sic instar omnium sequens:

R. alum. crud. ʒiʒ.

fol. salv. ʒiij.

rad. ireos Flor. ʒiʒ.

myrrh. ʒʒ.

Omnia probè pulverisata excipe c. f. q. mellis, & f. linimentum dentibus subinde affricandum.

R. fol. roris mar.

salvia.

flor. aquileg.

nuc. mosch. ana ʒij.

myrrh. el.

maslich. elect. ana ʒiʒ.

alum. crud. ʒij.

cum mell. rosac. vel ungu. de aquileg.

f. linimentum in gingivarum intumescencia. Aluminosa linimenta enim convenientissimè adhibentur cum aliis remediis in gingivarum scorbuticis affectibus. Borellus Cent. 2. obs. 65. recipit alum. parum in Ois ʒj. Conserv. rosar. ʒvj. deterſo dentium ꝑro, ope scalpelli lignei admoveat, & intra 14. O, si hæc sæpe fiunt, dentes firmari, dealbari, & carnem gingivarum produci scribit. Item

R. Unguent. de aquileg. ʒj.

flor. rosar. rub.

rad. ireos Flor. ana ʒj.

alum. uſt. ʒij.

myrrh. ʒʒ.

M. in gingivarum flaccescencia.

R. Pumic. uſti ʒʒ.

corall. rubr. prepar. ʒij.

g. lacca ʒj.

myrrh. c. + o sol. ʒij.

caryophyll.

macis

macis ana ℥℥.

Cum syr. cochlear. f. Linimentum.

Vel aliis irritis mel rosatum aliquot guttis ~Θis ad aliqualem acrimoniam imprægnatum dat linimentum egregium ad consummatam gingivarum exulcerationem, excoiationem & cruentationem scorbuticam, & ad summum corruptionis gradum. Convenit etiam in ulceribus oris & faucium scorbuticis. Quidam etiam miscent cum ~u ~li: ~ vero ~li reddit dentes nigros. Ad hos gingivarum affectus appropriata est conserva florum aquilegiæ: nam conserva hæc irrorata cum ~u cochleariæ, tanquam quoddam linimentum gingivis illinitur, bene fricando commendatur contra hoc malum. Elegans denique linimentum in scorbutodentium videbitis in Sennerto l. 3. Prax. 633.

Si ulcera maligna aut etiam gangræna occupent gingivas aut fauces, iisque minus videatur sufficere R laccæ, tunc in pessimo statu ~x virides Hartm. Pr. Chym. cap. 52. §. 4. & 5. vel Plateri applicari possunt, quæ in exulcerationibus scorbuticis oris sunt nobilissimæ. Basis harum est ~ cum ~to. Assumitur quoque colcothar, cerussa, alumen; vid. Schröderus Pharm. l. 2. Præcæteris Platerus in Praxi ~as famosas reddidit. Item conveniunt ~x ~ales (ex ~io dulci:) cautè tamen usurpandæ. Aut etiam, ubi magis urget malum, accedendum est ad unguentum Ægyptiacum melle dilutum, & locis exulceratis cum penicillo admotum; vel unguentum de aquilegia cum succo salviæ & pauco ~Θis mistum illinatur. Denique curatione magnetico-sympathetica potest fieri curatio scorbutodentium: si planta senecionis effodiatur illæsa radice, planta hæc & radix laventur, & cum radice fricentur dentes & gingivæ, ut sanguinem emittant: radicem ita sanguine adpersâ iterum in terram suffodiunt, observant, ut probè crescat; quantum enim planta crescit, in tantum decrescit malum scorbut. in gingivis.

## II. DENTIIUM DOLOR SCORBUTICUS.

Juxta vacillationem dentium & gingivarum, affectus frequens in scorbuto est dolor dentium scorbuticus, isque contumacissimus, gingivas exulcerans, & etiam subito dentes erodens. Conveniunt in tali scorbutico dentium dolore radix bistortæ & filicis, folia & flores salviæ, folia & flores roris marini, folia rutæ, plantaginis & hyoscyami in ~ vel ~ino decocta vel addatur parum aceti addendo simul colaturæ adhuc calidæ succum cochleariæ vel becabungæ, & ita pro collutione oris usurpetur. Sedum minus s. vermiculare admodum prodest, quod quidam colligere volunt ex signatura dentis & gingivarum in foliis, in primis succus sedi vermicularis expressus egregium est remedium in stomacace, & in dolore dentium

Tom. II.

scorbutico, decoctum foliorum pini cum spiritu cochleariæ acuaturn pro gargarismo etiam egregiè confert. Quod si dolor simul malas torqueat, tempora & reliquas vicinas partes afficiat, commodè dictis locis illinitur spiritus cochleariæ secundarius seu phlegmaticus cum spiritu lumbricorum terrestrium ana.

## III. ORIS ET FAUCIUM ULCERA SCORBUTICA.

Non raro etiam oris ulcera, non minus quàm in lue Venerea, infestant fauces palatum partesque vicinas. Contra hæc præter linimenta jam dicta ad unguentum Ægyptiacum, cum melle vel lacte vel vini spiritu dilutū & locis exulceratis cum penicillo admotum accedendum. Singulare & egregium hîc est gargarisma Rulandi, qui

R. ~ ~ commun.

Hydromel. ana ℥℥j.

his addit:

alumin. ~℥. ad ~j.

Ebullire permittit & hoc decocto manè, à meridie post pastum, vel vesperti colluatur os, & ita sanentur ulcera oris.

Vel R. ~ ~ nasturt. aquat.

plantag. ana ~℥j.

nicotian. ~j.

~Θis ~j.

ung. Ægypt. ~℥j.

mell. rosat. vel rutac. ~j.

Syr. fl. aquileg. ~℥.

M. D. S.

## Reinigende Mund-Mixtur.

Summitates pini his adjectæ erunt quoque proficue, quia hæc virtute balsamica instar terebinthinæ ad hæc ulcera sananda multum conferunt. Nec ~ viridis Plateri negligenda, quæ absque periculo usurpatur.

## IV. MACULÆ CUTANEÆ SCORBUTICÆ.

Dixi, quod in superficie artuum & partium externarum maculæ scorbuticæ subinde erumpant coloris varii, & quod earum eruptio sit proficua ex eo, quia sint semper bonum signum malæ causæ foras erumpentis. Opera ergò danda est, ut conserventur in superficie corporis & promoveantur expellendo eas per cochleariam & fumariam. Quia autem lympham acidiorern tanquam causam agnoscant, ad has maculas expellendas internè conveniunt omnia, quæ acidum absorbendo ac edulcorando sanguinem purificant. Præmissa igitur purgatione leni Mercuriali præscribantur Antiscorbutica. ~e volatili acriori turgida, ut M. S. purificetur ac floridior reddatur, quæ inter est essentia fumariz simplex, & imprimis composita, ess. helenii, persicariz cum ~ cochleariz permista; R florum aquilegiæ expellens hic etiā convenit, non minus quàm emulsio seminis aquilegiæ, R coralliorum antiscorb. reliq. præfertur, egregiè enim promovet exclu-

(Sss)

exclusionem, quæ etiam in purpura puerperarum, de malignitate scorbuti plus minus participante, egregie confert. In maculis rubris, internis remediis addendus venit succus acetosæ, ipsa acetosa, acetosella, & succus citri: in cœruleis & lividis cochlearia & ex hac parata medicamenta, optimè conveniunt; hisce interponantur diaphoretica terrea, acidum, temperantia & absorbentia, C. C. sine igne, corallia rubra præparata, cinnabaris antimonii, & diaphoreticum simplex & Martiale, bezoardicum Joviale, antihæcticum Poterii, myrrha, flores  $\frac{1}{2}$  is, &c. c. g.

℞. C. C. f.  $\Delta$  e 3℔.

corall. r. præp. 3j.

℞ii diaphor.

flor.  $\frac{1}{2}$  is.

Cinnab. ℞ii. a 3℔.

myrrh. el. 3ij.

M. f. Pulvis: S.

#### Ausstreibend Pulver äußerlichemahl.

De hoc quotidie bis l. ter a 3j. ad 3℔.

Quod si expulsæ sint maculæ, sponte evanescent; sin verò pertinaces resistant, nec evanescere velint, utut nihil mali in recessu habeant, quibusdam tamen cutis nitori studentibus sint molestæ, & etiam interdum majores ad excoriationem disponunt partes, necesse est, ut removeantur, quod fit optimè per linimentum, paratum ex pulvere sinapi cum aceto in linimenti liquidi formam redacto: post hoc enim in balneo vel lecto post sudorem illitæ maculæ subito disparent, quod etiam conducit in maculis hepaticis. Quod si acrius fuerit, ad modum Timæi von Guldentlee/ convenit linimentum sequens:

℞. pulv. sem. sinapi subtiliss. 3℔. ad 3ij.

o amygd. amar. rec. 3℔. ad 3vj.

succi citri rec. q. s. M.

His quoque associari potest infallibile hoc, c. g.

℞. rad. irid. flor.

belleb. albi ana q. s.

Pulverisata misce cum melle virgineo vel o amygdal. amar. in unguentum.

D. Michaëlis arcanissimum remedium in usu erat sequens:

℞. flor.  $\frac{1}{2}$  is. p. ij.

camph. p. j.

arena ad pondus omnium.

abāt, & c.  $\nabla$  scropularia inungebat.

#### V. PRURITUS CUM PURPURA.

Non rarum est, quod scorbutici in ambitu corporis patiuntur pruritus rodentem cum eruptione quasi purpuræ in loco calido, quæ in frigido denuo disparet, das stecket zwischen Fell und Fleisch/und beisset in der Haut wie Messeln. Pro excretionem intercutanea promovenda nihil melius est decocto summit. pini, expectando sudorem, qui multum expellit. Externè canis linctura manuum ac

pedum laudatur in M. A. N. C. Ann. 4. & 5. obs. 51. quæ etiâ ad maculas cutaneas confert.

#### VI. CRURUM DOLORES SCORBUTICI.

Præ cæteris notum est, quod doloribus frequentissimis iisque variis stipatus sit scorbutus, qui dolores nunc sunt fixi nunc vagi. Dolores fixi sæpissimè abdomen, sæpe etiam crura infestant. Ad dolores crurum, qui magis sentiuntur tempore vespertino & nocturno, sudorifera appropriata sunt optima, præmissa subinde in principio V. Sine brachii & pedis oppositi, aut etiam cruris ægri, si nempe maturè instituat, avertendo quasi aut derivando contentorum motum; potius tamen in brachio, quod bene notandum; sicuti etiam omnia ea conveniunt, quæ postmodum circa arthritidem vagam explicabuntur. Speciatim præ cæteris internè conducunt  $\sim$   $\frac{1}{2}$  volatil. seu carminativus,  $\sim$  theriacalis camphoratus, &c. cum  $\sim$  cochlear. aut nasturtii,  $\sim$  u baccarum ebuli aut sambuci, aut  $\sim$  u antiscorbutico mistus; essentia sassafras mista cum  $\sim$  u cochleariæ aut antiscorbutico quocunque ad 3j. assumatur, addendo subinde essentiam opii aut grana aliquot laudani opii, ad compescendam doloris ferociam: c. g.

℞. Ess. ligni sassafr. l. succini sassafr. 3ij.

$\sim$  antiscorb. 3j.

Ess. opii  $\frac{1}{2}$  isat. 3℔. ad 3j.

M. D. S.

#### Scorbutische Fluß-Essenz.

Convenit item decoctum ligni sassafras aut summit. pini cum radice chinæ: c. g.

℞. ras. ligni sassafr. 3ij.

cort. ligni sanct. 3j.

rad. china elect.

sarsaparil. ana 3℔.

stent in infusion, cum  $\nabla$  simpl. 1℔liij.

manè coq. vase clauso suo alembico munito,

Colaturæ ferventi infunde,

herb. scord. M. iij.

rad. liquirit. 3j.

polypod. 3vj.

stent per  $\phi\phi$ ; manè coletur, colaturæ addatur liquor per alembicum prolectus.

D. S.

#### Scorbutischer Fluß-Trank.

Externè conveniunt fomenta, tam humida quam sicca. Humida parentur ex decocto altheæ, abrotani, fumariz, beccabungæ, pulegii, hyssopi, cochleariæ, salviæ, sabinæ, nasturtii, floribus chamomillæ, sambuci, & baccis juniperi: v. g.

℞. Herb. salvia

flor. chamomill.

samb. ana M. ℔. ad M. j.

herb. nasturt. aquat. M. j. ad j℔.

Coqu. in f. q. lactis vel feri lactis, vel  $\nabla$  comm. pro fotu calido cum linteis multiplicatis applicando,

D. S.

#### Uindernde Bädung.

Aut



Aut etiam coqu. in forma cataplasmati & ita applicetur. D. S.

**Lindernder Umschlag.**

Item flores sambuci, quibus adduntur aliquot folia hyosciami, in lacte cocti commendantur admodum ad scorbuticum crurum dolorem.

Aut fiat cataplasma ad imitationem D. Michaelis:

℞. *Rob. junip.* ʒj.  
*succ. inspiss. flor. chamom.*  
*sambuc.*  
*nasurt. vtic. ana* ʒʒ.  
 coqu. in l. q. *lactis coagul.*  
 f. l. a. cataplasma.

Sed quoniam non æque omnia subiecta ejusmodi fatus humidus ferunt, fatus siccus fieri potest, v. g. sacculus, qui calefactus imponatur.

℞. *Mili M.* iiij.  
*Θ commun.* M. j.  
*furfur. tritic.* M. ij.  
*summit. absinth.*  
*flor. chamom.* ana Mj.

Includantur sacculo, quo dolor brachii gravissimus refertur curatus, in M. A. N. C. A. 6. & 7. *observ.* 94. pag. 133.

Mili quantitas ad ℞ʒ. & ℞j. augeri potest, uti etiam quantitas Θ is ad ʒiv.

Horum loco spiritus possunt commodè illiniri calidè, qua ratione ~baccarum juniperi camphoratus Timæi von Gildentlee / externè illicus etiam est elegans: vid. ejus *Epist.* p. 368. ~Θ xci cum Ψ, vel, qui omnium optimus, ~lumbricorum ~strium, cum duplo, triplo vel quadruplo ∇ articul. ad extra mistus, & ita crebrius illicus, est optimus, cavendo, ne acriora sint ingredientia. Galbanetum Paracelsi cum ~u q̄i mistum & circulatum, hinc leniter affricatum, externè dolores crurum fixos sedat. Facit huc pediluvium Myns. contra dolores crurum. Imprimis singulare quid obtinet lixivium coriario- rum, *gebrauchte Gerberlauge* / cum dimidio Ex humanæ mistum, in forma humoris vaporosi est singularis efficacæ, vid. M. A. N. C. *nn.* 6. & 7. *Observ.* 229. Tandem vinacea & intellus vinaceorum calidorum, ut probè incalescat membrum dolorosum, singulare quid obtinent in corrigendis doloribus artuum: Quando scilicet fermentatione spontanea probè incalescunt (si non spontè incalescunt, aspergatur Ψ) pars affecta immersa probè sudet, quo absterfo æger in lectum calidum se conferat: donec spontè cesset sudor, & si opus est, ulterius sudet, & sic mirificè hi dolores sistuntur; ultimò horum locò balneum ex formicis, earumque cubile, itidem hic est egregium. Denique aliis irritis thermarum ∇æ, aut balnea ex luto thermarum, aut thermæ artificiales ex ꝑe & Ψ parata, pro lotionem dolentium membrorum

Tom. II.

sunt convenientissimæ: sed probè notandum præmissis præmittendis, vesicatoria in aut prope locum magis dolentem applicata subinde multum conferre in hujusmodi fixioribus & contumacioribus torturis.

**VII. COLICA SCORBUTICA & NEPHRITIS NOTHA.**

Inter alia symptomata scorbutica eminet quoque ventris dolor, colica & iliaca passio, qui sunt affectus acerbissimi, interdum adeò atroces, ut duos exinde rupturam peritonæi passos Eugalenus p. 86. perhibeat. Variè affligit agros, ut plurimum conqueruntur, circa vertebrae dorsi se pati dolores lancinantes & lacerantes, unde totum abdomen cruciatur, & spasmodicis convulsionibus ad dorsum usque, ubi imprimis mesenterium annectitur, se manifestant: subinde umbilicus ad interiora versus retrahitur, & ægri jacent incurvati, interdum totum abdomen tumet, & licet ventris exspirent flatus, tamen levamen non sentiunt.

Facit huc nephritis notha, in quæ omnia fere nephritidis adfunt symptomata, etiam urinæ ardor atque suppressio, cum dolore lumborum circa renes in regione hypochondriaca ac perineo exquisitissimo, nullo licet præsentè calculo. Frequenter enim decipiuntur ægri, æque ac Medici, ut putent, se laborare nephritide, sed malè; & utut urina supprimatur, non tamen statim adest calculus. Complicati quidem interdum sunt dolores nephritici & abdominis, interdum seorsim affligunt. Conqueruntur de angustis cordis, imò subinde eadem symptomata, quæ mulieres hystericae, & utut cessent dolores nephritici & abdominis, tempore tamen extra paroxysmum conqueruntur de doloribus lancinantibus & lacerantibus circa regionem lumborum, donec varix causæ externæ evigilantes parotidem inferant.

Dolor hic simpliciter oritur ex spasmis seu motibus convulsivis intestinorum, mesenterii, & partium nervosarum annexarum, ab acti scorbutico Θe vellicatarum, in quibus imprimis regio lumbaris mirè lacerari & affligi solet quorum fundamentum hæret in plexu mesenterico nerveo & ibi confitis glandulis.

De hac nephritide notha nemo melius, quàm Dravviziuss scripsit.

Quoad curam horum dolorum in paroxysmo duæ Indicationes observandæ sunt:

1. Intestina leviter abstergenda blandis injectis & assumptis.
2. Convulsivi impetus & spasmus in intestinis & membranis abdominis, tam generalibus quàm specialibus scorbuticis, imprimis volatilibus ꝑosis, & opiatibus & temperatis compescendi sunt, internis & externis.

Extra paroxysmum scorbuti cura primariò

(Sss 2)

riò attendenda; & in specie post  $\sigma$ alia remedia, & illa ex pino sunt optima; idque cessante paroxysmo, aut intra eum.

Quoad primum scopum: quovis morbi statu à purgantibus fortioribus planè abstinendum, quia maximè nocent, symptomata spasmodica exasperant, & dolores exacerbant, ac non raro hinc fecum per os rejectio contingit.

Cum verò alvus subinde pertinaciter sit clausa, usurpentur saltè blandè abstergentia intestina: inter quæ eminent passulæ & omnia passulata, serum lactis, imprimis caprini aut lac caprinum cum saccharo &  $\sim$ u  $\sigma$ \*mistum; ad demulcendam acrimoniam  $\sigma$ is scorbutici, istas convulsiones spasmodicas in abdomine excitantis,  $\rho$ o amygdal. dulcium recens, aut olivarum, in quo rosæ pallidæ fuerint infusæ ad  $\zeta$ ij. vel iij. vel solum, vel in jusculo gallinaceo, jure pisorum, decocto rad. altheæ aut parietariæ haustum, aut sperma ceti cum illis assumptum, egregiè temperant acrimoniam  $\sigma$ ium, blandè alvum leniunt, & intestina abstergunt. Quoad passulata in alvo nimis obstructa, vid. Timæus à Guldenslee in *Epist. pag.* 236. Vel

*ix. Tamarind.  $\zeta$ iss.*

Coqu. in s. q. *seri lactis* ad Mens. j. Si verò dolores hi adhuc in principio fuerint, leviter tantum affligant, & alvus nondum constipata, statim purgantibus materia vitiosa educi debet, illam primò attemperando per absorbentia & temperantia, ut  $\rho$ o amygdal. sperma ceti, lapillos 69. solut.  $\sigma$ is cum succo pomorum, &c. Singularis verò est encheiridis, quam Riverius *Prax. lib. 10. cap. 1.* commendat, scilicet ut purgantibus opiata commisceantur, quibus mediantibus primò somnus inducitur, hincque alvo soluta paroxysmus sedatur.

Quoad alterantia; variant hæc pro diversitate acrimonie peccantis, quæ modò absorbentia minusque acria, modò præa  $\rho$ ola aromatica &  $\sigma$ ia volatilia admittit. Si enim humores rodentes, ac æstuentes magis fuerint, convenient alterantia absorbentia terrea & marina, v. g. lapides cancerorum, mater perlarum, maxillæ lucii piscis, corallia rubra, margaritæ,  $\sigma$ ialia, unicornu sine  $\Delta$ e, ebur sine  $\Delta$ e, &c. item serum lactis tepidum, aut in quo radix chinæ cum ana flor. borrag. & part. ii. flor. tunicæ decoctum, cujus usum pro obtundendo  $\sigma$ e acri acido singularem frequentius observavi: Vid. Dravvizi<sup>us</sup> *l. 4. pag.* 224. Aut loco hujus emulsi, sem. 4. frigid. majorum cum semine papav. albi & ebore sine  $\Delta$ e: Aut his substituendum saccharum Saturni, & ex hoc parata R antiphthisica, quæ omnes rodentes & æstuentes humores singulariter temperant, observatis tamen illis circumstantiis, quas Dravvizi<sup>us</sup> *l. 4. pag.* 126.

indigitat. Sin  $\sigma$ areniformis simul in  $\sigma$  cornpareat, frustraneus est lenientium usus, nisi per diuretica moderatissima & abstergentia ille prius tollatur, scilicet per terebinth. syr. de althea Fern. Emuls. sem. 4. majorum & papav. albi, violarum, ac lapillos 69 &c. Præter ea ad convulsivos impetus sistendos conveniunt  $\sigma$ ia volatilia  $\rho$ ola cum opiat<sup>is</sup> mixta, in specie remedia ex castoreo, cochlearia & cort. aurantiorum aliisque carminantibus sunt optima. Præ cæteris verò Ess. cort. aurant. mista cum Ess. castorei &  $\sim$ u cochleariæ est elegans.  $\sim$ u  $\sigma$ \*ci mistus cum  $\sim$ u cochleariæ, item cum  $\sim$ u anisi & benè circulator ac unitus etiam convenit. Spiritus  $\sigma$ i cum  $\sim$ u cochleariæ unitus & dulcificatus dat  $\sim$ u i dulcem cochleariatum contra dolores ventris scorbuticos. Imò si diutius dureret paroxysmus,  $\sigma$ alia sunt usurpanda. Denique  $\sim$ u carminativus de tribus cum  $\sim$ u cochleariæ mistus, etiam cum vehiculo antiscorbutico appropriato assumptus, est nobilissimus in abdominis doloribus. Loco  $\sim$ u carminativi potest etiam summi  $\sim$ u  $\sigma$  volatilis mistus cum spiritu cochleariæ vel cum  $\sim$ u lumbricorum terrestrium, qui in sero lactis assumti sunt optimi; item Elixyr proprietatis antiscorbuticum non incommodè usurpatur. Quibus subinde præmissis præmittendis laudanum opiatum, laudanum hystericum aut essentia opii, consultò addi possunt: v. g.

*ix.  $\nabla$  Carminat. Dorncr.*

*antiscorbut. ana  $\zeta$ ij.*

*$\sim$ u cochlear.*

*carmin. de tribus ana  $\zeta$ j.*

*Ess. opii  $\zeta$ ss.*

*Syr. cort. aurant.  $\zeta$ vj. ad  $\zeta$ j.*

M. D. S.

### Scorbut. Mixtur wider das Schneiden.

Præ cæteris externè clysteres cum cataplasmatibus, fomentis ac linimentis antispasmodicis magno emolumento sunt; unde clysteres lactei, tam simplices quam terebinthinati, sunt perquam proficui. Fomenta ex lacte cum anodynis & scorbuticis; cum anodynis v. g. florib. chamomillæ, sambuci, summit. absinthii, anethi, althea,  $\rho$ iali, parietaria, rad. helenii, baccis lauri, foliis hyoscyami, &c. sunt egregia. Hæc enim & similia mista pro clysteribus lacteis coquantur, & vel ventri applicentur, vel decoctum sub forma clysteris addito oleo violarum, rosarum ac vitellis ovorum injiciatur: Vel fiant clysmata ex lacte, vel solo vel medicato, cum appropriatis quibusdam addito saccharo; imprimis lac, in quo dissoluta terebinthina cum vitello ovi est egregium in abdominis doloribus, idque imprimis, si diu retineatur: Vel fiant clysmata ex sero lactis, quibus additur castorii ana  $\zeta$ ss. vel  $\zeta$ ij. ad  $\zeta$ j. cum syrupo papav.

pav. albi ʒij. ad ʒij. vel cum Requite Nicolai ad ʒij; Sic enim fit clyisma appropriatum, & admodum dolores leniens; aut injiciantur clysmata carminativa anodyna & terebinthinata.

℞. *Herb. & flor. chamomill.* Mij.

*althea* Mij.

Θꝓ vel *cin. clav.* ʒj.

Coqu. in l. q. *lactis*.

Colaturæ ʒviiij. adde

*Mell. & al. l. rosat.* ʒj.

M. pro Enemate: D. S.

*Pindernd Clystier.*

℞. *Lact. bubul.* vel decoct. *flor. chamom.*

cum *lacte* & Θꝓ ʒix rad x.

*terebinth.* cum *vitello ovi* ʒiiij. vel ʒiij.

*theriac. Androm.* ʒj. l. ʒij.

*sacch.* ʒij. vel ʒiiij.

*mell. rosat.* ʒj. M.

Sin clysteres nil præstent, aut planè retineantur, ab ulteriori eorum usu desistendum, & solis fomentationibus aut balneis negotium tractandum, folia hyoscyami his addendo: vid. Dravvizijs pag. 315. Per reiterata quippe atque retenta enemata intestina magis inflantur, hincque dolor augetur. Quod si verò spasmus intestinorum ab usu clysterum aliquaratum remittant, illis insistendum, & purgantibus potentioribus iidem acuendi sunt. Jungitur ulterius ʒ lumbricorum terrestrium, ʒ cochleariæ, ʒ chamomillæ, &c. quæ ipsa ʒ ea etiam externè in dolore hypochondriorum circumscripto optimè conveniunt & conducunt; quibus in nephritide notha ʒ scorpionum, unguentum de liquiritia, altheæ, &c. addendum. Reliquis præfertur Galbanetum Paracelsi, seu ʒ destillatum ex Galbano & terebinthina externè regioni umbilicali largiter calidè illitum est efficacissimum, imponendo desuper laterem calefactum; vel emplastrum de Galbano usitatum seu matricale, malaxatum cum ʒ eo destillato succini, Philosophorum, ʒ ʒi, castorei, chamomillæ, vel cum balsamo Peruviano, est optimum. Nam eadem externa, quæ in passione hysterica usurpari possunt, conveniunt etiam in doloribus hisce abdominis, imprimis in hujusmodi doloribus, ubi cum nephritide notha seu doloribus dorli lumbaribus, circa os sacrum conjunctis & quasi ischiaticis optimum est emplastrum diaphysphuris Poterri, quod aliàs præmissis præmittendis interius nobile est remedium ad ischiadem.

Dravvizijs ejusmodi emplastra planè rejicit; nonnulli tamen eo modo suadent, ut modò applicentur, modò iterum removeantur. Ubi deficiunt talia, fons humidus & cataplasmata adhibeantur, qualia parantur ex baccis juniperi, floribus sambuci, nasturtii, hyoscyami & similibus:

℞. *flor. chamomill.*

*sambuc. ana* M. j.

*fol. hyoscyam.* M. ij.

*rad. helen.* ʒij.

*bacc. lauri* ʒj.

Incisa & contusa D. S.

Species zur Bähung.

Coqu. in lacte, & dictis modis usurpentur.

Præ cæteris tamen convenit fons toti abdomini insternendus ex fol. hyoscyami in lacte coctis, de quo vid. Dravvizijs *Tr. de Scorbuto* pag. 315. Aliis irritis infusus in decocto emollientium & carminantium fiat, commendatus à Timæo von Gildenflee in *Epist.* pag. 236. Lacti incoquendi imprimis canceri fluviales, tam pro usu fons, quam pro usu injectionis.

Extra paroxysmum radicalis cura scorbuti postmodum est attendenda, ubi præter ʒialia & antiscorbutica, imprimis remedia ex pino conferunt. Decoctum strobilorum pini aut baccarum juniperi, sudore aliquoties repetito cum emplastro de pice sola sufficiunt pro curandis his abdominis doloribus, ne recidivent. Horum defectu lacticia cum scorbuticis usurpanda sunt, præmissis ʒialibus extra paroxysmum: nam dolores solent præcavere, aut imminentes sistere. De nephritide notha vid. Dravvizijs de scorbuto M. A. N. C. *Ann. 3. observat.* 44. pag. 73. ubi ~Θ\*ci & lumbr. terrestrium, item essentia nephritica è ligno nephritico, cum ~u Θ\*ci & fragorum extracta, commendatur, propinanda in ʒ petroselinii, in qua crySTALLUS candefacta extincta.

## VIII. ARTHRITIS VAGA SCORBUTICA.

Juxta dolores hos etiam familiare est scorbuti symptoma dolores vagi arthritici s. arthritidis vaga. In locis, ubi scorbutus est familiaris, sic solet appellari; ubi verò rarus est, ibi apud Practicos subinde sub nomine dolor artuum à rheumatismis seu defluxionibus natorum, qui ordinariè sunt scorbutici, proveniunt. Veteres dicunt rheumatismus, Reissen in Gliedern / Sicht. Reverà ergò cum arthritide vera convenit, accidentibus saltem variat. Differt sc. hæc arthritidis vaga ab arthritide vulgari propriè sic dicta, seu podagra: nam ut non rarò etiam scorbutus podagræ s. arthritidi vulgari se associet, ita, ut etiam arthriticis seu podagricis antiscorbutica remedia non sint incongrua, & cum successu applicentur; nihilominus tamen arthritidis vaga scorbuticis magis propria est: deinde & in hoc differunt, quod arthritidis vera sit constans, seu in parte, quam semel occupavit, successivè sua tempora absolvat; arthritidis verò vaga, quatenus scorbutica, inconstans est, & fixam sedem non habet, & simul musculosas partes atrocius infestare solet, modò in hanc, modò in illam partem irruens, jam in pedes, jam in brachia, in specie si forsan per externa frigida admota repellatur, ex improvviso evanescit, modò redit: interdum fulminis instar articulū locaq; vicina occupat, interdū



citò disparet. Curiosū est, quod fricatione panni calidi dolores mox remittant, sed mox in alio loco se manifestent. In arthritide vera successivè oriri solent nodi seu topi, difficulter curabiles; in vaga verò non, & utut etiā tumores interdū observentur (nam fuerunt observati instar ovi gallinacci) nihilominus tamen facilius discutiantur & disparent, cum tumores tales non sint propter materiam contentā, sed propter contracturas spasmodicas, nunc constantes sunt, nunc inconstantes, modò evanescent, modò denuo comparent. Dolores hi nunc sunt simpliciter lacerantes, nunc profundi, ostocopi, subinde nocturno tempore per modum febriculæ plus minus lentæ affligentes, utut sint maximè fixi & quandoque vagi. Terminatur arthritidis vaga nunc per sudores & ☐m, nunc eam excipit excretio cutanea instar purpuræ, & tota superficies corporis fit aspera; loco cujus interdum excrecentiæ parvæ, item pustulæ superveniunt, quæ subinde excrescunt. Notabile est, quod si arthritidem vagam excipiat talis purpura, quod ægri tantum pruritum percipiant, ut etiam fricando cuticulam detrahant; talis purpura est cum rubore corporis totius instar erysipelatis. Non rarum est, imprimis in nostro climate, quod arthritidis vaga sit complicata cum scorbuto, unde dolores & symptomata graviora esse solent. Arthritidis vaga hæc, præter dolores in articulis, simul solet affligere, in specie dum recrudesceat paroxysmus, cum gravissimis anxietatibus præcordiorum, quod sit in principio paroxysmorum: adest sitis clamorosa, sudores, totius membri movendi imbecillitas, dolores lancinantes, magis pungentes.

Fundamentum hujus pathematis est sal scorbuticum vellicans fibras nerveas motrices carnem, & imprimis periostrum, minus tamen affligens partes tendinosas in articulis. Notetur autem hic error ingens Mælenbroccii, ☐ hoc scorbuticum asserentis aliquid volatile, exinde quod subito è parte in aliam transmigret: nam revera symptomata hæc non oriuntur à sale è parte in longè distantem volante, cum constet, ☐ia omnia in corpore esse fluida, & moveri secundum motum humorum ordinarium; sed ex consensu nervorum, cui omne id est attribuendum, quod Helmontius per morbos potestativos explicat, quando v. g. affecto ventriculo cerebrum & aliæ partes afficiuntur.

Procura ergo observandum, ut in paroxysmo

1. Impetus spirituum & humorum, occasione salis scorbutici excitatus, refrænetur.
2. Volatilibus appropriatis, nunc ☐sis, nunc ☐osis amaricantibus, succurrendum, vel per ☐m, vel per sudorem, istud evacuando.
3. Paroxysmo declinante remediis ex pi-

no sudoriferis radici morbi succurrendum; &

4. Extra paroxysmum præter dictam convenientem lacticiniis præsertim mali recidiva præcavenda.

Quoad 1. pessimè faciunt, qui in principio paroxysmi usurpant volatilia; frustranea enim sunt: potius ergò in principio & incremento V. S. nunc revulsoria respectu partis affectæ, nunc averforia, subinde cum fructu singulari instituitur, si ægri conditio ferat; non tamen cum tanto excessu, ut facit Sydenham. in *Observat.* pag. 409. nec in latere aut membrò affecto, sed in opposito, ne circumstantiâ hæc neglectâ illud eveniat malum, quod Horstius l. 8. *observat.* 16. in hatrona quadam observavit. Præsertim convenit, quando suspicio est sanguinis suppressi, & in specie, quando mentes suppressi sunt. Loco V. S. nis cucurbitulæ scarificatæ optimæ sunt: sicut etiam vomitus in genere in principio hujus mali egregiè convenit. Hinc præmissio clymate, præsertim, si anxietates præcordiorum urgent, usurpanda sunt fixa & impetum ☐is scorbutici peccantis refrænantia, qualia sunt alcalia, marina & testacea. Eminet hic arcanum duplicatum Mynsichti, cum quo simul usurpetur ☐ diaphoreticum simplex & ole, vel cinabaris ☐ii, item lapilli cancerum, maxillæ lucii piscis, ossa humana sine igne, dens equi marini, &c. cum opiatis: interdum Bezoard. minerale ole, ☐re, &c. it. aurum fulminans. Interdum adduntur ☐ia fixa alcalia, quæ nunc spontaneo sudore, nunc per ☐m levant ægros, ita ut & symptomata remittant, & dolores postmodum sint mitiores, v. g. in motu materiæ nimis excessivo & plus minus perturbato, cujus indicia sunt febris intensior, pulsus inordinatio, præcordiorum symptomata graviora, &c. præscribatur diaphoreticum opiatum.

℞. Arcan. dupl. Myns. ☐ss. l. gr xv. ad ☐j. ☐ diaphor. ☐ss.

laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulvis. D. in duplo. S.

#### Scorbutische Glieder-Pulver.

℞. ☐ii diaph. ☐ial ☐ij.

cinab. ☐ii. ☐j.

laud. opiat. gr. ij. M. pro 2. dosibus.

℞. Cinnab. ☐ii. ☐j.

☐ diaph. Poter. gr. xij.

laud. opiat. gr. ij. M. pro 2. dosib.

℞. ☐ fumar.

flor. samb. ana ☐ss.

☐ ☐ci ☐j.

arcan. duplic. ☐ss.

☐ii diaph. ☐j.

cinab. ☐ii. ☐ss.

Syr. scelytyrb. zvj. M. D. S.

Scorbut. Glieder-Tränckl. auff etliche mal. Subinde & blando laxativo primæ viæ abstergendæ veniunt. In motu naturæ deficientis potius

potius aromatica diaphoretica opiatas plus minus sociata, ut Essentia lignorum, theriaca cum osteocolla, &c.

Postmodum fiat accessus ad volatilia eaq; generalia cum scorbuticis mixta, imprimis tamen fiat accessus ad appropriata volatilia, quæ inter ex pro lumbrici antecellunt; lumbrici enim terrestres una cum aliis, sunt specificum optimum, quod par sibi non habet remedium in hac arthritide vaga. Nam si lumbricus vivus applicetur loco dolenti, in quo est arthritidis vaga, hic ipse statim exiit, mirè circumgyratur, & tandem moritur, idque cum dolorum levamine, qua contorsione & expiratione arthritidis vaga scorbutica manifestatur, unde hæc impositio novorum lumbricorum tamdiu continuanda, donec lumbrici non amplius, aut saltem non tam cito, moriantur, sic dolores egregiè sistuntur: videatur Wierus in observ. Item Hotstius, Forsterus, Timæus von Guldenslee / Mollenbrocc. de Paris, Willsius de Scorb. cap. 9. Omnia ergo remedia ex lumbricis parata externè pariter & internè erunt optima. Internè usurpantur crudi, vel depurati & pulverisati: sic decoctum lumbricorum terrestrium cum plantis appropriatis antiscorbuticis in vino laudatur à Lotichio: vel quod melius est, lumbrici terrestres contusi infundantur vino vel lacti aut ejus sero, quod infusum colatum hauritur quotidie bis aut ter, pro vario ægrorum statu; in vino propinantur, dum æger vinum ferre potest, & si ablit febris; si verò adsit febris seu phlogoses, in lacte. Pulvis asellorum est probatus: pulvis scarabæorum unctuosorum similiter commendatur. Sed quia talia decocta & infusa quandoq; ægri horrent prius præparantur lumbrici. Lumbrici enim terrestres putrefacti resolvuntur in liquorem, qui destillatus & rectificatus dat spiritum penetrantissimum egregium, & qui mira facit in arthritide vaga, dosi ad ʒss. in sero lactis, vel ipso lacte. Cum hoc & ana ~ C. C. sale volatili acuatō fit essentia contra arthritidem vagam D. Michaëlis, si nempe affundantur isti ~ speciebus arthriticis appropriatis & nervinis exsiccatis, digerantur & filgrentur; & ita dant essentiam egregiam contra arthritidem vagam, quam nunc solam ad ʒj. nunc cum Ess. pini optimè exhibuit: sed aliquandiu continuanda expectando sudorem. Convenit etiam liquor pistorius lumbricorum, in vase massæ panis incluso paratus, qui datur ad ʒss. Quibus ~ carminat, de tribus aliisque ~rea volatilia addenda sunt; vel

℞. Liquor. ~a fol. ʒi.

~ Oxi, vel lumbr. ~estr. ā ʒij.

M. D. S.

Scorbutische Glieder-Essenz.

dos 40. vel 50. gutt.

℞. ~ Serpilli.

comar. abiet. l. pini strob.

tochlear. ana ʒj.

Ess. catarrhal. ʒij.

~ lumbr. ~estr. per putr. ʒj.

~ vel. C. C. ʒi.

succini ʒss.

lapill. 69. prap. ʒss.

laud. opiat. gr. iij.

Syr. rad. helen. ʒj. M. D. S.

Scorbutische Glieder-Tränckl. Köffel-weise.  
Facit huc mistura Timæi von Guldenslee / contra arthritidem vagam scorbuticam, quæ non est incongrua.

Hicce etiam declinante paroxysmo usurpatis conveniunt postmodum remedia, quæ malum ex ipsis artubus, quantum possibile, eradicant, & talia sunt ex pino cum antiscorbuticis mixta, essentia pini mista cum essentia lumbricorum terrestrium, aut cum essentia contra arthritidem vagam sit egregium remedium, e. g.

℞. Ess. contra arthr. vag. Myns.

pini ana ʒij.

M. D. S.

Scorbutische Glieder-Essenz.

Loco horum tamen non inconsulto bacc. juniperi, aut ex iis parata remedia propinentur, imprimis ex recentibus; nam & harum vis balsamica in arthritide vaga est egregia: unde rob baccarum juniperi expectando sudorem, aut decoctum baccarum juniperi, radic helonii laudatur à Mollenbroccio; Tr. de Arthrit. vaga. In specie decoctum centaurei minoris & absinthii in sero lactis est admodum proficuum: Conf. M. A. N. C. Ann. 8. observ. 84. p. 120. præsertim cum antiscorbuticis mixtum, expectando sudorem. Absinthium imprimis, & omnia ex absinthio remedia, à Galeno laudantur in arthritide vaga, item succus corticis citri & corticis aurantium. Præterea card. benedictus, chamædrys, chamæpytis & sabina; rad. armorac. aristol. rotundæ, caryophyllatæ, veronica, & rad. amaræ dulcis cum antiscorbuticis mista, convenientia dant remedia. Necessè est subinde, ut etiam præscribantur noduli vino infundendi ex antiscorbuticis. ~ Anhaltina composita est magnæ commendationis. Denique mixtura simplex cum ~u cochleariæ permista, spiritus ~xi cum ~u antiscorbutico, ~us carminativus & similia sunt egregia. Decoctum strobilorum pini curam ferè absolvit; sicut etiam decoctum radicis chinæ & sassafras insigniter conducit.

℞. Cymar. resinof. pinastr. l. abiet. ʒij.

rad. china in tal. incis. ʒi.

(vel in subjectis serosiorib; & humidiorib. rad. sassafr. ʒj. ad ʒss.

bac. juniperi ʒj.

Incis. & contus.

Coqu. in f. q. ~ communi:

Colaturæ lb. jv. l. vj. D. S.

Scorbutischer Glieder-Tränk.

De





*Elect. de bacc. lauri, l. de hiera cum agar. ʒi.*

*Olei destillat. chamomill. ʒʒ.*

*vitelli ovi. no. j.*

M. f. Enema.

Extra paroxysmum indicationes hæ obser-  
ventur:

1. Acidū in primis viis hærens evacuetur; &

2. M. S. inquinata corrigatur.

Pro indicatione prima ex fonte pharmaceu-  
tico, præmisso prius aliquandiu lap. 69. usu,  
vel ʒri essentificato, omni vespera gutta-  
tim sumendo, vomitus instituitur:

*Rx. ʒ menth. ʒʒ.*

*cinamom. ʒij.*

*syr. emet. ʒʒ. ad ʒvj. M.D.S.*

**Brech-Tränkein auff einmahl.**

Ad secundam indicationem itidem ex fonte  
pharmaceutico tam diaphoretica quàm diu-  
retica proficua sunt, e. g.

*Rx. ʒii diaph. ʒi.*

*ʒ volat. succin. ʒʒ.*

*Elae-sacch. cochlear. gr. vj.*

M. f. Pulvis: S.

**Schweiß-Pulver.**

*Rx. ʒ fumar. ʒi.*

*cinamom.*

*ʒi sambuc. ana ʒij.*

*Theriac. ʒj.*

*ʒu absinth. ʒi.*

*Syr. scelotyrb. Fern. ʒij. M.D.S.*

**Schweiß-Tränkein auff einmahl.**

Ex fonte dietetico, vitatis vitandis, pro  
temperanda sanguinis acrimonia prosunt la-  
cticia cum succis antiscorbuticis expressis,  
omni manè jejuno stomacho & vesperi biho-  
rio ante pastum haurienda.

#### IX. CEPHALALGIA SCORBUTICA.

Porro præter dolores artuum vagos subin-  
de in scorbuticis caput dolere solet. Pro ce-  
phalalgia scorbutica sudoriferorum vis est  
maxima, in specie laudatur ʒ volatile succi-  
ni, spiritus ʒ-li volatilis cephalicus cum spi-  
ritu liliorum convallium paratus, & cum spi-  
ritu ʒri & cochleariz mixtus; item cinnab.  
ʒii, succinum catarrhale, ambra; quibus in-  
terdum in contumaciori malo addenda opia-  
ta. Conveniunt etiam pilulæ ex ladano, quas  
Hartmannus *Prax. pag. 48.* describit; Vel

*Rx. Elix. propr. antiscorb.*

*ess. absinth.*

*liq. C.C. succin. ana ʒij.*

Post hæc lactis usus proficuus est in dolore ca-  
pitis scorbutico, in alio verò noxius.

Externè zedoaria & baccæ juniperi cum ʒ vel  
decocto verbenæ, florum sambuci ac betoni-  
cæ admoventi poterunt.

#### X. PARALYSIS SCORBUTICA.

Scorbuticis etiam subinde evadunt membra  
stupida plus minus paralytica, quæ paraly-  
sis scorbutica seu potius paresis non adeò con-  
festim, ut aliàs in paraplegia fieri solet, sed po-  
tius sensim invadit, & pereunte successivè mo-

tu sensus ut plurimum superstes est, cui inter-  
dum conjunctus est sensus fornicationis cu-  
jusdam, als wenn Ameisen drinnen lieffen/  
qui sensus sæpius præcedit paralyfin scorbu-  
ticam, subinde etiam eam comitatur; inter-  
dum sensus est lancinans, & quasi dolor com-  
positus ex lancinante & ostocopo; in paraly-  
si hac, aliquandiu affligente membra non-  
nunquam rigida & quasi contracta fiunt. Hæc  
paralytis scorbutica est grave malum, quod  
difficiliter curatur, imprimis si inveterata sit,  
in specie fornicationis sensus, quo præsentem  
vigil sit Medicus, ut possit præcavere paralyfin.

In cura talis paralyseos conveniens est, ut  
præmissis præmittendis, in specie vomitoriis,  
nisi metus doloris abdominis subsit, eam inci-  
piamus. Si enim æger per se inclinaret in do-  
lores abdominis scorbuticos, à vomitoriis ca-  
veamus; dolores enim ab his exacerbantur;  
si verò abdomen est sanum, tutò possunt pro-  
pinari vomitoria, imminente vel præsentem pa-  
ralysi scorbutica. Purgantia quoque frequen-  
tiora ac vehementiora utpote materiam pec-  
cantem ad genus nervolum magis moventia  
affectus hi paralytici haud ferunt, sed mitiora  
saltem concedunt, præprimis ubi paresis &  
dolores abdominis adsunt, & quidem à clyste-  
ribus emollientibus ac purgantibus lenioribus  
similibusque, de quibus superius, inchoan-  
dum. Venæsectio pariter in his symptomati-  
bus parca admodum, imò nulla sit, nisi ple-  
thora excessiva aliud suadeat. Præmissis ergò  
evacuantibus, vel omissis, præmissis etiam re-  
liquis remediis antiscorbuticis, nempe ʒ libus,  
in leviori malo lac vel ejus serum, appropriatis  
antiscorbuticis medicatum confert: in gravio-  
ri verò malo juxta vel unà cum lacte pinus, ju-  
niperus cum aromaticis nervinis, cum rore  
marino conveniunt. Imprimis pinus seu abies  
alba & ex hac parata remedia, sunt appropria-  
ta ad paralyfin scorbuticam, per sudores evacuantia &  
curantia. Hinc essentia pini crebrius usurpanda, quæ  
misceri potest cum ana ess. catarrhalis, & propinari à  
gr. 40. l. ʒo. bis vel ter in die: item decocta ex pino,  
& hinc decoctum ligni juniperi, & omnia juniperina,  
& similia commendare soleo; loco quorum etiam  
decocta reliqua lignorum imprimis sassafras & rad.  
chinz, cum fructu usurpantur; quin & antiscorbuti-  
ca cum lacte propinata sunt egregia, quæ ratione pa-  
ralysin scorbuticam contractam, per rad. armoraciz  
decoctum in sero lactis, curavit Barbette in praxi.  
Quibus si accedat spiritus carminativus, item ʒri  
volatilis, vel simplex vel compositus, cum ʒu ca-  
chleariz vel spiritu antiscorbutico, erunt magis ap-  
propriata. Nam ad paralyfin scorbuticam imprimis  
valent tartarea volatilia internè usurpanda, imprimis  
quando scorbutica recrementa nervis atque membra-  
nis jam tum impacta sunt, quæ tolluntur, si singulis  
quaternis diebus sudor per dictam mixturam aliudve  
diaphoreticum moveatur. Spectat huc decoctum ab-  
sintii ab Eugaleno p. 199. laudatum, aut hujus es-  
sentia roisimarini & castorei mixta est conveniens si-  
mula; item electuarium Eugaleni.

Porro nervina, v. g. spiritus liliorum convall.  
ʒ \*ci simplex succinatus, serpillatus, laventulatus,  
essenc.

essent. lignorū succini simpl. & sassafr. ambræ, ac ♂ volatile succini aliaque juxta Eugalenum potentiora antiscorbuticis mixta propinentur. Juxta quæ ulterius specificum cephalicum, ☉ fulminans mistum cum cinabari antimonii, aut ☉ diaphor. Poterii, & ossa microcosmi, in rob juniperi vel alio vehiculo antiscorbutico pro scopo sudorifero, repetito tamen usu, sunt insigniter proficua.

Inter ea, quæ externè conveniunt ad paralyfin scorbuticam, ferè sunt ea, quæ externè circa arthritidem vagam fuerunt laudata, præsertim rad. symphyti majoris & bryoniæ contusæ, coctæ & impositæ, præsertim si tumor durus partis resolutæ adsit. Item pro externa frictione membrorum paralyticorum ~ baccarum juniperi, lumbricorum terrestrium, essentia castorei, &c. sunt optima. Quando ita fricatæ sunt partes, adspargitur commodè ~ tri, qui insinuat se sensim & paralyfin solvit. Juxta hæc imprimis vinacea & infusius ex iis parata, imprimis in paralyfi crurum scorbutica sunt nobilissima; nempe vinaceis collectis & sibi invicem impositis, donec incipiant incalescere, imergatur æger usque ad regionem iliacam. Hujusmodi vinaceorum balnea sicca aliquoties repetita sudorem largum partibus inferunt, & paralyfin scorbuticam solvunt. Si non sufficienter incaluerint, aspergatur ~ balsamum galbani terebinthinat. seu galbanetum Paracelsi, de quo vid. Sennertus Schröderus, & Hartmannus, etiam in paralyfi scorbutica præ reliquis est nobile, quod illinendum est tepidè à radice membri ad posteriora versus; Vel

℞. liq. lumbr. terr. ʒj.

& cochlear. ʒss.

destillat. salvia:

rorismar. ana gutt. jx. M.D.S.

**Eufferlich Dehl zum Schmieren.**

Quod si tumor, ut dixi, cum rigore membri adsit, convenit cataplasma Sennerti l. 3. *Prax. de Scorbuto pag. 639.*

Quibus admodum commendatur fatus siccus seu halitus ex pinguedine anserina, si sc. pinguedine super carbones bene calefacta aliquoties inde suffumigetur quasi & foveatur membrum; est enim penetrans, & in paralyfi scorbutica apud Westphalos usitatum remedium. Aliis in usu est illinire membrum paralyticum oleo lumbricor. ~ estr. & cochleariæ; addendo aliquot guttas. ☉ destillati salviæ, majoranæ, serpilli, roris marini, balsami Peruviani & succini, vel ol. lini destillat. Alii usurpant pinguedinem taxi, vulpis, gallinæ, ciconiæ, castoris, serpentum; emplastrum oxycroceum aut nervinum Vigonis; it. quod Dravvizi de *Scorbuto pag. 175.* describit; quæ tamen oblinendo poros minus conveniunt in scorbuticis; pori enim quantum possibile aperti servantur; Hartmannus aliis irritis ad thermas ablegat, verum poten-

tiores non conveniunt, sed moderatæ saltem, v.g. Embleses & Töplenses, neque fervidæ nimis adhibeantur ob eandem rationem.

### (XI.) CONVULSIONES SCORBUTICÆ.

Subinde etiam convelluntur & tandem contrahuntur membra & universum corpus, ac rigida evadunt, dum corrugantur fibræ musculorum & tendinosæ à se scorbutico, quæ convulsiones comitantur ferè paralyfin scorbuticam; tam miræ sunt interdum & stupendæ, ut ægri ab adstantibus ignaris pro obsessis à dæmone habeantur; qualia vid. exempla in *Partbol. Cerebri Willisii.*

Curantur optimè hujusmodi contracturæ & convulsiones scorbuticæ per vomitoria quæ magnarum virium observantur, quorum loco etiam purgantium usus repetitus convenit, v.g. Electuarium Marburgensium ab Horstio *Cent. Probl. Decad. 10. Quest. 7.* descriptum. Accedunt his antiscorbutica anticonvulsivis seu genus nervosum & cerebrum confortantibus mista, in lacte imprimis usurpanda: sic enim Epilepsia talis hypochondriaca cum lacte, in quo sape Venerus dissolutus fuit, curata observatur. Observatio prostat in M.A.N.C. *Ann. 1. observ. 85. Barbette Praxi.* Cura hæc nihil ferè peculiare habet à suprâ dictis remediis contra arthritidem vagam & paralyfin scorbuticam. Lac præ reliquis hic in usu est, cui adduntur remedia ex castoreo; item cinnab. ʒij. specif. cephalicum, cum ☉ volatili succini & camphora, in vehiculo decocti helenii cum baccis juniperi commodè propinatur v.g. contra Epilepsiam scorbuticam propinavi aliquando cum successu hunc pulverem:

℞. cinab. ʒii. gr. xv.

☉ vol. succini ʒss.

laud. opiat. gr. j.

M. f. Pulv. S.

**Scorbutisch Pulver.**

Cujus vehiculum erat ☉ antiscorbutica Dorncrellii, cum ~u lumbric. ~ estr. & cochleariæ probè imprægnata; Vel

℞. ☉ antiscorb. Dorn.

epilept. Langsi ana ʒij.

~ cochlear. ʒj.

C.C. ʒss.

arcam. duplicat. Myns. ʒij.

cinab. ʒii. ʒj.

syrup. cochlear. essent. ʒj. M.S.

**Scharbocks Träncklein auff etliche mahl.**

Item convenit mixtura ex ~u tri probè rectificato & volatilifato, vel carminativo, cum spiritu cochleariæ & spiritu theriacali camphor. castoreo affusis & invicem in essentiam reductis; vel spiritus ☉ci cum ~tu cochleariæ; aut ☉ci cum calce viva & ~u cochleariæ destillatus affunditur castoreo pro essentia, contra contracturas scorbuticas egregia: item essent. pini cum spiritu

ritu cranii humani mista, addito ~u cochleariæ etiam convenit in contracturis & convulsionibus scorbuticis: Essent. ligni sassafras mista cum essentia fumariz aut pini, addito ~u cochleariæ aut nasturtii Vtici commendatur etiam contra contracturas & convulsiones. In genere usurpantur, quæ ad convulsiones adhibentur, mista cum scorbuticis, & interdum cum opiat. Quibus ad nutum non operantibus, diaphoretica substituantur, & inter hæc decocta lignorum ac radices chinæ, item sceniculi. Sedum vermiculare quid obtineat contra rigiditatem & contracturam membrorum scorbuticam, vid. M. A. N. C. Ann. 6. & Observat. 23. p. 50. internè usurpatum.

Externè usurpantur Væ articulares ad extra, mistæ cum essentia castorei, cum aqua hircundinum cum castoreo, it. V apoplect. cum castoreo; item Vinus. cephalicorum, lil. conv. primulæ veris, lavendulæ, salviæ & similia, una cum castoreo imprægnatus, externè affricatus: item remedia lumbricalia & alia superius jam allegata. Sunt qui recipiunt Ψm, eique affundunt ʒo lini, destillantque ʒo penetrantissimum, quod ad contracturas scorbuticas & paralyfin scorbuticam comendant; oleum enim lini per se destillatum fit adeo penetrans, ut forsitan nullum ʒo ei par sit. Alias ʒo cochleariæ, lumbr. æstr. rutaceum cum ʒo laurino, angelicæ & cumini, etiam externè commodè usurpantur ac unctio fida Valeriolæ, quàm l. 5. observ. 9. describit. Balnea etiam in contracturis scorbuticis, it. in doloribus scorbuticis, imprimis abdominis, sunt egregia. Tale balneum contra contracturas scorbuticas est hoc:

℞. Herb. gentian. cum rad. lbß.  
gran. junip. cum ramis.  
herb. ruta mont. ana lbj.  
agrimon. Mj.

Hæc omnia in nodulo collecta coquantur pro balneo.

Hoc balneum tepidum quotidie per 8. horas repetatur, idque tam diu, donec 40. horæ balneando fuerint consumptæ: sic enim contracturas & convulsiones scorbuticas cessare dicunt. Observetur tamen, quod renovandæ sint species, & non debeat mingi in balneo.

## XII. DYSPNOEA & ASTHMA SCORBUTICUM.

Respiratio difficilis & insultus asthmatici in scorbuto affligentes sæpe extra methodum generalem appropriata urgent, & quidem modò incidentia plus minus aromatica, modo spasmodica prout nimirum hujus symptomatis causa variat: e.g. crocum, cujus extractum Bartholinus Act. Hassniens. P. 1. c. 92. commendat ~m C. C. fuliginis, liq. C. C. luccinatum, castoreata, ~m & flor. Θ\*ci, benzoes, rad. aristolochiæ rotundæ cum decoctis antiscorbuticis; vid. Simon Pauli Quadr. Botan. pag. 22. c. g.

Tom. II.

℞. V flor. rapar. ʒiv.  
antiscorb. Dornier. ʒij.  
~u cochlear. ʒij.  
asthmat.  
Ess. enule.  
croci ana ʒj.  
syr. rad. enul. ʒiß.  
M. S.

Lufft: Sasse auff etliche mahl 2. Löffel voll. In asthma vero merè convulsivo vicio scorbuti Willis. de Scorb. p. 330. & 331. laudano opiato nullum præstantius remedium suspicatur; cui laudanum hystericum aliis appropriatis junctum, substitui potest. Accedunt his clysteres aciores cum diaphoreticis ac diureticis, e.g. asellis, lumbricis, ubi de asthma te convulsivo; & si à sanguine circa præcordia stagnante hic affectus oriatur, V. S. instituatur.

## XIII. VOMITUS SCORBUTICI.

Præterea affligit etiam scorbuticos vomitus contumax, sæpius pertinax nausea cum continuo vomendi conatu & cardialgia, ex irritatione stomachi ab acrimonia Θis scorbutici. Quo in casu, præter vomitoria blanda, quibus purgantia per inferiora, blanda tamen, interdum substitui possunt, conducunt imprimis acrimoniam Θis scorbutici temperantia & præcipitantia; quæ inter eminet, lapilli cancerorum, ebur, corallia præparata, cornu cervi ustum, & similia. Ulterius R̄yri, elixyr proprietatis sine acido, ~Θ\*ci, arcum duplicatum Mynsichthii, flores Θ\*ci & similia, interius cum V is antiscorbuticis assumpta, imò cum opiat interdum miscenda, laudantur: item ~Θis dulcis, aut præscribatur sequens mixtura:

℞. V menth. ʒj. ad ʒiß.  
cinamom. ʒj.  
~u cochlear. ʒij.  
Dulc. ʒj.  
syr. cydonior. ʒiß.  
M. D. S.

## Scorbutisch Magen-Träncklein.

## XIV. DIARRHOEA SCORBUTICA.

Quodsi adsit diarrhœa, forsitan & dysenteria scorbutica, adstringentia non statim adhibenda, utpote quæ lipothymias & maximas præcordiorum angustias excitant: sed loco horum potius medicamenta quælibet ex absinthio, rosæ & mastiche imprimis conducunt; ut v.g. essentia absinthii cum ess. lignorum & ~u cochleariæ, it. ~u cochleariæ mistus cum spiritu mastiches, decoctum lignorum aut ligni Guajaci cum antiscorbuticis & absinthio parata: cum quo simul propinetur ~mastichis, qui provocando sudorem diarrhœam etiam sopit; item liquor Θis Oariz, aut loco hujus à Willisio comendatæ acidulæ.

Quibus præmitti & singulis octiduis reiterari debet evacuatio cum rhabarbaro, additis aromaticis stomachicis. In dysenteria ejusmodi satis diuturna atque enormi Willisius pilulas

(T 16 2)



pilulas ex rhabbaro & vulnerariis singularis efficacia commendavit; in quo casu clysteres ex vulnerariis parati magnum quoque levamen præbent.

### XV. HÆMORRHAGIÆ SCORBUTICÆ.

Hæmorrhagiæ scorbuticis frequenter & per diversa corporis loca contingentes sin immodicæ, mox adstringentium & sanguinem temperantium & incrassantium usum postulant: quod optimè præstant  $\sigma$  alia, & quidem illa, quæ magis  $\sigma$  ina &  $\sigma$  ea, minùs  $\sigma$  rea, sunt, v.g.  $\sigma$  diaphoret.  $\sigma$  le,  $\sigma$  lum  $\sigma$  is, liquor  $\sigma$  is,  $\sigma$  is, & Rantiphthifica D. Michaelis, &c.

### XVI. ATROPHIA SCORBUTICA.

Atrophia scorbutica, sicut modò chylum depravatam, modò M. S. nimis acrem & corruptam, modò spirituum animalium defectum aut crasin eorum viciatam, pro causa agnoscit; ita remedia huic symptomati appropriata variant. Quippe si primarum viarum culpa alimenta non ritè digerantur, digestiva, vomitoria blanda, stomachica aromatica, &c. conveniunt. Aut si chylus laudabilis, vel propter vasa lactea obstructa, vel propter mesenterii & lumbarium glandularum tumores scirrhosos non ritè distribuatur, ita ut fluxus cæliacus superveniat, resolventibus præprimis volatilibus ac acidulis opus est. Quando verò marasmus è sanguinis crasi contingit, lac & lacticia similiaque, quæ copiosum chylum suggerunt, sunt exhibenda. Imo totum negotium in alimentorum succulentorum & evpeptorum usu consistere videtur, quæ antiscorbuticis temperanda, v. g. si lac caprillum cum nasturtio aut cochlearia decoquatur, aut  $\sim$  cochleariæ illi instilletur; item carnis vitulinæ, limacum & ostrearum juscula cum sero lactis & antiscorbuticis præparentur. In genere equidem & in atrophia scorbutica omni, à quacunque causa primarum viarum dependeat, diætæ lactea vulgò commendatur, sed malè; cum stomachus malè constitutus exinde lædatur, magisque debilitetur, & lac corrumpatur, spiritibus verò animalibus, horum anomaliis corrigendis minus conducatur. Diætæ ergo lactea in usum non vocanda, nisi stomachus à sordibus & cruditatibus liberatus, & digestio ejus laudabilis sit. In fine pastus æger semper cochleare unum passularum probè contusarum comedat, superbibendo bonum haustum cerevisiæ.

$\mathcal{R}$ . Elix. propriet. sine acido  $\mathfrak{z}$ iiij.

$\sim$   $\sigma$  ci simpl.  $\mathfrak{z}$ ij. M.D.S.

Scorbutisch Elixier.

De hoc omni manè dentur 40. ad 50. guttulae in vehiculo tepido: à meridie verò bihorio antecenam propinentur  $\mathcal{R}$ æ antiphthificæ, ex saccharo  $\mathfrak{b}$  &  $\sigma$  lo  $\sigma$  is paratæ, 40. guttulae; continuando ad tempus aliquod. Quod si verò spirituum animalium crasi viciata nutritio

in scorbuticis lædatur, iis per nervina volatilia, tam externa quam interna, succurrendum.

### XVII. FEBRES SCORBUTICÆ.

Quotiescunque accidit, ut M. S. scorbutica amittat visciditatem suam, degeneretque per omnes partes in liquorem acrem corrosivum, toties adest in corpore febris scorbutica, quo sensu omnino accedit M. S. fermentatio nimia, dum si partes contrariæ impropportionatæ impetuosè in se invicem agunt. Hæc febris in nostris provinciis profecto est frequentissima, adeò ut hinc nonnulli sibi persuadeant, hecticam febrem penitus esse amissam in pathologia moderna, in ejusque locum surrogatam esse febri scorbuticam.

Signa diagnostica hujus febris sunt omnia ea, quæ per se scorbutum significant: palmarium interim notetur signum, quod in febre hac adsint notabilia circa appetitum vitia: v.g. adest nimius, ut plurimum autem cum vomitu, aut depravatus, ita ut ad omnis generis  $\sigma$  la appetitus feratur: item in febre hac ut plurimum adsunt obstructions alvi contumaces, in habitu corporis videntur maculae lividæ, demumque sudor odorem spargit subacidum, reperiturque in lecto mane copiosum rubrum sabulum, prætereaque adest totius corporis macies.

Signa prognostica sunt: Omnis febris scorbutica est tandem periculosa, imprimis autem ea, quæ comitatur exulcerationes. Hæ namque ut plurimum degenerant in gangrænam, & subsequentem sphacelum.

Febres scorbuticæ curantur ut aliæ, in quibus cujuscunque generis antiscorbutica reliquis medicamentis semper commiscenda, observata tamen sanguinis & reliquorum succorum vitalium crasi, id est, ut respectu hujus nunc acriora, nunc temperatiora adhibeantur. Scorbuto autem, ut tali, præprimis ingravescenti propria est febris erratica cum sudoribus nocturnis, in quo casu præter v  $\sigma$  lum aut canam saltem parciolem præmissis universalibus,  $\sigma$  lia  $\sigma$  ia fixa atque volatilia, quæ cruditates chyli corrigunt, cum antiscorbuticis mixta notabilem usum præstant, utpote sine quibus omnis labor erit frustraneus: v.g. conducunt flores &  $\sim$   $\sigma$  ci simplex aut sassafrasatus, cochleariatus, &c. Arcanum duplicatum est unum ex optimis eorum remediis, cum absorbentibus imprimis sociatū.

$\mathcal{R}$ . Elix. propr. antisc.

Ess. absinth.  $\mathfrak{z}$  sat. ana  $\mathfrak{z}$ ij.

M. D. S.

Scorbutisch Sieber Elixier.

Dosis 30. ad 40. guttas.

$\mathcal{R}$ .  $\sim$  Carminat. de tribus  $\mathfrak{z}$ iiij.

$\sigma$  ci cochlear. sine  $\mathfrak{z}$  par.  $\mathfrak{z}$ ij. M.

$\mathcal{R}$ . arcan. duplicat.  $\mathfrak{z}$ ij.

corall. rubr. præp.

Specif.

*specif stomach. Poterii* ana ℥.

M. f. Pulvis pro 2. dol. bus.

℞. flor. Θ\*ci gr. xv. ad ℥j.

℥ diaph. dial. ℥ss.

M. f. Pulvis detur in 4plo.

℞. Θcentaur. min.

arcan. dupl.

corall. rubr. prepar. ana ℥ss.

Θvol. succin. gr. v. M.

℞. ∇ antiscorbut. Dorner. ℥j.

~Θ\*ci. ℥j.

laud. opiat. gr. ij.

M. D. S.

Scorbutisch Fieber Tranklein auff 1. mal.

℞. ∇ centaur. min.

antiscorb. Dorner. ana ℥j.

~ cochlear.

Θ\*ci ana ℥j.

arcan. dupl.

mag. coral. c. f. c. ana ℥ss.

fyr. scelotyrb. For. ℥vj. ad ℥j.

M. pro aliquot dosibus.

Urgente siti convenit Julepus Timæi in Epist. 237.

Vel ℞. Seri lact. c. succo citri acidul. ℥bj.

Decoct. tamarind. ℥ss.

R flor. bellid. ℥vj.

fyr. extoto citri ℥ij.

~ Oli philosoph. q. s. M.

Serum enim lactis per succum citri acidulatum valde prodest; nec inutilis est, præmissis absorbentibus blandèque laxantibus, potus lactis extra paroxysmum febrium scorbuticarum, si aliquantulum ~Θ\*ci addatur & stomachus ejusque digestio bene se habeat.

#### XVIII. HYDROPS SCORBUTICUS.

Hydrops scorbuticus, si diuturnior habitualis, scorbutus autem gravior fuerit, curari vix potest: qui verò non inveteratus & à causa saltem evidente, v. g. quando à vehementiore purgatione M. S. scorbutica nimis exagitata fuerit, interdum curatur: vitanda autem sunt purgantia fortiora atque frequentiora, humores scorbuticos, ut jam innui, agitantia, & ad hydropem disponentia, & usurpentur blandiora primas vias tantum evacuantia, e. g. Mercurius dulcis cum stimulo appropriato acuatus, aut clysteres aciores, hinc resolventia cum diureticis blandis & antiscorbuticis mixta, utpote quibus solis sine multis evacuationibus hanc hydropis speciem curatam EUGALENUS pag. 244. perhibet. Conducunt ergo millepedes vino infusi, ~Θ\*ci simpl. & compositus, cochleariatus, juniperiatus, elix. juniperinum, R̄i cum ~cochleariæ, it. infunduntur millepedes conquass. cum R̄i, & extractio filtretur.

#### XIX. ERYSIPELAS SCORBUTICA.

Fit subinde, ut scorbuticos invadant erysipelata, levissimaq; occasione quæ recidivant, eaque admodum periculosa, quia facile in

gangrænas aut in ulcera maligna cacoëthea abeunt. Conveniunt ergo internè sudorifera ex antim. diaph. bezoard. minerali aut Kali cum ~ sigillata, & C. C. atque cum ~uor. sambuci in misturam antiscorbuticam usurpanda, & omnia remedia ex sambuco appropriatis mista: sic essentia rob. sambuci cum spiritu cochleariæ mista; it. essentia rob. sambuci cum ess. persicariæ aut essentia fumariz usurpata, item decoctum flor. sambuci in lacte bibulum.

Externè pulveres, in specie Mynsichtii, ad erysipelata conveniunt: it. epithema ad erysipel. Zvvelfteri in Pharm. Reg. pag. 91. quod polychrestum est ad exulcerat. humid. in metu gangrænar.

#### XX. SITIS.

Sitis, quæ subinde graviter affligit scorbuticos, præsertim matutino tempore, optimè decocto radicis chinæ aut liquiritiæ ad imitationem Timæi von Guldenslee/ lib. 3. Epist. 29. p. 237. cedit.

#### XXI. ULCERA SCORBUTICA.

Ulceræ verò scorbuticorum sive per se, sive post erysipelata effloruerint, periculosa sunt: quod si verò fiat, ut partes ulceratæ non sentiant, nec doleant, periculum est, ne immineat gangræna. Contra hæc ulceræ ergo convenit optimè ∇Ψ pro eluendis his ipsis, & applicetur desuper unguentum nicotianæ cum saccharo Saturni; item unguentum diaphoreticum cum succo inspissato beccabungæ mistum, & malaxatum cum oleo nicotianæ. Horstius commendat unguentum de apio, ulcerum horum mundificativum; quin & decoctum Ψx pro eadem intentione commodè usurpatur.

Quod si ulceræ sint pejora, ibi succedaneum sunt decoctum sedi minoris, cui additur aliquantulum de ~uoli; sic enim partes exulceratæ mundificabuntur.

Cum verò non semper scorbutici ferre possint unguenta aut emplastra, præsertim pingua, sic bekommen Jucken und stincket / tunc partes exulceratæ pulveribus inspersis curandæ sunt. Nempe pulvis ex sacch. hi, lacte Dx, olibano, myrrha, croco &is ~ato & similibus. Internè fomitem horum ulcerum subtrahunt ess. lignorum, ess. fumariz, traumatica, item R coralliorum antiscorbutica & similia, sanguinem mundificantia.

#### XXII. TUMORES.

Tumores duri, qui crura subinde affligunt, resolvantur per cataplasma ex rad. consolidæ maj. cui etiam addi possunt radix bryoniæ; absinthii, chelidoni majoris, farina fabarum & lupin. ex quibus in lacte coctis fiat cataplasma imponendum: v. g.

℞. Flor. chamomill. M. ij.

(T t t 3)

rad.

*rad. symphyti maj. ʒjv.*

*bryon. ʒij.*

*medulla pan. albi no. j.*

Coqu. in l. q. lactis ad consist. cataplasmat. Vel etiam cataplasma ex beccabunga & geranio Robertiano locum habet: vid. Wedelius de Compos. Medic. pag. 63. Vel

*ʒ. Empl. diaph. Myns. ʒj.*

*succ. inspissat. rad. symph.*

*beccabung. ana ʒj.*

*malax c. ʒo destill. chamom. f. emplastrum.*

Quod si dolor adsit, tacamahacæ dimidium ad emplastrum diaphoreticum addi potest.

## ARTICULUS VII.

De

*Affectibus Cutaneis.*

MEMBRUM I.

De

SCABIE.

**A**ffectuum cutaneorum, in specie scabiei, origo est simpliciter à vitiosa nutritione depravata partium ipsarum subcutanearum. Causa peccans est fermentum acidum in glandulis intercutaneis, hærens, nunc simpliciter tale, nunc acidum acre seu acido-salsum; hinc enim pruritus, squamulæ, & pustulæ rubræ, interdum pus & sanies; videatur Beckius de Princ. Rerum Natur. & Willis. Pharm. Rat. P. 2. p. 476. adeoque formalitas scabiei consistit in nutritione depravata, quatenus illam ut plurimum corporis contabescencia, interdum pedum tumores, comitantur. Vitiatur autem nutritio partium subcutanearum privata ab acido præternaturali fermentum digestivum impediente, & alimentum partis proximum corrumpente. Acidum istud præternaturale fermentativum oritur l. ex transpiratione insensibili nonnihil impedita, indeque retentis effluviis acido-osis, aliisque similibus; idque subinde ex immunditie ægri, aut quando e. g. pueri, servi, ancillæ, pharmacopœorum aut aromatariorum aliorumque famuli, corpora sua nunc frigori intensissimo exponunt, nunc à frigore recedentes fornacis calori vehementiori sese obijciunt, unde à subitaneis his & sæpius reperitis mutationibus non raro scabiosi fiunt: vel ex ipso vitio nutriti allati, sanguinis nempe & chyli, & sioris aut acrioris; fermenta præternaturalia sub cute hinc inde generantur, unde oritur fermentatio; vel denique frequenter ex contagio fermentativo, e. g. chirothecæ scabiosæ, extrinsecus hausto, spiritum insitum cutis alterante; quod fermentando se multiplicans partium intercutanearum nutrimentum lædit, & in saniem seu ichorem acido-sum convertit, simili modo ac crusta lactea infantum subinde florescit ex vitio lactis nutritis.

Ex his patet: non semper in scabie totam M.S. affectam esse, sed frequentius nutrimen-

tum intercutaneum seu serum nutritium in habitu corporis: unde, quicquid Practici de viscerum intemperie & sanguinis impuritate in omni scabie docent, locum non semper habet; cum à solo sæpe scabiosi contactu vel hujus vestimentorum usu, &c. scabiem contrahamus, ubi præter cutim aliæ partes simul non afficiuntur, quæ tamen si tota M.S. semper inquinata esset, viscera interna etiam inquinaret: accedit & hoc, quod scabies sæpe per sola medicamenta externa curetur. Utut negari non possit etiam interdum ex mala dieta & causis internis, v. g. scorbuto, lue pœa, &c. scabiem excitari, aut contagium, quo serum nutritium in habitu corporis semel affectum, totam M.S. successivè inficere potest, unde phthisis, cachexia, & alia similia mala excitantur. Dividitur vulgò scabies in humidam & siccam; quæ tamen differentia non est essentialis, sed tantum accidentaria, cum pro diversitate corporum plus minus serosorum & sicciorum pustulæ scabiosæ nunc humidiores, nunc sicciores & magis crustosæ, sint. Illæ enim à nutrimento partium subcutanearum magis seroso & magis temperato, adeoque facile corruptibili; hæc verò à nutrimento minus seroso, sed magis balsamico aut & volatile oleoso magis imprægnato oriuntur.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica per se patent: scabies humida & sicca faciliè quoque à se invicem dignosci possunt, dum illa apparet sub forma ulcerculorum, cutaneorum, hæc verò solum saniem exsiccatam & incrustatam repræsentat.

### PROGNOSIS.

Prognosis quod attinet: scabies propter deformitatem & pruritus magis molestum malum, quam periculosum, cum hac affecti pluribus morbis ferè immunes sint, v. g. à variolis, epilepsia, &c. imò ipsa peste, notante Foresto l. 6. Observ. 24. in Schol.

Scabies recens faciliè curatur; inveterata verò Medicis multum faceffit negotii; interdum in impetiginem ac lepram degenerare, & viscera interna inquinare solet.

In senibus contumax magis est, quam in juvenibus, quibus sæpè insanabilis: vid. Fonseca Tom. 2. Conf. 18.

Scabies humida melius curatur, quam sicca; imò vix curari debet, vid. Gabelchoverus C. 6. observat. 75. Malè curata multorum morborum chronicorum, infarctorum & inflammatorum causa existit; unde frequens post malam curationem phthisis.

### CURA.

Curantur cutanea vitia tam per purgantia, quam sudorifera. Externè verò conveniunt, quæ vi absorbendi aut destruendi acidum polent. Conveniunt ergo internè inter purgantia helleborina extract. helleb. nigri & panchym. Crollii, pulveres purgantes cum tantillo antimo-



timonii diaphoretici ad imitationem Comit-  
tis de Warvvick, quibus semper & dulcis ad-  
dendus erit; adeoque optimè pilulæ &ales  
conveniunt, item Calomelanos Turqueti,  
i. e. & dulcis cum scam. Arato, item & vitæ per  
inferiora purgans, de quo vid. Hartmannus  
in *Praxi Chym. cap. 4. §. 1.* In robustioribus  
turb. minerale, & viridis, e. g.

℞. *MP. de xco Querc. l. extr. bellebo-  
ri nigri, l. panchym. Croll. gr. v.  
& dul. gr. xij. ad xv.*

*extr. troch. alhand. gr. j. ad ij. (vel  
loco hujus Scam. Arat. gr. j.)*

cum *Eff. lignor. l. R̄i &iat. l. fumaris,  
f. pilulæ: D. S.*

### Blut-reinigende Pissen.

Vel fiat nodulus pro purificando sanguine in  
genere, simul & alterativus & laxativus, qui-  
bus plantæ amaricantes, scorbuticæ & san-  
guinem purificantes addendæ erunt v. g. ra-  
dix enulæ, polypodii, scæniculi, hellebori ni-  
gri, rhabbari, armoraciæ, &c. fumaris, car-  
duus benedictus, veronica, scordium, absin-  
thium, flores acaciæ, bellidis, &c.

℞. *Herb. rec. absinth.*

*cochlear.*

*fumar. 2 M. j.*

*flor. bellid.*

*cichor.*

*cent. min. ana p. ij.*

*fol. fenn. f. f.*

*rad. rec. armorac.*

*fenic.*

*enula ana 3vj.*

*belleb. nigri crud. 3ß.*

*rhabarb. el. 3iij.*

*galang.*

*zedoar.*

*cinamom. ana 3j.*

*pass. min. 3j.*

*sem. anisi.*

*fenic.*

*nasturt. ana 3ij.*

⊕ 3iij.

Incisa & contus. includ. nodulo. S.

### Blut-reinigender Püschel.

Vel tempore vernali:

℞. *Flor. acac. rec. M. j.*

*seri lact. bubul. l. caprill. Mens. ß.*

Coqu. leniter in vase clauso.

De colatura bibatur manè dimidia pars, per  
7. ad 14. continuando, & singulo manè ex  
florib. recentibus coquendo.

De usu seri lactis in scabie vid. Amatus Lu-  
sitani *Cent. 2. Cur. 74.* & lactis caprilli, Pla-  
terus *pag. 542. & 543. l. 2. Observat.*

Inter sudorifera conveniunt ligna, corti-  
ces etiam, in specie ligni sancti, eorum nem-  
pe decocta, essentia & ~, uti etiam partes  
animalium duræ philosophicè calcinatæ, e. g.  
C. C. f. Δe, ebur sine Δe &c. ♂ia fixa & ♂ia

volatilia quæcunque, in specie verò ♂ vola-  
tile viperarum, & omnia ex viperis parata re-  
media: quibus ex regno minerali additur  
♂ii, cinabaris ♂ii, & diaphoreticum, aliaque  
fixa ♂alia; nunc sociata cum aliis, nunc per  
se cum rob baccarum sambuci; item Ræ ♂ia-  
les, vid. M. A. N. C. *Ann. 6. Observ. 217.*

In contumacioribus malis præsertim vipe-  
rina, aliaque quæ sanguinem purificant, con-  
ducunt; & aliis irritis salivatio &alis institu-  
enda, sicut in pessimo rerum statu, adeoq;  
in ipsis leprosis; tandem ad ∞ fixum con-  
fugiendum erit.

Quoad sudoriferorum formulas:

℞. *Δa fumar. 3iß.*

*& diaphor. 3j.*

*⊕ volat. viperar. gr. vj.*

*fyr. de succo scabios. 3vj.*

M. pro haustulo sudorifero: S.

### Schweiß-Träncklein auff einmahl.

℞. *Δa flor. samb. 3j.*

*~theriac. camph. 3ß.*

*♂ii diaph. gr. xv.*

*⊕ volat. viper. 3ß.*

*fyr. cort. aurant. 3ß. M.*

℞. *♂ii diaph.*

*⊕ absinth. ana 3ß.*

*volat. C. C. gr. v. vel vj. M.*

℞. *C. C. f. Δe 3j.*

*♂ii diaph. 3ß.*

*⊕ vol. viperin. gr. vj.*

*laud. ferment. gr. j. M.*

℞. *C. C. f. Δe.*

*flor. Δis ana 3ß.*

*⊕ is card. ben. gr. xij. M.*

℞. *Extr. bals. Δis p. iij.*

*♂ii diaph. p. j.*

*C. C. f. Δe p. ß. M.*

De quo omni manè, quantum cuspis cultelli  
capit, sumatur; vesperi verò duabus horis  
ante cænam elixyr proprietatis, sine acido,  
l. elixyr cachecticum.

℞. *Rob. Samb. l. theriac. 3j.*

*pulv. serpent. calcin. l. non calcin. 3j.*

*⊕ xi 3ß.*

*c. f. q. Syr. cort. aur. f. Bolus.*

D. S.

### Blut-reinigende Latwerge auff einmahl.

℞. *Conserv. fumar. 3j.*

*pulvis viperin. 3ß. ad 3ij.*

*c. fyr. rosar. sol. f. Bolus.*

℞. *Bals. Δis terebinth. 3ij.*

*succinat. 3j.*

M. D. S.

### Blut-reinigender Balsam.

Dosis x. ad xv. guttulas manè.

Externè conveniunt remedia ex Saturno,  
Mercurio, Δe, ♂i, calce viva, item saccha-  
rum bi, cerussa, minium, cosmeticum Cla-  
vii ex bismutho paratum, seu magisterium  
marcasitæ, vid. Schræderus in *Pharmac. &c*  
Begvi-

Begvinus in *Tyrocin. chymico*, lap. calaminaris, sperma ranarum, decoctum cosmeticum Mynsichthii, in *armament. Chym.* pag. 377. Mercurius dulcis, arcanum corallinum, liquor Mercurii saccharatus Mynsichthii l. a. pag. 443. essentia benzoës, oleum nicotianæ, unguentum de liquiritia, de nicotiana, unguentum album camphoratum, de lithargyrio, unguentum enulatum, unguentum dia-Saturni Zvelfferi enulatum, unguentum extutia, dia-pompholygos, emplastrum de ranis cum Mercurio, &c. quæ mirificè acidum temperant, absorbent, & mitigant.

In usu tamen  $\Delta$ is &  $\Xi$ ii. nec non unguentorum Saturninorum observandum, ut pori corporis probè aperti maneant, ne fermentum, externo illitu repulsum totam M.S. inficiat, pro quo scopo  $\Delta$ i semper  $\Theta$ q vel aliud alcali adjungendum: e. g. sit sequens ungv. ad scabiem mihi perquam familiare.

$\Re$ . Ungu. enulat. vel diapomphol. vel album campb. vel de liquirit. 3vj. ad 3j.

(vel ungu. enul. & alb. campb. ana p. xqu.)

flor.  $\Delta$ is 3ij. l. 3ij.

$\Theta$ q 3j. vel 3iſ. (vel  $\circ$ q p. d. 3ij.)

c. f. q. Ol. hyperic. l. nicot. f. linimentum.

D. S.

#### Reinigende Salbe.

addi huic pro lubitu & gratia odoris possunt bals. Peruv. 3ß.

Ol. ligni Rhod. gutt. vj.

Hoc ipso illinantur saltem junctura brachiorum & pedum, v. g. articulatio tali, genuum, carpi, & interstitia digitorum, vesperi sub introitum lecti, & corpus bene tectum conservetur: manè manus possunt ablui  $\square$  propria calidâ, relicto in pedibus linimento, reiteretur hoc ipsum tamdiu, donec malum evanescat. Postmodum ubi evanuerit scabies, ut vestigia rubra deleantur, abluantur manè & vesperi cum  $\nabla$ xx. Vel

$\Re$ . Ungu. de liquirit. vel dia-bni Zvelf. 3vj.

Ol. laurin. 3ij.

pulv. bacc. laur.

flor.  $\Delta$ is l.  $\Delta$ is comm. pulveris. 3 3ij.

$\Theta$ q 3j.

c. f. q. Ol. hyperic. f. linimentum.

Ubi contumacius fuerit malum, ad glia fiat accessus.

$\Re$ . Ungu. nicotian. vel pomat. 3ß. ad 3vj.

flor.  $\Delta$ is 3ij.

$\Xi$ ii dulc. 3j.

c.  $\circ$  nicotian. vel jasmint f. linimentum.

Hæc ipsa præter scabiem etiam in pruritu partium, in serpigine, in den Schwinden/it. in lichenibus & similibus cutaneis corporis affectibus, commodissimè usurpari possunt. Augetur vel imminuitur  $\Theta$ q quandoque propter nimiam acredinem. Item

$\Re$ . Unguent. rosat. 3ij.

$\Xi$ ii 3ij.

M. pro linimento.

Quod etiam externè in gravioribus malis usurpari potest.

$\Re$ . Ol.  $\Xi$ i p. d. 3ij.

amygdal. dulc. q. s.

M. pro linimento externo.

Facit etiam huc decoctum  $\Psi$ x polychreston in cutaneis affectibus pro partium affectarum ablutione:

$\Re$ .  $\nabla$   $\Psi$ x lb. ij.

$\Delta$ is comm. pulver. 3ij.

Ebulliant invicem aliquandiu:

Colaturæ adde

$\nabla$ a rosar. 3iv.

M. D. S.

#### Reinigend Wasser.

Hac aqua eluantur membra scabiosa, item genuum & cubiti articulationes: permittantur sponte siccare, & evanescet scabies & maculæ atque pustulæ ab hac relicte; & convenit hæc lotio etiam, si partes scabie affectæ tumore œdematoso tumeant. Præsertim aqua subsequens est egregiæ virtutis, sc.

$\Re$ . Decoct.  $\Psi$ x lbj. ad lbjss.

$\Xi$ ii dulc. 3j. l. 3ij. ad 3ij.

$\sim$ theriac. camphor. 3j.

M. pro lotionem partium externarum in

scabie ferina, quam sola repetita lotio curat. Odoris gratiâ  $\nabla$ rosarum, interdum etiam sacchari Saturni 3iſ. vel 3j. addi possunt: loco cujus etiam

$\Re$ .  $\Xi$ ii viv. purif. qu. v. e. g. 3iv.

Ebulliant in lbjv.  $\nabla$ a simpl. aliquandiu: Coletur.

Quâ solâ partes abluendo, præsertim manus, scabies evanescit.

Qui verò potentiùs volunt, addunt  $\Xi$  dulc. 3j. vel 3iſ. ad 3ij. & ita calidè utuntur.

Secretum in omni scabie est  $\nabla$  destillata stercoris humani, lavetur locus, exertissimum est: Item die gebrauchte Berberlauge warm gemacht / die Hände damit gewaschen / felici cum successu vidi usurpatam in scabie ferina puellæ, internè adhibendo simul essent. viperarum. Denique ungu. auratum, elegans in alopecia leprosa, quod vid. in M.A.N.C. Ann. 6. Append. p. 179 & hic non inelegans erit.

Sunt qui in remediis externis contra scabiem, item in aliis similibus pro usu cosmetico non rarò adhibent  $\Xi$ -atum, sed pessimo cum consilio: nam præter alia mala incautius adhibitus dolorem inflammatorium, pustulas, & vesicas ingentes, acrimoniâ suâ corrosivâ acidâ excitat; vid. M.A.N.C. Ann. 8. observ. 77. in quo casu optimus est fons lactis tepidi, cessantibus postmodum doloribus, convenientissimum est adhibere  $\nabla$ m  $\Psi$ x. Aliquando Studiosus ex liquore Mercurio imprægnato contra scabiem ex afflictione ejus dolorem & tumorem brachii & manus à cubito ad

ad digitos usque incurrit cum crudelissimo dolore; unde præscripti:

℞.  $\nabla$  a  $\Psi$  a lbj.

$\nabla$  3j.

cerus. 3iij.

M.D.S.

Lindernder Umschlag.

Applicabatur calidè, & optimè contulit.

In casibus pertinacioribus etiam cingulum ple concedendum, de quo vid. Bartholinus C. 3. Hist. 79. cui Fonseca L. 2. Conf. 18. suffitum cinabarinum addit, probè tamen prius purgato & contra frigus præmunito vel sub sudore detento corpore: effectus enim ex Mercurialium abusu satis deploratos experientia testatur, quos etiam ab aliis externis intempestivè applicatis contigisse Medicorum observationes cum quotidiana experientia testantur: exemplum ab ungu. ex arsenico videbitis in Amato Lusitano Cent. 2. Cur. 33. & ab ungu. ex litharg. in Zacuto Lusitano l. 1. Præcos.

Notandum quoque, quòd in scabie critica nulla remedia externa applicanda, sed solummodò remediis internis diaphoreticis insistendum esse. In scabie autem forsan retro-pulsa, & inde natis gravibus symptomatibus, optimè conveniunt viperina, ess. viperarum, & ejus ad 3j. cum 3j. syr. fumariz.

Tandem etiam in usu sunt balnea pro delenda scabie, quæ etiam in scabie critica concedi possunt, ex chamomilla, malva, melilotò, hyperico, nicotiana, scabiosa, fumaria, persicaria, lapatho acuto, enula, saponaria, parietaria & similibus appropriatis: e.g.

℞. Herb. lapathi ac. M. jv.

nicot.

scabios. ana M. ij.

rad. lapathi ac. 3iij.

enula 3ij.

bryon. 3j.

℞is crud. 3vj.

$\Psi$  a lbj.

Incisa & contusa D. S.

Species zum Baden.

Coqu. in s. q.  $\nabla$  moderato igne pro balneo. Prius sudet æger c. C.C. sine  $\nabla$  in rob sambuci, vel cum essentia lignorum, dein insideat huic, corpus fricando & à sordibus repurgando; post cum linimento appropriato illinendo. Item:

℞. Herb. fumar.

nicotian.

persicar.

scabios. ana M. ij.

rad. enula.

lap. acuti ana 3ij.

bryon. 3j.

pulv. ℞is lbj.

℞i.

$\Psi$  ana lbj.

Concisa & contusa S. ut suprà.

Tom. II.

Coqu. in  $\nabla$  dule. cum ana lixivii acuata, moderato & benè agitandò. F. balneum.

Vid. Horstius pag. 325. & 327. Item:

℞. Herb. lapathi ac. M. jv.

parietar.

saponar. ana M. ij.

rad lapathi 3vj.

bryon. 3iij.

$\Delta$  is vivi 3ij.

$\Psi$  a rec. lbj. M.D.S.

Species zum Bade.

Coquantur in  $\nabla$  simpl. addendo parum lixivii.

## MEMBRUM II.

De

Pruritu.

**P**Ruritus est scabiei symptoma individuum, & futuræ signum certissimum.

C A U S A E.

Causa pruritus excitans est serum acidofalsum cujus acrimonia à causa scabiei in hoc differt, quod illa tenuior & subtilior sit, atque per minima magis inter cuticulam & cutim se insinuet. Oritur tamen etiam interdum à causa externa, ab urticarum & formicarum contactu, culicum & pediculorum, nec non siro-num mortu, item à ligatura strictiore in fracturis & luxationibus.

## D I A G N O S I S.

Diagnosi opus non habet, cum malum hoc somnum & alia negotia maximè impediat.

## P R O G N O S I S.

In Prognosi nihil peculiare occurrit, nisi quod pruritu diutius vexati scabie tandem afficiantur.

In decrepitis incurabilis est: vid. Valescus de Taranta in Chirurg.

## C U R A.

In Cura, si malum sit à causa interna, & quidem totum corpus affligat, conveniunt acrimoniam temperantia. Ante omnia verò purgetur corpus Mercurio dulci, e.g.

℞. Conf. rosar. 3j.

℞is dule. gr. xv.

res. jalapp. gr. vj.

scamm.  $\Delta$  at. gr. j. l. ij.

c. syr. fumar. f. Bolus. S.

## Blut-reinigender Zucker.

Non minus etiam conducunt noduli purgantes, & omnia purgantia jam membro præced. in scabie laudata.

Purgato sic corpore, in plethoricis V.S. institui potest: post sudorifera temperata etiam acrimoniam & sam absorbentia, in scabie pariter jam laudata, imprimis ex antimonio diaphoretico Martiali, C.C. sine igne, cinnabari antimonii, &c. præscribenda. Ubi verò pars tantum una vel altera pruritu molestat, una cum sudoriferis jam dictis conveniunt omnia externa in scabie laudata. Vel fiat linimentum Rondeletii:

(Uuu)

℞. rad.



℞. rad. lapath. ac.

belen. ana ℥j.

Decoqu. in  $\dagger$  ad mollitiem:

per setaceum trajectis adde:

℞. irini ℥iij.

Θis com. ℥j.

myrrha ℥iij.

lythargyr. ℥iij.

cera parum.

F. l. a. Linimentum.

In malo pertinaciori dictis aliquid  $\mathfrak{g}$ ii dulcis addi potest, imprimis si malum oriatur à sironibus, in quo casu simul decoct. colocynthidis applicari solet.

Si à ligaturis diuturnioribus aut strictioribus, pars tantum lavetur cum  $\nabla$  tepida: si à formicis vel urticis, præter frictionem cum gleba  $\nabla$  recenti convenit lac tepidum, decoctum malvæ,  $\nabla$  sperm. ranarum, vel unguentum diapompholigos, de tutia, &c. quibus sacch. Saturni addendum.

### MEMBRUM III.

De

Lepra.

**L**eporam olim abominabilem affectum fuisse, tam ex S. S. quam aliis autoribus constat, nostro autem seculo cum scorbutus & lues Venerea ubique ferè se insinuent, lepra ipsa est rarissima, cum vel sub nomine luis Venereæ, vel ipsius scorbuti lateat. Imprimis convenit cum scorbuto confirmato. Alias etiam pfora dicitur, & elephantiasis Græcorum; ab elephantiasi Arabum in hoc differt, quod hæc particularis tantum, & senes vino liberalius indulgentes plerumque invadens, affectus quidam sit, pedum nempe tumor rubicundus, lividus seu nigricans, cum ulceribus varicosis, è quibus serum acre limpidum effluit: interdum etiam solæ crustæ furfuraceæ totos pedes occupant; illa verò universalis. Vocatur elephantiasis, quia hac ipsa affectis tumida cutis, rugosa & alpera, elephantum instar, apparet. Aliàs etiam vocatur Satyrasmus; vel quia nares & labia tumida, aures tabidæ, genæ rubentes, & in fronte excrecentiæ quædam instar cornuum hinc inde protuberant, quali facie satyri pinguntur; vel quod leprosi in principio morbi maximè libidinosi dicantur. Item leonthisis dicitur, vel quod leprosi vultum terribilem & frontem rugosam leonum instar acquirant; vel quod eorum anhelitus & excrementa leonem huiusque excrementa oleant. Nihil est aliud, quam summus & contumacissimus scabiei scorbuticæ gradus, unde scabies & lepra ab Ægineta conjunctim tractantur; in lepra tamen longè major & habitualis succi nutritii corruptio est, quam in scabie, adeò ut, quando in hac cutis instar furfuris separatur & decedit, hæc in lepra squamarum piscium instar decadat, quatenus in hac non tantum cutis, sed etiam sub-

iacentes partes carnosæ exulcerantur: unde & scabies ferina & inveterata in lepram degenerare solet.

### CAUSÆ.

Causa lepræ cum scabiei causa communis est, longè tamen gravior: Sedo nempe feri muriatica & corrosiva, in specie acido-salsa. Veteres bilem atram, singulari malignitate præditam accusant, ratione cujus quidam lepram cancerum universalem non ineptè dicunt, quatenus eadem ferè causa cum cancro particulari concipi potest.

### DIAGNOSIS.

Circa lepræ diagnosis Medicus sit cautus & prudens, ne signo uni ac soli credat, sed iudicium dirigat ad signa plura, tam propria quam communia; adeoque secundum illa quidem iudicet, secundum hæc verò maximam partem. Colliguntur autem signa hæc vel ab antecedentibus, vel conjunctis. Quoad antecedentia: Medicus imprimis investiget ex ægri parentibus, consanguineis & agnatis, an horum aliquis lepra vel cachexia congeneri enormiore laborarit: cum contagium hoc interdum ad tertiam & quartam usque generationem propagari soleat: deinde attendatur vitæ genus, an æger aut parentum aut consanguineorum quidam cum leprosis degerit: quo victu & quali diætâ utatur? an quartana, mania, aliisque similibus morbis olim laborarit? an hæmorrhoides, menses vel alia solennis quædam evacuatio, ipsi aliquandiu suppressa fuerit, aut adhuc supprimatur? ex quibus conjecturæ artificiales formari possunt, ægrum ad lepram esse dispositum, adeo ut, licet jam nondum leprosus, lepra tamen metuenda sit.

Quod signa concomitantia attinet; hæc sunt vel interna vel externa. Interna sunt in principio ructus crebriores & molesti, cruditas acida vel nidorosa, alvus obstructa: quibus progressu temporis superveniunt oris & faucium siccitas, sitis intensa, sudor graveolens & foetidus, urina subjugalis, cui si juxta Levinum Lemnium calx hni injiciatur, hæc fundum ejus non petat, sed supernatet; sunt libidinosi: sanguis venæsectione educus solet esse foetidus, crassus viscosus & unctuosus, adustus, nigrescens aut lividus, sœculentus & pingui quasi crusta obductus, qui digitis aut manu agitatus arenæ instar stridet & tactu asper apparet; per pannum verò colatus arenulas, granula & nodos quasi post se relinquit; grana aliquot Θis superinjecta mox dissolvit, ab  $\nabla$ a verò non adeò facile diluitur, sed potius cum hac instar gelatinæ congelatur: vid. Marcellus Donatus *Histor. Mirab. lib. 1. cap. 4.* Pulsus præterea frequens est & debilis, respiratio difficilis, & foetida, ut in phthisi, dyspnœa & asthma; vox clangosa & rauca, & interdum ægri per nares

nares quasi videntur loqui. Accedit his in malo confirmato segnitie & lassitudo totius corporis, facilis in frigidatio, abolitus tactus, remanente tamen motu, vid. Paræus l. 19. cap. 7. utut ægri interdum pruritum formicarum repentium adinstar percipiant: somnus est gravis cum insomniis turbulentis & incubo, ac si cor eorum claudatur ac comprimatur; imò tandem pusillanimitas quædam supervenire solet.

Inter signa externa apparet cutis, nunc ad colorem lividum & nigrum vergens, nunc flavescens & ex rubro nigricans; vid. Valerola l. 6. Enarrat. 5. Aëri exposita mox corrugatur, exasperatur & infrigescit; tota apparet unctiosa, ut ∇ ipsi inspersa vix hæreat, sensim crassescit, rugosa & asperior redditur; fursure, nunc purpureo, nunc albicante, ac si calce incrustata esset, imprimis in facie aspersa videtur, multisq; nodositatebus, tuberculis mobilibus & indolentibus, potissimum pone aures, circa frontem, mentum & artus, defœdatur, & morphæa, impetigine & scabie sicca pertinaci, aliisque pustulis afficitur; vid. Hildanus Epist. 24. Unde etiam continuus (& continuæ exinde ortæ vigiliæ,) pruritus, ac si acubus pungantur, aut urtica percussi essent, aut vermibus roderentur, leprosos maxime urget; & dum partes cutaneas unguibus scāpunt, paucissima saltem aut nulla materia, neque serosa neque purulenta, promanat, partesque cutaneæ erosæ mox exsiccantur, nec crusta quadam obducuntur: cum his simul observatur capillorum defluvium superciliorum; pilisque veris interdum parvis, lanuginis instar, succedunt; frons est rugosa & tuberosa, aures tensæ, earumque pinnae tumidæ, vid. Hildanus l. 4. supercilia sunt elevata & callosa, & pilis aut destituuntur, aut si evellantur, aliquid cutis & carnis in radice hæret: oculi juxta Guidonem de Cauliaco fiunt rotundi, rubicundi, scintillantes & lachryman-tes, qui venas tumidas & intra angulos tubercula grandinosa, aut juxta Hildanum l. 4. in angulo majore pelliculam acquirunt: narium extrema dilatantur, superior pars constrigitur & coarctatur, in medio cartilaginis corrosio apparet una cum ozænis, fœtore, polypo, respirationis per nares interceptione, & copiosa sternutatione; nec non palati atque uvulæ erosionem: labia cum facie pallent, crassa, dura, nigricantia, livida, & fissa comparent; in ore & faucibus hinc inde observantur tubercula flavescencia & sublivida, lingua tumet, nigrescit & finditur, cujus venæ inflantur & varicosæ evadunt cum tuberculis grandinosis & durioribus albis, viridibus vel lividis: sicuti etiam gingivæ præter modum pallent, tument & rubent, asperæ & corrosæ apparent: saliva maxime est viscida & quasi biliosa: mammae sunt duræ & tument cum venis varicosis: artus non solum marcescunt,

sed etiam in pedum plantis & digitorum interstitiis, nec non in manibus, propè cubitum, aliisque artuum locis, fissura & ulcera callosa, prætumida, & ad levissimum contactum cruenta, ut plurimum tamen indolentia, deprehenduntur, manuum muscoli, maxime pollicis & indicis, consumpti sunt; ipsique manuum ac pedum digiti frigus & dormitationem, & quasi quandam sensus privationem patiuntur; articuli horum sunt nodosi & distorti, ungues verò lividi, nigri, incurvi & fissi.

### PROGNOSIS.

Lepra inveterata incurabilis est: de incipiente verò, à mala diætâ aut contagio orto, per diætâ accuratiorē & remediorum generosorum diuturniorem usum aliqua spes adhuc affulget; sicuti lepræ incipientis sanatæ exempla videbitis apud Aretæum l. 4. de sign. & caus. morb. cap. 12. Galenum Iagog. cap. 12. & Horstium 7. Observ. 18. & 21. utut forsân rariora sint. Cont. Laurentius de Lepra 18. & Palmarius de Lepra c. 4.

Sanguis in lepra fœtidus & nigrescens: item serpigo & impetigo in manuum ac pedum digitis; cum pilis parvis ascendentibus, malum signum sunt.

### CURA.

In Cura sanguis purificetur, tam per evacuantia sudorifera, & alterantia scorbutica.

Quoad purgantia; propinentur primò miltiora, hinc potentiora & generosiora, qualia supra de lue Venerea & scabie fuerunt proposita.

Purgantibus succedunt sudorifera, quæ inter primum locum tenent viperæ, quas commendat Aretæus, l. 4. & Galenus l. 11. de simpl. Med. Facult. cap. 1. quarum quidem virtutem in dubium vocant Eraſtus 4. Diss. contra Paracels. Zacutus Lusitanus l. 1. de Med. Princ. Hist. 5. & Palmarius de Elephant. c. 9. Commendantur autem theriaca benedicta viperina, pulvis ess. & ☉ volatile viperarum, ☉ volatile cornu cervi, ☉ ❄️, ☉ volatile & Q. E. sanguinis humani, R ❄️, coralliorum, ❄️ diaphoret. ☉ le, ☉ ❄️ ☉ datum, ubi remedia aliàs usitata & vulgaria non valent, tandem ad arsenicum fixum contugendum est, quo mediante Doctor Rhefeld leprosum quendam restituit, præmissis digestivis & laxativis per alvum; nempe dedit sequentia:

℞. Matr. perlar. calc. ℥ij.

☉ is fumar. ℥j.

M. f. Pulvis pro 2. dosibus.

℞. ❄️ vita gr. jv.

cum theriaca fecit Bolum, S.

Purgier-Zucker.

℞. Recrement. wvar. Weintrostter. qu. v.

Redigantur calcinando in cineres, è quibus more solito f. lixivium, ad dimidium porro incoquendum:

(Uuu 2)

℞. Hu-

℞. Hujus lixiv. Mens. jv.  
arsenic. albiss. ℥ij.

Coqu. in olla per horam unam aut alteram, semper lignea spatula movendo, donec ferè sit consumium lixivium; sic fiet massa spongiosa; tunc novum affundatur lixivium, & coctio repetatur; sic mox arsenicum erit resolutum, quæ solutio decantetur in aliud vas purum, in quo ratio addatur sequens:

℞. Ceruss. ℥ij.

✱ q. l. ad solutionem, quæ filtretur.

Hæc solutione tantum præcipitetur, quantum possibile, edulcoretur & exsicceetur.

Exhibuit doses 8. per tot dies, incipiendo à gr. ij. singula aurora gr. j. augendo, & ad 3℥. assumendo. Potest sumi in theriaca in forma boli, vel cum antimonio diaphoretico & paucosacchari in juscule vel cerevisia calida, bono semper sequente sudore.

Post balnea & scarificationes simul aliquoties adhibitas squamæ deciderunt, & ita æger sanitati fuit restitutus. Alterantia denique sunt vel interna vel externa; inter interna eminentia, quæ de scabie dixi, & omnia absorbentia, uti sunt corallia, conchyliæ, lapilli cancerorum, & diaphoreticum simplex & compositum, aliiq; hujusmodi pulveres: quibus & plantæ hepaticæ & spleneticæ adjungi possunt, e. g. fumaria, eupatorium, chelidonium, de quo vid. Hæfenrefferus de *Affectibus cutis* p. 128. Scorzonera seu viperaria, quæ à Zacuto Lusitano laudatur; R Qi simplex & giata. De carne asini pulsi comesta vid. Bartholinus C. 6. *Histor.* 31. utut carnis hujus esum Amatus Lusitanus C. 2. *Cur.* 34. inter causas lepræ externas referat; milvii caput combustum laudatur in Sennerto *Pr. c.* 5. pag. 177. sanguis leporis & cinis lepor. it. fel & sanguis accipitris. vid. Hæfenrefferus *l. a.* pag. 130.

Externè profunt balnea in scabie commendata, aut juxta Rulandum *cap.* 4. pag. 411. ex plantagine, pitis & foliis quercus, & quod Weckerus in *Antidot. Special.* l. 2. pag. 604. describit, unguentum ex succo lapathi majoris Hæfenrefferi, unguentum medicamentosum Mynsichtii, & 30. Qis Rulandi, de quo *l. a.* Quidam thermas commendant, quibus tamen contradicit Hæfenrefferus *l. a.* pag. 127. & Zacutus Lusitanus loco allegato.

#### MEMBRUM IV.

De  
*Elephantiasi Arabum.*

**E**lephantiasis Arabum ejusque causæ, it. quomodo ab Elephantiasi Græcorum seu lepra differat? jam dixi. Effectus ut plurimum est criticus, ideò in cura cavendum ab externis repellentibus, ne sero acriore affluente intempestivè cohibito, & transpiratione insensibili impedita, per metastasin ejus asthma-

ta, catarrhus suffocativus, peripnevmonia, hydrops pectoris, lethargus, similiaque mala, quæ aliàs à scabie retropulsa aut ulceribus crurum intempestivè occlusis oriri solent, excitentur. C U R A.

In cura feri acrimonia temperetur, ejusque colluvies per purgantia evacuetur, pro quo scopo confert & dulcis, jalappa, & omnia in scabie laudata. Item

℞. HB. fumar.

scordii.

nummular. rec. 3 M. j.

flor. hyper. Miß.

rad. enul.

caryophyllat. 3vj.

cort. ligni guajaci 3j.

sem. anisi.

fanic. 3iij.

Incisa & contusa includantur nodulo:

D. S.

#### Blut-reinigender Püschel.

Affundantur vini Rhenani Mens. ij. de quo manè & à meridie bonus haustus capiatur.

Quod si nodulus hic laxare debeat, folia sennæ, helleborus niger & colocynthis addi possunt.

Externè conveniunt absorbentia Saturnina Martialia & Venerea, unde applicari potest emplastrum griseum seu de lapide calaminari, vel emplastrum de spermate ranarum camphoratum Cnöffelii in *Append. M. A. N. C. Anni 6. & 7. Tit. 25. pag.* 186. omniaque in *Dissertat. de usu & abusu præcipitant. cap.* 3. §. 2. allegata; item emplastrum de alcalib. Tacchenii in *Morb. Princ. pag.* 117. vel ad hujus imitationem concinnatum emplastrum mirabile Meibomii sequens:

℞. Ol. Olivæ. ℥ij.

calefacto adde

Sapon. Venet. ℥ss.

cerussa abla pulveris.

minii cribr. 3 ℥ij.

Coquantur lento Δc in emplastri consistentiam, circa finem addendo

Camphor. 3j.

Convenit quoque emplastrum binum polychrestum, item emplastrum nigrum Helmontii.

Pedes autem simul fasciis involvantur, incipiendo à talis usque ad genua.

Quod si cum inflammatione erysipelacea juncta, quod non rarò accidit, à dictis emplastris abstinendum, donec inflammatio hæc debitis remediis, discussa fuerit.

#### MEMBRUM V.

De

*Serpigine & Lychene.*

**A**ffectus hi maximè sibi sunt cognati, & gradu tantum differunt. In lychene enim, Germ. *Schwinden / Flechten / Zittermaße* / cutis est aspera cum pustulis hinc inde eroden-



erodentibus, crustis furfuraceis, & cum summo pruritu ad partes vicinas serpentibus; in serpigine verò, vulgò in dem **Burm** oder **schlaffenden Wurme**/ asperitati & pustulis cutis dolor & ardor conjuncti sunt; unde etiam Celso ignis sacer vocatur, & serpendo pariter se extendit, hinc etiam vulgò **die frieschende Raude** dicitur. Pustulæ hæc, si summitatem tantum cutis erodant, herpes miliaris; si verò cutis tantum profundiora excendant, papula fera seu herpes exedens, item **ἰσχυρὸς** vocantur. Bontius quidem *de Medic. Indor. Observ.* 19. serpiginem cum lychene confundit, dum serpiginem per pruritum definit. Verum licet in lychene nulla symptomata graviora conjuncta sint, certum tamen est, quod in serpigine major acrimonia, adeoque major sanguinis & feri dyscrasia peccet.

**C A U S A.**

Causa serpiginis & lychenis est eadem, ac de scabie dixi, serum nempe acido-salsum circa glandulas subcutaneas effusum; utur hujus acrimonia ab ea, quæ in scabie peccat, specificè differat, adeoque pro varia cutis textura nunc scabies, nunc serpigo & lychen oriatur.

**P R O G N O S I S.**

Serpigo & lychen sunt sine periculo.

Lychen facillè curatur; difficulter autem serpigo.

Imò si totum corpus ab hac defœdatur, lethalis esse solet, dum simili quoque ratione interiora & exteriora eroduntur.

**C U R A.**

In serpigine & lychene M. S. purificanda & alteranda; unde etiam eadem methodo per purgantia, in specie pilulas Mercuriales, & sudorifera instituenda, ac in scabie dictum fuit; quibus etiam in casibus desperatis salivatio adjungenda; quo etiam fonticuli pertinent.

Quoad alterantia præter supra dicta in scabie, in serpigine conducunt hina, in specie SS. hni, bals. hni, Rantiphthif. D. Michaëlis. Quoad externa, sunt hæc vel blandiora, vel magis potentiora. Inter blanda laudantur in serpigine & lychene  $\nabla$  sperm. ranarum, flor. omnium,  $\Psi$ æ vel solitaria, vel cum saccharo hi mista: ovorum; nicotiana, ceræ, radix lapathi acuti cum  $\dagger$ to in formam linimenti subacta; linimenta ex  $\mathcal{O}$  per deliquium, cerussa & camphora vel linimentum buryri-forme Borelli *C. 4. observ.* 88. ex  $\mathcal{O}$   $\dagger$  p. d. cum  $\mathcal{O}$  lil. alborum, amygdal. dulc. & aliquot granis camphoræ. Vel subigatur fortius lixivium cum oleo baccarum sambuci expresso, donec lactescat, & applicetur; lixivialia enim acidum in glandulis subcutaneis stagnans destrunt & invertunt. Unguentum album camphoratum, nicotianæ, à Sculteto *armament. Chirurg. Observ.* 89. laudatum; ungu. nobile

Mynsichtii, dia pompholygos, de pio dulci, SS. hni, tutia. Vel

$\mathcal{R}$ . Ungu. nicot. l. rosat.  $\mathfrak{z}$ ss.

$\mathfrak{z}$ ii dulc.

$\mathcal{O}$   $\dagger$  p. d. a  $\mathfrak{z}$ ij.

cera l. sapon.  $\mathfrak{z}$ i. M. D. S.

**Reinigend Sålbleim**

Alias quoque sapo Venetus cum  $\Psi$  rectificato subactus instar lactis, ac cum linteis inde madefactis applicatus lychenem tollit, quibus & amalgama hni admitceri potest, ad quod imprimis pertinet mumia hina cum ungu. digestivo à Poterio *P. 3. observ.* 65. & 80. commendata, & in *Pharmac. Spagy. Append.* descripta; it. empl. ex hni SSro, de ranis cum pio & omnia externa, in scabie laudata. Inter potentiora sunt arcanum corallinum, turpethum minerale,  $\nabla$  divina  $\mathfrak{z}$ ii, liquor  $\mathfrak{z}$ ii saccharinus, & liquor  $\mathfrak{z}$ ii acetosus Myns. hujus unguentum medicamentosum, unguen. secretum Riverii ex ungu. rosat.  $\mathfrak{z}$ j. &  $\mathfrak{z}$ ss.  $\mathfrak{z}$ j. Vel

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$   $\Psi$ æ  $\mathfrak{z}$ ij.

$\mathfrak{z}$ ss.  $\mathfrak{z}$ ii.

M. D. S.

**Reinigend Wasser.**

Cui etiam  $\mathfrak{z}$ ss. vel gr. xv. camph. addi possunt. Instar epithematis applicetur.

In dolore serpiginis enormiore leniendo convenit mixtura Riverii ex pulp. pomor. putrid. no. vj. cum  $\mathfrak{z}$ ij.  $\mathfrak{z}$ ii rosarum, & paucolactis muliebris. vid. *Observ.* pag. 279. & c.

Notandum adhuc, quod impetigo seu lychen in senibus, nec non vino indulgentibus, criticè quasi efflorescat, & integros artus, maxime pedes, occupet, quo in casu ratione externorum eadem cautela observanda, quam de Elephantiasi Arabum audivistis. Prodest in hoc casu epithema seu fots ille elegans contra erysipelata ex lichargyrio, myrrha & olybano cum vino & aceto laudatus. Aliàs cortex medianus sambuci recens contusus & calidè applicatus egregiè etiam convenit.

**MEMBRUM VI.**

De

*Phlyctanis.*

**P**hlyctænæ seu phlyctenes, Germ. **die Hige-ge Blattern**/ sunt vesiculæ parvæ pruriginosæ & ferventes, sero limpido repletæ, quæ intra digitos & circa carpos oriri solent.

**C A U S A.**

Causa proxima est serum plus minus acre, sub glandulas miliares seu subcutaneas collectum.

Remota est frigidior, post ignis aut balnei calorem subito admissum, aut quando aliquis ex loco æstuoso, aut post vehementiora corporis exercitia cum sudore, si frigidiori se exponit.

**P R O G N O S I S.**

Pustulæ hæc, uti celerrimè generantur, ita cito

(Uuu 3)

citò & intra biduum ad summum evanescunt: interdum tamen in scabiem & serpiginem degenerant, imprimis quando nimia seri acrimonia peccat, vel phlyctænæ ex inepta externorum applicatione retropulsæ fuerint.

## C U R A.

In Cura conveniunt purgantia & sudorifera. Quoad purgantia

℞. *Crem. ſi* ℞. l. gr. xii.

*ſi* ℞.

℞ii *diaphor.* 3 gr. vj.

*ſcamm.* 4at. gr. iv. l. v.

℞o *deſtillat. ſenic.* gutt. j.

M. f. Pulvis: S.

## Blut-reinigend Pulver.

℞. *ſi* *abſinth.* l. *ſi* ℞.

℞ii *diaphor.* 3 gr. xij.

*pulv. jalapp.* ℞.

*ſcamm.* 4at. gr. iij. M.

℞. *Extr. cathol. l. panchym. Croll.*

℞ii *dulc.* 3 gr. xv.

*ſcamm.* 4at. gr. iij.

c. *eff. fumar.* f. pil.

Inter sudorifera conveniunt, quæ seri acrimoniam simul temperant, v.g. C. C. uſtum & ſine igne præparatum, pulvis diaphoreticus Ludovici, & diaphoreticum ſimplex & ale, bezoardicum minerale, cinnabaris ℞ii &c. cum rob. ſambuci, theriaca, &c.

℞. *ſi* *fumar. l. ſcab.* ℞iij.

℞ii *diaphor.* ℞ij. ad ℞j.

*Bezoard. mineral.* ℞j.

*ſyr. ex toto citro l. rubi idai* ℞j.

M. D. S.

## Blut-reinigende Mixtur auff etliche maſſ.

Capiatur pro duab. vel tribus doſibus, vel cochleatim pro ſcopo temperandi. Externè conducunt in principio mucilaginosa temperantia, v.g. mucil. ſem. cydoniorum pſyllii, ſcenugræci, lini, &c. cum *ſi* ſperm. ranarū extract. progreſſu verò temporis *ſi* x, ung. de lithargyrio, diapompholygos, album camphoratum, linimentum binum Zvvelfferi, vel per ſe, vel mixta cum amalgamate hni: Vel

℞. *ſi* *oſaſmin.* l. *amygd. dulc.*

+ *ſi* *hin.* (ex inſul. *mini* vel *litharg.*

c. + *o* *paras.*)

à part. æqu.

Miſta agitentur probè in conſiſtentiam linimenti.

D. S.

## Rührend Sälblein.

℞. *Crem. lactis.*

+ *ſi* *hin.* à part. æqu.

Miſc. probè pro linimento.

## MEMBRUM VII.

De

*Sudaminibus.*

**S**Udamina Græcis *ὕδαμα* à phlyctænibus, uti & Sepinyctidibus, terminthis & eſſeribus, parum differunt, minora ſunt, & milii granis

ſimilia. Germanis vocantur *Schweiß-Blät-terlein*.

## C A U S A.

Cauſa proxima eſt ſerum plus minus acere.

Cauſa remota eſt ſudor copioſior impeditus, aut intempeſtivè ſuppreſſus, qui ratione acrimoniæ plus minus intenſæ cutim exulcerat, & cum pruritu exaſperat.

## C U R A.

Internè conveniunt, poſt leniora purgantia, medicamenta diaphoretica, imprimis cervina & ſata, qualia ſunt C. C. ſine & cum igne, & diaphoreticum, pulvis diaphoreticus Ludovici &c. manè cum rob ſambuci, aliquoties repetendo.

Externè aliàs commendatur induſſiorum mundatorum & calidorum frequentior mutatio, hinc partis cum lacte aut *ſi* ablutio; addendo gr. unum vel alterum camphoræ; convenit etiam unguentum de lithargyrio.

## MEMBRUM VIII.

De

*Sironibus.*

**S**irones, Germanis *Reitliefen* oder *Säuren*/ ſunt puſtulæ in volis manuum atque pedum plantis æſtivo tempore emergentes, & cum inſigni pruritu moleſtantes, in quibus ſubtiliſſimum vermium hoc nomine gaudentium genus latet; de quibus & horum effigie microſcopii ope obſervatis, videbitis in *Obſervat. mea Actis erud. Lipſienſ. Anni 1682.* inſerta.

## C U R A.

Quoad curam; ante omnia ſirones intus latentes acu effodiendi ſunt; hinc locus vino, in quo abſinthium, colocynthis, myrrha, alium, porrum, naſturtium & ſimilia vermes necantia, incocta, item halecum muriâ abluatur, tandemque applicentur linimenta Mercurialia hætenus præſcripta, imprimis unguent. ex ſucco lapathi acuti, ſcabiola, abſinthii, ranaceti, & Mercurio vivo paratum, quod deſcribit Sennertus *Pr. l. 5. p. 118.* vel aliud ungu. ex aloë, *ſi* & *ſi* nicotianæ paratum, cui ſimiliter aliquid ℞ii vivi vel dulcis admilceri poteſt.

Internè præter purgationem Mercurialem & ſudorifera, propinetur eſſentia myrrhæ *ſi* ſata, R ℞ii *ſi* ſata, elixyr proprietatis cum & ſine acido, C. C. *ſi* ſimplex & ſolus, &c.

## MEMBRUM IX.

De

*Varis.*

**V**ari, die *Ginnen*/ ſunt tumores duri & parvi, ex rubedine in ſummitate tandem albeſcentes, qui ut plurimum in facie & collo oriri ſolent, & aperti pus craſſum & tenax fundunt, magnitudine grana cannabis ut plurimum æquant, ſi non ſuperant, & tam adoleſcentes quàm virgines ad Venerem aptos præ cæteris

cæteris molestant; unde frequentius non tam à sero excrementitio, quam alimentitio, & fermento seu spiritu genitali p. n. inquinato, dependere videntur.

### PROGNOSIS.

Per se sunt sine periculo, adeoque curam eorum Celsus ineptis adnumerat.

Nihilominus, ubi rubor intensus conjunctus erit, difficilis satis est curationis; & licet pustulæ removeantur, rubedo tamen permanet; cui si inflammatio & raucedo conjungantur, lepræ imminentis signum est.

### CURATIO.

In cura ad serum nutritium inquinatum respiciendum, ejusque acrimonia temperanda est. Talia inter, præter hætenus dicta, conveniunt:

℞. pulp. passul. min. ℥iij.  
lapill. Br. præp. velebor. sine Δe ℥iij.  
ad ℥iij.

rhabarb. elect. 3j. ad 3ij.

c. f. q. syr. cichor. f. Electuarium.

D. S.

### Blut-reinigende Lattwerge.

℞. Conserv. fumar. ℥iij.

ebor. sine Δe.

lap. Br. præp.

unicorn. foss. ana 3ij.

c. f. q. syr. cichor. c. rhabarb. f. Electuarium.

Pro potu ordinario commendatur serum lactis. Inter externa, & quidem in principio sufficiunt discutientia, hinc emollientia, & tandem erodentia. Imprimis commendantur à Practicis ∇ li). alborum, flor. fabarum, rosarum, sigilli Salomonis, sperm. ranarum, flor. omnium, & Qi, camph. destillatum, farina lupinorum, pulvis radic. ireos Florent. & dulcis, saccharum Bi, lac ♀is, flor. ♀is, cataplasma ex semine sinapi & Θe communi cum albumine ovi, c. g.

℞. So laurin. rec. expr. 3ij.

ungu. pomat. vel rosat. 3j.

℞ii dulce. 3j.

So Qi p. d. gutt. vi.

M. f. Linimentum. S.

### Reinigend Sälblein.

℞. ∇ sperm. ran. 3ij.

flor. Sambuci.

Omnium a 3j.

So Qi p. d. 3j.

flor. ♀is 3ij.

camph. 3j.

M. D. S.

### Reinigende Mixtur.

℞. ∇ flor. omnium 3ij.

fabar.

lilior. alb.

sigill. Salom.

sperm. ranar. ana 3ij.

So Qi p. d. 3j.

& dulcif. 3j.

borrac. Vener.

cerussæ ana 3ij.

camphor. 3j.

∇ rosar. 3ij. M.

Quo ipso subinde abluatur facies.

℞. patellam ferream, eamque novam: Candefiat nonnihil probè ignem, huic ex ore injiciatur ∇, & sic facie excipiat fætor, post eadem patella adspargatur myrrha, & sic tumus myrrhæ facie probè munita excipiat; post facies tegatur, & aliquot diebus fatus hic continuetur, sic rugæ disparent, ut sic vetulæ mentiri queant juventutem.

Facit huc etiam lac Virginis dictum, quod præ aliis experimentum est ad varos.

℞. ∇ comm. Mens. j.

cui in olla nova ferventi adde

℞ti 3j.

alumin. 3ij.

hinc vase probè clauso coquatur per horam integram, dum refrigerit, adde camph. gr. xv.

& testo vase leviter ebulliant, & ita spontè refrigerari permittantur.

Liquor hic usurpatur, illinendo successive partem unam post alteram varis affectam; abusu enim hujus ∇æ continuatæ vari in pustulas, variolarum instar, efflorescunt, & successive squamatim decidunt cum insigni dolore: quo facto hic liquor cum ana vel duplo aut etiam triplo ∇æ communis temperandus, & ne amplius redeant, præservativè usurpandus. Nec inelegans est essentia benzoës camphorata, quæ ∇æ florum fabarum vel spermatis ranarum ad lactescentiam instillata facies ac mentum sæpè lavari potest.

Denique oleum vitrioli cum melle rosato experimentum est Timæi von Guldentlee in Cas. l. 6. cas. 19. pag. 20. contra varos.

## MEMBRUM X.

De

Lentiginibus.

**L**entigines, Sommer-Sprossen / sunt maculæ obscure flavescentes, magnitudine lentis & ut plurimum totam faciem, colulum, pectus ac manus defædantes.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta est cutis & cuticula; & quidem certa illius in facie ac manibus textura.

### CAUSÆ.

Causa proxima est vel interna, vel externa, vel utraq; simul. Causa interna est serum nutritium



tritium in valvularum lymphaticarum interstitiis, intra cuticulam & cutim partium, calori ☉is expositarum, stagnans: inter causas externas notissima est ☉is ardor, dictum serum in partibus cutaneis, imprimis faciei ac manuum poris, in gelatinam quasi coagulans & exsiccans; unde æstivo tempore suboriuntur, hyberno verò iterum evanescent. Quod v. certa quædam cutis, imò certa forsan seri nutritii textura, concurrat, probare videtur, quod si quoque, qui radiis ☉aribus non adeò exponuntur, & imprimis capillis ruffis præditi, lentiginibus ut plurimum afficiantur.

#### PROGNOSIS.

Lentigines cuti pertinacissimè adhærent, nec facile curantur, imprimis in iis, quibus jam per aliquot tempus efflorescere consueverunt.

#### CURA.

Præcaveri solent lotione faciei ac manuum cum album ovor. conquassato, & ☐ rosarū vitando simul tempore verno radios ☉ares: sicuti etiam lentiginum cura per sola externa instituitur, & quidem majori cum successu, si à causa externa, quàm interna, originem ducant. Nihilominus tamen præstat etiam, laxantia blanda, serum temperantia, adhibere ex flor. acaciæ, fol. fennæ & ☐eis; & hinc sudorem provocare, post quem lentigines primo vere prodeuntes facie linteis abstergenda tolluntur. Prodest etiam elix. proprietatis sine acido.

Externa inter conveniunt ☐ florum fabarum, flor. omnium, rad. sigilli Salomonis, scrophulariæ, leucoji bulbosi, & satyrii maculosi, ✕ aut succus citri affricatus, decoctum cosmeticum, & unguentum nobile Mynsichthii, pulvis rad. ireos flor. & bryoniæ, & dulcis, Hni cum ☐i ☐at. cosmeticum Clavii, & cerussa, gïalia, camphora, lac virginis, tam Schræderi, Zvelfferi in *Append. Pharm. Aug. p. 299.* & Willisi *Pharm. Rat. P. 2. pag. 471.* descriptum, quàm in cura varorum communicatum, oleum ovorum, ligni Heraclini, Guajaci, betulæ, ceræ, saponis, oleum ☐i per deliquium, arcan. ☐i, & ex corrosivis liquor gïi saccharatus Mynsichthii. B. D. D. Michaëlis commendat sequens linimentum:

℞. Olib.  
ceruss.  
myrrh.  
☐is vivi ana ʒiʒ.  
camphor. ʒi.

c. s. q. pingu. gallinac. f. linimentum.

Plura quid desiderat, videat Johannem Baptistam Portam in *Mag. naturali.*

Talia autem externa semper inungantur tempore nocturno, matutino verò ☐ fontana rursus abluantur. Ut plurimum verò cutis post tales inunctiones evadit semisquamosa vel furturea, quæ particulæ demum com-

modissimè per axungia humanæ inunctionem separantur.

### MEMBRUM XI.

De  
*Ephelidibus.*

**E**phelides sunt maculæ cutaneæ fuscæ, & interdum asperæ, mulieribus communes, quæ potissimum frontem, interdum genas, imò collum & manus quoque deturpant, in longum & latum, & sæpe ad palmæ magnitudinem se explicant, gravidas in specie afficiunt, in quibus etiam per reliqua ingravidationis signa dignoscuntur.

#### PARS AFFECTA.

Pars affecta sunt partes cutaneæ in dictis locis.

#### CAUSÆ.

Causa proxima est seri acrimonia, quæ tam in gravidis quam interdum virginibus & mulieribus non gravidis mensium suppressorum occasione, nec non menstruationis tempore non rarò observari solet, unde serum non parum alteratur.

Causæ remotæ sunt varicæ: Ex rebus non naturalibus maximè facit crasis massæ sanguineæ acrior. Ad res non-naturales pertinent aromata similiaque acria ☐sa, & alimenta fermentescibilia, & colorandi vim habentia, v. g. rad. carotæ, betæ rubræ, & c. cerevisia & mustum recens, fructus horæi & similia menstruationis tempore assumpta.

#### PROGNOSIS.

Mulieribus, quæ in matrimonio vivunt, nec dictos aut alios dietæ errores commiserunt, conceptionis signum existunt, & in his etiam rarissimè curantur: imò si evanescent, mox redeunt & plerumque usque ad & post partum durant; in aliis mulieribus & virginibus facilius cedunt, mensibus scilicet ritè aut fluentibus, aut penitus cessantibus.

#### CURA.

Pro cura ephelidum remediis internis non opus est. Inter externa prodest frictio partium affectarum pomo dissecto subacido, vel pomo citrio dissecto. Aliàs laudatur linimentum ex pulvere baccarum lauri decorticatarum, cum melle, quo facies in balneo inungatur; item emulsio seminis cannabis, succus radicis buglossæ, ☐vium & flores ☐is.

### MEMBRUM XII.

De  
*Maculis Epaticis.*

**M**aculæ epaticæ ita dicuntur, vel quod hepatis colorem repræsentent, vel quod vitio hepatis obstructi, nec ritè sanguificantis, oriri vulgò credantur; suntque maculæ obscure flavi coloris; nunc majores ad palmæ ferè latitudinem; nunc minores, quæ interdum evanescent, mox denuò emergunt, cum

cutis

cutis aliquali asperitate & squamis; occupant imprimis collum, pectus atque dorsum, interdum manus, cum singulari pruritu.

C A U S A.

Causa harum nil aliud est, quam serum nutritium acidum, plus minus viscidum in valvularum lymphaticarum interstitiis, occasione frigoris aut  $\Delta$ is externi post exercitia vehementiora admissi, in gelatinam quasi coagulatum, unde à lentiginibus vix aliter quàm gradu differunt. Taxat quidem Platerus Sennerium, quod hic causam harum internam & curam unam eandemque cum lentiginibus statuatur: sed sine ratione, cum maculæ sic dictæ epaticæ eundem cum lentiginibus colorem habeant, illosque, quibus lentigines familiares sunt, pariter afficiant. Unde patet, quid sentiendum de illis, qui sanguinem feculentum & melancholicum, tanquam macularum epaticarum causam, accusant, quatenus etiam hæc subiecta illa, quorum M. S. Se volatili oleoso seu bilioso constat, afficiunt.

C U R A.

In cura harum conveniunt absorbentia blanda & sanguinem purificantia, unde præmissa pleniori purgatione Mercuriali præscribantur. vegetabilia amara antiscorbuticis juncta in forma nodulorum l. essentiarum; quorum formulæ ex hæcenus dictis patent.

Externa sunt vel blandiora, vel fortiora seu rubefacientia; blandiora sunt cosmetica hæcenus recensita, v. g. rad. bryoniæ, oxy-lapathi, symphyti majoris, sigilli Salomonis, lac virginis, oleum  $\Psi$ i per deliquium cum oleo amygdalarum dulcium in formam linimenti redactum; cui etiam olea suaveolentia, v. g. oleum jasinini, ligni Rhodii, &c. ad aliquot guttas addi possunt: Convenit etiam linimentum ex  $\mathcal{O}$   $\Psi$  per deliquium, cerussa & camphora: quibus omnibus  $\mathcal{Q}$  dulcis addendus.

Inter fortiora eminet sem. sinapi viride cum  $\nabla$  appropriata in formam pultis redactum, quo in balneo post sudorem cutis fricetur, donec fervor & punctio quædam percipiatur, hincque cuticula mortificetur.

Ad maculas ergo epaticas optimum est:

$\mathcal{R}$ . Sem. eruca s. sinapi q. l.

contunde in mortario, addendo +, ut fiat iustar pastæ, adde

$\mathcal{O}$ is comm.  $\mathfrak{z}$ j.

album ovi, no. j.

M. D. S.

**Beitragender und reinigender Umschlag.**  
Et hoc ipso in balneo cutis maculata probe fricetur, relinquatur aliquandiu, & abluatur postmodum cum aqua communi. Fiat hoc aliquoties, aut saltem singulis anni quadris: vid. etiam Timæus von Guldensee in Epist. l. 6. Epist. 26. p. 229.

Tom. II.

Ad varos etiam usurpari potest.

Pulvis quoque seminis sinapi cum sapone & succo lapathi acuti misceri, & simili modo adhiberi potest.

MEMBRUM XIII.

De

Gutta Rosacea.

**G**utta rosacea, à figura das flupferige Angesicht/ vulgo der Kupfer-Handel/ est rubor faciei tuberosus, pustulosus, guttis interdum sanguineis similis, qui nasum læpè & genas inæqualiter & valdè tingit, & potatibus satis frequens est.

C A U S A.

Causa est ut plurimum acidum volatile vinosum per glandulas cutaneas secretum, & cutim erodens; unde patet, quod non semper tota M. S. hac dyscrasia laboret, nisi acidum volatile per naturam existat, sed serum tantum nutritium sub faciei cute corrumpatur, cum ejusmodi homines quoad reliqua ut plurimum maximè sani sint.

P R O G N O S I S.

Malum curatu est difficile, præsertim si facies simul pustulosa & exulcerata fuerit; & tunc ut plurimum ad mortem usque comitari solet.

C U R A.

Internè præmissio nodulo purgante & sanguinem purificante, & in plethoricis venæsectione, conveniunt absorbentia s. ca & marina, e. g. os sapiæ, lapilli 69. & diaphoreticum Martiale, R coralliorum sassafrata, R  $\mathfrak{z}$ ii  $\Psi$ ilata, &c. diutius continuando.

Externè guttam rosaceam optimè curant Saturnina, quæ acidum istud promptè absorbent, & vulgò propterea refrigerare dicuntur: Hinc saccharum hni aut cerussa cum  $\nabla$  appropriata mista, addendo parum camphoræ, optimè hic convenit; vel ex Saturno cum aceto destillato soluto, & oleo rosaceo, fit mistura egregia, item linimentum ex saccharo Saturni cum succo semper-vivi & plantaginis paratum, crebrius illitum, in specie præmissis in graviore malo sanguisugis faciei per vices applicandis: vid. Timæus l. 6. Casu 20. pag. 282. vel scarificationibus auricularum ab Hartmanno commendatis. Porro ceu expertum admodum sequens laudatur unguentum:

$\mathcal{R}$ . Piper.

Zingiber.  $\mathfrak{z}$  3j.

$\mathcal{O}$ is vivi  $\mathfrak{z}$ ss.

Ungu. pomat. q. s.

M. pro linimento.

Vel saccharum Saturni crebrius in cella in liquorem resolutum cutim albam valdè reâdit, si antea rubra pustulosa fuerit. His & aliis irritis tandem ad Mercurialia accedendum erit.

(Xxx)

Quò

Quo etiam pertinet Ol.  $\frac{1}{2}$  p. d. in loco humido solutum, c. g.

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  flor. fabar.

sigill. Salom.

sperm. ranar.  $\mathfrak{z}$ ij.

Ol.  $\frac{1}{2}$  p. d.  $\mathfrak{z}$ ss.

campb. c.  $\mathfrak{V}$  solut.  $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S.

Sonderlich reinigend Wasser.

MEMBRUM XIV.

De

Cutis Nigredine.

**N**igredo cutis, in specie faciei & manuum, ab igne aut vis ardore contracta tollitur cum  $\mathfrak{x}$ o; cui etiam simul ante destillationem flores fabarum, liliorum alborum, jasmmini, cerasi, radix sigilli Salomonis, scorophulariæ infundi possunt. Melius & magis evaporison est succus citri vel caro ejus succulenta, quæ affricando omnem cutis nigredinem tollit. Huc etiam camphora &  $\mathfrak{V}$  camphoratus pertinet; vel de essentia benzoës rubicunda instilletur  $\nabla$ æ communi vel  $\nabla$ æ rosarum, quantum velis, & fit liquor albicans lacteus, quo manè & vesperi abluantur facies & manus, permittendo ut sponte siccescant. Quidam cum emulsione ex nucleis persicorum & amygdalis amaris, cum  $\nabla$  spermatis ranarum, florum omnium, florum fabarum, &c. parata, cutim aut faciem lavant. Glabram & nitidam cutim imprimis reddit magisterium marcasitæ, vel cum unguento rosato vel pomato, aut pulveris forma applicatum; unde v. g. sequens laudatur pulvis:

$\mathcal{R}$ . Amygd. amar. exc.

nucl. persic. exc.

sem. papav. albi.

rad. ireos Flor.

sigilli Salom.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ j.

M. f. l. a. Pulvis: adde

amyl.

far. fabar.

mag. marcas.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ j. M. D. S.

Reinigend Pulver.

Huic, qui ferre possunt odorem, addi possunt,

Moschi.

Zibethi  $\mathfrak{a}$  gr.  $\mathfrak{iv}$ .

$\mathcal{R}$ . Sapon. Venet. rasi & exsic.  $\mathfrak{lb}$ ss.

nucl. persic.

sem. papav. albi  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ ij.

M. f. l. a. Pulvis:

cui adde

amyl. puriss.  $\mathfrak{z}$ iv.

farin. fabar. l. lupinor.

pulv. rad. Ireos Flor.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ ij.

Probè mistis adde pro lubitu

Moschi opt.

Zibethi  $\mathfrak{a}$  gr. viij. M.

Usus est, ut tempore vespertino sub introitum lecti  $\mathfrak{z}$ j. l.  $\mathfrak{z}$ ij. horum pulverum cum sequentibus aquis ad pultis formam humecten-

tur, & facies, collum ac manus, aut loca pustulosa, leniter eodem illinantur, altero manè cum linteo, præfatâ  $\nabla$  humectato, denuo abluantur, & ita aliquandiu moderatè continentur.

Aqua in hunc usum fit:

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  rad. scorophular.  $\mathfrak{z}$ ij.

flor. fabar.

rosar.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ ss.

rad. lil. albor.

sigill. Salom.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S.

Reinigend Wasser zum Pulver.

Mixtura hæc cum pauxillo olei  $\frac{1}{2}$ i per deliquium acui poterit. Item:

$\mathcal{R}$ . fecul. rad. bryon.

ari

facch.  $\mathfrak{vi}$ .

$\mathfrak{z}$ ii dulc.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ ss.

M. pro pulvere.

De hoc parum cum præfatis aquis humectetur, & dicto modo procedatur.

Delicatiores his non contenti ad ipsum oleum talci provocant, quod tamen genuinum vix habetur, & quæ sub olei talci nomine venduntur, nil aliud sunt, quàm subtilissima talci calx in alcali quodam fixo obvelata, ad quod plerumque borax, vel  $\Theta$   $\frac{1}{2}$  expetitur. Non inutiliter ergò loco hujus ol.  $\frac{1}{2}$ i per deliquium, cum  $\nabla$ is dictis dilutum, adhiberi potest.

Interdum saponès odorati cosmetici expetuntur à virginibus delicatis, quorum compositiones videbitis in Schrœdero, l. 2, p. 280.

Vel  $\mathcal{R}$ . Sapon. Venet. rasi & exsic.  $\mathfrak{lb}$ ss.

amygdal. amar. exc.

nucl. persic. exc.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ ij.

M. f. l. a. Pulvis:

adde

pulv. rad. ireos Flor.

aron.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ j.

$\Theta$   $\frac{1}{2}$   $\mathfrak{z}$ ss.

Cum f. q. essent. benzoës c. spiritu rosar. parata,

f. l. a. Massa saponiformis,

addendo

ambra gris.

Moschi opt. ana c. spir. rosar. sol.  $\mathfrak{z}$ ss.

Zibethi gr. v.

$\mathfrak{z}$  ligni Rhodii gutt. xv. ad xx.

Formentur Globuli saponiformes, leviter exsiccandi.

Tandem sit adhuc fucus multis usib9 dicatus

$\mathcal{R}$ .  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$ j.

bulliat in

$\nabla$  commun.  $\mathfrak{lb}$ j.

quousque sentiat aliquam acrimoniam in lingua, hinc adde

Ceruss.  $\mathfrak{z}$ iiij.

Bulliant parum: mixtura clarificetur cum albumine ovi, coletur, & usui servetur.

Sub usu agitetur crebrò.

MEM.



## MEMBRUM XV.

De  
Porrigine.

**P**orrigo capitis affectus satis fœdus est, scorbüticis, lue Venerea affectis, & leprosis familiaris.

## C A U S A.

Causa est acidum plus minus Æsum, à sero tamen viscido & corrupto temperatum; quod in partibus capitis intercutaneis stagnans poros cutis obstruit, conglutinat, & sic insensibilem transpirationem impedit: unde propter acidi hujus cum sero viscido combinationem non ulcuscula humida, uti aliàs ab acido acriori in sero prædominante fieri solet, sed crustæ densiores, & densè subinde compactæ, & successivè lamellatim sibi invicem superstratæ, eventunt, quæ successivè exsiccatae furfurum instar decidunt.

## C U R A.

Internè conveniunt purgationes Mercuriales, noduli laxantes & sanguinem purificantes, siniliaque remedia, quæ scabiem & terpiginem curant.

Externè usurpantur lotiones capitis, singulis septimanis instituendæ, c. g.

℞. HB. abrotan.  
betonic.  
malva.  
chelidon. major.  
saponar. à M. j.  
rad. alch.  
lapathi ac.  
bardan. à ʒj.  
pisor. ʒij.  
bacci lauri.  
colocynth. à ʒij.

Incisa & contusa coqu. in liq. lixivii.

Colatura D. S.

Haupt-reinigende Lauge.

## ARTICULUS VIII.

De  
Capillorum Vitiis.

**A**D capillorum vitia referuntur calvities, capillorum defluvium, alopecia, capillorum tinea, & plica Polonica. Calvities est, quando capilli in summo capite deciderint; Capillorum defluvium dicitur, quando hi undique copiosè decidunt: alopecia, quando cutis nuda hinc inde conspicitur. Tinea pilorum dicitur, quando hi frustillatim decidunt: plica Polonica verò est, quando capilli in cyrrhos contorquentur, ut nullo ferè modo explicari possint.

## MEMBRUM I.

De  
Calvitie.

**C**alvities in pluribus malum hæreditarium est, quæ in juventute incipiens nul-

Tom. II.

lo modo curatur, nisi capillis factitiis pallietur. Aliàs ad calvitie præcavendam Mynsichtius in *Armament. Chym.* Rm suam proprietatis commendat.

Externè præscribuntur cucuphæ aromatizæ, imprimis si calvities à nutrimento vitioso oriatur.

## MEMBRUM II.

De  
Capillorum Defluvio.

**C**apillorum defluvium frequenter morbis acutis supervenit, ubi convenit decoctum rosmarini in vino, vel unguentum Bucetii, quo capilli flavi simul regenerantur.

℞. fol. Abrot. maris.  
capill. Veneris à M. j.  
favi mellis.  
ladani à ʒj.  
myrtillor. ʒi.  
sem. fanugr.  
lini à ʒij.  
Ol. Amygd. dulc.  
Vini gener. à ʒij.

Facta infusione per 24. horas bulliant ad humiditatis consumptionem, hinc fiat expressio fortis.

## D. S.

## Sälblein zum Häaren.

Hoc ipso D crescente illinitur caput, quod sub decremento Dæ ultimò blandè abluatur, hinc vino rubro aut aliis austeriusculis irroratur, hinc ulterius linimentum continuatur.

Ad canitiem tollendam seu obvelandam convenit D in V soluta, & V simplici probè diluta & temperata, qua capilli frequentèr pectinentur. Quidam pectine plumbeo canos frequentèr fricare jubent, donec nigredinem nanciscantur. Longius lixivium betulæ, & Botellus *Centur. 3. observ. 2.* sequens laudat.

℞. Ciner. clavell. ʒij.  
V puræ lbjv.

Bulliant ebullitione unâ tantum in vase æneo in decoctione ab Æ remota extingue

℞ ʒjv.

Quâ extincta adde

hi usti.

lithargyr. Aur. à ʒj.

Bulliant omnia simul bis vel ter.

## MEMBRUM III.

## De

## Alopecia.

**I**n alopecia, præter purgationem Mercurialem, convenit decoctum & essentia lignorum, essentia fumariz, & diaphoreticum, Matialia, & omnia sanguinem purificantia supra in scabie & pruritu laudata.

Externè commendatur unguentum medicamentosum Mynsichti, & unguent. nicotianæ,

(Xxx 2)

nz,

na: acuata cum oleo Philosophorum, ceræ saponis, ligni juniperini, &c.

## MEMBRUM IV.

De

*Pilorum Tinea.*

**I**N Capillorum tinea, in den *Mülsen*/prodest lixivium, in quo pisa, fabæ, semen lupinorum, absinthium, centaurium minus, colocynthis, semen staphisagrie, myrrha, &c.

cocta; quo sæpius caput lavandum: sicut & capillorum extremitates forfice rescandæ.

## MEMBRUM V.

*De Plica Polonica.*

**D**E plica Polonica, affectu apud nos rarissimo, videatur Sennertus in *Praxi* l. 5. p. 3. S. 2. c. 9. seq. Davisonius in *Commentar. super Petri Severini Dani ideam Medicina Paracelsi* p. 452. & Hercules Saxonia.

## S E C T I O XVIII.

D E

## SANGUINIS EX PARTIBUS REFLUXU VITIATO,

&amp; exinde orta

INFLAMMATIONE,

tam in genere, quàm in specie.



**S**I arteriæ plus sanguinis advehunt, quàm venæ revehere possunt, læditur etiam distributio seu motus circularis per partes & vasa, unde plus minus vitiatur;

- (1.) Quando sanguis in parte quadam hæret, stagnat, & in viis suis subsistit.
- (2.) Quando extra partem effunditur in singularem corporis quandam cavitatem.
- (3.) Quando sanguis planè extra corpus effunditur.

Sanguis ergo in suo motu impeditus & in quandam partem solidam depositus, stagnat & hæret in vasis capillaribus venosis, & partium spaciolis; vel in minori quanto, ita ut successivè insensibiliter evanescere & discuti possit, id quod fit in contusionibus, & inde natis suffusionibus, *wenn es blau und braun wird* v. g. casu ab alto, vel hæret & congeritur in majori quanto sanguis, unde uberius collectus mox excandescit, ac molestum caloris sensum in parte quadam sensili producit, donec sensim corruptus in pus vel saniem abeat: unde prior mutatio vocatur inflammatio seu *φλεγμονή*; posterior verò abscessus seu apostema. Quando verò sanguis in corporis cavitatem quandam, humoribus naturaliter vacuum effusus, v. g. in pectus, vel cavum abdominis, ac ibidem collectus in pus mutetur, vocatur tum empyema; quod si sanguis planè extra corpus effundatur, generaliter fluxus sanguinis seu hæmorrhagia.

## CAPUT I.

De

*Sanguinis in parte quadam Stagnatione.*

## ARTICULUS I.

*De Inflammatione, in genere.*

**R**efluxus igitur sanguinis quicumque impeditus successivè inflammationem constituit; quia enim arteriarum motus & per has sanguinis influxus est validus & impetuosus, & omnino perpetuus, necessariò fit, dum perpetuò influit, non tamen debite possit fluere, ut exinde in parte hæreat, hinc coaccervetur, & coaccervatus det tumores, qui vocantur inflammationes.

C A U S A E.

Causa materialis proxima omnis inflammationis est sanguis collectus & stagnans in parte quadam, ob impeditum suum ex arteriis in venas refluxum, ita, ut plus influat per arterias, quàm refluere valeat per venas. Nempe si qualibet pulsatione 3ß. sanguinis per arteriam influat, sed 3j. per venas saltem refluat, remaneat 3ß. qui stagnat, & dum continuatis pulsibus semper major majorque sanguinis hæret copia, sic necessariò oritur inflammatio. Quod si verò in parte inflammata nihil omnino refluere queat, adeoq; reciprocus influi fiat motus, à quo sustentetur insitus, necessariò supervenit tandem gangrena, dum sanguis spiritu vitali influo privatus corrumpitur & putrescit, indeque pars, suppressio spiritu insito, emoritur.

Jam verò cum sanguis, qui dat inflammationem, sit materia rubra spirituosus & calidus, ergo calefaciet partes, & pars necessariò exinde rubet; quia verò plus influit sanguinis, quàm refluat, necessariò pars intumescit, & cum à tumore distendantur partes fibrosæ, hinc necessariò excitabitur dolor, & consequenter inflammatio. Hæc ergò quatuor modò dicta pathemata seu symptomata in omni inflammatione observabilia sunt; sunt enim signa inflammationis pathognomonica à Cello enarrata, nempe calor, rubor, tumor, & dolor.

Dolor, qui adest, triplex in omni inflammatione.

matione successivè observatur: (1.) Tensivus (2.) Pulsatorius. (3.) Punctorius. Tensivus propter partes fibrosas & membranosas, à sanguine congesto & stagnante distentas & convulsas: pulsabilis, quia sanguis influens repercussionem patitur, à cujus influxionis & repercussionis impetu fit pulsationis sensus, & quidem à fibrarum, membranas arteriarum, per quas sanguinis motus debitus non nihil impeditur, constituentium spasmo aut convulsiva tensione, hinc ad diastolen resistentia. Punctorius adest in omni inflammatione, dum suppuratur inflammatio, & in abscessum degenerat, superveniens ab acerbis & in acidis salis particulis, partes nerveas acicularum instar pungentibus.

Hæc omnibus manifesta sunt in parte externa visibili; dolor pulsatorius verò in parte interna, adeoque invisibili, item interdum gravativus, ardor & denique partis ordinaria functio læsa, inflammationem comitantur. Hinc observetur, quod quia omnis inflammatio est in parte quadam determinata tanquam in subjecto, semper hisce modò allegatis 4. symptomatis omni inflammationi communibus, subinde simul prodeunt aut accedunt peculiariora quædam symptomata; ex partis specialis inflammatione, non morbi ratione nata: sic enim v. g. inflammationi faucium in Angina simul deglutitio læsa & difficilis; in pleuritide difficilis respiratio, ratione partis affectæ superveniunt.

Causa efficiens, quare sanguis stagnet, est vel externa seu remota, vel interna seu proxima. Causæ externæ seu remotæ sunt variæ, quæ vas angustando occasionem præbent, ut impediatur sanguinis motus, qualia sunt quæcunque, quæ vel partes & vasa arctè comprimunt, vel quæ adstringunt, v. g. fortiores ligaturæ, & vincula injecta, luxationes, fracturæ, vulnera, ulcera, contusiones graviores v. g. testium ex equitatione violenta, sic spinæ post ossa fracta aut post cranium contusum altius eminentes semper inflammationes inferunt. Interdum sola transpiratio à frigore intercepta inflammationem excitat. Sæpissimè fibrarum nervearum & tendinosarum dolorificæ crispationes & contracturæ, & hinc natæ, vasorum capillarium arctæ constrictiones, inflammationem inferunt; hinc enim est, quod quibuscunque ferè doloribus in specie fibrarum nervearum læsionibus, frequenter superveniant inflammationes, aliique tumores. Hæ siquidem irritatæ spasmo convelluntur, quibus convulsis dura redditur pars, unde pori non transmittunt sanguinem, sed pars rueret & inflammatur: c. g. dolori dentium ab acido, radicem dentis nerveam morficante & vellicante, supervenit tumor totius maxillæ, & capitis ipsius inflammatorius

hinc & in arthritide & simili causa tumor inflammatorius, ut plurimum erysipelaceus, supervenit; item in punctura vespæ, aut intrusione spinæ.

Causæ internæ sunt sanguinis motus circularis æquabilis ineptitudo per quævis vasa capillaria, vel est in parte recipiente vitium, nempe quodcunque illud, cujus occasione viæ & partes angustatæ ineptæ fiant, ut sanguinem debitè non transmittant.

Sanguis ad motum circularem ineptus est duplici modo:

1. Quando nimis est viscidus & crassus, obleri defectum ejusque nimiam absorptionem, quod tamen rariùs evenit; aut propter chyli crudioris ac glutinosioris seu pituitæ viscidæ congestionem.
2. Quando idem sanguis non nihil congrumatus aut quasi semicoagulatus in quodam loco sistitur & coacervatur, hinc ita subsistit, & inflammationem ita inferit.

Dispositio hæc ad grumescentiam sanguinis oritur ab acido quodam vitiolo occulto, & nimis excessivè sanguini permisto: Quod confirmatur non tantum per experientiam, dum sanguis in liquorem acidum immittitur, sed etiam ex infusione liquoris acidi in venam canis. Hinc enim omnes inflammationes erysipelaceæ ex grumescencia aliquali sanguinis, facta ab acido occulto, inducente tales coagulationes, originem ducunt: hinc v. g. à subitaneo frigore, post nimium corporis motum ac incalescentiam, partibus internis subito communicato, subito spissatur & condensatur sanguis calidus, nimis attenuatus ac resolutus, unde internæ inflammationes, in specie pleuritis & angina: hinc expositio corporis concalefacti in frigidiori, immersio ejus in frigidam, sanguinem ad sui coagulationem, & hinc ad eadem mala disponere solet; aut potius frigidus post nimia exercitia, in nimio æstu ac corporis calore, copiosius ingestus sæpiùs dant pleuritides aut peripneumonias ex sanguine in præcordiis condensato & non nihil coagulato, circa pulmones, ac pleuram subinde subsidente, ac inflammationes excitante: vid. Sylvius de Inflammatione, sed rarior ex recensitis causis est inflammatio: nam vel universalis in toto corpore, aut una quadam parte, aut pluribus partibus simul, fieret sanguinis ex causis istis stagnatio, aut danda foret ratio, quare præcipuè in hac, non verò in alia parte fieret talis stagnatio, adeoque sic ad partem inflammatam simul respiciendum erit.

Probatum sanguinis grumescencia, hinc quævis inflammatio, & quævis cætera symptomata aut supervenientes affectus, ab ejusdem aciescentia ex eo,

(X x x 3)

(1.) Quod



(1.) Quod in pleuritide sanguis venâ sectâ extravasatus dum fluit, semigrumofus appareat; id quod non tantum *Helmont. Tract. Pleura Furens*; it. *Willisius de febris cap. 11.* testatur, sed præterea exempla suggerit *Gabelchoverus cap. 4. Cur. 70. & 79.* ubi affirmat, se in sanguine pleuriticorum sectâ venâ educto grumos, uti loquitur, vidisse, ex aliquali sanguinis coagulatione & grumescencia.

(2.) Quod nempe inflammationes quælibet internæ, remotis causis externis, omnium optimè internè per talia curentur, quæ sanguinem grumofum dissolvere, attenuare, & fluidum reddere possunt, quia acidum vitiosum absorbere & corrigere, & vi diaphoreticâ sanguinem mobilem reddere, atque per sudorem vel  $\Sigma$ m ejicere valent.

(3.) Externæ inflammationes quævis, in specie erysipelaceæ, per talia externa, inflammationes discutientia & resolventia, tolluntur; qualia sunt quæ acidum corrigunt, istudque absorbent.

Alterâ causa interna, nempe vitium partis recipientis, sanguinem non debitè transmittentis, præter spasmum fibrarum & inde vasorum angustationem, de qua suprà dictum, observandum est, quod subinde aptitudo quædam certa in quibusdam partibus insit talis, ut ex levi quacunque occasione inflammantur: videmus enim, quod semel in parte quadam facta inflammatio à causa interna subinde in eadem parte recurrere soleat. Priùs quod attinet, dispositio ista seu aptitudo prompta ad inflammationem in parte consistit imprimis in nimia partis sensibilitate, ideoque irritabilitate, dolore, &c. hinc enim partes nerveæ faciliùs quàm sanguinæ inflammantur, oculi faciliùs quàm genæ, & sic porro. Quoad posterius; quidam quotannis laborant pleuritide, alii erysipelate suræ, ita ut facilè recurat malum in eadem parte: Angina & inflammationes tonsillarum semel factæ, si non benè curentur, facilè vel data externa saltim causa seu occasione, recurrunt in eadem parte; ubi vulgò dicunt Autores, remanere in parte semel inflammata certam dispositionem, secundum quàm inflammatio semel affligens denuò renovetur: quæritur in quonam hæc dispositio consistat? *Helmontius* quidem rectè allegat, subesse robur inæquale partium, idque per ideas in archæo depictas exponit. Sed non satisfacit scrupulo, siquidem hic triplex revera subest ratio, cur pars sæpiùs in eundem affectum incidat; nempe

1. Debilitas spiritus insiti.
2. Atonia partis semel inflammatæ.
3. Relicta spina seu fermentum acidum occultum,

post inflammationem, quod facilè vel internis occasionibus, v. g. iræ excandescencia;

vel externis diætæ erroribus, commovere sanguinem & ad stagnationem disponere denuò potest.

Debilitatem spiritus insiti & atoniam quod attinet: certum est, quod pars semel inflammata, sive discussa, sive, idque imprimis, suppurata fuerit inflammatio, necessariò debilitetur ac plus minus enervetur spiritus insitus, ob denegatum liberiùs cum influo commercium; simul quoque partim eroduntur fibræ, partim distenduntur, ac alio modo læduntur. Fibræ autem hæc semel relaxatæ, distentæ ac laceratæ, non ampliùs in debitum tonû coeunt, & hinc pori partis transformantur, & pars debilis manet, ut vel levi datâ in M. S. occasione facilè postmodum sanguinem in suo motu legitimo impedire potest, unde circa eandem partem sanguis hæret & extravasatur. Quod autem attinet fermentum post inflammationem residuum; certum est, si in parte curata tantillum odoris fermentativi remaneat, imprimis si abscessus suppuratus seu inflammatio suppurata non probè & exactè mundificetur, etiam post consolidatum ulcus inflammatio recurrit; tum enim odor fermentalis acidus residuus manet, qui partim partes sensiles irritando, si excitatus fuerit, fibrarum crispationem efficit, partim suo quasi odore & contagio sanguinem præterfluentem simul disponit ad faciliorem sui coagulationem, adeoque subsistentiam & inflammationem: ità enim in ulceribus, si iisdem non nihil fermenti purulenti remaneat, videmus eadem recrudescere, *sic brechen immer wieder auff.*

Attendendum etiam; an sub inflammationibus concurrat simul aliqualis plethora, sive reverà talis, sive ex consuetudine? nam tali sub occasione copiosior sanguis stagnare, & inflammationem insigniter promovere solet. Hinc ii, qui assueti sunt annuis phlebotomiis aut scarificationibus sæpiùs repetendis, simul atque si hæc intermittuntur, facilè in inflammationes crebriùs recurrentes incidunt, ipsas tamen ferè præcavent ordinariis & aduetis suis sanguinis diminutionibus. Novi hîc mulierem non ignobilem, quæ nisi singulis mensibus aut post bimestre saltem spatium utatur scarificationibus, ordinariò tonsillarum & faucium inflammationi est subjecta. Concurrit nempe hic plethora secundum quid, seu à consuetudine contracta, in qua sanguis è suo naturali puncto deflectit, in motu suo impeditur, & sic inflammationem inducit.

Sanguis ergò extravasatus plus minus, ac in parte stagnans, non ibidem quietus hæret, seu dum ejus spiritus volatilis evanescit, coagulatur & acorem contrahit, qui acor cum  $\Theta$ e volatili oleoso adjuncto effervescentiam concipit, sub qua sanguis impenitè incalescit, turgescit, ac in pus corrumpitur, quod suppurare

rare

rare dicunt: *Es wird unterföhrtig / vel die Entzündung gehet in ein Geschwür.* Ratio hujus est, quia sanguis p. n. extravasatus suis partibus volatilibus balsamicis destitutus mox corrumpitur, acescere incipit (acor enim p. n. vitiosus corruptionis individuus comes semper est) & in grumos abit: quæ vitiosa aciditas in sanguine extravasato oborta, uti spissat & coagulat primitus sanguinem, ita postmodum cum sale volatili oleoso in sanguine abundante, & successivè magis magisque emergente M. S. fermentando, imò interdum acriter effervescentia, calorem intensum, & tumoris successivum augmentum efficit; sub quo fermentativo motu successivè sanguis corrumpitur, ita ut tandem  $\Theta$ ia effervescentia mutuò concursu ex sanguine alterato & corrupto aliam substantiam, tertium  $\Theta$ sum, nempe pus, quod est crassum, moderatè  $\Theta$ sum, grumosum & album, constituent: nam omne pus est falsum, si est laudabile & naturale, quia natum ex concursu acidi vitiosi, &  $\Xi$ li, ex quibus semper & necessariò subsalescit; est album, quia ab acido  $\Xi$ atur  $\Delta$  sanguinis, sub effervescentiæ motu ab alcali solutum; exinde enim emergit color lacteus. Confer. hinc Sylvius l. i. *Prax.* ubi de inflamm. item Beckius de *Experim. circa Rer. natur. Princ. pag. 46.*

Ardor, qui in inflammatione perquam sensibilis, est ex acidi volatilis motu concitatoris; adeoque pro hujus plus minus acrioris cum alcali etiam plus minus acriori plus minus facta effervescentia majori cætera symptomata, ardor, rosio, punctio, &c. plus minus intendi quoque solent. Idem acor vitiosus, sive sanguinem purum coagulando ad inflammationem disponat, sive inflammationi ex alia causa obortæ superveniat, effervescentia in tota M. S. cum ejus sale volatili causa est adjunctæ febris continuæ ardentis symptomaticæ, qualis in omni inflammatione interna adest, & est tam acuta, ut in inflammationibus partium internarum à causa interna enatis, v. g. in pleuritide, hepatitide, &c. quàm lenta, superveniens nempe inflammationibus partium quarundam externarum à causa externa subortis, v. g. in inflammatione mammæ ex lactis grumis, &c.

Dividunt, vulgò inflammationes in legitimas & illegitimas. Illas, quando sanguis benè constitutus inflammationes excitat; has verò seu illegitimas in biliosas, pituitosas, melancholicas, &c. dispescunt, non propter tales humores sanguini permistos, sed propter variam sanguinis crasin, ac inde natam temperiem.

#### DIAGNOSIS.

Signa inflammationum suprà sunt recensita: nempe

1. Tumor renitens ad tactum.
2. Rubor.

3. Calor, seu ardor ægrum, ac attrectantis mantum afficiens.

4. Dolor urens, tensivus, pulsabilis, punctorius, & etiam gravativus, dum pars à sanguine distenditur, & gravando distendit partes, quibus est annexa, & quibus deniq; semper accedit febris, sive symptomatica sive comitata, plus minus acuta, conjuncta cum inflammationibus à causa interna excitatis.

Satis per se patent hæc signa in parte visibili, in invisibili verò parte dolor pullatorius, ardor, febris, & denique partis ordinaria functio plus minus læsa inflammationem innunt; quibus in specie accedunt signa unicuique parti læsæ seu inflammatæ propria & specialia, quæ nempe aliter se habent in faucibus, aliter in pleura, aliter in pulmonibus, aliter in ventriculo inflammatis.

#### P R O G N O S I S.

Inflammatiō vel sua sponte recurrit, vel non recurrit: istud, quando sanguis nondum perfectè extravasatus aut congrumatus fuit, quin relaxatis fibris aut apertis poris idem stagnare incipiens denuo per venas regurgitat, sive purus fuerit, sive sordibus heterogeneis, in quandam partem depositis, & ita inflammationem occasionaliter inferentibus permistus; id quod probè notandum est in tumoribus partium criticis semper cum inflammatione junctis: dum non recurrit inflammatiō, omnis in genere vel discutitur, vel suppuratur, vel scirrhescit, vel gangrænescit.

Unde inflammationis Prognosis duo involvit: eventum ipsum, & morbi tempora. Eventus observatur bonus & malus: bonus scilicet, si inflammatiō seu materia peccans vel insensibiliter discutitur & planè dissolvatur (id quod fit imprimis ab operante & prædominante alcali, dissolvente sanguinem grumosum) & ita vel in alia vasa remeet, vel insensibiliter transpiret: est optimus & brevior finiendi modus, & inflammationi exiliori non adeò profundæ, & quæ à causa externa magis dependet, frequens est; hinc est iste, quando sanguis ille extravasatus non resolutus suppuratur, & abit in abscessum; id quod fit ex aliquali motu fermentativo acidi & alcali, quæ ambo coeunt in  $\Theta$ sum tertium: malus; & quidem toti aliisvè membris, si evanescat quidem, insensibiliter resolvatur inflammatiō, cum aliorum tamen symptomatum accessu atque incremento; parti verò affectæ, si in gangrænam aut scirrhum abeat. Nam ab acido nimis inspissante abundante & prædominante sanguis in tumorem penitus induratur ac in scirrhum abit, quod malum est propter tumorem contumacissimum & curatu difficilem; nisi enim scirrhi cautè & leniter tractentur, humores tales effervescentiam concipiunt, & faciè in carcerum exulceratum degenerant, cum cancer

occul-

ocultus & scirrhus dolens in paucis differant. Inflammatio verò ista, quæ ex omnimodo sanguinis & spirituum in parte motu impedita, & ita ejus mortificatione ac destructione in gangrænam abit, omnium periculosissima & pessima est, dum acido vitali spirituosissimo destructo sanguis & pars in putredinem dilabuntur.

Alias eventus boni & mali signa quoque petuntur

1. à subjecto, cujus intuitu inflammatio in juvenibus, & bonæ constitutionis hominibus, in parte externa & carnosâ, minus periculosa ac in senioribus ac cachecticis, in visceribus & membris nerveis.
2. à magnitudine, cujus ratione major & ampla inflammatio plus periculi, quàm minor, involvit.
3. à tempore & loco, quorum intuitu graviores, quæ anni tempore fervidioræ & in regione calidioræ, quàm quæ in aëre & locis temperatis aut frigidioribus emergunt.

### C U R A.

Positis his fundamentis facilis est accessus ad curam, pro qua in omni inflammatione in genere observandum est, ut sanguinis stagnatio tollatur, & motus naturalis & circularis restituatur in integrum; id quod fit, vel impedimenta quævis externa, sanguinis motum extrinsecus inhibentia removendo, vel internè sanguinis grumescentiam crassiorem, & acescentiâ corrigendo, sive eadem fiens præcaveatur, sive eadem jam facta resolvatur.

Adeoquæ quoad has

1. Sanguinis tenuitas & fluiditas conservanda, & circulus ejus concitator reddendus per sudorifera, præsertim alcalinæ naturæ tam fixa quàm volatilia: illa acidum absorbentia: hæc eundem positivè dissolventia & attenuantia, expectato sudore, optimè conducunt.
2. Fermentum vitiosum acidum in parte affecta corrigendum, aut quodvis aliud heterogeneum removendum; id quod tam interna quàm externa præstant.

Interna sunt absorbentia fixa, aut penetrantia volatilia cum sudore administrata, adeoque sudorifera, inflammationibus quibusvis conducunt.

Hæc inter autem sudorifera  $\Theta$ ia volatilia imprimis palmam obtinent, utpote cum hæc egregiam potentiam habeant coagulata & conglutinata omnia in corpore humano dissolvendi, eademque ad debitam fluiditatem deducendi simulque sudorem movendi. Ubi insensibilis discussio obtineri nequit per sola sudorifera, sed inflammatio persistit, tunc ad secundum scopum accedendum, nempe externis discutientibus seu aromaticis carminantibus:  $\Theta$ e volatili temperato constanti-

bus applicatis dissipanda est inflammatio. Quod si verò nec hæc sufficiant, tertius scopus in auxilium vocandus, & suppurantibus & maturantibus sanguinis extravasati ac coagulati in pus transmutatio maturè promovenda, & denique factus abscessus aperiendus, mundificandus & consolidandus.

Inter remedia ergò interna, ad inflammationes in genere proficua, nullo modo conveniunt purgantia, nisi interdum primas vias propter junctam sæpius febrem simpliciter blandè evacuare velimus. Alvo tamen incerto morbi adstrictâ clysteres injiciantur ex

sero lactis c.  $\mathfrak{z}$ ss. l.  $\mathfrak{z}$ ij. mellis: Vel  
 ℞. flor. chamomill. M. ij.

Coqu. in f. q. feri lactis:

Colatura  $\mathfrak{z}$ vii. l. ix. adde

Butyr. rec. c. vitello ovi

solus.  $\mathfrak{z}$ j.

mellis  $\mathfrak{z}$ ss.

M. f. Enema: S.

Abspulend Clystier.

Inter sudorifera conveniunt omnia urinosâ  $\Theta$ ia volatilia, quæ inter sunt:  $\mathfrak{a}$ q.  $\mathfrak{a}$ xi,  $\mathfrak{a}$ x, &  $\Theta$  volatile C. C. sanguinis humani, oss. humanorum, & similia. Item huc pertinent alia tali alcali occulto imprægnata concreta, acidum potenter absorbentia, v. g. animalium partes duræ, ut lapilli  $\mathfrak{g}$ rum, mandibulæ lucii piscis, dens apri, C. C. sine igne, ebur sine  $\Delta$ e, unicornu, lap. car pionum, &c. quibus adde  $\mathfrak{a}$  &  $\mathfrak{a}$  mineralia & metallica fixata, præsertim  $\mathfrak{a}$ ialia, &  $\mathfrak{a}$  diaphoreticum, it. bezoardicum minerale, tam simplex quàm compositum, & similia: quin & modò dictis addenda theriaca,  $\sim$  theriacalis, tam simplex quàm camphoratus, liquor C. C. succinatus, mixtura simplex & R bezoardica in principio inflammationis propinanda, præsertim si oriatur ista ex subitaneo corporis frigore quocunque post nimium ejus æstus; faciunt quoque huc omnes pulveres bezoardici vulgò dicti, Sennerti & quicunque alii, utpote quorum ingredientia non tantum acidum absorbendo & temperando, sed & sudorem excitando, suo modò inflammationes sistere solent.

His omnibus simul adduntur sperma ceti ac cancerorum lapilli cum aceto assumpti, & omnia vegetabilia vulneraria, alcali plus minus occulto temperato prædita, v. g. quæ ex chærefolio, bellide minore, flore sambuci, mentha, scabiosa, papavere rhæados fiunt remedia: item florum sambuci  $\sim$ , baccarum sambuci essentia & rob. nec non ex variis plantis antiscorbuticis aut similibus actib<sup>9</sup> partib<sup>9</sup> petita remedia, qualia sunt ex nasturtii speciebus, cochlearia, ex erysimo & similibus parata. Præ cæteris  $\sim$   $\Theta$ i dulcis, in specie cum spiritu flor. sambuci per fermentationem paratus, ad  $\mathfrak{z}$ ss. in  $\nabla$  chærefolii cum syr. pap. rhæados pro-



propinatus, ceu appropriatum remedium sudoriferum in inflammationibus quibuscunque internis, præsertim quando febris ardens acuta simul urgeat, admodum est commendatum remedium, quin & omnia Data, ratione febris conjunctæ conveniunt, tam Odepuratum quàm Odatum.

℞. ▽ scabios.

flor. sambuc. ana ℥i℥.  
~ theriacal. simpl. l. camph. ℥iij.  
dent. apri prap. ℥j.  
Θ vol. C.C. gr. xv. ad ℥j.  
syr. scabios. ℥vj.

M. pro duabus vel tribus dosibus: S.

**Beitheilende Mixtur auff etliche mahl.**

Uturpetur pro scopo sudorifero in principio inflammationum, habita ratione venæsectionis.

Quibus etiam pro circumstantiarum ratione opiata addi possunt. Aut hujus loco

℞. Unicorn. veri prap.  
maxill. luc. pisc.  
C.C. f. Δe ana ℥j.  
Θ vol. C.C. gr. xv.  
laud. opiat. gr. ij. vel iij.

M. pro duabus vel tribus dos. in haustulo vinicapiendis, expectando sudorem.

In incremento inflammationum, ubi ardor & calor urget,

℞. ▽ flor. sambuc.  
charesfol.  
papav. errat. ana ℥j.  
+i sambuc. ℥iij. l. ℥℥.  
maxill. luc. pisc. ℥ij.  
lapill. Θ prap. ℥j.  
syr. papav. errat. ℥j.

M. pro duabus l. tribus dos. expectando sudorem:

℞. ▽ flor. sambuc.  
card. bened. ana ℥i℥.  
+i sambuc. ℥vj.  
maxill. luc. pisc. ℥ij.  
lap. Θ prap. ℥℥.  
syr. papav. rhaad. rubi idai ℥vj.  
M. pro duabus dosibus.

Non sine ratione additur +; licet enim illud cum lapillis cancerorum effervesceat, non tamen penitus saturatur, sed hoc ipso lixivii naturam assumunt, & in saporem urinosum mutantur, ut dicit Helmontius, ac potentius vitiosa acida absorbere, sanguinemque grumofum mediante sudore dissolvere valent.

Vel: ℞. lap. Θ prap. ℥ij.  
ebur. f. Δe ℥j.  
laud. opiat. gr. ij.

M. f. pulvis pro duabus dos. in haustu vini Rhenani assumendis, vel in parvo cochleari +i expectando sudorem.

In progressu vel statu morbi, & imprimis, quando nimis urget juncta febris acuta,

Tom. II.

℞. ▽ flor. samb.  
card. bened. ana ℥iij.

℥ii diaphor. ℥j.

syr. card. bened. aut papav. errat. l.  
acetos. citri ℥j.

~ Qi dulc. q. s. p. grato sapore  
M. f. potio S.

**Rührend Stärck-Träncklein.**

Capiatur subinde cochleatim vel pro duabus dosibus observando, ut, quantum possibile, corpus in madore conservetur.

Sub sudoris defectu opiata non negligenda sunt, quæ figendo spirituum impetum, & hinc fibrarum nervearum solvendo stricturam, multum promovent sudorem.

Loco potionum istarum, in inflammationum incremento laudatarum, commodè etiam mixtura theriacalis ex theriaca & aceto usurpari potest. Hisce formulis jungantur binæ istæ mixturæ, quas habet Sylvius in sua Praxi l. I. c. 40. §. 28. & 43.

Fiunt etiam non rarò emulsiones, internè contra inflammationes sub morbi statu multum proficue, ex seminibus cardui bened. & Mariæ cum ▽ papaveris erratici paratæ, quibus adhuc adduntur appropriata, & diaph. sperma ceti, & similia supra dicta. Quod si inflammationes sint erysipelaceæ, imprimis adhibendum simul rob sambuci, quibusvis formulis additum; aut pro vehiculo pulverum usurpandum, ceu appropriatissimum erysipelatis remedium, præsertim quando motus naturæ excretorius deficit, nec debite erysipelas efflorescere potest. Porro pro dictis scopis observandum, solenne terè esse in omni inflammatione ingruente aut præsentè V. S. instituere; & rectè quidem, eamque subinde aliquoties repetere, idque secundum revulsionis, aversionis & diversionis leges & fundamenta alibi explicata. Id quod revera suum locum adhuc obtinet, debitæ ac selectis in locis instituta, absque tamen nimio ejus secundum alias nationes abusu, in casu quando nimis urget inflammatio & morbus admodum acutus videtur, in tali casu mox in principio, vel ante vel post sudorem prolicitum, convenit sanguinem mittere per V. S. ut immixto nonnihil sanguinis quanto facilius in loco stagnationis seu inflammationis per vicinos ramos distribui, & ita incrementum nimium inflammationis præcaveri possit; ita quidem, ut pro scopo revulsionis secetur in regione respectu cordis opposita, in principio sc. inflammationis; pro scopo verò aversionis secetur vena in regione respectu inflammationis eadem, sed loco paulo remotiore, in incremento nempe; pro scopo verò derivatorio secetur vena in loco inflammationis proximo, isto nempe, per quem ordinariò sanguis stagnans refluerè deberet, in statu nempe: utut non semper V. S. necessaria sit, nisi in insigni pletho.

(Yyy)

plethora, aut iis, qui consuetudine se manciparunt, ut statuto tempore inanes instituant V.S. In principio inflammationum, tam internarum quàm externarum, suadent applicare remedia repellentia, quibus volunt sanguinem stagnantem denuò repellere, vel urgere, ut retrocedant, id est; volunt sanguinem movere à termino ad quem ad terminum à quo, repellentia autem sic dicta partim impossibilia, partim sæpè nociva esse, ex hætenus dictis patet: nam stante sanguinis circulo, impossibile est sanguinem, qui per arteriam influit, per eandem ex loco stagnationis repellere; nociva autem sunt, quia repellentia quæcunque ordinariò ex refrigerantibus aut acidis, aut adstringentibus, & similibus composita sæpissimè inflammationes reddunt deteriores, aut ad scirrhus vel etiam ad gangrænam disponere solent: id quod imprimis in erysipelatibus notum est, in quibus curandis cautiore sunt mulierculæ, quàm Chirurghi, qui omnia humida prohibent, quorum timor sanè est inanis, cum V, sperma ranarum, & similia tutò applicentur erysipelati. Certè natura morbi contrarium vult: nam ubi stagnat sanguis, ibi partis tumor; ubi partistumor; ibi angustia vasorum sanguinis; ubi major angustia, ibi eadem non per repellentia aut similia est augenda, quin potius per discutientia aromatica, quantum fieri potest, minuenda, ut materia concreta possit promoveri & removeri. Intercipientia quod attinet, seu sic vulgò dicta defensiva, subinde sunt tolerabilia: sunt autem talia, quæ fermenti acidi vim aut progressum, absorbendo istud aut corrigendo, einendare possunt.

Externa sunt ea, quæ

1. Acidum absorbent, ut Saturnina & alcalina.
2. Sanguinem vi aromaticâ alcalina dissolvunt, & ita inflammationem discutunt.
3. Quæ temperando mutuum Sium effervescentium concursum suppurationem adjuvant. Quò factò
4. Abscessus aperiendus, ulcus mundandum, hinc consolidandum.

Mundificatio sit exacta, ne tantillum fermenti in ulcere corruptivi residuum recidivas inferre possit.

## ARTICULUS II.

De

### *Inflammatione Faucium.*

**Q**uod speciales jam attinet inflammationes, occupant hæc vel partes internas, vel externas; omnes enim corporis partes, ossibus exceptis, inflammari possunt, quippe his parum sanguinis advehitur. Internas ordine pertractabimus, externas Chirurgiæ relinquendo. Inter internas autem inflammationes se offerunt primo, quando partes faucium

internæ sæpè etiam cum externis, nempe pharynx cum summitate gulæ; larynx cum aspera arteria; fauces nec non tonsillæ in isthmo faucium sitæ; uvula; interdum denique musculi faucium & gulæ; musculi laryngis motui dicati, & similes partes vicinæ inflammantur. Inflammatio musculorum colli, in specie laryngis & gulæ, ordinario nomine angina appellari solet: quæ ita dicitur à Græco ἀγχη, strangulo, suffoco. Ab angina autem excipitur tonsillarum inflammatio, quæ ferè nostra existit, ac alias speciali nomine caret. Angina Barbaris aliàs Squinantia, Germanicè das Hals-Geschwür / appellatur. Malè prænella, die Bräune / quibusdam dicitur, cum linguæ saltem ardor, & symptoma sit, & simul quodammodo faucium, in febribus ardentibus familiaris. De faucium tamen omnibus ac partium huc pertinentium inflammationibus, cum habeant communem medendi rationem, conjunctim agere placet.

In angina fauces afficiuntur, i. e. ea pars colli imprimis, quam constituit pharynx seu gulæ musculosa expansio, & larynx seu caput asperæ arteriæ. Etsi enim ut plurimum utraque pars, tam pharynx quàm larynx, adeo quæ utriusque partis musculi, tam interni quam externi, utut nunc una pars magis, altera minus inflammantur; tamen pro majori acribia theoretica angina à Galeno & Tralliano in 4. species seu differentias, utut saltem speculativas, non autem practicas, curioso nimis, ut Galenus loquitur, verborum aucupio dividitur, nempe

1. In Synanchen, quando interni faucium seu pharyngis musculi inflammantur.
2. In Parasyanchen, quando externi faucium seu pharyngis musculi affecti sunt.
3. In Cynanchen, in qua internæ laryngis partes sunt inflamatæ; &c.
4. In Paracynanchen, quando exteriores laryngis & gutturis musculi sunt inflammati.

De quibus vid. Sennertus l. 2. Pr. P. 1. cap. 24. pag. 95.

Circa quas observandum est, in cynanche sæpius simul pulmones plus min⁹ esse affectos, unde etiam tunc temporis tam insignes respirandi difficultates solent adesse, quales in peripneumonia interdum contingunt, adeò, ut ægri canum more ore hiante respirent; vid. Deckers in Barbette Prax. p. 47.

Formalitas anginæ consistit in inflammatione, quæ nihil aliud, quàm sanguinis motus retrogradus ex partibus impeditus seu stagnatio est, unde intumescencia laryngis atque pharyngis, respirationem atque deglutationem notabiliter lædens, nullo alias in pulmonibus ac thorace existente vitio.

CAU.

CAUSÆ.

Causæ externæ crebriores, quæ in specie anginam inducunt, præter generales, sunt res ineptæ deglutitæ, quæ in faucibus hærent, & vel nimia mole eas angustando, & ita vasa comprimendo vel pungendo, vel acrimoniâ nimio opere irritando, ad fibrarum contracturam, & ad successivas inflammationes, hinc anginam, disponunt: sic à spina piscis in faucibus hærente, item ex partibus vitri devoratis & faucibus infixis, inflammationes & tandem abscessus faucium & gulæ notarunt Schenckius alique Practici: Ex potu ☿ aut similibus liquorum corrosivorum, inflammationes non rarò fauces & gulam esse, res per se est nota. Imprimis inspirata, ut ☿ externus, immediato contactu hæc loca irritantia & lædencia, multum conferunt. Ex simili, sed singulari, inspiratorum vitio, epidemica oriuntur hæc mala, ut plurimum maligna, cum non saltem miasma morbosum inspiratum in sui transitu fauces lædat, & acrimoniâ occulta tanquam tot infixis spiculis eas irriter, sed forsan etiam sanguinem certo modo alterando hunc ad facilem sui stagnationem, quin & inflammationem, & febrilem malignam fermentationem disponat; hoc modo enim observatæ fuerunt anginæ epidemicæ malignæ.

Ac in specie ad tonsillarum inflammationem & tumorem disponit lymphæ nimis viscida, glutinosa & spissa, eas infarciens ac tumidas reddens, ac naturalem sanguinis motum ac transitum per & circa glandulas impediens, unde successivè earum tumor. Quin & lymphæ per glandulas oris & vicinarum partium excreta nimis ☿sa, acris vel acida, ut in affectibus contingit catarrhalibus, excoriando aut rodendo dictas partes, nunc graviores nunc leviores inflammationes tonsillarum infert. Imprimis in hac tonsillarum inflammatione materia viscida, crassa ac mucosa linguam & fauces incrustat, ac subinde tenacis pelliculæ instare adhæret, ac nihil aliud est, quam lymphæ tonsillarum ac glandularum vicinarum vitata ac impura reddita, & glutinosa, à nutrimento dictarum partium chyloso, ob earum læsionem non ritè assimilato, ita alterata. Porro tonsillæ habent foramen amplum in summitate sui, quod hiat in fauces, & lympham salivalem non nihil glutinosam in fauces, & gulam emulget pro faciliiori deglutione: Quando ergo tonsillæ hæc sunt tumidæ & inflammata, foramina hæc insigniter sunt expansa & hiant, magisque inde conspicua fiunt unde ab imperitis Chirurgis interdum pro ulceribus tonsillarum in earum inflammatione habentur, observante hoc jam olim Schenckio in l. 2. obs. ubi de tonsillis.

Præterea inter causas externas ad tonsillarum & faucium inflammationes disponentes,

sunt in specie subitaneum frigus inspiratum, aut potus nimis frigidus post nimiam ac intensam corporis incalescentiam; his enim læsæ fauces & gula atque sanguis in istis spissior factus stagnando inflammationem inferunt.

Præter has causas externas ad anginam disponunt, consuetæ sanguinis evacuationes suppressæ, imprimis mensium ac hæmorrhoidum suppressio, idque speciatim in talibus subjectis, quæ ante hac jam angina laboraverunt, & ad anginam disposita sunt.

Pertinet huc morbi alius in Anginam transitus; quæ ratione dysenteria pravè curata aut intempestivè suppressa, præsertim dysenteria epidemica, uti crebrò pleuritidem, ita etiam anginam infert; qualia exempla non tantum recenset la Monier de fluxu dysenter. c. 5. sed & Hildanus Tract. de dysenteria observat.

Observantur interdum etiam anginæ epidemicæ, ut dictum, conjunctæ ut plurimum cum febre continua ardente, eaque in specie maligna, in quibus sanguis ita disponitur, ut facile stagnando det inflammationes: nam cum miasma morbosum inspirando imprimis attrahatur, hoc in transitu affigendo faucibus & laryngis partibus has ita afficit, ut imprimis istis in locis inflammatio oriatur, qualis fuit ista, quam tractat Bartholinus de angina Epidem. cujus quoque exempla habet Wierus in suis obs. Et singulare itidem exemplum anginæ admodum malignæ contagiosæ epidemicæ videbitis in Panarollo Pentec. 5. obs. 10. in puero, ubi parum mordendo digitos obstetricis mox in parte commorsa carbunculus excitatus, & obstetrix simul angina correpta fuerit.

Præter dicta in unclio Mercurialis pro cura luis Venereæ ineptè instituta inflammationem tonsillarum & faucium subinde infert, eamque satis periculosa, si nempe nimis copiosa sit salivatio, sanguis circa dicta loca stagnat, ab acrimonia caustica ☿ni, fauces vellicante, liquore lymphatico corrosivo easdem rodente, subinde graves faucium inflammationes, interdum suffocationes excitantur; quale exemplum observat Schenckius l. 6. obs. Conf. Tacchenius Hipp. Chym. c. 25. p. 225. & Sylvius de lue &c. Sane luis &cæ virus acre, ut speciatim lympham glandularum conglomeratarum inficit, ita & hujus ratione sæpissimè excoriationes ac inflammationes faucium, subinde perquam contumaces, infert; quod vulgò vocant angelauffene Halsse.

Vulgo etiam anginæ ex luxatione & compressione vertebrarum colli fit mentio: idque ob malè intellectum Aphor. 35. Sect. 4. Hippocratis: Si à febre detento repente collum intorqueatur, ut vix deglutiri queat, nullo tamen tumore intus vel foris apparente, lethale est. Hic enim aphorismus ordinariò intelligitur de angina ex luxatione vertebrarum colli, anasque



huic sententiæ dedit Galenus, quasi luxatio vertebrarum in eodem loco intelligatur. Sed structura & articulatio vertebrarum colli evincet, eas difficulter admodum luxationem pati, atque tunc paralyfin potius universalem, quam anginam, excitare. Nam in dicto aphorismo nil aliud intelligitur, quam convulsio colli, emprosthotono ac episthotono similis; utroque enim in casu suffocationis periculum imminet, cui si superveniat angina, seu tumor inflammatorius colli, lethale est.

Aliàs dividi etiam solent inflammationes tonsillarum, & faucium in exactam seu genuinam, & non exactam seu notham. Ista autem, quæ rarior est, tonsillarum inflammatio, quando solus saltem sanguis stagnans in dictis locis inflammationem infert, adeoque est, ut vulgò dicitur, vel sanguinea, vel biliosa; acutum malum est, de quo hæcenus dicta ferè intelligenda sunt. Hæc est, quando sanguis chylosus, seu, uti vocant, lymphâ glutinosâ permixtus, stagnando inflammationes infert, est tantum tumefactio serosa istarum partium plus minus cœdematosa, & excitatur ferè occasione lymphæ vitiosæ, glandulas dictarum partium malè afficientis, loca vicina rodentis, plus minus excoriantis, & ita junctam phlogosin inducentis. Et talis notha angina frequentius occurrit cum tonsillarum inflammatione, quarum tumor crebrius occasione vitiatæ lymphæ supervenit. Nunc febris expers est hæc notha, nunc lentam saltem junctam haber. Et de ejusmodi angina notha seu alba dicta, cæque satis periculosa vid. M. A. N. C. anno 6. obs. 152. pag. 218. Pertinere huc videtur rara anginæ quali membranosa species, quæ vid. in Sennerto Prax. l. 2. p. 1. cap. 24. & M. A. N. C. ann. 2. observat. 14. p. 31.

### DIAGNOSIS.

Quoad diagnosin; præter signa generalia omnium inflammationum, nempe calorem, dolorem, tumorem, & interdum visibilem ruborem faucium, quæ faciliè possunt conspici, si os aperiatur (nisi in cynanche, ubi vix tumor ullus apparet) in specie in incipiente inflammatione faucium & tonsillarum adest difficilis colli motus non absque dolore; item difficultas quædam respirandi propter vias angustatas: idque imprimis ubi larynx est afflictus, difficilis etiam adest deglutitio, imprimis ubi pharynx, minus verò ubi larynx est inflammatus. Et denique dolor ardens percipitur in faucibus, præprimis, si angina commune malum observetur, aut causarum quædam externarum præcesserit.

In facta verò jam angina signa sunt, (1.) Respiratio plus minus abolita, & non, nisi cum summa difficultate, reiterata, ita ut etiam, in quibus gravius afficitur larynx, us etiam suffo-

cationis metus subinde adsit, sine pulmonum & thoracis affectibus.

(2.) Deglutitio etiam notabiliter est impedita, ita ut etiam liquor in ore detentus vix gulam intrare possit, aut si assumi debeat, propter summam tamen faucium angustiam & laryngis irritationem denuò sursum per nates regurgitet, quam speciem adesse dicit in hydrophobia Josephus ab Aromatariis, utur pauci ei adstantur.

(3.) Dolor circa guttur & fauces insignis & admodum urgens, tam ardens & rodens, quam pulsans aut etiam crebrius pungens.

(4.) Febris quoque adest acuta & continua in angina, quamvis interdum typum tertianæ continuæ aut tertianæ productæ, seu cujus paroxysmi ultra 30. horas durant, habent, prout vel exquisita magis vel notha est angina. In illa est acuta cum pulsu in principio tensivo & quasi convulsivo, magno & undoso, instar pulsus peripneumonicorum, qui tamen in progressu, & in his, quos suffocatio vehementius urget, parvus & rarus, tandem creber ac inæqualis, magis observatur. juxta Galeni delineationem: *Angina pulsus tensione quadam præpeditus est & convulso similis, magnus & undosus, ut pulsus peripneumonicorum: quicunque vehementer ex illis suffocantur, habent parvum & rarum; ubi jam anginam agunt, crebrum & inæqualem.* In hac tamen subinde febris lenta conjuncta solet esse.

(5.) Lingua rubet, ac insigniter tumet; unde etiam ejusdem motus plus minus impeditur, ac faucibus anginâ præclusis sæpius simul è lingua filum viscidum propendit, seu copioso muco viscido ac glutinoso continuo obducitur, quod nihil aliud est, quam lymphæ ex glandulis, speciatim tonsillis affectis inspissata ac inquinata, nempe mucida, & amarâ & tenax, quæ successivè linguam & fauces incrustat; sæpius etiam est arida aut filia, interdum scabra.

Omnia hæc symptomata sunt periculosiora & graviora in angina, ut plurimum remissiora in tonsillarum inflammatione, vid. Riverius & Sennertus. Interim quæ pars magis laboret, an pharynx, an larynx? ex actionibus respirationis, item deglutitionis, & situ doloris ac tumoris, perscrutandum venit.

Tonsillarum quoque inflammationibus occasione lymphæ vitiatæ, spissioris scilicet & acidæ acrioris concitatis, febris continua, sed magis lenta, est junctæ, fauces quidem rubent, sed magis inflammatae sunt, tonsillæ verò tumidae insigniter prominent.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: inflammationes hæc tribus modis finiuntur; aut enim evanescent & retrocedunt subito, aut discutuntur, aut suppurantur, aut ægrum suffocando interimunt:

Et

Et si suppurantur, in specie tonsillarum inflammationes, abeunt interdum successivè in ulcera diuturna, & difficulter curabilia.

Quod si ex dictarum partium inflammationibus mori contingat ægro, ut plurimum suffocatus interit; & quidem duplici ratione: vel à tumore, vel pure ad pulmones defluo, vid. Forestus *l. 15. obs. 25.* de angina in pus mutata, quod ad pulmones & pectus ruens ferè suffocavit ægrum.

Quò magis faucium est angustia & spirandi difficultas, eò periculosius malum; ut plurimum enim intra quartam diem strangulat; interdum verò, sed rariùs per modum criseos, sudore, hæmorrhagiâ, aliòve modò terminatur: Refert exemplum Forestus *l. 15. obs. 14.* Cynanches verè quarto die per fluxum mensium criticum curatæ; vid. Hippocrates *Prognost. Text. 23. §. 3. 4. 5. Coac. Prænot. S. 3. §. 96. S. 4. aphor. 45.* Contra, quo magis ad extra tumor fertur, ut respiratio liberior fiat, v.g. in parasynanche, ubi exteriores laryngis musculi magis inflammantur, illi cum rubore & tumore colli externo, & interdum ad pectus extenso, si cum tumore magis interno, sed exili: media ratione se habet synanche, ubi interiores laryngis musculi inflammati ad fauces & collum plus minùs protuberant.

Quò verò fauces & cervix magis rubent, eò minùs periculi subest; partes enim magis externas inflammari indicio est; vid. Hippocrates *Prognostic. loco allegato §. 8. Sect. 6. Aph. 37. & S. 7. aphor. 49.* Qui textus, licet contradicere videatur observationi ejusdem Hippocratis, quam *Epit. libr. 5. tex. 36.* allegat, decidi tamen potest, distinguendo inter ruborem partium externarum, qui fit per metastasin, & illum, qui fit per epigenesin seu extensionem: quorum hic lethalis, ille minùs periculosus existit, vid. Laurentius *Avat. l. 5. Qu. 5. p. 148.*

Fit interdum, ut angina, tumore & rubore foris apparente per metastasin causæ peccantis in principio subito evanescat, sed in pleuritidem mutetur; quæ conversio est admodum periculosa, juxta *Coac. Prænot. S. 3. Text. 101.* nisi ad locum minus periculosum alium materia peccans conversa, aut criticè discussa fuerit, quod præprimis ex tolerantia ægri dignoscitur: Nam inflammatio, quæ faciliè & subito evanescit, ad interiores faucium partes recurrendo, suffocationem infert, aut alio in loco inflammationes periculosiores concitat: Sic Amatus Lusitan. *c. 5. cur. 73.* periculosum anginæ in pleuritidem transicum observat: vid. Hippocrates *7. aphor. 11.* Nam vel ad cerebrum transfertur, unde cephalalgia, deliria, phrenitis; vel ad pulmones, unde peripneumonia, pleuritis, vel ad cor, unde syncope; etiam ad alia loca, unde varia mala. Pertinet huc *Aphor. 10. Sect. 5.* Hippocratis:

*Quibus ex angina in pulmonem mali fit conversio, intra 7. diem moriuntur si verò hoc effugiant, empyrici evadunt.* Aphorismum hunc optimè explicat Lindanus; nempe ea angina, quæ est in arteria aspera circa laryngem, si suppuretur, ut magna ex parte fit, si contingat eam membranam, quæ succingit asperam arteriam, per materiæ suppuratæ turgescientiam & pravitatem rumpi, ut metastasis materiæ fiat in pulmones, intereunt intra 7. diem; inflammatur enim ab hoc materiæ decubitu pulmo, hinc peripneumonia; aut suppuratur pulmo, unde empyema: Conf. Hippocrates *Prognost. Sect. 23. Text. 15. & Coac. Prænot. S. 3. Text. 105. & Forestus lib. 15. obs. 24.*

De cætero ex sputo quoque citiùs tardiùsve prodeunte in angina salutis & mortis signa petuntur: dum anginosus, si non brevi cocta expuant, lethale, juxta *Coac. Prænot. Sect. 3. §. 141.* ut si nimis arida sputa fuerint, §. 101. In anginis sine signis (nempe coctionis in sputo quasi criticis) dolores in caput conversi, lethale inquit Hippocrates. Nam cum sine crisi à materiæ translatione fiat, manente eadem faucium angustia morbum non imminui, sed augeri indicio est: vid. *Coac. Sect. 3. §. 112.* item si ad alias partes sine ejusmodi signis dolor extendatur, v. g. ad crura, hypochondria, juxta §. 113. & 114. & *lib. 5. Epidem. Text. 36. §. 12.*

Febris cum angina conjuncta sæpius est continens, seu eodem tenore continuo ægros affligens; interdum typum tertianæ continuæ repræsentat; interdum hemitriteos.

Ista angina, quæ è tertiana continua producta seu cujus paroxysmi 36. horas perdurant, ut plurimum solet esse lethalis, observante Lindano in *Hartmannum.*

Quo minùs oculis consistit tumor, tam in faucibus, quàm extra eas in collo, eò majus imminet periculum; quia internæ laryngis & pharyngis partes sunt obsessæ: quò magis verò ab extra conspicuus tumor, eò tutiùs. Observetur hoc contra perversum usum adstringentium & repellentium, quibus in principio adhibitis tumor cogitur, ut interiores partes magis occupet. Certè interna talis inflammatio paucis est tuta, unde ex omnibus anginæ speciebus omnium gravissima & periculosissima est cynanche, ubi musculi laryngis sunt inflammati; hinc paracynanche; levior adhuc est synanche; levissima omnium parasynanche.

Denique anginosus, sicut strangulatis & suffocatis, spuma circa os apparens sæpè lethale signum est, teste Hippocrate *S. 2. aphor. 43.* idque imprimis, quando cum tali circa os spuma magna adsit respirationis angustia insignis.

Tandem si in angina venæ raninæ incisæ nihil aut parum sanguinis fundant, malum signum est; contra si bene fluant.

## C U R A.

Hæc triplici innititur scopo: sc.

- I. Ut heterogeneous, si quod est impactum, v. g. spina, tollatur.
- II. Ut sanguinis stagnatio tollatur, ipsique motus naturalis restituatur.
- III. Ut, si illud fieri nequit, per suppurationem id educatur.

Priori indicationi quomodo satisfaciendum, ex Chirurgicis peti debet; nunc ratione secundæ observandum, illam perfici partim sanguinis missione revulsoriâ ac derivatoriâ, partim diaphoresi & attenuatione humoris impacti, per absorbentia & sudorifera. Uno verbo: Cura in omnibus est eadem quoad remedia interna, cum reliquis inflammationibus. Quoad externa verò, specialem merentur considerationem gargarismata, inunctiones, cataplasmata, & similia resolutiva, quæ in faucium, oris, tonsillarum, laryngis, pharyngis, uvulæ & similibus partium inflammationibus solent esse peculiariora.

Pro legitima ergò cura anginæ ac cognatarum inflammationum faucium observandum:

I. Internè in angina & reliquis faucium inflammationibus etiam omnia ea conveniunt, quæ aliàs in omni inflammatione, speciatim pleuritide in usu esse solent; verbi gratia, mixtura simplex, ~Θ dulcis, dens apri, & diaph. salia volatilia, &c. Sic Valeriola *obs.* 12. l. 2. refert, quod rasura dentis apri ad ʒj. cum ʒo amygd. dulc. & saccharo cand. propinata sit optimum remedium anginæ, non minus quàm pleuritidis. In specie quæcunque animalium excrementa seu stercorea præ reliquis eminentiam habent, & in specie à Paracelso & Hartmanno insigniter commendantur interno & externo usu in principio anginarum; imprægnata enim hæc, & imprimis avium excrementa, sunt Θe volatili nitroso quasi ammoniacali, quæ omnes inflammationes, discutendo & resolvendo sistunt. Præ cæteris v. g. sterco equinum, in specie eius *Sengsis* / ejusque expressus succus, vel hujus pomum in potu ordinario maceratum & expressum si assumatur, expectato sudore egregiè convenit, & anginam in prima herba detruat; id quod etiam de albo Græco ad ʒj. ut & de stercore ovium & caprarum, similiter affirmari debet; externè convenit nidus cum stercore hirundinum. Sanè hæc & similia remedia cum debito sudore, in inflammationibus administrata, in specie in paroxysmo anginarum, & quam diu ægri deglutire possunt, multum opis adferunt, quoniam febrem compescunt, sanguinem resolvunt, & ita inflammationem tollunt. Conveniunt ergò in omnibus à causa interna enatis imprimis acidum infringentia, sanguinem dissolventia, & mediante blando sudore partes abstergentia, quæ tempestivè adhibita sæpissimè sunt salutaria: c. g.

✱. ▽ *prunell.* ʒiij.

~Θi *dulc.* ʒß.

*dent. apri pulveris. vel lapill. & præp.*

*ʒi diaphor. ana ʒß.*

*laud. opiati gr. ij.*

*syr. semper vivi ʒj. M. S.*

*Schweiss: Tract.*

✱. *ʒi diaph. l. bezoard. min.*

*dent. apri, velebor. f. Δe l. max. luc. pist.*

*Θi ʒiati ana ʒj.*

*sacch. ʒij.*

M. f. pulvis. D. S.

*Kühl: Pulver.*

Urgente febrili siti convenit julepus è floribus papaveris eorumque R cum ~Θi dulc.

In horum usu, & quidem cum diaphoresi seu sudore persistendum, modò ægri illa deglutire possint, cum canalis ac syringa, quam Riverius *Pr. l. 6. c. 7. & c. 3. observ. 72.* pro alimentis & medicamentis per gulam ad ventriculum impellendis, non semper applicari possit, nec cum effectu adhibeatur.

II. In tonsillarum ac quibusvis partium oris anginis, & in genere in omnibus inflammationibus, semper simul lymphæ habenda est ratio, tam quæ nimis crassa, interdum simul acidula aut alio modo vitata, hinc inde partes ferè omnes oris internas densè incrustat, quàm etiam adhuc circa glandulas & in valis lymphaticis hæret; cujus vitii per medicamenta interna anticatarrhalia succinata, myrrhata, item volatilia, & absorbentia, ac similia succurrendum est; unde & liquor C. C. succinatus expectando sudorem in principio inflammationum tonsillarum est nobilis.

Cum his III. Si ita visum fuerit, mox ad V. S. accedendum erit in corpore plethorico sive ei præmittatur sudor sive ei postponatur, perinde est; nam interdum utrumque in angina benigna locum habet. Et quidem venæ saphenæ in pede propter revulsionem universalem, postmodum venæ in brachio alterutro vel utroque propter revulsionem particularem seu aversionem, & quidem in statu venæ raninæ sub lingua propter derivationem, instituenda est. Has inter V. Snes interdum una alterave sufficit, interdum omnes administrandæ sunt, & quidem deficientibus mensibus vel iisdem in fluxu suppressis, vel hæmorrhoidibus vel iis inflammatis, cum angina conjunctis, vel concurrente alio simili vitio, semper in pede secanda est vena, secus ac Forrestus *l. 4. & Sennertus Pr. l. 2. p. 1. c. 4.* rem sibi conceperunt. Cæterum venæ sectionibus solis non fidendum est, quoniam sæpius ægri, quando videntur meliores, subito non rarò suffocati intereunt, cujus rei exemplum notatu dignum videbitis in Barbette *Praxi l. 2. c. 1.* Quin etiâ præter remedia interna ipsa V. S. interdum aliquoties repetenda est pro circumstantiarum, subjecti, temporum anni, affectu ad jun-



adjunctorum, ratione, vid. Forestus *l. 1. c. 6. obs.* 16. in *Schol.* & Sydenham *de morbis acut. f. 6. c. 7.* ita ut, prout corpus est juvenile vel senile, prout plethora major vel minor, prout effervescencia febrilis impetuosior vel remissior, prout incrementum morbi acutius remissiusque, prout patiens sanguinis detractio- nibus magis vel minus adsuetus fuerit, eate- nus V. S. nunc semel nunc sæpius administretur, idque eò magis, quo minus interna reme- dia ob faucium occlusionem exhiberi pote- runt, cautiùs tamen in angina maligna insti- tuenda, & vix nisi in primo morbi princi- pio.

Cæterum quidam cum Veteribus etiam venarum jugularium sectionem suadent, quam commendatam ac illustratam videbitis in Ri- verii *Prax. l. 6. c. 7. p. 398.* Zacuto Lusitano *l. 1. Prax. Admir. obs.* 95. Bonetto *Mercur. compital. p. 15. §. 5.* Bartholino in *eleganti Tr. de angina puer. epidem.* imò Riverius modum eam administrandi prolixè tradit: verum sub- inde est periculosa, & nonnisi ab experto & erudito Chirurgo cautè peragenda venit, qui rariores apud nos sunt, hinc meritò ab illa ab- stinemus. Tutiores sunt cucurbitulæ scarifi- catæ cervici, scapulis, & mento admove- ndæ, vid. Zacutus Lusitanus *l. 4. obs.* 94. V. S. raninarum sub lingua tantummodo in statu morbi convenit, præmissis scilicet reliquis ve- næ sectionibus, quando inflammatio jam nul- lum ampliùs augmentum capit: Secatur tunc cum in finem, quia ranina sunt ista vasa, per quæ naturaliter sanguis reflueret, qui in locis vicinis stagnando inflammationem in- fert, uti etiam ita impeditur stagnatio, & re- vocatur in motum naturalem sanguis sectis venis raninis. Interdum sola hæc venarum raninarum sectio præcavet anginam, si acce- dente angina præservationis gratia mox ape- riantur, idque speciatim eo in casu, quo corpus non est nimis plethoricum, nec fervor ac ef- fervescencia sanguinis febrilis adeò intensa est, sed quando tantum oritur ex impedimento aliquo sanguinem in suo refluxu impedi- ente, si in tali casu mox in principio secantur raninæ, prævenitur malum: Huc etiam spectat, si hi- rudines venulis his applicentur, de quibus vi- deatur Zacutus Lusitanus *l. 2. Pr. histor. c. 12.*

IV. Observandum, in angina febrium malignarum symptomatice, seu quod ferè idem est ac angina epidemica nihil attenden- dum priùs quàm ut specifica ista malignitas corrigatur, & appropriatis sudoriferis, jun- ctis opiat, maturè discutiat ac ejiciatur; quoniam curato morbo, symptomata ferè spontè ac facilè acquiescunt. Et in tali casu locum non habent, aut saltem non nisi cautis- simè, & in primo principio antequam mali- gnitas debacchari incipiat, instituantur pur- gationes & V. Snes, ut rectè Petrus & De-

ckers *l. 4. p. 49.* monent. Quin potiùs præ- misso ferè clymate, solis sudoriferis & alexi- pharmacis studiosè est insistendum, quibus nempe ebullitio febrilis sedetur ac malignitas rejiciatur. Ipse verò Medicus caveat sibi in tali angina ab halitu taliter ægrotantium, ne ipse similiter ab hac malignitate corripiatur, cum ferè admodum contagiosa esse soleat.

V. In anginæ cura Vomitoria à quamplu- rimis insigniter commendantur v. g. ab Hart- manno in *sua Pr. Chymiatr. p. 130.* & Bartho- lino *de angina pueror.* & quidem monente Hartmanno in angina incipiente & confirma- ta; item à Rulando in *Empyr. obs. l. 2. p. 95.* qui sæpius cum fructu usus fuit iisdem. Ulti- mò harum singularissimum usum videre po- testis in Riverii *Praxil. 6. c. 7. & cent. 2. observ.* 10. & 24. *it. in C. 4. obs.* 60. qui V. a benedicta morbum non rarò intra biduū dissolvi perhibet. Verùm & laudè & vituperium merentur, & cautè admodum in horum legitimo usu pro- cedendum est. Duo enim sunt tempora, in qui- bus conveniunt vomitoria, nempe principium, aut periculosissimus status morbi. Quoad prin- cipiū morbi, subinde admodum proficua sunt vomitoria; fit enim interdum sæpe, ut dicit Lindanus, ut causa occasionalis remota an- ginæ sint vitiosa excrementa in stomacho & in primis viis stabulantia, in specie humor, quem vocant bilem æruginosam, in qua, uti notum est, peccat acidum imprimis, dum illa bilis subtilia & morsicantia effluvia mittit ad oeso- phagum & fauces, ubi ipsorum stimulo fit in- flammatio & angina. Quando ergò ægri te- stantur, se sub primo principio morbi percipe- re vitiosos sapes in lingua, æruginosum, acrem, amarescentem, plus minùs nidosum cum ardore quodam quasi sodæ, in gula quan- dam titillationem, seu quasi erosionem, flu- ctuationes in stomacho, nauseam, ac anxietates præcordiorum; in tali casu protinùs & au- dacter opera danda est vomitoriis, in specie ðialibus, imprimis V. benedictæ Rulandi seu infusioni ðiali, ut ita præcaveantur futura sym- ptomata, dum non tantum quoscunque vitio- sos humores ex ventriculo tollit, sed juxta vim emeticam etiam interdum sudorem movet: Ita quando gravitas in hypochondriis senti- tur, vomitoria itidem conveniunt. Præter- ea in angina maligna & epidemicè grassante, & quæ per contagium afficit ægrum, de qui- bus videatur Wierus in *observat.* non secus ac in peste vel febribus malignis contagiosis, opti- mum videtur consilium, mox in primo princi- pio interdum suppeditare vomitorium, ut po- te in quibus eorum usus est maximè necessa- rius, modò maturè administretur. Cæterum post primum principium conveniunt etiā vo- mitoria in periculoso morbi statu, nempe eo in casu, quando scilicet jam facta est suppuratio & symptomata maximè urgent, v. g. quando

fauces

fauces abscessu sunt praelusæ, dum propter angustiam & ineptitudinem loci, aut profunditatem situs, abscessus suppuratus scalpello aperiri nequit, quin potius ex tumore imminet suffocatio; aut si spontè aperiatur, metus sit, ne ruptus abscessus in pulmones irruat, & similiter ægrum suffocet, aut in stomachum irrumpat, & eundem insigniter vitiet. Tali sub anxio statu, ubi aliàs arcta sunt auxilia, ut abscessus aperiatur vi, ne desperatum relinquamus ægrum, ultimum quasi refugium est vomitus, quo quasi concutiat abscessus jam maturatus, & ita ruptus per superiora effundat, quod Riverius *cap. 4.* & Rulandus *observ. all.* confirmant.

Periculosum equidem est remedium, dum fauces occlusæ, provocare vomitum, propter suffocationis metum, quatenus Trincavellius *l. 5. c. 7.* testatur, sceminam quandam ex assumpta cassia secuto vomitu strangulatam fuisse; interim tamen satis tutum est remedium, quod est unicum, dicit Celsus. Quod si medicamenta vomitoria non possint semper deglutiri nihilominus tamen, si tantillum deglutire possunt ægri, sufficiunt infusa gualia; sin verò nil deglutire queant, vel plumâ deco illitâ subinde irritandæ fauces vel liquor vomitorius iisdem subinde instillandus, aut & vitæ melle exceptus faucibus illinendus. His enim modis ad vomitum provocatur stomachus, gula concutitur, & ita abscessus rumpitur.

VI. Purgantia quemadmodum in quibusvis inflammationibus internis, ita in angina quoque vix locum habent, nisi primas vias statim in principio pharmaco blandiore, progressu temporis clysteribus, evacuare mens sit, quos quotidie repetere convenit.

VII. In tonsillarum inflammationibus sæpius subinde recurrentibus, præsertim illa, quæ ex lymphæ vitio, v.g. scorbuto aliove simili habituali crebrius recidivat, præsertim ubi ætatis aut aliarum circumstantiarum ratione à priori malum non bene curabile existit, fonticulus brachio inustus convenientissimum est consilium præservativum. Sæpius enim evenit, ut qui semel in quadam parte inflammationem suppuratam fuerint passi, & forsan fermenti ulcerosi aliquid residuum manserit, & facili occasione ex irritatione undecunque tacta, præsertim in corpore cacochymico, mox recidivet inflammatio, idque faciliè in locis glandulosis; quibus in casibus pro cura palliativa fonticulus videtur convenientissimus, potissimum cum angina singulis annis repetente fonticulum sub mento à natura excitatum præservasse Zacutus Lusitanus *l. 1. Prax. Adm. obs. 96.* testetur. Unde non inconveniens erit, statim in angina principio post primam sanguinis missionem vesicatorium cervici apponere; vid. Riverius *Pr. lib. 6. cap. 7.*

VIII. Non confundendæ sunt inflammationes aliique faucium partiumque vicinarum tumores, sive à sanguine sive ab aliis contentis excitentur, cum Prunella, isto nempe linguæ & faucium symptomate, quod in febribus acutis, ac in specie castrensis seu Hungaricis, familiare est. Ut plurimum hoc evenire solet, ut omnes de angina tractantes Practici remedia contra prunellam usitata ad anginam simul consignent, faciliè cum legentis confusione. Et talia prunellæ dicata remedia sunt in specie ☿, sempervivum majus, prunella, mucilagines, sal \*, nitrum, butyrum, lardum, &c. quæ ipsa minùs anginis, nisi aliis temperata vel cautè applicata, convenire possunt.

IX. Externa remedia ipsis partibus inflammationis, faucibus, tonsillis, &c. applicabilia, uti sunt gargarisationes oris, litus, cataplasmata, unguenta & emplastra, & similia, eò sunt directæ, ut (1.) quantum possibile, resolvant & discutiant sanguinem stagnantem, & inde natam inflammationem; & talia sunt blanda incidentia seu penetrantia volatilia, &c. Scopus hic contrarius est vulgari methodo, quæ in principio repellentia, adstringentia, & refrigerantia, quæ tamen pessima sunt, suadet. Quod si tamen hoc fieri nequeat, (2.) ejus suppurationem seu maturationem adjuvent, uti sunt temperata & emollientia. (3.) Tandem maturatum abscessum aperiant, eadem aut acrioribus mista; item auxilia Chirurgica, aut denique vomitoria. (4.) Apertum abscessum purificent & consolident per vulneraria & adstringentia. (5.) Partem restitutam denuò firment, ac naturalem tonum ejus restituant, nempe per adstringentia, ne harum atonia in causa sit, ut sæpius recidivent inflammationes. In principio quidem ratione vulgaris medendi methodi in gargarismatibus resolutentia sola rarò usurpantur, sed adstringentia, nunc sola, nunc discutientibus addita, ut nempe internè partibus oris & faucium nonnihil adstrictis nunium tumoris partium internarum incrementum præveniantur, ne deglutitio aboleri aut suffocatio inferri possit: sed quàm præposterè hoc fiat, ex doctrina repellentium manifestum, ac præterea periculum est, ne hujusmodi adstringentibus superiora saltem loca proximè stringantur, tumor autem & inflammatio partium inferiorum sic intendatur, & ad interiora convertatur, hinc strangulationis metus inferatur, ut rectè comprobant Martianus in *Hippocr. l. 2. de morb. sect. §. 24.* Heurni<sup>9</sup> in *praxi de angina*, ac Sylvius<sup>9</sup> *l. 1. prax. c. 49. §. 58 & seq.* uti etià Deckers in *Comment. super Prax. Barbette p. 51.* ut taceam periculi, quod in angina maligna ex ejusmodi repulsione metuendum. Quoad gargarismatum usum observandum est, ea quodammodo suspecta esse, quia partes inflammatas nimis commovent, quæ tamen potius quietem postu-



Moderni, speciatim Walæus M.M. pag 66.  
& Deckerus *super Barbette prax.* p. 52. & it.  
Θ\*, ac similia volatilia gargarismatibus ad-  
dere jubent; sicut etiam gargarisma ex succo  
semper vivi majoris, in quo parum Θ\* disso-  
lutum sit, insigniter confert: Alii ceu experi-  
mentum commendant ∇ destillatam ex succo  
semper vivi majoris, in qua Θ\* dissolutum,  
Tom. II.

2. Conveniunt ea, quæ emolliunt, scutu-  
morem, qui discuti nequit, ad abscessum &  
murationem perducunt: cum quibus sem-  
per asperitatem faucium & dolorem arden-  
tem ac rodentē mitigantia, socianda veniunt.  
Conveniunt igitur temperata quævis, v. g. al-  
thæa, malva, melilotus, chamomilla, violaria,  
caricæ pingues, rad. lil. alb. alch. passulæ, ju-  
jubæ, mucilago dictorum seminum & radicū,  
flores malvæ arboreæ, semen fœnu Græci, me-  
dulla panis triticeï, gummi ammoniacum,  
ungu. dialth. resumptivum, emplastrum de  
meliloto, diachylon, decoct. hordei, lac te-  
pidum, ʒ. amygd. d. ʒ. liliorum alb. chamo-  
melinum, anethinum, violarum, irinum, ovo-  
rum, ʒ. decoctionis exuviar. serpentum, bu-  
tyrum recens, vitella ovorum, pingu. caponis,  
gallinæ, human. porcin. vel ubi fortius agen-  
dum, locum habent pinguedo anserina, cepæ  
imprimis sub cineribus coctæ, cataplasma ex  
pane triticeo cum melle, cinis hirundinum,  
cochlearum combustarum, cancerorum flu-  
viatilium, noctuæ; nidus hirundinum cum  
stercore est optimum pro omnibus & quasi  
universale ad anginam, tam resolutioni, quàm  
suppurationi abscessus inserviens, non secus  
ac alia stercorea, in specie canis, item hiru-  
ndinum, gallinarum, columbarum, equinum,  
&c. conveniunt; illa ipsa enim, quia multum  
Θ \*ci quasi nitrosi continent, propterea plu-  
rimis scopis satisfaciunt: Item detineri poterit  
in ore medulla cassiæ, ut sensim liquefiat, vid.  
Riverius l. 4. p. 284. Rulandus cataplasma  
ex fermento & melle & flor. chamomillæ,  
(Zzz) aceto,



aceto, & oleo ex stercore canino & melle, ex stercore caprillo, aceto & melle; item ex absinthio contuso & pinguedine porcina eundem in finem commendat.

3. Abscessum jam factum & apertum mundificant & consolidant simplicia vulneraria eorumque decocta, imprimis cum aqua ferrariorum, addito melle, alumine, &c.

4. Sublata angina & consolidato abscessu, aut discusso tumore, si necessarium fuerit, ad partes roborandas fiat decoctum ex herba prunellæ, plantag. & flor. rosarum in vino decoctis; quibus addendum rob. dianucum, diamoron, rob. caricar. succus acaciæ, citri, granat. syr. granat. syr. de rosis siccis, myrtillor. cydonior. &c. q. s. pro gargarismate blandè adstringente. Adstringunt etiam myrtilli, rhus, gallæ, flor. bellidis, balaustræ, cortex granator. jugland. folia rubi & myrti, uvulariæ, plantag. O. phlegma Ois, phlegma Oli, ∇ nucum jugland. destillata, ∇ prunellæ, plantag. ∇ ferrariorum, solani, bursæ pastor. aut alio convenienti vehiculo dilutum; item sacch. hni, cerussa, &c.

Interim toto morbi decursu potui ordinatio semper  $\Theta$  probè depuratum aut  $\hat{\Theta}$ atum addatur, seu optimum febricitantium ac impensè sitientium ægrorum auxilium, ita ut ad  $\text{lbij}$ . potus misceantur nitri  $\text{zß}$ .

Ex hisce variæ possunt fieri formulæ: sic enim v. g. pro gargarismate sufficit vel solum decoctum raparum, quod egregium est in principio harum inflammationum, vel quod melius est, adde parum  $\Theta^*ci$ , aut si in principio ardor adsit, nitri parum: Item eminet hîc in principio gargarismus Sculteti, ut & in incremento, revera polychrestus, quem videb. in *Armam. Chirur. obs.* 32. inhibet nimium tumoris incrementum, mucilaginem fauces oblinentem egregiè solvit & foràs elicit, & denique abscessum rumpit.

Convenit etiam in principio & incremento inflammationis gargarismus Hartmanni quasi catholicus in *Pr. Chymiatr. c.* 85. §. 3. p. 726. resolvens & discutiens, quem commendat in omnibus ferè faucium affectibus.

Ubi viscidior mucus, præsertim in tonsillis inflammatis, adfuerit, sem. sinapi vel saponis Venet.  $\text{zj}$ . ad  $\text{ziii}$ . similiter decoqui poterit; sicuti, ubi acrior videtur talis gargarismus, cum leni expressione colaturæ sacch.  $\text{zj}$ . ad  $\text{ziii}$ . aut mellis, l. simpl. l. rosac. addi potest; est enim egregium in incipiente & augmentante angina: ad imitationem Decker. in *Comment. ad Barbette Praxin* tale gargarisma in principio & incremento inflammationis præscribi poterit, v. g.

- ℞. herb. hyssop.
- flor. sambuc.
- chamomill.
- herb. melilot. ana M. j.

sem. sinapi  $\text{zß}$ . ad  $\text{zj}$ .

passul. min  $\text{zß}$ . l.  $\text{zvj}$ .

Coquantur in s. q. ∇ a simplic.

Colat.  $\text{lbj}$ . ad  $\text{lbjß}$ . adde

v  $\text{zj}$ . ad  $\text{zjß}$ .

(vel hujus loco  $\sim \Theta^*ci$   $\text{zj}$ . l.  $\Theta^* crudizß$ .)

M. pro gargarismate:

Resolvirend Gurgelwasser.

Confer. quoad talia gargarismata discutiencia, Deckers in *Comment. ad Barbette. pag.* 19. §2. §7.

Vel in decocto quodam diluto dissolvatur q. s.  $\Theta^*ci$  &  $\Theta^*ci$ , ut ita sui juris fiat  $\Theta$  volatile, ac ita penetrare queat, addito pro temperanda volatili acrimonia aut melle rosato, aut syrupo violarum, aliove simili temperante. Sanè loco gargarismatis domestici optimè in his calibus convenit decoctum hordei vel avenæ, in quo parum  $\Theta^*ci$  dissolutum est; imò sola  $\square$  humana calida aut calefacta loco gargarismatis adhibita multa composita superat.

Præter talia gargarismata resolutentia, ulterius etiam externa pro similibus scopis in usu esse solent; v. g. pro discutiendo & resolvendo tumore convenit cataplasma supra laudatum ex absinthio rec. contuso cum pinguedine porcina, quod Rulando p. 101. in principio & incremento est egregium; vel sterco caprillum cum aceto & melle; vid. Rulandus p. 98. Insuper appropriatissima cataplasmata, in principio & incremento morbi convenientia, parantur ex nido hirundinum & albo Græco. Pro scopo autem resolvendi & discutiendi nidus hirundinum cum vino coquendus. In omni inflammatione specificum est sequens oleum, tam in inflammationibus à frigore, quàm calore ortis.

℞.  $\hat{\Theta}$ is citr. pulveris.

$\Theta^*ci$  ana  $\text{zj}$ .

Probè mixta liquefiant blando igne in lebetes; massæ frige factæ & pulverisatæ affundantur

Oleum amygd. dulc.  $\text{ziii}$ .

camph.  $\text{zß}$ .

stent in digestionem per tres dies:

adde

flor. hyperic. M.  $\text{ß}$ .

Iterum digere, & usui serva.

℞. Oleum amygd. dulc.  $\text{zj}$ .

$\sim \Theta^*ci$  q. l. pro consistentia lini-  
menti.

M. D. S.

Zertheilend Salsblein.

Quod extrinsecus locis tumentibus calidè crebrò illinendum.

Vel ex terebinthina, cum  $\Theta$  volatile  $\square$ æ aut  $\Theta^*ci$  malaxata, & hinc cum unguento dialthæ, emplastro de meliloto mista. Vel

℞. Empl. de melil. q. l.  
malaxetur c. Oleo Philosophor.

Vel

Vel *Ol. destillat. succini* aut *cera*.

D. S.

resolvend *Plaster*.

Externè enim applicatum incipientes inflammationes tonsillarum & faucium tollit & discutit. Vel

℞. *Ungu. dialth. comp.* ℥ij.

*Oleum lil. alb.*

*chamom. ana* ℥℔.

*Philos. vel succin.* ℥ij.

M. pro Linimento externo, S.

resolvend *Sâlslein*.

Quod si verò nequeat discuti talis tumor, in progressu morbi pro maturando abscessu, ob dolorem & excoriationem faucium & phlogosin, nil, quod tantillum acre sit, sed simpliciter dulcia temperata emollientia adhibeantur, ne dolores exacerbentur. Quo in casu in incremento & statu tale convenit gargarisma temperatum emolliens ad suppurationem disponens.

℞. *Rad. liquirit.* ℥℔.

*ebuli.*

*ireos. ana* ℥ij.

*flor. chamom.*

*rosar. r.*

*hyperic. à P.* ij.

*daëtyl. no.* iij.

*ficum. no.* j.

*sem fœnugrac.* ℥ij.

*albi Graci.* ℥ij.

coqu. in *Decocto rapar.*

colaturæ ℔℔. adde:

*Syr capill. Veneris*

*jujubin. ana* ℥j.

M. pro Gargarismate.

Nam propter dolorem & fauces excoriatas in progressu morbi vel minima acria sunt admodum dolorosa. In progressu ergo morbi talia dulcia ac blandè detergentia, & detergendo maturantia conveniunt.

℞. *Rad. alth.* ℥ij.

*liquirit.* ℥j.

*Herb. malv. Mj.*

*chamom.*

*melilot. ana* M℔.

*fic. pingv. incif.* no. ij.

*alb. Graci.* ℥℔.

Coq. in t. q.  $\nabla$  *comm.* vel *Decocto rapar.* vel *Serilactis*; ubi minor adest æstus & nimius dolor, ipso lacte cum  $\nabla$  misto vel lacte ebutyrato pro gargarismate: nam serum lactis & ipsum lac calidum in ore detentum potenter detergunt, dolores leniunt & abscessum maturant.

℞. *Herb. malva.*

*melilot. ana* M. j.

*rad. alth.* ℥j.

*fic. pingv. no.* vj.

Coqu. in t. q. *lactis*: aut ubi ardor & inflammatio intensior, in sero lactis. Colatura à ℔℔. ad ℔ij. usurpetur vel ita nudè, vel addatur

Tom. II.

*Syr. violar. vel mell. despum.* q. s.

cui, si materia suppuranda pituitosior ac viscidior fuerit, aliquid *sapon. Ven.* unà incoqu.

Præter ea gargarismata, etiam externè conveniunt emplastra, unguenta, & cataplasmata. Inter unguenta usitatum est unguentum dialthææ cum oleo chamom. vel amygd. dulc. Inter emplastra, emplastr. de melilotò: inter cataplasmata emollientia & suppurantia, v. g. sequenti modo communiter solent ordinari:

℞. *Medull. panis tritic.* ℔℔.

*rad. alth.*

*lil. alb. ana* ℥j.

*sem. lini* ℥vj.

*fœn. Grac.* ℥℔.

Coqu. in *lacte dulc.* q. s. ad consist. pultis; trajiciantur per setaceum, adde:

*Ol. amygd. dulc.*

*lil. alb. ana* ℥vj.

*butyr. rec. non*  $\Theta$  is. ℥℔.

*croci* ℥j.

*vitel. ovor. no.* ij.

M. applic. pro Cataplasma. omnibus horis repetendo: S.

*Erweichender Breynzum Halße.*

Temperata enim hujusmodi temperant acrimoniam  $\Theta$ ium in inflammatione suppurante effervescentium; & quò magis temperant acrimoniam, eò magis dolorem minuunt, & suppurationem promovent.

Cataplasma suppurans & discutiens cum myrrha vid. in *Hortii Obs.* p. 125. & 126. Vel

℞. *Cepam cavam*, immitte *Theriacam*, & impone.

Cæterùm appropriata hic magis sunt ea, quæ fiunt ex nido hirundinum, subigitur & coquitur cum melle, axung. porci, inspergendo *alb. Gracum*, & sic fit cataplasma, simplex quidem, sed admodum egregium.

℞. *Nidi hirund. cum sterc.* no. j.

*albi Graci* Mj.

Hæccoquantur in vino, in principio morbi, ubi discutiendum; vel in incremento & statu, ubi maturare & dolorem sistere animus est, in lacte: trajiciatur per cribrum, & sæpiùs applicetur instar cataplasmatidis colli & faucium regioni, quod admodum egregiè convenit.

Qui autem composita cataplasmata desideraverit. præscribat *cataplasma de nido hyrund. Mynsichth. in thesaur. scēt. ult. p. 524.* It. *Pauli Lutheri in Sennerto ubi de Angina* it. *Barbette & Deckers in Chirurg. ubi de Inflammatione. in specie de Angina. p. 55. & 58.* vel potest fieri tale cataplasma compositum.

℞. *Nid. hirund. c. sterc.* No. j.

*cepar. sub cin. coct.* no. iij.

*flor. sambuc.* M. ij.

(Zzz 1)

coqu.

coqv. in cerevisiavellacte.

Pulpæ trajectæ add.

alb. Graci ʒʒ.

& destillat. chamom. ʒʒ.

Cum s. q. olei chamom. coct. l. lilior. albor.

F. Cataplasma.

Loco cinerum noctuæ usurpari possunt cineres hirundinum : Vel

℞. Rad. alth.

lil. alb. ana ʒj.

cepar. sub ciner. coct. ʒvj.

nidi hirund. No. j.

ficum.

daetyl. ana no. iij.

alb. Grac. ʒʒ.

Coq. in s. q. Væ hordei.

Colaturæ lbj. adde

farin. tritic.

sem. lini.

san. Graci.

rad. alth. ana ʒj.

vitell. ovor. no. ij.

croc. orient. ʒij.

& chamom. ʒiij.

M. pro Cataplasmate.

Præmittantur his cataplasmatibus externæ inunctiones ex ungv. dialtheæ, vel aliis emollientibus supra dictis, & desuper cataplasma applicetur pro meliori operatione, quod toties repetendum & reiterandum est, quoties siccetur.

Suppuratâ his ipsis inflammatione pro meliori abscessus apertione fauces illinantur internè cum melle, vel solo, vel cui additum sit q. s. albi Græci, quæ probè permista & subacta illinuntur cum pluma vel penicillo; hoc namque admodum maturat abscessum, & suppurationem promovet: Vel mel aut sirupus de rosis siccis cum cineribus hirund. subactum, & abscessui illitum optimè solet maturare & aperire; aut etiam, si fieri potest, propter dolorem, parum Θ\* addendum est, & erit eo melius: item noctua combusta, cum melle mixta & illita, promptè abscessum aperire asseritur. Quidam commendant tanquam specificum ad anginam filum purpureum, cum quo strangulata fuit vipera. His ipsis si sponte aperiatur abscessus, res salva est: verùm si hoc non fiat, coquatur gargarisma ex sinapi in hydromelite, c. g.

℞. hydromel. lbj.

sem. sinapi ʒj.

Hoc coctum in ore detineatur & gargarisetur, donec abscessus apertus sit. A Sennerte in *Praxi*, ubi de angina, laudatur ad citò retolvendum; in suffocationis discrimine admodum præstans habetur.

Alii recipiunt ~ Oli, cui pluma leviter intincta, hæc ipsâ attingunt abscessum, ut ita rumpatur. Vel

℞. Vini alb. vel etiam Vfont. lbij.

Osli gutt. XXX.

M. D. S.

### Eröffnend Gurgelwasser.

Hoc sæpius gargarisetur ac eluatur iisdem os ac fauces; sic enim citò ruptus fuit abscessus, & est euporiston Rulandi in *Thesauro suo*.

Bartholetus ceusecretum ad rumpendum abscessum commendat cataplasma externè applicandum, factum ex cremore radic. ireos recent. cum butyro & Os violaceo, quod mirabili cum successu abscessum rumpere asserit.

Aliis irritis creatus, tussis, ac tandem vomitus provocandus est, qui abscessum non nihil aperiunt. Quibus etiam irritis, scalpello incurvato, si pateat abscessus, aperiendus & incidendus, ut à suffocatione liberetur æger.

Quod si suffocationis imminet periculum, aut modis hisce nec tumor, nec abscessus, removeri aut aperi queat, ne suffocetur æger, laryngoromia, quam Germani pavidè abhorrent, administrari potest; auxilium tamen aliàs est satis tutum, & absque ullo periculo conjunctum, de quò vid. Chirurgi Practici, v. g. Barbette in *Pr. &c.* Aperto abscessu tertio loco ulcus in faucibus mundandū & demum consolidandum est, pro quo scopo inseruit gargarisma ex V mulla, in qua aliquoties Oignitum sit extinctum, si eadem eluantur fauces: vel

℞. Decoct. hord. lbj.

mel. rosat. ʒij. vel ʒjv.

M. D. S.

### Reinigend Gurgel-Wasser.

Item adhibeatur decoctum plantag. cum rad. & foliis quercus vel mespilorum, cui mel aut rob. diamoron additum sit, quo purificant & consolidant: vid. Rulandus p. 98. ; Vel mixtura Timæi. 2. *Caf.* 1. sub linctus specie usurpanda; item decoctum veronicæ c. melle; quib⁹ in abscessibus contumacioribus & quæ consolidari nolunt, addatur parū ~ Oli, quantum saltè ad blandam aciditatem necessariū est, partim melius purificat, partim consolidat abscessum; utut probè observandum sit, quod sordida ac contumacia tonsillarum ulcera ordinariò ferè pro fundamento habere soleant luem Veneream. Vel

℞. herb. prunell.

veronic.

salv. ana M. B.

rad. polypod.

liquirit. ana ʒij.

alum. crud. ʒj.

mellis rosat. ʒj.

Coq. in l. q. V a simpl.

Colatura adhibeatur pro gargarismate purificante & consolidante.

Quod si



Quodsi propter latentem scorbutum ulcerata talia faucium sint contumaciora, optimum est, si mel rosaceum impraenetur cum  $\sim u$   $\Theta$ is benè rectificato q. s. ad suavem acefcen-  
tiam, quo ipso multa præstare possunt in fau-  
cium & oris exulcerationibus.

Quodsi sordidiora sint ulcera, ad  $\Theta$  recur-  
rendum erit; nempe vel ad  $\nabla m$  viridem Plate-  
ri, aut Hartmanni, quam videb. in ejus *Pr.*  
*Chym. cap. 52. thes. 4. & 5.* Quibus ipsis attingantur ulcera penicillo, & hinc vel gargari-  
smus vel litus cum melle rosaceo instituitur;  
vel horum loco recipiunt chirurgi unguentum  
*Ægyptiacum*, subigunt cum melle rosaceo,  
ita, ut acrimonia ejus non nihil temperetur.  
Hoc ipso cum penicillo attingunt & mundifi-  
cant ulcera, præsertim sordida, aut jam ad  
gangrænam declinantia. Consolidat post-  
modum talia ulcera decoctum veronicæ cum  
melle, quod eò potentius est, si de alumine  
aliquantulum simul addatur. Tandem & li-  
nimenta cum pauxillo aluminis pro consoli-  
dando abscessu non sunt incongrua, hinc ad  
imitationem Timæi von Gilden-Klee; in  
*Casib. lib. 2. c. 1. p. 78.*

\*. Rad. iros Flor.  $\mathfrak{z}$ ij.  
myrrha el.  $\mathfrak{z}$ ß.  
alum usti  $\mathfrak{z}$ ß. ad  $\mathfrak{z}$ ij.  
mell. rosati  $\mathfrak{z}$ ij.

M. F. Linimentum ulcera mundificata  
consolidans. S. . .

Heilend Gäl Wein zum Halse.

Tandem si necessarium fuerit, ad roborandas  
partes læsas in fine morbi fiat decoctum pru-  
nellæ, plantaginis & florum rosarum in vino  
decoctis; quibus addatur syrupus dia-nucum  
q. s. pro gargarismate blandè adstringente;  
Vel

\*.  $\nabla$  prunell.  
plantag.  
betonic. ana  $\mathfrak{z}$ ij.  
rob. nucum.  
dia-mor. ana  $\mathfrak{z}$ iß.

M. pro gargarismate adstringente.

D. S.

Stärkend Gurgel-Wasser.

Quod anginam notham seu pituitosam, aliàs  
albam, optimè hanc pertractat Mindererus  
in *Medic. milit. p. 202. & seqv.* in hac V. S. haud  
opus est, nisi in plethoricis, ne affluxus ma-  
jor contingat. Convenient potius in princi-  
pio sudorifera, & post hæc purgantia leniora,  
cum externis solventibus. Nempe ubi len-  
tor viscidus obsidet linguam, prodest abster-  
sio faucium mediante linteolo cum aceto, &  
fiat postea gargarisatio cum decocto florum  
ligustri, salviæ, & origani, rad. pyrethri, sem.  
sinapi, in  $\nabla$  cum paucis aceto, vel cum  $\nabla$  flo-  
rum ligustri & plantaginis, addita myrrha,  
particula  $\Theta$ \*ci, item juxta Deckers *Prax.*

*Barberr. p. 51. V &  $\sim \Theta$ \*ci*; sin vero aphthæ  
adsint, loco  $\Theta$ \*ci addatur On; loco aceti  
etiam succus sempervivi recens, acuatus cum  
 $\Theta$ \*co, utilis est pro abstergenda lingua.  
Quibus si tumor suppuretur, appropriata su-  
perius recensita substituuntur, vid. Senner-  
tus *lib. 2. Part. 2. c. 24.* Purificato ore succus  
sempervivi recens inungi potest cum rob nu-  
cum vel dia-mor. subactus cum paucis melle  
rosato. Collo verò exterius admoveantur  
resolventia, qualia sunt salvia, hyssopus, ser-  
pillum, flor. chamomillæ, radix levist. liqui-  
ritæ, &c. Quodsi verò ex inflammationis  
augmento & symptomatum circa vesperam  
exacerbatione in abscessum vergat, solventi-  
bus dictis adjungantur emollientia, v. g.  
herba & flores meliloti, violarum, rad. altheæ,  
malvæ, sem. lini, scenugr. caricæ, lac tepidū,  $\mathfrak{z}$ ß  
lil. alb. chamom. empl. de meliloto, &c. Ru-  
ptus abscessus vel sola  $\nabla$  mulsa, vel gargari-  
smus ex decocto florum rosar. plantag. veron-  
icæ, rad. liquirit. & consolidæ maj. cum  
melle simplici & rosato detergitur, & ad cicat-  
ricem ulque mundificatur.

## MEMBRUM I.

De

Aphthis.

In infantibus Aphthæ dicuntur Germ. Die  
*Schwämmigen* / quæ nihil aliud sunt,  
quam aliqualis excoariatio aut levis exulcera-  
tio omnium oris partium subinde & œsopha-  
gi ac ventriculi; id quod patet tunc in rejectis  
excrementis, cum quibus sæpius squamulæ  
rejiciuntur, seu leves quasi crustulæ.

### CAUSÆ.

Aphthæ succedunt ferè febribus ingenti-  
bus & æstuosis, suntque pustulæ, quæ succes-  
sivè in ulcuscula abeunt, & excitantur ex acri-  
horibus umorib⁹, & ferè istis febrib⁹ superveni-  
unt, quæ homines crudi ventriculi, seu qui sunt  
æuginosis seu porraceis recrementis referti,  
corripiunt. Hanc si Medic⁹ evacuare in tempo-  
re neglexerit, aphthæ necessariò sequuntur.  
Utut autem ventriculus purus sit, nihilomi-  
nus interdum aphthæ oriuntur, nempe à sali-  
va corrupta, à falso & acri humore. Quæ  
à ventriculo initium capiunt, in imis fauci-  
bus observantur; quæ verò ab ichore saliva-  
li corrupto, plerumque incrustare solent lin-  
guam, quæ tunc fit arida, pallida, viscosa &  
varia, prout peccant humores.

### DIAGNOSIS.

Aphthas futuras in morbo cognoscimus ex  
sapore & singultu; qui toto morbi decursu  
(Zzz 3) non

non dormiverunt, in soporem incidunt, & tunc aphthæ prodeunt: Singultus accedit, si sunt ex ventriculo, & tunc plerumque sunt deteriores.

### PROGNOSIS.

Pessima autem sunt, quæ ex ventriculo non purgato veniunt; totum enim ductum per gulam usque ad fauces obsidere solent.

Optimæ sunt albæ, quæ planè candidæ, fungosæ, molles; quando instar floccorum videntur tumere: Sed quando sunt glabræ, viscidæ, subsidentes, compactæ, tales significant morbum periculosum & diuturnum.

In infantibus discere possumus naturam aphtharum, quæ fiunt ex corruptione lactis; non raro namque corripitur infans aphthis primis septem diebus: nihil autem melius, quam lac ipsum præbere; inde enim absterguntur, modicè humectantur & molliuntur.

Sunt & aphthæ rubræ & molles, prioribus deteriores, lividæ, virides; nigræ verò omnium pessimæ.

Malum signum est, non facile coqui, emolliiri, humectari, & longo tempore siccas, aridas, compactas, planas æqualesque manere, & quidem diutius durantes.

Longum morbum significant aphthæ, quæ intra triduum veniunt & abeunt: Has enim sequuntur novæ, & tantò futurus est longior morbus, quantò Medicus frequentius purgat. Nil enim pejùs, quam sæpè purgare, eò tempore, quo aphthæ adsunt, vel etiam proximè adfuerunt.

### C U R A.

Curatio tota consistit in humectatione, quæ emolliat & leniter calefaciat. Cum verò aphthæ coctæ sunt, abstergere illas oportet vel spongiolâ alligatâ bacillo, vel linteaminibus; alterutrum intingi debet in decocto aliquo emolliente, flor. salvie in  $\nabla$  ferratorum decoctorum. Quando igitur lingua incipit exasperari id quod præcedit aphthas,

*℞. fol. sed. maj.*

Detrahatur pellicula ab utraque folii parte, hinc in  $\nabla$  rosarum imponantur, ut humida ferventur, postea imponantur linguæ ad humectationem.

Pari ratione adhiberi possunt folia portulacæ, aut mucilago sem. cydoniorum cum  $\nabla$  portulacæ extracta. Cum autem jam adsunt aphthæ, optimum est decoctum raparum, ex quo expressus succus imponatur linguæ, humectat & abstergit. Si parum salis prunellæ vel nitri addatur, ardorem simul restinguit. Vel  $\phi$  raparum, in quo saccharum quantum potest, dissolutum ori illinatur, vid. M. A. N. C. ann. 4. obs. 28. p. 73. Aut

*℞. herb. bellid. cum toto Mj.*

*ficuum pingu. no. ij.*

Coqu. in  $\nabla$  communis q. s.

Colaturæ adde

*℞. prunell. parum.*

M. D. S.

**Kühl- und reinigend Mund-Wasser.**

Quo humectentur fauces & lingua sæpius.

In maxima autem oris siccitate,

*℞. butyr. rec. insuls.*

Misc. cum saccharo cando rubro, ut f. instar boli, S.

**Lindernd Mund-Salblein.**

Teneatur in ore, emollit & abstergit.

Addi potest parum salis prunellæ.

Quod si ulterius progrediantur aphthæ, degenerant in ulcera oris successivè depascentia; quæ ipsa oris ulcera etiam ex aliis causis nata frequentius ferè curantur abstergentibus, quæ interest decoctum fol. ligustri, vel aqua destillata sub forma gargarismatis, vel sequens:

*℞. herb. veron. M. ij.*

coqu. in f. q.  $\nabla$  simpl.

Colaturæ adde

*mell. q. s.*

M. D. S.

**Reinigend Mund-Wasser.**

Addi etiam potest herb. plantag. effectum eò meliori: decoctum satæjæ in vino à quibusdam laudatur, sed suspecta; quia acris est, quasi ignea, potius prædicta condicunt, item phlegma  $\phi$ i cum  $\nabla$  prunellæ & plantag. mistum egregium & in ulceribus oris partiumque vicinarum: rob dia-moron, item dia nucum, detergunt & purificant ulcera: Quibus in malo contumaciori parum  $\phi$ li aut  $\phi$ is rectificati pro suavitate acida addi possunt, præsertim si scorbuticum subsit vitium. In hujusmodi ulceribus Gallicis optimæ sunt  $\nabla$  virides Plateri aut Hartmanni, de quibus supra dictum. Confer & Hildanus Centur. 6, obs. 15.

## MEMBRUM II.

De

**Uvula exulcerata.**

**P**AR ratio est uvulæ exulceratæ, undecunque etiam natæ, in qua etiam hæc ipsa remedia, in specie gargarismus Hartmanni *Pr. Chym. pag. 264.* polychrestus commodè usurpari potest, qui in affectibus ori communibus & angina est præstans.

Sicut de his & cognatis oris ejusque partium malis videatur citatus locus.

MEM-

MEMBRUM III.

ARTICULUS III.

De

Uvulæ Prolapsu.

**U** Vulæ verò prolapsus seu relaxationem optimè curare docet Hildanus *Cent. 2. obs. 21.* sicuti & instrumentum singulare pro uvula nimis tumente abscindenda describit Bartholinus *Centur. 2. Histor. 88.* Portione abscissa pro hæmorrhagia arcenda nonnunquam sufficit collutio vel pulvis adstringens, instrumento certo applicandus.

Aliàs recentem uvulæ prolapsus curant.

Recipiendo *fermenti c. v humect. 3j.*

*succini albi. 3j.*

*massich. 3j.*

Mixta vertici imponunt.

Item

℞ succini solum, vel unguent. Horstii ex gummi elemi cum eodem malaxatum bregmati applicant; vid. Wedelius *de Comp. Med. p. 181*; unà cum gargarismate & decocto florum ligustri cum nitro & sale prunellæ, Vel

℞. *Decoet. prunella lbj.*

Θ \*ci 3j.

*alum. crud. 3ß.*

M. f. Gargarisma:

℞. *Herb. prunell. M. ij.*

*plantag. M. j.*

*gall. pulverisat. 3ß ad 3vj.*

Coqu. in f. q. ∇ *simpl. vel ferrarior.*

Colaturæ 3xv. adde

*Syr. de ros. sic. 3iß.*

*alum. crud. l. usq. 3j. ad 3ß.*

M. pro gargarismate in prolapsu & faucium excoriatione.

Item Θ decrepitatum cum paucis pipere applicari potest uvulæ ita prolapsæ. Loco salis communis optimum est Θ \*, subinde uvulæ applicatum. Spiritum aluminis commendant alii.

Quod si simul uvulæ inflammatio adsit, optimum est decoctum herbæ aut rad. taraxaci: suffitus succini ore exceptus specificum est Rulandi: Velsemen cannabis in posca parum coctum & colatum, pro gargarismate adhibitum, est unum ex optimis remediis; vel rad. tormentillæ & uvulariæ herba anatica proportionem in cerevisia secundaria coctæ & colatura cum modico mellis edulcorata, adhibeatur pro gargarismate; Vel decoctum vineæ pervinæ cum vino paratum. Quibus si dolor ex irritatione aut dispositio inflammatoria exinde accedat, syr. dia-codii Montani parum modò dictis addi potest.

De

Inflammatione Stomachi, ejusque Abscessu.

**P**ost fauces non rarò quoque inflammatur stomachus, quæ inflammatio est affectus periculosus &, si quis alius, peracutus.

CAUSÆ.

Causas habet easdem, quas reliquæ inflammationes in genere: In specie interdum assumpta acrimia aut vitiosa: Sic etiam aciculæ deglutitæ subinde inflammationem ventriculi periculosissimam inferunt, de qua Hildanus *C. 1. obs. 34.* Inflammatur rarissimè ventriculus integer, id quod est malum adeò furiosum, ut penitus sit desperatum; aut saltim unum alterumve ejus orificium.

DIAGNOSIS.

Quoad signa: Inflammatio stomachi facile cognoscitur, imprimis ubi cum febre ardente acuta conjunctus est simul aliqualis tumor in præcordiis, circa ventriculi regionem sub costis nothis dolens insigniter, cum gravi æstu ejusdem loci, siti inextinguibili, corporis jactatione, & vigiliis.

Malum est, ut dixi, peracutum, superveniunt subinde deliria, it. convulsiones non rarò lethales, speciatim si orificium unum alterumve fuerit inflammatum, nauseant ægri, & assumpta ferè evomunt.

Non confundantur autem, sed distinguantur inflammatio ventriculi cum inflammatione lobi hepatis vel musculorum rectorum abdominis, ubi ventriculo incumbunt. Nam in ventriculi inflammatione ardor & dolor magis in profundo sunt; hepatis autem inflammatio magis circumscripta est; musculi verò recti externam abdominis in thoracis confiniis occupant regionem, ac dicta symptomata magis extrorsum vergunt.

Item inflammatio stomachi rarò est sensibilis, nec potest contingi; Loborum verò hepatis musculorumque abdominis nunc patent sensibus, nunc manu contrectari possunt.

Porro in ventriculi inflammatione sævissima & peracuta adsunt symptomata, secus ac in loborum & musculorum abdominis inflammationibus.

PROGNOSIS.

Ventriculi inflammatio est malum peracutum, ex quo pauci evadunt, tertio vel quarto die finiri solet, & ferè semper lethalis est, imprimis ubi in principio sunt vires infractæ.

Interdum, sed rarò ad suppurationem tendit; quo facto melius est, ut abscessus aperiat intra ventriculum, & per inferiora excernatur;



natur; quàm si extra ventriculum, intra abdomen effundatur, pus enim peritonæum aut intestina inficere, aliamve quampiam partem, & mediante gangræna ægrum interficere solet.

## C U R A.

Quoad Curam: hæc eodem modo se habet, atque reliquarum inflammationum in genere curationes. Ante omnia sudoriferis tumorem discutientibus insistendum est, in specie tamen cautio in V. S. ne adhibenda est, quod monet Forestus l. 18. obs. 1. ne plus, quàm opus sit, sanguinis evacuetur: Cum gravia symptomata affectum hunc comitari soleant, syncope etiam, ob dolorem vehementem & virium summam imbecillitatem. Purgatio verò in principio & progressu morbi non est adhibenda; irritando enim ventriculum magis malum exasperat, uti hoc confirmat exemplo quodam ab alio petito Forestus l. 18. obs. 31. de puella, quæ cum tertia die ab inflammatione ventriculi sumisset purgans, quinta die interiit. Clysmata tamen blanda & abstergentia convenienter injici possunt, vid. Forestus l. 18. obs. 31. Aliàs in cura primatum obtinent sudorifera.

Remedia igitur interna in principio & incremento sunt ex papav. rhæad. & carduo benedicto, imprimis ex ☉ parata, ut in specie ☽iatio; sicuti solo ☉, tam purificato quàm fixato, in decocto hordei soluto & sæpius propinato, curavit filiam suam inflammatione pylori laborantem Lindanus *super Hartmannum*. Unde illud possumus præscribere ita:

℞. Decoct. hord. ℥ij.  
☉ depur. l. ℥iat ʒβ.  
M. D. S.

## Kühlender Trank.

Præterea potui interserviat intulum aut decoctum liquiritiæ rasæ in ∇ simpl. cum successu adhibita in ventriculi inflammatione à Rulando, vid. *ejus Thesaur. pag. 175*. Conveniet & hoc præsertim cum ☉ depurato aut ☽i dulci in parva quantitate imprægnatum, sæpius haustum, non incongruum est ad inflammationes ventriculi; sicuti etiam spiritus nitri dulcis copiosè potest exhiberi. Porro mixtura simplex, & diaphoreticum, antihecticum Poterii, cum nitro depurato mistum & propinatum convenienter usurpari possunt. Saccharum etiam Saturni, item crystalli mineræ Saturni paratæ ex minera cum spiritu ☉i, cum ☽o acuato, sunt egregiæ; Vel

℞. ☉i depurat. l. ℥iat i gr. xv. ad ʒj.  
Antihect. Pot. ʒβ.  
Sach. li gr. v.  
M. f. pulvis prodosi.  
D. S.

## Kühl-Pulvergen.

℞. pulpa tamar. ʒij.  
☉i ☽lat. Tacch. gr. xv.  
bez. mineral. ʒβ.  
Cum syr. viol. q. i. f. Bolus: D. S.  
Kühl-Lattwerge.

Quoad externa inflammationi ventriculi convenientia, laudant quidam, imprimis Deodatus in *Panth. Hygiæ* succum canctorum fluviatilium, caluè una cum aceto subactum, in principio applicantes; qui tamen minùs convenit, quin potius proderunt cataplasmata vel unguenta ex plantis aromaticis in vino vel ∇ decoctis parata, ut ita partim discutiat tumorem, partim ad suppurationem blandè promoveatur. In principio fofus ex chamom. & rosis rubris imprimis convenit, in vino aut saltim aqua coctis, & crebrius applicatis; vel fiat fofus aut cataplasma ex foliis caulium rubr. scabiosæ, dentis leonis, ficubus, uvis passis & similibus, quæ in sero lactis decoquantur, & ita externè applicentur. ∇m plantaginis & solani cum saccharo Saturni pro fofu insigniter commendat Paracelsus ad curam inflammationis stomachi. Quod si ad suppurationem videatur vergere malum, fiat fofus vel cataplasma:

℞. fol. branc. urfin.  
rad. alth.

ros. rubr. ana Mß.

quibus ad putrilaginem coctis, adde

farin. hord.

flor. chamom.

sem. fen. Grac. ana ʒβ.

c. ☽o rosar. & chamomill. f. Cataplasma.

D. S.

## Erweichend Pflaster.

Quo tempore, præter scabiolam, & internè passulæ cum ficubus, malvâ, & similibus, in sero lactis coctis adhiberi possunt.

Tandem, ut citius maturetur abscessus, fiat cataplasma ex stercore columbino & fermento, ad imitationem Sennerti, quod fortius est, & ad apertionem abscessus disponit.

℞. sem. fenugr. ʒij.  
sterc. columbin. ʒij.  
ferment.  
mell. ana ʒj.  
☽o chamomill. ʒiβ.

M. pro cataplasmate, quod applicetur stomachi regioni inflammatæ. Quoad abscessum: internè convenit terebinthina, qua nihil melius est, quocunque modo usurpata; hæc enim cum ∇ absinthii mediante ovi vitello soluta, si bis tervè detur, resolvit, maturat, mundificat & consolidat abscessum, imprimis si cum aqua mulsa sumatur; sicuti etiam ∇, succus, syrupus scabiosæ & omnia ex herbis parata, internè frequentius usurpata, vel sola vel cum melle mista, simili modo conducunt & sanant quoscunque, præsertim ventricu-

tricoli, abscessus, ut is interiora versus aperia-  
tur. Quibus & spiritum tartari rectificatum  
nonnulli addendum suadent, e.g.

℞. ▽ scabios. ʒij.  
~ Qi rectif. l. carm. de tribus ʒj.  
Syr. de succ. scab. ʒiij.  
M. D. S.

Maturirend Träncklein.

Quodsi aperto abscessu jam genitū sit ulcus,  
usurpetur decoctum hordei vel hyssopi cum  
melle, item serum lactis aut lac chalybeatum,  
decoctum quoque rad. chinæ cum herba sca-  
biosæ paratum confert. Item cornu cervi u-  
stum, terra sigillata, bolus Armena, &c. O-  
leum seu balsamum mastichis cum oleo hy-  
perici expertum fuit in cultrivoro Prussia-  
co, de quo vid. Beckerus pag. 182. de cultri-  
voro Prussico.

℞. ▽ scabios. ʒij.  
menth. ʒj.  
cinam. ~ ol.  
✱ ana ʒvj.  
lapill. ʒ prapar. ʒj.  
ʒ diaphor. ʒj.  
extr. fl. hyper. ʒij.  
syr. de symph. Fern. l. scabios. ʒj.  
M. f. Potio: S.

Reinigend Träncklein Löffelweise.

Dosis cochlear. ij.

℞. Extr. flor. hyper. liquid. ʒij.  
bals. Peruv.  
ʒis anis. ana ʒj.  
M. D. S.

Reinigender Mund-Balsam.

Dosis gutt. v.

Cæterum Bartholetus *Tr. de Respirat.* ad  
aperiendum abscessum ventriculi ceu singu-  
lare hac in parte laudat lapidem pavonium  
seu malachiten, quem absinthium redolere  
dicit, abscessum ruptum in forma pulveris ad  
ʒj. assumptum simul mundificantem & con-  
solidantem. Verum cum nemo sciat, qualis  
hic sit lapis? miror, cur eum obtrudat.

Quodsi ex acerbis corrosivis aut similibus  
assumptis arrosus aut exulceratus fuerit ven-  
triculo, præmisso in principio vomitorio, la-  
dicinia, item terra sigillata, sunt convenien-  
tissima, it. tragacanthum in ▽ flor. rorismar.  
solutum, vid. Bartholinus *Cent. 6. Hist. 21.* Vel

℞. mucilag. sem. psyll.  
cydon.  
tragacanth. c. ▽ ros. extr.  
syr. violar.  
rosat. solut. ana ʒj.  
M.

Vid. Barbette in *Pr.* pag. 134. & 136.

Aliàs rarum malum est inflammatio stoma-  
chi, exempla tamen videb. in Amato Lusita-  
no *Cent. 3. Curat. 93.* Foresto *lib. 18. observ.*  
Tom. II.

1. 30. 31. item Zacuto Lusitano *Medic. Princ.*  
*lib. 2. Hist. 63.*

## ARTICULUS IV.

### De Inflammatione Intestinorum.

#### C A U S Æ.

Juxta stomachum etiam inflāmantur sub-  
inde intestina, quæ præter alias causas in-  
ternas, omnibus reliquarum partium inflam-  
mationibus communes, interdum pertina-  
cem & quasi iliacam alvi obstructionem, in-  
terdum herniam, interdum dysenteriam im-  
mediatè suppressam, interdum quoque ex-  
ternam læsionem, v. g. violentam contusio-  
nem, &c. præsupponunt. De ileo enim notum  
est, quod contumacem secum trahat inflāma-  
tionem intestinorum; sic de hernia quoque  
patet, quod intestina in loco hernioso ad in-  
flammationem perveniant. Inflāmantur in-  
testina tam tenuia quàm crassa, utut frequen-  
tius illa.

Ex causis externis non tantum à corporis  
incallescencia, Foresto *lib. 21. observ. 18.* sed et-  
iam abdominis refrigeratione, intestinorum  
inflammatio observata fuit, qualem etiam ob-  
servavit Rhodius *cap. 2. observ. 78.* ab incur-  
vata costa spuria, colon pungente.

#### DIAGNOSIS.

Quoad pathemata inflāmationis intestino-  
rum, quibus malū cognoscitur hæc est facilis  
& quidem sunt ea: quod in loco inflāma-  
tionis tumor quidam rotundus ac tactui re-  
nitens percipi soleat, quem veteres in specie  
chordapsum appellarunt, quia chordæ instar  
intestina convoluta ac indurata apparent,  
cui chordapso confirmato, cum sæpissimè  
iliaca passio superveniat, hinc factum est, ut  
chordapsum & iliaca passio pro synonymis  
habita fuerint, utut differentia intercedat  
ceu causæ particularis, & chordapti nomen  
traxerit ex traditione vulgari, quā instar  
chordarum intestina convolvi putantur.

Præterea in loco isto intensus ardor & ve-  
hemens dolor, in specie pullatorius, fixus,  
distendens, &c. percipitur. Gravis affectus  
est, habet cruciatus insignes, sed sicut sunt  
vehementissimi, ita brevissimè durant. Al-  
vus est occlusa, & podex non rarò strictissi-  
mè stringitur seu contrahitur, ut ne specil-  
lum admittat; interdum interiora versus re-  
trahitur, quod quando fit, signum est cer-  
tissimum, quod excrementa per os rejician-  
tur, & tunc vocatur ileus. Hoc si eveniat,  
clystere paulò ante immisso, ipse clyster per  
os redditur, quia intestina subinde superiora  
(Aaaa) versus

versus contorquentur. Febris adest acuta, lipyria, tepent extrema, uruntur interiora; præterea  $\square$  interdum supprimitur, venter ferè inflatur, respiratio est difficilis, vires languent &c. Quodsi tenuia inflammata sint intestina, omnia symptomata graviora & periculosiora esse solent, & situs doloris & caloris imprimis medium ventrem & regionem circa & infra umbilicum occupat, dolor & tormina ad superiora magis vergunt, stomachi distensio adest,  $\sim$  angustia, nausea & vomitus assidui, &c. Ubi verò afficiuntur intestina crassa, omnia symptomata nonnihil sunt remissiora, & situs peripheriæ intestinorum crassorum eorum affectum demonstrat; dolor enim ad hypochondria magis pertingit, vomitus non ita continuò durat, ac lumborum adest gravitas.

### PROGNOSIS.

Inflammatiò intestinorum in genere periculosum & peracutum est malum; quæ intestinum ileon occupat, periculosissima est, brevissimè durat, & non rarò intra biduum aut triduum cursum suum absolvere solet, & facilè ac sæpiùs in gangrænam & sphacelum intestina inflammata terminantur, quæ inde patent, quod subitò cesset omnis dolor: neque enim inflammationes internæ subitò cessare debent, sed tractu temporis.

Omnis ergò subitanea cessatio doloris infallibile argumentum est extinctionis seu mortificationis partis: sæpiùs etiam sine gangræna in ileum terminatur frequentius lethalem, unde perfectâ inflammatione intestinorum laborantes rarò evadunt ægri, sed sæpissimè intereunt.

Non rarò etiam in abscessum terminatur, cujus ruptura ad intestinorum cavitatem tutior est, quàm ad cavitatem intestinorum pus facilè evacuari potest.

### C U R A.

In cura tractentur leniter, ne irritentur erabrones, adeoque aut mortificatio aut ileus citiùs provocetur. Sanguis è secta in brachio vena revellendus, idque interdum etiam repetitis vicibus. Hinc si alvus aperta non sit, clysteres frequentes injiciantur, iique tales, qui non requirunt longum tempus ad præparationem, quia morbus præceps, sed sic  $\epsilon\upsilon\pi\acute{o}\rho\iota\sigma\tau\epsilon\upsilon$ . v.g. solum decoctum hordei cum melle, aut saccharo rubro, aut nitri depurati  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ ijj. Vel clysteres ex lacte parati cum saccharo violaceo, vel melle rutaceo, vel ex lacte cum succo plantaginis, aut etiam ex lacte cum  $\Phi\omega$  depurato; item clyster ex succo aut decocto cancerorum fluviatilium,

qui tamen magis in inflammatione intestinorum crassorum, minus in tenuium, prodest. Vel ad imitationem Barbette in *Prax. l. 4. cap. 7.*

$\mathfrak{R}$ . Herb. *semperviv.*

*savax.* ana Mj.

*tamarind.*  $\mathfrak{z}$ j.

*sem. melon.*  $\mathfrak{z}$ ß.

$\square$  *crud.*  $\mathfrak{z}$ ij.

coqu. in s. q. *decoct. hordei.*

Colat.  $\mathfrak{z}$ x. adde

*syr. rosat. solut.*  $\mathfrak{z}$ j.

M. pro clystere. S.

*Lindernd Clystier.*

Hinc leniendi causa externè applicetur cataplasma discutiens in lacte ejusvè serocotum. Præ cæteris commendatur hic à Lindano omentum vervecinum, animali vivo extractum, & ventriculidissimè impositum. Oportet igitur in eodem conclavi animal discindere, omentum extrahere, & leniter involutum immediatè abdomini imponere, pulvillis calidis superimpositis. Si dolor non cesset, aliud omentum imponatur, imò tertium. Item paratum balsamum ex oleo Saturni per destillationem, mistum cum oleo rosaceo, & externè inunctum, remedium est commendatum ab Hartmanno.

Quoad autem interna; ea sunt, quæ reliquis inflammationibus, in specie pleuritidi dicata, specialiter ergo conveniunt, præter diaphoretica & discutientia,  $\Phi$ ata,  $\sim$   $\Phi$ i dulcis, &c. qui certè egregius est. Oportet internè simul dare anodyna, v.g. laudanum opiatum, quibus si dolor successivè remittat, & somnus succedat, salva res est; si non, & delirium sequitur, mors certa: sin dolor subitò cessaverit, & gangræna supervenerit, æger brevi moritur. Commodè etiam videtur præscribi posse mistura elegans Barbette, quàm habet in *sua Praxi cap. 7. lib. 4. pag. 231. ubi de ileo; Vel*

$\mathfrak{R}$ . Card. ben.  $\mathfrak{z}$ ijj.

+ *sambuc*  $\mathfrak{z}$ ß.

*succ. sempervivi maj. depur.*  $\mathfrak{z}$ j.

*rob. sambuci*  $\mathfrak{z}$ ij.

*bezoard. mineral.*  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ ß.

*syr. de portulac.*  $\mathfrak{z}$ j.

M. f. Potio: S.

### Bertheilende Mirtur Löffelweise.

Item saccharum Saturni, aut oleum Saturni p. d. paratum, similiter conveniunt internè.



ARTICULUS V.

De

Inflammatione Ani.

CAUSÆ.

Cæterum juxta intestina frequentissime eorum extremitas seu recti exitus, anus, etiam inflammatur; idque à violentia causæ externæ, contusione nempe, aut vehementi concussione, ut ex equitatione nimia, quale exemplum observatur in Foresto lib. 23. observat. 13. item ex irritatione externa per acria facta, quando nempe adhibentur chartæ vitriolatæ aut piperatæ podici pro anitergio, quale exemplum habet Platerus; vel ex interna causa, inter quas imprimis hæmorrhoides suppressæ, aut etiam cæcæ, inflammationem in intestino recto seu ano excitare solent.

DIAGNOSIS.

Signa autem ani inflammati sunt dolor ejus insignis pullatorius, qui propter arterias hæmorrhoidales & sanguinis impeditum motum sequitur, & tumor nunc magis nunc minus sensibilis.

Dolor quoque ac sensus ardoris nunc in profundo seu parte interna, nunc in parte magis externa hæret, in qua palpari potest digito non immisso, sed externè applicato aut ano pressio, interdum tumor oculis inspicitur potest.

Peculiariter quoque foramen seu podex ipse, circulus nempe ultimus intestini recti, introrsum versus retractus percipitur, alvus difficulter redditur, accedit febris, &c.

PROGNOSIS.

Quoad eventum, inflammatio hæc ani sæpè est periculosa, & nisi maturè discutitur, ritèque tractetur, in gangrænam, aut in abscessum abit, & hic in fistulam difficillimæ curæ; quæ fistula interdum penetrat in vesicam, hinc crepitus & stercorea subinde per vesicam emittuntur.

CURA.

Quoad curam, mox in principio oportet revellere sectâ venâ in brachio, & hinc ante aliorum applicationem opera danda est, ut protinus alvus solvatur & aperta servetur. Fit hoc quidem cum aliquali dolore & inflammationis aggravatione; omnia tamen hæc symptomata graviora fiunt, si feces retentæ aut induratæ postmodum excernuntur: ob id ergo protinus clyster leniens & emolliens ex lacte, ac etiam ex alio decocto emolliente in lacte paratus, vel ex decocto foliorum & florum verbasci, parietariæ, & foliis me-

Tom. II.

liloti injiciendus; addatur saccharum. Quod si verò induratæ jam sint feces, 3j. Ois gemæ, potenter dissolventis easdem, addenda. Quod si unum clyisma alterumvè injectum & rejectum non sufficiat, aliud injiciendum cum oleo rapistri seu rapi sylvestris & lini mistum; hoc enim est appropriatum, & sic præcavetur abscessus; suspensa autem quasi manu & blandè clyisma applicandum, ne dolor & ardor augeantur. Sin verò minus externa talia scopo suffecerint, aut clysmata nequeant injici ex metu majoris irritationis, convenientissimum erit, ut per blanda passulata aperiat alvus, & fluida servetur, acria enim quæcunque, fortius intestina stimulantia, ac inter ea imprimis laxativa resinosa, fugienda, ne horum visciditate malum redatur pejus; hocque probè observetur in fistulis ani, quæ per resinosa semper solent exasperari, ac proin passulata lenientia sufficiunt.

Externè foveatur anus cum decocto agrimonie & menthæ Saracenicæ ex  $\nabla$  & aceto, vel cum vino coctarum, quod est appropriatum discussivum in inflammatione ani; vel decoquantur hæc simplicia in  $\nabla \Psi x$ , in specie si metus gangræne imminet, vel etiam  $\nabla$  calcis vivæ, in qua ebullierit chamomilla, commodè adhibetur; folia etiam & flores verbasci in  $\nabla$  l. sero lactis cocta pro fotu itidem egregiè conveniunt ad huiusmodi calidos abscessus; quibus folia solani & portulacæ, aut etiam si dolor nimis urgeat, commodè parum fol. hyoscyami simul addendum est, cautè tamen; mucilago seminis psyllii aut cydoniorum cum  $\nabla$  temper-vivi extracta, addito saccharo Saturni, & applicata, est utilis. Sin acrimonia orta ab acribus externis, nil melius est quàm lac, vel simplex vel cum linaria, chamomilla, ac floribus sambuci decoctum, & in forma fotus vel cataplasmatidis calidè admotum: item lac cum albumine ovorum agitato mistum, & ita pro fotu applicatum, convenit etiam in podicis ardore & inflammatione, in specie piperatorum & rerum adurentium contactu facta, teste Platero in Observ.

Et hætenus dicta in incipiente inflammatione possunt usurpari.

Internè diaphoretica & sudorifera blanda sunt optima.

Quod si inflammatio ani discuti nequeat, & jam factus sit abscessus, præter emollientia & resolventia imprimis confert bals.  $\frac{4}{5}$  ad extra Rulandi ex  $\frac{4}{5}$  re cum  $\frac{3}{4}$  papaveris paratum, quod optimum est remedium, & describitur ab Hartmanno in Praxis Chym. ubi de mamillar. affectibus; hic enim & maturat & mundificat, & consolidationem promovet, & præprimis imminentes fistulas præcavet: Item

(Aaaa 2)

q. Lact.

℞. *Lact. chalybeat.* ℥ij.  
*Terebinth. c. vitell. ovi sol.* ʒvj.  
*mell. rosati* ʒj.

M. pro enemate.

Item præparetur unguentum Nicodemi, ut vocatur, & describitur in *Antidot. Weckeri*, quod bals.  $\Phi$ is permistum optimum erit remedium pro curando hujusmodi abscessu. Hoc ipsum tamen maturè faciendum est, quia aliàs in fistulam degenerat, quæ interdum in vesicam urinariam hiat.

Ad hæmorrhoidum exulcerationem linimentum ex auro fulminante, cum oleo amygdalorum dulcium paratum, singulare est Anglorum experimentum.

Sin abscessus in fistulam abierit, hæc non facilè curatur; optimum tamen remedium esse dicitur  $\Phi$  dulce  $\Phi$ ii, quod vid. in *Agricolæ Comment. in Poppium*.

Internè, ubi intestinum rectum exulceratum, usurpari possunt potiones vulnerariæ, e. g.

℞. *Herb. beder. terr.* M. ij.  
*plantag.*  
*sanic. ana* M. ʒ.  
*raf. c. c.* ʒiij.  
 Coqu. in s. q.  $\nabla$ a:  
 Colat. ʒviiij. adde  
*syr. corallior.*  
*de symph. Fernel. ana* ʒj.  
 M. D. S.

Heil-und reinigender Wund-Trank.

Ter hauriatur in die cum gutt. 4. bals.  $\Phi$ is.

## ARTICULUS VI.

De

*Mesenterii inflammatione aliisque affectibus,*

& inde orto

A B S C E S S U.

**P**ergimus ad mesenterii inflammationem, cujus tumores & inde nati abscessus sanè sæpiùs sunt origo & fons chronicorum & latentium admodum morborum, & fomes mirabilium turbarum & complicatorum affectuum. Affectus hi adeò latentes sunt & occulti ex eo, quoniam difficillimè cognoscuntur, cum mesenterium in profundo situm aliis quoque partibus hinc inde circumseptum sit, & propter sensum obtusum minus clara sint ejus pathemata, unde sæpissimè & ægros & Medicos fallunt, ut rarò de his possimus esse certiores. Accedit præterea & hoc, quod corpus mesenterii variis glandulis sit infarctum, quæ ipsæ diversimodè affectæ similiter varia abdominis symptomata inferunt, tam per se, quàm ratione lymphæ, adeoq;

evenit, ut tam intricati affectus oriantur: item accedit textura, divaricatio, & distributio nervorum per mesenterium sparsorum varia & mirabilis, unde uno affecto aliæ etiam partes facilè per consensum simul afficiuntur, ut nequeamus ob id rectè distinguere proprios mesenterii affectus ab aliis. Affectus seu morbi, qui vitio mesenterii oriuntur, tumores & abscessus, sunt varii & vagi, interdum frequentius, idque in paulò obesioribus, plus minus dolorosi, nunc circa dorsum & lumbos dolorem, nunc in abdomine, ac præsertim circa umbilicum, tormina inferentes, lenti tamen omnes & diurni; subinde cum febricula erratica complicati ac continuis aut saltim vagis æstuationibus & intercurrentibus interdum horribus levibus comitati, quæ symptomata propria sunt ferè membranosis partibus affectis. Corpus simul ut plurimum successivè emaciatur, respiratio evadit difficilior & subinde aliquid molesti, quod ipsi ægri satis explicare nequeunt, in profundo abdominis circa & infra umbilicum & circa præcordia se perferre affirmant. Venter nunc inflatur ac plus minus tumet, ut interdum ægri quasi tympanitide laborare videantur; nonnunquam tenditur abdomen, nunc ad interiora dorsum versus quasi retrahitur; dolor autem & tumor lumborum aut abdominis subinde per intervalla recurrit, & sæpè multis annis affligit; flatulentix plures insimul ægros vexare solent. Frequentissimè tamen mesenterii inflammationes alii tumores inde nati & occulti abscessus sequuntur, hinc etiam variis glandularum tumoribus, duris, scirrholis & strumosis mesenterium afficitur, qui nunc suppurantur, nunc manent sine suppuratione, sicut & steatomata, atheromata, melicerides & similes tumores intra duplicaturam mesenterii congeriuntur. Infantibus, quibus affectum est mesenterium, non rarò atrophia & tumores quasi tympanitici abdominis supervenire solent. Febres ardentes ceu metastasi critica in abscessus mesenterii terminantur, quin & aliis febribus aut morbis complicatæ inflammationes, & inde nati abscessus mesenterii, eos intricatos & molestos magis reddunt, unde non ineptè exinde Sennertus derivat febres semitertianas l. 3. *Prax. pag. 445.*

Curantur tamen hæc pathemata mesenterii ferè ut alii chronici affectus, cachectici aut hypochondriaci, internè quidem per  $\Theta$ ia  $\Theta$ sa,  $\Phi$ rea,  $\Theta$ ata,  $\Phi$ osa, abstergentia, & hinc per Martialia & volatilia, item aromatica, amara, aperientia aut hepatica vulgò dicta, interpositis blandis purgantibus. Tractentur tamen cautè & sine violentia, aliàs exasperantur & deteriores evadunt

evadunt ob nervos tunc irritatos. Externè emplastrum ex gummatibus, de cicuta, de nicotiana, emplastrum Vigonis de ranis cum Mercurio, vel ex gummatibus & Mercurio, descriptum à Barbette in *Anat. Practic.* pag. 557.

Multa præterea tumorum & abscessuum occultorum in mesenterio hinc inde prostant observata: v. g. callum inter venas mesenterii natum lethalem; item calculos in mesenterio, refert Schenckius in *Observat.* l. 5. Hydropem à vesiculis mesenterii recenset Tulpus l. 2. *observat.* 34. Mesenterium lapidosum, hinc atrophiam lethalem Panarollus *Pent.* 5. *observat.* 19. abscessum mesenterii, ubi cum pure simul vermiculi excreti, Thonerus l. 1. *observat.* p. 173. Tumorem mesenterii durum circa medium pancreas per emollientia curatum videbitis à Foresto l. 21. *observat.* 1.

Ex scirrholo mesenterii tumore hecticam incipientem, menses albos, tormina, Trincavellius l. 3. *Consil.* 22. pag. 372. Mesenterium scirrholum in hysterica in M.A.N.C. *Ann.* 4. *observ.* 32. pag. 107. Glandulas mesenterii induratas & auctas, ventrem tumidum reddentes, apud Platerum l. 3. *observat.* pag. 697. Sed de his & similibus mesenterii affectibus, tam veris quàm falsis, præ cæteris omnium optimè scripserunt Fernelius in *Pathol. speciali*, & post hunc Matthæus Martini de morbis mesenterii *abstrusioribus*, & hinc Sennertus l. 3. *Prax.* In his utut vera falsis, & bona sint mista malis, cum licet non theoriam plausibilem, sed pro tempore illius ratione mancam, ex sanguinis circulatione, lymphæ & glandularum observatis aliisque hodiernis experimentis emendandam, nec remedia bonæ notæ offerant, horum tamen historiarum observatarum, diagnosi, prognosis & praxis satis commoda, pro ulteriori indagine uberiores occasionem subministrant.

Speciatim jam consideranda est mesenterii inflammatio, & hanc subsequens abscessus.

Satis autem frequentes sunt mesenterii inflammationes, quoniam copiosissima habet vasâ sanguifera, simulque copiosissimis instructum est glandulis, utut ferè cum aliis morbis jungatur, ac sub aliis morbis se præsentare soleat inflammatio, idque imprimis, dum illud ob varios casus eam pati queat, in specie accedente intestinorum affectu: unde mesenterium nunc solum, idque rariùs, nunc una cum intestinorum parte, inflammari solet: si hoc, meliùs est pro Medico, qui ita faciliùs eam cognoscere potest; pejus pro ægro magis patiente; quale exemplum habet Chiffletius *observat.* 31. de mesenterii & intestinorum inflammatione cum umbilici dolore conjuncta.

#### CAUSÆ.

Ex causis, quæ inflammationem Mesenterii inducunt, præter eas generales inflammationum reliquarum causas, duæ imprimis sunt speciales in mesenterio, nempe dysenteria & hernia: dysenteria enim pravè curata, in specie suppressa, ac adstringentibus intempestivè tractata, sæpissimè in inflammationem mesenterii periculosam & lethalem degenerat, observante hoc Hildano, Lamoniére, & Matthæo Martini cap. 1. pag. 47. Quoad herniam verò, dum in hoc, ubi cum intestinis tenuibus mesenterium simul in scrotum descendit, non potest non mesenterium contractum aut vitiosè compressum sanguinis circulum turbare & impedire, & ita inflammationem incurrere. Præterea & febres ardentes per metastasin quasi criticam materię morificæ in mesenterii abscessum terminantur.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: Inflammatio hæc non secus ac reliqui ejus tumores & abscessus, difficulter cognoscuntur, quia latent in profundo, & sæpiùs sunt indolentes; aut dolentes licet, pro uterinis, colicis aut nephriticis pathematis subinde habentur, cum nausea & vomitus subinde accedant. Nihilominus tamen in inflammatione mesenterii percipitur quasi pondus in abdomine, ac imprimis in ejus profundo, quod in specie sensibile fit, dum æger se in lecto volvit; ardor simul adest non rarò præcordiorum aut circa umbilicum, dolor pulsatorius in profundo abdominis, cum leni tamen ardore absconditus, cum quo etiam percipitur tensionis quidam sensus sub ventriculo & circa ejus regionem, & in abdomine, idque tamen citra vehementem, & quæ nonnisi pressu animadvertitur, duritiem interdumque adfunt egestionis chylosæ ac plus minus serosæ, citra tamen ventriculi vitium præsens excitatæ. Dolor vehemens aut acris adest nullus, sed tensivus, obrusus, plus minus pulsatorius urget; adfunt signa inflammationis reliquarum abdominis partium, quæ aliàs faciliè confunduntur.

Observandum ergò, ne confundatur inflammatio umbilici cum inflammatione mesenterii; nam umbilicus in parte sui interna, non externa, circa musculos rectos non rarò inflammatur & suppuratur, unde pus per eum evacuatur. Nempe in umbilici inflammatione circa regionem ejus in profundo dolor magis sentitur, tumor apparet prominulus & propior, qui in mesenterio est remotior, ardor & febris sunt magis intensa, ægerque in abdomine majorem tensionem

(Aaaa 3)

per-



perlentiscit ; quando verò inflammatio ad abscessum pervenit, percipit tunc horrorem, interdum rigorem, cum superveniente insigni æstu.

Cauti etiam simus, ne inflammationem intestinorum confundamus cum inflammatione mesenterii: nam circa umbilicum tres vel quatuor sunt digiti, ubi imprimis locus est mesenterii, in quo præ aliis tangi atque cognosci potest ejus inflammatio aut abscessus; nam si ipsi non adest inflammatio, non potest percipi tactu, si ipse umbilicus inflammatus, percipitur propior tumor, qui in mesenterio est remotior.

Febres diversæ etiam in mesenterii inflammatione & abscessu adjunguntur, pro diversitate loci inflammati: si profundè mesenterium inflammatum, ut plurimum febres non sunt continuæ, sed lentæ, languidæ, absque siti insigniori aut gravioribus symptomatibus, & quæ interdum circa vesperam exacerbantur, oriuntur: interdum nulla febris indicia adsunt, teste Rhodio *cap. 2. observ. 95.* Sin verò circa exteriores ejus partes, ubi reliquis abdominis contentis visceribus jungitur, inflammatio mesenterii accidat, præsertim cum intestinis, tunc symptomata dicta omnia existunt graviora, febres ardentes plus minus acutæ, non rarò semitertianis conjunguntur, & graves dolores affligunt, innuente Sennerto *cap. de inflammatione mesenterii lib. 3. Prax.*

In genere, dum suppuratio fit, ut aliàs in quavis inflammatione, febris, dolor & symptomata reliqua fiunt graviora. Dum apostema suppuratum rumpi incipit aut rumpitur, horror insignis, interdum rigor quatit ægrum, cum superveniente æstu non rarò insigni, quem puris, præsertim per alvum, excretio successivè comitatur: Confer. Horstius *lib. 14. Observ. 25. & 26.* item Bartholinus *Centur. 4. Epist. pag. 491. & Cent. 4. Hist. 96. & Cent. 2. ep. 23.*

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin; inflammationes mesenterii aut resolvuntur, aut frequentissimè suppurantur; & in abscessus abeunt, diutius durando, aut in scirrhus degenerant, non tam in mesenterio inflammato, quàm ejus glandulis observati satis sunt.

In obstructionibus mesenterii supervenientes cruentæ dejectiones subinde salutares sunt, vid. Bartholinus *Cent. 6. Hist. 41.*

Suppurationes mesenterii admodum sunt lentæ, ac non nisi tardè suum absolvunt cursum, unde etiam ægros vix in consuetis

functionibus impediunt. Diuturno hoc malo afflicti successivè aut ad tabem & hæticam aut tandem ad cachexiam, deveniunt. Eructante pure, post abscessus ruptionem, alium locum quàm alvum, excretioni idoneum non reperiente, gravis affectus colicæ similis non rarò observatur. Sin verò in abdominis cavum effundatur, tunc membra vicina vel inficit, ut gangrænam concipiant, vel acredine corrodit, & malorum quamplurimorum autor est.

Interdum abscessus ruptus optimè non tantum per alvum, quod sæpius, quàm, quod rariùs, per  $\square$ m, rarissimè per uterum expurgatur, intestina corrodit, & eadem siderata seu sphacelata reddit: exemplum suggerit Tulpius *Observ. 37. l. 2.*

Ut autem discernatur, nec confundatur, excretio purulenta facta ex mesenterio, ab excretionem purulentam vitio exulcerationis intestinorum, observetur hoc signum distinctivum: quod si confertim uno impetu, & copiosè, & sine dolore, per alvum fluant purulenta, eaque plerumque permixta cum sanguine plus minus, ex mesenterio esse: quod si verò purulenta pauciora, & tardius cum magnis torminibus, ac præcedente febre acuta sensim ac successivè effluant, signum est, esse ab ulcere intestinorum, ac horum cum mesenterii simul conjuncto.

Observationes singulares ac præ aliis curiosas inflammationis mesenterii, ejusque abscessuum, cum gravissimis symptomatibus, secuta tamen excretionem copiosam purulentam, videbitis in Bartholino, *Cent. 4. Epist. pag. 490.* item in *C. 4. Hist. pag. 96.* sicut etiam rarum est, quod refert Rhodius *cap. 2. observat. 95.* de abscessibus mesenterii interdum sine febribus observatis, ut ut, uti dixi, ut plurimum adsit febris lenta; & Tulpius *l. 2. observ. 37.* ubi notabilem habet casum, inflammationem sc. mesenterii suppurati, & ad sphacelum dispositi.

Porro evenit interdum in mesenterii abscessu, ut emittatur  $\square$  copiosa, eaque laudabilis cum sedimento laudabili: quod si fiat sine levamine, ægri, quin potius cum incremento dolorum malum est, innuit enim fluxum colliquefactivum, ægrum tibi ac hæticæ, brevique post mortem traditurum.

### CURA.

Cura ferè cum reliquis inflammationibus est eadem, mutatis saltem mutandis, ratione nempe partis affectæ, & conjunctorum symptomatum.

Notandum saltem, quod V.S. nil prodest, nec ipso morbo, nec sanguinis effervescentia febri acutis existentibus. Præ cæteris tamen sanguini-

sanguinis quibusvis evacuationibus vasorum hæmorrhoidalium apertio, præsertim per hirudines, applicatione facta, suo cum fructu in mesenterii morbis institui solet, natura monstrante viam, & per dicta loca subinde felici cum successu se ipsam exonerante.

Purgatio quævis propriè sic dicta seu vehemens ex se & per se potius est nociva, irritat crabrones, & absque euphoria ægri evenit. Clysmata verò emollientia, lenientia, abstergentia & anodyna, pro circumstantiarum ratione subinde injecta, imprimis quando jam per alvum purgatur abscessus, sæpius sunt utilissima.

De cætero tota inflammationis mesenterii cura consistit in resolventibus & emollientibus, ut rectè loquitur Hartmannus in *Pr. Chym.* illis quidem internis; his verò externis. Interna ferè sunt nota ex superioribus, præter quæ in specie quædam, v. g. *℞* *℥* larus, liquor *℞* fol. *℞* tri ritè paratus. *R* *℞* tri, *℞* tri simplex, aut carminativus, *R* *℞* *℞* is Zvvelstieri; item alia blanda *℞* lia, *℞* *℞* is cum succo pomorum, *R* *℞* ifaca *℞*ialis Ludovici; it. essentia amaræ aperientes dictæ, ut absinthii, centaurii min. fumariz, carduibened. chelidonii majoris, gummi\*, &c. Quibus adjungenda sunt, speciatim si febris lenta adsit, diaphoretica Martialia; unde *℞* diaph. præsertim Martiale, hinc etiam bezoardicum Martiale, antihect. Pot. & similia in morbi cursu sunt præstantissima & frequenter usurpanda. Externè applicatum emplastrum de cicuta usitatum, vel solum, vel cum gummi ammoniaco subactum, juxta curiosam Hartmanni compositionem, est egregium in tali casu; hæc tamen simul observatâ cautelâ, ut, si citra dolorem emplastrum hoc emolliat, & inflammationem discutiat, res bene se habeat; sin verò dolorem intendat & exacerbet, malum signum sit; certum enim est, factam jam esse inflammationem ac abscessum, adeoque emplastrum removendum erit, & ab eodem abstinendum. Aliàs quoque præter consueta emplastra, cataplasmata & fomenta emollientia ex betonica, solano, agrimonia, chamomilla, verbasco, meliloto, liliis albis, absinthio, & similibus in vino coquenda, & cum spongia vel aliis appropriatis applicanda conducunt. Quod si cum inflammatione & abscessu mesenterii febris lenta plus minus conjungatur, internè Martialia & *℞* alia reliquis suprâ enarratis addantur remediis, præsertim lap. cancr. antihect. Poterii &c. cum paucis *℞* \*co socianda erunt.

His ipsis vel resolvitur inflammatio & abscessus, vel ut plurimum suppuratur, unde rupto abscessu sequitur tandem puris ut plu-

rimùm per intestina vel per *℞* m excretio, eaque in principio confertim, & postmodum successivè, continuatur ad perfectam usque abscessus expurgationem; interdum remittit puris excretio, post aliquot dies tamen recurrens, idque crebrius, mutatis sic vicibus, quando nempe tanquam in vomica purulentia successivè colligitur, donec in quanto sufficienti collecta, excernatur. In hujusmodi suppurationibus & abscessibus mesenterii adhuc notabile est, quod refert Marcellus Donatus in *Histor. Medic. Mir. lib. 4. Histor. cap. 7.* supervenire sæpè iis copiosum *℞* x profluvium, sed sine alleviatione doloris ægri. Ob sedimentum autem, quod in matulæ fundo reperitur, laudabile, nullam salutis spem concipere debet Medicus, cum istud colliquamentum potius quoddam corporis contabescens existat, non autem genuinum *℞* x sedimentum. Quod si ergò remediis hæcenus dictis inflammatio resolvi nequeat, sed degeneret in abscessum, tunc abscessus ita factus est expurgandus, mundificandus, & consolidandus: Et quidem dum apertus est, quod docet rigor & horror cum phlogosi, alvus clysmate acriore injecto stimulanda est, & diureticis pus promovendum, ut maturè id evacuetur: in mundificatione verò & consolidatione abscessus eadem omnia conveniunt, quæ aliàs in phthisi, ab exulcerationibus partium internarum orta, sunt proficua, speciatim terebinthina & omnia terebinthinata, hinc vulneraria vegetabilium reliqua, primatum obtinent, unde balsamum *℞* is terebinth. aut succinatum, ni intensior febris obstiterit; item balsam. Peruvianum in jusculeo calido vel ovo fortibili ad gutt. viij. x. xii. &c. assumptum, pilulæ de terebinth. item terebinth. Cypria c. vitello ovi assumpta, reliquis præferuntur meritò remediis à Martini laudatis; quibus subinde & blandiora Martialia, præsertim in forma liquida, *R* a, extracta & essentia Martiales quæcunque, v. g. essentia Martis liquida, extr. *℞* is cum succo pomorum, item *R* *℞* is *℞* li, & *R* anti-phthisica addenda, quia abscessum & mundificant & consolidant. Hinc acutulis cum fructu usus fuit Thonerus in *suis observation. pagin. 173.* Potiones vulnerariæ aliàs notæ sunt, speciatim tamen in hoc casu proficua sunt agrimonia, hypericum, persicaria, ceu propriatum abscessuum mesenterii remedium; decocta ligni sancti & sassafra in principio ruptionis abscessus insigniter conveniunt; quibus addenda & radix glycyrrh. scorzonæ, ficus, jujubæ, & similia, quæ mundificant abscessum & purulentias acres simul temperant & abstergunt; item



item decoctum rad. Chinæ c. passulis, & minoribus & majoribus, glycyrrhiza, rad. scorzonera, caryophyllata, cinamomo & similibus in sero lactis parandum; vel aqua etiam, utut priori modò melius sit. Serum lactis etiam est egregium absterisivum & consolidativum ulcerum internorum, ratione suæ nitrositatis, id quod vel solum propinetur, vel decoctum c. rad. cichorii, liquiritiæ, &c. usurpetur. Rhabbarum, tam pro scopo absterivo, quàm adstrictorio & quasi vulnerario, non negligendum venit. Sed plura de his videb. in specie in modo laudato Martinio.

Cæterum tumores mesenterii duri, scirrhusi, scrophulosi vel ipsi suppurantur, & simili modò curantur, vel præmissis internis & alibus, ad salia volatilia & penetrantia accedendum. Externè verò usurpanda empl. ex gummat. vel sola, vel cum addito Mercurio vivo; uti & prodest emplastrum de ranis cum Mercurio, à quo nullum periculum metuendum est.

## ARTICULUS VII.

De

### *Inflammatione Pancreatis.*

**Q**Uæ hætenus de Mesenterio dicta fuerunt, etiam de pancreate ferè monenda sunt; cuius morbi & affectus ut perquam occultus sunt, ita plurium difficilium & intricatorum morborum subinde origo sunt. Ex pluribus pauca annotare sufficiat.

Tumorem scirrhusum pancreatis cum affectione hypochondriaca, vel potius scorbuto, eleganter curatum vid. in Riverio *Cent. 3. observ. 85.* Riolanus *Anthropogr. l. 2. cap. 16.* in Thuano melancholico pancreas amplitudine sua & pondere ipsum hepar æquans totum scirrhusum, multis globulis specie ovi columbini refertum refert: & Cætierius *observ. 10.* pancreas insolite atque stupendæ magnitudinis allegat, ex quo renis è suo loco naturali dimotio facta sit cum hypochondrii dextri dolore gravissimo, & dispncea gravi: Tulpius item *l. 2. observ. 32.* cum steatomate mesenterii pendente lib. 18. quod vñ intercutem mentiebatur, pancreas pingue & ponderosum refert. Abscessum in pancreate latentem perpetuas vigilias, lipothymias, aliaque gravissima symptomata inducentem, refert Schenckius *l. 3. Observat. de Mesent.* Pancreas suppuratum lethale Bartholinus *Cent. 2. Histor. 39.* Pancreas lapidosum, vomitum lethalem continuum causans, Panatolus *Pent. Obs. 44.* Idem corruptum & sphacellatum cum vomitu continuo lethali, Barbette *in Prax.* Puellam per 8. annos misere vexatam hecticâ febre mortuam, in qua pancreas scir-

rhosum & induratum, vid. apud Petrum Pavvium *Observ. 14.* Mortem repentinam ex pancreate sphacellato vid. M.A.N.C. *Ann. 1. Observ. 99. pag. 230.* & *Ann. 3. observ. 45.* Ex pancreatis excrecentia marasimum M.A.N.C. *Ann. 8. Observ. 31. pag. 57.* Interdum pancreatis morbi superveniente salutari fluxu cruento curantur, autore Bartholino *Cent. 6. Hist. 41.*

## ARTICULUS VIII.

De

### *Omenti Tumoribus.*

**N**Ec omittendum hîc penitus omentum in hoc, tanquam in burla, humores vel flatus collecti, it. glandulæ ejus subinde scirrhusæ aut steatomatosæ factæ, varia pathemata inferunt: Conf. Barbette *in Anat. Pract.* sicut & admirandos omenti tumores videbitis in Marcello Donato *Hist. Med. l. 7.* ab Horstio adiectos; item in Horstio *decad. 6. Problem. Quæst. 10.* Hildano *Cent. 3. Observ. 61.* Quibus Schenckius *in Observ. de omento* addatur.

## ARTICULUS IX.

De

### *Inflammationibus Partium Thoracis internarum,*

In specie de

### *Inflammatione Pleura, Pleuropneumonia, & Peripneumonia.*

**O**Mnium frequentissimæ inflammationes sunt præ reliquis, quæ afficiunt partes internas ad thoracem pertinentes, & ferè semper sunt ab aliquali sanguinis in præcordiis grumescencia, & acescencia, suntque frequentius erysipelaceæ, nunc magis humorosæ seu sanguineæ, quâ ratione v.g. pleuram inflammatam decuplo crassior, quàm naturaliter est, observavit Riolanus *in Anthropogr. lib. 3. c. 5. pag. 358.*

Frequentia autem harum inflammationum dependet ex eo primariò, quod thoracis interiora, nempe sanguis in pulmonibus, aëris alterationibus vel maximè sunt exposita, cujus occasione & vitio alteratus sanguis promptissimè loca thoracis lateralia & alias ejus partes afficit, quia partium harum arteriæ proximæ sunt cordi, unde vel simpliciter vel respectivè sæpius inflammationes excitantur, & hî thoracis inflammatorii affectus Vincentio Baronio *Tract. de Pleuropneum.* in genere Pleuropneumonia appellantur; quæ postmodum, prout modò hæc, modò alia pars inflammatur, in specie varias sortiatur appellationes



lationes. Inflammatio enim utriusque pulmonum partis dicitur peripneumonia; si altera verò pulmonum medietas inflammetur, vocatur pleuritis; quia in hac semper ferè simul istius partis membrana à pleura est inflammata; sicuti econtrà cum pleura semper quoque pulmo istius partis observatus fuit inflammatus.

Communis quidem inter pleuritidem & peripneumoniam hæc asseritur differentia, quod in illa pleura, in hac pulmones tantum afficiantur; utraq; tamen interdum combinantur, & invicem transmutantur. Sunt interim nonnulli, v.g. Zecchius *Consult. Med. Conf. 26. in Append. Platerus l. 2. Prax. p. 409. & l. 3. pag. 365.* cujus rationes amplius deducit Hæchstædterus *decad. 7. Cas. 4. pag. 92. & Lælius à Fonte Conf. 91.* ubi refert; observatum semper fuisse in pleuritide correptis, quod non solum pleura, sed pulmonis medietas simul in isto latere inflammata fuerit, muniti præprimis autoritate Hippocratis *de loc. in hom. Text. 24.* quibus quidem Sennertus & Riverius respondent; nihilominus rarò forsan inflammatio pleuræ sine pulmonum inflammatione existit; id quod pariter confirmant modernorum anatomicorum observationes in pleuritide demortuis: Conf. Sennertus *lib. 2. Prax. P. 2. cap. 16. de Pleur. Quæst. 2.*

Loco pleuræ interdum quoque cum pulmonibus inflammatur mediastinum, quæ inflammatio tamen peculiari nomine caret; quin & diaphragma interdum inflammatur cum pulmonibus, cui ordinariò supervenire solet delirium leve, quod speciali nomine paraphrasinen & paraphrenitiden appellare solent veteres à phrene, quod diaphragma significat.

Non autem solum lateraliter afficitur pleura, sed etiam interdum simul cum pleura & pulmone membrana humeri, item membrana juguli, & similes vicinæ membranæ, observante Tulpio *l. 2. observat. 1.* cum pleurâ ita inflammata impossibile videatur, quin & inflammatio musculis contiguus intercostalibus internis communicetur. Siquidem interdum accidit, ut in vera pleuritide phlegmone versus exteriores musculos ob magnitudinem affectos simul tendat, & dolor etiam primo attactu percipiatur; quin curiosum est, quod observavit Barbette, interdum nempe diaphragma juxta processum inferiorem ignaris repræsentasse speciem nephritidis seu renum inflammatorum. Præ cæteris, quoad historiam pleuropneumoniarum in genere & in specie conf. Vincentius Baronius *Tom. 11.*

*Tract. de Pleuropneumon. lib. 1. cap. 1. & 3.* cujus vestigia terit Schneiderus in *Dissert. de Pleuropneumonia.*

### C A U S Æ

Causa proxima pleuro; pneumoniæ, sub quo nomine omnes inflammationes thoracis comprehendo, est sanguinis coagulatio atque stagnatio, ab acido in eo peccante orta, cujus ratione hic ad facilem & successivam sui coagulationem & congrumescentiam disponitur, & hinc vel in pulmone solum, vel in pulmone & pleura simul aliisve vicinis locis hærendo, acidò simul membranaceas partes vellicant, & ad crebriores contraturas stimulante, hos affectus infert: Conf. Helmontius *Tract. Pleura Furens*, Holterhoff, *de Error. Medicor. P. 2. S. 2.* Hinc sanguinis, qui venâ sectâ emittitur, subinde nunc semigrumofus prodire observatur, teste Gabelchovero *Cent. 4. Curat. 70 & 79.* nunc promptissimè coagulabilis existit, ita ut ferè exeundo congrumescat, teste Helmontio *cit. loco*, ipsi verò extravalato pellicula tenax subalbida viscida supernatare solet, teste Wilisio *in Pharmac. Ration. Part. 2. pag. 178. & 179.* relicta acidi hujus peccantis vestigia in parte affecta, etiam curato abicessu, recidivas crebriores in eodem loco facere solent. Quod si sanguis haud perfectè coagulatus minus firmiter intus fixus inhæreat, minorem quoque dolorem inferat, facile resorberi, & hinc per *μετάστασιν* pleuropneumoniarum ad diversas partes transferri potest.

Causæ remotæ harum inflammationum, in thorace obvenientium, sunt variz: frequentior imprimis solet esse frigus externè haustum, post immoderatos calores aut corporis motus & incalescentias; languinem enim coagulando, eum ad stagnationem disponere potest: & quidem est una ex frequentissimis causis; sive aër inspiratus, sive potus ingurgitatus fuerit frigidus: sic Horstius *lib. 3. observat. 10.* pleuritidem observat ex haustu vini frigido post æstum & corporis refrigerationem: Riverius *Observation. 14.* à Dionysio Pomaret *Communic.* ex nimio cursu & potu frigido pleuritidem notat: Conferatur Hildanus *C. 4. observat. 25.* qui habet peripneumoniam ex indefessa saltatione, & hanc excipiente potu frigido: Forestus *lib. 16. observat. 28.* observat juvenem, post exercitium ex vix frigida potu in pleuritidem incidentem. Hornung *in Cista Medic. pag. 276.* observat peripneumoniam in Clerico concitatam ex eo, quod bene potatus sæpè in templo cantasset: Vid. etiam M.A.N.C. *Ann. 2. observat. 285. pag. 384.*

(Bbbb)

Occa-

Occasionem pleuritidis quoque præbent potus spirituosus nimia ingurgitatio, motus vehementior, &c. Præterea ordinariæ suppressæ sanguinis evacuationes non raro dant pleuritides, in specie tamen menses suppressi; pari enim ratione ac menses suppressi dyspnœiam procurant, ita & iidem pleuritidem generare poterunt; quorum etiam occasione acidum vitiosum interdum colligi solet: Sic Deodatus in *Valetud.* pag. 219. observat ex mensium ante legitimum tempus emanatione hæmoptysin cum pleuritide: item pertinet huc casus Timæi von Guldensee l. 2. *Cas. 7.* pag. 99. mulieris pleuritice ex subitanea mensium suppressione propter casum in fluvium frigidum: præterea dysenteria suppressa aut adstringentibus malè curata non raro dat pleuritides, observantibus autoribus omnibus, in specie Sennerto in *Praxi cap. de Pleurit.* item Schneidero *Tract. de Pleuropn.* unde etiam Helmontius rectè asserit; quod benè observetur pro praxi, dysenterias & pleuritides non differre in radice, sed tantum quoad locum affectum. Imprimis considerata aëris constitutio epidemica, & malignitas: hujus siquidem ratione non raro pleuritides grassantur subinde epidemico more, quo tempore pleuritides tales ac peripneumonia ut plurimum sunt malignæ & contagiosæ plus minus, quod multorum practicum testantur observationes, v. g. Foresti lib. 16. *observat.* 34. Wieri in *Observat. ubi de Pleurit. maligna*, Baronii de *Peripneumonia in Prax. &c.* 1. item Bartholini, pag. 69. lib. de *Incendio Bibliotheca.* Facit huc Lælius à Fonte *Conf.* 3. & 83. qui observavit anginas, pleuritides & peripneumonias conjunctim, & simul vulgariter grassantes, in quibus secta cadavera, quæ catervatim mortua fuerunt, pulmones ingentibus abscessibus correptos, ex quibus apertis pus copiosum & foetida materia effluxit. Hinc patet, quod hi affectus differant non radice, sed loco affecto, unde etiam eodem modo curantur, ac unus in alium sæpius mutatur, de quo vid. Rhodius *Cent.* 2. *Observat.* 11. Febris quoque continuus non raro supervenit pleuritis, qualis etiam observata fuit post morbillos in M. A. N. C. *Ann.* 4. *observ.* 7. pag. 10. adeoque tanquam symptoma aliquod ejusdem subinde se associat, ut rectè Sydenham in *observ.* pag. 355. Pleuritidem nunc essentialem seu primum affectum, nunc symptomaticam febris, esse asserat: similiter scabies retropulsa, ut asthma, sic & peripneumonia & pleuritidem infert, observante hoc Amato Lusitano *Cent.* 2. *Cur.* 62. Insuper periodica subinde est peripneumonia & pleuritis, idque, uti rectè insinuat Helmont. tunc temporis, ubi non adeò fuit ritè curata, & fermentum remanet, & quidem periodum ha-

bet interdum annuam, teste Zacuto Lusitano l. 3. *Prax. Admir. Observat.* 112. vel aliis modis crebrius recidivat, de quo vid. Borellus C. 4. *Observat.* 83. de viro septem vicibus pleuritide detento, qui tandem hydrope periit. Tandem causæ externæ, casus, ictus, indeque natæ contusiones, aliæque pathemata similia, quæ sanguinis ordinariæ motum per vasa intercostalia plus minus remorantur, ad pleuritidem disponunt: sic ex risu & sternutatione simultaneis pleuritidem natam videbitis in Bartholini *Act. Med. Hassn.* Vol. 2. pag. 239.

Hæ ferè sunt causæ ordinariæ pleuritidis & peripneumoniz.

Denique pleuritis notha à vermibus intestinorum oriunda à Quercetano in *Pharm.* & Bartholeto *Tr. de Respir.* l. 3. c. 3. observata fuit. Et hæ pleuritides se manifestant, quod præter pleuritidis signa simul adsint signa intestinorum affectionum: vid. Amatus Lusitanus *Centur. Curat.* 52. item Zacutus Lusitanus lib. 8. *Prax. admir. Histor. Observat.* 7. cap. 3.

## DIFFERENTIÆ.

Observandæ sunt ob id differentiz, quod nempe

1. Alia est vel benigna, vel maligna; interdum epidemica, de qua supra; quando nempe acidum pleuriticum singulariter corruptum acrimoniam perquam hostilem & venenosam acquirit.
2. Alia est primaria, alia secundaria, seu quæ alios insequitur morbos: vel pleuritis febribus continuis aut affectibus thoracis aliis supervenit.
3. Alia est simplex, alia cum peripneumonia aut cum alterutra reliquarum thoracis partium inflammationibus, v. g. diaphragmatis, juncta.
4. Quædam est periodica, quæ sæpè recurrere solet, imprimis non ritè curata; aliz, & quidem ut plurimum, non sunt periodicz.
5. Pleuritis nunc est vera, nunc est notha, quæ alias extraordinarias agnoscit causas: Vera est inflammatio medietatis pulmonum & pleuræ illius lateris, juncta hinc cum febre acuta aliisque symptomatibus superius explicatis; notha verò sine febre aut cum febre lenta admodum.
6. Pleuritis tandem est vel ascendens, vel descendens, ratione loci, doloris & extensionis.



nis. Fundamentum hujus divisionis consistit in distributione vasorum descendendum, & ascendendum, per quæ sanguinis recursus impeditus inflammationem infert. Hinc ascendens consistit in duobus spatiis trium costarum superiorum, quæ nempe sunt intra secundam & tertiam vertebra, à jugulo numerando: descendens verò consistit in reliquarum 9. costarum inferiorum 4. spatiis, ascendens dicitur, quia spatia illa intercostalia recipiunt vasa sua certa à truncis supra cor, ex vena nempe & arteria axillari: descendens verò, quia spatia illa accipiunt vasa à truncis infra cor nempe ex inferiori trunco arteriæ magnæ. Hæc differentia scitu necessaria & probè observanda est, ob legitimam administrationem venæ sectionis.

Pleuritis notha est varia, imprimis quadruplex:

(1.) Ista, quæ à Sennerto ita dicitur *l. 2. Prax. P. 2. cap. 16. ubi de Pleurit. pag. 225. & 230.* quo loco intelligit inflammationem musculorum thoracis externorum & internorum intercostalium, in qua febris est nulla, aut non adeò acuta, sed saltem lenta, tussis pariter non nisi rara & catarrhalis, sine cruentorum expectoratione, pulsus minus durus, dolor mitior, saltem pullans, minus pungens, & qui externo contactu minus exasperatur, adeoque cum vera pleuritide parum vel nil habet commercii, nisi cum vera graviore hæc simul juncta sit.

(2.) Est ista, quæ usitato magis pleuritidis nothæ nomine venit, estque dolor insignis punctorius in uno alterovè latere sine febre ac siti, aut saltem cum febre catarrhali simili, hinc cum pulsu quoque ferè laudabili, nisi in quantum doloris ratione immutatur & frequentior redditur; tussis adest aut nulla, aut si quæ est, non adeò frequens aut vehemens, saltem catarrhalis aut lymphæ vitio, unde & febris catarrhalis similis tunc ferè jungitur. Cuncta autem hæc symptomata, utut vulgò à flatu oriri asseruntur, oriuntur ex acido vitioso, vehiculo lymphæ aut feri stagnantis intra pleuram delato sine hujus inflammatione, sine pulmonum alteratione, & potius dolor pleuriticus, quàm pleuritis appellanda venit. Atque talis affectus in scorbuticis aut affectibus generis nervosi obnoxiiis, non rarò observatur cum appetitu non rarò laudabili, pulsu naturali, dolor tamen non adeò fixus est, sed locum sæpius mutat, vid. Dravvizi *de Scorb. Tit. 7. & Willisius l. 4. item symptoma hoc est, variolarum & morbillorum eruptionem interdum antecedens aut scabiem intempestivè curatam excipiens*, vid. Sennertus *Prax. lib. 2. P. 3. c. 6.*

Tom. II.

item Gallico morbo affectis aliquando accidere solet, vid. Sennertus *loc. supra alleg. pag. 256. Quæst. II. item Willis. Pharmac. Ration. l. 4. pag. 199.*

(3.) Ad hujusmodi pleuritidem malè sic dictam notham, seu potius dolorem pleuriticum, etiam pertinet iste dolor pectoris, qui à flatibus aut vaporibus, pleuram ac musculos intercostales divellentibus ac distendentibus, subinde oriri dicitur. De quo vid. Sennertus *l. 4. Part. 3. cap. 6.* Nulla enim in hoc observatur febris, nec tussis, nihil etiam cruenti, licet tussis superveniat, exspuitur; dolor quoque vagus est, minusque perpetuus, sed per intervalla recurrens, non tamen pulsans, nec pungitivus, nisi quando pars affecta manu comprimitur. Oritur ab humore seroso acri sine inflammatione singulari. Hæc cum pleuritide notha primæ speciei, quia utraque saltem externa est, præter febris acutæ defectum à vera facillè dignoscitur & hoc commune habet; ut ægri in pleuritide notha ut plurimum in latus oppositum potius quàm in morbosum seu partem affectam decumbere queant, secus ac in pleuritide vera, utpote in qua contrarium observatur; vid. Amatus Lusitanus *C. 3. Cur. 67. Annot. & Cent. 7. Cur. 62.* Sennertus *l. 4. pag. 2. cap. 16. pag. 232. & Willisius Pharmac. Rat. pag. 2. Sect. 1. cap. 9.* In pleuritide vera enim, cum æger decumbit in latus oppositum, pars inflammata pondere suo divellitur, majoremque patitur distensionem; minus in pleuritide notha. Spectat huc

(4.) Similis dolor pleuriticus à verminibus intestinorum, qui ab horum putrescentium vapore fieri dicitur, de quo videatur Quercetanus *in Pharmac.* observatam à se notham pleuritidis speciem, quæ in omnibus symptomatibus veram & legitimam æmuletur, ortam à malignis & acris vaporibus, ab inferioribus sursum in pectoris regionem delatis, ex quorum virulentia & acrimonia pleuræ inflammatio, nec non venarum erosio excitata fuit, unde sanguinis exspuitio, spirandi difficultas, febris, & alia symptomata, ubi purgatio cum v. benedicta Rulandi instituta, sanguinis detractioni & eccoprotici exhibitioni longè latèque præferenda. Imprimis vermes & corruptionum incommoda tollere jubet, à quibus sæpè numero hæc spuria pleuritis oritur, id quod præstarent antimonialia. Simile ferè exemplum recenset Bartholetus *de difficili respiratione lib. 5. cap. 3. pagin. 548.* dum inquit; se curasse pleuritidem in quadam virgine, cui omnia pleuritidis veræ seu legitimæ signa adfuere in principio

(Bbbb 2)

pio



pio, quæ tamen post primos dies malignam ex pravo vermium halitu se manifestasset, & prorsus absque sanguinis missione fuisse curatam: vid. etiam *lib. 4. cap. 11.* ubi similia habet. Item pleuritidem à verme Rhodius *C. 2. observat. 12.* Schenckius *l. 2. observation. 92.* Gesnerus *l. 3. Epist. pag. 49.* Bonettus *Med. Sept. pag. 374.* Riverius *cap. 1. observat. 75.* & Hæchstædterus *Decad. 7. pag. 49.* notarunt. Atque hæ pleuritides nothæ se manifestant, quoniam præter signa pleuritidis communia adsunt simul quoque signa intestinorum affectuum, & quæ vermibus sunt propria, maximè si ventriculi angorem secum habet conjunctum.

Pauciores differentias patitur peripneumonia, quatenus 1. vel primariò & sine alterius morbi interventu generatur, vel aliis morbis v. g. anginae aut pleuritidi, succedit: quorum hoc iterum duplici modo fit; aut enim pleuritis in peripneumoniâ commutatur, dum priore morbo cessante alter excitatur; aut morbo laterali pulmonia supervenit: Hinc 2. alia peripneumonia est simplex, alia pleuritidi juncta: 3. Alia benigna est, alia maligna, de qua vid. Baronius *l. 4. cap. 7. 9. & 10.*

## DIAGNOSIS.

Diagnosin inflammationum partium thoracis, earumque signa & symptomata comitantia, quædam sunt vel communia omnibus inflammationibus, quædam vel propria magis & distinctiva, pro partium affectuum ratione varia.

Signa communia pleuritidis, pleuropneumoniae, peripneumoniae diaphragmatis & mediastini inflammationum sunt sex: nempe

1. Adest in omni thoracis inflammatione respiratio plus minus difficilis, anhelosa, adeoque simul frequens nempe & parva, nec sufficiens necessitati naturæ.

2. Deinde adest febris continua acuta, cum insigni ardore ut plurimum, & insigni febrilium symptomatum syndrome conjuncta, interdum tertianæ typum observans.

3. Pulsus est admodum frequens, celer, magnitudine moderatus, qui saltem in progressu parvus fit, & in specie durus simul, ob articularum tensionem insignem quasi convulsivam, talis pulsus (interdum, quod sæpius observavi, pulsus est intermittens, quo nunc quarta nunc septima pulsatio deficit) est hic, quem vocant alias tertium seu serratum, qui licet aliàs à Lindano in Collegio super Hartmannum pro figmento habeatur,

cum tamen sano sensu explicatum pleuritidi ferè proprium plurimi testantur Medici.

4. Facies in omnibus his pectoris inflammationibus rubet insigniter, oculi turgent, genæ sunt quasi inflatæ & efflorescunt, nisi declinaverit morbus ad mortem; tunc enim facies confidet. Et quidem mirandum est, si altera saltem pulmonum medietas, seu pleura, fuerit inflammata, rubor faciei seu malarum respondeat saltem lateraliter parti affectæ. Durat hic rubor genarum à principio ad finem usque, & tunc cætera allegata symptomata magis in uno, quàm altero latere, observantur.

5. Tussis semper enormis, frequens admodum & molesta adest, in principio quidem sicca, hinc progressu temporis sensim rejicitur materia tenuis, aquosa, nonnihil spumosa, mox variè tincta; hinc spurum totum fit cruentum, tandem verò albescit, crassescit & spissescit, fitque mucilaginosum & tenax, & tunc vocatur sputum coctum.

6. In omnibus thoracis inflammationibus caput dolet insigniter, & adsunt simul agrypnia sitisque intensissima, & similia febrilia symptomata fatigant ægros, interdum cum superveniente delirio.

Quoad verò signa & symptomata propria magisque distinctiva horum affectuum à se invicem, ea oriuntur ex speciali partis affectus habitudine, & sunt:

(1.) Quod in peripneumonia adsit major admodum respirandi difficultas cum summa pectoris angustia, anxietate atque inquietudine, ita quidem, ut suffocatio ægros magis urgeat, adeoque interdum non nisi erecti cogantur spiritum ducere: Interdum nec bibere nec loqui commodè possunt, ob respirationis angustiam, qualem respirandi difficultatem Hippocrates vocat sublimem.

(2.) Dolor in pectore gravativus, profundus admodum, spinæ dorsæ quasi attingens & obscurus aut intertussendum saltem observabilis, quodque tamen in thoracis etiam ambitu, si pleuritis scilicet fuerit juncta; quando verò membrana succingent pulmones simul inflammata non fuerit, dolor semper remissior est.

(3.) In peripneumonia primis diebus vomitiones magis familiares sunt, secus ac evenit pleuriticis, observante Pisoni *Tr. Colluv. serosa pag. 230.*

(4.) Febris adest continua, ut plurimum

acuta cum symptomatibus intensioribus, utut febrem mollem seu epialam subinde se observasse referat Lindanus.

Contra in pleuritide semper conjunctus observatur dolor ambientis lateris seu pleurae affectus acutus, quando inspiramus, aut punctorius auctus, & tunc imprimis molestus; cujus originem ab acido, & fiendi modum per contracturam fibrarum pleurae eleganter explicat Helmontius *Tractat. Furens Pleura*. Adeoque rarum est, quod refert Lindanus, dolorem hujusmodi punctorium non in omni esse pleuritide: utut & pleuritis sine punctorio lateris dolore observata fuerit à Zacuto Lusitano *in Hist. Med. Princip.* & Tulpio.

Notabile est, quod praeterea addit Barbette *in Praxi*, quod nempe pleura in regione dorsi, ubi adnascitur diaphragma, inflammata interdum ab incautis habeatur pro nephritide, licet hoc fiat cum tummo detrimento aegri.

In inflammatione diaphragmatis simul extrema costarum spuriarum circa finem sterni imprimis dolent, & ista ventris pars, ubi diaphragma est extensum, dolorem percipit; dolor tamen exiguus est, inspirationem saltem aliquo modo turbans, & saltem molestia quaedam juxta sternum inspirando percipitur. Tussis magis sicca in principio aequè ac progressu morbi existit, & si humida, nec cum tam copiosis excretis, atque in pleuropneumonia, adesse solet. Et denique, cinguli instar supra lumbos, ventrem dolor ambit, & hypochondria tendi seu constringi videntur; facile tales delirant aegri, quod delirium paraphrenitidem appellant, exemplum elegans diaphragmatis inflammationi vid. in Platero *Observation. l. I. pag. 158*. Respiratio est inaequalis, modò parva modò magna, modò frequens, modò rara, &c. solent etiam non nunquam accedere convulsiones, & palpitare interdum videtur diaphragma: vid. Platerus *l. a. pag. 170*.

Denique in inflammatione mediastini paria ferè observantur, ut plurimum in anteriore pectoris regione incalescentia & dolor quidam non nihil gravativus in & sub sternum percipitur, citra tamen puncturam aut citra insignem aliam molestiam, nisi sub inspirando. Tussis verò quoad omnia instar pleuriticorum se habet, nempe in principio sicca, postmodum humida, in qua rubra & flava rejiciuntur, non tamen adeò copiosa. Pulsus qualis pleuriticorum.

Hepar inflammatum subinde paria ac

pleuritis habet symptomata, in eo tamen distinguuntur, quod dolor sit in latere dextro & circa dextrum hypochondrium gravativus, non punctorius, ut dolorosa quaedam plus minus tensiva molestia ad jugulum usque ascendere videatur: Pulsus est undosus, non durus; tussis sicca, non adeò frequens; nec tanta respirandi difficultas.

Quodsi progrediatur malum, ita ut pleuritides & omnes inflammationes hae degenerent in suppurationem, tunc hanc fientem quidem monstrat rigor, qui certum est indicium, & qui necessario omnes internarum partium, praesertim membranacearum, suppurationes comitatur, nec non exacerbatio doloris, febris, vigiliarum, ac similibus symptomatum: factam verò jam suppurationem monstrant dolor imminutus, febris remissior, respiratio liberior, & virtus vitalis non adeò debilis. Verum licet confecto pure & febris & dolor mitefcant, tamen instante disruptionis tempore vehementius cum horrore aegri denuò febricitant, ac difficilius ferè quam antea respirant.

#### PROGNOSIS.

Prognosis affectus hos periculosos admodum pronunciat; ita tamen, ut ex his pleuropneumoniae variis quasi speciebus, ceteris paribus, levissima omnium sit pleuritis, etiamsi interdum pullum intermittentem habere videatur, qui in ea minus periculosa est, vid. M.A.N.C. *Ann. 2. observat. 237. pag. 339*.

Vehementior autem & periculosior est peripneumonia, utpote quod morbi genus juxta Celsum plus periculi, quam doloris habet.

Adhuc vehementior & periculosior, ceteris paribus, est diaphragmatis inflammatio, quae acutissimus morbus est, atque aegrum citò in summum discrimen deducit, saepè jugulat; sicuti etiam mediastini inflammatio est periculosior pleuritide.

Quodsi absque interitu aegri finiantur hae pleuropneumoniae & his conjuncti affectus, curantur, vel

- (1.) Insensibili discussione & resolutione ipsius inflammationis; id quod fit nunc criticè, nunc medicè.
- (2.) Quando successivè per sputi crebrioris rejectionem solvitur.

(B b b b 3)

(3.) Quan-



(3.) Quando inflammatio successivè suppuratur, ac in abscessum vel empyema abit, quàm suppurationem fieri ostendit doloris, febris & vigiliarum exacerbatio.

(4.) Si per raram ac singularem materiæ morificæ metastasin terminantur: v. g. nunc per phrenitidem, nunc in singulares morbos articulares, nunc in abscessum in fura, nunc in ulcera tibiæ.

Si terminantur resolutione vel per sudores, vel diarrhœas, vel et copiosum fluxum, vel hæmorrhagias, vel aliis modis, imprimis est observandus motus naturæ criticus, qui nullo modo impediendus, sed potius promovendus: nam in diebus criticis natura sibi relicta imprimis solennes tales instituit evacuationes: vid. Amatus Lusitanus *Centur.* 7. *Curat.* 28. qui refert pleuritidem sævam sine V.S. die 14. per sudorem criticum curatam: Porro Piso *Tract. de Colluvie serosa* pag. 229. observat pleuritidem die 7. per sudorem curatam: Vallerioli *lib. 4. observation. 4.* habet historiam curiosam pleuritidis gravis in gravida 8. mensium, quæ solius naturæ ope sine V.S. die 4. per sudorem fuit curata: & *c.l.* aliam refert gravidam pleuriticam, quæ variis licet aliis adhibitis remediis, tandem die 7. 11. & 14. robore naturæ per copiosos sudores fuit curata; item *lib. 7. observat. 6.* simile ferè refert exemplum.

Quod attinet hæmorrhagias, v. g. narium, hæmorrhoidum, aut mensium fluxum, hæmorrhagiam septimo die criticam in pleuritide salutarem refert Lotichius *lib. 3. cap. 3. Observ.* 3. item Forestus *l. 16. observ.* 35. & *observat.* 37. habet pleuritidem per fluxum sanguinis ex naribus die 14. curatam: sicut pleuritidem in peripneumoniam conversam per fluxum mensium die critico sanatam, *idem Observ.* 36. & 39. refert: pleuriticæ mulieris exemplum per sanguinis mictum curatæ habet Ferdinandus *Consil.* 5. & pleuritis magna in gravida post partum ob uteri exanitionem curata in Ferdinando *Histor.* 13. observatur.

Interdum superveniunt diarrhœæ criticæ, per quas pleuropneumonix feliciter solvuntur: ipsemet curavi superiori anno mulierem, quæ ex pleuritide fiebat suppurata, in qua tamen ulceris omnis purulentia per diarrhœam criticam feliciter expurgabatur: Panarolus *Pent.* 1. *observat.* 36. observat senem septuagenarium pleuriticum, superveniente diarrhœa sanatum: sic diarrhœa salutaris pleuritidi superveniens observatur in Amato Lusitano *Centur.* 1. *Cur.* 7. Zacuto Lusitano *lib. 1. Præx. Admirand. observat.* 105. Desperata pleuritis per alvi fluxum curata in Val-

lerioli *Observ.* 4. & 5. *lib. 1.* Nec obstat *aphorismus* 16. *Sect.* 6. Hippocratis. *Diarrhœam, quando superveniat pleuritidi vel peripneumonia periculosam esse*; de quo imprimis videatur Castro: *Quæ ex quibus.* pag. 17. Aduarius *cap. 18. l. 5.* & Platerus *Præx. Medic. Tom. 2. pag. 14.*

Dejectiones fortentes sunt bonæ; innum enim ruptum abscessum & evacuationem furis per inferiora.

Inflammatio diaphragmatis sæpius est lethalis.

Porro in pleuropneumonia observandus est specialiter *aphorismus Hippocratis* 12. *Section.* 1. qui est: *In pleuritide (quod & valet in reliquis thoracis inflammationibus) si statim sputum in pleuresi in initio, intra tertium diem scilicet, appareat cruentum, brevem morbum indicat; sin verò seriùs, longum; sic quoque Aphor. 8. Sect. 5. dicit: quod pleuritici intra 14. dies non superne per sputum repurgati, empyici fiunt; qui verò ex pleuritide empyici fiunt, si in 40. diebus repurgentur, à die, quo ruptio facta est, liberentur, alioquin in tabem seu phthisin incidunt, uti habet Aphor. 15. Sect. 5.* Nempe pleuritis plerumque die 14to terminatur, aut saltem 20. dum nempe suppuratur; & quidem si æger 4to die exspuat sputum album, læve ac æquale, idque tertio vel quarto tussiendo, in septimo terminabitur. Si in septimo tale sputum primariò appareat, concurrentibus aliis signis bonis, morbus ultra 14. dies non extenditur.

Sputum autem nullum aut iterum suppressum, dolore & gravitate pectoris superstitæ, paucum, tenue, crudum, biliosum aut cruentum valde (utrumque scilicet sincerum,) item glutinosum valde, æruginosum, ac nigrum, malum; item si cum sputo copiosiore dyspnœa aut dolor non remittant.

Non tamen semper sputi paucitas & suppressio malum signum existit, cum sæpius per alias vias natura materiam peccantem criticè deturbet, scilicet per hæmorrhagias, diarrhœas, per sudorem: vid. Vallerioli *C. 4. observ.* 1. Rhodius *C. 2. observat.* 14. per *c.m.* vid. Schenckius *observat. l. 2. pag. 243 & 252.* item Horstius *l. 3. observat.* 10. Rhodius *l. 2. Observ.* & Botellus *C. 1. observ.* 17. *l. 5.* ubi in pus conversa materia per urinam & alvum excreta fuit.

Paria quoque de peripneumonia dicenda sunt: ea in genere est malum acutum, frequentissimè periculosum, non rarò lethale.

In specie sputorum magis quam urinx in morbis his ut plurimum habenda est ratio. Ut enim urinx sint optimæ & satis coctæ, si tamen sputa sunt mala, periculum portendunt & contrahunt; ac urinx in principio laudabiles, sanguinis recrementa cuncta in locum affectum



affectum deposita esse, testantur; contra, etiam si urinæ sint malæ, sputa verò bona seu cocta, melius; indicat enim, quod natura criticè expellat malum, & tales paulatim per solutionem hanc evasuros esse.

Nihilominus urina in principio crassa comparens, si circa quartum non turbetur, sed attenuetur, lethale est.

Peripneumoniam in pleuritidem transmutari, bonum est; convertitur enim materia peccans ab interioribus ad exteriora, quamvis hoc rariùs contingat: pleuritis autem peripneumoniæ combinata hujus periculum intendit.

Pariter peripneumonia pleuritidi & angina superveniens, vel per utriusque immutationem contingens, mala, & intra 7. dies moriuntur, sin hos effugiant, purulenti evadunt; vid. Hippocrates *Secl. 7. Aphor. 11. & Secl. 5. Aphor. 10.* nisi sputum maturè satis coctum copiosè & facile excernatur, cujus phænomeni rationem Willis. *l. 19. Pharm. Ration. P. 2. Secl. 1. cap. 9.* explicat. Sicuti contrà quàm miræ subinde sint peripneumoniæ metastases plus quam faustæ, vid. in Willisio *l. 4. 187.*

Peripneumoniæ si non resolvuntur, suppurantur; quæ suppuratio fit, si dolores exacerbantur, vigilæ continuant; hoc enim signum est tendere eam ad suppurationem, juxta ipsius Hippocratis Aphorismum inquit: Cum pus fit, malum majus est; facto autem pure omnia symptomata remittunt, & quieti redduntur, respiratio fit liberior, virtusque vitalis emergit. Quando verò abscessus rumpere incipit, insigniter rigor cum intensissima exacerbatione febris præstò est, ut & difficilior respiratio.

Vomitùs copiosus & biliosus in principio pleuritidis & peripneumoniæ apparens, salutem pronunciat; in progressu verò admodum periculosus est.

Pleuritici dolore levati, & tamen facie tristi oculisque perturbatis, signum est materiæ metastaseos in cerebrum, casusque ut plurimum lethalis est; indicat enim phrenitidem seu inflammationem membranarum cerebri.

Porro pleuritis in principio leviter apparens & usque ad quintum diem sic procedens, sexto verò exacerbata, ut plurimum est lethalis, interdum verò difficilis solutionis.

Item pleuritici subinde delirant. Delirium hoc quando fortem sequitur pleuritidem, res est sine periculo; sin mitiorem ac leviolem cum tristi facie oculisque perturbatis, tunc periculum subest, ut plurimum aut malignitatis latentis aut metastaseos pleuritidis in caput.

Aliàs prognosis pleuritidis & peripneumoniæ desumitur etiam à symptomatum gravi-

tate majore & minore, vel à viribus; ratione illorum febris mox summè acuta, sitis, agrypnia, delirium, convulsionones, hemiplegia, respiratio valdè anhelosa, orthopnoea, vomitus, tussis magna, & sicca, dolor ingens cum sudore circa caput & cervicem, aut universali frigido, periculum summum portant; & contrà symptomata pauciora ac mitiora: neque coryza ac sternutatio in his morbis suspitione carent, quatenus membranas cerebri in consensum trahi innunt: ratione harum, quatenus sæpè sub symptomatibus recensitis satis horrendis, si pulsus ad huc fortis & spirituum vigor adsit, melior ægroantium spes est, quàm si cum blandioribus ac paucioribus symptomatis pulsus debilis ac vires oppressæ fuerint, præprimis si illius parvitati frequentia & durities nimia accedat, utpote cum quo nullum evalisse Galenus testatur.

In magnis tamen doloribus cum febre ardente junctis, si pulsus fuerit parvus, neminem terreat; conf. Bartholinus *t. 5. Hist. 37.*

Post pleuritidem & peripneumoniam suppuratam & malè curatam, sequitur phthisis pulmonalis.

Qui semel pleuritide fuerunt correpti, illi levi occasione eam experiuntur.

### C U R A.

Omnes huic cognati morbi simili modo tractantur, quorum cura tribus gaudet indicationibus. Nempe

1. Sanguis stagnans est resolvendus, & blandis sudoriferis, tam generalibus quam specificis, acidum corrigentibus in naturalem circulum revocandus.
2. Hoc si fieri nequit, excretio & copiosa sputatio, quantum possibile, est promovenda, in principio quidem temperantium seu incassantium moderato- rum ope, in progressu verò per incidentia, miscenda hæc variè, prout sputi conditio & expectorationis ratio requisiverit.
3. Sin & hæc sint frustra, suppuratio inflammationis expectanda ac adjuvanda per pectoralia temperata, anodynis mista, & pus confectum educendum.

Pro his scopis meliùs obtinendis observandum:

1. Sæpissimè in primo morbi insuleu esse instituendam venæsectionem, eamque aliquoties interdum esse repetendam, prout necessitas & conditio affectus requisiverit. Interim tamen notandum, eam semper simpliciter necessariam non esse, quia potius tunc temporis appropriata remedia, ac in specie diaphoretica dissolventia, quæ sanguinis grumos resolvunt & sudorem movent citra venæ-

sectio-

sectionem non rarò malum tollunt ; vid. Helmontius *Tractatu Pleura Furens*, Holterhoff *de Erroribus Med. cap. 1. §. 2.* tamen per sudorifera posset præcaveri. Ac sanè per se nullum locum obtinet venæsectio, saltem ubi copiosior adest sanguis, & nimis acutus seu præceps morbi ad statum motus ; in tali casu per accidens interdum instituta & repetita venæsectio aliquale levamen affert : sic Lindanus necessitate coactus mulieri gravidæ intra 24. horas quinquies venam secavit, urgente nempe affectu. Propterea de tempore non multum deliberandum venit, siue vesperi siue manè siue medio noctis fuerit, dum necessaria est (quod tamen in nostro climate rariùs evenit) instituenda erit. Pluribus hanc de venæsectionis in pleuritide usu controversiam ventilatam videb. ab Hæchstedtero *Decad. 7. p. 107. & M.A.N.C. Ann. 9. & 10. observ. 190.*

Ubi ergo secanda est vena, observanda erit differentia pleuritidis ascendentis & descendentis. Nam eadem pro usu revulsionis instituat in pede, si est pleuritis ascendens; aut in brachio, si est pleuritis descendens. Aversionis verò seu revulsione particularis sanguinis gratiâ secetur in pede vena, & quod meliùs, oppositi lateris, si est descendens; in brachio verò pro aversione, si est ascendens, &c. Quibus paucis prolixæ istæ controversiæ de loco venæsectionis, quas agitarunt veteres insigni fervore, decidi possunt : Confer. Williius *Pharm. Ration. Part. 2. pag. 204.* Præstat autem, ut venæsectio fiat aliquot vicibus, nec longis intervallis, neque magna quantitate, ut loquitur rectè Hildanus. In peripneumoniæ Cura venæsect. nec revulsoria, nec averforia, nec derivatoria locum habet : quod igitur à corde recipit, eidemque iterum remittit. Interim sæpissimè & ferè tutissimè pleuritis benigna absque venæsectione curari potest, per diaphoretica, volatilia præsertim & specifica. Jam verò licèt in pleuritide benigna venæsectio si non juvat, non noceat, in, maligna tamen vix locum inveniet, sed semper erit nociva, refert Bartholetus *l. c.* sibi diuturna praxi esse compertum, omnes ferè, quibus in pleuritide maligna vena tunditur, mori ; è contra periculo defungi, qui sine phlebotomia sunt curati : Videatur etiam Gesnerus *l. 1. Epist. pag. 19.* qui similiter asserit, venæsectionem esse inutilem in maligna epidemica : quod sanè in pleuritide maligna verum arbitror, utut in epidemica non adeò semper locum inveniat ; Dodonæus enim *Observation. cap. 21. pag. 38.* refert, in pleuritide epidemica administratam venæsectionem salutarem ; neglectam verò lethalem.

2. Purgationes omnes esse frustras subinde nocivas ; disponunt enim ad rhœas exitiales, in specie, ubi sputum ciliis rejectum retrocedit. Purgatio in pleuritide non convenit, quia sanguinem agitat, & in partem affectam altius impingit, si ad declinationem malum pervenerit, si interdum conveniat purgatio, ut plurimum tamen ante diem septimum perniciosa deatur Riverius *Centur. 1. observation. 92.* primis verò præcedente sputo abstinet à purgatione, per experientiam, confirmat hoc Zacuto Lusitano *lib. 1. Prax. ad observat. 107. & 116.* quicquid etiam in contrarium dicant quidam practici, in hoc Rulandus in *thesauro practico pag. 129.* defendit acriter, quàm maxime ex usu in principio pleuritidis fortem purgationem & exempla refert plerumque per vomitum & secessum ex  $\nabla$  benedicta à se curatos. Quidam cum Rulando vomitoria valde dant : Sanè per se nil valent in pleuritide potius nocent, adeoque ab his est abstinendum, cum humores ad pectus magis moveant, per accidens verò, ubi locum vitiosa excrementa, in specie acidum & ruginosum in primis viis & intestinis fuerit : in tali casu primo in principio quod nihilominus Medicus rarò vocat prodest vomitus ; deinde etiam in morbi declinatione, factâ suppuratione, vel ad secessum rumpendum, vel hoc rupto ad ulteriorem puris evacuationem vomitus aliquid conducere potest. Bonè hic dissert Lindanus, dum dicit ; se in cura peripneumoniæ non audere vomitorium dare. Ita etiam in progressu vomitoria conveniunt, nil pulmonibus nocentiùs est : si enim tenuiter purgentur, diarrhœa accidit, cum virus per se molle sit ; illâ autem accedente sputum non coquitur, nec pus maturatur & pereunt ægri. Interim clysteres, ubi vi obstructio, magno cum fructu injiciuntur.

3. Ex omnibus remediorum generibus quæ huic morbo mirificè opitulantur, meliùs esse, quàm sudorifera & diaphoretica, in specie anti-pleuriticis juncta ; vid. Ronius & Schneiderus *citatis locis* ; item Petrus Johannes Faber *Cur. 8. 10. & 20. 60.* qui plurimos pleuriticos curavit per sudorificum & diaphoretico propinato, præter clystere, interdum etiam venæsectione, applicando externè ballamum sulphuris & emplastro di-sulphuris Rulandi. Confirmat hoc pariter Hildanus *C. 1. Cur. 52.* item Nealmus in *Observation. 32.* qui pleuritide



aliquot secta vena flores *Æi* diaphoreticos exhibuit, & statim prodeunte sudore omnes dolores punctorii abierunt. De antimonii diaphoretici usu vid. etiam M. A. N. C. *ann.* 3. *obs.* 72. Et sanè ipsa natura vel viam monstrat, toties per sudores spontaneos pectoris curatis ejusmodi inflammationes; imprimis in principio adhibeantur cum specificis aliis volatilia, in statu verò fixiora; vid. Ludovici *Pharm.* p. 237.

IV. Malè quidem in principio morbi, id est, quando natura ad sputum nondum inclinatur, præscribunt Practici plures expectorantia. Nam talia cum tussim stimulent vel adjuvent, non solum materiam crudam emittendam sollicitant, quod tamen frustra fit; sed & concussionem thoracis, pulmonum ac pleuræ inferunt, quibus in principio dolor intenditur, & mala hæc exasperantur, ut rectè observavit Gabelchoverus c. 2. *cur.* 93. ac proin saltem in incremento ac statu expectorantia dissolventia usurpemus. Et hæc *inter remedia, quæ sputi coctionem aut suppurationem inflammationis faciunt, malim, dicit Lindanum, decocta pectoralia, quam syropos & saccharata. Nobilissimum pectorale habemus in liquiritia & in passulis. Saccharum malè pectoralibus additur; nam constat, omnia dulcia, & mellita facile acescere in ventriculo, cui nil inimicitiæ quàm illud sylvestre acidum. Præscribuntur autem radices & herba pectorales, sed omittantur semper ista dulcia, nec credatis, gaudere pectus dulcibus, gaudet equidem insipidis, & que non habent qualitatem excedentem, non dulcibus extremè, ut saccharo. Liquiritia igitur convenit, quæ tamen in pauca quantitate sumenda, cavendo, ne uratur; tunc enim prava & acris fit.*

V. Opiata non negligenda sunt in curâ harum inflammationum, sed usurpentur in principio & incremento, saltem ad suffocandam nimiam morbi vim & sistenda pathemata dolorosa, quæ ipsa quoque ad corrigendam materiam expuendam cruditatem, adeoque eandem coquendam seu incrassandam multum præstare solent: vid. Wedelius *opiol.* p. 111. & 112. In statu verò & declinatione vitanda sunt, ne impediatur expectoratio, atque materia cocta nimis pertinaciter sic inhæreat, id quod sine suffocationis periculo vix fieri potest; qualem observationem Zacutus Lusitanus l. 1. *Pr. admir. obs.* 115. testatur. Solum papaver rhæase ejusque flores seu optimum specificum in toto morbi decursu locum habet.

VI. Benè observandum est, ut omnia, quæcunque ægri bibunt, calidè assumant. Nil nocentius est in his affectibus, & quod magis exasperare eosdem solet, quam frigidus potus, qui coctionem impedit, excretionem remoratur, tussim provocat, inflammationem intendit, & lædendo pulmones respirationem

difficiliorem facit, quæ omnia in calido potu contrario modo se habent. Est autem potus optimus decoctum hordei & liquiritiæ, idque in toto morbi decursu; item decoctum papaveris rhæados cum syrupo scabiosæ aut violarum aut capillorum Veneris. In contagiosa seu maligna decoctum rasuræ C. C. crudi, vel cum vel sine floribus papaveris, aut etiam cum sarsaparilla, optimum est potulentum. Potui ordinario addatur gelatina dentis apri, & R. florum papaveris erratici cum sero lactis parata, julepis: hinc pro potu ordinario, imprimis si febris ardens conjuncta, inserviunt julepi. Vel

ix. *Flor. papav. errat.* Mj.

*violar.* M. ss.

irror. c. f. q. ~ *Q* *dulcis.*

Infunde in f. q. *Decoct. priap.* l. C. C. stent in loco calido horis aliquot.

Colat. tibiß. ad le

*syr. flor papav. errat.*

*violar.*

*scabios. ana ʒj.*

M. S. *Bertheil: Pülender Julep.*

Præmissa igitur vel omnia V. Sine progrediendum statim est ad specifica pleuritica, sanguinem stagnantem dissolventia, sudorem prolicientia, inflammationesque erysipelaceas sistentia; circa quæ notandum: quod eadem sint, quæ in dysenteria & angina aliàs locum habent, uti rectè loquitur & experientia comprobavit Helmontius: Deinde, quod omnia ea specifica, quæ conveniunt in pleuritide, etiam convenientissimè in aliis quibusvis internarum partium inflammationibus à causa interna enatis, ut faucium, stomachi, intestinorum &c. prosint, cum omnes ejusdem sint naturæ sæpius erysipelaceæ. Appropriata talia remedia in pleuritide ex regno vegetabili sunt papaver erraticum, flores acaciæ nostratis, bellidis rubri, rosarum rubrarum, chamomillæ, carduus benedictus, carduus Mariæ, papaver album, taraxacum, scabiosa, pimpinella, ulmaria, hederæ terrestres, cherefolium, radix bardanæ, eryngii, sem. card. b. Card. M. papav. alb. *∇* æ destillatæ istorum simplicium in specie *∇* florum acaciæ, florum papav. rhæados, & *∇* florum chamomillæ, hyssopi & similes, singulatim præ cæteris omnibus hæc tria: papaver rhæas, carduus benedictus & Mariæ, quocunque modo usurpata, nunc simplici, nunc repetita vice, expectando sudorem, sunt optima, exque his parata *∇*, syrups, R. pulvis florum, succus & conserva horum. Usus hujus decantatum habet Valleriola *lib.* 5. *obs.* 5. & 10. Item ex sem. carduiben. & Mariæ sunt emulsionibus cum albis: v. g.

ix. *Sem. card. ben.*

*Mar. ana ʒij.*

*papav. albi ʒj.*

(Cccc)

Cum



Cum l. q.  $\nabla$  *cherefol. card. bened. & flor. papav. errat. f.* Emultio: adde  
*dent. apri præpar. vel maxill. lucii pisc.*  
 ʒi. aut ana ʒj. ad ʒʒ.  $\sim$   
*ʒii diaphor. ʒj.*  
 M.edulcoretur parum.

D. S.

**Stärck-Milch gegen das Seitenstechen.**

Subinde hauriatur expectando sudorem:

℞. *Ulmæ. vel cherefol. ʒiij.*  
*bezoard. mineral. gr. xij. vel xvj.*  
*syr. flor. papav. errat. ʒiʒ. ad ʒij.*

M. D. S.

**Träncklein gegen das Seitenstechen.**

A multis laudatur radix bardanæ, succus scabiosæ, & succus taraxaci, item succus pimpinellæ sanguisorbæ. Quoad succum taraxaci, cum hoc egregiam & expertam præscribit mixturam Barbette in sua Praxis l. 3. c. 1.

Ad hujus imitationem concinnior erit sequens formula:

℞.  $\nabla$  *card. ben.*  
*cherefol. ana ʒʒ.*  
*theriacal. ʒvj.*  
*succ. tarax. depur. ʒj. ad ʒiʒ.*  
*lap. & præp. ʒʒ.*  
*syr. papav. errat. ʒʒ. M. D. S.*

**Beitheilend Träncklein gegen das Seitenstechen.**

Mixturam sumat æger quovis quadrante horæ 2. cochlearia, operationem ejus mirabimini.

Post succum taraxaci est imprimis decoctum eryngii.

Quod ad radicem bardanæ, hac Castro Veronenſis cum summa copia glutinosi sanguinis, per sputum intra biduum rejecti, absque V. S. nec curavit pleuritidem: primo externè applicando & singulo bihorio renovando lintea duplicata cum spermate ranarum non destillato, sed per se servato, applicando, & ita per biduum continuando; hoc enim est singularissimum remedium ad quasunque inflammationes compescendas si applicetur. Secundò internè radice bardanæ seu lappæ majoris vere collectæ crescente luna, autumno verò decreſcente D.

Servantur radices, ac in umbroſo loco siccatæ & pulverisatæ dantur doſi cochlearis j. in vitro generosi vini; vel decoctum bardanæ ritè paratum ceu appropriatum sudoriferum pleuropneumonicis convenit.

Pertinet huc ratione ʒis volatilis lignorum fuligo furnorum, quæ est nobile specificum pleuriticum D. Horſtii junioris, dum fuliginem benè tritam lavat sæpiùs cum aqua florum sambuci, exſiccatur, & ita pulveriſatur: hujus pulveris ita propinati doſi ʒʒ. ad ʒj. in 10 sambuci vel infuſo papaveris rhæados, propinat expectando sudorem: ſic pleuritidem lævam pulvere fuliginis camini ad ʒʒ, in  $\nabla$

carduiben. die ſeptimo curatam habet Riverius centur. 2. obſ. 79. Laudantur quoque flores buxi, de quibus vid. Riverius Pr. l. 7. c. 2.  $\sim$  Pri, fuliginis, &c.

Ulterius quoque priapi ceti, cervi & tauri, ceu ſingularia remedia à quibusdam commendantur, quorum raſorum vel pulveriſatorum, præ reliquis tamen ceti, ad ʒj. in aqua ſpecifica aſſumitur; aut ex iis paratum decoctum, ceu corpus juleporum, cum aliis permiscetur. Hinc & Bartholetus in peripneumonia & pleuritide maligna raſuram priapi tauri commendat, cui tamen revera ceti & cervinus præferendus, aut alia alexipharmaca ordinari poſſunt.

Conveniunt ulterius partes animalium duræ, & c. volatili turgidæ, acidum ſanguinis imbibentes, præſertim in principio, & multò magis exinde parata ʒia volatilia &  $\sim$  urinofi, mediante ſudore ſauſtiſſima remedia, qualia ſunt: lapilli cancerorum, dens apri, caſtoris, maxillæ lucii piſcis, aut quælibet oſſa lucii piſcis, lap. carpiſonum, percarum, tali leporis, corallia rubra, hincque alia genera marina, ut & C. C. & ebur. Ex quibus ſpeciatim dens apri & oſſa lucii piſcis, lap. carp. & percarum, uti cætera marina, primas tenent, utpote quæ per ſe à ʒj. ad ʒʒ. vel ʒij. præterpropter in convenienti vehiculo inſigniter commendantur. Commodè etiam propinantur in emulſionibus, & in ſpecie ʒ volatile maxillarum lucii piſcis primatum ducit, tam in maligna, quàm benigna pleuritide. Loco hujus ʒis volatilis tamen etiam ʒia volatilia alia ſubſtitui poſſunt, uti & pulveres antipleuritici compoſiti Auguſtanorum, Mynſichtii, Ludovici, Wedelii, Trag. antipleuritica Hartmanni in Praxis Chym. Porro in ſanguine hirci legitime præparato expertiſſimum remedium eſt contra pleuropneumoniã, ad ʒj. propinatum in  $\nabla$  appropriata. Methodum parandi hunc legitimam beneficio abſciſſionis teſtium ex hirco videb. deſcriptum apud Helmont. Tr. Septuplex Dig. Tr. 75. & hinc à Zwelfſſero: quod ſi ab ejus uſu non ſtatim ſequatur ſenſibile levamen, repetatur aliquoties, idque faciendum mox in principio, antequam facta ſit ſuppuratio. De hoc ſanguine, ut & de dente apri, vid. Tachenius Morb. Princ. p. 126. Pariles virtutes habet ſanguis leporis ritè ad ʒj. collectus. Huc quoque pertinet Bezoar German. ſeu Ægagropilæ. Hiſ adnumeranda ſtercora animalium iudorifera & antipleuritica. Præ cæteris expertum eſt, præſertim apud Anglos, ſtercus equinum maſculinũ, ſi ſcilicet pila una ſtercoris hujus recens excreti hauſtui potùs ordinarii infuſa, aut cum vino vel aqua papaveris erratici macerata & ſubacta, probè exprimatur & ſuccus iſte expreſſus propinetur mox in principio,

capio, & quò citius, eò melius, expectando sudorem, & quoties opus fuerit repetendo: Conferatur Willisius *Pharm. Ration. Part. 2. p. 191. & 209. du Hamel de Affect. Corp. pag. 310. & Helmont. de Febribus.* Huic non cedit album Græcum & pulvis stercoris co' umbini, à ʒʒ. ad ʒj. in liquore conveniente propinatus, quem pulverem secretum Magnatum ad curandam pleurisin Panarollus *Pentec. 4. Observ. 14.* affirmat: Aut maceretur hoc stercus cum aqua papaveris rhæados, & hinc facta expressione propinetur. Ab aliis admodum extollitur stercus ovillum, quod subigunt in mortario cum aqua papaveris erratici vel cardui benedicti seu scabiosæ, & exhibent statim initio, quod Lindanus vocat nobile medicamentum: Nam, dicit, *præstat id ob* *nitrosum volatile quasi ammoniacale, habent enim stercora copiosum* *Θ\**. Porro multum convenit quoque sperma ceti à ʒʒ. ad ʒj. in vehiculo calido assumptum; hinc usu ejus cum castoreo misti curavit pleuritidem ex suppressione mensium natam Timæus von Guldensee *in cas.* imprimis si ex terrore subito mentes fluentes supprimantur, & ita pleuritis oriatur.

Denique quoad regnum minerale: excellit imprimis *~* *Θi* dulcis seu potius *~* antipleuriticus, imprimis ubi urget æstus febrilis; magis tamen sic convenit, dum nempe *V* digeritur & cohobatur aliquoties à specificis antipleuriticis, postmodum hic *~* subtiliori vegetabilium substantia imprægnatus miscetur cum parte dimidia *~* *Θi* invicem, digeritur, & cohobando destillatur, egregium dat spiritum antipleuriticum, cujus dosi ʒj. ad ʒij. in *∇* cardui benedicti expertum est remedium in pleuropnevmoniis, sudorem movet, inflammationes solvit, & simul expectorationem promovet, febresque sistit. Loco hujus paratur à quibusdam non inconcinne *R* bezoardica, recipiendo loco *~* *Θli* spiritum *Θi*, & ita ulterius lege artis procedendo: nobile est remedium ad ʒj. in *∇* appropriata, has inflammationes sudore mediante levans.

His adnumeratur mixtura simplex, *Δ*, ejusque flores, à ʒʒ. ad ʒj. vel solum, vel cum aliis, conf. Wedelius *loco alleg.* Hinc quoque pulvis pyrius egregium remedium est contra pleuritidē, ad ʒj. repetitis vicib<sup>9</sup> propinatus, tam nitri quam sulphuris ratione. Pertinent huc quælibet sulphurea *θ*ialia fixa sudorifera, & hinc etiā *θ* *θ*ij, *θ* diaphoreticū, bezoardicum minerale, Martiale, bezoardicum solare, *θ* *Θari* irradiatione calcinatum; Pertinent huc pilulæ antipleuriticæ Bartholeti, quibus nullum præstantius remedium inveniri asserit *l. 5. de Dyspn. c. 3. p. 451.*

Quod ad Formulas huic scopo applicandas

*~* *∇ charesfol.*

*card. ben. ana ʒʒ.*

*maxill. lucii pisc. vel lap. & prap. vel*

Tom. II.

*θij diaph. ʒʒ.*

*Θ vol. maxill. luc. pisc. gr. xvj.*

*laud. opiat. gr. ij.*

*syr. scabios. ʒʒ. M. D. S.*

*Zertheilende Mixtur Köffelweise.*

*~* *dent. apri prap. ʒij.*

*sang. hircin. prap. ʒʒ.*

*laud. opiat. Lang. gr. ij. vel iij.*

*M. pro pulvere:*

*Divid. in 3. part. æqual. S.*

*Zertheilende Pulvergen.*

*~* *maxill. lucii pisc. ʒj.*

*Θ card. ben. ʒʒ.*

*vol. dent. apri. gr. v.*

*laud. opiat. gr. iʒ.*

*M. t. pulvis:*

*~* *Sang. hirci ppt. ʒj.*

*bezoard. mineral. ʒʒ.*

*laud. opiat. gr. j.*

*M. f. pulvis pro 2. dosibus.*

Hisce remediis ritè adhibitis & subinde reitèratis, si non succedat per inflammationis diffusionem, adeoque diaphoresin & sudores, legitima morbi solutio, promovendum erit sputum, & adjuvanda materiæ intra pulmones partesque vicinas congestæ alteratio seu coctio, & hinc expectoratio, utpote quæ tunc ordinariò naturaliter supervenire solet. Hic conveniunt aliàs nota, in principio quidem temperantia sputi acrimoniam, idque incrasantia; Postmodum verò, quando sputum album, crassum & viscidum emittitur, usurpentur attenuantia, incidentia, & expectorantia.

Ad promovendam sputationem profunt potius decocta pectoralia, quam syrupi aut linctus pectorales, quoniam minus perferunt tales ægri saccharata. Convenit ergò in principio decoctum hordei cum radice glycyrrhiæ, helenii, scabiosa, cum syrupo violarum, de jujubis, de tussilag. papaveris, &c. Item decoctum & rob. passularum, decoctum helenii, scabiosæ, violarum, polypodii, veronicæ, salviæ, tussilaginis & papaveris erratici, aliaque similia temperata. Cum verò copiosius sputum apparere incipit, usurpandum venit decoctum hyssopi cum melle rosaceo ad promovendam meliorem excretionem materiæ. Ad coctionem quoque si quid aliud, imprimis facit *ο* seminis lini, & hinc *ο* amygdal. dulcium, sed recenter expressa, tam à veteribus quam modernis practicis, experientiâ duce, laudata; nempe Tacchenius alicubi spiritum vini camphoratum cum ana essentia croci, cum *ο* lini-l. amygdalorum dulcium datum, rarò fallere asserit; in *Hippocr. Chym. lib. 2. p. 102.* Vel

*~* *ο lin. rec. expr. ʒij.*

*syr. violar. ʒʒ.*

*∇ hyssop. ʒiv. v. vel vj.*

Dentur ʒij. vel ʒij. pro dosi, aliquoties in die:

(Cccc 2)

Vel

Vel saltem  $\circ$  lini recens sine igne extractum, cum saccharo mistum, & ita exhibitum, egregiè confert: Vel

$\mathfrak{R}$ .  $\circ$  lini  $\mathfrak{z}$ ij. vel  $\mathfrak{z}$ iiij.

Misceatur cum syr. *scabiosa* vel  $\nabla$  card. ben.

Quo suos pleuriticos egregiè restituit Gesnerus in *observat. & Epist.*

Sic Pilo ceu expertum habet  $\circ$  lini ad  $\mathfrak{z}$ iv. cum pulvere dentis apri ad  $\mathfrak{z}$ j. mistum, & ita propinatum, præsertim in principio: D. Carolus Reigerus adhibuit  $\circ$  lini cum speciebus dia ireos felici cum successu; vid. M. A. N. C. *Ann. 4. obs. 7. pag. 11.* Plura qui cupit de  $\circ$  lini, vid. Gabelchover. *Cent. 4. Curat. 68.* Hujus loco  $\circ$  amygdalorum dulcium, sed recens, ab  $\mathfrak{z}$ ib. ad  $\mathfrak{z}$ ij. in principio morbi propinatum crebrius, egregium est, emollit, dolorem lenit, expectorat, subducit alvum, &c. Confer. Thonerus & Platerus. Pertinet huc experimentum Quercetani & Bartholeti, quod est pomum excavatum, &  $\mathfrak{z}$ j. thuris repletum, & ita ad ignem coquendum, hinc deglutendum, aut cum  $\mathfrak{z}$ iiij. aut  $\mathfrak{z}$ iv.  $\nabla$  card. ben. propinandum; hoc enim multos restituisse refert Riverius *Cent. 1. observat. 56. & C. 2. obs. 63.* Quidam mastichen addunt: Quidam indunt  $\mathfrak{z}$ ib. thuris & superaddunt simul  $\mathfrak{z}$ ib. florum sulphuris, & ita coctum assumunt, & præstantissimum remedium dicit Fonseca *lib. 2. Consil. 85.* Aliàs quoque, ubi sputatio copiosior, prosunt  $\sim$   $\Theta$   $\star$  ci simplex, anisatus & succinatus,  $\mathfrak{R}$   $\Phi$  is. Conveniunt etiam flores asæ dulcis seu ipsa asa dulcis probè pulverisata, & permista cum syrupo seu conserva violarum, syrupo de tussilagine, papaveris rhizados, & in specie de jujubis, quæ egregiè temperant acres humores seu succos, & expectorationem blandè promovent. Quod si facta coctione fortius expectorandum sit, conveniunt incidentia & expectorantia in specie sic dicta, v. g. addendi sunt syrupi de hyssopo, de erysimo, nicotianæ, de quo vid. Epiphanius Ferdinandus *Histor. 32. & 45.* mel rosatum, sperma ceti,  $\sim$   $\Phi$  i dulcis, &c. Quibus omnibus tamen prætero succum raphanirecenter expressum. In specie  $\sim$  nitri dulcis moderata dosi dictis remediis additus multum conducit. Item aqua mulsa in difficultianacatharsi princeps est remedium, cui simul specifica varia ac pectoralia incoqui possunt.

$\mathfrak{R}$ .  $\nabla$  hyssop.

*scabios.* ana  $\mathfrak{z}$ ib.

$\sim$   $\Theta$   $\star$  ci anis.  $\mathfrak{z}$ j. ad  $\mathfrak{z}$ jib.

*maxill. luc. pisc.*  $\mathfrak{z}$ ij.

*syr. dia-cod.* seu *violar.*  $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S.

Brust-Mixtur Löffelweise.

$\mathfrak{R}$ . *Herb. charesol.*

*hyssopi.*

*Hb. scabios.* ana Mj.

*rad. liquirit.*  $\mathfrak{z}$ ib.

*enul.*

*polypod.* ana  $\mathfrak{z}$ vj.

*succum pingv.* No. vj.

Coq. in f. q.  $\nabla$ :

Colaturæ  $\mathfrak{z}$ ib.  $\mathfrak{z}$ ib. ad  $\mathfrak{z}$ ibj. adde

*Ess. croci*  $\mathfrak{z}$ iiij. ad  $\mathfrak{z}$ ib.

*syr. nicot.*  $\mathfrak{z}$ ij. l.  $\mathfrak{z}$ iiij.

M. pro potione maturante & expectorante. Inter Symptomata pleuriticis vexantia in toto morbi cursu præ cæteris nil magis urget, quàm dolor ille punctorius, acutus, mirè excrucians ægros; pro quo liniendo, præter internum laudani opiatum usum conveniunt externè varia anodyna & resolventia. In principio, uti dixi, applicatur sperma ranarum bono cum successu; Item Spiritus vini camphoratus, aut crocatus; Clauderus *Tr. de Balsam. Corpor*  $\Theta$   $\star$  ci p. j. & *ciner. clavellat.* p. ij. in  $\nabla$  simplici vel aquis destillatis solutorum, in sedandis & sopiendis punctiõibus pleuriticis admodum commendat; vel illinatur, unguentum pleuritic. *Mynsichtii in Armament. Medico-Chimic. p. 485.* calidè; item  $\circ$  antipleuriticum Petri à Castro, quod describitur in M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 10. p. 29.* Vel

$\mathfrak{R}$ . *Ung. di alth.*  $\mathfrak{z}$ j.

$\circ$  amygd. dulc.  $\mathfrak{z}$ ib.

M. D. S.

Lindernde Salbe.

Simplex est unguentum, sed expertissimum Rulando & Zacuto Lusitano, cujus effectum pariter observavi, si singulis bihoriis aut trihoriis ad summum, loco dolenti illinatur, ad imitationem Rulandi. Addere soleo interdum  $\circ$  destillati cumini  $\mathfrak{z}$ j. & gr. jx. camphoræ, meliori cum effectû. Conveniunt  $\circ$  jasminum, seminis lini, chamomillæ, hyperici, anethi, araneatum, liliorum alborum, papaveris, hyoscyami, scorpionum, florum verbasci, 7. florum Myns. sebum hircinum, unguentum pectorale, empl. de meliloto, de mucilag. it. iræatum, & de cumino, quod Deckers *Pr. Barbess. pag. 78. & 79.* describit; item emplastrum de meliloto cum oleo hyperici aut chamomillæ aut Philosophorum relaxatum,  $\circ$  etiam camphoræ excellens est, ut &  $\circ$  chamomillæ destillatum, &  $\circ$  ceræ, pinguedo muris montani (cui posse substitui arbitror sebum hircin.) est experimentum Paracelsi, qui tale medicamentum ordinat.

$\mathfrak{R}$ . *Pingv. mur. mont.*  $\mathfrak{z}$ j.

$\circ$  chamomill.

*rosar.* ana  $\mathfrak{z}$ i.

*amygd. dulc.*  $\mathfrak{z}$ ib.

M. F. Linimentum.

Item convenit balsamus  $\Phi$  is terebinthinatus & Rulandi, super-imponendo emplastrum dia  $\Phi$  is Rulandi.

Dicta



Dicta applicentur tepidè, & imponatur desuper linteum crassum, vel lapis calefactus, ut melius penetraret remedium: Item

- ℞. Ungv. dialth. ʒvj.  
empl. filii Zach. ʒß.  
℞ 7. flor. Myns. ʒiij.  
hyoscyam. expr. ʒij.  
destillat. aneth. ʒj.  
camph. ʒß.

M. pro Ungvent. resolvente.

- ℞. Emplastr. de melilot.  
filii Zach. ana ʒj.

c. f. q. ℞ verbalci f. emplastrum resolvens.

Succus caulium seu brassicæ & ex eo paratum unguentum à multis simpliciter est expertum: Sic factum emplastrum ex succo caulium cum pulvere cumini insigniter commendatum est à Gabelchovero *Cent. Curat.* 68. Sic etiam ex pulvere caulium cum pulvere cumini, caryophyllorum, & melle, expertum emplastrum fit contra pleuritidem Bartholeti. Quibusdam singulare habetur emplastrum subsequens:

- ℞. Picis naval. ʒiij.  
Castre. ʒß.  
cera flav. ʒvj.  
terebinth. clar. ʒß.  
℞ chamom. q. f. M.

Præmissa V. Snc, si opus est, & sudorifero, calidè applicetur.

Huc etiam pertinet stercus gallinarum cum ℞ chamomillæ, quod certè admirandas præstat virtutes. Fomenta quoque parari solent ex malva, althea, flor. sambuci, meliloti, chamomillæ, &c. quorum prolixam catervam apud Autores invenietis: e. g.

- ℞. Herb. cherefol.  
nasturt. hortens.  
fol. hyoscyam.  
flor. sambuc.  
melilot.  
chamomill. ana Mj.  
cepar. subciner. affat. ʒiij.  
farina fabar.  
lupinor. ana ʒj.  
nid. hirund. no. j.

Coqu. in f. q. lact. ebulyr. ad consistent.

Cataplasmat.

adde

camph. ʒj. M.

Quod si nec per sudorem, nec per sputi expectorationem desinant pleuropnevmonia, seu quæcunque inflammationes thoracis, necesse est, ut successivè suppurentur inflammationes, & ita in perfectum abscessum abeant; circa quem

1. Suppuratio promovenda.
2. Abscessus perfecti ruptio adjuvanda.
3. Abscessu aperto partis ulcerosæ mun-

dificatio & consolidatio, ac simul puris excretio, instituenda.

Suppuratio hæc in pleuritide frequentius contingit, in qua nunc saltem apostema colligitur intra pleuram, idque frequentius, nonnunquam simul ex parte intra pulmones istius lateris, idque rarius: Nam hoc revera sputo solvitur, dum illud sæpius suppuratur. Semper tamen in suppuratationis hoc negotio ad utrumque respiciendum. Pleuritis suppurata intra pleuram nunc rupto abscessu intra cavum thoracis fluit, nunc intra saccum ex dilatata pleura colligitur. Probè hoc observavit Lindanus, qui dicit: *Autores semper crediderunt suppuratione facta pus infundi in cavitate thoracis, atque empyema fieri: Verùm sæpe tantum est collectio puris in parte antè affecta, quod vidi in filia D. Pisonis, qua in pleuritidem incidit, quæ in suppurationem transiit. Locum Chirurgus candela cerea exploratoria exploravit aliè, sed inde nihil potuimus colligere: Nam puella mortua cum dissecta fuerit, invenimus membranam, succingentem pleuram dilatam in immensum saccum, in quo subsidebat omnis purulentia. Illud tamen magni Medici, hac de re consulti, omnes esse putabant. Verùm hic frustrà fuit paracentesis facta, & miserè obiit. Ad maturationem autem abscessus promovendam optima remedia sunt nicotiana, hederæ terrestris, cherefolium, & scabiosa, quæ 4. aliis suppurationibus omnibus præferantur; unde usurpetur syrupus de nicotiana, de hederæ terrestri, de symphyto Fernellii, de hyssopo.*

Externè verò ad suppurandum abscessum, ejusque apertionem, conveniet lac coctum cum malva arborecente, & ita sub forma cataplasmatidis crebrius impositum; mirè enim maturat & rumpit abscessum. Fetus etiam stercoris asinini, non minus quam stercoris caballini, in aqua appropriata vel vino dissoluti, factâ jam suppuratione maturat, & rumpit apostemata; vel conveniet etiam emplastrum filii Zach. vel apponantur cataplasmata ordinaria, ad maturationem & ruptionem abscessuum usitata.

Ubi facta suppuratio, opera danda, ut abscessus rumpatur, & pus evacuetur. Apertionem abscessus factam cognoscimus expuitione puris cum ichore plus minus cruento. Ut autem rumpatur seu aperiatur abscessus in tempore, optimum remedium est, si vomitus aut sternutatio excitentur, & patiens altâ voce clamando de latere in latus se volvat. Optimum esset, ut, quoties certi essemus de maturato abscessu, saltem perforentur spatia intercostalia, cū hoc securè fieri possit, modò loc<sup>o</sup>, in quo abscessus continetur, certè & exactè cognosci possit, qui nonnunquā rubore, tumore & dolore ad extra se manifestat. Neque enim in eo loco, quo in empyemate & pure, (Cccc 3) jam

jam in thoracis cavitate collecto, sectio fieri solet, apertio instituenda; sed ex pondere, dolore & calore locus, in quo abscessus hæret, investigandus, & intra duas costas leniter aperiendus, &c. sed cautè omninò procedatur: Quæ apertio quoque in abscessu intra pleuram locum habet. Sin in pulmonum quodam lobo simul suppuratio fiat, necessariò empyema expectandum venit. Ferdinandus in *Hist. Med.* 32. & 45. decoctum tabaci & illius post convenientem digestionem paratum syrupum, nec non tabaci fumum, ad rumpendam vomicam suppuratorum seu empyematicorum, & evacuandum pus non potest sufficienter commendare. Et testor Deum, me anno elapso non tantum à morte revocasse mulierem, quæ jam erat per tres menses pleuritica & suppurata cum febre hectica, quæ nicotianæ assumptione per tres dies, & ab hujus fumo accepto, tribus vicibus plus lbvj. puris albi, tribus diebus tussi evomuit, & nunc sana. Decoctum est hoc:

℞. *fol. tabac.* ʒj.

Bulliant in  $\nabla$  dulcis lbij. ad consumptionem medietatis, addendo in fine

*fol. malva.*

*branc. ursina.*

*violar. ana* Mj.

Colentur, & cum sapa misc. & detur calidiusculum pluries.

Fumus vero est:

℞. *fol. tabaci.*

Reponantur in cineribus adhuc ignitis, & fumus per fistulam seu embolum assumatur.

Cum quibus & terebinthinæ usum subinde adhibuit.

Facta ergo ruptione abscessus, & puris in thoracis cavum evacuatione ad evacuationem hujus vomitus convenit. Ad ulcus verò mandificandum & consolidandum, vel si aliæ partes antea inflammatae labem patiantur, præter remedia pus expectorantia eadem ferè medicamenta, imprimis ex nicotiana, hederæ terrestri & chærefolio sunt experta; quam hederam & stem ejusque succum & syrupum Lindanus præfert omnibus aliis remediis ad curandos abscessus suppuratos; egregiè enim apostema mundificat, & denuò consolidat, ne æger in empyema desperatum & phthisin incidat. Quibus ~ seu ꝑ terebinthinæ, & cum eo paratus balsamus  $\Delta$ is terebinthinatus & anisatus, flores ejus & modicum terebinthinæ, in specie in vitello ovi solutæ, & extractum  $\Delta$ is siccum, syrupus  $\Delta$ is Willisii, it. balsamus Peruvianus & hujus R commodè ad-di possunt.

Huc referenda sunt omnia ea, quæ supra de phthisi pulmonali ex eorum exulceratione monui, & etiam infra de empyemate monebuntur. Potus toto morbi cursu sit decoctum hordei & liquiritiæ, vel decoctum papaveris rhæados cum syrupo capillorum Ve-

neris. Convenit etiam Potus sulphuratus quicunque secundum Helmontii hypothesein præparatus.

#### CURA PLEURITIDIS NOTHÆ.

Quoad pleuritidem notham: prima ista, quæ est ab inflammatione partium externarum, internis diaphoreticis, ad quaslibet inflammationes supra laudatis, & externis sacculis ac fomentis discutientibus levatur, nisi plerhora aut ingens sanguinis stagnatio sanguinis missionem quoque urgeat.

Restat unus adhuc scrupulus eximendus circa opii & opiatorum usum: Scilicet posset horum usus esse suspectus, cum impediatur naturæ motum in lymphæ vitiosæ expectoratione consistentem: nam uti illa ~uum, ita quoque humorum motus sistit. Observavi quippe in muliere: cui liquorem C. C. succinatum cum essentia opii præscripseram, conquestam fuisse ex hujus usu: *Es sen ihr so dämpficht umb die Brust.* Sciendum tamen, opium scilicet non curare, sed saltem symptomata palliare, simul autem atrociora ex doloribus continuis imminencia præcavere, hinc quò commodiorem agendi occasionem accipiat Medicus, rectè usurpari poterit; & quidem in principio & incremento ejus usus semper convenit, quando nempe tussis sicca & febricula vesperei affligere solet; in statu verò opiatum in usum non sunt vocanda, quia jam tum collecta est materia mucosa.

Pleuritis notha ab acido acri, intra pleuram & musculos intercostales solitariè collecto, per diaphoretica, salia volatilia, opiatum mixta tollitur, in specie spiritu salis ammoniaci anisato cum dimidio essentia opii mixto, & propinato, expectando sudorem. Egregiè quoque conducit  $\delta$  diaphoreticum cum maxilla lucii piscis, dente apri, & opiatum propinatum, vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 72.

In pleuritide notha, quæ est à sero scorbutico, diaphoretica maximi usus sunt, quibus quamvis rariùs V. S. jungenda: vid. Dravviziùs de scorbutico Tit. 7. potissimùm cum per hæmorrhagias críticas illa interdum solvatur, v.g. mensium fluxum, vid. Riverius c. 1. *Obs.* 47. Imò in scorbutico antiscorbutica illis miscenda. Valent hic etiam sacculi ex resolventibus, aut unguentum, quod Dravviziùs l. 4. p. 252. describit.

Si à flatibus hæc fuerit, carminantia, discutientia atque diaphoretica interna & externa conveniunt. Non rarò tamen V. S. ne quoque opus esse testatur Riverius C. 3. *obs.* 3. & Forestus l. 6. *obs.* 42.

Quod attinet pleuritidem verminosam, ea medicamentis verminosam progeniem enecantibus curatur. Præ cæteris convenit  $\nabla$  galis seu Hermetica, parata ex  $\nabla$  cardui benedicti, in qua agitatus fuerit aut aliquantum ebullierit  $\phi$  vivus: ubi subsederit  $\phi$ , decantata  $\nabla$  propinetur cochleatim; ita

omnes

omnes vermes certò interficit & exturbat, quibus ejectis affectus ipse cessat. Conf. Riverius *c. 1. obs. 75. 1.* Sic quoque phlegma & Oli, it. phlegma & Qis in conveniente vehiculo usurpatus, vermes egregiè abigit, v.g.

4. ▽ violar.

card. bened.

ferrar. ana ℥iij.

syr. hyperic. ℥i℥.

— Oli dule, gutt. vj. vel x, vel q. s. pro modica aciditate.

M. D. S.

**Träncklein wider die Würme.**

Hæc mixtura capiatur cochleatim, haud tamen negligantur diaphoretica interna ac solventia externa.

**ARTICULUS X.**

De

**Inflammatione Hepatis.**

**V**Lterius inter reliqua viscera hepar etiam interdum & satis periculose inflammatur, quod ipsum inflammatum interdum abit & degenerat in abscessus, totum ejus parenchyma devastantes. Non enim tantum in Schenckio leguntur exempla abscessuum in hepate post inflammationem, ubi totum parenchyma suppuratum fuit; sed etiam imprimis Forestus egregium habet casum *l. 19. obs. 10.*

**CAUSÆ.**

Rariores equidem sunt tales inflammationes, & in specie quoad causas agnoscunt easdem, quas reliquarum partium inflammationes, subinde tamen externa læsio, in specie contusio circa regionem hepatis & casus ab alto in hypochondrium dextrum disponunt ad hujus inflammationem; item præter has nonnunquam emplastra & unguenta nimis calida hepatis ac stomachi regioni, ubi lobus hepatis hunc attingit, ad mota hujus inflammationis causa sunt, uti etiam cucurbitulæ hepatis regioni crebrò affixæ. Conf. Hildanus *c. 7. obs. 46. & 47.*

**DIAGNOSIS.**

Quoad Diagnosin: Hepar esse inflammatum ex symptomatis adjunctis cognoscitur. Cautè autem considerentur omnia symptomata, quæ sunt admodum diversa, prout nempe inflammatio est vel in parte hepatis gibbea, vel convexa, vel prout eadem est in parte concava. Nam si Inflammatio hepatis est in parte gibbea, magis urgere ferè solent symptomata pleuritidis simillima, seu quæ aliàs observari solent in pleuritide vera; si verò inflammata magis sit pars ejus concava, urgent magis symptomata stomachi & intestinorum.

Non facilè hepar inflammatur, aut si inflammatur, febris tamen & æstus, ac cognata symptomata non adeò intensa sunt, quàm pro ratione partis esse deberent, quia nempe he-

par parvam habet arteriolam. Jam verò in omnibus inflammationibus à sanguine arterioso magis, quàm venoso, intendi solent symptomata. In genere verò percipitur in omni hepatis inflammatione dolor obscurus & sensitivus ratione membranarum, ac gravativus ratione visceris, isque circa regionem hepatis in dextro hypochondrio & ejus profundo, qui sub suppuratione punctorius plus minus evadere solet.

Equidem non rarò apparent dolores punctorii in hypochondrio dextro, qui tamen nunquam sunt ex hepate inflammato: Sed revera tunc vitium in colo hæret, à vicinis partibus, quæ aptæ sunt, ut dolorem talem repræsentent. Adest simul in inflammatione hepatis mox febris, nunc quidè magis acuta, ubi major est inflammatio, nunc verò minùs acuta, sed sæpius lenta, pro ratione circumstantiarum in eo inflammato observabilium, prout nempe inflammatio vel intensior vel remissior, ac nunc profundas plus minùs, nunc externas magis partes occupat: vid. Forestus *l. 19. c. 7. in schol.* Nam perpetuò inflammationis magnitudinem vehementia febris analogicè comitatur.

Quod si hepar inflammatum simul afficiat diaphragma, cui per ligamentum latum firmiter est annexum, dolor ad jugulum adscendens percipitur, quasi ad inferiora traheretur, præsertim dum vehementius ager inspirat: Ob id tussis arida seu inanis per intervalla affligit, & difficultas respirationis ægros cruciat, nec non decubitus in latere affecto est difficilis, non secùs ac in latere opposito, unde ferè supini jacent ægri, pulsus est frequens, celer, inæqualis &c. Adest simul sitis intensa, anorexia, lingua arida, calor mordax totius corporis, &c. Sin verò hepatis pars cava laboret, præter suprà memorata symptomata generalia urgent in specie symptomata stomachi, singultusque frequens oboritur, vomitus bilis subinde supervenit, interdum & diarrhœa adest, it. nausea, anorexia, & similia.

Cum verò dicta symptomata sæpius in pleuritide etiam adsint, ob id necesse est, ut accuratè distinguatur pleuritis vera ab inflammatione hepatis, in specie cum symptomata hæc multos fefellerint, & non pauca exempla prostant curatarum hepatis inflammationum pro pleuritide, aut saltem pleuritidi similibus. Exempla jam nota prostant in Galeno, quæ videntur; imprimis in Valleriola, Horstio, Zacuto Lusitano *l. 2. Med. Princ. hist. 101. it. conf. Schenckius in obs. l. 3. P. natollus Pent. 1. obs. 37. & Forestus l. 19. obs. 12.* adeò ut referat Amatus Lusitanus, se observasse jecoris inflammationem cum tussi & sanguinis scretu conjunctam, idque *cent. 4. obs. 1.* In specie, si pleuritis circa costas nothas dextri hypochondrii affligerit, facillimè cum



cum hepaticide confundi potest. Signa ergo distinctiva sunt imprimis dolor punctorius, qui in pleuritide est longè acutior acerbiorque; parvus verò vel nullus in hepatis inflammatione: Item inspiratio in hepatis inflammatione est difficilis; expiratio verò facilis, cum utraque difficilis satis sit in pleuritide. Ad hæc tussis longè & vehementior & frequentior, eaque humida in pleuritide, quæ in hepatis inflammatione est mitior, arida & sicca: ac in specie rejiciuntur in pleuritide copiosa; quæ contrà pauca sunt in hepaticide: pulsus pleuriticorum est durus, ac ut vocant, serratus, qui in hepaticide magis ad undosum accedit: denique pondus gravans & quasi deorsum trahens thoracem percipitur in latere dextro, quando hepar est inflammatum, ubi etiam non rarò tumor aut renisus quidam percipitur tactu, quando hepar in parte sui convexa est inflammatum; quæ minùs in pleuritide apparent.

In genere in pleuritide vera omnia sunt acerbiora & vehementiora, in inflammatione hepatis remissiora.

Fit interdum etiam, ut cum hepate inflammato concurrant dolores ventris, unde contingere solet, ut à quibusdam hepatis inflammatio habeatur pro colica; exempla habet Hildanus *cent. 7. obs. 48.*

Distinguuntur verò facilè per adjuncta symptomata, per febrim, per tussim, per difficultatem respirandi, & similia, quæ in colica ferè abesse solent.

Non rarò linea ex rubro nigricans latissima cum vesiculis elatis in hypochondrio dextro, maximis stipata doloribus, hepatis inflammatione patefacit, vid. *M. A. N. C. ann. 3. obs. 215.*

Porrò musculorum abdominis externorum descendentium & ascendentium inflammationes circa hepatis regionem fallunt interdum Medicos, ut illos habeant pro inflammatione hepatis, idque imprimis, si profundè sint inflammati. Exemplum elegans & curiosum talis fallaciæ habet Valleriola *l. 4. obs. 5.* item Bartholinus *C. 2. epist. 45. p. 543.* ubi prostat notabile exemplum ex contusione ortorum inflammatorum musculorum, loco hepaticidis curatorum.

Distinctio tamen horum affectuum est facilis, cum ut plurimum in inflammatione musculorum abdominis percipiatur dolor pulsabilis, qui ferè est nullus aut saltem exiguus in inflammatione hepatis, propter parvam & unicam ejus arteriolam: Præterea pectoris symptomata absunt in inflammatione musculorum abdominis; quæ tamen adsunt in hepatis inflammatione: tactus etiam circumscriptum percipiens tumorem, eumque non profundè nimis situm, sed sensibilibiter protuberantem, facilè judicat, an hepar an musculus sint inflammati? Si enim musculus ab-

dominis, imprimis externi, sunt inflammati, tumor magis est circumscriptus, & tactu perceptibilis, qui tamen minùs cognoscibilis est, si hepar in gibbea sui parte fuerit inflammatum: Insuper symptomata interna, puta febris, sitis & pathemata alia in hypochondrio, sunt longè intensiora in inflammatione hepatis, quàm musculorum abdominis.

Denique dum inflammatio musculorum abdominis incipit suppurari, dolor est punctorius; contrà in hepatis inflammatione dolor ferè nullus perceptibilis est.

Interim tamen, quod rectè monet Sennertus, cavendum, ne fallamur, si tumor in medio ventre apparet, cum quibusdam etiam hepar ad medium ventris extendatur.

Sed quoad hæc conf. imprimis Sennertus *l. 3. Prax.* ubi de hepatis inflammatione, ejusque epitomator, Riverius.

Pro majore dictorum illustratione conferratur exemplum notabile apostematis in jecore ex Coitero ejusque observationibus *Anatom. Chirurg. Miscell. pag. 120.*

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: aut discutitur hepatis inflammatio, aut successivè suppurata abit in abscessum, ac malè curata in scirrhum degenerat. Si suppuratur, ruptus abscessus frequentissimè nunc per alvum, vid. Salmuth *Cent. 1. obs. 27.* & Hercules Saxonia *pag. 16.* nunc per urinam, vid. Salmuth *l. 4. obs. 28.* expurgatur.

In specie dicunt Practici; Si inflammatum sit hepar in parte gibba, expurgationem fieri imprimis per urinam; sin in concava, magis per alvum.

Interdum etiam, sed rariùs pus hepatis copiosum per vomitum ejicitur, quale exemplum videb. in Salmuth. *Cent. 1. obs. 27. & 28.* Fernelius *Pathol. l. 6. cap. 4.* *M. A. N. C. Ann. 8. pag. 121.*

Rariùs adhuc fit, ut ipsum purulentum excrementum hepatis suppurati per sputum & tussim, more pleuriticorum rejiciatur: Exemplum tamen videbitis in Schneidero *lib. 4. de catarrh. pag. 103.* Erasmo *lib. 4. Disp. de Febr. putr. & Friderico Hoffmanno M. M. p. 313.*

Rarissimum adhuc est, quod hepatis abscessus maturatus per metastasin materiz tranteratur in furas, quale exemplum videbitis in Schenckio *l. 3. obs. de hepate* & Jacouii, *Comm. ad Coac. Hipp. pag. 349. & 826.* nec non Bauhino *de obs. propriis.*

Aliàs periculosum & acutum malum est inflammatio hepatis, & quæ sæpiùs ad mortem deducit ægros.

Ea inflammatio, quæ in cavo hepatis contingit, periculosior esse solet propter graviora ventriculi symptomata concurrentia, magis inappetentiam, nauseam, vomitum biliosum, & si.

& sitim ingentem affert; quæ verò in parte gibba, mitior est, majorem tamen respirandi difficultatem, frequentiore tussim & dolorem usque ad dextræ partis jugulum infert.

Sic singultus admodum contumax, superveniens hepatis phlegmoni, lethale ferè est signum, ac malum portendit: conf. in specie Forestus *lib. 19. obs. 8.* Hippocrates *sect. 5. aphor. 58. & sect. 7. aph. 17.*

In inflammatione hepatis, si sub cursu morbi ex usu nitri & nitratorum sequatur copiosa urinæ excretio, res salva est, & optimum indicium.

Hepatis inflammatio, si dies & noctes 21. excedat, & febris perduret, tumore non subsistente, in suppurationem fertur: Vid. Hippocrates 4. *Acutor. B. M. A. N. C. obs. 74.*

Quibus hepar aut lien suppuratus est, iis plerumque hæmorrhagia narium supervenit primis septem diebus, paucis undecimò, rarissimè decimo quarto, & confert illa hæmorrhagia, si à directo fiat.

Pessima signa inflammationis sunt febris ardens, sitis inexhausta, lingua scabra, refrigeratio extremorum, dum interiora uruntur; vomitus item niger & porraceus.

Morti proximis venter intumescit, ruptò abscessu, & frigidum sudant circa collum & faciem, atque animo linquunt.

Cum hepatis inflammationem febris ardens & continua comitatur, malum est, quia vehementer viscus inflammatum significatur.

## C U R A.

Quod attinet ergò curam inflammationis hepatis: eadem est cum omnibus reliquis partibus internis inflammatis. Unde omnia antipleuritica, præsertim camphoratis mista, etiam hinc in usu erunt; saltem quoad spotum variat cura, simul quoque ad partem affectam, cujus tonus facilè lædi potest, & qui amaris præsertim conservatur, semper respectus habendus est. Nam præmissa vel omissa venæ sectione in brachio, & hinc in pede, blandæque laxatione cum pulvere comitis de Warvick, de tribus, imprimis diaphoretica, v. g. mixtura simplex ad 3j. liquor cornu cervi succinatus, salia volatilia, spiritus nitri dulcis, antimonium diaphoreticum, sudoriferum magnum Fabri, bezoardicum Joviale, ut & alia ex Jove, densapri, flores sulphuris, & similia convenient; e. g.

\*. C. C. f. Δ gr. xv.

Ξii diaphor. ʒß.

Θis vol. C. C. vel Viperar. gr. viij.

M. f. pulvis: S.

**Zertheilend Leber-Pulver.**

In principio & incremento allumatur in aquis dictis hepaticis aqua agrimoniz, cichorii, endiviæ, taraxaci, &c. Vel

Tom. II.

\*. Ξii diaphor. ʒij.

Bezoard. Jovial. gr. xij.

Θiscard. bened. ʒß.

Laud. opiat. gr. ij. M. pro 2. dos.

Purgantibus reliquis & vomitoriis omnibus prætermisissis nitrum antimoniatum, nitrum simpliciter depuratum, & quælibet nitrata, item antihecticum Poterii, interno usu laudari assolent: item Saturnina, v. g. saccharum Saturni, crystalli mineræ Saturni cum spiritu nitri & similia. Zacutus Lusitanus *l. 2. Prax. Admir. obs. 39. & 40.* ceu expertam commendat cassiam fistulosam recenter conditam, item colum, fructum quendam peregrinum ex Guinea allatum. Quibus omnibus amara quævis, hepatica dicta, associari possunt. Pro Potu ordinario inserviant temperata, imprimis si inflammatio pergere minetur ad abscessum; qualia sunt julapium ex decocto radices cichorii cum floribus papaveris erratici, cum nitro & saccharo: sed oportet dare calidum, & minimè confertim; vel detur decoctum hordei & radices graminis cum radice cichorii, passulis, & tantillo liquiritiæ, & syrupo violaceo aut capillorum Veneris. Circa finem tamen inflammationis addenda simul diuretica, radix apii, petroselini, agrimoniz, & similes.

Cum his internis externè in inflammatione hepatis circa principium conveniunt linimenta & epithemata penetrantia, discutientia & ardorem compescentia, calidè tamen applicanda, e. g.

\*. Ungu dialth. ʒß.

ol. absinth ʒij.

destill anethi ʒj.

camphor. gr. ix.

M. D. S.

**Lindernd und zertheilend**

**Leber-Salbleim.**

Spiritus vini blandè camphoratus, cum aqua plantaginis vel rosarum dilutus, vel solitariè cum linteo multiplicato calidè applicatus à Keslero laudatur.

Vel \*. ∇ Hyoscyam.

Plantag.

Nymph. ana ʒj.

Qi depurat. ʒß.

Camph. in ∇ solut. gr. xv.

M. f. Epithema.

Insuper ex aliorum consilio nitrum, cum aceto rosaceo & succo sempervivi majoris vel & telephii solutum, sub forma epithematis externè tepidè regioni hepatis admoveri potest: Vel imitemur Forestum *lib. 19. obs. 9. & c. 12.* qui mirè commendat in inflammatione hepatis, ad abscessum quoque tendente, discutienda totum.

Tandem casum & curam singularem inflammationis hepatis ex nimia salacitate Venerca

(Dddd)

nera videb. in Joel, *in sua Praxilib. 5. sect. 4. Artic. 3. pag. 11.* quo loco habet peculiare remedium, nempe jecora galli nigri in aceto dissoluta & propinata.

Quodsi his administratis inflammatio discuti nequeat, sed nihilominus ad suppurationem tendere videatur; ( id quod docet dolor, febris, aliaque symptomata ingravescentia, vigores nullo ordine accedentes, quos caloris exacerbatio sequitur; confecto verò pure omnia illa mitescant, vires tamen debiliores relinquuntur, pulsus frequens, languidus, & interdum animi deliquium, ) tunc internè temperantibus suppuratio est promovenda. Propterea fiant cataplasmata ex emollientibus & blandè discutientibus, cum addito croco & summitatibus absinthii, pro hepatis tono melius conservando, in moderata licet quantitate. Pro usu interno:

℞. *Rad. China in taleol. incis. ʒiʒ.*

Macerentur in Mariæ Balneo per noctem in ∇ simpl.

manè adde

*Rad. liquirit. ʒj.*

Coqu. ad medias: huic infunde

*passul. conquassat. ʒiij.*

Post refrigerationem colaturæ

℥iʒ adde

*syr. de scabios.*

*Violar. ana ʒiʒ. vel q. s. M. D. S.*

#### Temperirender Leber-Tranch.

Suppurato abscessu ejus apertio est promovenda; id quod præter artificialem apertionem ut plurimum spontè fieri & diversimodè nunc per alvum, nunc per urinam, nunc per tussim, nunc per vomitum, expurgari solet. Quodsi ergò in parte cava fuerit vomica, cum tussi, corporis qualicunque jactatione, aliisque similibus modis, ejusdem ruptio est promovenda. Sin verò inflammatio sit in parte hepatis gibba, ac exteriora versus satis promineat tumor suppuratus, etiam extrinsecus per apertionem quatuor muscutorum abdominis è jecoris regione mediante scalpello abscessus perforari, vel caustico potentiali aperiri, & ita pus evacuari potest; vid. Hercules Saxonia *Prælect. Pract. lib. 2. pag. 159.* Sennertus *in Praxi*, Bartholinus *Cent. 2. Epist. p. 639.* Horstius *in Problem. p. 79.* it. Amatus Lusitanus *Cent. 7. Cent. 76. & 77.* Schenckius *lib. 3. Obs.* Rupto seu aperto abscessu optimè convenit oxymel, vel simplex vel diureticum; ac alia quoque diuretica, & imprimis blandè alvum laxantia, quæ excretionem puris per urinas promovent. Vid. Salmuth *Cent. 1. Observat. 27. & 28.* Quod si itaque ad intestina rejicitur pus, idque imprimis, dum cavum hepatis suppuratum fuerit, mediantibus vasis choledochis, internè attemperantibus acrimonia puris est mitiganda, simulque hydromel plus minus medicatum exhibendum;

externè verò blandis clysteribus intestina abstergenda, & excretio promovenda. Quodsi verò per renes evacuetur purulenta materia mediante sanguinis circulo, imprimis dum hepatis gibba pars inflammata sit, supradictum oxymel diureticum, item serum lactis plus minus medicatum, emulsionem seminis violarum, item decoctum radices apii, petroselinii, agrimonie, baccarum juniperi, &c. cum hydromelite factum, præsertim si juncta febris mitior fuerit, propinare convenit. Si regurgitando ex intestinis vomitu rejicitur materia purulenta, promoveatur hic ipse attemperantibus, pinguibus jure pinguidiusculo, cerevisia butyrata, oleo amygdalarum dulcium, &c. Quodsi verò fiat, ut ab acrimonia puris in facto abscessu erodatur hepatis membrana, adeoque pus in cavum abdominis excidat, periculum est, ne contentæ corporis partes, præsertim membranosæ, & ipsæ erodantur, atque ad sphacelum plus minus disponantur. In tali casu veteres ad incisionem abdominis accesserunt, ne scilicet aliquid intentatum relinquerent, de quo intelligendus *Aph. 45. sect. 7.* Hippocratis. Observatum tamen fuit, pus ita in cavum abdominis effusum per alvum evacuatum fuisse, erosâ forsitan in quodam loco intestinorum substantiâ, & ita excreto pure. Sub tali puris evacuatione non tantum naturæ ductum Medicus sequatur, sed & simul ex abscessu relictum ulcus mundificet & consolidet. Quo pertinent imprimis decocta vulneraria cum lignis, item decoctum radices chinæ vel sarsaparillæ; ista enim decocta simul urinam promovent. Inter vulneraria ista agrimonia, & omnia ex hac parata, sunt optima. Serum lactis, cui talia vulneraria incocta sint, pro absterfione & per urinas evacuatione est optimum: e. g.

℞. *Ras. ligni, Juniper. ʒij.*

*Sassaf. ʒj.*

Macerentur per noctem in ℥iv. ∇ x comm. manè adde

*Hb. Veronic.*

*Heder. ʒiʒ.*

*Alchymill. ana Mj.*

*C. C. raspat. ʒvj.*

Coqu. invicem ad casum tertiz partis vel medietatis:

Colaturæ adde

*syr. de symphyt Fernel.*

*Hyssopo ana q. s.*

pro gratia saporis: M. S.

#### Blutreinigender Leber-Tranch.

Quibus tubinde simul addenda venit terebinthina cruda in vitello ovi soluta; hæc enim mundificat & consolidat, & reliquias mali absumit: Item balsamum sulphuris terebinthinatum, vel solitariè, vel cum saccharo Saturni mistum, est elegans. Verum ex abscessu & ulcere hepatis, nisi superficiale aut leve fuerit,



rit, rari sunt, qui evadere solent, omnibusque inflammationibus suppuratis malè curatis supervenit phthisis. Applicari aliàs possunt ea, quæ in mesenterii abscessibus & ulceribus adhibet Martini loco supra citato.

## ARTICULUS XI.

De

### *Inflammatione Lienis.*

**P**ost hepar interdum Lien etiam inflammatur, ut rarissimè contingere solet, cum pauca ejus prostant observata, quorum exempla tamen videbitis in Foresto *lib. 20. obs. 5. 6.* atque Lollo *Cent. 3. obs. 45.*

#### CAUSÆ.

Causæ sunt eadem cum reliquarum partium inflammationibus.

#### DIAGNOSIS.

Quoad signa & pathemata concomitantia: ea sunt calor, fervor, ac ferè tumor, & pondus gravans nonnihil, seu dolor gravativus in profundo sinistri hypochondrii. Cum verò ren sinister sit elatior dextro, & ibidem proximè adiaceat spleni, ita ut inflammatio renum faciliè possit confundi cum inflammatione lienis, ob id cautè hæ ipsæ discernendæ sunt. Distinctio imprimis petenda est ex dolore insigniter pulsatorio, qui in liene est satis sensibilis propter arterias, quas splen obtinet, copiosissimas, adeò ut à quibusdam dicatur, quod appositâ manu regioni lienis pulsatio ferè sensibilis extrinsecus percipi possit, de quo tamen meritò dubitatur; cum econtrâ talis pulsatio pauca vel nulla sit in renum inflammatione. Symptomata quoque in renis inflammatione magis posteriora affligunt; contrâ eadem in splene inflammato anteriora nonnihil latera & superiora occupant. Insuper in renis inflammatione dolor est adeò ingens, febris in lienis inflammatione adest continua, sed non adeò intensa, respiratio nonnihil difficilis, propter diaphragma lieni vicinum & per consensum affectum, simul adest.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin, lieui inflammato superveniens hæmorrhagia narium, imprimis naris sinistræ, aut fluxus alvi, aut hæmorrhoidalis, idque præsertim die critico, & præcedentibus coctionis signis, saluberrimum est: vid. Forestus *lib. 20. obs. 6. in schol.*, vel urinæ profluvium, & tunc solvitur lienis inflammatio, vel quia discutitur, vel quia aliò transferatur. Quò facit sententia Hippocratis: *Inflammationem hepatis in lienem converti melius est, quam si lienis ad hepar deferatur, vel suppuratum vel scirrhescit.*

#### CURA.

Cura est eadem, quæ reliquarum partium  
Tom. II.

internarum inflammatarum, eademque remedia hîc locum habent. Opera enim danda est, ut quantocyus discutatur ac sistatur inflammatio, ne malè curata, quod alias faciliè fit, in scirrhum ejus contumacissimum degeneret. Salvatellæ sectio, quam in lienis affectibus, & præcipuè ejus inflammatione, commendant, fundamento caret. Præter alia, imprimis remedia Saturnina, primariò convenire dicuntur; qualia sunt Saturni saccharum, crystalli mineræ Saturni, Saturnus diaphoreticus, ad imitationem Jovis diaphoretici paratus, ac similia internè cum reliquis diaphoreticis in aqua appropriata propinata.

Externè emplastrum de cicuta malaxatum cum paucò oleo camphoræ applicari solet. Equidem suadent nonnulli, ut eidem addatur saccharum Saturni, aut melius linimentis immisceatur cū oleo rosaceo & vitello ovorum. Poppius applicat theriacam, aut ejus loco Rob Sambuci, cui saccharum Saturni permiscuit & sub forma spissi linimenti regioni splenis illinit; id quod pariter in renum inflammatione quoque locum habet.

Quodsi verò inflammatio hæc in scirrhum degeneret, conveniunt unguenta, linimenta & emplastra incidentia & resolventia. e. g.

*Empl. de Melik.*

*G. xci in acet. quocunque subact. ana 3vj. liquefactis adde*

*Fulig. pulveris. 3ß.*

*M. & malax c. s. destillat Qi.*

Inducatur super alutam in forma usitata,

D. S.

*Zertheilend Pflaster.*

## ARTICULUS XII.

De

### *Renum Inflammatione & Exulceratione.*

#### CAUSÆ.

**I**nflammantur etiam Renes ex iisdem causis internis, aliarum partium inflammationibus communibus, subinde acido vitioso, ex primis viis eo delapso.

Quoad Externas: in specie occasionaliter subinde excitatur ex nimia corporis succussione, v. g. equitatione. Interdum etiam supervenit calculo renum insigniori, qui aut nimis magnè distendendo ac comprimendo, aut minor, pungendo, atterendo, & ad spasmos irritando, uti etiam ex nimio Veneris exercitio subinde renes ad inflammationem disponuntur. Excitant hanc quoque non rarò læsiones externæ, ut lapsus, ictus & vulnus in lumbis perpeffa, item diureticorum medicamentorum abusus, quæ inflammatio renum in specie nephritis appellari solet.

(Dddd 2)

DIA.

## DIAGNOSIS.

Signa renum inflammatorum & symptomata concomitantia ordinaria sunt: Mictio ardens, dum urina exeundo plus minus fervere, & fervendo quasi adurere partes percipitur, adestque etiam stranguria & mictio frequens, cum acerbo cruciatu, ita ut tales ægri cebrarius quidem, sed & parcius mingant, urina interdum supprimitur. Corporis flexio ferè est impossibilis, vel admodum graviter fieri potest, & decubitus in dorso exacerbat dolores. Urinæ sunt paucæ & flammeæ, interdum etiam aquosæ & claræ, sed quæ semper sine ullo impedimento in vesica exeunt. Dolor interdum est pulsans, si nempe ista renum pars superficialis inflammatur, in qua arteriæ sunt magis insertæ; obtusus, si centralis aut media quasi carnosæ substantia magis inflammata sit; calor & dolor lumbaris gravativus, lancinans & tensivus, qui ob partium contuitatem & consensum non rarò sursum ad dorsum æque & versus costas nothas, ut ægri nec erigere se, nec commodè incedere possint, interdum deorsum ac ad inferiora, secundum ureterum ductum, ad vesicam, item coxendicem & femora usque extenditur. Combinatur huic febris vehemens, continua ac inordinata. Stupor cruris etiam è regione renis inflammati percipitur, supervenit interdum per consensum vomitus biliosus, isque satis contumax; interdum, licet rarò, observante hoc Hippocrate, uno rene inflammato alter, licet sanus & non inflammatus, cessat agere officium urinam secernendi, ut sæpius omnimoda fiat ischuria seu urinæ suppressio; cujus rei causa & ratio videtur esse, quod ren etiam sanus ex consensu cum inflammato ratione suarum fibrarum aliquid convulsivi & quasi spasmotici patitur, unde porulis contractis urinæ cesset transitus, vel videtur causa esse, quod sanguis nimis copiosus ac universum serum per emulgentes ad renem sanum promorum, nimiam suam copiam sibi ipsi quodammodo viam præcludat, quo minus suo transitu per renes separari queat. Symptomatis his interdum alvi suppressio accedit, quod huic morbo peculiare Forestus *lib. 14. obs. 30.* ait, cum extremorum frigore.

Ceterum ut ritè distinguatur calculus à nephritide observetur.

1. Quòd nephritidi perpetuo sit juncta febris continua synochus; calculo verò minimè, aut admodum rarò.
2. Quòd dolor in inflammatione sit magis continuus, & pulsanti plus minus similis; in calculo verò sit magis interpolatus seu periodicus & gravativus.
3. Quod plerumque renes inflammati comitem habeant urinam ardentem, ejusque stillicidium seu mictionis dif-

ficultatem; contra verò res se habet, ubi renes calculo sunt oblecti, in quo affectu urina sæpius admodum libera fluere solet, & non semper ischuria se offert, sed tunc demum, ubi calculus ipsis ureteribus firmiter fuerit impactus: vid. Unzerus & Charleton, *Tr. de Calculo.*

## PROGNOSIS.

Inflammati renum periculosum est malum, & in non adeò robustis, imprimis macilentis, & viribus exhaustis, frequentius lethale, præsertim si febris acuta cum delirio adsit.

Urina alba, tenuis ac purulenta absque febris ac ceterorum symptomatum remissione, & cum crurum ac femorum extenuatione, mortem portendit.

Hæmorrhoidum fluxus renum inflammationi superveniens est salutaris.

Tandem, nisi inflammati renum discuratur, sed suppuretur, dat ulcera renum difficulter curabilia, & quæ interdum ad mictum cruentum disponunt, vel in phthisin renalem transeunt.

## CURA.

Pro hujus cura ex eodem fundamento, quo de inflammationibus in genere dictum, remedia ferè sunt desumenda, & quæ sunt reliquarum inflammationum internarum. Cum omnibus inflammationibus quoad externa secundum curam anginae procedendum; quoad interna verò secundum curam pleuritidis. Ante omnia sanguinis stagnatio per venæsectionem revulsoriam ac derivatoriam solvenda, post clysteris emollientis injectio instituenda. Pro revulsione fiat Venæ Sectio in brachio sub principium morbi, & si plethora adsit; in progressu verò pro aversione in talo seu malleolo, *vid. Forestus lib. 24. obs. 30. & 31. & Riverius Cent. 2. obs. 15.* Fortan optimo cum successu hæmorrhoides per hirudines possent aperiri. Imò in iis, qui hæmorrhoidibus assueti, ac quibus tument, hæc omnino aperiri debent, cum, si natura eas moveat, valde proficuum hoc observetur. Quo facto, vel pro circumstantiarum varietate omisso, notandum, quod noceant purgantia proprie dicta quæcunque, nisi pro spasmis dolorificis sistendis clysmata lactea cum terebinthina in vitello ovi soluta interdum commodè injici possint; aut etiam quæ sunt ex parietaria, malva, summitatibus anethi, floribus sambuci, violarum, chamomillæ, semine lini, aut ex his parata fomenta; item ex lacte ejusve sero cum nitro simplici vel antimoniato. Clysteribus quoque secundum Riverium *Cent. 4. Observat. 7.* addi potest aqua benedicta Rulandii ad ℥ij. vel iij. Sin cruditates ventriculi combinentur, conveniunt laxantia mitiora ex man-

manna, tamarindo, syrupo rosarum solutivo, aut Mercurio dulci, quem Hartmannus in affectibus nephriticis extollit. Nocent autem diuretica in principio, utpote quæ nimis urinæ fluxum promovent, & inflammationem irritant; adeoque non nisi in declinatione morbi, ubi dolor remiserit, & materia cocta deprehenditur, pro reliquiarum abstersione conducunt, & quidem temperatiora tantum, & quæ simul vim anodynam sanguinemque congruatum solvendi habent; vid. Forestus *l. 4. obs. 31. v. gr.* ex fructibus alkekengi, althea, liquiritia, terebinthina, item emulsiones seminum 4. frigidorum majorum, violarum, lapilli cancerorum, &c. sicut & nitrum & nitrata locum habent:

*Rx. ▽ alkekeng.*

*Genista.*

*Hyperic. ana ʒj.*

*Acet. destill.*

*~ Θ dulc. ʒʒ.*

*ʒi ʒlat. gr. xv.*

*Syr. Hed. ʒssr. ʒʒ.*

*M. S.*

**Rührende Nieren-Mixtur Köffelweise.**

Alias succus cancerorum fluviatilium seu astacorum recens expressus, qui blandum alcali in recessu habet, tam cum jusculo quam decocto nymphae, prunorum, &c. exhibitus, tanquam singulare remedium merito ab Hartmanno in *Praxi Chimiatica* commendatur, & non absurdum est, quia ad quasvis inflammationes canceri internè mirè conveniunt; decoctum florum papaveris erratici & acetosæ, item terrea, & absorbentia, cum opiatīs interdum miscenda & propinanda sunt.

Inter externa cum his internis sedandæ & discutiendæ inflammationi regioni renum applicatur succus nymphae, semper vivi majoris, succus plantaginis ac portulacæ cum succo cancerorum fluviatilium expresso, addendo iisdem camphoram, oleum item camphoræ est nobile: quibus etiam interdum parum de opio pro sistendo dolore addi potest. In principio præ reliquis convenit camphora cum oleo amygdalarum dulcium, vel rosarum, vel violarum, vel septem florum Mynsichti soluta: vel dictis oleum hyoscyami expressum, aut oleum papaveris expressum, pro illinitio- ne externa convenit: item ex succo nymphae, semper vivi majoris & succo cancerorum fluviatilium, vel cum oleo rosarum, aut aliis oleis, vel cum ungentis mediante vitello ovi mutuo in mortario plumbeo mixtis fiat litus, externè egregius; cui urgentibus doloribus tantillum opii crudi addi potest; vel unguentum ex succo semper vivi majoris & succo cancerorum fluviatilium cum oleo rosaceo in humiditatis phlegmaticæ evaporationem ebullitis, hinc

in mortario plumbeo diuturna agitatione, ut ramenta Saturni se insinuare possint, mistis, sit unguentum refrigerans, quod applicatum conducit, quia absorbet acidum inflammationem excitans. Huc spectat & unguentum renale Mynsichti. Denique unguentum ex alumine crudo pulverisato, & cum albumine ovi misto, frigide applicatum laudatur à Langio in *Fabrum cap. de renum inflammatione.*

His verò irritis, dum resolvi nequit inflammatio, renum suppuratio expectanda, eaque debitis externis promovenda est, internè per temperata ex decocto hordei, glycyrrhizæ, malvæ, parietariæ; externè verò cataplasmata ex emollientibus, in lacte coctis, applicanda. Ulcere rupto, mihi sit purulentus. Exinde non rarum est

**ULCUS RENUM.  
CAUSÆ.**

Ulceris renum frequentissima causa est eorum abscessus & inflammatio, utut etiam calculi asperiores, renes atterentes, successivè eos ad ulcerationem disponant. Sicut etiam quodvis acre, vehiculo feri per renes transcolatum, eosdem erodere & hinc exulcerare potest: quo pertinet etiam pus aut sanies acris, ex aliis locis ad renes fluens. Eosdem lues Venerea quoque subinde exulcerat, teste Horstio *lib. 4. obs. 43.* sicut & gonorrhœam Veneream inconsulto suppressam renum insignis ardor, & hinc non rarò exulceratio, insequaliter.

**DIAGNOSIS.**

Exulceratio renum præter dolorem in lumbis rodentem, plus minus simul gravantem, urinæ purulentæ excretio ostendit. Hinc *sect. 4. aphorism. 75.* Hippocratis, *Si quis sanguinem aut pus mejat, renum aut vesica exulceratio significatur:* Sic *aph. 76.* *Quibus cum urina crassa exigua caruncula & veluti pus exeunt, iis à renibus excernuntur:* quod etiam Galenus in *Comm.* se vidisse neget, ab aliis tamen observatum est.

Causas antecedentes antecedentia ferè ostendunt. In specie si ulcus est ex inflammatione, multum puris apparet in lotio, & cum mingitur, apparet album; sed cum steterit, deponitur pus: quod si bene est coctum, & urina sanorum similis, suppurationem subesse indicat.

Si verò erosio est à calculo, mingitur urina alba, instar lactis ebutyrati, statim subidet, & planè alius est consistentiæ instar cinerum, quos etiam colore refert, & minore gravitate excernitur.

Præterea dolor morficans & rodens in lumbis sentitur, à sero acri & nitroso, quod in transitu irritat & rodit, unà cum caloris sensu.

(Dddd 3)

PRO.



## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Ulcera renum sunt difficulter sanabilia, & satis periculosa, sæpius lethalia.

Quæ est ab inflammatione suppurata, minus est periculosa, facilius curatur: quæ verò est à calculo in renibus, periculosior est, & non raro in totius renis consumptionem degenerat.

Sic quæ ab erosione sunt ulcera, etiam periculosiora iis, quæ ab inflammatione.

Quo magis inveterata quoque fuerint, eò difficilius curabilia existunt.

Alioquin ulcus renum lumbos perforasse, ibique in fistulam degenerasse, curiolo exemplum notavit *Willis. de Urin. pag. 364.*

Dejectiones tæxentes sunt bonæ; innuunt enim ruptum abscessum, & evacuationem puris per inferiora.

## CURA.

Quoad Curam: Mundificantia & hinc consolidantia utramque faciunt paginam, ubi prius univèrso corpori ejusque contentis prospèctum fuerit, partim evacuando, partim temperando hæc ipsa, ne occasione horum magis exasperetur ulcus; in quem finem Vomitus à pluribus laudatur: *vid. Riverius in praxi pag. 146. Horatius Augenus lib. 12 Epistol. pag. 693. Valeriola lib. 6. observat. pag. 483.* Tunc Mercurius dulcis pro mundificando renum & vesicæ ulcere cum terebinthina in forma pilularum usurpatus, admodum laudatur ab Hartmanno; pilulas in ulceribus & vulneribus renum proficias *videb. in Barbetre Chirurg. Part. 2. cap. 7. lib. 3. pag. 336.* & pilulas Quercetani. Lac terebinthinarum Plateri *in obs. lib. 3. pag. 304.* ex terebinthina cum vitello ovi agitata bene, & in quovis liquore appropriato soluta; vel

℞. *Resin. abiet. vel Laric. ʒß.*

*Vitell. ovi No. 1.*

*Mell. ʒß.*

c. f. q. ▽ *flor. Fabar. f. Potiolla ctea. D. S.*

## Reinigende Nieren-Milch.

Hinc serum lactis vel hydromel copiosè potum, item decoctum herbæ & radicis fragariæ, sed imprimis hypericon, proficuum est ad ulcera renum, unde ex semine hyperici electuarium ad ulcera renum Timæus von *Güldenlee in Casib. pag. 422.* & Döringius *in Tr. de Mithridat.* decoctum radicis petroselinii commendat: quò etiam pertinet decoctum chærefolii & cicerum rubrorum pro purificatione ulcerum, quod Sebizi *in Tr. de Facult. Medicam.* laudat. Præmissis mundificantibus pro consolidatione decoctum lignorum cum agrimonia, hyperico, chærefolio; Decoctum agrimonie cum hyperico in vino, quod Poterius etiam, uti & D. Michaelis *in Colleg. Jonstoniano* singulariter commendat, & decoctum hederæ terrestris cum chærefolio in vino, vel chærefolii in vino vel

cerevisia, &c. sunt optima. Quò etiam, pertinet electuarium Hartmanni ex conserva rosarum & malvæ cum semine hyperici; Vel

℞. *Hb. Agrimon.*

*fl. hyperic. ana M. j.*

*lign. lentisc. ʒiß.*

*rad. Consol. maj. ʒß.*

*sem. hyper. ʒiij.*

Incisa & contusa dentur pro decocto: S.

Species *zum Wund-Trancß.*

Pertinet huc decoctum ad ulcera renum Quercetani; Vel

℞. *Rad. China ʒj.*

*liquirit. ras. ʒß.*

*lt. Agrimon.*

*Chærefol.*

*heder. ʒssr. ana M. j.*

*fl. Hyperic. M. ʒ.*

*ras C. C. ʒj.*

Coq. in f. q. ▽ *a simpl.*

Colat. *th j. aduc*

*syr. de symphyt. Fernel. ʒiß.*

*Essent. vulner. Mich. ʒj.*

M. D. S.

## Heilender Nieren-Trancß auff die mal.

Terebinthina Cypria optimum est auxilium, detergit renes, & per inferiora derivat. Dosis à ʒij. ad ʒß. In specie convenit, si ex abscessu exulceratio fuerit orta, quod etiam præstat balsamus de Capaibe à gtt. x. ad xv. Ut consolidantia eò melius operari possint, inter hæc eminent remedia ex canceris fluvialibus, sive succus, sive eorum in plenilunio exsiccatorum pulvis. *℞. & fluviat.* In plenilunio ponantur in vase terreo non vitreato ad os furni, ut exsiccantur paulatim, ne cremantur: postea contendantur in mortario lapideo; renum & vesicæ ulcera egregiè curant, quibus dicta quædam vulneraria appropriata, in specie ex iis simplicibus, quæ suo loco infra ad miectum cruentum laudabuntur, superaddenda sunt.

Nullum efficacius autem remedium ad renes exulceratos dari, quam trochiscos de Alkekengi, *videb. in Augenio libr. 12 Epistol. pag. 695.* syrupum magistralem in ulcere renum expertum *videb. in Hildano Cent. 6. obs. 44.* Denique acidularum usus non penitus contemnendus in ulcere renum, *de quib. vid. Hildanus citato loco.* Item Heer *obs. 1.* Nempe mundificando optimè conveniunt, cum consolidando decocta vulneraria; it. electuaria ex absorbentibus cum bolo Armena, terra sigillata, lapillis cancerorum, cornu cervi usto, & similibus, imprimis conducunt.

Observetur tandem, quod interdum renes magis in parte extrema gegen den Rücken zu suppurentur, & apostema musculis corti circa spinam simul cum tumore doloreve occupet: in quo casu ab extrâ facta abscessus apertio est optima, ut extrinsecus in lumbis eorum pus queat evocari, de quo *vid. Horstius in obs. pag. 260 lib. 4.*

ARTICULUS XIII.

De  
Inflammatione Vesicæ Urinariæ.  
C A U S Æ.

**I**nflamatur etiam vesica urinaria, sed ex causa interna rarissimè, nisi calculus huc referendus; vid. Forestus *l. 25. obs. 27. in schol.* frequentius verò occasione externa, scilicet in specie à contusione, aut ictu violento in regione pubis & perinæi accepto, vid. *Bonneti Sepulchret. pag. 1232.* & Forestus *Obs. 27.* frequentiori equitatione. Denique supervenit eadem etiam interdum sectioni calculi ineptæ, vel in operatione vel post operationem, si nimirum hœc sectio non rectè tractetur, vesica quacunque etiam ex causa, laceratur, aut alio modo læditur; sicut & inflammatio vesicæ accelerari solet, si ægri post sectionem frigida potent; tunc enim subinde ad summum die quarto, interdum citius, supervenit ejus inflammatio, quæ aut in gangrænam lethalem, cui intra biduum mors supervenit, aut si malum est minus, in pessimum ulcus fistulosum degenerat. Præterea cantharides quoque tam externo quam interno usu inepto, acrimoniâ suâ rodendo, vesicæ inflammationi non nunquam occasionem præbent, quod observatum in vesicatorio ex cantharidibus extra appposito; conf *Misc. A N. C. Ann. 2. observat. 105. pag. 178.*

DIAGNOSIS.

Ceterum pathemata, quæ ordinariò inflammationem vesicæ comitantur, sunt tensio, durities, ardor, tumor, ac dolor in regione pubis & vesicæ; & quidem admodum is est sensibilis, ac levissimo tactu exasperatur; cui accedit urinæ in vesica suppressio seu urinam reddendi impotentia, & in specie, si inflammata est vesica in loco infimo prope collum: item supervenit propter connexionem cum ano tenesmus, interdum alvi suppressio, adeo simul febris acuta, plus tamen aut minus, prout major vel minor fuerit inflammatio, & vel partem membranosa, vel simul circa collum carnosam, affecerit: quibus interdum vigilæ & deliria superveniunt; unde rarum est, quod observavit Hildanus *Centur. 3. obs. 68.* abscessum vesicæ ex casu ab alto, sine febre & sine dolore.

PROGNOSIS.

Utut rara sit vesicæ inflammatio, quoniam minuta admodum & exilia vasa habet; eadem tamen vera & perfectæ, juxta Forestum, gravissimus & periculosissimus est morbus, quia ut plurimum lethalis, ex facili superveniente gangræna; in partibus nempe nerveis facilius gangræna producitur, adeo ut ex omnibus vesicæ affectibus nullus sit deterior inflammati-

one; intereunt enim ægri quarto, aut ad summum septimo die; interdum, si symptomata mitiora, evadunt, sed rariùs, cum metastasi materiæ morbificæ circa hypogastrium & perinæum, per erysipelas, aut urinæ fluxum copiosiore, de quo Sennertus *Prax. lib. 4. Part. 8. sect. 2. cap. 4.*

Inflammatiō & abscessus, quæ sunt circa collum vesicæ, ubi sunt fibræ musculosæ, interdum suppurantur, & in pus mutantur, succeditque exinde ulcus vesicæ, curatu difficilimum.

Mutatam verò jam esse inflammationem in abscessum, innuit imprimis doloris, febris & ardoris remissio, Hippocrate asserente.

Facto postmodum abscessu, si ulcus rumpatur intra vesicam, pus cum urina effluit; si verò ad exteriora tendat in cavum abdominis aut perineum, supervenit abscessus in inguinibus, ibique sibi viam parat.

C U R A.

Remedia eadem ferè conveniunt, quæ in pleuritide & inflammatione renum sunt utilia: & in specie, cum urinæ aut alvi suppressio malum sæpiùs exasperent, ob id, quantum possibile, removeantur. Hinc optimus est clyster anodynus ex solo lacte, aut ex lacte, in quo nitrum depuratum dissolutum est, injectus, quibus etiam terebinthina addi potest. Internè à purgantibus & diureticis omninò abstinendum, saltem juxta sudorifera decoctum hordei cum nitro depurato aut antimoniato, cui interdum aliquid sacchari Saturni addi potest, est optimum. Alias prosunt emulsiones seminis portulacæ, lactucæ, papaveris albi, quatuor frigidorum majorum, & inflammationi renum dicatæ emulsiones, quibus semper nitrum aut saccharum Saturni addendum. Spiritus nitri dulcis etiam hæc non negligendus. Denique spiritus vitrioli philosophicus dulcificatus interdum assumptus ad compescendam febrim conjunctam est optimus.

Externè quoque conveniunt imprimis balnea seu infusio, item fomenta humida ex aqua tepida, cui incocta sunt radix & folia malvæ, althææ, parietariæ; folia salicis, capita papaverina, & similes herbæ diaphoreticæ seu carminantes, cum linteis multiplicatis, sed blandè, apposita. Hinc post infusum vel fotum blandissimè inungatur pecten, cum oleo anethino, chamæmelino, papaveris albi, rosarum aut nymphææ, & similibus, in quibus aliquid camphoræ dissolutum sit, ut ibi discutatur inflammatio, vel etiam succus cancerorum fluviatilium expressus cum oleo rosarum & nymphææ in mortario plumbeo ductus, addendo saccharum Saturni, vel oleum ejus per deliquium, extrà applicari potest, & in asperitate doloris additur simul oleum papaveris aut hyoscyami expressum.

Deni-

Denique cum interdum metus sit supervenientis gangrænæ in inflammatione vesicæ, hæc ut præcaveatur aut inhibeatur, imitemur consilium Riverii in praxi, jubentis, ut admoveantur cataplasmata roborantia ad gangrænâ aliâs usitata, v. g. ex radice scorzonæ, ex farina fabarum & lupinorum in vino decoctis, addendo simul aloen, myrrham, & postmodum camphoram, aut spiritum vini camphoratum.

Hiscemodis, si possibile, detur opera, ut discutiatur inflammatio; sin minus, suppuratio, & hinc abscessus & ulcus expectandum: Illam promovemus emollientibus & temperantibus, sæpius hætenus recensitis.

Quidam vesicæ inflammatae liquores refrigerantes, inepto satis consilio, injicere jubent, cum tamen syringa non applicari, nec liquor injici, aut si injiciatur, commodè rejici non possit: vid. Hercules Saxonia *loc. allegato*.

Quoad

### ULCUS VESICÆ,

Præter inflammationē suppuratam etiam calculi acutiores vesicam lædentes, item cantharides interius propinati interdum, vel externè admoti, item acia acida sub vehiculo urinæ, vesicam nunc ad scabiem, nunc excoriationem & exulcerationem, disponunt: vid. *Miscell. A. N. C. ann. 8. Obs. 88. pag. 148.*

### DIAGNOSIS.

Comitatur ulceratam vesicam urinæ purulentæ excretio, ita quidem, ut si vesica incipiat exulcerari, primò sanguis exit; si sit perfecta, pus; si magis adhuc, squamæ & ramenta, quæ Græcis *φελιδες*; si gravis & consummata est exulceratio, gravis fœtor in urina est. Dolor adest gravis in pectine & pube: quoties ægri mingunt, urinæ difficultas accedit, sæpè & tenemus, & membri virilis erectio.

Ne autem confundatur exulceratio vesicæ cum meatûs urinarii exulceratione, observandum: Si pus & sanies præcedant urinam, aut statim in primo exitu appareant, aut etiam sine urina effluant, in pene vitium est; si verò talia cum urina permista sint, in vesica malum est. Propterea si in pene vitium est, inter menjendum dolor percipitur: quod in vesicæ ulceribus non accedit, nisi juxta ejus collum ulcus consistat.

### PROGNOSIS.

Sunt autem omnia vesicæ ulcera difficillimè curabilia, ut plurimum incurabilia; periculosiora, quæ ex erosione; gravissima, quæ à magno calculo, quæ sine extracto calculo curari nequeunt.

### C U R A.

In Cura præmissis internis universalibus conveniunt,

1. Acrimoniam humorum temperantia, propter urinam imprimis exulcerationem subinde exasperantem.
2. Ulcus sine morfu abstergentia seu mundificantia, ob fermentum ulceris acidum, & hinc pus.
3. Consolidantia, ob resolutionem partis exesæ.
4. Anodyna, propter dolorem imprimis urgentem.

Talia tam internè quàm externè adhiberi solent. Et quidem acre temperant lac, althea, liquiritia, passulæ, violæ, violaria, semina quatuor frigida majora; hinc decoctum chamæpityos in lacte mirè laudatur à quibusdam crebrius usurpatum: sic experta potio Thoneri in *Obs. pag. 176.* quæ, ut ipse ait, quasi miraculosum effectum præstitit, & exulcerationem cum urina cruenta sustulit.

Mundificant Therebinthina, decocta vulneraria cum melle, balsamus sulphuris terebinthinatus & succinatus, oleum terebinthinæ, Mercurius dulcis, trochisci de alkekengi, de carabe, trochisci Gordonii, &c. quæ specificè laudantur.

Consolidant decocta lignorum cum vulnerariis, uti agrimonia, hypericum, plantago, hederæ terrestris, &c. quibus addantur corallia, lapilli cancerorum, terra sigillata, bolus Armena, succinum, tinctura sulphuris vitrioli, tinctura antiphthifica, &c.

Dolorem leniunt opiata, papaverina, laticinia, in specie, si à cantharidibus fuerit malum, &c. De lacte ait Aetius, *nescio an post ullum aliud remedium secundò saltem locò id sit habendum: nam & asperitatem lenit, & exulcerationes eluit*: cui etiam serum substitui potest.

Ex his variz possunt fieri formulæ; Pro prima & secunda Indicatione:

- ℞. Rad. liquirit. ʒj.  
alsh ʒss.  
saxifrag. ʒiij.  
HB. agrimon.  
plantag.  
portulac.  
heder. terr. ana M. j.  
fl. Malv. arbor.  
nymph.  
violar. ana M. ʒ.  
sem. alsh.  
papav. alb.  
violar.  
portulac. ana ʒiij.  
fruct. alkekeng. No. vj.  
cicer. r. ʒij.

Hord.



*Hord. mund. M. ℞.*

Coq. in f. q. ▽ simplicis:

Colat. ℥iij. adde

*syr. violar. sol.*

*agrimon. ex succo.*

*Capill. Qis*

*Mell. rosat. ana ℥j.*

M. D. S.

**Temperirender Trancf.**

De quo bis vel ter quotidie bonum haustum æger capiat.

Terebinthinata imprimis conducunt, in specie Platero usitata fuit sequens mistura terebinthinata :

℞. *Terebinth. 3vj.*

*Mellis ℥j.*

*Vitell. ovi no. j.*

*Vini Malvat. ℥iv.*

Diluta servanda ad utum: dosis 3vj.

Vel ℞. *Terebinth. ℥℞.*

*vitell. ovi no. j.*

*Mellis ℥i.*

Agitentur in mortario, donec albescant:

adde

*Vini albi.*

▽ *parietar.*

*flor. fabar. ana ℥j.*

*syr. limon. ℥j.*

M. D. S.

**Reinigende Mixtur.**

Imò solum lac, cui terebinthina cum vitello ovi soluta, cum paucio saccharo permista, sufficit pro leniendi scilicet & temperandi scopo.

Nec acidulæ ad ulcera vesicæ mundificanda rejiciendæ sunt: vid. Riverius *lib. 14. c. 5.* Scholzius *Conf. 155. & 161.* & Tulpius *lib. 2. observ. 53.* ubi refertur ulcus vesicæ desperatum, per fontis Spadani usum curatum.

Sic pro tertia indicatione:

℞. *Rasur. lign. sanct. ℥iij.*

*rad. Sarsaparill.*

*liquirit.*

*eryng. ana ℥j.*

*HB. agrimon.*

*Veronic.*

*heder. terr. ana M. ℞.*

*flor. rosar.*

*violar. ana p. iij.*

*Passul. major. ℥℞.*

Coqu. in f. q. ▽ ad ℥ij.

Colatura capiatur crebrius:

D. S.

**Zeitheilender Trancf.**

Nobilis est observatio Thoneri *lib. 3. de morb. ves. obs. 3. pag. 176.* ubi refert exulcerationem ingentem vesicæ cum urina retenta, & intensissimis doloribus, post calculi per sectionem extractionem, aliis omnibus frustra adhibitis, potu quodam ex radice liquiritiæ curatam:

Tom. II.

℞. *Rad. liquirit. ras. ℥j.*

*passul. min. M. j.*

*Fujub.*

*Sebest. ana M. ℞.*

*rad. china ℥℞.*

Incisa & contusa dentur.

℞. *de his. M. j.*

*Hord. M. ℞.*

Coquantur in mens. ▽, &c.

Hinc

℞. *HB. agrimon.*

*equiset.*

*plant. an. M. ℞.*

*rad. liquirit. mund. 3ij. vel ℥℞.*

Decoxitin ▽ plantag. & beton. ana q. f. vel sola ▽ ferrariorum ad consumptionem tertiæ partis.

In colaturæ ℥℞. dissolvit

*Mell ros. ℥℞. M.*

Et æger singulis horis portionem per syringam injiciet.

Interdum etiam saniculam & alchimillam addidit. Addi etiam potest essentia myrrhæ cum spiritu vini tartarifato parata, vel resinæ aloes 3ij. ad ℥℞.

Inter externa injicienda sunt varia; vel per catheterem, vel per syringam: quò pertineat clysmata terebinthinata. Sumatur etiam lac recens, serum lactis, mulsum, succus equiseti, vel plantaginis, aqua ferrata, in qua radix symphyti modicè bullerit. Convenit aqua calcis vivæ cum Sief albo Rhasis secundum Barbette in *Chirurg.* vel injectiones Platero absterisivæ usitatæ sunt:

℞. *Rad. liquirit. ℥ij.*

*Cicer. rubr. p. i.*

*Cort. fabar. ℥j.*

*fol. plantag. M. j.*

f. decoctum in ▽:

adde parum lixivii.

in decocti hujus ℥℞. dissolve

*Terebinth. in melle dissol. ℥ij. M.*

In graviore malo potest addi unguentum Ægyptiacum.

Tandem fieri potest injectio consolidativa:

℞. *H. equiset.*

*plantag.*

*summ. hyperic. ana M. j.*

*rad. bistort.*

*Consol. major.*

*lil. alb. ana ℥j.*

*cort. granat. 3ij.*

coqu. in ▽ ferrar. ℥℞.

in colat. dissolve

*Troch. alb. Rhaf. f. opio. ℥℞.*

*bol. Armen. 3j.*

Misc. S.

**Heilende Einsprühung.**

(Eccc)

Sic ad

Sic ad ulcus in collo vesicæ, & inde sanguinis per penem egressum, præter interna convenit injectio:

℞. Oli Roman. ʒij.

∇ comm. lbj.

t. decoctio.

vid. Forestus lib. 26. obs. 1. Schol. in fine.

Nec thermarum usus ad exulcerationes vesicæ & renum negligendus; vid. Consil. Schol. 2<sup>o</sup> pag. 383. Sed de vesicæ exulceratione curanda vid. in specie Horstius observat. 478. & hinc Platerus in Observationibus.

## ARTICULUS XIV.

De

### Inflammatione Membranarum Cerebri.

Seu Phrenitide.

**P**orro inflammantur interdum quoque partes superioris ventris, membrana nempe cerebri, & forsan, utut rarius, ipsum cerebrum; vid. Fontanus Anat. c. 1. Forestus l. 10. obs. 11. in schol. Rhodius cent. 1. obs. 39. & Willilius de anim. brut. l. 2. c. 10. Nam cerebrum ipsum si inflammari contingat, brevi ad corruptionem & hinc mortificationem tendit, adeoque à Montano multisque aliis dubitatur, an cerebrum verè inflammari possit; vel si contingat, an sub curam Medici cadat? De ejus tamen membranis, imprimis matre tenui, res extra dubium est quoad inflammationis possibilitatem, cum copiosis resperse sint arteriis, quibus respondent venulæ in sinus terminatæ, simulque perquam sensiles sint, in quarum vasis si contingat sanguinis motum & circulum impediri, sequitur inflammatio, quæ membranarum cerebri vel solitaria, vel cum parte quadam cerebri sociata inflammatio modernis vocatur phrenesis sive phrenitis; sed perperam & perverso vocabulorum usu. Hippocrati enim & Græcis Autoribus diaphragma vocatur *Φρένις*, unde phrenitis proprio ac genuino sensu est inflammatio diaphragmatis, quam ordinariò insequitur delirium. Dicitur autem *Φρένις* diaphragma, vel quia antiquis mentis sedes fuit reputatum, vel quod in diaphragmate affecto & inflammato mens perturbetur. Cum igitur Interpretes mentem Hippocratis non intellexerint, phrenitidem interpretati sunt per delirium gravius febribus ardentibus superveniens. Antiqui è contra inflammationem membranarum cerebri, aut ipsius cerebri vocarunt sphacelum seu sphacelissimum, uti patet ex aphorismo Hippocratis 50. sect. 7. ita sonante: *Quibus cerebrum sideratum est, intra tres dies intereunt, si verò hos superaverint, sani sunt*; ubi per siderationem seu sphacelum cerebrum inflama-

matum intelligitur. Phrenitis ergò propria est inflammatio diaphragmatis, sicut sphacelus est inflammatio cerebri & membranarum ejus: Conf. Sennertus Pr. lib. 1. part. 1. cap. 23. pag. 203. & 205. Sed cum verba valeant ut nummi, recepto usu phrenitis, modernorum vocabulo, veterum sphacelum, i.e. inflammationem cerebri, ejusque membranarum, & inde natam febrem acutam plus minus continuam, peracutumque ac gravissimum delirium, intelligemus.

In Phrenitide ergò calor, rubor, dolor & pulsus, tanquam necessaria & quasi pathognomonica omnis inflammationis signa sunt obvia. Dolor ratione partis affectæ, ex inflammatione & impedito sanguinis motu, est intensissimus, cum certum sit, nullam corporis partem sensiliorem esse, quàm ejus membranas, & quidem dolor acerbissimus, & horrendus lacerativus percipi solet. Hinc videmus veros phreniticos (ut plurimum enim confunditur phrenitis cum delirio in febribus ardentibus superveniente) avellere capillos præ nimio dolore, & immenso quasi furore caput immaniter concutere: propter quem etiam acerbissimum dolorem malum adeò est acutum, ut tertio die sit lethale; quoniam propter dolorem istum sensibilissimum spiritus animales nimis dissipantur, & facile istarum partium inflammationem sequitur gangræna, & inde necrosis. Præterea hi ægri propter spiritus animales impetuosè & inordinatè motos mox delirant, adeò ut quæ sit de circumstantiis caloris vel doloris v.g. eas sufficienter expromere nequeant. Unde talibus insigniter delirantibus tandem gravissima symptomata, in specie convulsiones, superveniunt, idque tunc præcipuè, quando jam gangræna imminet. Præterea pulsatio in capite adest vehementissima, de qua in primo principio conqueruntur ægri, & quanta talis pulsatio & inde dolor capitis pulsatorius sit, exinde potest colligi, si attentè aspiciatur collum; apparebit enim tunc, quod vehementissime pulset arteria carotis, idque propter impeditum legitimum sanguinis transitum in suis extremitatibus. Ex quo colligi potest, quantum impetum & quantam pulsationem sanguis affluens, & in cerebro vel loco inflammationis sub cranio stagnans, inferre valeat.

Moderno ergò usu phrenitis erit delirium intensissimum ex membranarum cerebri inflammatione ortum, cum febre ardente & peracuta conjunctum.

Patet ex his, veram seu veterum phrenitidem rarissimum esse affectum, & quem ferè intra biduum vel triduum insequitur mors.

CAU-

## CAUSÆ.

Causæ phrenitidis internæ sunt raræ, nisi forsitan præcedens sanguinis quædam excretio suppressa, aut alius inflammationis metastasis, occasionem veræ phrenitidi seu sphacelo subministret: sic enim in puerpera propter suppressa nonnihil lochia, phrenitidem observavit Horstius *lib. 2. obs. 25. & 26.* item ex suppressione hæmorrhoidum *cit. loco obs. 26.* Fit etiam interdum, ut peripneumoniæ seu pleuritides non rarò per metastasin materiæ abeant in phrenitidem veram, tunc temporis ut plurimum lethalem. Exempla subministrat Schenckius *lib. 1. obs. pag. 61.* Inflammatio cerebri per abscessum soluta veram phrenitidem repræsentans, videri potest in Loffio *obs. p. 18.* à vermibus verò in Paracello *lib. 2. §. 2.*

## DIAGNOSIS.

Ex his signa phrenitidis per se patent. Nempe phrenitidem imminere, concluditur ex vigiliis pertinacibus, somniis turbulentis, sermone immodico, mutatione morum, urina primò crassa, mox tenui, imò diaphana, capite tactu calidiore, oculorum torvitate, item dolore capitis intenso, præprimis circa occiput, & arteriarum colli atque capitis pulsatione nimia.

Delirium verò simplex à phrenitide in hoc distinguitur: quod illud sit levius cum intervallis; hæc vehementior & ferè continua cum intensis doloribus capitis: quorum ratione hoc sæpius fricant, respiratione difficili, febre continuâ & siti nulla, quamvis hujus causæ adsint. Si inflammatio quædam subsit, in gangrænam degenerans, ferocia remittit, oculis clausis prostrati decumbunt, & lethargici evadunt ægri.

## PROGNOSIS.

Quoad prognosin: vera phrenitis seu inflammatio cerebri ejusque membranarum affectus est peracutus, ut plurimum lethalis, juxta Hippocratem *lib. 7. aphor. 50. & lib. 2. epidem. sect. 3. Ægrot. 4. pag. 733.* & tertio vel quarto die, ad summum septimo finiens, ita ut brevi post superveniat necrosis perfecta, ægrique convulsi intendant. Nam & Prosper Alpinus *lib. 1. de Med. Ægypt. cap. 13.* refert: vidisse se in Ægypto phrenitides planè lethales, ita ut tertio vel quarto die jugulaverint ægros.

Aliàs in inflammationis cerebri incremento dejectiones alvi albicantes, & urinae crudæ, albidæ & pallidæ existentes, pessimæ sunt; ut plurimum enim ægri intendant, teste Hippocrate *sect. 4. aphor. 72.* sicut etiam Galenus *lib. 1. Prædict. Comment. 1. tit. 12.* nullum phreniticum, qui similes urinas emisserit, servatum vidisse scribit; & cum similes urinas

Tom. II.

reddidisset *Philista 2. in 3. Epid. Ægr. 4.* vehementer insanivit, & quinto die defunctus est.

Siquis in phrenitide vera dentibus stridet, delirium grave imminet; sin verò jam adsit delirium, convulsio lethalis est in procinctu.

In inflammatione cerebri membranarum, quibus, ut loquitur Hippocrates tremulæ aut obscuræ sunt desipientiæ, i. e. si ægri sunt minus furiosi, sunt periculosiores, quàm quibus sunt desipientiæ tumultuosæ; i. e. interdum phrenetici apparent, quasi dormiant, aut quodammodo quieti sint, utut nihil minùs faciant, quin variis hinc inde insomniis conturbantur & in se ipsis delirant, adeò ut interrogati licet, ineptè respondeant: & tales phrenetici cum talibus variis insomniis & tremula desipientia ferè periculosiores sunt, quam phrenetici magis furiosi, cum vociferationibus, artuum contorsionibus & similibus.

Lethalem phrenitidem denunciat dyspnœa, facies cadaverosa, sudor syncopiticus, lingua & manus tremulæ, stridor dentium, rigor, si floccos legant ægri, stillicidium narium, dejectiones, & urinae minus tinctæ observantur. Sin verò febre mitescente delirium non cesserit, ut plurimum in lethargum, maniam, aut melancholiam mutatur; ita quidem, ut affectus soporosi ex phrenitide rarò curentur; hinc notatu digna sit observatio Zacuti Lusitani *lib. 1. Prax. Admir. obs. 15.* quamvis in illo subiecto somnus non adeò profundus extiterit.

De cetero phrenitis solvitur vel per sudorem, vel per largam narium hæmorrhagiam, vel diarrhœam, qualem etiam annotavit Forestus *lib. 10. obs. 1.*

Quod si inflammatio hæc suppuretur, lethalis est, unde rarissimum est, quod Hercules Saxonia refert de quodam phrenetico servato, cui pus per os & aures eruperit.

## CURA.

Superest cura, quæ tamen nil habet peculiare præ cura in febribus acutis cum delirio conjunctis, & sub deliriis commodius tractatur, cum in phrenitide curanda ad duo respiciendum sit: nempe ad ipsam febrem ardentem inflammatoriam, quæ non secus ac pleuritis & aliæ similes curanda; & hinc ad urgentiæ pathemata, in primis dolorem capitis & delirium. Adeoque convenit venæsectio largissima, in principio interdum repetenda; quin & præmissis clysmatibus & vomitorio in omni morbi principio mox sudorifera adhibeantur, ut sanguinis stagnatio maturè primo vel secundo die discutiatur, nam nisi hoc maturè fiat, superveniente necrosi ægri intendant. Inter alterantia julepus sequens est elegans:

(Eccc 2)

Æ. Hord.



℞. *Hord. mundat.* M. ij.

*rad. scorzon.* ℥j.

*liquirit.* ℥℔.

*fol. acetos.* M. j.

*fl. borrag.*

*rosar. rubr.*

*Violar. ana* p. ij.

*passul. min. cont.*

*raf. C.C. ana* ℥j.

*cran. human.* ℥℔.

Coqu. in f. q.  $\nabla$  a.

Colat. f. b. v. aciduletur cum  $\sim$  *Oli* q. s.

## ARTICULUS XV.

De

### Oculorum Inflammatione,

*vera & notha.*

**I**nflammantur subinde etiam oculi, malum satis frequens & ubique cognitum, quod in specie vocatur ophthalmia: est vitium contradiſtinctum lippitudini, epiphoræ, & similibus.

Ophthalmia autem est vel vera, vel notha, seu sicca etiam vocata: Illius duæ sunt species, vel sanguinea, vel serosa, seu lymphatica, proprio nomine epiphora dicta, coincidens ferè cum lippitudine, nisi quod lippitudo & epiphora saltem subjecti proximi ratione nonnihil differant. Inflammatio sanguinea est inflammatio tunice adnatæ, cum rubore, ardore, & dolore, tumore & lachrymis, nunc plus vel minus fluentibus: hæc verò est affectus tuo modo catarrhalis, nempe copiosa & continua lachrymarum destillatio ex oculo, quæ nunc acres sunt, adeoque dolorem, morsum, ardo-rem, ruborem junctum habent, & vulgò dicitur humor seu catarrhus calidus, nunc mitiores sunt, & sine symptomatum talium syndrome affligunt, diciturque humor sive catarrhus frigidus: sicut lippitudo est affectus similis palpebrarum, in quo copiosissima lymphalachrymalis, tam ex glandulis angularibus, quam etiam glandulis palpebrarum à Stenone deſectis erumpit, ratione cujus notabilis in ophthalmia symptomatis, Celsus ophthalmiam Græcorum Latine lippitudinem appellavit.

### SUBJECTUM.

In ophthalmia vera afficitur oculus quoad membranas communes, in specie quoad membranam externam, quam adnatam appellant; subinde verò etiam cornea & uvea non leviter afficiuntur; quæ membranæ, imprimis extimæ, contextæ sunt ex copiosissimorum vasculorum textura, tam venularum quam arterio-  
larum: impedito ergò motu sanguinis in his vasculis, sequitur inflammatio, adeò ut vascula hæc sanguine stagnante distenta magis fiant conspicua, & subinde totus oculi bulbus intensissimè rubeat. Cum verò membrana hæc adnata intimè connectatur cum tunica sclerotica, à dura matre ortâ, & hac mediante ut-

iam cum uvea à pia matre natâ, ipsâ adnatâ à pericranio originem ducente, propter hanc membranarum oculorum connexionem cum cerebri membranis mutua partim dictarum conspiratio & plura pathemata per consensum oriri solent. Nempe ratione pericranii sit, quod in gravi ophthalmia simul capitis dolor, si non pulsatorius, tamen contractivus, præter gravativum, percipiatur. Patet etiam ratione conjunctionis cum internis membranis oculorum, & hinc membranæ cerebri, quare contusionib' cranii, & læsionibus membranarum cerebri, interdum superveniant ophthalmiæ, exque ut plurimum quarto aut septimo die, interdum nono aut undecimo, accedant, aut saltem fluxus oculorum cum eorundem rubedine, ut in nosodochio Patavino aliquoties observavi: quæ ipsa fuerunt signa periculosa ac imminētis mortis, quatenus ostenderunt jam factam cerebri membranarum læsionem, aliqualem inflammationem, & exinde gangrænam & necrosin. Certè si hæc sponte sequantur, periculosum signum est: nam dum stagnat sanguis in cerebro ejusque membranæ per arterias carotides affectis, sit ut uberiùs affluant ad oculum, ubi impeditur in motu, & ophthalmiam infert. In epiphora ad glandulas, ex quibus tale stillicidium oritur, imprimis respiciendum, siue sint in oculorum angulis, siue palpebris: de quibus videatur Steno in *obs. de glandulis oculorum & narium*.

### CAUSÆ

#### OPHTHALMIÆ VERÆ

Causa ophthalmiæ in genere est spina oculo alicui in externa ejus superficie infixæ, cujus occasione oritur dolorosa fibrarum strictura, sanguinis remora in motu, lymphæ ejus uberior per glandulas infusio: vel est quodcumque hostile aut inimicum, acidum aut acre, præsertim si oculum affecerit, plus minus irritaverit, sicque ad inflammationem occasionem dederit: estque vel internum vel externum.

Causæ externæ, ut contusio, læsio, vulneratio, pulveres acres in oculum illapsi, ut & fumi metallici aura asperior, &c. satis sunt cognitæ: sic enim pulveres afficiendo partes oculi sensiles, & irritando, faciunt, ut sequatur contractura fibrarum in tunicis oculi, & ita sanguis stagnans inflammationem inducit.

Causæ verò internæ sunt omnes ex, quæ quacunque ratione occasionem dare possunt, ut sanguis stagnet in vasculis minutissimis: sic v. g. in specie variolæ, quarum sanies acris & acido-falsa oculis insensibilissima, propter fermenta acria relictæ, sæpillimè ophthalmias, & quidem pertinacissimas aut sæpiùs recurrentes post se relinquunt, ut *suprà ex Lippio in eleganti Tr. de Variolis* monitum, ubi exemplum habet sæpillimè recidivantis epiphoræ modo in uno,

in uno, modò in altero oculo, ex malè curatis variolis. Nam oculus semel inflammatus facilè levi de causa postmodum denuò inflammatur, ita ut nunc in hoc, nunc in altero, nunc in utroque oculo recurrat, idque propter robur partis tunc læsum, vel propter ejusdem tonum laxatum, & etiam propter fermenta acria plus minus purulenta in parte relictæ. Nempe tantillum fermenti remanens in tunica oculorum est instar spinæ digito infixæ, quod excitatum facillimè inflammationem oculorum infert &c. Imprimis si aliàs solennes sanguinis in corpore evacuationes negligantur & supprimantur, si levis accidat in oculo irritatio, inflammationem inferunt; hinc suppressos menses, hinc tineam infantum, vel malè curatam vel spontè evanescentem, propter relictum acre salum sequuntur non rarò ophthalmiæ: exempla habet Gabelchoverus *Centur. 4. Cur. 38.* de inflammationibus oculorum propter omittas solennes scarificationes: item ophthalmiam observat ex retentis mensibus *Cent. 3. Cur. 61.* Infantes pariter ex aurium purulentis fluxionibus cessantibus, subinde in ophthalmias pertinaces & contumaces incidunt. Speciatim tamen acre quodcumque ex corpore excernendum, cum sanguine aut lymphâ lachrymali aut quacunque occasione ad oculos delatum, irritando oculum ad inflammationem disponit.

Uterius ratione modi afficiendi ophthalmia interdum est epidemica, & interdum contagiosa, item periodica. Epidemica est ex aère nempe inclementiori, & effluviis acrioribus inquinato, quo oculos feriente inflammatio oborta: qualem epidemicè grassantem ophthalmiam observavit Amatus Lusitanus *Cent. 7. cur. 80.* Contagiosa observata fuit, e. g. si quis ophthalmicos intueretur, simul quoque eodem malo corripere ratione atmospheræ, quæ ab alterius oculo recepta huic irritando & vellicando instar pulveris acris ad inflammationem disponit. vid. Forestus *lib. 9. obs. 4.* Zacutus Lusitanus *lib. 1. prax. hist. cap. 13.* Pleniùs *Ophthalmogr. lib. 5. cap. 12.* & Sennertus *lib. 1. prax. ubi de ophthalmia.* Periodicam denique, & modò in hoc, modò in alio loco recidivantem, à variolis natam, videbitis in Liplio *l. 4. pag. 70.*

Differentias etiam habet ophthalmia graduales, & in tres gradus dividitur, si enim inflammationis saltem initium adsit, cum nempe oculus cum rubore & calore humidior fiat, & non nihil doleat, dicitur *Τάραξις* seu levior oculi inflammatio, ut plurimum terè occasione externâ nata: Quod si inflammatio supra dicta insignior, præcipuè ex causis internis, oriatur, est ophthalmia κατ' ἐξοχήν dicta: si verò facta sit inflammatio interior, ut & palpebræ afficiantur, & quasi invertantur, cum

insigni tumore, nec claudi possint, albumque supra nigrum oculi intumescat, ita ut nigro quasi subsidente hiatus veluti in oculo appareat, *χίμωσις* dicitur, ut plurimum ex causa externa nata. Conf. Sennertus, *ubi de ophthalmia.*

## C A U S Æ.

### EPIPHORÆ & LIPPITUDINIS.

Quoad causas epiphoræ & lippitudinis; hæ sunt triplices:

I. Est nimia glandularum oculorum laxitas, quando eadem undecunque, præsertim sub nutritione propria, vitiatæ, aut aliàs irritatæ, flaccidæ & nimis spongiosæ redditæ, per patula nimis ac patentia foramina lympham copiosam continuò effluere aut potius elabunt, ipsâ lymphâ aliàs naturaliter tunc constitutâ; unde hic affectus nulli insigniori symptomati est adjunctus, nisi aliquali oculorum rubedini, ex sanguineis vasis ob copiosiorrem & faciliorem ejus effluxum & ob inanitam semper vasâ majorem turgescientiam. Malum hoc senibus & morientibus est familiare; hinc spontè illachrymari in acutis morbis periculosum ex Hippocrate: istud (in senibus) ob nativam ratione ætatis imbecillitatem, dum flaccidæ & quasi detritæ sunt glandulæ: hoc verò (in morientibus) propter morbosam summam prostrationem virium, & hinc spirituum animalium defectum, & glandularum flacciditatem. Facit huc defectus carunculae lachrymalis in affectu Græcis *πύος* dicto, quæ caruncula nihil aliud est, quàm substantia tenera carnea, juxta glandulas lachrymales sita, & se instar operculi lymphæ & glandularum lachrymalium habens, unde ea vel resoluta, vel ferro ablata, vel à lymphâ acrivel ulcere exesa, vel imminuta, sui absentia successivè infert continuum & involuntarium lachrymarum fluxum: quin & robur oculi læsum, seu quando glandulæ oculorum semel laborarunt epiphora, & sæpiùs postmodum ex imbecillitate hinc contracta idem patiuntur malum; unde sordium, puris, &c. proventus, quibus oculus & vicinæ glandulæ irritatæ continuò plorant; de qua oculi glandula majore, vulgò caruncula lachrymali dicta, vid. Warthoni *Adenograph. c. 26. p. 160.*

II. Causa epiphoræ est læsio & irritatio oculi sensibilissimi ab externis causis, quocumque modo oculum continuò irritantibus, ut substantiæ ejus glandulosa laxetur. Quò pertinent pulveres in oculos illapsi, item effluvia acria, v. g. cepacea, alliata & piperata, quæ salibus volatilibus turgida oculos pungunt & mordent; etiam aer externus nimis frigidus aut asper, qui oculum lædit, ex quarum rerum læsione & irritatione copiosus & continuus lymphæ vitiosæ ad oculum contingit affluxus, & sic epiphora catarrhalis.

(Eccc 3)

Duran-



Durante effluxu diutius ex copiosè affluente sanguine, & ob exhaustum laticem ejus pro impendio lachrymarum, sanguis nonnihil spissessit, ut in angustissimis istis vasculis stagnans ophthalmiam tandem seu oculi inflammationem inferat, modò majorem, modò minorem, cum ejus rubore, dolore & tumore, de quibus jam dictum.

III. Epiphoræ causa propriè catarrhum constituit, quando nempe ex vitio lymphæ catarrhalis habituali, ab interna causa profecto, per modum catarrhi præternaturalis lachrymarum fit effluxio; proprièque & frequentius epiphoram constituit. Vitium lymphæ est, quando eadem nimis acris & salta acida in corpore existit, quâ concurrente oculi debilis spongiosa magis substantia glandulosa effusionem lachrymarum copiosam faciliè excitare potest. Unde hæc lymphæ acido salta continuò oculos rodit & vellicat, unde eorum pruritus, & interdum palpebrarum exulceratio. Ex pruritu & irritatione magis magisque sanguinis & lymphæ affluxus promovetur: nam omnis lymphæ sub se continet subtilem quandam acorem abstergentem & detergentem, hinc fit, ut in naturali statu oculi in tali lymphæ lachrymalis humectati, sint faciliè mobiles, & ab omnibus sordibus purificati; simul verò atque hæc lymphæ lachrymalis fit nimis acida, tunc non rarò varia oriuntur oculorum mala, imprimis externa, v.g. dolor, oculorum rubedo, pruritus, tumor, corrosiones; lippitudines, inflammatio oculi periculosa, pustulæ, ulcera, fistulæ lachrymales, &c. quin & in cæcitatem interdum terminantur hæc epiphoræ catarrhales, quatenus ab acrimonia lymphæ nonnihil corrodæ membranæ oculorum fiunt asperæ, ex asperitate crassæ, ex crassitie tandem opacæ, minusque perspicuæ, ita ut exinde necessariò sequatur cæcitas.

Causæ hujus epiphoræ remotæ sunt omnes eæ, de quibus suo loco in catarrhis dicam. Inter has sunt assumpta quædam ad eam disponentia, ut nuclei malorum perficorum, de quibus vid. Rhodium *Cent. 1. Obs. 80. pag. 43.* Interdum specialiter concurrat potus nimius vini aciduli oculis nocens: interdum etiam parentum concurrat vitium, cum hæreditate materna aut paterna oculi infantum disponantur, ut accedente internæ lymphæ vitio similem in epiphoram incidant.

Cæterum omnium horum affectuum ordinarius comes est copiosissima lachrymarum destillatio, quæ, si affectus est oculus, degenerant à naturali more, & sunt in duplici differentia, quæ adhuc observanda pro cura melius instituenda, idque, si ex causa interna oriatur ophthalmia: nam interdum lachrymæ effluunt acres, tenues, acido salta, vel quasi plus minùs corrosivæ, pruritus inferentes, &

cutim malarum corrodescentes, idque in inflammatione periculosiore, utpote quæ turgis dolet, ardet, & instar erysipelatis cutis infestat, idque tunc vocant catarrhum, licet non semper vitium catarrhale adinuunt lympham lachrymalem ad aerem salinam & rodentem, & quibus ophthalmia biliosa dicitur: Interdum tamen non sunt corrosivæ, ac sine acrimonia, sed potius subdulces, simpliciter idque & in his ophthalmiis subinde oculi per quasi conglutinantur & inviscantur, lymphæ lachrymalis magis crassa, magis da & tenax esse solet, oculos incruconglutinans, concurrente tamen tum aliquali nutrimenti proximi in parte in glandulis, vel in superficie oculi, alio ne, quod depravatum lemas ordinatur: unde hujus imprimis occasione palpebræ solent, quæ lymphæ tamen melior est, quàm tenuis & salina.

Ex quâ lachrymarum differentia ophthalmiæ tempora distinguenda: principium est, quando humor tenuissimus defluit: augmentum, quando deturgetur, humorque fit crassior: Status magis coctus videtur humor, h. e. coctus, adeoque crassus, ut etiam palpebræ glutinet: declinatio, cum symptomata mittunt.

Licet autem hæc lachrymæ sint ordinaria symptoma, tamen distinguuntur. Nam interdum se habent instar causæ, dum instar producti. Communiter esse in fluxu; sed malè, cum etiam ab extrinsecus illapsis copiosius lachrymæ proventus obtingat, licet oculus sit. Ergo attendendum: an vitium sit à cetera? an vero interna, à qua generatur lachrymæ? Aliud namque est, quando epiphora in pueris ex tinea repressa: aliud quando ex irritatione quadam externa posteriori in casu adstringentia prioria nocent.

Quoad ophthalmiam notham, seu vocatur siccam, hæc est ista, in qua lachrymæ nullæ exstillant, utut plus minus palpebræ coagulari soleant. Talis ophthalmia nil commune habet cum vera, pruritem; oculi enim rubent, plus minus pruriunt, atque plus minus pruriunt, ut ejus sunt gradus:

1. Quæ est cum pruritu, & exigua onem saltam & acrem conjunctam habet dicitur *ψαροφθαλμία*.

2. Quæ cum pruritu & dolore levi & ligritate sine fluxione est, adeoque talis & tumidi sunt oculi, & dicitur *ξηροφθαλμία*.

3. Denique sine pruritu, fluxione, duritie ac asperitate palpebrarum est, ut: *σκληροφθαλμία*, seu dura lippitudo.



Oriuntur ex subtili, salsa vel acri lymphâ, oculos naturaliter humectante, alterante, & ita oculos malè afficiente.

## DIAGNOSIS.

Manifesta fit ophthalmia per se ex dolore, ardore, rubore, & tumore oculorum, & ipsarum palpebrarum; quæ omnia sunt signa inflammationum communia; sicuti etiam per se & ex relatione ægri manifestum erit, an ophthalmia à causa interna, an ab externa originem ducat.

Sanguis inflammationem excitans nunc per vasa oculi exteriora movetur, nunc per interiora: Si per exteriora, tumor, dolor, pulsus in fronte ac temporibus, percipiuntur: Si verò à vasis & membranis interioribus, dolor profundior & vehementior erit, pruritusque in palato ac naribus sentitur, ac sternutatio frequens erit.

Signa diagnostica epiphoræ per se patent: causæ tantum distinguendæ sunt, partim ex relatione ægri, partim ex scientia Medici.

## PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Nulla ophthalmia est negligenda, in specie si est à causa interna, quia semper oculorum necesse est fiat læsio: interim tamen una major, altera minor existere solet, hinc secundum supra monitos gradus magis vel minus periculosa ac curabilis est.

Ophthalmia verò pro subjectorum ratione, in iisque humorum, præsertim lymphæ ac sanguinis, constitutione, facilius vel difficilius curatur.

Ophthalmia per consensum à membranis cerebri internis, dura nempe & pia matre, & à partibus circa cranium contentis, sæviora & periculosiora habet symptomata, & difficilius curatur, quàm ea, quæ fit per essentiam affecto oculo.

Dolor diu in ophthalmia perseverans pessimum signum est; materiam enim aut corrodentem, aut distendentem aut suppurantem arguit.

Ophthalmiam diuturnam, aut sæpius recurrentem, facilè visus hebetudo insequi potest, partim ob membranas incrassatas, partim ob humores impuros redditos.

Quando res eò devenit, ut inflammatio non possit derivari, vel digeri, vel suppurari, ferè perit oculus. Interdum suppuratur, & tunc periculum cæcitatæ & gangrænæ pariter imminet, quod si eò devenerit malum, melius est amittere oculum, quàm certò perire & mori, adeoque oculus maturè extirpandus est, ne per consensum cerebro gangræna communicetur, & mors superveniat.

Ophthalmia discutientibus aliàs curatur: si sæpius recurrat, periculum cæcitatæ mi-

natur, dum occasionem suggerit, ut nebulae, panni aut cicatrices in perforatione uveæ & corneæ enascantur vel nutrimentum proximum corruptum, & in humore aqueo successivè conglutinatum, suisufusionem inducat.

Ea ophthalmia, quæ supervenit graviori capitis læsioni, frequenter est funesta & lethalis.

Ophthalmia laborantem superveniens alvi profluvium liberat: vid. Hippocrates *sect. 6. aph. 17.* & Galenus *l. contra Julianum cap. 1.*

Taraxis à causa externa nata, si mature curatur, sine periculo est; periculosior autem est chemosis seu ophthalmia perfecta & consummata.

Notha ophthalmia non adeò periculosa est, quàm vera; diuturna tamen est, & admodum chronica.

Quoad ophthalmiæ serosæ sive epiphoræ prognosin: Infantes frequenter lachrymari solent, & quidem sine insigni periculo; quoniam diætâ & procedente ætate sponte hoc vitium corrigitur: Inveteratus autem aut natu majoribus accidens contumacior, facilè fistulam lachrymalem potest inferre.

Qui in febribus aut aliis morbis acutis voluntariè lachrymantur, nec oculi sint affecti, aut crisis per hæmorrhagiam instet, inconveniens est: si verò citra & præter voluntatem hoc faciunt, malum signum est; innuit siquidem affectum esse cerebrum, & resolutionem facultatis, ut vocant, & periculum portendit, teste Galeno & Hippocrate *sect. 4. aphor. 52.*

Epiphora verò, quæ fit ex læsione carunculae lachrymalis, ferè est incurabilis; uti est pessima, quæ à caruncula, quacunque ex ratione, ablata oritur; uti facilius est curatu, quæ est ab illius erosione quàm excisione.

## C U R A.

Quoad curam:

- I. Causæ externæ quælibet, oculum hostiliter afficientes, sunt removendæ, hinc causis internis prospiciendum, Et tandem
- II. Sanguis in oculo stagnans resolvendus, & ad naturalem statum & circulum reducendus, & inde orta inflammatio removenda est.

Cùm verò causæ, internæ imprimis, sint duplices, ob id vel sanguinis motui, qui oculum tumefacit & inflammat, per revulsoria remedia prospiciendum, vel acre quodcunque oculum vellicans & irritans corrigendum.

Inflammationi leviori, imprimis ex causa externa natæ, & ubi non est tantum ægri periculum, ut in rubore, ac moderato dolore, pauca externa saltem ex pharmaceutico fonte sufficiunt remedia. Ubi verò tumor & inflammatio sunt magna, aut gravius imminet peri-

periculum, simul per remedia interna curatur, quibus & alia ex chirurgico fonte pro revulsione, aversione & derivatione adhibenda.

In graviore ergo ophthalmia, imprimis ex causa interna nata, si corpus vel plethoricum, vel sanguinis evacuandi suppressio fuerit, venæ sectio admodum necessaria erit. Convenit ergo pro scopo revulsione universalis quidem venæ sectio in pede, pro scopo aversionis verò in brachio, pro scopo derivationis, si fieri poterit, in fronte. Et quidem quod in pede secanda sit vena, confirmat & illustrat egregium exemplum Lindani *super Hartmannum*, dum dixit, se vidisse, quantum valeat venæ sectio legitima in ophthalmia in Chirurgo Amstelodamensi, cui dexter oculus fuit inflammatus. Quod attinet derivatoriam venæ sectionem; sanè ad derivationem nil melius est, quàm venam frontis incidere: sed hocce habet incommodi, ut subinde pro secanda vena frontis laqueus collo injiciendus sit, ut promeliori illius intumescencia venæ jugulares constringantur, ubi periculum imminet, ne constrictis ita venis jugularibus simul insigniter augeatur oculorum inflammatio; unde non aperienda est, nisi tundi possit vena frontis sine hac adstrictione, & per se pateat, & potius omninò eadem est relinquenda. Non tamen nisi præmissis præmittendis hæc vena frontis incidatur, siquidem post eam intempestivè sectam ophthalmiam gravissimam, visus & loquelæ perditionem observavit Hildanus *Cent. 5. obs. 18*. Interdum etiam pro derivatione arthrotomia temporalis in ophthalmia contumacissima instituitur: vid. Nicolaus Fontanus *in Respons. & Curat. Medic. l. 1. pag. 50*. Huc etiam pertinent cucurbitulæ scarificatæ ponè aures applicandæ; vid. Rhodius *centur. 1. obs. 79*, qui felicem harum usum habet, ut ut rarò in usum vocentur. Quò etiam spectant vesicatoria nuchæ, aut etiam ponè aures applicata, quæ pro aversione usitatissima ac sanè proficua sunt. Ut ut enim hæc saltem sint remedium palliativum, & medeantur ophthalmiæ à posteriori, tamen verissimum est, quod multum illa valeant. Neque ipse credidissem horum fructum adeò insignem esse, nisi ipse eundem vidissem. Et quidem nuchæ applicata juvant sensibilibus, si rectè fluant, quia ibidem arteria cervicalis se dividit in duas partes, interiorem, etiam ad oculum progredientem, & in exteriorem circa nucham hinc inde disseminatam: unde vesicatoria, dum in nucha faciunt dolorem, auctiorem cò sanguinis promovent fluxum, dum ex ramo hoc interiori fit derivatio quasi ad ramum exteriorem, ut minori impetu ac copia sanguis ad oculum affluat. Quibus

autem non est cutis sanabilis, facillè non conveniunt vesicatoria, ut hydropicis; nam ad gangrænam disponunt, vid. Rolfinccius. In contumacissima ophthalmia, ubi non sufficiunt vesicatoria, cum ulcus superficiale post aliquot dies denuò sanetur, setaceum applicetur nuchæ, quæ apud Veteres diversis membris applicata in usum fuerunt; perquam molestum quidem, sed potentissimum & summè proficuum in oculorum affectibus diuturnis remedium, quod potentius & cum majori efficacia serum eliminat, atque ejus stagnationem corrigit; tamdiu autem apertum servetur, donec levamen æger inde sentiat, de quorum egregia præstantia in ophthalmia vid. Gabelchoverus *cent. 4. observ. 38. in Schol.* Horstius *Dec. 7. quæst. 1.* Hildanus *cent. 1. obs. 41. & 42. & cent. 4. obs. 6. 7. 14. 19. & 71.* Glandorpheus *cap. 7. & 24. & Scultetus lib. 1. Tab. 3. Figur. 2. & 3.* Loco hujus tamen adeò molesti, in ophthalmiis vel inveteratis contumacionibus, vel ex causa interna crebrius recurrentibus, quales in specie in infantibus observantur, fonticuli optimo consilio non rarò in brachio vel pede illius lateris, ceu palliativum remedium excitandi sunt, qui inusti mirum est, quantum possint, in infantibus etiam quinque vel sex annorum, qui sub pubertatis annis, si ita visum fuerit, denuò consolidari poterunt. Rolfinccius tamen *in Epit. Meth. cogn. & cur. partic. corporis affectus pag. 91.* fonticulum in cervice vel bregmate excitat; Riolanus *Encheir. pr. pag. 255.* in cavo auris postico; & Riverius *obs. à Martino comm. 7.* in nucha sive spatio intercapulari; denique, & quidem commodissimè, in brachio lateris oculi affecti. Aut loco setacei in nucha remedium est quasi vicarium fonticulus auricularis, auriculare quasi setaceum, ex radice thimelæ arbore-scentis (est ista thimelæ in specie, quam Tabernæmontanus *lib. 3.* nomine thimelæ granicidii describit, loco cujus & chamelæ vulgaris seu mezereon, item cortex radice esulæ, & hellebori nigri, potest substitui.) de quo etiam vid. Riverius *centur. 4. obs. 100.* item Velschius *Micromim. cent. 1. obs. 63. annex. Appendici Miscellan. A. N. C. ann. 4. pag. 39.* Bartholinus *c. 4. obs. 80.* Timæus *l. 1. Epist. 22. pag. 52.* & Tabernæmontanus *lib. 3. pag. 10.* Nempe radícula dissecatur in fibrillas, quæ lobo auris perforatæ immittuntur: exsiccata enim in orbiculos dividitur; postea maceratur in lixivio ex vitium cineribus facto, vel in aqua, in qua nitrum solutum sit; sine præparatione enim aures corrodit & inflamat, quæ acrimonia etiam acidis obtundi poterit. Perforatâ aure, filò butyro pingui tractò, promota suppuratione, secunda vel tertia die fibula radice vel orbiculorum imponitur, quæ humores potenter ex capite elicit:

elicit: singulis diebus recens immittitur; prior tamen exsiccata & purgata secunda & tertia vice usum eundem præstat. Confert non saltem in graviore ophthalmia, sed & in suffusione incipiente, aliisque malis visum hebetantibus; item in epiphora magnum affert commodum. Hujus loco radicem hellebori recipit Timæus von Guldensee in *Epist.* 22. *lib.* 1. pag. 52.

Ceterum vesicatoria dictis locis applicanda variè parantur: ordinariò quidem ex fermento, cantharidibus & aceto; malè tamen, cum excitent vesicam dolorosam, & præter hanc id noxæ secum ferunt, quod vesicæ excitatæ non adeò commodè fluant. Potius fiant sequenti modo:

℞. *Empl. citrinum*;

Subigatur hoc cum pulveris cantharidum quantitate debita, prout major vel minor excitanda est vesica, & in forma emplastri applicetur nuchæ, ita sensim excitat vesicam,

Vesica semel facta aliquamdiu servetur aperta, pro quo scopo vulgò quidem folium brassicæ rubræ calefactum applicant, quod quidem aliquid præstat, brevi tamen iterum coalescit vesica. Præter hæc admovent quoque emplastrum de spermate ranarum, sed hoc adhuc pejus est, quin potius optimum pro apertione servanda est, ut applicetur emplastrum citrinum, vel emplastrum de cerussa, vel de spermate ranarum, cui pro stimulo tantillum pulveris cantharidum additum sit, talis nempe quantitas hujus, quæ saltem irriter & pungat, non autem vesicet: ita quidem vesica semel excitata ad aliquot septimanas optimè potest in continuo fluore conservari. Pulveris hujus pro subjectorum varietate plus vel minus sumendum est, plus scilicet in iis, qui cutim densiorem, minus, qui molliorem obtinent. In delicatioribus subjectis loco setaceorum & vesicatoriorum etiam sacculus Hartmanni sufficit, ex pulvere seu farina seminis erucæ vel sinapi paratus, qui nuchæ applicatus cutim rubefacit, & ophthalmiam inhibet: vid. *Pr. Chimsatr.* pag. 99.

Confert quoque sapphirus in ophthalmiis & nimia oculorum lippitudine, si circulus circa oculum ducatur.

Præter hæc & internè ex fonte pharmaceutico ophthalmiæ contumaciores, aut ex lymphæ dyscrasia sæpius recidivantes curandæ veniunt, adeoque, præter purgationem cum jalappa factam, decocta lignorum, radicis chinæ & sarsaparillæ, præsertim ligni juniperi, & omnia juniperina, sunt optima, & à Zacuto Lusitano *lib.* 1. *Prax. Hist.* cap. 13.

Tom. II.

commendantur: sic Horstius *lib.* 2. *observat.* 32. observat ophthalmiam contumacem aliis irritis decocto assafras & lignorum curatam: Rulandus quoque in *Thef. Pract.* pag. 61. refert de muliere quadraginta annorum, quæ oculi rubore, dolore, lachrymis & cæcitate diu affecta, post alia plurima tentata decem dierum spatio hisce convaluit. Purgata fuit prius pilulis, hinc decocto ligni sancti per decem dies usa, post sudorem imposuit aquam ophthalmicam ex antimonio, & sic convaluit. Conf. Galenus *lib.* 13. *M. M. cap.* 11. & Rolsinccius *lib.* 3. *Consult. Med.* 3. Ac sane causarum ophthalmiam antecedentium magna habenda est ratio: nam ophthalmia ex fumis metallicis, frustraneis externis per interna mineralia curata fuit ab Horstio *lib.* 7. *obs.* 27. Sic Bartholinus ophthalmiam in prægnante, quoties uterum gerit, pertinaciter recurrentem sternutatoriis & venæsectione curavit *Cent.* 6. *Hist.* 31. Ophthalmiam Gallicam Mercurii ope curatam videbitis in Zacuto Lusitano *lib.* 1. *Prax. observat.* 45. denique cinnamomum jejuno stomacho comestum fluxiones in oculum promovet, teste Panarollo *Pent.* 2. *observat.* 28. quibus insuper accedunt alterantia cephalica & exsiccantia vulgò dicta, e. g. fœniculum, rosmarinus, euphrasia, betonica, Valeriana, & ligna aromatica, horumque decocta & essentia.

Quoad remedia externa seu topica, ipsis oculis admovenda, sunt varia: Practicis pluribus in usu est communi, ut applicent lac, imprimis muliebre, nunc solitarium, nunc aliis mixtum: sed pessimo consilio; item interdum propter dolorem quidam applicant opium, sed sæpissimè periculoso cum eventu; opium enim demulcet quidem dolorem, sed simul in ophthalmia illud & omnia opiata sunt nociva, quia facile inflammationem ad excitatem & gangrænam disponunt, & inhibent insensibilem transpirationem. Sic quoque lacticia nocent: lac enim quodcunque, si recens instilletur oculis, incrustat eos unctuositate sua, & quasi sordibus inficit, unde impedita insensibili transpiratione ejus, tunc maximè necessariâ, inflammationem potius auget. Si verò lac non recens applicetur, nocet subtili suo acore, quoniam lac muliebre, sicuti omnia alia lacticia, facile acorem contrahit, & ita acescendo oculum lædit, grumescit, & in calæum abit; qui grumi oculis incumbentes eos excitant maximè sensiles, adeoque ophthalmiam majorem reddunt: unde caveamus nobis ab opio & lacte, nisi summa urgeat necessitas. Rectè igitur Lindanus dicit; se sæpissimè vidisse lac & opium applicatū, nunquam tamen felicem usum observasse. Quæ ergo conveniunt in ophthalmiis externè, sunt imprimis sperma ranarum,

(Ffff)

vel



vel per se asservatum, vel secundum Tachenium destillatum, item aqua cancerorum fluviatilium ex iisdem contulis, & cum putrescere incipiunt, maturè destillatis, elicta, in specie aqua cancerorum fluviatilium cum chelidonio majori aut succo ejus destillata: de modo vid. Mynsicht. in *Armam. Chymic. pag. 296.* item Crollius in *Basil. Chym.* Item oleum seu potius liquor florum cyani, liquor florum calcatrippæ aut florum cichorii per deliquium in furno pistorio parati, admodum efficaces & nobilissimi sunt, quos omnes Autores unanimiter commendant. Parandi modus vid. in Schrœdero, *ubi de Cichorio*, & Hartmanno, *ubi de Ophthalmia* p. 786. Succus baccarum herbæ paridis expressus excellens habetur remedium ad ophthalmias & piphoras, vid. Vellchius *Microm. 25. cap. 1. annex. Anno 4.* M. A. N. C. Huc pertinet phlegma spiritus vitrioli epileptici, quod alterâ vice prodit, oleum sacchari per deliquium, spongiz sambuci, aquæ florum sambuci aut calcatrippæ, infusæ & applicatæ. Mucilagines etiam seminis Psyllii, cydoniorum, scœnugræci, althææ, cum aqua chelidonii majoris aut alia appropriata extractæ, addito saccharo Saturni, & tantillo camphoræ, etiam sunt egregiæ, cum linteis multiplicatis applicatæ, in specie, si à causa externa oriantur ophthalmiæ, v. g.

℞. ∇ Fl. Cyani ʒij.  
Mucil. sem. Cydon. c. ∇ sperm. ranar.  
Crocī gr. vj. (extr. ʒj).  
M. f. Epithema.  
D. S.

#### **Ähl- und lindernder Umschlag.**

℞. Mucil. sem. Cydon.  
hormini.  
Scœnugræc. c. ∇ chelidon. maj.  
vel fl. Cyani extr. āā ʒʒ.

Sacch. Saturni gr. vj. jx. ad xij.

Diluantur c. f. q. ∇ scœnicul. vel chelidon. major. vel euphras.

Nam ipsum saccharum Saturni cum aqua appropriata, dilutum, & oculis impositum, est egregium antiophthalmicum. Vel

℞. ∇ Euphras.  
Fenic. āā ʒj.  
Album. ovi no. j.

post conquassationem dissolve  
Sacch. Saturni ʒj. M.

Saccharum Joviale, ut vocat Lindanus, est præstantissimum, quod sequens est:

Teratur saccharum candi probè contritum in cyatho vel scutella stannea nova, nec usurpara, cum novo cochleari stanneo, idque tamdiu, donec saccharum benè tritum & agitarum fiat instar plumbi lividum, & quò magis livet, eò est melius. Nec potestis nimis diu terere, & sic habebitis optimum ophthal-

micum, quod vel in forma pulveris seorsim potest oculis inflari, vel cum aliis appropriatis admisceri, v. g.

℞. ∇ Plantag.

rosar.

fenic. āā ʒʒ.

sacch. candi ʒial. ʒij. ad ʒʒ.

Tutia præp. ʒʒ.

Crocī Or. gr. ij. vel iij.

M. f. Collyrium.

De quo ter vel quater in die guttæ aliquot in oculum instillantur. Dicit esse anodynum optimum, refrigerare & discutere dolores. In principio enim morbi, dum dolor, rubor, fervor & lachrymarum acrium fluxus urget, absorbentia metallica appropriata imprimis conveniunt, qualia sunt in specie tutia præparata, rubrica, cerussa, creta, & hinc flores zinci, flores Jovis à Barbette laudati, quibus addatur mater perlarum, lapides cancerorum, lapis calaminaris exactissime præparatus, verbi gratiâ:

℞. ∇ Fl. Cyani

Euphras.

Verben. āā ʒʒ.

Tut. præp. ʒj.

Matr. perlar. præp. ʒij. M.

De qua mixtura instilla aliquantulum oculis, & simul madentes perias impone.

Facit huc collyrium Lipsii contra ophthalm. ex variolis sæpissime recurrentem.

Vel ℞. ∇ Plantag.

euphras. āā ʒj.

Tut. præp. ʒʒ.

Camph. gr. v.

Crocī gr. ij. M.

Instilletur aut applicetur oculo; visum præservat à variolis.

Porro phlegma aluminis primò prodiens insigniter laudatur à Poterio, & etiam aliis. Egregium etiam est albumen ovi cum aqua spermatis ranarum benè conquassatum in principio applicatum. Egregiè etiam convenit albumen ovi cum frusto aluminis probè conquassatum in patina stannea tamdiu, donec unguenti consistentiam adeptum sit, nunc solitatio, nunc ana, respectu albuminis ovi, vel parum aquæ rosarum aut scœniculi addendo: Conf. Borellus *Cent. 1. observ. 31.* Hoc extenditur supra linteum duplicatum, & tepidè oculis applicatur, conducit in principio ophthalmiæ; Vel

℞. ∇ Tormentill. vel rosar. vel flor. cyani.

Plantag. āā ʒj.

Album. ovi num. j.

Alum. gr. v. vij. ad viij. vel ʒʒ.

Conquassentur probè.

Cum quo coincidit, si recipiatur lithargyr. aur. pulveris. q. v. idque decoquatur in aceti vini q. f. ita surgit liquor dulcis adstringentior, quasi aluminosus, qui filtratus per char-

chartam, & cum linteis oculis impositus, egregiè prodest.

Infusa etiam antimonialia sunt optima: nempe aquæ destillatæ florum cyani infunduntur croco metallorum, vitro antimonii, aut, quod melius, capiti mortuo butyri antimonii pulverisato; quæ probè filtrantur. Si quidem ad hunc modum parantur aquæ ophthalmicæ Crollii & Rulandi, quæ oculis instillatæ, vel cum linteis multiplicatis sunt egregiæ, addendo simul, ubi ardor urget, saccharum Saturni aut parum camphoræ, v. g.

℞. *Vitri. ðii pulveris. ʒi. ad ʒj.*

Infund. in

▽ *fl. cyani*

*calcatripp. vel euphras.*

*sperm. ranar. āā ʒj.*

Stent in loco calido per noctem; manè filtrentur: adde

*Sacch. Saturni ʒj. ad ʒʒ.*

*Camph. gr. iij vel jv. ad vij. M.*

Instillentur oculo, & cum linteis multiplicatis tepidè applicentur eidem.

Quod si intensus æstus simul adfuerit, addi possunt sacchari Saturni ʒʒ. & camphoræ gr. v. Vel

℞. *Vitr. ðii pulveris. ʒʒ. ad gr. xv.*

Infunde in

▽ *sperm. ranar. vel fragor. ʒiij.*

Stent in loco calido per noctem, manè filtrentur: adde

*Ceruss. vel sacch. ðni subtilissimè pulveris. ʒj. ʒʒ. ad ʒj.*

*Camph. gr. vj. M.*

Pertinet denique huc etiam vitriolum album, & hinc vitriolum Cyprium, si scilicet horum unum albumini ovi indurato & excavato indatur, ut lique scat; sic enim fit collyrium ophthalmicum magnæ commendationis: in specie misceri possunt cum tutia præparata, ubi lachrymæ acriores adfuerint. Vel

℞. *Ov. gallinac. integrum ad duritiem coctum, & dempto vitello excavatum:*

Cui immitte

*Sacch. ðni gr. vj.*

*Ol. alb. gr. viij.*

*Camph. gr. ij.*

*Mell. rosar. ʒʒ.*

Expressus liquor instilletur subinde oculo.

Ubi observetur, quod tale collyrium imprimis conveniat, ubi lachrymæ nonnihil sunt crassæ, & ubi inviscantur palpebræ oculorum.

Quantum enim valeant mixturæ ex vitriolo albo in ophthalmiis: videb. in Riverii *Praxi*, Barbette *Chirurg. p. 150.* & Thonero in *ejus Observ. pag. 116.* ad cujus imitationem aliquoties præscripti:

℞. ▽ *Rosar.*

*plantag. āā ʒij.*

Tom. II.

▽ *solan. ʒj.*

*Ol. albi ʒj.*

Solve, filtra, & adde

*Tut. præp. ʒj. M.*

Hoc collyrium benè agitaturn cum linteis imbuto & expresso tepidè applicatur oculis, quod egregiè profuit: interdum aliquot grana camphoræ addita fuere.

De aqua rosarum vid. Tachenius in *Hippocr. Chim.* cujus loco potiùs aqua florum cyani vel spermatis ranarum sumi posset.

℞. ▽ *Fenic. vel ruta.*

*euphras.*

*fl. cyani āā ʒʒ.*

*Ol. albi gr. jv. vel viij.*

Solutionem filtra per chartam emporeticam: adde

*Sacch. ʒial. ʒij.*

*M. f. Collyrium.*

*D. S. ut supra.*

℞. *Ol. alb. ʒʒ.*

▽ *chelidon. maj.*

*fenic.*

*fl. cyani āā ʒvj. ad ʒj.*

filtra & adde

*Tut. præp. ʒʒ. M.*

Calidè instilletur oculo.

Ac sanè in statu morbi mirabiliter conveniunt hæc collyria vitriolacea, quorum aliquot egregia exempla videbitis in Barbette *Praxi, ubi de Cataractis.*

Cum histamen simul observetur differentia lachrymarum aut sordium in oculis; ubi enim sunt viscidæ, glutinosæ, ibi dilutiora magis conveniunt; ubi sunt nimis copiosæ, sed non acres, moderatè adstrictoria, speciatim vitriolacea, conducunt; ubi verò acriores sunt & corrosivæ, in tali casu semper remediis simul pro histemperandis metallica fixa addenda sunt, v. g. Tutia præparata, cerussa, saccharum Saturni, lapilli cancrorum præparati, lapis calaminaris, margaritæ præparatæ, imprimis flores zynci, vel flores Jovis, quos Barbette *l. a.* insigniter commendat. In Bartholini *Act. Med. Hassniens. Vol. 2. p. 302.* laudatur unguentum, quod videatur.

Aliàs sempervivum cum foliis sceniculi contusum & applicatum etiam elegans ophthalmicum est in incipiente ophthalmia.

Quodsi verò rubor & tumor oculi est saltem superficialis ex causis externis, in specie ex rebus & pulveribus incidentibus in oculos, tunc conveniunt leviter discutientia, præter mucilagines suprâ præscriptas, egregium remedium est frustum recens carnis vitulinæ vel bovinæ crudæ, magnitudine & crassitie thaleri, tempore decubitus oculis admotum; hoc enim ardorem, rubedinem & tumorem oculorum à causa externa insigniter discutit.

Quodsi malum sit occasione aëris inclementioris, und wenn einem der Wind was hinein

(F fff 2)

vinein gewehet / similiter mucilagines jam laudatæ sunt optimæ.

Cæterum sæpius urget in ophthalmia intensissimus dolor & ardor oculi, malum exasperans, pro quo, etiam aliis in casibus, compescendo nil melius est cataplasmate ex pomis dulcibus & benè odoratis, sub cineribus aut cum aqua appropriata coctis, parato, v. g.

℞. Pom. Borsdorff. sub ciner. assat. vel poma recentia no. iij.

coqu. in f. q. ∇ fl. Cyani, vel Euphras. & rosar. ad mollitiem, trajiciatur per setaceum:

Pulpæ trajectæ adde

Tutia præp. vel sacchar. albiss. vel Zial. Lind. ʒij.

Camph. gr. viij.

Croci gr. iij. vel jv. vel v.

M. f. Cataplasmat.

Applicetur tepidè cum linteis multiplicatis. Experimentum est Timæi von Guldentlee contra dolorem partium, in specie ophthalmiam in Casibus lib. 1. Cas. 21. pag. 48. Barbette in Chirurg. item Sculteti in Armam. Chirurg. observat. 25. & D. Michaelis in Colleg. Fenslon.

Quodsi ophthalmia ex ictu apis, curatur optimè collyrio ex alumine & albumine ovi supra dicto.

Quoad ophthalmias nothas seu siccas: eadem ferè conveniunt; præcipuè tamen aquæ cancerorum, mucilagines, alumen cum albumine ovi, item lithargyrium in aceto coctum, egregium est. Vel

℞. Butyr. rec. non salit. ʒß.

Sacch. Hni.

Tut. præp.

lap. calamin. præp. ʒā. ʒj.

Camph. gr. j.

M. f. Linimentum.

D. S.

Augen-Salblein.

quò palpebræ sæpe illinantur.

### CURA EPIPHORÆ.

In cura ophthalmiæ magis serosæ seu epiphoræ causarum habenda est ratio: unde

1. Irritatio à causa externa est removenda, & inducta læsio corrigenda.
2. Lymphæ interdū vitium, ejus scilicet aciditas & acrimonia internis catarrhalibus generalibus est corrigenda; unde quæ in genere in catarrhis laudantur, hîc observanda: exterius verò acrimoniam ejus temperantibus, & blandè adstringendo humorū excretionem impediendibus succurrendum, ubi ferè in genere ea conveniunt, quæ jam in ophthalmia commendata fuerunt.
3. Glandularum tonus laxus blandè adstringentibus est firmandus.

De sternutatoriis res est dubia, an in affectibus oculorum lachrymalibus aut in quibusdam aliis conveniant: & sanè unumquem-

que terrere debent exempla ab experto Hildano adducta Cent. 1. observat. 24. item Cent. 2. observ. 13. item Cent. 4. observ. 12. & 13. ubi inter alia sternutatoriis, aut nimis, aut in affectibus oculorum aliàs adhibitis, cæcitatem inductam refert. Econtra suadere eadem possint ea, quæ habet Bartholinus Cent. 3. Epistolarum pag. 267. & Cent. 4. pag. 411. & 523. Et hæc ipsa roborari possunt ex Stenone, qui observat vasculum quoddam excretorium ex utroque oculo ad nares tendere, & sub ejusdem membrana intima per longum ejus protendi, & tandem in narium cavum aperiri: ratione cujus vasculi non raro collyria seu medicamenta ophthalmica externè oculis applicata subinde in ore paulò post gustata fuerint. Sed quicquid horum sit, fateor, me esse admodum timidum in applicandis sternutatoriis in oculorum affectibus: nam Hildani vestigia me terrent. Si tamen interdum eadem usurpanda, (1.) applicanda sunt eadem non in principio, sed in declinatione, (2.) sedatà jam maximà ex parte inflammatione, quæ ut plurimum accedere solet, (3.) moderata applicanda sunt sternutatoria, nullo verò modo acriora aut fortiora.

Quæ ergò conveniunt remedia in epiphora, blandè adstringentia sunt.

Commendatur igitur sequens experimentum non inelegans, quod laudat Timæus von Guldentlee.

℞. Rad. tormentill. grosso modo pulv. ʒj.

Alum. gr. v.

∇ Rosar. vel fl. cyani,

Plantag. ʒā ʒj.

stent in loco calido per diem & noctem, filtrentur & reserventur ad usum: S.

### Anhaltend Augen-Wasser.

Tutia præparata, & cum aqua fœniculi subacta, oculis instillata est egregia. Valde quoque prodest decoctum corticum granatorum, quod habet Hartmannus in Praxi Chimiæ. cap. 36. & etiam commendatur ad præservandos oculos in variolis, si adest tumor, parum de floribus chamomillæ potest addi: hoc enim vi suâ adstrictoria optimè eam sistit, sicut & illi, si lachrymæ aciores affligant, tutia addi potest.

Alii insigniter commendant cortices myrobalanorum citrinorum: hos infundunt in aqua rosarum per tres dies, deinde exsiccant atque pulverisant; iterum infundunt, idque ter vel quater: pulvis ita præparatus mirabiliter oculorum lachrymas consumere, & oculos eleganter adstringere prædicatur.

Porro verno tempore, cum floret salix, inciso cortice effluit liquor, qui oculis instillatus aut illitus mirabiliter superfluum humiditatem absumere, lachrymas oculorum sistere & hebetem visum confortare dicitur: Solenandro Conf. 8. Sect. 2. quidam commendant etiam



etiam ad lachrymas involuntarias rutam siccam, quam miscent cum melle & aceto, coquant, colant per pannum lineum, & colaturâ oculos inungunt, & certò lachrymas sistere dicunt. Thus alii cremare, & septies in aqua extinguere jubent, & aquam istam postmodum oculis instillant pro sistenda epiphora. Forestus *lib. 11. observ. 14.* commendat collyrium, quod multis etiam lachrymis emanantibus cum oculorum rubedine, ita ut etiam ægylops impenderet, profuit, & convenit etiam in epiphora catarrhali.

Decoctum ossium bubulorum & palcarum tritici est secretum Burrhi in epiphora, uti hoc videbitis in ejusdem *Epistol. de humoribus oculorum restituendis pag. 54.* Liquor seu oleum florum cichorii & cyani, uti & liquor sceniculi saccharatus ex Bartholeto, sunt egregii. Quin tutia præparata cum aqua sceniculi oculis instillata admodum temperat aciditatem; item saccharum Saturni, cerussa, mucilago seminis cydoniorum cum saccharo Saturni: flores cynici, lapilli cancerorum minutissime pulverisati, succinum pulverisatum, & denique lapis calaminaris præparatus, qui singulare remedium dicitur fuisse Paracelsi in talibus casibus.

Tandem potest & usurpari decoctum foliorum cydoniorum, laudatum à Riverio in *Praxi* contra ophthalmiam, quod exscripsit ex Solenandro:

Vel albumen ovi no. j. cum saccharo Joviali & aqua rosarum misceatur, & vesperi oculis applicetur. Vel albumen ovi conquisatum cum succo sempervivi & flor. fabarum impositum confert. Egregium etiam est, si dimidium pomi Borsdorffiani putrefacti nucis alligatur: Vid. D. Langius in *Miscell. Aليا*, ut lapis hæmatites, aqua sigilli Salomonis, aqua rosarum, infusio Sumach, aqua ophthalmica Maximiliani Imperatoris, &c. ex Practicis spontè innotescunt.

Quodsi pulveres in oculos incidentes vel alix res inducant epiphoras, tunc optimè retrahuntur hi ipsi beneficio lapillorum cancerorum, si scilicet hi imponuntur oculis, ita, ut pars cava oculi bulbum tangat, & ita clausis palpebris agitur hinc inde in oculis, & inde subito illapsa extrahantur. Semen scleræ oculis intrusum etiam ad extrahendas res alienas ex oculis admodum laudatur. Si incidat in oculum festuca vel palea, extrahitur cum frustulo succini, prius panno bene afficti. Si scobs ferri vel chalybis in oculos inciderit, manus oculo aperto applicanda secundum experimentum Hildani *Cent. 5. observat. 21.* Modum chirurgicum rem illapsam extrahendi per instrumentum, vos docebit Hildanus *Cent. 2. observ. 14.* item *Cent. 4. observ. 18.*

Denique si lymphæ concurrat vitium, vel

nimia acrimonia, ea, quæ in ophthalmia vera fuere laudata, conveniunt: In specie opera danda, ut acrimonia salia temperetur, & acida corrigatur.

Remedia hæc etiam in lippitudine conducunt.

## ARTICULUS XVI.

De

*Inflammatione Aurium, earumque Ulcere.*

**D**enique inflammantur etiam interdum aures, nempe auris interna, ejusque membrana meatum auditorium succingens eidem subjecta esse solet.

### C A U S Æ.

Præter externa occasionaliter hæc inferentia, qualia sunt vel vulnerantia, aut contundentia, nec non auribus intrusa, quorum exempla videbitis in Foresto *lib. 11. obs. 3.* & Hildano *Cent. 1. observat. 45.* subinde etiam spontè sua ex causa interna eadem concitatur. Nam in Parotidibus dolor auris inflammatorius percipitur, qui tamen mox transit.

### D I A G N O S I S.

Cognoscitur ex insigni ardore in aure, ex dolore continuo tensivo & pulsatili vehementissimo in aure, & cernitur interdum rubor quidam auris externæ, quò magis nempe ad exteriora vergit inflammatio; quæ ubi fuerit gravior, ad malas & tempora usque se extendit, sicuti, ubi magis interiora inflammantur, pulsatorius dolor gravior esse solet, in quo casu & febris & subinde delirium etiam, imò & interdum motus convulsivi superveniunt, vid. Forestus *l. a. observat. 5.*

### P R O G N O S I S.

Interdum satis periculosum malum inflammatio aurium esse solet; in tantum lethale est, & graviora symptomata conjuncta habet: nam hæc insensibiliter discutitur, aut suppuratur, & in abscessum degenerat, qui ulcus aurium post se relinquit.

Dum suppuratur, res non caret periculo, propter febrem & conjunctum dolorem, quò interdum cerebrum ejusque membrana periculosissime afficiuntur, sicque delirium supervenit.

Pueris & juvenibus periculosius est, quàm senibus; hi enim brevi & ante diem septimum mori solent: sin vero superveniat suppuratio & materia in pus laudabile convertatur, major spes reconvalescentiæ expectanda. Sic enim Epiphanius Ferdinandus *Hist.*

(F ff 3)

Med.

*Med. 14. lib. 1.* refert inflammationem aurium & dolorem intensum cum febre acuta, delirio gravi, &c. per excretionem copiosam puris die morbi nono, inflammationis septimo criticè curatam. Mirabile inflammationis acris exemplum est, quod Bartholinus *Cent. 3. Epist. 17. pag. 67.* refert in abscessu aurium erumpens pus & vehens simul secum dentem, sine defectu dentis ullius in maxillis.

Subinde hemicraniz aliique similes chronici affectus capitis per abscessum auris solute observantur, vid. Horstius *lib. 2. observ. 10. pag. 444.* utut nec auris suppuratione propter erosionem tympani, vel ipsius nervi auditorii, aut alia symptomata graviora supervenientia, omni periculo, ad minimum surditatis, careat, adeoque insensibilis inflammationis discussio tutior est, quàm suppuratio. Unde si auris inflammatio interiora magis occupaverit, & suppuretur, superveniunt interdum ulcera diuturna, pus ab aurium abscessibus natum tympani membranam exedit, quæ quandoque integra rejicitur, interdum putredine absumitur. vid. Horstius *lib. 9. observat. 8.* Cæterum quod dicat, tympani hanc excretionem observatam fuisse citra auditus læsionem, dubito, & suspendo hac in parte iudicium.

## C U R A.

In cura sudorifera repetita, & venæ sectio, aliaque universalia præmittenda sunt: loco verò venæ sectionis scarificationes pone aures institui, aut harum venis hirudines admoveri possunt, utpote quarum usu sævas & desperatas aurium inflammationes solutas Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Admir. observ. 64. & lib. 1. Princ. Hist. c. 14.* testatur.

Externa quoque nonnisi cautè & consideratis probè omnibus circumstantiis applicanda: nam talia plus interdum nocent, quàm prosunt. Vid. *Miscellan. M. A. N. C. Ann. 6. observ. 82. pag. 117.* Id quod in specie de actu frigidis aut repellentibus intelligendum venit, quæ etiam rejiciuntur à Riverio *lib. 3. Prax. cap. 3.* Schneidero *de Catarrh. specialiss. p. 181.* Septalio *Animadvers. lib. 6. §. 103.* & Hercule Saxonia *Prælect. P. 1. cap. 22.* Optimè curatur, vel quando maturè discutitur, vel quando suppuratur, & degenerat in abscessum. Opera igitur danda est, ut discutatur quantocyus tumor inflammatorius: quod si fieri nequeat, ad suppurationem perducatur. Discutient tumorem oleum chamomillæ cum balsamo sulphuris mistum; interim si hoc paulo acrius sit, misceatur cum oleo chamomillæ. Præterea etiam conducit oleum chamæmelinum, vel oleum rosaceum, in quo millepedes vel lumbrici bullierint, vel scorpium & lini, oleum decoctionis lumbrico-

rum terrestrium, vel millepedum, &c. tepidè auribus instillatum, vel oleum rosaceum cum mucilagine seminis cydoniorum applicatur, aut cum bombace iisdem intincta immittitur: oleum vitellorum ovorum egregium est remedium ad inflammationem aurium, & laudatur admodum à Petro Johanne Fabro *Curat. 53. & 54.* & Zacuto Lusitano *Hist. Med. Princ. Hist. 59.* utpote quod non solum anodynum est, sed etiam in principio inflammationem discutit, factam verò suppurationem subito aperit. Nobilius est oleum, in quo cancri fluviatiles contusi bullierint, quippe tale ob alcali susceptum laudatur à Deodato in *Panth. Hygiæ.* tam ad inflammationem aurium discutiendam, quàm mitigandam, si instilletur. Decoctum absinthii, centaurii minoris, abrotani, & alia aromatica auribus immissa, vel spiritus vini, vel spiritus salis ammoniaci cum mica panis calida auribus applicetur. Videatur Sylvius *de Morbis infantum cap. 9. §. 87.* Instillantur vel applicantur hæc ipsa cum bombace auribus; item succus sempervivi majoris auribus instillatus egregiè convenit in inflammatione; nam etiam aperit: v. g.

℞. Succ. semperviv. maj. ʒiij. ad ʒij.  
ol. Rosar. vel scorpion.  
Lumbric. ʒssr.  
Chamomill. ʒā ʒj.

M. D. S.

## Bertheilende Mixtur.

Applicantur cum bombace auribus, vel instillantur.

Fomenta aurium ex decocto plantarum emollientium & discutientium externè applicata egregiè conducunt.

His & similibus si non discutatur inflammatio, sed ad abscessum pergat, properemus ad suppurationem, pro qua promovenda speciatim convenit cataplasma ex medulla panis albi in lacte cocta, addendo vitell. ovorum, ut describitur à Riverio:

℞. Medull. panis alb. lbj.  
Coq. in lacte caprino ad pulvis consistentiam  
deinde adde  
Vitell. ovor. no. ij.  
ol. rosac. ʒij.  
Crocij ʒj. vel ʒij.  
F. Cataplasma.

quod extra applicatum auri suppurationem promover.

Sicuti in specie cataplasmata cepacea, aut capita allii sub cineribus cocta, bene confusa & auribus applicata, has inflammationes & maturant & abscessum aperiunt, verbi gratia:

℞. Ce.

℞. *Cepar. sub ciner. assat.* nō. 1.  
*Butyri* ℥℥. ad ℥j).  
*ol. Chamomill.*  
*Amygd. dulc.* āā ℥℥.  
*Croci* ℥j).

Misceantur, pistentur, & calidè in forma cataplasmatidis auribus inflammatis ad suppurationem tendentibus applicentur. Conf. *Riverius lib. 3. Prax. pag. 206.* *Forestus lib. 12. Observ. 4. Amatus Lusitanus Cent. 7. Curat. 92.* & *Hæterus in Hercul. Med. pag. 62.*

℞. *H. Malv.*

*Alb.*

*Violar.*

*fl. Chamomill.* āā M. j.

*rad. alb. pulveris.*

*Lil. alb.* āā ℥℥.

*Caric. pingu.* nō. vj.

Coqu. in ∇ ad consistent. cataplasmat. adde

*Medull. panis tritic.* ℥℥.

*farin. fenugr.* ℥℥.

*ol. chamomill.*

*Lil. alb.* āā ℥j).

*vitell. ovor.* ℥℥.

M. D. S.

**Matutirender Umschlag.**

Post inflammationem aurium sequitur subinde abscessus, adeoque

## ULCUS AURIUM.

Ulcera aurium aliàs sunt vel vera vel apparentia: vera vel ex abscessu post inflammationem nato, vel ex acriori lymphâ cò delata, meatum interiùs exulcerante: Apparentia ulcera sunt, quando sanies subinde multiformis ex auribus effluit, nunc cum, nunc sine præcedente earundem dolore, qui effluxus subinde diu durat, & quo cessante varia capitis & cerebri superveniunt symptomata, quæ levantur sub fluxus continuatione: ut in infantibus subinde observatum est, qui per huiusmodi aurium fluxus plus minus sordidos à pluribus malis, tam externis quàm internis, levati solent.

## P R O G N O S I S.

Vera aurium ulcera, si diuturna aut inveterata sunt, facilè in fistulam degenerare solent, vel erodendo occasionem membranis suggerunt, ut hyper-sarcoma succrescat, quod auditum obturet.

Pus quod effluit, si sit album, æquale, substantiæ mediocris, meliùs est, quàm si inæquale, foetens, saniosum &c. fuerit.

## C U R A.

In cura observandum est, ne apparentia huiusmodi ulcera aurium, seu effluxus eorundem plus minus saniosi citò nimis sanentur, præsertim in subjectis vel humidioribus, vel excretionibus capitis cutaneis, vel affe-

ctibus cerebri & capitis internis obnoxiiis, idque in infantibus imprimis observandum, ne major noxa inde oriatur; sufficit, si modò mundus servetur meatus auditorius, id quod optimè mediante urinâ humanâ assequimur.

Quoad ulcera vera: præmissis præmittendis internis, v. g. purgantibus, aut sudoriferis, aut essentia lignorum, &c. ulcus mundificandum, & hinc consolidandum venit. Mundificat optimè urina humana infusa, aut urina, in qua rasura ligni Guajaci maderit, item phlegma urinæ spirituosum; Vel

℞. *Vini alb. subtilis dulc.*

*De pueror.* āā ℥j).

*Mellis* ℥℥.

Ebulliant leviter.

D. S.

## Reinigende Mixtur.

Quibus tepidè meatui auditorio instillatis, aut cum turundula liis ebrîâ immissis, ac manè & vesperi repetitis, ulcus mundificabitur.

Item succus, vel syrupus, vel essentia absinthii, aut marrubii, cum paucò melle rosato, item syrupo nicotianæ, egregiè conveniunt. *Lyserus in Observ. pag. 133.* refert ulcus periodicum auris curatum per instillationem succi marrubii, misti cum melle. Sic alumen ustum cum vino mistum in aurem si infundatur, potentissimè ulcus exsiccatur. Puer decem annorum surdus ex variolis permanens, & cui per tot annos sanies ex aure fluebat, liberatus fuit succo cepæ & rhodomelite instillato, teste *Foresto l. 12. obs. 7.*

Denique si antiquum & sordidum ulcus fuerit, applicanda venit urina pueri cum paucò unguento Ægyptiaco imprægnata. Hisce si mundificatum & abstersum fuerit ulcus, id quod ex eo patet, si minor sordium ac puris quantitas effluerit, pro consolidatione istis modò dictis Tutia & Pompholyx addenda sunt, pro ejusmodi perfecta consolidatione.

# CAPUT II.

De

## *Sanguinis Extravasatione in Peculiarem Corporis Cav- itatem.*

## ARTICULUS UNICUS.

De

## *Empyemate.*

**Q**Uando sanguis planè extra sua vasa in cavitatem corporis quocunque modo effusus mox ad corruptionem tendit, acorem contrahit, hinc coagulatur & congruatur, tandem in loco calido successivè fermentando



tando suppuratur, hæc puris inde nati collectio in quadam corporis cavitate insigniori, humoribus aliis vacuâ, empyema dicitur, ab apostemate seu vomica distinctum, quæ est collectio puris in quodam viscere ex inflammatione partis cujusdam inducta. Oritur empyema duplici modo; vel

1. Ex sanguinis à causa externa in quadam cavitate extravasati corruptione, v. g. quando quis ex vulnere thoracis patitur effusionem sanguinis in thoracem, & si sanguis transmutatur in pus, est empyema primi generis.
2. Ex vomicae live abscessus cujusdam visceris inflammati interiora versus ruptione, cujus pus tandem ex parte in cavum corporis influit: v. g. quando ex pleura suppurata ac tandem rupta pus effunditur in thoracis cavitatem, est empyema secundi generis.

Veteribus alia horum vocabulorum fuit acceptio, dum propriè loquendo vomica Latinis est id, quod Græcis empyema, seu collectio puris in aliqua parte, præsertim interiore, & empyici propriè sunt, quibus pus in aliquo viscere oboritur: sicut purulentum hepær Hippocratis *Seç. 7. Aphorism. 45.* idem quod empyema. Tale malum Latinis dicebatur vomica: ita enim Celsus: Moderni ex ignoratione substituunt abscessum, & in specie pulmones purulentos κατ' ἐξοχήν vomicam appellant. Quoniam verò frequentissimè post peripneumoniam puris in cavitate thoracis collectio, ruptâ vomica, fieri solet, ob id empyema primariò de puris in thorace collectione intelligitur, secundariò tamen etiam, si in aliis locis colligatur. Frequentissimè dixi: quod post pleuritidem suppuratam sequatur tale empyema, quoniam pus in cavitate thoracis tandem effunditur. Verùm singulare est exemplum, quod refert Lindanus *super Hartmannum*, se nempe observasse in quodam puerulo, pleuritide suppuratâ affecto, factâ thoracis apertione pro extractione & factâ exploratione cum candela cereâ, nihil tamen puris fuisse excretum: mortuò tandem puerulo thorax pro scrutinio viscerum fuit apertus, & inventum fuit, quod scilicet pleura dilatata fuerit in immentum saccum, in quo omnis purulenta materia, tanquam in suo receptaculo fuerit comprehensa, ita ut aperto thorace nihil potuerit puris evacuari: id quod sæpissimè fieri arbitror.

#### C A U S A E.

Causæ, propter quas sanguis aut ecchymomata constituit, aut extra sua vasa intra cavitates partium effundatur, congrumescat & suppuretur, rarò aut nunquam sunt internæ, sed semper læsiones, aut imprimis injuriæ externæ, nempe vulnera punctim facta, vel contusio partium internarum. De vulneribus penetrantibus notum est, quod non si-

ne sanguinis ex vasis in cavitatem corporis singularem effusione fiant. Ex contusione, si lacerantur vasa intercutanea capillaria, & sanguis in partibus subcutaneis externis hæreat, oritur sanguinis suffusio seu ecchymoma, ad chirurgiam pertinens: sin verò interiora loca occupet, hujus est considerationis.

Ad contusionem pertinet in specie casus ab alto, in quo vel ruptione vasorum, vel partium violentâ contorsione, aut earundem nimis validâ contusione, vel aliâ laceratione, ex laceratis plus minus vasis sanguis per vasa læsa effunditur, inque certam corporis cavitatem infunditur, sanguis ergo extra vasa effusus ex his læsionibus externis, in cavo collectus, & ex vitali consortio proscriptus, mox ad corruptionem tendit, hinc immediatè acorem præternaturalem antea occultatum contrahendo spissescit seu in grumos abit. Similis hîc est ratio atque cum lacte, quod faciliè levi ex corruptione acescit, & magis magisque grumescit: id quod multò magis faciet sanguis lacte genitus, in quo particulæ salinæ copiosiores existunt, dum nutritivæ temperatiores & oleosæ in partium nutrimentum abeunt. Sanguis occulto tali acore grumefactus successivè incipit fermentare, dum acidum in sanguine coagulato cum alcali volatili massæ sanguineæ satis copioso concurrat, donec mutuâ fermentatione tandem in falsum tertium, nempe pus, abeant.

#### D I A G N O S I S.

Signa causarum ipsarum per se patent; cognoscendum saltem est, an sanguis grumulosus in quodam loco colligatur? aut etiam pus in quodam loco coërceatur? cognoscitur hoc imprimis ex antecedentibus causis, nempe læsione externa, & ex symptomatibus junctis.

Cavitates autem corporis insigniores, in quibus sanguis effusus corrumpitur, imprimis sunt tres: vel abdominis, vel pectoris, vel capitis.

In specie ergo 1. sanguinem collectum & congrumatum in abdomine hære, non rarum est, quod fit per vulnera abdominis, in specie contusione & casu ab alto. Hoc, præter vulnus penetrans, imprimis ostendit abdominis tumor, hinc inde sparsus livor, primum per superficiem abdominis, & quasi plumbea nigredo, post sanguinis effusi grumescentiam & suppurationem, durities quædam & renilus abdominis ad tactum in superficie abdominis, præsertim in loco, ubi est sanguis grumulosus, non simpliciter ex repletione, sed ex tensione membranarum peritonæi, quæ quasi spasmus laborant, horrentibus partibus viventibus cadaver sanguinis. Ad hæc non rarò superveniunt lipothymie vagæ, ex consensu cum stomacho affecto, item virium defectiones insignes, respirationes nonnihil impeditæ, & interdum tumor & abscessus circa inguina, per quos sanguis effusus interoû felicissimè evacuat, & similia symptomata.

Quoad

Quoad 2. In pectore esse collectum sanguinem ibique congruatum & suppuratum, monstrant, præter causas antecedentes, insigniores respirationis læsiones, tussis admodum molesta, dolores pectoris varii, imminens & frequens syncope, virium prostratio insignis, gravitas ac pondus circa costas notas, extremorum frigus, febris plus minus acuta, quæ omnino comprobant modum læsionis: v.g. si quis cadit ab alto, & frangit costas, consequenter propter ruptionem vasorum costis subjectorum, necessario sequitur sanguinis in pectus effusio: Item si quis fuerit punctum aut cæsum læsus infra costas, ubi sunt venæ & arteriæ, tunc est signum effusi sanguinis in thoracem, & factæ ejusdem congrumationis, corruptionis, & sic empyematis.

Denique, quoad 3. In capite & sub calvaria ejusdem collectum esse sanguinem congruatum, monstrat præter læsionem externam, dolor ejus gravativus, item sensus insignis pulsationis in capite hinc inde perceptibilis, propter motum arteriarum impeditum, oculi nonnihil sponte lachrymantes, & rubor faciei; superveniunt etiam varia symptomata stomachi, imprimis vomitus biliosus, nausea, ac interdum, sed raro, singultus, &c. quæ parthematia si superveniunt læsionibus capitis, signum sunt, sanguinem in caput esse effusum & grumosum. Sanguis nunc per os, nunc per nares, nunc per aures exitum molitur, quæ magis sanguinem intra meninges cerebri effusum & congruatum indicant, quibus septimo vel octavo die accedunt vigilæ pertinaces, aphonia & similia, quæ gravius malum portendunt; interdum ægri obstupescunt, aut brevi post læsionem stupidi redduntur; accedunt denique causæ antecedentes, aut validâ contusione cranium affligentes, aut forti incisione cranium dividentes. Sanguinem verò intra calvariam effusum ac congruatum suppurari, testantur febris superveniens intensior, plus minus acuta, pro varietate circumstantiarum; item ardor in ista parte, in qua fit suppuratio: accedunt insignes præcordiorum anxietates, vigilæ, & interdum deliria, &c. In specie ex rigore & febris suppuratio se manifestat.

Hæc ipsa posterius enarrata signa etiam ostendunt sanguinem in alio loco congruatum ad suppurationem tendere, quia interim in loco quodam externo, v.g. si sanguis coagulatus in abdomine hæreat, circa inguina oritur abscessus, in quo & per quem sanguis congruatus & suppuratus postmodum feliciter evacuetur.

Empyema jam factum seu pus collectum facile ex eo cognoscitur, quod remittat febris, æstus ac reliqua symptomata, quin potius

Tom. II.

fluctuatio quædam puris hinc inde percipitur.

Quod attinet alteram speciem empyematis: ea est, quando abscessus suppurati ex inflammationibus nati aperiuntur, & ex his aperiuntur pus in corporis quandam cavitatem effunditur, inter quæ istud gravissimum est, quod fit post pleuritidem & peripneumoniam suppuratam, quæ uti sunt altioris indaginis, ita & difficilioris cognitionis & curationis.

Cum ergo frequens sit empyema thoracis, ex suppurata peripneumonia natum, specialiter probè cognoscendum est, hinc loco omnium proponam, ut de reliquis simile fieri queat judicium, signa ejus. Rumpitur autem vomica circa vigesimum, interdum trigesimum, aut 40. diem: tum rigor fit, & febris intensior supervenit: vid. Hippocrates *lib 5. Aph. 5.* Adest tussis continua & frequens, item obscura, *hohl* / & quasi è profundo cavoque producta, tonus est obscurus, quia tota hæc tussis actio est à diaphragmate, non verò pulmonum: Illud enim gravatur ab incumbente pure. Porro inter tussiendo sentiunt ægri in cavo pectoris concussionem aliquam & fluiditatem, ac imprimis in eo thoracis medio, ubi est pus effusum, quia materia diaphragmati incumbens, per tussim agitata & sublata, denuò recedit, adeò ut sæpe nihil excernatur; in progressu verò post multos demum tussiendo conatus materia plus minus purulenta excernitur, & tandem etiam aliquid saniosum. Febris adest, quæ in principio magis acuta esse videtur, in progressu verò mitior & lenta magis redditur, ad hæcticarum ferè naturam accedens, quæ vesperi præsertim exacerbatur, & circa noctem vehementior est. Respiratio semper est gravis ac difficilis, unà cum sensu gravativo pectoris, quando patientes stant aut sedent; si verò decumbunt, in specie in dorso sentiunt aliqualem fluctuationem, & decumbendo optimè se habent, & sine molestia ferè respirant; quando verò inclinant, v.g. calceos aut solvere aut ligare volunt, videntur suffocari; hinc enim à pondere puris incumbentis diaphragmati, & pulmones inundantis, diaphragmatis motus ferè antrorsum versus impeditur, anxietates subinde vexant, superveniunt interdum palpitationes cordis, item sudores colliquativi nocturni; ulterius sentiunt frequentissimè evaporationes ex pectoris cavo ad os adscendentes instar aquæ calidæ, *wie ein warmer Dampf* / ac in specie mala è regione partis affectæ subinde phlogosum quadam, nunc apparente, nunc transeunte, rubet, ita ut, quando empyema sinistrum latus occupat, mala quoque sinistra phlogosum patiatur. Tandè in ulteriori mali progressu percipiunt frequenter saporè quendam tetrum, cinereum, & quasi putridum continuo in ore.

(Gggg)



ore. In pulsu talium hoc est singulare, quod creberrimis vicibus in una cum altera pulsatione intermittat, idque in specie, si tangatur in carpo lateris affecti, in altero carpo pulsu subinde se ritè habente, ita ut intra quatuor pulsationes semel penitus cesset, quod etiam in pleuriticis fit gravioribus; Pustulæ in thorace erumpunt cum reliquis phthiſeos aut tabis phænomenis, ac denique, si in dextro latere est empyema, tunc decumbentes in eodem bene habent; sin verò decumbunt in sinistro latere, male habent, & contra. Tumor intercostalis mollior comparet; vid. Plate-*rus observat. pag. 734.* aut potius, annotante Riverio *Prax. lib. 7. cap. 4.* latus affectum tumorem œdematosum monstrat à tenuioris materiæ aliquali transudatione. Plura videbitis in Hippocrate *Progn. 16. §. 6. 7. &c.*

### PROGNOSIS.

Prognosis variat in his affectibus pro quantitate sanguinis effusi, & pro qualitate loci in quem effusus est, quod etiam intelligendum est de pure. Nam sanguinem collectum plus minus congruatum subito evacuari, aut si hoc non citò fiat, suppuratum faciliè per vias naturæ consuetas, vel per factum & apertum quovis in loco abscessum excerni, optimum est. Si hoc non fiat, periculosum est; nam expure retento interdum gangræna & partium corruptio lethalis infertur.

Casui ab alto, percussionibus & læsionibus capitis si superveniunt vomitus, funestum est signum; innuit enim gravem læsionem cerebri, cranii & meningum, & nisi tempestivè instituatur trepanatio, mors sequitur.

Febres interdum periculosæ his affectibus superveniunt, interdum ulcera internarum partium, adeoque phthiſis & tabes accedunt, interdum gangræna & consequenter mors sequuntur.

Ac in specie empyema pectoris, ut plurimum ex læsione pulmonum, nisi maturè curretur, phthiſin pulmonalem & tabem infert; si verò sanguis in cavitatem abdominis effusus suppuretur, frequenter apostemata circa inguina infert, eaque salutariter.

Sanguis in capite infra cranium collectus est malum peracutum, & ut plurimum lethale, quia citius ægrum morti tradit, antequam ad suppurationem veniat, proinde maturè si exitus procuretur.

Urinæ rubræ turbidæ cum sedimento multo in lateribus matulæ, so sich viel anhänget/ indicant communiter læsionem visceris cujusdam interni, præprimis à causa externa, vom schlagen oder fallen; hinc natura malum à bono segregat. Præcipuè autem illud sedimentum in lateribus indicat pinguedinem renalem dissolutam, & cum urina excretam.

Prognosis in empyemate pectoris Hippocrates *text. 17. §. 9. 10. &c.* innuit, evaluatos scilicet, quos febris aut ruptura deserit, quibus citius appetunt, non amplius siccant, nec diarrhœa laborant, & pus leve, album, & æquale exspuunt; e contra morituros, quibus symptomata illa permanent, aut recedunt, cum puris flavi, viridis, lividi, foetidi, visceridi & spumosi exspuitione: quibus accedit dyspnœia major minorve, quorum illa ob puris copiam celeriter suffocat, hæc salutem promittit: item *sect. 5. aphor. 15.* si empyema intra quadraginta dies & noctes sputando, aut aliâ ratione, v. g. per urinam, non expurgetur, in tabem degenerat.

Suppuratio, quæ utramque thoracis partem occupat, periculosior est, quàm quæ unam.

Quibus robustis viribus pus per alvum aut vias urinarias copiosè excernitur, evadunt.

Quicumque suppurati uruntur aut secantur, si pus purum & album fluat, evadunt; secus, quibus suberuentum, foetidum, &c. vid. Hippocrates *lib. 7. aphor. 45.* item quorum pus specillum argenteum velut ignis tingit, vid. Willisius *Pharm. Rat. P. 2. pag. 193.*

### C U R A.

In Cura considerandus est sanguis effusus, & postmodum pus ex eo genitum. Sanguinem effusum & congruatum quod attinet, si illud sit à vulnere, si ve casu ab alto, eo primariò est incumbendum, ut

1. Sanguinis grumi resolvantur, & hinc
2. Per convenientes vias quantocyus evacuentur.
3. Quod si sanguis affusus vel dissolvante suppurationem commodè que evacuare nequeat, suppuratio promovenda, & febris adjuncta tunc nonnihil mitiganda est.
4. Pus factum per debitas vias quantocyus evacuandum.
5. Læsiò partis à pure curanda, & in integrum restituenda, quod in omni empyemate æqualiter obtinet.

Via istæ convenientes, per quas tam sanguis grumofus, quàm pus exinde genitum, ex corporis cavitatibus evacuatür, sunt hæc, ad quas vel sponte vergit natura, & monstratur nobis imprimis à loco, in quo sanguis congruatus hæret, quando interdum evacuatür per vias consuetas, alvum, sudorem, urinam, interdum per alia loca, vel quas docet ars per vias inconsuetas arte chirurgica factas, dum sanguis in cavitatibus collectus, vel grumofus, vel omnes exinde genitæ purulentæ, optimè evacuantur earum perforatione: v. g. si in abdomine hæreat sanguis vel pus, factâ debita paracentesi, aut vulneris majori dilatatione, si

pun-



punctum factum est illud, dictis via aperienda, vel alio modo infra umbilicum cum lancetta vel scalpello fiat apertura. Thoracis apertio seu intra quintam vel sextam costam, (à supremis numerando) sectio, optimè evacuat sanguinem & empyema thoracis. Ac denique, si facienda apertio in capite, optimum remedium est ejus trepanatio. Hi sanè modi sunt optimi, qui citò & tutò satis curant, modò, quoad legitimum usum, maturè instituantur hæ operationes chirurgicæ & temporis habeatur ratio, & non, aut nunquam, aut tardè nimis instituantur, quando vel vires sunt prostratæ, vel sanguis jam tum firmiter congrumatus est, vel quando pus ira est alteratum, ut commodè evacuari, quin potius, quò celerius instituuntur tales operationes & perforationes, eò promptior & optatior est successus: de quibus tamen cautelis & requisitis aliis videantur rerum chirurgicarum scriptores, in specie Sculterus in *Arman. Chirurg.* Hornius in *microtechnè*, & imprimis Thomas Fienus in *lib. 12. chirurgiæ*, ac denique Guillemeau; de *Operat. chirurgicis*.

Quod si vero mediis pharmaceuticis agendum sit post casum ab alto, vel etiam alio casu, pro sanguine plus minus grumoso, dissolvendo & dissoluto evacuando, subinde necesse est, ut in gravioribus vulneribus, & his supervenientibus stagnationibus & extravasationibus sanguinis, in primo principio venæ sectio instituatur, idque in specie aut in corpore plethorico, aut ebrio, aut subjecto, cujus sanguis aliàs est aptus ad suscipiendas turgescantias febriles. His in casibus convenientissima est sanguinis missio ad certum pondus, pro circumstantiarum ratione, ut ita imminuatur aliquantulum sanguinis quantum, & impetus ejus per vasa se effundens impediatur, ne in vasis uberius turgescens, confertim nimis & nimis copiosè per vasa sum in corporis cavitatem irrumpat; observando tamen semper circumstantias & regulas revulsionum quoad locum venæ sectionis, in quem influit sanguis, ut nempe in contrario seu opposito loco venæ secetur vel aperiatur.

Facta vel omissa venæ apertione maturè sanguis omnis grumosus resolvendus est, & resolutus, uti dixi, vel ductu naturæ per convenientes vias evacuandus, vel per meatus arte apertos arte exhauriendus. Resolvunt grumosum sanguinem omnia ea, quæ absorbent acidum plus minus, qualia sunt vulneraria plurima ratione alcali plus minus occulti, vi cujus absorbendo acidi cessat coagulatio. Equidem latus campus horum patet, quæ inter in specie eminent rubia tinctorum, & hinc artificiale illud tinctoribus usuale paratum, *Crapp* / quod in specie aceto ebullitum & potum, egregiè dissolvit grumos e.g.

Tom. II.

2. *Rad. rubia tinct. præp. 3℔.*

Ebull. in 4. q. aceti.

Colat, capiatur pro 2. dosibus.

D. S.

*Zeitheilender Trancf auff 2 mal.*

æger in lecto se probe contegat, sudoremque expectet.

Sic quoque laudanda sunt radix tormentillæ, bardanæ, symphyti majoris, bistortæ, caryophyllatæ, polygonati, scabiosa, ablinthium, abrotanum, hypericum, bellis minor, quam singulariter tanquam secretum commendat Hartmannus; chærefolium, carduus benedictus, scœniculum, hyssopus, & in specie hedera terrestris; item sabina, verbascum, geranium robertianum cum vino decoctum, succus geranii, arnica, de cujus usu egregio vid. *Misc. A. N. C. Ann. 9. Obs. 2.* semen cardui benedicti & Mariæ, chærefolii hyperici, &c. item conveniunt rhabbarbarum, radix angelicæ, vincetoxici, pimpinellæ, aristolochiæ rotundæ, aquæ horum simplicium, in specie chærefolii, scabiosæ, alkekengi & cinnamomi, syrupus acetosilatis citri, scabiosæ, hyssopi, &c. Reliquis tamen omnibus palmā præfert acetum vini, in quo lapilli cancerorum sunt soluti. Huc pertinet sperma ceti à 3℔. ad 3j. in cerevisia vel alio vehiculo calido propinandum, quod nobilissimū & expertissimum est remedium & mirabilis efficaciz, in specie si sanguis congrumatus sit in pectore, cum respiratione difficili, expectorationem promover. Porro castoreum, sanguis hirci secundum Helmontium *Tr Plen-va Furens* ritè collectus ad 3j. propinatus. Mumia ad 3j. hic etiam communiter laudatur, sed nihil valet, quia non habemus genuinam. Hisce adduntur bezoar orientale, lapilli cancerorum, lapides percarum, carpionum, bovini è felle, album Græcum, dens apri cum aceto, corallia rubra, & marina quæcunque maxilla lucii piscis, succinum album præparatum, carbonēs tiliz ad 3j. vel 3ij. in aqua chærefolii propinati commendantur ab Hartmanno, osteocola cum aceto destillato propinata, marga saxorum, terra Hibernica, terra sigillata, bolus Armena, terebinthina, fuligo, vel pulvis factus ex carbonibus tiliz, lapillis cancerorum, ex herba chærefolii; cujus 3j. datur in aceto. Hinc pulvis Augustanorum ad casum in aceto vini vel destillato, species diamumiz Mynsichti, stercus passeris in aceto dissolutum & propinatum, &c. pinguedo humana & canina, quæ ab 3℔. ad 3j. liquefacta & in potu cerevisiæ assumpta, est egregia in casu ab alto; item antimonium diaphoreticum, bezoardicum minerale, & reliqua consueta sulphurea, antimonialia fixa, &c. acidum plus minus absorbentia, essentia myrrhæ, florum hyperici, in specie essentia quæ-

(Gggg 2)

cun-

cunque vulnerariæ, tinctura, succus & extractum florum bellidis, tinctura coralliorum Mynsichti, spiritus theriacalis camphoratus, spiritus tartari, liquor cornu cervi succinatus, mixtura simplex, tinctura bezoardica, & similia, quæ in genere ad sanguinis grumos, adeoque in casu ab alto in casibus chirurgicis post vulnera adhibentur.

Ceterum in propinandis his remediis contra casum ab alto, seu contra sanguinis grumos resolvendos, siue causa externa siue interna occasionem dederit malo, observetur necessariò hæc cautela: ut nempe cum his sanguinis grumos solventibus semper talia misceantur, quæ sanguinem congruatum resolutum simul per convenientes vias evacuare queant, adeoque simul, vel ut alvus laxior, vel urina aut sudor uberius fluant; opera danda est: quid enim confert, ut dissolutus cruor in corpore hæreat? Unde si sanguis dissolutus hæreat in abdomine, aut locis alvo vicinis, & adfuerit hujus inclinatio ad secesum, aut natura per alvum ejicere inclinet, simul laxantia remediis istis, v. g. folia sennæ, vel quod melius, rhabarbarum, aliaque similia blanda abstergentia addenda erunt; nam & ipsum rhabarbarum simul sanguinem resolvit: e. g.

℞. HB. Charesol. M. j.  
Rhabarb. el. ℥ij.  
fol. Senn. s. st. ℥i℥.  
℞i ℥j.

Coqu. in l. q. *¶ a simpl.* leniter:  
Colat. adde

lapill. *Er. prap.* ℥j.  
sperm. ceti ℥℥.  
Pulv. contra cas. Aug. ℥℥.  
Syr. scabios. q. s. pro edulcoratione. M.  
D. S.

**Bertheilend Parier-Träncklein/wohl umb-  
zurütteln/auff 2. mal.**

℞. Decoct. Charesol. aut, quod melius, heder.  
terrestr. ℥j.

Infunde huic tepido adhuc per noctem in loco  
calido

Rhabarb. el. ℥j.  
fol. senn. s. st. ℥℥.  
℞i ℥j.  
manè adde expressioni

lapill. *Er. prap.* ℥j. vel ℥i℥.  
Pulv. contr. cas. ℥℥ ad ℥i℥.  
Syr. heder. terr. q. s. pro grato sapore.  
M. D. S.

**Bertheilend Parier-Träncklein auffestl. mal.**

Si vero in pectore vel locis vicinis & remotioribus sanguis congruatus hæreat, & natura inclinet evacuare per urinam, diuretica sunt addenda, quæ sanguinem resolutum per vias urinarias amandent. Sin ad sudorem natura ægri vergat, & in partibus aut vasis magis exterioribus hæreat sanguis, tunc sudorifera

præsertim sunt optima, quò resolutus ita sanguis extramittatur.

Facit huc etiam egregia cura Lindani, qui curavit aliquando fabrum quendam lignarium, à summo tecto decidentem, dum ipse ædificaret, & duas costas frangentem, simulque sanguinem multum expuentem cum suffocationis metu, unde collegit, sanguinem in ipsum cavum pectoris effusum esse. Paravit ergo decoctum ex brassica rubra, artemisia, consolida Saracenica, & floribus bellidis minoris: cui decocto infudit aliquid rhabarbari, & hinc post infusionem addidit aliquid spermatis ceti: tunc sumit seorsim lapillos cancerorum, & illis ad eminentiam transversi digiti affudit acetum vini, & cum fervor defervuisset, dedit aceti hujus benè agitati cochlear unum, & miscuit cum uncis quatuor vel quinque prioris decocti, & ita hauriendum dedit, ex quo potu sanguinem congruatum antea, postea resolutum protinus ejicere cepit, & quidem integras matulas, cum magno levamine, & tertio die continuato potu venit visum, quid agerent ceteri operarii.

Ac sanè potius præstat à diureticis incipere; in fine autem non incommodum est, aliud quod sudoriferum subnectere. Adeoque convenit in dictis casibus mixtura polychresta ex lapidibus cancerorum cum aceto destillato, diaphoretica & diuretica, e. g. confici possunt tales formulæ:

℞. Lapill. *Er. prap.*  
sperm. ceti  
sangu. hircin. vel *℥ii diaphor.* ā ℥j. ad ℥℥.  
M. pro 2. dosibus in aceto assumendis:  
D. S.

**Bertheilende Pulver.**

℞. Sangu. hircin. *prap. secundum Helmont.* ℥j.  
℞a sigill. vel marg. Saxor.  
℥ii diaphor. āā ℥℥.

M. Div. in 2. part. æqu.  
D. S. ut *supra.*

℞. Lapill. *Er. prap.* ℥j.  
Rhabarb. el.  
sperm. ceti  
Castor. vel Myrrha  
sangu. hirci āā ℥℥.  
M. f. Pulvis: S.

**Bertheilend Pulver auffestliche mal.**

Dosis ℥j. in decocto charesolii vel feniculi. Item

℞. Lapill. *Er. prap.*  
Osteocoll. *prap.* āā ℥j.  
Nuc. moschat. ℥℥.  
M. D. S.

**Heilend Pulver.**

℞. *¶ Menth.* vel scabios.  
Charesol. āā ℥j.  
acet. vini simpl. destill. ℥j.  
Corall. *r. prap.* ℥j.  
lapill. *Er. prap.* ℥j.

*Laud. opiat.* gr. ij. vel iij.  
*Syr. card. bened.* ʒvj. vel ʒj.  
M. D. S.

**Zertheilende Mixture/Löffelweise.**

Hæc est potio generalis, usurpari potest cochlear unum, vel pro binis aut tribus dosibus, & partim per sudorem, partim per urinam operatur.

Notandum: Quando hæc miscentur, fieri efferveſcentiam, & ita ex his prodire concretum novum.

Vel

℞. *✓ Ceras. nigr.*  
*lil convall.*  
*Meliss. aa* ʒj.  
*Acet. Rutac.* ʒvj.  
*Lapill. & r. præp.* ʒj.  
*Cinn. ʒii* ʒi.  
*✓ vol. succin.* gr. xij.  
*Syr. fl. tunic.* ʒvj.  
M. pro aliquot dosibus.

D. S.

**Zertheilend Träncklein auff 3. mal.**

Quod si caput simul lætum fuerit, & metus adsit convulsionum, in his casibus loco coraliorum ʒj. vel ʒʒ. cinnabaris antimonii addi potest commodè, quæ utilissima est, si sudet confertim æger: Vel

℞. *Lapill. & r. præp.* ʒj.  
*ʒii diaphor.* ʒj.  
*Myrrh. el.* gr. xij.

M. pro 2. dosibus.

possunt etiam gr. ij. laudani opiatii addi:

D. S.

**Zertheilend Haupt-stärckendes Pulver.**

Si gravior sit malum, necesse erit, ut præscribatur decoctum vulnerarium, cui addi potest mixtura ex lapillis cancerorum cum aceto parata.

In victu æger utatur crebrius cherefolio minutim inciso in iusculis pro multiplici scopo.

Sanguis ita extravasatus suppuratur & fit empyema. Empyema verò quod attinet, sive quando pus factum est, & in cavitate quadam fluctuat & stagnat, præsertim thoracis, tribus scopis curandum venit.

1. Ante omnia evacuatio puris, sive mediata sive immediata, per convenientes vias est necessaria.
2. Dum hoc fit, simul acrimonia ejus noxia corrigenda seu temperanda.
3. Læſio partis vel à pure vel ab abscessu inducta, debitis remediis restituenda.

Cum verò præ ceteris empyemata thoracis sint frequentia, hujus curationem proponemus, ubi quæ de hoc dicuntur, de aliis simul intelligenda sunt.

Pro primo scopo eadem observanda sunt, quæ supra in casu ab alto pro sanguine grumoso dissolvendo, nempe per convenientes vias

instituenda venit puris evacuatio. Vix evacuationi puris dicata pro varietate partiū & ipsæ variant, sunt quæ vel naturales, vel artificiales: Illæ, quibus natura molitur evacuationes, & quæ subinde per varia loca inimitabili arte purulentias evacuat, ut dū v.g. pleuriticorū, vel aliàs in thorace suppuratorum purulentias, nunc per urinas, nunc per alvum, nunc frequentissimè per sputum evacuat, imò per purulentam in toto corpore scabiem (quo de videb. *Miscellan. A. N. C. Ann. 2. Observat. 146. pag. 230.*) solvi observatum fuit. Sanè pus empyici per urinam excretum cum dolore quasi nephritico & stranguria refert Horſtius lib. 3. *Observat. 10. simile videb. apud Panarolum, item Borellum Cent. 1. Obs. 17. & Rhodium Cent. 2. Obs. 13. & 15. Schenckium obs. pag. 24. & 252.* Facit huc, quod refert Hildanus *Centur. 3. Histor. 39.* ulcus diuturnum in brachio ex ictu sclopeti, quod, quia per urinam pus excernebatur, ulcus siccabatur, tum patiens rursus urinas laudabiles nullo pure permistas reddebat. Per quas vias materia empyematis in pectore v.g. deferatur ad urinam, aut alvum, aut etiam ad os pro exspuitione, plures Autores litigant: Conf. Sennerius lib. 2. *Prax. ubi de Pleuritide, Quæst. 3. Willis Pharm. Rational. Part. p. 180. & 201. Miscellan. A. N. C. Ann. 3. Obs. 213. pag. 393. & Ann. 6. Obs. 41. pag. 75.* His in casibus, si molitur aliquid natura, semper minister ejus est Medicus, dum, quò illam vergere videt, eò simul motum illius promoveat, v.g. quando in pleuritide suppurata redditur urina purulenta, dentur diuretica; si verò in empyemate pectoris diarrhœa purulenta appareat, alvum stimulantia & laxantia; si natura inclinet ad os mediante tussi, propinentur vomitoria vel blandè temperata, expectorantia vulgò dicta; si verò rupto abscessu & collecto jam empyemate pectoris naturam nil moliri observat, pro copia puris, dum vires adhuc constant, evacuanda similiter vomitus convenit, cujus insignes utilitates pluribus Piso de colluvie serosa declarat, quippe qui mirabiliter contenta & pectoris purulenta evacuat, ita ut unicus vomitus plus excernat, quam septem diebus tussi rejicitur, modò absit periculum sputi sanguinis, in quo casu Medicus horreat vomitoria; contra si illud absit, tutò suadeat vomitum. Quod si tamen, sub metu licet sputi cruenti, natura inclinet evacuare per os, substituat Medicus fauces lubricantia & expectorantia; hinc sputum imprimis promovendum, ut hujus medio, ceu per proximas vias, modumque magis ordinarium puris fiat evacuatio. Pro quibus scopis convenit secretum Freitagii ad asthma, item nicotiana.



In sputo hoc promovendo habenda simul ratio qualitatū materiæ purulentæ evacuan-  
dæ; quæ quò acrior fuerit, ac tenuior, eò ma-  
gis temperantia simul usurpanda sunt; quod si  
verò non acre, sed crassius sit pus evacuan-  
dum, incidentia & abstergentia magis in usum  
vocanda. In specie mel & ex eo paratum hy-  
dromel seu aqua mulsa, oxymel squilliticum,  
&c. inter expectorantia primatum ducunt;  
in qua mulsa hyssopus, scabiosa, parietaria,  
helenium, iris Florentina, marrubium, liqui-  
ritia, jujubæ, passulæ, &c. pro indicantium  
varietate simul incoqui & propinari possunt;  
sicut etiam decoctum ex scordio & scabiosa  
tota, cum oxymelle squillitico edulcoratum,  
& calidè haustum, egregiè convenit: Vel fiat  
mixture expectorans:

℞. ▽ hyssop. ʒiij.

asthmat. ʒiij.

Oxym. squillis. ʒvj.

syr. Nicotian. ʒß.

emetic. ʒß.

M. D. S.

Abblösende Mixture  
Vösselweise.

Artificiales viæ pro evacuando pure sunt para-  
centesis, quæ ubi priores illæ naturales vel  
non suffecerint, vel non suffecturas suspicio  
est, in tempore institui potest. Vid. Sylvius  
Prax. c. 20. §. 18. In tempore dico, ut quando  
natura empyema non expurgat per urinam,  
statim instituenda paracentesis, ne pus in sani-  
em convertatur, nec vires frangantur, aut  
pulmo à sanie corrumpatur. Fonticuli etiam  
à quibusdam intra costas inuruntur. Volca-  
merus in M. A. N. C. Ann. 9. & 10. Obs. 19. in  
schol. mentionem facit emplastri Norimber-  
genſis Ehrnſingeri seu potius Galeni, cujus in  
educendo pure in abdominis cavitate conten-  
to vires insignes expertus est, adjunctis intus  
potionibus traumaticis.

Pro secundo vero scopo, quæ acrimoniam  
puris & ejus noxam corrigunt, h. e. ut aliàs  
dicunt, ulcus abstergunt & mundificant, opti-  
ma sunt sulphurea remedia, pinguedine suâ  
quodcunque acre, in specie pus falsum, tem-  
perantia, & balsamica quasi sua vi læsionem  
partium à pure oriundam corrigentia ac præ-  
caventia, & ulteriorem progressum aposte-  
matis & puris inhibentia; & sane sulphurea  
optima sunt in omnibus empyematum puru-  
lentiis temperandis. Talia sunt sulphur & an-  
timonialia fixa, ut flores sulphuris, antimo-  
nium diaphoreticum, antihecticum Poterii,  
bezoardica mineralia, myrrha, pulvis pectora-  
lis Lindani cum antimonio diaphoretico, bal-  
samus Peruvianus, balsamus sulphuris.

Ea verò, quæ læsionem partis post abscef-  
sum suppuratum & empyema restitunt, &  
eam quasi consolidant, sunt vulneraria: quæ  
inter eminet hedera terrestris, imprimis in  
empyemate pectoris, post pleuropnevmo-

niam suppuratam orto: scabiosa & chærefoli-  
um; quod trifolium simplicium, ut ita dicam,  
in viscerum læsionibus ex empyemate contra-  
ctis multum valet; item lignorum & radicum  
sudoriferarum decocta, in specie ligni fassa-  
fras, radicis Chinæ & ligni Guajaci, partim  
purulentias corrigunt, partim labem partibus  
inductam emendant: vid. Arcæus cap. de Ca-  
pitis Vulner. & Sylvius Prax. lib. 1. cap. 24. §.  
22. pag. 196.

Cæterum dum hi tres scopi intenduntur,  
observandum, ut semper simul habeatur ratio  
(1.) puris, ut hoc vel prius vel simul evacuetur,  
adeoque cum vulnerariis pus promoventia  
adhibenda erunt; (2.) adjunctæ febris, ne hæc  
plus minus intentia magis intendatur; nam  
semper conjuncta est febris lenta, plus minus  
ad hecticam inclinans. Hinc præmissâ puris  
evacuatione quacunque,

℞. ▴ Hyssop.

scabios. ana ʒjß.

fl. Dis ʒß.

℥ diaphor. ʒj.

Bezoard. Fial. ʒß.

Syr. de Nicotian. vel Hyssop. ʒj.

M. f. Potio.

D. S.

Reinigende Mixture  
Vösselweise.

Usurpatur vel pro duabus dosibus, vel cochle-  
atim ad corrigendam partim purulentiam  
in empyemate, partim noxam à pure indu-  
ctam partibus: cui, si intensior fuerit febris, si-  
mul nonnihil spiritus nitri dulcis addi poterit.

Vel

℞. ▽ papav. errat. ʒiij.

✕ vini ʒiij. ʒß. ad ʒvj.

lapill. ʒ prap. ʒj.

℥ ii diaphor. ʒß.

syr. fl. papav. errat. ʒvj. M.

℞. Amygd. dulc. ambros. ʒiij.

sem. melon.

papav. alb. ā ʒjß.

℞. f. q. ▽ papav. errat. F. Emulsio.

cui adde

maxill. lucii pisc. ʒß.

℥ ij diaphor. vel antihect. Pot. ʒj.

Edulcoretur c. paucis saccharo:

D. S.

Reinigende Stärck-Milch.

Capiatur læpius, & quando placuerit, im-  
mis in æstu,

℞. Conf. rosar. r. ʒij.

elect. diascord. Frac. ʒij.

Conf. alcherm. ʒj.

Corall. r. prap. ʒij.

antihect. Poter. ʒß.

syr. borrag. l flor. tunica, vel rosar r.

q. l.

M. f. Electuarium.

De quo usurpetur ter in die, manè, à meridie, &  
vesperi, quantitas castaneæ vel nucis juglandis.

Nec

Nec inelegans est liquor betulæ recens collectus sæpius in die, etiam in ipsa febre; haustus, tam solus, quam cum potu ordinario mistus; vel in mensura una potus ordinarii dissolvantur ℥ij. vel ℥iij. gelatinæ C. C. vel rasuræ ossium bovinorum, &c. Egregiè profunt, ubi juncta est æstuatio corporis & defectus vium.

Decoctum cherefolii, item hederæ terrestris, certè egregium est, & præ ceteris vulnerariis excellit; præmissa puris evacuatione, in empyemate quocunque curando, omnibus cæteris præferendum; aut ex hoc succo paratus syrupus; item essentia, quæ aliis addita; aut cum antimonio diaphoretico assumpta, sunt nobilissima; aut denique, si ejus succus semper cum decocto guajaci permisceatur.

℞. Succ. Hed. terr. ℥iv.

Præssii ℥ij.

c. f. q. Sacchari f. Syrupus  
addendo

Thuris,

Myrrh. el. ana ℥j.

M. D. S.

Heilender Saft.

Uti etiam decoctum radicis chinæ, propinando cum omni ejus haustu ℥ß. ad ℥j. antimonii diaphoretici; hoc enim mirabiliter supurationes quascunque abstergit & corrigit; sanguinem grumosum & empyema, imprimis pectoris, tollit, & cum radice chinæ vel ligno guajaci aut sassafras simul coquenda sunt hederæ terrestris, marrubium, tussilago, consolida major, capillus Veneris, hyssopus, & similes, præsertim si viscosi aliquid adest, & similes aliæ plantæ pectorales. Non opus est multa addere; simplex sufficiat decoctum, cum quo propinetur antimonium diaphoreticum, aliaque sulphurea. sumendo decocti bonum haustum, quotidie bis, mane & vespere. Arceus loco alleg. egregium modum docet curandi empyemata & vomitæ pulmonum beneficio decocti ligni guajaci. Nec incommodè ligna santala hæc recipiuntur: c. g.

℞. Ras. lign. guajac. ℥j.

Sassafras ℥ß.

Macera per 2. horas in ∇ comm. lbvj.

Coq. ad consumpt. lbß.

adde

HB. Heder. terr.

com. fl. hyperic.

HB. Veronic. ana M. j. ad M. ij.

rad. liquirit. ℥ß.

sem. fenicul. ℥vj.

passul. min. conquass. ℥iij.

Coq. ad remanent. lbvj.

Colatura D. S.

Reinigender Brust-Trank.

De quo decocto æger ad minimum ter in die, capiat, subjungendo & alia remedia, ut myrrham, elixir propietatis.

Sulphur pariter ejusque flores, item balsamus sulphuris, tam terebinthinatus, vel juniperinus, vel succinatus, sive fiat ex sulphure communi, sive ex sulphure aurato antimoniali ex Polemanno, quod nobilissimum; cui non incommodè potest substitui balsamus Peruvianus, de Capaibe, item tinctura sulphuris, &c. Egregia sunt ad quancunque suppurationem & internarum partium ac viscerum corruptionem curandam, propinentur ad aliquot guttas in vehiculo decocti hederæ terrestris, mundificant ulcera, & ulteriorem corruptionis progressum præcavere. Sed hæc sunt volatilia acris & nimis calida, unde ratione febrium minus conveniunt, si autem volatilia usurpanda, & igneus eorum, imprimis balsami sulphuris, calor pertimescat; convenienter miscentur cum saccharo Saturni vel antihectico Poterii, quæ dictis in casibus etiam sunt egregia, & inhibent noxam alias metutendam; vel fiat decoctum brassicæ capitatæ rubræ, vulgaris quidem, sed nobilis plantæ, cum tantillo sacchari temperatum, promovendo simul materiæ purulentæ effluxum per urinam; in quo usurpetur antihecticum Poterii, vel flores sulphuris & similia. Lac quoque caprillum cum saccharo rolato usurpatum pro ultimo hoc scopo est egregium; vid. Misc. A. N. C. Ann. t. obs. 19. pag. 78. Confertur cum his Willis. Pharm. Rational. P. 2. ubi de Phthisi & Empyem. Terebinthina denique & quæcunque ex ea parata, imprimis emulsio terebinthinata cum vitello ovi, melle, succo citri & aqua fragorum vel vino, suam etiam hæc laudem merentur.

### CAPUT III.

#### De Sanguinis extra Vasa Motu.

#### ARTICULUS I.

De

#### Hæmorrhagia in genere.

TAndem etiam viciatur sanguinis motus, quando hic ex suis vasibus & receptaculis penitus extra corpus effunditur; idque in hæmorrhagiis, quæ vox, dū derivatur ab *αἷμα*, sanguis, & *ῥεω* fluo, generaliter quancunque sanguinis effusionem præternaturalem extra corpus innuit, ut ut ratione loci, per quem fluit; & ratione modi, quod effluit, distinctas habeat rationes, ac in specie postmodum varias sortiatur appellationes: ex naribus enim hæmorrhagia narium; ex pectore hæmoptysis; & per vomitum vomitus cruentus; ex alvo fluxus alvi cruentus; ex vasibus ani fluxus hæmorrhoidum; ex vesica mictus cruentus; & ex vasibus uteri menses, hæmorrhagia uteri, & lochia nimia; &c. dicitur, utpote ex unius generis causis dependentes.

CAU.

## CAUSÆ.

Causæ hæmorrhagiæ cujuscunque in genere sunt; vel (1.) ipsorum extimorum osculorum in venis & arteriis apertio quasi spontanea & hiscentia, & dicitur aliàs communiter anastomosis; vel (2.) est ipsorum vasorum violenta læsio & soluta unitas, sive hæc fiat à causa externa per instrumenta acuta, quæ pungendo, incidendo, contundendo vel quovis alio vulnerandi modo lædant, sive fiat à causa interna per humores acidos & acres extremitates osculorum vasorum erodentes, aut ipsas tunicas vasorum tenuiores penitus perforantes, quæ posterior species vocatur diæresis, item *Διάβρωσις*. Quidam addunt (3.) *Διὰ τὴν δύσιν*, quæ tamen admitti nequit; siquidem intelligitur talis sanguinis tenuitas, quæ per vasorum tunicas transudare possit, quod tamen citra osculorum apertionem vel ipsarum tunicarum vulnus vix est credibile; cum scilicet non in vasis, juxta veteres, sed in substantia partiū tantum eas concipere licet: sunt enim satis densæ satisque validæ & tenaces venarum, multò magis arteriarū tunicæ, ut impossibile sit, per easdem tantillum transudare posse de ipsa massa sanguinea integra, ut ut sero transitus per easdem non denegandus sit.

Cæterum locus seu vasa, per quæ effluit in hæmorrhagia sanguis, sunt imprimis arteriolæ; nam ex venis vix & nunquam effluit, nisi his ipsis simul incisis aut erosis, ut in vulneribus; aliàs maximè arteriarum per anastomosin fit apertio. Sanguinem autem, qui sponte effluit, stillare ex arteriis, pater ex eo, quod omnes hæmorrhagiæ, v. g. narium, fiant stillarim guttatimque & subinde notabile spatium temporis inter unam vel alteram guttam cadentem observetur; id quod liquidissimè patet venire ex arteriis nunc dilatatis, nunc subsidentibus. Nam dum cor sanguinem per arterias impellit, eo ipso etiam idem per arterias apertas expellitur, subsidente verò arteriâ in systole, sanguis non amplius adeo confertim effluit, & ita successivè sanguis stillatim erumpit: Id quod simili modo etiam patet in arteriotomiis seu erroneis sive studiosè administratis, in quibus etiam subsultim tantum & repetitis vicibus pro pulsus ratione sanguis erumpit: ex venis verò unò ductu effluit. Ut proin probabile sit, nisi promiscuè vasa aperiantur in hæmorrhagiis, arterias solum sanguinem stillare.

Quoad causas hæmorrhagarum remotas, anastomosis seu osculorum vasorum apertio fit vel vitio sanguinis, vel vitio vasorum, vel utriusque. Vitio sanguinis fit propter eundem vel abundantem, vel turgescens, vel ferescentem seu aquescentem; vitio vasorum verò propter hæc inæqualiter stricta aut laxa.

Adeoque anastomosis vasorum est quadruplex: 1. Nimia sanguinis abundantia seu plethora vera aut absoluta, eaque rarior; unde annuæ sanguinis missiones plethoricis solennes neglectæ frequentius hæmorrhagias excitare solent: unde e. g. suppressionibus mensium superveniunt hæmorrhagiæ narium, spiritum cruentum, & quidem sine damno ac cum euphoria.

2. Est plethora respectiva seu apparens, eaque frequentior, propter nimiam sanguinis turgescens, vel auctam fermentationem in vasis, dum sanguis vehementiori motu intestino, aut majori vel minori motu & exercitio corporis, vel potu generoso, vel alimentis aromaticis, magis incalescit & turgescit, aut etiam, quando effervescentiâ febrili nimis ebullit; sic enim sanguis turgescens mole quasi auctus ordinariis vasis & receptaculis contineri amplius nequit, quin per orificia vasorum capillarium distenta erumpat: quod fit frequenter in principio & incremento febrium continuarum, tam benignarum quam malignarum, item variolarum ac morbillorum, in quibus spumescens sanguis & extraordinariè ebulliens orificia vasorum aperit & erumpit, quod in specie contingit melius & facilius, si accedat suppressa quædam sanguinis evacuatio ordinaria, quod testatur fluor ille mensium nimis ab ira, terrore, &c. de quo vid. *Lossius lib. 4. Obs. 6.* simul tamen in his & ad statum vasorum a sanguine pertranscunte plurius irritatorum, hinc ad sanguinis motus variationem, respectus habendus: hinc & obesi frequenter hæmorrhagiæ narium sunt obnoxii, propter vasa compressa ab habitu corporis pingui, quia vasa non possunt cedere, unde patet apertio: item vini potiores, exercitiis nimis dediti, ad hæmorrhagias frequentius inclinant, quod illa hæmorrhagia narium testatur, quam à musti & vini Hispanici ingurgitatione *Forestus lib. 1. Obs. 12.* observavit.

3. Est sanguinis nimia tenuitas & fluxilitas, ob abundantiam maximam seri ejusque nimiam aquositatem; unde fit, ut in tali constitutione & fibrarum & membranarum tonus laxetur, & ipse etiam sanguis sua tenuitate faciliè orificia venarum permeet, eademque ita aperiat. Unde hisce ambobus concurrentibus, dum nempe à nimio sero fibræ flaccidæ sunt, & ita tonus à sanguinis fluxilitate læsus, consequenter sanguis tunc effluens minus tinctus & minus in debita consistencia conspicitur, quin potius liquidus & loturæ carniū similis; sicuti contra in prioribus duobus casibus, quando nempe nimia sanguinis copia hæmorrhagiam infert, ipse sanguis crassus turgescens, floridus & copiosus solet effundi, idque cum impetu, cum ta-

men



men aliàs sanguis tenuis existens pedetentim effluat, & quasi per vasorum orificia hiantia sudet; ut plurimum tamen & hic acrimonia sanguinis plus minus falsa, aut acido falsa, adeoque occultè rosiva accedere solet. Vulgò vitio hepatis hæmorrhagia hæc, in qua serosa effunduntur, contingere dicitur, unde ex defectu hujus sanguificationis sanguis serosus generetur, qui inferat talem hæmorrhagiam: Sed fallum est; sicut enim error alter alterum trudit, ita & cucurbitulæ & epithemata regioni hepatis applicanda malè suadentur. Revera autem vitium hoc in casu hæret in primis viis, & læsa inde digestionem prima, ejusque deficiente perfectione in duodeno, & inde nata vel serositate vel acrimonia sanguinis, ac in specie si alimenta nimis colliquescant. Dissolutivè simul concurrunt nimius potus, urinæ deficiens excretio, aut sudoris paucitas & consueti suppressio.

4. Vitio denique vasorum anastomosis oritur, quando per hæc æquabilis sanguinis circulus per arterias venas interruptitur, ita ut æqualis vel per arterias distributio, vel ex arteriis in venas transvasatio impediatur, idque ferè ob spasmum fibrarum nervosarum, tam (1.) ipsorum vasorum sanguifluorum, quàm (2.) partium, vasa recipientium. Adeoque si ex priori modo contingat, ut in uno alterove surculo cujusdam arteriæ fiat constrictio, & quasi per eundem liberior sanguinis motus impeditus, unde surculus vicinus majori sanguinis mole distentus, necessario in extremitate aperitur, & facta ita anastomosi sanguis effunditur. Spleneticis hoc videtur familiare, quibus interdum superveniunt sanguinis vomitus, ita tamen, ut percipiant prius fortes pulsationes circa splenem, locaque vicina, quæ pulsationes innuunt motum sanguinis non nihil impeditum per arteriolas in splene; unde si sunt turgidæ, ramuli arteriosi vi aperiuntur in stomachum, & ita vomitum sanguinis inferunt. Hinc quando cum insigni capitis pulsu fit hæmorrhagia narium, signum est impediti sanguinis per vasa vicina; unde vasa narium aperit, & hæmorrhagiam infert. Quod si posteriori modo accadat, ut fibræ nervæ partium recipientium quacunque ex causa irritatæ se fortius stringant, & ita sanguiflua vasa plus minus coarctent, ex impetu sanguinis per arterias ejus influxus adhuc continget, sed non refluxus, qui plus minus impeditus per venarum magis flaccidarum aut molliorum ora constricta, per vicina loca, qua data porta, ruit, arteriolarum anastomosis facit, sicque hæmorrhagiam infert. Sic nempe nimia narium irritatio ab euphorbio, &c. hæmorrhagias sæpe gravissimas inducit; vid. Kerkringius *Spicilleg. obs.* § 1. pag. 100.

Tom. II.

Pertinent ad anastomoses has scorbuticorum hæmorrhagiæ insignes admodum, & crebrius ingruentes, per quæcunque loca fiant; partim ob sanguinis crasin plus minus vitiatam, & ad diathesin acidam plus minus declinantem, imprimis sanguis tenuis simul est falsus acris, adeoque faciliori apertioni occasionem præbens; partim propter tonum laxatum, quo resoluta vasa eorumque fibræ debilitantur, & admodum flaccescunt, unde vasorum ostiis minus constrictis hæc hiscunt; hinc fit, ut hypochondriaci, scorbutici & cachectici variis & stupendis hæmorrhagiis non raro sint obnoxii, ita ut sanguis non unciatim, sed libratim, effluat: vid. Meara *in diatrib. contra pyrotolog. Willisii*, Lovveri *Resp. contra Mearam*, & M. A. N. C. *Ann.* 2. *Observat.* 48. & *Anno* 3. *Obs.* 22. 24. & 243, it. *ann.* 6. & 7. *Obs.* 90. pag. 130; quia ob tonum fibrarum partium viciatum & resolutum paralyticis affectibus obnoxii sunt, quo resoluta fibrarum tono è vasis sanguis effluit, isque serosus, cumque acrior sit scorbuticorum sanguis, hinc in hæmorrhagias recidivantes incidere solent; hinc mulieres scorbuticæ etiam nimio mensium fluxu laborant, item viri scorbutici enormes hæmorrhoidum fluxus patiuntur; partim denique quod scorbuticorum nervosum systema pathematis convulsivis obnoxium admodum sit, unde irritatum quodam in loco, à spinis salinis scorbuticis alicubi infixis mox tendi fibræ, pulsationis aut tensionis sensus, hinc hæmorrhagiæ oriri solent. Comprobat hoc notabili observatione Willisius *Pharm. Rational. Part.* 2. pag. 422. Quò etiam referendum sputum cruentum ab ulcere pedis diuturno coalescente, quale Rhodius *Cent.* 2. *Obs.* 35. annotavit.

In hætenus enim dictis anastomoseos causis tam ad sanguinem quàm vasa ut plurimum respiciendum venit, ita quidem, ut frequentissimè acidum consuetum sanguinis motum ad orgasmum præternaturalem concitans, aut idem acidum plus minus falsum vasa eorumque aut partium vicinarum fibras vellicans, considerandum veniat.

Diæresin & diabrosin inducunt omnia externa, quæ aut incisione, aut punctura, aut contusione, vasa aperiunt. Ex causis internis est quodcunque acre, imprimis acidum aut acido-falsum orificia vasculorum corrodens: quæ inter interdum lymphæ acrior nimis & acido-falsa multum habet in recessu, aut etiam ipsa crassim massæ sanguineæ acido-falsa redditur. Pertinent huc suo modo quæcunque nimis acris inspirata. Nam hæc, ut narium vasa irritare, ita & pulmonum vascula erodere valent, unde dictarum partium hæmorrhagiæ faciliè postmodum superveniunt.

(Hhh h)

Causæ

Causæ occasionales plures etiam sunt: nempe (1.) Motus corporis nimius, e.g. sternutatio, tussis, vociferatio, vomitus, & ponderum incongrua elevatio, unde v.g. menses nimii, vid. Forestus *lib. 28. Obs. 14. & 16.* (2.) Animi motus vehementiores; ut ira, gaudium, hincque menses nimii ex Loffio *supra allegato.* (3.) Acria ineptè applicata, ut hel-leborus albus in sternutatoriis, suppositoria, & etiam ita acriora, hæmorrhoides concitantia: vid. Forestus *lib. 23. obs. 4;* nec non purgantia acriora, e.g. scammonium, de quo vid. Monardes *lib. 12. Epist. 3.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: Diagnos ipsius hæmorrhagiæ per se patet, differentiæ saltem causarum observandæ sunt, pro quarum varietate varius etiam est sanguinis affluentis modus; dum sanguis, qui effluit, floridus, rubicundus, copiosus, &c. innuit factam anastomosin propter aliqualem sanguinis abundantiam & turgescientiam; observandus tamen simul cum his est causarum antecedentium impetus.

Sanguis effluens in loco cum forti regionis plus minus vicinæ pulsatione, innuit impedimentum plus minus sanguinis motum, per unum alterumve arteriolæ surculum.

Sanguis effluens tenuis, aquosus, & instar loturæ carniū, ut loquuntur, plus minus, signum est nimix sanguinis serositatis & aquositatis.

Denique humores acres excedentes ubi præcellerint, non possunt causæ latere, observatis simul ceteris concurrentibus signis, manifesto plus minus acris falsus sanguis effluens gustari solet.

In genere adhuc notandum; Sanguinis fluxum tuturum interdum prædicere hypochondriorum tensionem atque pulsationem, & difficultatem spirandi, imprimis si solennior quædam sanguinis evacuatio suppressa fuerit, aut causa quædam sanguinem exagitans præcellerit, vel symptomatis dictis combinetur; quamvis etiam sine his frequentius ille fluxus contingat.

Ex qua parte autem hæmorrhagia expectanda præter consuetudinem, quâ quidam ad narium hæmorrhagiam vel hæmorrhoidum fluxum proclives sunt, læsiones & symptomata partium, & morbi præsentis idea, v.g. variolarum, quæ narium hæmorrhagiam adjunctam sæpe habent, monstrant.

In specie hæmorrhagiam per nares imminuentem indicant dolor capitis & cervicis, pulsus arteriarum capitis & colli auctus, vertigo, oculorum rubor, aurium tinnitus, ac narium

pruritus; per asperam arteriam difficilis respiratio & tussis; hæmorrhagiam uteri imminuentem, præter tempus mensium consuetum monstrant tensio in regione hypogastrica & lumbis, eorum gravitas & æstus; hæmorrhoidum fluxum nimium innuit præter tempus consuetum pulsus in hypochondriis, lumbis & dorso, venarum ani dolor & tumor, atque tenesmus.

Pertinent huc præ cæteris hæmorrhagarum differentiæ probè dignoscendæ: Hæmorrhagia enim est vel spontanea vel non spontanea; spontaneæ sunt operæ naturæ exonerantis corpus, ut in fluxu mensium patet, aut hæmorrhoidum, aut hæmorrhagis narium periodicis, &c. Non-spontanea iterum vel critica est vel symptomatica. Critica hæmorrhagia fit in fine morbi cum euphoria ægri, quam post materiæ coctionem natura in morbo facit, ut unâ per illam curet: symptomatice sunt, quæ in principio aut incremento febrium ardentium & variolarum superveniunt, fiuntque ex orgasmo sanguinis, molientis effusionem. Unde critica non est curanda, quia est laudabilis naturæ conatus, qui potius promovenda, nisi nimia sit, & cum insigni virium prostratione fiat, juxta aphorismum Hippocratis 2. *sect. 1.* Symptomatica cautè tractanda est, nisi sit immodica, ad nâ impediatur alium naturæ conatum, relinquenda: sic e.g. si supervenerit in incremento variolarum aut petechiarum, ne retrocedant, supprimatur: similiter critica, si nimia sit, maturè compescatur. Symptomatica, cum morbus sit, aut procedat ex habitu corporis morbofo, necessariò est sistenda & præcavenda. Deinde hæmorrhagia est vel habitualis, vel accidentalis: Habitualis crebrius, & vel brevi vel nulla præcedente occasione, redit & affligit: Accidentalis verò rarò, nec nisi magnâ datâ occasione, contingit & affligit. Accidentalis est vel cum febre vel sine febre: ibi ad turgescientem & ebullientem sanguinem simul plus minus respiciendum; item, an critica magis, an symptomatica fuerit.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin in genere observandum, quod omnis hæmorrhagia sit excretio plane præternaturalis, ita quidem, ut etiam critica suo modo aliquid præternaturale sit; nulla enim, præter menses & lochia, naturalis est, vid. Forestus *lib. 6. Obs. 11. in schol.* Adeoque omnis, nisi tempestivè supprimatur, periculosa est, & aliquid mali potendit, præter illam, quæ morbis aliis, præprimis cum febre junctis, criticè supervenit, illosque solvit, aut certè notabiliter imminuit; optima enim crisis fit per hæmorrhagiam. Vid. Zacutus Lusitanus *Prax. Admir.*



Minus quoque periculi portendit hæmorrhagia plethoricis adsueta, quibusvè evacuatio solennior suppressa, aut membrum aliquod detruncatum fuit, cui sanguis destinatus, nunc verò cohibitus, plethoram facit.

Moderata & consueta & plus minus periodica hæmorrhagia, quocunque in loco fiat, si subjecti conditio respondeat, & hoc facile ferat, salubris, cum deficientem varia mala, non secus ac excedentem, insequi soleant. Moderata igitur talis non sistenda est.

Hæmorrhagiæ quæcunque à causa interna cæteris paribus & periculosiores & cautiùs tractandæ, quàm quæ ab externis.

Hæmorrhagiæ nimix quæcunque, uti ad animi deliquia, ἀσφυξίας & virium prostrationes immediatè disponunt, ita mediatè cachexias & hydropes successivè inferunt.

Periculosior est, quæ copiosior, quæ faciem citrinam, plumbeam aut fuscæ reddit, cui convulsionem superveniunt, quæ pituitosos & melancholicos, aut à quacunque causa emaciato corripit, quæ morbum, cui accedit, non sedat, quam rigor excipit, utpote qui de spiritibus exhaustis testatur: unde morbos chronicos, scilicet tabem, hydropem &c. hæmorrhagias immodicas sequi non adeò infrequens est.

In specie, ubi sanguinis fluxui supervenit extremorum refrigeratio, propinqua est syncope.

Dixæresis arteriæ & venæ insignis & plurimum, aut ejus diarrhoea, periculosissima & curatu difficilis sunt, nisi harum vulneribus remedia immediatè applicari possint.

Quæ ab anastomosi vitio sanguinis, vel absolute vel respectivè abundantis, nascitur, curatur facillimè; quæ verò vitio sanguinis screscentis, tardè & quasi medio modo se habet.

Quæ est ab acrimonia sanguinis, hujusque fluxu impedito, difficulter sedatur, potissimum si posterior casus causam pertinacior, v.g. scirrhum hepatis, agnoscat.

Quæ vitio vasorum contingit, pro ratione morbi primarii, plus minus curabilis esse solet.

Difficiliores sunt hæmorrhagiæ, quæ fiunt læsis arteriis, quàm venis; item quæ à venis majoribus, quàm quæ à minoribus ruptis, contingunt.

### C U R A.

Quod ergò attinet curam: in ea ante omnia considerandum est, an curanda sit hæmorrhagia, an verò sinenda? de quibus suprâ. Deinde in habituali distinguenda est cura in eam, quæ fit tempore paroxysmi, adeoque est curatoria, & eam, quæ est extra paroxysmum, adeoque præservatoria. Tertiò pro-

Tom. II.

bè considerandum, an ipsa hæmorrhagia sit morbus solitarius & primarius, an verò secundarius? & si hoc, an sit cum febre, an sine febre?

Consistit autem cura hæc vel in proximarum causarum remotione, vel affluxus inhibitione, vel sanguinis aversione, per venæ sectionem, cucurbitulas, hirudines, & fonticulos; vel in vasorum præter naturam apertorum fibrarumque partium constipatione atque obturatione, per interna sanguinis impetum coercentia; & externa, quæ vasorum ora adstringunt, & sanguinem profluentem incrassant. Dixæreses verò vasorum per interna, acre quodvis temperantia, & externa vasa plus minus arrosa adstringentia, consolidantia, conglutinantia, &c. sunt restituendæ. Externa ista, eorumque administrandi rationem, in sequentibus, ubi de Hæmorrhagiis in specie, pluribus explicabo. Hac vice interna cuiusvis hæmorrhagiæ speciei plus minus applicabilia consideranda veniunt. Ad eòque

(1.) sanguis nimis vasorum ora aperiens imminuendus lentè per parciorē diætā victumque tenuem; confestim verò magis per sanguinis missiones quasvis, nunc venæ sectiones, nunc scarificationes.

(2.) Idem turgescens, ut in plethorâ, vel præcipitantibus vel absorbentibus fermenta ista acida volatilia, vel acidis aut blandis aut fortioribus, volatile acidum figentibus & coercentibus, compescendus: qualia sunt v.g. acetum, tinctura florum bellidis, spiritus vitrioli, hæmorrhagias narium scorbuticas subinde figens; *Conf. M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 196. p. 176.* nitrum in aqua fontana solutum atque propinatum, vid. Riverius *Cent. 1. Obs. 48.* & Agricola *Chirurg. parv. pag. 190.* pulvis hepaticus rubens, tinctura lapidis hæmatitis, saccharum Saturni, hincque cum vitriolo Martis parata tinctura antiphthifica, corallia, unicornu fossile, terra sigillata, lapis hæmatites, usnea, camphora, & opiata. Huc etiam pertinent vegetabilia nitrosa & moderatè adstringentia seu vulneraria, nempe portulaca, plantago, sedum seu sempervivum, &c. opiata, camphorata.

(3.) Idem aquosus & nimis serosus & tenuis maturè corrigend⁹, temperand⁹, & in debitā consistentiā revocand⁹, vel exsiccantib⁹ aut imbibentib⁹, aut incrassantibus, & deinde evacuantibus serum superfluum per alvum, vel

(H h h h 2)

vel



vesicam, vel habitum corporis, & digestionem primæ prospiciendum.

(4.) In anastomosi verò vitio vasorum acidum istud, nervorum spasmos, nec non aliqualem obstructionem inducens, corrigendum per vulgò nota, Martialia in morbis convulsivis & hæmorrhagiis habitualibus pro eradicanda radice optima; de quibus alio loco dictum.

(5.) Quoad causas remotas diarrheas; si hæc fiat vitio sanguinis acrioris, succi acres falsi erodentes obtundantur per blanda temperantia, & sanguinis crasin corrigentia, ut passulata, lacticia, Martialia & similia. Si vitio vasorum erosorum, vulneraria adstringentia & incrassantia sunt convenientissima.

(6.) Laxitas denique atque porositas partium præternaturalis condensantibus atque roborantibus, quorum hæc repellentia dicere liceret, corrigitur; qualia sunt, præter alterantia dicta & mox dicenda, sterces asininum, lichenes equorum, de quibus vid. du Hamel *Tr. de affect. corpor. pag. 312.* talus suis, vid. Bartholinus *cent. 5. Hist. 97.* aqua ex typhis cervinis, pulvis sperniolæ Crollii: quibus demum accedant narcotica, v.g. semen hyoscyami, laudanum opiatum, electuarium diascordii &c. item crocus Martis cum aceto paratus, vitriolum Martis, acidulæ artificiales, & tinctura antiphthifica Michacalis.

Pro his scopis obtinendis

*Observ. 1.* Convenit interdum, ut dixi, Venæsectio, seu alia sanguinis evacuatio. Dico interdum: nam perversa chirurgorum est consuetudo, ut in omni hæmorrhagia sanguinem mittere velint. Verùm hoc stultum est, licet sanguis non abundet, & jam tum effluat, eundem velle ulterius evacuare: scilicet in quavis hæmorrhagia sanguis purè passivè se habet, movetur nempe eo, quo spirituum moventium & organorum impetu pellitur, & effluit, ubicunque vasorum ora aperta sunt, utut occasionalis causa interdum in sanguine hæreat. Non ergo sanguinem evacuando, sed causas occasionales, si ve in sanguine, si ve in parte, per quam fit effluxus, hæreant, removendo corrigendæ sunt. Unica ergò abundantia sanguinis, si ve plethora vera, & quibusdam in casibus apparens, si ve turgescencia, aut inde natus impetus ad locum, per quem effluit,

postulat venæ sectionem. Ideoque etiam in solenni evacuatione sanguinis suppressa sanguinis detractio locum habet, nec non in hæmorrhagia præternaturali periodica, paulò ante hujus invasionem; vid. Forestus *lib. 24. Obs. 9. in schol.* Hæmorrhagia verò à fluxitate aut acrimonia corrodebat sanguinis, & reliquis omnibus casibus, quæ oritur, ibi vana & insulsa est venæ sectio. Ubi verò secanda, ibi studiosè leges revulsionis, derivationis & aversionis observandæ, quas venæ sectio parciore & aliquoties reiterata, item scarificatio atque cucurbitulæ præstant. Sanguis quoque à parte affecta avertitur per intercipientia, in specie per ligaturas & cucurbitulas, tam scarificatas quam non scarificatas, partibus tamen potius remotioribus quam vicinis applicandas.

II. Purgationes ipsæ etiam sunt ridiculæ, & qua tales non conveniunt, interdum nimia abundantia laticis aquosi, nimis fluxilem aut acrem faciens sanguinem, sui excretionem urget: in tali enim casu utique purgantia blanda per inferiora conveniunt, uti rectè eadem commendat Forestus *lib. 24. obs. 12.* Fortis *cent. 1. conf. 92.* & Riverius *in Pr. lib. 4. cap. 8;* & confirmatur etiam hoc ipsum per experientiam Rondeletii, qui curavit quendam singulis diebus duas vel tres libras sanguinis rejicientem, solis syrupis serofos humores evacuantibus; leni enim copia, quod vehiculum sanguinis est, subinde fluxus hujus est causa, præsertim si acrius idem fuerit; quin & per sudores vel diuretica aquosum laticem uberiores cum salibus heterogeneis emittentia hoc commodè fieri potest. Utut enim sudor, dum actu fluit, dissolvat massam sanguineam, eamque ita fluxiliorem reddat, postmodum tamen ubi cessavit sudor, sanguis sero depauperatus non nihil crassescit, spissescit, & salibus superfluis aut heterogeneis liberatus mitior evadit aut dulcescit, & ita hæmorrhagia plus minus sufflaminatur & cessabit. In specie, ubi cum febre fuerit hæmorrhagia symptomatice, per sudoriferam non quidem volatilia, sed additis opiatum compescenda venit. *Confer. hic Willisius Pharm. Rational. Part. 2. pag. 418.*

III. Opiata generalia sunt hæmorrhagarum remedia, dum & irritationis sensum in hac vel illa parte undecunque excitatum sopiunt: & spirituum moventium impetum plus minus refrænant, adeoque quovis rapidiores sanguinis inde concitatos motus quietiores reddunt, quo ipsum catholicum *ixama*, id est, sistens, meritò habentur, internè & externè adhibenda.

Ex-

Experimenta hujus rei novissimè retulit Medicus quidam Halliacus, Michael Bernardus Valentini, in *Epist. ad D. Doct. Wittum*, Arthiatrum Spirensem, de nova matricis & morbonæ muliebris anatome, ubi fusè ostendit, quantum opiata in narium æquè ac uteri hæmorrhagia valeant. Vid. etiam Horstius in *Observ.* ubi arteria loco venæ secta ad motionem opii fuit sedata.

Ex dictis patet Remedia ad hæmorrhagias usitata esse.

(1.) Vulneraria & adstringentia, sanguinem partim inspissantia, partim vi alcalinâ acida vitiosa absorbentia, partim vasorum læsiones restituentia, ut plantago, portulaca, pilosella, bellis minor, rosæ, &c.; Vel

(2.) Absorbentia, tam Martialia, hisque cognata corallia, hæmatites, terræ, boli, &c. quàm animalia, ut cornu cervi sine igne, ebur sine igne, unicornu verum, dens hippopotami, &c. sanè Martialia plurimis scopis in curis hæmorrhagiarum satis faciunt; in specie hæmorrhagiæ ex nimia sanguinis acrimonia, item ex obstructione vasorum sanguiferorum, item hæmorrhagias habituales hypochondriacorum, scorbuticorum & splenetico- rum, quæ subindè sunt stupendæ, vomitu sanguinis splenetico sæpius recurrente (sive sit revera talis, sive non, loquor cum vulgo) optimè sistunt Martialia. Hujus rei singulare exemplum habet Lowerus *contra Mearam cap. 3. pag. 19.* ubi habet hæmorrhagiam stupendam chalybeatorum usu curatam: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 223. p. 324. & Ann. 3. Obs. 06. p. 176.* sunt præstantissima, partim quod acidum vitiosum, hæmorrhagiæ occasionalem causam, absorbeant, partim quod radicem in primis viis, unde affectus spasmodici hæmorrhagiarum superveniunt, excindant; quin etiam in sanguinis serositate tenui & falsa optimè conferunt. Vel

(3.) In hæmorrhagiis serosis serum imbibentia & incrassantia, ut usta, terrea, aut aliunde evacuantia, ut purgantia, diuretica, præsertim ex classe vulnerariorum; Vel

(4.) Sanguinem attemperantia & quasi edulcorantia, ut passulæ & passulata, quæ planè singulare sunt remedium in curandis hæmorrhagiis nimis, in specie cachexiis & scorbuticis, quatenus temperant acre quodcunque, & sanguinem dulcem & minus rosum reddunt: sic ipse novi exempla infantum, imo & adultorum, frequenter hæmorrhagiis narium obnoxiorum, solo frequenti passularum esu curatorum. Hinc quoque lac & lacticinia uti curant scorbutum, ita eorum usus hæmorrhagiam corrigit.

Ex his patent faciliè remediorum formulæ: v. g. in hæmorrhagiis ex turgescente nimis

sanguine cum impetu febrili & phlogosi vaga convenit.

℞. ▽ plantag.

semperviv. maj. ana ʒiʒ.

Syr. papav. alb. ʒj.

℞ fl. bellid. c. phlegm. Oli par. ʒiij.

— Oli q. s. ad gratam aciditatem.

M. D. S.

Blutstillende Mixtur auff etliche mahl.

In hæmorrhagiis habitualibus ex eodem sanguine turgescente ex acido volatili, v. g. in vini potatoribus, &c. adeoque in iis, qui vulgò ex sanguine bilioso & hepate nimis calido hæmorrhagias pati dicuntur.

℞. Dent. hippopot. præp. ʒiʒ.

Corall. rub. præp. ʒj.

Lap. hamat. ʒʒ.

Sacch. hni ʒij.

laud. opiat. ʒʒ.

M. f. Pulvis: S.

Dämpffend Pulver.

Capiatur subinde manè quantitas cultelli cuspidis.

℞. Extr. flor. ʒiij.

Ebor. f. Δc.

Dent. hippopot. ana ʒʒ.

Corall. r. præp. ʒj.

Hamat. præp. ʒij.

c. l. q. syr. ros. rubr. & papav. errat. f.

Electuarium.

Extractum florum paratur sequenti modo:

℞. fl. Rosar. rubr. p. ij.

Papav. errat.

Bellid. r. ana p. j.

Per multiplicem infusionem in aqua simplici hinc expressionem & inspillationem, f. l. a. Extractum.

Sic parabitur extractum succosum ad imitationem Angeli Salæ.

In hæmorrhagiis habitualibus ex sanguinis tenuitate serosa.

℞. Passul. min. conquass. aut earundem pulpa ʒʒ.

Rhabarb. el. ʒiij.

Qi Olati Tacch. ʒj.

c. l. q. Syr. Pomor. f. Electuarium.

Capiatur manè & vesperi duabus horis ante cœnam quantitate castanæ.

Ubi utile est, per sudorem occurrere tali hæmorrhagiæ:

℞. C. C. ust ʒj.

☿ sigillat. ʒʒ.

Laud. opiat. gr. iij.

M. pro 2. dosibus.

In hæmorrhagia ab acriori sanguine, à lymphâ aut erosione, omnib' ve modis concitata, sanè polychresta est mixtura Sylvii lib. i. *Prax. cap. 9. §. 20.* Ad cuius imitationem sequentes, omnes reliquas compositiones superare videntur:

(Hhhh 3)

℞. ▽

4. ▽ *Plantag.* ʒiij.  
*Cinnam.* ʒij. ad ʒiij.  
*Acet. vini* ʒiij.  
*Corall. r. prap.* ʒij.  
 ☞ *sigillat.* ʒj.  
*Laud opiat.* gr. iij.  
*Syr. Myrtin* ʒiij. M.

In hæmorrhagia symptomatice, e. g. febrium malignarum, præscribi potest sequens:

4. ▽ *Scorzoner.* ʒj.  
*Senell. C. C.* ʒj.  
*Acet. destill. vel simpl.* ʒvj. vel succ.  
*Citri* ʒj.  
*El. diascord. Frac.* ʒij. ad ʒiij.  
*ʒi diaphor.* ʒj.  
*Syr. Rubi idai* ʒj.  
 M. pro 3. dosibus.

His observatis, in genere ad hæmorrhagiam quamcunque, pluribus indicationibus, nempe adstringendo, consolidando, vasa claudendo, & sanguinem temperando satisfaciencia, imprimis sequentia, & quidem ex regno vegetabili, sunt: Portulaca, plantago, symphytum majus, & ex his paratus syrupus compositus, polygonum, millefolium, folia tenella quercus, rosæ rubræ inodoræ, semen sumach, cortices granatorum, Lysimachia, bursa pastoris, flores balaustii, sanicula, pyrola, polygonum, bellis minor, ruta, vinca pervinca, hederæ terrestris, urtica minor & radices urticæ majoris; vid. Rodericus à Castro *de Morb. Mul. lib. 1. cap. 5.* & Riverius *Pr. lib. 4. cap. 8.* symphyti majoris, tormentillæ, pimpinellæ, sanguisorbæ, millefolii, bistortæ, muscus terrestris, quercinus, &c. fructus myrtilli, acacia nostræ, gallæ, rubi, horumque simplicium decocta & syrupi, aqua & syrupus portulacæ, plantaginis, syrupus de symphyto, coralliorum, myrtillorum, de hederæ terrestri, &c. quæ omnia adstringunt, & sanguinem quodammodo incrassant; item semen portulacæ, lactucæ, urticæ; it. papaver & papaverina, semen hyoscyami, opiū, & quælibet alia hujus generis anodyna certo experimento hæmorrhagias sistunt. Pertinet huc radix acori aquatici seu pseudacori, & ex hoc paratum nectar adstringens D. Langii, ex succo nempe cum saccharo in consistentiam syrupi inspissato; & sanè egregium est remedium adstringens, & quodammodo sanguinem inspissans, indeque in quocunque tam sanguinis quam aliorum humorum fluxu commendo; in specie succus urticæ majoris recens expressus ad uncias aliquot internè assumptus quamcunque hæmorrhagiam narium, sputum sanguinis, vomitum cruentum, ab omnibus laudatum experimentum existit, in specie vid. Riverius *in Praxi*, Zacutus Lu-

sitanus, & Amatus Lusitanus, sic urticam majorem vulgarem contusam plantis pedum & volis manuum, item membro virili, applicatam maximè commendat Borellus *Cent. 1. Obs. 95.* sic fungi betulæ ramenta ad miraculum hæmorrhagiam externam sistunt, teste Crollio *Basil. Chim. pag. 308.* Tacchenio *Morb. Princ. pag. 187.* Porro muscus seu usnea cranii humani nobilis & mirabilis est in sistendis hæmorrhagiis, dosi à gr. xij. ad ʒj. vel ʒʒ. propinatur in aqua bursæ pastoris cum syrupo Coralliorum, &c. vid. Beckeri *Medicus microcosm.* & Hildanus *Epist. 27.* Lindanus refert, se comitissam, cui nullis remediis sedari potuit hæmorrhagia, restituisse per solam cranii humani usneam; unde & Hillerus *incent. 1. cura 20.* confirmat, se periculosissimam hæmorrhagiam narium ex potuvini excitatam, per ʒʒ. cranii humani, & ʒʒ. usneæ, cum aqua bursæ pastoris sedasse. Externè inditur naribus, aut ubi sanguis aliàs effluit, compescit insigniter fluxum hunc. De variis ex hoc paratis medicamentis, tum internis tum externis, vid. M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 53. pag. 100.* Loco hujus tamen solet substitui muscus prunorum sylvestrium & quercinus, qui tamen minoris est pretii. Hisce accensentur sanguis draconis: verum cum genuinus raro apud nos habeatur, caveamus ab usu ejus, & potius exhibeantur mastix, sarcocolla, thus, myrrha, aloe, gummi Arabicum, mumia, succinum, & similia sanguinem temperantia & incrassantia, passulæ supra laudatæ fuerunt, & conducunt in specie hæmorrhagiis ex vitio sanguinis acrioris, serosioris, acido-salsioris &c. Rhabbarbarum denique non tam profero evacuando, quam sanguine alterando & crassi ejus restituenda, in hæmorrhagiis & serosiore sanguine confert. Camphora non negligenda, quæ & spiritus afficit, & fermenta peregrina acida sanguinis mirificè corrigit.

Ex regno minerali reliqua remedia superat Mars, omniaque Martialia supra laudata, & subiecta reliqua Martialia: qualia sunt lapis hæmatites, tam in substantia præparatus, quam ejus tinctura; terræ Martiales, bolus ruber, item Armena, terra sigillata, terra vitrioli dulcis, &c. quæ huc suo modo pertinent, corallia, eorumque tincturæ, vitriolum Martis, & acidularum potus, &c. Ex omnibus convenit tinctura sulphuris vitrioli, quæ reverà est saltem tinctura Martis adstringens, ad omnes & quascunque sanguinis hæmorrhagias expertissima.

Facit huc quoque extractum Martis adstringens Hartmanni, quod habet *in Praxi chymiatr. cap. 50. de Hamorrhag. narium*, estque com-



compositum corpus ex terra & Marte; confert tam externè quàm internè in manibus dentum. Est experimentum Lindani, cui instar omnium remediorum est; utpote quo puerum desperata hæmorrhagia narium laborantem curavit. Datur ad gr. v. vel jx, cum conserva quadam adstringente in forma boli. Item saccharum Saturni & ipsum hæmorrhagias compescit. Similiter facit huc hæmatites artificialis ex vitriolo Martis & saccharo Saturni. Modum habet Glauberus in P. 3. *Teutschlandes Wohlfarth*. Item loco acidularum liquor Martis solaris ad hæmorrhagias chronicas aut sæpius recurrentes conducit, præternaturales nimios fluxus sanguinis sistendo, & contra naturales aut deficientes aut inordinatos restituendo; item pulvis hæmatitis cum aceto aut succo granatorum acidorum propinatus, item liquor stypticus ex terra sigillata cum spiritu vitrioli vel nitri paratus, item tinctura antiphthifica ex saccharo Saturni & vitriolo Martis parata, egregiè convenit in quacunque hæmorrhagia. Quibus essentia & extracta Martialis quæcunque commodè annumerari possunt. Spiritus vitrioli coagulando blandè sanguinem, hæmorrhagiam sistit, in specie quæ ex turgescencia aut nimia ebullitione sanguinis oritur. In quo casu etiam nitrum depuratum, & omnia nitrata, interno & externo usu, in specie interno, cum fructu usurpari possunt, etiam si hæmorrhagiæ per iracundiam excitatæ fuerint, & à Felice Wurzio tanquam speciale arcanum contra hæmorrhagias commendatur. Pertinet huc pulvis sympatheticus ex vitriolo Veneris benè depurato, & radiis solaribus, sole in leone versante, exposito & calcinato paratus, pro usu externo qui sanguini effluenti sive ex utero sive è naribus, sive pectore inspersus, aut saltem, si linteam sanguine isto adhuc madidum eo saltem adspargatur, aut linteam cruore effuso ebrium solutioni dicti pulveris immergatur & applicetur, certo & mirabili experimento ad hæmorrhagias quascunque sistendas maximè proficius est, quæ ita sympatheticè curantur: vid. Digby in *Orat. eleg. de pulv. Sympathetico*.

Ex animali regno conveniunt in genere animalium partes duræ, in specie ebur sine igne, unicornu verum, dens hippopotami, cornu cervi ustum, &c. absorbentia vitiosa acida, & incrassantia sanguinem; item remedia ex ranis, spermaranarum, cujus aqua destillata internè hausta, & externè convenit, quod solitario cum paucis aceto rosato applicatum, singularem vim obtinet hæmorrhagias compescendi; unde etiam ex hoc paratus pulvis spermiolæ Crollii est admodum commendatus dosi ʒß. ad gr. xv. vid. Schroederus. Permiscetur cum aliis in quacunque forma;

℞. *Lap. hamat. pulveris* ʒß.

*Spermiol. Croll.* gr. xv.

*Laud. opiat.* gr. iij.

M. f. Pulvis;

divid. in 2. part. æquales.

Nam papaverina & opiata quævis semper remediis contra hæmorrhagias nimias addenda sunt, imprimis si dolor adjunctus sit. Vehiculum horum pulverum potest esse:

℞. *Portulac.*

*Semperviv. maj.* ana ʒj.

*Syr. Plantag. vel portulac.* q. s.

M. S.

## Wasser zum Pulver.

Porro excrementa quorundam animalium singularem vim habent ad hæmorrhagiam sistendam. Cetera omnia antecellit stercus asininum, suillum, & stercus canis ossa rodentis, externo pariter & interno usu. Sanè, præter pulverem ex his paratum, ex stercoribus suillo & asinino exprimitur succus, qui ab ʒß. ad ʒi. vel ʒiß. in convenienti vehiculo propinatus est efficacissimus, aut ex horum succo cum saccharo fiat syrupus ad hæmorrhagias, qui vid. in Prævotio, & in Joelis *Praxi*. Item permiscetur hi succi stercorum cum succo urticæ, & ita internè propinantur. Conf. Rodericus à Castro de *Morb. Mul. lib. 1. cap. 5. pag. 48.* & Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Histor. cap. 2. num. 4.*

℞. *Succ. sterc. asinin. rec.*

*Syr. myrtillor.*

*Portulac.* ana ʒß.

*Plantag.* ad ʒjß.

M. pro Haustu.

D. S.

## Blut-stillend Träncklein aliff etumal.

Stercus canis verò pulverisatum in substantia convenienter admodum propinatur, loco quorum quidam pro secreto commendant ipsam sanguinem proprium per quæcunque loca excretum, arefactum, & à ʒß. ad ʒj. ipsi ægro in liquore appropriato propinatum, item externè, si fieri potest, loco hæmorrhagiæ, applicatum istam mirificè sistere dicunt: vid. Schmuck in *Curat. Magic. Magnetis*.

Superest adhuc bufo, mense Julio aut sole in leone existente captus, per caput transfusus, & ita enecatus, atque siccat, & in syndone rubro appensus, quamcunque hæmorrhagiam ex nimio spirituum fervore & impetuoso motu concitatam, ob pavoris ideam ex hominis præsentia contractam, feliciter sistit; vel etiam si tantum sub axillis lateris istius, quo sanguis fluit, applicetur, ut probè incallescât; vel etiã, si tantummodo bufo exsiccatus in

manu

manu detineatur, donec incalescat. Speciatim convenit ita bufo in hæmorrhagiis narium symptomaticis in principio febrium malignarum, in specie variolarum admodum periculosis: Juxta bufones & ranæ, in specie virides, exsiccatæ & omnia ex ranis, earumque pulvis in vino rubro propinatus mirificè hæmorrhagias sistit, quæ vivæ contusæ, earumque sperma, pariter applicari possunt ad quamcunque, tam virilem quam muliebrem, hæmorrhagiam compescendam.

Unum adhuc de partium, præprimis internarum, hæmorrhagiis curandis notetur, ut his sedatis medicamenta grumos sanguinis dissolventia propinentur atque applicentur, in principio tamen moderata, v.g. sperma ceti, marga saxorum, lapilli cancrorum, terra Hybernica, &c. adstringentibus, v.g. pulvere sperniolæ & Agricolæ modò commendato, temperanda. Progressu temporis & potentiora sola & cum sudoris aliqualis provocatione exhibenda, qualia præter diaphoretica sunt radix polygonati, caryophyllatæ, rubiæ tinctorum, cherefolium, sabina, verbascum, geranium Robertianum cum vino decoctum; terebinthina, fuligo, sanguis hirco, &c. Nisi enim talia applicentur, metuendum, ne grumi putrescentes acrimoniam contrahant, hincque erodendo novam hæmorrhagiam, aut ulcus, aut simile quid corpori detrimento-sum, parent.

In hæmorrhagia à cantharidibus convenit lac, decoctum nucum pineæ cum visco quercino, passulæ, ichthyocolla, gummi Arabicum & tragacantha: vid. *Joel Prax. lib. 3. pag. 280.*; quæ omnia acrimoniam hanc vel illam corrigunt.

## ARTICULUS II.

De

### *Hæmorrhagia Narium.*

**I**n hæmorrhagia narium subinde copiosissimi sanguis per plures poros ex naribus effluit, quem tunc ex sinu cerebri falciformi aut ejus vasis apertis ad nares pervenire multi asserunt, quod tamen falsum, sicuti sufficienter hoc dogma rejicit Schneiderus *Tr. de Offecribri-form. pag. 411. & seqq.* Quin potius vasa, ex quibus in hæmorrhagia narium effluit, sunt propagines rami arterialis à carotide interna, qui juxta processus mammillares plures inter surculos quosdam per foramina ossis cribrosi transmittit ad membranam narium superiorem glandulosam, per quæ vasa lymphæ simul affertur materia, per glandulosam istam texturam excernenda, ita ut ex orificiis istis apertis, & propter continuam à lymphâ humectationem naturaliter laxioribus narium hæmorrhagiæ accendant: Conf. Willisus *Pharm. Rational. Part. 2. pag. 40.*

### CAUSÆ.

Præter causas internas cum aliis hæmorrhagiis communes, externas inter motus animi vehementiores, ut ira, gaudium, &c. hæmorrhagiam hanc interdum excitant: quod pertinet etiam illa hæmorrhagia narium, quam cuidam ex vitulino boatu, & carnis vitulinæ conspectu contigisse Rhodius *Centur. 1. Obs. 89.* refert; item pulveres sternutatorum fortiores inspirati aut alia quævis inspirata acriora ineptè applicata. Hujus exemplum habet Kerkringius in *Spicil. Obs. 51.* ubi lethalem observat hæmorrhagiam narium ex helleboro albo in sternutatorio natam.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica: Imminentem eam ostendit motus sanguinis sursum versus, cujus indicia sunt dolor capitis & colli tensus, temporum verò dolor gravis plus minus pulsans, oculorum caligo vel splendor, lacrymæ copiosæ involuntariæ, rubor malarum, oculorum pruritus, tinnitus aurium, titillatio narium, &c. quin & interdum aliqualis manuum tremor accedit.

Imò & pulsus in carpo durus & quasi vibrans, arteriarum colli & capitis auctus, hæmorrhagarum recurrentium, & quidem vitio vasorum, signum esse solet.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin; ea instituenda est, tam de imminente, quam præsentem.

Hæmorrhagia narium, quæ fit in morbis acutis, & quidem præprimis in statu, funesta est. Si fiat confertim cum euphoria ægri, est salutaris: stillicidium verò sanguinis & stillarum facta ex naribus eruptio & fluxus in morbo acuto, præsertim maligno & die quarto, malum signum est, nisi forsan causa externa vel excitaverit, vel ejusdem incipientem fluxum inspissando vel retinendo impediverit.

Notabile est, quod Hippocrates jam olim monuit in affectibus hepatis & lienis, dum dicit: fluxus sanguinis è naribus non è directo factus (i.e. qui in nare diversa est, h. e. in dextra, si lien laborat, & è sinistra, si hepar) malum; nam tales hæmorrhagiæ, si debent esse proficua, κατ' ἴσιν. e. rectitudinem fieri debent.

Quibus in febribus ardentibus aures obsiderunt, hos, non soluta febre, delirare necesse est: solvit autem inter alia & sanguinis è naribus eruptio.

Interdum in morbis acutis ægri contrectant nares, quod pessimum signum est: innuit enim naturam moliri aliquam hæmorrhagiam, quæ tamen propter imbecillitatem & imminutum sanguinis circulum non procedit.

In febribus Hungaricis aliisque malignis ægros sanat critica hæmorrhagia, quam imminuentem indicat surditas in statu venient.

Si in



Si in principio variolarum larga narium hæmorrhagia advenerit, & spontè cesset, bonum est, & facillè evadent ægri.

Eruptiones sanguinis è naribus sæpiùs sunt admodum copiosæ, aliquot librarum pondus accedentes, adeò ut etiam ad libras quatuor sanguis effluerit, hoc tamen citra ægri virium lapsum. Item observatum fuit, ad libras octo vel decem excretum fuisse sanguinem non citra periculum, utut absque vitæ iactura.

Aliàs nimis copiosa hæmorrhagia narium si affligat, eadem prognosis facienda, quam in genere de hæmorrhagia nimia indicavi. Tam largiores enim sanguinis evacuationes, quàm ejusdem plus minus aut etiam planè non consuevit, saltem intempestivæ, suppressiones morbos excitant; hæ quidem pathemata cerebri & nervosi generis epileptica, soporosa, &c. illæ, absumendo spiritus vitales, syncopes, cachexias, singultum & convulsionem.

## C U R A.

In cura hæmorrhagiæ narium imprimis attendenda est causa proxima, an sit nimirum effectus anastomoseos, quæ frequentior; an vero erosione vasorum seu disreseos? interna sunt eadem, quæ de hæmorrhagia in genere dixi; saltem in hæmorrhagia narium ex nimia turgescencia & fervore sanguinis conveniunt blanda acida, sanguinem, & hujus impetum ad nares, quantum possibile, cohibentia, & quodammodo coagulantia; qualia sunt spiritus acidi ex mineralibus, essentia Martis adstringens, tinctura sulphuris vitrioli, liquor stypticus, syrupus factus ex succo stercoris asinini, mistus cum syrupo myrtillorum; item opium & opiata.

Si verò narium hæmorrhagia sæpè recurrat ex nimia tenuitate serosa, conveniunt passulata crebrò usurpata, in specie sub forma electuarii.

In hæmorrhagia narium habituali experimentum est herba menthæ recens cum pane & butyro comesta, vel ejus succus frequentius assumptus.

Præter hæcenus enarrata interna, eaque respectu causarum varia, in paroxysmo per externa sanguinis impetus ad nares, quantum possibile, avocandus, vel spirituum impetum sopiendo, vel sanguinis *εργασμὸς* aut turgescenciam refrænando, & deinde orificia vasorum aperta occludendo.

Quoad priorem scopum; ligaturæ extremorum dolorificæ, sanguinis missio in brachio, pro scopo aversionis, vel in pede pro scopo revulsionis, frigidorum & adstringentium nuchæ, fronti, item scroto, manibus, mammis, interdum & hepatis applicationes; item terror inspersione  $\nabla$  frigidæ in faciem & nucham, aut quovis modò inductus, vid.

Tom. II.

Rolsinccius *Ord. & Meth. Comment. l. 14. sect. 3. cap. 12.* dolores graviores circa remotiora loca excitati, aut lipothymia inducæ, spirituum & hinc sanguinis motum partim sistendo, partim aliunde derivando, subinde proficua existunt: Sic sunt, qui ceu remedium revulsorium proponunt incurvationem minimi digiti; cum enim vehemens illa compressio intensum dolorem pariat, hujus occasione forsan hæmorrhagiæ medela erit. Nec alia ratio videtur, quare contumax hæmorrhagia per cauteria actualia plantis pedum admota curata fuerit à Zacuto Lusitano *lib. 1. Prax. Admir. Observ. 66.* Quibus & specifica quædam, quæ singulari & sympatheticâ plus minus vi sanguinem cohibent, simul sociantur, inter quæ primarium locum habet bufo exsiccat, sub axillam alligatus aut fronti admotus, quod etiam facit pulvis bufonum naribus inspersus, hinc & emplastrum magneticum Cnæcellii ex bufone locum habebit: M. A. N. C. *ann. 6. Append. pag. 33.* item bufonis sub dio suspensi, donec caro universa sit absumpta, os femoris denudatum, nari inditum hæmorrhagiam subito & continuo compescere afferunt. Lignum fraxini, sympatheticum dictum, certo tempore decisum, revera nobile experimentum est, quippe quod naribus admotum gravissimas hæmorrhagias sistit, ut experientia testatur; hæmatites in manu detentus interdum, aliis irritis, egregiè juvat, ut vulgò notum; si nempe tamdiu detineatur in manibus, donec incaleseat. Boyle *de Gemmis.* Idem facit & bursa pastoris in manu detenta, vid. Langius *lib. 3. Epist. 1. pag. 941.* Jaspis genuinus, cujus rubedo venulis herbaceis est distincta, argento cinctus insigniter sistit hæmorrhagias, in ista manu sub pollice, ex cujus lateris foramine narium sanguis fluit, detentus vel naribus admotus, quod observavit Schmuckius *in Curat. suis Magico-Magnet. pag. 16. in casu 3.* Confirmatur hoc etiam à Bootio *Tr. de Gemm. & Lap. pag. 252.* Videatur etiam Hildanus *Cent. 3. observat. 2.* item Boyle *de Gemmis.* Verùm cum Jaspis non ubique prodest, substituunt huic succedaneum, umbilicum nempe marinum, qui in parte plana & averfa leviter humectetur cum saliva, & applicetur circa interstitium oculorum, ubi decurrit vena frontis, ita sistere eum hæmorrhagiam narium observatum est, ac confirmat hoc Boot. *loc. all.* uti & hujus effectum probavit Gabelchoverus *Cent. 4. Observ. 3.* Verùm non credo, vim umbilicum hunc specialem obtinere, quin potius convenit, quatenus ab eo applicato comprimuntur vena & surculi ibidem descendentes; quia etiā monera argentea sive thalerus frigidæ aquæ immersus, postmodum eidem firma compressione applicatus, compescit hæmorrhagiam narium.

(1111)

Æger



Æger nunc in aëre libero ac frigido, nunc clauso ac calido detineatur, &c. prout enim sanguis & corporis habitus magis vel minus transpirabiles existunt tales, si magis transpirent, in lecto, sin minus, extra lectum continendi sunt; vid. Willisus *loco cit.* Nam omnia hæc vel spirituum plus minus irritatorum impetum, vel sanguinis organum & fluxibilitatem coercendo, operationes suas exerant.

Quoad secundum scopum ea quæ naribus eorumque apertis vasis applicantur, sunt alumen, vitriolum, stercora, fuligo, thus, ac quælibet adstringentia. Conf. Willisus *Pharmac. Rational. pag. 2.* Præterea cum externis his venæ sectiones interdum locum habent, utut raro non secus ac cucurbitulæ, nunc cum, nunc sine scarificatione; observandæ tamen ubique revulsionis & derivationis leges. Horum loco frigida & adstringentia, sanguinem plus minus coagulantia, ejusque nimium motum intestinum fermentativum, tam naturalem quam præternaturalem, refrænantia, adeoque ab effectu refrigerantia dicta, externè applicantur. Alias applicatur etiam cataplasma Galeni ex aloë, myrrha, pilis leporinis, combustis, & albumine ovorum, quod oscula vasorum aperta restringendo occludit. Imò hic inter alia convenit imprimis solum cataplasma, vulgare quidem, sed egregium, ex argilla calcinata, quæ ipsa cum aceto subacta, vel ex furno pistorio (*Rehm auß den alten Defen*) aut bolo Armena, cum aceto invicem permistis, ac fronti cum temporibus ac nuchæ immediatè applicatum & subinde remotum, medicamentum est egregium, quod sine interpositione lintei hæmorrhagias egregiè cohibet; nam omnia ex aceto externè conveniunt. Si verò cataplasma tale applicatum non satisfecerit, interdum necesse est, ut præterea vertici capitis, item collo admoveatur, pro sanguine ad caput adscendente in media quasi via alterando. Loco tamen argillæ potest etiam sumi bolus communis, Martialis naturæ existens, & eodem aceto subigi, & fronti applicari. Alii gypsum cum aceto dictis modis applicant. Item epithema ex aceto simplici vel rosaceo, aut solo, aut cum succo sempervivi majoris misto, & sale vel nitro, addito plus minus camphoræ, testibus & seroto applicatum mirabiliter hæmorrhagiam narium sistit.

℞. Succ. semperviv. maj. rec. express. ʒvj.

Acet. vini acerr. ʒj. ad ʒiʒ.

℞i ʒij.

Camph. ʒʒ.

M. f. Epithema.

Fronti, collo applicandum.

℞. ∇ Fl. papav. errat.

sperm. ran. ana ʒjv.

Acet. rosac. ʒj.

Opii c. acet. solut. ʒj.

Boli comm. pulveris. ʒjv.

M. D. S. ut antè

Sunt qui talia etiam regioni hepatis applicant ex aqua appropriata, addendo hujus succum cum aceto, camphora, nitro & similibus, ac desperatis narium hæmorrhagiis consulunt, & curiosa admodum est observatio Horstii *lib. 4. observ. 46.* ubi notabile occurrit exemplum suppressæ hæmorrhagiæ narium desperatæ ex tali epithemate epati applicato; sed insequente diarrhœa biliosa e. g.

℞. ∇ hyoscyami.

Nymph.

plantag.

semperviv. ana ʒʒ.

sperm. Ranar. ʒiij.

℞i ʒj.

Camph. c. ∇ sol. ʒj.

M. f. Epithema.

Cum pannis multiplicatis tepidè regioni epatis applicandum.

Porro ex fuligine, albumine ovi & acetodestillato mistis frontale parant, quod egregiè conferre, & raro in graviore hæmorrhagia fallere dicitur; vid. du Hamel *de Affect. Corp. pag. 312.* Convenit etiam albumen ovi probe subactum cum alumine: Succus urticæ etiam cum linteis naribus inditus sanguinem fluentem sistit. Sic sperma ranarum cum pauco alumine vel cum aceto subactum, fronti ac temporibus applicatum, vel linteam in eo aliquoties intinctum, iterumque exsiccatum, idque repetitis vicibus, tempore ulus fronti ac temporibus impositum egregiè hæmorrhagias deprimit.

℞. ∇ sperm. Ranar. ʒjv.

Acet. rosac. ʒiʒ.

Sperniol. Croll. ʒj. M.

Applicetur tepidè fronti. Vel

℞. Sperm. ran. c. ∇ alum. asserv. ʒvj.

Sach. ʒni ʒj. ad ʒij.

Camph. ʒj. ad ʒʒ. M.

Ut suprâ venæ sectiones & cucurbitulas scarificatas revulsionis gratia usurpari assertum fuit, ita pro eodem scopo non pauci applicant cucurbitulas non scarificatas hypochondriis, hepatis nempe & lienis regionibus, ratione lateris, ubi per nares sanguis effluit, ita quidem, ut stillante nare dextra applicandas cucurbitulas cum flamma suadeant regioni hepatis, nare sinistrâ verò affectâ, regioni lienis. Prostant observationes apud veteres: sic Amatus Lusitanus *Cent. 2. Curat. 100.* mediante cucurbitula splenis regioni admota, & epithemate frigido testibus applicato, ingentem hæmorrhagiam narium

sedat.

sedavit. Veruntamen frustranea & nociva sæpe fuit ejus applicatio, quatenus hoc remedium falsam sapit hypothesein, quod ex hepate & splene mittatur sanguis ad nares; unde hic cautos nos esse debere monet Riverius, alique Practici, cum interdum cucurbitulas tales admotas sequatur gravis inflammatio viscerum sub cucurbitulis sitorum, quale exemplum refert Riverius & Hildanus in suis *Observ.* Potius nuchæ ventosæ magnæ impostæ locum interdum inveniunt: Conf. M. A. N. C. *Ann. 6. observat. 90. pag. 130.* Quod pertinent cucurbitulæ, in superiori furarum parte admotæ, vel scarificationes institutæ, quæ miraculi instar hæmorrhagiam narium sistunt, autore Foresto *lib. 13. obs. 14.* coërcetur enim sanguinis fluxus sursum, & coërcetur impetus ad loca superiora. Ad dicta epithemata pertinet Frontale Poterii *Cent. 1. Car. 67.* ex croco Martis, bolo armena, & opio, cum oleo rosarum mistis & temporibus applicatis.

Alumen in hæmorrhagia narium nimia naribus insufflatum vel cum turunda in aqua vel albumine ovi humectata vel aliâ ratione naribus applicatum efficacissimè graves narium hæmorrhagias sistit, vid. M. A. N. C. *Ann. 1. observat. 24. pag. 90. Ann. 2. Annot. ad Observ. 223. pag. 403. & 404.* item Borellus *Cent. 4. observ. 7. & 50.* Par ratio est vitrioli: hujus solutio, vel ad albedinem calcinati pulvis, dictis modis applicatus coagulando sanguinem, & adstringendo orificia vasorum, egregium est; item caput mortuum vitrioli, si in istud aliquot guttæ sanguinis incidunt; item caput mortuum vitrioli cum albumine ovi mistum, & instar turundæ naribus applicatum. A Riverio *Cent. 1. observat. 23.* oxycratum, ab aliis pulvis lichenum equinorum naribus inflatus, aut fumus & vapor stercoreis suilli commendatur, de quo vid. Rulandus *pag. 74.* Quidam in capsula gerunt pulverem stercoreis suilli, ut in casu necessitatis eundem olfaciant, aut naribus intrudendo sanguinem sistant & compescant. De pulvere bufonum vid. Hartmannus *pag. 114.* & Hæferus *Herc. Medic. lib. 1. cap. 10.* & tinctura sulphuris vitrioli paucâ aquâ plantaginis diluta, & naribus immissa, virium magnarum deprehenditur. Sic phlegma vitrioli acidulum, cum potentissimè sanguinem inspisset, & coagulet, naribus immissum fluxum reprimat. Facit huc etiam decantatus liquor stypticus seu essentia styptica recentissima Galli hætenus in secretis habita, quæ tamen reverà ex vitriolo Martis & alumine solutis & mistis principaliter constant, si enim in hunc liquorem gallæ injiciuntur, nigrescit. Autor est Gallus Vivient. Vid. in specie Bartholinus in *Act. Med. Hassniens. Vol. 2. observ. 41. pag. 116. & observ. 133. pag. 352.* Tom. II.

M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. observ. 152.* & Willisius *citato loco, pag. 214.* Scilicet ex hac ipsa ratione atramentum laudatur, quod quocunque modo naribus applicatum & intrusum, præsertim gossypium atramento scriptorio imbutum, aliquantulum expressum, & in turundæ forma, naribus immissum, ratione vitrioli sanguinem cohibet; Vel

℞.  $\nabla$  Plantag.  
bursa pastor. ana ʒiʒ.  
in quibus dissolve  
℞. li. ois ʒij.  
Alum. ʒj. M.  
℞. Alum.  
℞. li. ana ʒj.  
Phlegm. ℞. li. ʒj. ad ʒiʒ.

Ebulliant ad dissolutionem contentorum; Liquor filtratus ~ ℞. li. aliquot guttulis adhuc aciduletur.

℞. Alum. crud. ʒʒ.  
℞. li. dulc. gr. xv. ad ʒj.  
Phlegm. ℞. li. ~ u ℞. li. nonnihil acidul. ʒiʒ. ad ʒij. M.

Injiciantur naribus.

Sed forsân spiritus vini per se rectificatus, naribus paulò profundius injectus, omnibus his præstat: siquidem ab illo quivis sanguis fluidus, etiam calidus & adhuc recens, citissimè mirabili cum spectaculo coagulari solet.

Fuligo furni suprâ laudata cum albumine ovi mista, turundæ illita & naribus immissa, egregiè sistit hæmorrhagiam; vel simpliciter de cataplasmate ex aceto cum argilla combusta naribus nonnihil immissum fluxum sanguinis sistit; aut etiam albumen ovi cum alumine subactum dicto modò applicatum. Nempe est in fuligine acidum cum terreis particulis admistum, à quibus vis adstrictoria. Præstantissima fuligo est ista, quæ è fundo vasorum & cacaborum æneorum, quæ in culina usurpantur, colligitur, fuligo cul-tello separata ac naribus intrusa, vel pulverifata cum sanguine patientis mista, & turundarum forma naribus immissa, sanguinem sistit, remedium etiam à Willisio *citato loco* tanquam expertum commendatum. Sic denique decocta adstringentia naribus immissa hæmorrhagias subinde periculosas sistere valent: conf. M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 223. pag. 324. & in Annot. ad hanc Observ. p. 403.*

Præter dicta adhuc observandum: topica hoc in casu non naribus saltem esse attrahenda, nisi vè injicienda, aut cum penicillis lineis adaptanda, sed vertici etiam quædam imponenda, v. g. muscus de tegula aceto im-

(liii 2)

præ-



prægnatus, de quo vid. Bartholinus *Cent. 5. Histor. 97*. Ut illos taceam, qui certa remedia dentibus atterendo, aut linguæ subdendo, fluxus narium sanguinolentos sisti posse sibi persuadent, v. g. radicem cichorii albi circa festum Jacobi in meridie collectam, aut radicem nigellastri seu nigellæ, quam mastecatam, & naribus inditam, primatum hoc in passu obtinere Sennertus & Simon Pauli perhibent.

### ARTICULUS III.

De

#### *Gingivarum Hemorrhagia.*

POST nates etiam subinde gingivæ gravem hæmorrhagiam patiuntur, eamque satis copiosam, adeo ut observaverit Schenckius *lib. 1. observ. Hollerius Comment. 2. ad Aph. 18 lib. 2. sect. 2. Coac. Hipp. 1108*. lethalem sanguinis ex gingivis fluxum. Fluxus hic ex gingivis, si est spontaneus, nunc est criticus, de quo præter Schenckium vid. Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Admir. Observ. 86*. nunc periodicus, de quo Schenckius *lib. 1. observat.* Zacutus Lusitanus *Cent. 5. Cur. 3*. Arnoldus Boot *cap. 7*. nunc vagus: Criticæ hæmorrhagiæ gingivarum morbum solvunt; periodicæ affligunt, quando aliàs consuetæ sanguinis in certo loco evacuationes sunt suppressæ; vagæ verò sunt, quando ex variis causis effluit sanguis per gingivas, & præter supra nominatas causas, cum aliis hæmorrhagiis communes, in specie subinde est vel gingivarum laxitas scorbutica, conjuncta cum aliquali earundem erosione vasculorum à saliva nimis acri, aut sale scorbutico salso acri facta, vel est naturæ consuetudo, quæ certo & statuto tempore per istas vias solet se exonerare. Sequitur tamen etiam, quod frequentissimum est, hæmorrhagia frequenter ex gingivis post ineptas dentium evulsiones, quando arteria radicalis in dente laceratur.

#### C U R A.

Hæmorrhagia gingivarum, quæ est spontanea, ut critica, aut periodica, non est curanda, sed ceu salutaris relinquenda, nisi succedanea substituatur evacuatio. Ista verò, quæ est non-spontanea, sed à scorbuto, ex laxitate gingivarum, vel erosione vasculorum ex saliva acri, curatur imprimis optimè per antiscorbutica, in quibus primatum obtinet tinctura laccæ Mynsichti, item linimentum illud, quod habet Deckers *in suo Comment. super Prax. Barbett. ubi de scorbuto p. 156*. item decoctum radice tormentillæ cum alumine. Si verò oritur gingivarum hæmorrhagia ex dente evulso, curatur eadem optimè vel cum bombace intincto tincturæ sulphuris vitrioli, & alveo ita applicato, vel hujus

defectu applicetur solutio vitrioli, quæ sanguinem sistit: vel imponatur gummi Arabicum, quod ipsum glutinositate sua sanguinem ex arteriis ob dentem evulsum emanantem inspissando, consequenter fluxum ejus sistit: vel applicetur decantatum emplastrum Galeni, ex aloë, thure & pilis leporinis, contritis & cum albumine ovi exceptis, gingivis impositis; tale Zacutus Lusitanus *loc. cit. Observ. 85*. usurpavit feliciter; omni in casu convenit decoctum gargarisandum, quò coaguletur sanguis, hærens circa radices dentis evulsi; vel fiat decoctum ad gargarisandum:

℞. Rad. Tormentill.

bistort. ana 3iij.

Gall. contus. 3ß.

Sem. Papav. alb. 3ij.

coqu. in f. q. *¶ a simpl.*

Colatur: adde

Boli vulg. 3ij.

Alum. parum.

M. in forma gargarismatis in ore aliquamdiu detineatur, donec cesset hæmorrhagia gingivarum.

Convenit etiam suo modo aqua spiritus salis ebria pro eluendo ore. Conf. M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 316. pag. 534*.

Aliis irritis cauterium actuale admoventi potest; conf. M. A. N. C. *Ann. 2. observat. 48. pag. 87*.

### ARTICULUS IV.

De

#### *Sputo Sanguinis.*

POST sanguinis ex gingivis fluxum non rorò per os etiam rejicitur ille in affectu, qui vocatur sputum sanguinis, seu hæmoptysis, idque ad differentiam vomitus sanguinis, de quo supra actum fuit. Jam verò sanguis iste, qui spuendo seu *αιμφορῖσις* rejicitur, ex variis locis promanare, & hinc in os derivari solet: nempe nunc ex summitate narium emanat, nunc saltem ex palato, nunc gingivis, nunc faucibus, nunc œsophago, nunc ex larynge, nunc ex pectore, nunc ex pulmonibus, omnibusque aliis vicinis locis. In specie autem istud sanguinis sputum in considerationem venit Medicam, & etiam speciali nomine hæmoptysis vocatur, quando sanguis cum tussi ex respirationis organis, speciatim ex pulmonibus, per os tussiendo rejicitur, manat sanguis tunc ex arteriis, vel pulmonalibus, vel ex arteriis trachealibus, ut rectè & accuratè has distinguit Willisius *Pharm. Ration. P. 2. pag. 151*. Nam ordinariò quidem cum tussi fit hæmoptysis, nempe quando pulmo affectus est, aut profundiores tracheæ ramificatio



tiâ pectoris contingentem absque tussi observari, quando nempe saltem superior tracheæ pars affecta est, qualia exempla hæmoptyses ex vitio pulmonum ortæ sine tussi videb. in *M.A.N.C. Ann. 2. observ. 45. p. 83. Ann. 9. & 10. observ. 135. pag. 309. Willisio loc. cit. & Rhodio Cent. 2. pag. 83. & 84.* in quo casu cum aliquali plus minus scœatu prævio sanguis erumpit; sicuti è contrario non omnis sanguis, qui tussi rejicitur, præcisè ex thorace est.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta in hæmoptysi nunc est superior larynx, ejusque cavitas, nunc intermediis ductus tracheales, nunc eorum ultimæ extremitates orbiculares, adeoque ipse pulmo. Quæ partis affectæ differentia probè attendenda sunt ad explicandos diversos hæmoptyses modos.

### CAUSÆ.

Causæ hæmoptyses sunt vel in sanguine, vel in vasis sive, hæc anastomosi, sive diarræsi, aperiantur. Generales istæ causæ ex generali hæmorrhagiarum theoria patent: in specie tamen frequentiores sunt duæ: nempe (1.) Ruptio insignis cujusdam vasis in pectore aut pulmonibus, quod sit ex clamore nimio & forti corporis nisu & tensione pulmonum sub gestatione gravioris cujusdam oneris, quâ spiritus cohibetur; item ex casu ab alto, plagis pectori inflictis, ex tussi nimis concitata agitante pulmones; item ex copioso effusioneque risu, de quo vid. Zacutus Lusitanus in *lib. 2. Prax. Histor. cap. 6.* dum ex hoc hæmoptysin lethalem observavit; saltatione nimia Rolinccius *Med. Comm. lib. 2. Sect. 3. cap. 53. pag. m. 122.* quæ omnia ruptionem vasorum in pectore & pulmonibus inferre queunt. Disponunt ad faciliorem talem hæmoptysin ex hac causa imprimis solennis cujusdam sanguinis evacuationis suppressio, præsertim in partibus corporis inferioribus: sic enim nihil frequentius est, quàm quod suppressionem mensium & hæmorrhoidum subsequatur sanguinis sputum, ex sanguine nempe circa præcordia plus minus coacervato, stagnante in pulmonibus, & anastomosi vasorum inferente, vid. *M.A.N.C. Ann. 9. & 10. observ. 27.* pertinet huc, quod observavit Deodatus in *Valetud. pag. 219.* de hæmoptysi insigni cum pleuritide suppurata, oriunda ex nimis citâ mensium emansione. Plura exempla videb. in Schenckio *Observat. lib. 2. & Borello Cent. 1. observ. 24.*

(2.) Causa frequentior est vasorum, imprimis in pulmonibus, erosio, facta aut ab externis inspiratis, v. g. fumo sulphuris incensi, halitu aquæ fortis sub laboribus chymicis, &c.

vel ab internis, iisque omnino frequentissimis, in variolis lymphâ in specie nimis acri & acido-salsa, scorbutica, aut aliâ simili labe inquinatâ successivè vasa tenuia pulmonum erodente, & ita hæmoptysin procurante, quàm subinde solet præcedere tussis quædam sicca nocturna ferina; & frequentissimè ulcus & vomica pulmonum, & phthisis pulmonalis insequi solet. Præterea pertinet huc, quod observatum narrat Rhodius *Cent. 2. observat. 35.* quod post sanatum pedum ulcus supervenerit sanguinis sputum, dubio procul ex retrogressio fermento ulceris acri & corrosivo, mediante massa sanguinea ad pulmones delato, ac partes pulmonales erodente.

Hæ sunt ordinariæ sputi sanguinis causæ. Rarum est, quod hirudines cum potu assumptæ, & in faucibus hærentes, ibique sanguinem emulgentes, sputum cruentum induxerint. Exemplum hujus rei videb. in Schenckio *lib. 2. Observ. & Borello Cent. 1. observ. 24.* Sic non minus curiosum est, quod theriacum usus in quibusdam hoc malum excitaverit, Autore Willisio *Pharm. Rational. P. 2. pag. 155.*

Observanda ulterius sunt hæmoptyses differentia, dum nempe (1.) sanguis, qui rejicitur, vel est floridus, vel semigrumolus; (2.) est vel copiosus vel parvus & paucus, prout nempe conditio vel vasis aperti, vel impetus sanguinis undecunque concitati tulerit; (3.) vel faciliè vel difficulter ejicitur; (4.) quod hæmoptysis nunc sit recens, nunc inveterata; & hæc (5.) vel vaga vel periodica. Sanè hæmoptysium inveteratarum periodicarum innocuarum, quin potius cum euphoria ægrotum contingentium, plura hinc inde prostant exempla: Conf. Bartholinus *Act. Med. Hafniens. Vol. 1. pag. 196.* & Thiermayer *Cons. lib. 2. pag. 24.* Sic anniversariam hæmoptysin observavit Rhodius *Cent. 2. observ. 34.* sic diurnam periodicam sanguinis spuitionem notat Amatus Lusitanus *Cent. 6. Cur. 49.* casus reverà est singularis, cum æger singulis horis interdiu exspuit sanguinem, noctu verò, licet vigilet, non. Indolens subinde est hæmoptylis; nunc verò cum dolore plus minus conjuncta, vel constrictivo pulmonum, vel gravativo obtuso eorundem, vel rodente & plus minus irritante in aspera arteria, &c. pro causarum nempe varietate.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: hæmoptylis per se patet. Cum autem ex tam variis locis, naribus, palato, œsophago, larynge, &c. possit ejici sanguis cum sputo, necesse est, ut imprimis attentus sit Medicus ad cognoscendum locum, in quo sit vas læsum sanguinem

(liii 3)

tundens

fundens: quod ut cognoscatur, partis affectus differentia probè attendenda, & artificiali conjectura causarum antecedentes, & excretionis modus, examinanda sunt.

Ubi enim fit suppressa consuetà evacuatione sanguinis, vel ex prægresso clamore, vel tussi ferina, &c. semper est suspicio læsionis vasorum in pulmonibus, secus si aliæ præcesserint causæ. Item si sanguis exspuitione levi absque tussi, ex ore rejicitur, est saltem ex partibus superioribus palatinis, naribus aut vicinis superioribus; qui verò levi secreta, *mit råspern*/ exspuitur, est ex naribus, capite & faucibus, œsophago, summitate asperæ arteriæ, ac in specie si paucus fuerit, ex vicinis locis, iis scilicet, qui ad thoracem præcisè non spectant, & congruatus prodit. Confirmabit hoc causa antecedens, laryngem aut œsophagum afficiens. Qui verò copiosus & tussi, præsertim reiterata, profunda, & accedente conatu, rejicitur sanguis, ut plurimum ferè est ex thorace, & læsis in specie pulmonibus; ubi tamen hæc cautela attendatur, ut tussis præcedat sanguinis sputum. Non tamen semper omnis sanguis, qui tussi rejicitur, præcisè ex thorace est; propterea & alia concurrentia signa simul perpendenda erunt: nam sanguis confertim ex œsophago & faucibus erumpens, & laryngem plus minus affligens, sputum sanguinis cum tussi interre potest, ut ut malum non sit in aspera arteria vel thorace, sed tunc tussis aut sequitur, aut conjuncta est cum sanguinis sputo. Quod si tamen tussis præcedat, & post hanc sequatur sputum sanguinis, signum est, sanguinem provenire ex pectore, aut pulmonibus aut aspera arteria; unde spuma in sanguine excreto apparens ut plurimum sanguinis ex pectore, & specialiter ex pulmonibus erumpentis, signum est, idque eò magis, si cum tussi præcedente & floridus evacuetur, idque imprimis, si simul dolor pectoris in ejus profundo concurrat, si respiratio plus minus difficilis, aut alia symptomata affectum pectoris inoicantia adsint. Spuma fit, quando sanguis aliquamdiu cum aëre quasi concutitur, quò commodè in spumam abit. Quod si sanguis, qui ejicitur per sputum, si floridus coccineus, & magis rubicundus, tenuis, ex arteriis emanare indicio est; si verò nigricans, crassius, grumosus plus minus, aut obscurus, ex venis effluit, neque tam ex pulmonibus, quàm pectore ibidem extravasatus prodit.

Pari modo sanguis copiosè rejectus, magis est ex pulmonibus & pectore; minus copiosè excretus ex faucibus esse videtur. Qui quò diutius in pulmone, thorace, aut loco vicino hæserit, & ita demum rejicitur, niger, obscurus, plus minus grumosus observatur,

Sic quoque sanguis, periodicè qui cum sputo ejicitur, ut plurimum est ex pectore, rarò ex alio loco promanat.

Qui ex thoracis cavo, minimè spumosus, sed grumosus est.

Qui ex gutture & aspera arteria, est floridus ac paucus.

Qui denique à membris remotioribus, nigricans & paucus cum horum symptomatibus rejicitur.

## PROGNOSIS.

Quoad prognosin: omnis in genere hæmoptysis est suspecta & periculosa. Ex læsione pulmonum venis sputum sanguinis oriundum, sæpius ulcus & vomitum pulmonum vel empyema pectoris, (si enim sanguis non ejicitur, in pus mutatur,) hinc phthisin pulmonalem & tabem, interdum peripneumoniam, post se trahit, præsertim si præcedentem insequatur erosionem.

Quod verò ex vasis pectoris læsione & aliis locis profluit sputum cruentum, minus periculosum esse solet.

Intempestivè nimis suppressa hæmoptysis, in specie, quæ subsequitur vel sanguinis turgescientiam, vel suppressam evacuationem sanguinis, interdum non rarò inferre solet tabem periculosam, peripneumoniam.

Hæmoptysis, quæ fit ex pulmonibus, periculosior est ea, quæ fit ex pectore, h. e. majus periculum subest, si læsa sint pulmonum vasa, quàm vasa intercostalia.

Denique sputum cruentum si est primarius morbus, periculosius est, quàm si est morbus secundarius h. e. qui pleuritidem, peripneumoniam, aut alios pulmonum affectus, insequitur.

Sputum sanguinis periodicum, si sine pulmonum singulari noxa contigerit, minus periculosum est, quàm si cum pulmonum vitio junctum fuerit.

Prognosin specialem videb. in Bartholini *Act. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 10.*

## CURA.

Quoad curam hæmoptyses: hæc vel in paroxysmo, vel extra paroxysmum, instituitur:

In paroxysmo

1. Causa removeatur & corrigatur.
2. Vasorum læsio tollatur.
3. Sanguis effluens, ejusque impetus ad partem affectam, sanguinem coagulantibus & condensantibus, ejusque motum nimium inhibentibus, maturè supprimatur & sistatur.

Causa removeatur, vel saltem suspensioe & languis.



sanguinis motus certâ determinatione , h. e. vel spirituum impetum, vel sanguinis turgentiam, vel copiam, &c. revellendo, derivando, papaverinis, &c. cohibendo.

Posteriores scopi peraguntur vulnerariis & adstringentibus.

Cura extra paroxysmum præservatoria consistit in eo, ut recidiva præcaveatur;

1. Causam ex toto removendo.

2. Ut, sputo desinente, si quid restitit sanguinis grumosi in pectore, vel locis vicinis, resolvatur, & resolutus maturè expectoretur vel discutatur, ne aliquando relictus acrimoniam concipiat, ichoretiscat, vomicam & empyema, & consequenter phthisin inducat.

3. Læsiō pulmonum vel partis vulnerariis vegetabilibus, succino & succinatis remediis restituatur.

Pro his scopis obtinendis subinde necesse est in paroxysmo, ut præmittatur

1. Venæ sectio in principio curæ, in casu nempe, quo sanguis nonnihil abundat, observatis tamen simul revulsionis & aversionis regulis, ut imminuto sanguinis quanto sub liberiori circulo minus confertim per venam læsam effluat; ita quidem, ut venæ sectio non instituatur in pede, si tamis superioribus læsis oriatur hæmoptysis. Hinc v. g. ubi sanguinis sputū est ex mensibus vel hæmorrhoidibus suppressis, secetur vena in pede, ubi ex hæmorrhagia narium solenni suppressa, secetur in fronte aut sub lingua, aut in brachio. Non tamen hoc in omnibus æquè obtinet, cum in quibusdam phlebotomia malum exasperare soleat; Conf. Willisi *Pharm. Rational. Part. 2. p. 167.* adeoque circumstantiæ suprâ circa venæ sectionem in hæmorrhagiis instituendam in genere insinuatæ probè notandæ. In ista autem hæmoptysi, quæ est ex corrosione ab acrimonia contentorum, inepta penitus & frustranea est venæ sectio.

2. Purgantia vitentur. Diuretica & diaphoretica potius sunt optima, vid. Benedictus *Theatr. Tabidor. Exerc. 30.* Nam hæmoptyci minus ferunt catharsin, utpote à qua facile in tabem conjiciuntur.

3. Interna adstringentia ante & sine avertentium administratione non facile usurpanda, ne sanguinis inconcinnam suppressionem suffocatio aut peripneumonia excipiat.

4. Nec adstringentia externa, multò minus actu frigida, pectori admoveantur; cum ab his sputum cruentum augeri posse illud suadeat, quod sola partium pneumaticarum ab aëre refrigeratio hæmoptoën non rarò excitet; illorum verò incommodum Platerus *Pr. Tom. 3. pag. 715.* & Schenckius *pag. 241.* testetur.

5. Præ aliis hæmorrhagiarum speciebus,

præsertim in hæmoptoë, oplata sunt perquam proficua & satis efficacia, qualia sunt pilulæ de cynoglossa, laudanum opiatum, confectio narcotica Mynsichti, pulvis Helidæi, &c. & inter hæc ipsa in specie hyoscyamus ejusque semen nobile specificum, præsertim si malum est ab acrimonia corrodeute. Imò jam ab ipsius Hippocratis temporibus decañtatū est remedium, unde specificum Heurnii contra sanguinis sputum est electuatium ex conserva rosarum & violarum cum semine hyoscyami, coralliis, bolo, lapide hæmatite, &c. de quo vid. Commentar. Heurnii in *aphor. 13. sect. 5. Hipp. pag. 103.* vel quod Helidæus Paduanus, Medicus olim Bononiensis, felici cum experimento ad hæmoptysin, omnesq; tales affectus adhibuit. Vel

℞. Sem. hyoscyam. alb.

papav. alb. ana 3x.

≡ sigillat.

Corall. r. præp. ana 3v.

Conf. rosar. antiqu. q. s.

M. f. Electuatium.

Vid. Riverius *lib. 7. Pr. cap. 6. pag. 348.* item semen quoque detur cum lapillis cancerorum, ut & sistatur sputum cruentum, & temperetur acre, & dissolvantur grumi sanguinis, Platerus *Observ. pag. 789. & 793.* habet tabellâs & trochiscos de hyoscyamo.

Simus tamen cauti in usu hyoscyami propter vim narcoticam, qua pollet, ac prohi non in nimia dosi exhibeatur, sed repetitis vicibus; vid. Helmontius. Cavendum etiam ab acrioribus seu calidioribus, monente Platero *Prax. Tom. 3. pag. 715.* v. g. thictiaca & Mithridatio.

4. Quoad remedia cetera, quæ interne conveniunt, sunt omnia ea, quæ suprâ de hæmorrhagia in genere fuerunt insinuata; in specie semper simul ad acrimoniam sanguinis, vasa erodentem, quæ frequentissima est ex hæmoptyscos causis internis, respiciendum, pro quo scopo conveniunt *Pilula Sylvii lib. 1. Pr. pag. 48. §. 20.*

Præ cæteris tamen portulaca & plantago sunt insignis commendationis: nam portulaca quocunque modo usurpata, ejus etiam succus & syrupus ad uncias aliquot propinatus, insigniter commendatur, imprimis si iisdem aliquid de opio admisceatur: nam & sanguinis motum sistit, & simul acrimoniam corrosivam, si quæ subest, temperat. Quidam insigniter commendant decoctum portulacæ cum radice symphyti & herba prunellæ, in vino rubro si propinetur; quorum etiam succi aut syrupi uticiatim propinati valent. Fonsæca *lib. 1. Conf. 8.* dicit, quod sanguis non erumpat, si manducet quis in venæ sectione portulacæ semen, de quo experientia consulenda. Præter hæc symphytum majus speci-

fice



ficè medetur hæmoptysi, five blandè decoquatur, five syrupus Fernelii propinetur. Post hæc est imprimis hedera terrestris, quæ in sputo sanguinis est planè mirabilis, idque imprimis post paroxysmum: nam temperat acria, consolidat vasa rupta exesaque, & sanguinem dissolvit congruatum: hinc ejus syrupus, decoctum, vel conserva in usum vocari possunt.

℞. Conf. hed. terr. ʒij.

Rosar. ʒj.

☞ Sigillat. c. ~u & li impragn. (si circumstantiæ id patiantur; sin suspicio erosionis, abstinemus ab ejus usu) ʒʒ. ad ʒij.

Hemat. prap. ʒj.

Trochisc. de Carabe ʒij. ad ʒj.

Laud. opat. gr. iij. ad vj.

c. syr. de symph. Fernel.

t. Electuarium.

De quo subinde in die magnitudo nucis castaneæ vel juglandis capiat.

Appropriata magis hîc sunt trochisci de carabe, vel de terra sigillata, de spodio, pulvis Scaligeri, quem Schenckius *Observat. pag. 241.* & Petrus in *Nosolog. lib. 1. Dissert. 19.* describunt, terra catechu, centumnodium, chamædrys & decoctum foliorum aristolochiæ rotundæ, succus urticæ ab Amato Lusitano *Cent. 6. Hist. 4.* Foresto *lib. 6. observ. 16.* Riverio, & omnibus ferè autoribus, plenis buccis laudatus; species dia-plantaginis Mynsichti: Cum festucis secalinis, quæ vulgò ineptrè mater filiginis dicuntur, in aqua plantaginis propinatis, hæmoptoën diurnam curavit empiricus: Vid. Velschius *Mictom. Observ. 27. Cont. 1.*

Hinc pariter conserva rosarum rubrarum antiqua, item pulvis summitatum & pilosorum excrecentiarum cynosbati, *Schlaff-Kungen* / egregia specifica sunt in hoc malo, non secus ac oleum lini cochleatim usurpatum mira præstat: Confer. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. observ. 209. pag. 308.* Sic & spiritum vitrioli commendat Castellus, in  *suis epistolis*, in aqua plantaginis vel alia appropriata, quia coagulando sanguinem, eundem condensat, & ejusdem eruptionem sistit, quod ex experientia propriâ confirmat Hofmannus, & Thonerus in *Consilio 37.*

℞. ∇ Plantag. ʒvi.

syr. de ros. sic. ʒj.

~ & rectif. vel ejus ol. ʒj. M.

De qua subinde aliquot cochlearia ab ægro capiantur, in specie, ubi simul ebullit nimis aut effervesceat sanguis.

Conf. simul Hartmannus, ubi de sanguinis sputo. Sed in usu hujus acidi vitriolacei, cave, dicit Lindanus, ne propines, si aliqua ulceris in faucibus sit suspicio, aut aliqualis metus phthiseos, aliàs nocemus hîc magis pulmonibus. Aliàs

si copiosè fluat sanguis, addatur adhuc euphoriston Lindani, paratum ex pomo cotoneo:

℞. Poma Cydonia, five matura, five immatura,

Eaque discinde minutim in tenues lamellas, quas coque diu in diplomate, in aqua communi, donec penitus mollescant; quo facto separa aquam decoctionis largiter, & lamina pomorum bene mollitas fortiter exprime. Hujus succi expressi cochlearia ij. vel iij. ter quaterve in die propinat, præmissa venæ sectione, utut etiam corrosi fuerint pulmones: aquæ verò isti, in qua decocta poma, per residentiam clarificata, addit tantillum sacchari candi; vel decoctum hordei, in quo passulæ Corinthiæ coctæ fuerunt, & propinat simul pro potu ordinario.

Gelnerus in *Epist. pag. 105.* commendat malum cydoneum excavatum, drachma una thuris impletum, assatum & propinatum. De succo, syrupo & pulvere stercoris asinini & suili, vid. quoque Ballonius *lib. 1. Epid. & Ephemer. Consil. 22. pag. 62.* Ad hæmoptysin in specie stercus muris, a ʒʒ. vel ʒij. ad ʒj. cum succo plantaginis commendatur, addito saccharo pauco pro gratiâ saporis, subinde manè stomacho jejuno, & vesperti in introitu lecti, dandum per aliquot dies. Convenit in specie, si fuerit hæmoptysis ob ruptum pulmonum vas. Cetera, ut lapis hæmatites, bolus Armena, Martialia, in specie tinctura sulphuris vitrioli à gutt. xx. xxv. ad xxx. in vehiculo appropriato & tinctura antiphthisica, ex supra dictis jam nota sunt. In malo graviore autem ex causis externis sæpè recidivante, decocta pectoralia ex lignis sunt egregia, de quibus conf. Willisius *Pharmac. Rational. Part. 2. pag. 167. & 171.* Ex quibus facillè variz possunt fieri formulæ, e. g.

℞. Conf. Rosar.

Costæ.

heder. ☞ estr. ana ʒvj.

Hemat. prap. ʒij.

Corall. rub. prap. ʒj.

☞ sigillat. ʒij.

c. syr. papav. simpl. f. Electuarium.

Externe quæ dixi applicanda esse testibus in hæmorrhagia narium, commodè possunt quoque applicari iisdem in hæmorrhagia pulmonum seu sputo sanguinis.

7. Hîc potissimum observetur, quod superius *Artic. 1.* de hæmorrhagia in genere dictum, scilicet excretionem aliquantum sedata resolventia & expectorantia leniora esse iungenda, ne sanguis extravasat' vicus creet; qualia sunt sperma ceti, cornu cervi, antimonium diaphoreticum, lapilli cancrorum, unguentum potabile rubrum, syrupus de scabiola, oxymel squilliticum, oleum succini, quod ex Celsalpino Riverius commendat.

Tan-

Tandem & VIII. Pulmonibus læsis vulnerariis & balsamicis prospiciendum, v.g.

R. HB. Scabios.

Hed. æstr. ana Miß.

rad. Torment. ʒj.

sem. anisi ʒss.

Coqu. in l. q. ▽ & cerevis. ana p. æqu.

Colat. lbj. adde

*syr. heder. terr.*

*de symph. Fern. ana ʒ ʒ.*

M. f. Potio, S.

Heilender Trank.

De quo pro lubitu hauriatur.

## SECTIO XIX.

DE

### LÆSA URINÆ IN RENIBUS SECRETIONE.



Ræter alia viscera etiam ad renes appellit sanguis, ut in illis urina secernatur. Læditur hæc urina secretio in renibus quatuor modis:

1. Quando nulla fit, & est abolita.
2. Quando eadem est imminuta, & non sufficiens pro necessitate naturali.
3. Quando est nimia seu aucta.
4. Quando eadem est depravata.

Urina est lixivium, constans duabus partibus, aquosâ nempe & salibus superfluis falsis oleosis, seu compositis ex acido volatili, & ex urinoso seu alcali volatili, imprægnata. Hi duo saporis in urinis omnium inveniuntur, & mutuâ unione sal volatile falsum constituunt. Et quidem hæc de urina sanguinis imprimis intelligenda: nam de urina potus hic nihil nobis negotii. Jam verò in istis urinæ secretionibus utraque hæc pars constituens urinam probè attendenda, & nunc hæc, nunc illa considerata, cum juxta utramque partem lædi possit ejus secretio. Interdum enim v.g. læditur secretio juxta laticem aquosum, qui nimis copiosus, paucis contentis salinis saturatus, & tunc urina ut plurimum est pallida & tenuis, alio nomine cruda dicta, qualis urina excerni solet in scirthis hepatis & lienis, in morbis chronicis, uti etiam in principio febrium; e contra interdum contenta salina sunt nimis copiosa; vel propter defectum laticis aquosi exhausti per inediam, aut absumpti per sudores, &c. vel propter copiam salium vitiosorum in massa sanguinea cum urina excernendorum, ut fit in hypochondriacis, in scorbuticis, & similibus, ubi urinæ rutilæ & rutilantes copiosissimis contentis sunt imprægnatæ.

#### ARTICULUS I. & II.

De

*Urina Secretione imminuta & abolita.*

**I**mminuta urinæ secretio est, quando minus ejus transcolatur, quàm decet, ratione nem-  
Tom. II.

pe proportionis ad serum in massa sanguinea; quando enim parum inest feri, ut in iis, qui parum potant, aut copiosioribus sudoribus diffuunt, aut serum alibi colligitur, ut in ascite, in his casibus urina pauca emissa non potest dici præternaturaliter imminuta, quia in his serum non nimis abundat, sed proportionaliter sero in sanguine residuo respondet. Tunc ergo est imminuta urinæ secretio, quando tam parçè emittitur, ubi debitâ proportionem non respondeat assumptis, & inde collecto sero in massa sanguinea; sicuti abolita vocari debet, quando nihil excernitur, id quod aliàs dicitur ischuria seu urinæ suppressio. Hic defectus urinæ in genere consideratus fit vel vitio renum urinam non secernentium; vel vitio vesicæ urinam non excernentis. Multi cum Actio Tetr. 3. serm. 3. cap. 21. Ischuriam habent pro affectu vesicæ proprio, quandoque sc. urinam hæc ipsa colligat, nec reddat, quo sensu Goræus in desin. Med. pag. 199. apertè docet ischuriam propriè dici urinæ in vesica retentionem. Communiter autem ejus significatio ampliatur, ut istam quoque urinæ suppressionem comprehendat, quæ vitio renum contingit, vacuâ omnino vesicâ.

Ischuria ergo communiter statuitur duplex: vera, seu quæ fit vesicâ plenâ existente; & notha, seu ubi hæc urina vacua est, quatenus hujus nihil à renibus adducitur: quarum hanc urinæ secretionem; istam ejusdem excretionem læsam, pronunciare liceret. Dignoscuntur ambæ, ac distinguuntur à se invicem, quod in illa præter renum & ureterum pathemata, de quibus hactenus, nulla tensio, nullus dolor ac urinandi stimulus, similevè quid circa vesicæ regionem, & in hypogastrio observetur, nec cathetere immisso urina profluat; dum contra in hac æger, quamdiu sensus & mens integra, de tensione ac dolore molestissimo dictæ regionis, simulque insigni & frustraneo conatu conqueratur; imò hæc ad tactum tumida cum molestia quoque insigni deprehendatur. Hoc loco saltem ischuria

(K k k k)

ria

ria vitio renum non fecernentium confideranda est, cujus leviores causæ imminutam & deficientem urinæ secretionem efficiunt.

## MEMBRUM I.

De  
*Ischuria Renali, seu urinæ secretionem læsa.*

C A U S Æ.

**C**Ausa proxima, propter quam non fecernunt renes urinam, est vel in ipso sanguine inepto, ut ab hoc separaretur materia urinæ, vel idque ut plurimum, in ipsis renibus, redditis ineptis ad urinæ secretionem. In ipso sanguine frequenter vitium hæret, vel in qualitate, vel etiam certo modo in quanto. In quali quidem, quando massa sanguinea tota, ejusque serum seu latex aquosus, adeoque omnes ejus partes, ex læsa crasi ita sunt disposita, ac firmiter inter se se connexa & contexta, seu, ut loquitur Willisius *Pharm. Ration. Part. 1. pag. 166.* quando sanguinis compages ita est serrata, ut amplexibus his arctioribus se extricare, & serum per angustos renum porulos & tubulos commodè transire, & in iis ex reliquo sanguine legitime urina tecerni nequeat. Vitium hoc nunc à lymphæ austeritate seu acore præternaturali, nunc visciditate, oriri videtur; vid. Platerus *l. a. & Sylvius Tract. de Cach. § 29. & 295. & l. 1. Prax. cap. 55. §. 8. & 9.* observari hoc solet sæpius in febrium statu cruditis, imprimis in morbis chronicis, cacochymia, cachexia, &c. ad hydropem inclinantibus, leucophlegmatia, hydrope, affectibus hypochondriacis, scorbuto confirmato, &c. vitio aut scirrho hepatis aut lienis conjunctis; in talibus enim pauca urinæ ut plurimum est secretio, ejusque simul crudæ, seu paucis contentis in latice aquoso saturatæ, utut tales ægri aliàs sint copiosi salivatores, aliosque affectus à feri abundantia patiantur. Verum post medicamenta appropriata, imprimis salina, vitiosam sanguinis crasin alterantia, & scirrhos viscerum resolventia, evenit, ut urina successivè copiosa & diversimodè affecta, crassa, turbida, interdum nigra excernatur. Imò huc referri poterit Riverius *Cent. 1. Observat. 1. & 89.* Ubi quidem ischuriæ causam vasis emulgentibus tribuit, quasi hæc ob plethoram nimis distenta se contrahere nequiverint: Item forsàn M. A. N. C. *Ann. 3. observat. 212. & Ann. 4. observ. 159.* cujus tamen symptomatis ætiologiam Willisius *Pharmac. Ration. P. 1. Sect. 4. cap. 3.* tam per propriam, quàm Lovveri experientiam ab humorum strictiore combinatione deducit. Præter dicta urinæ secretio imminuitur, si serum sanguinis aliorsum ablegetur, & à viis urinariis avertatur, v. g. in catarrhis, sudore nimio,

diarrhoea, hydrope, &c. quibus præsentibus urina parcior; remotis verò uberior, secernitur atque excernitur. In quanto sanguis peccat, quando is propter nimiam abundantiam, aut propter ejus crassitiem, aut quamcunque aliam rationem, legitime licet circulatus, parum tamen aut nil in renibus ex se dimittit; simul verò ac secatur vena brachii, & ejus quantum ita imminuitur, copiosus urinæ fit effluxus: quale exemplum admodum curiosum habet Tulpus *lib. 2. observ. c. 43.* ubi quidam ecclesiastes singulis pleniluniis urinæ suppressione affligebatur: quæ non excernebatur, nisi vel declinante luna, vel per venæ sectionem in brachio; in anatome postmodum defuncti reperta fuit pelvis renis sinistri admodum distenta, ut ferè vesicæ vicem & magnitudinem expleverit.

Raræ autem sunt hæ secretiones urinæ imminutæ, quæ fiunt ex vitio sanguinis: frequentiores sunt ischuriæ, quæ vitio renum fiunt, quorum triplex ferè subest causa:

- (1.) Quando renum caruncularum, i. e. meatus fibrarum renalium, pori & canales, sunt admodum angusti, obstructi, aut infarcti, ita, ut per illos nihil feri possit transfundere; vel
- (2.) Hi ipsi inepti sint redditus, quò minus tecerni possit urina; idque vel ob tonum earum resolutum, ut in *atonia*, ita ut sit paralytis; sive sit nimis quasi firmus, ut in spasmódica earum constitutione vel convulsione; vel
- (3.) Vitio ipsius fermenti renalis urina supprimitur, quando illud deficiens, aut iners, aut alteratum, plus minusque corruptum, non sufficit negotio, uti subinde in affectibus cachecticis, hydropicis, aut ad hydropem inclinantibus, quibusdam hypochondriacis, aliisque chronicis affectibus, &c. manifestum est.

Quoad ergò primum vitium: inter ea, quæ obstruunt canales fibrosos renum, sunt (1.) interdum sanguis grumulosus, vel ex casu ab alto circa renes collectus, vel ex aliis partibus, in quibus sanguis grumulosus hæret, per sanguinis circulum ad renes derivatus, & ibi collectus, id quod causæ antecedentes confirmabunt; sicut & ex sanguine in pectore extravasato, si is sit resolutus, fit miæctus cruentus. (2.) Est etiam pus vel ex ulcere renum, vel ex aliis partibus abscessu laborantibus, cum sanguine ad renes derivatum, id quod pariter ex antecedentibus, vel renum, vel aliarum partium vomitis aut suppurationibus suspicari licebit; sicut etiam peripneumoniæ suppuratæ per urinæ fluxum purulentum feliciter solvuntur. Circa pus ejusmodi notandum, lethalem interdum urinæ suppressionem intulisse; vid. Sanchez



in suis *Observ. pag. 374.* (3.) Obstruunt renes humores pituitosi, crassi ac viscosi, vitio digestionis primæ, tam cum urina potus ad renes delati, quam etiam cum sanguine ad eosdem distributi; tale exemplum recenset *Amarus Lusitanus Cent. 6. Cur. 12.* de puero contumaci ischuriâ laborante, ob nimiam crassitiem & visciditatem lactis nutriticis. Assumpserat pro jentaculo vir quidam de cætero sanus calcem, quem vocant Hollandicum, ad satietatem, cerevisiam tenuem ac diureticam (*Rauterling*) superbibendo: elapsis aliquot horis urina citra ullum vesicæ renumvè dolorem supprimitur, ut ne guttam quidem excernere ad tertium usque diem potuerit. Innotescit hoc vitium, quando talium humorum præsentia in corpore observatur, qui nempe intestina & primas vias oblident, aut quando urina antea effluit solida, excernitur turbida ac crassa, cum sedimento copioso mucilaginoso, postmodum tale contentum in urina deficit, præsentem simul gravitatem in lumbis. (4.) Frequentissima causa est calculus renes oblidens, & eorum meatus ac tubulos obstruens, renes irritans, & ad inflammationem disponens; quale exemplum habet *Lotichius in observ. l. 4. fol. 376.* & *Bartholinus Cent. 4. Epistol. pag. 92.* (5.) Hisce annumeranda sunt comprimmentia, nempe tumores.

Quoad 2. Renum vitium conferens ad ischuriam, dixi esse tonum eorum plus minus vitiatum: quando ergo fibræ renales laborant atonia, seu quasi resolutæ sunt, fiunt flaccidæ, & connivent; unde supervenit suppressio urinæ: nempe hæc atonia est istud vitium, quod vulgò vocarunt imbecillitatem renum ex facultate secreticæ aut attractricis læsa natum. Jam verò, cum omnes istæ partes agant per structuram partium mechanicam, relinquamus has facultates illis, & dicamus; consistere has reverà in atonia renum, i. e. tali nervorum renalium & canaliculorum fibroforum laxitate seu flacciditate, ut defectu imprimis spirituum animalium non sustineantur in debita tensione, quin potius & nervi & ipsi canaliculi fibrosi postmodum quasi resoluti & flaccidi concidant, indeque orificia conniveant, ita ut propterea parum vel nihil de sero sanguinis transmeare, ac ex sanguine secerni possit. Exemplum siquidem aliud illustre videb. in *Bartholino Centur. 4. Epistol. 18. 38. & 39.* qui ex paralyti scorbutica omnium partium corporis inferiorum, talem relaxationem & ischuriam refert. Pertinet huc observatio *Hæchstædterii in observ. Decad. 5. cas. 10.* ischuriæ longioris ex externa renum refrigeratione in marmore nive frigidato, unde postmodum epilepsia & mors; & *Decad. 6. cas. 1.* ab abusu narcoticorum. Quibus insuper accedunt alii renum morbi, e. g. erosio, scirrhus, ulcus, vulnus,

Tom. II.

&c. Quò pertinent morbi acuti, febres ardentes, variolæ, &c. subinde ischuriam conjunctam habentes; unde ischuriam talem absque omni dolore, supervenientem aliis morbis acutis, ceu signum singulare lethale, ob atoniam renum, habet *Horstius lib. 4. observat. pag. 49.* Vid. etiam *Schenckius lib. 4. observat. pag. 464. & sequ.* Pertinent huc suppressiones istæ urinæ, quæ ob dorsii vertebrarum luxationem, aut ictum aut lapsum, aut vulnus spinalis medullæ accidunt, ac in genere quævis alia ischuria, vitio nervorum plus minus resolutorum eveniens, utpote quæ ipsa non minus à paralyti aut laxitate fibrarum renalium ac vesicæ interdum contingere, non impossibile est. Huic atoniæ contrarium interdum observatur vitium, nempe strictura pororum, & nimia fibrarum perforatarum & glandularum renalium angustia, quasi spasmus quodam contractarum, qualem nonnunquam in colica renes pati videntur, & qualis fit interdum in affectibus calculosis, dum uno rene læso à calculo, grumisvè sanguinis irritato, alter ab omni obstructione salvus subinde cessat agere; quod fit ex crispatura & strictura fibrarum, quatenus unius renis fibris convulsis, & ita poris clausis, clauduntur etiam alterius pori propter ramificationis nervosæ communicationem, vid. *Forestus lib. 24. observat. 26. in Schol. item Bartholinus Act. Med. Hassn. Vol. 4. pag. 102.*

3. Denique causa erat fermentum renum plus minus deficient, nec satis acre, aut alio modo vitiatum ac depravatum, unde etiam deficit plus minus transmissio, si nempe deficit fermentum in sua acrimonia & ina volatili urinosa, sub cuius defectu cessat operatio secretionis urinæ, quam tale fermentum promovere solet; sicut hoc ipsum in hydropicis patet, in quibus ex defectu aut alteratione fermenti renalis adest ischuria. Plura videbitis in *Willisii Pharm. Ration. pag. 165.*

## DIAGNOSIS.

Hæc ischuria, quæ fit vitio renum, cautè consideranda est, ne confundatur cum ischuria vitio vesicæ urinariæ obveniente; ideoque causæ antecedentes & symptomata probe pensitanda sunt.

Signa urinam esse suppressam vitio renum, sunt ea, quando nulla urina adest in vesica, adeò ut immisso licet cathetere, seu intrusione cujusdam cannulæ argenteæ, & factâ etiam suctione, exploratio instituatur, nihil tamen excernatur urinæ. Accedit, quod nullus vesicæ tumor circa regionem pubis, nulla gravitas perinæ, aliavè similia symptomata vesicæ, urinam aliàs supprimentia, adfuerint.

(Kkkk 2)

Quodsi

Quodsi accedant signa renum calculosorum, res eò est clarior, ortam tunc esse ex calculis ex obsessis renibus obstructionem urinæ.

Quodsi extra calculi suspicionem gravitas circa lumbos, variaque symptomata corporis ex sero regresso & retropulso contingant, res eò est clarior.

Superveniunt autem suppressionem urinæ symptomata varia, prout nempe seri urinarii in renibus plus minus alterati metastasis ac transcolatio in partes solidas varia, vel sanguinis aliorumve contentorum alteratio & immutatio plus minus gravior facta fuerit. Symptomata ista sunt angustia & anxietates præcordiorum, sudor fœtidus, urinosus, halitus fœtidus, torpor sensuum & omnium facultatum internarum animalium, non raro epileptica pathemata, interdum ascites, & pedum tumores œdematosi, vomitus, &c. Sudor fœtidus interdum plus, interdum minus urinosus est; qui præsupponit jam alterationem quandam à fermento renali factam, ita ut urinæ per pelvim transitus sit interclusus, & ulterius pergere non potuerit.

Quod si vitium sit ex obstructione renum, causæ antecedentes imprimis eam ostendunt: si enim adsint crassi & viscosi humores obstruentes, apparet ex similibus vitiis, quæ monstrant crassos humores, si nempe intestina & primas vias obsideant; item quando urina antea excreta fuerit turbida & crassa cum sedimento copioso, & mucilaginosa, superveniat urinæ suppressio cum gravitate lumborum, signum est renum à tali materia obstructorum. Sin verò sanguis grumofus obstruat renes, monstrant illud imprimis antecedentes causæ, vel casus ab alto, vel si urina cruenta antea emissæ fuerit, & ischuria superveniat, aut equitatio, aut fortis circa renes percussio, aut similia signa & causæ, etiam causa obstruens clara est.

Pus denique infarcire renes colligitur ex abscessibus aut ulcere renum alias consuetis; item quando est empyema aut vomica ex viscere nobiliore, ubi per sanguinis circulum eò defertur pus; vel quando aliàs observata fuit purulentia cum urina excreta, atonia renum, affectus paralytici, vel universales, vel plus minus particulares nervorum innuuntur, spasmus verò dolores circa regionem renum ut plurimum excitant.

Fermenti vitium patescit, si aliis causis ferè absentibus sine debito ac consueto odore & sapore urina excernatur.

### PROGNOSIS.

Prognosi nquod concernit: est vel generalior, & omnibus ischuriæ speciebus communis, vel specialior, seu ad certos casus restricta.

In genere grave ac periculosum malum est

urinæ suppressio, & quidem hæc, quæ renum fit vitio, periculosior ea, quæ fit vitio vesicæ: vid. M. A. N. C. *Ann. 4. observ. 159.*

Item urinæ suppressio, quæ fit vitio renum, si sine dolore, magis periculosa est, quam quæ est cum dolore tensivo, cujus phænomeni rationem Antonius Santorellus *de Sanitatis natura lib. 23. cap. 15.* reddit.

Quodsi symptomata suprâ dicta adsint, ne introeuntis quidem seri in renum parenchyma, indicium erit, adeoque sæpè lethalis est ischuria.

Et quidem quibus urinæ suppressa est renum vitio, si denuò ægri ante septimum diem mejere incipiant, servari possunt; sin minùs, ut plurimum intereunt, quæ communis Practicorum est sententia: quod tamen non semper contingit, sed ferè ut plurimum ad 10. aut 11. diem supprimi potest, antequam mors superveniat.

Licet tamen post septimum diem urina denuò profluere incipiat, copiosa etiam & varia; tamen partim ob infectam febre malfam sanguineam, partim ob vitium partibus solidis affictum, postmodum intereunt; vid. Tulpius *l. 4. observ. 29.* & Rodericus à Fonseca *T. 1. Consil. 87.*

Interim tamen quidam diutius, quidam minus supervivere possunt; testantur enim observationes, urinam per plures dies suppressam ex vitio renum, tamen curatam esse; sic Riverius *C. 4. observat. 45.* & Tulpius *l. 4. observ. 26.* observat ischuriam 11. dierum; item Horstius *l. 4. observ. 45.* quatuordecim dierum ischuriam ex calculo renum, & nihilominus tamen tandem curatam: Forestus *l. 26.* decem ac 18. dierum, ac Cornarius *Observat. 21.* urinam etiam 14. dierum suppressam, observat: ischuriam 22. dierum propter tumorem seu abscessum in collo vesicæ non lethalem, vid. in M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 176.*

Ferè tamen intra 14. dies jugulantur ægri, raro ad 20. vivunt: & quidem si cum urina ita suppressa aut sudor copiosus, aut vomitus crebrior, aut uberius seri per alium locum effluxus, concurrat, diutius supervivere possunt ægri & minùs periculosum est malum: sic Fonseca *l. 1. Consil. 87.* ad 17. dies noctesque, ac per multos menses; item *lib. 2. Consil. 96.* refert, monialem Patavianam, quæ supervixit, licet per 6. menses urina fuerit suppressa, quia sudabat quotidie circa ventrem & umbilicum. Exemplum notatu dignum refert Piso *de morbis ex serosa colluvie Sect. 4. cap. 6.* Ischuriæ in moniali 19. dierum, sed tamen conjunctæ cum sudore perpetuo, adeò ut postmodum etiam curata fuerit: sic observata fuit desperata ischuria vitio renum orta, in qua per umbilicum copiosus sudor fuit ejectus, vid. M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 208. p. 394.*

Ipsemet



Ipsemet aliquando observavi ischuriam vitio renum 17. dierum in muliere, quæ in 17ma die ex usu emulsionis seminis violarum solvebatur, sed cum gravibus insultibus epilepticis, finetamen interitu ægri, quæ nihilominus post aliquot septimanas recidivans lethalis erat; alii e contra citius & ante 7. diem ex ischuria renali pereunt, e. g. intra 30. horas, vid. Hæchstederus *Dec. 6. Cas. 1.*

Insuper urinæ suppressio, quæ est à calculis renum majoribus, si vel dissolvi, vel emitti nequeunt, ut plurimum est lethalis, quia vix potest curari.

De cætero, si à resolutione seu atonia renum evenierit ischuria, semper ferè observata fuit lethalis, adeoque ab Horstio, Schenckio, & similibus autoribus, retentio totalis urinæ in morbo, sine doloris sensu, instantis mortis signum esse asseritur.

*C U R A.*

Quoad curam: ut suppressa urina revocetur, removenda est imprimis suppressionis causa, adeoque vel corrigendum sanguinis vitium, vel renum præternaturalis dispositio. Nempe impedimenta in his removenda, tonus debitus conservandus, fermentum renale acuendum.

Quod attinet sanguinis vitium, hisce succurrimus vel in plethoricis per levem venæsectionem, vel cum ut plurimum occurrant in morbis chronicis, & ischuria tunc sit productum morbosum, per dyscrasie sanguinis correctionem, pro affectus primarii varietate, alterantibus aliisque appropriatis, hinc diureticorum quoque selectus erit habendus, ita ut nunc acida, nunc urinosa, nunc nitrosa, nunc terrea, nunc sulphurea, propinentur.

Quod verò attinet renum dispositionem præternaturalem removendam, hæc immutari debet pariter pro hujus varietate, subinde necesse est, ac sæpè fructuosum, præmittere levem alvi solutionem per laxativa in forma pulveris, cum sæpè observatum sit, alvo irritatâ simul in fluxum concitari urinam, e. g. tartarum vitriolatum, in foliatam ꝑi, &c. cum blando stimulo acuata, uti de vi laxativorum ad urinæ fluxum promovendum vid. Barbette in *Prax. cap. de suppressione urinæ.*

His internis adduntur clysmata terebinthinata injecta, cum oleo terebinthinæ aut succini parata, in specie, si adsit vitium renum obstructorum, idque fiat à sanguinis grumo, curanda venit per sanguinem grumolum resolventia, diuretica, quæ inter in specie rubia tinctorum ejusq; radix & inde paratum Crappi, sperma ceti, succinum, & succinata quælibet, omnis enim vis diuretica à sale volatili succini cum Helmontio derivanda, sive malum sit à crassis humoribus, sive sanguine congrumato, sive pure, lapilli cancerorum cum aceto assumpti, & alia simplicia vulneraria se-

lecta, chærefolium, agrimonia, hederæ terrestris, ac fœniculum; item hypericon, ejus flores & semen, & similia plus minus diuretica, conducunt. Hypericon enim potenter urinam movet, unde etiam internè, cum sit vulnerarium, in purulentis, & sanguinis grumis convenit, inungendo simul externè regioni renum & lumborum oleum scorpionum, oleum ceræ, item petroleum, & similia. Sin verò obstructio renum sit à pure, terebinthinata simplicia vulneraria, in specie balsamus sulphuris terebinthinatus aut juniperinus, succus aut syrupus de hederæ terrestri, essentia & extractum agrimonie, hyperici, &c. profunt. Quod si pituita tenax & glutinosa renum meatus ac tubulos obstruxerit, præmissis laxantibus, cruditates pituitosas per alvum evacuantibus, conveniunt hanc dissolventia, pro varietate sc. causarum, diuretica blanda, imprimis raphanacea quælibet, alkekengi, succus limonum, vel solus, vel cum vino, succus parietariæ cum oxymelite, in specie salina, ut ꝑi-latus, R ꝑi, Θ volatile succini, ~urinæ, Θiaque volatilia, ~urinæ, seu sal ejus volatile, item Θ volatile ammoniacale, & similis generis remedia, hinc mixtura Sylvii in *Praxi lib. 1. cap. 55. §. 62.* sunt proficua. Radix raphani, in specie ejus succus, item armoracæ radix in vino infusa & pota, ubi vel arena, vel sabulum vel mucus viscidus obfesserit renum tubulos, in specie conducunt & urinam promovent. Succus limonum & citri admodum egregius est in hoc casu, egregiè incidens & dissolvens mucum viscidum in renibus, si ad ʒij. vel iij. usque ad jv. in ▽ appropriata assumatur, multum laudatur ab Amato Lusitano *Cent. 5. observ. 71.* sicut & Helidæus Paduanus succum limonum cum oxymelite propinat, ubi renes à sordibus viscidis obsidentur, in quo casu etiam spiritus salis dulcis non est incongruus in decocto diuretico, v. g. radice petrolelini, in jure cicoris rubri, præsertim spiritus vitrioli Philosophicus, unde apozema Sylvii *lib. 1. Prax. c. 55. §. 61.* non incongruus erit. Cnæfeli *Ann. 3. M. A. N. C. Observ. 208.* extollit spiritum salis ammoniaci acidum per se præparatû in omnibus obstructionibus exilium vasorum, tanquam præsentissimum remedium, imprimis in hoc casu: item, ex vegetabilibus conveniunt fructus alkekengi, radix rubiæ tinctorum, herba parietariæ, ejusque succus recens expressus cum oxymelite assumptus, quod experimentum est Helidæi Paduani. Sed necesse est, sit parietaria, quæ in rudibus parietum antiquorum crescit: quia hæc sub nutrimento secum sal nitrosum in parietibus ratione calcis vivæ latitans attrahit. Quod si à calculo sit renum obstructio, conveniunt vel hunc maturè pellentia diuretica, vel eundem diffringentia; abrotani comæ pulverisatæ ad ʒi. cum tantillo ʒi iis commendatur,



datur, quibus ob calculum urina supprimi-  
tur; vid. Simon Pauli in *Quadrip. Botan.*

Quodsi ischuria oriatur vitio renum in to-  
no suo vitiatorum, tunc in atonia nervina a-  
romatica, imprimis terebinthinata, baccæ  
juniperi & juniperina, nobilia sunt, unde &  
malvaticum juniperinum, speciatim comen-  
dandum; item ~ baccarum juniperi & ole-  
um destillatum, cum juniperina ratione vir-  
tutis aromaticæ sint nervina; item cinnaba-  
rina & succinata specificè conducunt. Pri-  
matum obtinet sal volatile succini excellen-  
tissimum diureticum, quod Helmontio me-  
ritò audit apex remedium diureticorum,  
si à gr. vj. vel xij. in  $\nabla$  appropriata usurpetur.

Sin verò ex contractura spasmodica fibra-  
rum renalium vitium oriatur, curanda est per  
opiata, item cinnabarina, imprimis cinnaba-  
rim  $\zeta$ ii cum  $\Theta$ e volatili succini: quò forsan  
quoque facit, quòd Deckerus in *Prax.* refert:  
Mithridatium cum decoctione quadam diu-  
retica datum mirificè urinam provocare. Huc  
spectat vitrum in pollinem redactum, à ne-  
mine hætenus, nisi à Gesnero *lib. 3. observ.*  
4. 5. & 6. commendatum.

Quodsi fermentum renale hebetatum, aut  
iners plus minus factum fuerit, tunc semper  
conveniunt propriè sic dicta diuretica; nunc  
acria salina urinosa, tam volatilia quàm fixa,  
dictum fermentum renale acuentia, & acri-  
monia suâ quasi stimulantia, & secretionem  
promoventia; nunc simul oleosa temperata:  
v. g. radix raphani, tam orbicularis quàm  
armoraciæ, succus raphanorum, & quæcun-  
que ex raphano præparata remedia; item ra-  
dix armoraciæ vino infusa & pota, quibus  
meritò addenda capita allii & cepæ,  $\Theta$  &  
~  $\square$ æ per fermentationem, ~  $\Theta$ \*ci, ~  
lumbricorum per putrefactionem, infusum  
cantharidum,  $\Theta$ ia fixa  $\Theta$ ia ex simplicium  
diureticis, ac tandem terebinthina, junipe-  
rus, semen violarum. Hisce jungi debet se-  
men erysimi, *wilder Senff* /  $\Theta$ inum, & a-  
cre gustui, ad 3j. in forma pulveris assumptum  
in vino albo; vid. Fonsæca *lib. 1. Consil. 10. &*  
*lib. 1. Consil. 96.* De parietaria supra dictum.  
Flores tunicæ, & in specie cyani, calcatrip-  
pæ, præsertim juncti in vino cocto vel con-  
servæ forma ~ u  $\Theta$ is acidulati & propinati,  
blandè urinam cient. Sunt remedium agri-  
colæ usitatum. Ulteriùs folia ribes nigræ,  
urinæ odorem spirantia; egregiè urinam pel-  
lunt: item hederæ arborea, ejusque baccæ,  
sunt usitatæ: Glomi cynosbati, & eorum pul-  
vis, & ex his paratus ~ Hartmanni, sunt sa-  
tis decantati. Herbarum ononidis & hederæ ter-  
restris sunt satis utiles. Denique succus pa-  
stinacæ luteæ seu siferis alterius Matthioli per  
quàm egregiè urinam promovet, etiam aliis  
remediis irritis; in specie puerorum urinas  
suppressas mirò effectu hic succus stimulat.

Salia volatilia ~ &  $\Theta$ \*i, item tinctura ne-  
phritica diuretica Ammelungii clyssiiformis,  
~ etiam carminativus, quæ omnia spiritu vo-  
latili tartari maximam partem participant; o-  
ptima sunt diuretica, urinas pellentia; idque  
ubi copiosius vinum hauritur. Imprimis spi-  
ritus tartari, si eousque volatilifetur arte, ut  
fiat instar ~  $\Theta$ \*ci, habetur potentissimum  
diureticum, in specie calculorum præserva-  
tivum. In specie porro inter acria diuretica e-  
minet  $\Theta$  volatile succini, quod nobile est, &  
Helmontio commodè diureticorum apex  
vocatur; loco ejus tamen  $\rho$  destillatum est  
egregium, imprimis in sanguine grumoso ra-  
tione hujus  $\Theta$ is acris commodè adhiberi po-  
test. Pertinent huc insecta, lumbrici, scara-  
bæi Lucanici, coccionella, aselli, ac impri-  
mis cantharides. Hæc insecta sale volatili  
acri subtilissimo perquàm diuretico insigni-  
ter pollent, adeoque perquàm in ischuria  
conveniunt: ex lumbricis nempe terrestri-  
bus spiritus per fermentationem seu putredi-  
nem paratus & rectè rectificatus, vel recen-  
tes vino contriti & expressi, egregiè profunt.  
Pulvis asellorum, aut hi ipsi vino infusi & ex-  
pressi & potati, multum conveniunt ad pro-  
liciendam urinam. Cantharides, *Spanische*  
*Gliegen*/multis videntur suspectæ, sed vinori-  
te infusæ & maceratæ ita corriguntur, ut  
potentissimum diureticum subministrant, si  
vinum filtratur, & aliquot cochlearia propi-  
nentur. Loco horum spiritus lumbricorum,  
vel ipsi lumbrici v.l. vj. aut aselli benè loti, lin-  
teo inclusi, contriti vino infusi, expressi &  
potati, promptè urinam eliciunt; vid. Hil-  
danus *Cent. 6. observ. 50.* Hisce animalibus  
acrioribus addendum quoque vile illud qui-  
dem, sed optimum remedium, fimus nempe  
equinus; observavit enim Forestus, urinam  
ad 14. dies noctesque in rustico suppressam,  
aliis irritis, fimo equino curatam, infunden-  
do hujus 3ij. in vino Rhenano, exprimendo  
& exhibendo, & ecce! urinæ largior secutus  
est fluxus ratione  $\Theta$ is ammoniacatis, quo est  
imprægnatum. De hirco res nota est, quod  
sicut cervus totus est alexipharmacus, ita hir-  
cus est diureticus; unde urina hirci calida  
pota, omento & intestinis hircinis ad ventrem  
applicatis, in desperatis casibus admodum lau-  
datur. Juxta hæc  $\Theta$ ia fixa urinosa acria &  
salsa diuretica, aut his similia aut cognata  
concreta fixiora terrea animalium partes du-  
ræ, præ ceteris marina, conveniunt: v. g. lapi-  
des cancerorum, qui egregium temperatissi-  
mum in se habent sal alcali, vino aut aceto  
infusi, & ita simul potati, pro urina elicien-  
da nobilissimi sunt; nam cum acido fiunt e-  
gregiè diuretici, in specie ubi sanguinis gru-  
mi adsunt, in quo casu cum decocto chære-  
folii, vel rubiæ tinctorum, vel hyperici, seu  
vulnerariorum exhibeantur. Post lapides

can-

cancrorum sunt testæ ovorum, in specie eâ,  
ex quibus jam exclusi sunt pulli; quæ vel cru-  
dæ, vel calcinatæ, quod melius, ut quibusdam  
placet, ad ꝑj. assumptæ, omnia reliqua supe-  
rare dicuntur à Barbette, calcinatæ sunt instar  
cujusdam calcis vivæ, quæ per se vel vino in-  
fusæ assumptæ potenter urinam pellunt. Po-  
tentioris tamen adhuc efficacix sunt testæ o-  
vorum struthiocameli, quæ vel crudæ assump-  
tæ, vel in spiritu salis dissolutæ ita liquorem  
egregiè diureticum constituunt. In oper-  
culis cochlearum, quæ sponte suâ vere novo  
erumpentes remonent, singularem prædicant  
virtutem diureticam, & instar arcani summi  
in urinx suppressione & calculo comendant  
nonnulli, si pulvis ejus cum tantillo ~salis  
mistus, sive per se part. ij. cum parte una la-  
pillorum cancrorum propinetur: Vid. M.A.  
N.C. Ann. 9. observ. 79. Pertinent huc salia  
fixa cineritia ex plantis diureticis & nephri-  
ticis debitè calcinatis prolicita, ita nempe, ut  
non perfectè alcalisentur, sed potiùs salta  
permaneant: nam omnia vulneraria & omnia  
diuretica in se habent sal fissum, & etiam istud  
in cineribus relinquunt. Unde etiam tartar-  
us vitriolatus potentius est diureticum, quàm  
ipsium sal tartari fixum, adeòque sal fissi co-  
lumbini, stipitum fabarum, Ogenistæ ritè  
secundùm Tacchenium paratum, O prunel-  
læ, &c. urinas egregiè cient. Sali fissi colum-  
bini non cedit ipse finus columbinus nitro-  
sus vino infusus, solutus, expressus & propi-  
natus; blanda enim vini aciditas concurrens  
cum alcali stercoris dat tertium falsum, aliàs  
vix esset diureticum. Huc faciunt tartarea  
remedia, ut ~Qi volatilis, & sal ejus vola-  
tile, quæ in ischuria ex vini potu orta mul-  
tum præstant: O Qi, O latus, R Qi, omniaque  
tartarea, cremor tartari cum O Qi, junctus,  
tartarus tartarifatus dictus.

In filicibus calcinatis, & subinde in vino extinctis, latet etiam vis diuretica non vulgaris; nam vinum istud extinctionis filicum urinam remorata[m] provocat.

Omnibus his annumerandus succus betulae seu aqua betulina ex arbore incisa profluens, vid. Helmontius in *Lithiasi*.

Tandem terebinthina quacunque ratione usurpata est egregia in urinæ defectu, singulariter renibus & affectibus urinariis dicata: nam est singulare remedium ad urinam suppressam, ad detergendos & abstergendos renes, eorumque corrigenda vitia: in specie ꝑo destillatum terebinthinæ, & balsamus sulphuris terebinthinatus, item pilulæ de terebinthina apprimè hic conducunt, vel ipsa terebinthina Veneta à ℥iij ad ℥ss. c. s. q. vitelli ovi no. j. l. q. s. & aquæ graminis vel appropriatæ q. s. addendo nonnihil succi limonum, fiat mixtura instar emulsionis, quæ egregiè urinam promouet, & renes mundificat. Conf.

Platerus in *Obs.* ubi de affect. urinariis, pag. 810. 814. & 820. item Tunæus in *Epist.* pag. 242. Addendum est nonnunquam mel, præsertim in pure renum: utut non omnibus æquè conveniat, cùm mulieribus quibusdam propter mellis societatem hysterica pathemata excitare soleat, c. g.

из. тербинт. Венер. 58.

c.f.q. vitell. ovar. &  $\nabla$  gram. vel fragor. f.

Emulſio. Sed eſt ingrata

Vel *res. terebinth. Venet.*

*mellis* ā 𐭪𐭫.

vitell. ovi no. j.

succ. limon. ʒi.

Δ gram. q. f.

M. in consistentiam emulsionis; D.S.

Harntreibende Milch auff etliche mahl.

Est egregium remedium : nam succus limonum per se est egregius, ubi renes sunt infarcti à crassa materia & humoribus, si ꝑij. vel jv. assumantur.

Item emulſio ex ſola terebinthina cum aqua  
fragorum, mediante ovi vitello conducit.

Semen tandem violarum purpurearum, & inde cum  $\nabla$  veronicæ vel appropriata parata emulſio, evaporiston eſt optimũ, Hartmanno & Cratoni inſigniter comẽndatum, urinam, imprimis vitio renum ſuppreſſam, blandẽ, ſimulque alvum laxat. Vocatur emulſio nephrocathartica, e. g.

℞. *Sem. violar. purpur.* ℥iij.

*lithosperm.* 31.

c. f. q.  $\nabla$  petrosel. l. fragor. f. Emulsio.

Additissimul possunt testar. ovorum pulverisat. vel calcinatar. vel testarum ovorum struthiocameli, ʒi. edulcoretur parum.

Externè promovet urinæ fluxum inunctio cum oleo ſcorpionum & unguento dialthæ; ſicut & petroleum hoc in caſu externè illitum nobile eſt : quibus addendum eſt ꝑ deſtillatum terebinthinæ, cumini & camphoræ:

Vcl ℞. Unguent. dialth. ℥iij.

♄ *scorpion.* zij.

destillat. terebinth. ʒj.

M.f. Linimentum : S.

### Harn-befördernd Sälblein.

℞. Petrol. alb. ʒiij.

♂♂ *scorpion*. Zij.

destillat. bacc. junip. l. terebinth. 3j.

Misc. pro litu blando.

D. S. ut antè.

MEMBRUM II.

De

### Calculo Renum.

**C**Ausas inter, quæ meatus renales obstruendo urinæ secretionem impediunt, crebrior est calculus renû, qui præterea etiam urinæ excretionem per vesicâ non raro tollit. In renibus quidem quando hæret, secretionem & distri-



distributionem; quando verò in vesica subsistit, aut ejus collum & meatum obstruit, urinæ excretionem impedit. Equidem calculus in se non est morbus, sed saltem productum morbosum, effectus sc. illius renalis affectus, qui aliàs propriè Lithiasis dicitur, & significat dispositionem talem renum & vesicæ calculosam, à qua facillè urina mutatur, & successivè generatur calculus. Productum verò hoc morbosum calculus ipse, à Paracelso propriè duelech vocatur, quali diceret concrementum quoddam ex duobus contrariis mutuò coagulatis & arctè junctis. Quod attinet calculum renum & vesicæ: sub uno conceptu considerantur, quia se mutuò subsequuntur sæpiùs. Notum autem aliàs est, observatos esse calculos ubique in universo corpore, tam partibus solidis, ut renibus, lingua & cerebro, quàm liquidis, ut in folliculi fellei liquore, & in massa sanguinea genitos; frequentissimus tamen & ordinarius eorundem nidus sunt renes, vesica urinaria, & hinc vesicula fellea, nempe propter sal alcali copiosius ibidem hærens: & si in aliis partibus observati fuerunt, rariùs tamen hoc factum fuit. Isti verò calculi, quando vesicæ incumbunt, ut plurimum ex renibus, utpote in quibus acidum manifestum cum alcali volatili & terrea urinæ substantia coagulatur; vid. Tacchenius *Hipp. Chim. c. 14.* vel calculi minuti forma, vel arenarum macularum facie, successivè in vesicam illapsi sunt, utut ibidem retenti successivè augmententur, adeò ut credam, rarissimum esse vesicæ calculum, qui in eadem prima rudimenta concretionis ponat; utut omnes majores calculi, qui amplitudinem ureterum, tam naturalem, quàm morbosè auctam, superant, omne suum incrementum in vesica acquisiverint. Dico morbosè auctam: observatum enim, quò sæpiùs calculi per eam transierint, eò magis soleant distendi: in iis enim, qui sæpiùs calculo laborant, ex crebriori calculorum majorum transitu ureteres interdum ad digiti amplitudinem distenti reperiuntur; quando igitur in vesica hærent calculi majores his ureteribus, infallibile est, acquisivisse illos augmentum in vesica.

Hi lapides sunt concretum tertium salsum, ex sale volatili urinæ cum acido stomachali oberrante coagulatum. Quod attinet modum generandi, seu causam efficientem calculi renalis: materialiter & formaliter ex urina oritur. Non confundendus est modus, quo generantur lapides veri in macrocosmo cum hujusmodi concretionem arenosa in microcosmo; dispar enim ubicunque est ratio. Nam quod plures de succo petroso, spiritu lapidifico aut Gorgonio proferunt, qui vel spontè in petras abeunt, vel alias res in petras transmutant, saltem nuda sunt nomina, nil

explicantia; quin potius causa efficiens, quæ cum materiali coincidit, fieri videtur per modum coagulationis duorum salium contrariorum & præternaturalium, acidi præternaturalis & alcali volatilis urinosi. Nempe calculos generari puto, dum acidum manifestum, adeòque vitiosum, in specie digestionis primæ errore ex stomacho dilapsum, occurrit sibi contrario alcali volatili seu urinoso puriori in renibus vel reliquis partibus, cum quo promptissimè & necessitate naturæ concurrendo coagulantur invicem in concrementum arenosum. Hoc ipso in concursu simul levem terrestrem substantiam, in omni urina reperibilem, & quicquid coagulationi aptum simul apprehenderint, id cum urina potus ad vias urinarias delatum cum his duobus unà coagulum suscipit, & ita arenulas, ut majores & diversas, ita & firmiores constituit, & in siliceum concretum abeunt. Hinc adeò duræ evadunt exinde arenulæ calculosæ, quarum firmitudinem seu durtiem mirandam in poliendo & corrodendo vitro exploratam videre possumus in Panarollo *Pentec. 4. observ. 25.* qui pariter arenularum, tam albarum quàm rubrarum, diversitatem cum microscopio examinavit in *Pentec. 1. observ. 35.* Nempe triplex calculorum est diversitas, ut plurimum nunc alborum, nunc ruborum, nunc rufforum seu flavorum, qui frequentissimi: flavedo est simpliciter urinæ silius progenies, ex sale nempe urinæ coagulato: calculus albus fit, quando subcoagulatione duorum horum salium simul concurrat mucilago quædam viscida, ex vitio nutritionis renalis oriunda, aut ex attritis membranulis renis transudans; quæ unà cum salibus istis concreta calculos albos constituit: rubescences econtrà & obscuri calculi fiunt, dum minutissimæ sanguinis guttæ ex uno vel altero vasculo, aut eroso aut lacerato, transudantes simul coagulantur & concresecunt: hinc calculi candidi sunt longè duriores, quàm rubri & ruffi. Plura de generatione calculorum videb. in *M.A.N.C. Ann. 4. & 5. observat. 167. pag. 220.*

Hæc duo elementa salina calculos componentia confirmantur ex examine calculorum chimico: hi enim quando destillantur, oleum fetidum & empyreumaticum, spiritum urinosum, instar urinæ, & sal volatile in notabili quantitate præbent, remanente capite mortuo instar calcis vivæ: vid. Tachenius *l. 1.* & Helmontius *Tract. Tartarus non in potu §. 7.* An verò alcali hoc urinosum, frustulis calculi à destillatione relictis & friabilibus planè denuò affusum, eadem solidissima iterum reddat, prout Tachenius perhibet, ejus asserti fides sit penes autorem. Ex hoc interim patet adesse

1. Sal volatile oleosum urinosum.

2. Simul



2. Simul subesse acidum propter effervescentiam infusione  $\Theta$ is alcali.

Ex hoc habemus binos coagulatores, duo salia, acidum & alcali, quæ duo invicem coeundo se uniunt, & quicquid simultaneæ coagulationi aptum, arripiunt & coagulant in consortium lapidis. Idem calculus per calcinationem quoque alcalisatur; si cum dupla portione carbonum mixtus  $\Delta$ e reverberii per 5. aut 6. horas calcinetur, postmodum cum aqua calida solvatur, filtretur, & crystallisetur. (2.) Confirmat id odor & sapor calculorum; omnes enim calculi, etiam per aliquot annos asservati, urinam spirant, sicut triti aut affricati, item pulverisati. Nec (3.) aliud volunt, v. g. Helmontius *Tract. de Lithiasi*, qui aliam producunt mechanico-chimicam rationem generandi, si nempe coagulum fieri volunt à spiritu quodam vinoso, concurrente cum spiritu urinæ; non secus ac  $\Psi$  rectificatissimus subito coagulatur in consistentiam opacam seu offam albam, cum permisto spiritu urinæ volatili per fermentationem parato, aut loco hujus  $\sim$ u  $\Theta$ is  $\times$ ci cum  $\Theta$  parato. Id quod fieri putant ratione subtilis acidi in  $\Psi$  adhuc reperibilis, alcali volatile in  $\sim$ urinæ arripiens; utut integrum experimentum adhuc claudicet, cum non propriè dicta coagulatio, sed saltim apparens, & pinguedinis ex spiritu vini præcipitatio sit: nihil crystalliforme apparet in offa hac Helmontii;  $\sim$  $\Theta$   $\times$ ci enim phlegma  $\Psi$  statim assumit, unde ratio patet, quare idem spiritus urinosus à calce viva abstractus non ampliùs cum  $\Psi$  ita concrefcere soleat.

Ut ista duo elementa calculi, acidum & urinosum, meliùs cognoscantur, quoad acidum observandum est, quoad ordinariò ferè arthritici confirmati sint etiam calculosi seu nephritici, & contra; aut calculosi etiam ut plurimum sint, aut evadant etiam, arthritici; quatenus hi duo morbi dependent ab acido præternaturali in stomacho genito, quod pro varietate partium, quas affligit, varias dat turbas, & quod articulis dolorem infert, in renibus coagulat calculum. Porro utrumque malum commune & endemium videtur iis locis, in quibus vina bibuntur copiosiora & acidiora pro potu ordinario, ut sit in regionibus ad Danubium sitis, e. g. Franconia, Moravia, Austria, & similibus locis. Nempe idem videtur esse efficiens acidum, quod artuum nervosas partes pungens & rodens sinoviam in iisdem coagulat in nodos, quod in renibus similibusque in locis alcali urinario occurrens, istud in calculum cogit. Adeoque in talibus acidum copiosius sub falso urinæ sapore occultatum oritur ex primis viis, v. g. ex vino copiosius ingurgitato, indeque citra vomitum retento, hinc vitiosè digesto, quod acidum vitiosum ex stomacho dila-

plum, ut suo isto acore universo corpori est hostile, & ubique dolores ac punctiones infert; ita copiosiorum  $\Theta$ inis urinæ contentis materiam suggerens, seu illuc pertingens, sub forma  $\sim$  seu acidi paulò fixioris sub urina potus, & in eadem reperiens alcali quoddam volatile, ab acido debito non ritè saturatum, subito hoc aggreditur, & in calculum cum coit. Experimentum etiam habemus elegans, vinum in topfos & calculum coagulari: recipiatur nempe  $\Theta$  per carbones perfectè fixatum, misceatur cum parte silicum, fundantur  $\Delta$ e forti, coeunt in vitrum: hoc effusum in laminam aurichalceam, citò pulverisetur: huic affundatur  $\Psi$ , & brevi post tingeretur colore rubro hyacinthino, effundatur, & novus spiritus affundatur tandem menstruo spatio sit 3. rubicundissimum, cujus aliquot guttæ in vitrum vini instillatæ mox coagulant vinum in substantiam gypseam, similem calculo seu topfo in articulis podagricorum. Ratio est, quia alcali  $\Theta$ i urinosum cum spiritu vini exaltatum arripit acidum vini, quod coagulat in calculum seu substantiam topheam. Propter hoc acidum vitiosum vini tales incolæ etiam affecti sunt paresi, præcipuè ex colica, seu artuum post colicam contractura, affectu apud nos raro, ac reverà colicarum convulsivarum gravissimâ speciem, ab acido in intestinis torminoso, in artubus verò stupefactivo. Facit huc imprimis exenteratio calculosi cujusdam, cujus omnia contenta liquida acidum intensè spirabant: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 243. pag. 344.* Hinc est, quod Thonerus in *Observ.* dicat: melancholicos esse dispositos ad calculum, minùs biliosos; quia in melancholicis abundat fermentum seu succus calculosus. Ratio hæc est, quod in biliosis prædominetur  $\Theta$  volatile alcali, in melancholicis verò obtineat acidum.

Efficientis igitur locum acidum obtinet, nunc ipsius urinæ, nunc verò ex primis viis elapsum copiosius, inde urinam magis imprægnans & salsiorem reddens, & ita copiosiorum aut firmiorem calculorum genesis promovens; unde etiam vomitoria subinde à calculo præservant, contenta primarum viarum eliminando: id quod etiam faciunt vel terrea lapidea fixa, aut calcinata, quatenus acidum absorbent; vel per alcalia, tam fixa, quàm volatilia, acidum in salum mutantia, & per urinam evacuantia.

Præter hoc acidum alcali præsentiam in calculi genesis illustrat, quod frequentissimè calculi, imò in tota œconomia animali humana frequentiores non, quàm in renibus, & hinc in vesica fellea reperiuntur; quia in his locis manifestius reperitur alcali volatile urinosum, quod promptè potest corripi ab acido vitioso, cum naturaliter constituta urina sit salia, &

consequenter alcali jam ab acido sit saturatum, vix ex eodem, quâ tali, generari poterunt calculi; nam cum falsus sapor ex acido & alcali volatilibus, debitâ proportionem & coagulatione unitis, originem ducat, tam cum acido quàm cum alcali permiscibilis est, sine ulteriore immutatione; unde in cætera sanis, utur urinæ instillantur acida, aut licet urinæ in corpore permisceatur acidum, v. g. in stranguria, quæ oritur ab acido insensibili ex primis viis præternaturaliter urinæ permixto, tunc tamen non generantur calculi, quoniam acidum per se solum non sufficit, & sal urinæ tunc temporis naturaliter constitutum est, h. e. ☉ volatile urinæ falsum, seu à comparari suo acido debitè saturatum, existit, unde non potest coagulari ab eodem, vel alio quovis vitioso acido, ac pallida quidem ac turbida nonnihil, non verò in arenulas spissata excernitur urina. Aliud quid ergò subest: nempe ut coaguletur alcali urinæ ab acido ex primis viis delapso in lapidem, necesse est, ut sapor urinæ falsus dividatur, i. e. ut istud alcali volatile urinæ per se existere incipiat, & purius ac manifestius fiat. Dum enim ita urina facilè suscipit putredinale fermentum, ab acido proprio nonnihil separatum, nec debitè saturatum existat, ut ita promptius ab acido plus minus naturali aut vitioso corripitur, & ita in calculum constringi possit. Fit hoc, quando urina in renibus alterationem præternaturalem, uno nomine aliqualem putredinis præternaturalis notam, incurrit, quâ dissolvitur nonnihil ejus mistura, & ita sapor ejus falsus dividitur ut abundans ☉ alcali, & proprio prædominans acido, ab eo nonnihil separatur, & utraque salia hæc activa manifestiora fiant, donec novo & planè heterogeneo coagulationis modò societur, aut præternaturali acido vitioso, alcali denuò sub coagulationis jugum mittatur, & demum in calculum coëat: v. g. videmus, quod urina sanorum hominum clara & perspicua excreta, si ad tempus in matula, præsertim stannea, aut vase vitreo steterit, imprimis tempore æstivo aut in loco calidiore, ut corrumpi & leviter putrescere inchoet; quod tunc arenulæ, & successivè calculosa crusta, parietibus sese affigat, quod fit per putredinem, separatim salibus, proprium urinæ acidum, debile licet & paucum, ☉ tamen volatile proprium aliqualem putredine separatum ac resolutum, denuò novo coagulo spissat, & ita in novum concretum, arenulas, cogit, quæ instar tartari lateribus matulæ adhærent; nempe nunquam urina, nisi cum alcali fixo præcipitata aut putrefacta, suum sal volatile promittit, ubi simul etiam terrestrem & quasi sabulosam faburram putrescendo de se reddit.

Illustratur & confirmatur hoc negotium

imprimis historiâ Helmontii *Tract. de Lithiasi* de Jurisperito, qui ex esu asparagi copiosioris contraxit nephritidem. Asparagus enim eo ipso, quo intensè fœtidam reddit urinam, (qui fœtor nota est certa inchoatæ in urina putredinis) eam ad aliqualem putredinem, & ita salium divisionem disponit, unde vitiato sale alcali oleoso, separatoque ab occurrente vitioso acido, facile fiunt calculi; sicut è contra macis, juniperus & terebinthina, dum balsamicâ vi renibus amicissimâ urinam à corruptione præservant, & suaveolentem reddunt; etiam lithiascos suo modo sunt remedia.

Alteratio verò hæc urinæ putredinalis fit in renibus ab horum fermento alterato, plusque minùs enervato seu inertito reddito; quod sicuti in statu naturali constitutum promovet urinæ secretionem, & eam certo modo alterat, ita, si fermentum hoc in renibus fuerit præternaturaliter alteratum & corruptum, ut deficiat in debita alteratione urinæ, & sic degeneret & disponatur per renes colata urina ad præternaturalem sui putredinem in renibus, fit, ut corruptione ejus ☉ volatile oleosum separatur, & cum acido præternaturali concurrendo tales affectus calculosi orientur. Lithiasis ergò seu dispositio renum ad calculos consistit in fermento renum corrupto: ipsum verò ejus productum seu calculus fit ex sale volatili urinæ, coagulato ab acido urinæ, mediante alteratione urinæ putredinali; unde quia difficulter corrigibile est hoc vitium, difficilis etiam est lithiascos eradicatione. Cæterum fermentum hocce renum vitiosum est primitus acquisitum, nunc vitio diætæ, ut ab asparago, aut similibus simplicibus diureticis, quæ omnia urinam reddunt fœtidam; unde fermentum renum labefactatur, atque ut probabile videtur, occasione vitiosi acidi fermentativi ex primis viis, adeoque vitio fermenti ventriculi sub urina potus, aut quocunque alio modo, ad renes transmissi, enervatur; nunc communicata lithiasis seu transplantata, idque vel à parentibus ad liberos, vel etiam cum lacte nutriticis, quale exemplum lithiascos ex nutrice lacte contractæ habet Helmontius *Tract. infantis nutritio ad vitam longam*; sicut aliàs in vulgus notum est, hæreditarium malum esse lithiasin.

Ex his patet: dispositionem quandam certam inesse renibus ad generandum calculum, falsumque esse dogma, quasi hi ex his vel aliis alimentis præcisè generarentur; sub quacunque enim diætâ in prædispositis oriuntur calculi, in non-dispositis verò nulli, licet eodem nutriantur victu. Ponamus enim septem individua, unum idemque alimentum, & potum assummentia, ubi sanus ex alio fermento non generabit calculum; cujus autem renes in fermento debili corrupti sunt, ex omni ali-

mento



mento in lithiasin incidet. Interim tamen in dispositis est ratione alimentorum quædam differentia, prout scilicet

1. Eadem plus vel minus in primis viis accescunt, plus vel minus disponunt ad calculi generationem.
2. Prout magis vel minus eadem glutinosa sunt, eatenus quoque in dispositis plus minus duri generantur iidem.

Hinc post lacticia & caseosa, similiaque assumpta, sæpius renascuntur calculi, non quod materiam, quæ facile in calculos abit, in se contineant, sed quoniam hæc partim acido vitioso in primis viis facile corrumpuntur, partim alcali terreo promptè in calculum coagulabili sunt imprægnata, & postmodum cum urina potus ad renes delata promptissimè cum reliquis salibus coagulantur; vid. Salmuth *Cent. 2. observ. 97.* qui exemplum habet ex abusu casei, calculo vesicæ lethalis ad magnitudinem ovi gallinacei concreti. Vina ratione salis acidi fixi magis prædisponunt ad calculum, quatenus magis acidum coagulabile continent.

Hoc modo producantur ex iis causis occasionalibus ut plurimum nunc parvulæ tantum arenulæ & granula in renibus, in specie in pelvi, rariùs massulas majusculas compingi arbitror; salia enim dum coeunt, minutissima granula constituunt, quæ facile sunt solubilia, quæ læsione membranarum & pelvis, & transudatione succi nutritii aut sanguinis, accessione novarum invicem conglutinatæ, tandem in majores lapillos, nunc verò mox in majora & durissima saxea monstra & tophos concrescunt: adeò ut in confirmato etiam malo totum renum parenchyma his ipsis in lapidem mutatum observatum fuerit, quin & non rarò tota pelvis, omnesque hinc producti tubuli lapideo tali concremento sparsim infarcti & repleti reperiuntur. Notatu dignum talis rei exemplum subministrat idem Salmuth *Cent. 3. observ. 30.* de calculo totam renum amborum cavitatem replente, & urinam per orbitam quandam in lateribus calculi excavatam prodeunte. Arenulæ autem istæ seu calculi minores geniti velociter augmentum capiunt per ureteres in vesicam urinariam delapsi; ipsa etiam vesicæ attritu calculi non nihil vitiata, plorant hæc partes læsæ nutrimentum suum proprium chylosum sub forma mucilaginis crassæ ac spissæ, quæ ipsa mucilago postmodum una cum urina calculosorum excreta, interdum admodum copiosa, habetur vulgò pro pituita, ex qua per calorem arefacta calculi generarentur. Ast falsò, cum, uti dixi, reverà sit alimentum vesicæ proprium & ureterum, ex eorum læsione in vesicæ cavum destillans, & ita excrementum; quod præter Helmontium jam olim demonstravit Joubertus in *Praxi*, jam verò

Tom. II.

hæc ipsa mucilago, uti aliquantum ejus subinde adhæret calculo, ita sæpe circa calculos parvos in vesica coacervatur, unde postmodum successivè supervenientibus salibus coagulabilibus, simul in coaguli consortium rapitur, & exinde calculi primum minimi oriuntur augmentum insigne. Nam isti vesicæ calculi majores lamellatim concreti reperiuntur, seu in quibus instar ceparum corticis, vel lapidis bezoar, vel lapidis ex folliculo bovis felleo sibi mutuò incumbunt, qui ipsi cortices nil aliud sunt, quàm talis mucus pedetentim coagulatus à Sibus istis, mucum in coaguli consortium præcipitantibus. In centro parvus ordinario lapillus, vel invicem coagmentatæ arenulæ, ex renibus per ureteres eò delapsæ reperiuntur, quæ per succum nutritium, & alia ad calculi seu tophi generationem apta accidentia successivè augentur & coagulantur, quod eleganter declarat Boyle in *Philos. Experim. P. 2. p. 20.* Simile reperietis in Borello *Cent. 2. obs. 62.* qui etiam observavit calculum vesicæ, in quo distracto nucleus lapideus inventus est, qui arenulæ instar ex renibus descendens in vesica exinde augmenta lamellatim acquisivit.

#### DIAGNOSIS.

Calculi renalis aut vesicæ signa saltim sunt à posteriore, præbent enim hæc symptomata, quæ ejus occasione superveniunt; quæ sunt pauca vel nulla, dum calculus seu arenulæ sunt quietæ in pelvi vel ureteribus, nisi quod dolor aliquis gravativus, si calculus major subit, afficiat; si quidem calculi etiam insigniores, subinde in renibus latent, absque ullo præternaturali symptomate; Confer. M.A.N.C. *Ann. 4. observ. 29. pag. 31. & 33.* adeoque tunc tolerabile est tempus extra paroxysmum, gravia verò & varia tunc sunt symptomata, dum calculus & arenulæ moventur, & ex renibus ad pelvim & ureteres, & hinc ad vesicam trudentur, & tunc tempus est paroxysmi.

Symptomata omnia oriuntur ex attritu doloroso calculi ad membranas pelvis & ureteris, unde hæc spasmo correptæ & alias partes per consensum simili spasmo affici faciunt: propter quem consensum ratione nervorum renalium ex plexibus mesentericis derivatorum & vomitus & colica tormina supervenire solent; sicuti in mulieribus hysterici excitantur paroxysmi. Adeoque plurima ista & sæpè mira symptomata, quæ calculi aliosque dolores nephriticos insequuntur, partim ex spasmis variarum partium, partim ex retenta plus minus, & per metastasin aliorum translata urina, oriuntur.

Omnia autem hæc symptomata, quæ saltim ex dolorosa impressione dictarum partium originem ducunt, non sunt propria calculi,

(LIII 2)

lo, sed



lo, sed etiam aliis doloribus nephriticis ab alia causa natis, v.g. doloribus nephriticis scorbuticorum, per aciora salia istas partes arrodenda natis communia, ut & eandem originem habere solent: vid. & Riverius *Praxi lib. 14. cap. 1.* & Dravvizi *de scorbuto cap. 9.* Quinimo post multiplicia per consensum pathemata tam facile symptomata nephritica, colica, hysterica, &c. confundi solent, adeo ut non pauca prostant exempla calculorum pro colicis perverso modo curatorum.

Symptomata ergo, quæ in paroxysmo affligunt, sunt varia, ut etiam satis exercitatus Medicus fallatur, imprimis quando calculus incipit moveri, oritur dolor acutus; modò intensior, modò remissior, in regione lumbari, *hinten im Creuze* / minus tamen pungens; isque modò sinistrorsum, modò dextrorsum vergens, prout ren dexter vel sinister est affectus, ac proin rarò dolor punctorius sentitur: simul & sensus & dolor gravativus, plus minus obtusus, seu sensus ponderis gravantis & prementis in dictis locis adesse solet, adeo tamen molestus & cum tantis anxietatibus, junctus ut nec interdiu, nec noctu quiescere queant, dicantq; ægri: *es wäre ihnen / als wenn ihnen ein Centner Blei im Rücken wäre;* quo ipso explicant dolorem istum: *es drückt sie als ein grosser Block.* Ubi verò movetur calculus ex renum pelvi ampliori in ureteres angustos, tunc dolor lancinans, lacerans, & molestissimè tensivus & pungens magis, excitatur, neque cessat, donec calculus ex uretere denuò ad vesicæ cavum descenderit, aut ad renis cavum remeatit. Simul notabile est, quod refert Bartholinus *Cent. 4. Epist. 6. pag. 27.* quod in lithiasi interdum adfit hemicrania, istius in specie lateris, cujus ren calculo est affectus.

Urina subinde variat, cum sub paroxysmo ingruente urinæ paucæ, acres tamen seu admodum stimulantæ & aquosæ minguntur. Subinde perfecta ejus suppressio sequitur, si sc. uterque ren simul afficiatur. Interdum, imò sæpius, urina apparet intensè rubra, crassa, ferè subcruenta & quidem interdum revera est ex permixto pauco cruore, ex vulnere partium, seu laceratis vasculis à calculi asperitate emanante, &c. Interdum tamen talis urina subrubra & quasi sanguinea, perspicua tamen est, absque sanguinis consortio; quin talis urina interdum subrubra, crassa sæpè fit à copiosis salibus resolutis, & cum urina unà excretis, leni, ut alii vocant, tartaro resoluta quod frequenter fit in scorbuto ac malo hypochondriaco. Non igitur terreatur Medicus, quod sit sanguinea, monente Horstio *in Observ.*

Interdum arenulæ quoque in calculosis cum urina excernuntur, quæ fundum matulæ petunt. Verùm subinde excernuntur etiam arenulæ similes in non calculosis, quæ

frequentissimè sunt coloris ruffi, & friabiles, non sunt arenulæ renales, sed hypochondriorum, seu salia coagulata scorbutica; si verò non sunt friabiles, sed duræ, & subinde grandiores, & quæ fundum saltem occupant matulæ, sunt arenulæ renales, & ad calculum disponentes.

Uterius in paroxysmo calculi non possunt se erigere, nec corpus incurvare, sub talibus symptomatibus stupor cruris, ex regione affecti renis frequenter est perceptibilis. Hoc tamen non fit semper, sed in primo saltim calculi paroxysmo; qui enim frequentius calculo laborant, minus solent crurum pathematis affligi. Percipitur etiam dolor tensivus, & quasi contractivus, ex regione lumborum per longitudinem ossis sacri deorsum usque, juxta os ileum secundum ureterum ductum deorsum in regionem pubis & vesicæ terminans; unde etiam in viris similiter testiculus istius lateris, cujus ren est affectus, spasmo quodam correptus retrahitur sursum ad os pubis molestè & dolorosè, quod ipsum observetur pro dilucidando spasmo.

Interdum quoque tenesmus simul corripit ægros calculo renum laborantes, idque observavi in femina, ac notat quoque Timæus von Guldentlee *in Epist. pag. 242.*

Præterea superveniunt simul sub calculo renum anxietates præcordiorum, nausea, appetitus dejectus, non rarò difficilis respiratio, quasi cingulo constringerentur costæ inferiores, ita ut quidam asthmate videantur laborare, cum tamen affectus nephriticus hoc symptoma inducat; idque in consensum renum & diaphragmatis non immeritò videtur rejicere Sanctorius *in Comment. in Art. parv. Galeni P. 2. Digress. 95. pag. 994.* item vomitus enormes subinde insequuntur motum calculi renalis. Imò convulsiones digitorum, brachiorum, pavores dormientium &c. subinde calculo renum supervenire observantur, dolorem quoque titillantem sentiunt in extremitate glandis penis: vid. *Med. Hassn. Vol. 4. pag. 103.*

Frequentissima omnium symptomatum sunt tormina colica acerbissima, cum nausea & vomitu, ac similibus cognatis symptomatibus juncta, quæ sunt nil aliud, quam tormina convulsiva, propter nervos in plexu mesenterico spasmo correptos, ad dictas partes, nempe renes, intestina & stomachum derivatos; nervulis enim renalibus, qui in renibus dolorum sunt organa ex dolore spasmo correptis, continuatur idem spasmus ad plexus mesenterii usque, qui simili spasmo affecti; adeoque calculus renum in viris colicam convulsivam, in mulieribus pathemata hysterica dicta, inferre solet, ut etiam hæc nephritica colica exercitatissimos fallat Medicos. Imò in gravidis calculosis interdum dolores partus mentiri solet, vid. Hæferus: semper

tanta

tanta patiuntur tormina, ut non reculent decies dolores partus sustinere. Pulsus est durus propter spasmus aut convulsivam contractionem fibrarum arteriarum.

Interim hæc symptomata non reperiuntur promiscuè in omnibus calculosis, sed modò hæc in hoc, alia in aliis, ac interdum urgent talia symptomata per consensum nempe vomitus, dolores colici, passiones hystericae, &c. antequam percipiant ægri ullum dolorem circa renes. Interdum colicam patiuntur, antequam calculus in renibus sentiatur, vid. Sennertus *de calculo renum*. In specie stupor erurum innuit calculum.

Probè ergò distinguenda pathemata calculi ab affectibus cognatis, in specie à colica per essentiam, & colica nephritica. Hoc ut ritè fiat, observandum est, quod in colica nullus adsit pedis stupor; item quod in tali colica ægri se possint erigere, cum ii, qui calculo renum laborant, ut plurimum incurvati sint, quasi palus per vertebrae esset transfixus, & non sine doloris exacerbatione spinam rectà extendere, & in rectam lineam flectere possint: colicus dolor fit subito, modò remittit, modò succedit, cum calculi renalis dolor ferè sit continuus: & quidem imprimis locus doloris manifestat, an ex calculo, an ex alia causa sit? nam junctus fixus dolor in dorso calculum innuit, licet alia simul concurrant symptomata, nec in nephriticis talia murmura aut agitationes in intestinis concipiuntur atque in colicis. Alia quoque urinarum est conditio. Dolor quoque vagus in abdomine modò antrorsum, modò retrorsum, modò à dextris, modò à sinistris, colicam innuit. Plura huc facientia videb. in Sennerto *lib. 3. Prax. ubi de calculo renum*, Riverio & Dravvizio *de scorbuto pag. 9.*

P R O G N O S I S.

Quod Prognosis concernit: calculus renum affectus test gravis, nec tantum molestissimus ratione doloris atrocis, sed etiam admodum periculosus ratione symptomatum variorum, in specie, quando inflammationes, interdum exulcerationes renum, vigilæ, febres, ischuriæ lethales, & gravissimi morbi nervosi generis, supervenire solent.

Et foeminae calculo renum frequenter laborantes, si gravidæ reddantur, facile moriuntur, aut abortum patiuntur, vid. Panarolus *Pentec. 3. observ. 8.*

Certè, quò majores aut asperiores calculi, eò res periculosior; & contra quò minor & glabrior, eò minus periculosus, pertinaciter renibus impactus, subinde ischuriam lethalem, aut epilepsiam tandem lethalem excitat.

Calculus renum si crebrò affligit ægrum, inflammationes certè, & has ordinariò sequentes exulcerationes renum infert: vid. M. A. N. C. *Ann. 1. observ. 16. & ann. 2. observ. 81.*

Calculo renum, si ad plures dies noctesque perseveret, neque ullis medicamentis cedat, superveniens frigus extremorum, aut sudores frigidi, idque imprimis cum omnimoda urinae suppressione, mortem in propinquo innuunt.

Econtra si urinae tenues antea excreta, emittuntur crassæ & turbidæ, ac in specie cum sabulo, arenulis, & quasi frustulis lapideis, bonum signum est comminuti quasi calculi & minus solidi.

Interdum certas quasi periodos observat calculus renum, cum teste Helidæo Paduano *in Observat. pag. 156.* si est motus in quarto; in septimo ut plurimum soleat prodire, cæteris nempe paribus; si enim sit magnus, non valet; sic typum tertianarium aliquandò observavi in viro ex calculo nephritico, dum tertio quoque die à meridiè dolores abdominis & lumborum spasmodici reverterentur, & per noctem durarent, donec spontè successivè remitterent.

Lethargus ex nephritide ut plurimum lethalis est.

An unquam curabilis sit illa ad calculum producendi dispositio, quam lithiasin vocant, meritò dubitatur, nisi forsitan in primo statim principio eam observare contingat, qui tamen casus vix dabilis videtur. Minus tamen adhuc spei supererit illis, quibus affectus hic hæreditarius, aut cum ulcere renum contingit: vid. Hippocratis *Aphor. 6. Sect. 6.*

C U R A.

Cura calculi renum est vel in vel extra paroxysmum: in paroxysmo habetur saltem respectus ad motum calculi præsentis & indenta symptomata spasmodica dolorosissima. Ergò ante omnia dolores & partium spasmi, & hinc ureterum contracturæ sistendæ; hinc quantum possibile calculus præsens diureticis blandis & appropriatis promovendus; vid. Ludovici *Harm. pag. 449.* vel specificis confringendus: idque quò citius, eò melius, ne sub mora intra corpus calculus incrementum nimium capiat.

Extra paroxysmum verò si absint calculi, respiciendum, ut præcaveantur, ne denuò regenerentur; si verò novijam incipiant generari, ii maturè diureticorum ope ejiciendi, antequam dolorem pariant, nè nimium incrementum capiant.

Pro his scopis observandum;

1. Ut diuretica, aut lithontriptica dicta, quocunque modò pellentia, imprimis fortiora, in principio fugiantur, dum urgent dolores & spasmi partium abdominis; quoniam malum exasperant; nec prius applicentur, antequam omnes dolores & spasmi cessarent, quia aliàs viæ attritu calculi irritatæ dolorificâ crispatione vel contractione se angustant, & hinc malum exasperant.

(LIII 3)



rant. Si in statu fortioribus diureticis violentius protruditur calculus, crabrones irritantur; adeoque quò gravior dolor in paroxysmo est, eò minus aut mitiora adhibenda diuretica. Saltem ergò in declinatione, sedato dolore, primis viis repurgatis, & acrimoniâ humorum nonnihil temperata, diuretica, sed non nisi temperata, nec sola, sed cum opiatis mista, usurpanda sunt, ne calculus validè commotus exacerbet paroxysmum. Simul, quantum possibile, artificiosè conjecturetur ex collectione circumstantiarum calculi magnitudo, an sit hic major ureterum ductu, aut æqualis, aut minor? si minor, tunc tutò in tantis symptomatis possumus usurpare diuretica, opiatis mista, ut citò ejiciatur; si æqualis, sedentur symptomata, & idoneis pellentibus maturè promoveatur, nè majus capiant incrementum, & postmodum difficilè per ureteres transeat. Quod si calculus major sit viis urinariis, ita ut ejicere eundem sit impossibile, tunc cessandum ab omnibus pellentibus, quia impossibile est promoveri, nisi prius confringatur. Ergò infringendum, vel à re, ceu impossibili, delistendum, cum apertio per ferum chirurgica, si non impossibilis, saltem periculi plenissima sit. Verùm cum non semper conjecturando possit Medicus assequi, an parvus an magnus delitescat calculus? cum non rarò variis formis aut asperitatibus ludat, hinc tutissimum est, ut sedato dolore, tam internis quàm externis, præsens calculus per diuretica, quantum possibile, promoveatur, cum quamdiu dolores continuant, tamdiu membranarum ac ureterum major contractura ac spasmus vigeat, à quo penitus calculo via intercluditur.

2. Quia præsentè calculo, ac doloribus nephriticis urgentibus, urina subinde acrior ac falsior observatur, à qua dolores exasperantur. Ob id in paroxysmo simul talia administranda, quæ istam urinæ acrimoniam tollere, & ita dolorem nonnihil imminuere possunt. Id quod faciunt omnia ea, quæ vulgò dicuntur emollire, viasque laxare in calculo; talia autem sunt emulsiones oleosæ, non quatenus laxant vias calculi; ut veteres dixerunt, quos Helmontius meritò ridet, sed potius, quatenus acrimoniam urinæ temperant & tollunt, inde natos dolores leniunt; quibus sopitis, crispationes & dolorifici spasmi meatuum tolluntur, ac ita vel spontè ad debitam amplitudinem viæ antea arctatæ redeunt.

3. Cum symptomata colica, statulentitiæ & borborygmi, alvi obstructio plus minus, similiaque symptomata, in paroxysmis ægros admodum crucient, ob id opera danda est, ut primæ viæ à sordibus quibuscunque sint liberæ, ne hæ ipsæ coactæ malum exasperent, adeoque diuretica stent post principia.

Ergò semper in principio & fine paroxysmi opera est danda, ut alvus laxa sit. Præsentè ergò calculo, & urgente paroxysmo doloroso nephritico, pro alvo aperienda nil æquè convenit, quàm blandus clyster, aut emolliens aut anodynus injectus, qui certè tempestivè adhibitus multum ad leniendum dolorem confert, & sæpè totum curationis negotium absolvit: vid. Schenckius *Observ. pag. 475*. Et quidem parantur ex lacte, urina, radicibus liliorum alborum, althææ, liquiritiæ, herbâ malvæ, violariæ, parietariæ, de quâ vid. Simon Pauli *Quadrupart. Botan. pag. 109*. Veronicâ, summitatibus anethi, floribus chamomillæ, meliloti, sambuci, semine fœnu græci, & violarum, liliorum alborum, amygdalarum dulcium, unguento clysmatico, pinguedine caponis aut cuniculi, butyro recenti, &c. Ubi nota,

(1.) Decocta simpliciora compositis magis præferenda, decoctum v. g. chamomillæ, malvæ, parietariæ, violariæ, aut juxta Cratonem veronicæ.

(2.) Ex lacte paratis malè varia simplicia, præter dictam veronicam aut flores chamomillæ nostratis, radicem althææ, &c. incoqui.

(3.) Clysteres in minori quantitate esse injiciendos, præprimis in prægnantibus, nè mole suâ premant, & dolorem augeant, diutius verò retineantur, vid. Zecchius *Conf. 50*.

(4.) Si contumacior sit alvi obstructio, oleum dia-colocynthidis, & electuaria purgantia addere convenire; item terebinthina, & si dolor aliquantum deferbuerit, baccas juniperi, sal volatile succini, similiaque diuretica. Quin nudus clyster ex urina saltem pueri conducit, vel cui semina carminativa incocta sunt, qui lenit dolorem & calculi metum blandè promoveret. Exempli gratia:

℞. HB. *parietar.*

*malvæ.*

*violar. ʒ Mj.*

*flor. chamom. p. iij.*

*rad. alth. ʒiβ.*

Coqu. in f. q. ☐ *puer.*

Colaturæ ʒviii. adde

*Terebinth. c. vitello ovi sol. ʒiij. l. ʒβ.*

℞o *lil. alb. ʒvj.*

*scorpion. ʒj.*

M. pro clysmate: S.

*Lindernd Clystier.*

Aut si contumacior sit alvi obstructio:

℞. ☉ *lini.*

*rapar. ʒ ʒv.*

M. pro clystere: S.

D. S. ut suprâ.

Addi etiam potest ☉ *dia-colocynth. ʒvj.*

Post.



Post clysmata dolorem & spasmus partium internarum insigniter leniunt intestus & fomenta, si nempe iisdem infideat æger, ex vegetabilibus emollientibus, carminantibus, nervinis, nonnihil diureticis, vel sic dictis lithontripticis parata. Sic quoque sufficere possunt balnea aquæ tepidæ; quibus infideat aliquandiu æger, loco eorum tamen fieri potest balneum medicatum ita:

℞. HB. *malva.*  
*melilori.*  
*fl. chamom.*  
*sambuc.* ā M. j.  
*sem. lini.*  
*fœnugr.* ā ʒj.  
*a. calid. maj.* ā ʒss.

Incisa & contusa M.f. Sacculi no. ij.

D. S. ut antè.

Qui calidi, vel sicci, vel in lacte cocti applicandi lumbis pro doloris sedatione.

Quibus verò displicent balnea, iis sufficiunt foci humidi cum sacculis instituti: c. g.

℞. HB. & *flor. chamom.*  
*salv.*  
*serpilli.* ā M. ij.  
*bacc. juniper.* ʒij.  
*sem. anisi.*  
*anethi* ā ʒj.

Incis. includ. *saccul.* no. j. vel fiat foci.

Præterea cum his fociis & balneis blanda diuretica, interdum calculum nonnihil stimulantia, usurpanda, ut sc. calculus simul promoveatur per ureterem nonnihil flaccidum.

Post balnea, vel etiam sine his, conducunt inunctiones externæ ad emolliendas partes & spasmos ureterum sistendos doloresque leniendos, quæ fiunt ex emollientibus suaviter laxantibus & lenientibus: quibus interdum penetrationis gratiâ addenda sunt olea quædam destillata, partim nervina propter partes membranaceas spasmo affectas, partim diuretica, ut blandè promoveantur urina & calculus, cum oleo amygdalarum dulcium, papaveris, hyoscyami, chamomillæ, scorpiionum, liliorum alborum, unguento dialtheæ, medulla cervina, pinguedine anserina, oleo spicæ, petræ albo, baccarum juniperi, succini, terebinthinæ, camphoræ. Sic v. g. fiat linimentum emolliens:

℞. *Ungu. di-alth.* ʒss.  
& *amygd. amar.* ʒij.  
*scorpion.* ʒss.  
*petrol.* ʒj.

M. pro linimento. D. S.

*Lindernd Sâlblein.*

Cum his crebrius locus dolens circa lumbos, regionem umbilici, abdomen, & ductum ureterum illinatur; potest etiam illiniri regioni umbilicali. Additur huic compositioni meritò petrolcum, quod rectè à

Panarollo *Part. 2. observ. 2.* ceu externum remedium nobile mirè commendatur, & calculum imminuere creditur, ubi tamen sufficit, si modò promoveat eum. c. g.

℞. *Ol. amygd. amar.*

*chamom.*

*lil. alb.*

*scorpion.* ā ʒij.

*petra alb.* ʒij.

*destillat. spicæ.*

*bacc. junip.* ā ʒiʒ. M. D. S.

*Lindernd und befördernd Oehl.*

℞. *Ungu. rosat. camph.* q. v.

adde

*Laud. opiat.* q. f.

M. f. linimentum:

D. S. ut supra.

Juxta hæc conducit emplastrum de meliloto, cum ʒo chamom. & anethi malax. addendo ʒo cumini, & petrol. regioni lumborum applicatum; vel

℞. *empl. nervin.*

*tacamab.* ā ʒj.

*bals. Peruv.* ʒij.

M. pro emplastro.

Extendatur super alutam in forma quadrata.

D. S.

*Lindernd Pflaster.*

Item si renum calor intensior, præparatur cataplasma Cratonis, quod hic maximè commendat, ex cancris fluvialibus eorumque succo subactis cum oleis blandè emollientibus, vid. *Crato lib. 5. Conf. 17.*

Sicuti & Brunnerus simile cataplasma ex cancris contulis cum malva, raphano & parietaria, pro leniendo dolore, & eodem nonnihil moderando subactum, regioni renum applicatum admodum commendat in paroxystimo nephritico, de quo vid. Sennertus pag. 814. item cataplasma ex medulla panis albi cum lacte. Hujusmodi litus crebrò renoventur calidi superimponendo postmodum sacculos, aut etiam post balnea eadem illiniri solent.

Cum his & similibus externis etiam internis malo prospiciendum: & quidem, ubi dolor est remissior, aut nonnihil placatus, primæ viæ repurgatæ, & acrimonia humorum temperata, blanda tunc diuretica conveniunt, qualia sunt & nephritica, ~ carminativus de tribus, ~ Qi dulcis, &c. Interdum ergò in principio convenit blanda aliqua laxatio, primas vias abstergens, respiciendo tamen simul nonnihil renes, & modicè calculi excretionem irritando: v. g.

℞. Qi *lat.* gr. xij.

*Sis genist.* gr. v. l. vj.

*scamm. rosat.* gr. iij. l. jv.

ʒo *destill. juniperi*, l. *terebinth.* gtt. j.

M. f. Pulvis in principio paroxystmi assumendus: S.

*Eröffnend Stein-Pulver.*

In specie etiam pro tali scopo conveniunt terebinthinata, alvum simul moderatè laxantia, & simul renibus calculosis insigniter conducentia: hinc pilulæ ex terebinthina cum rhabarbaro usitatissimè præscribuntur; rhabarbarum enim à Paracelso singulariter æstimatur; item sunt emulsiones ex terebinthina, aut pilulæ de terebinthina Mynsichthi præscribendo à ʒss. ad ʒj. pro dosi: item catharticum terebinthinatum Mynsichthi. Sic enim Forestus *lib. 24. observ. 20.* observat Matronam calculo renum & morbo articulari affectam, quæ imprimis terebinthinæ usu fuit curata: item Fontanus *in Consil. & Respons. pag. 116.* refert septuagenarium dolore nephritico diu excruciatum, qui tandem usu terebinthinæ Venetæ ejectione 4. lapidum fuit curatus.

Vel fiant pilulæ ex terebinthina, succino & Rhabarbaro à Paracelso laudatæ, vid. Hæferus *in Herc. Med. pag. 175.*

℞. terebinth. pur. ʒj.  
rhabarb. pulveris. ʒij. ad ʒj.  
succini præp. ʒss.  
cinnam. ʒss.

c. f. q. ʒ terebinth. f. Pilulæ pro aliquot dosibus.  
Sic etiam convenit emulsio seminis violarum nephrocathartica, cum ∇ veronicæ, aut cum alia ∇ appropriata, in specie hederæ terrestris, cujus præscribitur à ʒij. ad ʒss. in principio paroxysmi nephritici: cui propter doloris rationem & papaverina simul addi possunt, c. g.

℞. Sem. violar. ʒij. l. ʒss.  
milii ʒss.  
papav. albi ʒ ʒj. ad ʒiss.

c. f. q. ∇ alkekeng. f. Emulsio ad ʒij. l. jv. adde

∇ cinamom. ʒij.

lapill. percar. præp. l. canceror. præp. ʒij. ad ʒij.

sacchari parum. M. D. S.

**Eröffnende stark- und Harn-treibende Milch.**

Evacuatis ita primis viis, & sublatiis impedimentis, dum adhuc urget dolor, & hæreat calculus, propinanda talia, quæ, quantum possibile est, dolorem tollere possunt.

Opiata ergò conducunt, sed appropriatis mista, in specie, ubi urgent graviora symptomata, ac proinde prostat essentia Triana anodyna D. Michaëlis, in alvaticum juniperinum, cum essentia opii mistum.

℞. lapill. ʒr. præp. ʒj.  
cinnab. ʒij vel nat. ʒss.  
laud. opiat. gr. j. l. ij. (vel pulv. anod. Ludov. gr. iij.  
M. f. Pulvis: S.  
Lindernd Pulver.

De his vid. in specie Ludovici *in Pharm. p. 449.* Vel ad imitationem Wedelii:

℞. lapill. ʒr. præp.  
sperm. cesi ʒ ʒj.  
Evolat. succin. gr. v.  
laud. opiat. gr. j. l. ij.  
M. f. Pulvis.

℞. ∇ petrosel.  
alkekengi ʒ ʒj.  
ess. opii ʒj.  
syr. de alth. Fernelii ʒij.  
M. S.

**Schmerzstillende Mixture.**

℞. Rabals. Peruv. l. capibe c. R ʒi par. ʒij.  
essent. opii ʒss.  
M. D. S.

**Lindernde Stein-Tinctur.**

Dentur 40. guttæ pro dosi.

℞. R ʒi acerr. l. compos. l. rhabarb. ʒss.  
carminat. de trib. ʒ ʒij.  
essent. opii ʒss. ʒj. M.

℞. Milleped. viv. no. xij.  
Contunde c. R ʒi acerr. ʒij.  
filtratæ adde  
ess. opii ʒj. M.

Dosis 30. vel 40. guttæ.

℞. ʒo destillat. terebinth.  
bacc. junip.  
ess. opii ʒ ʒss.  
M. S.

**Ubi vomitus simul & singultus**

℞. Extr. acori veri. gr. xvj.  
castor. l. Zedoar. gr. jv.  
laud. hysser. gr. j. l. ij.

c. ʒo terebinth. f. Pilulæ: S.

**Lindernde Stein-und Magen-Pillen.**

℞. ∇ menth.  
meliss. c. vino.  
cinnam.  
carbunc. ʒ ʒss.  
cochlear. ʒj.  
ʒi ʒlat. ʒj.  
laud. opiat. gr. ij. l. iij.  
syrup. cort. aurant. ʒss.  
M. D. S.

**Lindernde Stein-und Magen-Mixtur  
Löffelweise.**

Oleum amygdalarum dulcium, vel cum vel sine lapide percarum, & syrupo de althea Fernelii; (quod nonnulli etiam cum succo citri aut limonum miscent) similiter in usu est. Emulsio ex amygdalis dulcibus, & seminibus dictis 4. frigidis majoribus, violarum, nucleis persicorum, & similibus, quibus lapides percarum, aut lapilli cancerorum addi solent, subinde in hoc casu in usu sunt, quæ hauriuntur ad dolorem leniendum, & blandè urinam ciendam; potissimum si hujus emulsioni aliquid papaveris albi syrupi, aut laudani opiat addatur; vid. Hoffmanni *M. M. pagin. 437.* & Deckers *Exercit. Practic. pag.*

pag. 636. item decocta emollientia, simulque anodyna, blandè temperantia, & urinam pel-  
lentia, quorum formulam vid. in Barbette  
*Praxi*, ubi de dolore nephrit. Ad imitationem  
hujus

℞. rad. Alth. ʒj.  
liquirit. ʒij.  
HB. malva Mj.  
sem. violar. ʒß.  
Coqu. in l. q. Decoct. hord.  
Colaturæ fīss ad fīij. adde  
syrup. papav. albi l. errat. ʒiij.  
lapill. ʒr. præp. ʒj.  
M. D. S.

**Pindernder Harntreibender Trancf.**

Instar omnium etiam hic convenit decoctum  
expertum Foresti, quod præscribit lib. 24.  
Obs. 26. 28. & 29. & descriptum prostat in  
Sennerto lib. 3. *Prax. ubi de Calculo Renum*,  
pag. 812. quo decocto curavit virum despe-  
ratâ suppressione urinæ ex calculo renis sini-  
stri ureteri impacto laborantem cum inten-  
sissimis doloribus, summa virium prostratio-  
ne, & cum jam per 6. dies ne guttulam quidem  
urinæ emisisset, usurpato enim hoc decocto,  
urina confestim emanavit, lapilli cum impe-  
tu protrusi, & æger curatus fuit.

Sicuti decoctum non incongruum à Zwelf-  
fero correctum videb. in *Pharm. Reg.* pag. 89.

Ad imitationem ergo hujus similia com-  
posita possunt parari.

Addi simul possunt decocto huic certa pro-  
portione vel baccæ juniperi vel semen hype-  
rici, aut semen dauci, vel similia, quæ istud  
magis appropriatum reddere valent. Deco-  
ctum florum chamomillæ singulariter excel-  
lit in paroxysmo nephritico, vid. Simon Pau-  
li *Quadr. Botan.* pag. 255. & veronicæ, quod  
Crato l. 1. extollit. Idem hujus loci est de-  
coctum nymphæ, quo nihil promptius ad  
ureterum contracturam laxandam & dolo-  
rem placandum in paroxysmo nephritico à  
Tachenio *Hippocr. Chym. cap. 14. pag. 97.*  
extollitur. Præterea non inconsultum est  
consilium Timæi von Guldentlee / jubentis,  
ut omni haustu decocti cujusdam addantur  
aliquot guttæ ~ Ois dulcis communis, cum  
hujus vis egregiè sit diuretica. Sane spiritus  
salis extremo Δe prolectus, adeoque acido-  
salsus, singularis est ad promovendum & re-  
fringendum calculum: vid. Tachenius l. 1. a.  
nisi inflammatio atque erosio partium sublit;  
loco ejus tamen & spiritum Di à Sylvio tan-  
tè æstimatum, utrumque vel simplicem, vel  
dulcem, commodè potius usurparem, qui  
magis est diureticus. Rhumelius recipit ~  
salis, miscet cum Se volatili succini, coagu-  
lati in formam crystallinam, & potentissi-  
mum est nephriticum diureticum.

Quibus ita peractis, si imminuatur dolor,  
& calculus ulterius promoveatur, res bene  
Tom. II.

est: Ubi verò, licet doloribus aliisq; pathe-  
matis plus minus placatis, calculus vel in re-  
nibus, vel ureteribus, vel vesica, adhuc hæ-  
ret, fiat accessus ad ea, quæ diuresi blanda &  
specificâ urinam promovere possunt: aut,  
si grandior, propinanda ea erunt, quæ lapil-  
lum, quantum possibile, diffringere valent,  
ut ita confractus & comminutus eò commo-  
diùs possit propelli.

In horum tamen usu hoc observandum, ut,  
ubi ad tempus frustra adhibita fuerint medi-  
camenta, subsistatur, & quasi feræ permit-  
tantur naturæ, ne illo usu nimio plus, quàm  
par est, ad renes moveantur cruditates. Cu-  
riosa est hoc in loco observ. Epiphaniî Ferdi-  
nandi *Hist.* 54. ubi dicit: inviolabili lege ob-  
servandum esse, ut quandoque à remediis  
abstineamus, dum refert exemplum doloris  
nephritici, in quo post 9. & plura remedia  
propinata & applicata absque ullo usu &  
effectu: sed cum postmodum per 10. & 11.  
quies naturæ fuisset relicta, hæc ipsa sponte  
suâ sub fine undecimi plures calculos rejicien-  
do, ægrum liberavit. Diuretica hujusmodi  
usurpantur in specie in paroxysmo calculoso,  
sub introitu balnei, vid. Riverius l. 1. ut, dum  
hujus usu relaxantur viæ & demulcentur do-  
lores, illorum ratione melius promoveatur  
calculus: Sicut etiam blandus motus corpo-  
ris calculi descensum ex renibus promovet,  
qui aliàs à gaudio in exitu promovetur, à me-  
tu verò vel terrore retardatur: Conf. *Act.  
Med. Hassniens. Vol. 3. pag. 73.* Cautius quo-  
que diureticis utendum, si mictus cruentus  
combinetur, præprimis calidioribus & aro-  
maticis, habebuntq; tunc potius locum ter-  
rea & emollientia blandiora: Commendat  
eundem in finem Fortis C. 3. C. *onsult.* 95.  
thermas vitriolatas adstringentes æquè ac  
calculus promoventes: Ast non ubique ter-  
rarum hæc præstò sunt.

Diureticis tamen talibus longè præferenda  
sunt Lithonriptica propriè dicta, seu calcu-  
los ipsos confringentia remedia, de quorum  
existentia multi dubitant. Speciatim Sylva-  
ticus in *Conf.* & Panarollus in *Obs.* aliique  
magni nominis Medici, sed ordinariò chimix  
ignari, sanè rident eos, qui dicunt calculum  
in corpore humano semel compactum iterum  
posse dissolvi vel in minores particulas diffri-  
ngi. Et sanè res non caret scrupulo, utut sim-  
pliciter non neganda, licet rara sint sublimio-  
ra talia remedia, quæ reverà calculum con-  
fringunt.

Difficultatis ratio prima, ob quam impos-  
sibilis videtur calculi solutio, est: quia est  
concretum terreo-salsum, ex duobus salibus,  
alkali & acido volatilibus, firmissimo tamen  
nexu junctis, oriundum, intercedente sub-  
stantiâ quâdam terreâ firmiter coagulante;  
adeoque nec acida nec alcalia eum dissolvere  
(M m m m) possunt,



possunt, necesse ergo est, ut remedium calculum frangens ita sit constitutum, ut ferè de utroque, acido nempe & alcali, participet, ut ita concretum tale salum penetrare, & istud amica sua vi denuo blandè, & quasi liquefaciendo, resolvere possit.

Secunda difficultas est, quod posito, talia remedia & menstrua reperiri, quæ extra corpus solvunt calculum; hæc ipsa tamen longo isto transitu, donec ad calculum perveniant, in vi sua lithontriptica non parum infringantur. Unde errant, qui calculos humanos excretos certis & variis liquoribus injiciunt, expectaturi, quis liquor citius & felicius calculum dissolvat, ut postmodum eodem liquore & intus propinato eundem effectum in renibus & vesica obtineant. Ut taceam, non ejusdem duritiei & compaginis in omnibus nephriticis videri calculos, quin subindè multum variant duritie, firmitate, ac similibus plus minus proprietatibus. Ceterum expertum est ex omnibus vulgaribus menstruis hætenus tentatis, ~um ①i maximam habere vim in calculo, vel comminuendo, vel friabilem reddendo, & quasi mollificando. Ergo remedium illud lithontripticum necesse sit tale, quod ista insigni alteratione in primis viis intactum, adhuc maximam partem integrum transeat ad vias urinarias, ibidemque calculum concretum imminuat.

Tertia difficultas est, quod remedium lithontripticum, quod calculum, utpote concretum durum, dissolvere valet, non debeat esse corrosivum, sed quod citra stomachi, intestinorum, & aliorum locorum noxam possit propinari: cum hæc ipsæ partes sint longè molliores, & facilius dissolvantur, quàm concretum calculi, partesque attritu calculi antea plus minus læsæ ab acrioribus remediis admodum lædantur, indeque doloris aliaque pathemata exasperentur. Verum hoc ingenii phantasma est nullius momenti, cum nitatur falsâ hypothesi, quasi calculus non esset dissolubilis, nisi per corrosionem, adeoque unum ex menstruorum requisitis sit, ut corrosivitate gaudeant. Malè autem ad corrosivitatem in calculum frangentibus respicitur; corrosio enim est respectus saltem tributus rebus ratione gustus, adeoque plane accidentarium consequens, siquidem etiam reverà dantur menstrua plus minus insipida, aut planè non, aut parùm corrosiva, quæ tamen validissima etiam concreta diffringunt.

Quid igitur est, quod maximè considerandum in menstruis dissolventibus? Responderetur: consideretur proportio ista formalis, quæ est inter particulas menstrui solventis, & particulas ac poros corporis solvendi, ut hinc utriusque corporis particulae mutuo nexu se invicem jungere valeant; si enim particulae istæ menstrui ita sunt figuratæ seu conformatæ, ut exactè respondeant porulis corporis, prom-

pta & cita fit solutio: sin verò hæc duo nullo modo conveniunt, aut nullam habeant convenientiam aut proportionem requisitam, frustrà est spes solutionis.

Proportio ista materialiter originem ducit ex convenientia seu identitate in radice & essentia; hinc dicunt: menstrua debent esse homogenea cum rebus dissolvendis. Hinc concreta sulphurea per menstrua sulphurea, salina per menstrua salina & aquea, optimè solvuntur, i. e. requiritur in menstruis particulis certa quædam habitudo ad ipsam rem solvendam: vid. Beccherus in *Phys. subterr. lib. 1. p. 39*. Willsius de *Fermentatione* pag. 63. Hinc v. g. ∇ solvit saccharum, alumen, vitriolum, & similia, quæ non dissolvit V; e contra sebum, ceram, bitumen, succinum, terebinthinam, & similia subjecta, licet molliora, ∇ non dissolvit: V probè rectificatus dissolvit succinum & omnia corpora resinola, quæ non resolvuntur ab ∇: nihilominus tamen V hic probè rectificatus non attingit saccharum, neque Θ commune. Porro ∇ fortis, seu ~ ①i rectificatus, dissolvit lunam aliaque metalla, sed non aurum, aut lignum, aut ceram aut picem: Huic ∇ si injiciatur aliquid Θ \*ci, tunc promptè solvet Θ, sed non attingit lunam.

Ex his patet, omninò dari menstrua, quæ intactis stomacho & intestinis calculum in renibus attingunt, & eundem dissolvunt; dispar enim est ratio: ut taceam, gustum malæ corrosivitatis indicium exhibere; Multa enim nobis insipida & dulcia videntur, quæ in se admodum acrisunt & plus minus corrosiva, ut arsenicum, & vitæ, & antimonii, & vivus, &c. Lingua ergo ineptus judex est menstruorum. Ut taceam acris, & respectu certorum corporum acerrima, nobis & ventriculo nostro esse innocua, nec nisi in objectum appropriatum agere: v. g. sicut videmus in aceto, quod solvit corticem testaceum lapideum ovorum durum, substratam verò membranam tenuem aut mollem non attingit, copiosè à nobis etiam assumptum in stomacho est innocuum. Sic cantharides acrimoniam suam circa renes & vesicam saltem explicant, ea exulcerando, quæ tamen stomacho, quem immediatè ingrediuntur, intestinis & aliis partibus sunt innocuæ. Ergo præter hoc, quod dentur menstrua insipida, attendenda etiam est varietas menstruorum, quæ non simpliciter in corrosivitate, sed in particulari ejus textura, materia & conformatione mechanica consistit. Unde nullum dubium est, dari posse talia remedia, quæ instar menstrui, citra notabilem gustus acerbitatem ex admistione variorum succorum nostri corporis promptè calculos renales in corpore aggredi, eorum poros penetrare, & particulas unitas diffringere aut comminuerè possit; idque imprimis ex prosapia salina, ut id concretum calculi salinum subtiliter penetrent

trent & dissolvant. Unde non ad corrosivitate in specie respiciendum est in remediis calculum frangentibus. Confirmant hoc observationes quædam calculorum in corpore dissolutorum. Nihil dicam de Paracelli & Helmontii ludo, quia, cum rarus sit, & neuter possit ostendi, apud incredulos non merebitur fidem. Sed urgeo saltem, quod persicaria & succus betulæ, item semen dauci sint ad calculum frangendum destinata. Hinc enim Dn. Boyte in Philosophia experimentaliquot exempla refert, per solum dauci semen fractum fuisse renum calculum. Sic persicaria quoque secretum est quorundam Anglorum, Augerii & Laurembergii, contra renum calculum, quod ejus  $\nabla$  diutius continuata calculum ita comminuerit, ut frustulatim ipse fuerit ejectus. Experimentum etiam ad calculum vesicæ imminuendum sunt millepedes. Sic ipse quoque amicum, Medicinæ Doctorem, Dresdæ novi, qui spiritum instar  $\Theta$  aci ex  $\Phi$ o habet volatilem insignem, mediantem quo crebro usurpato, aliquoties renum calculos felici experimento intra corpus comminutos, frustulorum parvorum forma successivè expulit.  $\Theta$  fimi columbini benè præparatum & ipsum observatum fuit aliquando dissolvisse calculū, & frustulatim eundē ejecisse.

Sed talia vera lithontriptica reverà sunt rara & pauca. Sufficit, ut loco horū in paroxysmo calculis sedatis maximam partem paroxysmi doloribus & gravioribus symptomatis, diuretica plus minus acria aut fortia appropriata, sed malè Lithontripticæ dicta quibusdā, in usū adhibeantur, quæ partim in paroxysmo, partim extra paroxysmum ad præservatiōem possunt inservire; sive in præservatiōis negotio operentur acidum absorbendo, ut testacea, lapides minerales & animales; sive vi diuretica renes & loca urinaria abstergendo, ut omnia raphanacea, liquor betulæ, &c. seu balsamicā vi fermentum renum conservando, ut juniperina, terebinthina, &c. Diuretica talia à quibusdam, malè licèt, lithontriptica dicta, sunt multiplicia; & quidem ex vegetabilibus herba & radix liquiritiæ, radix fœniculi, petroselinii, pimpinellæ, lapathi majoris, apii, baccæ juniperi, radix rubiæ tinctorum, eryngii, bardanæ majoris, ononidis. Eminent hæc inter radix armoraciæ, quæ vino infusa recens, & aliquoties hausta, volatili suo  $\Theta$  renes abstergendo à calculo præservat, eundem verò præsentem fortiter pellit. Alii insuper armoraciā, tam radicem quàm folia incisa, infundunt vino, & vase clauso per 14. dies in cella relinquunt, quem liquorem per alembicū destillatum ad calculum promovendum hinc mirè commendant. Interim tamen ejuscemodi remedia alliata acriora non semper æquè tuta sunt, cum ardores renum in illis soleant intendere, qui aliàs iisdem vexantur. Usurpentur autem talia diuretica præmissis, ut dixi, præ-

mittendis, tam internis primas vias respicientibus, & symptomata mitigantibus, quàm externis anodynis emollientibus. Comodè etiā propinquantur sub introitū balnei, ut eò commodius tunc operari queant. Pertinet hūc porrò hederæ terrestris, item capillus Veneris, cherefoliū, parietaria, fragaria, & veronica, de cujus decocto &  $\nabla$  destillata vid. *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 107. pag. 245.* & Crato ii. *Consil.* folia quercus tenella, agrimonia, &c. Conveniunt etiam cepæ & allium, præsertim ejus capita, quæ sale volatili acri penetratè diuretico, tam acidum, calculi coagulatorē, corrigunt, quàm renes abstergunt, eorumq; fermentū ad calculū disponens suo modo alterant. Hinc multis non incogruè in usu positū est singulis noviluniis capitulū, vel aliquot saltē alii dentes, 6. 7. 8. 9. &c. minutim conscindere, & in  $\nabla$ æ seu spiritus baccarū juniperi cochleari uno vel altero, vel  $\nabla$  haurire, ad præservatiōem & curationem calculi, cujus remediū efficaciam laudat Bartholinus in *Epist. Medicinalibus*. Medicus quidā ceu optimū experimentū contra calculū venditavit sequens:

℞. HB heder. terr. M. j.

capitul. alli. No. j. ij. l. iij.

Discerpantur in frustula, affundatur  $\nabla$ lbj.

Stent per  $\Phi$  aliquot probè clausa, deinde agitati & probè colati liquoris detur cochlear j. vel ij. pro præservatiōe singulis pleniluniis & noviluniis; hoc enim certissimè præservare, & continuato usu calculū curare asserit.

Cortices avellandarū interiores etiā laudantur. Abrotani pulverem cum  $\Phi$ o Simon Pauli *Quadrip. Botan. pag. 183.* extollit. Huc pertinet & fraxinus, in quo, imprimis semine, non contemnenda est vis contra calculū, præsertim in oleo destillato ac  $\Theta$  volatili seminis fraxini, hinc etiā in ejusdē cortice interiore, quæ singulariter laudantur à Glaubero. *Conf. Aët. Anglic. No. 43.* Hinc non inelegans est hoc oleum lithontripticū admodum balsamicū & potens, quod contra Lithiasin alii conficiunt, & tanquā secretū in calculo renum commendant.

℞. Cort. rad. frax. inter. lbij.

bacc. junip. rec. lbij.

terebinth. lbij.

Terantur, & cū terebinthina misceantur, & in lbxij.  $\nabla$ æ in vase obturato in digestionem vel putredinem ponantur per 3. menses, postmodum destillentur leni igne, ut dent  $\Phi$ o potentissimū, cujus guttæ viij. l. x. in vino albo capiendæ, mirè conducere dicuntur tam præservando quàm curando calculo.

Porro laudantur baccæ juniperi, hederæ arboreæ, ciceres rubri, fructus alkekengi & avellanz, quarū egregiam efficaciam expertus est Amatus Lusitanus in *Cent.* Cynosbati cocti seu conditi commendantur vid. Unzerus de *calc. le. pag. 965.* & Borellus *Cent. 3. obs. 22.* item horū aulli & oleum inde expressum, & spongia, quæ simul anodyna est; vid. Crato *lib. 6. Conf.*

(Mmm 2)

83. &



c. 83 & Simon Pauli *Quadrip. Botan. pag. 65.* & 57. Præter dicta flores genistæ, virgæ aureæ, flores cyani & calcaltrippæ, semen milii solis, in specie semina hyperici, dauci, & cymini. In hyperici semine res est clara, quod manu contritum & contusum terebinthinam spiret & sapiat; Convenit ergo, tam vi balsamica, quam diuretica, unde Zapata in *Clave Med. cap. 10.* mirabiliter extollit ad præservandum calculum sequens Electuarium:

℞. Pulv. hyperici ex sem. in Julio vel Augustino collect. & exsicc. ʒiij.

Sacch. vel conserv. rosat. vel violat. vel rob junip. ℞j.

Misc. fiat Electuarium.

Dosis est ʒp omni septimanâ semel vel bis pro circumstantiarum ratione, tribus ante prandium horis usurpandum.

Laudatur quoque hoc ipsum tam præservationis quam curationis gratia ab Epiphanio Ferdinando tanquam expertissimum. *Hist. Med. 54.* De dauco & semine ejus, quantum in calculo valeat, imprimis vid. Helmontius *Tract. de Lithiasi*, ubi experimentis & rationibus comprobat ejus vim antinephriticam, & Angli partim ad præservationem, partim ad curationem paroxysmi nephritici frequenter utuntur hoc semine, tam in substantia, quam, ut moris est, in cerevisia medicata, addendo cerevisiæ, dum fermentare incipit, dauci semen contusum, ita, ut fermentando recludatur à cerevisia, & vis lithontriptica imbibatur. Conf. Boyle in *Philos. Experiment.* De junipero, ejusque baccis & lignis, item deligno nephritico Indiæ Orientalis, res per se nota est, quid hoc in casu præstent; ex quibus paratum decoctum vel infusum potenter calculos restituit, uti videre potestis in Sennerto, ubi de calculo; Gummi cerasorum solutum in vino, vel sub forma pilularum instar terebinthinæ propinatum egregiè præservat & pellit calculum. Succus citri aut limonum ad ʒij. cum vini malvarici ʒvj. ad exturbandum calculum non injuriâ à Timæo von Guldenelee aliisque laudatur; sicut succus parietariæ & veronica, item rob juniperi, rob cynosbati, & ex his paratum malvaticum juniperinum, aut cynosbatinum non, secus ac succus seu aqua betulæ, mente Martio collecta ex ramis tenellis betulæ, & instar acidularum gradatim potata, elegantissimum & decantatissimum est contra calculi pathemata: de quo vid. Helmontius *Tract. de Lithiasi cap. 8.* Charleton de spiritu Gorgonio seu calculo pag. 179. Bartholinus in *Act. Med. Hafniens. vol. 1. Observ. 19. pag. 49.* Boyle *Philos. Experiment. Tom. 1. pag. 102.* Kergerus de *Ferment. pag. 178.* M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 155. pag. 278.* & *Ann. 4. Obs. 201. pag. 276.* Ex his aliisque quamplurimis vegetabilibus fiunt vulgò essentia & extracta, nephritica dicta, composita & cum V. Usato parata.

Porro pertinent huc etiam Siæ, tam alcalia quam salia, in specie M, & quæ Dosæ sunt pro sapia, ad calculos solvendo, & vi diuretica promovendo, optima: speciatim tamen excellunt hic salia ex dictis vegetabilibus diureticis paratas, ut Si genistæ, stipitum fabarum, ononidi, stercoris columbini; & in specie omnibus his meliora Si volatile succini & Si urinæ egregia sunt diuretica antinephritica, Si fixi, & omnium maximè Si dulcis, nobilia sunt remedia,

item lac caprinum, lotium capræ, ut & aliorum animalium stercora & lotia propter Anitrosolum in ipsis contentum sunt perquam usitata. De efficacia stercoris columbini, præter communem Autorum consensum in specie vid. Forestus *lib. 24. Obs. 25. in Schol.* Hinc recipiunt quidam stercus columbinum, moderate calcinant, & Si exinde Dosum in vino acidulo propinam, ceu nobile diureticum; uti & alii recipiunt stercus columbinum, istudque macerant in aceto per ʒp, postea filtrant: Aceti hujus part. ij. addunt mellis depur. part. iij. miscent & propinant. Remedii contra calculum Polemanni præscriptio est hæc:

℞. Si puriss. ℞j.

Fluat in Δc, injiciendo desuper frustum Δis communis magnitudine fabæ, quo deflagrat aliud superinijice, donec hujus Δis ʒf. absumpta sit: Ubi omnia refrigerint, ac denuò pulverisata fuerint, denuò eodem modo procedatur, atque hoc tertiâ vice repetatur, semper successe si Δis ad ʒß adjiciendo. Jam

℞. Si ita præp.

Si absinth. à. ʒj.

succini ʒß.

sacch albi ʒvj.

Si destillat. succin. ʒiv.

Misc. pro pulvere.

De hoc dosi, quantum tres cultelli cuspides capiunt, propinetur, unâ vice bis, ter vel quater in die, pro circumstantiarum variatione omnem saburrâ ex partibus urinariis evertit, & calculi recentem comminuit.

Hic etiam addatur Si compositum, quod in paroxysmo nephritico ad sistendum dolorem nephriticum & promovendum calculum est egregium, cujus preparatio hæc est:

Fiat Si fixi ex Si o mediantibus carbonibus:

Hoc Si expositatur Δi, ut liqueat ad pulvis consistentiam saltem: Huic affundatur Si

Si li rubri ana.

Facta ebullitione, & eadem cessante abstrahatur liquor ex retorta forti Δc, & remanebit Si candidum subacidum; quod ipsum præter usum singularem nephriticum etiam aliquid singulare obtinebit in usu Pharmaceutico & alchimistico in puncto solutionis corporis.

Porro præter dicta Siæ Dosæ, vi nephritica etiam innotuerunt hætenus ipsi lapides tam minerales, quam animales, unde v. g. lapis Judæus, lapis lyncis, lapis spongiæ, lapis nephriticus, lapides seu oculi cancrorum, lapis in vesica aprici seu bovis repertus, mandibulæ lucipiscis, dentes truttarum, lapides percarum, carpiorum, aquilæ; item testæ ovorum, maxime struthionis, &c. Verum hæc ipsa ratio per se solent convenire, sed acidum, calculi coagulator, in corpore peccans saltem absorbendo, acrimoniam feri urinarii in paroxysmo temperant, ac mutatione sui saporis in Si sum tertium, vim diureticam egregiè acquirunt. Melius est, si dissolvantur cum ~u Si composito, ex Si communis & Si coparato. De ovis struthionum cum ~u Si solutis, vid. Tacchenius *l. 2. Dant.* liquorem nephriticum salum præstant. In pelliculas micilaginosas ~u Si testas ovorum solvit, quæ urinæ saporis sunt. Si his aut pelliculis addatur Si fixi, præcipitat se pulvis, quod probat, pelliculis his adhuc acidum adfuisse. Faciunt huc liquo-



res nephritici dicti, ex hisce lapidibus parati, quibusdā in usu, pro varietate autorū variū: v. g.

℞. *Lapill. 69r.*  
*lapid. Judaic.*  
*lynxis*  
*spongia.*  
*aquila*

*Glac. Maria ā qu. v.*

Solvantur in ~u  $\Theta$ is decrepitati ritē destilato (i. e. ultimo  $\Delta$  gradu elicto:) l. ~u  $\Theta$ is compos. Solutio saporis adstrictorii decātatur, filtratur, coagulatur leni calore in vitro ad siccitatem. Materia hęc siccata iterum pulverifanda, & hinc in cella per deliquium dissolvenda, filtranda, & ita pro usu asservanda.

Liquor hic  $\Theta$ us elegans diureticus ad 10. vel 30 guttulas in declinatione paroxysmi nephritici ad eliminandum calculum in vino frequenter propinatur, pellit calculū per urinam instar massę coagulatz. Aliās calculus ex felle bovis desumptus & pulverifatus, ad gr. v. assumptus, admodū probatū contra calculum dicitur remediū; nam ~ $\Theta$ is fit ita diureticus, & insigniter expellens. In cancris fluviatilibus singularis latitat vis antinephritica ratione virtutis diureticę, quę in alcali eorum latet, unde decoctū cancrorū fluviatiliū ovulis pręgnantium egregiē ad curandum & pręservandum commendatur calculum. Item

℞. *Er. fluviat.*

Coqu. in vino in olla probē obturata tamdiu, donec pulverifari possint.

Hujus pulveris 3j. propinata aliquot desperato calculo laborantes, & incredibiliter ejulantes restituit, atque hoc certum est.

De calculo humano dos. 3j ad 3j. urinam pellit. Quibusdam hinc accedit superstitio, quod proprios calculos devoratos pręservare ā calculo dicunt. Promoveunt quidem urinam, sed curativē & pręservativē nil valent.

Dictis modō lapidibus vicarię sunt testę ovarorū, ex quibus exclusi sunt pulli: omniū optima sunt ova struthionū. Unde etiā testę ovarorū struthionū ingredi simul solent liquorem nephriticum. Aliās etiā testę ovarorū calcinatę ā multis laudantur. Vid. Bartholinus *Hist. Anatom.* imprimis in C. 4. *Epist. pag. 451. & 526.* refert  $\Upsilon$ m nephriticam decoctionis talis calcis testarū ovarorum mirē prodesse, & in specie  $\Upsilon$ m calcis ostreorum ad calculum in mucilaginem dissolvendum, multum prodesse refert. Nam ovarorum testę, uti & marina testacea, calcinando in corpus instar calcis vivę abeunt, cujus lixivium ad calculum in paroxysmo promovendum est laudatum. Sanē in ipsa calce viva vulgari singularis vis antinephritica residet, unde & ~ $\Psi$ z Basilii ritē paratus ceu singularissimum calculum frangens laudatur; loco cujus  $\Theta$  ex calce viva cum  $\Theta$ c \*co calcinando & elixiviando paratum commodē substitui potest. Unde etiam ex calce viva cum tartaro Rę nephriticę parari solent non inelegantes:

Sic famosus aliquando Medicus Rm nephriticam habuit talem, v. g.

℞.  $\Psi$ z part. jv.  $\Theta$ i crud. part. ij.

Coqu. in olla c.  $\nabla$  font Liquor filtratur, coagulatur, & emergit  $\Theta$  fixum planē singularis naturę: quod ipsum vel crudum usurpari potest; vel fundatur, hinc extrahatur c.  $\nabla$  probē rectificato, donec rubeicat, & saporem urinosum & fortiter penetrantem acquirat.

Quo pertinet antinephriticum D. Helvetii:

℞.  $\Psi$ z q. v. affunde

\*i optimi ad eminent. 3. l. 4. digitor.

Coque, frigetac, decanta, inspissa,  $\Theta$  candefac in +ulo, & extra hevel c.  $\nabla$  l. cum vino Hispanico.

Dosis grt. 10. ad 20. in calculo.

Externē contra podagram 3j. infunditur in vinum aut urinam propriam, & eo lavantur partes podagrā affectę.

Tandem lumbrici, & horum ~ per putrefactionem paratus, egregium sunt nephriticum, qui adhuc superantur ab asellis ritē pręparatis. Speciatim scarabęi Majales prę cęteris insigniter conveniunt; imprimis alę horum superiores ac durę pulverizatę & propinatę in vino usurpatę, egregium dant antinephriticū.

Huc pariter pertinent scorpiones, si nempe pulvis factus ex 4. 5. vel 6. scorpionibus lavatis, sicque vivis per 24. horas in vino Malvatico relictis, postmodum in olla supra folia salvię positus in furno blandē crematis. Dosis gr. iij. jv. aut v. in ovo sorbili vel vino propinata, calculum promovet.

Grilli domestici, in rusticorum hypocaustris familiares, egregium sunt lithontripticum, si nempe unus altervē, abjectis capitibus, alis ac pedibus, in  $\nabla$  petroselini vel alia appropriata macerentur, idque tamdiu, donec in liquorem lacteum facessant, liquorque propinetur, multoties experimentum hoc factum, & ad miraculum in urinx retentione fluxus secutus; quin etiā vel integer vel resolutus calculus prodire coactus fuit: vid. *M. A. N. C. ann. 9. & no. Obs. 71.* Huc etiā facit essentia reguli avis Goerlicensii.

#### CURA PRÆSERVATORIA.

Pręservantia in 4. classes dividuntur:

1. Sunt ea, quę primas vias frequentius abstergunt & expurgant.
2. Quę acidum coagulans primarum viarum, & hinc viarum urinaryarum vitiosum corrigunt aut absorbent.
3. Quę renes moderatis diureticis abstergunt.
4. Ea, quę in specie renibus, eorumque fermento appropriata sunt.

Ratione primarum viarum conveniet, harū cruditates singulis tribus vel quatuor mensibus purgatione solenniore, singulis verō septimanis laxante, evacare: Quarum tamen nec illa fortiora sint, i. e. quę humores nimis exagitant, & ad renes commovent; vid. Nicolaus Piso *lib. 3. Præf. cap. 35.* & Unzerus de *Nephritide lib. 1. pag. 972.* sed mitiora, qualia pręter superius recensita sunt helleborus niger, folia sennę, vid. Montanus *Consil. 267. & 268.* pulvis Solenādris sennę, (Mra mm 3) rhabar.

rhabarbaro, turpetho; syrupus rosarum solutivus, &c. Hinc quotidie etiam assumantur juscula, in quibus radix liquiritiae, polypodii, flores violarum, &c. ebullierint, aut decoctum prunorum simplex, vel cum foliis sennae; item cremor & crysalli tartari, &c. Imò hujus loci imprimis quoque erunt vomitoria, teste Hildano *Cent. 5. Obs. 61. & Epist. 35.* & Unzero *l. 4. pag. 975.* & quidem modò mitiora, modò potentiora, pro circumstantiarum varietate. Acidum coagulans temperant ac absorbent terrea absorbentia, vel mineralia, vel animalia, lapides nempe suprà memorati, & testacea, v. g. lapis spongiae, cancerorum, corallia, silices & alcalia fixa ex diureticis parata; item lixivium tale, in quo silices candelacti extincti sunt. His alia volatilia & ~ urinosos addere licet, frequentius cum pastu aut post pastum assumptos,

℞. arcan. dupl. ℥j.

corall. rubr. prap.

matr. perlar. prap. ā ℥ss.

Misc. pro pulvere:

Div. in 2. part. æqu. S.

Digestiv. Pulver.

Tertio scopo satisfaciunt diuretica volatilia, ut Θia volatilia quaecunque, in specie ~ & Θ volatile tartari, ~ carminativus de tribus, ~ Θ \*ci & urinæ, R nephritica Ammelungii, ~ lumbricorum, elixyr proprietatis.

℞. R tartari acerr.

compos. ā ℥ss.

M. S. Magen-Mixtur.

℞. Aqu. alkek.

ceras. nigr. c. nucl. ā ℥ss.

malv. juniperin. ℥vj. ad ℥j.

Ra nephrit. ℥ij.

lapill. str. prap. ℥ss.

laud. opiat. gr. ij.

syrup. fragor. ℥ss.

M. D. S.

Nieren-reinigende Mixtur/  
Lösfel-weise.

Addunt his nonnulli lac & lacticia, excepto caseo. Verum cum omne lac plus minus substantiae caseosae in se habeat, de ejus usu in lithiasi merito dubitatur: vid. Horatius Augenus *T. I. l. 2. Epist. 1. cap. 8. 9. &c.* & Unzerus *l. 4. pag. 963.*

Renes quoque abstergunt serum lactis, acidulae, aquae quaevis, & pingua frequentius hausta: Hinc Zecchius *Consult. 13. & 17.* Juscula pulli gallinacei, vitulinae aut vervecinae carnis, item aquam tepidam simplicem immediate ante pastum quemlibet commendat. Ast potentius agunt haec diuretica, quamvis nonnulli sint, qui eorum usum in praeservatione à calculo planè interdiciunt, sc. Crato apud Scholzium *Consil. 246.* Henricus *Methodo ad Praxin lib. 2. cap. 12.* & Rubæus in *Celsum lib. 4. cap. 10.* Ab aliis tamen ea maxime commendantur, v. g. Unzero, Riverio, &c. sed

controversia haec facile componi potest, modò observetur in eorum usu, ut

1. Mitiora sint.

2. Jejunò stomacho, & longè ante pastum.

3. Non, nisi purgatis prius primis viis, propinentur.

Talia sunt terebinthinata, juniperina, de quibus vid. Amatus Lusitanus, radix bardanae, raphanorem genera cuncta, v. g. armoraciae, radix & folia, si vinum ab his destilletur, liquor betulae, semen dauci, quod cum cerevisia fermentatum contra calculum commendat Bartholinus *Cent. 3. Epist. 30. & in Act. Hassniens. P. 1. Obs. 19.* Succus veronicae in saccharo inspissatus, & cum semine violarum mixtus, vid. Crato *l. 4.* Ex scarabaeis subcaeruleis combustis Borellus *Cent. 4. Obs. 73.* addendo tantulum caryophyllorum, pulverem parat: Alii pulverem scorpionum exhibent: Ab aliis vero acidulae non sine ratione laudantur. Verum horum usus non adeò frequens esse debet, & sufficiet bis tantum in mense, aut vix intra 3. septimanas illa assumere; quamvis observatio, cujus Amatus Lusitanus *Cent. 2. Observat. 68.* mentionem facit, terebinthinæ usum frequentiore concedere videatur.

Pro quarto scopo conducunt ea, quae praeservant à putredine renali, qualia sunt balsamica, terebinthinata, juniperina, balsamus sulphuris terebinthinatus, hypericata, remedia ex dauco, anisata, moschata, in specie crocus, macis, allium & alliata, succus betulae, rhabarbarum & similia renibus dicata.

## ARTICULUS III

De

*Urinae Secretione nimis aucta, seu Diabete.*

Aliàs Diabetis nomine duo vitia insigniuntur, idque promiscuè, adeoque nec absque confusione. Nam primò est diabetes, dicitur allzu viele Harnen/ quando immodicè urina effluit, & plus quidem, quàm bibendo homo assumit, cujus rei exemplum stupendum suppeditat Digby in Oratione de pulvere sympathetico; sicut etiam Schenckius in *Observ. lib. 3.* qui inter alia refert quendam, qui quotidie supra 4. cantharos minxit, ut vix quadrante bibere: Idem notat exemplum puellae plus paucis diebus mingentis, quàm ut tota ponderaret. Item Bartholinus in *Actis Hassniens. Vol. 1. Observ. 5. p. 14.* refert virum, qui per aliquot septimanas quotidie ad l. b. xxiv urinæ emisit: vid. etiam *M. A. N. C. Ann. 2. obs. 162. p. 250. & obs. 167. p. 265.* uti etiam Tulpus *l. 2. obs. 46.* Diabeten refert cujusdà, qui quotidie 6. libras mingeret, utur parum vel nihil biberet. Cum modò dicta copiosa nimis urinæ excretionem simul intensissima sitis, debilitas virium, macies totius corporis, febris continua lenta, ardor in & circa regione

nervi



nē dorsi lumbarē & similia symptomata conjuncta sunt; uno nomine symptomata instar hecticæ confirmata, aut instar tabis dorsalis, sicuti etiā cū urina copiosa aliquid pingue excerni, & tandem ut plurimū mors subsequi solet. Equidē non rarum est, copiosiores urinæ excretiones naturæ opus esse, quæ e.g. in febre acuta motu critico, aut huic simili, se ipsam à morbis liberat, unde cum ægri euphoria contingit, nec adeò diu durare solet. Si verò excretio talis urinæ sit diabetes morbosa, paulatim & insensibiliter crescere solet, ita ut æger in principio haud adeò curet, sed successivè uberior quantitas prodit, & tenuis, aquosa, uno nomine sic dicta cruda, quam & oris siccitas & sitis, virium insignis defectus, & viscerum internorum ardoris quidam sensus, &c. comitantur. Quod si urinam aliquando contineant ægri, lumbi, coxæ & testes cum gravitate intumescunt. Aliò autem sensu etiam diabetes dicitur cita nimis potulentorum & liquidorum assumptorum, aut planè non, aut parum admodum mutatorum per vias urinarias excretio, ita ut non rarò forma, h. e. color, odor & sapor assumptorum liquidorum in excretis per urinam adhuc sint sensiles, quam celiacæ & lientericæ similem Galenus *lib. 6. de loc. aff. cap. 3.* pronunciat. Exempli hujus rei non sunt pauca; Sic Bartholinus *Cent. 1. Histor. 68.* talem diabetem calculosi recenset, vinum rubrum assumptum mox per vias urinarias eadem formâ demum reddentis; ut etiam Hæferus *in Herc. Med. pag. 171.* vinum rubrum immutatum per velicam excretum refert, adeò, ut decepti Medici quidam istud vinum pro urina sanguinolenta habuerint: sicut Horstius quoque in *Obs. pag. 397.* observat diabetem miram, in qua vinum & emulsiō seminis violarum & amygdalarum dulcium eodem modo, ut assumpta fuerunt per urinam denuò excreta. Imò observatum fuit, grana anisi, semina coriandri integra, semina ficuum comestorum, & denique radículas apii incisas, & similia unà cum urina fuisse reddita, vid. Sennertus in *Praxi: Mirabilia urinæ excreta vid. in M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 157. p. 248. Obs. 158. p. 266. & Annotat. ad Observat. 157. p. 401.*

Cæterum hi duo affectus distinctissimi, uno nomine diabetis vulgò veniunt, quæ tamen vox propriè, & secundum vocabuli vim posteriori affectui, nempe immutatae assumptorum excretioni, convenit. Dicitur enim diabetes à *διαβαίνω*, quod est citò transeo, ita ut prior species, nempe copiosior urinæ excretio impropriè diabetes dicatur, & diabetes propriè sit affectus, in quo potulenta citò per corpus transeunt, & propterea melioris doctrinæ gratia diabetem in veram & notham seu spuriam distinguo.

Vera est ista posterior, cujus typum hunc

dedimus, nempe immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio. Notha seu spuria erit copiosa saltem & colliquativa urinæ excretio, excedens longè potulentorum quantitatem, cum tabe, siti, febre & similibus affligens.

His quoque tertius, & quasi intermedius gradus addi potest, celiacæ nempe urinalis seu ad matulam, quando nempe chylus cum urina aut loco urinæ prodit, qualem Timæus von Guldensee / *lib. 3. Casu 43.* sub pultaceæ mictionis termino annotavit.

#### C A U S Æ.

Quod ergò attinet diabetem notham seu spuriam, hujus causa investigatu perquam est difficilis: Et quidem considerata veniunt,

1. Unde tanta materiæ quantitas, quæ excernitur?
2. Quare in specie eadem per vias urinarias amandetur?

Quoad quantitatem urinæ excretæ, quæ septies, interdum duodecies excedit potulentorum quantitatem, quæritur: unde urinæ tantæ quantitatis origo? Aliquid lucis afferunt eorum exempla, qui insigniter, licet corpulenti, per usum tamen remedium diureticorum admodum emaciati fuerunt, mediante nempe copioso, hinc per diuretica concitato urinæ profluvio. Exemplum habet Helmontius *tractat. Jus duumvir. §. 59. item Asthma & Tussis §. 44. item Latex Hum. neglect. §. 44. item Schenckius Observat. lib. 3.* sicut alias nimia corpulentia per salivationem Mercurialem curata fuit, uti à Borello *Cent. 2. Obs. 12.* refertur, continuâ masticatione foliorum tabaci crassitiem & pinguedinem corporis insigniter fuisse immutatam. In omnibus his per colliquationis modum, tam contentorum corporis, quam ipsius pinguedinis, hæc ipsa in texturam serosam resoluta istis modis fuerunt excreta: sicut purgantia acrioria simili colliquativâ vi ratione alcali acris humores alterare, & flaccidam seri texturam mutare solent, ut succi colliquefacti forma liquaminis exeant. Hoc posito, arbitror, massam sanguineam, & hinc reliquos corporis succos liquidos, primariò ipsam partem ejusdem chylosam nutritivam, ipsum etiam rorem & succum corporis nutritivum, ipsamque adeò tandem pinguedinem resolvi & colliquefieri, atque ita fatiscere in consistentiam ac formam aquosi laticis, ac ita per loca urinaria excerni. Hinc enim urinæ diabeticorum horum excretæ mira dulcedo, ex pinguedinis aut roris chylosi liquefacti cum salibus urinariis misti, mutuâ temperaturâ, & in dulcedinem vergente texturâ: Confer. Willisius *Pharm. Rat. Part. 1. pag. 164. & 172.* Hujus colliquefcentiæ causa, & inde genita copiosa urina subministratur nobis, dum fluxus hic ita dispositus est, ut præcisè per renes, non verò per alia loca transeat, unde



unde causa simul investiganda est in renum fermento nimis acri, quod ex natura falsa degenerat in successivam urinosam acrimoniam insignem volatilem feri sanguinis, similem acri isti volatili sali, quod in cantharidibus, asellis, scarabæis minoribus, ac his cognatis insectulis, deprehenditur, quæ ex primis viis derivata mediante chylo sanguini, & hinc universo corpori, communicata est; quæ acrimonia urinosa resolvit, attenuat, colliquat, & ita acidum pingue talia coagulans dissolvendo fatiscere cogit sanguinem & nutrimentum corporis chylosum, & ex eo productam pinguedinem. Patet hæc acrimonia colliquesactiva urinosa ex eo, quod in diabete incipiente urina semper acris, & ob ejus rosionem cum ardoris insignioris sensu excernatur; item quod hæc notha diabetes ferè curetur à Practicis eodem modo atque febris hæctica, per ea nempe, quæ acrimoniam feri falsam nimiam temperare valent, qualia sunt v. g. Lacticinia. Et denique, quod hæc diabetes notha inter alias causas remotas ex abusu remediorum diureticorum, contenta corporis attenuantium, ac renes stimulantium excitare soleat, quod patet ex observatione Tulpil loco suprâ citato, & Helmontio *l. al.* & ex Amato Lusitano *cent. 2. obs. 94.* ubi nata fuit diabetes ex usu vini meracioris, & muria fœniculi marini; item Schenckius in *observat. p. 455.* ex diureticorum usu diabetem natam memorat: sic à nimio succi betulæ usu diabetes lethalis observata fuit in *M. A. N. C. Ann. 2. obs. 198. pag. 300.* Item à potu spermatis ranarum insignem diabetem Lössius habet in *observat. pag. 314.* & ex abusu thee Grimmius in *compend. Medico-Chym. pag. 255.* Nempe omnia diuretica hæc alcali subtili plus minus prædita in acre salum volatile in primis viis abundo acriorem reddunt massam sanguineam, cæteraque contenta, hincque liquefactum humorem nutritium, stimulando simul renes, sub forma urinæ excerni faciunt. Hinc est, quod acida volatilia potulenta ob vim diureticam, quam in primis viis acquirunt, etiam diabetem excitant: sic ex Cydoniorum usu diabetem notat Schenckius in *observat.* Item ex pomaceis; item ex abusu vini Rhenani, unde incurabilem diabetem notat Willisius *Pharm. Rat. P. 1. cap. 3. pag. 171.*

Acrimonia autem hæc sanguinis ejusque feri, colliquans fermentum renum, dependet à fermento ex primis viis, nempe ventriculi digestivo, quavis ratione vitiato aut alterato, adeoque prout ventriculi prima digestio basis est reliquarum omnium, ita & hujus ratione vel macri vel pingues reddimur, & consequenter ex alterato eodem pingues emaciari denuò possunt, prout scilicet fermentum ejus spirituosum plus minus acre vel temperatum fuerit, indeque similis notæ chylus corpori undi-

que distribuatur, quo tota massa sanguinea, hinc & alia liquida, & tandem etiam solida afficiuntur ita, ut ab acrimonia alcalina, destructo acido pingui, ceu missionis in sanguine seminali vinculo, liquecant in talia serosa liquamina; sicut crebrius ex primæ digestionis errato, indeque acri colliquativo fermento enato, fluxus alvi colliquativus exoritur, cum insigni, ex corporis macie, virium debilitate; ita patiter simili ex origine aliud acre volatile fermentum, contentorum corporis colliquesactivum, & in serosam consistentiam resolutivum, renasci potest, quo factò fatiscit massa sanguinea in substantiam aquosam. Quod etiam intelligendum de pinguedine, antequam coagulata sit ab acido blando: hoc itaque destructo, necessariò illa degenerat in liquamen serosum, utut Bartholinus *Ad. Hassniens. Vol. 1. obs. 5.* diabetes spurie periodice mentionem faciat, quæ sine ulla corporis consumptione evidente contigerit.

Quoad posterius, quare colliquati ita succiac pinguedo in specie per renes, urinæ sub forma, expurgentur? non est solum textura resoluti & ferescentis fluidi, facile per poros renum transeuntis, sed quandoque ipsi renes simul affecti, & ab acri isto volatili acido & fermento sensibilibiter vellicari & irritari videntur, cujus occasione dolor, ardor, &c. circa renes in lumborum regione percipitur. Spirituum quoque impetus eò magis hinc concitatur, adeoque & massa sanguinea eò uberius quasi movetur, non secus ac ex stimulo purgantium ad intestina, ex stimulo Mercurialium ad glandulas gingivarum, uberius moventur & excernuntur contenta corporis.

Alteram diabetes speciem, nempe genuinam, quod attinet: oritur hæc ipsa ex nimia laxitate & apertura viarum istarum, per quas urina potus ex primis viis ad renes vel loca urinaria mandatur, concurrente forsan simul pyloro nimis laxo, elabi sinente potulenta ceu fluidiora, antequam perfectè sint alterata. Equidem fateor, vias has pro urina potus nondum detectas esse: Nihilominus tamen fieri nequit, ut semina integra coriandri & anisi, frustula radicis apii, excreta cum sanguine rapi, & hinc inde per vasa capillaria circulari potuerint; Item, vinum rubrum, aut emulsiò amygdalarum dulcium & sanguini permisceri & circulari cum eodè, sine insigniore alteratione nequeunt, adeoque qua data proxima via & occasione ex primis ad loca urinaria transeunt. Confirmatur hoc ex eo, quod inter causas remotas ad hanc diabetem veram disponentes imprimis sint acidulæ. Jam verò, uti rectè asserit Helmontius, acidulæ vix ascendunt supra diaphragma. Nam eadem vix haustæ, imprimis continuato eorum usu, subito per urinam denuò transeunt limpide & claræ in eodem quanto, & in eadem ferè forma,

forma, qua fuerunt assumptæ. Ab hoc ergo subito ac sæpius repetito acidularum hauriarum transitu laxata ista via, ex primis viis ad urinarias tendentes, etiam potulentis liberiores concedunt transitum, & sic talis diabetes supervenit. Willisius quidem diabetem hanc veram in *Pharm. Ration. P. 1. sect. 4. c. 3.* omnino negat, sed contra experientiam, quatenus Galenus *l. 4.* bis eam vidisse dicit, & Bartholinus *c. 1. Hist. 68.* refert, urinam vino in paroxylmo nephritico epoto adeo similem redditam fuisse, ut ignaris pro ipso vino propinari potuerit; sicut à Sylvatico sibi narratum fuisse dicit, de quodam, qui curis & marasmo senili emaciatus post emulsionem & consummata mox urinam illorum odore tinctam excreverit.

Sic etiam Hildanus in  *suis Observ. c. 5. obs. 53.* ex usu acidularum observat diabetem, in qua lac amygdalarum immutatum transit: pariter Zacutus Lusitanus *Prax. Admir. Observ. 80.* quinquies tale quid se observasse; sicut & Lofsius cerevisiam immutatam redditam refert. Et Johannes Pigray, chirurgus quidam Gallus, in sua chirurgia refert, se vidisse grana coriandri, durante acidularum usu post pastum pro roborando stomacho assumpta, immutata cum urina reddita. Unde etiam Petrus Pavv in *Observ. pag. 5.* in diabete mortuo renes admodum flaccidos à frequenti liquidorum transitu observavit. Verum, ut existimo, non flacciditate resolutionis seu paralyticæ, aliàs enim potius supprimeretur urina; sed flacciditate nimie aperitionis, qua renes instar spongiæ porosæ molles & flaccidi, fibræque admodum permeabiles redditæ fuerint. Post acidulas etiam frequens calculus disponit ad hanc diabetem. Denique rarum est, quod Salmuth *Cent. 2. observ. 53.* observavit talem diabetem potus planè immutati in febre maligna.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica quod attinet: signa diabetis veræ, seu immutati potus transitus, facile patent, modò conferantur assumpta potulenta cum excreta urina.

Diabetes verò notha, seu copiosum urinæ profluvium, cum paulatim insensibiliter crescat, in principio vix percipitur. Interdum urina talis est tenuis, aquosa & pallida, uno nomine admodum cruda. Curiosum est, quod observavit Willisius in *Pharm. Ration. pag. 164. & 172.* quod urina diabeticorum admodum dulcescat, propter alcali urinolum acré solvens pingua; unde sapor mutatur. Particulæ enim aciores salinæ, v. g. diureticorum, menstrui instar nutritivam gelatinam & spissiore sanguinis consistentiam, quin & acrimoniâ particularum suarum cu-

neorum instar findunt, & affictu suo alterant pinguedinis & carnis musculosæ texturam molliorem, nec adeò tenacem, adeoque hoc modo resolvunt denuò easdem. Ex hoc diabeticorum mira dulcedo derivanda videtur.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: diabetes vera parum habet periculi, quia interdum sponte cessat, estque partim facilis curatu, partim non adeò nociva.

Rarum est, quod duret per totum vitæ cursum, quod sit e noxa observatum in M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 175. pag. 274.*

Diabetes verò notha, est periculosum malum, & sæpe lethale, imprimis nisi in principio, maturè nempe cognitum, curetur; deducit enim successivè ad tabem lethalem homines.

Eadem quoque post immodicum laborem, post nimium Veneris exercitium, post chronicas denique febres, plerumque incurabilis est.

### CURATIO.

Quoad medendi rationem: in diabete notha tres observandæ sunt indicationes.

1. Ante omnia temperanda est acrimonia nimia alcalina volatilis feri, tam per remedia ex fonte pharmaceutico, quam à dietetico.
2. Alimenta chylosa succulenta temperata & subpinguia subministranda:
3. Narcoticorum moderatorum interpolato usu nimia succorum colliquesfactio, & urinæ secretio nonnihil impedienda, additis simul blandis adstringentibus, & renes ac partes corroborantibus.

Ea, quæ primo scopo conveniunt, in specie sunt sulphurea, quippe quæ ab alcali dissoluta istud temperant, & hinc præcipitando compescunt; & absorbentia; hinc acida moderatè austera eadem alterantia quasi, figentia, & plus minus adstringentia: quæ verò ex fonte dietetico, sunt alimenta succulenta, imprimis lacticia. In genere rectè asserere videtur Zacutus Lusitanus *lib. 18. Med. Princ. Hist. cap. 17.* Hujus affectus curationem in quamplurimis convenire cum hecticâ febre; quia tam in 6. rebus nonnaturalibus, quam etiam in medendi ratione is ordo servandus, ut corpus refrigeretur & humectetur, firmetur renes, & eorum exuberans caliditas attemperetur, ut loquitur Zacutus Lusitanus *l. 4.*

Ante omnia ergò quoad pharmaciam vomitus commendatur; apertè enim Brendelius in *Conf. 83.* cui alii consentiunt, ex Platero asserit, principium curationis esse vomitum, jubendo, ut, dum maximâ æger torquetur siti, copiosam deglutiat frigidam, hancque repentè revomat, quod fiat singulis 4. die-

(Nnnn)

die-

Tom. II.



diebus. Item Zacutus Lusitanus dicit: Prodest vomitus iis præsertim, quibus falsa vel viscida pituita in ventriculo abundat. Conf. etiam Ferdinandus Epiphanius *Consil.* 37. item Horatius Augenius *Tom.* 1. *lib.* 12. *Epist.* 3. & Riverius *Pr.* 1. 14. *cap.* 6.

Hoc ergo præmissis ad ea, quæ corrigunt acrimoniam dicti fermenti, est accedendum, quæ inter appropriata imprimis sunt remedia, quæ præparantur ex plantagine & portulaca, nymphæa, papavere, sive eorundem succi, sive syrupi, aut decocta usurpentur, vi enim suâ stypticâ aliquali simul nonnihil in-crassant corporis succos, eorumque colliquefactionem impediunt: item lapis hæmatites, tam naturalis & ejus præparata varia, quam artificialis ex vitriolo & tis & hni saccharo parandus; sublimat enim se hæmatites quali verus, primitus à Glaubero edoctus, tandem contra diabetem notham in M. A. N. C. *Ann.* 2. *observ.* 143. *pag.* 227. descriptus sub nomine lapis chymicus, loco hujus etiam saccharum Saturni cum vitriolo Martis mistum; hinc etiam R sic dicta  $\Delta$ is  $\Theta$ i aut  $\Theta$ is adstringens, ex croco  $\Theta$ is &  $\sim$ u  $\Theta$ i parata, R  $\Theta$ is  $\Theta$ aris, saccharum Saturni, & ex eo &  $\Theta$ o  $\Theta$ is parata R antiphthifica usurpari possunt. Hæmatites naturalis quoque in vehiculo acido est usurpandus, operatur vi acido-austerâ. Conveniunt etiam corallia, & varia ex his parata, imprimis eorum solutiones & Ræ cum succo citri, vel limonum, magisterium coralliorum cum succo citri, vel mixtura ex coralliis cum aceto polychresta Sylvio usitata, de qua vid. *l.* 1. *Prax.* c. 30. § 183. *pag.* 573. & M. A. N. C. *Ann.* 3. *observ.* 183. *pag.* 345. vel

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  plantag.  $\mathfrak{z}$ ij.

+ i vini simpl. vel destillati  $\mathfrak{z}$ vj.

Corall. r. pulver.  $\mathfrak{z}$ j.

laud. opiat. gr. ij.

syr. portulac.  $\mathfrak{z}$ j.

M. D. S.

**Unhaltende Mirtur wohl umzurütteln.**  
Capiatur cochleatim.

Potro alumen, & ut alii volunt,  $\sim$ alum. cum convenienti vehiculo est egregium remedium: Præter quæ tamen etiam succinum & succinata, pinguedine suâ sulphureâ temperatâ imprægnata, locum inveniunt; item trochisci de carabe, de  $\sim$  sigillata, vehiculo subacido assumpti profunt optimè. Quibus speciatim vespertino tempore opiata sunt intermiscenda, suasu Brendelii & Riverii *l.* 4. antihæcticum Poterii, bezoardicum Joviale, imprimis quando urgent febres, item ardores in regione lumborum, & bezoardicum Saturninum & similia, sunt optima. Tandem Aqu. calcis vivæ, sive simplex sive composita, subinde hausta, nobile & singulare est experimentum: vid. Willisius in *Pharmac. Rat. Part.* 1. p. 174. & 177. dosis  $\mathfrak{z}$ ij. iv. ad v. & vj.

ter in die. Alia, ut C. C. ustum, crocus Mart. adstringens, &c. vel spontè ex dictis manifesta evadunt.

Cum his quoad secundam indicationem ea, quæ temperant & nutrimentum suggerunt, simul in auxilium vocanda: inter quæ eminent lactinia, quæ temperant, ac præsertim chalybeatum: hinc Itali ac veteres commendant lac asininum, in quo imprimis  $\Theta$  candens extinctum, & ita chalybeatum factum, quod cum Philonio Persico permistum Zacutus Lusitanus *l.* 2. *Prax. Admir. Observ.* 80. commendat. Loco asinini aut caprini lactis lac bubulum commodè etiam usurpatur, imprimis cum chalybe probè imprægnatum; item emulsiones factæ ex amygdalis dulcibus, seminibus 4. frigidis majoribus (quæ ipsa tamen in pauca dosi addenda) & minoribus, cum semine papav. albi, &c. æque crebrius & copiosius haustæ subinde usurpandæ sunt: vid. Grimm. *l.* 4. qui diabetem cum macie ex abusu potus Thee curavit cum diata ex lacte, & emulsione sem. 4. frigidorum majorum, quibus syrupus de nymphæa, & syrupus de papavere est intermiscendus. Lac chalybeatum semper cibus est permiscendum, & tempore nocturno seu vespertino opiata non negligenda.

Externè sacculi & fomenta ex plantagine, foliis quercus &c. in aqu. chalybeata codi, subinde regioni renum applicentur: item canceri fluviales aut recentes contusi, eorumque succus recens expressus, dicto loco admoveantur.

Diabetes propriè dicta & vera, convenienter curanda venit per adstringentia talia, quæ stomachum nempe & primas vias roborant; qualia sunt in specie Martialia, & vegetabilia adstringentia aromatica. Nempe par ratio est, atque quando in potu acidularum subinde usurpanda sunt omni pastu blanda aromatica & adstringentia, quæ stomachum nempe & viscera firmant. Fugienda autem sunt cydonia & cydoniata, aut saltem non crebrò nimis usurpanda; utur enim sint adstringentia, summè tamen sunt diuretica, uti hoc non tantum observat Bartholinus *Cent.* 5. *Hist.* 22. sed etiam Schenckius in *Observ.* item decoctum prunorum sylvestrium, decoctum corticum aurantium, quercuum, & similia usurpanda veniunt. Crocus Martis adstringens, R  $\Delta$ is  $\Theta$ i, bolus Armena,  $\sim$  sigillata, cum conserva rosarum vitriolata, & conserva radices symphyti conducunt. Potus si plantago in  $\nabla$  chalybeata cocta. Tandem ceu singulare experimentum commendatur, si recipiatur crista galli calcinata, eaque manè & vesperi ægro in propria ejus urina propinatur.

Qui plura de his cupit, adeat præter Mæbium & Willisium de *urinis* Sylvium in *Praxi* *cap.* 55.

ARTI-



ARTICULUS IV.

De

*Urina depravata in renibus secretione.*

**D**Epravatæ urinæ in renibus secretiones terè sunt innumerabiles, dum scil. diversimodè affecta urina in colore, consistentia & contentis excernitur, speciatim tamen sub praxin medicam cadit

1. Urina nimis pinguis & oleaginosa.
2. Urina rubra sanguinolenta.

MEMBRUM I.

De

*Urina pingui & oleaginosa.*

**H**ic ante omnia distinguendum inter urinam pinguem, quæ est talis saltem ratione superficiæ, & ratione consistentiæ. Quoad consistentiam: an sc. ita exactè tota urinæ materia excreta & quoddam repræsentet, vix credo, nisi forsan in diabete vera pinguis & oleosa assumpta sub forma propria demum excernantur, quod tamen unquam me legisse non memini. Aliàs etiam urina talis, perfectè sc. oleaginosa, fieri nequit, ob incompatibilem aquæ cum oleo miscelam, quæ nullo modo possunt conjungi, nisi sit  $\Theta$  alcali fixum in urina, pinguedinem solvens, ut videmus in saponibus. Cum verò in urina tantum sal salsum volatile, non verò purum alcali insit, ideò nec urinæ pinguis & oleaginosa excretio quoad consistentiam concedi potest. Pinguis ergò sæpè excernitur urina, quando nempe in superficie ejus quasi crusta aut pellicula pinguis supernatat, quæ ipsa tamen crusta, probè distinguenda, an sit vera pinguedo? an verò sit saltem crusta salina, pinguedinem tantum mentiens? uti in scorbuticis & hypochondriacis usu venire solet. Differentiæ ratio in eo consistit, quod talis crusta supernatans, si constet ex concrementis salinis in pelliculam inspissatis, quod tunc ad latus juxta lucem aspecta varios colores instar caudæ pavonum, vel instar iridis in sua superficie repræsentet; id quod infallibile signum est crustæ salinæ ex malo hypochondriaco aut scorbutico, in quibus salia heterogenea abundant. Testantur hoc omnes solutiones salium ad pelliculam inspissatæ, quæ pingues videntur. Ubi autem vera est pinguedo, quæ urinæ supernatat, sine ullo colore solet esse conspicua, & etiam subinde quasi guttulas repræsentat, pinguis autem

Tom. II.

fit talis urina ex colliquatione partis pinguioris massæ sanguinæ, in specie pinguedinis corporis, unde pinguedo talis frequenter apparet in urinis, febre ardente colliquativa aut etiam hæctica, tabe, ulceribus renum, & similibus afflictorum. Et hæc ipsa colliquatio oriri videtur ex defectu acidi debiti in massa sanguinea, quod ipsum aliàs spissat & blandè coagulat pinguedinem nutritivam, cujus defectu ipsa denuò liquefcit pinguedo, & ita cum urina denuò excernitur; quæ tamen cum non possit intimè urinæ misceri, supernatat, & sub forma olei conspicitur.

C U R A.

Quoad curam: curatur hæc crusta salina, pinguedinem in urina mentiens, facilè, curato morbo primario, ac in specie conducunt Martialia, acidum peccans absorbentia, & hinc volatilia, illud ad vias urinarias deducunt, ac per cutim emittentia. Urina verò, cui pinguedo vera supernatat, curatur spontè, modò primarius curatus fuerit morbus, in specie per acida blanda, pinguedinis liquefactionem impediencia, eamque coagulantia, ut spiritum  $\Theta$ is dulcem.

MEMBRUM II.

De

*Mictu cruento.*

**P**ORRò urina cruenta seu sanguinolenta excernitur, quando ipsi permiscetur sanguis, nunc copiosus, nunc parvus quidem, unde interdum minus tincta loturæ carniū similis apparet urina, interdum verò intensius rubet, si magis tincta, spissa ac crassa apparet, vel potius ex opaco nigrescit, ita ut etiam linteum immersum suo rubore sanguineo inficiat, & interdum cum sanguine in fundo matulæ subsidente apparet. Sanguis iste, qui tingit urinam, ut plurimum ex renibus effluit, seu in renibus ipsi permiscetur, interdum tamen etiam in ureteribus, interdum etiam in vesica, interdum ex læsis arteriis in pene, quale exemplum vid. in Græcio lib. de Organis Generat. viror. pagin. 151. Rariùs verò ex aliis partibus ad loca urinaria eò deferitur, ut cum urina simul excernatur, v. g. in casu ab alto, aut si grumi sanguinis in pectore, vel alio quodam loco hæreant, qui successivè ad vias urinarias deferuntur. Sicuti rarum est, quod propter inflammationem aut contusionem hepatis urina cruenta interdum

(Nnn 2)

emit-

emittatur. Ex causis etiam antecedentibus facile cognoscitur.

### C A U S Æ.

Causæ urinæ cruentæ, non secus atque aliarum hæmorrhagiarum ( est enim mictus cruentus species hæmorrhagiæ ) in genere oriuntur interdum ex anastomosi vasorum sanguiferorum in viis urinariis; interdum, idque crebrius, ex eorum diæresi, vel diabrosi in locis urinariis. Quoad anastomosin, hæc frequenter fit nunc vitio contentorum, in specie impetu sanguinis, aperientis sua irruptione concitatiores oscula vasorum, nunc vitio ipsorum vasculorum renalium, quando poruli renum sunt nimis aperti cum eorum tubulis, unde sanguis per hiantes poros unâ cum lotio variè transmittitur; vid. Willisius *Pharm. Rat. pag. 166.* quod vitium veteres vocant imbecillitatem renum, estque huiusmodi mictus ferè indolens, minusque intensa tinctura urinæ, minusque crassa. Quoad sanguinis impetum, inferentem vasorum anastomosin, sequitur interdum mictus cruentus post equitationem nimiam, item post nimium motum corporis, saltum nimium; & facile in renibus, impetu in sanguine concitato, orificia aperiri, & ita mictus cruentus inferri potest: vid. Hildanus *Cent. 6. observ. 46.* In specie mictus cruentus per anastomosin nunc est spontaneus, nunc non spontaneus seu symptomaticus: Ille nunc criticus, nunc periodicus, nunc vagus, &c. est. Præcedere autem solet dolor gravativus & tensivus, uti & comitari solet huiusmodi cruentam mictionem perceptibilis in isto loco, in quo sanguis suo impetu anastomosin infert: sequitur enim interdum solennes excretiones sanguinis suppressas mictus cruentus; hinc etiam Forestus *lib. 24. observ. 7.* inquit: *Urinam cruentam ex alto delapsis statim emitti videmus, idque sapius etiam ex nimia Venere in adolescente nobili, in mulieribus etiam mensibus suppressis, & in viris hæmorrhoidibus fluere consuetis & retentis.* Truncatâ etiam manu vel pedè aut pleno corpore, ex abscessibus ulcereque cruento urinam cruentam emictam fuisse scio: id quod ulteriori observatione confirmat de mictu sanguinis, ex suppressis hæmorrhoidibus per intervalla oriundo, Hildanus *Cent. 1. observ. 11.* Quin & periodica quibusdam urinæ cruentæ mictio observatur; vid. præter Schenckium in *Observat. Salmuth c. 3. Histor. 47.* de mictu sanguineo periodico & quasi menstruo, qui cohibitus mortem intulit. Criticus observatur sanguinis mictus, dum morbi solvuntur urinæ sanguinolentæ excretionem: sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. admir. Observat. 69.* mictum cruentum in criticum in

febre ardente observavit; sicuti etiam pleuritides interdum per sanguinis mictum iudicatæ observantur ab Hildano *Cent. 2. observ. 31.* & Schenckio *lib. 2. observ. 20.* ex Marcello Donato. Pertinet huc vini abusus ad mictum cruentum disponens, de quo vid. Zacutus Lusitanus *Medic. Princ. Histor. 139.* item diuretica fortiora aut acriora, v. g. post terebinthinæ nimiam dosin mictionem cruentam refert Hildanus *Cent. 5. observ. 52.* tandem abusus Veneris anastomosin vasorum, & ita etiam mictum cruentum infert, dum in actu Venereo nimio præcipue circa vesicam & partes genitales vasa sanguifera nimis turgida hîscent & aperiuntur, quæ aperta sanguinem fundunt: Inter alia refert Forestus *lib. 14. observ. 10. & 13.* mictum sanguineum ex nimia Venere, qui spongia aceto calido infusa, & lumbis ac partibus genitalibus circumposita, curatus est.

Quoad diæresin, & in specie diabrosin; hæ frequentior causa urinæ sanguinolentæ existunt vitio contentorum acrium, aut erodentium, aut alio modo lædentium vascula ductorum locorum, dum nempe à sero nimis acri vascula sanguifera circa vias utinarias eroduntur, vid. Forestus *lib. 8. observat. 6. 11. 12. & 13.* quò etiam pertinent exulcerationes & excoriationes renum & vesicæ, tali ex causa mictus nati cruenti scorbuticis, catarrhosis, & sero acido falsiori, aut aliàs plus minus corrosivo præditis, accidere solent: calculus item asperitate suâ lædens & lacerans renum, ureterum aut vesicæ membranulas, subinde talem mictum infert: faciunt etiam huc imprimis cantharides, de quibus notum est, quod aut ineptè assumptæ, aut etiam extrinsecus cum vesicatoriis sine iudicio applicatæ, imprimis absque acidis, mictum cruentum subinde admodum dolorosum, & vesicæ excoriationem inferant: vid. Forestus *lib. 24. observat. 7.* Mictum à vermibus cruentum habet Schenckius *Observ. lib. 3. observat. 294.* Pertinet huc curiosâ ista observatio & historia, quam habet Horstius *lib. 4. observat. 42.* mictionis purulentæ & sanguinæ ex ulcere colli vesicæ, propter carunculam ibidem loci ex acidularum usu suppuratam. Sic etiam observatus fuit mictus cruentus ex abusu allii, teste Schenckio in *Observ.* Item ex nimio aloës usu urina cruenta enata refertur in *Act. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 167.* Tandem in morbis malignis, ac speciatim in variolis, supervenit subinde mictus cruentus, qui, quando oritur erosione vasculorum aut vesicæ, est pessimus & admodum funestus, cum ordinariò intereant ægri. Exempla in Schenckio, Hæchstedtero, Salmuth, aliisque inveniuntur, forsan & isti mictus cruenti,

enti, qui in aliis febribus malignis observantur, huc pertinent, ut quando hæmorrhagia penis nimia in febre maligna suppressa dat hæmorrhagiam narium lethalem, vid. Hæchstedterus *Decad. 1. Casu 3.* quin & in peste observata fuit urina sanguinolenta, quæ inter pessima tunc temporis recensetur signa. Tandem urethram vulneratam, exulceratam, &c. etiam mictum cruentum intulisse, Graffius *de Organis Viril. pag. 150. refert.*

Quoad casus externas: quilibet violentus motus ruptioni circa loca urinaria occasionem suggerens, mictum cruentum infert: talia sunt saltus nimius, casus ab alto in dorsum aut lumbos, thorax vulneratus; vid. Rhodius *Cent. 2. observat. 19.* item contusio vehemens circa loca inferiora facta.

### DIAGNOSIS.

Sequuntur signa, quæ satis sunt clara, quoad diagnosin: nam urinam esse cruore tinctam, facile per se patet, modò probè distinguatur rubor urinæ sanguineus à rubedine salina, quando nempe contentis copiosioribus salinis oleosis probè unitis cum liquore continente, idque ferè vi acidi, rubens repræsentatur color; rubedo hæc ex contentis salibus ordinariò est perspicua, clara & quasi fulgida, ac non adeò crassa, aut quæ præcipitata sedimentum vel intensè croceum, vel instar cinnabaris, vel incarnati nonnihil coloris suggerit: econtrà quæ est à sanguine rubra, semper est opaca, turbida & crassiuscula plus minus, prout plus minus sanguinis est permixtum. Unde & à salibus contentis orta rubedo splendet quasi; simili namque ratione ac lixivium lotricum, quò magis est alcalibus imprægnatum, eò magis ad rubedinem vergit; ita & urina, quò magis salibus turget, eò magis flavescit aut rubescit; quæ verò est à sanguine, absque splendore obscura minusque clara observatur. Illa interdum in febribus, interdum in scorbuto, malo hypochondriaco & similibus accidere solet; hæc etiam in aliis ægris deprehenditur.

Et urina cruenta, si ex sanguine constat, si aliquandiu steterit, uno alterovè die crassamentum seponere solet ex intensè rubro quasi nigrescens, & sanguinem grumosum exactè referens.

Verùm cognoscendum ulteriùs: ex quo loco affecto sanguis profluat? si enim est ex affectu renum aut vesicæ, semper dolor aut gravativus, aut acutus rodens percipitur circa locum affectum: quorum ille quoque dignoscitur, si sanguis copiosior fuerit, & urinæ intimius permisceatur; item liquidus, ac non grumosus subsideat: hic, si sanguis parci-

urinæ non æqualiter perfundatur, cùm grumescentia subsideat, ac cum dolore urina prodeat.

Interdum tamen culpâ meatus urinarii tale quid contingit, cuius læsi signa præcesserunt, sanguis sine urina effluit, & mox concretus subsidet.

Si est ex alio loco sanguis, alius partis affectæ signa & symptomata concurrent.

Ex quibus verò causis oriatur urina cruenta, ostendunt antecedentia & adjuncta. Hinc de omnibus mictus cruenti differentiis Medicus sit curiosus, quoad indagandas causas, an nempe sit ex anastomosi? an ex diæresi? & si est à causa externa, saltu, cantharidibus, &c. patet ex ægri relatione; sin à causa interna, examinandus est æger, an sit icorbuticus? an ordinariò aliàs sanguinis evacuationis suppressione laboret? an percipiat dolores circa renes aut vesicam? nam si casus ab alto præcesserit, loca læsa, & circa quæ sanguis extravasatus hæret, non possunt esse incognita, in quibus suspicatur sanguinem devehiri ex aliis locis ad renes.

Si aliàs adsunt symptomata calculi, semper de renibus, aut de vesica affectis, harumque laceratione, suspicio ingruit, vid. Forestus *lib. 8. observat. 6. 11. 12. & 13.* item ulcera vesicæ aut renum antecedentia aut concomitantia ex diæresi mictum cruentum ostendunt, simul adesse solet dolor acutus rodens, morficans, in specie molestus circa pubem, aut vesicam; item si præcesserit stranguria, dysuria, &c. manifestum signum est, mictum cruentum oriri ex excoriatione & erosione vasculorum.

Observandus simul motus naturæ, sive criticus, sive periodicus, qui ferè citra ullius partis urinariæ affectum contingit, ne impediatur, & pro morbofo habeatur, qui tamen salutaris est.

Quod si malum sit à causis externis, à cantharidibus, à radice rubiæ tinctorum, quæ colore rubro inficit urinas; item si ab esu fructus Indici majoris seu opuntia oriatur, quæ ipsa etiam tingit urinas, ex relatione ægri cognoscendum.

In specie si sit à cantharidibus, adesse simul solet intensus stimulus Veneris, ita, ut penis sit intensus & rigidus, & ægri ad Venerem insigniter stimulentur, & si quæ sunt aliarum similes circumstantiæ.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: omnis mictus cruentus, imprimis copiosus ac sæpiùs recurrens, (Nnn 3) peri-



possunt, necesse ergo est, ut remedium calculum frangens ita sit constitutum, ut ferè de utroque, acido nempe & alcali, participet, ut ita concretum tale falsum penetrare, & istud amica sua vi denuo blandè, & quasi liquefaciendo, resolvere possit.

Secunda difficultas est, quod posito, talia remedia & menstrua reperiri, quæ extra corpus solvunt calculum; hæc ipsa tamen longo isto transitu, donec ad calculum perveniant, in vi sua lithontriptica non parum infringantur. Unde errant, qui calculos humanos excretos certis & variis liquoribus injiciunt, expectaturi, quis liquor citius & felicius calculum dissolvat, ut postmodum eodem liquore & intus propinato eundem effectum in renibus & vesica obtineant. Ut taceam, non ejusdem duritiei & compaginis in omnibus nephriticis videri calculos, quin subindè multum variant duritie, firmitate, ac similibus plus minus proprietatibus. Ceterum expertum est ex omnibus vulgaribus menstruis hætenus tentatis, ~um ☽i maximam habere vim in calculo, vel comminuendo, vel friabilem reddendo, & quasi mollicando. Ergo remedium illud lithontripticum necesse sit tale, quod istâ insigni alteratione in primis viis intactum, adhuc maximam partem integrum transeat ad vias urinarias, ibidemque calculum concretum imminuat.

Tertia difficultas est, quod remedium lithontripticum, quod calculum, utpote concretum durum, dissolvere valet, non debeat esse corrosivum, sed quod citra stomachi, intestinorum, & aliorum locorum noxam possit propinari cum hæc ipsæ partes sint longè molliores, & facilius dissolvantur, quàm concretum calculi, partesque attritu calculi antea plus minus læsæ ab acrioribus remediis admodum lædantur, indeque doloris aliaque pathemata exasperentur. Verum hoc ingeni phantasma est nullius momenti, cum nitatur falsâ hypothesi, quasi calculus non esset dissolubilis, nisi per corrosionem, adeoque unum ex menstruorum requisitis sit, ut corrosivitate gaudeant. Malè autem ad corrosivitatem in calculum frangentibus respicitur; corrosio enim est respectus saltem tributis rebus ratione gustus, adeoque plane accidentarium consequens, siquidem etiam reverà dantur menstrua plus minus insipida, aut planè non, aut parùm corrosiva, quæ tamen validissima etiam concreta diffingunt.

Quid igitur est, quod maximè considerandum in menstruis dissolventibus? Respondetur: consideretur proportio ista formalis, quæ est inter particulas menstrui solventis, & particulas ac poros corporis solvendi, ut hinc utriusque corporis particula mutuo nexu se invicem jungere valeant; si enim particula istæ menstrui ita sunt figuratæ seu conformatæ, ut exactè respondeant porulis corporis, prom-

pta & cita fit solutio: sin verò hæc duo nullo modo conveniunt, aut nullam habeant convenientiam aut proportionem requisitam, frustrà est spes solutionis.

Proportio ista materialiter originem ducit ex convenientia seu identitate in radice & essentia; hinc dicunt: menstrua debent esse homogenea cum rebus dissolvendis. Hinc concreta sulphurea per menstrua sulphurea, salina per menstrua salina & aquea, optimè solvuntur, i. e. requiritur in menstruis particulis certa quædam habitudo ad ipsam rem solvendam: vid. Beccherus in *Phys. subterr. lib. 1. p. 39*. Willsius de *Fermentatione pag. 63*. Hinc v. g. ∇ solvit saccharum, alumen, vitriolum, & similia, quæ non dissolvit V; econtrà sebum, ceram, bitumen, succinum, terebinthinam, & similia subjecta, licet molliora, ∇ non dissolvit: V probè rectificatus dissolvit succinum & omnia corpora resinosa, quæ non resolvuntur ab ∇: nihilominus tamen V hic probè rectificatus non attingit saccharum, neque ☽ commune. Portrò ∇ fortis, seu ~ ☽i rectificatus, dissolvi lunam aliaque metalla, sed non aurum, aut lignum, aut ceram aut picem: Huic ∇ si injiciatur aliquid ☽\*ci, tunc promptè solvet ☽, sed non attingit lunam.

Ex his patet, omninò dari menstrua, quæ intactis stomacho & intestinis calculum in renibus attingunt, & eundem dissolvunt; dispar enim est ratio: ut taceam, gustum malæ corrosivitatis indicium exhibere; Multa enim nobis insipida & dulcia videntur, quæ in se admodum acris sunt & plus minus corrosiva, ut arsenicum, & vitæ, ☿ antimonii, & vivus, &c. Lingua ergo ineptus iudex est menstruorum. Ut taceam acris, & respectu certorum corporum acerrima, nobis & ventriculo nostro esse innocua, nec nisi in objectum appropriatum agere: v. g. sicut videmus in aceto, quod solvit corticem testaceum lapideum ovorum durum, substratam verò membranam tenuem aut mollem non attingit, copiosè à nobis etiam assumptum in stomacho est innocuum. Sic cantharides acrimoniam suam circa renes & vesicam saltem explicant, ea exulcerando, quæ tamen stomacho, quem immediatè ingrediuntur, intestinis & aliis partibus sunt innocua. Ergo præter hoc, quod dentur menstrua insipida, attendenda etiam est varietas menstruorum, quæ non simpliciter in corrosivitate, sed in particulari ejus textura, materia & conformatione mechanica consistit. Unde nullum dubium est, dari posse talia remedia, quæ instar menstrui, citra notabilem gustus acerbitatem ex admistione variorum succorum nostri corporis promptè calculos renales in corpore aggredi, eorum poros penetrare, & particulas unitas diffingere aut comminere possit; idque imprimis ex profapia salina, ut id concretum calculi salinum subtiliter penetrent

trent & dissolvant. Unde non ad corrosivitate in specie respiciendum est in remediis calculum frangentibus. Confirmant hoc observationes quædam calculorum in corpore dissolutorum. Nihil dicam de Paracelsi & Helmontii ludo, quia, cum rarus sit, & neuter possit ostendi, apud incredulos non merebitur fidem. Sed urgeo saltem, quod persicaria & succus betulæ, item semen dauci sint ad calculum frangendum destinata. Hinc enim Dn. Boyte in Philosophia experimentaliquot exempla refert, per solum dauci semen fractum fuisse renum calculum. Sic persicaria quoque secretum est quorundam Anglorum, Augenii & Laurembergii, contra renum calculum, quod ejus  $\nabla$  diutius continuata calculum ita comminuerit, ut frustulatim ipse fuerit ejectus. Experimentum etiam ad calculum vesicæ imminuendum sunt millepedes. Sic ipse quoque amicum, Medicinæ Doctorem, Dresdæ novi, qui spiritum instar  $\Theta$   $\star$ ci ex  $\varphi$ o habet volatilem insignem, mediante quo crebrò usurpato, aliquoties renum calculos felici experimento intra corpus comminutos, frustulorum parvorum forma successivè expulit.  $\Theta$  simi columbini benè præparatum & ipsum observatum fuit aliquando dissolvisse calculū, & frustulatim eundē ejecisse.

Sed talia vera lithontriptica reverà sunt rara & pauca. Sufficit, ut loco horū in paroxysmo calculis sedatis maximam partem paroxysmi doloribus & gravioribus symptomatis, diuretica plus minus acria aut fortia appropriata, sed malè Lithontriptica dicta quibusdā, in usū adhibeantur, quæ partim in paroxysmo, partim extra paroxysmum ad præservationē possunt inservire; sive in præservationis negotio operentur acidum absorbendo, ut testacea, lapides minerales & animales; sive vi diuretica renes & loca urinaria abstergendo, ut omnia raphanacea, liquor betulæ, &c. seu balsamicā vi fermentum renum conservando, ut juniperina, terebinthina, &c. Diuretica talia à quibusdam, malè licèt, lithontriptica dicta, sunt multiplicia; & quidem ex vegetabilibus herba & radix liquiritiæ, radix sceniculi, petroselinii, pimpinellæ, lapathi majoris, apii, baccæ juniperi, radix rubiæ tinctorum, eryngii, bardanæ majoris, ononidis. Eminent hæc inter radix armoraciæ, quæ vino infusa recens, & aliquoties hausta, volatili suo  $\Theta$  renes abstergendo à calculo præservat, eundem verò præsentem fortiter pellit. Alii insuper armoraciā, tam radicem quàm folia incisa, infundunt vino, & vase clauso per 14. dies in cella relinquunt, quæm liquorem per alembicū destillatum ad calculum promovendum hinc mirè commendant. Interim tamen ejuscemodi remedia alliata acriora non semper æquè tuta sunt, cum ardores renum in illis soleant intendere, qui aliàs iisdem vexantur. Usurpentur autem talia diuretica præmissis, ut dixi, præ-

mittendis, tam internis primas vias respicientibus, & symptomata mitigantibus, quàm externis anodynis emollientibus. Comodè etiā propinantur sub introitū balnei, ut eò commodius tunc operari queant. Pertinet hūc porrò hederæ terrestris, item capillus Veneris, cherefoliū, parietaria, fragaria, & veronica, de cujus decocto &  $\nabla$  destillata vid. *M. A. N. C. Ann. 1. Obs. 107. pag. 245.* & Crato ii. *Consil.* folia quercus tenella, agrimonia, &c. Conveniunt etiam cepæ & allium, præsertim ejus capita, quæ sale volatili acri penetratè diuretico, tam acidum, calculi coagulatorē, corrigunt, quàm renes abstergunt, eorumq; fermentū ad calculū disponens suo modo alterant. Hinc multis non in-cōgruè in usu positū est singulis novilunii capitulū, vel aliquot saltē allii dentes, 6. 7. 8. 9. &c. minutim conscindere, & in  $\nabla$ æ seu spiritus baccarū juniperi cochleari uno vel altero, vel  $\nabla$  haurire, ad præservationē & curationem calculi, cujus remediū efficaciam laudat Bartholinus in *Epist. Medicinalibus*. Medicus quidā ceu optimū experimentū contra calculū venditavit sequens:

$\star$ . HB heder. terr. M. j.

capitul. allii, No. j. ij. l. iij.

Discerpantur in frustula, affundatur  $\nabla$  lbj.

Stent per  $\varphi$  aliquot probè clausa, deinde agitati & probè colati liquoris detur cochlear j. vel ij. pro præservatione singulis plenilunii & novilunii; hoc enim certissimè præservare, & continuato usu calculū curare asserit.

Cortices avellanarū interiores etiā laudantur. Abrotani pulverem cum  $\varphi$ o Simon Pauli *Quadrip. Botan. pag. 183.* extollit. Huc pertinet & fraxinus, in quo, imprimis semine, non contemnēda est vis contra calculū, præsertim in oleo destillato ac  $\Theta$  volatili seminis fraxini, hinc etiā in ejusdē cortice interiore, quæ singulariter laudantur à Glaubero. *Conf. Aet. Anglic. No. 43.* Hinc non inelegans est hoc oleum lithontripticū admodū balsamicū & potens, quod contra Lithiasin alii faciunt, & tanquā secretū in calculo renum commendant.

$\star$ . Cort. rad. frax. inter. lbij.

bacc. junip. rec. lbij.

terebinth. lbij.

Terantur, & cū terebinthina misceantur, & in lbxij.  $\nabla$ æ in vase obturato in digestionem vel putredinem ponantur per 3. menses, postmodū destillentur leni igne, ut dent  $\varphi$ o potentissimū, cujus guttæ viij. l. x. in vino albo capiendæ, mirè conducere dicuntur tam præservando quàm curando calculo.

Porro laudantur baccæ juniperi, hederæ arboreæ, ciceres rubri, fructus alkekengi & avellanæ, quarū egregiam efficaciam expertus est Amatus Lusitanus in *Cent.* Cynosbati cocti seu conditi commendantur vid. Unzerus de *calc. le. pag. 965.* & Borellus *Cent. 3. obs. 22.* item horū aillij & oleum inde expressum, & spongia, quæ simul anodyna est; vid. Crato *lib. 6. Conf.*

(Mmm 2)

83. &



c. 83. & Simon Pauli *Quadrip. Botan. pag. 65.* & 57. Præter dicta flores genistæ, virgæ aureæ, flores cyani & calcaltrippæ, semen milii solis, in specie semina hyperici, dauci, & cymini. In hyperici semine res est clara, quod manu contritum & contusum terebinthinam spiret & sapiat; Convenit ergo, tam vi balsamica, quam diuretica, unde Zapata in *Clave Med. cap. 10.* mirabiliter extollit ad præservandum calculum sequens Electuarium:

℞. Pulv. hyperici ex sem. in Julio vel Autumno collect. & exsicc. ℥iij.

Sacch. vel conserv. rosæ. vel violæ. vel rob junip. ℞j.

Misc. fiat Electuarium.

Dosis est ʒss omni septimanâ semel vel bis pro circumstantiarum ratione, tribus ante prandium horis usurpandum.

Laudatur quoque hoc ipsum tam præservationis quam curationis gratia ab Epiphanio Ferdinando tanquam expertissimum. *Hist. Med. 54.* De dauco & semine ejus, quantum in calculo valeat, imprimis vid. Helmontius *Tract. de Lithiasi*, ubi experimentis & rationibus comprobat ejus vim antinephriticam, & Angli partim ad præservationem, partim ad curationem paroxysmi nephritici frequenter utuntur hoc semine, tam in substantia, quam, ut moris est, in cerevisia medicata, addendo cerevisiæ, dum fermentare incipit, dauci semen contusum, ita, ut fermentando recludatur à cerevisia, & vis lithontriptica imbibatur. Conf. Boyle in *Philos. Experiment.* De junipero, ejusque baccis & lignis, item de ligno nephritico Indiæ Orientalis, res per se nota est, quid hoc in casu præstent; ex quibus paratum decoctum vel infusum potenter calculos restituit, uti videre potestis in Sennerto, ubi de calculo; Gummi ceraforum solutum in vino, vel sub forma pilularum instar terebinthinæ propinatum egregiè præservat & pellit calculum. Succus citri aut limonum ad ʒij. cum vini malvatici ʒvj. ad exturbandum calculum non injuriâ à Timæo von Guldenelee aliisque laudatur; sicut succus parietariæ & veronica, item rob juniperi, rob cynosbati, & ex his paratum malvaticum juniperinum, aut cynosbatinum non, secus ac succus seu aqua betulæ, mensis Martio collecta ex ramis tenellis betulæ, & instar acidularum gradatim potata, elegantissimum & decantatissimum est contra calculi pathemata: de quo vid. Helmontius *Tract. de Lithiasi cap. 8.* Charleton de *Spiritu Gorgonio seu calculo pag. 179.* Bartholinus in *Act. Med. Hassniens. vol. 1. Observ. 19. pag. 49.* Boyle *Philos. Experiment. Tom. 1. pag. 102.* Kergerus de *Ferment. pag. 178.* M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 155. pag. 278.* & *Ann. 4. Obs. 201. pag. 276.* Ex his aliisque quamplurimis vegetabilibus fiunt vulgò essentia & extracta, nephritica dicta, composita & cū v. u. sato parata.

Porro pertinent huc etiam Sia, tam alcalia quam salia, in specie D, & quæ Dosæ sunt pro sapia, ad calculos solvendo, & vi diuretica promovendo, optima: speciatim tamen excellunt hic salia ex dictis vegetabilibus diureticis parata, ut S genistæ, stipitum fabarum, ononidi, stercoreis columbini; & in specie omnibus his meliora S volatile succini & Surinæ egregia sunt diuretica antinephritica, D fixum, & omnium maximè ~ ~ ~ i dulcis, nobilia sunt remedia,

item lac caprinum, lotium capræ, ut & aliorum animalium stercora & lotia propter Anitrosum in ipsis contentum sunt perquam usitata. De efficacia stercoreis columbini, præter communem Autorum consensum in specie vid. Forestus *lib. 24. Obs. 25. in Schol.* Hinc recipiunt quidam stercus columbinum, moderatè calcinant, & S exinde Posum in vino acidulo propinant, ceu nobile diureticum; uti & alii recipiunt stercus columbinum, istudque macerant in aceto per ʒc, postea filtrant: Aceti hujus part. ij. addunt mellis depur. part. iij. miscent & propinant. Remedii contra calculum Polemanni præscriptio est hæc:

℞. Ds puriss ℞j.

Fluat in Δc, injiciendo desuper frustum Δis communis magnitudine fabæ, quo deflagrat aliud superinijce, donec hujus Δis ʒf. absumpta sit: Ubi omnia refrigerint, ac denuò pulverisata fuerint, denuò eodem modo procedatur, atque hoc tertiâ vice repetatur, semper successive Δis ad ʒss adjiciendo. Jam

℞. Ds ita præp.

Sis absinth. à. ʒj.

succini ʒss.

sacch albi ʒvj.

So destillat. succin. ʒiv.

Misc. pro pulvere.

De hoc dosis, quantum tres cultelli cuspides capiunt, propinetur, unâ vice bis, ter vel quater in die, pro circumstantiarum variatione omnem laburâ ex partibus urinariis evertit, & calculi recentem comminuit.

Hic etiam addatur S compositum, quod in paroxysmo nephritico ad sistendum dolorem nephriticum & promovendum calculum est egregium, cujus præparatio hæc est:

Fiat S fixum ex ʒo mediantibus carbonibus:

Hoc ʒi exporatur Δi, ut liqueat ad pulvis consistentiam saltem: Huic affundatur ʒj

Δi rubri ana.

Facta ebullitione, & eadem cessante abstrahatur liquor ex retorta forti Δc, & remanebit candidum subacidum; quod ipsum præter usum singularem nephriticum etiam aliquid singulare obtinebit in usu Pharmaceutico & alchimistico in puncto solutionis corporis.

Porro præter dicta Sia Dosæ, vi nephritica etiam innotuerunt hætenus ipsi lapides tam minerales, quam animales, unde v. g. lapis Judæus, lapis lyncis, lapis spongiæ, lapis nephriticus, lapides seu oculi cancrorum, lapis in vesica pri seu bovis repertus, mandibulæ lucupifæ, dentes truttarum, lapides percarum, carpiorum, aquilæ; item testæ ovorum, maximè struthionis, &c. Verum hæc ipsa rarò per se solent convenire, sed acidum, calculi coagulator, in corpore peccans saltem absorbendo, acrimoniam feri urinarii in paroxysmo temperant, ac nutritione sui saporis in Ssum tertium, vim diureticam egregiè acquirunt. Melius est, si dissolvantur cum ~ u S composito, ex S composito & S comparato. De ovis struthionum cum ~ u S solutis, vid. Tacchenius *l. 1. Dant.* liquorem nephriticum salium præstant. In pelliculas micelaginolas ~ S testas ovorum solvit, quæ urinosi saporis sunt. Si his aut pelliculis additur S fixum, præcipitat se pulvis, quod probat pelliculis adhuc acidum adfuisse. Faciunt huc liquo-



res nephritici dicti, ex hisce lapidibus parati, quibusdā in usu, pro varietate autorū variū: v. g.

1. *Lapill. 69r.*  
*lapid. Judaic.*  
*lyncis*  
*spongia.*  
*aquila*

*Glac. Maria* a qu. v.

Solvantur in ~u  $\Theta$ is decrepitati ritē destillato (i. e. ultimo  $\Delta$  gradu elicto: ) l. ~u  $\Theta$ is compos. Solutio saporis adstrictorii decātur, filtratur, coagulatur leni calore in vitro ad siccitatem. Materia hæc siccata iterum pulverisanda, & hinc in cella per deliquium dissolvenda, filtranda, & ita pro usu asservanda.

Liquor hic  $\Theta$ sus elegans diureticus ad 20. vel 30. guttulas in declinatione paroxysmi nephritici ad eliminandum calculum in vino frequenter propinatur, pellit calculū per urinam instar massę coagulata. Alias calculus ex felle bovis desumptus & pulverisatus, ad gr. v. assumptus, admodū probatū contra calculum dicitur remediū: nam ~ $\Theta$ is fit ita diureticus, & insigniter expellens. In cancriis fluviatilibus singularis latitat vis antinephritica ratione virtutis diureticę, quę in alcali eorum latet, unde decoctū cancrorū fluviatiliū ovulis prægnantium egregiē ad curandum & præservandum commendatur calculus. Item

2. *Er. fluviat.*

Coqu. in vino in olla probē obturata tamdiu. donec pulverisari possint.

Hujus pulveris 3j. propinata aliquot desperato calculo laborantes, & incredibiliter ejulantes restituit, atque hoc certum est.

De calculo humano dos. 3j ad 3j. urinam pellit. Quibusdam hinc accedit superstitio, quod proprios calculos devoratos præservare à calculo dicunt. Promovent quidem urinam, sed curativē & præservativē nil valent.

Dictis modò lapidibus vicarię sunt testę ovariorū, ex quibus exclusi sunt pulli: omnium optima sunt ova struthionū. Unde etiā testę ovariorū struthionū ingredi simul solent liquorem nephriticum. Alias etiā testę ovariorū calcinatę à multis laudantur. Vid. Bartholinus *Hist. Anatom.* imprimis in C. 4. *Epist. pag. 451. & 526.* refert  $\nabla$ m nephriticam decoctionis talis calcis testarū ovariorum mirē prodesse, & in specie  $\nabla$ m calcis ostreorum ad calculum in mucilaginem dissolvendum, multum prodesse refert. Nam ovariorum testę, uti & marina testacea, calcinando in corpus instar calcis vivę abeunt, cujus lixivium ad calculum in paroxysmo promovendum est laudatum. Sanē in ipsa calce viva vulgari singularis vis antinephritica residet, unde & ~ $\Psi$ x Basilii ritē paratus ceu singularissimum calculum frangens laudatur; loco cujus  $\Theta$  ex calce viva cum  $\Theta$ e \*co calcinando & elixiviando paratum commodē substitui potest. Unde etiam ex calce viva cum tartaro & nephriticę parari solent non inelegantes:

Sic famosus aliquando Medicus Rm nephriticam habuit talem, v. g.

3.  $\Psi$ x part. jv. *Qi crud.* part. ij.

Coqu. in olla c.  $\nabla$  font Liquor filtratur, coagulatur, & emergit  $\Theta$  fixum planē singularis naturę: quod ipsum vel crudum usurpari potest; vel fundatur, hinc extrahatur c.  $\nabla$  probē rectificato, donec rubescat, & saporem urinosum & fortiter penetrantem acquirat.

Quo pertinet antinephriticum D. Helvetii:

4.  $\Psi$ x q. v. affunde

\*i optimi ad eminent. 3. l. 4. digitor.

Coque, frigetac, decanta, inspissa,  $\Theta$  candefac in +ulo, & extra hevel c.  $\nabla$  l. cum vino Hispanico.

Dosis gtt. 10. ad 20. in calculo.

Externē contra podagram 3j. infunditur in vinum aut urinam propriam, & eo lavantur partes podagrā affectę.

Tandem lumbrici, & horum ~ per putrefactionem paratus, egregium sunt nephriticum, qui adhuc superantur ab asellis ritē præparatis. Speciatim scarabæi Majales præ cæteris insigniter conveniunt; imprimis alæ horum superiores ac durę pulverisatę & propinatę in vino usurpatę, egregium dant antinephriticū.

Huc pariter pertinent scorpiones, si nempe pulvis factus ex 4. 5. vel 6. scorpionibus lavatis, sicque vivis per 24. horas in vino Malvatico relictis, postmodum in olla supra folia salvię positus in furno blandē crematis. Dosis gr. ij. jv. aut v. in ovo sorbili vel vino propinata, calculus promover.

Grilli domestici, in rusticorum hypocauftis familiares, egregium sunt lithontripticum, si nempe unus altervè, abjectis capitibus, alis ac pedibus, in  $\nabla$  petroselini vel alia appropriata macerentur, idque tamdiu, donec in liquorem lacteum facessant, liquorque propinetur, multoties experimentum hoc factum, & ad miraculum in urina retentione fluxus secutus; quin etiā vel integer vel resolutus calculus prodire coactus fuit: vid. *M. A. N. C. ann. 9. & no. Obs. 71.* Huc etiā facit essentia reguli avis Goerlicensii.

#### CURA PRÆSERVATORIA.

Præservantia in 4. classes dividuntur:

1. Sunt ea, quę primas vias frequentius abstergunt & expurgant.
2. Quę acidum coagulans primarum viarum, & hinc viarum urinariorum vitiosum corrigunt aut absorbent.
3. Quę renes moderatis diureticis abstergunt.
4. Ea, quę in specie renibus, eorumque fermento appropriata sunt.

Ratione primarum viarum conveniet, hæc cruditates singulis tribus vel quatuor mensibus purgatione solenniore, singulis verò septimanis laxante, evacuare: Quarum tamen nec illa fortiora sint, i. e. quę humores nimis exagitant, & ad renes commovent; vid. Nicolaus Piso *lib. 3. Pract. cap. 35.* & Unzerus de *Nephritide lib. 1. pag. 972.* sed mitiora, qualia præter superius recensita sunt helleborus niger, folia sennę, vid. *Montanus Consil. 267. & 268.* pulvis Solenādris senna,

(M m m m 3) rhabar,

rhabarbaro, turpetho; syrupus rosarum solutivus, &c. Hinc quotidie etiam assumantur juscula, in quibus radix liquiritiae, polypodii, flores violarum, &c. ebullierint, aut decoctum prunorum simplex, vel cum foliis sennae; item cremor & crystalli tartari, &c. Imò hujus loci imprimis quoque erunt vomitoria, teste Hildano *Cent. 5. Obs. 61. & Epist. 35.* & Unzero *l. 4. pag. 975.* & quidem modò mitiora, modò potentiora, pro circumstantiarum varietate. Acidum coagulans temperant ac absorbent terrea absorbentia, vel mineralia, vel animalia, lapides nempe suprà memorati, & testacea, v. g. lapis spongiae, cancerorum, corallia, silices & alcalia fixa ex diureticis parata; item lixivium tale, in quo silices candelacti extincti sunt. His salia volatilia & ~ urinosos addere licet, frequentius cum pastu aut post pastum assumptos.

*℞. arcan. dupl. ℥j.*

*corall. rubr. prap.*

*matr. perlar. prap. ā ʒß.*

Misc. propulvere:

Div. in 2. part. æqu. S.

Digestiv. Pulver.

Tertio scopo satisfaciunt diuretica volatilia, ut  $\Theta$ ia volatilia quaecunque, in specie ~ &  $\Theta$  volatile tartari, ~ carminativus de tribus, ~  $\Theta$  \*ci & urinæ, R nephritica Ammelungii, ~ lumbricorum, elixyr proprietatis.

*℞. R tartari acerr.*

*compos. ā ʒß.*

M. S. Magen-Mixtur.

*℞. Aqu. alkek.*

*ceras. nigr. c. nucl. ā ʒß.*

*malv. juniperin. ʒvj. ad ʒj.*

*Ra nephrit. ʒij.*

*lapill. ʒr. prap. ʒß.*

*land. opiat. gr. ij.*

*syrup. fragor. ʒß.*

M. D. S.

Nieren-reinigende Mixtur/  
Lösfel-weise.

Addunt his nonnulli lac & lacticia, excepto caseo. Verum cum omne lac plus minus substantiae caseosae in se habeat, de ejus usu in lithiasi merito dubitatur: vid. Horatius Augenus *T. I. l. 2. Epist. 1. cap. 8. 9. &c.* & Unzerus *l. 4. pag. 963.*

Renes quoque abstergunt serum lactis, acidulae, aquae quaevis, & pinguis frequentius hausta: Hinc Zecchius *Consult. 13. & 17.* Juscula pulli gallinacei, vitulinae aut vervecinae carnis, item aquam tepidam simplicem immediate ante pastum quemlibet commendat. Ast potentius agunt haec diuretica, quamvis nonnulli sint, qui eorum usum in praeservatione à calculo planè interdiciunt, sc. Crato apud Scholzum *Consil. 246.* Henricus *Methodo ad Praxin lib. 2. cap. 12.* & Rubæus in *Celsum lib. 4. cap. 10.* Ab aliis tamen ea maxime commendantur, v. g. Unzero, Riverio, &c. sed

controversia hæc facile componi potest, modò observetur in eorum usu, ut

1. Mitiora sint.

2. Jejuno stomacho, & longè ante pastum.

3. Non, nisi purgatis prius primis viis, propinentur.

Talia sunt terebinthinata, juniperina, de quibus vid. Amatus Lusitanus, radix bardanz, raphanorum genera cuncta, v. g. armoraciae radix & folia, si vinum ab his destilletur, liquor betulae, semen dauci, quod cum cerevisia fermentatum contra calculum commendat Bartholinus *Cent. 3. Epist. 30. & in Act. Hassniens. P. 1. Obs. 19.* Succus veronicae in saccharo inspissatus, & cum semine violarum mixtus, vid. Crato *l. 4.* Ex scarabaeis subceruleis combustis Borellus *Cent. 4. Obs. 73.* addendo tantulum caryophyllorum, pulverem parat: Alii pulverem scorpionum exhibent: Ab aliis vero acidulae non sine ratione laudantur. Verum horum usus non adeò frequens esse debet, & sufficiet bis tantum in mense, aut vix intra 3. septimanas illa assumere; quamvis observatio, cujus Amatus Lusitanus *Cent. 2. Observat. 68.* mentionem facit, terebinthinæ usum frequentiore concedere videatur.

Pro quarto scopo conducunt ea, quae praeservant à putredine renali, qualia sunt balsamica, terebinthinata, juniperina, balsamus sulphuris terebinthinatus, hypericata, remedia ex dauco, anisata, moschata, in specie crocus, macis, allium & alliata, succus betulae, rhabarbarum & similia renibus dicata.

## ARTICULUS III

De

*Urinae Secretione nimis aucta, seu Diabete.*

Aliàs Diabetis nomine duo vitia insigniuntur, idque promiscuè, adeoque nec absque confusione. Nam primò est diabetes, das allzu viele Harnen/ quando immodicè urina effluit, & plus quidem, quàm bibendo homo assumit, cujus rei exemplum stupendum suppeditat Digby in Oratione de pulvere sympathetico; sicut etiam Schenckius in *Observ. lib. 3.* qui inter alia refert quendam, qui quotidie supra 4. cantharos minxit, ut vix quadrantem biberit: Idem notat exemplum puellae plus paucis diebus mingentis, quàm ut tota ponderaret. Item Bartholinus in *Actis Hassniens. Vol. 1. Observ. 5. p. 14.* refert virum, qui per aliquot septimanas quotidie ad l. b. xxiv urinæ emisit: vid. etiam *M. A. N. C. Ann. 2. obs. 162. p. 267. & obs. 167. p. 265.* uti etiam Tulpus *l. 2. obs. 46.* Diabeten refert cujusdà, qui quotidie 6. libras mingeret, ut parum vel nihil biberet. Cum modò dicta copiosa nimis urinæ excretionem simul intensissima sitis, debilitas virium, macies totius corporis, febris continua lenta, ardor in & circa regionem



nē dorsi lumbarē & similia symptomata conjuncta sunt; uno nomine symptomata instar hecticæ confirmatæ, aut instar tabis dorsalis, sicuti etiā cū urina copiosa aliquid pingue excerni, & tandem ut plurimū mors subsequi solet. Equidē non rarum est, copiosiores urinæ excretiones naturæ opus esse, quæ e.g. in febre acuta motu critico, aut huic simili, se ipsam à morbis liberat, unde cum ægri euphoria contingit, nec adeo diu durare solet. Si verò excretio talis urinæ sit diabetes morboſa, paulatim & insensibiliter crescere solet, ita ut æger in principio haud adeo curet, sed successivè uberior quantitas prodit, & tenuis, aquosa, uno nomine sic dicta cruda, quam & oris siccitas & sitis, virium insignis defectus, & viscerum interiorum ardoris quidam sensus, &c. comitantur. Quod si urinam aliquando contineant ægri, lumbi, coxæ & testes cum gravitate intumescunt. Alio autem sensu etiam diabetes dicitur cito nimis potulentorum & liquidorum assumptorum, aut planè non, aut parum admodum mutatorum per vias urinarias excretio, ita ut non raro forma, h. e. color, odor & sapor assumptorum liquidorum in excretis per urinam adhuc sint sensibiles, quam cæliacæ & lentericæ similem Galenus *lib. 6. de loc. aff. cap. 3.* pronunciat. Exempli hujus rei non sunt pauca; Sic Bartholinus *Cent. 1. Histor. 68.* talem diabetem calculosi recenset, vinum rubrum assumptum mox per vias urinarias eadem formā demum reddentis; ut etiam Hæferus in *Herc. Med. pag. 171.* vinum rubrum immutatum per velicam excretum refert, adeo, ut decepti Medici quidam istud vinum pro urina sanguinolenta habuerint: sicut Horstius quoque in *Obs. pag. 397.* observat diabetem miram, in qua vinum & emulſio seminis violarum & amygdalarum dulcium eodem modo, ut assumpta fuerunt per urinam denuò excreta. Imò observatum fuit, grana anisi, semina coriandri integra, semina ficuum comestorum, & denique radículas apii incisas, & similia unā cum urina fuisse reddita, vid. Sennertus in *Praxi: Mirabilia urinæ excreta vid. in M. A. N. C. Ann. 2. Observ. 157. p. 248. Obs. 158. p. 266. & Annotat. ad Observat. 157. p. 401.*

Cæterum hi duo affectus distinctissimi, uno nomine diabetis vulgò veniunt, quæ tamen vox propriè, & secundum vocabuli vim posteriori affectui, nempe immutatæ assumptorum excretioni, convenit. Dicitur enim diabetes à *διαβαίνω*, quod est citò tranſeo, ita ut prior species, nempe copiosior urinæ excretio impropriè diabetes dicatur, & diabetes propriè sit affectus, in quo potulenta citò per corpus tranſeunt, & propterea melioris doctrinæ gratia diabetem in veram & notham seu spuriam distinguo.

Vera est ista posterior, cujus typum hunc

dedimus, nempe immutata ingestorum potulentorum per urinam excretio. Notha seu spuria erit copiosa saltem & colliquativa urinæ excretio, excedens longè potulentorum quantitatem, cum tabe, siti, febre & similibus affligens.

His quoque tertius, & quasi intermedius gradus addi potest, cæliaca nempe urinalis seu ad matulam, quando nempe chylus cum urina aut loco urinæ prodit, qualem Timæus von Guldensee / *lib. 3. Casu 43.* sub pultaceæ mictionis termino annotavit.

#### C A U S Æ.

Quod ergò attinet diabetem notham seu spuriam, hujus causa investigatu perquam est difficilis: Et quidem consideranda veniunt,

1. Unde tanta materiæ quantitas, quæ excernitur?
2. Quare in specie eadem per vias urinarias amandetur?

Quoad quantitatem urinæ excretæ, quæ septies, interdum duodecies excedit potulentorum quantitatem, quæritur: unde urinæ tantæ quantitatis origo? Aliquid lucis afferunt eorum exempla, qui insigniter, licet corpulenti, per usum tamen remediorum diureticorum admodum emaciati fuerunt, mediante nempe copioso, hinc per diuretica concitato urinæ profluvio. Exemplum habet Helmontius *tractat. Jus duumvir. §. 59. item Asthma & Tussis §. 44. item Latex Hum. nedgei §. 44. item Schenckius Observat. lib. 3.* sicut aliàs nimia corpulentia per salivationem Mercurialem curata fuit, uti à Borello *Cent. 2. Obs. 12.* refertur, continuā masticatione foliorum tabaci crassitiem & pinguedinem corporis insigniter fuisse immutatam. In omnibus his per colliquationis modum, tam contentorum corporis, quam ipsius pinguedinis, hæc ipsa in texturam serosam resoluta istis modis fuerunt excreta: sicut purgantia acioria simili colliquativā vi ratione alcali acris humores alterare, & flaccidam seri texturam mutare solent, ut succi colliquefacti forma liquaminis exeant. Hoc posito, arbitror, massam sanguineam, & hinc reliquos corporis succos liquidos, primariò ipsam partem ejusdem chylosam nutritivam, ipsum etiam rorem & succum corporis nutritivum, ipsamque adeo tandem pinguedinem resolveri & colliqueſieri, atque ita fatiscere in consistentiam ac formam aquosi laticis, ac ita per loca urinaria excerni. Hinc enim urinæ diabeticorum horum excretæ mira dulcedo, ex pinguedinis aut roris chylosi liquefacti cum salibus urinariis misti, mutuā temperaturā, & in dulcedinem vergente texturā: Confer. Willisius *Pharm. Rat. Part. 1. pag. 164. & 172.* Hujus colliqueſcentiæ causa, & inde genita copiosa urina subministratur nobis, dum fluxus hic ita dispositus est, ut præcisè per renes, non verò per alia loca tranſeat, unde



unde causa simul investiganda est in renum fermento nimis acri, quod ex natura falsa degenerat in successivam urinofam acrimoniam insignem volatilem feri sanguinis, similem acri isti volatili sali, quod in cantharidibus, asellis, scarabæis minoribus, ac his cognatis insectulis,prehenditur, quæ ex primis viis derivata mediante chylo sanguini, & hinc universo corpori, communicata est; quæ acrimonia urinosa resolvit, attenuat, colliquat, & ita acidum pingue talia coagulans dissolvendo fatiscere cogit sanguinem & nutrimentum corporis chylosum, & ex eo productam pinguedinem. Patet hæc acrimonia colliquefactiva urinosa ex eo, quod in diabete incipiente urina semper acris, & ob ejus resolutionem cum ardoris insignioris sensu excernatur; item quod hæc notha diabetes ferè curetur à Practicis eodem modo atque febris hæctica, per ea nempe, quæ acrimoniam feri falsam nimiam temperare valent, qualia sunt v. g. Lacticinia. Et denique, quod hæc diabetes notha inter alias causas remotas ex abusu remediorum diureticorum, contenta corporis attenuantium, ac renes stimulantium excitare soleat, quod patet ex observatione Tulpii loco suprâ citato, & Helmontio *l. al.* & ex Amato Lusitano *cent. 2. obs. 94.* ubi nata fuit diabetes ex usu vini meracioris, & muria sceniculi marini; item Schenckius in *observat. p. 455.* ex diureticorum usu diabetem natam memorat: sic à nimio succi betulæ usu diabetes lethalis observata fuit in *M. A. N. C. Ann. 2. obs. 198. pag. 300.* Item à potu spermatis ranarum insignem diabetem Lössius habet in *observat. pag. 314.* & ex abusu theæ Grimmius in *compend. Medico-Chym. pag. 255.* Nempe omnia diuretica hæc alcali subtili plus minus prædita in acre falsum volatile in primis viis abundo acriorem reddunt massam sanguineam, cæteraque contenta, hincque liquefactum humorem nutritium, stimulando simul renes, sub forma urinæ excerni faciunt. Hinc est, quod acida volatilia potulenta ob vim diureticam, quam in primis viis acquirunt, etiam diabetem excitant: sic ex Cydoniorum usu diabetem notat Schenckius in *observ.* Item ex pomaceis; item ex abusu vini Rhenani, unde incurabilem diabetem notat Willisius *Pharm. Rat. P. 1. cap. 3. pag. 171.*

Acrimonia autem hæc sanguinis ejusque feri, colliquans fermentum renum, dependet à fermento ex primis viis, nempe ventriculi digestivo, quavis ratione vitiatum aut alteratum, adeoque prout ventriculi prima digestio basis est reliquarum omnium, ita & hujus ratione vel macri vel pingues reddimur, & consequenter ex alterato eodem pingues emaciari denuò possunt, prout scilicet fermentum ejus spirituosum plus minus acre vel temperatum fuerit, indeque similis notæ chylus corpori undi-

que distribuatur, quo tota massa sanguinea, hinc & alia liquida, & tandem etiam solida afficiuntur ita, ut ab acrimonia alcalina, destructo acido pingui, ceu mitionis in sanguine seminali vinculo, liquecant in talia serosa liquamina; sicut crebrius ex primæ digestionis errato, indeque acri colliquativo fermento enato, fluxus alvi colliquativus exoritur, cum insigni, ex corporis macie, virium debilitate; ita pariter simili ex origine aliud acre volatile fermentum, contentorum corporis colliquefactivum, & in serosam consistentiam resolutivum, renasci potest, quo facto fatiscit massa sanguinea in substantiam aquosam. Quod etiam intelligendum de pinguedine, antequam coagulata sit ab acido blando: hoc itaque destructo, necessario illa degenerat in liquamen serosum, utut Bartholinus *Ad. Hassniens. Vol. 1. obs. 5.* diabetes spurix periodicæ mentionem faciat, quæ sine ulla corporis consumptione evidente contigerit.

Quoad posterius, quare colliquati ita succi ac pinguedo in specie per renes, urinæ sub forma, expurgentur? non est solum textura resoluti & ferescentis fluidi, facile per poros renum transeuntis, sed quandoque ipsi renes simul affecti, & ab acri isto volatili acido solo fermento sensibilibiter vellicari & irritari videntur, cujus occasione dolor, ardor, &c. circa renes in lumborum regione percipitur. Spirituum quoque impetus eò magis hinc concitatur, adeoque & massa sanguinea eò uberius quasi movetur, non secus ac ex stimulo purgantium ad intestina, ex stimulo Mercurialium ad glandulas gingivarum, uberius moventur & excernuntur contenta corporis.

Alteram diabetes speciem, nempe genuinam, quod attinet: oritur hæc ipsa ex nimia laxitate & apertura viarum istarum, per quas urina potus ex primis viis ad renes vel loca urinaria mandatur, concurrente forsan simul pyloro nimis laxo, elabi sinente potulenta ceu fluidiora, antequam perfectè sint alterata. Equidem fateor, vias has pro urina potus nondum detectas esse: Nihilominus tamen fieri nequit, ut semina integra coriandri & anisi, frustula radices apii, excreta cum sanguine rapi, & hinc inde per vasa capillaria circulari potuerint; Item, vinum rubrum, aut emulsião amygdalarum dulcium & sanguini permisceri & circulari cum eodè, sine insigniore alteratione nequeunt, adeoque qua data proxima via & occasione ex primis ad loca urinaria transeunt. Confirmatur hoc ex eo, quod inter causas remotas ad hanc diabetem veram disponentes imprimis sint acidulæ. Jam verò, uti rectè asserit Helmontius, acidulæ vix ascendunt supra diaphragma. Nam eadem vix haustæ, imprimis continuato eorum usu, subito per urinam denuò transeunt limpide & claræ in eodem quanto, & in eadem ferè forma,

forma, qua fuerunt assumptæ. Ab hoc ergo subito ac sæpius repetito acidularum hauritarum transitu laxatæ istæ viæ, ex primis viis ad urinarias tendentes, etiam potulentis liberiores concedunt transitum, & sic talis diabetes supervenit. Willisius quidem diabetem hanc veram in *Pharm. Ration. P. I. sect. 4. c. 3.* omninò negat; sed contra experientiam, quatenus Galenus *l. a.* bis eam vidisse dicit, & Bartholinus *c. I. Hist. 68.* refert, urinam vino in paroxysmo nephritico epoto adeo similem redditam fuisse, ut ignaris pro ipso vino propinari potuerit; sicut à Sylvatico sibi narratum fuisse dicit, de quodam, qui curis & marasmo senili emaciatus post emuliones & consummata mox urinam illorum odore tinctam excreverit.

Sic etiam Hildanus in  *suis Observ. c. 5. obs. 53.* ex usu acidularum observat diabetem, in qua lac amygdalarum immutatum transit: pariter Zacutus Lusitanus *Prax. Admir. Observ. 80.* quinquies tale quid se observasse; sicut & Lollius cerevisiam immutatam redditam refert. Et Johannes Pigray, chirurgus quidam Gallus, in sua chirurgia refert, se vidisse grana coriandri, durante acidularum usu post pastum pro roborando stomacho assumpta, immutata cum urina reddita. Unde etiam Petrus Pavv in *Observ. pag. 5.* in diabete mortuo renes admodum flaccidos à frequenti liquidorum transitu observavit. Verum, ut existimo, non flacciditate resolutionis seu paralyticæ, aliàs enim potius supprimeretur urina; sed flacciditate nimix aperitionis, qua renes instar spongiæ porosæ molles & flaccidi, fibræque admodum permeabiles redditæ fuerint. Post acidulas etiam frequens calculus disponit ad hanc diabetem. Denique rarum est, quod Salmuth *Cent. 2. observ. 53.* observavit talem diabetem potus planè immutati in febre maligna.

### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica quod attinet: signa diabetis veræ, seu immutati potus transitus, facile patent, modò conferantur assumpta potulenta cum excreta urina.

Diabetes verò notha, seu copiosum urinæ profluvium, cum paulatim insensibiliter crescat, in principio vix percipitur. Interdum urina talis est tenuis, aquosa & pallida, uno nomine admodum cruda. Curiosum est, quod observavit Willisius in *Pharm. Ration. pag. 164. & 172.* quod urina diabeticorum admodum dulcescat, propter alcali urinosum acré solvens pingua; unde sapor mutatur. Particulæ enim acriores salinæ, v. g. diureticorum, menstrui instar nutritivam gelatinam & spissiore sanguinis consistentiam, quin & acrimoniâ particularum suarum cu-

neorum instar findunt, & affrictu suo alterant pinguedinis & carnis musculosæ texturam molliorem, nec adeò tenacem, adeoque hoc modo resolvunt denuò easdem. Ex hoc diabeticorum mira dulcedo derivanda videtur.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: diabetes vera parum habet periculi, quia interdum sponte cessat, estque partim facilis curatu, partim non adeò nociva.

Rarum est, quod daret per totum vitæ cursum, quod sit e noxa observatum in M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 175. pag. 274.*

Diabetes verò notha, est periculosum malum, & sæpe lethale, imprimis nisi in principio, maturè nempe cognitum, curetur; deducit enim successivè ad tabem lethalem homines.

Eadem quoque post immodicum laborem, post nimium Veneris exercitium, post chronicas denique febres, plerumq; incurabilis est.

### CURATIO.

Quoad medendi rationem: in diabete notha tres observandæ sunt indicationes.

1. Ante omnia temperanda est acrimonia nimia alcalina volatilis feri, tam per remedia ex fonte pharmaceutico, quàm diætetico.
2. Alimenta chylosa succulenta temperata & subpinguia subministranda:
3. Narcoticorum moderatorum interpolato usu nimia succorum colliquescitio, & urinæ secretio nonnihil impedienda, additis simul blandis adstringentibus, & renes ac partes corroborantibus.

Ea, quæ primo scopo conveniunt, in specie sunt sulphurea, quippe quæ ab alcali dissoluta istud temperant, & hinc præcipitando compescunt; & absorbentia; hinc acida moderatè austera eadem alterantia quasi, figentia, & plus minus adstringentia: quæ verò ex fonte diætetico, sunt alimenta succulenta, imprimis lacticia. In genere rectè asserere videtur Zacutus Lusitanus *lib. 18. Med. Princ. Hist. cap. 17.* Huius affectus curationem in quamplurimis convenire cum hæctica febre; quia tam in 6. rebus nonnaturalibus, quàm etiam in medendi ratione is ordo servandus, ut corpus refrigeretur & humectetur, firmetur renes, & eorum exuberans caliditas attemperetur, ut loquitur Zacutus Lusitanus *l. a.*

Ante omnia ergo quoad pharmaciam vomitus commendatur; apertè enim Brendelius in *Conf. 83.* cui alii consentiunt, ex Platero asserit, principium curationis esse vomitum, iubendo, ut, dum maximâ æger torquetur siti, copiosam deglutiatur frigidam, hancque repentè revomat, quod fiat singulis 4.

(Nnnn)

die-



diebus. Item Zacutus Lusitanus dicit: Prodest vomitus iis præsertim, quibus salsa vel viscida pituita in ventriculo abundat. Conf. etiam Ferdinandus Epiphanius *Consil.* 37. item Horatius Augenius *Tom.* 1. *lib.* 12. *Epist.* 3. & Riverius *Pr.* 1. 14. *cap.* 6.

Hoc ergo præmissis ad ea, quæ corrigunt acrimoniam dicti fermenti, est accedendum, quæ inter appropriata imprimis sunt remedia, quæ præparantur ex plantagine & portulaca, nymphæa, papavere, sive eorundem succi, sive syrupi, aut decocta usurpentur, vi enim suâ stypticâ aliquali simul nonnihil incrassant corporis succos, eorumque colliquefactionem impediunt; item lapis hæmatites, tam naturalis & ejus præparata varia, quam artificialis ex vitriolo & tis & hni saccharo parandus; sublimat enim se hæmatites quali verus, primitus à Glaubero edoctus, tandem contra diabetem notham in *M. A. N. C. Ann.* 2. *observ.* 143. *pag.* 227. descriptus sub nomine lapis chymicus, loco hujus etiam saccharum Saturni cum vitriolo Martis mistum; hinc etiam R sic dicta  $\text{¶}$ is  $\text{¶}$ i aut  $\text{¶}$ is adstringens, ex croco  $\text{¶}$ is &  $\text{¶}$ u  $\text{¶}$ i parata, R  $\text{¶}$ is  $\text{¶}$ aris, saccharum Saturni, & ex eo &  $\text{¶}$ o  $\text{¶}$ is parata R antiphthifica usurpari possunt. Hæmatites naturalis quoque in vehiculo acido est usurpandus, operatur vi acido-austerâ. Conveniunt etiam corallia, & varia ex his parata, imprimis eorum solutiones & Ræ cum succo citri, vel limonum, magisterium coralliorum cum succo citri, vel mixtura ex coralliis cum aceto polychresta Sylvio usitata, de qua vid. *l.* 1. *Prax.* c. 30. §. 183. *pag.* 573. & *M. A. N. C. Ann.* 3. *observ.* 183. *pag.* 345. vel

R.  $\nabla$  plantag.  $\text{¶}$ ij.  
 $\text{¶}$ i vini simpl. vel destillati 3vj.  
 Corall. r. pulver. 3j.  
 laud. opiat. gr. ij.  
 syr. portulac.  $\text{¶}$ j.  
 M. D. S.

#### Unhaltende Mictur wohl umzurütteln. Capiatur cochleatim.

Porrò alumen, & ut alii volunt,  $\text{¶}$ alum. cum convenienti vehiculo est egregium remedium: Præter quæ tamen etiam succinum & succinata, pinguedine suâ sulphureâ temperatâ imprægnata, locum inveniunt; item trochisci de carabe, de  $\text{¶}$  sigillata, vehiculo sub acido assumpti profunt optimè. Quibus speciatim vespertino tempore opiatâ sunt intermiscenda, suâsu Brendelii & Riverii *l.* 4. antihecticum Poterii, bezoardicum Joviale, imprimis quando urgent febres, item ardores in regione lumborum, & bezoardicum Saturninum & similia, sunt optima. Tandem Aqu. calcis vivæ, sive simplex sive composita, subinde hausta, nobile & singulare est experimentum: vid. Willisius in *Pharmac. Rat. Part.* 1. *p.* 174. & 177. dosis  $\text{¶}$ ij. iv. ad v. & vj.

ter in die. Alia, ut C. C. ustum, crocus Mart. adstringens, &c. vel spontè ex dictis manifesta evadunt.

Cum his quoad secundam indicationem ea, quæ temperant & nutrimentum suggerunt, simul in auxilium vocanda: inter quæ eminent lacticia, quæ temperant, ac præsertim chalybeatum: hinc Itali ac veteres commendant lac asininum, in quo imprimis  $\text{¶}$  candens extinctum, & ita chalybeatum factum, quod cum Philonio Persico permistum Zacutus Lusitanus *l.* 2. *Prax. Admir. Observ.* 80. commendat. Loco asinini aut caprini lactis lac bubulum commodè etiam usurpatur, imprimis cum chalybe probè imprægnatum; item emulsiones factæ ex amygdalis dulcibus, seminibus 4. frigidis majoribus (quæ ipsa tamen in pauca dosi addenda) & minoribus, cum semine papav. albi, &c. æque crebrius & copiosius haustæ subinde usurpandæ sunt: vid. Grimm, *l.* 4. qui diabetem cum imacie ex abusu potus Thee curavit cum diata ex lacte, & emulsione sem. 4. frigidorum majorum, quibus syrupus de nymphæa, & syrupus de papavere est intermiscendus. Lac chalybeatum semper cibus est permiscendum, & tempore nocturno seu vespertino opiatâ non negligenda.

Externè sacculi & fomenta ex plantagine, foliis quercus &c. in aqu. chalybeata cocti, subinde regioni renum applicentur: item canceri fluviales aut recentes contusi, eorumque succus recens expressus, dicto loco admoveantur.

Diabetes propriè dicta & vera, convenienter curanda venit per adstringentia talia, quæ stomachum nempe & primas vias roborant; qualia sunt in specie Martialia, & vegetabilia adstringentia aromatica. Nempe par ratio est, atque quando in potu acidularum subinde usurpanda sunt omni pastu blanda aromatica & adstringentia, quæ stomachum nempe & viscera firmant. Fugienda autem sunt cydonia & cydoniata, aut saltem non crebrò nimis usurpanda; utut enim sint adstringentia, summè tamen sunt diuretica, uti hoc non tantum observat Bartholinus *Cent.* 5. *Hist.* 22. sed etiam Schenckius in *Observ.* item decoctum prunorum sylvestrium, decoctum corticum aurantiorum, quercuum, & similia usurpanda veniunt. Crocus Martis adstringens, R  $\text{¶}$ is  $\text{¶}$ i, bolus Armena,  $\text{¶}$  sigillata, cum conserva rosarum vitriolata, & conserva radice symphyti conducunt. Potus si plantago in  $\nabla$  chalybeata cocta. Tandem ceu singulare experimentum commendatur, si recipiatur crista galli calcinata, eaque manè & vesperti ægro in propria ejus urina propinatur.

Qui plura de his cupit, adeat præter Morbium & Willisium de *urinis* Sylvium in *Praxi* *cap.* 55.

ARTI-



ARTICULUS IV.

De

*Urina depravata in renibus secretione.*

**D**Epravatæ urinæ in renibus secretiones terè sunt innumerabiles, dum scil. diversimodè affecta urina in colore, consistentia & contentis excernitur, speciatim tamen sub praxin medicam cadit

1. Urina nimis pinguis & oleaginosa.
2. Urina rubra sanguinolenta.

MEMBRUM I.

De

*Urina pingui & oleaginosa.*

**H**ic ante omnia distinguendum inter urinam pinguem, quæ est talis saltem ratione superficiæ, & ratione consistentiæ. Quoad consistentiam: an sc. ita exactè tota urinæ materia excreta, quoddam repræsentet, vix credo, nisi forsan in diabete vera pinguis & oleosa assumpta sub forma propria demum excernantur, quod tamen unquam me legisse non memini. Aliàs etiam urina talis, perfectè sc. oleaginosa, fieri nequit, ob incompatibilem aquæ cum oleo miscelam, quæ nullo modo possunt conjungi, nisi sit  $\Theta$  alcali fixum in urina, pinguedinem solvens, ut videmus in saponibus. Cum verò in urina tantum sal salsum volatile, non verò purum alcali insit, ideò nec urinæ pinguis & oleaginosa excretio quoad consistentiam concedi potest. Pinguis ergò sæpè excernitur urina, quando nempe in superficie ejus quasi crusta aut pellicula pinguis supernatat, quæ ipsa tamen crusta, probè distinguenda, an sit vera pinguedo? an verò sit saltem crusta salina, pinguedinem tantum mentiens? uti in scorbuticis & hypochondriacis usu venire solet. Differentiæ ratio in eo consistit, quod talis crusta supernatans, si constet ex concrementis salinis in pelliculam inspissatis, quod tunc ad latus juxta lucem aspecta varios colores instar caudæ pavonum, vel instar iridis in sua superficie repræsentet; id quod infallibile signum est crustæ salinæ ex malo hypochondriaco aut scorbutico, in quibus salia heterogenea abundant. Testantur hoc omnes solutiones salium ad pelliculam inspissatæ, quæ pingues videntur. Ubi autem vera est pinguedo, quæ urinæ supernatat, sine ullo colore solet esse conspicua, & etiam subinde quasi guttulas repræsentat, pinguis autem

Tom. II.

fit talis urina ex colliquatione partis pinguioris massæ sanguinæ, in specie pinguedinis corporis, unde pinguedo talis frequenter apparet in urinis, febre ardente colliquativa aut etiam hæctica, tabe, ulceribus renum, & similibus afflictorum. Et hæc ipsa colliquatio oriri videtur ex defectu acidi debiti in massa sanguinea, quod ipsum aliàs spissat & blandè coagulat pinguedinem nutritivam, cujus defectu ipsa denuò liquefcit pinguedo, & ita cum urina denuò excernitur; quæ tamen cum non possit intimè urinæ misceri, supernatat, & sub forma olei conspicitur.

C U R A.

Quoad curam: curatur hæc crusta salina, pinguedinem in urina mentiens, facilè, curato morbo primario, ac in specie conducunt Martialia, acidum peccans absorbentia, & hinc volatilia, illud ad vias urinarias deducunt, ac per cutim emittentia. Urina verò, cui pinguedo vera supernatat, curatur spontè, modò primarius curatus fuerit morbus, in specie per acida blanda, pinguedinis liquefactionem impediencia, camque coagulantia, ut spiritum  $\Theta$ is dulcem.

MEMBRUM II.

De

*Mictu cruento.*

**P**ORRò urina cruenta seu sanguinolenta excernitur, quando ipsi permiscetur sanguis, nunc copiosus, nunc parvus quidem, unde interdum minus tincta loturæ carniū similis apparet urina, interdum verò intensius rubet, si magis tincta, spissa ac crassa apparet, vel potius ex opaco nigrescit, ita ut etiam linteam immersum suo rubore sanguineo inficiat, & interdum cum sanguine in fundo matulæ subsidente apparet. Sanguis iste, qui tingit urinam, ut plurimum ex renibus effluit, seu in renibus ipsi permiscetur, interdum tamen etiam in ureteribus, interdum etiam in vesica, interdum ex læsis arteriis in pene, quale exemplum vid. in Græcio lib. de Organis Generat. viror. pagin. 151. Rariùs verò ex aliis partibus ad loca urinaria eò deferitur, ut cum urina simul excernatur, v. g. in casu ab alto, aut si grumi sanguinis in pectore, vel alio quodam loco hæreant, qui successivè ad vias urinarias deferuntur. Sicuti rarum est, quod propter inflammationem aut contusionem hepatis urina cruenta interdum

(Nann 2)

emit

emittatur. Ex causis etiam antecedentibus facile cognoscitur.

### C A U S Æ.

Causæ urinæ cruentæ, non secus atque aliarum hæmorrhagiarum (est enim miætus cruentus species hæmorrhagiæ) in genere oriuntur interdum ex anastomosi vasorum sanguiferorum in viis urinariis; interdum, idque crebrius, ex earum diæresi, vel diabrosi in locis urinariis. Quoad anastomosin, hæc frequenter fit nunc vitio contentorum, in specie impetu sanguinis, aperientis sua irruptione concitatore oscula vasorum, nunc vitio ipsorum vasculorum renalium, quando poruli renum sunt nimis aperti cum eorum tubulis, unde sanguis per hiantes poros unâ cum lotio variè transmittitur; vid. Willisius *Pharm. Rat. pag. 166.* quod vitium veteres vocant imbecillitatem renum, estque huiusmodi miætus ferè indolens, minusque intensa tinctura urinæ, minusque crassa. Quoad sanguinis impetum, inferentem vasorum anastomosin, sequitur interdum miætus cruentus post equitationem nimiam, item post nimium motum corporis, saltum nimium; & facile in renibus, impetu in sanguine concitato, orificia aperiri, & ita miætus cruentus inferri potest: vid. Hildanus *Cent. 6. observ. 46.* In specie miætus cruentus per anastomosin nunc est spontaneus, nunc non spontaneus seu symptomaticus: Ille nunc criticus, nunc periodicus, nunc vagus, &c. est. Præcedere autem solet dolor gravativus & tensivus, uti & comitari solet huiusmodi cruentam miætionem perceptibilis in isto loco, in quo sanguis suo impetu anastomosin infert: sequitur enim interdum solennes excretiones sanguinis suppressas miætus cruentus; hinc etiam Forestus *lib. 24. observ. 7.* inquit: *Urinam cruentam ex alto delapsis statim emitti videmus, idque sæpius etiam ex nimia Venere in adolescente nobili, in mulieribus etiam mensibus suppressis, & in viris hæmorrhoidibus fluere consuetis & retentis.* Truncatâ etiam manu vel pedè aut pleno corpore, ex abscessibus ulcereque cruento urinam cruentam emittam fuisse scio: id quod ulteriori observatione confirmat de miætu sanguinis, ex suppressis hæmorrhoidibus per intervalla oriundo, Hildanus *Cent. 1. observ. 11.* Quin & periodica quibusdam urinæ cruentæ miætio observatur; vid. præter Schenckium in *Observat. Salmuth c. 3. Histor. 47.* de miætu sanguineo periodico & quasi menstruo, qui cohibitus mortem intulit. Criticus observatur sanguinis miætus, dum morbi solvuntur urinæ sanguinolentæ excretionem: sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. admir. Observat. 69.* miætum cruentum criticum in

febre ardente observavit; sicuti etiam pleuritides interdum per sanguinis miætum iudicata observantur ab Hildano *Cent. 2. observ. 31.* & Schenckio *lib. 2. observ. 20.* ex Marcello Donato. Pertinet huc vini abusus ad miætum cruentum disponens, de quo vid. Zacutus Lusitanus *Medic. Princ. Histor. 139.* item diuretica fortiora aut acriora, v. g. post terebinthinæ nimiam dosin miætionem cruentam refert Hildanus *Cent. 5. observ. 52.* tandem abusus Veneris anastomosin vasorum, & ita etiam  $\square$ m cruentam infert, dum in actu Venereo nimio præcipuè circa vesicam & partes genitales vasa sanguifera nimis turgida hîscent & aperiuntur, quæ aperta sanguinem fundunt: Inter alia refert Forestus *lib. 14. observ. 10. & 13.* miætum sanguineum ex nimia Venere, qui spongia aceto calido infusa, & lumbis ac partibus genitalibus circumposita, curatus est.

Quoad diæresin, & in specie diabrosin, hæ frequentior causa urinæ sanguinolentæ existunt vitio contentorum acrium, aut erodentium, aut alio modo lædentium vascula dictorum locorum, dum nempe à sero nimis aceri vascula sanguifera circa vias utinarias eroduntur, vid. Forestus *lib. 8. observat. 6. 11. 12. & 13.* quò etiam pertinent exulcerationes & excoiationes renum & vesicæ, tali ex causa miætus nati cruenti scorbuticis, catarrhois, & sero acido saliori, aut aliàs plus minus corrosivo præditis, accidere solent: calculus item asperitate suâ lædens & lacerans renum, ureterum aut vesicæ membranulas, subinde talem miætum infert: faciunt etiam huc imprimis cantharides, de quibus notum est, quod aut ineptè assumptæ, aut etiam extrinsecus cum vesicatoriis sine iudicio applicatæ, imprimis absque acidis, miætum cruentum subinde admodum dolorosum, & vesicæ excoiationem inferant: vid. Forestus *lib. 24. observat. 7.* Miætum à vermibus cruentum habet Schenckius *Observ. lib. 3. observat. 294.* Pertinet huc curiola ista observatio & historia, quam habet Horstius *lib. 4. observat. 42.* miætionis purulentæ & sanguineæ ex ulcere colli vesicæ, propter carunculam ibidem loci ex acidularum usu suppuratam. Sic etiam observatus fuit miætus cruentus ex abusu allii, teste Schenckio in *Observ.* Item ex nimio aloës usu urina cruenta enata refertur in *Act. Med. Hassn. Volum. 2. pag. 167.* Tandem in morbis malignis, ac speciatim in variolis, supervenit subinde miætus cruentus, qui, quando oritur erosionem vasculorum aut vesicæ, est pessimus & admodum funestus, cum ordinariò intereant ægri. Exempla in Schenckio, Hæchstedtero, Salmuth, aliisque inveniuntur; forsan & isti miætus cruenti,

## Mictus Cruentus.

enti, qui in aliis febribus malignis observantur, huc pertinent, ut quando hæmorrhagia penis nimia in febre maligna suppressa dat hæmorrhagiam narium lethalem, vid. Hæchstedterus *Decad. 1. Casu 3.* quin & in peste observata fuit urina sanguinolenta, quæ inter pessima tunc temporis recensetur signa. Tandem urethram vulneratam, exulceratam, &c. etiam mictum cruentum intulisse, Graffius de *Organis Viril. pag. 150. refert.*

Quoad casus externas: quilibet violentus motus ruptioni circa loca urinaria occasionem suggerens, mictum cruentum infert: talia sunt saltus nimius, casus ab alto in dorsum aut lumbos, thorax vulneratus; vid. Rhodius *Cent. 2. observat. 19.* item contusio vehemens circa loca inferiora facta.

### DIAGNOSIS.

Sequuntur signa, quæ satis sunt clara, quoad diagnosin: nam urinam esse cruore tinctam, facile per se patet, modò probè distinguatur rubor urinæ sanguineus à rubedine salina, quando nempe contentis copiosioribus salinis oleosis probè unitis cum liquore continente, idque ferè vi acidi, rubens repræsentatur color; rubedo hæc ex contentis salibus ordinariò est perspicua, clara & quasi fulgida, ac non adeò crassa, aut quæ præcipitata sedimentum vel intensè croceum, vel instar cinnabaris, vel incarnati nonnihil coloris suggerit: econtrà quæ est à sanguine rubra, semper est opaca, turbida & crassiuscula plus minus, prout plus minus sanguinis est permixtum. Unde & à salibus contentis orta rubedo splendet quasi; similinamque ratione ac lixivium lotricum, quò magis est alcalibus imprægnatum, eò magis ad rubedinem vergit; ita & urina, quò magis salibus turget, eò magis flavescit aut rubescit; quæ verò est à sanguine, absque splendore obscura minusque clara observatur. Illa interdum in febribus, interdum in scorbuto, malo hypochondriaco & similibus accidere solet; hæc etiam in aliis ægris deprehenditur.

Et urina cruenta, si ex sanguine constat, si aliquandiu steterit, uno alterovè die crassamentum seponere solet ex intensè rubro quasi nigrescens, & sanguinem grumosum exactè referens.

Verùm cognoscendum ulteriùs: ex quo loco affecto sanguis profluat? si enim est ex affectu renum aut vesicæ, semper dolor aut gravativus, aut acutus rodens percipitur circa locum affectum: quorum ille quoque dignoscitur, si sanguis copiosior fuerit, & urinæ intimius permisceatur; item liquidus, ac non grumosus subsideat: hic, si sanguis parcius

urinæ non æqualiter perfundatur, cum grumescencia subsideat, ac cum dolore urina prodeat.

Interdum tamen culpâ meatus urinarii tale quid contingit, cujus læsi signa præcesserunt, sanguis sine urina effluit, & mox concretus subsidet.

Si est ex alio loco sanguis, alius partis affectæ signa & symptomata concurrent.

Ex quibus verò causis oriatur urina cruenta, ostendunt antecedentia & adjuncta. Hinc de omnibus mictus cruenti differentiis Medicus sit curiosus, quoad indagandas causas, an nempe sit ex anastomosi? an ex diarræli? & si est à causa externa, saltu, cantharidibus, &c. patet ex ægri relatione; sin à causa interna, examinandus est æger, an sit scorbuticus? an ordinariò aliàs sanguinis evacuationis suppressione laboret? an percipiat dolores circa renes aut vesicam? nam si casus ab alto præcesserit, loca læsa, & circa quæ sanguis extravasatus hæret, non possunt esse incognita, in quibus suspicatur sanguinem develi ex aliis locis ad renes.

Si aliàs adsunt symptomata calculi, semper de renibus, aut de vesica affectis, harumque laceratione, suspicio ingruit, vid. Forestus *lib. 8. observat. 6. 11. 12. & 13.* item ulcera vesicæ aut renum antecedentia aut concomitantia ex diarræsi mictum cruentum ostendunt, simul adesse solet dolor acutus rodens, morficans, in specie molestus circa pubem, aut vesicam; item si præcesserit stranguria, dysuria, &c. manifestum signum est, mictum cruentum oriri ex excoriatione & erosione vasculorum.

Observandus simul motus naturæ, sive criticus, sive periodicus, qui ferè citra ullius partis urinariæ affectum contingit, ne impediatur, & pro morbofo habeatur, qui tamen salutaris est.

Quodsi malum sit à causis externis, à cantharidibus, à radice rubiæ tinctorum, quæ colore rubro inficit urinas; item si ab esu fructus Indici majoris seu opuntia oriatur, quæ ipsa etiam tingit urinas, ex relatione ægri cognoscendum.

In specie si sit à cantharidibus, adesse simul solet intensus stimulus Veneris, ita, ut penis sit intensus & rigidus, & ægri ad Venerem insigniter stimulentur, & si quæ sunt alia similes circumstantiæ.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: omnis mictus cruentus, imprimis copiosus ac sæpiùs recurrens, (N n n n 3) peri-



## Collegium Practicum.

periculum malum est, invehens eadem variaque symptomata, quæ hæmorrhagias nimias insequi solent: nam v. g. ex mictu sanguinis diuturno hydropem observavit Schenckius *lib. 3. Observ.*

Minus periculosus est sanguinis mictus ex pudendis, & à calculo; magis periculosus, qui ab erosione ac exulceratione vesicæ, cum metuendum sit, ne in vesica subsistens periculofam urinæ suppressionem, aut sui corruptela varia symptomata inferat.

Omnium maximè periculosus est, si ex renibus, præsertim erosio, aut eorum, ut vocant, imbecillitate, malum ortum fuerit.

### C U R A.

1. Quod ergò attinet curam: in hac primariò multiplex causarum remotarum varietas attendenda, & hinc cura nonnihil varianda: unde causa removenda, adeoque anastomosis tam venæsectione quàm remediis adstringentibus curanda, diæresis autem vel diabrolis vulnerariis consolidantibus & appropriatis corrigenda; hinc in specie acrimonia feri erodens aut exulcerans temperanda, & vas apertum vel erosum vulnerariis & adstringentibus consolidandum; adeoque maximam partem ad hæmoptysin dicata remedia conducunt. Imò cum serum urinarium plus minus acre omnem mictum cruentum undecunque ortum exasperare soleat, semper unà attemperandi scopus probè attendendus venit, unde papaverina ac opiata, item quæ supra circa exulcerationem renum & vesicæ fuerunt monita, locum invenient.

2. Venæsectio interdum locum habet. Nempe pro scopo vel revulsorio vel derivatorio, quando nempe occasione solennis cujusdam sanguinis excretionis suppressæ mictus cruentus ortus fuerit, qua ratione per phlebotomiam mictum cruentum ex meri nimia potione in plethoricis curavit Zacutus Lusitanus *cit. loc.*

3. Purgantia, quæ talia, non conveniunt, cum faciliè acrimoniâ suâ exasperare malum queant. Saltim rhabarbarum est, quod convenit, & magis pro scopo alterativo, quàm laxativo, adeoque in serosiore corporis habitu, aut in acriori sanguinis crasi; item in renum imbecillitate rhabarbarum est optimum. Hinc pilulæ ex rhabarbaro cum succo plantaginis; item pulvis rhabarbari parùm torrefacti, & in specie pilulæ ex terebinthina cum rhabarbaro aliquandiu continuatæ, nobile sunt experimentum Hæferi *Herc. Med. pag. 172.*

His ita præmissis, remedia vel spontè patent.

In genere ergò quæcunque remedia supra de hæmorrhagia in genere dicta, & inter has in specie mixtura ista polychresta Syl. vii in *Idea Prax.* ubi de cruento vomitu, locum habet: Conf. Graff *de Organ. genit. viror. pag. 154.*

Cum verò semper ad acrimoniam feri urinarii aciduli plus minus respectus sit habendus, præ cæteris convenit portulaca quovis modo usurpata; item plantago, & speciatim ejus succus ad ʒij. vel iv. haustus, & omnia ex his parata remedia, quò simplicius, eò melius: Vid. Riverius. Syrupus item compositus ex succo radice symphyti, & succo foliorum plantaginis, post hanc est equisetum, ejusque decoctum, quod & ipsum egregiè conducit. Hinc consolida major, millefolium flore albo, ejusque decoctum; convenit quoque bursa pastoris, hederæ terrestris in cerevisia cocta. Decoctum auriculæ muris & pimpinellæ Italicæ in lacte caprino commendatur ab Horstio *lib. 4. observat. 52.* Hisce in specie addatur agrimonia, seu eupatorium vulgare, quod imprimis est remedium ab omnibus Practicis expertum, quocunque modo usurpetur, tam internè quàm externè, adeò ut etiam in ipsa renum & vesicæ exulceratione probè conducat, sive agrimonia sola, sive eadem cum hyperico mista, usurpetur; unde Lindanus agrimoniam miscet cum quinquefolio & millefolio, hisce imprimis sociandum hypericon, tam planta quam ejus semen; siquidem hoc etiam specificum est ad ulcera renum, ratione odoris sui & saporis terebinthinati, unde etiam cum hoc Timæus von Guldensee parat electuarium elegans contra exulcerationem renum, in *Cas. pagin. 421.* Vel

℞. HB. agrimon.  
millefol.  
summ. hyper. flor.  
musci prun. sylvestr. ā M. j.  
rad. symph. maj. ʒij.  
sem. hyper. ʒss.

Incis. & contus. coqu. l. in vino (cui tempore usus addatur parum de lap. ʒr.) l. in aqu. ferrar. l. in lacte, vel sero lactis chalybeato.

Colatura edulcoretur cum syr. de symph. Fernel.

D. S.  
Anhaltender Trans.

Egre-

Egregiè quoque conducit tam præservativè quàm curativè hederæ terrestris, sive in decocto cum aquæ & cerevisiæ ana, sive in extracto, ebulliendo nempe in aqua. vel in succum exprimendo, & solatum saccharo condiendo.

A quibusdam etiam insigniter laudatur bellis minor ac tota ejusdem planta. Porro chamæpitys commune est experimentum Poterii, cujus decoctum in jussulo carnis paratum in mictu cruento & ulceribus renum optimum, & specificum Sulzbergeri est. Item pertinet huc decoctum ad mictum cruentum Mynsichtii in *suo Armament.* In specie lac ovillum ad ʒiv. c. 3j. boli Armenæ assumptum omni manè experimentum est, aliquoties comprobatum, uti hoc videre est in *Foresto lib. 24 observ. 13.* quod etiam expertum est cum successu Timæo von Guldentlee in *Cas. lib. 3. Cas. 40. pag. 180.* Imprimis conducit, si ab acrimonia feri & exulceratione partium sive etiam casu ab alto, cruentus mictus oriatur. Ad hoc succinum & omnia succinata, in specie ex hoc parati trochisci de carabe, cum fructu usurpari possunt, si cum vel sine terra sigillata sumatur in aqua plantaginis, unà cum paucis aceto acidulatâ; conferatur Timæus von Guldentlee/ *Epist. 23. pag. 248.* ubi trochisci de carabe ad ʒj. cum boli Armenæ ʒss. in aqua plantaginis, laudantur: quibus in malo contumaciori opiata addenda. Huc quoque trochisci Gordonii, & species dia-plantaginis Mynsichtii pertinent. Hinc & Ræ istæ polychrestæ, Ræis Oli, & Ræ antiphthica in quolibet mictu cruento sunt proficua: ista quidem, ubi magis est adstringendum; hæc verò, ubi magis est temperandum. In specie ratione Martis hæmatites inter ea, quæ in genere ad hæmorrhagias nimias conducunt, & ex eo parata remedia conveniunt, ita ut assumptus cum copioso lacte etiam ad mictum cruentum à cantharidibus exortum prosit; loco hujus commodè etiam ☿ sigillata & quæcunque pingues, item bolus Armena, in usum vocantur; acrimoniam enim insigniter temperant. Quò etiam pertinet hæmatites artificialis, emulsiones etiam ex seminibus lactiferis cum liquoribus adstringentibus parari possunt.

Opiata autem per se nota sunt, in specie electuarium Helidei Paduani ad sputum sanguinis ex conserva violarum & semine hyocyami, commodè hinc applicari potest.

Ut pro scopo vulnerario hæc consolidantia eò melius operari possint, inter hæc eminent remedia ex cancris fluvialibus, sive succus sive eorum in plenilunio exsiccatorum pulvis usurpetur: quibus dicta quædam vulneraria appropriata, in specie ex jam dictis simplicibus ad mictum cruentum lauda-

tis superaddenda sunt. Præ cæteris expertus est continuatus terebinthinæ usus crudus, abstergendo & consolidando omnibus scopis satisfaciens, ac in specie, ubi mictus cruentus ex diæresi vasorum fuerit; unde Potio Plateri terebinthinata, in *Observation.* egregia est.

Vel pilulæ ex terebinthina cum rhabarbaro torrefacto paratæ, quas continuo usu ad mictum cruentum desperatum singulariter commendat Hæferus *l. a.* quibus rhabarbarum additur ob vim suam nephriticam renibus dicatam; sicuti ad acrimoniam sanguinis & feri, & inde ortum mictum cruentum, succus plantaginis cum rhabarbaro assumptus commendari solet ad exulcerationem renum & vesicæ; vel pilulæ Barbette in *Chirurgia lib. 2. cap. 11.* sunt optima remedia; oleum verò & ~ terebinthinæ, & balsamus sulphuris terebinthinatus, sunt nimis acria. Unde potius terebinthina recens, vel cum vitello ovi soluta, vel cum ovo sorbili, aut cum vitello ovi, & aqua fragor. in formam emulsionis aut misturam lacteam redacta prodest.

Denique hisce externè subjungatur usus pulveris sympathetici, vel ☿ ☿ h non adeò exactè calcinatum.

Quod si ex renum & vesicæ vitio erosæ aut exulceratæ mictus cruentus oriatur, præter ea interna, quæ hætenus suo loco fuerunt recensita, speciatim conducunt injectiones similes in vesicam, quales supra in vesicæ exulceratione laudavi.

Huc etiam referendi clysteres terebinthinati pro injectione in vesicam, imò solum lac, cui terebinthina cum vitello ovi soluta, permixta cum paucis saccharo pro temperandi & leniendi scopo sufficit. Fortior est injectio ex emulsione papaveris albi cum lapide hæmatite præparata, vel succus plantaginis cum pulvere lapidis hæmatitis per syringam injectus. Si à calculis & arenulis fit sanguinis mictus, quomodo curandus, vid. Riverius in *Praxi.*

Quod si fiat, ut se dato mictu cruento, ac etiam purificato ulcere renum vel vesicæ, sanguis congruatus adhuc hæreat in vesica, tunc, ne hic ipse suppressionem urinæ inferat, dissolvendus est per remedia appropriata; quæ tamen non nimis citò danda, ne aperiantur denuò vasa. In quo casu succinum, quod sanguinem coagulat, dissolvit, & cruentum cohibet,

& omnia succinata, præ cæteris sunt egregia.

## CAPUT II.

De

*Urinæ per vesicam excretionem læsa.*

**L**æditur urinæ per vesicam excretio juxta læsam urinæ in renibus secretionem tribus præterpropter modis:

1. Quando omnino urinæ excretio aboletur, & urina supprimitur: id quod fit in ischuria, vitio vesicæ contracta.
2. Quando eadem augetur in urinæ incontinentia.
3. Quando depravatur, ut in stranguria & dysuria & similibus affectibus.

## ARTICULUS I.

De

*Urina excretionem abolita.*

## MEMBRUM I.

De

*Ischuria vesicali.*

## CAUSÆ.

**F**it ischuria vesicalis vel vitio vesicæ urinam non emittentis; vel urethræ, urinam non transmittentis. Vesica non emittit urinam, vel quia ipsa se non stringit pro illius excretionem, vel quia sphincter ejus pertinacius se claudit. Non stringit se vesica, vel vitio quasi paralytico, vel vitio relaxati fibrarum toni, quando nempe est nimis distenta: urethra verò non emittit, quando est obstructa ab intra, aut quando est compressa ab extra.

Vesica fit quasi paralytica, quando sensus & motus ejus constrictivus est torpidus, ita, ut quamvis vesica plena ac urinæ copiâ distenta sit, non tamen sentiat stimulum urinæ, aut quando vesica se contrahere, & ita urinam expellere nequit. Nam notum est, quod media membrana sit fibrosa, & gaudeat motu peristaltico naturali. Quod si ergò fibræ fiant ineptæ contractioni, tunc vesica non potest exprimere urinam, utut aliàs se sphincter laxet. Id quod fit vel universaliter, v. g. in moribundis; vel particulariter, v. g. à medullæ oblongatæ parte inferiore, aut nervis læsis, ad vesicam qui derivantur: sic enim Amatus Lusitanus *Cent. 4. observ. 10.* obser-

vat suppressionem urinæ propter vesicæ resolutionem ex diuturna mora in  $\nabla$  frigida contractam: facit etiam huc læsio nervorum vesicæ constrictioni inservientium, sub inepta testis extractione, unde dolorosa mictio, & ferè urinæ suppressio inducta fuit, teste Hildano *Cent. 5. observ. 61.* Sic pariter Zacutus Lusitanus *lib. 2. Med. Princ. Histor. p. 146.* ex torpido vesicæ sensu urinæ suppressionem notat. Quò etiam pertinent vertebrarum luxationes, aut ictus, aut lapsus, aut spinalis medullæ vulnera isto in loco circa os sacrum. Unde nervi ad vesicam distributi maximam partem prodeunt, quibus compressis vel laceratis, non percipitur urina stimulanis, & sic non emittitur urina; vid. Galenus *lib. 6. de loc. aff. cap. 4.* facit huc, quod aliquando observavi in viro, qui non aut saltim difficulter urinam poterat emittere, priusquam manu regionem ossis sacri probè fricaret, forsàn usus flagrorum in re Venerea negotium hoc illustrat.

Quoad distensionem nimiam vesicæ: lædit hæc necessariò fibrarum ejus musculolarum tonum, propter quem eadem se amplius contrahere nequit, siquidem distentæ nimis, & quodammodo laceratæ fibræ musculosæ propter urinam copiosiores diutius retentam, ita in suo tono læduntur, ut fibræ amplius vesicam contrahere nequeant, & quamvis tota repleatur vesica, nil tamen omnino excernere valeat; qualia exempla refert Schenckius *lib. 3. observat. 5. pag. 484.* & Forestus *lib. 25. observat. 14.* Quod malum, utut apparenter leve videatur, nihilominus tamen ordinariè ferè inflammatio vesicæ, & hinc gangræna lethalis supervenit. Videatur Forestus *l. a. observ. 2. in Schol.* Galenus *l. a. Parnatollus Pentec. 1. observ. 72.* Hildanus *de Lithiasis cap. 3.* Paræus *lib. 16. cap. 48.* & Riolanus *Enchirid. Anat. Pathol. lib. 2. cap. 3.*

Huc quoque faciunt vermes in vesica stabulantes, lancinando & punguendo fibras vesicæ irritantes, hincque suppressionis urinæ autores: vid. Schenckius *lib. 3. observation. 312.*

Pertinent etiam huc vesicæ ulcera & vulnera, ejusque laceratio & erosio, item inflammatio: vid. Forestus *lib. 25. observat. 27. & 28.* quæ vim ejus constrictoriam turbant; tunicarum vesicam constituentium induratio seu soliditas præternaturalis, vid. in Bonnetti *Sepulchret. lib. 3. Sect. 24. observ. 16.* & paraly-sis seu laxitas involucri ejus carnosissimi, v. g. à coitu nimio, vid. Ballonius *Epidem. & Ephem. lib. 2. pag. 156.*

Musculos quoque abdominis, dum quacunq; de causa non sufficienter contrahuntur, & vesicam comprimunt, ischuriam excitare possunt.



posse non improbabile est ; quod de tumori-  
bus eorundem Hildanus *Epist.* 56. suspicatur.

Quoad sphincteris vitium ; hujus debita re-  
laxatio atque colli vesicæ apertura deficit,  
quando hic spasmus quasi affectus pertinacius  
se stringit : id quod interdum observare da-  
tur in doloribus abdominis spasmodicis , uti  
hoc in colicis convulsivis subinde observavi,  
atque imprimis in dolore abdominis scorbuti-  
co ; item in dolore nephritico , Dravvizi-  
*Tract. de Scorbuto c. 9. p. 354.* & Willisius *de*  
*Anat. Brutorum lib. 12. c. 15.* Ischuriam, qua  
cervix vesicæ obturatur à calculo, Bartholi-  
nus *Cent. 2. Epist. 86.* annotavit. For-  
san huc cantharides pertinent, utpote de quibus re-  
fert D. Fehr *de Scorzonera pag. 88. & 133.*  
quod ex vesicatoriis, suris admotis, urinæ sup-  
pressio nata fuerit : nempe stimulo continuo  
& irritatione sphincteris vesicæ, adeoque su-  
perveniente convulsiva ejusdem strictura, vel  
ex nato irritationis vicinarum partium tumo-  
re, & hinc colli vesicæ & meatus urinarii com-  
pressione, ischuria talis originem traxisse vide-  
tur.

Quoad vitia canalisi seu meatus urinarii, u-  
rinam non transmittentis , ea sunt varia : im-  
primis se offert ejus angustia variis ex causis e-  
nata. Est enim angustatus vel obstructus ab  
intra, idque frequentius à calculo vesicæ ean-  
dem infarciens, quod frequentius : vid. Za-  
cutus Lusitanus *Prax. Admir. lib. 2. Observ.*  
*75. 76. & 77.* item caruncula seu verruca post  
exesam in aliquo loco urethram, ex quo ero-  
sionis loco caro parva, verrucæ instar, plus  
minus dura & sensilis, enascitur, urethram  
penitus occludens; quæ caruncula frequen-  
tissimè gonorrhœam diuturnam virulentam  
insequitur, & per catheteris vel candelæ im-  
pressionem, ubi sita sit, optimè cognoscitur:  
qualem ex vesicæ fundo ad urethram exsur-  
gentem, hancque constipantem, in fœmina  
quadam Sylvius *Pr. lib. 1. cap. 57. §. 7.* annota-  
vit : Ischuriam quoque à carunculis urethræ  
cavitatem occupantibus refert Riverius *Cent.*  
*1. Obs. 81.* Referatur etiam huc scirrhus ovi  
gallinacei magnitudine collum vesicæ obtu-  
rans, quem Hildanus *Cent. 2. Observat. 65.*  
describit : vid. Bartholinus *Cent. 2. hist. 52.*  
Forestus *lib. 25. Obs. 10.* Riolanus *Anthropogr.*  
*lib. 2. cap. 28.* aut alter ille, cujus *de Lithiasi*  
*cap. 3.* meminit : Item pituita viscida & gluti-  
nosa, quod recens natis solenne; siue colliga-  
tur in vesicæ ex renibus & ureteribus è calcu-  
lo læsis, siue cum urina eò deferatur vitio di-  
gestionis primæ, obstruit meatum urinarium,  
& ischuriam infert. Quò facit nimia crassi-  
ties lactis nutriticis, ischuriam in puero quodam  
inducens : vid. Amatus Lusitanus *Cent. 6. ob-*

Tom. II.

*serv. 12.* Sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Pr. Ad-*  
*mir. observ. 64.* urinæ suppressionem lethalem  
à filamentis crassis instar calami scriptorii in-  
ductam refert. Et sane, quicumque humor  
viscidus in vesicam delapsus, angustans mea-  
tum, obstructionem infert : Inter quos hu-  
mores sæpè etiam sanguinis grumi in vesica u-  
rinaria restitantes ; vid. Galenus *l. 6. cap. 4. de*  
*Loc. aff.* item pus crassum ex vesicæ ulcere vel  
renum, vel aliarum partium eò delatum, &  
circa vesicæ collum collectum, obstruendo  
urethram, inferunt ischuriam periculosam.  
Quin & quæcunque comesta, quæ promptè  
cum urina potus ad loca urinaria moventur,  
aut validiora diuretica intempestivè assumpta,  
nempe vel mox post alimenta, vel antequam  
primas vias abstergentia præmissa sint, subin-  
dè ischuriam inferunt, dum occasione celeri-  
oris & copiosioris feri urinarii secretionis, tan-  
quam vehiculi nutrimenti & excrementi, unà  
chylosa cruda, aut etiam alia contenta visco-  
sa seu pituitosa, ad loca urinaria rapiuntur,  
ubique mediante obstructione urinam suppri-  
munt. Sic etiam ex potu vini recentis, nec  
ritè defecati, partim renes partim ureteres in-  
farcientis, urinæ suppressionem observavit  
Hildanus *Cent. 4. obs. 52.* qui etiam observat  
periculosissimam urinæ suppressionem ex usu  
terebinthinæ post cibos crudos & viscidos as-  
sumptæ, *Cent. 5. obs. 59.* Ab extra verò com-  
pressus est meatus urinarius propter tumores  
in ejusdem radice obortos, quos inter emi-  
nent tumores prostatici. Fit nempe non-  
nunquam, ut post nimium exercitium Vene-  
reum supprimatur urina, quale exemplum  
habet Forestus, Platerus *in obs. p. 261.* Hille-  
rius *Cent. 1. c. 17.* & Riolanus *l. 4.* nec non  
Rhodius *Cent. 3. obs. 27.* Sic, cum essem Romæ,  
mortuus est Princeps Tuscanus ex contuma-  
cissima urinæ in vesica suppressione, cum gra-  
vi dolore, quam neque catheter, neque can-  
dela cerea, neque res ulla alia prolicere pote-  
rat : post mortem cadavere apertò, nihil vi-  
tii in meatu urinario aut vesica inventum fuit,  
præterquam inflammatio, & tumor durus  
prostaticus ad radicem penis sitarum, obser-  
vatus fuit, à quo tumore lethalis urinæ sup-  
pressio exorta fuit. A fecibus nimium  
induratis Schenckius ischuriam observavit  
*lib. 3. Observ. 8. pag. 485.* Tandem inflam-  
matio colli vesicæ, vel inflammatio etiam pe-  
rinei, quatenus angustat meatum urinarium,  
etiam urinæ suppressionem infert. Exem-  
plum tale legitur in Zacuto Lusitano *lib. 7.*  
*Med. Princ. histor. pag. 149. & 150.* ischuri-  
am de tumoribus vesicæ cervici adnatis ha-  
bet M. A. Severinus *de Abscess. pag. 276.* Bar-  
tholinus *Cent. 1. Epist. 23.* & Riverius *Pr. lib.*  
*14. cap. 8.* Item, dum urethræ canalisi post  
vulnera aut ulcera coalescit, aut, quod Hil-

(Oooo)

danus

danus *Cent. 6. Observ. 49.* addit, quando idem canalis in decrepitis concidit, ut anfractuositates & obstacula talia per catheterem se interdum deprehendisse testetur, ischuria fieri solet. *Platerus lib. 3. Observ. pag. 564.* refert, glandem penis a præputio ita fuisse occlusam in recens nato infante, ut ne quidem guttulam lotii reddere potuerit. Similes historias videb. in *Bonetti Sepulchreto p. 1237.* Nec dubium est, simili urinæ suppressione urgeri fœminas, quas atretas vocant, si vel à nativitate vel alio errore vulva occludatur in totum.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Ischuria vesicalis à renali distinguitur, quod in hac vitio ureterum nulla gravitas, nulla tensio, nullus dolor circa pubem percipitur, adsuntque potius renum & ureterum afflictorum pathemata. Contrà, si vitium in vesica hæreat, atque ea urinâ repleta sit, tumor & protuberantia circa vesicam contingit; æger quoque, quamdiu vesicæ sensus salvus est, de tensione & dolore molestissimo, & insigni urinam emittendi nixu, frustraneo tamen, conqueritur; ac Medicus, si regionem vesicæ contrectet, tumidam eandem, sed non absque insigni dolore, percipit. Ischuriæ ex vitio vesicæ eveniens malum est per se facile cognitu, saltem causarum primarum perscrutatio necessaria est, ac imprimis causæ antecedentes, unâ cum modo afficiendi, quomodo nempe talis causa prima ischuriam inferre queat.

Causas has dignoscimus partim ex vesicæ aut aliarum partium vicinarum affectuum signis, partim ex rebus prægressis & concomitantibus. Attentus ergo sit Medicus ad investigandam causam proximam ischuriæ, e.g. Vitium vesicæ paralyticæ latere nequit ex indolentia & insensibilitate vesicæ, vel regionis vesicæ, licet distentæ.

Vitium fibrarum distentarum latere nequit ex eo, quod urina antea fuit nimis diu retenta, & quod admotâ licet syringâ nihil effluxit, postmodum verò, compressâ regione pubis manu, urina profluxerit.

Causam veram verò esse in occluso plus minus meatu urinario seu urethra, ex eo patet, quod ingens tumor in pube, ubi sita est vesica, isque admodum dolorificus, percipitur, & quod ex levi loci tumentis compressione hic dolor insigniter exasperetur.

Si adest insensibilitas vesicæ, vel dolores circa os sacrum, signum est oriri ex vesicalæ; si præcesserit nimia vesicæ distensio à retentione urinæ, hærebit vitium in vesica ab atonia contractum. Unde verò sit angustatio meatus urinarii, ex adjunctis & antecedentibus conjecturare licet: nempe ex signis

calculi vesicæ, ex mixtu ctuento antecedente, ex casu ab alto, vulnere, ruptura partium vicinarum, &c. quæ suspicionem de sanguine congrumato & extravasato inferre possunt. Materia viscida sæpius cum urina excreta, aut etiam pus, obstruere meatum ostenditur, si æger solitus sit cum urina subinde talem materiam rejicere, quod malum hoc subinde solet recurrere. Indicium hujusmodi suppressionum, præter tumorem & dolorem vesicæ ex repleta urina optimè suggerit catheter, qui intrusus per sphincterem vesicæ penetrat, & ita aperiendo meatum urinarium, & removendo impedimenta, urinæ fluxum promovet: *Vid. Riverius Pr. l. 14 c. 8.*

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Suppressio omnis urinæ malum est periculosum, & quò diutius durat, eò est gravius, quia acutum dolorem, sæpè inflammationes, & interdum ex nimis doloribus epilepticas convulsiones infert, ut plurimum die 11. necat.

Meliùs tamen est, si ægri ex urinæ suppressione percipiunt dolorem: Nam retentio urinæ totalis in morbo sine dolore instantis mortis solet esse signum; innuit enim jam deficientem vim sensibilitatis corporis.

Ista, quæ sit ex vesicæ paralyti ischuria, item, quæ ex nimia corporis ejus distensione oritur, contumacissima, & sæpiùs periculossima esse solet: *Vid. Panarollus, & Hildanus l. 4.*

Pari ratione schabet, quæ à scirrho cervicis, aut partis cujusdam vicinæ tumore incurabili oritur, collum sc. & meatum urinarium constipante aut comprimente.

Breviùs morituros denotat tenesmus & singultus.

Contrà frequentius solvitur ea, quæ à grumo calculove minore inducitur.

### CURA.

Quod ergo attinet curam: in hac causarum imprimis habenda est ratio; Unde

1. Hæiptæ, impediētes transitum urinæ, imprimis removendæ.
2. Interna diuretica, præsertim salina, seu urinam acrimoniam suam promoventia propinanda.
3. Externis vesica subinde stimulanda.

Sin ergo malum est à vitio nervorum, vel vesicæ minùs sensilis, vel aliàs quasi paralyticæ, conveniunt nervina intrinsecè æquè propinanda, ac exteriùs admovenda: internè e.g. malvaticum juniperinum, & destillatum baccarum juniperi, succini aut terebinthinæ conveniunt, idque ad imitationem *Thoneri in Obs. pag. 175* qui ischuriam & stranguriam gravissimam ab intemperie frigida & humida cum humoribus phlegmaticis, præmissis inter-

ternis curavit per  $\phi$  destillatum succini ad gtt. vj. c.  $\nabla$  petroselinii : item conveniunt ascelli. Quò etiam spectat cerebrum picarum à Rive-rio *obs. communic. pag. 340.* laudatum. Inji- ciendi sunt clysteres, primò quidem blandè emollientes, postmodum etiam acres ex cen- tauri minori, colocynthide & similibus; aut administranda blanda purgantia, quæ alvum stimulare, & per consensum simul vesicam ad excretionem urinæ plus minus irritare valent: Vid. Langius in *Misc. Med. Gymnasm. 6. pag. 14.* ubi laudat Autor clyma in casu suppressæ urinæ vitio vesicæ : item comprimatur abdo- men, detineatur anhelitus, ut ita vi quasi u- rina proliciatur, quod nisi urina spontè sequa- tur, catheter usurpetur. Sed quoniam gravia & periculosa subinde symptomata vel ineptè vel crebrius usurpatus catheter inferre potest, de quo vid. Lyserus in *Obs. pag. 250.* item Pa- rarollus *Pent. 2 Obs. 20.* tutior est candela ce- rea, melle aut oleo amygdalarum dulcium illita, si immittatur ad imitationem Sylvii *Tract. de cachexia §. 275.* vel usurpetur fistula mem- branacea seu coriacea ad imitationem Hel- montii *Tract. de lithiasicap. 7. §. 34.* mediante qua simul per syphonem appropriati liquores comòdè possunt injici. Prolectâ sic urinâ, in- jiciatur vesicæ liquor decoctionis salviæ, ori- gani, pulegii, calaminthæ, rutæ, flores tilix, rosarum, castorei, ac similium nervinarum, antiparalyticarum, ut sensus & motus vesicæ redeat: Item applicanda sunt fomenta ex de- cocto similium nervinorum cum anetho, cha- momilla, abrotano, parietaria & similibus in aqu. vel vino cocta; vel fiat focus ex decocto:

*m. sem. anisi.*

*petrosel. ana ʒj.*

*HB. filipend. rubr, M. j.*

*zedoar. ʒij.*

*bacc. lauri ʒj.*

Decoq. omnia in vino vel aqu. & vel instar focus applicantur cum spongia aut linteolis multiplicatis, vel infunduntur in vesicam.

Proficuum est in quavis ferè ischuria vesic- ali.

Vel etiam folia tilix in vino cocta, & super pectinem imposita subito urinam proliciunt. Vel apponitur cataplasma ex parietaria cum oleo scorpionum, quod ipsum aliàs est egregi- um in quacunque urinæ suppressione. Litus item ex oleo scorpionum, castorei, nardino, rutaceo, hyperico,  $\phi$  destillato juniperi, te- rebinthinæ & similibus regioni pubis & peri- nei comòdè illiniri potest, etiam circa os sacrum : Item unguentum dialthæ cum oleo scorpionum mistum pubi, vel lumbis illina- tur, addito petrolco. Denique oleum masti- chis destill. umbilico inunctum remorantem urinam promovet; c. g.

Tom. II.

*ʒj. ungu. dialth. ʒʒ.*

*& scorpion. ʒij.*

*destill. bacc. junip. ʒʒ. M.*

Quo illinatur regio pubis.

Item conveniens est emplastrum nervinum applicatum regioni ossis sacri & pubis, mala- xatum prius cum  $\phi$  destill. succini.

Tandem, ubi in graviore vel pertinaciori malo nec hæc suffecerint, infessus & semicupia ex emollientib⁹ & nervinis appropriatis, insti- tuantur, quibus infideat æger, exhibendo paulò ante infellum blanda diuretica, v. g. a- liquot guttas olei destillati succini vel tere- binthinæ, aut aliquot grana  $\Theta$ is vol. succini in  $\nabla$  seu  $\sim$ u juniperi, vel alio liquore appropria- to.

In ardentibus aut malignis febribus si sup- pressio sit urinæ, vel ægri aliquandiu circum- ducendi sunt deambulando, conf. Sydenham in *observ. de Morbis acutis pag. 212.* vel illina- tur regio pubis cum unguento jam dicto; vel imponantur fomenta & cataplasmata.

Si fiat suppressio urinæ ex extensione vesicæ nimia, præter blandiorem compressionem cum manu in specie conveniunt externi simi- les focus nervini ex parietaria, anetho, fiori- bus chamomillæ, millefolio, origano, pule- gio, meliloto, semine lini, tœnu Græci, & si- milibus; item cataplasma ex chærefolio, pa- rietaria & petroselino, in butyro frixis, quod expertum est à Simone Pauli in *Quadrip. Botan. pag. 257.* Vel cataplasma ex parietaria, & cepa cum oleo scorpionum pectini im- positum egregiè prodest; item cataplasmata ex cepis, vel parietaria, de quibus infra, ap- plicari possunt, si prius modis suprâ dictis per catheterem, & c. urina fuerit evacuata. Fiat quoque litus oleis destill. aromaticis, cumini, terebinthinæ & juniperi; vel emplastrum de meliloto, malaxatum dicto oleo, applicetur regioni pubis.

Quod si vitio sphincteris supprimatur urina, litus in perineo & pubis regione ex unguento nervino, dialthæ cum oleo papaveris, casto- rei ac succini confert, & applicetur focus ex nervinis recensitis. Internè verò simul propi- nantur volatilia antispasmodica cum opia- tis mista, sed modò primarius curatus fuerit morbus, secundarium hoc symptomata spon- tè evanescit. Sic v. g. si à cantharidibus ortum fuerit, lac, & emulsiones lactæ, sunt opti- mæ.

Si ab hæmorrhoidum intumescencia, aut prolapsu sinus pudoris, hernia, inflammatio- ne vesicæ, partiumque vicinarum similibus- que tumoribus dissolubilibus, focus approp- priatis removeri debent.

Quod si obstructa sit urethra, tunc pro di- versitate causarum vel materiæ effluentis va- rianda remedia. Nam si sit à grumo sanguinis, (Oooo 2) dentur



dentur internè hunc solventia, ac in specie solutio lapillorum cancerorum in aceto, cum decocto radicis rubiæ tinctorum, aut Krapp/ item dandum decoctum artemisiæ cum decocto chærefolii, hyperici; vel mumia, myrrha, trochisci de carabe, spermaceti, essentia chærefolii, essentia hyperici, essentia traumaticæ. Cum quibus jungatur infusus aut fodus ex decocto simplicium emollientium & solventium sanguinis grumos, sicut propriâ experientiâ docet Timæus von Guldentsee lib. 3. Cap. 41. Externè expectum remedium est in grumus sanguinis stercus bovinum, quàm recentissimè adhuc excretum, pectini, pudendo, & perineo applicatum; hoc ipsum enim discutit & emollit sanguinem, si desit recens stercus, adhibeatur siccum, oleis appropriatis ad ignem permistum: Vid. Zacutus Lusitanus lib. 2. Prax. Adm. Obs. 65.

Quod si malum sit ab urethræ obstructione à materia viscida & mucilaginosa, post purgans blandum conveniunt internè raphanacea ex armoracia, raphano communi, terebinthina cum pulvere liquiritiæ frequentius exhibita, decoctum aperiens & diureticum superbibendo; item succus Parietariæ & similia incidentia; item ~ gummi ammoniaci compositus, aut etiam ~ salis dulcis. Imprimis succus limonum vel citri ad ʒiij. vel jv. usurpatus appropriatissimum est remedium, vid. Amatus Lusitanus Cent. 5. Cur. 71. vel ad imitationem Riverii in Obs. 42. à Fomio communicata:

℞. vini albi dulc. ʒiij.  
succ. limon. ʒj.  
~ terebinth. ʒj. M.

Mucilaginem dissolvit, & urinæ transitum parat.

Item succus parietariæ cum oxymelite experimentum est Helidæi Paduani, &c. Forestus ceu singulare experimentum commendat folia ribes nigræ, decoctis urinam cientibus addenda. Hæc enim folia adeò pellere urinam, ut etiam sanguinem proliciant, res est probabilis. Nam ipsa folia odorem urinæ foetidissimum obtinent, ita, ut nulla matula sit adeò foetida, quàm hæc folia.

Si malum sit ex tumoribus prostaticarum circa radicem urethræ, præter cataplasmata cepacea & alliata, prodest beccabunga cum floribus chamomillæ, instar fomenti aut cataplasmatibus, regioni perinei & vesicæ applicata.

Si pus tenacius obstiterit, succinum cum vino propinatum, item succinata, balsamus sulphuris succinatus, terebinthinatus, & oleum juniperinum, succini, & similia ferè, quæ modò circa grumos sanguinis fuerunt in-

sinuata, sunt egregia; imò etiam vesicæ injicienda: cum quibus simul debitus catheterum usus non negligendus, qui tamen, ubi vesica simul, aut aliàs, inflammata, locum non habet.

Quod si supprimatur urina à caruncula intra meatum urinarium genita, hæc quanto-cyus removenda est; illius erosio & ablatio tentanda, methodò ab Amato Lusitano Cent. 4. Obs. 14. delineatà.

Vel ℞. Merc. ʒiij.

ungu. de ceruss. ʒiij.

Misc. pro Linimento.

Pro magnitudine affectus aliquid olei Oli addi potest.

Supra ceream candelam ponitur, & hòc ipsò caruncula aliquoties, sed modestè, in die attingitur; vel Merc. præcipitatus dulcificatus seu turbit mineralis cum emplastro tripharmacò candelæ cereæ apponitur, & dicto modo usurpatur: Vid. Velschius Misc. Com. Cent. 1. Obs. 54. annex. M. A. N. C. Ann. 4.

In malo leviori cādela ex cera alba, cui admiscetur ʒ crudum pulverisatum, vel, qui melior, crocus metallorum, leviter aufert carunculam. Quod si gravius aut pertinacius fuerit, magma ex Mercurio sublimato & viridixris cum cereo applicetur: Conf. M. A. N. C. Ann. 8. Obs. 92. p. 152.

Observandum autem, ne virgæ aut candelæ sint ex pura cera, quia facilè nimis franguntur, sed admiscenda est terebinthina.

℞. cera alba lbj.

terebinth. Venet. ʒj.

Liquefiat cera, post addatur terebinthina: quibus liquatis tingantur ellychnia, fiantque candelæ.

Unguentum de calce viva, fuscum Felicis Wurzii, cum melle rosato etiam carunculam absumit: Conf. Barbette in Chirurg.

Quod si exesa fuerit caruncula, pro consolidatione relictæ ulculculi unguentum album camphoratum immittatur.

Applicentur tamen candelæ corrosivis imbutæ cautè, ne ex nimia corrosione gangræna oboriat, cujus exempla videb. in Lyteri Observ. pag. 250. Cætera pro hoc scopò usitata remedia videb. in Sennerto lib. 3. Prax. item Borello Cent. 1. Obs. 79.

Externè in quacunque ischuria convenientissimus est fodus suprâ laudatus ex semine anisi, petroselini, & similibus in vino coctis, hinc remedia ex alliis & cepis cum oleis, coctis aut frixis, pubi aut pectini applicatis. Ischuriam vesicæ optimè tollunt. Cepæ albæ concisæ in vino decoctæ, instar fomenti applicentur, vel

℞. Cepa sub ciner. coct.  
adde

pin-

MEMBRUM II.

De

*Calculo Vesicae.*

Quod si calculus vesicæ meatum urinarium obturaverit, hic removendus venit. An unquam aliquis in vesica calculus producat, dubitat Fernelius, omnemque, qui in ea reperitur, rudimentum suum in renibus traxisse, in vesica verò postmodum incrementum sumpsisse, putat, ideò, quod in contritis vesicæ calculis nuclei sæpius reperiuntur, diverſi à reliqua earum crusta coloris ac substantiæ, nullusque observetur calculo laborans, nisi qui nephriticis doloribus vexatus fuerit. Et quidem calculi vesicæ frequentissimè ex calculo renum primariam sui originem ducunt; conf. M. A. N. C. *Ann. 6. Observat. 109. pag. 147.* Læsà enim ureterum tunica nervosa, ipsa etiam vesicæ calculi motu nonnihil attrita, plorant hæ partes læsæ nutrimentum proprium sub forma mucilaginis crassæ & spissæ; quæ mucilago unà cum urina calculosorum excreta habetur vulgò pro pituita, ex qua per colorem arefacta generetur calculus, cum tamen reverà sit alimentum proprium ureterum ac vesicæ, in vesicæ cavum destillans, & ita concretum. Hæc ipsa tamen mucilago, ubi aliquantulum ejus subinde adhæret calculo renali eò delapso, in hujus augmentum cedit. Accrescentibus enim plurimis arenulis, aut advenientibus salibus coagulabilibus ex urina, simul in calculi consortium rapiuntur, & exindè calculi vesicæ augmentum oritur. Hinc vesicæ calculi majores lamellatim concreti reperiuntur, instar nempe ceparum cortice uno supra alterum concreto, facilè tamen à se invicem separabili; quod eleganter declarat Boyle in *Phil. Experiment. Confer. & Borellus Centur. 2. Observ. 62. & Vellchius Hecat. 2. pag. 32.*

Nihilominus autem, utut frequentissimè rem ita se habere concedi debeat, i. e. plurimi calculi rudimenta sua prima renibus debeant, in vesica verò morbosum incrementum recipiant; contrarium tamen quoque, i. e. quamplurimos calculos ipsam etiam vesicam pro prima minera agnoscere diversa persuadent:

1. Quod multi pueri sine nephriticis symptomatis antecedentis calculo laborent.
2. Plures etiam calculi è vesica protracti, quoad nucleum & corticem eundem substantiæ modum, quoad interiora & exteriora, habeant.
3. Calculus vesicæ non rarò adnascatur per tunicam quandam, vid. Riverius *lib. 14. cap. 2.*  
(Oooo 3)

DIA-

*pingued. anser. 3ß.*

Misc. sub forma Linimenti: S.

*Harn beförderndes Gälblein.*

Illinatur hoc ipsum umbilico & pubi; subito enim promovet urinam. Conveniens etiam est perineo applicatum, si à Veneris abusu suppressa sit urina, prout in tali casu expertus est Hillerius *Cent. 1. Cur. 17.* Vel:

℞. *Cepar. alb. crud. No. vj.*

*cap. allii No. ij. l. iv.*

Contulis in mortario adde

*pingu. anser. q. s.*

℞. *scorpion. parum.*

Adspargantur aliquot guttulæ olei destillati juniperi.

Misc. pro Cataplasmate:

Applicetur regioni renum & pubis.

Post hæc egregium etiam est cataplasma ex parietaria contusa, cocta cum cepis & cum oleo scorpionum instar cataplasmatris pectini imposita, quod experimentum singulare est Helidæi Paduani. Me rarò fefellit, dicit Forestus *lib. 25. Obs. 8.* Vel decoquatur parietaria cum vino, & subigatur cum cepis in formam cataplasmatris; Vel

℞. *Hb. Parietar. M. ij.*

*cherefol. Miß.*

*fl. chamom. M. j.*

Incisa coq. ad mollitiem, adde

*butyri rec. 3ij. l. 3iv.*

℞. *scorpion. 3ß. ad 3iß.*

M. f. Cataplasma.

D. S. ut *suprà.*

Applicetur calidè pubi, & desuper operculum calidum. Hoc ipso ischuriam puerperæ ex frigore subitaneo desperatam curavit Forestus: vid. l. a.

Tandem etiam in ischuria ex vitio vesicæ convenit litus externus cum oleo amygdalarum amararum; item cum oleo nucleorum persicorum; item fiat linimentum cum unguento dialthæ, & oleo nucleorum persicorum, oleo scorpionum, acuato cum aliquot guttis olei destillati terebinthinæ, succini & similibus, regioni pubis, perineo & umbilico inungendum.

Vel

℞. *ol. petra alba 3iß.*

*destill. bacc. junip. 3ß.*

Excip. c. i. q. *Unguent. dialth.* pro Litu externo:

D. S.

*Harn beförderndes Gälblein.*

Denique oleum mastichis destill. inunctum umbilico, remorantem urinam egregiè pellic. Tandem quorundam dicitur experimentum, ut ægro inscio immittantur pedes in aquam fervidam, seu benè calentem; sic enim perterrefactum ægrum subito urinam reddere asserunt. Quod etiam prodesse dicunt in tussis.

## DIAGNOSIS.

Signa diagnostica calculi vesicæ sunt ferè difficillima, potissimum in principio morbi; grandior autem redditus signa ferè faciliora præsefert, vid. Salmuth *Cent. 1. Obs. 25.* Riolanus *Anthropogr. lib. 2. cap. 24.* Hildanus *de Lithiasi vesicæ cap. 3.* & Scholziographus Hollerii *lib. 1. de Morb. intemperiei cap. 50.*

Conjecturari interim licet calculum in vesica exsequi. Nam percipitur imprimis impedimentum quodcumque in vesica, ita ut sentiant ægri quasi aliquod obstaculum, quod se opponit meatui urinario sub urinæ excretionem, & in medio sui cursu urina subito supprimatur, unde assiduus ad urinam mittendam stimulus, & summa mectendi difficultas & urinæ stillicidium.

Item anus in consensum trahitur, & unâ tenesmo affligitur, quod unum ex potissimis est signis: Imò tenesmus hic interdum est tantus, ut ex crebriori egerendi conatu sæpius procidentiam intestini recti comitari soleat.

Uterius ægri calculo vesicæ correpti percipiunt obtusum dolorem perinei seu colli vesicæ, qui circa finem mictionis exasperatur, & si calculus majorem molem contraxerit, pondus in perineo & tota pectinis regione.

In penis glande est dolor & pruritus ex continuatione membranæ internæ vesicæ ad glandem penis, ita ut ægri interdum putent, calculum hære ibidem; vid. Hildanus *Cent. 6. Obs. 49.* hinc urinam reddituri glandem fricent, comprimant & protrahant.

Subindè continuam erectionem atque tensionem penis patiuntur, idque ex irritatione membranæ vesicæ internæ cum membrana meatus urinarii circa radicem penis.

Sanè Helidæus Paduanus ceu expertissima calculi signa vesicæ habet, præter urinæ difficultatem, si post mingendi desiderium etiam adsit desiderium excernendi feces intestinorum, & si ægri, dum aliquem palum, & simile quid humo attollere volunt, dum se inclinant, in parte vesicæ anteriori circa regionem pubis dolorem & quasi puncturam sentiunt.

Præterea sub vehementiori corporis saltu vel motu motum calculi in vesica ægri percipiunt, modò non sit adnatus: Nam interdum per membranâ post laceratam vesicam ita ei adnascitur, ut tanquam in capsula videatur contentus, quo in casu est difficillimus cognitu.

Porro immisso in vesicam cathetere, aut immisso digito in podicem ab experto, facile residens calculus in collo vesicæ fluctuet. Nam observarunt quidam, quod calculus quasi conglutinatus hæserit membrarum vesicæ, unde tunc cathetere opus est, quia gravior doctima calculi.

Item si inter mingendum supprimatur urina, signum est satis certum, suppressam esse urinam à calculo vesicæ.

Corporis inquietudo varia adest, quâ ægri præprimis crura exagitant, & transverlim complicant, coxas & pubem comprimunt, abdomen ad humum flectunt, imò si calculus major fuerit, vix recti stare, equitare, aut per salebrosa loca ambulare possunt.

Et denique in malo diuturno mucilago ista, cujus antea mentio facta fuit, nec non lutosa ac argillosa, copiosè cum urina excerni solet, quæ aut non ut materia, sed productum quoque calculi erit agnoscenda: Vid. Lindanus *de Lithiasi vesicæ cap. 3.* & Riverius *Pr. lib. 14. cap. 2.*

## PROGNOSIS.

In prognosi calculus vesicæ malum est difficillimum curatu.

Facilius tamen in sceminis propter brevitatem & simul amplitudinem colli vesicæ in matrice, difficilius & periculosius in viris, quorum urethra est longior & angustior.

Calculus vesicæ propriæ membranæ inclusus, & firmitus adhærens, ferè incurabilis est, vid. Tulpius *lib. 3. Obs. 5.*

Calculus vesicæ subinde non, nisi sectione, tolli potest; quæ, nisi ritè tractetur, nec sic periculo caret, quia sectis aut extractis licet, sæpius tamen aut vesicæ inflammatio lethalis cum gangræna, aut certè fistula supervenire potest, & sic ægri tædiosam agunt vitam. Imò nec feliciter secti à recidiva planè immunes, vid. Hildanus *l. 4. cap. 4. & 8.*

## CURA.

Hæc eosdem, quos renum calculus, scopos habet, sc. ut materia anteceden tempestivè evacuetur, calculique generatio inhibeatur, ipseque calculus maturè extra corpus ejiciatur. Quod si nequeat expelli ob magnitudinem, comminatur, vel medicamentis assumptis, vel injectis, dolorque sedetur: si nec hoc procedat, excindatur.

Quoad interna: præter laxativa, acidum absorbentia &, dolore urgente, diuretica validiora, & ea ipsa, quæ in calculo renum fuerunt laudata, etiam in vesicæ calculo promovendo sunt convenientia; diutius tamen continuanda, quia longiore mora vis eorum non nihil infringitur; vid. Fortis *C. 4. Consult. 3.* Præ cæteris internè agrimonia commendatur à Foresto *l. 5. Obs. Chirurg. Obs. 3.* In specie & decoctum persicarum in calculo renum & vesicæ ab Anglis laudatur, & succus betulæ, imprimis ex ramis mediocris crassitie prolektus, aut ipsius betulæ frondes exiliores seu virgulæ conquassatæ, & cum semine dauci vel beccabunga cerevisiæ parandæ incoctæ, de quibus vid. Helmontius *de Lithiasi,*



*Lithiasis*, c. 8 & 27. item Hartmannus *Praxi Chymiat.* p. 252. Item aqua ex cepis destillata, cujus efficaciam singularem Riverius *l. 4. & l. 4. Obs.* 14. confirmat: item sanguis & urina hirci ac tauri utriusque embryonis, vel etiam urina hirci recenter mactati pota; vid. Helmontius *l. 4.* & Hartmannus p. 252 & 270. herniaria & betonica in jusculeo carniū cocta & quotidie ebibita, expertum est in calculo à Poterio *Cent.* 3. c. 73. sicut vesperi lapilli cancr. ad 3ß. cum succo limonum assumpti, vid. Poterius *Cent.* 3. c. 74. decoctum malvæ cum butyro & melle ulurpatum fuit ab Horstio in *Obs.* p. 462. A. Turriano in *Fatr. lib.* 4. c. 6. commendatur crystallus & hujus liquor. Specialissime aselli seu millepedes præparati, vel potius conquassati in vino Rhenano expressi, continuato usu mirabiles sunt ad comminuendum & quasi labefactandum vesicæ calculū, secundum Horstii, Augerii & Laurembergii experientiam; quorum usum & compositionem vid. in Sennerto, *lib.* 3 *Prax. ubi de Calculo vesicæ* p. 848. Laurembergius, qui hujus medio se curavit, singularem de calculo vesicæ cum asellis curato edidit tractatum, & ante cum primis hujus experimenti mentionem fecit Horatius Augennius *T. 2. l. 9. Ep.* 8. v. g. Spectant huc pilulæ ex salibus baccarum hederæ & nasturtii aquatici, crystalli tartari ac nitri à part. æqu. cum terebinth. paratæ, quarum Riverius *obs. alleg.* meminit; item calculus humanus ejusque ~ & ⊖ volatile, vid. Hartmannus *Prax.* p. 250. & Hæferus *herc. Med.* 1. 3. c. 4. Item electuarium, quod Montagnana *Conf.* 182. describit; vel succi ex succo parietariæ ʒij. vini ʒj. succi limonum, ʒss amygdal. dulcium à ʒjß: vel succus ʒss duorum cum vino expressorum, vel cum syrupo violarum & althea temperatus, à Mayerne laudatur. Interdum, ubi calculus est motus, & tamen non bene procedit, malumque desperatum, vomitus convenit, in specie in mulieribus, cujus egregium exemplum videb. in Poterio *cent.* 3. c. 74. ubi in casu desperato calculi vesicæ propinavit ⊕ li depuratum in jusculeo carniū, & ita excitato vomitu cum impetu calculus vesicæ prorupit. Sed certos nos esse convenit de illius mole, ne major aut acutus laceret.

Externæ in vesicæ calculo tollendo primaria sunt ea, quæ in vesicam injiciuntur, ut alteretur ab iis, & consumatur calculus, quæ tamen admodum rara sunt, imò hætenus nulla cognita. Nam si fuerit acidus, eam corrugabit; si urinosus, soluturus eum in mucaginem mutabit. Verum dico, liquorem illum debere esse temperatum: Nam quod non impossibile sit, ut per urethram solvatur calculus. confirmant M. A. N. C. *An.* 2. *obs.* 158. in *Schol.* p. 250. quod Parisius quidam em-

piricus talem liquorem habuerit, & beneficio talis aliquot calculos vesicæ comminuerit, & frustulatim ejici curaverit, & Zechius *Consult.* 31. sanguinem vulpis & hirci calidè injectum eundem in finem laudat; quod etiam Monconys *Voyage l. 1 p.* 3. testatur. Sunt, qui solutionem stercoris columbini calcinati, cum parietaria decocti, vel ejus aquam pro hoc scopo commendant. Alias etiam balnea ex emollientibus, item fomenta & cataplasmata ex anodynis, & moderatè pellentibus, similibusque in usu esse solent.

Item inunctiones fiant cum pinguedine hircina, cuniculi, petroleo, oleo scorpionum, amygdalarum amararum, succini, ceræ, & similibus, circa regionem pubis & perinei: nam petroleum etiam renibus externè inunctum, eorum calculum promovet; & ob id maximum remedium vocatur à Panarollo *Pent.* 2. *obs.* 2. Vel

℞. *Petrol. albi* ʒijj.

℞ *expr papav.* ʒiß.

*hyosc.* ʒß.

M. D. S.

*Uinderend Del.*

Singularissimum est cataplasma factum ex alba cepa, cocta in vino decoctionis parietariæ, & oleo scorpionum, quod ipsum pubi & perineo admovendum, quàm calidè fieri potest. Cataplasmate hoc usus quidam fuit duabus vicibus, quibus se curavit à calculo vesicæ, quem sibi jam exscindendum decreverat: Vid. Hæterus *Herc. Med.* pag. 175. item Horstius in *obs.* pag. 460. Injiciantur quoque clysteres. Tandem si hæc irrita fuerint, opera danda erit, ut sectione promoveatur calculus; cui addenda illa vesicæ cervicis perforatio, quam in desperatis Riolanus *Encbeir. Anatomico pathol. lib.* 2. cap. 30. & Zechius *Consult.* 58. describunt & commendant.

## ARTICULUS II

De

*Urina Excretionē Aucta.*

MEMBRUM UNICUM

DE

URINÆ INCONTINENTIA.

Aucta seu frequens nimis urinæ excretio, seu quando urina ad voluntatis imperium & arbitrium diu satis retineri nequit, & præter voluntatem effluit, aliàs dicitur urinæ incontinentia, seu involuntarium urinæ profluvium.

Vitium hoc duplici modo affligit ægros: aut enim dormientes solummodò urinam continere nequeunt, ut in lectimingis; aut vitium hoc diurno pariter ac nocturno tempore infestum est, ita ut vigilantibus ac dormientibus æqualiter urina involuntariò effluat: Quod etiam spectat, si urina satis diu retineri nequeat, sed ad mictionem frequentiore urgeat.

PARS

## PARS AFFECTA &amp; CAUSÆ.

Subiectum & causa hujus affectus proxima, quam veteres retentricem læsam aiebant, est deficiens constrictio sphincteris vesicæ.

Causa remota, per quam debita sphincteris hujus constrictio, modò symptomaticè, modò idiopathicè, deficit, est I. Paralysis vel resolutio vitio nervorum eveniens, sive universalis totius corporis, sive partialis, solam vesicam & sphincterem afficiens, dum nempe ex impedimento nervis injecto spirituum animalium irradiatio debita fieri nequit. Si ergò ex quacunque causa, vel interna vel externa, læduntur nervi ad sphincterem abeuntes, eumque stringentes, spiritibus resolutis fibræ relaxatæ se minùs stringunt, & incontinentia urinæ infertur. Similiter quoque contingit hæc sphincteris resolutio interdù à casu ab alto, si quis ad regionem lumborum, ossis pubis, aut ossis sacri impingat, ubi nempe nervi ex spinali medulla derivantur ad vesicam; sic luxatio etiam vertebrarum in locis istis subinde urinæ incontinentiam infert; qualia exempla videb. apud Schenckium in *Obs. lib. 3.* Zacutum Lusitanum *l. 2. Med. Princ. Histor. 143.* Amatium Lusitanum *Cent. 2. Cur. 11.* Imò diuturnior mora in aqua frigida & ipsa resolvere sphincterem vesicæ, & sic urinæ incontinentiam inferre valet. Pertinet huc, dum morbis acutis, ægrisque summè debilitatis, supervenit urinæ incontinentia ex defectu spirituum animalium, adeoque viribus penè exhaustis: id quod & apoplecticis ordinariò ferè accidere solet, in quibus involuntariò & feces alvi & vesicæ effluunt.

Deficit etiam II. sphincteris vesicæ constrictio ob fibrarum sphincteris nimiam relaxationem, sive tonum omninò læsum, idque sæpiùs propter nimiam distensionem. Causa hæc subindè affligit in specie mulieres primiparas in partu difficili, facto propter nimiam foetus magnitudinem; hinc enim, dum foetus eluctari nititur per istas angustias, vaginam uteri, & simul collum vesicæ, ejusque sphincterem vaginæ uteri implantatum nimis dilatando in causa est, ut sæpiùs postmodum urinam retinere nequeant. Exemplum tale recenset Platerus in *Observat. pag. 256.*

Tandem III. Quando fibræ sphincteris constrictoriæ omninò lacerantur, ac plùs minùs intensè læduntur, etiam cessat urinæ retentio. Fit hoc non tantùm in vulneribus istarum partium fortuitis, sed etiam imprimis in lithotomia, incautè instituta, exemplum videb. in Sculteti *Armament. Chirurg. Obs. 63.* Pertinet huc etiam obstetricum ineptitudo, quæ vesicæ collum aut carunculam myrtiformem majorem, orificio vesicæ præpositam, in parturientibus subinde digitis aut ungui-

bus lacerant, & inde non rarò gravissimam incontinentiam ☐z inferunt: Ut taceam in difficiliore partu rumpi quasi vesicæ sphincterem; vid. Heintici s ab Heer in *Observat. 14.* item Salmuth in *Observat. C. 1. Histor. 39.* Fit hoc interdum etiam in mulieribus propter prolapsum sinus pudoris. Vid. Bartholin *Cent. 4. Histor. Anat. 2. pag. 213.* ubi urinæ incontinentiam refert ex ulcere vesicæ cum prolapsu uteri.

Cæterùm pertinet huc suo modo vitium istud, quando urina satis diu retineri nequit, id quod ferè propter continuum ac sensiliorum in vesica stimulum contingit, ita ut & sæpè & parum excernatur, absque tamen dolore in excretionem, aut absque ulla molestia; sin verò retineri debeat diutiùs urina, tunc vesica doleat, aut irritata excretionem stimulet. Contingit hæc interdum in calculo vesicæ, qui incumbens collo vesicæ clauso, suâ mole aut asperitate, aliavè ratione continuò irritando, mictionem urget: item contingit hoc etiam interdum gravidis ultimis gestationis mensibus, dum moles uterina premit vesicam, aut subsidendo distendit vaginam uteri, sicque per consequens orificium vesicæ simul dilatat, unde continuus percipitur stimulus, nec sufficienter urina retineri potest.

Facit huc etiam vitium, quando excoriata aut exulcerata est vesica, in specie ejus orificium; sic enim ab excoriatione ad excretionem stimulata vesica urinam mittit, ut propterea frequentius & sæpiùs mingatur.

Denique etiam risus & tussis diuturnior & gravior ad hoc vitium disponit, dum ægri crebrius tussientes simul urinam emittunt, quod etiam observavit Salmuth *Cent. 2. Observat. 30.* item Platerus *lib. 2. Observat.* in speciem mulieribus corpore magis obeso aut habitiori præditis: nempe concutuntur in tussi cum diaphragmate quælibet abdominis partes internæ, quibus concussis etiam vesica concutitur, & sphincter se laxat, idque eò magis, quò minus in obesiori corporis habitu partes externæ cedunt, ut ita quasi impetu protrudatur tanquam ex siphone urina. Fit denique hoc etiam malum in casu, quando vesica ob suam angustiam urinam multam, aut diu, retinere nequit, tam nativam, sub prima generatione, quàm ascitiam propter tumorem vel proprium vel partium vicinarum, & ex earum compressionem angustatur, ut urinam diu satis retinere nequeat, v. g. in inflammatione musculorum rectorum, abdominis in pubis regione vesicæ superjacentium: vid. Timæus von Guldenslee *lib. 3. Cas. 45.*

Hæc fuit vera & propriè dicta urinæ incontinentia, vigilantibus pariter ac dormientibus conveniens.

Verùm



Verum, quoad improprie dictam incontinentiam urinæ, seu quando interdum optime retinetur urina, noctu verò dormientes saltem stragula permungunt, vitium istud aut est ex debilitate facultatis retentricis, ut vulgò loquuntur, rectius verò facultatis animalis, i. e. vel ex deficiente activitate, & ita torpore spirituum animalium, aut ex eorundem defectu, dum sc. hi aut deficientes aut torpidi non satis firmant tonum fibrarum sphincteris vesicæ constrictoriarum. Unde videmus, quod in specie infantibus aut senilibus propter spirituum torporem aut segnitiam vitium hoc frequens sit, dum nempe spiritus animales nequeunt validè per nervos ac fibras nocturno tempore irruere. Interdum etiam senibus in ultimo senio obvenit nocturna incontinentia urinæ, quin & interdum morbis acutis supervenit, ex prostratione nempe facultatis animalis, seu ex defectu spirituum animalium. Frequenter autem solet affligere senes propter musculum sphincteris semiparalyticum, & propter spirituum animalium vigorem deficientem. Imprimis & his valdè familiaris est urinæ incontinentia, qui sub consistente ætate nimis indulserunt potui, & qui obnoxii fuerunt calculo. Interdum etiam consuetudo hinc supervenit, ita ut pueri, interdum etiam adulti, ex prava consuetudine stragula largiter permungant. Facit etiam huc imaginationis vis, quatenus nonnulli à nimio potu, acriore urina, aut sensibilitate vesicæ majori stimulatiles dum permungunt, somniantes se matulam tenere: Utrumque non tam medicamentis, quàm flagris aliisque fraudibus cedens.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa diagnostica, affectus hic facillimus est cognitus; nam si ægri tacent, loquuntur stragula & vestimenta: saltem curarum diversitas partim ex relatione ægri, partim ex antecedentibus circumstantiis expiscanda venit; vid. Riverii *Praxis lib. 14. cap. 7.* & Timæus von Guldensee / l. 4.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin verò, istud urinæ profluvium, quod dormientibus saltem obvenit, levius est, quàm quod vigilantibus contingit.

Quodsi adsit talis urinæ incontinentia ex vitio nervorum paralyticorum, in specie vitio cerebri, aut spinalis medullæ, difficilis curatu & periculosus est affectus, nempe ex vitio sphincteris exortus: Vid. Platerus *Observ. pag. 805.*

In senibus urinæ incontinentia est ut plurimum immedicabilis, nisi quod interdum forsan thermæ iisdem succurrant.

Tom. II.

In febribus acutis, aut aliis morbis acutis, sive à delirio sive spirituum resolutione proveniant, superveniens urinæ incontinentia, summum periculum innuit, & mortem ut plurimum portendit: indicat enim deficientem penitus vim animalem, & deficientes spiritus animales, tonumque nervorum jam fatiscentem.

Puerperis ex læsione violenta superveniens urinæ profluvium rarò curatur.

In pueris interdum per incrementum annorum subinde spontè cessat, sc. intra annum vigesimum quintum: Nam ubi tunc non cessat, metus est, ne ex Hippocratis mente sit immedicabilis. Observat tale exemplum Timæus von Guldensee / in casibus lib. 5. *Cons. 22. pag. 258.* de puero incontinentia urinæ laborante incompefcibili, quæ ipsa tamen succedente ætate sponte natura curata fuit.

### C U R A.

Quod attinet curam incontinentiæ urinæ: in hac imprimis causæ remotæ corrigendæ; hinc frequentissimè in malo hoc musculus sphincter adstringentibus & nervinis aromaticis roborandus, sive internè propinentur, sive externè admoveantur. Pro quo scopo in genere conveniunt omnia adstringentia, nervina simplicia antiparalytica: Et quidem si malum adsit à paralyfi seu resolutione, remedia externa non tantum vesicæ, sed etiam lumbis, ossique sacro, ubi sc. nervorum vesicæ est exortus, imò ipsi cerebro, applicanda erunt. Purgantibus aliisque evacuantibus hoc in casu vix videtur opus, nisi humores pituitosos ac serosos abundare constet, ubi decocta sudorifera ex lignis singularis efficaciz à Riverio l. 4. proclamantur.

In genere ergò ad quaecunque ferè urinæ incontinentiam laudantur quædam euporista, per usum appropriata observata, ut calamintha, & mentha, & omnes his cognatæ simplicium species cum vino coctæ, & ante pastum haustæ. Deinde alchimillæ & agrimoniz usus, calaminthæ additæ, specificè quocunque modo conveniunt ob vim adstringentem vulnerariam. Hisce accensetur castoreum, quod imprimis in affectu nervino paralytico egregium est remedium. Galanga, non secus atque lignum aloes resinofum, subtilissimè pulverisatum, ad ʒj. cum cyatho dimidio vini albi generosi, aut etiam in ovo forbili assumptum, manè & tempore somni insigniter prodest; item plantago, radix consolidæ majoris, cyperi, nuces cupressi, equisetum, succinum, flores & semen hyperici, semen agrimoniz, glandes & medulla glandium, mastix, &c. Certè pulvis mastichis ad ʒj. crebrius in vini haustu admodum etiam confert; uti etiam myrrha, si

(P p p p)

propi-



propinetur in vino decoctionis seu infusionis calaminthæ. Ulterius thus ejusque pulvis, item gummi Arabicum ad ʒj. in vino assumptum, laudantur, præsertim quando occasione stimuli præternaturalis non benè retinetur urina. Unde Joellequentem commendat pulverem ad incontinentiam urinæ paralyticam, v. g.

℞. calaminth.  
myrrha  
castor. ā. ʒiij.  
gland. ʒv.

Hæc pulverisata subtilissimè propinentur ad ʒj. cum vino enulato.

Specifica inter talia convenit guttur galli tostum, tritum, & cum vino propinatum, ad ʒj. tam in diurna quàm in nocturna urinæ incontinentia, quod mirè laudatur à Solenandro *Sec. 4. Conf. 11.* vid. Sennertus *l. 3. Prax.* ac Horstius in *Problem.* item Hartmannus in *Praxi Chim.* & Lindanus. Commendat etiam hoc puerperis, si à partu difficili malum ortum fuerit, Hæferus in *Herc. Med. pag. 343.* Porro pulvis erinacei combusti inter alia etiam specificum optimum & certissimum est ad omnem incontinentiam urinæ, quod B. D. Michaelis frequenter, felici aliquoties cum successu adhibuit; qui retulit etiam, quendam Medicum, qui 20. annos hoc affectu laboraverat, postmodum solo hoc medicamento feliciter curatum fuisse. Ipse etiam in puero 12. annorum, post morbum acutum urinæ incontinentiâ laborante; hunc pulverem cum medulla saxorum mistum, cum successu adhibui. Hinc Bartholetus in *Encyclop. cap. 164.* contra urinæ incontinentiam adhibet pulverem compositum ex interioris tunicæ ventriculi gallinarum part j. & cineris erinacei part. iij. quæ duo pulverisata insigniter commendantur ab eodem. Unde etiam erinaceus est basis pulveris experti Montagnanæ pro iis, qui lectum permingunt. Compositio est hæc:

℞. Tunic. stomach. gallin. pulv. ʒʒ.  
HB. agrimon. ʒj.  
erinac. combust. ʒiij.  
Misc. f. Pulvis.

Dosis ʒj. cum jure vel vino propinatur.

Porro vesica suis vel apri tosta, item vesica capræ exsiccatæ ad ʒj. data valdopere commendatur ab Hartmanno *Praxi pag. 269.* Præ cæteris vesica capræ præ vesica suis & apri commendatur. Hisce addatur medulla lapidis, das Stein-Marc/ quæ apud Jenneses & Rochlicenses invenitur, est etiam expertum specificum contra incontinentiam urinæ dosi ʒj. ad ʒʒ. in vino generoso propinatum, quo Tacchenius Nobilem quendam urinæ incontinentiâ laborantem citra spem & expectationem curavit. Unde quidam ad-

modum commendant hunc pulverem; vel:

℞. pulv. medull. lapid. ʒiij.  
gran. mast. ʒij.  
ligni aloes resinosi exactæ pulveris. ʒʒ.

M. fiat pulvis pro aliquot dolibus.

Propinetur pro dosi ʒj. in quocunq; vehiculo.

Item huc spectat pulvis pro lectimiginis, quam officinis suis usualet Hæchstædterus *Dec. 2. Hist. 2.* describit. Piscis in ventre lucii inventus & propinatus commendatur ab Hartmanno. Porro pudendum suis seu vulva suilla quocunque modo præparata, tam in pulvere propinata exsiccatæ, quàm ex eadem paratum farcimen ægro offerendum, non tantum commendatur à Schenckio in *Thef. Med. cap. 1.* ceu remedium sæpius sibi observatum in praxi, sed etiam D. Michaelis aliis irritis in usu fuit. Hoc tamen observat Schenckius, quod farcimen ex pudendo masculi sit pro masculo remedium faciendum, & fœmellæ pro fœmina. Aliàs cinis pudendi suilli convenit, & loco farciminis substituitur, quo ipso puer 18. annorum ab incunte ætate hoc malo affectus curatus dicitur: conf. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 21. pag. 36.* ac *Ann. 9. & 10. Obs. 150.* Alii loco vulvæ suillæ ungulas porci castrati siccatas & subtilissimè pulverisatas in haustu vini vel potu communi propinant; mures exsiccati & pulverisati, vel mures in butyro elixi & ita propinati, sæpius expertum sunt specificum contra urinæ incontinentiam, tam vigilantium quàm dormientium. Conf. *M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 88. pag. 124.* Forestus *lib. 25. Obs. 22.* item cineres eorum, A Galeno laudantur cerebrum & testiculi leporis exsiccati aut combusti, item cochleæ cum testis combustæ, alii sterus leporis propinant, item sterus capræ: In specie verò, si dormientibus saltem contingat hoc malum, tunc ex experientia Helidæi Paduani convenit pulvis cupularum glandium in ∇ vel vino chalybeat; item & sigillata cum pulvere castorei in junioribus ad ʒj. adultis ad ʒj. in haustu vini vel aquæ parietariæ sub introitum lecti propinetur: item pulvis pulmonis hædi tosti, & ad ʒj. exhibiti, ceu specificum commendatur. Facit etiam huc pulvis Augustanorum pro lectimiginis, quem etiam commendat Hæchstædterus *Decad. 6. Cas. 2. in Schol.* ubi habet mixturam contra incontinentiam urinæ nocturnam.

Denique cuidam singulare experimentum venditur rana viridis per medium scissa, & renibus applicata. Nutrices & mulieres interdum pueris penem constringunt cum quodam vinculo, ne lectulos permingant, sed sit hoc cum summo periculo. Exemplum videb. in Bartholino *Cent. 3. Hist. Anat. 52. pag. 103.* ubi ex penis constrictione periculosa secuta notat symptomata.

Lacc.

**Laceratio & distensio sphincteris vesicæ à partu difficili curatur per trochiscos de carabe, glandes quernas, bolum Armenam, guttur galli rostum, &c.**

His occurrunt etiam externa, inter quæ imprimis balnea & fomenta laudantur, facta ex incoctis plantis nervinis atque adstringentibus, ut mentha, absinthio, floribus rosarum, balauftiorum, radice tormentillæ, bistortæ, foliis quercus, imprimis radice symphyti; quæ etiam defloratæ utuntur virgines; vid. Hæchstædterus; & similibus, ut ex Horstio *lib. 5. Obs. 20.* constare potest. Balnea hæc sunt cum aqua ferratorum, quæ vitriolacæ profapiz, adeoque adstrictoria est. Loco horum artificialium speciatim thermæ sunt proficue in malo contumaciori, idque primariò senibus. Harum enim infusione vir 72. annorum ab incontinentia urinæ fuit levatus. Novi sanè qui à potu, mox atque unicum potum hauriret, continuo eoque perquam doloroso vesicæ cruciatu, & ad continuum mictum stimulo, afficiebatur; aliis multis irritis profuerunt internè juscula decoctionis carniæ & gallinarum calida, loco potus assumpta; externè verò thermæ. Juxta hos infusus convenit etiam inunctio lumborum & regionis pubis cum oleo absinthii, mastichis, menthæ, rutaceo, castorei, unguento nervino Augustanorum, item styrace liquido, balsamo Peruviano, oleis nervinis destillatis, oleo destillato macis, terebinthinæ, juniperi, succini, semine dauci vel carvi. Item emplastrum oxycroceum vel nervinum, vertebri lumborum applicatum, malaxatum cum balsamo Peruviano & oleo succini, commendari solet à JOELE *Pr. lib. 6. pag. 134.* item à T. MAEO von Guldentsee *in Cas. pag. 258.* Tandem singulare remedium est pulvis butonis vivi in nova olla usti, & in sacculo collo appensi; quod est veterum experimentum; vid. Henricus ab Heer *Observ. 14.* Confirmatur simile exemplum à Digby & Boyle *in Philos. Exper. pag. 217.* ubi refert: in Anglia fuisse reiteratum hoc experimentum, idque felici cum successu in incontinentia urinæ ex læsione vesicæ in partu difficili, cujus curationem videb. in *M. A. N. C. ann. 3. Observ. 325.* Sennerto *lib. 4. Prax. P. 2. cap. 9. pag. 466.* qui eandem curat balneo & unguento ex catellis. Quidam hoc unguentum ceu singulare commendant contra profluvium urinæ muliebri seu potius ☐æ stillicidium, post partum difficilem:

*℞: lap. calaminar. in ✕ & ▽ rosar. bis vel ter loti & subtiliss. pulveris. ℥iv. lithargyr argent. ℥ij. ceruss. præp. ℥j. 8o rosar. chamomill. ā ℥v. Tom. 1h.*

Agitentur simul per horas duas & cum axungia hirci ℥ij. f. l. a. Unguentum, benè agitando ad horæ quadrantem, donec consistentiam debitam acquirat.

Hoc ipso leniter inungenda est pars affecta, ac linteo cooperienda.

Puerperis post partum, à laceratione & distensione sphincteris conveniunt infusus & fofus ex radice consolidæ, foliis quercus, hederæ, gypso usto, bolo & vitriolo; suffimigia ex pice, thure & mastiche; vid. Plate-rus l. a. Unguenta ex catulis Sennerti; Item, ubi incontinentia urinæ ex vesicæ exulceratione.

*℞. Aqua rosar. plantag. ā. ℥ij. sacch. cand. ℥ss. ceruss. litharg. alum. crudi plumosi ā. ℥ij. camph. gr. v. ungu. Egypt. 3℔ M.*

Quodsi dictis modis non cesset malum, pro cura palliativa vascula quædam arte applicanda veniunt in maribus, quibus urina continuo depluens colligatur, ut cum minore fastidio vivant: quale instrumentum videb. in Hildano *Cens. 6. Obs. 54. & 55.* foeminis verò inserviet, quale ab Heer l. a. fuit explicatum.

## ARTICULUS III.

De

### Urinæ Excretionē depravata.

Depravata urinæ est excretio, quando urina cum dolore, ardore, insigni difficultate, vel alio modo præternaturali excernitur.

## MEMBRUM I.

De

### Stranguria.

Stranguria dicitur ἀπὸ τῆς στενότητος, à gutta, Latine urinæ stillicidium, quia in eadem urina guttatim excernitur, idque cum acerbò dolore colli vesicæ & urethræ, tam in quàm post mictionem, remanente nihilominus continua ad mingendum stimulatione. Et quidem in suo genere simillimus stranguria est affectus cum tenesmo, ubi continuus est conatus excernendi excrementa, unà cum gravi dolore sub excretionē. Nam sicuti se habet tenesmus in podice ejusque sphinctere, ita se habet stranguria in vesica, ejusque musculo constrictore, dum uterque continuo irritatur; & sicut in tenesmo peccat acidū in subjecto viscido, ita in stranguria peccat acidum in subjecto aqueo. Equidem communiter hoc malū oriri volunt ex refrigeratione (Pppp2) abdomi-

abdominis & partium urinarum, in specie vesicæ, vel à potu etiam frigido interno assumpto; unde Germanis vocatur *die kalte Seife oder Pisse*.

#### C A U S Æ.

Potius causa proxima hujus stranguriæ est vitiosa urinae aciditas, quæ acore suo, fibris nerveis inimico, stimulando vesicam, in specie circa collum, ubi admodum sensibilis existit, & rodendo suo transitu meatum urinarium, continuum ferè mingendi conatum acerbumque dolorem diu permanentem infert. Urina verò guttatim prodit, quia, dum vesicæ sphincter se laxat, ut urina effluat, ab urinae acrimonia acida vellicante subito denuò se stringit, post denuò se laxat, & iterum stringit, & sic porro, unde guttatim prodit. Dolor iste primariò percipitur tam in urethra, quàm in vesicæ collo, idque post mictionem; iste tamen, qui urethram affligit, acerbior est illo, qui vesicam & ejus collum afficit: licet enim urethra & interior vesicæ membrana sit continuata & una eademque substantia; tamen vesica interiùs est oblita mucò crasso, nonnihil viscido, qui eam ab acrimonia urinae plus minus rosiuæ defendit, quo cum careat urethra, eò acerbius à transeunte cruriatur urina acida. Hunc urinae acorem peccantem confirmat Helmontius in *Tract. Pleura furens*, qui demonstraturus in urina stranguriosorum peccare acidum, sumere jubet urinam naturalem, i.e. constantem ex Æ & volatili Æso, seu composito ex acido & alcali volatilibus, & huic adderetantillum vini acidi, & injicere in vesicam urinarum; sicut enim subito percipi dolorem stranguriæ simillimum: itè quod in nosocomio Lugdunensi taliter affectorum urina gustata manifestum acorem linguæ repræsentavit. Confirmatur hoc ulterius per curam, quæ per talia, quæ acidum corrigunt in primis viis, istudque destruunt, aut obtundendo demulcent, peragitur; hinc etiam urinae opacæ & turbidæ, albicantes & plus minus lacteæ, & hoc in specie in senibus, excernuntur, qui vitio digestionis primæ laborant.

Acor hic in urina vitiosus, stranguriæ autor, natales habet suos in stomachi digestionem, ejusque in duodeno perfectionem vitiatam, ex cruditate acida, eaque ut plurimum vitio assumptorum. Causa dispositiva est inertia fermenti bilis, non debite perficientis in duodeno chylum: dum nempe assumpta, imprimis potulenta, non digesta ritè, sed acore aut stomachi aut proprio adhuc tincta & inquinata è stomacho elapsa rapiuntur ad intestina sine transmutatione in salsum, & ita rapiuntur cum urina potus ad vias urinarias; unde postmodum in vesica collecta hanc suo acore stimulant, & stranguriam interunt.

Confirmat hoc quotidiana experientia; dum unusquisque observare potest, quod potus non ritè fermentati, sed facile adhuc fermentescibiles, indeque acetcentes, ut vinum meracum, *Randwein*/ vel mustum, vel cerevisia nova non ritè defecata, aut copiosius aut intempestivè assumpta, & similia, ubi inde inferant stranguriam: Vid. Hæferus *Herc. Med. lib. 3. pag. 155.* item Guilielmus Faber f. 574.

Alias unumcunque naræ excoriationes, exulcerationes, item attritiones à calculo, ita vesicam disponunt, ejusque interiorem superficiem adeò irritabilem reddunt, ut nullius rei accedentis contactum, etiam urinae naturaliter constitutæ, nisi cum summo dolore ac molestia, adeòque continua irritatione perferre queat, quin continua adsit stranguria, unde & ulcus vesicæ aut renum, occasione acrioris puris, stranguriam molestissimam infert: sed rarum est, quia talia potius ad dysuriam disponunt,

Præter hanc ordinariam stranguriam datur etiam virulenta stranguria, utut hæc magis ad dysuriam referenda sit, iis frequens, qui laborant lue Venerea, ac quæ difficillima est curatu, ac subinde in ulcus penis & prostarum ejus terminatur; quin & hæc stranguria virulenta cum quibusdam consenscit ac commoritur, observante Schenckio *lib. 3. Obs.* Originem habet ex prostaticis glandulis circa radicem penis inquinamento Venereo infectis, & ita lympham acrem plus minus corrosivam plorantibus. Interim rarum est, quod oriatur stranguria admodum pertinax ac tormentosa ex incantatione, quale exemplum singulare refert Helmontius *Tract. de Lithiis*, quam per succum betulæ, seu cerevisiam betulinam curatam refert.

#### DIAGNOSIS.

Stranguria per se patet ex relatione ægrotum, quibus malum hoc insigniter est molestum: Causarum differentia ex circumstantiis antecedentibus est cognoscenda: ideò interrogandus est æger de usu externorum assumptorum, cum sæpissimè ex causis externis oriatur.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: stranguria, si ex vitio urinae, periculosa non est, utut admodum molesta.

In senibus autem malum curatu perquam difficile propter deficientem digestionem primam, & inertiam fellis.

Cæterum diuturniorem aut contumaciorē stranguriā ulcus vesicæ interdum pedetentim insequi solet.

Quæ



Quæ ex vitio vesicæ est, curatu difficillima, ac subindè periculosa existit.

## C U R A.

Curam stranguriæ quod attinet : in hac imprimis

1. Acre acidum urinæ corrigendum ac temperandum.
2. Vesicæ qualiscunque læsio restituen-  
da.

Quoad prius : ante omnia imprimis ventriculus est rectificandus, inter quæ in malo contumaciori primatum obtinent vomitoria, quorum utilitatem in stranguria & aliis urinariis affectibus multis commendat Riverius in *Praxilib. 14. cap. 9.* & confirmat per experientiam Hildanus *Cent. 6. Obs. 52.* Porro ad rectificandum stomachum etiam pro scopo averforio purgantia blanda interdum propinantur : quæ inter sunt imprimis pilulæ de terebinthina cum rhabarbaro, præter vim laxativam simul acrimoniam urinæ temperantes, jalappa cum terebinthina ; item spiritus dia-turbith cum rhabarbaro, ac denique extractum panchymagogum cum Mercurio dulci, idque imprimis in virulenta stranguria ex lue Venerea, vel quæ ad aliquam exulcerationem vult terminare. Sunt qui cassiam quoque hîc commendant ; experientia tamen multorum practitorum docet, illam non raro dolores augere ; vid. Horstius *lib. 4. obs. 4.* Pigræus *Chirurg. lib. 7. cap. 4.* & Hildanus *l. 4.* Quoad posterius, ea, quæ in vesicæ exulceratione suprâ fuerunt posita, locum obtinent.

Inter remedia pro corrigendo acriacido egregiè convenit radix glyzyrrhizæ ; ejusque decoctum, ac radix malvæ cum nummularia in jure pulli : Vid. Gabelchoverus ; portulaca, sonchus levis, glandes pulverisatæ, aut etiam in specie gallæ, flores violarum, nymphææ, chamomillæ : fructus etiam alkekengi, & trochisci de alkekengi, cum & sine opio, optimè conveniunt in stranguria. Præ cæteris quoque cortices aurantiorum pulverisati, aut etiam tinctura seu essentia corticum aurantiorum cum spiritu vini tartarisato parata, aut etiam, idque primariò, & destillatum corticum aurantiorum ad aliquot guttas assumptum. Convenit præsertim, si à causa externa assumptorum malum ortum fuerit : Horum enim sal volatile oleosum acidum potenter destruit, & acuit bilem eadem ex ratione. Pulvis nucis moschatæ curat stranguriam ab usu cerevisiæ crudæ vel novellæ enatam, cerevisiæ immixtus : Vid. de hoc successu Forestus *lib. 25. obs. 2.* Insuper ribes nigræ, quæ spirant urinæ odorem, in usû sunt, & tam baccæ quàm folia, item gemmæ ribes nigræ ad ʒss. cum semine dauci in vino rubro decoctæ singulariter commendantur à Foresto *lib. 28. obs. 4.* Porro deco-

ctum raparum domesticum fermè sine pari remedium est, atque specificum Gabelchoverus *Cent. 3. Cur. 2.* utpote qui hoc decoctum in affectu urinæ, præsertim in stranguria & dysuria, feliciter adhibet, & in quacunque acrimonia acido-salsa est optimum : Conf. Crato & Sylvius in *Praxi.* Conveniunt quoque semen cannabis, 4. semina frigida majora, ex iisque cum papavere albo paratæ emulsionες : Nani hujusmodi oleosa semina acrimoniam urinæ obtundunt. Quò pertinet & amygdalarum dulcium cum syrupo de althea, additis lapillis cancror. ita assumptum ; lac ipsum hujusque serum incoctis præprimis floribus cyani & calcatrippæ, malvæ radix & flores, unde horum conservam Riverius & Amatus Lusitanus *Cent. 6. Hist. 58.* & foliorum decoctum Foresti *25. obs. 4.* & Gabelchoverus *Cent. 1. obs. 21.* in stranguria mirè extollunt. Pariter pulvis radice altheæ cum saccharo, aut hujus cum jujubis decoctum, item semina mucilaginosæ, & exinde parata decocta & syrupus, vid. Hartmannus *Prax. pag. 271.* item hujus loci est albumen ovicum aqua rosarum conquassatum, decoctum florum chamomillæ cum lacte, ac decoctum brassicæ rubræ, de quibus idem Forestus *l. 4. observ. 3.* Decoctum item herbæ & baccarum alkekengi cum passulis non immeritò laudatur ab Amato Lusitano *Cent. 6. Cur. 92.* Balsamum Peruvianum sunt, qui exhibent à guttis x. xv. vel xx. ad summum ʒj. interiùs in vehiculo appropriato ; cui tamen à Lindano meritò præfertur & specificè commendatur Balsamus ille Indicus de Capaibe dictus, ad guttas aliquot in decocto petroselinii assumptus, utpote quod nobile etiam experimentum in stranguria contumaci, in specie, quæ comitatur gonorrhœam virulentam, vel lue Venereæ ; non secus ac balsamus sulphuris, & cæteræ, succini, macis, si ab erosione vesicæ malum, in aqua aut decocto appropriato, v. g. cicerum rubrorum, propinatum, locum invenit. Quod si pertinacius fuerit malum, & vitæ digestionis solo à cruditatibus ibidem detentis sit stranguria, id quod v. g. in senibus frequentius evenit, conveniunt atomatica, & horum olea stomacho grata hujusque digestionis faventia, v. g. galanga, zedoaria, nucem moschatæ, crocus, cortices aurantiorum species diacumini ; item potus vini Hispanici aut Malvatici, aut Malvaricum juniperinum usurpentur ; vel etiam convenit vinum, in quo filices candefacti aliquoties sunt extincti ; si enim sic vinum diureticum, omnis acidi absorptivum : propter quam rationem in stranguria etiam conveniunt subjecta alcalisata, v. g. lapilli cancrorum. Ac san in cancris absoluta est stranguriæ cura, & alcalina diuretica pluribus scopis satisfaciens :



toties optimè se habuit; simul ac in prandio vel cœna tantillum bibit, intensum dolorem in cervice vesicæ sensit, cum stranguria continua & diuturna. Urina ejus erat non lactea, nec purulenta, sed in superficie blandè pinguis; tandem thermis curatus fuit, & per biennium se benè exinde habuit. Audivi tamen, malum recrudescere, quod propter inertiam bilis in senibus facilè fit, hinc in iis stranguria difficilis est curatu.

## MEMBRUM II.

De

## Dysuria.

In dysuria seu urinæ difficultate cum magno mingendi conatu & labore ægri, accedente non levi dolore, urina effluit. Dolor iste concurrens, cum inter mingendum quasi ardoris sensum inferat seu exprimat, ob id exinde malum hoc alio nomine etiam ardor urinæ venire solet. Conqueruntur enim ægri in tali affectu: *Es brennet als wann heiß Wasser lieffe*/Cognatus est hic affectus cum stranguria, differunt tamen ambo à se invicem in eo:

1. Quòd in dysuria urina non guttatim, sed sine interruptione, & sæpiùs in debita quantitate, utut cum conatu & labore, in stranguria verò guttatim, effluat.
2. Quòd etiam dysuriæ dolor tantum inter mingendum percipiatur, non verò ante, aut rarò etiam post mictionem, uti in stranguria, ubi post mictionem dolor adhuc urget, qui dolor quoque alterius planè generis est, quàm qui in dysuria afficit, cum hic ardoris quidam sensus subsit.
3. Quòd rariùs propria urinæ acrimonia, sæpiùs verò partium urinolarum, vesicæ puta, aut vicinarum partium affectus, in specie quidem læsio vel erosio, plus minus excoariatio aut exulceratio orificii vesicæ seu principii meatus urinarii dysuriam inferant. Stranguria verò saltem à sola urinæ acrimonia nimia acida originem ducat.
4. Quòd in stranguria urina cum continuo ad mingendum stimulo, tenesmo podicis non absimili, excernatur; dysuria nihil horum sentiat.

## CAUSÆ.

Causa ergò talis urinæ difficultatis ac ardoris est aut in ipsa urina; quæ excernitur, in partibus Oriis, vesicæ nempe & partibus vicinis, per quas eadem excernitur. Hæ ipsæ enim præternaturaliter affectæ, etiam ab urina naturaliter constituta præterfluente læduntur, & hinc doloris sensum concipiunt.

Quod ergò attinet primò urinam: hæc quidem, licet rariùs, dysuriam gravem aut habitualement inferat, quando nempe acris nimisque salsa, acido salsa, aliavè ratione mutata existit; sive hoc fiat à salibus copiosis imbibitis, ut fit in hypochondriacis & scorbuticis, qualem dysuriam lethalem ex acrimonia seri scorbutici cum mira penis retractione observarunt M. A. N. C. *Ann. 4. obs. 155. pag. 197.* sive eadem fiat à pure acriore nimisque salso permisto, qui pus aut exulcerationem renum aut vesicæ, aut aliarum partium exulcerationem insequi, solet. Pertinent huc cantharides vesicam ulcerantes, & corrosivo suo veneno urinam imprægnando, dysuriam inducentes, aut applicati externè, aut perperam propinati. Pertinent huc quoque Mercurialia, imprimis præcipitata non ritè præparata, quæ aliàs ad gonorrhœam virulentam adhiberi solent; nam & hæc ad dysuriam disponere observavit Forestus *lib. 25. obs. 37.* de quodam nauta, qui gonorrhœa laborans & mingendi difficultate, cum usurpasset pilulas ex ~~q~~to paratas, exinde urinæ ardorem duplo majorem incurrit.

Contingit frequentius, ut aut ipsæ partes urinariæ aut vicinæ malè affectæ dysuriam inferant, sive per essentiam, sive per consensum fiat, ut plurimum vesica aut ejus collum, aut etiam meatus urinarius excoariata, aut exulcerata, ingentem & acerbum concipiunt dolorem, dum urina transit. Hinc etiam non rarò vesicæ calculus eandem attritu suo successivo nonnihil excoarians, aut alio modo circa collum, quo continuo incumbit, lædens, nunc stranguriam, nunc dysuriam pertinacem, inducere solet. Pertinent huc prostratæ, imprimis à contagio Venereo per congressum impurum affectæ. Quin & ita affectæ loco lymphæ blandioris elaborant succum acrem, & virulentiam corrosivam Veneream infectum, qui dum urethram, per quam fluit, excoariat & lædit, hoc ipso dysuriam admodum crudelem inferre solet. Difficillima cura tunc est talis dysuriæ, aut interdum in ulcus penis terminatur, quando & hæc ipsa virulenta cum quibusdam consenescit & moritur, uti observat Johannes Schenckius *lib. 3. observat.* Verum præter affectus per essentiam, etiam per consensum vicinarum partium affectarum dysuria interdum inferitur: Sic enim affecto utero in mulieribus, aut affecto intestino recto in viris, nil frequentius est, quàm supervenire simul dysuriam. Hinc propter inflammationem intestini recti, & tenesmum & dysuriam molestant observavit Amatus Lusitanus *Curat. 6. Cur. 84.* item ex consensu cum hæmorrhoidibus dolentibus urinæ ardorem & stillicidium curatum postmodum per clysmata ex oleo violarum, annotat Schenckius *lib. 3. Obs.*

Obser;



Observandum simul est, subinde in modò dictis affectibus, stranguria & dysuria, excerni materiam crassam, mucilaginosam & pituitosam, quæ ipsa nihil aliud est, quàm nutrimentum vesicæ aut partium illarum urinariorum proximum, quod ex partibus istis læsis & nonnihil excoritatis continuò exstilians, sub forma talis mucilaginis crassæ aut lactæ unâ cum urina excernitur; à qua mucilagine urinæ ardor magis augeri solet, quatenus meatum urinarium nonnihil obstruendo difficultatem affert in mejendo, ut non absque conatu & labore urinæ fiat excretio. Hinc est, quod refert Veslingius in *Obs. anat. à Bartholino editis* p. 146. quod in demortuis ex dysuria vesica mucosâ & lentâ albicante materiâ plena observatur.

### DIAGNOSIS.

Signa hujus dysuriæ diagnostica, per se & ex se facillè patent, cùm relatio ægri eadem insinuet.

Imprimis autem causæ antecedentes considerandæ, & speciatim ad excoriationem vel exulcerationem vesicæ respiciendum, quæ ex excretis cum urina & circumstantiis antecedentibus facillè patet.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Dysuria variam habet per se, pro varietate causarum.

In genere malum est perquàm molestum quidem dysuria, non tamen per se lethale, utut subinde contumax admodum & diuturnum sit, sub qua diuturnitate, ex quacunque sit causa, periculum est, ne exulceretur tandem vesica, aut facta jam ejus exulceratio insigniter exasperetur, aut etiam, si diutius affligat, urinæ incontinentia superveniat.

In senibus, cùm sequatur ordinariò aliquam vesicæ exulcerationem, difficilè & rarissimè curatur, nisi forsan potus vini Malvatici, aut frequentior usus jusculorum gallinaceorum eandem sublevet; sicuti idem vinum Malvaticum, uti etiam pulvis stomachalis Quercetani, optimè convenit, si conjuncta cum ista mucilagine materia crassa & alba, &c.

Quæ est cum excretionem mucilaginis viscidæ, est periculosior eâ, quæ est sine tali mucagine.

Si à mucilagine crassâ, quæ interdum in dysuria effluit, oriatur suppressio urinæ ex obstructione canalidis, per quem fluit, malum est periculosum, aut saltem molestum.

### C U R A.

Quod attinet *Curam*, in hac attendatur ante omnia ad causas, adeòque

1. Acrimonia urinæ lædens temperetur;  
et hinc

2. Partes urinarie quocunque modo læsæ, in specie vesica exulcerata aut excoriata consolidentur;

ac denique

3. Vicinarum partium affectus maturè removeantur.

Conveniunt ergò in dysuria temperantia acrimoniam urinæ, & hinc balsamica, vesicam excoriatam consolidantia; adeoque omnia, quæ in stranguria conveniunt, etiam mutatis mutandis, huc applicari possunt. Pluribus scopis in dysuria satisfacit & amygdalarum dulcium, sæpius usurpatum; item si cum syrupo de althæa lapillis percarum, & pulvere lapillorum cancerorum in forma positionis misceatur. Malva etiam, ejusque conserva florum, aliaque malvacea, specificè commendantur, quatenus egregiè urinæ aut puris acrimoniam obtundunt, sensum vesicæ irritatæ demulcent, & loca læsa quasi mucilagine temperante oblinunt. Hinc conservam florum malvæ per experientiam comprobata mirè laudat Amatus Lusitanus *Cent. 6. Cur. 58*, ubi ardorem urinæ cum caruncularum mictione beneficio conservæ ex floribus malvæ curavit. Conferatur & Hoechstederus *Dec. ad. 6. Cas. 2. Schol. item Syrupus de Malva*. Exemplum videb. in Horstio Juniore. *Epist. & Obs. pag. 50*. Item mucilagine seminum cum decocto althææ paratæ, & cum hoc ipso propinatæ, sunt euporiston Hartmanni in *praxi chimiair*. Potius ex his decoctum fiat, quod vel ita, addendo *lap. cancerorum*, usurpetur; vel addatur  $\Phi$ , & potus erit gratus. Decoctum pariter Forresti suprâ, ubi de calculo renum, laudatum confert. Decoctum herbæ & baccarum alkekengi, cum passulis itidem singulariter est laudatum: Vel decoctum florum nymphæ, petroselini, sonchi lævis cum saccharo & nitro adhibeantur. Similiter decoctum florum & herbæ malvæ cum passulis, jujubis & sebesten, pro usu interno admodum commendatur: Nam, si quid aliud, certè decoctum granorum sebesten cum  $\nabla$  sempervivi omni manè ad  $\mathfrak{z}$ j. assumptum, à Gabelchovero ad dysuriam laudatur. Alii grana sebesten incisa decoquunt, vel in aq. sempervivi majoris, vel hordei; quod decoctum ad  $\mathfrak{z}$ v. omni manè usurpatum insigniter ardorem & dolorem urinæ lenire dicitur, idque imprimis, si tantillum de croco fuerit additum, uti hoc commendat Gabelchoverus *Cent. 1. Cur. 21*. Stoeckerus in praxi laudat decoctum hordei, sebesten & glycyrrhiæ, manè vesperique haustum, unâ cum syrupo papaveris; commune euporiston est pulvis radicis althææ cū saccharo mistus & usurpatus: emulsionem ex amygdalis dulcibus, semine melonū & nucleis persicorū, additis lapillis percarum, sunt egregiæ. Porro

Porrò lac, serum lactis, & omnia lacticia, uti in omni dysuria singulariter conveniunt, ita in specie pro sunt in ea, quæ est à cantharidibus, quarum corrosivi veneni appropriata medela & aëxipharmacum est in lacte: in quo casu lac copiosum assumatur, vel decocti sint in eo flores chamomillæ; nec inconveniens est, si cum lacte ebullierint flores cyani vel calcatrippæ; hauriantur autem lacticia copiosè & calidè: id quod pariter de omnibus potulentis intelligendum, cum certè potus frigidus assumptus aut aër frigidus extrà susceptus insigniter stranguriam & ischuriam soleant exasperare. Ulterius terebinthina & omnia terebinthinata, ut in aliis affectibus urinariis, ita & in dysuria, vitio vesicæ enata, optimè conveniunt, quocunque modo usurpentur; excoriationes enim & exulcerationes inchoatas sistunt, & maturè tollunt. Cautè tamen spiritus seu terebinthinae adhibeatur, quia nimis acria sunt. Potius pulveres convenientes, v. g. olibani, myrrhae, mastichis, succini, boli Armenæ, sanguinis draconis, & præ omnibus terebinthina, sicque redigantur in pilulas, v. g. pilulæ Quercetani contra dysuriam & stranguriam.

℞. *Thuris*  
*myrrh.*  
*mastich.* ana ʒij.  
*Succin.*  
*croc.* ana ʒß.  
*Camph.* ʒj.  
ʒ *diaphr.* ʒj.  
*c. terebinth.* f. pilulæ, dos. ʒj.

Faciunt huc sequentes pilulæ ad ardorem urinæ expertæ Ellenbergeri, Medici olim Hallensis. Compositio est hæc:

℞. *succi liquirit. depur.*  
*succini.*  
*thuris* ā q. v.

Incorporentur cum terebinthina Cypria, f. pilulæ. Dentur mane & vesperi, jejuno ventriculo. Dosis ʒß. ad ʒij.

Facit etiam huc pulvis Joelis ad dysuriam admodum commendatus, compositus ex testis ovorum, semine urticæ & succino; unde etiam trochisci de carabe, item trochisci de terra sigillata, & de alkekengi, usurpentur ad dysuriam, idque in specie, ubi exulceratio aut excoriatio locorum urinariorum subest. Remedia quoque ex myrrha & mastiche sunt optima. Vesica capræ præparata, item vesica apri sylvestris masculi siccata & pulverisata, ad stranguriam & dysuriam præstantissima dicuntur remedia, hisce etiam addatur ʒo destill. carvi, quo Thonerus in *Observ.* aliquot dysurias graves subito curavit, guttulas v. propinando. Pulegium quovis modo assumptum ad dysuriam commendari solet. Pulvis nucleorum persicorum cum

Tom. II.

calicibus, *Stein und alles mit einander/* insigniter conducit in dysuria pertinaci, etiam senili, uti hoc per experientiam refert Gabelhoverus *Cent. 1. Cur. pag. 39.* Loco hujus dactyli sunt ferè salubriores; ex his enim tale quorundam euporiston paratur:

℞. *Dactyl.* qu. v.

Ossa limâ redigantur in pulverem tenuissimum; caro verò scindatur in particulas, & in clibano exsicceatur, pulverifetur in mortario, & misc. cum pulvere ossium, addendo *Sacchar. albiss.* part. æqu.

Hujus pulveris manè & vesperi capiatur tantum, quantum mucrone cultri semel aut bis accipi potest, continuetur aliquandiu, idque in mistura sequenti:

℞. *Syr. de alth. Fern.* ʒiij.  
*cichor. c. rhabar.* ʒj.

▽ *nymph.*  
*lactuc.*  
*chamom.* ā ʒij.  
*cinnam. lactesc.* ʒj. M.

Item ℞. *lap. percar. præp.*  
*Off. sep.*  
*Gr. calcin.*  
*pulv. nuc. mosch.* ā ʒß.  
*extr. opii* ʒj.  
M. f. Pulvis.

Externè serpillum calefactum, & partibus urinariis applicatum, dolorem sedat, & urinam promovet, quod expertum se esse dicit Montagnana *Cons. 187.* cataplasma ex althæa, malva, meliloto, parietaria cum lacte aut oleo scorpionum pubi imponatur; aut saltem ruta & parietaria in oleo scorpionum cocta & apposita præsentissimè juvant, dicit Amatus Lusitanus *Cent. 6. Cur. 92.* Vel

℞. *HB. parietar.* m. ij.  
*cherefol.*  
*fl. chamom.* ana m. j.

Incil. coqu. in lacte ad mollitiem.

Pulpæ per setaceum trajectæ adde  
*butyr. rec.* ʒj.  
*ʒo scorpion.* ʒj.

Misc. pro cataplasmate.

Imponatur calidè regioni pubis, & desuper operculum calefactum.

Porrò clysteres crebrò in usum sunt vocandi, nunc blandè stimulant, nunc lenientes, ex lacte, aut similes anodynæ, qui dolorem & calorem mingendi admodum levant; nam quò contumacior est alvus, cò intensior est dysuria.

Tandem injectiones ex lacte vel simplici, vel decoctionis anodynorum; item ex oleo amygdalarum dulcium conveniunt: loco quarum in exulceratione vesicæ injectiones primò mundificantes, hinc consolidantes instituantur, v. g. injectio mundificans in exulceratione vesicæ.

(Qqqq)

℞. *rad.*

℞. rad. liquirit. ʒij.  
cort. fabar. ʒʒ.  
sem. cicer. rubr. ʒij.  
fol. plantag. M. j.

F. Decoct. in ∇, addendo parum lixivii.  
In Colat. ℥b. j. dissolve.

cereb. lar. l. vulgar. in mell. dissol. ʒvi.

Unguent. Ægyptiac. tantum, quan-  
tum ferre potest.

Idque saltem quantum necessitas urget,  
misc. pro injectione.

D. S.

Reinigende Einspritzung.

Injection consolidativa :

℞. ramul. equiseti.

fol. plantag.

sem. hyper. ā M. j.

rad. cherefol. maj.

rad. bistorta.

tormentilla ā ʒj.

cort. granat. ʒiij.

Coqu. in ℥b. j. ∇ a ferrarior. vel mista.

In Colatura dissolve

trochisc. alb. rhasis sine opio ʒʒ.

bol. Armeni ʒj.

Misc. pro injectione.

Item præter injecta convenit hoc unguen-  
tum expertum ad urinæ difficultatem :

℞. Unguenti Martiat.

Agrippa,

℞. laurin. ā ʒj.

Misceantur optimè :

Hoc blandè calidè ungatur regio pubis, &  
subitò fluat urina, idque absque dolore.

## SECTIO XXI.

DE

### LYMPHÆ IN GLANDULIS SEPA- RATIONE ET MOTU LÆSO.



Itiatur & læditur lymphæ secretio,  
& debita ejus in partes distributio,  
tribus imprimis modis:

1. Dum ipsa vitiosè generatur. Dege-  
nerat nempe à naturali crasi & textu-  
ra, tam in quanto quàm in quali,  
quatenus generatur aut nimis copio-  
sa aut nimis acida, aut nimis falsa,  
aut alio modo vitata.
2. Dum eadem vel naturaliter vel præter-  
naturaliter constituta vitiosè distri-  
buitur, & ex glandulis conglomeratis  
in partes & cavitates infunditur.
3. Dum eadem tam naturaliter quàm præ-  
ternaturaliter constituta impeditur in  
suo motu ex glandulis conglobatis per  
vasa lymphatica.

A prioribus duobus vitiis lymphæ oriun-  
tur catarrhi dicti, seu omnes catarrhales af-  
fectus. Et quidem prius vitium hinc varia  
& distincta producit pathemata, pro glandu-  
larum & partium vicinarum varietate; al-  
terum dat affectus catarrhales propriè sic di-  
ctos. Tertio verò lymphæ vitio, nempe in  
motu impeditæ, oriuntur omnes hydropes  
particulares & tumores serosi particulares.

#### CAPUT I.

De

Lymphæ vitiosa genera-  
tione.

Vitiatur lymphæ generatio tam in quan-  
to, quàm in quali, vel objecti vel subjecti

vitio. Objecti seu materiæ ex qua (quæ ma-  
ximam partem est serum sanguinis) vitio vi-  
tiata generatur lymphæ, quando hoc serum  
parcius vel copiosius, tenuius, vel à conten-  
to chyloso rore crassius dulcius, & vitiosè a-  
crius fuerit; subjecti denique vel glandula-  
rum vitio vitiatur lymphæ generatio, quan-  
do earundem tonus & textura secretoria, &  
alia requisita ad lymphæ genesis necessaria  
non ritè se habent.

Frequentissimum vitium est, quando ob-  
struuntur glandulæ, hincque plus minus in-  
tumescent, ut plurimum à materia lymphæ  
generandæ viscidiorè, vel gelatina chylosa  
magis turgida, quæ undecunque coagulata  
aut inspissata, tam à frigore aliavè causa ex-  
terna, quàm interna, sicque in pituitam abi-  
ens, tumores glandularum majores aut mi-  
nores, molliores aut duriores, benigniores,  
& cum sensu punctorio maligniores, consti-  
tuit. Circa quorum affectuum theoriam &  
praxin consulendus venit Sylvius lib. 1. Prax.  
cap. 49. 50. 51. 52. 53. & 54. Ubi saltem hoc  
simul addidero pro his affectibus curandis,  
illis præsertim, qui ex obstructis glandulis o-  
riginem ducunt, præter Mercurium dulcem  
pro purgatione, optima remedia esse sudori-  
fera ex lignis, præsertim juniperino parata, v.g.

℞. rasur. ligni juniperin. ʒij.

sassafr. ʒʒ.

cort. lign. Guajaci ʒj.

HB. ros. mar. M. iij.

bacc. junip. ʒʒ.

Infund. in l. q. Aqu. & vini ana ℥b. j.

Mace.



Macerata per 24. horis, coqu. in MB. in cucurb. cum suo alemb. juncto ad medias.

Colatum & destillatum misce, & adde

~ Oxi ziiij.

syr. flor. calend. Ziß. ad iij.

M. D. S.

Bertheilender Fluß, Transf.

Hoc ipso præmissa purgatione Mercuriali, nuper scēminam cum mensium suppressione, tumores parotidum & glandularum in collo habentem, cum capitis gravedine, narium obstructione, oris siccitate & difficili anhelitu, & pectoris ac pulmonum quasi repletionem, interdum suffocationem quandam minante, restitui, capiendo omni manē bonum haustum calidē, & expectando hinc in lecto sudorem.

## CAPUT II.

De

*Lymphæ vitiosa distributione.*

### ARTICULUS

De

*Affectibus catarrhalibus.*

**C**atarrhi vocem quod attinet: in sensu Hippocratico quemcunque decubitus seu depositionem alicujus humoris, ut plurimum actioris in quodam loco vel parte innuit, adeo ut ratione hujus sub generali catarrhorum nomine etiam diarrhœa, diabetes & alii similes morbi Hippocrati catarrhiaudiant. Veruntamen in specie, & nunc usitato catarrhi seu defluxionis nomine, innuitur κατ' ἐξοχὴν decubitus seu effusio lymphæ aut ichoris tenuis, sive jam serum hoc sit mite & insipidum, sive acre, asperum, salinum, ad aliquam certam & determinatam partem. Et hoc est propriè catarrhus; nempe præternaturalis à sero plus minus vitiato in quacunque parte facta alteratio seu functionum læsio. Vocatur catarrhus à πῶς, fluo.

Uterius veterum de catarrhis hypothesis quod nempe ex intemperie stomachi frigida & jecoris calida exhalent copiosi vapores sursum, qui in capite, tanquam alembico à loci frigiditate denuò condensati in liquores seu aquas serosas cumulatæ, postmodum exinde per foramina ossis cribriformis, tanquam per rostrum alembici, successivè in partes inferiores, easque interiores, nares, fauces, oculos, aures, gulam, asperam arteriam, pulmones, &c. defluant, & ita catarrhos internos constituent: vel quod per loca intercutanea externa, inter membranas

Tom. II.

nempe cranii extimas derivetur in totam corporis peripheriam, etiam ultimos artus usque, à quibus destillationibus, seu, ut vocant, defluxionibus varia mala, in specie arthritici affectus & similia oriantur, satis nota est; nam stomachum ex intemperie frigida copiosum phlegma generare; jecur verò ex intemperie calida incumbens stomacho istud phlegma in vapores & fumos resolvere, qui copiosè ex ventriculo exhalantes, & evaporantes catarrhos externos constituent, dixerunt.

Sed hanc theoriam veterum sufficienter discussit tam Helmontius in *eleganti Tract. Catarrhorū deliram*, vocato, quam etiam Schneiderus in *Operibus suis de catarrhis*: cujus prolixa volumina hunc nucleum continent, quod asserat & defendat, non à capite seu cerebro depluere serum pro catarrhis, sed istud ex arteriarum vasculis, à massa sanguinea facultate expultrice apertis, seponi, & per membranas transsudando excerni; unde pro varietate membranarum, per quas fiat ista transsudatio, & pro varietate seri, ex sanguine per arterias ita exclusi, & hinc inde sepositi, varii, etiam oriantur catarrhi. In qua doctrina glaciem prius fregerunt Schneidero tam Helmontius, quàm etiam Carolus Piso in erudito scripto *de Colluvie serosa*.

Sed, ut propius ad rem accedamus, equidem in hoc non culpandi sunt veteres, quod serum statuerint materiam catarrhorum, ut ut lymphæ vitiosæ moderni hoc adscribant: nam serum veterum collectum, quod Helmontio dicitur latex aquosus seu humor neglectus, propriè loquendo modernorum est lymphæ, & reverà in radice conveniunt, ut ut in explicanda causa & fiendi modo catarrhorum errarint, glandularum vasorumque lymphaticorum natura & usu nondum cognitis: vid. Sylvius *lib. 1. in Praxi de læsa transcolatione lymphæ*. Serum autem catarrhorum est materia, nunc mediatè ex arteriis cum sanguine excretum, & motu suo plus minus impeditum, & in spatiola partium mollium effusum; nunc verò, idque primariò, mediatè, mediante nempe sui in lympham mutatione, & hinc ex glandulis conglomeratis in certa loca effusione; materia ergò propriè dictorum catarrhorum est lymphæ glandularum conglomeratarum, tam naturaliter, quàm præternaturaliter constituta, copiosè, in partes effusa. Fontes verò, unde scaturiat hæc, dictum, quod glandulæ circa lympham elaborandam & distribuendam sint occupatæ. Scaturigo prima catarrhorum denique est massa sanguinea. Cùm ergò frequentissima glandularum conglobatarum & conglomeratarum textura circa cerebrum cohzreat (nam totus ejus cortex minutissimarum glandularum est textura, demonstrante hoc Malpighio in scrutinio viscerum) cum

(Qqqq 2)

itidem

itidem in cerebri medulla copiosæ glandulæ sint compositæ, vel etiam in locis cerebro, vicinis, oculis, faucibus, larynge, auribus &c. copiosæ & insigniores sint glandulæ, ac denique collo & asperæ arteriæ copiosæ adhæreant glandulæ, & hinc caput & partes respirationi inservientes præ reliquis externi aëris injuriis & læsionibus sint expositæ, ob id non mirum erit, si propriè dicti catarrhales affectus frequentius capiti, ipsiusque partibus vicinis, hinc faucibus ac asperæ arteriæ, ac consequenter pulmonibus & pectori, sint molesti, i. e. ratione causæ efficientis externæ & materialis proximè ad catarrhos hæ partes sint dispositæ, idque eò magis, quò magis externis injuriis, in specie aëris, modò dictæ partes sunt expositæ.

Quod verò attinet membranas Schneideri, in specie binas pituitarias, anteriorem & posteriorem, ab eolib. 3. de catarrhis accuratè delineatas, per quas materia catarrhorum ab eodem transsudare dicitur (utut in ultimo tomo de catarrhis addat his ipsis etiam glandulas, tanquam opercula vasorum) observandum est, quod rectius alii his glandulis, ceu cribris aut transcolatoriis, originem catarrhorum adscribant; imprimis cum hæ ipsæ membranæ Schneideri à parte posteriore texturam copiosarum glandularum habeant adhærentem, ex quibus glandulis, ceu fontibus, per vasa minuta excretoria, membranas istas perforantia, omnes catarrhi excernuntur, sicuti naturaliter per hæc vasa lymphæ, fauces & nares aliasque partes obliens, hoc modo excernitur: vid. Steno in *Observ. de glandulis & musculis*.

Per has igitur glandulas conglomeratas lymphæ aut nimis abundanter per loca exclusæ, aut vitiosè simul præparata, & ita excreta catarrhos constituit, i. e. defluit lymphæ aut copiosa, aut vitiata ex glandulis, imprimis conglomeratis circa caput, fauces, collum, laryngem, asperam arteriam, aliàsque similes vicinas partes, & proximè constituit catarrhos. Unde huic lymphæ depositioni non tantummodò functionum istarum partium læsiones, sed pro vario lymphæ vitio varia etiam simul symptomata superveniunt. Et sanè hoc sensu nil obstat, quin gonorrhœæ virorum, fluor albus mulierum, salivationes quælibet, quin & interdum diarrhœæ ad catarrhos referri queant.

#### C A U S Æ.

Equidem lymphæ, ceu humor sui generis, spontaneo impetu non, nisi fluidi gravis ratione, deorsum movebitur, adeoque purè passivè se se habebit ad hoc, ut copiosior, aut plus minus vitiata, per glandulas conglom-

meratas moveatur, & ita spirituum influxum moventem, secundum organorum seu instrumentorum dispositionem catarrhalis influxio imitabitur. Ut igitur per glandulas quasvis conglomeratas catarrhalis lymphæ fiat excretio, causa proxima, propter quam lymphæ vel naturaliter vel præternaturaliter constituta effunditur, & ita vitiosè distribuitur, semper est irritatio & læsio quædam in parte quadam plus minus sensili, in qua vel cujus vicinia sunt glandulæ copiosæ. Hujus enim irritationis seu læsionis occasione lymphæ ob fibrarum stricturam ex glandulis vicinis uberius exprimitur, & ita semper restaurata continuus quasi rivus eò derivatur; quæ ipsa, quo plus vel minus à statu naturali recesserit, eò magis vel minus gravem affectum catarrhalem constituit, v. g. sicut spina digito infixa causa est sanguinis effusionis & inflammationis in loco, ubi plura sunt vasa sanguifera, ita similis spina, v. g. acidum inspiratum, aut inspiratus fumus sulphuris ibidem lymphæ uberiores effusionem, indeque raucedinem aut tussim subinde chronicam, & materiæ mucosæ copiosam ejectionem faciet; aut si cuidam pulvis incidit in oculum, mox ex irritatione dolorosa effunduntur copiosæ lachrymæ, qualis lachrymatio est quasi catarrhus à causa externa ortus. Quod si verò ab interna oritur talis copiosa lachrymatio, tunc rectè dicitur catarrhus. Læsio ista, prout nunc magis superficialis, adeoque irritatio quædam saltim partis fuerit, vel prout nunc gravior, quæque non sensum saltem partis afficiat, sed etiam texturam ejus & spiritum insitum simul alterare valeat, etiam catarrhum, nunc graviores nunc leviores, infert. In quo posteriore, loco laudabilis alimenti, vitio spiritus insiti ex propriæ digestionis & coctionis læsione vitiosum continuò excrevit excrementum, quod similiter novum alimentum corrumpendo, partem magis magisque lædet, unde catarrhus habitualis seu perennis catarrhi scaturigo; ut in phthisi manifestum est.

Causa ergò proxima est irritatio quædam molesta, ubi sunt glandulæ; sive irritatio ista fiat à fermento exotico, sive ab alia causa, perinde est: v. g. si fermentum aliquod exotikum in parte relictum eandem affligit; nam mox in glandulis vicinis copiosæ lymphæ effusio, & consequenter catarrhus, producitur.

Causa remota, & quidem materialis irritans, & nunc saltim sensum nunc spiritum insitum magis afficiens, utut sit varia, tam externa quam interna, speciatim tamen est acidum acre, vel falso-acidum acre, quod occasionem dictæ catarrhali defluxioni subministrat atque infert. Non est excludenda



da hîc causa efficiens formalis, quæ est spiritus impetum faciens, & occasione istius irritationis catarrhalem lymphæ excretionem efficiens.

Causæ externæ, quæ irritant partes & loca glandulosa, occasionemque subministrant catarrhis, sunt speciatim aëris injuriæ, ratione cujus evenit subinde, ut epidemici fiant catarrhi, sique nunc cum nunc absque malignitate; sicut ex eadem ratione febres malignæ catarrhales epidemicæ, die *Fluß-Fieber* observatæ frequentius fuerunt, hyberno tempore communissimæ. Epidemici hi catarrhi ab aëre inspirato originem ducunt duplici modo; quatenus externa inspirata partim lympham ac serum inquinant & præternaturali ejus alterationi occasionem præbent; partim quoque, quatenus irritant loca, per quæ transeunt, nares, fauces, &c. Sæpius tamen sine vitio aëris epidemico etiam ex alia ratione aër vitiosus catarrhis occasionem præbet. Quò si pertinent, quando cum aëre fumi acres metallici & Mercuriales inspirantur in laboratoris chymicorum & aurifabrorum; quorum acidum gas & particulæ acres acidæ membranas narium, faucium, laryngis, & sub his reconditas glandulas copiosas, continuâ irritatione ad fibrarum contracturam & copiosam lymphæ excretionem stimulant; quin & ipsam lympham non rarò vitiant, ut acrimoniam acidam, spissiore, aut alio modo vitiatam qualitatem, acquirat: Sic frigus pariter externum aëre mediante vehementius aut diutius haustum similiter has partes lædit, easque ad catarrhales defluxiones disponit: Similiter, quando nos ex inclementia aëris autumnalis & hyberni raucedo, tussis & coryza affligit, qua ab aëre extrinsecus inspirato dicta loca irritantur, unde sternutationes, tussis &c. non secus atque in sternutatione acrimonia inspiratorum irritantur narium membrana & vasa lymphatica excretoria, ut exinde lymphæ copiosa, subindè mucus crasso imprægnata, profluat: Imò si nares vel vicina loca ab alia præternaturali causa irritentur, idem omnino evenire solet; si enim aer inspiratus, si pulveres sternutatorii, vellicent nares, idem est: v. g. si solutionis vitrioli, in specie Veneris, aliquot guttæ inspirentur naribus, sic lymphæ copiosa destillabit, & habetur coryza artificialis, hemicrania istius lateris, &c. Jam læsio hæc & irritatio interdum eò usque procedit, ut etiam alimentum, seu nutrimentum partis læsæ proximum exinde vitiosè alteratum appositioni fiat ineptum, adeò ut sub forma muci crassi, spissi, varii coloris & consistentiæ, unâ cum lymphæ non rarò excernatur. Porro non rarò frigus externum etiam post corporis insignem æstum aut nimium motum nudo capite exceptum aut pleno ore hau-

stum, promptissimè ad catarrhos disponit: Tunc enim ex improvviso sistitur insensibilis transpiratio, quia subito clausis poris transpiratio coercetur, & id, quod insensibiliter alias exhalare deberet, in lympham quodammodo spissatur. Undè cum salibus acris sit præditum omne id, quod transpirare debet (uti patet ex sudore) talis lymphæ asperior seu acrior & salior redditur, quæ copiosius per glandulas, capitis imprimis, emulsa, aut hinc inde deposita, catarrhos hinc suggerit.

Causæ efficientes internæ, quæ loca glandulosa irritando, & partem quandam lædendo, & ita ad catarrhos disponunt, sunt duæ:

1. Est in ipsa parte.
2. Est in ipso sero seu lymphæ effusa.

Quoad priorem; in ipsa parte quadam causa catarrhorum hæret, quando aliquid præternaturale, ut plurimum acre, ex digestionem privata læsa in parte quadam enatum, & successivè congestum, pertinacius in eadem hæserit, & quasi fermentum, in specie acidum salsum, sensum molestum parti intulerit, unde occasione talis irritationis sub digestionem particulari copiosior ex loco vicino lymphæ eò effunditur, & ita consequenter catarrhus excitatur. Hujus exemplum sit character phthiseos hæreditarius, successivè phthisin catarrhalem inferens; vel acidum istud fermentum circa dentium vitiorum radices hærens, dolori, tumori, ac similibus pathematibus catarrhalibus occasionem præbens. Quod si verò lymphæ, naturaliter aliàs humectans laryngem, citra occasionem talem datam in se acrior, salior & acidior fuerit, hoc ipso laryngem vellicando successivè tussim, raucedinem, sputum copiosum, & tandem phthisin catarrhalem sic dictam inferet. Par ratio est cum oculo: festuca oculo illapsa dolorem, calorem, tumorem, copiosæ lymphæ continuam effusionem infert. Quæ mala à causa externa nata quasi catarrhum oculi repræsentant. Quæ pathemata si ab interna oriuntur causa, seu sponte superveniant, dicuntur catarrhi, si sc. talis quasi quædam festuca à variolis oculis infixæ manserit, cujus occasione crebrior recidiva catarrhi excitabitur: v. g. si in scorbuticis acrior lymphæ oculum, utpote teneriorem, forsàn læserit, dicta superveniunt symptomata.

Uc pressius examinemus has causas, catarrhus, qui ex ipsius partis ejusque privatæ digestionis læsione oritur, supervenire solet, quando pars quædam vel à violentia externa, vel à quacunque causa interna læditur, ut ita spiritus infusus seu archæus debilitetur; ex tali enim occasione, digestionem particulari deficiente, catarrhi crebrius recidivantes superveniunt: vid. hic præter Helmontium *Tractatu Catarrh.*



*Catarrh. Deliramenta*, imprimis Petrus Johannes Faber in *sua Patholog.* Inter causas alias *ad lymphæ vitia* disponentes imprimis consideranda vitiata stomachi digestio, dum nempe ventriculus impotens non sufficiens est digerendis & coquendis ingestis; propterea senes imprimis obnoxii sunt catarrhis propter digestionem primam successivè deficientem, sive quod ejus fermentum sit nimis iners & debilitatum, sive quod ipsa assumpta, imprimis potulenta copiosè nimis assumpta, ejus vim infringant; unde locum invenit hîc vulgatum illud: *Glüsse geben Glüsse*. Idque tunc imprimis, quando accedit pauca urinæ excretio, aut imminuitur sensibilis transpiratio, vel sensibilis sudatio: hinc etiam propter frigus aeris ambientis, & imminuta sensibili transpiratione frequentiores in hyeme sunt catarrhi, quam aliis anni temporibus. Ventriculus ergò in isto casu colliquat potius: quàm reverà concoquit assumpta, chylum facit aquosum nimis & vitiosè acidum, aut etiam vitiosè salsum; unde sanguis aut ipse aquosior & acrior generatur, inde & necessariò etiam tandem lymphæ in quibusvis glandulis elaborata simul vitiatur. Unde & tabem ex acrimonia sanguinis ordinariò aut præcedunt aut concomitantur raucedines, tussies, coryzæ, similesque ex acrimonia lymphæ orti affectus; unde veteres erroneè tabes istas à destillationibus à capite oriri voluerunt ob salsum fundamentum. Sed quoad alia subiecta, in specie scorbutici, obnoxii sunt acris & corrosivis catarrhis vitio stomachi, & inde iniquatione totius massæ sanguineæ & feri ortis, unde etiam lymphæ salivales scorbuticorum adeò salsa, acris & acida est, ut gingivarum fibras erodere, eas flaccidas reddere, & hinc omninò exedere soleat. Unde & aliarum glandularum, tam conglomeratarum quàm conglobatarum, lymphæ similiter malè affecta necessariò non rarò catarrhos ac febres dabit catarrhales, plus minus lentas, & plus minus intensas; quæ originem ducunt à lymphæ vitio, quæ sanguini infusa naturalem fermentationem turbat, & ad præternaturalem effervescentiam disponit.

Jam quoad differentias catarrhorum, catarrhus omnis ratione modi affligendi potest distingui in accidentalem & habitualem: ille est, qui ex improvise, & quasi fortuitò casu, vel ex incidentia, parti supervenit, & ejus spiritum insitum afficit, adeoque facile debilis existit, & ferè occasione externa propullulat, v.g. raucedo & tussis ex nimis diuturna concione; lymphæ enim, quæ naturaliter fauces irrorat, si fit acrior, acida & similis, & acrimonia sua fauces dolorosè irritat, tunc majoris lymphæ sequitur effluxus & major catarrhus. Hinc ex tali causa supervenit

phthisis catarrhalis, quatenus scilicet talis lymphæ fauces ad tussim, & ex hac phlogoses, &c. disponit, habitualis est, qui sæpius in eodem loco gravius recrudescit seu recidivat, & successivè spiritum insitum graviter labefactat, ac vel levi occasione data repetit, & nunc ex vitio hæreditario, nunc contentorum notabili dyscrasia supervenit, & ita firmiter in parte radicatam causam aut occasionem innuit. Causa crebrioris catarrhi recidivantis, seu habitualis est partim loci semel affecti læsus tonus, ex insiti deficientia, unde fibræ ex læso tono laxantur, adeoque facilis lymphæ copiosioris quocunque modo restitutæ receptio; quibus accedit & glandularum læsus tonus, qui exinde spongiosiores & tumidiore factæ facilius lympham præternaturali modo effundi faciunt; partim verò est remanens fermentum præternaturale in glandulis & locis plus minus vicinis ex digestionem privata læsa enatum, quod plus minus commotum & exasperatum, irritando istas partes sensiles, catarrhum in eodem loco sæpius provocat, & recrudescere facit. Non secus enim ac simile tale fermentum in loco quodam exulcerato relictum crebrius ulcus recidivare facit; ita simili ratione fermentum præternaturale acido-acre in quadam parte relictum, ob id topicum dictum, crebrius ulcus recidivare facit; unde & vulgus per experientiam edocuius dicit: *Wo einm die Glüsse einmahl hinziehen / da kommen sie gerne wieder*; idque, ut dixi, propter partis robur læsum aut inæquale, ut Helmontius scitè explicat, idque aut propter atoniam ejus, aut propter spiritus insiti aliqualem defectum, indeque digestionem læsam.

Porro etiam catarrhus, qui cum sensibili materię cujusdam excretionem est conjunctus, sub duplici substantia lymphæ extra corpus solet fieri excretio; nunc tenuis aquosa, plus minus acris; nunc crassiuscula viscida: Sub priori schemate incedens dicitur catarrhus tenuis, falsus, acris; sub posteriori catarrhus coctus & crassus. Hinc tempora paroxysmi catarrhalis probè distinguenda sunt, nempe in principio omnis catarrhus, quæ talis, solet esse plus minus tenuis, seu crudus, falsus, acris, successivè tandem evadit crassus coctusque. Lymphæ nempe, quamdiu sincera fluxerit, eadem tenuem seu crudum pro lymphæ ratione constituit catarrhum. Dum verò diuturniore aut copiosiore lymphæ irritatione laxatur pars, & successivè exasperatur, adeoque superficietenus excoriatur, tunc nutrimentum partis læsæ proprium se associat, quæ lympham antea tenuem, spissiore, antea acrem, temperatam, dulcem & quasi insipidam reddit, id quod fit in incremento & statu paroxysmi atque hoc materiam

teriam coctam & incrassatam appellare solent, cujus excretionem, & partis læsæ spontanea restitutione declinatio paroxysmi absolvitur.

Tandem ratione qualitatis ipsius lymphæ effusæ & catarrhum inferentis hæc observatur; quod nunc sit mitior, seu insipida, dulcis, &c. idque rarius; interdum, idque frequentius, acris, in specie acida, nunc acido-salsa plus minus corrosiva, à qua acrimonia partes membranosæ catarrho affectæ lædi & non nihil excoriari solent; unde mox dolent, insigniter rubent, & aliquid inflammationis plus minus tamen, patiuntur, ut v. g. in epiphora, oculorumque catarrhis subinde est manifestum; Imò partes affectæ perfectè exulcerantur, ut v. g. in coryza diuturna, aut in tussi diuturna observari solet; unde aut narium ozænz aut oris exulcerationes catarrhis aut diuturnioribus, aut frequentioribus succedunt.

Ab his ergò symptomatibus seu productis catarrhi morboris, nempe à dolore, rubore, inflammatione &c. differentia inter catarrhum vulgò appellatum calidum vel frigidum petenda est. Nam in catarrhis à lymphâ insipida seu dulci, sæpius insimul præternaturaliter crassa, uberius effusa, aut cui mox copiosus mucus adjungitur, catarrhus frigidus appellari solet; à lymphâ verò acriori & corrosiva catarrhus si excitatus fuerit, propter excitatam partium affectarum phlogosin catarrhus calidus dicitur.

Hæc ipsa, tantum non omnia, mutatis paucis mutandis, applicari etiam possunt ad catarrhum minus propriè dictum, ex seri cum sanguine infusione per arterias, nunc immediatè, nunc mediatè, in lympham mutati, sed ob fibrarum aliqualem, ob irritationem undecunque factam, stricturam aliqualem remorâ & in parte plus minus coacervatione enatam, hincque partis variam, tam ex læsione plus minus sensili, quàm seri plus minus insipidi aut acris, parioris vel copiosioris effusi alterationem & functionem læsam. Sic enim ex refrigeratione partis cujusdam nocturna post aliqualem sudationem manè in variis partibus musculosis, in scapulis, brachiis, circa femora & similia, &c. dolor plus minus sensibilis, catarrho adscriptus percipitur. Nempe subito clausis poris, id quod insensibiliter aliàs exhalare deberet, in lympham acrem spissatur; unde interstitiis musculorum distentis talia pathemata ex partis irritatione varia superveniunt. Sic ex seri scorbutici in loco quodam, speciatim in pedibus, facta irritatione, & hinc dolorosa alteratione, dolores lancinantes, & lacerantes, præsertim nocturni, qui catarrhis tribuuntur, oriuntur: Sic pariter ex dentium irritatione & dolore

& hinc fibrarum strictura natus tumor maxillæ serosus itidem catarrho tribuitur. Ex sero paulò acriori pleuram fortuito irritante natus dolor in pleuresi notha, catarrhis quoque tribuitur.

Causas hi catarrhi nothi agnoscunt eadem, quas illi suprâ dicti catarrhi: Nam quoad materialem, serum vel immediatè ex arteriis cum sanguine elapsum, vel mediatè in lympham prius commutatum, hanc constituit: Quoad causam efficientem occasionalem, insequuntur læsionem irritatam; vel ex occasione externa, præsertim refrigeratione partis, v. g. post sudorem; vel ex ipsius seri pro materia lymphæ distributæ acrioris, in specie acido-salsi, partes nervosas aut membranosas vellicantis; vel habituali in malo ex vitioso fermento ob læsam digestionem privatam, ~ insiti vitio collabescit, nato, quod data occasione quavis excitatum, ex irritatione tanquam spina infixâ catarrhales affectus infert. Per catarrhales tales defluxiones ipsæ glandulæ, per quas fit lymphæ vitiatæ transitus, non leviter læduntur, quia earum tonus interdum insigniter laxatur, ipsæque exinde promptiores fiunt, ut sæpius & copiosius lympham vitiatam transmittant. Unde ex robore glandularum læsarum ad alias glandulas inæquali facilius & sæpius ex interna causa nata catarrhi unam eandemque partem postmodum afficiunt, adeò ut sæpius recurrere, & unam eandemque partem afficere deprehendantur.

Tandem pro varietate partium affectarum, in quibus fit lymphæ effusio & inepta distributio, etiam catarrhis variis specialibus nominibus insigniri solet: Nam qui per nares erumpit, ipsisque vicinas partes infestat, dicitur coryza; qui infestat oculos, lippitudo aut epiphora; qui infestat laryngem, ipsique annexam asperam arteriam, eamque nimis humectat, bronchus seu rauco. Tussis catarrhalis, ut plurimum tempore vespertino affligens; qui verò alias partes, generali catarrhi seu rheumatismi, à *gla fluo*, vel defluxionis nomine venire solet; si artus infestat lymphâ vitiatâ, communiter dicitur *ein kalter Fluß*/ catarrhus externus, &c. quo ipso citra sensibilem partis mutationem dolor acerbus eandem excruciat, aut etiam sensus ac motus partis hebescit, aut omninò tollitur, aut etiam sensus quidam formicationis percipitur. Quæ symptomata ex tali lymphâ acri nimis, sæpiissimè nimis acido, originem ducunt.

Denique interdum conjuncta esse solet cum catarrhis febris plus minus acuta, catarrhalis ob id dicta, non tantum in catarrhis epidemicè affligentibus, sed etiâ in catarrhis cæteris, inter



inter unam alteramve personam observabilis; & eadem febris nunc lenta plus minus, nunc magis vel minus intensa esse solet, pro ut magis vel minus vitium lymphæ, præsertim glandularum conglobatarum, sanguini in vena axillari sinistra intus, junctum fuerit; unde etiam ipsa febrilis effervescencia aut major aut minor excitatur, & vespertino tempore, aut nocturno præsertim, hæ ipsæ febricitantes exasperantur & incrementum capiunt, & præcedentibus levissimis horribus & dorsi refrigerationibus momentaneis, subinde molestæ esse solent. In senibus propter spiritum insitum nimis deficientem difficillimè curantur.

Sed si omnia hæc rectè consideremus, manifestum evadit, omnem catarrhi hætenus traditam doctrinam non tam morbum ipsum, quam productum morbosum respicere, adeoque à posteriori saltem rem declarare: siquidem tam lymphæ ista ex glandulis conglomeratis effusio, quam seri plus minus vitiosi à sanguine refluente separati, aliqualis in parte retentio, non nisi effectus sunt ex consequentia læsionis ejusdem morbosæ in parte ista catarrho oblecta, ita ut & in theoria seu fiendi modo primariò ad læsionem istam & irritationem, ejusque causam, quam sequitur catarrhalis influxio, & in Praxi ad irritationis illius mitigationem & læsionis correctionem, harumque causarum remotionem, respiciendum sit potius, quam ad catarrhi istius exsiccationem & discussionem. Istis enim deficientibus nunquam ruent catarrhi; sicut iisdem sublati spontè hi ipsi languescent & evanescent.

### DIAGNOSIS.

Symptomata, quæ insequuntur catarrhos, & instar signorum diagnosticorum inservire possunt, variant pro particulari catarrhorum varietate.

In genere tamen frequentius catarrhos præcedunt gravitas capitis, sensuum & actionum animalium torpor, artuum lassitudo, supervenit successivè refrigeratio quædam in superficie corporis, in specie & horripilatio dorsi levis, vaga tamen (*Es ist ihnen/als wann kalt Wasser über ihren Leib gegossen wäre/und den Rücken hinunter ließe*) quin etiam observatum fuit in talibus, quod imminente catarrho urina spumosa, circulum faciens, soleat emitti, quæ pro signo imminenti catarrhi habetur ab Hætero in *Herc. Med.* pag. 30.

Accedit à graviore catarrho febricula lenta plus minus subinde, eaque imprimis vespertino ac nocturno tempore, quo exacerbatur, & ad diluculum perdurat, cum quo noctu affligente corpus insigniter incalescit,

interdum autem febre silente nunc coryza & lippitudo, tussis, rauco, sputum copiosum, nunc dolores artuum lancinantes, aliaque symptomata pro speciali catarrhorum varietate varia, simul cum febricula incrementum capiunt.

Antecedentes causæ & ipsæ catarrhi præsentiam faciliè persuadent, frigus nempe exterius susceptum, refrigeratio corporis post exercitia, tempus autumnale aut hyemale, & similes causæ antecedentes appropinquantem catarrhum Medico curioso persuadent.

Tandem ipse catarrhus faciliè sensibus obvius est, idque imprimis, dum supervenientibus variis excretis per nares, os, fauces, & similia loca secretis se prodit; vel quando horum defectu dolor in quodam loco plus minus acerbus, ut plurimum interdum intermitens, vesperi & noctu magis affligens, ægrum cruciat: quibus specialia, pro catarrhorum speciali differentia, signa accedunt.

Ante omnia autem consideretur: an nempe catarrhus adsit ex lymphæ tenui & acris? an verò insipida & crassa? qui per excreta se ipsum prodit. Si enim peccaverit lymphæ tenuis acris acido-salsa, tempore vespertino & nocturno, dum pori corporis magis conivent, magis affligit cum gravibus symptomatibus; itemque parum vel nihil in catarrho tenui solet excerni per emunctoria. Catarrhus verò ex lymphæ crassa aut viscidior, aut cui nutrimentum proximum in mucum degenerans simul permixtum est, æqualiter fere omni tempore affligere, & varia pro varietate transitus lymphæ ejici solet.

Intensiora porro omnia sunt symptomata in calido catarrho, contrà remissiora in eodem frigido dicto, rubor, ardor, tumor, dolor rodens plus minus, imprimis lancinans cum majori vel minori corporis phlogosi; quin & excoriatio, aut tandem etiam superveniens ulceratio catarrhum tenuem & corrosivum, seu ex lymphæ acido-salsa oriundum innuunt; si verò talia symptomata deficient, lymphæ est mitis, & simul excernuntur mucosa, viscida & crassa.

In specie, quæ dicta sunt, magis catarrhum ex lymphæ vitio oriundum respiciunt; si verò catarrhus est ex proprio partis vitio, ejusque vitiata plus minus digestionem privata, hanc insinuat imprimis crebrior ejusdem in eodem loco eodem modo recidiva, levi etiam ex causa excitabilis. Item tales tempestatum mutationes persentire, & aliquam molestiâ, quam in loco catarrhis obnoxio persentiscunt, manifestari solent: id quod fit ob partis debilitatæ propter spiritus insitum aliqualem defectum, qualis pars debilis longè promptius alteratur ab impressionibus externis, quam pars alia robusta iisdem magis resistens.

Cogno-



Cognoscendum est ulterius: an ex interna sit causa catarrhus? an verò ab externa partis læsione originem malum duxerit? externa læsio facillè patet, & ab ipso ægro observari potest; sive enim versetur in aëre frigido, sive hauriat copiosa frigida, sive fumos metallicos in laboratoris, sive ex alia sit causa? hæc enim non latent ægrum, nec postmodum Medicum.

Internè verò ventriculi cruditas præcedens, & hanc insequens sanguinis & lymphæ vitium ferè ex eo cognoscitur, quod catarrhi sæpius recurrant: idque aut in eodem loco, ubi pars læsa ob viciatum tonum seu robur inæquale facilius recipit, & receptam promptius transmittit lympham viciatam; aut certè si non in eodem semper recurrunt loco, saltem ex uno remoti catarrhi promptè in vicino, aut loco priori connexo, denuò se manifestant, & ita subinde repetitum accedunt.

Tandem quod digestio stomachi viciata catarrhos ex lymphæ & sanguinis vitio natos foveat, patet non tantum ex urinis, quæ subinde pallidæ ac tenues conspici solent, sed etiam, quod ægri tales frequenter sint sputatores: id quod etiam observat Hæferus in *Herc. Med. pag. 30.* quod non rarò multum & facillè sudare soleant, simulque de vitiis stomachi subinde sint queruli, & quæ sunt similia signa antecedentia, vid. Helmontius *Tract. Catarrh. Delir. & Tract. Tussis & Asthma.*

#### P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin; catarrhus à causa & læsione externa proveniens adhuc recens minus periculosus est, quàm qui internum habet fomitem, aut in quo propter læsionem à causa externa pars affecta ita est debilitata, ut particulari ejus vitio crebrò catarrhus recidivare soleat, ac imprimis contumacissimi facillimè recidivantes & pessimi ferè isti esse solent, qui à scorbuto.

Deinde catarrhus sæpius in eodem loco recidivans haud contemnendum malum est, & crebriori recidiva spiritus insitus debilitatus, hinc propter atoniam partis & robur inæquale facillè malum habituale contrahere queat; hinc enim facillè illa pars ad alios morbos dilabi poterit.

In specie si laryngem aut asperam affligat arteriam, ex eodem varii pectoris morbi, subinde etiam in pulmonibus phthises ex lymphæ acri in catarrholis in pulmones derivata, oriri solent.

Si crebro tussis affligit à causa interna ægrorum, metus est, ne mala pulmonica, v. g. vomica, vel excoriatio pulmonum, ac tandem phthises pulmonales superveniant.

Uterius quò magis ingravescent catarrhi, accedente ætatis incremento, eò periculosiores solent affligere.

Tom. II.

Catarrhi seu destillationes & raucedine peculiares magis sunt senibus, unde ab Hippocrate *Secl. 3. Aphor. 12.* item *Secl. 2. Aphor. 40.* & Fontanus *lib. 2. cap. 2. Meth. cognoscend. morbos pag. 43.* inter morbos senum recensentur, in iisque graviore ac difficulter curabiles sunt, undecunque orti fuerint; partim quod digestionem quæcunque, imprimi prima digestio in stomacho, non ritè perficiantur; partim verò etiam eorum glandulæ laxiores admodum dispositæ sint ad catarrhorum copiosas recidivas; partim propter partium solidarum deficiens robur ex languore spiritus insiti, partim propter serum & lympham in talibus acriorem & ferè acidiorum, ratione cuius acrimoniæ regionum quarundam incolis catarrhi præ aliis graviore observantur, tussisque v. g. catarrhales frequentius in erosionem pulmonum & phthisi degenerant, ut de Belgis Sylvius *Pr. l. 1. cap. 49. §. 3. & 4.* annotavit.

Catarrhi ex lymphæ motu nonnihil impedito vel alia ratione cerebrum inundant periculosi sunt, & uti senibus sunt familiares: ita varia & funesta iis inferunt symptomata nempe lethargica, aut paralytica, aut alie systematis nervosi morbos. Nam glandula minutas cerebri, in specie plexum choroidæum, circa lympham esse occupatas, & structura earum, & locus seu situs sufficenter demonstrat; quin & reliquæ cerebri glandulæ pinealis, pituitaria, &c. simile omnino officium obire videntur. Ab his ergò lymphæ non ritè secreta, tam in quanto quàm in quali, & non ritè distributa, sed in cerebrum deposita, istud inundat, & ita periculosa capitis symptomata infert.

Porro minus periculosus est catarrhus, qui fluit per nares, vel patulum os; magis suspectus verò, qui asperam arteriam aut laryngem infestat.

In catarrhis cum sensibili materiæ excretionem conjunctis, quo citius in iis materia coacta rejicitur, eò tutiores sunt; quo tardius eò periculosiores, quia metus subest, ne subsistens acrimoniâ suâ partes corrodat, aut etiam exulceret, hinc prava inferat symptomata.

#### C U R A.

His ita præmissis pergo ad curam catarrhorum, in qua semper tria capita primariè sunt consideranda, nempe

1. Causa efficiens remota.
2. Ipsa materia catarrhalis, seu lymphæ effusæ conditio; &
3. Locus catarrhalis seu pars affecta, & major vel minor ipsi inducta læsio.

Quoad 1. ratione causæ efficientis plù minus irritantis considerandum: an sic catarrhu

(R r r)

tarrhu

catarrhus à causa externa, an à causa interna? & hæc, an sit lymphæ, an verò topicum partis affectæ vitium.

Quoad II. materiam sc. catarrhalem, observandum; an ea plus vel minus acris aut mitis, insipida, tenuior aut crassior extiterit?

III. Ratione partis affectæ consideretur præservatio, ne recidivent catarrhi, in specie roborandæ eadem, & à recidiva præservandæ.

Catarrhus, qui à causa externa, & læsione, in specie aëris; curatur, si percipitur in suo principio, sensum irritationis tollendo, & ita lymphæ affluxum præcavendo. Ob id in principio commodè opiata, cum salibus volatilibus oleosis, imprimis succinatis, mista usurpentur, expectando, si fieri potest, sudorem. Instituantur etiam suffitus capitis & oris, aut verticis inunctiones cum oleis destillatis aromaticis. Nam opium sensum tollit, & hinc humorum motum sufflaminat, salia volatilia vitia lymphæ corrigunt, & per diaphoresin poros aperiunt, & vitium partis topicum quasi abluunt; si verò jam incrementum sumpsit affectus, opiata minus tuta sunt, nisi universalia præmissa fuerint. Usurpentur ergo salia volatilia oleosa, & ubi Indicatio aut præsentia materiæ peccantis adest, evacuetur, speciatim in tussi & stertore per os: quò factò, tutò opiata vel sola, vel appropriatis mista, denuò usurpari possunt. Si verò catarrhus oriatur ex vitio lymphæ peccantis, ipsiusque vitiosæ constitutionis, hæc ipsa vitiosa, acris, falsa & acida, partes nerveas vellicans & rodens, aromaticis & volatilibus, in specie salibus volatilibus oleosis temperatis corrigenda, & nunc per urinam, nunc, idque optimè, per sudores eliminanda. Eadem verò lymphæ crassa vel nutrimento partis in mucilaginem degenerato imprægnata, attenuanda, incidenda & resolvenda; ubi tamen observetur, modò pars affecta sit restituta, sponte hæc rejicitur. Fontes verò ejus, imprimis digestionis primæ vitia, & hæc sequens totius massæ sanguineæ corruptela, in specie ab acrimonia salsa emendanda, hinc juniperina, sassafrata ac myrrhata, ferè primatum ducunt cum exercitio moderato, idque imprimis extra paroxysmum. In paroxysmo verò Oia volatilia oleosa, opiatis mista, propinentur. Nimirum, uti rectè monet Schneiderus, materiæ, causæ, & loci ratio sedulò in cura catarrhorum habenda. Quodli catarrhales affectus crebriùs recidivantes oriuntur ex vitio partis & glandularum, aut obstructarum, aut alio modo læsarum, propter digestionis privatæ læsiones, & propter reliquias quasi fermentativas in parte affecta, hæc ipsa ex parte removeantur, & hinc pars firmetur. Tales catarrhos curant imprimis sudorifera, partium sordes eluentia & abstergentia; item vesicatoria, lo-

co affecto aut huic vicino applicata; aut si fieri potest, leni suppuratione facta per abscessum contumax vitium removendum: v. g. tumor catarrhosis malæ, crebriùs recurrens vitio dentis, ex privata digestionis læsa cariosi, hujus evulsione radicitus curatur; sin minus, inustis fonticulis talis catarrhus palliativè curandus; sic v. g. tonsillarum tumores sæpiùs recurrunt catarrhali vitio, qui vix radicitus curantur, nisi facta aliquando suppuratione perfecta, & inde nati abscessus legitima mundificatione, & ita vitii particularis correctione, hoc enim modo, quicquid heterogenei fermentativi partem obsederit, removeretur.

Pro his scopis ritè obtinendis observandum est:

I. Remedia, quæ hîc conveniunt, in genere videntur esse evacuantia, quæ primum locum obtinent. Attendendum igitur est: an, & quando, & quibus in casibus, conveniant. Per alvum quidem talia minus in catarrhis sunt commoda, quin potiùs feliciori & promptiori successu per urinam, & hinc per sudorem, evacuando lymphæ augmentum, tollatur; unde diuretica, & imprimis sudorifera ex salibus volatilibus v. g. succini C. C. & imprimis salia volatilia aromatica ex succino, myrrha, &c. ac hinc ex lignis sudoriferis, in specie ex ligno sassafras, erunt optima; In catarrhis his enim si sudor moveatur, ipsorum insultus desinit. Ubi tamen catarrhus fuerit contumacior, si magis universaliter plures partes corporis affliguntur, aut idem ex stomachi vitio graviore dependeat, vel etiam corpus impurum offendant, subinde necesse est ad purgantia progredi; Imò interdum in recidivante & contumaciore malo, ex vitio stomachi & lymphæ orto, etiam ad vomitoria pergendum suadent Prosper Martianus in l. 4. Acut. l. 202. & Riverius Cent. II. obs. 90.

Inter purgantia primatum ducunt pilulæ de succino Cratonis v. g.

℞. Mass. Pil. de Succ. Crat. ℥j.

Extr. absinth. gr. v.

Res. jalap. gr. iij.

Scam. ʒi. gr. j.

c. ʒo Succin. F. Pilulæ.

II. In catarrhis chronicis & sæpiùs recurrentibus, v. g. in senibus, aut similibus affectibus catarrhalibus scorbuticis recurrentibus, imprimis quando ex feri vitio accidat, ac partes nerveas magis afflixerit, semper ante novilunia, interdum & ante plenilunia, vel evacuantia blanda appropriata, vel à catarrhis aliàs præservantia, usurpanda sunt, cum affectus à lymphæ oriundi, & partes nervosas affligentes subinde lunæ moribus auscultare soleant. Inter hæc remedia eminent succinata, myrrhata, sperma ceti, Juniperina, &

Gumma



similia temperata oleosa quasi balsamica, lympham seu serum corrigentia, & partes læsas roborantia.

III. In catarrh. s. calidis dictis, aut à lymphæ acrimonia vitiosa, præsertim falsâ, vel acri, tenui, &c. à causa externa opiata optimè profunt præservativè, & in principio morbi curativè, ac hinc veteribus in tali casu, nempe in catarrho, ut vocant, tenui pilulæ de cynoglossâ fuerunt in usu, quas dixerunt inspissare catarrhum tenuem, edulcorare catarrhum acrem, ac refrigerare catarrhum calidum. Earum autem loco ferè opiat. ritè paratis, ut laudano opiato & hystérico, utimur, quibus catarrhus, nocturnus imprimis, optimè evertitur & curatur.

Sola tamen opiata vix usurpanda, sed, uti jam monui, succinatis & appropriatis catarrhalibus aromaticis semper mista, nempe succino, sulphureis, cephalicis, & similibus aliis, ut simul vitia lymphæ corrigantur, & præsertim diaphoresis auctior ab eorum usu expectetur. Decantat admodum horum opiatorum usum Helmontius in *affect. catarrhalibus Tract. Catarrhor. Delirium. Tussis & Asthma, Castos errans, & Jus duumvirat.* §. 62. 64. 65. & inter alia felicem prædicat ægrum, cujus auxiliator Medicus sciat lethalia à papavere separare, retento auxilio excitatore potestatis in duumviratu. Salutarem præterea quoque horum usum confirmat experientia, cum iisdem ex Modernorum consuetudine frequenter usus fuerit Riverius, *Cent. 3. Obs.* 15. 69. 74. Assumuntur talia opiata, cum primis tempore vespertino sub introitum lecti, uti alias est consuetum; vel aliquot horis ante introitum lecti, aut etiam paulo ante, quando moveri solet catarrhus; vel duabus horis ante cœnam, quod melius est, cum cœna parca & moderata. Observandum tamen, ne abutatur his ipsis, suspendendo nempe & inhibendo catarrhalem motum, istis nempe in casibus, quando catarrhali influxione alius morbus solvitur, vel quando epidemius fuerit affectus, vel quando ad incrementum jam pervenerit malum. In talibus casibus non statim suspendenda materia catarrhi; plus enim nocuementi alias contingit, nisi divertentibus, sudoriferis, diureticis, & similibus mista fuerint opiata.

IV. Chirurgica in catarrhum cura ferè tacet, nisi in iis corporibus interdum locum habeat, ubi catarrhi à priori jam removendi, causæ nempe ferè sunt incorrigibiles; aut ubi sunt admodum contumaces, atque sæpius recidivantes, aut ubi sunt similes affectus vitio lymphæ exorti admodum contumaces. Tunc enim productum morbosum saltem removendo, deceptivum & palliativum fontanellorum remedium interdum est adhi-

bendum, item vesicatoria. Ista enim voluntaria ulcera palliativè & à posteriori hi tantum affectibus catarrhalibus medentur aquam nempe exhauriunt, non autem fontem ipsum, ne nimium seri aut lymphæ catarrhalis inundatio partem debilitet, aut tonum ejus nimium destruat. Productum morbosum eliminant, causas verò ipsas radicales relinquunt. Per se enim totus fonticulus eadem valet, quæ vesicatoria; horumque auxilia in cruoris & laticis seu serminuta quidem, sed continua ex haustione consistunt; adeoque à posteriori & palliativè tantum iis propriè conferunt affectibus, qui oriuntur à scorbutico, qui à sordibus quibusdam vitio primæ digestionis, aut vitio læsæ in sanguine fermentationis, aut vitio corrupti seri in massa sanguinea enascuntur, aut vitio specialis cujusdam parti sub digestionem propria deficientis, enascuntur, ita ut labes illa à priori propter subiecti ineptitudinem radicitus, v. g. vel ob senium, vel in mulieribus propter mensium naturalem defectum, aut propter characterem hæreditarium sint incorrigibiles. In talibus ergo casibus conveniunt fonticuli in nucha & brachio: Sicut interdum fit, ut ipsa natura hinc inde in quibusdam subiectis cacochymicis spontanea facit in partibus ulcera, quæ clausa per artem vario morbos nec levia incommoda inferunt; deinde verò aperta ab aliis malis se liberet, & corpori sanitatem restituat: Vid. egregia hujus rei exempla in Sculteto in *Obs. Chirurg.* 55. & 57. Et sanè id, quod Scultetus hic observavit in ulceribus spontaneis, interdum etiam in fonticulis intempestivè occlusis observatum fuit. Præterea pertinent huc vesicatoria, quando v. g. in affectibus catarrhalibus, in specie oculorum, in nucha excitantur vesiculæ.

V. Quoad venæsectionem, negotium hoc per se locum non invenit: Sin verò subiectum sit plethoricum, aut consueta sanguinis evacuatio suppressa, &c. quibus & aliis similibus occasionibus intenderetur affectus catarrhalis, consultum est, venam secare observando revulsionum & aversionum regulas. Quin etiam, cum confertim nimis sit decubitus catarrhalis in quandam nobiliorem partem, ad impetum istum refrœnandum venæsectio in loco opposito, secundum revulsionem & aversionem instituta, subindè solet in praxi admodum esse proficua: vid. Hercules Saxonia *Prælect. Pract.* P. 1. pag. 58. & 60. & Julius Cæsar Claudinus *de Catarrhis*. Si tumor capitis ex odontalgia, opposito in brachio secatur vena; Per se autem & primariò non convenit, sed tantum pro scopo ventilatorio.

Potius ex fonte Pharmaceutico (1.) primarium  
(Rr rr 2)



matum obtinent opiata, causæ efficientis activitatem nonnihil tollentia; hinc (2.) remedia vel sudorifera, in specie aromatica & hinc volatilia, quæ partes eluunt, earundem sordes mediante sero commodè abstergunt, ac ipsum serum simul corrigunt ac minuunt; tandemque (3.) aromatica vel balsamica, quæ tam fomitem ipsum lymphæ vitiosæ in stomacho emendant, quam partes solidas læsas denuò restituant & roborant, sunt utilissima in paroxysmis catarrhalibus. Hæc ipsa enim indicationibus suprâ factis maximam partem satisfaciunt.

Observata ergò legitima medendi methodo, remedia simplicia in affectibus catarrhalibus usitiora, magisque appropriata, & imprimis catarrhis à causa interna enatis succurrentia, sunt serpillum, quod ut dicit Lindanus simul corrigit stomachum, & ita antecedentes causas removeret; porro satureia, thymus, majorana, mentha, hyssopus, betonica, salvia, præsertim ros marinus, horum flores, & omnia ex eodem præparata remedia, flores lavendulæ, liliorum convallium, lignum sassafras, & omnia sassafrata, Guajacum, lignum lentiscinum, juniperinum, & similia, quæ communia decocta sudorifera ingrediuntur: Quin & baccæ juniperi, & omnia juniperina, ex earum baccis paratum rob, decoctum ligni, malvaticum juniperinum, &c. macis, acorus verus & adulterinus, zedoaria, cinnamomum, &c. & similia usitatissimè usurpantur: quibus succinum, quod instar omnium est, & quælibet succinata, myrrha quoque, extractum myrrhæ, tandem sulphur, & omnia sulphurea temperata, cinnabaristam nativam quàm antimonialis, salia volatilia, tam simplicia quàm oleosa, opiata, &c. prosunt: Quoad sassafras lignum, imprimis egregium præ omnibus est ad catarrhos remedium, adeò, ut etiam propterea à Brunnero in suis Consil. proprium catarrhorum vocetur alexipharmacum; sal enim aromaticum habet nobile, odorem & saporem fœniculatum, ideò vocatur & lignum fœniculare. Corrigit optimè seri & lymphæ vitia, tam acidam quàm salsam, prætereaque eam simul per urinam & sudores evacuat, abstergit vitia partium topica, & noxas eis inductas eludit, simulque digestionis primæ succurrit; nobile enim est stomachicum. Unde commune decoctum ligni sassafras, & essentia ligni sassafras, vel tinctura sassafras Mynsichtii, egregium est remedium ad sistendos & curandos catarrhos, cochleatim usurpata, expectato blando sudore: Pertinet huc etiam essent. catarrhalis D. Michaelis, quæ paratur ex ligno sassafras cum spiritu serpilli; siquidem serpillum & ipsum decantatum simplex est contra catarrhales affectus; unde etiam aquam suam benedictam

serpilli tantopere commendat Mynsichtius in Armament.

Pertinet huc aqua ista contra catarrhos descripta ab Hoffmanno in clave in annexo Thes pag. 6. Cujus aquæ, nec non benedictæ, dosis coch. j. ad ij. nunc manè, nunc meridie, nunc vespere, vel quocunque alio tempore, propinari potest.

In catarrho scorbutico miscenda sunt remedia sassafrata cum summitatibus pini recentibus, ut unà decoquantur. In talicatu commodè miscetur hæc tinctura ligni sassafras cum remediis ex abiete alba, essentia pini balsamica, & erit egregium remedium contra catarrhum scorbuticum, imprimis si simul immineat paralytis notha seu scorbutica; aut decoctum utriusque simplicis fructuosè usurpatur. Essentia pini cum proprio paratur, quæ in affectibus catarrhalibus à lymphâ scorbutica oriundis instar omnium est, speciatim si cum catarrho scorbutico paralytis scorbutica vel notha velit imminere, vel conjuncta sit. Strobuli enim tenelli pinastri, von Rieffern / sunt singularissimum in catarrhis scorbuticis. Colligantur coni seu strobuli dicti pini, vel abietis juniores in fine Martii, & initio Aprilis, & coqu. in aqu. simpl. seu cerevisia; Postmodum ʒij. l. jv. bibendæ ante pastum. Juxta remedia ex ligno sassafras subinde & aliorum lignorum decocta fructuosè usurpari possunt, uti videri potest in Obs. Lotichii lib. 2. c. 3. Observ. 2. & l. 3. c. 1. Observ. 1. & 6. sicut & admodum fructuosus decoctorum lignorum usus in affectibus catarrhalibus in Poterio Cent. 2. Observ. 71. & Pharm. Spag. lib. 1. pag. 331. & pag. 635. item Gabelchovero in Observat. qui etiam decoctum radicis Chinæ contra catarrhos fructuosè præscribit. Alii non sine ratione commendant decoctum ligni lentiscini, ex quo destillat mastix: cum igitur mastix sit nobile contra catarrhos, nullum dubium est, quin ligni lentiscini decoctum æque sit egregium: Cui tamen ligno, ceu raro, potius decoctum ligni juniperi potest substitui. Conf. Hartman. Prax. Chym. cap. 21. §. 2. & Poterius Cent. 3. cap. 68. Sic v. g. sequens vinum medicatum admodum laudat Lindanus in cura catarrhorum, & ad affectus catarrhales chronicos, speciatim lymphæ & stomachi vitio genitos:

℞. Ligni guajac.  
cort. tamaris. ʒij.  
ligni Rhodii  
sassafr. gumm. ā ʒij.  
HB. absinth. M. j.  
scolopendr.  
eupator.  
mentha.  
hyssopi ā Mß.

rad. enul.  
cent. maj.  
Zedoar.  
galang.  
cinnam. ā 3j.  
affund. vini mens. jv.

Stent in infuso, & de hoc semper sumatur bonus haustus horā unā vel alterā ante pastum.

Ros marinus nobile est simplex in catarrhis curandis, unde egregium est sequens decoctum catarrhale modò laudati Lindani:

℞. ras. ligni sassafr. 3ij.  
rad. caryophyll. 3j.  
HB. rorismar. rec. M. j.  
Vini generosi Ment. ij.

Coqu. leni Δe vase bene clauto in MB. horis 6. 7. l. 8. Hinc removeantur ab igne, ut refrigescant, & colatura amara usurpetur eodem modo vel inter cibandum, vel in lecto calidè, expectando blandum sudorem.

Pertinet huc vinum Hadriani Papæ dictum, contra catarrhos aliās admodum decantatum: *Uid. lib. 1. Prax. Sennerti, p. 712.* Aliās etiam sunt egregiæ essentiae lignorum compositæ; item R coralliorum sassafrata, item essentia florum anthos, essentia salviæ, essentia serpilli, præ cæteris essentia succini, ~serpilli, liliorum convall. cerasor. nigror. & similia.

Præter dicta vegetabilia, ex iisque paratas essentias & tincturas, &c. ulterius conveniunt baccæ juniperi, malvaticum juniperinum, & electuarium Paracelli, quod videb. in ejusdem consiliis.

Succinum, & omnia ex succino parata remedia, interna & externa, summa sunt specifica contra catarrhos: Sic succinum solito modo præparatum, seu quod melius, succinum catarrhale ad modum D. Michaëlis cum aqua serpilli spirituosa, vel essentia serpilli, vel solitario, vel hujus part. ij. cum part. j. cinnab. nativæ præparatum, & largiter imbutum: quinimò essentia succini parata cum spiritu vini rectificatissimo est appropriatum remedium ad quæcunque vitia lymphæ, quæ à guttis 20. vel 25. plus minus propinatur: Vel fiat cum spiritu serpilli essentia catarrhalis D. Michaëlis: Item Ææa destill. v. gr. oleum majoranæ, succini, rorismarini, vel purā, vel ex iis cum saccharo parata elæosacchara, internè crebrè usurpantur: quin & balsamus sulphuris anisatus ad aliquot guttulas, vel ex hoc paratum elæosaccharum, admodum conducit in catarrhis: Sal volatile succini ā gr. xij. ad 3j. & Θ volatile C. C. adeoque ex iis paratus liquor C. C. succinatus, maximè egregia sunt in catarrhis per sudorem curandis.

Item ~Θ\*ci succinatus ex Θ\*co, calce viva, V & rasura succini, per retortam factus itidem est egregius: idque eò magis, si affundatur myrrha, & ita essentia catarrhalis elegans paretur. Ex succino & myrrha quoque cum spiritu salis Ammoniaci essentia fieri potest; loco quorum etiam & alia salia volatilia, ~Θ\*ci anisatus, balsamum nervinum D. D. Schefferi, ex Θe vol. C. C. Θe Ammoniaco, oleo macis & V, &c. egregia sunt in his affectibus, tam curativè sudorem movendo, quam præservativè contenta corporis alterando. Post succinum est myrrha, tam in substantia ad 3j. quàm ejusdem essentia cum V q̄sato, vel essentia salutis cum R q̄i, aut etiam cum ~u Θis Amm. vinoso parata catarrhorum præservativum & curativum optimum est. Post hæc est sperma ceti, quod acres catarrhos egregiè temperat, modò habeatur recens, & non rancidum; hoc namque & corrigit acrimoniam lymphæ catarrhalls, & simul lympham crassā & viscidā incidit, resolvit, & ad expectorationem disponit: Addi possunt olibanum, mastix, benzoë & similia, quæ lymphæ acrimoniam temperant, & substantiā pingui noxas tollunt. Faciunt huc pilulæ Montagnanæ ad catarrhos curandos & sistendos egregiæ.

Quin & ipsum sulphur, & ex eo parata quæcunque remedia, flores sulphuris ritè parati, optimè conveniunt in curandis catarrhis, si tam simpliciter in forma sicca ad 3j. usurpentur, vel cum aliis misceantur, imprimis cum succino: aut si ex his cum extracto enulæ campanæ fiant pilulæ catarrhales, quas insigniter commendat Rhumelius in *Jatrochimia*, quàm in forma liquida cum 3o destillato terebinthinæ, aut succini aut anthos, aut baccarum juniperi, aut anisi, &c. in balsamum sulphuris redacti, affectibus catarrhalibus mirè resistit; vel fiat ex tempore elæosaccharum sulphuratum compositum non inelegans:

℞. 3o destillati succini 3j.  
anthos. 3ss.  
c. l. q. sacchari f. Elæosaccharum: adde  
flor. 4is 3j.

M. S.

Glus-Zucker.

De quo capiat æger manè & vesperi, & sub introitum lecti.

Item Benzoë, R 4is cum V q̄sato elicita & similia sunt optima: Item tragea ex balsamo Peruviano, sulphure & saccharo.

Speciatim si febris catarrhalis affligat, nil melius est volatilibus sudoriferis, quibus jungatur opium: ad opiata pertinet theriaca, (R r r r 3) à Ve.

à Veteribus imprimis ad præcavendum, item ad sistendam excretionem catarrhalem nimis ruentem usitata, tam vetus, quam recens, in qua vis opii fermentando non est nimis infracta. Assumitur vel sola, vel additur ipsi aliquid de bolo Armena.

Quod attinet medicamenta externa in catarrhosis affectibus usurpanda: applicanda sunt hæc vel ipsis partibus affectis, vel locis glandulosis catarrhos fundentibus vicinis; partim noxam inductam tollendo, partim præcavendo. Hinc in affectibus capitis catarrhalibus remedia imprimis vertici, & hinc temporibus admoventur sub forma lituum & emplastrorum; in affectibus verò faucium & asperæ arteriæ suffituum formâ, ut melius penetrant, conveniunt. Suffitus hi constare possunt ex resinosis, v. g. ex succino, quod primatum obtinet, sandaraca, benzoë, olibano, mastiche & gummi animæ, &c. carbonibus injectis: expiratus fumus excipitur capite mediantibus lintaminibus probè hujusmodi suffitu imprægnatis: c. g. secundum Deckers in *Praxi Barbette lib. I. cap. 4.*

℞. succini ʒj.

mastich. scrup. i.

M. f. Pulvis grossus.

Quo multos catarrhosos restitutos perhibet.

Inter illinenda primatum obtinet oleum destillatum succini, bregmati, vertici, locisque vicinis illitum. Hoc, ubi acrius & fortius visum fuerit, substituatur balsamus Peruvianus, vel cum simpliciter illinendo, vel in vitello ovi prius dissolutum, & cum spiritu juniperi mistum parti læsæ subinde affricando: vid. Timæus von Gûlden-Klee/ c. 5.

℞. bals. Peruv. ʒj.

dissolve cum

vitell. ov. No j.

adde

℥iij. bacc. junip.

D. S.

### Eufferlich Glieder-Wasser.

Ceu expertum commendatur in doloribus partium musculosarum, qui fiunt à defluxionibus seu catarrhis frigidis.

Juxta hæc est ʒo mastichis, ʒo destillatum majoranæ, menthæ, macis, &c. ʒo destill. C. C. potentissimum est, vertici aut temporibus illitum, modo ejusdem fœtor non sit adeò gravis. Observandum tamen, ut si ejusmodi olea penetrantiora & membranas sensiles magis afficientia partibus extus admovenda sint, talia subjecta vim eorum penetrantem ferre queant, cum, qui capitis sunt debilioris, ab hujusmodi fumosis lædantur, & vel solo odore sternuatio & incipiens coryza iisdem excitetur. Facit huc et-

iam unguentum Horstii ex gummi elemi, cum oleo succini malaxato, imprægnato; vel emplastrum de betonica, item emplastrum de bregmate usitatum, item de tacamahaca, si malaxata cum ʒo succini vel appropriatis, emplastri formâ bregmati applicentur: v. g.

℞. empl. de beton. usit.

G. tacamah. ā q. s.

Malax. c. f. q. ol. succini l. bals. Peruviani; Inducatur super alutam, & obducatur syndone rubro, in forma orbis medii f. emplastrum pro capite.

D. S.

### Haupt-Pflaster.

Vel applicetur ceratum ex ladano, gummi elemi, sandaraca, olibano, styrace liquida, &c. vel ex aloë, pulegio, calamintha, ladano, &c. utraque à Montagnana *Antidot. cap. 3.* descripta: item emplastrum ex mastiche, gummi juniperi, caryophyllorum, & ladano Cratonis *lib. 6. Conf. 12.* Pertinet etiam huc fumus tabaci seu nicotianæ haustus, cujus moderatus usus sanè egregium est remedium ad catarrhos capitis & pectoris, imprimis si ex lymphæ oriantur vitio, & omnibus hunc in finem debet esse commendatus. Sal enim ejus volatile acerrimum penetrat, abstergit & resolvit hostile illud irritans, corrigit acrimoniam lymphæ acidam, incidit eandem crassam & viscidam atque fluxilem facit, abundantemque per ductus salivales evacuat, vid. Mayovv. *lib. I. cap. 9.* Ratione verò olei sui narcotici, quo opiatorum virus æmulatur, insigniter sistit efferos motus catarrhales, & irritationis sensum sopit & mitigat, ac vi salivatoriâ nimium lymphæ proventum imminuit. Concinnius est, si tali Nicotianæ, usitatæ aliàs in catarrho ad brachia & pulmones defluo, pro fumo simul permisceatur semen anisi, coriandri; vel pulvis succini, mastichis, sandaraca, styrax, vel pulvis cardamomi, aut cubearum; vel si irroretur aliquot guttis olei succini aut anisi; sic enim fit remedium eò magis appropriatum.

Quoad catarrhos nothos, curantur hi, si sunt graviores, per sudorifera, imprimis per salia volatilia, vel spiritus salino-volatiles, opiatas mista, qualia sunt ℥iis æci, ℥i C. C. cranii humani, & similia. Hi enim spiritus urinosi acidum vitiosum absorbent & præcipitant, opiata verò acorē temperant, & simul dolorem imminuunt. Externè cavendum est ab omnibus oleosis unctuosus. Hæc enim inuncta crustam quasi inducunt cuti, porosque constringunt & implent. Emplastra itidem hic nocent. Optimum in hoc dolore & casu est emplastrum



plastrum ex gummi tacamahaca, soluto in vino, atque extenso super alutam vel linteum, & parti dolenti impositum: si non benè hæreat, addi debet tantillum terebinthinæ. Hoc ipsum emplastrum applicatum egregiè resolvit istas humiditates: id quod patet ex eo, quod sub illo ut plurimum membra sudant, & omnis dolor promptè evanescit. Convenit etiam interdum cum hoc ipso conjungere *gummi caranna*, hujus part. j. ad illius part. ij. recipiendo, dum 2. ista gummata ita imposita optimè resolvant lympham crassam. Quod si eveniat, ut cutis non benè ferre queat gummatum applicationem, sed attollatur in pustulas, tunc potius cura instituenda est per tincturas, seu essentia spiritus vini extractas, & ita inunctas, nempe infunduntur ea aromatica, quæ potentem vim habent incidendi, attenuandi, penetrandi, resolvendi, & simul calefaciendi, v. g. 4. semina calida majora, nigellæ, erucæ, allium, sinapi, majorana, salvia, serpillum, origanum, piper longum, & similia. Sufficit quoque V à plantis cephalicis nervinis abstractus, seu aqua articularis ad extra, nuncque solitarie, nunc mista cum ~u salis Ammoniaci cum spiritu vini parato, externè calidè illinendo, & locum dolorosum probè affricando, ita optimè dolores sistuntur.

Huc quoque pertinet sacculus ex succino cum V irroratus, aut ex chamæpitide cum o succini conspersus: vid. Hartmannus *Pr.* p. 93.

## ARTICULUS II.

### De Coryza.

**S**pecialiter inter catarrhos frequentissimus est catarrhus narium, qui vulgo etiam coryza Græcis, aut quia caput gravat, Latinis Gravedo, & Germanis *der Schnupfen* dicitur. Est, quando copiosa lymphæ, tenuis & acris, in principio quidem per nares, defluit, donec successivè adjungente se nutrimento corrupto, liquor crassus, spissus, tenax, varique subinde coloratus, insequitur. Simul percipitur in principio titillatio quædam in naribus, superveniunt sternutationes crebriores, post incipit caput dolere, & quidem dolore gravativo. Naturaliter equidem à lymphæ insipida moderatè crassa intus oblinuntur nares, cujus vasa & fontes videb. in *Stenone de glandulis oculorum, narium, oris, &c.* quæ ipsa lymphæ blandè humectat non tantum internam narium membranam, & defendit ab externis inspiratis, sed etiam suo modo faciliat odoratum. Ipsa tamen moderatè crassa continuo aëris inspiratu attenuata crassiores partes relinquit, spissioris

sub mucis forma emulgendas. Quod si verò præternaturalis lymphæ fiat excretio, ita ut copiosa, tenuis, sicque minus temperata, sed acrior & sæpè acida effluat, vocatur catarrhus narium seu coryza, dum lymphæ ista acrior, rodendo & irritando membranam narium, primitus sternutationes frequentes deinde ex narium læsione dolorem, hinc ruborem, interdum etiam eorundem excoriationem & exulcerationem infert, id quod jam suo tempore observavit Forestus *lib. 13. Observ. 15.*

### C A U S A.

Causa hujus coryzæ præter causas generales, speciatim internas, communes omnibus catarrhis, sæpissimè solet oriri ex errore externo, ut dubitem: an præcisè oriri possit à causa interna, imprimis ex vitio aëris austeri, vel inclementia hyberna aut autumnali? Aër enim hybernus effluviis acidis acutis videtur imprægnatus, unde talis aër simul partes sibi expostas, labia imprimis, faciem, manus, in specie nares & laryngem, solet lædere, & sicuti facies & manus exindè finduntur, & quasi corroduntur in fissuras, ita à simili  $\triangle$  inclementiore, aut effluviis acrioribus acidisque imprægnato, inspiratione hausto læsa interiora narium, simulque fauces & larynx ex irritatione ista mox copiosam fundunt lympham puram, tenuem, & ex læsione partium insigniter acidam, à qua in naribus coryza, in faucibus asperitas & dolor, in larynge rauco & tussis superveniunt: Hæc ipsa enim ut plurimum in coryza tempore hyberno solent concurrere.

Subiectum patiens coryzæ est summitas interior narium, ubi est membrana, quæ aliàs solet esse subiectum olfactus, in qua etiam ex osse cribriformi inseruntur multi tubuli nervei. Quando ergo à dicta acrimonia vellicatur hæc membrana, superveniunt sternutationes, quando tubuli aliquid convulsivi patiuntur, unde tubulis his vellicatis, corrugatis, & convulsivis crispaturis affectis, similiter membrana cerebri dura, hisce tubulis continua, simili spasmo crispatur, unde dolor gravativus capitis, qui dolor similis videtur, quasi caput interius stringatur, estque nunc in toto capite, nunc in altero saltem hemisphærio, pro nare dextra vel sinistra affecta. Continuat hic fluxus lymphæ, nunc blandioris, nunc acrioris: in principio morbi omnia saltem profluunt aquosa & serosa, successivè magis magisque acria, unde quamdiu durat, tamdiu odoratus magis obtunditur, donec ab aëris, simulque lymphæ vitio læsæ, & nonnihil excoriatæ, narium internæ

ternæ partes doleant, rubeant & plorent nutrimentum proprium, sub forma mucilaginis crassæ, quæ narium suprema obstruendo inspirationem tollit, usque dum hæc sponte effluat, & ita noxa inducta deleatur: In faucibus hærens copiosum scretum facit, & laryngem incrustans frequenti tussi rejicitur; Quin & non raro in saxeam duritiem in naribus concrevit, quale exemplum observat Henricus ab Heer in *Observ.* 28.

Præter aërem inclementem inspiratum subinde etiam alia externa possunt coryzam inferre. Nam sternutatoria acriora, nimisque frequenter usurpata, continuò stimulo membranam irritando copiosam lympham effluere faciunt, & tandem coryzam producant pertinacem.

Quando est à causa externa, ut aëre externo, coryza, ut plurimum frequentem sputationem ac tussim supervenire videmus, partibus sc. ipsis, per quas aër rigidus transit, & quæ copiosis glandulis hinc inde sunt obsesæ, naribus tamen læsis & irritatis hinc lympham copiosam & viciatam sub forma catarrhi plorantibus; imò ex partibus istis ita læsis continuà aëris expiratione exhalantia miasmata fermenti quasi obtinent naturam, unde & contagiosa percipitur coryza, ita ut ista effluvia aliorum naribus inspirando attracta, vel per halitum, vel per lintea, seu per pocula communia communicata, irritativâ suâ acrimoniâ instar pulveris sternutatorii membranam narium vellicando, & hinc nares lædendo, ac lympham alterando, similem etiam in altero subjecto coryzam inferant, ut adeò rarissimè & parcissimè coryza à causa interna notetur. Adeò sanè falsum est, quod coryza semper sit salubris, ut vulgò dicunt: per coryzam purificari massam sanguineam, quasi existat in massa sanguinea, *der Schnupfen sey gesund / und nehme viel Böses weg.* Nam ut ut hoc verum sit, si à causa interna oriatur, quæ tamen coryza rarissima est, non tamen semper procedit negotium, cum ut plurimum occasiones externas agnoscat, & talia potius fiant in naribus & faucibus, quàm quòd aliò deferantur. Qui vult hæc magis dilucidata, conferat in specie Helmontium *Tract. Tussis & Asthma*; item *Catarrhor. Delirium*.

#### DIAGNOSIS.

Diagnosis coryzæ facilis, etiam aniculis nota est.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Coryza per se est malum insons, quod caret periculo: saltem observetur,

1. Quod crebrior repetens olfactum magis obtundat.

2. Quod lymphæ effluens nimis gravis adeò graviter exulceret interiora narium, & ita ozænas, vel narium ulcera periculosa producat. Imò observatum fuit, ex tubulis nervis nonnihil eros, supervenire excrescentiam carneofibrosam, seu polypum.

#### CURA.

Cura communis est cum aliis catarrhis: Duo autem tempora sunt observanda ad coryzæ curam:

I. Tempus coryzæ inchoatæ, quando incipiunt sternutare, & caput dolere, & lymphæ apparet tenuis.

II. Tempus coryzæ confirmatæ, quando mucus obsidet narium summitatem.

Unde opera danda est, ut ratione prioris irritatio membranæ narium, ejusque inde oriunda læsio, sistatur maturè & corrigatur; sic enim mox in principio supprimi potest coryza: ratione verò posterioris est attendendum, ut genitus mucus nares obsidens crassior & viscidior in progressu morbi maturè evacuetur. Quibus ipsis pro conditione subjecti patientis, & ipsius catarrhi, vel epidemici, vel non epidemici, copiosioris vel parcioris, nunc blandè laxantia, nunc in specie sudorifera, socianda veniunt. Conveniunt ergo pro primo scopo obtinendo & salia volatilia oleosa odorata, quacunque forma adhibita, in specie, si à causa interna oriatur: maxime tamen conveniunt externa vel naribus applicanda, vel vertici inungenda, vel in ore masticanda, vel inspiranda, hinc suffitus, inunctiones, varia odoramenta, &c. coryzam inchoatam curant, & in prima herba suffocant, quatenus læsionem inductam plus minus corrigunt, acidum vellicans temperant, & irritationem sistunt. Imprimis illinitio narium cum oleo destillato anisi, succini, aut alio simili oleo aromatico. In specie oleum destillatum anisi, mox in principio illitum ante excoriationem narium est egregium. Oleum succini hæc superat, in specie si illinatur vertici, mirum quantum levat coryzam, quia & naribus potest illini, idque eò præsentiori effectu, si aliquot guttæ olei destillati caryophyllorum ipsi addantur: sed quoniam est acriusculum hoc oleum, ob id tantillum bombacis ipsi intingatur, & inde subinde per olfactum naribus admoveatur; nam & sic coryza tollitur. Item balsamus apoplecticus naribus illitus præservat à coryza in inclementiore constitutione aëris, ut inde interius nares condiantur & loricentur, ut eadem per illius halitum quasi præmuniantur, quo minus ab aëre exteriori lædi possint, eandem etiam incipientem curat. Tandem solus odor ex cornibus & un-

gulis raspatis, v. g. cornubus bovinis, aut in præparatione pectinum perceptus, etiam coryzam recentem subito sistit, sicut & proficuum est, si raspentur ejusmodi cornua limâ ferreâ, quo factò salibus volatilibus excitatis, & nares penetrantibus, aufertur coryza. Nec incommodum est, si fiant suffitus pro coryza narium: sicut enim in catarrhis aër attractus inspirando infert asperitatem narium, faucium & laryngis; similiter inspirati suffitus alterationem ab aëre præ reliquis tollunt, & harum partium impressas læsiones denuò restitunt, & quasi abstergunt; sunt isti suffitus imprimis ex gummatibus, quorum accensorum salia volatilia oleosa interiora narium & faucium penetrando acrimoniâ lymphæ & corruptelam nimiam tollunt. Hæc inter excellit suffitus, præsertim ex succino, mastiche, olibano, & similibus. Denique, suffitus ex gummi animæ experimentum est Hartmanni, insigniter commendatum à Lindano.

℞. *G. juniperin.* ʒss.

anima

succini ā. ʒij.

thuris

mastich. ā. ʒj.

benzoes ʒij.

M. f. Pulvis: S.

#### Raucher-Pulver zu den Glüssen.

Pertinet & huc suffitus tabaci, aliquot guttis ʒœi destill. anisi prius imprægnati, si scilicet ita præparatus tabacus per fistulam consuetè attrahatur, & fumus inspiretur. Convenit etiam, si recipiatur ʒo amygdalarum dulcium, in quo q. s. solutum sit camphoræ, quod ipsum ʒo extrinsecus ossi nasi, vel intrinsecus superfici ei ejus illitum, eleganter coryzam sistit. Perhibetur esse secretum Tackii.

Quodsi verò eò usque processerit malum, ut sub incremento & statu ejus pathemata graviora capitis afflixerint, nec non copiosus, nimis crassus, nimisque viscidus mucus narium summities occupaverit, & nares obstruxerit, tunc attenuantia, resolventia, & excrementa eliminantia locum habent; unde optimus est suffitus aceti super ʒ candens effusi, & ex gummi animæ & succino jam laudato: Sic etiam loco suffitus conveniens est spiritus ʒis Ammoniaci odoratus crebrius; talia enim penetrant ac incidunt mucum, materiam resolutam fluxilem faciunt, & nares aperiunt, ac læsionem inductam corrigunt, sic ʒ volatile camphoræ optimè solvit mucum latitantem. Ulterius pro simili scopo optimè conducunt sternutatoria appropriata, lymphæ proritando fluxum, ejus beneficio membranas narium abstergentia, quin & dictum mucum crassum &

Tom. II.

viscidum eliminantia. Fiunt ordinariò ex pulvere tabaci, ex floribus & radice liliorum convallium, majorana, euphorbio, & similibus:

℞. *Pulv. Tabaci Ind.* ʒss.

major.

*fl. lil. convall.* ā. ʒij.

ʒo *destill. salv.*

major. ā. gtt. vi.

Misc. pro pulvere sternutatorio subinde naribus hauriendo:

D. S.

**Eröffnend Niese-Pulver.**

Huic, si placet, pro ditioribus subinde addi possunt,

*Ambra* gr. v.

*moschi* gr. ij.

Misc.

Ita hæc conjuncta dant pulverem sternutatorium gratum.

Vel etiam fit elegans pulvis sternutatorius ex pulvere radice ireos Florentinæ, cui tantummodò aliquot grana euphorbii pulverisati adduntur; hoc enim potenter materiam suâ forti irritatione, rivuli instar, profluere facit.

Pertinet huc etiam pulvis sternutatorius Helmontii in hoc casu expertus, ex pulvere radice hellebori nigri cum ana sacchari mistus, naribus attractus, quibus aliquot guttæ olei destillati caryophyllorum, vel cinnamomi addantur, quem etiam ceu egregium commendat Riverius in *sua Praxi*. Vid. Helmontius *Tractat. Tuss. & Asthma*. His ipsis enim corrigitur mucus, & denuò liberantur nares: Item folia Nicotianæ irrorantur aliquot guttis olei destillati majoranæ, & ita odorantur; vel exsiccata pulverisantur, blanda, sed egregia sunt sternutatoria. Conveniens etiam est semen nigellæ cum majorana in forma pulveris, vel sola, vel cum camphora: semen basilici pulverisatum sternutatorium non incongruum est, in principio quoque coryzæ usurpandum. Optima denique sternutatoria fiunt ex vitriolo; mitiora, si tantummodò ad albedinem calcinetur; potentiora, si ad aliquam rubedinem uratur seu comburatur: quæ inspirata potenter penetrant, omnesque narium latebras emungunt. Cæterum, ne nimis acre sit, solvatur tantillum vitrioli albi, seu ad albedinem calcinati, in ʒ majoranæ seu aqua liliorum convallium, aut in aqua salvie diluti, ita ut gr. v. l. vj. pro ʒj. aq. sufficiant. Liqueor is filtratus & naribus attractus quasvis narium latebras emungit, & insigniter convenit coryzæ:

℞. *fl. lil. convall.*

*HB. major.* ā. M. ij.

*Nicot.* M. ss.

(Ss ss)

Coqu.



Coqu. in f. q. aq. & vini in vase clauso:

Colaturæ ʒvj. adde

Œli albi ʒj.

Colentur per pannum densum,

D. S.

### Abziehend Wasser zur Nase.

Quæ optimè quoque mucum nares obstruentem resolvit in statu coryzæ.

Quidam usurpant olei nicotianæ & olei nigellæ ana partes æquales cum aliquot guttis olei destillati majoranæ; Vel

℞. *Oleum irini.*

*Nicotian. ā. ʒj.*

*destillat. major. gtt. vj.*

M. S.

### Eröffnend Del zur Nase.

Subinde intra nares attrahatur, vel cum turundula naribus immittatur, vel naribus extrinsecus illinatur, mucum narium insigniter solvit & elicit.

Melius est oleum anisi, si interiora narium eodem illinantur; referit enim nares obstructas, & si sit ab effluviis inspiratis, lympham temperat, ne fauces & sanguinem feriat attenuata; vel sumatur oleum anisi, & ita naribus cum bombace in parva turunda immittatur; vel oleum succini, vel caryophyllorum, quæ propter acredinem cum oleo amygdalarum dulcium temperentur. Tachenius camphoram in duplo olei amygdalarum dulcium solvit. Sic conveniens est, ut naribus admoveatur nodulus cum stilo ex semine nigellæ contuso, qui nodulus subinde olfactus admodum corrigit & emendat coryzam, in specie nares obstruentem; est remedium Tabernæmontani, quod insigniter commendat. Possunt addi folia majoranæ, aut præparata ex majorana, in specie oleum majoranæ; v. g.

℞. *Fol. majoran. pug. iij.*

*sem. nigell. contus. ʒij. l. ʒij.*

*Œo destill. majoran. gtt. iij.*

*succini*

*anisi ā gtt. j.*

M. f. Nodulus:

detur c. stilo: S.

Riech-Pfischlein.

Quod si caput perturbatum sit grave & obnubilatum, convenit vel balsamum Peruvianum, vel, ubi fortius agendum, & destillatum succini, aut ejusdem balsamus vertici illitus; unde dolor capitis tensivus ejusque perturbatio successivè remittunt. Loco horum adhiberi etiam possunt cucuphæ suprâ laudatæ:

℞. *Flor. anthos,*

*lavend.*

*stach. Arab.*

*rosar. r.*

*lib. convall.*

*salv. ā. part. ij.*

*sem. nigella,*

*ras. succini ā. ʒij.*

*styrac. calam.*

*benz. ana ʒj.*

Concis. & contus. irrorentur c. guttis aliquot Œi destillati succini: includ. sacculo quadrato ex syndone rubro interpassato.

D. S.

### Œaßlein auff den Wirbel zu legen.

Quodsi pro derivatione lymphæ catarhalis prius pro præservatione partium oris aliquid agendum sit, pilulæ conveniunt vel trochisci parvi ex Mithridatio, mastiche & olibano facti, & in ore retenti. Catarrhum enim & læsionem partium sistunt, dolorem oculorum, dentium fœtorem, & gingivarum corruptelam, &c. tollunt, atque in principio imprimis conveniunt.

## CAPUT III.

De

### *Lymphæ motu impedito, indeque orto hydropes in genere & in specie.*

Quodsi lymphæ vitiosè moveatur ex glandulis vel circa glandulas conglobatas, per vasa lymphatica, ita ut in suo motu stagnet, & hinc loca vicina occupet, tumoremque inferat ∇sum, hydropes particulares sequuntur; utut enim etiam in hydropes universali semper ad glandulas & vasa lymphatica plus minus respectus habendus sit, quatenus aquosas collectiones plus minus intendere, aut pertinaciores reddere valent, attamen cum vix in universo corpore lymphæ motum per vasa lymphatica impeditum suspicari liceat, propterea magis hydropes particulares hujusmodi lymphæ in motu impedimentum respicere videntur.

Sanè ubique per totum corpus & quolibet viscera dispersa sunt vasa lymphatica, tamque per partes internas, quam per externas, quæ semper habent suam correspondentiam cum glandulis. In his ergo lymphæ contenta si impediatur moveri, sive sint vasa rupta, sive crosa, cum interim continuus ejus sit proventus, necessariò lymphæ

lymphæ collectio seu tumor aquosus seu hydrops particularis in ista parte, ubi sit lymphæ impeditus motus, excitatur; & tam in partibus internis, v. g. ex lymphaticis capitis, hydrocephalus; ex lymphaticis pulmonum, aut glandularum pectoris, hydrops pectoris; ex lymphaticis hepatis vel lienis vel testium, &c. hydrops ascitis particularis, & hydrocele inducitur; non secus ac in partibus externis à lymphaticis artuum tumores serosi partium externarum superveniunt.

Causa verò generalis, propter quam non movetur lymphæ, in ordinatis vasis est aut ruptio aut erosio vasorum lymphaticorum. Si enim in quodam loco glandulæ, & ex his derivata vasa lymphatica obstruantur; necesse est; cum lymphæ fiat continuus proventus, ut exinde hujus fiat collectio in glandula, aut ejus cursus in vase ita impediatur, ut necessariò hinc lymphæ in parte colligatur. Et quidem si obstructum sit vas lymphaticum à materia crassa & viscida, seu, ut vocant, pituita, hoc ipsum vas obstructum à lymphæ per istud distribuenda insigniter distenditur, tandem rumpitur; & ita lymphæ successivè effunditur; aut etiam si ipsa lymphæ fuerit acidior, salior, acriorque aut alius quicunque humor corrosivus vasa lymphatica tenella exeserit; necessariò etiam lymphæ motus naturalis in ista parte sic impeditur, ita ut lymphæ exinde in quendam locum præternaturaliter effusa & collecta tumores aquosos particulares, aut hydropem particularem, inducat.

Confirmat hanc hydropis particularis, per lymphaticorum vasorum vitia, originem hydatites viscerum, *Wasserbläsigen* / in specie hepatis & lienis, quæ subindè observatz sunt, aut prodromi, aut comites hydropis particularis, ut in specie hoc rectè observat Schenckius *lib. 3. Observ. de Hydrope*, Platerus *in Observ. pag. 596*, & Sennertus *in Praxi*, ubi *de Hydrope*. De hydatidibus insignioribus pulmonum vid. Carolus Piso *in Tract. de Colluvie serosa pag. 214*. De hydatidibus insignioribus hepatis vid. Panacrollus *Pentec. 5. Observat. 16*. quia horum viscerum vasa lymphatica magis exteriora ambiunt, unde humorum horum seu aquarum contentarum collectio magis sit conspicua. Sc. dictis in locis vesiculæ aquæ turgidæ, nunc minores ac copiosiores, nunc grandiores conspiciuntur; quæ ipsa sunt nihil aliud, quam vasa lymphatica, in quibus motus lymphæ est impeditus. Hæc ergò lymphæ in iis hæret propter interjectas crebriores in vasibus lymphaticis valvulas, eaque sensim distendit, & dum intercepta est lymphæ distendens intra valvulas, quibus plurima vasa lymphatica sunt instructa, spatiola ista intermedia distendendo tumefaciunt,

Tom. II.

& ita vesicularum aquosarum faciem repræsentant. Quod si rumpatur una alteravè valvularum, aut ipsorum vasorum lymphaticorum lymphæ sub membrana visceris tenui coercita, & effusa, sensim majores vesicæ & grandiores, ad nucis juglandis magnitudinem interdum observatas, exhibebit, donec tandem ruptis aut erosis hydatidibus lymphæ extravasatio, in cavo corporis quodam collectio, & ita hydrops postmodum particularis oritur.

Post hydatides illustrant hydropis ortum ex lymphæ motu impedito ascites seu hydropes abdominis, vesicales dicti, h. e. in quibus aquæ abdominis tumorem quidem faciens, non in cavo ejus fluctuaverit, sed potius viscera copiosis & innumetis vesiculis aqua turgidis observata fuerint, ita ut post abdominis apertionem nihil aquæ effluerit. Exempla aliquot enarrat hujusmodi hydropis vesicalis Sennertus *c. l. item Tulpius*, qui observat hydropem ascitem ex copiosis vesicis mesenterii *lib. 2. Observ. 34*; item vid. Hæferus *in Herc. Med. pag. 143*. Horstius *lib. 10. Observ. pag. 513. & 579*. similiter & Bartholinus *Cent. 4. Epist. 58. pag. 370*. observat ascitem ex glandulis vel vesiculis in omento sero repletis, nec non in *Actis Med. Hassn. Vol. 1. pag. 17*. sicut & in Valeriola. Hæ ipsæ vesiculæ pariter nil aliud sunt, quam vasa lymphatica; ex lymphæ in motu impedita, ut ratione interjectarum valvularum in lymphaticis vasibus tales vesicæ repræsentent; aut rumpantur licet vasa, si tamen lymphæ effluens in membranis ambientibus suprâ dicto modo coercetur, successivè in copiosas tales vesiculas coacervatur & colligitur.

## ARTICULUS I.

De

### *Ascite particulari.*

**F**requentior autem præ cæteris hydropis particularis speciebus est hydrops abdominis seu ascites particularis, idque duplici ex ratione:

1. Quia copiosa & insignia continet viscera, eaque omnia plus minus copiosis vasibus lymphaticis instructa quibus speciatim accedunt vasa lymphatica ab inferioribus locis ad receptaculum commune ascendunt.
2. Quia mesenterium etiam instructum est copiosis vasibus lacteis, chylum in si tenuem & limpidum vehentibus quibus plus minus ruptis aut exeli

(Ssss 2)

simili

similiter ascites & eadem pathemata in abdomine sequuntur, quæ aliàs ex lymphaticis vasis abdominis ruptis: nam quod his lacteis læsis, etiam sequitur ascites; vid. Sylvius *Lib. I. c. 17. Prax.*

### C A U S A

Quoad causas: equidem Lindanus ascitem particularem semper à colliquatione oriari asserit, quod tamen vix universale videtur: quin plausibilis sit lymphæ chylosæ alteriusve humoris impeditus motus per vasa lactea, unde pariter omnia symptomata hæc obvia derivari possunt. Adeoque causa proxima investiganda est vel in vasis lymphaticis quacunque causa erosæ; vel vasis lacteis obstructis, ruptis, & consequenter lymphæ destillationem patientibus; vel ex sanguine, quodam in loco coagulato, qui putrescendo transit in aquam, cujus occasione supervenit interdum talis hydrops ascites particularis.

Ascitem particularem à sanguine quod attinet, huius subito facta suppressio, vel etiam extrinsecus facta in quodam loco contusio, & ita interna cujusdam partis læsio, ibique sanguinis effusi facta congrumescentia, interdum ad hunc hydropem disponit. Equidem notum est, quod asserit Helmontius, dum derivat illum hydropem ex renibus, in quibus ac circa quos sanguis congrumatus fuerit collectus; sicuti etiam observavit hydropem ex congrumato sanguine. Interim hoc effatum non est universale, licet interdum vitium sit in rene non ritè emulgente; prostantque alia exempla hoc confirmantia: v. g. ex suppressione lochiorum talem ascitem particularem hæc Lipsiæ observavi, quæ nullâ arte potuerunt revocari, copiosissimæ & in omento continebantur, quia tumor circumscriptus erat circa umbilicum, brevi post, intumescente abdomine in immensam molem, concepit secundâ viçe, partumque edidit, denuò lochia supprimebantur, unde abdomen magis intumescerebat, candelæ lumen admotum translucebat, & suffocatâ ægrâ abdomen sponte rumpebatur, & incredibilis aquæ copia evaeuabatur. Præterea huius rei se aliud offert exemplum, ubi ex contusione extrinseca in hypochondrio dextro in viro paupere, aliàs sano & robusto, ascitem cum tympanitide particularem observavi; brevi enim post contusionem, abdomine & scroto tumidis factis, tandem interiit. Forsan huc facit Lovveri experimentum *Tr. de corde c. 2. p. 124. & 125.* ubi similiter ex sanguinis motu, ex arteriis in venas impedito, hydrocephalum ortum recenset.

Cæterum præter dictas interdum extraor-

dinaræ & planè singulares ascitis reperiuntur causæ: Sic refert Bartholinus *Cent. 2. Hist. 74.* de hydrope ascite subitaneo, ex gestatione diuturna oneris gravioris oborto: Item Borellus *Cent. 2. Obs. 24.* observat hydropem ex compressione nimia circa os stomachi. Non possum, quin quæ de ascite particulari habet Lindanus super Hartmannum, proferam: Quæritur hæc, quid sit hydrops siccus Hippocratis in *Secl. 4. aphor. 11.* Omnes autores dicunt, hæc intelligendum esse hydropem tympanitidem, & sequuntur præcessorem Galenum. Ego ex Hippocrate & aliis monstravi, esse intelligendum ascitem, qualis est, quando omnia marcescunt præter abdomen. Nam, inquit, quomodo? Sunt duæ ascitis species. Una est, in qua ab aquis collectis non tantum venter tumet, sed etiam scrotum & pedes, ubi interdum pustulæ aperiuntur, & effluit humor, & hæc ordinaria est species; sed præter hanc videbitis & speciem aliam, ubi nullus nempe in scroto tumor, neque etiam in pede, sed in abdomine omnis humor colligitur; pedes autem & reliqua membra contabescunt & marcescunt, ut squamas concipiant. Cætera vix ossibus hærent, facies est arida & squalida. Et hic est hydrops siccus Hippocratis. Dicitur igitur siccus ab illa ariditate, squalore & macie totius, & hydropica aquea sunt lutea, quæ expurgantur: In hydrope sicco urinæ sunt splendidæ, instar ♀ planè croceæ, instar ictericorum, sed non habent illam crassitiem, sunt paucissima, & vix 2. vel 3. cochlearia, in ignem effusæ ardent: In ascite vero humido urinæ sunt albæ, pallidæ & crudæ, interdum, ubi renes non sunt affecti, satis copiosæ. Hæc Lindanus. Exempli huiusmodi ascitis particularis videb. in specie in Hæchstedtero *Decad. 10. Cas. 7.*

### DIAGNOSIS.

Ascites particularis faciliè cognoscitur, saltem in eo Medicus sit cautus, ut artificiosa conjectura & consideratione omnium circumstantiarum possit cognoscere, an in cavo peritonei, an in omento, aut utero, aut aliis similibus locis aqua collecta contineatur?

Duobus ferè modis inchoat: Primam ejus invasionem præter signa generalia in hydrope universali recensita, prodit epigastricæ regionis tensio continua equidem, quam tamen alimenta assumpta intendunt; malo verò ingravescente aut abdomen successivè intumescit, hinc pedes & scrotum, quando vitium hæret in ruptis vasis lymphaticis vel lacteis abdominis: aut verò frequentissimè inchoat ascites, ita ut prius pedes intumescant, & hinc tumor successivè ascendat, & abdomen occupet, tandem-

que



que perfectam ascitem inducat. Et quidem, quando pedes intumescunt, ut plurimum non sola aqua, sed simul materia quædam crassior ac spissior concurrit, adeo ut non solum tumor serosus & aquosus, sed simul sit tumor cedematosus: uti fit, quando in cachecticis vel diuturnis morbis sequitur hydrops: & ita ascendit sensim tumor talis cedematosus, donec abdomen occupet. Superiora econtra, nisi anasarca adjuncta sit, contabescunt, quamvis extrema manuum ob pulsus debiliorem aliquantum inflentur, æger in latus conversus fluctuationem quandam aquæ instar, interdum etiam murmur percipit, intumescendo magis latere, in quod incumbit; & quo magis intumescit abdomen in ascite, eò magis contabescunt partes superiores.

Ad hæc attentus sit Medicus, ne confundat ascitem particularem cum graviditate. Siquidem & mulieribus gravidis subinde copiosæ aquæ intra uterum colliguntur, in quibus natat fœtus; sicut etiam iisdem nunc ante, nunc post medium gestationis tempus crura non raro tumescere assolent, idque tamdiu, donec superveniente partu medianibus lochiis successivè subsidant. Ne ergo falsamur, nec famæ & arti detrimentum conciliemus, probè observentur signa quædam distinctiva, quæ inter optima sunt, quæ præponit Lindanus, qui dicit, quod hydrops discernatur à graviditate.

1. Ex colore faciei vivido, qui est in specie in gravidis, & cæteris paribus sanis, magis floridus, vividus; hydropici verò malè se habeant, sint ut plurimum pallidi colore livido.
2. Ex tumoris specie: siquidem in gravidis tumor abdominis magis ad præcordia & sursum versus prominere, *Die Seiten aber sind hohl* / estque inæqualis, nisi, quod tamen raro, gerant gemellos; tunc enim etiam lumbi sunt distenti, & in specie tumor magis ad umbilicum & supra umbilicum exsurgit primo gestationis tempore, sicuti ultimo versus inferiora: e contra in hydropicis totum abdomen, etiam latera & lumbi, tumidi sunt, & magis inferunt acuminatum tumorem post medium gestationis tempus.
3. Si motus percipitur aliquis, nempe fœtus, graviditatis præsumptio patet.
4. Ex fluctuatione; sic nempe interdum hydropici, quando se movent & jectigant, percipiunt aliquam fluctuationem in cavitate corporis, quæ deest in graviditate. Interim tamen fluctuatio non semper hydropem abdominis comitatur: quanto enim mem-

brana peritonei ex spasmo est distensa sine fluctuatione, solent ibidem aquæ contineri.

5. Oculi in gravidis, utut ipsæ malè se habeant, ut plurimum tamen solent esse fulgidi & clari: In hydropicis verò nitor oculorum perit, ipsique oculi apparent quasi cornei, lividi, & sic porro. Vel si hydrops est siccus, oculi interdum apparent ignei seu fulgidi.
6. Porro urinæ in gravidis non sunt aquei coloris, ut in hydropem.
7. Hydrops admodum membrum genitale mulierum premit, quod non fit in gestatione fœtus.
8. In hydropem menses interdum aquosè fluunt; in gravidis non, aut rarius.

Plura signa prognostica distinctiva supra, ubi de ascite universali egimus, videri possunt. Quibus probè observatis, vix fallere potest Medicum hydrops.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: levior & minus periculosus est ascites particularis, quam universalis, & facilius curatur, modo maturè cura instituat, ne occasione retentæ colluviei aquosæ viscera interiora abdominis inficiantur, & ad sui corruptelam disponantur; tunc enim per accidens lethalis fieri potest ascites.

Ascites anasarce superveniens melioris spei habetur, quam si iste solitarius fuerit, i. e. propter tumores viscerum abdominis, v. g. hepatis aut lienis, aut propter vasa lactea & lymphatica rupta contigerit; cum prioris affectus causa continens & procatactica sæpè tollatur aut imminuatur: posterioris verò utraque difficulter admodum aut ut plurimum incurabilis existat, aut licet curatus semel, tamen subinde denuò renascitur, & talis hydrops curatus denuò renascens lethalis est, uti habet Hippocrates in *Observ. Coacis*, item Deodatus in *Valerudin.* pag. 160.

In hydropem post cachexiam & similes morbos diuturnos dejectionem nigram lethalem pronunciat Platerus lib. 13. *Obs.* pag. 670.

Hydrops ex perverso purgantium usu admodum periculosus est, quia hæc admodum inquinant massam sanguineam, uti hoc habet Poterius *Cent.* 2. *cap.* 29.

Hydrops post febrem leviolem ortus non est adeò periculosus, nec adeò curatu difficilis, quam qui à se ipso invadit.

Hippocratis *aphor.* 43. *Seç.* 6. hanc habet observationem: qui lienosi dysenteriam corripiuntur, iis dysenteriam diutius durante hydrops aut lienteria supervenit, & moriuntur. Expositionem hujus aphorismi habet Sennertus lib. 3. *Prax.* *cap.* de hydropem, quæ satis est accurata.

(Ssss 3)

Hydropi

Hydropi superveniens tussis, malum, inquit Hippocrates *Secl. 6. aphor. 35. Secl. 7. aphor. 47.* & M. A. N. C. *An. 4. & 5. Observat. 148. p. 168.*

Abscessus vel maculæ in cruribus erumpentes lethales sunt, observante etiam hoc Hippocrate in *Epidemics.*

Hydrops, qui oritur à partium urinariarum, renum, uterum, vesicæ, &c. ruptura aut exulceratione, ut plurimum lethalis est, nisi partes hæ celerius coalescant, aut urina per ulcus abdominis effluat.

Si asciticorum aqua à propinatis medicamentis copiosè & cum euphoria evacuetur, ac venter detumescat, aliqua curationis spes est; sin verò medicamenta hæc nihil aut parum evacuent, sed viscera inde irritata cum abdomine magis intumescunt, omnino desperandum erit.

Iste ascites particularis, in quo aquæ intra corpus membranosum, omentum, peritoneum, uterum &c. collectæ, cum eo ægri plures annos, cæteris paribus, sani manere possunt.

Tumores serosi artuum particulares vix, nisi aliis supervenientibus morbis, lethalitatem inferunt, utut eorum unus altero difficilius, vel ratione causæ, vel aliarum circumstantiarum, lænetur.

Tandem viscerum internorum hydrops nunquam periculo vacat, sed ut plurimum funestus existit.

### C U R A.

In cura ascitis hujus particularis attendendum est:

1. Ut aquositates collectæ evacuentur.
2. In vasis lymphaticis & lacteis factæ obstructions solvantur, vel erosiones illorum consolidentur, ut & sanguis grumulosus, si adest, maturè dissolvatur.

Prius fit per purgantia, hinc, utut rarò, sudorifera, & speciatim diuretica; omnium optimè per abdominis paracentesin, modernorum more cum acu argentea faciendam, de qua vid. Barbette in *Chirurg.* Posterius fit per salina diuretica, vel volatilia vel fixa, v. g. arcanum duplicatum Mynsichtii. Sudor vix in alio hydrope universali seu anasarca convenit, simul tamen etiam causarum antecedentium habenda est ratio, exque variz, prout sc. eadem sunt diversæ; ut plurimum tamen mucus viscidus vasa lymphatica obstruens, & lympham incrassans, incidendus, dissolvendus, & fluxilis reddendus. Ulterius promoveatur consolidatio, quæ spontè succedit, quia talia vasa cum

rore spermatico chyloso nutriuntur, sunt glutinosa, & sponte coeunt. Sed in specie, quoad hanc medendi methodum, vid. Sylvius l. 1. *Prax. cap. 17.* cum quo conf. Senhertus. Quod si vitium sanguinis congruati, aut alia ex causa collecti, morbum intulerit, per appropriata naturæ succurrendum, de quibus jam supra.

Ex diureticis  $\ominus$  genistæ, stipitum fabarum,  $\sim$   $\eta$  volatilis eminent, in specie in hydrope seu ascite particulari nitrum & omnia nitrata sunt optima, imprimis quando post febrem vel in febre ascites talis supervenit subito.

Ex sudoriferis verò volatilia quæcunque in cuncta tympanitide; præ cæteris spiritus nitri dulcis, & hinc  $\sim$  carminativus de tribus, miræ sunt efficaciz. Borellus *Cent. 4. Observ. 16.* sanguinis humani elixyre hydropicos bis curavit desperatos & conclamatos intra 3. dies  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ , qualibet vice propinando per tres vices.

Quoad externa: habuimus hæc supra in hydrope universali.

Quoad hydropem siccum pergit Lindanus: *Rarus est hic hydrops, & in eo curando observandum, quod nulla purgationes conducant, sed uno & simplici remedio, nempe nitro probè depurato, tales hydroptici curandi sunt, dando nempe quotidie solum  $\mathfrak{D}$  in vino Rhénano, ita ut quotidie  $\mathfrak{D}\mathfrak{i}$   $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$  absumatur, idque per 24. horas, nempe non simul & semel, sed partitis vicibus; & quoties aliquid bibunt,  $\mathfrak{D}\mathfrak{i}$  depuratissimi  $\mathfrak{D}\mathfrak{i}$  addi debet, & nil præterea agendum. A purgatione abstinendum; quanto enim magis expurgabis, tanto magis mox intumescunt, & lotia eo magis indies splendescunt & inflammantur, sicuti in diabete. Temperandus est sanguis nitro; hoc enim sedat sitim, temperat astum, & ciet urinam. Et quando hæc in tali hydrope post nitri usam non amplius splendet, signum est propemodum superati mali, & ager in declinatione morbi est constitutus, tuncque oportet dare bonum aliquod conditum corroborans & confortans.*

## ARTICULUS II.

De

### Hydrocephalo.

Inter hydropes particulares eminet in specie post ascitem hydrocephalus seu hydrops capitis, quando nempe colligitur aqua in sphaera capitis. Interim hydrocephalus hic ratione subjecti immediati, in quo colligitur aqua, ordinariò solet esse triplex:

1. Prima

1. Prima species est, quando aqua colligitur intra partes cutaneas & cranium.
2. Quando aqua colligitur intra cranium & ipsum cerebrum, sive sit supra sive infra meninges, in specie matrem duram.
3. Tertia species est, quando aqua colligitur in ipso cerebro, speciatim in ventriculis cerebri, nimia copia cerebrum & ipsam calvariam distendens.

Priorum hydrocephalorum exempla sunt frequentiora: rariora autem ista quæ hydrocephalum internum talem demonstrant, ut ut huius primus mentionem fecerit Vesalius *de structura Corp. Hum. lib. 1. cap. 5. de puella*, in qua cerebrum à collectis aquis omnimodò excavatum, & singulariter distentum fuit. Præter hunc simile exemplum refertur à Tulpio *lib. 1. Observ. cap. 24. de puero quinquenni*, hydrocephalo mortuo, in quo *lib. v. aquæ in capite inventæ sunt*. Cerebrum autem amissa figura globosa, induit figuram convexi fornicis, & ab exuberante aqua adeò fuit distenta medulla ipsius cerebri, ut instar membranæ crassiusculæ adhæresceret cranio, manentibus tamen semper salvis operibus naturæ; id quod fit, sive in utroque ventriculo seu latere colligantur aquæ, sive in alterutra saltem medietate cerebri, cujus exemplum videb. in Tulpio *Cent. 2. Obs. 25. Hydrocephali nempe dimidiati capitis*, in cujus cerebri altero ventriculo ultra *lib. ij. aquarum tam stricte inclusæ fuerunt*, ut altera cerebri pars planè illæsa & integra persisteret. Illustrat verò hoc Nicolaus Sieno in *Anat. capitis vitulini hydrocephalici instituta*, vid. Bartholinum *Act. Med. Hassn. Volum. I. pag. 249. & seq.* Cæterum infantes huic hydrocephalo imprimis sunt obnoxii, quia in illis ossa capitis teneriora, & quæ non sunt futuris firmiter juncta, faciliùs hiscunt, & ob mollitiem talem obsequentiora faciliùs distenduntur. Aliàs raro observatur hydrocephalus internus in adultis, in quibus propter ossium cranii firmiorem compagem futuræ discedere nequeunt, adeò ut potiùs alios morbos aquæ in cerebro collectæ inferant. Non tamen penitus desunt, vid. Hildanus *Cent. 3. Observ. 48. Sic puellam hydrocephalam notat Panarollus Pent. 5. Obs. 47. septimo ætate percurrentem*, in qua aqua partim per quasdam futuras dilatatas, partim per cranium perforatum egressa erat: Sic Piso in eleganti scripto *de colluvie serosa* notat hydrocephalum in puella 22. annorum semel atque iterum periodicè recurrentem: Zacutus Lusitanus *lib. 3. Prax. Admirand. Observ. 12. stupendum retexit hy-*

drocephalum curatum in viro, cujus caput bovis æquavit. In infantibus etiam interdum vitiatus in utero materno situs ad hydrocephalum disponit, quando nempe infantes cum capite diutius ossi pubis insident, in quo positi interdum ad aliquot septimanas observantur; quam causam urget Placentinus in *Observ.* sicut talia exempla duo observata fuerunt Uratislaviæ. Aliàs imaginatio materna quoque signando fœtum hydrocephalum infert, teste Hildano *Cent. 5. Observ. 3. uti etiam Marcellius Donatus Histor. Med. Mirabil. refert lib. 2. cap. 1.*

## C A U S Æ.

Causam proximam quod attinet: solet esse lymphæ stagnatio in præfatis locis, propter ejusdem naturalem distributionem impeditam, ex obstructione vasorum lymphaticorum nunc extra, nunc intra cranium oriunda. Adeoque hîc ad lymphæ ductus respiciendum est, ut non tantùm vult Pauli in *Anat. Anatomia Biliana pag. 85. sed ve-* maximè confirmat Heertodt in *Crocolog pag. 282. de puero*, hydrocephalo mortuo in quo vasa lymphatica cerebri partim turgida, partim rupta visa. Interdum præter aquas etiam flatus simul colligi solent; quæ cum aqua caput distendentes tumorem hydrocephali insigniter augent: sed raro oriuntur tales hydrocephali. Interdum per artem agyrtæ inducunt hydrocephalum artificiosum per insufflationem aquæ juxta nucham intra cranium & cutim capitis.

## D I A G N O S I S.

Signa hydrocephali sunt satis manifesta quia conditiones & circumstantiæ tumoris faciliè rem innuunt, ac vel visui vel tactui malum patet.

Discernendum autem imprimis: an flatus, an verò humor solus tumorem hydrocephali inferant? si enim flatulentia seculi flatus peccant, nunc solum, nunc conjunctæ cum aqua; solet adesse insignis cuti distensio, ut caput levitet pulsatum instatympani cujusdam resonet: Deinde si digito prematur tumor, aut non recedit, aut si recedat nonnihil, ad pristinum tamen statum illicò redit: si verò est ab humore solo, & quidem extra cranium collecto, cognosci potest ex cognitione tumoris; videtur enim cutis mollior, caput qualisplendescens à candelà admotà translucet percussum nullum edit sonum, & faciliè digito prementi cedit, nec statim ad statum pristinum revertitur.

Quod si verò intra cranium & cerebrum contineatur aqua, tumor non est ad tactum



Etum adeò mollis, nisi valida fiat compressio, obstantibus nempe ossibus; in specie frons ipsis quasi extrà protrusus est, palpebrarum tumor, oculi tumidi extra orbitas quasi prominere videntur, seu vix intra orbitas retinentur; simul etiam frequenter lachrymantur, concurrunt insignis omnium sensuum hebetudo, & ad somnolentiam inclinatio, cum dolore capitis tensivo.

Quibus successu temporis tam in infantibus, quam interdum in adultis, accedit capitis intumescencia ac moles reliquo corpori minus proportionata, & sæpè vix credibilis, quale exemplum Hildanus *Cent. 1. Observat. 10.* recenset. His absentibus circumstantiis, tumente nihilominus insigniter capite, suspicio est, in cerebri ventriculis radices egisse hydrocephalum.

### P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin; difficile est malum & periculosum, minus tamen periculosus est hydrocephalus externus seu supra cranium, & faciliè curatur. Internus verò, seu intra cerebrum, periculosus est, & plerumque malum incurabile, quia superveniente lethargo, aut apoplexia, aliisque gravissimis affectibus, ægri moriuntur. Intra cranium & cerebrum collectæ aquæ subinde, utut rarò & difficulter, curari solent.

### C U R A.

#### In Cura

1. Ante omnia aquæ sunt evacuandæ.
2. Caput ac cerebrum aromaticis volatilibus appropriatis roborandum.

Quoad evacuantia: hæc sunt vel interna, sensibilibus id exhaurientia; vel externa, insensibilibus discutientia; vel media chirurgica, secta cute humori vias patefacientia.

Interna ergo, quæ evacuant, sunt omnia hydragoga dicta, in hydrope quocunque usitata, quæ pro robore subjecti patientis determinanda, & præsertim in infantibus, in quibus saltim mitiora & temperata usurpantur: e. g. Mercur. dulcis gr. vj. cum syrupo rosarum solutivo aut syrupo de Rhabbaro aut spina cervina, aut mauna, cui tantillum succi & syrupi ireos nostratis admistum est; item prodest blandum infusum & syrupus ex mediano cortice sambuci; sicuti adultis generosiora laxativa, & eadem, quæ in ascite in usu sunt, conveniunt, v. g. elaterium, vel post hoc succus radicis ireos recens, &c. Clysteres etiam tam infantibus quam adultis mirè conducunt: sed ii sint acres & fortiter stimulant, v. g. ex radice bryoniz, ireos, soldanella, gratiola, cortice sambuci, & similibus. Sic D. Michaëlis aliquando famulum cujusdam mercatoris hujus loci hydrocephalo laborantem cly-

matibus factis ex fortiter stimulantibus, & aquas potenter evacuantibus, restituit. Laboraverat autem antea hydrope in partibus inferioribus, quo soluto tumor quasi ad caput raptus fuit, ita ut non tantum cutim valde distenderit, sed & oculos ex cavernulis foras protruderet, quin & organa aliorum sensuum laderet, & idem bruti ad instar in lecto jaceret; sed jussu D. Michaëlis clyisma sequens applicabatur:

℞. HB. soldanell.  
gratiol.  
fol. ebuli  
asar. ā. Mß.  
fol. sambuc.  
genist.  
Persicor. ā. p. ij.  
cortic. inter. samb.  
frangul. ā. ʒß.  
rad. ireos nostrat.  
bryon.  
esula ā. ʒiij.  
pulp. colocynth. ʒj.

In urina pueri coquebatur; quo applicato, factis simul aliis faciendis, sanitati restitutus fuit.

In infantibus Clysteres blandiores injicendi sunt. Cum his simul internè vel ℞i ad guttas x. commodè propinatur pro stimulanda urina, aut spiritus ψi volatilis, & quæcunque volatilia ex tartaro propter vim diureticam & penetrantem ad promovendum urinæ fluxum commodè misceri possunt; sicuti etiam spiritus Paracelsi ad Hydrocephalum ex tartaro, vitriolo & radice vince-toxici, tanquam universale remedium egregius est in Hydrocephalo, quem egregiè commendat Poterius *Cent. 1. Observat. 2. cap. 13.*

Cæterum cum his internis simul usurpanda sunt externa, eaque primariò discutientia, & tumorem insensibilibus resolutentia, vel sensibilibus evacuantia. Inter illa sunt cataplasmata & fomenta ex aromaticis discutientibus, ex chamomilla, meliloto, artemisia, stæchade Arabica, calaminta montana, roremarino, absinthio, origano, pulegio, cumino, serpillio & similibus: quibus farina fabarum, lupinorum, stercus columbinum, caprillum, semen anisi & cumini, ac similia, commodè addi possunt.

Conveniunt etiam olea discutientia, ut ʒo chamomillæ, anethinum, laurinum, & similia. Hinc usu expertum est præstans ʒo seu linimentum Foresti *lib. 3. Chirurg. Observat. 6.*

℞. ʒo chamom. vulg. ʒiv.  
ʒis pulveris. ʒj.

Probd

Probè invicem mixtis, & digestionem ungitis, constituunt Linimentum.

Cui si addantur aliquot guttæ vel ʒj. ʒss destillati cumini, vel succini; vel alius ungentis addatur balsamus sulphuris terebinthinatus aut juniperinus, erit unguentum eò penetrantius. Imo nullum est dubium, quin ipsum balsamum sulphuris vulgare terebinthinatum, aut hoc nobilius, anisatum, blandâ manu illitum, potentius sit hydrocephali discussivum. Avicennæ & Roderici à Castro remedium sunt cochleæ recentes in decocto quodam cephalico, e.g. stachados Arabicæ, calaminthæ montanæ, &c. contusæ, & in forma cataplasmatidis capiti applicatæ; quod & ipsum remedium modernorum experientiâ compertum est, & in seroti tumore aliàs mirabile; item cataplasma ex cochleis contusis cum pulvere stercoris caprilli & seminis carvi. Conf. etiam M. A. N. C. *Ann. 4. Append. pag. 46.* Tandem quoque fons ex lixivio calcis vivæ egregium admodum est in discutiendo hydrocephalo, quibuscunque tumoribus serosis in partibus externis, quo feliciter in puerorum hydrocephalo Aquapendens usus fuit. Quin & huic aquæ calcis vivæ quædam aromatica cephalica, ut rosmarinus, &c. infundantur, & fomentum magis appropriatum reddi potest. Denique essentia rosmarini, salviæ, hyperici, pro externo litu crebrius repetendo; ad discutiendas aquas à quibusdam adhibentur. Forestus *in loco cit.* pueris recens natis hydrocephalo correptis sola olei hyperici continuâ inunctione, addito pulvere myrtillorum; auxilium attulit.

Hiscæ insensibiliter discutientibus, & similibus remediis irritis, ad sectionem chirurgicam, ut sensibilibus evacuentur aquæ, accedendum erit; idque in specie in hydrocephalo externo: id quod præstat imprimis sectio, quæ fit in loco tumoris maxime eminente, nunc per figuram crucis, nunc literæ V, nunc literæ H, de qua variè hinc inde in chirurgis, in specie Hildano *Cent. 3. Observat. 17.* annotata leguntur. In interno verò, qui cerebri ventriculos occupat, & hinc extrorsum plùs minùs fertur, periculosissima est, teste Hildano ubi observat, & experimentis testatur, non semper sine periculo istam hydrocephali sectionem institui, quia metus gangrænæ, aut etiam mors superveniat. Qui verò est intra cranium & cerebrum, non nisi cautè, & perquam circumspectâ sectione, tractandus venit, observando cautelam, ne unicâ vice nimium exauriatur. Conf. hic Marcus Aurelius Severinus *in lib. de Efficacia Medicina.*

Tom. II.

## ARTICULUS III.

De

### Hydrope Pectoris.

**P**Ræter caput, interdum etiam, sed rarò, hydrope pectoris observatur, quando nempe in cavo pectoris fluctuat aqua, vel lymphæ plùs minùs copiosa, eaque hydropem insert. Hujus exempla egregia & curiosa observavit Piso *Tract. de colluvie serosa: Conferatur etiam Willitius Pharm. Ration. Volum. 2. Sect. 1. cap. 13.*

### CAUSÆ.

Hydropis hujus pectoris particularis causæ sunt eadem cum aliis hydropis speciebus: Nempe nunc vitium est in valis lymphaticis & lacteis, per quæ, impedito lymphæ motu, hujus ex valis ruptis ac exesibus effusio in thoracem, & hinc collectio, supervenit; unde ex hydatidibus in pulmone observatis hydrope pectoris natus fuit, Vid. Bartholinus *Cent. 2. Hist. 66.* Nam & hic lactea pariter & lymphatica pulmonum, subinde primariò consideranda esse, non saltem confirmatur à Bartholino *Cent. 3. Epist. pag. 327.* sed etiam imprimis à Willitio *Pharm. Ration. Volum. 2. pagin. 261.* Vel vitium est in massa sanguinea, quando v. g. simul cum hydrope universali, vel cum hydrope omnium partium inferiorum, simul etiam conjungitur superveniens hydrope pectoris; quin etiam ad majorem lymphæ copiam & hydropis incrementum multum conferat habitus corporis magis vel minus cachecticus, ut & vitium renum, & aliæ causæ in hydrope universali observabiles, nullum est dubium. Curiosa & singularis observatio hoc in puncto est Meatz *in suis Historiis Medicis Rarioribus pag. 153.* Hydropis nempe pectoris ex discissa hydrocele oborti. Sanè jam olim Laurentius *in sua Anatome* observat singularem quendam consensum pulmonum & pectoris cum testibus, aded ut ipse notaverit à tussi diuturna & vehementi ortam hydrocelen; unde hanc controversiam de consensu pulmonum & testium decidit *lib. 7. Quæst. 5. pag. 532.* Aqua hæc in hydrope pectoris nunc in utraque thoracis parte, nunc, utut rariùs, in altera ejus medietate hære observatur.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa hydropis pectoris: percipitur in hoc ut plurimum in cavo thoracis dolor gravans ob materiæ aquosæ abundantiam, & plerumque illud cum empyemate commune

(T t t)

ne si-

ne signum, nempe aquæ fluctuantis tonitus obscurus in imo pectoris, dum æger corpus movet: Quæ tamen materia fluctuans in hoc à pure distinguitur: quod hoc inflammatio præcedat, illam verò non; hoc quoque brevius, illa diutius ut plurimum, observatur. Cum empyemate hoc quoque commune hydrops pectoris habet, quod ob epithematum, aut cataplasmatum calidorum applicatione angustia pectoris intendatur, uti Willisius *Pharm. Rat. Part. 2. pag. 335.* confirmat; quæ tamen angustia hydropis ab empyematis per signa jam recensita distingui possunt.

Tussis est sicca, cum nil excerni queat, respiratio difficilis & frequens; subinde urget orthopnoea (quod signum pathognomonicum cum Pisone *de morbis ex colluvie serosa lib. 1. Sect. 3. cap. 7.* Riverius *Praxi lib. 7. cap. 5.* refert) ita ut ægri non possint decumbendo respirare, & imprimis, vesperti ac noctu, ut & primo morbi tempore intendi, post mediam verò noctem denuò remitti observatur, vid. *Act. Med. Hassniens. Vol. 2. pag. 298.* quin etiam, dum in somnum inclinant, subitaneo quasi terrore correpti denuò evigilant.

Interim tumor pedum supervenit, & si tumor cessat, mors: Appetitus posternitur, palpitation cordis supervenit, & imprimis, quando corpus anteriora versus movetur, angustias insignes præcordiorum percipiunt, subinde quoque febricula accedit.

Tandem his interdum jungitur unius vel alterius brachii dolor atque debilitas seu resolutio, cujus phænomeni causas idem Pison. *l. 4. pag. 293. & 297.* explicare conatur.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Hydrops pectoris & pulmonum, quia organa vitalia & respiratoria immediatè afficit, periculosior est ascite; imò brevius suffocat, præprimis cum pulmones cordis agglutinet, & polypum cordis vel ut causam, vel ut productum morbosum, comitem habeat. Hinc grave &

periculosum malum est, & raro felix & fausti ominis, quin sæpius ad mortem deducit ægros.

Et licet idem affectus, sive medicamentis quibusdam curatus fuerit, sive post apertionem thoracis æger levamen senserit, non tamen est adeo diuturna alleviatio, quin recidivante malo ægri suffocati intereant: vid. Tulpius *lib. 2. Observat. 16.* Riverius *Cent. 1. Observat. 88.* & Salmuth *Cent. 2. Observat. 4. & 16.* nisi saltem laceratis valis lymphaticis minoribus, ac visceribus integris contingat, & materia peccans per ulcus thoracis sensim effluat, qualem observationem Willisius *Pharm. Ration. P. 2. Sect. 1. cap. 13.* perhibet.

Alit magis lethalis est hydrops pectoris, qui anasarca aut asciti supervenit.

### C U R A.

In cura ante omnia evacuanda & resolvenda sunt aquæ, & firmanda seu roboranda partes interiores pectoris.

Pro evacuatione conveniunt eadem, quæ in ascite, tam pharmaceutica quam chirurgica. Quoad pharmaceutica evacuatur aqua per purgantia, diuretica, & imprimis persudorifera. Pro scopo purgante conveniunt ea, quæ in ascite universali & particulari fuerunt laudata; imprimis succus bryoniae, & hinc succus ireos nostratis; vid. Hartmannus *in Prax. Chim.* Riverius cum succo bryonia curavit aliquot hydropes pectoris, nec non calomelano suo, vid. *Cent. 4. Observat. 3. Conf. & Willius c. 1. pag. 269.* Possunt etiam dictæ aquæ per sudorem aut urinam evacuati; sic enim beneficio decocti sudoriferi in sene hydropem pectoris curavit Riverius *Cent. 4. Obs. 71.*

Quoad media chirurgica: omnium optima est paracentesis thoracis, quæ maximè salutaris, simillima isti, quæ debet institui pro evacuatione empyematis: Et hæc quidem operatio est facilis, tuta, & sine ullo periculo, de qua vid. Willisii *Pharm. Ration. Volum. 2. pag. 163.*





## SECTIO XXII.

De

## SANGUINIS MOTU AD CORPORIS CIRCUMFERENTIAM, LÆSO.

IN praxi observatur sudor vel excedens, vel depravatus, rarò deficiens.

Phlegm. Oli ʒß. vel Clyff. ʒij. l. ʒß.

Syr. rubi Idai ʒj. ad ʒiß.

M. D. S.

Stärk-Träncklein Löschweise.

## CAPUT I.

De

## Sudore Nimio.

EXcedens sudor frequens solet esse scorbuticis, qui copioso sudore tantum non distillant, interdum pariter ac noctu: Hinc etiam phthysici confirmati tempore nocturno sudores copiosissimos solent effundere. Rationem non incongruam suggerit Willis in *Pharm. Ration.* quod nempe tales sudores excessivi eveniant propter deficientem assimilationem nutrimenti assumpti & chyli cum massa sanguinea, ita ut tales sudores sint colliquativi, & per quos succus nutritivus, qui assimilari nequit, foras emittitur.

. C U R A.

Hinc in cura respiciendum imprimis ad corrigendam sanguinis crasim: Id quod fit in scorbuticis per usum Martialium, & salium volatilium oleosorum, nempe partitis vicibus, tandem per usum lactis & lacticianorum. In phthysicis imprimis lac ad tales sudores compescendos conveniens est; sicut phthysicorum sudores & inde natas debilitates palliativè sistit antihecticum Poterii cum laudano opiato, vespertino tempore assumptum: Convenit etiam tinctura antiphthysica, tinctura solis. In scorbuticis:

℞. sol. ʒi s. c. f. pom. ʒij.

~ cochlear. ʒj.

M. S.

Scorbutische Tinctur.

Post sudorem nimium in morbis acutis & malignis:

℞. Aqua ceras. nigr. ʒiv.

## CAPUT II.

De

## Sudore Depravato.

SUDor depravatus fit in specie ex ratione fieri ejusque contentorum, quæ prout plus vel minus à statu naturali deficiunt, ita etiam plus vel minus sudores depravatos reddunt; hinc pro varietate depravationis sudoris varia etiam subinde cura instituenda venit.


## CAPUT III.

De

## Sudore Deficiente.

DEFiciens sudor contingere solet, vel vitio pororum, vel vitio sanguinis ejusque feri: vitio pororum, dum hi arctè plus minus clausi, infarcti aut obstructi sunt, unde lotiones corporis, frictiones rerum calidarum, laterum calidorum applicationes, &c. sudorem promonent. Vitio sanguinis verò deficit sudor, quando tam arctè substantia terosa cum massa sanguinea unita est, ut conveniens feri secretio per glandulas fieri nequeat: id quod interdum in febribus continuis, speciatim malignis, usu venire solet. In tali casu remediis sudores moventibus, tam positivè, ut alcalibus fixis vel volatilibus, quam privativè talibus, ut sunt lapilli cancrorum, cornu cervi, &c. Simul acida blanda addenda erunt, in specie acetum; hujus enim medio deficiens sudor commodè potest excludi.





# LIBRI SECUNDI

## SECTIO I.

De

### SPIRITUUM ANIMALIUM GENERATIONE AC DISTRIBUTIONE LÆSA in genere, in- deque SENSUS & MOTUS LÆSIONIBUS.



Quod attinet spirituum animalium generationem vitiatam; tria sunt vitia, quæ in Praxi occurrunt:

1. Quando deficient, & nimis pauci sunt, unde hebetudo sensuum, imbecillitas corporis, defectus in motu, &c. apparent; uti videre est v.g. in senibus, aut in iis, qui gravi ex morbo sensum convalescunt.
2. Quando abundant.
3. Quando depravantur, & plus minus à debita crasi degenerant.

Deficiunt hi spiritus, vel propter sui consumptionem, labore, Venere, studiis: quibus omnibus nimis agitati in cerebro adeò subtilifantur, ut promptissimè dissipabiles existant; vel propter deficientem debitam sanguinis spiritualescentiam, in constitutione præsertim ejus cacochymico-cachectica, ac primariò ex vitio digestionis primæ, dum non ritè chylus spiritualescit in primis viis: quò faciunt inedia, ac alimenta mali succi & minus spiritualescentia & similia; vel vitio cerebri & ejusdem corticis, inepti ad separationem spirituum vitalium ex sanguine propter vitium conformationis & læsionem cerebri, contusionem aut concussionem in casu ab alto, meatuum obstructionem, & similia. In quibus casibus poruli ac insensiles meatus cerebri aut subsidentes, aut compressi, aut omninò aboliti, & sanguinis debitum circulum ac spirituum animalium ex eo separationem impediunt.

Interim defectus hic spirituum facilè & optimè curatur per medicamenta spirituosissima assumpta, ob id analeptica dicta, ut vinum generosum, spiritum liliorum convallium, ceraforum nigrorum, aquam apoplecticam, quintam essentiam Matthioli, essentiam ambræ cum spiritu rosarum paratam, spiritum liliorum convallium cum sale volati-

li cornu cervi circulatum, aut sale volatili succini mistum, spiritus volatiles, olea destillata, aut ex his paratos spiritus vel salia volatilia oleosa, aliasque aquas spirituosas aromaticas & similia, & quæ alias in lipothymis adhiberi solent. Sicut si vitium est in conformatione cerebri & læsione externa, curatà hac externa læsione, spontè defectus spirituum curatur.

Secundum vitium spirituum animalium est, quando abundant, & hinc impetum quendam extraordinarium actionibus animalibus, & ex nimia eorum agilitate insignem promptitudinem actionum, tam insensibus quàm motibus, conciliant. Id quod videmus in iis, qui alimenta laudabiliora usurpant, potuique vini generosi moderatè indulgent, ut agiliores & hilariores fiant, accedente simul blando corporis motu, & vitâ curis vacuâ.

Abundantia hæc spirituum rarò curationi offertur, quia spontè vel per inediam, aut denique per motum vehementiorem corporis aut animæ in studiis severioribus cessat.

Denique tertiò vitiosè generantur spiritus animales, quando depravantur iidem plus minus in sua crasi, unde motus eorundem variæ exorbitantiæ & anomalix, unde crasseos vitiatæ ratione iidem vel stupidi vel torpidi, vel fixi, imò quasi immobiles, vel econtrà nimis agiles vel confusè & inordinatè mobiles, minus subtiles, plus minus acres & intemperati, generantur, aut alio vix intelligibili modo vitiosi & depravati. Vitia hæc, pro specialium hinc dependentium affectuum ratione, diversimodè sunt curabilia, quorum cura in sequentibus patebit.

CA.

## CAPUT I.

De

### Facultatis Animalis Affectibus in genere.

**A**Ntequam autem in specie affectus facultatis animalis consideremus, notandum,

I. Torum systema nervosum cerebri, cerebelli, spinalis medullæ, nervorum inde natorum, & quarumcunque partium nervosarum, membranarum, tandem & ligamentorum, non nisi ex fibris, nunc delicatissimis, nunc minus delicatis, sed paulò firmioribus, constare. Quæ fibræ in naturali statu tensæ quidem sunt, sed simul continuum quasi nixum, aut impetum aut vim quasi elasticam obtinent ad motum, quæ vis, modò impetu interno spirituum animalium roboretur, motum animale quemvis, tam spontaneum quàm naturalem, infert, sicuti tensæ hæ fibræ, si ab objecto quodam externo commoveantur, constituunt sensum externum, ita ut spirituum diversè constitutorum diversi motus, & fibrarum nervearum diversa textura & constitutio, basin constituat omnium phænomenorum, quæ aliàs facultatis animalis nomine veniunt, & totam sic dictam animam sensitivam absolvant.

II. Cerebrum & nervos singularem quasi consensum habere ad extra cum motu lunæ. cum observationibus constet, secundum phasæ lunæ affectus cerebri, nervorum, & partium nervosarum, in sensu ac motu consistentes, plus minus exacerbari. Unde tales secundum lunæ stationes mutabiles affectus non nisi partibus nerveis contingunt, & propriè ephemerides ægrorum dicuntur, ubi ex læsione partium fibrosarum remanet talis peculiaris sensus in parte, ut ægri percipiant mutationes temporum sanis non perceptibiles.

III. Mirabilem consensum habere cerebrum & partes eidem connexas cum visceribus abdominis, in specie cum ventriculo, ita ut quoque propter hanc continuam conspirationem sæpè contingat, ut origines morborum subinde invicem confundantur, cerebrique morbi causam proximam ac fomitem habeant in ventriculo & primis viis, sicut contra stomachi affectus in cerebro fomitem obtinent: v. g. ex læso cerebro superveniunt subinde vomitus, & ex imminente vomitu vertigo, &c. Hæc ipsa Helmontium admodum turbavit, hinc observata ejus practica & res facti in *Tract. Duumviratus*, *Jus Duumviratus*, *Sedes anima*, *Demens idea*, *Ignota actio regiminis*, &c. sunt optima; sed theoriæ & reflexiones speculativæ nil valent.

Consensus interim notissimus est, ut monitum. Similiter ex imaginatione, v. gr. ex auditu rei horridæ supervenit nausea, subversio stomachi, appetitus dejectus, & quæ sunt alia symptomata, simpliciter ex cerebro, & spiritibus in cerebro, certo motu motis, enata. Imaginationis læsio in picantibus, in melancholicis hypochondriacis; item motus convulsi partium externarum ex affecto abdomine, e. g. in hysteris, nota sunt. Unde etiam remedia adhuc quædam in stomacho facultatem animale afficiunt, v. g. hyosciami semen, opium &c. vid. Helmont. *Tr. Jus Duumviratus* §. 22.

IV. Spiritus animales ceu materiam admodum subtilem conditiones etiam subire certo modo materiales: unde pro varietate suæ constitutionis, & inde natarum proprietatum, variant etiam eorum attributa, & consequenter nunc plus nunc minus appropriati, amici vel hostiles nervis totique eorum systemati in medulla cerebri & cerebelli, itemque reliquis fibris per totum corpus dispersis, existunt. Unde pro variis constitutionibus & texturis, materialiter ex textura sanguinis enatis, etiam varia pathemata secundum sensus internos & motus corporis, secundum vigilias & somnum erunt derivanda.

## CAPUT II.

De

### Facultatis Animalis Affectibus in specie,

seu

### Morbis Capitis.

**I**N specie quod affectus facultatis animalis, attinet: de iis optimè agit Willisius *Tract. de anima Brutor. Part. 2.* Spiritus nempe vitales, dum per corticalem cerebri substantiam scaturiunt, ac transudant in cerebri medullam fibrosam, ulteriùs derivantur in nervos, & inde in universum corpus, ac ita motu suo extra cerebrum vim motivam distribuunt in organa sensuum, inde in naturali subtilitate ordinatè moti majorem vim conciliando fibris eas sic disponunt, ut fortius tensæ faciliè mobiles reddantur, & ab objectis externis recipiant impressiones, per quas fit motus. Uti ergo, dum hoc modo continuò influunt animantibus spiritus animales organa sensuum, ut promptè excipiant objectorum externorum impressiones, & sic sensuum passionibus sustinent, ita promptè varios motus excitant & obeunt, quo in statu animal vigilare dicitur; cujus privatio est somnus: quæ duo necessaria

(T t t t 3)

cessaria



cessaria vicissitudine se mutuo insequuntur naturaliter. Vicissitudo hæc mutua si tollatur, ita ut somnus vel penitus deficiat, vel saltem paucior sit, & continuæ sint vigiliæ, vitium hoc vulgo vocatur Agrypnia Græcis, Latinis pervigilium, seu vigiliæ nimia.

## ARTICULUS I.

De

### *Vigiliis Nimis.*

#### C A U S Æ.

**N**imiarum vigiliarum causa proxima est motus spirituum animalium aut nimius aut saltem continuatus in organa machinæ corporeæ, vel interna vel externa, cujus influxus, ut vocant, seu motus ratione promptè sensilium objectorum impressiones recipiunt, & postmodum pro ratione motionis in organo impressæ similiter ipsi in cerebro commoti varias animæ rationali discursuum occasiones subministrant. Ubi verò in sensibus externis nil percipitur, necessariò animal dormit, adeoque saltem ratione externorum sensuum, & hinc consequenter sensus communis, vigiliæ vel somnus oriuntur.

Causa verò perpetui aut nimii spirituum influxus seu remota est duplex:

1. Objectum sensile externum, fortius organon quoddam, tam intra quàm extra corpus, afficiens; adeoque tunc per modum symptomatis saltem se habent vigiliæ.
2. Est ipsum vitium morbosum aut spirituum animalium aut cerebri, quo iidem mobiliiores fiunt.

Spirituum animalium vitium est, quando quavis ex causa mobiliiores & quasi magis elastici redduntur iidem. Cerebri vitium, cujus occasione isti in continuo motu conservantur, est, aut pororum ejus nimia apertio atque hiatus ex aliquali ejus ariditate seu siccitate, commodique nutrimenti defectu, unde etiam cerebri poris patulis spiritus in continuo sunt motu, unde tandem urgentur vigiliæ; aut irritatio quædam ipsarum fibrarum cerebri aut membranarum ejus propter nutrimentum acrius aut salius, aut propter serum actius, undecunque cerebro communicatum.

Primam causam quod attinet: quando objectum quoddam fortius organa sensuum afficit, necessariò spiritus agitantur & fortius moventur, quæ motiones secundum nervi ductum ad cerebrum usque continuatæ ceteros spiritus in cerebro similiter movent, unde necessariò vigilat animal. Hinc videmus, quod clamor fortior, dolor quicunque, tam externus, v.g. capitis, quàm internus, v.g.

colicus, nephriticus aut iliacus, &c. in sensoriiis externis spiritus in motus inordinatos cogant, somnum tollant, & vigiliæ continuas inducant: item tussis, quatenus concutitur subinde totum pectus & totum nervosum systema, necessariò in vigiliæ deducit. Quin & dyspnœia, orthopnœia, &c. ordinariò vigiliæ infert, sed saltem symptomaticas, ob sensibilem illam molestiam, quam in pulmonibus & præcordiis excitar.

Præterea objectum ~ afficiens sæpius in primis viis investigandum. Sanè in omnibus agrypniis pertinacioribus vel vitium est in spiritibus animalibus & cerebro, vel per consensum est, ex vitio primarum viarum, digestionis; plus minus vitiatæ ratione, & undecunque præternaturalis, quæ oritur vel ex assumptis vitiosis, vel malè digestis, vel vitiosè alteratis, vel perversè distributis, quæ irritando partes sensiles in illis locis, etiam nobis non sentientibus agrypnias inferunt: v.g. qui largius cœnant, insomnes noctes ducunt; quibus alvus clausa est nimis, somnum interruptum habent. Agrypnia infantum, item pavores in somno, ex primis viis, præsertim circa stomachum, radicem habent.

Quoad secundam causam: est ipsum vitium spirituum animalium varium, à quo iidem ad concitiores & pertinaciores disponuntur motus: quod fit in junioribus & vegetioribus subjectis, laudabili & generoso victu & potu, moderatius tamen, utentibus, quibus spiritus nimis mobiles ac nimis agiles generantur, in his namque subinde vigiliæ solent urgere. Pertinet huc totius cerebri fervor & incalescentia in febribus ardentibus & similibus, cujus occasione velocius spiritus moti necessariò inducunt pertinaces vigiliæ; unde etiam in ætate, item in juventute, & ætate virili, in genere in choleris, promptiores sunt agrypnia, somnique minus profundi. Hinc in ætate ab aère æstivo & fervidiore, item sub climate æstuante sanguis, & ab hoc spiritus animales quasi commoventur, hinc vigiliæ excitantur. In specie miasmata peregrina & maligna, aut spiritus animales irritando & corrumendo, & inordinatè agitando, aut cerebrum ejusvè membranas præternaturali sensu afficiendo, pertinaces vigiliæ inducunt in febribus malignis, quas deliria & variæ phreneses excipiunt; quia spiritibus animalibus vinosis quasi minus sociabilia sunt hæc miasmata; unde eosdem turbant. Similia miasmata spiritus exagitantia & in herbæ Théæ ac Coffeæ potione quoque concipere convenit. Quò etiam facit usus carniū ferinarum, in quodam vigiliæ movens; vid. Rhodius *Cent. . Obs.* 35. Ad hunc causarum fontem pertinet etiam ipsa anima rationalis, curis intensis vel meditationibus & similibus occupata. Cum enim hæc ipsa utatur, ceu instru-

instrumento, ministerio spirituum animalium, quorum motum graves curæ aut anxie meditationes intensiorem reddunt, necessario vigilias nimias inferunt. Pertinent huc tandem animi affectus, ut amor, ira, insignis terror, pavor, metus in gradu intenso, &c. in quibus ob velociores & inordinatos motus nimis coacti spiritus haud facile cessant, quin continuato motu agrypnias inducant.

Quod verò attinet cerebri vitia: hoc vigiliarum causa evadit, si meatus ejus patuli magis & laxiores existunt, adeoque spiritibus animalibus nulla repagula imponuntur. In quo casu hoc peculiare observatur, quod ejusmodi ægri nullum torporem, nullam ad somnum propensionem, nullamque aliam molestiam inde percipiant; cujus causa aliqualis cerebri & fibrarum medullæ ariditas, & squallor, ex defectu humoris nutritii (vel quatenus hic non generatur, vel quatenus absumitur) cerebrum humectantis, & sub nutritione poros angustantis, ratione cujus inane quoddam tractibus illis medullaribus contingit; hinc inedia diuturnior pervigilium inducit, de quo vid. Marcus Marci *Phil. Veterum Rest.* p. 392. Nempe alimentis, imprimis temperatis, roridis, humectatur cerebrum, & blandè irroratur, ipsique adeo spiritus quasi aquosiores facti placidiore motu somnum inferunt; sed sub inedia, cerebro minus humectato, sed magis arido & poroso facto, ipsique spiritus animales subtiliores reddituri vigilias inducunt. Et hoc modo intelligenda est illa locutio plebeja, *der Patient isst nichts / drum kan er nicht schlaffen.* Faciunt huc etiam alimenta acriora & spirituosiora assumpta, & oleosa volatilia, tam aromata, ut piperata, cinnamomum, &c. quam alia, ut alliata, cepæ, cruce, &c. à talibus enim spiritus animales fiunt insigniter volatiles, acuti & quasi acres, unde ex velociori motu irritatum quodammodo cerebrum, & genus nervosum alteratum, vigilias inducit. Hinc Venus nimia, abusivè instituta, causat vigilias nimias, partim quatenus eâ spiritus animales insigniter commoventur, partim quatenus Venus exhaurit rorem nutritium cerebri ac partium spermaticarum nutritioni dicatarum. Quò etiam facit agrypnia à sudore nimio & lienteria, item ab intempestivo purgantis usu, dum quidam sub fervore caniculari ex haustu purgantis factus fuit agrypnus per tres septimanas, vid. *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 185. pag. 346.* & tabaci abusu; dum quidam ex nimio abusu tabaci inciderit in agrypniam septendecim dierum. Equidem tabacum per se est narcoticum, interim ex nimio usu prævalet sal ejus volatile acre, quod salivam excitat, & simul rorem corporis chylosum evacuat, cerebrumque ita porosius reddit; conf. *Miscell. Acad. Nat. Cur. loc. alleg.* In specie senibus impri-

mis frequens symptoma est agrypnia, idque non tam ex spirituum vitio, quam partim cerebri textura alterata, partim digestionis primæ vitio. Nempe cerebri pori, nutritione in senibus nonnihil naturaliter deficiente, nimis aperti ac nimis patuli liberrimum spiritibus com meatum undique continuo permittunt, quorum placidâ quidem, sed continuatâ motione, somnus deficit. Quoad digestionis primæ vitium verò, non saltem circa primas vias inseniles molestiæ spiritus turbant, dum minus commodè ea procedit, sed etiam deficientis chyli nutritivi causa, cerebrum partesque nervæ aridiores ac sicciores fierè redduntur: quare etiam his calefacientia, v.g. vinum, aliaque spirituosiora, somnum conciliant, ventriculi digestionem juvando; minime verò humectantia & refrigerantia communiter dicta. Modò etiam agrypniam infert succi chylosi acrimonia, qualem scorbutus interdum inducere solet: quo etiam spectat, quæ de Théè & Coffèe supra adducta. Accedit hic senum ad rem attentio; senum enim continua sedulitas, & continuæ curæ circa rem familiarem, quibus senilis ætas est exposita, calcar addunt spirituum animalium contumaci & magis continuo motui, unde vigilias.

Denique melancholici, maniacy & similes, præ aliis molestissima patiuntur pervigilia, ita ut quidam melancholicus per quatuordecim menses fuerit vigil & insomnis, & tales melancholici, utut etiam per aliquot dies, imò menses, in continuis sint vigiliis, continuato cursu hoc malum sine virium debilitate perferunt; ac quidem multiplici ex fonte: Nam præter phantasmatum melancholici continuatam speculationem supra insinuatam, eorum massa sanguinea acrior, & vitio digestionis primæ acidior esse videtur, unde spiritus animales & ipsi minus volatiles degenerant à debita crassi, & actiores & asperiores, quodammodò acidiores & fixiores generantur, qui fibras cerebri medullares impetuosius vellunt, quæ commotæ motum novum & extraordinarium ipsis spiritibus denuò imprimunt. Unde ex pertinaci spirituum per eosdem poros motu, præter alia pathemata continuæ oriuntur vigilias, quæ & camphorâ curantur: in quo continuo motu spiritus animales ne fortissimis etiam opiatum auscultant, & somnum capiunt. Interim meticulositas & meditatio suum penum huc conferunt.

#### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica per se sunt nota; æger enim, si non dormit, satis manifestat se vigilare.

Præ ceteris tamen cognoscendæ causæ vigilias, quæ sunt faciles, quando æger fateatur se affligi curis, affectibus indulgere. In febri-

febris ardentibus & malignis facile patet, unde sint vigilie.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Vigilie nimie non sunt contemnendae, cum necessario omnes vigilie notabilem virium debilitatem inferant, quae in somno reficiuntur, ac praesertim non raro in febribus acutis deliria ac motus convulsivos post se trahunt. Hinc Hippocrates *Secl. 7. Aphor. 18.* à vigiliis convulsio aut delirium malum pronunciat.

Deinde vigilie in ætate consistente aut in sexu muliebri plus nocent, quam in ætate juvenili aut in sexu virili.

Interim vigilie in morbis acutis diu nequeunt durare, imprimis in febribus puerperarum, juxta canonem; quod caret alternâ requie, durabile non est, sed vel ad salutem vel ad mortem terminantur. In chronicis verò morbis, speciatim in affectibus melancholicis, interdum satis diu citra noxam continuantur vigilie, v. g. in puella illa, cujus modò ex Marco Marci mentio facta fuit. Sic enim observatae sunt eadem quadraginta quinque dierum continuæ. Fernellius *Patholog. lib. 5, cap. 2.* & Schenckius *lib. 1. Observat.* refert vigilias quatuordecim mensium in mente capto.

Sed utut minus malæ sint in chronicis talibus vigilie, quam in acutis; tamen quo diuturniores, eò pejora symptomata tandem post se trahunt, ac nonnunquam in delirium & fatuitatem terminantur & stupidos reddunt, ut experientia testatur: sic Panarolus *Pent. 5. Observat. 40.* refert puerum biennem sex mentes insomnem, postea fatuum redditum: aliquibus tamen minus exitiosæ existunt; vid. *M. A. N. C. Ann. 3. Observat. 185.*

### C U R A.

In cura vigiliarum agrypnie causarum remotarum seu antecedentium imprimis habenda est ratio, adeoque vel

1. Objectum externum, quocunque modo systema nervosum afficiens, partes sensiles plus minus irritans, & consequenter spiritus animales in vigilias symptomáticas commovens, removendum & sistendum; aut
2. Nimia spirituum animalium agilitas & impetus blandis anodynis aut bene correctis narcoticis moderatè sistenda, iique ad motum blandiorem & torpiorem quasi disponendi; aut
3. Blandis temperatis & nutritivis, & moderatis oleosis, cerebro ipsorumque spirituum animalium dyscrasie, prospiciendum, ut spirituum acrimonia temperetur, & cerebri siccitas, hujusque meatuum amplitudo, per alimenta boni succi & humectantia

seu oleosa corrigatur; ventriculi autem digestio vitiosa, si in culpa fuerit, emendetur.

Laceffentia exteriora, quomodo removenda, ex hætenus dictis partim constat, partim in vulgus innotescit. Causæ internæ, quæ sunt vel acrimonia, vel motus sanguinis impetuosior, vel miasmata heterogenea, patet, quod universalia vulgo dicta, nempe venæ sectiones, aut purgationes, etiam digestiva, &c. in vigiliis per se nil conferant, sed vel prioris indicati tantum intuitu alicujus usus sunt, ut nempe per accidens causam occasionalem auferant: scilicet quamvis v. gr. venæ sectio interdum, ubi vigilie urgent, postulatur, sit tamen hoc propter morbum adjunctum, sive causa vigiliarum existat, sive secus: v. gr. ubi peccat acrimonia scorbutica, catharsis aut evacuatio per sudorem; ubi exæstuatio sanguinis, inflammatio dolorifica, &c. venæ sectio locum habet: vid. Forestus *lib. 10. Obs. 36.* Sic etiam refert Deodatus in *Valetud. pag. 25.* Vigilias pertinaces aliis irritis per *catharticum melanogogum* fuisse curatas, quodque per accidens tantum, nempe ventriculi cruditatibus evacuandis, vigiliis aliquid contulisse, probabile videtur.

Pro secundo verò scopo satisfaciunt medicamenta hypnotica & narcotica dicta, quæ figere solent spiritus potenter, & promptè vigilias sistunt. Hæc ipsa narcotica sunt imprimis papaverina, usitatissima jam antiquis, exque papavere inspissatus succus; aut expressione elicitus, dictus meconium, quod est nostrum opium; nicotiana, radix, folia & semen hyoscyami, mandragora ejusque radix, flores ligustri, item stramonium, ejusque semen à Bartholæo commendatum, tanquam singulare narcoticum, & quod simul hilaritatem inducat; uti & species ejus nobilior, datura Indorum dicta. Hisce etiam crocus ejusque præparata; & suo modo absinthium addenda sunt; quæ duo cum papaverinis & opiatis frequentius usurpantur; reliquorum enim usus non adeò tutus est, quemadmodum ex radicis hyoscyami esu Borellus *Cent. 4. Observat. 45.* dementia annotavit. Ex his ipsis hypnoticis varia sunt composita, & veterum & modernorum. Veteribus in usu sunt philonium Romanum, philonium Persicum, requies Nicolai, pilulæ de cynoglossa, &c. quæ tamen ipsa remedia, cum cruda narcotica recipiant, jam propemodum in desuetudinem abierunt. Loco eorundem à modernis theriaca, Mithridatum, syrupus de papavere simplex & compositus, diacodium, electuarium diascordii, ac laudana opiata infinita, & similia imprimis usurpari solent, inter quæ extractum opii cum tinctura tartari, aut per fermentationem Langelotti, aut per digestionem cum sale tartari aut aliis salibus lixivialibus; item fermentum

rum



tum narcoticum Conerdingii, excellunt. Nam ratio opium adhibetur, quin appropriatis addatur. Quibus etiam accensemus aquam hypnoticam Dorncrellii, aquam somniferam Langii, extractum & pilulas de stramonio, quæ easdem habent virtutes cum opio.

Pariter convenit essentia seu pharmacum phantasticum Bartholetti, ac laudanum sine opio sive ex fructibus daturæ Turcarum sive Indorum ejusdem, quod Bartholetus in *suo Tract. de Respirat. lib. 5. cap. 1.* describit; commendat etiam Bartholetus essentiam opii cum spiritu vitrioli volatili paratam, & spiritum lolii, quem omnium præstantissimum proclamat. Spectat huc etiam primum ens Veneris ex vitriolo cum sale Ammoniaco parandum; item sulphur vitrioli anodynum, quamvis huic posteriori nihil ejusmodi viri-um concedat Bartholetus *l. a.*

Sed de opiatorum usu in agrypnia bene observandum, quod monet Winclerus *Tr. de opio pag. 244.* nempe quod *opiata licet in vigiliis singulariter utilia sint, tamen iis nec semper, nec in omnibus utendum sit. Est enim, quando vigilia sunt instantis crisco signum, ubi ferè sunt omittenda opiata, nec natura labor impediendus. Est etiam, ubi senes diuturnis vigiliis torquentur, ubi potius analeptica conducunt, ut spiritus dia-moschi dulcis, diambra, ambra, & similia. Est tandem etiam, ubi vigilia sunt ex angustia pectoris, ex dyspnæa, in hydropè, ubi opiata vix tuto usurpantur; metus enim est, ne somno fortiori provocato suffocentur ægri. Est etiam, ubi vires exhausta sunt, spiritusque deficiunt, ubi quoque minus opiata conveniunt. Et si quando usurpanda sunt, usurpentur eadem in quantitate parva, partitis vicibus, ut rectè monet Sepralius, adeòque repetito crebrius in parva dosi eorum usu, quoniam eorum animam labefactant, & eos stupidi ingenii reddunt. In agrypniis melancholicis nihil faciunt, sed saltem temperata adhibenda sunt ex passulis, liquiritia, borragine, & similibus.*

Pro tertio scopo, ut nempe temperatis nutritivis cerebro & discrasia spirituum animalium prospiciatur, ad vigilias profunt vulgò sic dicta refrigerantia & humectantia, hinc temperata plus minus oleaginosa, & quasi lactescentia chylosa blandè nutrientia, ut lactuca, & totus lactucarum exercitus, ejusque esus: hæc ipsa enim jam à Galeni temporibus est in usu contra vigilias nimias. Videantur Zacutus-Lusitanus *lib. 1. Med. Princ. Hist. 14.* ubi refert, vigilias ex nimis meditationibus, aliis frustra adhibitis, per esum lactucarum, & per oleum nymphææ naribus inunctum, curatas fuisse; Ubi etiam refert de Galeno, quod ipsi lactuca fuerit alexipharmacum vigiliarum, &c. Item nymphæa,

Tom. II.

ejus folia & flores, imprimis externo usu, Papaver rhæas & ipsum hic convenit, item sonchi, chondrilla, flores verbasci, & plura inde parata remedia; In specie fructus seu nuclei & semina lactescentia, scilicet semina quatuor frigida majora & minora, hordeum amygdalæ dulces, pineæ, pistaciæ, nuclei perficorum, ut & ex iisdem nunc solitariis nunc cum semine papaveris & portulacæ, factæ emulsiones sunt usitata, & in specie cum semine stramonii, cujus gr. j. vel ij. addita mira faciunt, de quo supra. Hæ emulsiones humectant, temperant acrimoniam turgescentium humorum, blandè nutriunt, & successivè somnum inferunt, vid. Sylvius *Pr. pag. 222. §. 25.* Vel

*℞. Sem. 4. frig. major. ana 3j.*

*Papav. alb. 3ij.*

*Amygd. dulc. 3ij. ad 3℞.*

*c. f. q. Aqua Nymph. f. Emulsio:*  
cui adde

▽ *Cinnam. 3℞.*

*Edulcor. c. syr. Nymph. l. Papav. vel cum Rot. manus Christi perlat.*

M. D. S.

### Stärkende Ruhe-Milch.

His emulsionibus postmodum pro affectuum ratione, imprimis in acutis morbis, & alia morbis appropriata ulterius addi possunt.

Decoctum hordei factum cum papavere & radice liquiritiæ commendatur à Lindano in agrypnia propter inedia vel defectum roris nutritii humectantis cerebrum; sicuti hordeaceorum temperatum usum proficuum expertus est Borellus *Centur. 4. Observ. 89.* in agrypnia, tussi & macie, tummatim: quæcunque diæta nutritiva & quasi semilactea ad talem agrypniam est optima.

Quoad externa: ad agrypniam in genere usitata sunt vel anodyna narcotica opiata, vel blanda humectantia, nunc temporibus ac fronti, nunc manibus ac pedibus in forma pediluviorum applicanda, quamvis eorum usum Sanctorius *Meth. l. 13. cap. 2.* & Primærosius *de Error. vulgi lib. 4. cap. 45.* nullius efficaciam judicent: scilicet epithemata aut lotiones ex decoctis vegetabilium emollientium & anodynorum flor. ligustri, violarum, paralyseos, jaceæ, chamomillæ, nymphææ, herbæ lactucæ, foliorum nymphææ, solani, summitatum anethi, foliorum salicis, vitis, violariæ, corticis mandragoræ, capitum & seminis papaveris albi contusi, & similibus. Emulsiones pariter ex nucleis perficorum, semine papaveris albi, 4. frigidis majoribus & minoribus, hyoscyami, lactucæ & stramonii (quibus Hartmannus semen anthos, fœniculi & anisi addit) cum ▽ nymphææ vel alia quadam specifica vel lacte muliebri paratæ, fronti ac tem-

(Uuuu)

pori-

poribus cum linteis multiplicatis applicatæ; sicuti & linteola lacte tepido madida fronti imposita insigniter conveniunt. Hujus etiam loci sunt spongiæ cynosbati, *die Schlaffungen/* & liquor vermiculorum in his re-  
 pertorum, mense Augusto collectorum. Vermiculi hi conquassentur seu contundantur inter duos lapides, ut liquor exeat, qui colligatur in vitro & asservetur, quo liquore illinantur tempora; est enim suave & blandum hypnoticum sine omni periculo narco-  
 seos. Item sponsia somnifera ab Heurnio *Meth. lib. 2. cap. 7.* descripta, quæ humida facta vel imprægnata his succis, postmodum leni calore exsiccat, & naribus admove-  
 tur pro conciliando somno. Hinc fiunt in-  
 unctiones ex medulla crurum vituli & cer-  
 vi recenti, quæ temporibus aliquoties tem-  
 pore somni illitæ blandum somnum inducunt;  
 vel accipiat axungia ex cruribus bovinis  
 elixando in aqua simplici elicita, quæ sepa-  
 rata asservetur in vitro, & radiis solaribus  
 vel alii blando calori exponatur, ut depure-  
 tur, & post temporibus illinatur. Item sua-  
 vem inter somnum pinguedo lucii piscis, vel  
 leporis, oleum nymphæ, anethinum, pa-  
 paveris albi, nucis moschatæ expressum,  
 hyoscyami, nucleorum persicorum, & simi-  
 lia. Quod etiam pertinet unguentum popu-  
 leum recens, de alabastro & hypnoticum  
 usitatum; quibus aliquot guttæ olei hyo-  
 scyami, interdum aliquantulum croci, vel  
 aliquot grana opii addi possunt, imprimis  
 ubi cum vigiliis infestant dolores capitis.  
 Denique pertinet huc balsamus hypnoticus  
 Mynsichti, & cerumen ex auribus asini  
 quantitate pisi temporibus illitæ in agrypnia  
 febrium ardentium potens dicitur narcoti-  
 cum. Sed observetur, ne augeatur dosis;  
 aliàs nimis profundus & diuturnus somnus  
 inducitur. Sunt qui odorem quoque e-  
 jusmodi sudoriferorum commendant, v.g.  
 florum ligustri Sennertus *Prax. lib. 1. pag.*  
*231.* item Zacutus Lusitanus *Prax. Hist. l.*  
*1. pagin. 165.* odorem decocti ex radic.  
 mandragoræ, hyoscyami, semine lactu-  
 cæ, opio. Quo etiam odor croci spectat,  
 cujus gratia sacculus, in quo hic asservatus  
 fuit, à vulgo culcitro supponitur. In *M. A.*  
*N. C. Ann. 6. Observ. 171.* aliquot prostant  
 euporista somnum conciliantia, qualia sunt:  
 aures leporinæ abscissæ & pulvinari supposi-  
 tæ; unguem illud seu crassamentum unctuo-  
 sum, quod rotis molaribus agglutinatur, *daß*  
*sich den Mühl-Rädern als eine graue Sal-*  
*be ansehet/* temporibus illitum; cranium hu-  
 manum ægro infcio subditum; succus nastur-  
 tii aquatici cum aceto naribus illitus; pingue-  
 do item lucii piscis eodem modo adhibita;  
 pulvis ex foliis & semine hyoscyami albi sac-  
 culo capiti dormituri vel pulvinari suppositus,

quod habet Langius *Epist. lib. 3. cap. 6.* qui et-  
 iam aliquando hirudines post aures applicuit,  
 & remotis eis gr. j. opii vulneribus imponere  
 solitus est; sicut etiam turundam ex grano  
 uno & altero laudani opiatum cum aliis misti-  
 naribus efficacissimè inditam videbitis in Ti-  
 mæi von Büldenstee *Casib. pag. 94.* Præter-  
 eà specificè hîc prodest sanguis calidus ani-  
 malium timidorum: v.g. recipiatur pullus  
 gallinaceus trium vel quatuor septimanarum,  
 subitoque disrumpatur, quò sanguis calidus in  
 frontem patientis decidat.

Cæterum apud practicos etiam clysmata  
 & suppositoria magno cum fructu interdum  
 ad somnum conciliandum injiciuntur, qui-  
 bus gr. v. vel vj. opii adduntur, ubi tutò in-  
 ternè usurpari nequit opium; sed hæc vix  
 adhibeantur, nisi vigilæ oriantur ex intesti-  
 norum dolore aut fluxu alvi; secus violen-  
 tum sunt remedium: Zacutus enim Lusi-  
 tanus habet aliquot exempla mortuorum ex  
 suppositoriis opiatum. Probatum clysterem  
 habet Schmuck ex cort. radicis mandragoræ,  
 & capitibus papaveris cum semine, in lacte  
 coctis, & applicatis.

℞. *Fol. Vitis,*

*salicis,*

*Nymph.*

*Herb. Chamomill. c. flor. aa. M. j. l. ij.*

*Rad. Rhod. ʒj.*

*Caryophyllat.*

*Ireos Florent. aa. ʒß.*

*Cap. Papav. albi c. sem. contus. No. iv.*

*Coqu. in f. q. ∇ a simpl.*

Quo decocto primò benè foveantur tem-  
 pora, hinc laventur manus & pedes, ac lin-  
 teis tandem involutæ spontè exsiccantur.

℞. *Ol. Papav. expr. ʒj.*

*Nucist. expr. ʒß.*

*M. S.*

*Schlaff-Salbleim.*

℞. *Ungu. popul. l. hypnot. Off. ʒij.*

*Extr. opii c. spir. vini par. gr. iv. ad viij.*  
*vel loco hujus ʒo expr. sem. hyosc. ʒß.*

*M. S.*

*Schlaff-Salbleim.*

℞. *∇ a Rosar. ʒviij.*

*Opis ʒj.*

*Groc. scrup. ij.*

*Misceantur.*

Mixturâ hâc imbuta lintea tepidè appli-  
 centur temporibus, donec somnus accedat.

De senum vigiliis, aut etiam in vigiliis, quæ  
 insequuntur diuturnas curas & meditationes,  
 jam monitum fuit, non tam anodyna quàm  
 confortantia plus minus aromatica, ventri-  
 culi digestionem primam promoventia con-  
 venire, vixque locum habent humectantia  
 illa aut opiata, & quæcunque narcotica,  
 adeoque talia remedia sic dicta calida, po-  
 tus vini Malvatici, aut alius dulcis, item  
 aqua vitæ apoplectica & aromata, essentia  
 absyn:



absinthii, & similia somnum inducentia potius in usum trahenda. In specie verò vinum dulce & spiritus vini à pastu senibus convenit, in vigiliis ex vitio cerebri dependentibus. Conferatur hic exemplum elegans Heinrici ab Heer, qui *Observat. 2. & 5.* aliquot granis piperis albi conditi, nuce moschata, zingibere, acoro vero & ambra grisea vigilias sedatas testatur; sicut etiam Schenckius *lib. 1. Observat.* refert mulierem Patavinam quindecim diebus insomnem, tandem usu panis cum vino Malvatico macerati somnum recuperasse; pariter remedia ambrata, & moschata laudantur in Wedellii *Opiolog. pag. 38.* Sic quoque agrypnia in affectibus sic dictis frigidis, v.g. in catarhis per usum piperis albi, item per electuaria ex aromatibus & calidis optimè sopiuntur: Spectat huc etiam consilium Rondelleti *Meth. curandi lib. 1. cap. 17.* ubi ventriculo refrigerato, pro vigiliis tollendis olea & unguenta calida, illis autem, qui ob mororem & curas vigilant, vinum meracissimum aut Hippocraticum commendat. Alii in vigiliis nimis à cruditate ventriculi spiritus vini usum post cœnam commendare solent; siquidem omnia hæc promovent digestionem, & ad somnum blandum disponunt: Sic pariter in agrypniis cum virium exhaustione, spirituumque absorptione analeptica talia ex vino dulci sunt optima: aut si propinanda papaverina aut opiata, eadem aromaticis, in exigua admodum dosi, socianda, & sub analepticis semper vehiculis propinanda sunt: quem morem Veteres in Philoniorum compositionibus observarunt. Jure-Consultus quidam ex diuturno literarum studio quatuor menses sine somno fuit, ita ut jam putaretur planè fatuus, nullis præfidiis proficientibus Philonii Persici drachmâ unâ cum vino Malvatico exhibitâ bis vel ter, ad somnum rediit, autore Zacuto-Lusitano *lib. 1. Med. Princ. Histor. 13.*

## ARTICULUS II.

De

### Somno nimio.

**V**igiliis nimis, contrarium vitium est somnus & sopor nimius, dum ægri aut nimium in somnum sunt propensi, aut actu nimis dormiunt. Multi autem affectus sub nomine affectuum sopororum solent circumferri, sed cum insigni confusione & errore. Fit hoc, judicante sic Lindanno, quod propter neglectos fontes Hippocraticos alios Autores promiscuè scrutantur; indeque in confusos errores promiscuè lapsi fuerunt; quo non parum facit garrulitas Galeni, ejusque fallax autoritas, cujus vestigiis alii insi-

Tom. II.

stentes, confusè admodum de affectibus soporosis egerunt. Interim optimè distinxit hos affectus Lindanus in *Melet. Med. & Chim. pag. 282.* cujus vestigia nos terimus. Cæterum antequam ulterius in explicatione sopororum affectuum progrediamur, distinguendus ante omnia est somnus præternaturalis & nimius ab impotentia vigilandi, ægris quibusdam ex nimia virium prostratione familiari. Nimius somnus est propensio in somnum, ita ut ægri in somnum inclinantés revera dormiant. Impotentia vigilandi verò est, dum scilicet ægri ex nimia virium prostratione & operationum animalium imbecillitate oculos apertos non amplius tenere, nec membra alia movere queunt, sed instar dormientium quieti jacent, utut reverà oculis saltem clausis & conniventibus vigilant, nec perfectum somnum capiant. Quod patet ex eo, quod accessu personæ ejusdam inconsectæ, aut ad ejus auditam loquelam oculos nonnihil aperiant, gestus faciant, & se nonnihil moveant, sed mox collabi oculos sinant, & quod interrogati præ imbecillitate respondere vix possint, omnia tamen audire indicant, & si oculos haberent apertos, omnia viderent, utut impotentes sint ab obeundas actiones vigilarum. Hic somnus non est præternaturalis, sed saltem impotentia ad vigilandum, Germ. *es ist ein matter Schlaf*; ubi nullo modo usurpanda talia, quæ aliàs in affectibus soporosis conveniunt, sed potius restaurantia, confortantia spirituosâ, in specie ambrata, sunt optima.

Observandum porro est; somnum nimium esse naturaliter alium præternaturalem, alium nonnaturalem: somnus nimius non-naturalis est, quando quis ex errore externo quodam ad nimium somnum quasi disponitur, v.g. si quis ex abusu opii vel vini, vel post diurnas vigilias, post exercitia, nimium motum, nimias lassitudines aut labores graviore, qualis somnus trium dierum & noctium contingens ob prægressam lassitudinem; vid. in Plateri *lib. 1. observat. pag. 5.* Conferatur etiam Salmuth, *Centur. 3. observat. 66.* de virgine quadam saltationibus defatigata, adeò ut per bidduum sine somno esset, postmodum quatuor dies & noctes integras somno consumpsit. Sic refert alium ex itinere fessum, qui octodecim horas profundissimè dormivit. Quò etiam facit, quando post sanguinis excretionem, alvi profluvia, dolores magnos, animi pathemata graviora aliquamdiu continuata, adeoque in genere in omni spirituum, præsertim subito exhaustorum defectu, somnus naturalis imminet. Observandum quoque, quod imminentes lipothymiz sub specie somnolentiz seu propensionis in

(Uuuu 2) somnum



somnum interdum imponant, ex spirituum animalium defectu oriunda: v. g. hysterica in graviore paroxysmo & mulieres quædam post partum debiliores somnolentæ fiunt, sed revera lipothymia imminet. Post largiores venæ sectiones aliasque sanguinis effusiones somnolentia observatur, sed quæ revera lipothymiam minatur.

Sed quoad somnum præternaturalem nimium, adeoque affectus soporosos, affectus multi huc pertinent, qui cadunt sub considerationem Medici, variis nominibus, iisque confusè admodum insigniti, utut parum referat. Genuinam affectuum sopororum explicationem nominalem videb. in Lindani *Meletematibus Physicis & Medicis* pag. 282. *seqq.* Placet hic Sylvii terere vestigia, adeoque præternaturalis somnolentia & inde dependens somnus vel solitarium malum est, vel eadem somnolentia delirium ferè comitem habet.

Hos inter affectus soporosos in specie horum quinque primariæ species considerentur: nempe (1.) Carus, (2.) Coma, somnolentum & vigil. (3.) Lethargus (4.) Noctambulones, & (5.) Catalepsis.

## MEMBRUM I.

### De Caro.

**C**arus est somnus adeò profundus, ut æger vix aut nullâ ratione denuo excitari queat, quin stertendo profundè admodum dormiat, salva tamen manente & integra respiratione; & licet à fortiori subiecto, e. g. punctura aciculæ, fortius commotus excitatus, unum vel alterum membrum moveat & loquatur, perfectè tamen excitari non potest, sed jacet talis æger sensu & motu destitutus, salvâ saltem respiratione, quæ sita enim non intelligit, multo minus ad hæc respondet. Uno nomine: Carus proximus ad apoplexiam gradus, proprièque est sopor gravis à vino, & hinc dicuntur carotici, qui post vini nimium abusum ita profundè dormiunt instar caroticorum. Propriè ergo carus non tam morbus est, sed ex illo symptomatum genere, quæ ex quocunque errore externo manifesto fiunt, v. g. ex nimia ebrietate; nam si ab interna causa repente talis oriatur somnus, revera ad apoplexias pertinebit, eritque primus apoplexiæ gradus, seu apoplexia levior. Hinc carus est, qui abusum vini & spiritus vini insequitur; præter tamen ebriositatem vinosam etiam abusus opii & narcoticorum carum pertinacem infert, quacunque ratione applicetur; exemplum videb. in Salmuth, *Cent.* 2. *Ob-*

*servat.* 97. ubi talis affectus fuit inductus à drachma una opii per clysterem injecti, & curatus per aliud clyisma ex vino Malvatico injectum. Pertinent huc fumi & gas carbonum incensorum hausti; nam carboni sulphure narcotico sunt imprægnati, quod ipsum figendo spiritus carum infert: exemplum videb. in Foresto *lib.* 10. *Observat.* 39. Ita sulphura mineralia immatura inspirata disponunt ad carum. Facit huc gas & halitus potuum nimis fermentescentium, vinorum, cerevisiarum & similium expirantes, qui ut suffocationis inferunt metum, ita etiam respiratione attracti somno profundo quasi obruunt ægros pariter & sanos. Facit huc etiam halitus calcis vivæ, parietibus recenter incrustatæ, unde in tali cubiculo dormientes ægri fiunt carotici. Item facit huc nimius odor croci, qui vi narcotica ad gravem carum disponit, ut observavit Borellus in *Observ.* in famulo aromatarii, qui dormiens super sacculum croci semimortuus repertus fuit. Pertinet huc abusus fumi nicotianæ, cujus oleum ut ipsum est admodum narcoticum, & vi narcotica sua caroticos reddit nimium haurentes; vid. Oswaldus Grembs in *Arbore integra & corrupta Hominis lib.* 3. *cap.* 1. §. 37. Item qui sub arbore juglandis diutius versantur aut dormiunt, caro corripuntur, hinc etiam à Græcis veteribus nuces *καρπώ* dicuntur, quod somnum caroticum sive capitis gravedinem inducant, vid. Hildesheim, in *Spicileg.* 4. *pag.* 394. *de Affect. capitis.* Denique hydrargyri seu Mercurii vapor intro haustus, uti varia infert symptomata facultatis animalis, ita pariter interdum carum excitat, Autore Palmario *de Morb. Contagios.* dum vapore hydrargyri naribus excepto faber quidam aurarius statim gravi somno correptus concidit, & difficillimè postmodum curari potuit. Adeoque hi sunt propriè carotici, qui ex errore quodam externo italem profundum somnum incidunt. Quo referendi etiam sunt ii, qui post graves purgationes, concussiones capitis, ejusque contusiones, sive casu ab alto sive quacunque læsione externa, profundo somno sepulti, & quasi apoplectici, jacent.

## MEMBRUM II.

### De Comate Somnolento, & Vigili seu Cataphora.

**Q**uoad coma, illud est duplex; vel somnolentum, vel vigil. Si enim somnolentia jungatur cum delirio tali, in quo exci-

tati

## MEMBRUM III.

De

*Lethargo.*

tati ægri ferè deliria loquuntur, ac denuò in somnum relabuntur, vocatur Coma somnolentum, & Cataphora; hæc enim duo Hippocrati sunt unum idemque. Coma hoc propriè non est morbus, sed symptoma tantum morbi; est enim sopor præternaturalis, qui febrientibus interdum accidit, tam in febribus continuis quàm intermittentibus. Si autem cum tali somno adsunt vigilæ internæ seu insomnia, dicitur Coma Vigil, in quo ægri habitu corporis externo, & organis sensuum externis, i. e. clausis & in somnum propensis oculis atque torpore, in somnum propendent, ac etiam dormiunt, licet quoad internas operationes animales reverà vigilæ seu potius fortiora adsunt insomnia, dum tales somniando delirant, subinde faucibus apertis clamitant, interdum membra inordinatè movent, excitati verò faciliè oculos aperiunt, ineptè respondent & delirant. Uno nomine: adest, quoad externa sensuum organa, somnolentia summa; quoad interna, perpetuæ vigilæ cum delirio. Tale Coma Vigil, quòd aliàs etiam dicitur *τυφωσεία* seu *τυφωπάρια*, ita ut hoc & coma vigil pro uno habeantur, rarò est affectus solitarius, sed ut plurimum aliis, v. gr. phrenitidi, lethargo, speciatim in febribus malignis, obviis, in quibus tamen potissimum signum esse solet imminentium phrenitidum & convulsionum, uti rectè observat Forestus *libr. 6. Observat. 38. in schol.* adeò vix ab aliis peculiarem curam postulat, modò illorum remediis adjungantur cephalica resolventia, aut potius modò vigiliis, modò sopori, medela fiat, prout scilicet hunc aut illas prævalere observamus, i. e. aut perfectus somnus, aut perfectæ vigilæ inducantur, in quo posteriore casu postmodum opiata totum negotium absolvunt. Comata hæc observantur interdum, sed rarò, sine febris; observatum enim fuit coma ex crudis julis sambuci comestis absque febre in Bartholini *Act. Med. Hafn. Volum. 1. pag. 164.* Sanè, ut rectè dicit Wedelius *de Opio pag. 46.* rarissimos esse affectus soporosos, in quibus non simul calor præternaturalis percipiatur; ita comata ut plurimum sunt symptomata febris, siquidem in intermittentibus, præsertim chronicis, non quidem in principio, sed sub incremento, quando mutatur frigus in æstum, statu & declinatione paroxysmi, ægrè profundè dormiunt; quin & in continuis subinde comata observata fuerunt, in quibus delirium vehementius subinde convulsionem imminentes prælagit. Non solum observantur in principio & cursu morbi, sed superveniunt etiam in declinatione, quando per metastasin materiæ morbificæ factâ rupturâ defertur ad caput, & ibidem coma infertur.

Pertinet ad hos soporosos affectus tertio Lethargus, seu Veternus Latinis, Veteribus Arabibus Subeth dictus, qui propriè est sopor profundus ejusdem generis cum comate somnolento, cum delirio & insigni oblivione omnium rerum conjunctus, in quo affectu ægri profundè dormiunt, & excitati licet, subito tamen in somnum denuò relabuntur stupidi simul sunt, ita ut lethargici excitati, si interrogantur, respondeant quidem, aliquid autem postulantes, e. gr. matulam aut aliud quid petentes, dum illam adhuc in manu tenent, mictionis tamen aut actionis perficiendæ obliviscantur, ita ut nesciant, quid cum re petita facere velint, ac in somnum relabuntur: Adest præterea delirium, excitati enim lethargici respondent quidem, sed inconditè & inconvenienter, non secus ac ii, qui naturaliter ex somno profundo excitati non adeo subito vel appositè respondent, sed inordinatè & ridiculè loquuntur. Cum hoc lethargo febricula lenta est conjuncta, eaque continua, quæ tamen ferè vespertino ac matutino tempore exacerbatur; calor nec acris nec mordax est, pulsus sunt frequentes & magni, urina ut jumentorum redditur turbida. Primariam essentiam lethargi constituit sopor obliviosus.

## MEMBRUM IV.

De

*Noctambulis.*

Pertinet quartò ad hos affectus etiam, quando cum somno insomnia juncta sunt, ut in incubo & noctambulis, ut ut reverà propriè loquendo non sit affectus morbosus. Est enim revera res maximam partem naturalis, dum clausis organis sensuum externorum ægri tales dormiunt; valida verò animæ rationalis, cum imaginatione, actione per spiritus paulò fixiores agitados vigilant, à quo posteriori etiam moveri quidam solent, nescientes tamen quorsum, adeoque est quasi somnus vigilans, & vigilia somnians. Uno nomine: est validum somnium, quod non secus atque nos ipsi interdum in somno ea loquimur, quæ somniamus, movendo linguam, laryngem & maxillam inferiorem, interdum quoque pedes aut brachia movemus; ita hi noctambulones moventur ad istas actiones, ad quas somnium dirigit, dum dormiendo surgunt, ambulant, & varia opera pro exercendis ipsis vigilantibus aliàs insueta & horribilia, vel formidantia, vel impossibilia exercent,

(Uuuu 3)

cent, idque nunc clausis nunc apertis seu potius semi-conniventibus oculis. Clausis quidem oculis in iis locis, quos interdum sæpius peragrarere solent; in locis verò minus consuetis, in quibus etiam non sine nocumento versantur, oculis subinde conniventibus solent versari; idque interdum cum damno, dum cadunt ab alto, interdum sine nocumento. Symptoma hoc hypochondriacis est familiare, iisque, qui simul ad pathemata melancholica non nihil inclinant, adeoque suo modo est quasi affectus mixtus ex affectibus melancholicis & soporosis, & quasi gradus quidam levior delirii aut melancholiz hypochondriacæ ac simili etiam ratione curandus venit. Auscultat verò subinde lunæ phasibus, unde nunc plus nunc minus affligit, unde etiam à quibusdam tales vocantur *Mond-Süchtige* / utut hoc nomine interdum etiam intelligatur epilepsia inveterata secundum lunæ phases plus minus affligens.

Hos inter affectus primariam considerationem meretur lethargus (nam cæteri aut sunt rari aut à causa oriuntur externa, aut alios comitantur morbos) qui revera est morbus primarius, nec adeò rarus, simulque periculosus, & subindè in praxi occurrit.

### CAUSÆ LETHARGI, *Et reliquorum* AFFECTUUM SOPOROSORUM.

Quoad causas somni præternaturalis, ejusque variorum modorum; sicut somnus naturalis dependet ex imminuto spirituum in organa externa influxu, ex aliquali eorundem torpore, dum minus volatiles minusque subtiles, sed potius phlegmatici facti minus prompti sunt ad obeundas functiones animales per solitas expansiones & excursiones; ita pariter causa proxima & ratio formalis lethargi, & aliorum affectuum soporosorum in genere, est spirituum animalium nimius torpor seu elasticitas fracta, & plus minus impeditus motus intra cerebrum, quo inepti fiunt motionibus & expansionibus debitis ad obeundos sensus & functiones necessarias, unde consequenter somnus supervenit.

Causam remotam, propter quam torpidi redduntur & deficiunt in motu spiritus, suggerunt ea, quæ naturaliter somnolentiam & nimium somnum inferre valent: nempe causa est vel

1. Spirituum paucitas & hebetudo.
2. Nimia aquositas ac pituitositas massæ sanguineæ, & in specie hinc cerebri, indeque phlegmatica spirituum animalium constitutio, qua instar spiritus vini non ritè dephlegmati deficiunt in debita volatilitate & mobilitate.

3. Virulentia stupefactoria quædam, quæ speciali virtute spirituum animalium impetum sistere, adeoque narcosi seu stupore eos inquinare & afficere valet.

4. Quæ cerebrum mole sua comprimunt, v. g. sanguis tam intra vasa stagnans, quam extravasatus, cranium depressum, & cerebri tumores.

Quod verò causæ hæc modò coma, modò lethargum, modò carum producant, vehementiā distinctos affectus, partim ex earum potentia majore, partim quod exteriores & corticalis magis, quam interiores & medullaris cerebri tractus horumque spiritus afficiant, dependet: vid. Riverius *Pr. lib. 1. cap. 2.* & Willisius *de Anim. Brut. P. 2. c. 3. & 4.*

I. Primò ergò spirituum paucitatem & hebetudinem somnolentiz ejusmodi autorem existere posse colligitur; quod quæ spiritus enervant ac dissipant, scilicet hæmorrhagiæ, coitus nimius, vigiliæ, lassitudo, &c. talem non rarò producant; vid. Plateus *Observat. pag. 6. & 7.* quo etiam catalepsis ex amore pertinet, de qua vid. Tulpus *lib. 1. Observat. 22.*

II. De secunda causa remota, quod sæpè oriantur affectus soporosi à nimia humiditate & inundatione cerebri, facta à sero & lymphâ, & ita à spiritibus animalibus quasi phlegmaticis constitutis, res minus dubia est.

III. De tertia causa quaeritur: an citra externa inspirata, assumpta aut admota, etiam humores in nostro corpore ita præternaturaliter alterari queant, ut vim anodynâ & plus minus narcoticam acquirere, & ejusmodi narcosis ex causis internis generari possit? Id quod affirmatur à Sennerto *Pr. lib. 1. Part. 2. cap. 32. & 33.* ac Willisio *de Anima Brutor. P. 2. cap. 3. 8. & 9.* Quia extra corpus res non narcoticæ per certam mutationem secundum minima fiunt stupefactoriz, quod videmus in musto, quod ante fermentationem nullam possidet vel vim inebriativam seu stupeactivam; quando verò mustum incipit fermentare, exhalat gas insigniter stupeactivum: Vinum fermentatum pariter fit narcoticum, propter spiritus fermentatione in eo genitos; Sicuti enim ex musto per fermentationem & secundum minima alterationem: sicut quoque ex ligno & carbonibus incensis, emergit de novo virulentia talis narcotica, quæ antea formaliter in iis non præexistebat; ita simili ratione nostro in corpore humores diversimodè alterari, ac similem virulentiam stupeactivam inducere ac acquirere possunt. Simili modo ac morsus hominis irati venenosus est, vid. Rhedi *de Vipera*, Archiater Florentinus, contra quem quidem scripsit Charas, natione Gallus: Hinc Hel-



**Helmont.** *Venenum inebriativum* soporosos affectus producere ait.

Quod ergo attinet aquositate & inundationem, ac pituitositatem sanguinis & cerebri, indeque oriundum torporem spirituum animalium, notum est ex structura cerebri, quod in hujus substantia corticali separentur spiritus ex sanguine, ita ut depuratissimi ab omni phlegmate oleoso seu ab omni latice in cerebrum scaturiant, hinc non tantummodo substantia cerebri medullaris pinguis & quasi oleosa percipitur, nihil aut parum aquositate admittens, sed etiam ob id receptacula in cerebro hinc inde pro recipiendo sero sunt excavata, nempe ventriculi. Præterea reperiuntur etiam hinc inde confixæ glandulæ copiosæ, quæ, quicquid superfluum est aquæ, absorbent, & sub lymphæ nomine aliolum derivant, cum & ipsa tota corticalis cerebri substantia, per quam imprimis fit spiritus animalis filtratio & quasi destillatio, glandulosa sit, lympham & laticem uberius absorbens, & volatiles exinde generans spiritus animales. Quodsi ergo fiat, ut nimis humectetur aut irrigetur præternaturaliter cerebrum à tali seroso latice aut lymphæ, sive in istud influente, sive in ventriculis ejus, & per consequentiam etiam substantia stagnante, vel etiam ex massa sanguinea, mediante colluvie serosa variis recrementis onusta, in cerebrum destillet, quæ ratione loco crasseos lethargum subnatum, per decubitus materis morbosæ in cerebro observat Willis. *cit. loco*; qui ipse tam in *Anatom. Cerebri*, quam *P. 2. de Anim. Brutorum cap. 3.* in lethargicis quoque alia loca sero inundata observ. A tali causa spiritus volatiles animales minus mobiles, turpidiores & quasi phlegmatici ac minus mobiles redduntur, & hinc in nervos radiatio admodum impeditur, unde pathemata soporosa lethargica, item obliviositas & ex perturbato spirituum motu delirium supervenit. Hinc est, quod subinde ex Hydrocephalo oriatur lethargus, teste Hildano *Centur. 1. observat. 10.* item *Cent. 4. obs. 20.* sicuti etiam Severinus observat infantem hydrocephalo laborantem, in eleganti *Tr. de Occulta Abscessuum natura*. Hinc isti, qui constitutionis sunt phlegmaticæ, naturaliter somnolenti esse magis solent, non secus ac naturaliter infantes propter eorum cerebrum fluidius, mollius & humidius, copioso sero rorido inundatum, & spiritus animales ob id torpidiores minusque subtiles admodum solcant esse somnolenti. Hinc à crebriori capitis lotionem coma somnolentum enatum in nobili Polono refertur in *M. A. N. C. Ann. 3. Obs. 327. pag. 541.* Sic quando incipiunt affligere catarrhi, & similes affectus capitis serosi, lymphæ in cerebri partibus copiosius congesta ante sui excretionem nimis humectando cerebrum, utpluri-

um ad gravitatem capitis & extraordinariam quandam in somnum propensionem solent disponere; hinc est, quod suppressio urinæ à calculo renum subinde insignem soporem soleat inferre. Sic coma vigil à sero enatum in sene refert Piso *Tr. de Colluvie serosa pag. 78.* & Sanchez in *Obs. pag. 380.* refert quendam, qui cum laborasset comate vigili cum febre continua, in capite ejus inventi sunt cerebri ventriculi multa aqua pleni. Unde etiam petenda ratio, quare lethargicis facies sit pallida & tumida, oculique tumidi, ut fere iis evenire solet, qui crapulam nondum edormiverunt, vel lethargici quoad faciei habitum quasi leuco-phlegmatici videntur. Facit huc observatio Deckeri in *Barbette pag. 36.* de lethargo gravi sternutatorio curato, copiosissimum pus per nares alliciente: Sic lethargum periodicè repetentem cum arthritide ex vitio feri observat Piso *cit. loco*: sicuti similem lethargum periodicum singulis annis eodem die recurrentem notat Borellus *Cent. 4. observat. 67.*

Quod attinet vim narcoticam succorum corporis ex eorundem præternaturali degeneratione enatam, spiritus animales figentem, hanc inexpugnabilis ista dormiendi necessitas & junctum delirium, effectus effectibus similimi opiatorum, confirmat. Acre oleosum certo modo afficiens, seu subjectum hujus virtutis, suspicatur Sylvius *lib. 2. Prax. ubi de soporosis affectibus*. Sed observandum hic sedulo non necesse esse, ut præcise ad caput feratur ipsa virulentia narcotica; sufficit enim, si saltem in primis viis hæreat ad instar herbarum gas inspirati, aut opii assumpti, ad instar summi carbonum vix inspirati vim narcoticam exercentium, & stuporem somnolentum inferentium; Nam & virus in hypochondriis existens & adhuc delitescens, caput tentare solet. Facere huc videtur, quod in peste quidam perquam somnolenti evadant. De tali vi narcotica in corpore genita facit huc exemplum Borelli in *obs. 96. Cent. 1. de quodam*, qui sæpius lethargo fuit correptus propter auram venenatam ex pollice emissam, per cauterium actuale pollicis admotum, successivè curatum. Sic non rarò in affectibus hystericis supervenit talis somnolentia, & si relinquerentur dormientes, nunquam evigilarent. Facere huc videtur curiosa observatio Riverii *Centur. 1. observat. 26.* talis soporis gravis, cum passione hystERICA conjuncti, cujus paroxysmum inhibuit propinando laudanum opiatum. Præter modò dictos affectus soporosos subinde observantur adhuc alii sopores præternaturales, qui ad comata in genere referri solent, sed confusè. Unde forsitan pertinet huc lethargus, à lumbricis oriundus, de quo Hollerius *Centur. 1. Cur. 35.* qui notat soporem quendam certum, lethargo similem, cum præcedente dolore circa

circa oppositionem lunæ recurrentem, à lumbricis natum: Idem Hol'erius *Centur. 1. Observ. 84.* cataphoram notat ex lumbricis: Sic refert Piso *de Colluvie serosa pag. 93.* affectum lethargicum periodicè repetentem cum arthritide, idque probabiliter à sero.

Comprimentium exempla varia observamus: v. g. sanguinis extravasati in læsionibus capitis cum affectibus soporosis frequentius combinatis; tumoris glandulosi super corpus callosum stuporem inducentis, observante Platero *Obs. pag. 13.* & calculi in dextro cerebri ventriculo, observ. Kerckringio *Spicil. observat. 37.*

Quoad febrim lentam, quæ lethargo semper est juncta, videtur hæc esse ex genere earum, quas lymphaticas seu vitio lymphæ oriri, supra dixi. In comate seu sopore febrili eadem ferè causæ cum lethargo obtinere solent. Verum in comate vigili præter dicta malignitatis narcoticæ imprimis habenda est ratio, dum nihil est, quod impediatur, quò minus etiam malignitas conjuncta delirium & somnum inferre valeat, non secus ac quælibet venena ac narcotica virulentiora præstare solent.

#### DIAGNOSIS.

Pergendum est ad signa affectus soporosi, quæ per se facile patent, saltem signa distinctiva eorundem inter se invicem sunt attendenda.

Qui lethargo laborant, obliviscuntur omnium, delirant cum perpetua in somnum propensione, excitati rursus feruntur in somnum, interrogati vix respondent; Febricula lenta adest, eaque continua, habet tamen continuò vespertino & nocturno tempore suas exacerbationes, alvi excrementa plerumque sunt liquida, urina redditur ut jumentorum turbida, pulsus sunt varii ac inordinati, facies & oculi tumidi & pallidi apparent.

A caro distinguitur lethargus, quod non oriatur à causa externa, & quod non adsit febris lenta; aut si adest febris in caro, hæc solet præcedere aut saltem est febris vehementior, aut ex genere intermittentium, aut continuatum ardentium.

A catalepsi facile distinguitur lethargus, quod ægri non retineant membra quasi rigida in eodem situ, sed dormientium instar eadem collapsa habeant.

A typhomania seu comate vigili distinguitur, quod in hoc adsit quædam febris gravis, eaque ardens maligna, item quod quidam ægri in comate excitentur, nec tam facile de novo obdormiscant, secus ac in lethargicis fieri solet.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: in genere rectè pronuntiat Hippocrates *Sect. 2. Aphorism. 3. somnus & vigilia, si modum excesserint, est malum.*

Porro, in quo morbo somnus laborem facit, malum idem dicit *sect. 2. aphor. 1.* Ita tamen, ut quo intensior somnolentiæ gradus, eo periculum majus sit: vid. Galenus *libr. 3. aph. 24. & l. 2. de sympt. Different. cap. 3.*

Somnus, ubi in acutis intenditur, ut malus cum distinctione est animadvertendus, quando in hoc sua malitia latitudinem habeat effectui dignam; si quis enim præter naturam & consuetudinem dormit, malum deterius; si autem tertia diei parte ad reliqua dormiat, ut in Hippocratis *Progn. l. 1. 1.* non noccebit.

In specie coma, quod oritur in febribus ardentibus acutis, periculosum esse solet, in statu semper lethale, cum, uti superius monui, ut plurimum subsit malignitas: minus tamen periculosum, si per consensum partium inferiorum & in febribus intermittentibus contingat; item cui evacuatio aliqua, v. g. fluxus alvi, hæmorrhagia narium, &c. accedit; periculosum autem in incremento.

Evigilandi impotentia, & somnus nimius, qui advenit vigiliis in delirantibus, pessimum signum est.

Lethargus præ reliquis malum est magis acutum, ut plurimum lethale, septem diebus sæpius interficiens: quos si ægri effugiant, sanantur. Vid. Hippocrates *lib. 2. de Morb. Text. 63.* Sanantur autem hi affectus vel evacuata tam sponte & criticè, quàm artificialiter materiâ vitiosâ per alvum, vel per copiosam per nares emunctionem aut sternutationem, vel per parotidum eruptionem, vel salivationem, vel puris ex auribus profluxum.

His si adjungatur febris & reliquorum symptomatum remissio, spes est, ægrum convalescentem: quod verò senibus minus quam juvenibus periculosus existat, rectè à Platero per experientiam & rationem negatur.

Lethargus superveniens aliis morbis gravioribus, in specie cephalicis, ut cephalalgia, vel melancholia, vel mania, vel epilepsia, plagis capitis vehementioribus, & in corpore cacochymico, valetudinario, aut senili, item nephriticis, puerperis & similibus, lethalis esse solet. Item quo gravior mox in principio fuerit, eò solet esse periculosior.

De cætero quo plura & atrociora sibi combinata gerit lethargus symptomata, scilicet torporem immanem, difficillimam & inæqualem respirationem, tremores, spasmos, &c. eo periculum majus; contrà, si leviora & pauciora, aut remittant.

Exigua autem salutis spes, si fluxus superveniat. Item accrescentibus lethargicis symptomatibus, si erumpat sudor frigidus, imprimis in capite, lethale est.

Tremor lethargo superveniens periculosus est; e contra superveniens phrenitis salutare ceteris paribus est; superveniens verò phrenitidi lethargus lethalis.

Lethar-



Lethargus, qui occasione causæ externæ supervenit, in corpore aliâ sano, scilicet crapulæ & ictui non adeò vehementi, minus periculi fovet, quàm qui sub contrariis circumstantiis corripit: vid. Hippocrates *lib. 3. de morb. text. 5.* Qui spontè à causa interna, lethalis est.

Si per purgantia, vesicatoria & sternutatoria fiat copiosæ materiæ effluxus cum ægri levamine, spes affulget; utut adhuc cum timore conjuncta, quod etiam intelligendum est de aliis.

Cari prognosis semper est mala, præsertim si febribus continuis aliisque morbis cephalicis & plagis succedat: siue autem ad salutem siue mortem terminetur ab it non rarò vel in apoplexiam, vel in paralyfin & spasmodum: Vid. Willisius *loc. all. cap. 4.*

*C U R A.*

In cura lethargi respectus habendus est imprimis ad causas remotas supra deductas, ad eoque vel

1. Nimum phlegma, massam sanguineam ac imprimis cerebrum inundans, est evacuandum; nunc per alvum, nunc per sudorem, nunc per vesicatoria, nunc per sternutatoria & similia.
2. Spiritus torpidi excitandi; nunc acidis, si virulentia narcotica peccaverit; nunc volatilibus acrioribus plus minus aromaticis, & ita virulentia narcotica corrigatur: ubi à nimia humiditate cerebri malum originem duxerit, internè acribus, sensuum organa vellicantibus, somnus nimius impediendus.
3. Cerebrum aromatibus, & spiritus animales in motu deficientes restituendi, & in statum naturalem redigendi sunt.
4. Læsiones externæ, si adfuerint, per chirurgiam curandæ.

Quoad primam indicationem: inter evacuantia venæ sectio in lethargo à sola narcosi interna vix convenit; ast ubi à colluvie recrementorum, mediante sanguine & sero cerebri inundante, malum ortum fuerit, venæ sectio ferè semper necessaria est, pro scopo averforio aut derivatorio, & quidem primò in brachio, vel secundum quosdam recentiores in venis jugularibus: vid. Willisius *loc. cit. pag. 319.* Riverius *loco all.* & Riolanus *Enchirid. Anatom. Patholog. lib. 3. cap. 93.* postmodum, si opus fuerit, in crure; siue sanguis causæ principalis, siue adjuvantis rationem habeat, modò ætas & vires illam ferant, quod non tam ex actionibus nunc deficientibus, quàm quales ante insultum fuerint, æstimandæ: Quem in finem, & quò sanguiniseductio repeti queat, non unâ vice tantum, quantum opus est, statim sanguinis emissionem, cum per iteratam sanguinis missionem revulsio commodius fiat, viresque magis con-

serventur. Quibus non sufficientibus altero die cucurbitulæ scarificatæ intra scapulas, aut hirudines fronti, temporibus, & prope aures applicari possunt.

Simul verò mox in principio acria & fortiter stimulantia clysmata injecta & suppositoria optimo cum successu conveniunt, præprimis si purgantia non possint convenienter adhiberi: quibus imprimis addenda salia volatilia, v. g. sunt tales clysteres ex centauro minori, majorana, salvia, origano, absynthio, serpillio, ruta, pyrethro, felle tauri inspissato, pulpa colocynthidos in petia ligata, cum electuario de hiera picra cum agarico, cum electuario Indo, & similibus; v. g.

*℞. HB. Absynth.*

*Centaur. min.*

*Fol. ruta aa. M. j.*

*Rad. Pyrethr. 3vj.*

*Pulp. Colocynth. in pet. lig. 3j.*

*Coqu. in f. q. & a commun.*

*Colat. 3ix, adde:*

*Elect. hier. c. Agar. 3j.*

*Fell. tauri inspiss. 3j.*

*Sis vol. succini 3ss.*

*Vitell. ovi No. j.*

*M. f. Clysm: S.*

*Abfubrend. Clystier.*

Item subinde applicentur suppositoria, eaque pariter acutiora; nunc scilicet suppositoria acuta usitata, illita cum felle tauri, aut cum oleo colocynthidos Quercetani; vel præparentur de novo ex melle inspissato cum sale gemmæ, aut ex felle tauri inspissato, cum speciebus hieræ picræ, & similibus, quæ cum melle conjunguntur in formam suppositoriorum applicanda:

*℞. Spec. hier. c. Agar. 3ss.*

*sterc. mur.*

*fell. tauri inspiss. aa. 3j.*

*Cum f. q. Mell. anthosat. l. rutæ. f. suppositorium,*

*cum oleo dia-colocynth. aut myrrha illinendum.*

Quod si nec sic resuscitari videtur æger, præmissis talibus vesicatoria largiora & paulo acriora, item sternutatoria sumò cum successu usurpantur in lethargo, & tunc imprimis, quando oriuntur affectus comatosi in declinatione ejusdem morbi; tunc enim propter metastasin materiæ usurpantur: illa quidem pro scopo averforio; hæc autem pro scopo excitatorio, ac simul evacuatorio, sed non nisi istis prius præmissis: v. g.

*℞. Pulv. Cantharid. 3j.*

*Euphorb. gr. xij.*

*Castor. gr. xv.*

*ferment. acerr. 3ss.*

*M. f. Cataplasma vesicatorium.*

*D. S.*

*Blasenziehend Pflaster.*

*(Xxxx)*

*Hæc*



Hæc applicari nunc possunt ordinario modo nuchæ, i.e. loco circa aures vel collum, nunc vertici, nunc ad imitationem, Willisi *incipiti*, nunc occipiti, nunc brachiis, nunc scapulis, pro scopo derivatorio; nunc cruribus pro scopo revulsorio: vid. Willisius *de Anima Brutor. cap. de lethargo*. Imò etiam applicentur parotidibus, præprimis si has in tumorem attolli observatur, cum interdum soporosi affectus per has resolvantur, & lethargum surditate solutum Zacutus Lusitanus *l. 1. Prax. Admir. Observ. 18. annotavit*. Quantæ autem efficaciz in his casibus velicatoria sint, Willisius *l. 4.* duobus exemplis notabilibus testatur.

Quod si ab his affluxum aliquantum sedatum esse dignoscas, maturè adhibeantur purgantia. Inter ea autem primatum obtinet vomitus, qui si commodè potest institui (statim enim in principio, nisi à causa externa, aut à virulentia narcotica interna fuerit, obesse potius quàm prodesse videntur, prout contra communem agendi modum testatur Willisius *loc. all.*) admodum proficius est, ut vel virulentia narcotica, vel copiosi succi evacuentur: sic enim Riverius *Centur. 4. Observat. 28.* puerum quinque annorum veterno correptum acri clystere & vomitu curavit. Hæc inter, uti notum est, eminent emetica antimonialia seu vina emetica, item Tinctura Nicotianæ cum spiritu vini extracta, ad drachm. ij. propinata. Loco vomitoriorum, si non sufficiant illa, aut forte nequeant vomitus institui, purgatio per alvum instituatur citò, neglecta temporum electione; Neque enim timidus aut cunctabundus Medicus in purgandis lethargicis debet esse, & quidem forti medicamento fiat, aliàs enim eventu frustrabitur. Inter purgantia imprimis est purgans ex scammonio, cui semper castoreum, quod affectuum sopororum appropriatum est alexipharmacum, commisceatur, & jam à Tralliani ætate fuit celebratum: v. g.

℞. *Castor.* scrup. ij.  
*scamm. præp.* scrup. j.  
 M. pro 2. dosibus, & detur in vehiculo oxymel.

Quo curavit Borellus virum quinquaginta quinque annorum, uti videre est in *Centur. 1. Observat. 52.* Conf. Zacutus Lusitanus *lib. 1. de Med. Princ. Hist. 16.* ac Forestus *lib. 10. Observat. 33.* qui curavit lethargum beneficio pilularum cochiarum, cum castoreo propinatarum. Aliàs extractum melanagogum Quercetani à scrup. j. ad drachm. ß item *Extract. esula aut trochiscor. albandal* à gr. vj. ad xij. usurpatur, aut alii addita pro stimulo conveniunt. c. g.

℞. *Extr. phlegmag. Querc.* scrup. j.

*Castor pulveris.* scrup. ß.  
*troch. alband.* gr. ij.

*Res. Jalapp.* gr. v.  
 Cum *ess. Castor.* f. Pilulæ.

D. S.

Purgier-Pillen.

Diæis pilulis commodè etiam Mercurius dulcis addi potest, cum hic in similibus affectibus aliàs sit egregius.

Præmissis hisce modo narratis universalibus, idque imprimis in casu, quod oriatur affectus soporosi à colluvie serosa (nam si virulentia narcotica hos affectus induxerit, vomitus sufficit) progressus faciendus est ad ea appropriata, quæ aut spiritus animales excitant, volatilifant, & agiles reddunt, eorum torporem excutunt, & ita somnolentiam nimiam compescunt, acrimoniâ suâ subtili penetrando, & sensuum organa vellicando; aut eosdem plus minus restitunt & augent, aut virulentiz narcoticæ resistunt.

In casu ergo colluviei serosæ peccantis alcalia acia volatilia plus minus aromatica, ex plantis acris cephalicis desumpta, sunt optima; sicuti, quando virulentia narcotica peccat, acida, imprimis acetum, conveniunt. Utroque in casu primatum ducit castoreum, reliquis remediis semper sociandum, hinc quævis inde parata interna & externa, vel sola, vel cum acidis, vel alcalibus mixta, præsertim ejus essentia cum spiritu salis Ammoniaci urinoso parata, in largiori dosi propinata, est egregia. Conveniunt ergo in priori casu ruta, serpillum, pulegium, origanum, satureja, salvia, calamus aromaticus, raphanus, cubebæ, semen sinapi, erucæ, nasturtii, &c. Scylla & similia acia volatilia, ex quæ his parata remedia, spirituum animalium torporem corrigentia, hinc & salia volatilia quæcunque, tam acia quam oleosa facta, in lethargo, apoplexia & caro, salubriter usurpantur: nempe spiritus salis Ammoniaci, formicarum volatilis, seminis sinapi, sal volatile urinæ, succini, & quæcunque alia, quo acriora, eò meliora, cum vehiculo aquæ liliorum convallium spirituosæ propinata, quibus Wedelius plus præstitit in affectibus soporosis, quam spiritibus aromaticis sulphureis: Videatur *Opilogia ejus pag. 46. 47. & 52.* quibus spiritus, olea & essentiz vegetabilium adjungenda, v. g. Essentia anthos, majoranæ, liliorum convallium, rutæ, croci, spiritus & elixyr citri, essentia ambræ cum spir. rosarum vel liliorum convallium, ceraforum nigrorum; oleum anthos, majoranæ, rutæ, caryophyllorum, salviz, saturejæ, similiaque, tam simplicia quàm composita, per se nota, adduntur. Decoctum herbæ Thée à modernis admodum decantatum optimè convenit, somno-

len-

lentiam nimiam naturaliter discutiens citra virium dispendium; hinc commodè cum aliis appropriatis, in specie post crapulam, usurpari potest. De his acribus remediis torporem spirituum excutientibus, vid. Sylvius lib. 2. *Prax. cap. 26. c. g.*

℞. ▽ *Majoran.*  
ruta aa. ʒiʒ.  
apopl. ʒvj.  
ess. *Castor.* ʒiʒ.  
~ *fulig.* scrup. ij.  
*Syr. de Beton.* ʒj.  
M. S.

**Erweichende Mixtur Lösselweise.**

℞. ~ *serpill.*  
cort. *Citri* aa. ʒiʒ.  
sangu. hum. ʒj.  
M. D. S.

**Erweichender Spiritus 30. Tropfen.**

℞. *Cons. Salvia.*  
Anthos  
Lavend. aa. ʒj.  
Spec. di-anthos ʒiʒ.  
Pulv. *Cubebæ.* ʒj.  
sem. *sinapi*  
*Castor.* aa. scrup. ij.  
Cum *syr. fl. pæon.* f. Electuarium:  
D. S.

**Erweichende Lattwerge.**

Quodsi verò virulentia narcotica vel ab externa vel ab interna excitata causa affectus soporosos induxerit, conveniunt acida volatilia internè & externè: qualia sunt acetum vini, aceta medicata diversa, in specie acetum hystericum Mynsichti, acetum, cui castoreum infusum, acetum & oxymel squilliticum, spiritus sulphuris per camp. Veteres oxymelle squillitico fuerunt contenti; hodie spiritu imprimis vitrioli volatili utimur. Excellit hic etiam spiritus æris viridis volatilis; vel per se adjectâ arenâ; vel cum aceto præparatus, spiritus vitrioli regeneratus, seu ex capite mortuo, aëri exposito, denuò destillatus & ipse commendatur ad curam lethargi; vel adhibetur spiritus vitrioli cephalicus D. Michaëlis. Admodum convenit, & egregiè restituit ægros spiritus vitrioli epilepticus spiritus æris viridis jam dictus usurpatur. His præ cæteris addatur acetum vitriolatum benedictum, D. Langio in secretis positum, remedium quoddam singulare in affectibus catarrhosis, & etiam in affectibus soporosis. Modus præparendi est hic:

Vitriolum in crucibulo leniter calcinatur ad absorptionem phlegmatis: exhausto autem hoc crucibulum tegitur operculo, & hoc contegitur carbonibus vivis, ita ut per quadrantem horæ calcinatum exactè rubescat: hoc  
Tom. II.

modo calcinatum pulverisatum, per fetaceum subtiliter trajiciatur: postmodum

℞. *Carbon. faginar. duror. bene pulverisat.*  
ac per fetaceum traject.

℞. *istius præp.* ā ʒij.

Benè mixtæ indantur vasi pleno & satis patulo terreo, quodque igni tamen resistere valeat, imponatur carbonibus in furno venti, benè calcinentur, continuò agitando cum ratibulo ferreo, donec nulla amplius scintilla in mistura appareat: Hinc

℞. *h. m. vitriol. præparatum.*

Affundatur acetum destillatum acerrimum, ponatur in digestionem in loco calido, aut saltem vase benè contexto, exponantur radiis solaribus, idque per quatuordecim dies & noctes, hinc filtetur acetum per chartam, eritque sic paratum acetum vitriolatum benedictum.

Dosis est à gutt. x. ad xij. in aqua appropriata assumendum: In omnibus catarrhis frigidis, ut vocant, item in affectibus soporosis, admodum commendatum.

Post hæc & sternutatoria & apophlegmatismi applicentur. Illa, eaque acria, facienda sunt ex radicibus & floribus liliorum convallium, castoreo, turpetho minerali, & paucò radicis hellebori albi, & euphorbii; item ex pulvere nicotianæ cum euphorbio, utut cautè, quibus pro meliori penetrantia grana quædam salis volatilis urinæ, vel salis Ammoniaci volatilis, &c. addi possunt, in specie in apoplecticis; aut spiritus salis Ammoniaci cum calce viva paratus. Nam hæc salia volatilia commodè permiscuntur cum talibus sternutatoriis acrioribus, cum fortiter penetrent ceteris addita, dum interea alia acria sternutatoria vellicant. Vitriolum ad albedinem calcinatum ad ʒj. solutum cum aquæ majoranæ ʒj. constituit liquorem, qui naribus attrahendus subinde, pro sternutatorio satis eleganti. Ad tertium autem diem, & post purgantis operationem differantur, ne materiam peccantem ad cerebrum magis commoveant apophlegmatismi ex sem. nigellæ, radic. pyrethri, confect. anacardina, theriaca, &c. v. g.

℞. *Elleb. alb.*  
*Castor.*  
*Piper. alb.* aa. ʒj.  
So *destill. ruta.*  
*Majoran.*  
*salv.* aa. gtt. ij.  
M. f. Pulvis.

Sternutatorium ex turbith cum pulvere glycyrrhizæ videb. in *Barbette Praxi cum comment. Deckeri.* pag. 76.

Cum his & externo usu simul usurpanda, quæ aut spiritus excitare, eorumq; torporem discutere valent, acria, penetrantia, & sensuū  
(Xxxx 2) organa

organa plus minus vellicantia. Admoveatur igitur crebrius naribus spiritus salis ammoniaci acris, sal urinæ, vel oleum tartari cum sale ammoniaco, &c. in vitro angusti sed longi colli. Post hunc aliàs non inelegans experimentum est Hartmanni ex aceto castoreo imprægnato, cum linteo vel spongia naribus admoto, & epithematis loco fronti & temporibus applicato. Hartmannus commendat spongiam cum succo apii, fœniculi, & aceto rosaceo vel rutaceo, cui adspersit pulverem castorei, & ita crebrò naribus admovendam; vel succus fœniculi, aut etiam succus rutæ recens expressus cum aceto & castoreo naribus admotus, vel cum linteis multiplicatis temporibus, fronti & plantis pedum applicatus, admodum laudatur. Quò etiam facit acetum radicatam Riverii, simili modo usurpatum. Hæc aceta potentius penetrabunt, si cum semine nigellæ, rutæ, castoreo, &c. cocta, laminæ ferreæ candenti affundantur, quò vapor nares ægri subeat, vid. Hoeferus *Herc. Med. Parr. 1. lib. 1. pag. 82.* Interim & simul tempora, frons, nares ac facies aquis apoplecticis ac spirituosis, oleis destillatis, succini, majoranæ, anthos, rutæ, saturejæ, serpilli, nigellæ &c. horumque balsamis, aliisque cephalicis illinantur, quæ ipsa etiam linguæ affricentur. Curavit Wedelius *loc. cit.* affectum soporosum in puella spiritu salis ammoniaci volatili, cum aqua liliorum convallium spirituosam propinato: externè inunxit tempora, nares & præcordia oleo succini, & camphoræ cum pinguedine castorei, & in sacculo appendit camphoram, nigellam & castoreum. Capiti quoque admoveantur fomenta nervina, v.g. decoctum saturejæ, cujus etiam aliquot guttæ auribus instillantur: vid. Schenckius *pag. 60.* Artus nihilominus frictionibus asperioribus tractentur. Sinapi etiam cum aceto subactum, si hoc ipso fricentur plantæ pedum, vel instar epithematis applicetur, excitat lethargicos &c. item epithemia ex sem. sinapi, piperis, &c. cum spiritu vini & aceto; Vel fiat acetum aromaticum acre ex infuso & decocto baccarum lauri, juniperi, zedoariæ, herbæ roris marini, seminis sinapi & nasturtii, & simil. c.g.

℞. ʒo destill. Salv. ʒß.

Castor.

Succin. aa. scrup. j.

M. pro oleo, temporibus & faciei illinendo. S.

**Ermunterend Dehl.**

Vel

℞. ʒa hirund. c. castor. ʒj.

carbunc. ʒß.

— Serpilli.

virid. aris aa. ʒij. M.

Quodsi à sanguine extravasato, cranio

depresso, similivè tale quid contigerit, hæc per remedia appropriata removeantur.

Comata febrilia quæcunque optimè curat acetum naribus applicatum, quò validius, eò melius; unde & spiritus vitrioli reliquis præfertur.

Comata vigilia, præter modò allegata, curat cataplasma ex raphano recenti cum ruta, aceto, fermenti s. q. & sale communi subacta, plantis pedum applicata, & subinde reiterata: vel ex ranunculo cum sapone nigro, sale marino, & fimo columbino, similibusque acribus invicem mistis pedibus applicatum.

Quod si carus ex narcoticorum externo insultu, aut vaporibus venenatis Mercurialibus, aut ex esu nucum jugland. contractus; item qui inspiratum gas liquorum fermentescentium sequitur &c. curatur, si vomitus maturè instituitur; hinc acetum, præsertim cum castoreo imprægnatum, naribus est applicandum, & internè cum castoreo propinandum, ac postmodum spirituosus internis spiritus animales denuò volatilifandi: v.g. ex fumo carbonum, vaporibus venenatis, &c. si oriantur talia mala, vomitus præmittatur, cum pars affecta soleat esse circa orificium stomachi, & tales ægri conquerantur de angustia circa præcordia: In talibus enim apparet suffocatio, unde mox instituat vomitus per valida vomitoria, post propinentur internè acida cum castoreo probe subacta, eaque in larga dosi, c.g.

℞. ʒ Menth.

Ruta.

+ si rutac. aa. ʒj.

ess. Castor. ʒvj.

Syr. acetos. citri ʒß.

M. D. S.

**Ermunternde Lust-Mixtur.**

Capiatur crebrò cochleatim.

Naribus verò subinde admoveatur castorei frustum, aceto intinctum. Eadem valeat, si malum sit à croco.

Quodsi quis ex abusu opii vel similium in carum aut soporosos inciderit affectus, præmisso vel omisso vomitu, accipiat acetum vini vel rutaceum, acetum vitriolatum benedictum, vel scylliticum, in quo dissolvatur castoreum; Famulus cujusdam materialistæ cum aliquando ʒi crudi opii pro reconciliando somno recepisset, binas noctes & dies continuò dormivit: tertiâ die vocatus Medicus recipere jubet acetum squilliticum, in quo extractum castorei dissolutum fuit, quod infudit copiosè ori, hacque mixtura frontem ac tempora, pulsus etiam manuum ac plantas pedum, & imprimis genitalia, irroravit largiter, & sedulò fricanda iussit, sicque successivè denuò evigilavit, & ex mortis faucibus ereptus fuit. Si affectus topo-



soporosus ex opio contractus his corrigi non potest, præscribuntur sinapi, eruca, &c. alia quippe volatilia languentia illa organa excitant. Clyster etiam ex vino Hispanico curat narcotin ex opio.

Quod si ex ebrietate, abusu vini, spiritu vini ac simili potu generoso. Carus aut ejusmodi affectus soporosus oriatur, præmisso vomitorio, si non spontè sequatur, acetum fronti ac temporibus applicandum, vel solum vel cum succo apii mistum. Epithema verò ex succo sempervivi majoris, cum aceto & nitro scroto aut testibus admovendum, ac subinde removendum. Potenter enim ebrietatem discutit: Sic Wedelius affectum soporosum à spiritu vini inductum curavit, applicando testibus lintea oxycrato imbuta, ubi statim natura sponte se liberavit vomitu, ubi postea propinavit elixyr cephalicum, cum spiritu urinoso salis ammoniaci fortius acuat: Vid. *Opiol. pag. 37.* Spiritus enim salis Ammoniaci volatilis aut fuliginis corrigunt & destruunt acidum volatile vini, & inde natam ebrietatem, si sudor expectetur; sicuti & ille ante vinum assumptus, facit, ut non inebriemur: si post potum assumitur, crapulam statim discutit.

## MEMBRUM V.

De

### Catalepsi.

**P**ertinet ultimo ad hos affectus etiam catoche seu catalepsis, affectus rarissimus & summè mirabilis, qui est, quando in ægro cessat omnis sensus internus & externus, unà cum cessante motu, ita ut ægrorum membra rigida & instar statuarum in sua positura, qua ægros corripit affectus, pertinaciter persistant, impulsæ tamen moveantur, sed tamen denuò in ista per motum acquisita figura fixa persistent, oculis pertinaciter hiantibus, torvum vident, in eodem, quo ponuntur seu collocantur, membrorum positu permanent; Non dormiunt tales ægri, sed videntur dormire, dum nihil sentiunt, & tamen moventur, non ab intrinseco, sed saltem ab impulsu externo, instar machinæ cujusdam. Quamvis autem in gradu ejus remissione interdum nonnihil audiant, videant, ac sublato paroxysmo referant, immoti tamen ut plurimum sine voce acta tumanent; hinc vulgò pro ecstasticis habentur.

### CAUSÆ.

In hoc affectu, quomodo verè constituti sint spiritus animales? vel quodnam speciale eorum vitium? adhuc inexplicabile est. Fixatos eorum spiritus esse, minusque mobiles, quam naturaliter esse debent, certum

est. Simul tamen etiam eosdem continua sua præsentia membra actuare, & in tono debito conservare & animare, ex eo confirmatur, quod tales stent, sedeant, impulsu progrediantur, oculos apertos servant, adeoque, ut ut ipsi etiam hoc nesciant, semper figuram antiquam retineant. Unde ad convulsiones refert catalepsin Valentini *Disp. Inaugural. de convulsionibus*, ejusque causam dicit esse nimium spirituum motum, quatenus uno impetu cerebrum relinquentes, utrumque musculum antagonistam irruunt, nec inde statim retrocedere possunt, unde rigor ille notabilis. Hoc fusè confirmat ex antecedentibus, concomitantibus, juvantibus, & nocentibus: Hinc D. D. Dolæus catalepsin, apoplexiam inversam, haud inconcinne vocat in *Encycloped. Med. Tract. tit. de Catalepsi*. Chimici derivant ex tumis quibusdam vitriolaceis acidis, spiritus animales coagulantibus: Sylvius *Pr. lib. 2. cap. 24.* spirituum animalium coagulationem quandam, à spiritu quodam quasi urinoso volatili acri, qui sit similis spiritui urinæ per fermentationem parato, coagulante spiritum vinosum rectificatum in quoddam colostrum candidum & spissum; Sed rem dubiam relinquit. Scriptores in hoc conveniunt, inesse certam quandam spirituum animalium coagulationem, tam in toto quam in partibus, i. e. ut in illa spiritus non tantum in cerebro, sed intra nervos quoque & musculos quasi coagulentur: qualis verò sit coagulator ille? difficile dictu, cum nec spiritum illum vitriolicum seu acidum, quem nonnulli in hoc morbo sibi concipiunt, nec spiritum illum urinosum atque volatilem, spiritus animales instar spiritus vini coagulantem, ut Sylvius suspicatur, concipere liceat. Rarissimus aliàs est affectus, & qui varias habet antecedentes causas: Vid. imprimis Henricus ab Heer *Observat. 3.* ubi duo singularia catalepticorum exempla habet; Rondeletius *Meth. Med. lib. 1. cap. 20.* Fernelius *Pathol. lib. 5. cap. 2.* Sic Forellus *lib. 10 Observ. 44. in schol.* refert, puellam, cum nubere cogeretur, hoc affectu fuisse correptam: Item *l. c. Observ. 41. à frigore* quosdam rigidos instar catalepticorum fuisse redditos: Item Fonseca *lib. 2. Consultat. 92.* refert catalepsin singulis septimanis recurrentem, sex horas tantum durantem, in muliere post mensium suppressionem obortam: Hildesheim in *Spicil. Affectuum capitis pag. 224.* meminit cujusdam hypochondriaci catalepsi correpti, idque, uti ipse affirmat, ex vaporibus ex liene adscendentibus. A vermibus quoque aliquoties catoche observata est, qualia exempla refert Marcellus Donatus *lib. 2. Hist. Arab. c. 7.* & Schenckius in *Observ.* In paroxysmis febris intermittens catochen observavit Dodonæus *Observat. 14.* A fumo & vapore

(Xxxx 3)

carbo-

carbonum accensorum simillimum catalepsi affectum refert Platerus *libr. 1. observat. p. 19.* Jucundum hujus catalepticos exemplum est, quod refert Tulpius *libr. 1. cap. 22.* Juvenis Britannus impensius amori indulgens, ex inopinato repudio matrimonii catalepticus factus est: cum verò illi acclamaretur, desideratam eum habiturum amicam, quasi excitatus ex profundiore somno actutum ad se rediit, & profiliit.

#### PROGNOSIS.

Catalepsis morbus admodum periculo-

sus est; periculosior tamen, si graviora ipsi combinentur symptomata, scilicet dyspnœa, excrementorum suppressio, viriumque imbecillitas.

#### CUR A.

Remedia hæcenus proficua sunt vomitoria antimonialia, spiritus vini rectificatus, sive internè sive externè usurpatus: Item cataplasmata acria. Sic Henricus ab Heer refert Capucinum catochicum factum, per acre suppositorium excitatum.

## SECTIO II.

De

### SENSUUM EXTERNORUM LÆSIONIBUS.

#### CAPUT I.

De

#### Visus Læsionibus.

**V**isus hic læditur quatuor modis:

I. Quando penitus aboletur, ut in cæcitate; aut

II. Quando saltem imminuitur, ut in visus hebetudine varia; quæ propriè est, quando objecta remota obscurè, aut objecta minuta, licet propinqua, difficulter, & non nisi magna etiam objecta in distantia, non adeò remota clarè & distinctè cernuntur.

Quò etiam pertinet nyctalopia, i. e. istud vitium, quando homines interdiu rectè, vespri parum, noctu etiam accensis candelis nihil videre possunt.

III. Depravatur visus, idque variè vel

(1) Quando res vel dexterior, vel sinistrior, quam est; item res una apparet duplex: id quod fit ex diverso situ humoris crystallini, quando nempe vel uterque ad latus plus minus vergit, vel non æqualiter oculi sibi sunt.

(2) Quando res integræ perforatæ vel dimidiatæ apparent, ex re extranea medium vel dimidium pupillæ occupante.

(3) Quando res videntur apparere, quæ non sunt; v. gr. quando splendores, coruscationes & scintillationes Lati-

nis; Hippocrati verò Marmarygæ dictæ, ante oculos vesperi videntur; item quando flocculi, muscæ, filamenta, festuæ, pulvisculi & similia ante oculos versantur.

(4) Quando objecta remota optimè, proxima verò vel omninò non, vel difficillimè videntur, & vocatur senum visio. Fit, quando crystallinus humor posteriora versus propius ad tunicam retinam recedit, quod interdum senibus quibusdam, item liceratis accidit.

(5) Quando interdum propinqua seu propius admota, etiam minutissima, acutè & benè videmus, paulò remotiora verò difficulter aut planè non, qui affectus vocatur myopia. Fit, quando humor crystallinus magis anteriora versus tendit, & magis in anterioribus radiorum visivorum fit intersectio.

IV. Denique vitiatur visio, quando eadem quasi videtur augeri: quod fit, quando objecta etiam naturaliter constituta, vel nimis colorata, & nimis splendida ac lucida apparent, ita ut visus omnibus quasi majorem gradum tribuat, & objectum visus intensius reddatur; unde fieri solet, ut talis visio non absque molestia aut dolore & oculorum læsione percipiatur; verbi gratia, quando oculus inflammatione laborat, aut quando oculi ex percussione nonnihil tument; tunc enim levis candelæ splendor instar luminis solis intensus ac nimis lucidus apparet. Causa est, quando partes oculorum membranosæ sunt nonnihil laxæ, ex qua-

quacunque fiat causa, in specie tunica retina; unde facta irritatione fit admodum mobilis: hinc etiam ordinaria objecta impingentia in tunicam retinam, eandem nimis movent, & sic ex impressione tunc fortiore graduata, nimis colorata, aut quasi splendida apparent.

Pertinet huc ille affectus, quando quidam noctu cernunt, quorum quædam leguntur exempla, ut talis visio nocturna non sit continua, sed tantum, quando evigilant, vident, quo tamen visus acumen pedetentim immittitur & tollitur.

Hæc in genere de visus læsionibus: In specie jam considerabimus affectus oculorum frequentiores, & quidem eo ordine, quo radii visivi, à quibus primario dependet visio, oculi membranas & humores trajicere solent.

## ARTICULUS I.

De

*Visu abolito.*

### MEMBRUM I.

De

*Impedito Radiorum Visualium per Pupillam Ingressu.*

### PUNCTUM I.

De

*Palpebrarum Paralyti.*

**U**T ergo dictum ordinem observemus, necesse est prius, ut oculi palpebræ pateant, adeoque oculi aperti sint. Vitiatur hoc in paralyti palpebrarum undecunque nata, quæ, dum attolli nequeant, oculum obstinate claudunt.

C U R A.

In hoc casu convenit emplastrum ex taca-mahaca & caranna in regione frontis infima applicatum; vel oleum destillatum tartari nigrum cum pauca cera in forma emplastri admoveatur: Conf. *M. A. N. C. Ann. 4. Observat. 210. pagin. 296.* Vel imitemur Zaccutum Lusitanum *libr. 1. Prax. Admir. Observat. 64.* cui in paralyti palpebræ post multa frustra tentata ex usu fuit unguentum ex balsamo Peruviano, cum aqua vitæ commistum.

### PUNCTUM II.

De

*Ungue seu Panno Oculi.*

**I**ngressus radiorum per pupillam impeditur propter corneæ perspicuitatem ablatam, quod fit in specie ob tunicam quandam præternaturalem, ab uno oculi angulo, & ut plurimum à cantho majore circumnatum, frequentius enatam; quæ ipsa successive accrescendo tandem ad pupillam pervenit, & corneam obtegit, quâ obtectione oculi fenestra, foramen pupillæ, foras clauditur, & nullus radio visivo luminoso transitus conceditur. Græcis malum id dicitur *πτερυγία* quasi dicere velint alam, quoniam instar alæ obtegit pupillam; Latinis verò ungula seu unguis aut pannus appellatur.

Tunica hæc non semper uniformis existit, sed habet suas differentias, nunc est plana, nunc tenuit, & albida circa solem & lunam apparere solet, & proprie tunica appellatur & unguicula: interdum verò est crassior & carnosior, vestigiis rubicundis ventularum & arteriarum nonnihil conspersa, & tunc alio nomine dicitur Pannus, Germanis *ein Fell über dem Auge.*

C A U S A.

Causa hujus tunicæ est eadem cum reliquorum locorum nerveorum excrecentiis in corpore: nerveæ enim partes propriè saltem crescunt & excrescunt, quibus sanguineæ portiones demum accrescunt. Præcedit nempe semper aliqualis læsio carnis istius, hoc est, glandulæ in oculi angulo sitæ, unâ cum aliquali læsione membranæ adnatæ illius loci, talis quidem, ut dissolvatur continuitas carnis in isto angulo, unde successive membranæ dictæ accrescit. Quando in ophthalmia, v. gr. variolis seu aliis similibus nocementis, lachrymæ salino-acidæ aut acres carnem in angulo majore sitam nonnihil arrodunt, hujusque simul membranam oculi adnatam lædunt, occasione subtilissimæ saltem talis erosionis nutrimentum glandulæ istius in angulo majore, & imprimis nutrimentum istud membranæ adnatæ proprium, utrumque chylosum, per porulos, ubi fit subtilissima corrosio, dum non amplius à tono fibrarum læsarum coercetur, successive transfudat & foras emanat, & secundum membranæ læsæ determinationem ab illius spiritu insito pariter in concretum ejusmodi membraneum coagulatur, & ita successive augetur, & juxta oculi extensionem, ubicumque spatium invenerit, se applicat, & ita continuato augmento in tantum accrescit, donec integer oculus obtegatur.

Prout igitur ratione læsionis nutrimentum istarum partium læsarum, & in membranam coagu-



coagularum, nunc plus nunc minus degenerat à statu naturali, & acido præternaturali imprægnatum est, etiam tunicarum diversitas oritur, ut alia dicatur nunc simplex & benigna; alia verò maligna & plus minus cancerosa: Hæc quidem, quando pannus est nonnihil lividus, nigricans & dolorosus; quin imò, prout antecedens læsio membranæ & glandulæ in angulo majore fuerit major vel minor, ita ut etiam minutissima vascula sanguifera simul læserit, ut hinc & sanguis cum nutrimento transudans sese admisceat & suo motu vascula nova, antiquis una excrecentibus, continuo efformet, & valis sanguiferis respersus pannus hic generari solet: Benigna verò est, si pannus est candidus, clarus, tenuis, nec adeò crassus & indolens; quando enim est nimis crassa, aspera, obscura & dolorosa, tunc talis pannus est cancerosus.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: malum hoc per se oculis patet. Conditiones unguis vel tunicæ adnatæ ejus naturam repræsentant. Tunica enim alba, indolens & tensa, est naturalissima; sin verò sit crassa, dura, nigricans, & nonnihil dolorosa, unguis est cancerosus, prout nutrimentum fuerit magis vel minus corruptum.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Unguis hic aggravescens, pupillam obtegendo tandem, cæcitatem infert. Malum recens uti facile medicamentis curatur, ita inveteratum difficulter, & vix sine chirurgo potest removeri: neque hoc fit facile, quia nimis pertinaciter adheret.

Si tunica est cancerosa, non attingenda, ne exasperetur, quia curato minore malo, majus succedit, & subinde in cancerum exulceratum degenerat.

Si cum panno incipiente observetur, quod simul adsit principium quoddam suffusionis in oculo, uti fit post variolas, tunica hæc non attingatur; sublato enim ungue suffusio citius perficitur.

### CURATIO.

Ante curam specialem in genere, quæ in oculorum curationibus observanda sunt, præmittam.

I. Oculi cum partes sint perquam sensibiles, adeoque facile irritabiles, ac texturæ admodum delicatæ, minimè fortia, sed levia, ac quantum possibile, temperata, minusque acria ferunt remedia. Conf. Forestus lib. 2. *Observ. 17. in schol.*

II. Inter interna ophthalmica in oculorum affectibus felicissimè exhibetur decoctum saffras: *longa enim experientia didici, plurimum facere in oculorum malis à causa frigida*

*& humida provenientius*, dicit Ferdinandus Hist. 51. Hinc tæmiculum, & omnia inde parata, item euphrasia, ac similia interne conducunt. Facit huc vinum ophthalmicum egregium, descriptum in M. A. N. C. Ann. 6. App. pag. 71.

III. Vinum alias in oculorum morbis non semper æquè convenit, præsertim si cum phlogosi aut lachrymarum acrimie influxu juncti sint, aut ab acrimonia humorum ortum duxerint, interdum tamen; ubi opus est discussione, resolutione & attenuatione adhiberi potest. Conf. Borellus *Centur. 1. observat. 77.*

IV. Frigida nimis oculis admota iisdem perquam novica sunt, sicut etiam fervida & calida nimis admota, iisdem terre minus possunt. Temperata ergò & tepida ut plurimum sunt, quæ oculis admovenda veniunt.

V. Ex acidularum usu oculi primò lædi videntur, cum tamen solummodo repurgentur, & confestim clarescant. Scio equidem quosdam ex acidularum potu quasi occæcos fuisse, qui tamen secundà vel tertià die longè, quàm antea habebant, clariorem lucidioremque visum sunt adepti: protruduntur nempe ex oculis feces & purulentia quædam per angulum lachrymalem. Conf. Mindererus *de Vitriolo cap. 11.*

VI. Alcalia ergò & his cognata sunt optima remedia, ac oculis imprimis proficua: hinc aquæ ex cancris tantillum putrescentibus destillatæ, item aquæ ophthalmicæ Mynsichti ex cancris & chelidonio majori. Facit huc polychrestus liquor, nempe ex flor. cyani aut cichorei, per deliquium in furno pistorio paratus: vid. Sennertus & Hartmannus; in quamplurimis oculorum affectibus convenit: item sperma ranarum, de quo & exinde paratis aquis ophthalmicis vid. M. A. N. C. Ann. 6. Append. pag. 83. Hinc ablutio oculorum cum lotio proprio matutino multum iisdem conferre solet: Conf. Bartholini *Acta Med. Hassniens. Volum. 2. pag. 252.* item phlegmata ex urinæ & vitrioli destillatione in aqua epileptica Quercetani, item phlegma spiritus urinæ per putrefactionem parati, egregia sunt; Unde etiam aqua stercoreis humani destillata ad oculorum affectus multum est commendata: Hinc Quercetanus magnificat sequentem aquam:

℞. ☐a pueror. lbss.

℞ li albi

Tutia aa. ʒiv.

Succ. Chelid. lbij.

Stent in digestionem per aliquot dies & noctes, postea destillentur & asserventur.

Tutia tamen frustraneam additionem arbitror.

Alii

Alii

℞. Rad. Chelidon. maj.  
Valerian. aa. lbj.  
Hb. Ruta,  
siler. mont.  
Euphrag. aa. M. jv.  
sem. Anisi,  
sanic.  
levist. aa. ℥ij.  
fl. calend.  
rosar.  
borrag.  
consol. maj. aa. M. jv.  
Cor. fluv. No. xv.

Omnia incide minutissimè & superfunde  
phlegm. & li,

succ. Chelid. aa. q. s.

Digerantur per mensem: postea destil-  
lentur, & in alembico ponantur.

Campb. drachm. j.

Liquor prolatus dividatur in duas par-  
tes æquales: una pars per se asservetur,  
alteri parti infundantur

Croci metall. drachm. ij.

Stent ita per duos menses, postea filtre-  
tur, & reservetur usui.

Aqua ocularis Hartmanno familiaris fuit  
talis:

℞. Aqua sanic.  
Anisi aa. lbj.

In quibus solve

Vitrioli alb. purif. unc. β.

Ac postea rad. enulæ campanæ pulve-  
risatam cum iisdem digere: tandem co-  
latura in vitro mundo servetur.

Valet ad unguem, albuginem, cicatricem,  
maculam, item ad rubedinem & caliginem &  
quamplurima oculorum vitia.

Denique remedium pro affectibus oculo-  
rum inæstimabile vocatur Lindano mistura  
ista, quam habet Hartmannus *Prax. Chy-  
miatr. cap. 43. §. 3. pag. 304.* qua se in quam-  
plurimis oculorum affectibus cum felicissi-  
mo successu usum fuisse, refert.

VII. Optimus utè di modus huiusmodi  
collyriis humidis est iste, ut æger vel in dor-  
so decumbat, vel stans aut sedens caput pro-  
bè retineat, ut uterque oculus perpendicu-  
lariter cælum versus tendat, & ita guttatim  
liquor aliquoties in die instilletur in can-  
thum oculi majorem; hinc oculus tegatur,  
ut ita liquor undique per oculi peripheriam  
externam diffundi queat; sic enim paucae  
guttulæ plus commodi habebunt ex bina ta-  
li applicatione, quàm si decies drachma una  
corpore erecto oculi saltem abstergantur.

VIII. In quibusvis verò oculorum vitiis  
vesicatoria & fonticuli sunt optimi: vesica-  
toria quidem in nucha aut ponè aures in mor-  
bis recentibus adhuc incrementibus sunt o-  
ptima: Fonticuli verò in collo, & hinc in bra-

Tom. II.

chio ad eosdem inveteratos, & jam in statu  
perfecto constitutos, admodum proficui ob-  
servantur; sicut etiam moderatus errhino-  
rum usus iisdem multum conferre solet. Conf.  
Bartholini *Acta Med. Hassn. Vol. 2. pag. 64. &  
Vol. 3. pag. 21.*

In specie autem in unguis oculi cura tunica  
hæc præternaturalis ante omnia est removen-  
da, aut medicamentis abstergentibus & subti-  
li acrimonia blandè erodentibus & resollen-  
tibus, aut opera manuum chirurgica successi-  
vè cum acudetrahatur, vel cum instrumento  
separetur. Hinc remota tunica blandè ad-  
stringentibus fibræ ac hinc poruli circa radi-  
cem partis læsæ claudendi & firmandi sunt,  
ne revertatur denuò malum.

Pro his ergo scopis obtinendis, pro remo-  
venda hac ungue conveniunt saccharum can-  
dum, mel, os lepiæ, cornu cervi ustum, testæ  
ovorum calcinatæ, aut testæ in aceto acerri-  
mo solutæ, siccatae, & in subtilissimum pulve-  
rem redactæ: quæ pulveres oculis inspergun-  
tur, & similia blandè abstergentia, subtiliter  
erodentia & detergentia unguenta, item col-  
lyria extrinsecus applicanda, quæ inter usitata  
est aqua ophthalmica Quercetani blandè de-  
tergens:

℞. Væ euphras.  
chelidon. maj.  
sanic. aa. ℥j.

croci metallor. l. vitri ℥ij (quorum  
loco etiam optimè butyrum ℥ij  
recipi potest) ℥j.

Stent per aliquot septimanas loco cali-  
do; filtretur & usurpetur.

℞. Siss gemm. ℥j.  
dissolve in  
Væ rosar.  
sanic. aa. ℥j.

M. pro collyrio;

quo attingatur pannus cum penna, vel gut-  
ta una vel altera immittatur in oculum super  
unguem. In specie conveniunt fella piscium,  
speciatim fel mustelæ & lucii piscis, huiusque  
aqua destillata, item huius essentia. Præparan-  
di modum videb. in Sennerto, *Pr. lib. 1. p. 796.*  
item in Hartmanni *Pr. Chym. cap. 39. p. 99.*

Vel in huius defectu,

℞. Væ leucosi bulb. vel sperm. ran. ℥i℥. ad ℥ij.  
fell. lucii pisc. ℥j.

Mista stent in loco calido per noctem; manè  
filtrentur, & ita instar collyrii applicentur.

Loco huius fellis lucii secretum Burchi in  
his casibus est fel humanum destillatum ex  
cucurbita vitrea humili per alembicum æne-  
um seu cupreum, uti videre potestis in ejus  
Epist. ad Bartholinum *de Humoribus oculo-  
rum restituendis pag. 55.* Aliàs ex stercore  
anserum juniorum, mense Aprili collecto,  
etiam aqua per alembicum destillatur egre-  
gia, quæ olim dicitur fuisse usitata Maxi-

(Yyyy) miliano

miliano Imperatori ad obscuritatem visus, tunicas oculorum detergendas & alia oculorum vitia, imprimis si superficies oculi post variolas læsa sit. Si pertinacior fuerit pannus, ad aquam sapphiream Chirurgorum progrediendum, quam videbitis descriptam in Schræderi *Part. 2. Pharmac. cap. 29. no. 5. pag. 153.*

Vel ex tempore potest recipi  $\nabla$  fœniculi vel chelidonii majoris, & in ea solvi  $\Theta \times$ ci tantillum, ut moderatissimè linguam feriat, infundendo in pelvim æneam, donec coloretur; sic variè dilui, & ita ejus acrimonia pro lubitu infringi potest: filtretur, & sic oculis instilletur. Optimum est in detergendo ungue, albugine, maculis à variolis relictis & ulceribus oculorum. Conf. Tacchenius *Hippocr. Chym. Edit. 2. pag. 11.* item Riverius *Cent. 3. Obs. 45.* Ulterius de chelidonio majori nota est ejusdem egregia vis ophthalmica, unde ipse succus ejus expressus, dilutus cum rore fœniculo insidente, & matutino tempore collecto, vel cum aqua euphrasiz aut alia appropriata, præstans est collyrium, quod absumit tunicas & pannos oculorum, illitum aut instillatum.

Præter dicta etiam pulveres quidam in forma sicca oculis insufflentur, aut diluti cum aquis, applicari possunt. Vitriolum album etiam est egregium, quod laudat Poterius. Imprimis observatu digna est ejus curatio ungulæ oculi post gravem ophthalmiam relictæ, *lib. 2. cap. 8.* contra inflammationem & dolorem.

Tandem aliis irritis in malo pertinaciori ad Mercurium sublimatum tutò confugiendum est, imitando hoc in puncto Plempium in *Ophthalmogr.* qui ceu secretum mirabile & expertum in puella, quæ per aliquot annos ex ungue oculorum fuerat cæca, laudat. Nempe

*℞. Zii  $\pm$ ti gr. vj. ad ʒss.*

*Dissolvantur in ʒiij. ad tss. aquarum Ophthalmicarum, e. g.*

*Aque rosar.*

*euphras.*

*fœnic. aa. ʒj. ad ʒij.*

*Misce & filtra,*

*D. S.*

### Clarificirend Augen-Wasser.

Et de tali solutione omni mane, item vesperti, gtt. j. vel ij. infundantur oculo in loco panni, donec removeatur, & sic sensim absimitur ungula.

De cætero, si aliquid est, quod confert ad delendas oculorum membranas & tunicas, est sanè succus formicarum rubrarum, in arboribus resiniferis habitantium, expressus, qui vel per pannum depuratus, & ita vel crudus, vel cum aqua appropriata dilutus, oculo instillatus, removet has tunicas. Quò pertinent etiam Rulandi duæ aquæ ophthalmi-

cæ mirabiles, quarum una parata ex formicis artificialibus, & altera ex infusione vitri antimonii, quæ vid. *in ejus remed.*

Quodsi delicatius sit subjectum, aut sint pueri hoc malo correpti, qui non possunt terre acriuscula, & qui lachrymantur, aut tunica sit recens, adeoque nondum inveterata aut tenax, in tali casu sufficit mel illitum pelvi æneæ, & suppositis carbonibus ignis lentè calefiat pelvis, donec mel lenem vitiditatem contraxerit, corroditur sic pelvis à melle.

Tunc isto melle calido in loco tunicæ blandè illinatur oculus, donec deleatur tunica. Fuit experimentum Foresti *lib. 1. Obs. 7. in scholis.*

## MEMBRUM II.

De

### De Tunica Corneæ vitiis.

## PUNCTUM I.

De

### Nubecula, Albugine, & Suggillatione.

C A U S Æ.

Vitium prius fit, quando in nutritione corneæ perspicuæ vitiata alimentum chylosum, seri subtilioris vehiculo distributum, successivè non nihil crassius & viscidius suggeritur; hinc tollitur politura & pororum æqualis situs in cornea, unde fit, ut obscuratà nonnihil cornea agris omnia obscura & quasi per nubeculam appareant; imò si densior fuerit hæc cornea, planè visus pereat, unde vitium hoc Latinis communiter nubecula oculi appellatur.

Vitium 2. fit, quando cicatriculæ ab aliqua erosione vel læsione consolidata tunicæ corneæ, v. g. in variolis, aut in ejus ulcusculis, aut post ejus vulnus remanent. Talis enim cicatrix, cum crassior sit ac spissior, minusque polita, quàm reliqua corneæ pars, albedinem repræsentat, quæ non ritè permittit transitus radiorum visualium, tuncque albugo seu leucoma specialiter appellatur.

Vitium 3. fit, quando post ictum vel casum, item post plagas oculo illatas, vel similes injurias externas, læduntur vasa oculorum, ex quibus effunditur sanguis, qui congrumatus, si in albo oculi seu cornea hæret, & ita vitiosos colores, cæruleum, lividum & sanguineum inducit, visusque impedimentum infert: suggillatio oculi dicitur.

## DIAGNOSIS.

Signa horum malorum oculis patent: Nam cicatrix instar parvæ cujusdam maculæ albæ apparere solet (unde etiam vocatur macula:) In nubecula verò cornea nonnihil albi-



albicans & spissa cernitur : Et in suggillatione color cœruleus, lividus, &c. etiam spontè patet.

Causæ antecedentes, nempe contusiones, plagæ, &c. ex relatione ægrorum patent.

### P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin : Vitia priora corneæ, in specie cicatrix, difficillima sunt curatu, propter summam subtilitatem, simulque exquisitissimum sensum tunicæ : idque eò magis, quò crassior vel magis inveterata fuerit vel nubecula vel cicatricula.

Suggillatio verò, nisi sit nimia, facile removeri potest. In pueris tenellis, modò trahibiles sint, facilius potest abstergi macula, & ipsa tenuis, quàm in ætate consistente, ubi spissior & contumacior esse solet.

Post variolas, oculos infestantes, imprimis observetur, ut insequens macula vel cicatricula citò amoveatur, antequam in perfectam abeat spissitudinem.

### C U R A.

In cura nubeculæ materia crassa, inquinans perspicuitatem tunicæ corneæ, attenuanda, & discutienda aut removenda : Leucomatis macula & cicatricula abstergenda & detergenda : In suggillatione sanguis congruatus resolvendus & discutiendus. Propterea in duobus prioribus conveniunt subtilia nonnihil acria & fortiter penetrantia ; in tiora quidem in nubecula, fortiora in cicatrice.

Pro nubecula ergò & cicatrice delenda conveniunt sequentia remedia : semen hormini Sylvestris tempore somni oculo impositum purificat oculum à sordibus, eumque abstergit, vid. Riverius in *Praxi*, & in *Observ.* Unde etiam ad fomenta oculorum hæc semina & folia adhiberi solent à Poterio, qui folia hormini sylvestris in oculorum fomentis præscribit. Effectus hujus ratio est, quod hoc semen oculis impositum à lymphæ, oculos continuo humectante, extrahatur in mucilaginem. Aqua fellis bubuli destillata cicatrices oculorum delet, aqua ophthalmica Imperatoris Maximiliani, & Quercetani p. 1476. nec non fel lucii piscis, perdicis, bovis, &c. cum aqua spermatis ranarum temperatum, vel eorum aquæ destillatæ, item essentia. Forestus in *lib. 11. Observ.* 29. habet exemplum pueri, qui ex variolis incidit in pustulas oculorum. Quæ pustulæ tandem fuerunt exulceratæ, & exinde oborta est nebula oculorum : huic profuit sequens collyrium :

℞. *℥a fenicul.* ʒiij.

*fell. Anguill.* ʒj. ad ʒiʒ.

*sacch. candi pulveris.* sub. ʒi.

M. stent in loco calido per noctem.

D. S.

*Augen-Wasser.*

Tom. II.

Spiritus urinæ cum vitriolo destillatus egregius est. Convenit etiam succus euphrasie aut fœniculi recens extractus, cui tantillum balsami Peruviani admistum sit ; vid. Riverius *Prax. lib. 2. cap. 7.* vel loco hujus magis penetrat & detergit liquor fœniculi saccharatus, qui colligitur ex saccharo, caulibus fœniculi excavatis indito & relicto, ut liqueat. Vel recipiatur succus fœniculi per residuum nonnihil depuratus, & addatur saccharum Joviale.

Præ reliquis optimum specificum est liquor oleosus ex epate mustelæ piscis in malo leviori saltem palpebris illitus ; acris enim admodum & penetrans existit : vid. Hartmannus *Prax. Chym. cap. 27. pag. 98.* & Sennertus *Pr. lib. 1. Part. 3. Sect. 2. cap. 16.*

In graviore verò malo, in specie cicatricula magis tensa, etiam cum penna subtilissimè potest illini, quod etiam unguibus, item suffusioni, conveniens admodum existit. Oleum papyri, aut panni seu linteorum combustorum, cum penna subtilissimè oculo illitum loco cicatriculæ est optimum remedium. Ubi validius agendum est, recipiatur aqua mellis vel simplex, & quidem prima, aut acuata cum secunda flava, vel composita Amati Lusitani. In incipiente macula prima est optima, in graviore sumatur secunda : vid. Schræderi *Pharmac.* ubi de *Melle*. Hinc etiam convenit aqua mellis composita à Fonseca *Tom. 2. Conf. 55.* & Amato Lusitano *Cent. 4. Cur. 53.* ubi nubeculam graviores discussit.

℞. *Mellis in fav.* lbij.

*summit. fl. Sambuc.*

*Euphras.*

*fœnicul.* aa. Mʒ.

*sacch. cand.* ʒiv.

Destillantur in MB. Δe fortiori nonnihil.

Liquor prodiens ad oculorum nubeculam & cicatricem ipsi Amato Lusitano per experientiam comprobatus est. Succus anagallidis flore cœruleo, imprimis florum ejus, expressus ; item succus chelidonii majoris expressus, vel solus oculo instillatus, vel cum melle rosaceo mistus & applicatus, tollit maculas, unde & hic commendari solet aqua anagallidis cœrulea destillata, non minus quàm aqua leucoji bulbosi destillata ; sicut etiam integra herba est singularis ophthalmica, si discerpitur caulis, liquor intense flavescens transudat. Tali caule attingenda est moderatè nubecula vel cicatricula. Sic diluitur succus à lachrymis supervenientibus, & tandem deletur nubecula & cicatricula ; vel fella animalium cum mellis modico subacta exactè litus forma oculis applicantur : vid. Hartmannus *Pr. Chymiatr. cap. 37.* & *Misc. Acad. Nat.*

(Yyy 2)

Nat.

*Nat. Cur. Ann. 2. Observat. 126. pag. 208.* de felle serpentum. Loco succi chelidonii succus rutæ etiam capi potest, qui instillatus simili pollet efficaciâ. Tandem, gravia si fuerint mala, aqua sapphinea Chirurgorum supra laudata, vel cum aqua calcis vivæ in pelvi ænea, vel sine calce viva cum solo sale Ammoniaco & aqua simplici aut appropriata, ut lenissimè linguam feriat, in vase æneo vel orichalceo, donec cæruleum acquirat colorem, etiam egregia est: vid. *Riverius Centur. 3. Observ. 45.* Tandem egregium est experimentum Plateri, quo omnes albugines & cicatriculas feliciter curavit, *lib. 1. Observat. pag. 112. & 382.*

*℞. Pulp. pomor. odorat. acidul. ℥ss.*

Incidantur minutim, & in  $\nabla$  rosar. & fœnic. coquantur, donec in pulvem redigantur: cui contusæ permisc.

*Mucil. sem. fœnugr. ʒij. l. iij.*

*Album ov. No. ij. l. iij.*

*Lap. hamat. minutiss. trit. vel preparat. ʒss. ad ʒj.*

*Cort. Granat. pulveris. ʒij.*

*M. f. Cataplasma,*

oculo clauso imponendum, continuò gestandum, & bis in die renovandum.

Convenit, si imprimis malum obveniat cum inflammatione & insigni lachrymarum acriuscularum fluxione, in albugine & cicatrícula. Pariter & *Horstius lib. 2. Observ. 39.* Leucomata ex variolis nata simili cataplasmate resolvente feliciter curavit; applicatis simul in tali casu post aurem velicatoriis:

*℞. Pulp. pom. dulc. ℥ss.*

Coqu. in l. q.  $\nabla$ æ fœnic. & rosar. ad consistentiam pultis:

adde

*Mucil. sem. fœnugr. ʒij.*

*Misc.*

Applicetur per dies aliquot, imprimis somni tempore.

Post hujus Cataplasmatidis usum

*℞.  $\nabla$ æ rosar.*

*fœnic. aa. ʒiij.*

*Margar. præp. ʒj.*

*Misc.*

*Conf. Platerus lib. 5. Timæus von Guldens Fleec. lib. 1. Cas. 21. pag. 48.*

Tandem liquores ex floribus cichorei cæruleis, aut flor. cyani, per deliquium seu colliquationem in furno pistorio parati specifi sunt singulariter ad nubeculas & albugines delendas. Tandem pulvis ex osse sepis, imprimis calcinato, vel solitario, vel cum saccharo albißimo, in pauca quantitate oculis inflatus prodest, uti etiam Cnœffellii pulvis compositus ex exuviis serpentum & lapillis cancrorum minutissimè tritis & invicem mixtis ita usurpatus, vel cum melle illitus, vel

cum aqua appropriata applicatus, cicatriculas egregie delet; qui pulvis etiam experimentum egregium est in vulneribus, in ulceribus, item in cancro oculorum. His etiam in casibus peculiariter convenit aqua ophthalmica ex chelidonio majori & cancris fluviatilibus destillata, secundum methodum *Mynsichti & Crollii in Basil.*

Omnium fortissimum medicamentum est Mercurius sublimatus, quem solutum in aqua appropriata uti ad unguem laudavi, ita & ipsius usus casu ad nubeculam & cicatriculas inventus; sic enim in *Platero lib. 1.* prostat observatio de quodam Chirurgo, qui curaturus nubeculam, nescio quò errore seductus, loco sacchari pulverisati insufflavisset oculo patientis Mercurium sublimatum, unde gravis quidem nata fuit oculi inflammatio, sed hac sublata mox nubecula simul omnino disparuit.

Cæterum infantes tenellos sæpe etiam affligunt hæ nubeculæ & cicatriculæ, post variolas præsertim, vel etiam si ophthalmiam patiantur: quos ut curemus, non incommodum est, si mater vel nutrix masticeet semen fœniculi aut ipsum fœniculum, & halitum oris mox immittat in oculum infantis, idque frequenter; ita enim sæpe nubeculam incipientem discussam observarunt. Fortius erit, si post masticationem etiam linguâ tangat albuginem, ut ipsa saliva fœniculo tincta blandè eam irriter.

Quodsi verò suggillati sint oculi, ad resolvendum & discutendum sanguinem grumosum convenit fœtus ex aquis cheresolii, florum cyani & hyssopi. In gravioribus malis semen cumini vel caryophylli terantur intradentes, probeque masticeantur, hinc halitus oris in oculum suggillatum frequenter immittatur, & mirè confert, & hinc est, quod *Burhus in Epist. ad Bartholinum* laudet halitum oris simplicem. Vel in malo contumaciori sumatur coma hyssopi, eaque contusa ebulliat in vino vel aqua calida; decocto isto in forma fœtus postmodum calide largiter foveatur oculus, idque crebrius, donec successivè sanguis extrusus discutatur, & resolvatur; confirmat hoc *Riolanus in Tr. de Affect. oculorum.* Tandem est quasi anchora sacra decoctum radicis symphiti majoris vel solæ, vel, quod melius, conjunctæ cum dimidio radicis sigilli Salomonis, pro fœtu usurpatum, c. g.

*℞. Fl. chamomill.*

*summ. hyssopi aa. p. ij.*

*rad. symph.*

*sigill. Salom. aa. ʒij.*

*M. f. Nodulus,*

instar fœtus humidi applicandus.

In graviore contusione

*℞. Rad. Consol. maj.*  
*min. ana ℥℥.*

*fl. chamom.*

*melil. ana ℥ij.*

*far. fabar. ℥iv.*

*butyr. rec. ℥iij.*

*sem. fenugr. ℥j.*

*Croci ℥℥.*

Coqu. bene pro Cataplasmate.

Tandem egregium est linimentum Mynsichti contra livorem faciei in *Arm. Chym. pag. 503.*

## PUNCTUM II.

De

*Hypopio.*

**L**æditur quoque tunicæ corneæ pelluciditas ab hypopio seu pure sub cornea, dum ab hoc nunc tota pupilla, nunc ejusdem limbus seu circuitus tantum tegitur.

### DIAGNOSIS.

Suppurationi huic quia ordinariè occasionem præbent ophthalmiæ enormiores & suppurationes, commodè ex morbis præcedentibus dignoscitur, & ad motum oculi movetur eadem materia, imò oculus suppuratus altero interdum prominentior apparet.

### CURA.

In cura pus educendum, præmittendo huic, si reliquæ inflammationis subsint, remedia de ophthalmia superius commendata. Eductio autem illa à discutientibus, quæ vulgò commendantur, nunquam speranda, sed ex chirurgia petenda erit.

## PUNCTUM III.

De

*Phlyctænis seu Oculorum Pustulis.*

**P**ertinent ferè huc pustulæ in annata & cornea tunica subinde observabiles, grani milii magnitudinis, cum pruritu, ardore, &c. Græcis phlyctænæ dictæ; quæ, si juxta pupillam sint, post sui ruptionem cicatricem relinquunt, visum abolentem; sin verò tunicam corneam occupent, eamque exedant, humoris aquei profluvium facere possunt.

### CAUSÆ.

Oriuntur ex retentis acerbis humoribus ad transpirationem ineptis, hinc in pustulam collectis, quæ successivè rumpuntur, & nunc exilia corpuscula, nunc cicatrices post se relinquunt, suntque quasi particularis oculorum scabies.

### CURA.

Unde in cura ad acrimoniam acido-sal-

sam temperandam respiciendum, cætera sat-agenti natura. Convenit ergò aqua vitriolata Hartmanni, quæ vid. in ejus *Praxi cap. 25. §. 3. & cap. 28.* Imò simplex vitrioli albi solutio cum addita tutia sufficit, saccharum Saturni, item cerussa cum appropriatis aquis instillata, conducit. Vel

*℞. Lap. calamin. præp. ℥℥.*

*Tutia præp. scrup. j.*

*Sacch. Saturni scrup. ℥.*

*M. f. Sief.*

Oculo pedetentim insufflandum.

D. S.

*Linderend Augen-Pulver.*

Aqua albuminis ovorum egregia est, si phlyctænæ aperiantur & exulcerentur, detergit & consolidat.

## MEMBRUM III.

De

*Humoris Aquei Vitiis, seu Cataracta & Glaucomate.*

**S**i in humore aqueo, inter pupillam uveæ & humorem crystallinum impedimentum aliquod se offerat, quod radiis transitum neget, visio tollitur. Fit hoc, quando materia quædam, reliquo humore aqueo paulò crassior & spissior, sensim in eodem colligitur, quæ primo minutissimorum pulvisculorum forma sensim in filamenta tenuissima, texturæ araneæ similissima, concresecunt, donec hæc ipsa textura tandem in tantum augeatur, ita ut perfectè crassescat & spissescat, & in membranæ consistentiam conglutinetur & coalescat. Membrana hæc vulgò cataracta oculi dicitur: malum verò ipsum suffusio oculi, Græcis *ὑπόχυμα* vel *ὑπόχυσμα*, Germanis *der Staat* / appellata.

Cataracta est nil aliud, quàm membrana quædam successivè intra humorem aqueum, vel in eo intra pupillam & crystallinum humorem, obducta, quam vocant *den Staat*.

Non autem confundenda sunt mala plura hoc nomine insignita: sic enim dicitur *der schwarze Staat* / quando anterior oculi pars fenestrata, serena & diaphana apparet, ita ut nihil vitii in oculo appareat in illo malo, quod vulgò gutta serena dicitur. Speciatim verò cataracta propriè dicta ingravesens, *der grüne Staat* appellatur, eo quod pupilla ob nubeculam subtus enatam colorem velut marinum & viridescens exhibet. Perfecta verò cataracta, *der weisse oder Milch-Staat* / dicitur ob pupillam ab albescente viscidoque humore exactius obstructam; hinc increscens illa cataracta respectu depositionis cum acu faciendæ etiam dicitur *der unreisse Staat* / cum subtilissima ista &

(Yyyy 3)

quali



quasi araneacea filamenta nondum firmiter adeò cohaerint, ut acu mediante absque divulsione possint subtrahi. Cataracta verò perfecta, in qua filamenta ista in membranaceam tenacitatem coaluerunt, adeoque ab acu semoveri possunt, *der reisse Staar* dicitur. Cataracta hæc nunc sita est post membranam uveam, inter hanc & humorem crystallinum, nunc sita est ante uveam inter hanc & corneam, utrobique in humore aqueo: quædam corneæ vel uveæ accrescit, quædam non: imò suspicor, omnem adherere iisdem, atque reverà ex filamentis uveæ membranaceis, præternaturaliter oblongatis & excrecentibus, originem habere.

### C A U S A.

Communiter causa hujus suffusionis vel cataractæ est materia ista quasi nutritiva, ex qua in suo esse conservatur ille humor aqueus; sive ex arteriis deriveretur, sive ex quibusdam glandulis conglomeratis vicinis, earumque lymphæ subtilissima originem ducat; sive, quod alii putant, aqueus humor sit tantum simpliciter spiritus animalis vel opticus, in aquam condensatus. Hæc ipsa materia reddita impura, & inquinata particulis crassioribus vel excrementosis, uti puritatem humoris aquei tollit, ita si tales particulæ vitiosæ plus minus glutinosæ successivè invicem connectantur, & magis magisque cohaereant, tandem talem substantiam membranaceam, cataractam, efformant; ita ut in principio saltem subtilissime filamenta instar telarum aranearum soleant hinc inde in oculo vagari, postmodum verò successivè videntur uniri, & varias figuras repræsentare, donec tandem magis magisque compacta obscuret oculum, & membranulam incipiat constituere. Sed, ut monui, probabilius omnino videtur membranarum, uveæ aut alterius cujusdam fibras præternaturaliter excrecentes suffusioni occasionem subministrare. Hinc si postmodum membrana talis successivè coagmentata totam pupillam obtegit, visus planè aboletur, plus minus, prout nempe densior vel rarior fuerit: si verò tantummodo dimidiam pupillam obvelet, omnia dimidiata saltem apparent, sin tandem parva saltem incipiens cataracta medium exactæ pupillæ occupet, omnia quasi perforata apparent, & hæc est suffusio vera.

Nam datur præterea etiam alia, quæ vocatur suffusio notha, sed minus propriè ita dicta, qualis interdum in quibusdam, imprimis hypochondriacis, & jejunis varia circa oculos filamenta versari videntur, accidit etiam iis, qui diutius crapula & stomachi vitio laborant, dum aut pulvisculi, aut flosculi, aut melleæ filamenta aut similia ante oculos versari videntur; aut quando oculi penitus oc-

cæantur, quod in specie in statu febrium & morborum oculorum, in stante crisi per hæmorrhagiam narium, aut etiam in vitiis cerebri, & hinc ex vitiis stomachi, oritur. Curiosum hujus suffusionis nothæ exemplum refert *Timæus von Büdenfleë* in *Cas. pag. 60.* in paroxysmo febris tertianæ tantum affligens, in quo æger omnino cæcus redditus, extra paroxysmum optimè videns cælum.

Malum hoc subito transit, iterum redit, & sic porro; & in aliis sanis sæpissimè stomachum vitiosum pro fomite agnoscit, quocunque etiam modo exinde ad oculum fiat transitus, exceptis saltem febribus ardentibus, vel ex lymphæ etiam subtilissimè coagulata, hinc etiam notha hæc suffusio post crapulam in hypochondriacis assumpto jentaculo cessat: unde probabile est, eam per qualemcunque consensum ex stomacho dependere. Quæ aliis morbis supervenit, his curatis ferè cessat. In specie, qui ex vitio stomachi hac laborare solent, optimè aloëticis ventriculorum purgantibus, item mastichinis & aloëphanginis, omni menstruali tempore purgentur, sicuti etiam per usum zingiberis, aut crudi aut in India conditi, manè jejuno stomacho masticati aut esitati curantur.

Distinguendum autem est inter suffusionem veram, & inter glaucoma; utur apud *Borellum Append. Centur. 3. Observ. pag. 279.* aliosque Practicos, sæpè confusio fiat. Glaucoma nil aliud est, quam tale humoris crystallini vitium, quando hic debitâ suâ perspicuitate, qua se habet instar vitri clarissimi, fit nonnihil opacus, & consequenter obscurè coloratus, adeoque albedine fusca seu obscura, h. e. glauco colore, suffunditur & inquinatur; unde & perspicuitas ejus laeditur. Hinc enim in tali humoris crystallini constitutione evenit, ut neque radii visorii rectè possint transire, & color rerum pertransientium vitietur.

Vitium hoc senibus tandem naturaliter ferè supervenit, aliàs præternaturaliter, & quidem simpliciter ex mutata humoris crystallini consistentia, & majori ejus siccitate, densitate & impuritate originem ducit; sic enim minus perspicuus, sed opacus & nonnihil coloratus redditur. Confirmat hoc mechanica anatomica: si nempe humor crystallinus extra oculum sumatur, per eum instar lentis constitutum omnia objecta majora videntur; sin verò idem exsicceetur, vel in aqua fervida ebulliat, fit opacus, densior, & nonnihil albus.

Quodsi in junioribus oriatur ex nimio Veneris usu, sive crystallini sive aquei humoris vitio, convenit in specie, præmissis præmittendis, fomentatio oculi cum spiritu vini, mediante linteo duplicato oculis sub introitum lecti imposito, & per noctem ibidem

contento, qua ratione glaucoma etiam præservari potest. Melius est, si recipiantur flores borraginis vel buglossæ, infundantur cum spiritu vini, quæ tinctura applicata præservat aut curat in junioribus imminens glaucoma. Alii laudant tincturam buglossæ cum phlegmate aluminis, additâ aquâ albuminis ovorum destillata, paratam.

Causæ remotæ, quarum occasione humor aqueus particulis excrementitiis inquinatur, & cum iis quasi congelatur, sunt intempestivæ lachrymationes, ex qua *Bartisch Part. 1. cap. 3.* & *Hildanus Cent. 4. Obs. 15.* cataractam observarunt; oculorum inflammatio, & Venus, tam intermissa quam nimia; frigida potus, de quo vid. *Bartisch l. 4. & Panatollus Pent. 2. Obs. 6.* ac *Pentec. 3. Obs. 32.* contusio item & vulnera, vid. *Hildanus Cent. 5. Obs. 13.* repellentium fortiorum, v. g. in ophthalmia, abusus, nec non externa corrosivorum applicatio, vid. *Bartisch Part. 5. cap. 1. pag. 57. & 79.*

His quoque accedit cataracta connata, qualem Boyle *de Util. Philosoph. Experim. Tom. 2. Part. 1. pag. 72.* sanatam refert.

### DIAGNOSIS.

Signa in suffusione vera faciliè se manifestant, & in incipiente rarò fallunt: Nam conqueruntur ægri in cataracta incipiente de variis punctis, filamentis, stolis, fumis, aranearum telis, rete vel cribro, & similibus ante oculos obversantibus, muscis oculos circumvolitantibus, objectis sub alieno colore, aut duplicibus, multiplicibus, dimidiatis, fissis, &c. id quod ut plurimum rudimenti prim. pro cataracta est indicium, utut non æquè semper in perfectam suffusionem terminentur: Conf. *Bartholini Acta Hafniens. Volum. 2. pag. 244.* hinc visus sensim plus minus obscuratur, & color pupillæ nonnihil glaucus, quasi marinus, aut vitro nebuloso similis, apparet.

Quamvis interdum signa hæc plane desint, & ex improvise & subito satis cataractæ oriantur, & quidem non tantum occasione causarum externarum apud *Hildanum l. 4.* sed internarum quoque, ita ut experientia testetur, aliquos oculis sanis obdormientes, cæcos evigilasse, & ad humum lynceos flexos itidem cæcos se erexisse, quemadmodum *Fernelius Pathol. lib. 5. cap. 5.* *Hildanus Cent. 5. Obs. 14.* & *Bartisch Augendienst Part. 4. cap. 2. pag. 44.* perhibent.

Quodsi cataracta sit perfecta, visus omnino tollitur, & pupilla oculum insipienti nunc similis vitro contaminato, aut saltem obscuro aut minus perspicuo similis, nunc gypsi, nunc argenti vivi, nunc viridiusculus, nunc lividus, nunc alius color in eo apparet.

Tandem perfectus color albus, aut etiam alii post pupillam se exhibentes, jam perfectam suffusionem innuunt.

Cum verò hæc modò vera, modò notha sit, sciendum: in notha rerum circumvolitantium & obversantium phænomena crescere & decrescere; imò interdum planè evanescere, majora atque frequentiora observari ventriculo repleto, vel digestionem prima peracta, item in plenilunio & aëre turbulento. Omnia tunc per fumum & nebulam videri videntur, interdum penitus cæcitas inducitur, & si attente inspicatur oculus, insignis & profunda albedo circa pupillam apparere solet, Econtra si vera fuerit, coruscationes & apparitiones illæ sunt continuæ, semper augentur, adeoque visus magis magisque obscuratur, ut plurimum unum saltem oculum occupat, quemadmodum notha ob causam communem utrumque afficiat.

Ipsæ humor aqueus itidem crassescere, & ita visum plus minus impedire observatus fuit in affectu anonymo, utur ad suffusiones à quibusdam itidem referri soleat.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin horum pathematum: omnis suffusio malum est difficulter curabile.

Recens, & in qua ægri objecta omnia secundum magnitudinem, figuram, numerum, motum, &c. adhuc discernunt, medicamentis discuti potest; quæ verò magis confirmata est cataracta, ac densius concrevit, in qua æger lumen aut solis splendorem propius admotum etiam vix aut non videt, medicamentis nunquam, chirurgiâ difficulter curatur, licet etiam oculo sano clauso pupilla ægra dilatetur; quamvis *Schenckius Obs. lib. 1. pag. 159.* & *Boyle de Util. Philos. Experim. Part. 2. Sect. 1. pag. 72.* hanc solis quoque medicamentis interdum curatam perhibeant.

Quibus altero oculo conniventibus & palpebrâ fricatâ, unâ alterius pupillam dilatari contingat, si punctio admittatur, recipiendi visum spem esse, aut per medicamenta aut per chirurgiam; quando verò pupilla non dilatetur, nec constringatur, eam incurabilem esse; item quæ suffusio nigra est, & quæcunque splendoris nitorisque expers, nullo modo curari posse perhibent. Sed tamen hæc ipsa non adeò universalis sunt, quin revera subinde fallant.

In specie color albidus aut glaucus, & instar cæli, signum est, cataractam maturam & aptam esse, pro depositione chirurgica: quando verò color membranæ est albicans, ac etiam plane obscurus & lividus, signum est densissimæ cataractæ: Suffusio cærulea & viridis instrumentorum vim eludunt; dum argentea, cinerea & flava per chirurgiam interdum



terdum sanantur: modò hæc posterior nondum valde inveterata sit, utpote quæ uveæ tunicæ firmitus adhærescit, & corneam atque ossæam duritiem contrahit, unde vulgo *der Glas-Staar oder Kagen-Staar* audit.

Sicut autem inveterata nimis cataracta nec chirurgiæ cedit, propter tenacitatem, quæ corneæ aut uveæ tunicæ arctius connectitur, ut sine harum laceratione vix detrahi queat, ita minus incrassata seu non sufficienter maturata instrumentis contingere haud licet, ne discontinuata totum humorem aqueum turbet, aut mox iterum concretescens magis callosa evadat, utraque autem ratione visum enormiter lædat.

Annatam esse tunicis dictis pelliculam dignoscitur: si (1.) acriorum & rodentium externorum usus præcesserit; (2.) si linteolæ albicantes, corneæ, flavæ, &c. iridem oculi, oblique spectati, transeant; vel & jam (3.) in ipsa cornea, si hæc rectè inspicitur, punctula albicantia, i. e. ipsa suffusione splendidiore, appareant: imò uveæ etiam cohære conclusitur, si post oculi compressionem atque frictionem pupilla non dilatetur.

Maturationem verò convenientem ante sextum vel septimum annum olim vix expectabant, hinc ad illud usque tempus operationem differebant, cum tamen solâ temporis mensurâ cataractæ crassities ac maturitas sufficiens determinari nequeat, eò quod suffusionem alia citius alia tardius vel propter diversâ materiæ quantitate, vel coagulâtoris, v. g. caloris majore aut minore vi eam acquirat: ita alba vix ante sextum annum chirurgiam admittit, & si citius instrumento tractetur, ab hoc instar lactis dissolvitur. Pariter si operatio diutius differatur, per eandem in lamellas tenuiores instar glaciei frangitur. Cinerea verò citius maturescit, i. e. sæpius intra quinque vel sex menses.

Cærulea minus frequens & curatu difficilima est, cum tardius ad soliditatem decentem pertingat, spiritus interim valde debilitet, vel potius humorum pelluciditatem destruat, ita ut, pellicula licet separata, visus tamen obscuritas & imbecillitas remaneat.

Viridis & flava citius maturescunt; posterior tamen, prout superius dictum, nisi mox detrahatur, instar cornu durefcit, hinc chirurgiam respuit.

Porro cataracta in junioribus potest facilius deponi, & sine recidivæ periculo, in ætate autem senili sponte suborta suffusio unius oculi successivè, ubi confirmata fuerit, etiam alterum oculum infestat, & ita ægri perfectè cæcutiunt: non potest deponi, & si deponitur, recidivat, vel regeneratur, vel senes non adeò perspicuum visum recuperant.

Quæ cum dolore capitis præcedente vel præsentente, difficilioris curationis est.

In cura suffusionis, in primo & secundo gradu existentis, substantia ista heterogenea, in humore aqueo adhuc fluctuans, ante sui concrectionem discutienda, & concreta jam, quantum possibile, attenuanda, resolvenda aut dissipanda, idque saltem in incipiente; sicuti firmitus concreta mediante acu deorsum versus ex situ suo removenda est.

Remedia ergò quæ hic conveniunt interne, sunt remedia ophthalmica, qualiacunque fuerint: quæ inter eminent millepedes, quorum usus internus mirabiliter extollitur à Boyle in *Philos. Experim. pag. 55*. Laudatur etiam euphrasia, cujus usu septuagenarios visum recuperasse testatur Hildanus *Epist. 59*. item decoctum viperarum cum aquis ophthalmicis paratum videb. in Claudino *Consult. 56*. A plurimis laudantur decocta lignorum sudorifera cum euphrasia, chelidonio, verbena, sceniculo, & betonica parata, vid. Claudinus & Zecchius.

Quoad remedia externa: necesse est subtilia, & quantum possibile, penetrantia sint, quæ oculis instillanda veniunt, frustra aliàs laborabitis. Ut igitur melius penetrare queant, conveniens est, ut prius fomentetur oculus vel sacco emolliente, vid. Hartmannus *cap. 41. §. 3*. vel usurpetur Fetus Plempii, descriptus à Timæo von Guldentlee *lib. 1. Epist. 24*. Quibus subjungantur ea, quæ oculis instillanda sunt subtilia: quæ inter præ ceteris eminent aquæ ophthalmicæ antimoniales, quæ nobilissimæ sunt in quamplurimis oculorum affectibus, & in specie suffusionibus.

Convenit ergò infusum vitri antimonii pulverisati; loco cujus vitri non immeritò alii caput mortuum butyri antimonii, vel crocum metallorum pulverisatum, pro infusione in aquis ophthalmicis suadent: quæ infusa in loco calido aliquandiu digesta, & hinc filtrata, additis aliquot granis camphoræ & croci, in forma collyriorum crebrius quotidie oculis instillata, & aliquandiu continuata, sunt optima. Riverius pro simili infusione commendat vinum album. Post hæc conveniunt etiam egregiè aquæ compositæ ex formicarum ovis cum felle mustelæ piscis præparatæ. Nempe

℞. *Ovor. formic. ʒiv.*

*fell. must. pisc. No. xxx.*

Mista omnia lento igne destillanda sunt; exit enim sic aqua turbida, quæ filtrata servetur ad usum, & tempore vespertino pro collyrio ad cataractam delendam oculis applicanda.

Ferdinandus verò in *Histor. Med. mirab. 25*. laudat pro collyrio aquam destillatam ex stercore humano, in qua dissolutum sit fel mustelæ.



mustelæ piscis, aut etiam leporis cum tantillo sacchari candi, & margaritis subtilissimè preparatis; liquorem hunc oculis instillare crebrius jubent. Nec omittenda venit a-zungia viperarum, vel instillata vel inuncta saltem. Chelidonium majus semiputrefactum, item cancri fluviatiles, dum incipiunt putrescere, destillata suggerunt aquam alcali subtilissimo ebriam insigniter penetrantem, & contra suffusiones utilem. Quodsi non videntur sufficere hæc, confugiatur ad aquam istam ophthalmicam Quercetani, quæ sub destillatione spiritus seu aquæ epilepticæ ex vitriolo & urina pueri, aliquamdiu digestis, hinc destillatis, primò prodit, ubi duplex phlegma colligitur, utrumque penetrantissimum, falsum volatile, quod sine sensu oculum penetrat. Vid. Schræderus in *Pharm. ubi de Vitriolo*, & Tachenius; vel loco hujus paratur ex tempore sequens ad modum Quercetani ex urina puerorum & vitriolo. Phlegma hinc elicitedum est subtilissimum, & quod penetrando fortiter discutit suffusiones, v. g.

*Re. Cæ pueror. fßß.*

*Öli alb. ʒiv.*

stent per aliquot dies in digestionem, & postmodum destilletur exinde aqua ophthalmica volatilis fortissimæ penetrationis.

Potest etiam ipsis succi chelidonii majoris libra una admisceri, & ita invicem destillari.

Nec minus penetrans est ille liquor, quando vel albumen ovi induratum interiùs excavatum perforatur & repletur saccharo candi & vitriolo albo, & ita suspenditur in cellam; sic enim destillat per deliquium liquor, diluendus cum aqua euphrasæ, qui egregiam dat aquam ophthalmicam.

Pertinet huc etiam aqua Hartmanni ex lapide scissili & sale in *Praxi sua Chymiatr. pag. 206.* descripta. Extractum chelidonii majoris, succus nempe inspissatus, magnitudine aciculæ capitis oculo impositum, multum laudatur in incipiente suffusione ab Hildano *Epist. 59.*

De anagallide flore purpureo, ejusque aqua, vid. Hollerius *lib. 1. de Morb. Intern. cap. 21.* Liquorem ex pane, cum sem. sceniculi & rutæ, cum modico mellis mixto, & recen-ter ex furno protracto, atque intra duas patinas stanneas concluso, prolectum commendant Mercurialis *Tom. 1. Consil. 87.* & Zecchius *Consul. 27.* Spiritus vini cum linteis multiplicatis oculo impositus extollitur à Timæo von *Guldenslee/ Epist. 26.*

Denique Hartmannus *loc. all. cap. 43. §. 3.* habet aquam ophthalmicam zinziberatam, quam non potest sufficienter laudare Lindanus in affectibus oculorum ferè quibuscunque, in specie ad suffusiones; testatur enim Lindanus quod aliquoties dicta aqua suffu-

siones etiam factas curaverit, in specie quandam mulierem, quæ in utroque oculo suffusiones habuerit.

In præservandis & curandis suffusionibus his, observandum simul, quod subinde etiam cum fructu & felici successu in principio seu incipiente suffusione adhibeantur velicatoria in nucha aut prope aures; teste Hildano *Epist. 67.* sicut in senibus fontanellæ feliciter inuruntur; sed in confirmata parum valent. Conveniunt quoque setacea & hujus farinæ alia; vid. Hildanus *Cent. 1. Observ. 41. & 42. Cent. 4. Obs. 6. 7. 17. & 19.* Glandorpius *cap. 24.* & Scultetus *lib. 1. Fab. 3. fig. 2. 3. &c.* Quodsi hæc nimis molesta videantur, loco horum egregium quoque & singulare remedium est secretum Schlegeri, nempe radix Thymelæ arborecentis seu Mezerei in aqua solutionis nitri, vel lixivio ex cineribus vitium, macerata & siccatà loco auris priùs acu perforato immissa, instat foniculi successivè phlegma copiosum eliciens. Hujus Thymelæ radice mentionem facit Riverius *Cent. 4. Obs. 100.* item Timæus von *Guldenslee in Epist. pag. 52.* de perforatione aurium. Conf. etiam Bartholinus in *oculorum affectibus.*

In subjectis habitioribus aut copiosiore sero turgentibus in principio mali fumus nicotianæ laudandus venit.

Denique si alia irrita, ipsa verò cataracta in perfectam firmamque nondum coaluerit membranam, dubium: annon salivatio Mercurialis simili modo, atque in Venerea luc instituta, penetrante intimè Mercurio, instituenda veniat? idque eò magis, si ex luc Venerea oriatur. Inclinat ad hanc affirmativam Fonseca *lib. 1. Cas. 29.* Per experientiam verò felicem hoc illustrat Boyle *Phil. Experim. pag. 65.* Conf. etiam Schenckius *Obs. ubi de Luc Venerea pag. 159.*

## MEMBRUM IV.

De

*Vitio nervi optici.*

## PUNCTUM I.

De

*Gutta serena.*

**V**itiatur etiam visio, quando recta radii visivi extrinsecus illapsi pertingunt per totum oculum usque ad tunicam retinam, eamque feriunt, nulla verò sequitur visio, utut nulla aperta aut sensibilis in oculo appareat læsio aut alteratio, tunc vitium hoc dicitur Græcis amaurosis, Latinis gutta serena, Germanis *der schwarze Staat* / & est omnimoda cæcitas.

(Zzzz)

CAUSÆ.

## C A U S Æ.

Cæcitatis hujus causa quærenda est ferè semper vel in nervo optico, vel ejus expansione, quæ tunicam retinam constituit. In nervo optico quidem contingit gutta serena, quando hic vel obstruitur, vel comprimitur, vel alio modo læditur, vid. *Bartisch Augendienst Part. 6. cap. 1.* *Lossius lib. 1. Obs. 27.* *Platerus Obs. pag. 108. & 110.* & *Riverius Pr. lib. 2. cap. 1.* quibus à *Sculteto Obs. 26.* etiam contabescencia dictorum nervorum accensetur. Sic guttam serenam à tumore globoso in cerebro, nervos opticos premente, proveniente notat *Platerus lib. 1. obs. pag. 101.* non minus ac *Pavv obs. Anat. 2.* notat cæcitatem ex improvise ortam in diabetica, ob vesicam ingentem aqua plenam circa conjunctionem nervorum optico- rum inventam. Sternutatio nimia etiam cæcitatem induxit, autote *Hildano Centur. 1. obs. 24.* vid. etiam *M. A. N. C. Ann. 1. obs. 71. pag. 174.* A fortiori cerebri commotione, v. g. post casum, observavit *Hildanus Cent. 5. obs. 8.* ab alapa *Zacutus Lusitanus lib. 1. Prax. Admir. obs. 52.* & *Amatus Lusitanus Cent. 7. Cur. 44.* Pariter interdum post alios morbos plus minus acutos curatos supervenit talis gutta serena, nunc per metastasin nunc alio modo commotâ causâ materiali occasionali, obstruente vel vitianti nervum opticum: sic enim ex scabie scorbutica retro- pulsa cæcitatem observat *Sennertus lib. 1. Pr. pag. 886.* item ex sublata natta ex nucha *Horstius in obs. pag. 547.* item ex ulcere pedis intempestive clauso *Timæus von Guldensee lib. 1. Cas. 28. pag. 60.* ex usu decocti guajaci in lue Venerea, non purgato corpore, *Henricus ab Heer obs. 4.* non secus ac *Rhodius ab intempestivo sudorifero Cent. 1. obs. 37.* à venæsectione *Fontanus Exemph. 10. f. 48.* ex veneno *Tulpius lib. 1. cap. 31.* à purgatione fortiore *Ammanus Med. Crit. Cas. 79. pag. 530. &c.* Alias curiosum est, quod refert *Bartholinus Cent. 3. Epistol. pag. 275.* de monacho, qui quoties barbam ralerit, visum amisit; quando verò ea iterum crevit, visum recuperavit.

Sed præter nervum hunc opticum vitium interdum etiam hujus nervi expansio membranacea in bulbum oculi, quæ tunicam retinam constituit, interdum causa primaria est guttæ serenæ, quando nempe hujus tonus, & legitima tensio, quæ fortiter expansa à quovis radiorum visualium illapsu movetur, remittat, relaxetur, ac ita flaccida ac molliuscula evadat, ita ut non nisi à forti aut etiam nullo radio visivo moveatur, unde exinde omnino perit visus.

Quò etiam facit, quando ex causis externis, forti percussione oculi, vel ex casu in

occiput, vel ex forti stermitatione aut etiam ex nixu nimio epileptico, laceratur quasi, aut alia etiam ratione vitatur membrana tunicæ retinæ. Porro ad istas causas, quæ possunt inferre læsionem tunicæ retinæ, & inde guttam serenam accensendus venit objecti nimis splendentis, v. g. solus diutinus nimis aspectus, aut etiam diuturnior & continuata lunæ plenæ inspectio, cujus exemplum habet *Henricus ab Heer loc. all.* item *Salmuth Cent. 3. Hist. 83.*

Quò etiam facit, quod ex bombardarum horribili coruscatione & impetu visus sine externa nota subito amissus fuerit, teste *Schenckio in Obs.* item dolores colici: *Platerus lib. 1. Observat. pag. 102.* observat dolores colicos cum convulsione & cæcitate quotannis recurrentes; item *pag. 100. & 102.* alia exempla refert ejusmodi cæcitatum post convulsiones natarum; non secus ac *Schenckius in Observ.* ex colicis doloribus excæcatam mulierem perhibet: Sic *Hildanus Cent. 5. observat. 5.* cæcitatem ortam refert post curatam epilepsiam per vomitum. In genere observandum; nil magis nocere oculis, quàm nimium Veneris exercitium, adeò, ut hujus solius occasione quosdam gutta serena affectos meminim.

Sunt porro, quorum oculi ex idiosyncrasia à quibusdam assumptis notabiliter alterantur: Novi virum, qui ex variolis à pueritia oculos habet debiliores, qui, quoties caneros comedit fluviatiles, toties exasperantur pathemata oculorum; id quod & ex milio ipsi evenit: Sic alium novi ex canceris idem malum contraxisse; *Aromatarium* novi, qui ex volatilium acrium, armoraciz, cochleariz, sinapi, &c. abusu notabilem oculorum hebetudinem incurrit; hinc communiter sæpe oculis hostiles dicuntur: Novi virum jam senescentem vertiginosum, qui ex usu spiritus salis Ammoniacy notabilem visus hebetudinem percipit.

Singularem guttam serenam gravidis solennem, quæ statim ab imprægnatione invadit, & ad aliquot menses, imò per totum gestationis tempus, molesta est, & post partum spontè remittit, videbitis in *Bartisch Augendienst*; qualem etiam iisdem, quæ mensium suppressione laborant, evenire, neque, nisi his restitutis, evanescere testatur.

## D I A G N O S I S.

Cæterum guttam serenam in cæcitate adesse, non semper manifestum est; nam possunt etiam occulta oculi vitia cæcitatem inferre. Hinc ut vitii retinæ conjecturam probabilem hauriamus, attendatur: quando nullo vitio sensili aut notabili in oculo præsentente homo nihilominus cæcus evadit; & qui-



& quidem cæcitas ista si fiat paulatim, suspicio est, quod ex vitio partium quarundam in oculo non apparente fiat cæcitas: quæ verò confestim fit, aut breviter sua incrementa capit, citra sensilem læsionem, ex vitio nervi optici quod fiat, probabilissimum est, si præcesserit læsio cerebri aut capitis, nervos plus minus afficiens. Aliàs quæ de amplitudine, dilatatione pupillæ &c. profertur indicia, ferè fallacia sunt, quibus solis non fidendum, prout dicit Platerus in *Praxi*. Dicunt enim, si fricando oculum unum, & alterum comprimendo, in pupilla ejus, qui fricatur, appareat dilatatio & constrictio, nervum opticum esse illæsum, spiritumque liberum habere commeatum, atque tunc cæteris paribus vitium hædere in tunica retina, vel in alio oculi loco. Si nulla planè sit dilatatio, vitiatos esse nervos opticos; nam amplitudinem pupillæ etiam in hominibus sanis, ad loca tenebriora se convertentibus, naturaliter dari; in casu verò allabentis luminis excellentioris pupillam arctius constringi, ne oculus nimia radiorum ubertate obruatur, certissimum est. Parilis subest error quoad dilatationem: nam dum æger luci obvertitur, ut pupilla tantò clarius videri possit, pupilla identidem ad luminis excessum connivet, quod etiam cuivis sano accidit.

## P R O G N O S I S.

Quoad Prognosin: Senes naturaliter quoad visum hebescent, & interdum ex relaxata tunica retina omnino obcæcantur, unde gutta serena laborantes non restituantur, si ve dependeat eadem ex vitio nervi optici, vel retinæ.

In genere enim omnis gutta serena difficulter curatur, in specie quæ subito fit; e. g. ob sortem capitis plagam, aut casum ab alto; quia ejusmodi affectus est talis, ut remedia, antequam ad oculos penetrent, suam vim amittant.

Difficilis etiam curationis est gutta serena, quæ fit à tumore, qualem Platerus *Obs. pag. 108.* describit; à nervorum laceratione; eorundem labe, quæ visum penitus abolet, utur hanc, modò causa mobilis fuerit, interdum curatam Platerus *l. a. pag. 110.* testatur. In imperfecta verò gutta serena major salutis spes est, vid. *Bartsch l. a. præfat. cap. 3.* Riverius *l. a.*

## C U R A.

Si adsit cæcitas ex gutta serena, curatur ea partim internis, partim externis. Insuper quidem conveniunt evacuantia per sudorem & alvum, & alterantia, quæ per experientiam visum confortare, tam internè

quam externè, hætenus observata fuerunt. Imprimis dicta exquisita summoperè necessaria est. De cætero quoad remedia evacuantia, vomitoria cautè usurpentur, cum *Hildanus Cent. 5. observ. 19.* referat, exhibito vomitorio ægrum visum amisisse ejusdemque beneficio eandem recuperasse; sicuti idem *Cent. 5. observat. 5.* post curatam epilepsiam per vomitum cæcitatem ortam esse refert. Tutius ergò est, alvum stimulare per interiora, cum alvi profluvio restituti interdum observati sint oculi. Quæ alvum evacuant, temperata sint, utut enim à veteribus pilulæ lucis, ut vocant, & quidem majores pro senibus, & minores pro juvenibus, præscribi soleant, minus tamen ipsis fidendum est, cum scammoniata & quæcunque purgantia acra in oculorum affectibus magis noceant, quam prosint, secundum *Panarolum Pentec. 4. observat. 9.* Magis ergò temperata, & minus resinosa, sed moderatè acra usurpentur. Pilulæ aloëphanginæ singulis noviluniis ad 3℔. assumptæ, & deinde continuatæ, ad oculos nebulosos mirè commendantur. Aliàs etiam infusum sennæ & agarici cum sale tartari in aqua euphrasiæ & fœniculi pro purgatione in oculorum affectibus adhibetur; aut pilulæ ex extracto panchymagogo cum oleo destillato fœniculi subactæ conveniunt. *Hermodactylorum* genuinorum pulvis singulariter etiam ad oculorum affectus pro scopo purgante laudatur à *Deodato in Valetud. pag. 153.* Potest etiam fieri vinum medicatum alterativum & laxativum.

Inter sudorifera excellunt, quæ ex lignis patantur, & imprimis sassafras. De cætero inter alterantia appropriata aromatica blanda oleosa, & nonnihil amara, oculis singulariter conveniunt: sed acra & volatilia manifesta, v. g. cephæ, & quæcunque alliata, armoracia, spiritus salis Ammoniaci etiam, internè oculis nocent: sic novi viros, qui quoties armoraciâ utuntur, semper in obcuritatem visus incidunt: hinc cum aliquando cuidam seni adhuc Veneri & vino indulgenti, & aliis affectibus nervorum, & oculorum obnoxio, ordinassem cum aliis spiritum salis Ammoniaci, ex hoc maximum percepit cæcitatis periculum, utut aliàs hoc remedium sit insons. Cæterum palmam ducit euphrasia, indeque parata conserva, vinum euphrasiatum, essentia euphrasiæ & lithilia, vid. *Gabelchoverus Cent. 3. Curat. 100.* *Valeriana*, ejusque radix, mirè laudatur à *Tabernæmontano*, ad visus restorationem. *Chelidonium* majus singularissimum est ophthalmicum, item *levisticum* ac *fœniculum*, omniaque horum præparata, hinc etiam lignum sassafras, quod etiam ad nyctalopiam admodum com-

(Zzzz)

mendat



mendat Ferdinandus in *Hist. Med. Mirab.* pag. 51. Porro hisce addantur baccæ junipeti, carduus benedictus, ruta, semina 4. calida majora, helenium, rosmarinus, ex quibus spiritus, essentia, vina medicata, &c. parari possunt.

Hinc conveniunt noduli ex hujusmodi simplicibus vino infusis, in & ante pastum subinde hauriendo, quorum descriptiones videb. in *Cent. 2. Kesleri Processuum* pag. 69. & *Hartmanni Prax. Obymiatr. cap. 25. §. 2. pag. 94.* Simili ratione parantur etiam essentia ophthalmica ad intra, qualis fuit D. Michaëlis, similibus ex speciebus paratæ. Vinum enulatum & rosmarini etiam oculos confortare dicuntur.

Facit huc pulvis pro conservatione visus laudatus:

℞. HB. Beton.  
Ruta.  
Chelid. maj.  
Euphras.  
levist.  
sem. Anisi,  
rad. levist.  
Valerian.  
Cinnam. 22. ʒj.  
Cardam.  
Zingib.  
Galang.  
sem. Fenic.  
Petrosel.  
siler. mont.  
herb. origani à ʒß.  
sacch. ʒj. M.

Ex quibus f. pulvis, qui aliquandiu ante pastum & in pastu sumatur.

Churfürst Friedrich hat dieses Pulver hoch gehalten/welches einem/so sieben Jahr blind gewesen/nachdem er es 14. Tage continuirlich gebraucht / sein Gesicht wieder gebracht.

Electuario ex seminibus ad visus imbecillitatem simplici, sed efficacissimo, usus olim Innocentius III. ex semine fœniculi, sileris montani, apii, anethi & petroselini, cum melle, quo viro centum annorum visus amissus restitutus fuisse dicitur; quod ex MSCto antiquo Serenissimi Principis Mantuani 1448. adnotatur: vid. Velschius *Miscrom. Cent. 2. Obs. 96.* Solenander *Seët. 2. Conf. 9.* ad imbecillitatem visus mirè commendat hunc pulverem:

℞. Sterc. falcon. sic. ʒij.  
sem. fenic. ʒj.

Subtilissimè trita misceantur, & partim quotidie usurpetur internè, partim tantillum caligantibus oculis imponendum.

Excellunt etiam ex regno animali ex formicis quævis parata remedia, quæ ad roborandum visum internè mirificè conducunt, ut aqua magnanimitatis, item lumbricalia, &

tandem ex millepedibus parata. Nam quantum valeant, millepedes vino infusi ad visum restituendum & suffusionem curandam de quo omni manè assumatur haustus: singulæ exempla refert Boyle in *Util. Philosophie Experimentalis* pag. 154. & 155.

In gutta serena à solo spiritum opticonum defectu, propter evacuationes nimias, e. g. Venerem nimiam &c. dissipatorum, sola alimenta expepta & aromatica analeptica conveniunt: conf. Panarollus *Pent. 3. Observ. 46.* Sicuti aliàs diætæ tenuis observanda, vitando simul alimenta crassiora & flatulenta, quatenus Riverius *Observ. 29.* à Fomio *Commun. testatur*, guttam serenam casu per inediam solutam fuisse.

Hisce internis etiam addenda sunt externa: quæ inter ad oculos sanos confirmandos & præservandos, debiles verò restituendos, multum convenit ros majalis plantis ophthalmicis, & speciatim fœniculo, infidens, oculis bis de die instillatus & crebrius usurpatus, qui lucubrationibus nocturnis oculis nocere, convenit liquor fœniculi saccharatus Bartholeti. Sic etiam infusa antimonialia præstant, & aquæ ex fellibus piscium destillatæ, quarum jam supra facta mentio, in specio lucii, non sunt contemnenda, item aquæ ophthalmicæ exemplum non inelegans videbitis in Bartholini *Actis Med. Hafniens. Vol. 2. pag. 304.* quæ tam solitariè usurpari, quam pro infundendis antimonialibus egregiè adhiberi potest: item aqua stercoris anserculorum destillata. Inter alia etiam eminet supra laudatum illud oleum sive liquor hepatis mustelæ piscis, de cujus efficacia mirabilem habet observationem Forestus *lib. 2. Observ. 28.* cum quo conf. Borellus *Cent. 3. Observ. 91.* Huc etiam facit pinguedo viperarum, quam tum in hoc tum in omnibus oculorum vitiis mirè deprædicat Ludovici in *Pharm. & Wedelius de Fac. Medic. p. 182.* His addatur succus seu liquor de formicis majoribus expressus, & per residentiam sponte depuratus, qui bis in die instillatus omnes cæcos curare laudatur. Quin etiam aqua ista, quæ verno tempore ex pampinis vitis incisis destillat, ad oculorum vitia similiter commendari solet.

Denique convenit etiam liquor iste, qui ex lumbricis, vitro & massæ panis fermentatæ inclusis, in clibano per deliquium solutis emergit: nempe si oleum istud per linteum densum transcoletur, & cum tantillo camphoræ acuetur, blandissimeque oculis illinatur. Quidam mirificè commendant contra oculorum hebetudinem & cæcitatem sequens unguentum expertum Brendelli *Conf. 55.* ubi refert, quod Uratislaviæ femina quædam per 14. annos altero oculo cæca visum recuperavit: nempe

℞. Mel.

*℞. Mell. anthosat. & despumatum,  
Zingib. pulverisat.  
Caryophyll. minutiss. pulveris.  
Sis comm. aa. ʒiʒ.*

Miscentur hæc omnia invicem cum melle in unguentum liquidum.

De quo particulam quantitate seminis sinapi indidit oculo; qui quidem exinde primo vellicatur, sed statim desinit & postmodum plurimum humiditatis ex oculo effluit, quod continuetur aliquamdiu, donec effectus succedat speratus.

Denique vesicatorium pone aures aut nucham applicetur, eoque exsiccato vel fonticulus vel setaceum in nucha excitatum multum valent ad guttam serenam: conf. Sculteri *Armat. Observ.* 34. Vel potius duplex excitetur fonticulus ad latera quartæ aut quintæ colli vertebræ; imò ipsi vertici inutendum esse fonticulum, & vesicatorium toti capiti admovendum, Riverius *loc. all.* monet.

Nec negligenda sunt masticatoria, quæ Plempius *Ophthalmogr. lib. 5. cap. ult.* & Spiegelius *Disquis. Corp. Hum. lib. 7. cap. 2.* sternutatoris præferunt, unde etiam usum fumi nicotianæ approbat Hildanus *Epist.* 67.

## ARTICULUS II.

De  
*Visa imminuto,*  
& in specie  
De  
*Nyctalopia.*

**C**Æcitati suo modo cognatum malum est *Nyctalopia*, quando æger de die medioctiter, vesperi parum, ad lucem candelæ ferè nihil cernit. Exempla hinc inde observantur; imprimis Heer *Obs.* 4. notat nyctalopiam, cui in serena tempestate apparent nebulæ; in turbido verò & obscuro loco minus. In specie Manardus *lib. 6. Epist.* 15. refert quendam interdum imbecilliter, vesperi parum, noctu nihil cernentem, nisi lucerna geminata sit.

### C A U S Æ.

Ex jam dicto exemplo ferè concludo: Causam nyctalopiæ videri paralyticam tunicæ retinæ laxationem, quæ non nisi fortiore & intensiore objecto ac lumine moveri potest.

Remotas inter causas dextra mala multum promovet nyctalopiam, teste Hæchstedtero *de ad. 9. p.* 346. Ex usu loliacei panis notat Schenckius *Hist. gen. humor. cap. 2.*

### C U R A.

Nyctalopia hæc difficilis curatu est, ac præsertim inveterata non curatur. Remedia inter alia decoctum ligni lassafas multum commendat Ferdinandus in *Hist.* Item je-

cur anguillæ super carbones assatum aliquoties ante cibum assumptum specificum est Panarolli *Pent. 3. obs.* 49. cujus loco epar bovis coctum in tres partes discissum, & omni manè jejuno ventriculo pars cum successu usurpata fuit: vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *obs.* 133. *pag.* 243.

Denique pulvere ex semine fœniculi, anisi, coriandri, &c. curata fuit nyctalopia à Gabelchovero *Cent.* 4. *Cur.* 49.

## CAPUT II.

De  
*Auditus læsionibus.*

**A**uditus læditur duobus ferè modis:  
1. Quando imminuitur obauditione, h. e. in difficili auditu, aut quando omnino aboletur in surditate: Ac  
2. Quando depravatur aut vitatur, ita ut soni, qui non sunt, audiri existimentur, in affectu tinnitus & sonitus aurium appellato.

## ARTICULUS I.

De  
*Auditu imminuto, & abolito.*  
Seu de  
*Surditate.*

**C**ontingunt hæc læsiones tanquam symptomata, vel in morbis malignis aut acutis, idque ut plurimum fausto omine, dum interdum crisin prætendit, interdum verò conatum saltem criticum ad parotides; vel extra hos, idque nunc vitio proprio undecunque contracto, nunc aliis chronicis affectibus superveniunt, v. g. lvi Venereæ.

### C A U S Æ.

Quod causas hauriendæ sunt ex quatuor fontibus. Imminuitur enim aut aboletur auditus

I. Vitio auris externæ, si scilicet hæc sit abscissa, vel alio modo læsa; tunc enim tantum obscurus & raucus minusque distinctus sonus percipitur: unde taliter affecti manibus cavis auribus admotis defectum istum resarcire coguntur. Quod pertinent etiam alia instrumenta otica pro surdastris, quæ vid. apud Schottum in *Mag. Nat. lib. 3. Art.* 2. *Syntagm.* 4. *Pragm.* 1.

II. Vitio meatus auditorii, obstructi scilicet aut infarcti, quò minus aure externâ motâ possit æther interior ad aurem internam progredi: quod sit non tantummodò à rebus extrinsecus illapsis, pilis, nucleis cerasorum, &c. sed etiam ipsa cerumina, diutius in auribus retenta, & tandem indurata, subinde  
(Zzzz 3) idem



idem præstant. De gryllo in aurem ingreſſo vid. M. A. N. C. *Ann.* 4. *Obſ.* 50. Nec tantum meatus auditorius externus, ſed & internus in fauces hians, ſimiliter anguſtatus, auditus difficultatem infert. Quod facit ſurditas ab incremento nimio glandularum, prope quas excurrit meatus auditorius in os, obſervata à Tulpio *lib.* 1. *Obſ.* cap. 35.

III. Vitiò membranæ tympani. Sanè dubium non eſt, quin vitiatâ hâc membranâ tympani lædatur plus minus auditus; cum certum ſit, ipſam non fruſtrâ eſſe conditam in meatu auditorio, ſaltem de uſu ejus eſt dubium, qui probabiliter ſaltem ſtatuitur præſervatorius auris internæ, & nervi intrinſecus expaſi auditorii ab externa vi frigoris, aëris, pulveris, ſimilibusvè injuriis; nec magis pertinere ad auditum ipſum videtur, quàm vitrum in fenestris ad viſum, i. e. ſicut hoc intromittit lumen ſine offeſione eorum, qui ſunt in conclavi, ita illud permittit ſonum tranſire, & excludit, quæ aliàs læderent organum, quemadmodum apparet in experimento, quò fractâ membranâ tympani canis videtur nihilominus audire per aliquot ſeptimanas, donec aliæ cauſæ, v. g. frigus externum, corrumpant organon: Sic Horſtius *lib.* 7. *obſerv.* 8. pag. 444. notat tympanum per abſceſſum putredine abſumptum, ſine ulla tamen auditus læſione; Sicuti etiam Schneiderus *lib.* 3. *de Catarrh.* pag. 402. eandem membranam ruptam, aut totam ferè excretam, nullam tamen noxam auditus attuliſſe, obſervat.

Læditur auditus vitiò hujus membranæ vel ruptæ, v. g. à cauſa externa, imprimis ex forti nimis ſonitu, cujus impetu divelli & plus minus lacerari vel rumpi ſolet: vid. Hildanus *Cent.* 3. *obſerv.* 7. hinc ſit interdum, ut ab exploſione ſcolopeti ſurdaſtri fiant; vel exæſæ & plus minus exulceratæ, ut obſervatum in abſceſſibus aurium internis, item in variolis & morbillis interiora auris obſidentibus; aut etiam ſecundùm Riverium vitiò membranæ relaxatæ nimis, nimisque humectatæ, tam propter cauſas internas in affectibus catarrhalibus, quam externas, nempe humidam aëris conſtitutionem: hinc quidam ſub tempeſtate pluviali, vel conſtitutione aëris auſtrina vel humidioris, gravio-rem habent auditum, membranâ iſta ab aëris humiditate plus minus relaxata; ex qua cauſa videtur orta ſurditas ex copioſo oleo communi auri inſtillato, quam refert Timæus von Güttenſlee in *Reſp.* pag. 109. in ſerena verò & ſicciori, admodum acutè: uno nomine paralyticæ factæ; aut denique vitiò ejusdem convulſæ ac fortiter nimis expaſæ. Requiritur namque ad debitum aëris moti ſeu ſoni tranſitum, ut membrana iſta ſit tenſa, & firmiter diſpanſa; aliàs laxa-

ta membrana certò extingueret & ſupprimeret ſonitum, pariter ac in tympano videmus: Conf. *Act. Anglic. Volum.* 1. pag. 553. Nam quoad paralyticam membranæ hujus conſtitutionem, pertinet huc illa ſurditatis ſpecies à Willisio in *Anim. Bruor. Part.* 1. cap. 14. obſervata, quando quidam ſunt ſurdi & nihil audiunt; quando autem pulſatur tympanum, vel campana, vel inflatur buccina, ſub tali fortiori ſonitu impulſa redit in debitum tonum, & ſic alios intelligunt. Novi mulierem aliquamdiu ſurditate laborantem, tandem audito ſonitu in capite, ac ſi bombardæ exploderetur, ceſſavit, dicebat: *Sie hätte nicht gemeynet/ daß es in ibrem Kopffe wäre/ hat die andern Leute gefragt/ ob ſie es nicht auch gehöret/ oder geſchoſſen hätten.* Pertinet huc etiam ſtupefactio tympani; vel ab ære frigidiore; vel narcoticorum abuſu; vel incruiatione; vel exſiccatione, aut per ætatem, aut inepta calidorum applicatione, quale exemplum de pane calidiore annotavit Bartholinus *Cent.* 6. *Hiſt.* 77.

Quoad convulſionem hujus membranæ: arbitror, ſubinde convulſivi quid pati, quatenus ratione muſculorum convellitur, & ita nimis tenſa & expaſa redditur; tunc enim propter talem tenſionem & ſpasmus nequit commodè ab aëre externo percuti, ſed ille ſine fructu retrocedit. Fit hæc v. g. in hypochoſdriacis, quibus ſæpe aliquid ante aures obtendi videtur, quod nil aliud innuit, quàm quod iſta membrana tympani convulſa tendatur; quando verò iterum relaxatur, iterum audiunt, unde dicunt: *daß es ihnen ſo jählung vor die Ohren ſalle/ und auch jählung wieder vergehe/* ibi ſubito tendi nimis, ſubito remittere, denuò videtur. Sanè etiam in auditus læſione ventriculus cum nervis confuſus ſubindè attendendus, utut à priori non adeò benè explicabilis, cum ſubinde, prout ventriculus vel vacuus vel plenus eſt, remitti aut intendi etiam malum obſervetur.

IV. Tandem vitiò nervi auditorii ſeu acutiſti in cochleam expaſi ut plurimum imminuitur vel aboletur auditus, ſi nempe hic ſit (1) vitiòſè conformatus, ita ut non ad aurem internam, ſed ad alium locum deriveretur; quod ſit ſub prima fortis formatione, unde tales ægri ſubinde ab ortu ſolent eſſe ſurdi, & ut plurimum ſimul muti. vid. Deuſingius: aut etiam (2) ſi nervus præternaturaliter eſt affectus, nunc in exortu, nunc in progreſſu: In exortu, circa baſin cerebri, quando illud eſt compreſſum & anguſtatum, unde intercipitur ſpirituum animalium motus per hunc nervum ad expansionem in cochleari & labyrintho; In progreſſu, quando ipſe nervus eſt anguſtatus, ſive ſit obſtructus,



Aus, sive sit compressus, sive alio modo huc faciente vitiatus, adeò ut spiritibus animalibus omnem transitum intercludat, à quacunque fiat causa, vel in casu ab alto, illusione temporum ex casu, aut eorum & cerebri gravi percussione & contusione, morbo Gallico, vel in affectibus catarrhalibus à lymphâ subtili se insinuante, & membranam ejus atque ipsas fibras nerveas plus minus humidas & flaccidas reddente, ut in debito tono cessent, vel etiam subinde in morbis acutis ad statum properantibus, & per hæmorrhagiam criticam finituris, arteriis & venis intra *ixéφα* *λ*er magis distentis, hincque nervum auditorium comprimantibus. (3) Quando hic nervus in membranam intra cochleam & labyrinthum se expandit, & membrana ista vitiatur, auditus læditur; idque duplici modo: quando vel quasi paralyti, vel quasi spasmo corripitur: Paralyticam constitutionem quod attinet, quando scilicet fibræ ejus sunt aut ruptæ aut divulsæ, aut relaxatæ plus minus, aut alio modo vitiatæ; adeoque à naturali tono remittunt: hinc etiam convulsis fibris rigidior quasi evadit membrana, & ab externo motu vix mobilis, illud frequentius, hoc rarius arbitror vitium. Nam in paralytica constitutione membrana ista propter atoniam suam inepta erit, ut moveatur ab impellente aëre, unde ita auditus necessario tollitur. Hinc fit sæpius, ut post nimis acutos sonos homines fiant surdastri, v.g. in insuetis ex explosione sclopetorum auditus ad tempus tollitur, aut plus minus debilitatur. Quidam reddunt rationem, quod interna expansio nervi acustici aut membrana auditoria in cochleam & labyrinthum ingressa, à sono gravi tam fortiter moveatur, ut aut fibris laceratis aut nonnullis fibrulis ruptis, distentis, vel alia ratione malè affectis, auditus plus minus lædatur; unde soni non percipiuntur, vid. Hildanus *Cent. 3. Obs. 7.* quod tamen non videtur probabile, quia membrana tympani extrinsecus obstat, quæ omnes fortes sonitus retundit, quo minus possint penetrare. Potius ergo tympanum læderetur, quàm membrana acustica in cochleari expansa, quod fit saltem à causis externis.

Nam quoad internas, si dicta membrana nimis laxetur & humectetur, unde & eadem paralytica facta in tono remittit, & minus fortiter à sono potest moveri & percuti, & ita auditum difficilem & obscurum infert: id quod etiam in catarrhali vitio à lymphâ in suo motu impedita, ibique plus minus excreta, fieri potest; Item si saltem tantillum recrementi ex privata illius nervi aut membranae nutritione relictæ, aut aliunde cum sanguine transmissi, auditus læsionem inferre poterit, prout vel irritando ad convulsivas,

vel nervum obstruendo ad paralyticas aut similes affectiones disponere valebit: quo & metastasis materiæ seu potius fermenti in morbis acutis aut etiam chronicis pertinent; item incongruus usus unguenti Mercurialis pro sordibus capitis detergendis, vid. *Timæus lib. 1. Epist. 29.* Spasmodicam affectionem membranae quod attinet; eadem, quacunque occasione irritata, convulsis fibris rigida quali evadit, adeoque ab externo movente vix mobilis. Facit huc observatio Bartholini in *Cent. 4. Epist. pag. 235.* de senē, qui ex surditate acutum visum recuperavit, sed curata surditate antiquum visus vitium rediit. Vitium videtur hæsisse in exortu nervorum, ut spasmo nervi acustici spiritus animales ad nervum opticum penetraverint, quo reserato, in tanta copia ad opticum non pervenerunt.

### DIAGNOSIS.

Vitium obauditionis & surditatis per se patet, saltem scrutinium causarum incumbit Medico, quarum differentias à priori perscrutari perquam difficile est, saltem ratio causarum antecedentium, & ita fiendi modus nunc repentinus nunc successivus, item adjuncta aliarum partium symptomata, vel capitis, vel sensuum reliquorum, item an surditas continua sit? an interrupta? an conjungatur cum morbis hypochondriacis & aliis pathematibus? easdem subinde plus minus manifestant. Ex his enim origo seu causa surditatis artificiosa conjectura eruitur.

Causam esse vel defectum auris, vel obstructionem meatus auditorii, vel tympani læsionem, vel etiam malam conformationem, facile per se & levi ex circumstantia patet. Sin verò vitium nervi obstructi aut alio modo læsi adsit, id solâ conjectura difficulter admodum à Medico deprehenditur & percipitur.

Affectum esse catarrhalem ostendunt pathemata catarrhalia conjuncta; item progressus tinnitus aurium aut etiam sonitus: item si sensus fuerit ex aliquali obstructione, item difficultas successivè & inchoat & successivè incrementum capit.

In morbis acutis subito fit surditas, ex quacunque etiam oriatur causa.

Si sit à causa externa, à casu super aurem à sonitu gravi, &c. ex relatione ægri cognoscitur.

### PROGNOSIS.

In Prognosi habenda est ratio differentia surditatis, quatenus observatur vel in morbi acuti statu, vel morbo chronico.

In acuto surditas subito facta, si est à causa externa, nil habet in recessu.

Surditas

Surditas superveniens in febribus acutis, urina existente crudâ, delirium grave portendit; sin verò surditas in acutis & malignis febribus cum signis coctionis, aliisque signis bonis jungatur, ut plurimum bonum signum esse solet, cui ipsi interdum aut hæmorrhagiæ narium, aut forsan dejectiones biliosæ plus minus, per diarrhæam criticam superveniunt, & sic finitur morbus; aut si nihil tale eveniat, saltem ex obauditione, febribus acutis superveniente, decubitus quidam & motus translatorius ad parotides ferè innuitur. Nam quod non semper sit malum signum, videbitis præter Zacutum Lusitanum in lib. I. Med. Princ. Histor. Dubio 40. & Pauli in Digress. de Febr. Mal. pag. 16. & 17.

Si in morbis acutis surditati superveniat delirium, vigiliæ & similia, pejus est, quàm si surditas superveniat delirio; & si tale delirium surditati superveniens cum anxietatibus, vigiliis, aut etiam cum vomitu jungatur, periculosum morbum innuit.

Quibus surditas cum gravitate capitis & hypochondriorum tensione, & oculorum ad splendorem perturbatio adest, iis hæmorrhagiæ narium indicatur: quod eò magis confirmatur, si ægri vellicant nares.

Surdi ab ortu curantur rarò; nihilominus tamen loco aurium iis inserviunt oculi, quoniam arte tales surdi possunt assuefieri, ut oculis, considerato motu labiorum & linguæ, omnem loquelam possint intelligere, & sic ipsi loquentes reddi possint: Sic D. Wallis, Mathematicus Oxoniensis, duos Nobiles Anglos ab ortu surdos arte, mediante solo labiorum & linguæ motu, ut loquentes intelligant & accuratè respondeant, edocuit: Simile exemplum habet Digby in Tract. de Immort. Anima Humana, de Nobili quodam à nativitate muto, ita instructo, ut quoscunque loquentes perciperet ex solo adpectu, etiam linguam ignotam loquentes. De hoc Tractatum Anglicum scripsit D. Braun, dictum Philocophos, ubi prolixè disserit, quomodo surdi possint institui, ut voces audiant, & accuratè loquantur.

Interim tamen surditas, quæ per se morbum constituit, aut ex unico morbo successivè supervenit, contumax & difficile curatum malum est: quod ubi semel radices egit, aut facilè redit, aut pertinaciter affligit.

#### C U R A.

Cura pro varietate ipsius affectus ejusque causarum imprimis varianda. Et quidem si adsit surditas in morbis acutis, attendendus est criticus naturæ motus, & quorsum eadem vergat, & talis surditas rarò curatur à Medico, quia sub morbi mutatione ferè spontè cessat, salutari cum effectu: aliàs cinnabarina interdum conveniunt. Si post morbum acutum super sit, vel aqua Anhaltina, cum

bombace auribus immissa, prodest; vel cucurbitulæ propè aures affigendæ, & fumus tabaci subinde hauriendus: conf. M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 110. Si verò sit à morbo non acuto, sed per se affectum primarium ferè constituat, varietas causarum observanda est. Quæ ex abscissione vel in defectu auris externæ oritur, curatur per instrumenta quædam concava, extrinsecus auribus admota: vid. Schottus loc. cit. Si obturatæ sint aures, in specie à cerumine, idem emollientibus & liquefacientibus attenuetur, & educatur, quod fit v. g. per succum absinthii instillatum, vel per essentiam absinthii, vel per urinam pueri, aut spiritum urinæ non adeò rectificatum & acrem infusum. Sin ex aliis causis internis fuerit malum, ferè semper membranæ tympani, & hinc nervi acustici habenda est ratio, ut horum tonus, quantum possibile, aromaticis, & appropriatis nervinis, præmissis internis, aut conservetur aut restituatur.

Quoad interna; affectibus catarrhalibus internè conveniunt, volatilia, succinata, lasafrata, & similia, quæ ex suprâ dictis cognoscantur, e. g.

℞. Ess. flor. rosmar.

hyperic.

ligni sassafr. ā ʒij.

M. D. S.

Glus. Essenc.

Intet remedia externa præ reliquis granum unum vel alterum moschi vel ambræ vel zibethi cum bombace involutum, optimum est remedium, quod auribus immittatur vesperti sub introitum lecti, si ve solitariè usurpetur, si ve post medicamenta quæcunque auribus instillata talis bombax moschatus applicetur; item bombax essentiâ ambræ imprægnatus ita intrudatur. Ac sanè in surditate senum vix melius remedium esse dicitur, quàm ambra, imprimis ubi simul adest spirituum animalium defectus. Datur internè vel per se, vel ejus essentia crebrius, vel externè dictis modis. Hamburgi Medicus quidam ejus beneficio cuidam auditum restituit antea à veneno læsum; sicut & Pastor quidam surdus zibetho cum bombace auribus indito feliciter restitutus fuit: Sic balsamum Peruvianum cum V dilutum, & cum gossypio auribus applicatum, admodum confert: Vel aqua origani cum vino destillata, vel aqua cardui benedicti, per crebriorem à nova planta cohobationem parata, sæpius usurpata, fuit polychreston Cratonis; guttatim auribus instillata, vel cum linteolo hac humectato applicata; Item aqua fraxini, ista nempe spontè ex ligno recenti quoad unam extremitatem igni injecto, in altera extremitate exsudans & collecta, experimentum est Cratonis contra surditatem, cum nimia aurium soliditate conjunctam: aut si sur-

si surditas oriatur à causa calida, aqua picarum cum castoreo, aqua formicarum, aqua muscarum per alembicum destillata, &c. similiter insigniter conducit: Succus raphani, succus cepæ, cum oleo succini & amygdalarum amararum conjunctus auribus instillatus insigniter prodest.

In specie tamen aromatica penetrantia conducunt, ut aqua seu spiritus theriacalis, essentia absynthii, essentia cardui benedicti, castorei, thymi, essentia caryophyllorum, cardamomi, & essentia composita, spiritus quoque acusticus Mynsichti & Mindereri, item Barbettæ, vel aliæ similes compositæ aquæ spirituosæ, vel guttatim instillatæ, vel cum bombace crebrius admotæ auribus, sunt egregiæ. Essentia itidem ex fellibus animalium cum spiritu vini paratæ præ ceteris omnibus commendari solent; egregium enim sunt remedium ad auditum amissum: sic fel humanum cum spiritu vini mistum, aut etiam fel leporis, vel fel anguillæ, si affundatur spiritus vini, stent in digestionem, & per filtrum separentur, horum essentia manet & vesperi ad gutt. ij. l. iij. auribus instillantur, & ut singulare specificum commendari solent. Alii

℞. Fel. bovin.

Vini Malvat. aa. part. æqu.

Destillant per alembicum: liquor, qui prodit, vel ad paucas guttas auribus instillatur, vel cum gossypio auribus imponitur, & sæpius repetitur, in aure sana postmodum superdormiendo: Vid. Martini Schmuëß *Theauriol. Secretor. Part. 2. pag. 91.*

Facit huc essentia acustica, specificum singulare ad auditum, Practici cujusdam celebris Brunsvicensis, quæ cum successu crebrius usus est:

℞. Rad. helleb. nigr. ʒiij.

Calam. arom. ʒij.

Pulp. Colocynth. ʒj.

Bacc. lauri excort. fel. ʒj.

sem. Cumin. ʒij. ad ʒiij.

V ʒiv.

Incisa & contusa stent in infuso per aliquot dies in vase vitreo obturato bene, postea colentur cum expressione & filtrentur: cujus essentia aliquot guttæ singulis octo horis auribus instillandæ, vel cum bombace meatui auditorio applicandæ sunt; sicque curavit surditatem inveteratam.

Potest acui cum tantillo essentia ambrae, vel in ea dissolvatur parum moschi aut zibethi, & erit eò efficacior: vel applicetur cum bombace, in quo antea moschus vel zibethum jacuit.

Facit huc etiam oleum destillatum succini, anisi, lavendulæ, &c. itidem gossypio involutum, auribus admovendum. Lindanus fel perdicis cum oleo succini sæpius rectificato destillat; sic enim potens remedium esse dicitur. Aut oleum destillatum anisi cum oleo amygdalarum amararum, vel cum oleo nucleorum persi-

Tom. II.

corum, permixtum instillandum venit. Quo etiam pertinet oleum destillatum succini, majoranæ ac fœniculi, similibus modis applicatum. Liqueor ex ovis formicarum expressus, si quid aliud, admodum confert, & mirè commendatur; aut etiam ova formicarum contrita cum succo ceparum permixta & in aurem instillata, quàm vetustissimam surditatem sanant. Quidam

℞. Ovor. formic. ʒj.

fell. leporis No. vj.

cum duplo melius in mortario benè trita & subacta auri instillant, & ita surditatem curant.

Vel etiam sola aqua ex ovis formicarum per MB. destillata in usu esse solet, & commendatur à Kunratho in *Medulla Destillatoria*. Item remedia ex formicis, in specie aquæ magnanimitatis dictæ. Spiritus item formicarum admodum laudatur in gravi auditu & surditate. Facit huc mistura Heertodii de *Croco pag. 107.* & oleum istud singulare ad quosvis aurium affectus, surditatem, tinnitum, & similia mala laudatum, à quamplurimis mirè commendatum, & à nonnullis pro secreto habitum, quod fit ex vermiculis albicantibus, qui in quercu inter corticem & lignum gignuntur. Modus est hic:

℞. horum vermicul. No. xx,

ebulliant in

℞. Olivæ immat. ʒiij.

deinde excavetur radix cyclaminis, eaque repleatur oleo dictorum vermiculorum, superaddendo

pulv. rad. Pyrethri

costi aromat. aa. ʒj.

℞. costin. & rusac. quantum

adhuc capere potest.

Occludatur denuò radix cyclaminis, & sub cineribus affetur, & postmodum contundatur in mortario marmoreo, & exprimatur succus fortiter.

De liquore expresso oleoso immittantur aliquot guttæ per octo, novem vel decem aut etiam plures dies in aurem, & est mirabile remedium, sicuti de Timæo à Guldentlee refertur, quod hoc modo surditatem terè nativam curaverit. Vid. Theodatus Camerarius in *Memorabil. & Petrus in Diss. Harmon. 11.*

Hicce adnumeranda venit axungia serpentum, meatui auditorio illita, aut cum gossypio applicata, quæ pro magno arcano à quibusdam habetur: Vel serpentes coquantur in aqua, cui supernatans pinguedo separata, & cum spiritu rectificato juncta, ad consistentiam olei: sic pinguedo viperina cum guttis paucissimis olei succini auribus infusa, admoto postea pane recenti calido, commendatur in Velschii *Mistomim. Centur. 1. observat. 39. annexis Anno 4. M. A. N. C.* Huic vix cedit pinguedo anguillæ, collecta, dum anguilla pinguis affatur in veru: excipitur ista pin-

(Aaaaa)

guedo



guedo exstillans foliis lauri hinc colligitur, & tepidè auri instillatur contra surditatem, vel solum, vel additis aliquot guttis olei destillati anisi, obturando postmodum.

Vulgò solet commendari ad surditatem panis recens furno extractus, spiritu vini imprægnatus, & auribus ita calidè admotus: sed non suadendum, juxta Bartholinum, qui maximam exinde noxam observavit. Quidam panem pistorium cum semine anisi, fœniculi & cuminipræparant, & recentem auribus applicant.

Vaporem ex spiritu salis Ammoniaci, sive simplici sive anisato; aut mixturæ ex sale Ammoniaco, misto cum oleo tartari per deliquium, aut duplo calcis vivæ cum aqua simplici, ex vitro parvo angusti orificii, sed longioris & curvi colli, probè calefacto auribus excipiendum commendat Ludovici in *Pharm. pag. 311.*

Cæterum de remediis hisce auribus applicandis, observandum est in genere, nempe (1.) quoties talia medicamenta auribus sint instillanda, aurem semper obturandam esse facta instillatione cum bombace moschato aut ambrato, aut cui unum alterumvè moschi vel ambræ granum est impositum; cum, ut supra monitum fuit, solus talis bombax gratissimus sit auribus, & per se ad surditatem & gravem auditum sit egregius. Adhæc (2.) quod oleosa non sint immittenda, nisi prius benè auris sit absterfa & purificata, & hinc renovetur remedii applicatio. (3.) unâ vice tres vel quatuor guttas immisisse sufficit. (4.) quoque, quæ sub forma liquorum subtilium, essentiarum, vel spirituum volatilium aut similium auribus instillantur, ferè solent esse mitiora, quàm oleosa ac plus minus viscida. (5.) ea, quæ in aurem immittuntur, nunquam sint intensè calida aut frigida, sed tantum tepida, calori aurium appropriata. Tandem (6.) post medicamenti applicationem dormiat æger super aurem sana, ut ita remedii vis aurem ægram eò melius ingrediatur & penetret.

Quando aurium affectus sunt vagi, adeoque in specie, quando habent fomitem in cerebro, & sic ad modum affectuum catarrhalium solent affligere, optimum est, si percipiat imminens paroxysmus, ut vertici imponatur linteam spiritibus penetrantibus apoplecticis imprægnatum, vel illinatur vertici oleum destillatum succini, & similia; quod etiam simul observandum, quando supra dicta aromatica & spirituosæ auribus applicantur, in vitio imprimis nervi acustici; nam & talium usus obauditionem subinde notabiliter levat.

Inter alias causas surditatis fit interdum, ut à nimio sonitu externo, uti dixi, lædatur auditus: in tali casu saltem dictum remedium ex pane locum habet: Nempe recipiendæ sunt baccæ juniperi vel lauri probè contusæ,

subigendæ cum massa panis fermentata, & ita, ut reliquus panis coquendus est vel pinsendus: postmodum panis hic medicatus calidissimè è furno est extrahendus, discindendus, & per medium apertus ita calidè singulo manè, jejuno ventriculo, aurib⁹ ita admovendus; sic enim denuo restituitur auditus.

Item

12. HB. *majoran.*

*salvia,*

*rosmar.*

*flor. rosar. r. à M. B.*

*bacc. junip. ʒj.*

*sem. cumin. ʒʒ.*

Incisa & contusa includantur sacculo interpassando, qui probè calefactus auri imponatur, vel per se, vel irroratus c. *∇ vita Saxonica, ∇ magnanimitatis, balsamo Anglico, &c.*

Hicce addatur spiritus seu aqua cephalica Anhaltina, cujus descriptionem videb. in Schræderi *Pharm.* quæ auribus instillata experimentum fuit Thoneri, & cujus salutarem usum sæpius feliciter expertus est in surditate pariter ac aurium tinnitu, & similibus affectibus.

Tandem axungia serpentum, quæ, ceu supra dictum, supernatat, dum in aqua coquantur, separata, cum spiritu vini rectificato juncta dat liquorem seu oleum ad deperditum auditum excellentissimum.

Præter dicta etiam suffitus interdum pro auribus instituitur, qui ex asaro, origano, absinthio, verbena, sabina, serpillio, colocynthide, baccis lauri & juniperi, & similibus fiunt, in vino vel aqua decoctis, & ita auribus exceptis. Quidam ceu singulare & perquam egregium commendant suffitum ex decocto limaturæ Martis, cum aceto destillato parato, adjectis herbis cephalicis; quod decoctum instar suffitus in aures excipitur. Sunt etiam, qui suffitum florum sulphuris singulariter commendant ad surditatem: scilicet recipiunt infundibulum, & hoc immitunt carbonibus, quibus sulphur vivum fuit injectum, & per foramen fumum sulphuris facie benè obvelata excipiunt in aurem. Facit hujus mentionem Fossæca *lib. 1. Consil. 15. & lib. 2. Consil. 58.* Post suffitum oleum fœniculi destillatum cum gossypio applicandū.

In chronicis auditus læsionibus, imprimis si oriuntur vel in subjecto senili, vel in ægris, affectibus catarrhalibus obnoxiiis, Thermae subinde proficue observantur, in quibus non solum æger se lavet, sed etiam spongiam amplam capiti imponat, quæ aquam thermarum per epistomium embrochæ modo excipiat; sicuti etiam ex fonticulo, brachio in regione auris affectæ inulto, surditatem diuturnam cum nervosarum partium morbis, ex lymphæ præsertim scorbuticæ affectionibus natam, insigniter levare observavi.

Denique fit interdum etiam surditas ex casu

casu ab alto, contusione, læsione capitis externa, & similibus. In tali casu aqua cyclaminis per alembicum destillata reliquis præfertur, vel ex tacamahaca & ceroto de betonica, ana q. v. paratum emplastrum capiti raso imponendum; Conf. Hœchstetterus *Decad. 9. pag. 320.* Sicut Lyserus *Obs. pag. 233.* refert surditatem ex ictu curatam per iteratam injectionem urinæ calidæ ex lepore fugâ interempto: Et sanè Gabelchoverus *Cent. 1. Curat. 60. in schol.* urinam leporis impositam auribus sumum surditatis remedium asserit; hinc spiritus urinæ talis non adeo acris forsan proficius erit.

Extremum remedium in auditus defectu, idque in casu desperato, est salivatio Mercurialis, sive in specie ex lue Venerea oriatur, sive à causa interna alia, in specie vitio nervi acustici: vid. Fonseca *lib. 2. Cas. 58.* Sanè undique penetrat Mercurius, & quosvis etiâ angustissimos meatus perreptat; unde si ex obstructione vel simili causa oriatur malû, proficius ejus usus probabilis est, ut ut nemini autor esse velim, ut huic Mercuriali medicamento se faciliè exponat. Aliis autem in casibus penitus inutilis erit.

Per transfusionem sanguinis ex agnæ in carnem surditas in cane curata fuit, de quo *Journal des Sçavans Ann. 1668. Acta Societ. Reg. Vol. 1. pag. 705.*

## ARTICULUS II.

De

### *Sonitu & Tinnitu Aurium.*

**I**N quibusdam depravatur auditus, ut sonitus quidam aut tinnitus, qui non est, audiat. Sonitus est, quod vocant *das Gausen und Brausen der Ohren*; tinnitus verò est, *das Klingen der Ohren.*

Affectus hic nunc continuus est, adeoque subinde diurnus & chronicus, nunc intermittens, subinde vagus, qui subinde accedit, & brevi post iterum remittit. Item nunc est per essentiam, nunc per consensum: si per essentiam, nunc per protopathiam, dum per se affectum constituit; nunc per deuteropathiâ, dum morbis acutis aut chronicis supervenit.

#### C A U S Æ.

Causa omnis sonitus & tinnitus, item murmurationis aurium, quærenda est vel in aëre isto, qui continuò in cavo tympani seu concha auris continetur, & qui etiam reptat per labyrinthum & cochleâ; partim verò in nervi acustici excursionem membranacea in intimo cochleæ auditus organon constituyente; quia in naturali auditu adest fibrarû hujus membranæ motus cum aëre interno moto. Quoad aëris istum motum: naturaliter quidem non, aut parum admodum movetur; quod si verò fiat, quacunque ex causa, ut aëre extrinsecus mo-

Tom. II.

to & hinc aër internus moveatur, ut expansionem nervi membraneam in cochlea feriat, auditus fit naturalis. Quod si verò citra auræ externæ motum à causa interna præternaturaliter moveatur, qui in concameratis labyrinthi & cochleæ locis crebrius percussus ad nervi expansionem continuò allidat, sonitus præternaturalis & ita vitiata auditio contingit. Quod si motus iste aëris interni, & quidem subtilioris & tenuioris sit velox, celer, & plus minus vehemens, qualis sit, v. g. quando à nervis vel chordis testudinis fortiter tensis excitatur sonus, tunc excitatur sonus acutus sive tinnitus; sin verò tardius, ob curius & confusè moveatur aura ista interna, ut sit in chordis laxioribus, & ipsa aura hæc sit crassior & minus pura, sit sonus gravis, obscurus & raucus, cum murmurationis sentu.

Causa ergò, quæ movet hanc auram internam, intra tympanum & concham contentam, quærenda vel in ipsa aura undecunque commota; vel in membrana tympani, dictam auram movente.

Auram ipsam commotam quod attinet: hujus motus causa communiter dicitur spiritus flatulentus, seu flatulentia quædam aut halitus admodum subtiles, ex massa sanguinea per arteriolas eò exhalantes, & dictæ auræ permisti, qui in locis istis concameratis inclusi motu suo præternaturaliter eandem agitando & extraordinariè movendo, istum præternaturalem sonitum & auditum excitent. Nam halitus peregrini in dictis locis vix quieti persistunt, sed hinc inde moti aërem ibi præsentem similiter movebunt.

Experimentum fieri potest cum charta, auribus applicata, gerisset; sonus enim in charta ab aëre in illa contento auditur, affectum tamen saltem vagum & brevi durantem inducere potest. Præter dictam causam & arteriolarum, interiora aurium subeuntium fortior pulsatio aërem movere, & ita sonum peregrinum repræsentare potest, de quo infra.

Tympanum quod attinet seu membranam ejus; hæc à quacunque causa, vel interna vel externa, crebrius & præternaturaliter irritata aut molestata, & hinc plus minus motu convulsivo agitata, auram istam in tympano & internis cavitatibus movere, & consequenter auditum depravare valet. Confirmat hoc exemplum Hildani *Cent. 6. Observat. 10.* qui observavit in rustico quodam tinnitum ultra annum molestum propter gryllum in aurem ingressum, qui forde inviscatus tympano agglutinator fuit, hoc extracto omnis tinnitus cessavit, cessante nempe irritatione præternaturali, & hinc membranæ tympani à musculis propriis motione; Gryllus enim hic juxta membranam hæsit, & eandem commovit, (Aaa aa 2) quâ

quâ motâ continuus tinnitus fuit perceptus. Pertinet huc, quando post graves quosdam sonos à valida aëris externi percussione tinnitus supervenit, cujus occasione etiam auditus depravari solet, quando membrana tympani laceratur quodammodo, ex qua læsione semper convulsiones quasdam patitur, propter quos motus convulsivos continuatus iste motus solet percipi. Unde quicquid membranam hanc irritare, & in convulsivos motus agitare valet, etiam tinnitus vel sonitus aurium inferre potest. Quin imò ipsa membrana forti impetu translocata nonnihil, ac ossicula translocata etiam inferunt continuum sonitum vel tinnitus, donec in debitum statum ac situm redeant.

Hæ duæ causæ videntur ordinariæ: nempe aër extrinsecus commotus, & hinc membrana tympani continuò commota ac vibrata. Sanè quilibet diuturnior & contumax aliquot annorum tinnitus & sonitus minimè ab auræ internæ primario affectæ vitio, sed potius à partis cujusdam ipsius organi malè affectæ ratione, oriri videtur: quas inter hæc tympani membrana, & hinc nervi acustici expansio membranacea, primatum obtinent.

Quod tandem attinet membranam auditoriam seu expansionem membranaceam nervi acustici in cochlea: hujus fibrillæ laceratæ, aut quodammodo translocatæ, postmodum continuâ suâ motione sonum ingentem & malè affectum repræsentabunt. Imò videtur etiam sonitus & tinnitus talis oriri posse ex ipsis filamentis membranæ hujus acusticæ motis, & convulsivo spasmo variè agitatæ: v.g. sicut in imminente epilepsia & apoplexia non rarò varii colores & splendores ante oculos versari putantur, propter convulsionem fibrarum nervi optici in tunica retina expansi; ita etiam eodem in casu, item in vertigine; varii sonitus repræsentari videntur, ex spirituum nempe & hinc fibrillarum istarum simili excitato motu, atque aliàs ab objectis externis excitari solet. Nempe hinc videtur oriri, quod auris externæ, temporum aut capitis vehementiorem percussione, item sonitus vehementiores in aurem violentius irrumpentes subinde tinnitus aut sonitus contumax soleat insequi, saltem ex affectione & læsione membranæ nervi acustici. Quod si celeriores & fortiores sint fibrillarum motiones, tinnitus; sin verò rariores & remissiores sint, sonus gravis percipi videtur.

Ex hac causâ febribus tinnitus aurium supervenire videtur ex motu humorum, ut vocant, ad superiora, hinc & ad parotides & loca vicina; unde membranularum in istis locis convulsiva plus minus affectio. Nempe non rarum est, quod ex sanguinis turgescencia, in specie febrili, cum dolore capi-

tis subinde etiam aurium tinnitus adsit, ex motis nempe velocius arterioliis. Hinc etiam oriri videtur, quod in talibus morbis acutis hæmorrhagiam narium interdum tinnitus seu sonitus aurium præcedere soleat, ex sanguine turgescente & effervescente, in istis & vicinis locis quasi stagnante, & ex forti arteriolarum pulsatione, adeoque membranæ acusticæ affectione, tinnitus inducente, unde tunc in talibus malis, superveniente hæmorrhagia narium, tinnitus aurium cessat, sanguine per alium locum evacuato. Facit huc observatio Tulpii 35. lib. 1. ubi observat tinnitus aurium ex incremento nimio glandularum, prope quas excurrit meatus auditorius: Sicut ex alia quacunque causâ, aut ex sanguinis motu circa loca auribus vicina nonnihil impedito, sæpius continua & diuturna talis auditus sit depravatio.

Sed quid sibi vult motus & raptus humorum ac sanguinis ad caput & aures, & hinc excitatus aurium sonitus? Scilicet motus iste humorum, sursum & deorsum in morbis à natura factus, ritè explicandus venit: Moventur humores cum sanguine, & ab hoc mediante cordis pulsu indeterminatè tam sursum quam deorsum; quod verò magis unam partem præ alia occupare, ibidem congeri, & hinc per eandem tandem evacuati soleant, non humorum, sed partium solidarum ex causa evenit, dum harum membranæ & fibræ à causa quacunque interdum ipso humorum influentium vitio irritatæ, spasmus affectæ, plus minus stringuntur; sicque æquabilem & liberum contentorum circulum aliquo modo sufflamant, & ita phænomena, quæ aliàs ab *εναρρίσσει* humorum, seu raptu eorum ad caput, oriri dicuntur, excitant. Multa hinc quæ de surditate ex vitio nervi acustici supra monita fuerunt, etiam huc applicari possunt, dum non rarum sit, permutari invicem ob additionem cum tinnitu.

Catarrhalia huc pertinent vitia sic dicta, depositio feri, vitioso sapore inquinati, aut saltem nutrimenti chylosi illius vehiculo ad unum alterumvè nerveum aut membranæ locum distributi, nervosis partibus inimica, sive membranam tympani sive nervi acustici afficiat. Interim talis tinnitus non videtur posse esse chronicus, quia potius brevi tempore transit, aut non adeò diuturnus est.

#### DIAGNOSIS.

Causarum omnium harum varietas, præsertim remotarum, non nisi ex circumstantiis probè examinatis cognosci possunt.

Sonitus & ipse tinnitus aurium ab ægro refertur. Causæ si sint externæ, patent ægro; ubi verò sint internæ, in morbis acutis, febribus ardentibus & similibus, facile possumus cognoscere, esse à sanguinis & spirituum ani-

ma-



malium inordinato motu; si sint ex alia quacunque causa, raro à priori cognosci possunt, in locis nempe adeò profundè sitis.

**PROGNOSIS.**

Quoad prognosin; Si in febre ardente sonitus aurium oculorum caligine contingat, cum narium tensiva gravitate, eadem innuit, quæ de surditate membro antecedente dicta sunt; nempe si est cum signis coctionis, hæmorrhagia narium expectanda venit, præsertim si pulsationes in capite simul percipiuntur.

In febribus quibuscunque tinnitus aurium & sonitus ferè spontè curatur sine medicamentorum usu.

Si verò per se morbum constituat, ex se sine periculo est, nisi quod chronicus & molestus esse soleat. Interdum etiam ad omnimodam surditatem terminatur: sicut aurium tinnitus diuturnus chronicus extra febrim, & qui biennium & ultra duravit, solet esse satis gravis & periculosus, & raro perfectè curatur; & utut curetur, sæpè tamen recidivat. In specie ordinarius quasi est prodromus apoplexiæ.

Tinnitus aurium, qui ex frequentè percussione in caput, ac in regione temporum exoritur, propter internam membranæ acusticæ læsionem, non adeò facilè curatur, quin in surditatem degeneret.

**C U R A.**

In cura tinnitus & sonitus aurium consideranda est causarum efficientium ratio.

De cætero remedio & auxilia ea, quæ, præmissis universalibus, conveniunt in sonitu & tinnitu aurium, fere sunt similia iis, quæ membro anteced. commendata fuerunt in surditate. In specie tamen ad tinnitum aurium inchoantem suffitus seu vapor ex absinthio & verbena, in lacte vel aqua communi decoctis, auribus exceptus, admodum laudatur ab Hartmanno *in Praxi Chym. pag. 106.* Loco quorum quoque semina 4. calida minora, baccæ lauri & juniperi, & similia adhiberi possunt. Suffitus etiam ex succino, olibano, item ex gommate animæ, commodè auribus exhiberi potest. Singulare quid obtinet fumus seu vapor aceti bullientis, auribus exceptus, quem laudat Langius *in M. C. pag. 6.* in specie, si aceto incoquantur specifica nervina, & decocto infundatur limatura Martis, & dum maximè bullit, vapor excipiat auribus. Item oleum vermiculorum quercinorum, oleum nucleorum persicorum cum castoreo mistum, conducunt. Præter hæc egregius est spiritus volatilis ☐x seu spiritus salis Ammoniaci cum bombace in aurem immissus, qui in diuturniori aurium sonitu etiam tanquam singulare laudatur à Lindano. Egregius esse solet vapor ex

sale Ammoniaco, cum oleo tartari per deliquium permisto, exsurgens, spiritus succini auribus cum bombace aliquantulum inditus, in tinnitu & susurratione convenit. Præter dicta essentia florum anthos, ligni sassafras, castorei, in specie essentia seu tinctura sulphuris, ut & fellium animalium, hominis aut lucii piscis, perdicis, imprimis fellis bovis, cum bombace simili modo in usu esse solent, quod quotidie bis reteretur, auribus prius purgatis. Melius est, si recipiantur fella aliquot luciorum, & vitro inclusa pastâ farinaceâ occludantur, & coquantur in clibano, donec panis est coctus; de hoc liquore aliquot guttæ auribus instillantur, & bombax cum zibetho imponatur. Item liquor ex cortice tenello betulæ, spiritu formicarum aut aqua magnanimitatis cum bombace inditus. Aqua picarum cum castoreo instillata vel cum gossypio applicata, in frequentiori usu erat D. Michaelis; non secus atque granum unum aut alterum zibethi aut moschi bombace involutum. Sacculus ex milio tosto & sale tosto cum anetho & chamomilla mistis factus, probè calefactus & auri externè applicatus mirè convenit, imprimis si aliquot guttis olei destillati caryophyllorum prius fuerit irrigatus:

℞. HB. & flor. chamom. M. j.

anethi l. salvia.

majoran.

rorism. à M. b.

milii tosti ʒj.

ois torref. ʒss.

Incisa includantur sacculo interpassando, qui probè calefactus auri applicandus.

Frequentissimum auxilium solet esse vapor panis recenter ex furno extracti, parati ex massa fermentata cum semine cumini, sceniculi, anisi, origano, serpillio, baccis lauri mista, & sic in clibano excocta, calidè auribus admota. Convenit etiam hîc oleum illud mirabile ex vermiculis quercinis; item oleum destillatum caryophyllorum aut lavendulæ & cumini destillata invicem mista. Pertinet huc oleum oticum ceu catholicum ad aurium affectus laudatum: Nempe oleum nucleorum Persicorum expressum cum floribus Persici subinde infusum & clarificatum, quod ad gutt. iij. vel iv. in dolore, tinnitu, strepitu aurium, & auditus difficultate, auribus instillatum egregium est; sicuti ad tinnitum aurium etiam inveteratum ceu præstantissimum admodum laudatur sequens remedium:

℞. Helleb. albi

Castor. aa. ʒij.

Costi Arom. veri ʒss.

Ruta ʒij.

Euphorb. ʒss.

o Amygd. amar. vel nucl. persic. ʒj.

(Aaaaa ʒ)

Deco-

Decoquantur leniter & successivè in duplici vase in s. q. olei rutacei: quod oleum cum bombace auribus immittatur, vel guttæ quædam tepidè instillentur auri.

Rondeletii experimentum fuit:

℞. Rad. helleb. albi ℥iij.

fol. lauri.

ruta aa. M. ℞.

fraxini M. j.

F. Decoctio in oleo Amygd. amar. vel nucum cum vino albo aut malvatico ad consumptionem vini: Exprimantur, colentur & auri immittantur.

Convenientius tamen est, si loco decoctionis in oleis dictæ species potius infundantur in spiritum vini, & exinde fiat essentia, addendo castoreum, ambram aut moschum pro lubitu, cum bombace auribus applicanda. Vel præparetur essentia practici cujusdam Brunsvicensis membro anteced. data. Tandem decoctio sinapi pulverisati in vino sub forma suffitus auribus excepta, est euporiston Steckeri non contemnendum; hinc forsan spiritus sinapi ritè applicatus erit proficuus. In diuturnioribus malis, præsertim ubi suspicio est catarrhalis affectus, tonticuli in brachiis, item cucurbitulæ pone aures, subinde sunt proficue. In dyscrasia pituitosa convenit oleum Barbette, quod commendat *libr. 2. Anat. Pract. cap. 1.*

Quod si tinnitus aurium fiat ex casu ab alto aut percussione & contusione capitis, aliisque causis externis, imitemur Platerum *libr. 1. Observat. pag. 115.* qui præmissis præmittendis mulierem ex casu ab alto tam gravi aurium tinnitu correptam, ut nihil ferè audierit, præmissis universalibus restituit:

℞. V Cochlear. j.

Succ. Cepar. rec. cochl. ℞.

℞o destill. spica gtt. iv. l. v.

Misc.

Et auribus tantillum ejus instilletur, & ita fuit curata. Huc etiam pertinet cataplasma ex cepis *Faventini*, quod *Forestus libr. 12. observat. 1. & 4.* describit.

Præter dicta remedia subinde convenit in specie in junioribus aut plethoricis venam brachii è regione auris sonantis secare; sicuti etiam sternutatoria moderata in aurium affectibus diuturnis, præmissis universalibus subinde conducere solent. Fit non rarò, ut tinnitus & sonitus, etiam surditas, nunc remittant, nunc denuò accedant in affectibus quasi catarrhalibus: In tali casu, ubi percipit æger redire malum, optimum est applicare vertici cum linteis duplicatis aquam apoplecticam spirituosam, aut etiam spiritum urinæ, item oleum destillatum succini; hoc ipsum

enim uti catarrhos, ita etiam hujusmodi pathemata, præcavere solet.

Ex remediis internis, aurium affectibus dicatis, præmissis universalibus duo præ ceteris eminent: nempe sassafras & succinum, & quæcunque ex istis parata; quæ eò melius conducere solent, si post eorum usum blandus sudor instituat.

Hæc ferè in tinnitu aurium per essentiam observanda fuerunt.

Sed non rarum est, Hypochondriacos pati aurium sonitus, qui cum pathematis abdominis modo exacerbantur, modò remittunt. Speciatim ex hypochondriis malum esse, ex eo clarescit, quod pro vario statu stomachi in media aut à cibatione plus minus exasperari affectus aurium, aut remitti observetur. Præmissis præmittendis Martialia, carminativa & hinc salia volatilia urinosa conveniunt, speciatim liquor cornu cervi succinatus, cum leni sudore. Externè essentia castorei confert.

## CAPUT III.

De

### *Lesio Tactu.*

Vlriatur tactus diversimodè: Nam præter abolitionem & imminutionem suam apoplecticam & paralyticam privativam, item præter ejus abolitionem positivam in stupore, tactus interdum depravatur, seu potius augetur & exasperatur in affectu, dicto dolor.

## ARTICULUS I.

De

### *Stupore.*

DE stupore, qui & affectui tactus obveniens est, nihil addo, cum rarissimè ejus cura incumbat Medico.

### PROGNOSIS.

Nam particularis stupor citra manifestam causam obveniens, subinde prodromus esse solet aut paralyseos scorbuticæ, aut si plura occupet membra, hemiplegiæ, aut etiam universalis apoplexiæ.

### CURA.

Et stupor quidem, qui maximam corporis partem aut etiam universum corpus, quod tamen rarissimè evenit, invadere solet, optimè per lignum sassafras & medicamenta sassafrata, quocunque modo adhibita, curatur & propellitur.

ARTI

## ARTICULUS II.

De  
Dolore.

**Q**uod dolorem attinet, omnibus sensibus externis communis est affectus. Nam ut omnes sensus fiunt per certum tactum vel per contactum seu per impressionem quam objecti sensibilis in organum proximum, quam impressionem sequitur talis spirituum animalium motus in organis, qui vocatur sensus; ita si in organum tam vehemens fiat impressio, ut istud nimis moveatur & vibretur, & exinde nimis rapidè & vehementer in eo spiritus agitetur, sequitur sensim adjuncta molestia, ex præternaturali & nimis vehementi objecti, organum contingentis, impressione resultans, quæ ipsa molestia communi nomine dolor appellatur. Sic enim v. gr. datur visio dolorifica, ex subito aspectu rei nimis lucidæ seu lucis fulgidæ post tenebras, ob vehementem & præternaturalem motionem membranæ retinæ; datur auditus molestus seu dolorosus & radiosus ex nimio sono, impetuosius tangente aurem internam, ac nimis fortiter movente membranam auditoriam in cochlea; quod ipsum etiam facit inæqualis motus membranæ in sono non harmonico & inæquali: Idem fit etiam similiter in gustu & odoratu. Speciatim si fibrillis nerveis objectum quoddam tactile in specie sic dictum occurrat, quod eas nimis fortiter & non absque quadam vehementia moveat, sequitur tactui conjuncta molestia.

In specie ergò consideratur dolor, quatenus & symptoma tactus ferè præcipuum, tam internas quam externas partes excrucians.

Pro cognoscendo ergò dolore præsuppono ex Physiologicis, quod fibræ in genere subjectum sint tactus & cujuscunque sensus; in statu quidem naturali tantummodò, & quæ extra cutim sub cuticula in papillas protuberant, sive in membranas subtilissimè contextentur, sive in corpora papillaria conglomerantur, sive nudæ aut solitariae distribuantur; præternaturali verò in statu etiam reliquum fibrarum systema & ipsum tangendo afficitur. Neminem ergò confundat, quod in vulneribus vel ulceribus &c. ubi vel nervi, vel nerveæ fibræ tanguntur, & ubi nullæ tales sunt papillæ & membranæ, sensus tamen percipiatur acutissimus & dolorificus insigniter; nam fibræ nerveæ sentiunt, i.e. promptè moventur. Hæc tamen intercedit differentia, quod in papillis naturalis & blandus fiat motus & sensus, tactus scilicet simpliciter sic dictus; in fibris verò nerveis ex violento & nimio earum motu, tactus dolorificus & quasi

præternaturalis. In membrana autem vel puncta, vel distenta, vel rupta, eadem ratio militat atque in fibris nerveis solitariis. Unde hæc præternaturales affectiones naturali & ordinario tactus organo nil derogare valent.

Fibræ hæc, earumque subtilissimæ fibrillæ, ubi ex fortiori & vehementiori objecti actione & motione quacunque ratione à se invicem violenter separantur, divelluntur, & quasi lacerantur, sequitur in iis adeò vehemens & molesta motio & vibratio, adeò ut ex situ æquali & ordine naturali vitiatis, quædam ab aliis divulsæ quasi contractivâ vi abbrevientur, quæ & aliàs illæsas in naturali situ violenter quasi trahunt ac lacerant, ad eum modum, quo dolorem ex puncto nervo explicat Sylvius *libr. 2. cap. 27. §. 165*. hinc molestia illa accidit, quam dolorem nominamus: & huc videntur respexisse veteres, dum dolorem solutionem continui definiverunt.

Affectis fibris, vibrationis istius occasione, spiritus animales & ipsi ad certum motum determinantur, ad cerebrum nempe, ubi in sensu communi fit formalis doloris perceptio seu sensus doloris internus: Conf. Willisius *Pharm. Ration. Part. 1. Sect. 7. c. 1*. Hoc ipso simul convulsivi quid patiuntur, & in spasmos aguntur, ita ut motus fibrillarum velocissimus & convulsivus seu spasmodicus sit istud, in quo ratio formalis doloris consistat. Unde fit, quod non rarò dolores sequantur convulsiones ac motus convulsivi, si scilicet sint aut diuturniores, aut graviore, ex inordinata scilicet & veloci spirituum animalium, occasione doloris, in cerebro motione, ut v. gr. ex punctura nervi dolorifica convulsio membri, aut à nephritide vomitus superveniat: Imo in quovis dolore semper convulsio quædam, occulta licet, jungi solet; hinc enim tendi plus minus pars dolens, & sæpe pulsatoria molestia simul supervenire solet, adeòque hic circulus observandus, ut & à dolore convulsio, & a convulsivo impetu doloris incrementum. Hic est primus doloris actus. Quod si jam fibrillis læsis & nonnihil laceratis, objecti, naturali licet impressione, agentis fiat contactus, tunc fibrillæ antea nonnihil laceratæ aut divulsæ, vel tantillo objecti contactu nimis agitatæ & vibratæ novam doloris impressionem repræsentare faciunt: Unde vel levissimus specilli contactus in partibus vulneratis aut ulceratis intolerabilem dolorem concitat; magis tamen in partibus nervosis ob fibrillas copiosiores, minus in partibus sanguineis ob fibrillas rariores, vel etiam dispersiores.

Similis interim motus seu tactus ab objectis in extremitate fibrarum nervearum in fibris partis



partis sanæ, post abscissionem membri sphacelo correpti, sæpius producitur, tum ignorantes ægri existimant, se in digito manus, ante aliquot dies licet abscisso, dolorem percipere, qualia exempla habentur in Hildano, *Centur. 3. Observat. 14. & 15.* Item in Sculteto *Armam. pag. 67.* & Binningero, idque ob continuatas tales nerveas fibras ex parte sana ad partem usque antea abscissam, ob quam continuitatem naturalem dum similis fit motus fibræ circa ejus medietatem post abscissionem, qualis antea fiebat in fibræ extremitate, ante hujus cum parte separationem, hinc fit, ut ex identitate motus etiam in sensu interno & imaginatione idem feratur judicium, & æstimatur pars jam abscissa adhuc sentire, quasi toti adhuc cohæreat.

### C A U S Æ.

Ex his causa doloris proxima, materialis nempe læsio, & violenta ac vehemens motio fibrarum nervearum organi ab objecto præternaturali; & formalis, spirituum hinc rapidior, singulariter tamen determinatus, & ad cerebrum usque continuatus motus, per se patent. Illæ pro sensu doloris externo: Hic pro sensu doloris interno.

Remota est omne id, quod fibras laceßere valet, quod ipsum, prout est varium, & ipsæ quoque partes prout variant, etiam tam varix doloris species exsurgunt, indeque etiam postmodum varias appellationes acquirunt, quorum sane innumerabiles sunt species, cum unum quodque objectum peculiari modo agat, & unaquæque pars alio & distincto ab aliis modo impressionem recipiat.

Causæ hæ remotæ sunt vel externæ vel internæ: Externæ sunt notissimæ, ut omnia ea, quæ contundunt, secant, vulnerant, lacerant, urunt, erodunt, & similia, quæ per se patent.

Causæ internæ dolorem efficienter inferentes, imprimis sub acore vitioso, militare solent, ita ut ferè in omni dolore acerbo, à causa interna enato, acidum aut acido-salsum peccans in recessu sit. In omni enim acido sunt particulæ admodum acutæ, simulque duræ, quæ & se insinuant in fibras, easque pungunt, lacerant, & quasi scindunt, quin & sæpius simul ardoris & ustulationis quendam sensum junctum habent, v. gr. si quis vel guttulam spiritus nitrici cituti affundat, ab hujus acore excessivo intensus dolor, una cum sensu ignis quasi ardentis, infertur & talis dolor etiam in arthritide & dolore ischiatico, item in erysipellate, & pleuritide, & similibus doloribus ab acido ortis est obvius. Acidi hujus peccantis dolorosi origo ut plurimum est ex stomacho primisque viis, verbi gratia, in arthriticis, in scorbuticis, ischiaticis, rarius ex privato partis affectu in dige-

stione propria læsæ vitio: v. gr. in affectibus dolorosis chronicis aut sæpius recurrentibus ab acido natis, in odontalgia, quando dens ex læsione privatæ digestionis acidum colligit, quod dolorem infert: Sic in ossæ carioso sæpè recurrens dolor observatur à nutrimento privato vitiatò.

Differentiæ dolorum sunt tantum non innumeræ, ex varietate objecti lædentis, multiplicitate organi læsi, & mutua horum ad se invicem proportionem oriunda: in specie tamen primariæ differentiæ sunt ratione diversæ status causæ proximæ & deinde ratione diversimodi afficiendi partes.

Quod varietatem causæ attinet; Dolor, prout excitatur ab acido plus minus volatili seu spiritioso, & fixo, hæret in subiecto humoroso, seu vehiculo subtiliore & tenuiore, ut lympa; vel crassiore & viscidior, ut chylo; item prout acidum dolorosum plus vel minus parti dolenti infixum fuerit, etiam vel pertinaces magis, vel facilius aut difficilius mobiles, adeoque nunc vagi nunc fixi esse solent; item exinde plus minus recidivantes, aut faciliè curabiles, cum aut sine partis erosionem juncti, observantur dolores, adeoque variis modis mutabiles & alterabiles: sic contumacissimi sunt dolores venerici, & ut plurimum cum erosionem partis juncti, propter acidum acre in mucoglutinosissimo, pertinacissimè parti infixò.

Doloris vagi, adeoque ab acido magis volatili spiritioso, magis spiritui influo, in subiecto seu vehiculo tenuiori partibus communicato, exemplum habemus in arthritide vaga scorbutica: e contra doloris fixi, ab acido magis fixo vel austero in subiecto viscidior vel tenacior hærente, exemplum habemus in arthritide ordinaria in articulis hospitante; item in colica à mucilagine viscida acida in cellulis coli stagnante, & pertinacissimum dolorem inferente.

Frequenter recidivantes quod attinet dolores; iidem in uno eodemque loco ut plurimum cum proprio & privato partis vitio conjuncti esse solent, vitio nempe ejusdem digestionis læsæ, indeque recrementorum acrim dolorosorum proventu oriuntur, & ferè tempestatum mutationibus auscultantes, ægrorumque ephemerides constituunt; id quod v. gr. in odontalgia est manifestum. Maximè post articulos graviter vulneratos dolores remanent pertinaces, quavis tempestatum mutatione recrudescentes, ex fermento vitioso, in parte ex spiritus insiti debilitate genito, ab externis commoto, & partes sensibiles notabiliter vellicante.

Dolor nunc est continuus, nunc interruptus; & hic vel periodicus, vel non periodicus: Periodicus est, qui certa observat tempora, & frequenter nocturnus, v. g. scorbuticorum

ticorum vel Venereorum, esse solet, quando nocte gravis lacerans dolor subsequitur, de die verò nihil sentiunt: Continuus præsupponit acre intensius parti fortiter inhærens: Non continuus, acre remissius, saltem occasionibus quibusdam externis mobile & excitabile, & minus firmiter agglutinatum, & minus fortiter partem afficiens.

Porro dolor omnis est nunc cum tumore conjunctus, nunc sine tumore; qui tumor est tam sanguineus, quam serosus, scirrhosus &c. Tumor interdum est causa, interdum, idque frequentius, effectus seu productum doloris: v. g. inflammatorius tumor & suppurans causa est doloris ardentis, rodentis, pulsatorii: E contra dolor est causa tumoris in arthritide, odontalgia, &c. ex fibrarum strictura convulsiva, æquabilem contentorum motum & circulum remorante. Ordinariò in doloribus arthriticis, quando adest tumor, vel in aliis partibus dolor, dicunt esse catarrhū; hinc dolor, hinc tumor; sed falsò: quia ex dolore supervenit tumor, unde cessante dolore, cessat tumor: v. g. homo spina pungitur intra digitum, vel vulneratur in quâdam parte, ubi nullum antea habet dolorem, sed post vulnus supervenit dolor, post dolorem tumor. Reverà ergò semper tumor sequitur dolorem, quia ex objecto dolente seu acido vellicante partes nerveas, & dolorem excitante, in istis partibus supervenit fibrarum nervearum spasmus ac convulsiones, unde angustantur pori partis, adeoque remoratur sanguinis circulus, unde tumor; Si verò discutitur dolor anodynus, & removetur spasmus, dolores cessant spontè. Sic qui in arthritide & similibus volunt curare tumores, curam à posteriori inchoant; sistuntur in odontalgia dolores, & tumores evanescent.

In specie pro meliori methodo medendi, observetur differentia dolorum, imprimis ex causa interna ortorum, quæ ratione efficiendi modi, (vid. Sylvius *de Dolor. Intestin.*) est duplex:

### I. DOLOR GRAVATIVUS.

Dolor gravativus, *es drückt und liegt so schwer*/ quando sensus quali ponderis cujusdam prementis & gravantis percipitur, v. g. in hepate tumido; aut scirrhoso, in calculo renum ingenti, sed quieto.

Oritur in parte sensu aut paucò aut obscuro præditâ, sentiente tamen nonnihil membranâ cinctâ, quæ ipsa pars infarcta & tumefacta imprimis à materia vel crassa, vel viscida, vel fluida, minus acri, sed ferè dulci & insipida, ponderis gravioris sensum repræsentat, uti est pituita, sanguis, serum, lympa, &c.

### II. DOLOR PUNCTORIUS, seu ACUTUS.

Membranis proprius, *es sticht wie Steck-*  
Tom. II.

*nadeln*/ dum ex improvise repetitis vicibus quali aciculis aut acutis instrumentis membranæ punguntur, & interruptim vellicantur, ipso punctiois sensu ad magnum spatium se diffundente: qualis dolor v. g. est in pleuritide, & similibus locis membranosis.

Oritur ab acido acri, firmitus parti membranosa infixo vel impacto, eandem pungente & rodente, quæ hinc convulsivo spasmus crispatur, unde doloris intensio.

### III. DOLOR TEREBRANS.

Dolori punctorio cognatus, simul tamen terebrationis aut perforationis sensum conjunctum habens, *es liegt und sticht an einem Ort*/ fixus est, quali terebra aut palo pars perforaretur, qualis e. g. in arthritide, in erysipellate, & similibus affectibus est satis cognitus; item in dolore colico, cephalæa, &c.

Oritur à viscido plus minus acido, parti cuidam impacto.

### IV. DOLOR RODENS seu MORDAX.

*Es beißt und frisset*/ quando percipitur sensus cujusdam rolionis & morsionis, quasi vermiculi continuò fodicarent, & roderent, qui membranosis locis proprius.

Oritur ab acri salso succo, nervosa & membranosa loca rodente & vellicante.

Huic vicinus est dolor pruriginosus, ut in purpura & scabie.

### V. DOLOR PULSATORIUS.

*Es klopfet und pochet/ als wenn ein Huhn pickete*/ quia in eodem pulsatorii sensus aut arteriæ pulsatio exactè percipitur, ita ut quoties arteria pulset, toties etiam dolor exasperatur. Proprius est inflammationibus, & partibus inflammatis, v. g. in digiti à spina infixa inflammatione.

Provenit hic dolor, quando in parte quadam tumente & dolorosa tenduntur fibræ & membranæ, & cum membranis etiam simul tunica membranaceæ ipsarum arteriarum; tunc enim sanguinis per arteriam impeditur nonnihil motus legitimus, & propter fibrarum tensionem difficilis fit sanguinis ejaculatio in dictam partem, quin potius fibræ sanguine irrumpente irritantur; id quod observatur imprimis in stagnationibus humorum, adeoque ortis tumoribus, unde præ ceteris hæc doloris species observatur in digiti à spina infixa inflammatione, aut fortioribus membranarum tensionibus, item in cephalalgis.

### VI. DOLOR OSTOCOPOS, aliàs FRANGITIVUS.

In quo ossa in sui profundo quasi frangi & malleis contundi videntur, *als wenn einem die Beine mit Hämmern zerschmissen würden*; qualis v. g. in lue Venerea affectis, imprimis nocturno tempore, contingit; nec scorbuticis  
(Bb b bb) aut

aut hypochondriacis inveteratis & similibus est rarus. Afficitur proximè membrana investiens ossa seu periostium, quod ab acido vellicatum dolores istos repræsentat.

Oritur ab acido non adeò acri, interdum in materia plus minus viscida hærente pertinacius periostio affixa.

Huic dolori vicinus est dolor contundens, profundiora loca occupans, ac mitius urgens.

## VII. DOLOR TENSIVUS & DISTENDENS.

Quando quasi disrupta pars distenta videtur, *es dehnet und spannet*; proprius hic dolor præprimis partibus membranosis, aut membrana quadã densa involutis, per se nullo aut admodum paucò & hebeti tactu præditis, quæ spasmò correptæ tensionem dolorem repræsentant: v. g. qui caput subinde affligit post crapulam, aut dum in odontalgia dimidium caput tendi videtur.

Oritur à spasmò partium membranearum, & fit in specie in malo hypochondriaco, ex irritatione membranosarum partium ab acido molesto.

Distinguendus est hic dolor à dolore distendente: Distendens est, quando à re replente, v. g. flatibus, membrana cingens distenditur, & dolorem tensionem repræsentat, ut in inflatione stomachi, hypochondriorum, colica flatulenta, tympanitide, ascite, & similibus.

## VIII. DOLOR LANCINANS & LACERANS.

*Das Reißen/das Wüten/das Toben in Gliedern/im Daumen/im Kopfe/xc.* quasi quis unguibus laceraretur, qualis sæpe in cruribus percipitur. Frequentissimus est in Praxi, Membranis est proprius.

Oritur ex acido acri plus minus falso subtili, ferè volatili & tenui, partes membraneas rodente, vellicante, & variè morsicante. Nunc autem acrius est, nunc falsius, unde nunc lancinans, nunc lacerans nunc tensionem, nunc similis sensus percipi solet. Scorbuticis est non rarus, qui, utut uno saltim in puncto subinde affligat, per consensum tamen membranarum aut nervorum sæpè integrum nervi ductum vel quoddam membrum afficit: v. g. malum ischiaticum, tantum prope os sacrum est, sed tamen in toto corpore per consensum dolor percipitur.

## IX. DOLOR ARDENS.

Quasi ignis scintillulæ hinc inde urerent, ab acido subtili acri, ferè volatili, partes fibrosas & membranosas afficiente, v. g. in erysipellate, in quo pars membranosa solida afficitur, tanquam si spiritus nitri rectificati, aliquot guttæ fuerint inspersæ, subinde verò in partibus dolor ardens talis percipitur ab humori-

bus contentis effervescentibus & à dominante acido volatili producitur.

## X. DOLOR ALGENS.

*Es ist falt/* ab acido minus acri, sed singulariter fibras alterante, & quasi stupore afficiente.

## DIAGNOSIS.

De signis diagnosticis res clara est, quia dolores satis manifestantur ab ægris.

Differentiæ dolorum à modo afficiendi & circumstantiis cognoscuntur.

## PROGNOSIS.

Prognosis dolorum variat pro circumstantiarum suprâ allegatarum conditione.

Fit interdum, ut cum gravioribus doloribus conjungatur pulsus intermittens, qui tamen non debet terrere Medicum, cum hoc frequentius eveniat, sedato enim dolore statim pulsus ad naturalem redit rhythmum; vid. Bartholinus *Observ. Anatomicis*.

In genere tamen nullus dolor in quocunque corporis parte negligatur; semper enim aliquid mali prænuntiat, cum certum sit, quod ubicunque ægri doleant, ibi laborent morbo: Conf. Hildanus *Cent. 5. Observat. 7*. Hinc & Hippocrates inquit: *Ubi dolor, ibi morbus*.

## C U R A.

In cura dolor omnis tollitur, aut quancunque causam removendo, aut eam temperando, sicque dolorem demulcendo, aut sensum partis stupefaciendo.

Ea, quæ causam doloris remonent, si est ab interna, in specie sunt ferè alcalia tam fixa quàm volatilia, tam macra quàm pingua, si ve oleosa si ve aromatica, pro circumstantiarum ratione seligenda, quatenus penetrant, acidum corrigunt & tollunt, viscidum incidunt & attenuant, vi sudorifera acidum humorosum resolvunt & discutunt, abstergunt & remonent. Quæ secundò dolorem demulcent, sunt anodyna blanda, acrimoniam acidi temperantia, fibrarumque tensionem & irritationem demulcentia.

Temperant & demulcent pingua, oleosa, mucilaginosæ, quæ acre quodcunque obtundunt, mitigant, fibrarum spasmum & tensionem blandè emolliunt. Narcotica, ut opiata, hyoscyamus, & similia, stupefaciunt, quatenus fixiores minusque mobiles reddunt spiritus animales, eatenus etiam dolorosam objecti impressionem, partivè irritationem percipi inhihent. Usurpantur hic ipsa tam internè quàm externè. Interna in specie opiata, & hinc volatilia aromatica, quatenus hæc acida destruunt, & vel per sudorem vel per urinam evacuant, simulque nervis grata existunt.

*Præ-*



Præsertim sudores ad corrigendos dolores etiam contumacissimos subinde sunt summè proficui, dum eorum medio & viscidum, in contumacioribus doloribus simul peccans, plus minus emendetur.

Inter purgantia excellit imprimis Mercurius dulcis: Conf. Velschius *Hecat. lib. 2. pag. 40.* Quibus evacuantibus pro fomite morboſo circa primas vias destruendo Martialia, Saturnina, solaria, ut aurum diaphoreticum, addi solent. Sicuti externè pro causæ peccantis remotione nunc venæ sectio, hirudines, vesicatoria, caustica, &c. magis inserviunt: v.g. Poterius *Cent. 3. Cur. 84.* dolorem refert tibie contumacissimum sudoriferis nullis curandum, aperta tibia caustico curatum. Inventa ibi materia dura, subalbida & sebacea, quâ sublata dolor evanuit. Schenckius *lib. 5. Observationum* dolorem omnium membrorum refert, excitatis per phænimigos copiosis pustulis, & evacuato sero, curatum.

Sanè dolores artuum graviores ex sero acri scorbutico nati, & in quibus nulla ferè partis alteratio sensilis observatur, per applicatum vesicatorium optimè curantur: Sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. Observ. 57.* refert, lumborum lævum dolorem impositis supra lumbos hirudinibus curatum: *Idem. l. observat. 72.* immanem inguinum dolorem salvetellæ sectione curatum. Ubi dolor sæpe nullis remediis cedit, proficua observatur sectio venarum raninarum sub lingua, *von einem hisigen und wütenden Geblüthe/* conf. Borellus *Cent. 1. observat. 47.* Horstius *lib. 8. observat. 9.* habet diuturnum & contumacem brachii dolorem, diætâ sudorifera curatum.

De narcoticis observandum est, quod eadem dolorem quidem tollant, sed saltem palliativè & quasi à posteriori curent, doloris symptoma sistendo, sed causam materiale nec corrigendo, nec removendo; adeoque necesse est, cauti simus in eorum usu; de quib⁹ cautelis optimè differit Johannes Chicotius *in dissert. & Epist. Med. in Dialogo de dolore*, dū dicit: *si rodens humor excruciet te, narcotica tunc exhibeantur, utpote quæ minus hos affectus quam alios ledunt, quippe & tenues vel acres & calidi hujusmodi humores sunt. Hac autem narcotica non solum salutaria sunt, quod sensui torporem inducant, sed etiam quod humorum tenuitatem cogant & quasi coquant. Ubi vero crassi & glutinosi humores cum acore conjuncti excruciant, in specie simul acor infestat ex irritatione, alienissima sint opiata, quæ torporem inducunt; nempe interdum quidem dolorem mitigant, sed deteriore reddunt partium affectarum dispositionem, ut in colicis doloribus, in quibus v. g. ex opio, hyoscyamo, & similibus remedia membra ad patiendum reddunt idonea,*

*& in pleuritide talia dolorem non sanant, sed doloris sensum tollunt, partem enecant. & ad granam disponunt. In his ergo casibus talis cura deceptio est.* Cautè ergo narcoticorum usus adhibeatur, & non nisi urgente necessitate, & saltem appropriatis respectu causæ peccantis & partis affectæ mista, præmissis præmittendis, adhibeantur. Hinc etiam opiata minus conveniunt in dolore gravativo & pulsatorio, quoniam metus est, ne ad gangrænam perducant; ne in dolore ostocopo, in specie lue Venereæ correptorum; magis tamen conveniunt in dolore ostocopo scorbuticorum, semper tamen addantur appropriata volatilia. Conveniunt verò in doloribus punctoriis, tensivis, etiam distendentibus, lancinantibus, & lacerantibus, in doloribus vagis, & quæ sunt aliæ circumstantiæ.

Præter has circa narcotica cautelas in quovis dolore curando ad tria semper respiciendum:

1. Ad partem affectam plus minus sensilem, adeoque ferè plus minus carnosam & nerveam.
2. Ad causam efficientem occasionalem plus minus acrem.
3. Ad subjectum seu quasi vehiculum causæ, vel viscidum, vel glutinosum, successivè attenuandum; vel tenue & subtile, facilè discutiendum.

V. g. in nodis & gummatibus Venereis nocentissimus est spiritus salis Ammoniaci applicatus, cum implacabiles dolores inferat, in acidum acre impetuosius agendo: Unde effervescentiæ quasi concitato motu, & resolutio nonnihil subjecto viscido, crudelissimè exacerbantur dolores. Nempe quò sensilior est pars, eò magis temperata conveniunt: Item quo acrior fuerit causa occasionalis; item quo viscidior est fomes, eò minus volatilia discutientia, sed successivè emollientia magis conveniunt.

Remedia igitur ad primam classem pertinentia alcalia plus minus aromatica, à priori dolores curantia, quatenus acidum destruunt, sunt sequentia: Absynthium, anethum, chamomilla, malva, althea, sambucus, in specie ejusdem flores, mentha, verbascum, ejus flores, & parietaria. Sanè contusum absynthium, & cum parietaria decoctum, & instar cataplasmatismatis applicatum, in plurimis doloribus resolvendis & discutiendis perquam convenit; sive à causa externa, contusionibus nempe, nati fuerint; sive etiam internè ex acri humore seroso ortum duxerint, tam in capitis dolore, quam aliarum partium: Sic v. g. Amatus Lusitanus *Centur. 1. Curat. 57.* Dolorem spinæ ad os sacrum intensum per tale cataplasma ex absynthio & parietaria in oleo frixa & applicata curavit. Porrò folia lauri, radices altheæ, liliorum convallium, crocus, baccæ

(B b b b b 2) lauri

lauri & juniperi, semina cumini, anethi, carvi, lini, scœnogræci, anisi, fœniculi, etiam hic conducunt. Ubi catarrhi vel abundans serum acre dolorem infert, fœtus humidus, v. g. ex floribus salviæ, vel salvia, majorana, roremarino, non conveniunt, sed dolores ingentes causant. Proficua in hoc casu magis sunt fumigationes ex succino. Ex his parata aqua vitæ seu spiritus volatiles, aqua articularis ad extra & intra, imprimis acuata cum spiritibus urinosi, ad dolores præsertim lacerantes & lancinantes, imprimis scorbuticos, nocturno tempore affligentes conferunt. Item urina humana, & omnia ex ea parata remedia, ut spiritus salis Ammoniaci, spiritus & sal volatile urinæ humanæ, insigniter conveniunt; nam talia absorbent omnem acorem. Non secus ad hujusmodi dolores ab acido volatili ortos, imprimis volatilia ex animalibus petita remedia, conducunt, in specie ex insectis, quæ inter sunt imprimis lumbrici, & ex his paratus spiritus lumbricorum terrestrium, formicæ, &c. unde & scarabæis cornutis & liquori ex his parato singularem vim tribuit Glauberus. Hinc v. g.

℞. *Δa artic. ad extr.* 3℔. ad 3j.

~ *Θ\*ci c. ♀ par.* 3vj.

*lumbr. terr. per putr. c. Θe Vol.*  
*acuat.* 3j. 3ij.

M. D. S.

### Eusserlich Glieder-Wasser.

Pertinet huc etiam sapo Venetus in spiritu vini dissolutus, & ita in forma liquida illitus, hic enim ratione alcali oleosi dolores ex acido ortos rodentes, etiam arthriticos, subinde compescit. Quod si ardoris sensus conjunctus sit, in spermate ranarum solvatur; sin minus, solvatur vel liquefiat in spiritu urinæ ac lumbricorum terrestrium, aut spiritu vini, addita camphora & croco & ita cum pluma subinde applicetur. Olea ex flor. verbasci, vel sambuci, per putrefactionem & in clibano digestionem, insignia sunt & egregia anodyna. Pertinet huc etiam camphora, potenter anodyna, cum tota sit sal volatile oleosum concentratum, simulque admodum penetrativa, dolores ab acido optimè compescit; hinc spiritus vini camphoratus ad sopiendos dolores inflammatorios, in specie erysipelaceos est optimus. Spiritus vini crocatus camphoratus in artubus dolorosis est optimus; unde etiam solutioni saponis Veneti nonnunquam camphora additur, idque egregium cum successu. Rana quoque huc pertinent, imprimis eorum sperma, alcali temperato singulariter anodyno turgidum, unde & arthriticos hisque cognatos dolores sopire valet: sicuti oleum ranarum ritè paratum egregium quoque est lenitivum plurium dolorum: sic ex succo ebuli singulare fit oleum per deliquium ad dolorem & contractionem nervorum: nempe succus e-

buli reconditur in vase vitreo, & involvitur cum pasta panis fermentati, immittitur in furnum pistorium, donec succus bene sit coctus: dein excipe vas vitreum, & succus ita liquefactus à crassamento separatus, asservatur pro usu; adduntur interdum pro meliori efficacia olei ranarum part. jv. v. vel vj. Simili modo proceditur cum floribus verbasci & chamomillæ. Fit etiam oleum ex bufonibus catholicum anodynum in omnibus doloribus, dum scilicet bufones macerantur in aqua salia seu aqua marina, postmodum decoquuntur, & aqua inspissatur ad remanentiam salis, quod sal dissolutum cum oleo amygdalarum dulcium dat oleum anodynum ad compescendos dolores quoscunque. Post oleum bufonum etiam sunt olea lumbricorum terrestrium, liorum alborum, oleum septem florum seu anodynum Mynsichti, & oleum chamæmelinum, anethinum, oleum papaveris & hyoscyami expressum, olea destillata, tam aromatica, cumini, anisi, quam fœtida, ex animalium ossibus pinguedinibus, cera, &c. in specie fœtida, oleum destillatum tartari fœtidum; item oleum ossium humanorum destillatū, oleum pinguedinis humanæ, oleum ligni Guajaci fœtidum, oleum buxi per descensum. Fœtida quidem; nobilissima tamen sunt in doloribus nervorum, vel artuum ab acido ortis. Ulterius oleum ceræ cum spiritus vini ana circulatum & probè digestum ac inunctum in partium nervosarum doloribus ex contusione est egregium: Videatur Riverius *Cent. 4. Obs. 51. sic oleo destillato pinguedinis humana* dolorem brachii diuturnum curavit Borrichius *de Hermet. Sap. pag. 371*. Liberari possunt à fœtore cohobando super caput mortuum.

Facit huc Galbanetum Paracelsi seu oleum istud ex galbano cum terebinthinæ & spicæ oleo destillatum: Vid. Sennertus *in Praxi, ubi de Colica*, & Schræderus *in Pharm.* quod speciatum in doloribus artuum & partium nervosarum chronicis & sæpius recurrentibus est admodum egregium remedium. Facit huc balsamus Peruvianus, qui anodynus, ad nervos contusos, combustos ac punctos egregius; Item in nervorum & articularum doloribus nulli cedit remedio, imprimis cum spiritu vini dissolutus. Hinc Timæus von Guldenslee in doloribus partium musculosarum à detractionibus seu catarrhis frigidis ut vocant, commendat sequentem misturam: Nempe

℞. *Bals. Peruv.* 3i.

~ *distolvatur c. vitello ovi*: adde

~ *bacc. Junip. vel flor. samb.* 3ij.

Misc.

& utere externè illinendo.

Guñata denique, tam Amoniacum, quam galbanum, sagapenum, &c. in doloribus lixioribus, à viscido acido natis, & in specie emplastrum ex tacamahaca, vel sola, vel cum caran-

caranna applicatum, sunt quasi catholicum anodynum in artuum & partium musculosarum doloribus, in specie ubi nervæ partes, vel à causa interna, v. g. sero, vel lymphæ acida, adeoque catarrhis aliàs tributis, vel externa, sunt egregia. Potentiora sunt & penetrantiora, sed acriora & non ubivis obvia, ex dictis gummatibus, ut emplastrum de galbano crocatum, empl. de meliloto, ad dolores à contusione vel ex casu ab alto efficacissima, auctore Thonero; quæ exaltantur in suo vigore, si malaxentur cum oleo destillato succini vel cum oleo destillato tartari, vel balsamo Peruviano. Aliàs emplastrum de meliloto; item terebinthina teratur cum salibus volatilibus vel spiritu salis Ammoniaci sic dant misturam tenacem albidam instar cujusdam emplastri, non secus ac emplastrum Vigonis de ranis cum Mercurio est egregium in doloribus artuum Venereis nocturno tempore affligentibus; quod uri etiam in doloribus à materia viscida acida enatis, item in doloribus cum tumoribus duris plus minus scirrholis & chronicis, & omnibus reliquis, meritò præferatur.

His addi possunt stercora animalium, egregiè anodyna, ex quibus optimum est humanum, seu vaccinum, vel recens applicatum, vel cum oleo rosarum mistum, sub forma cataplasmatismatis in graviore dolore brachiorum & pedum mirabiliter conducere solet, ut hoc expertus est sæpius ipse Thonerus. Linteum cruore menstruo tinctum, exsiccatum, & dolori applicatum, eum evanescere facit.

Quoad alteram remediorum classē; dolorem temperant & demulcent anodyna, suntque temperantia, blando sensu partes nervæ afficientia, imprimis lac & quælibet lacticia, vel sola, vel cum aliis in forma fomenti aut cataplasmatismatis applicata; emulsionēs internæ & externæ ex seminibus 4. frigidis majoribus, papavere, amygdalis dulcibus. Hinc althea, malva, melilotus, verbasum, ejus & sambuci flores, ac omnia emollientia, mucilagines istarum plantarum, & ex seminibus emollientibus, oleum lumbricorum, amygdalarum dulcium, liliorum alborum, septem florum Mynsichti, altheæ, malvæ, verbasci, sambuci, ovorum, laurinum, &c. quæ egregiè anodyna: Sic lac caprinum cum pauco melle ebullitum, & loco dolenti applicatum, calidè ad sedandos dolores à Rulando commendatur: Sic Rulandus etiam

℞. *Lactis* ℥v.

℞. *Rosar.* ℥ij.

*Nymph.* ℥iij.

Quæ invicem calefacta cum linteis multiplicatis crebrò parti dolenti applicantur, quo dolor brachii totius ingens tanquam fomento brevi tempore curatus fuit.

Pertinet huc cataplasma istud chirurgorum ubique usitatum anodynum, ex mica panis albi in lacte cocta, addito croco, & cataplasmatismatis instar applicatum. Vel ad imitationem Rulandi in dolore lumborum ex defluxionibus aliquoties ab eo probatum:

℞. *Medull. panis albi,*

maceretur lacte vaccino, per cribrum æneum trajiciatur: adde vitella ovi, & cum butyro recenti & seqq. oleis q. s. misce, & hinc calido linteo applica.

℞. *℞ Chamomill.*

*Anethi*

*lilior. alb. ana* ℥ij.

*lumbr. terrestr.* ℥iij.

Misc.

Item cataplasma ex plantis appropriatis narcoticis & anodynis, in lacte coctis, applicatum prodest.

Pertinet huc & liquor iste oleosus ex floribus verbasci & sambuci per deliquium in clibano paratus, potenter anodynus. Pertinent hunc etiam pinguedines animalium anodynæ, ad oblinendam acrimoniam causæ dolorificæ, v. g. butyrum, pinguedo anatis, humana, gallinacea, suilla, taxi, anserina, cuniculi, vulpis, & similes, cum oleis subinde miscendæ. Vel ad dolorem brachii ex scarificatione in scapula expertum fuit hoc unguentum:

℞. *℞ lumbr. terr.* ℥iij.

*Pingu. taxi*

*vulpis* aa. ℥ij. M.

Vel etiam cum aqua hirundinum cum castoreo eadem simul illinatur & foveatur.

Faciunt huc unguentum dialtheæ, alabastrinum, anodynum, hypnoticum usitatum, balsamum hypnoticum Mynsichti, & similia usitata.

Quæ tandem vi narcotica stupefactivâ dolores sistunt, sunt quælibet narcotica, ut omnia Papaverina, internè & externè, in specie omnia opiata, &c. Juxta hæc est hyoscyamus, & ejus semen, & quævis ex hyoscyamo parata remedia, in specie oleum hyoscyami expressum, externè potissimum narcoticum. Item stramonium ejusque semen & exinde paratum extractum. Solanum furiosum & ipsum vi stupefactivâ insigni pollet, uti etiam mandragora, ejusque radix & radice cortex. Sunt, qui ex semine hyoscyami parant oleum catholicum penetrans ad quoscunque dolores compescendos: recipiunt semen hyoscyami, ex eoque instar seminis lini oleum expriment, cui addunt camphoram, crocum & spiritum vini. Hæc omnia simul mista claudantur in vase vitreo, quod obducitur massâ farinaceâ fermentata, & ita simul coquantur in furno pistorio tamdiu, quamdiu solet panis pinû, quo facto liquor eximitur, (Bbbbb 3) & ad



& ad longum tempus pro usu asservatur, qui decantatus optimus est in crurum graviore dolore.

Huc quoque pertinent oleum ligni buxi, unguentum anodynum Mynsichti & unguentum populeum, e.g.

℞. Ungu. hypnot. ʒij.

℥o expr. nuc. mosch. unc. ij.

sem. hyoscyami unc. j.

M. S.

### Linderend Sälblein.

Ex his facillè patet, quomodo speciales dolores curari debeant: Nempe

#### DOLOR GRAVATIVUS

Curatur materiæ remotione. Hinc venæ sectio, purgantia & sudorifera locum habent; item fonticuli, variatis his ipsis pro circumstantiarum varietate.

Externè olea destillata penetrantia inungenda, in specie si dolor gravior oriatur ex lymphâ inundante partes. Si à materia viscida & tenaci, usurpentur emplastra ex gummatis & narcoticis, ut ex tacamahaca; item emplastrum diaphoreticum, de cicuta, nicotiana, de ranis cum Mercurio, & alia contra scirrhus & scrophulas usitata.

#### DOLOR PUNCTORIUS

curatur interne per salia volatilia sudorifera, subinde cum opiatâ mista, v.g. spiritum salis Ammoniaci anisatum cum essentia opii.

Externè conducunt Fomenta emollientia & aromatica discutientia; item litus ex temperatis, ex oleis & pinguedinibus blandè volatilibus mistis, ut unguentum dialtheæ, oleum amygdalorum dulcium, addito pauco oleo destillato chamomillæ & camphoræ; item litus ex volatilibus penetrantibus, ut spiritus vini camphoratus, spiritus salis Ammoniaci, cispërma ranarum, &c. Conducunt etiam ex sapone remedia, ut sapo in spiritu lumbricorum dissolutus, &c. qualia in pleuritide, & hinc arthritide usitata sunt.

#### DOLOR TEREBRANS

requirit internè incidentia & evacuantia, præsertim, ex gummatis, item mercurio dulci.

Externè gummata; item emplastrum carminativum Sylvii, emplastrum de galbano crocatum Mynsichti, emplastrum de ranis cum Mercurio, &c. conducunt.

#### DOLOR PULSATORIUS

internè curatur per sudorifera acidum destruentia, subinde cum opiatâ mista.

Externè sedatur per fomenta ex aromaticis vino incoctis, ut discutiant & resolvant. Item empl. de meliloto cum theriaca confert.

#### DOLOR OSTOCOPOS

tollitur præmissa purgatione, imprimis per sudorifera: sed cum plurimum sit contumax, aliquamdiu continuanda, adeoque interdum per dictam sudoriferam, ex lignis institutam.

Externè confert emplastrum ex gummatis, speciatim ammoniaco; item de ranis cum Mercurio, malaxatum cum oleis destillatis, imprimis fœtidis, nempe tartari, ligni guajaci, cornu cervi, succini, petroleo destillato, &c.

#### DOLOR TENSIVUS

internè volatilia temperata cum opiatâ postulat.

Externè conveniunt fomenta demulcentia, anodyna, opiatâ, lacticia, ex quæ talibus parata cataplasinata.

#### DOLOR DISTENDENS

internè carminantia seu volatilia oleosa, v.g. spiritum salis Ammoniaci anisatum; externè discutientia, & fomenta aromatica carminantia, &c. requirit.

#### DOLOR ARDENS

curatur, si in internis partibus observetur, per absorbentia, aliàs præcipitantia dicta. Externis in partibus removetur per Saturnina, item ranina, ut sperma ranarum; non per acria, malum magis exacerbantia; non per pingua ardorem, oblinendo poros, magis intendentia,

#### DOLOR ALGENS

curatur per aromatica, vel oleosa, olea destillata, v.g. galbanetum, spiritum vini crocatum, aquam articularum, &c.

Post hos dolores considerandi sunt quidam dolores atrociores particulares, quos inter acerbissimi & satis frequentes esse solent dolores lacerantes & lacerantes artuum, & odontalgia. Sit ergo

### ARTICULUS III.

De

#### Artuum Doloribus Lancinantibus & Lacerantibus.

**D**olores hi frequentes sunt, imprimis in scorbuticis, tam vagi quàm fixi, speciatim fixi crudeles & pertinacissimi sunt.

#### CAUSÆ.

Oriuntur hi dolores fixi ex subtili acido, fibris tendinosis aut membranis quibusdam se insinuante, cum intenso dolore, unde universum partis fibrarum membranarumque systema compatitur, & compatiendo mediante

diante occulta fibrarum crispatura totum membrum dolere facit, utut ut plurimum ne minima quidem partis dolentis percipiatur alteratio. Confirmat hoc, quod in malo ischiatico laborantibus, ubi malum hæret circa coxendicem, integra crura gravissimo corripere soleant dolore. Similiter insignis quidam nervus ab acido rosus & afflictus totum fibrarum nervosarum systema in consensum trahit. Tales dolores lacerantes scorbutici in partibus musculosis & nervosis fixi diurno tempore ferè acquiescunt, aut mitius affligunt, sed nocturno tantum tempore per duas vel tres horas ante & post mediam noctem exacerbari solent, & post hanc per horas binas vel ternas remittunt, in quo ipso simillimi sunt hi doloribus venereis & ipsis nocturnis. Dolores isti lacerantes fixi in quadam parte, utut sæpissimè, pro fomite agnoscunt scorbutum, interdum tamen etiam sine scorbuto saltem manifestò ægri patiuntur dolores tales contumacissimos, ubi à rheumatismo oriri dicuntur, in quibus etiam interna remedia subinde parum ferè operantur, externa verò applicata malum subinde potius exasperant, quam quod istud corrigant: narcotica verò applicata istud aliquomodo mitigant; sed postea malum contumacius & rebellius reddunt. Memini virginem adultam scorbuticam, crebriori hæmorrhagiæ narium obnoxiam, hæc per lignum sympatheticum fraxini suppressâ incidisse in huiusmodi dolores lancinantes nocturnos intolerabiles & implacabiles, ab hora decima vespertina ad secundam post mediam noctem constanter affligentes, hinc remittentes & somnum concedentes. Interdum benè habebat, quavis nocte statò tempore dolores recrudescébant, idque per aliquot septimanas. Præ ceteris de his doloribus, & quid in recessu habeant, videri potest Horstius *libr. 8. Observat. 13. 14. seqq.*

**C U R A.**

Pro curandis his & similibus doloribus venæ-sectio subinde, præsertim in principio, proficua esse solet: vid. M. A. N. C. *Ann. 9. Observ. 120.* observatis tamen revulsionis & derivationis regulis. Hæc utut per se hæc mala non curet, per accidens tamen, quatenus liberior sanguinis & contentorum conciliatur motus, occasione doloris & fibrarum strictionis plus minus deficiens, v.g. quando crus affligitur tali dolore, ibi vel in brachio opposito, vel crure opposito secatur vena, & ad aliquot uncias sanguis emittatur. Vesicatoria quoque in membro dolente convenienti loco applicata, sæpius sunt proficua. Interdum ad fonticulos accedendum est, imprimis, si pertinaciùs persistat malum, aut crebrius repetat, qui tamen sedato dolore iterum consolidari potest.

Internè, cum acidum peccet, ante omnia observandum est, ut destruat, vel per fixa absorbentia anodynis mista, istud in primis viis destruentia, partim & imprimis per sudorifera volatilia, singulas partes perreptantia: unde ratione prioris Martialis, & antimonialia sulphurea, ut antimonium diaphoreticum Martiale, cinnabaris antimonii, partes animalium duræ & ossæ, conveniunt: hisque præmissis ratione posterioris salia volatilia alcalia, omnia antiscorbutica & antiarthritica, conducunt, in specie ex lumbricis, tartaro ac urina parata remedia volatilia subinde subjungenda sunt. Item decocta lignorum sudorifera, præsertim ubi contumacior observatur dolor, ex radice chinæ, ligno sassafras, lignoque juniperino, de quibus videri potest in Horstio *cit. loc.* Quò etiam pertinere videtur insignis ille dolor costarum, aliis frustra tentatis, per decoctum curatus a Petro Poterio *Centur. 1. Cur. 83.*

Decocti aliàs formula, quàm in ejusmodi casibus observavi proficuum, est hæc:

*R. Rasur. ligni juniperin. ℥iij.  
Sassafras ʒj.  
Cym. pini junior. & rec. M. ij.  
H. rosmar. M. j.*

Incisa minutim macerentur in  $\nabla$  x simpl. lbvj.

stent in MB. per noctem: manè coqu. ad tertiam:

Colatura detur pro haustu matutino sudorifero, præmissis universalibus.

In specie huiusmodi formulam utilem notavi, ubi glandularum circa caput ac fauces obstructions & tumores simul occurrerunt.

Præter interna ad externa subinde fiat accessus; verùm canto opus est. Pinguia enim unctiosa, viscosa & similia, oblinendo poros magis exasperant malum quàm leniunt, adeoque saltem subtilia volatilia penetrantia, nunc urinosa acris, nunc spirituosæ, conveniunt. Hinc spiritus vini camphoratus, item spiritus theriacalis camphoratus, in specie cum castoreo imprægnatus, spiritus liliorum convallium, ceraforum nigrorum. salis ammoniaci cum spiritu liliorum convallium subactus & illitus, spiritus urinæ, spiritus tartari volatilis, qui reliquis præfertur pro usu externo, aqua hirundinum cum castoreo, &c.

Convenit quoque sapo Venetus in spiritu vini dissolutus, cum spiritu ceraforum nigrorum & liliorum convallium mistus, & externè illitus. Imprimis spiritus tartari volatilis reliquis præfertur cum spiritu vini temperandus, ubi acrior fuerit. Galbanetum Paracelsi quocunque modo paratum etiam hoc in casu mirabiliter convenit; sed cum spiritu vini seu simili volatili temperatum, aliquamdiu circulatum, ut penetrantius fiat, & ne nimis crassum sit. Radix consolidæ majoris recens

recens contusa, & cataplasmatibus modò manè & vesperi loco dolenti imposita, singulare quid obtinet. Conferri hic potest Hartmannus, ubi *de Paralyfi*. Proficuum etiam observavi lixivium coriariorum jam usitatum, **die gebrauchte Gerber-Lauge** / mistum cum dimidio vel ana urinæ humanæ, ex quibus fiat suffitus seu fons vaporosus. Hæc mixtura probè calida injectis lapidibus vel ferris ignitis in vaporem resolvitur, qui vapor parte dolente, desuper probè recta, excipendus, ut sudor hinc concitetur, & subinde repetendus.

Thermæ denique, earumque infusus, aut luta thermarum & lapides thermales in aqua probe bulliti, instar thermarum naturalium usurpati, etiam hujusmodi dolores crurum lancinantes insigniter placant. Similia balnea, thermis naturalibus succedanea, aut thermæ artificiales, parari possunt ex aqua, calce viva, & sulphure, ad imitationem Zwelferi in *sua Mantiss. Spargyr. pag. 40*. Integer formicarum acervus sacco inclusus in aqua coquitur, cui æger insidet: Item balnea ex vinaceis.

## ARTICULUS IV.

De

### *Odontalgia.*

**D**olor dentium seu odontalgia, quibusdam dentium podagra, nunc per essentiam, nunc per consensum ex affectis gingivis, enascitur.

### *CAUSÆ.*

Si per essentiam fuerit, causa hujus sæpissimè est acor vitiosus; nunc ex vitiosa dentium nutritione seu alimenti eorum proximi corruptione proveniens, qui dum rodit substantiam dentis, rodit etiam radicem, membranam nerveam & sensilissimam investitam, ex qua varix fibræ in dentis cavum penetrant; nunc feri vehiculo, dum nutrimentum dentium chylosum, vitioso & acore occulto plus minus inquinatum, hujus medio ad eos derivatur, ad dentem quendam depositum, ut in scorbuto & lue Venerea subinde obvium. Subinde etiam lymphæ quædam acida per errorem distributionis ex vicinis glandulis eò derivata talem dolorem infert; est enim affectus catarrhalis. Forasan interdum & collecti humores acres in cavernula ossium maxillæ superioris infra oculum multum contriunt. Vid. Moebii *Fundam. Physiol. cap. 9. pag. 414*.

Corruptio ista alimenti proximi non assimilati in acorem vitiosum interdum eò usque procedit, ut etiam ex corruptela dentium ac gingivarum subinde vermiculi in alveolis

dentium generentur, qui ipsi dolorem istum intensum dentium non leviter exasperant: Vid. Bartholini *Acta Hafniens. Centur. 5. Observat. 108*. Bonectus *libr. 2. Med. Sept. Sect. 4. cap. 13*. M. A. N. C. *Ann. 9. Observ. 24. § 107*. Imò ab acore isto sæpissimè rodente dentes dolorificè, & corrumpente ejusdem alimentum, interdum eorum compages ossæ adeò corroditur, ut exinde dentes carioli fiant & excaventur, ac eorum compages laxetur, ut frustulatim tandem excidant.

Ipsi quidem dentes non dolent, sed membrana dentium intima investiens, ex expansione nervi orta, & cujus fibræ hinc inde per dentium porulos & meatus in eorum substantiam penetrando se insinuant, doloris istius acerbi subiectum sunt. Dolorem hunc vicinarum partium & fibrarum nervearum crispationes, levesque contracturæ per consensum continuitatis insequuntur: unde quousque hæc fibrarum crispatio dolorifica continuatur, eo usque dolor hinc se extendere videtur, ita ut exinde perfecta hemicrania superveniat; & dum ab ista contractura fibrillarum nervearum angustantur poruli, & stringuntur meatus, per quos sanguis aut alii humores meando circulantur, hinc nunc sanguis nunc serum aut lymphæ in motu impedita stagnant, adeoque isti dentium dolori supervenit tandem ut plurimum aut inflammatio maxillæ cum dolore tensivo & pulsatorio, totum capitis hemisphærium occupans, aut etiam tumor, vel sanguineus, vel serosus, vel oedematosus, saltim ab acido membranam nerveam dentis rodente & vellicante.

Causa ergò proxima formalis in dolore dentis est spiritus impetum faciens, cujus ratione membrana dicta, hujusque fibræ sentiunt, ac dolorem percipiunt: materialis verò est acidum in radice dentis hærens.

Causæ remotæ, quæ vel nutrimentum dentium privatum corrumpunt, vel acidum præternaturale eò distribuunt, nunc sunt externæ, nunc internæ. Ex internis, quæ nutrimentum vitiosum acore peregrino infestum feri vehiculo denti communicant, sunt imprimis ipsius alimenti proximi vitia, seu cacochymia sanguinis & humorum in lue Venerea aut scorbuto; mox enim ingentes tumores in scorbuticis & lue Venereâ laborantibus supervenire solent: Externæ sunt imprimis assumpta, quæ dum inter interstitia se insinuant, successivè acorem contrahunt, & partes denti vicinas rodunt, & nutrimentum privatum inquinare solent. Inter hæc excellunt saccharata, dulcia, fervida, nimis frigida, imprimis acida, spiritum insitum dentium labefactantia, & hinc hujus materialem texturam vitiantia: speciatim dentibus nocent saccharata & mellita, quæ facillè fermentando acorem, eumque satis subtilem, contrahunt.

*DIA-*



DIAGNOSIS.

In odontalgia ægri satis sunt queruli, per quos malum manifestatur, saltem quoad causas remotas observetur; quod sæpius in scorbuticis acutissimi dentium sint dolores; sicuti in lue Venerea hi ipsi sunt crudelissimi, planè intolerabiles, iique nocturni, id quod à Medico cognoscendum pro faciliiori instituenda cura. Vitiosum enim, horum morborum causa, acidum, dum in talibus dentibus antea non benè se habent, facillè iis se insinuat, nutrimentum privatum inquinat, & rodendo malum exasperat: Vel dum alius dens per se dolere incipit, facillè ejus occasione acidum præternaturale in corpore concurrere, ac dentis dolorem & vicinorum locorum pathemata crudeliora, efficere valet.

PROGNOSIS.

Quoad prognosin: per se quidem odontalgia in adultis nullum periculum habet, utut per accidens contumacior vel diuturnior convulsiones, in specie musculi temporalis, vigilias pertinaces, aliaque similia symptomata gravia inferre potest.

Adhæc doloribus his interdum superveniunt tumores, iique inflammatorii, qui ad suppurationem tendunt, & aperti interdum in fistulas degenerant.

Ob id ergò maturè compescendus est dolor.

C U R A.

In cura acidum in dentibus peccans est corrigendum, dens cariosus evellendus, & tandè vermiculi geniti enecandi; imprimis tamen, quantocyus fieri potest, dolor sistendus, addendo remediis his semper simul, quæ morbo primario, e. gr. scorbuto aut lue Venereæ, à quo odontalgia etiam tanquam symptoma dependet, appropriatè conveniunt. Sic enim in dolore dentium scorbutico, quò etià ille pertinet, qui ex malo hypochondriaco subinde excitatur, vulgaribus odontalgicis simul misceantur subinde appropriata antiscorbutica, v. g. lac & lacticia, internè & externè; sicuti etiam sola sufficit herba cochleariæ, aut in hujus penuria nasturtium aquaticum, aut etiam nasturtium Indicum, & similia: si nempe dictæ plantæ cum salvia, rosmarino, rosæ, plantaginis & similibus, pro oris collutione subinde misceantur & decoquantur. Sic dolor iste, qui in lue Venerea obvenit, appropriatius non habet remedium, quàm quod malignū istum acorem evincere potest, ex quo genere decoctum Guajaci cum aqua communi, aut ejus essentia, & oleum destillatum & similia optima sunt remedia. Sed de his & similibus videbitis plura in Strobelbergeri *Tract.* eleganti de Podagra dentium.

Remedia ergò, quæ ad dolorem dentium

Tom. II.

compescendum usurpantur, & acidum temperant, sunt innumerabilia, & tot, quot sunt ægri, qui patiuntur dolores. In usu sunt decocta plantarum quarundam in ore tenenda, aut gargarismata ex origano Cretico, foliis nicotianæ, herba persicariæ, radice pyrethri, rasura ligni sancti, buxi, sabina, chamomilla, serpillio, foliis & radice hyoscyami, item teneris germinibus quercus, & similibus, in vino decoctis; e. g.

℞. HB. Persicar.

serpill. aa. M. j.

rad. lapath.

Urtic. aa. ʒj.

Pyrethri.

ras. ligni buxi.

sancti aa. ʒʒ.

sem. hyoscyam. alb. ʒj.

coqu. in l. q. aqua.

Cum Colatura gargarifetur os.

Vel sola persicaria cum corticibus hyoscyami in vino cocta dolorem sistit. Frequenter coquantur in aceto, ubi dolor dentium est à causa calida, ut vocant, ubi simul est tumor sanguineus; in vino, ubi dolor est à causa frigida, quando conjunctus est tumor serosus & œdematosus: utut hæc parum referant, cum potius sint producta morbosa. Sed decocta in aceto cautè applicentur, seu penitus intermittantur: nam acetum acore suo dentibus hostile est, & ejusmodi decocta plus nocent, quàm profunt, dentium compagem solvendo aut friabilem reddendo, & stuporem inducendo: sic mulier quædam doloribus dentiū correpta acetum fervidum in os sumpsit, ubi cessavit quidem dolor, sed dentes frustulatim exciderunt. Vel decoctum sabinæ cum baccis juniperi in ore detentum commendatur à Brendelio. Decoctum itidem radice & herbæ hyoscyami in vino vel aqua & aceto paratum, in ore detentum, potenter dolorem dentium sistit. Melius est, si ex manu ductione Paracelsi recipiatur herba Persicariæ cum cortice radice hyoscyami, decoquatur in vino, & in ore detineatur: quidam enim simpliciter radicem hyoscyami seu ramenta hujus radice, in specie recentis, aut in vino maceratæ, loco dentium dolenti applicant; sic enim acerbus dolor intra horæ spatiū fuit aliquando curat<sup>9</sup>. Oleum hyoscyami ex semine expressum denti applicatum, vel interiùs, vel exteriùs in specie quando vermiculi adsunt, convenit. Loco hyoscyami usurpatur commodè Nicotiana, cujus fumus, præmissa, ubi opus est, purgatione egregius est; sicuti sola nicotiana denti dolenti attrita & masticata (ne tamen saliva deglutiat) solet vi narcoticâ dolorem dentium sistere, teste Riverio in *Observ.* unde decoctum nicotianæ cum floribus chamomillæ in ore detentum ac masticatum

(C c c c c)

reme-

remedium fuit Heurnii in dentium dolore: Decoquitur vel in cerevisia secundaria, vel in lactis sero.

Sic gummi Juniperinum seu sandaracha Arabum in omnibus doloribus dentium admodum laudatur, si scilicet ejus  $\mathfrak{zj}$ . in vini  $\mathfrak{lbj}$ . decoquatur, quo ipso colluatur os; hoc enim multum conferre dicitur ad compescendum dolorem dentium, etiam à lue Venerea obortum: Conf. Amatus Lusitanus *Centur. 5. Cur. 21.* Aliàs experimentum hocce etiam laudatur:

*Rx. Flor. spica nardi,  
coqu. in Vino.*

Et colatura sæpius in ore detineatur.

Præ ceteris conveniunt opiata: nempe fiant pilulæ ex opio vel laudano opiato, quæ ipsa denti dolenti vel cavo immisæ subito dolorem sistunt; ve ejus essentia aut extractum excipiat cum bombace, & vel denti immittatur, aut extrinsecus dentibus ac gingivis affricetur.

Interim notabile est, quod refert Salmuth *Cent. 3. Obs. 34.* ex laudano opiato, dentibus dolentibus intempestivè adhibito, omnium sensuum stuporem, vertiginem & gravedinē capitis oborta fuisse: Et Zacutus Lusitanus *lib. 1. Med. Princ. Hist. 61.* ex opio in dentis cavū sæpius pro ejus sistendo dolore immisso mortem observavit, adeò ut hinc subinde universalis præmittenda. Pertinet huc sotirella parva Augustanorum: Descriptio videatur in *Pharmacop. August.* ex qua pilula una vel altera aut denti cavo intrusa, aut extrinsecus admota dolorem sistit. Virtute opii etiam theriaca recens applicatur denti dolenti, vel ex theriaca recenti paratur emplastrum malæ dolenti imponendum, in specie quando tota series gingivarum cum malis & temporibus dolet. Cera Catholica Burri genis applicata quoque convenit, quem in finem & pilularum formâ denti inferi potest. Quod si dolor & ardor erisypelaceus adfuerit, tali emplastro ex theriaca salis absynthii  $\mathfrak{zj}$ . addendus; internè lac tepidum simul crebrius in ore tenendum, præsertim quando suspicio est de latente scorbuto. Optimum & singulare est camphora, itidem denti dolenti imposita, aut integra, aut soluta in spiritu vini rectificatissimo, aut, qui mihi in usu est spiritus salis Ammoniaci paratus cum spiritu vini & calce viva, in quo camphora soluta sit, cum bombace denti cavo immittatur, aut gingivis in loco dolenti imponatur, præsentaneum levamen infert, utut maxime mordeat; vel oleum camphoræ per ejus in oleo amygdalarum dulcium dissolutionem factum, non incongruum est. Essentiæ quædam vegetabilium aromaticæ mirè etiam conferunt, ut essentia ligni sassafras vel Guajacicum spiritu vini parata. Faber commendat

essentiam thymi, saturejæ, serpilli, salviæ, calaminthæ, zingiberis, &c. si his ipsis gingivæ fricentur, aut etiam cum bombace denti dolenti immittantur. Quò etiam facit Tinctura odontalgica Mynlichti, & Wedelii ex ras. ligni sancti  $\mathfrak{zj}$ . caryophyllorum & radicis pyrethri aa.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cum spiritu vini rectificato extractis. Omnium optima est essentia Benzoina. Hoc habent commodi, ut convenienter cum essentia opii misceri, & ita eò præstantius remedium constituere queant. Ego vidi aliquando dolorem dentium curatum per essentiam catarrhalem sassafratam denti applicatam. Loco harum essentiarum etiam Elixir Proprietatis sine acido, cum bombace vel alio modo denti dolenti applicatum, certò dentium dolorem sistit. In specie videatur Tinctura odontalgica M. A. N. C. *Ann. 6. Append. pag. 76.* Præcellunt adhuc his essentiis olea destillata, utpote salia volatilia concentrata, acidum vellicans destruentia, v. g. oleum destillatum caryophyllorum, & quod præstantius est, oleum destillatum origani Croatici: quibus tantillum camphoræ additum eadem reddit tantò præstantiora. Rulandi experimentum certissimum fuit oleum Heraclicum ex corylo paratum; locum cujus oleum destillatum buxi per descensum, & per vesicam rectificatum, convenienter potest recipi; vi enim narcoticâ nobile est odontalgia: cui præfertur oleum sabinæ destillatum perquam egregium, sicuti ipsum sabinæ decoctum in cerevisia secundaria vel vino paratum, in ore juxta locum dolentem detentum, excretum, & subinde ita repetitum, excellens est, expellens simul dentium vermes. Wedelius ex oleo destillato ligni Guajaci & caryophyllorum additâ camphora parat oleum odontalgicum, cujus guttas duas vel tres denti carioso cum bombace immittit. His oleis destillatis in acerbissimo dolore tantillum de oleo hyoscyami expresso convenienter addi potest. Claudini remedium fuit oleum terebinthinæ cum tantillo camphoræ, aut ipsemet balsamus sulphuris terebinthinatus cum bombace dentibus inditus etiam confert: Præter dicta etiam oleum destillatum rorismarini, salviæ, juniperi, succini, admodum commendatur. Videatur etiam balsamum odontalgicum in M. A. N. C. *cit. loc.* Plumbaginis radicem, seu verum experimentum, laudat Panarollus *Pentec. 4. Observ. 10.* Radix hujus plumbaginis contusa, & carpo manus imposita, per noctem relicta, mane maculam plumbeam relinquit, & dentium dolorem evanescere facit: id quod à multis fuit probatum, ratione cujus effectus etiam à quibusdam denticaria vocatur. Sulphur auratum antimonii confert etiam, si ejus tan-

tanpillum cum bombace in dentem cavum immittatur, aut denti dolenti applicetur; imbibitione enim acidi corrosivi dolorem citò sopit, quod ipse aliquoties observavi.

Præter hæcenus recensita etiam curæ magneticæ ac transplantatoriæ in usu sunt. Magneticas inter eminet Paracelli *Cura quoad Persicariam*, dum eam recentem in aqua maceratam imponit loco dolenti maxillæ, donec probe incalescat: hinc sepeliatur in fimo, ut citò putrescat, sic enim dolor cessat: Vid. Helmontius, & Marcus Marci. Pertinet huc ossiculum brachii bufonis, quod experimentum Helmontii & secretum Heurnii fuit, qui recipit os dextri femoris bufonis ab omni carne nudum, hoc gingivas dentis dolentis subinde & fortiter tricat, & subito cessat dolor. Helmontius *ossiculum brachii dextri bufonis* recipere jubet, quod loco dolenti applicatur. Quidam recipiunt frustulum ligni acutum, fricant eò dentem dolentem seu gingivas, post verò lardo infigunt; sic brevi post evanescit dolor. Lignum fraxini justo tempore cæsum, dentium cavitatibus intrusum, dolorem fugat, ubi & gingivis affricari poterit.

Quoad transplantationem, imprimis cum corylo hinc cum sambuco & salice, ea instituitur, si nempe ab his, separato nonnihil cortice, excindatur festuca, quâ ipsæ gingivæ & loca dentis affecti punguntur, usque dum sanguinem fundant, tum lignum cruentum denuò immittatur loco, unde excisum cortex denuò applicetur, & luto probe circumdetur: Vid. in Johanne Sophron. Kozak *Tract. de Sale* pag. 513. Alii ungues abscindunt à manibus & pedibus, dentesq; à sordibus mundant, hæcque omnia linteolo involvunt, atque die Veneris ante solis exortum sambuco prius discusso immittunt; quò citius foramen illud concrevit, eò citius dolor remittit. Conveniunt ejusmodi curæ in sæpius recidivantibus & quasi habitualibus odontalgis. Quamvis videatur aliquid superstitionis illi actui subesse, ob ceremonias, quæ observantur in illo actu, tamen reverà superstitione caret, & ceremoniæ, quæ adhibentur, non sunt de essentia artificii; nam & eis absentibus feliciter procedit cura.

Subinde etiam à chirurgis externè temporibus emplastra applicari solent eum in finem, ut saltem consensum doloremque per consensum hemicranicum tollant. Fiunt ex gummi tamaracahaca, vel galbano, quod est meli⁹, vel carannæ, malaxatis cum oleo papaveris expresso, vel cum balsamo Peruviano; quæ super linteum in forma thaleri extensa, sanè in odontalgis gravidarum non sunt contemnenda; & quidem, si in maxilla superiore doleant, temporibus; si in inferiore, prope aures sunt applicanda. Alii gummi elemi vel mastichen recipiunt, & eadem parant pro gravidarum doloribus. Alii mastichen & ceram; qui-

dam etiam gummi Ammoniacum aceto dissolutum, instat emplastri applicant.

Fit subinde, ut cum odontalgia etiam ingens maxillæ tumor conjunctus sit, tunc Chirurghi imperiti applicant emplastrum de meliloto, quo ipso sine ratione abscessum inferunt; nam modò sistatur dolor, tumor & omnia symptomata spontè evanescent. Potius ergò tales tumores fomentis discutientib⁹ & resolventibus, quàm emplastris suppurantibus, sunt curandi.

Fit etiam interdum, ut in gingivis circa radicem dentis dolentis superveniat aliqualis tumor parvus intensè dolens, qui pedetentim ad suppurationem tendit, qui tumor ut eò felici⁹ suppuretur, ne præmaturè evanescens recidivam inferat, sed potius maturè suppuretur, convenit lac tepidum in ore tenendum, vel, quod melius, frustula ficuum, vel crudarum vel nonnihil assatarum, tuberculo imponenda, quæ insigniter suppurationem promovent. Abscessus postmodum apertus sedulo aqua mulsa, quâ eluatur os, vel melle illito mundificandum, ne nimis citò consolidetur, aut ne in fistulam abeat; Tantillum enim fermenti remanens crebriorem ejusmodi tumoris recidivam facit.

Subinde contumaces odontalgix adeò sunt, ut propter feri copiosioris retentionem circa partem dolentem periculosa sint, imò crebrius adeò periodicæ, ut subinde quibusvis etiam generosissimis artis præsidis, curari vix queant. Exempla singularia videb. in M. A. N. C. *Ann. 8. Observat. 62. pag. 104.* Borello *Centur. 3. observat. 7.* Hildano *Cent. 4. obs. 21.* In talibus, ubi purgatione opus est, aut saltem metu gravioris mali, eadem instituenda videtur. Jalappa est convenientissima, juxta quam & ad sanguinis missionem interdum accedendum venit. Hinc Thonerus *lib. 1. obs. pag. 114.* dolorem dentis per venæ sectionem ad animi usque deliquium curatum refert: Idem *cit. loc.* dolorem dentium à sanguine copioso fervido per cucurbitulas scapulis, cervici, cubito applicatas, aliis irritis curatum memorat; sic dolor dentium contumacissimus nullis cedens remediis per impositionem cucurbitulæ maxillæ sanatus observatur à Foresto *lib. 14. observat. 6.*

Pro revulsione Pareus *Chirurg. lib. 16. cap. 25.* allium tritum illâ manu, in quo latere dolor percipitur, gestatum conferre ex Mesue refert: vid. Platerus *lib. 2. observat. pag. 371.*

Quoad dentes cavos aut cariosos: pro his nulla adsunt remedia, quamvis dolor levetur, semper tamen recidivat, unde dens cavus & erosus evellendus aut extrahendus est; vicini enim dentes simul carie inficiuntur. Evulsio hæc non est quidem genuina odontalgix cura; nihilominus tamen, quia in dente corroso adhuc hæret fermentum acidum



dum rodens, quod subinde recidivare facit dolorem, optimum est eundem evellere; Etenim quando est evulsus, facta sic foveâ interdum liquor copiosus limpidus solet evacuari, à quo abluitur quasi caverna loci, ne malum possit recrudescere. Quamdiu verò vel nondum eò usque processerit malum, vel propter pericula, sub dentium evulsione interdum observata, hæc nimis metuatur, remediis res tentanda est, cariei scilicet progressum ulteriorum inhibendo.

Cariei verò ulterior progressus per artem & medicamenta inhibetur, efficacissimè imprimis per inustionem dentis carioli cum cauterio actuali, sive ex ferro, sive ob subtilitatem commodiorem, ex argento vel auro facto, hinc auro foliato dens cavus repleatur; præservatur enim sic à majori putredine & corruptione: vel ex cera cum myrrha probe subacta, vel potius ex cera viridi propter admistam æruginem impleatur dentis carioli excavatio. Ipsa myrrha, denti indita, egregia est in hoc casu. Confer, hic Riverius in *obs. Communis* pag. 309 ubi refertur, quod dentesterebinthina impleantur & cauterio actuali dens inuratur in carie. Loco actualis cauterii, ubi necessum visum fuerit, potentiale adhibeatur; sic aqua fortis denti carioli admoda, vel spiritus vitrioli gutta j. vel ij. bombace indita, ac denti adhibita, mirè corrosivum juvare & præservare dicitur. Item zinziber in oxymelite coctum, & in cavernam dentis immisum, præservat corruptionem. Coralliorum pulvis denti cavo inditus, vel os sepiæ, item camphora, cariei ulteriorem progressum inhibent: vel ex pulvere coralliorum alborum, cum melle rosato ad consistentiam liniimenti crassioris redacto, dentibus illitum cariem inhibet.

Denique vermiculi in dentibus nidulantes sunt enecandi, quod optimè facit decoctum sabinz cum vino paratum, in ore detentum, quod copiosos vermes elicit. Item suffusus ex semine hyoscyami & cera, in globulos redactis, specificus est per infundibulum dentibus cavis receptus, vermiculos enecat, & mirabiliter egredi facit: Conf. Bartholini *Act. Med. Hafniens. Vol. 1. pag. 209* Melius est si loco hujus ex fructibus halicacabi contusus, cum cera mixtis fiat exinde pasta, & injiciatur in laminam ferream ignitam, quæ fumum suggerit, quo ore excepto, catervatim vermes cum sputo copioso rejecti, & crudelissimi, dolores sopiti, observati fuerunt. Spiritus sulphuris vel vitrioli quoque dentibus cum bombace inditus vermes optimè necat, & dolorem inde oriundum placat; vel pulvis gallarum cum succo radice pyrethri imprægnatus, & cum fermento in pilulam redactus, optimè vermes expurgat, si denti, ubi sunt vermiculi, indatur. Decoctum ra-

dicis vel corticis fraxini etiam vermes in dentibus stabulantes enecat. Sevum cervinum ad ignem liquefactum, & gingivis impolitum, quantum contra vermes dentium valeat, vid. Barcholinus *Cent. 3. Hist. 96.*

## ARTICULUS V.

De

### Dolore Oculorum.

#### CAUSÆ.

**D**olent etiam non raro oculi variis in casibus, tam quando inflammantur, quam etiam, si lachrymæ aut lymphæ eosdem humectans acrior & acido-salior fuerit, unde rosio, morficatio, dolor, & rubedo. Pertinent huc res externæ quæcunque in oculos incidentes, & oculorum dolorem infligentes.

Patiuntur etiam oculi dolorem ex rebus intrinsecus illapsis, & ex lachrymis acrioribus seu lymphæ falso-acida. Hi posteriores dolores parum habent in recessu.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Dolor in bulbis oculorum sine ophthalmia funestissimum signum est, si in principio morbi acuti ægri de tali conqueruntur; mox enim delirium & convulsiones adsunt, quod sæpius observavi.

#### CURA.

In cura sublatâ causâ tollitur effectus, curatâ ophthalmiâ cessat dolor. Adeoque si re externæ in oculos illapsæ fuerint, quantocius eadem removendæ; in quem finem convenit imprimis homini semen oculo immisum, quod ipsum à lymphæ oculari humectatum reddit mucilaginem, qua inviscantur ea, quæ in oculos inciderunt & ita extrahi possunt. Item Perla parva, vel parvus lapillus cancri, immittatur in oculum, & hinc inde sæpiâ agitatione ejici solent, quæ inciderant: vid. Wormius. *Magnes* admoveatur oculo in scobe Martis aut scoria chalybis: conf. Hildanus *Cent. 1. obs. 13. & Cent. 5. obs. 21.* Quomodo alias instrumentis chirurgicis externa ista ex oculis eximenda sint, vid. Hildanus *Cent. 2. obs. 13. Cent. 4. obs. 17.*

In inflammatione à causa interna hæc ipsa appropriatis curanda venit, in specie propter oculorum dolorem, præter remedia superius notata in ophthalmia, decoctum pomorum dulcium applicetur, idque solum, si sit à causa interna, vel sociatum cum albumine ovibene agitato, si sit à causa externa. Expertum quoque est sequens collyrium Hildani.

*℞. Mucil. sem. cydon. c. sperm. ram. extr. ʒiij.*

*Camph.*

*Crocea gr. v. l. vj.*

*Musc.*

Impo-

Imponatur oculis cum linteis multiplicibus instar collyrii.

Aqua fœniculi cum saccharo Saturni ardor in oculorum dolore tollit: si addatur parum camphoræ, erit magis potens. Vel

℞. ▽ *Chelidon. maj.*

*fl. Cyani*

*Calatr. aa. ʒj.*

℥ *li alb. gr. xij.*

soluta filtrentur per chartam:

adde

*Tut. præp. ʒß.*

M. S.

**Stillend Augen-Wasser.**

Cum linteis imponitur oculis.

Singulare est experimentum radix morsus diaboli, si scilicet quinque tales radices lunâ decrecente coctæ appendantur in fine de collo patientis; tunc enim fit, ut tollatur mirabiliter nimius dolor, & omnes exacerbationes oculorum affectuum impedit & aufert. Experimentum hoc est quorundam in casibus, ubi alia in cassum sunt adhibita.

Sic & arteriotomia subinde administranda venit: Videantur Bartholini *Acta Hafniens. Volum. I. pag. 23.* si adsit lymp̃ha corrosiva in oculo, vel lachrymæ acriores, adhibeantur in specie tutia præparata, aut flores cinci, ac loco hujus flores Jovis secundum manu-ductionem Zwelferi parati. Hi cum collyriis applicati, absorbendo acrimoniam lymphæ, corrigunt & temperant, qua ratione etiam in epiphora dolorosa applicari potest. His omnibus præfertur cataplasma resolvens & discutiens ex pomis dulcibus, quod omnes Practici unanimi consensu mirè deprædicant & commendant, applicando oculo dolenti, verbi gratia:

℞. *Pom. dulc. coct. & express. vel*

*sub ciner. assat. Nō. iij.*

*Album ovi conquass. Nō. j.*

*Sacch. albiss. ʒij.*

*Camph. gr. x. l. xij. ad xv.*

*Croci gr. v.*

M. f. Cataplasma oculis imponendum.

D. S.

**Linderender Brey.**

Vid. *suprà de Albugine & Colleg. Jonston. D. Michaëlis.*

Si sit malum à causa externa, applicatur cum albumine ovi benè invicem mistis & agitat; si sit à causa interna, albumen commodius omittitur. Convenit in quovis unde-

cunque nato oculorum dolore etiam inflammatorio. Experimentum fuit Timæi von **Gildentlee** in *Cas. pag. 48. Chirurg.* Barbette *pag. 150. 151. & 188. it. Armam. Chirurgic. Sculteti observat. 22. Horstius observ. p. 443. Pro optimo euporisto habet Borellus Cent. I. observat. 31. sequens:*

℞. *Album. ovi.*

Et cum aluminis frustulo tamdiu agitetur, donec pultis consistentiam acquirat: postea linteo subtili involvantur, & scuto clauso palpebræ imponatur, sæpè renovando.

Specialis est dolor, qui oculos subinde affligit, estque sensus vehementissimæ compressionis, & quasi simul ejusdem lacerationis, **Das Drücken in den Augen** / sine manifesta oculi latione vel alteratione. Urget vesperi, & manè quando surgunt, saltim interdum lineolæ rubræ in & circa membranas oculi hærent. Subinde sine causa manifesta urget. Credo esse quasi affectum spasmodicum tunicarum oculi. Dolor hic compressivus & lacerativus curatur per aquas ophthalmicas antimoniales quascunque, ex infuso antimonii, vel vitri antimonii, vel capitis mortui butyri antimonii, vel croci metallorum; vid. *de Ophthalmia supra l. a.* cum aqua spermatis ranarum vel fragorum: quibus commodè addi possunt cerussæ vel sacchari Saturni ana ʒj ad ʒß. vel ʒj, subtilissimè pulverisati: Item fomenta Poterii in *centur. 3. cap. 9.* ex decoctis ophthalmicis extra adhibitis, decoctum radice lapathi majoris quotidie potum, oculisque illitum, tanquam singulare commendatur: Item verberna, fœniculum, euphrasia, rosæ, sumach, tutia in aqua & vino decocta applicata; vel ad imitationem Hildani,

℞. *Mucyl. sem. Plantag. vel senugr.*

*Cydonior.*

*hormini s. sclarea, c. sperm. ran. extr. ā ʒj.*

*Croci gr. vj.*

*Camph. gr. iv.*

quæ mista applicentur oculis contra dolorem.

Quibus quidam & lac muliebre addere solent, vid. Hildanus *libr. I. observat. 2. pag. 13.* Folia item Nicotianæ recentia leviter contusa oculis imposita, vel si haberi non possint recentia, accipiantur sicca, macerata nonnihil in vino vel spiritu vini, applicentur; Sic enim ratione salis volatilis oleosi dictum dolorem solvunt. Ulterius saccharum Joviale cum aqua rosarum mistum & instillatum, est nobile ophthalmicum, quod mirè commendatur à Lindano in oculorum doloribus.

Huc pertinet dolor superciliaris periodicus, arthriticis imprimis familiaris cum vesicatorio retrò aurem curatus, qui vid. in M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 252,*

(Ccccc 3)

AR-

## ARTICULUS VI.

De

*Aurium Dolor.*

**D**olent etiam subinde aures graviter in Otalgia, *Ohrzwang*/ idque imprimis ratione membranae internae, meatum auditorium investientis.

## CAUSAE.

Causa huius doloris est vel frequentissime inflammatio, de qua jam supra suo loco dictum fuit, juncta cum sensu ardoris ac pulsationis, subinde lancinationis molestissimae, cum sensu aestuationis in regione auris externa: & quidem, licet non videatur primitus dolor ab inflammatione; tamen superveniente puris fluxu & levamine, res ipsa se prodit. Conf. in specie, quae notabiles aurium dolores cum curatione notant, M. A. N. C. *Ann. 6. observat. 82. pag. 117.* Vel est humor acris & salus, membranam internam pungens & admodum corrodens; item lymphæ catarrhalis vitiosa, aut nimis acore imprægnata in catarrhalibus affectibus, per errorem distributionis ad aures delata, quæ ad otalgiam disponit, & lancinantem dolorem infert. Eundem dolorem etiam infert iste humor, ex quo naturaliter concresecunt cerumina, depravatus, qui si præternaturaliter reddatur acris & salus, membranam internam pungit, & nonnihil arrodit, & sic aurium dolores infert. Dixi humor, ex quo naturaliter concresecunt cerumina; nam utut hæc ipsa cerumina sub consistentia spissiore flavescente, naturaliter in adultis dicantur amarescere (unde egregium adeo est vulnerarium & ulcerarium,) quæ in infantibus dulcescunt; prima tamen eorum genesis est ex quodam humore tenui seu lymphæ, quod ex eo patet: si quis cerumina aurium expurgans cum stylo altius intruso vellicaverit membranam meatus auditorii, tunc humor tenuis roridus fluere percipitur, quod etiam digito profundius immisso per se patet: Imò si copiosius forsan fluat in aures, aperte sensus fluxionis percipi potest. Hic ipse ad exteriora auris effusus resolvitur per aërem, & inspissatur tandem in sordes crassas, quas nos cerumina vocamus. Tandem sunt etiam vermes, nunc in aures irrepentes, nunc etiam interdum in ipsis auribus geniti, inde ex auribus etiam ad ipsum cerebrum penetrant, qui non raro atroces dolores aurium, eosque varios, inferre solent, cum sensu rosionis, punctorio pruritus; item cum sensu reptionis seu progressu vermium in interiori auri meatu: Vid. Panarollus *Pentec. 4. Observat. 27.*

## DIAGNOSIS.

Ex modo dictis facilia sunt signa: Nam uti videre est, Otalgia cognitio patet ex relatione ægri, saltem causarum distinctio probe attendenda.

Si dolor sit ab inflammatione, adest dolor pulsatorius, conjunctus est sensus ardoris in aure, subinde etiam auris externa rubet.

Si sit ex alia causa humorosa, dolor sine ullo insigni ardore, cum levi saltem pulsatione, percipitur, & dolor tantum acutus, pungens & quasi perforans, in auribus adesse solet.

Considerentur simul signa affectuum catarrhalium, capitis gravitas, &c. item dolor à tali causa nunc acerbior & gravior, nunc remissior esse solet; item per diuturnitatem se manifestat.

Vermes etiam facile patent; percipitur sensus rosionis aut punctura; item percipitur subinde pruritus à vermibus, interdum etiam reptionis seu progressus sensus in auri interiorum meatum percipitur; observentur simul circumstantiæ antecedentes.

## PROGNOSIS.

Aurium dolor, præsertim inflammatorius, admodum periculosum malum est; atrocior enim si fuerit, deliria, gravia cerebri pathemata, ipsam interdum etiam mortem infert; idque eò magis, si in profundo affectus hæserit, & magis magisque nervum acusticum afficiat.

Infantibus frequens malum esse solet, & quod facile supervenienti materię cujusdam plus minus purulentæ excretioni se jungit, seniores verò gravius & periculosius laborant.

Reliqui aurium dolores levis momenti esse solent, utut graviter torqueant ægros.

## CURA.

Quoad curam: varietas causarum observanda est; Imprimis distinguendus est dolor inflammatorius aurium ab aliis eorundem doloribus. In specie tamen, vel in genuino dolore, vel eo, qui supervenit otalgia, expertum est cataplasma ex cepis Faventini, quod Forestus *in libr. 12. Observat. 1. & 4.* describit.

Item ceparum assatarum succus cum oleo irino expressus laudatur *observat. 2. l. 4.* In genere etiam dolorem aurium sistunt fomenta ex anodynis & emollientibus in lacte coctis, ut radice althææ, semine fænugraci, floribus chamomillæ, meliloti, betonica, &c. applicata, præsertim si malum sit à causa externa: Vid. Hildanus *Centur. 1. observat. 5. & 6.* item Forestus *libr. 12. observat. 3.* Convenit etiam oleum chamomillæ, rosarum, rutaceum; item oleum, in quo cancri fluviatiles incocti; per alcali enim olei



olei acidum destruitur: cui in dolore inflammatorio nonnihil camphoræ addi potest: Item fumus Nicotianæ cum fistula inversa auri immixtus etiam confert ad dolorem aurium compescendum; vel folia nicotianæ, aut recentia, aut aquâ appropriatâ vel spiritu vini vel vino macerata, parum contusa auribus applicata, dolorem promptè sistunt. Præ ceteris utilia sunt olea auribus instillanda, ut oleum ovorum, insectorum, asellorum, scarabæorum, scorpionum.

℞. ʒ. scorpion. ʒj.

Amygd. dulc. aut, si opus est aliqualidetergione, amar. ʒß.

destill. Anisi.

Carvi aa. ʒß.

M. D. S.

*Linderend Oehl.*

De mistura hac blande calefacta auri dolenti instilletur, ægro in aure sana recumbente, aut etiam cum bombace paulo profundius immittatur; quibus non inferius est, oleum lumbricorum rectè paratum.

In dolore aurium, ubi aut adest inflammatio, aut metus est, ne inflammatio superveniat, optimè præscribitur hocce:

℞. succ. semperv. maj. ʒij.

ʒ. scorpion.

lumbr. terr.

Chamom. aa. ʒj.

Mista instillentur aut saltem cum bombace his oleis intincto auris obturetur.

Singulariter etiam non tantum ad dolorem aurium, sed etiam simul ad surditatem, laudatur bulbus seu radix panis porcini aut cyclaminis, quam excavant in forma scutellæ, & oleo liliorum alborum aliove appropriato replent, ad ignem relinquunt, usque dum probè cocta fuerint: post coctionem integram radicem benè exprimunt, & de liquore expresso auri dolenti vel immittitur, vel cum gossypio applicatur. Porro, ubi nulla est inflammationis suspicio, præter dicta, imprimis olea destillata vegetabilia conveniunt, quæ inter sunt oleum destillatum origani. Convenit itidem oleum castorei, item decoctum caryophyllorum aromaticorum in vino auri instillatum, ipso caryophyllo desuper applicato: Etiam confert ad dolorem ex lymphâ crassa. Urina etiam pueri recens, aut potius ejus spiritus phlegmaticus non adeò acris, auri instillatus est egregius, item spiritus otalgicus Mynsichti, qui est egregius spiritus, & optima compositio, aut spiritus otalgicus Barbette in *Anat. Pract. libr. 2. cap. 1.*

Quibus si graviori in malo non cedat, aut ubi dolor est nimis acutus, in spiritu hujusmodi otalgico aut alio, aut tantum spiritu

vini tartarifato, dissolvatur parum opii vel laudani opiiati, vel addatur tantillum essentia opii, & ita hoc modo auribus instillentur; sed cautè hoc fiat, ne auditum lædamus. Conf. Forestus *libr. 20. observat. 1. 3. & 4.* Denique oleum è ligno coryli destillatum, item oleum ligni buxi, acerbissimos aurium dolores subito sistit: sed olea scorpionum & asellorum instar omnium sufficere possunt.

Vor eine gewisse Cur wird ausgegeben/ so man eine Kugel nimmt/ die aus einem Hirsche geschnitten/ schläget dieselbe breit/ und drücket das Ohr damit zusammen.

Si dolor aurium a vermibus fuerit, ii quantocyus eliciendi sunt vivi, aut intus enecentur, & ita extrahantur. Lac tepidum auribus cum spongia aut linteo extrinsecus applicatum, dulcedine sua vermes allicit, ut ita prodeant, vel lac infundatur in aurem, vid. Panarollus *Pentec. 4. observat. 27.* Pomum etiam dulce allatum auri applicatum simili modo convenit, uti refert Panarollus *Pentec. 4. observat. 27.* His non sufficientibus interficiendi sunt. Interficit vel angit eodem succus absinthii, aut centaurii minoris aut cucumeris asinini, aut foliorum persicorum, item oleum nucleorum persicorum recentè expressum amygdalarum amararum, diacolocynthidis Quercetani; quibus aliquantulum Mercurii dulcis addi potest. Vel

℞. ʒ. Nucl. Persic. rec. expr. ʒj.

diacolocynth. Quercet. ʒß.

ʒii dulc. gr. vj. ad ʒß.

M. probè. S.

*Oehl gegen die Würmer im Ohr.*

Guttatim instilletur, vel cum bombace immittatur auribus.

Velaqua Hermetica, h. e. aqua hyperici vel graminis, in qua Mercurius vivus purificatus aliquantulum bullierit, vel cum qua probè agitatus fuerit; decantata auribus instillata aut injecta, non erit inconveniens. Elixyr proprietatis ratione myrrhæ & croci, si duæ vel tres guttæ instillentur auribus, etiam conducit ad evacuandos vermes. Vel injiciatur decoctum ex summitatibus absinthii aloë, vel aliis, mediante siphone pro eluendis auribus: c. g.

℞. Aloës ʒij.

Myrrh. ʒj. ad ʒij.

Colocynth. ʒß.

summ. Absinth. Mß.

Coq. in l. q. vini l. ʒ. a comm.

Colatura detur pro injectione in aurem.

Vid. Barbette *Anat. Pract. libr. 3. cap. 1. pag. 110.*

Suffitus myrrhæ auribus receptus, & ipse vermes evocat, item infusum seminis nigellæ in

in aquavivæ sive spiritu vini cum bombace auribus applicatum multos vermes eduxit, uti hoc observat Schenekius.

Aliàs etiam oleum destillatum corylinum omnes vermes aut enecat aut expellit.

Suffimigia amara cum antimonio juncta non auribus tantum, sed etiam ore & naribus excepta eosdem vermes expellunt; est enim meatus ex auris concha in os, teste Salmuth. *Cent. 2. Observat. 39.* Quò facit etiam unguentum Hartmanni ex pinguedine capi, oleo corylino & Mercurio sublimato aut dulci; nam & hoc egregiè aut enecat aut expellit vermiculos. Vel etiam ex semine hyoscyami cum cera formentur parvæ candelæ; quæ accensæ, aut carbonibus injectæ, spirant fumum, qui auribus exceptus mox vermes expellit. Oleum destillatum juniperi, item balsamum sulphuris terebinthinatum, enecat animalia in aurem ingressa; sicuti etiam suffitus gummi Ammoniæ quædam ejecit: *Conf. M. A. N. C. Ann. 3. observat. 266. pag. 480.* si gryllus in aurem irreperit, oleo infusionis gryllorum denuè ejicitur, vid. *M. A. N. C. Ann. 4. observat. 50. pagin. 44.* In specie si musca ex improvise introreperit, accipiatur terebinthina, eaque cum bombace & stylo immittatur in aurem, & inviscata musca extrahatur. Quodsi ex improvise hirudo in aurem irreperit, tunc subito auris externa perfundatur sanguine recenti cujusdam animalis, sic enim ad sanguinem prorumpunt hirudines, & ita egrediuntur; qualem historiam habet Bartholinus *Cent. 4. Hist. 74.* Vel injiciatur aqua solutionis salis communis. Quodsi pulex in aurem se insinuaverit, laudatur à Riverio globulus ex pilis caninis compositus, extrinsecus auribus applicandus, vel cum stylo in aurem immittendus; pilis enim subito pulices se insinuant & extrahuntur.

## ARTICULUS VII.

De

### Cephalalgia.

**P**Ræ aliis multiplex & sæpissimè sævus est dolor, qui caput crebrius affligit, in genere cephalalgia dictus, non quod caput integrum doleat, sed tunc saltim ista capitis suprema pars, quæ ossibus cranii circumscribitur; nam reliquæ partes in capite dolentes peculiaribus ferè appellantur nominibus. Et quidem in dicta parte capitis, quæ circumscribitur ossibus cranii, membranæ sunt solummodo ex fibris nerveis multiplicibus, cruciatim sitis sensibilibus contextæ, & ex istis natæ nervorum tunicæ; uti & istæ membranæ, quæ varias cerebri cavitates & anfractus investunt, quæ in dicto dolore primariò affliguntur, eæque tam externæ, cranium &

caput, quàm internæ, cerebrum in ejusdem ambitu, cingentes. Unde dolor capitis alius est internus, qui saltem meninges in toto sui ambitu solet affligere, & externus, quando externæ saltem membranæ dolent, de quo optimè scripsit Willsius *libr. de An. Brutor. Part. 2. cap. 1. & 2. pag. 180.* cujus etiam vestigia sequemur.

Dura verò mater duplici constat tunica, per quam vasa sanguifera multis anfractibus, imprimis ex vena jugulari, transeunt, donec perveniant ad vasa capitis, & tunc ad cerebrum; hinc non potest fieri, quin pro vario sanguinis statu multa patiantur hæ membranæ. Si igitur dilatentur vasa à sanguine, necessariò dilatatur tunica, & dividitur ejus duplicatura; unde necessario sic insequitur dolor capitis. Utrum autem caput omnis generis patiatur dolores, in specie tamen ordinariò pulsatorii & tensivi esse solent, qui hanc membranam affligunt, quæ ipsa etiam per consensum pericranium capitis afficere solet; interna enim tunica seu pia mater minus dolorosa videtur propter nimiam sui subtilitatem. Jam verò cum membrana ista dura comitetur nervum opticum usque ad oculum, & ibidem tunicam sclerotidem constituat, ob id frequenter in graviori capitis dolore ipsi etiam oculi intensè dolere solent; hinc est dolor capitis internus.

Quoad capitis dolorem externum; sit hic, quando saltem membranæ cranii, speciatim pericranium, hinc pannicul' carnosus, musculi; ipsaque adeò cutis, vel per consensum duræ meningis, vel propter læsionem externam in contusionibus aut concussionibus, aut similibus ex causis externis, afficitur; item quando materia præternaturalis recrementosa ibidem colligitur, uti in lue Venerea fieri solet, acerbè dolet, qui dolor externus facile tactu externo perceptibilis & sensibilis. Subiectum ergo, quod dolet in capite, non est cerebrum, neque cortex, neque medulla, sed saltem membranæ in & extracranium existunt; unde frequens est dolor capitis tensivus & pulsatorius; extraordinariè autem solet esse lacerans & lancinans; sicuti etiam dolorem puncturium & ostocopum caput perferre solet.

Dolet autem caput nunc universum, totus nempe ab ossibus cranii tractus circumscriptus, atque tunc generaliter cephalalgia audit, qualis iste est dolor, qui subinde homines post crapulam, vel sub aëris mutationibus, vel in febribus ardentibus & intermittentibus, vel alia simili causa affligit, quique secundarius est, & nunc synciput, nunc occiput (quod tamen rarissimè contingit) magis affligit. Quod si verò dolor talis capitis univer-



universalis sit gravior, diuturnus & contumax, mutato nomine cephalgia dicitur, & causam ut plurimum agnoscit fixam, in ipso capite, aut certè eò loco radicatam. Quodsi dimidium saltem caput, imprimis ratione futuræ sagittalis, vehementer & pertinaciter tantum doleat, ita ut altera medietas sit indolens, est hemicrania, ut plurimum diuturna & admodum contumax. Quodsi unica tantummodo pars capitis inter sagittalem & temporalem futuram afficiatur, dicitur ovum, à magnitudine nempe loci affecti, quæ ovum non excedit. Quodsi dolor porrò in uno parvo sit loco, contumax tamen & fixus, quasi clavus ibidem sit intrusus, dicitur clavus, sola magnitudine partis affectæ ab ovo differens. Dolor item in ovo est major, in clavo minor; ovum item per vices solet intendi & remittere, clavus verò non item; est enim ferè continuus eodem modo durans & affligens, nisi à causa externa forsan intendatur. Tandem, utut frequens percipiatur dolor in synipite, interdum tamen solum occiput dolet, idque frequentius in mulieribus, qui ferè conjunctus est cum sensu frigoris istius loci, quasi glacies intra calvariam esset recondita. Talis dolor fit imprimis per consensum uteri: imo quoque senes, tam mares quàm vetulas, talis dolor occipitis solet affligere, qui tamen ex alio est fonte.

Ab adjuncto cephalgia vel calida, vel frigida dicitur: calida, prout nempe sanguis vel ipse magis fervet, vel ex membranarum spasmò circa capitis partes, præsertim anteriores, magis detinetur; tunc enim caloris manifestus sensus, præsertim circa frontem, percipitur: Frigida econtrà dicitur, ubi nil tale occurrit, sed potius frigus sentitur, aut saltem gravedo capitis adest.

### C A U S Æ.

Causa hujus, quemadmodum omnis doloris, est, quicquid fibras dictarum partium distendere ac rodere valet: quod quia à quamplurimis causis nunc immediatè magis, nunc mediatè fit, distinguenda est ante omnia cephalgia in eam, quæ est per essentiam, ubi vitium & origo mali hæret in ipso capite, v.g. dum caput dolet ex vulnere, contusione capitis, &c. ab ea, quæ est per consensum, quando nempe vitio, aut massæ sanguinæ, aut partium quarundam inferiorum, caput dolet & compatitur, estque hæc cephalgia omnium frequentissima in praxi, quæ verò fit per essentiam, contumax magis, & ferè cephalgia esse solet.

Per consensum partium inferiorum fit cephalgia absque ulla vaporis aut humoris transmissione atque ascensu, utpote à Willisio aliisque neotericis refutato; sed simplici-

ter per solam communicationem membranarum & nervorum cum partibus aliis membranosis ac nerveis spasmodicam, intercedente simul certo nervorum conjungio. Nam sicuti ex contusione capitis aut gravi cerebri ejusque membranarum vulnere concitatur vomitus vehemens solo consensu; & sicuti ex jejuniò in hypochondriacis concitatur vertigo in cerebro, interdum etiam in quamplurimis cephalgia, solo consensu cum stomacho; ita etiam ex solo consensu ventriculi cum cerebro ejusque membranis dolor intensus excitari potest, quod confirmat Forestus *lib. 9. observat. 46.* ubi juvenis biliosus, cum jejunus ambularet, dolore capitis tentabatur; assumpto verò pauxillo cibo, subito omne malum remittebat. Ac sanè fit non alio modo, quàm per spasmos alibi inceptos, & nervorum ac membranarum ductu in caput usque continuatos: sic enim per consensum dolores oriuntur, vid. Willisius *de Anim. Brut. Part. 2. cap. 1.* cephalgia ex liene & ex hypochondriis nil frequentius; quia lien copiosis nervis est dotatus, ratione quorum & ejus constitutionis membranaceæ ejus spasmus cephalgiam inferre solet. Par ratio est, quando per consensum uteri fit cephalgia, vid. Forestus *lib. 9. obs. 51.* Riverius *Cent. 2. obs. 56.* & Riedelius *obs. 20.* Bartholinus *in Hist. Pannonicam* observat mulierem, quæ hemicraniâ semper affligebatur, cum utero non gereret; quando verò conceperat, nihil sensit. Imprimis quando mulieres dolore in occipite laborant, Practici dicunt, laborare uterum: siquidem cum utero membranoso, ejusque partibus ipsi connexis, universum systema nervosum & membranosum consentit, id quod patet in nixu parturientium, in quo sæpe convulsio epileptica supervenit; ita etiam ex vitio uteri partiumque vicinarum quocunque sensiles cerebri membranæ graviter affici per consensum, & hinc dolere possunt. Sunt enim membranæ quæcunque totius corporis continuatæ & connexæ membranæ, cerebrum involventibus, adeoque faciliè pars una alteram per consensum ex spasmò afficere potest: vid. D. Croon, *de Motu musculorum, in Willisii Tr. de Nervis adjunctus.*

Ex omni cephalgia per consensum frequentissima est ista, quæ fit ex stomacho, cujus hinc inde varix prostant observationes: Vid. Forestus *lib. 9. obs. 44. 45. & 46.* Willisius *l. 4. cap. 2. pag. 303. & 305.* & Lotichius *in observat.* Sic dolorem immanem capitis à phlegmate acido in stomacho cum vomitu conjunctum observat Thonerus *in observat. pag. 141.* In specie in iis, qui laborant *Βραδυψία* stomachi, item in hypochondriacis & similibus, frequentissimi sunt capitis dolores & tensiones circa frontem per consensum



stomachi, imprimis mucilagine acida in farcti, & partium vicinarum membranacearum; percipiunt enim semper simul tensionem circa hypochondria. Cephalalgia hujus exempla videb. apud Forestum *Observ.* 48. & 49. ac Riverium *Cent.* 1. *Observat.* 11. Interdum philtre inepta cephalalgias crudeles inferunt: Duo exempla hujus rei refert Lotichius in *Observat.* pag. 152. & 154. Porro hemicraniz per consensum causa subinde est dens cariosus. Conf. Thyrmayer *Consil.* lib. 2. pag. 128. & Hildanus *Cent.* 2. *Observat.* 10. Estque omnino dolor per consensum saltem sensitivus, & hinc punctorius ac pulsatorius. Porro renes affecti, imprimis calculo obsessi, per consensum cephalalgiam inferunt: Imprimis in Bartholini *Cent.* 4. *Epist.* 6. curiosa est observatio hemicraniz istius lateris, cujus lateris ren calculo erat obsessus: sic ex dolore nephritico similes cephalalgias observavit Forestus *lib.* 9. *observ.* 51. in *schol.*

Cephalalgiam verò per essentiam quod attingit; fit, quando malum & radix doloris ipsum caput occupat, qualis est v.g. in clavo & ovo. Talis dolor est frequentissimus in hemicrania, non tamen semper, ubi sæpius adest stagnatio sanguinis, ejus impeditus motus in uno alterove vasorum ramulo alterius medietatis.

Ratione causarum est vel accidentalis, vel habitualis: Accidentalisis est, quando sine procatarxi aut dispositione prævia à causa evidente solitaria originem ducit, rerum scilicet non naturalium malo regimine, & fortuitarum incongrua invasione, v. g. à crapula, insolatione, exercitio vehementiore, contusione, Mercurii intra cranii laminas, vel à medicamentis Mercurialibus salivantibus, vel à fumis Mercurialibus collectione: Habitualis verò, quando causa certa morbifica disposita hæret in cerebro ejusque partibus, propter quam vel continuo affligit, vel per vices, & à levissima occasione redit ille dolor: v. g. caput vulnere vel contusione graviori læsum per essentiam quidem, sed tamen sine causæ internæ fomite, dat dolorem seu hemicraniā accidentalem: Quod si verò post vulnus curatum remaneat, vel atoniā partis læsæ, vel ex nutritione deficiente, subinde recrementa quædam generentur, quibus occasionibus, aut sub omni mutatione tempestatis anni aut lunæ, sæpius redeat cephalalgia gravis, talis per essentiam, & quidem habitualis, erit: Sic Forestus *lib.* 9. *observ.* 34. Observat cephalalgiam post curatum vulnus diuturnam, aperta cute cranii inventum fuit os corruptum, quò exempto, dolor curatus fuit.

Utraque hæc cephalalgia per essentiam oritur frequenter tam à causa externa seu evidente, quam interna & latente: Prioris generis res infinitæ possunt dici, scilicet contusiones &

vulnera, æris inclementia varia, crapula, motus corporis, curæ, studia, elus castanearum, glandes quercuum, lactis potus, coriandri assumptio: Posterior verò seu interna causa habitualis cephalalgia magis propria, triplicem fontem agnoscit: Est (1.) vel à sanguine ejusque motu in vasculis cerebri plus minus vitio: vel (2.) à lymphæ glandulis cephalicis vitio: sive secreta aut malè distributa: vel (3.) à digestionis privatæ in cerebro ejusque membranis internis & externis errore & vitio, unde generantur heterogenea recrementa, quæ cephalalgiam inferunt: Quò in specie viscidior mucus, vermes, lapilli, abscessus, calculi, &c. in cerebro geniti pertinent: vid. Willis *Anim. Brutor.* Part. 2. Cap. 1. Ac sanè in habitualibus hujusmodi cephalalgias semper fere observatur simul partis affectæ debilis constitutio, & hinc facilius materiæ morbificæ occasionalis vel receptio vel regeneratio.

Quoad I. à sanguinis vitio, ejusque motu depravato, in specie dolor capitis sensitivus pulsatorius cum insigni capitis incalescentia & distensionis sensu excitari solet. Fieri hic solet, dum sanguis aut nimis abundans, vel verè vel apparenter in turgescencia quadam præternaturali, nempe febrili, quacunque occasione agitatus, aut à suppressione solennis evacuationis coacervatus, vascula meningum harumque fibras præter modum distendit in suo motu remoratur, & ita cephalalgiam ex hac causa satis frequentem infert. Iste dolor capitis speciatim, qui ex turgescencia & aucta sanguinis effervescencia oritur, semper conjunctus esse solet cum sensu pulsationis in capite tensivo, plus minus gravativo: & prout aut intensior aut remissior fuerit ista sanguinis turgescencia, etiam major vel minor percipitur cephalalgia. Hinc est, quod tempore æstivo in nimis æstibus canicularibus, aut diuturniore sub sole mora, aut exercitio quovis corporis nimio, & ex motu sanguinis rapidiore, ejusque effervescencia nimia, sudoribus, &c. præprimis quando his frigus repentinum superveniat, excitari soleant graviores cephalalgia: Hinc est, quod post crapulam ex nimio vini & cerevisiæ potu, præter cruditates relictas, turgidus sanguis postero die cephalalgiam inferat, cum artuum ferè lassitudine, nisi blando sudore partim præveniat, partim curetur: Hinc est, quod refrigeratio capitis, sicque impedita sanguinis transpiratio, cephalalgiam inferat, dum retenta effluvia transpirabilia vasa distendendo & sanguini certam turgescenciam plus minus inferendo, cephalalgiam excitet: ut taceam ipsa transpiranda salina, partibusque membranis infixæ, dolores inferre. Pariter sanguinis quælibet suppressæ consuetæ evacuationes ad cephalalgiam disponunt: Hinc hæc morrhagiæ narium suppressæ consumacissimas

simas habituales cephalalgias inferunt: Hinc est, quod hæmorrhoidibus, mensibus obstructis, solenni quadam sanguinis evacuatione intermissa, sæpius contumacissimæ oriuntur cephalalgia, observantibus hoc omnibus Practicis, in specie Foresto: aut quod quibusdam mulieribus non rarò uno alterovè die ante mensium eruptionem cephalalgia sint frequentes propter sanguinis turgescentiã tunc obvenientem. Speciatim febres quæcunque, tam continuæ quàm intermittentes, benignæ pariter & malignæ, item febres castrenses, ordinarium comitem cephalalgiam ducere solent, uti quotidie experimur; ex turgescentiã nempe & fermentatione sanguinis aucta. Huc pertinet phrenitis seu sphacelus cerebri, in quo ob factam inflammationem membranarum cerebri & corticis ejusdem intolerabilis est dolor. Facere huc videntur odores fortiores, cephalalgiam non rarò inferentes: Sic curiosum est exemplum, quod ex odore moschi & ambra in viro dolor capitis ortus fuerit; Pariter non rarum est, rosarum odore iis, qui tenuioris sunt in systemate nervoso texturæ, cephalalgiam inferri, quasi particulæ hujusmodi odoriferæ acrimoniã suã vellicent membranam narium superiorem, & ad hanc derivata à dura matre filamenta nervea, quibus unà vellicatis & dura mater simul tendi, hinc sanguinis circulus quasi remorari, & dolor hic pulsatorius & tensivus capitis supervenire solet. Quò etiam gas carbonum incensorum, item rerum fermentescentium, pertinet, suo inspiratu pertinaces cephalalgias interdum inducens.

Quoad II. porrò ad procatarxin ejusmodi spectat, causaque conjuncta evadit serum, item lymphæ, quæ aut vitiata aut stagnans in quodam capitis loco, aut, quod sæpius fit, ex lymphæ vitio genitus humor acidus plus minus viscidus, & in quodam interno capitis loco coacervatus, aut ex nutritione membranarum vitiosa collectus, aut ex quacunque ratione in capite depositus, graves cephalalgias & hemicranias infert, cum dolore lacerante & lancinante, interdum etiam capitis gravativo, subinde tensivo, vitio lymphæ circa glandulas collectæ excernendæ, adjuncto plus minus sensu torpore. Curiosa est observatio hemicrania ex his causata, per stillicidium aquæ frigidissimæ per nares curatæ: vid. *M.A.N.C. Ann. 3. Obs. 184. pag. 455*. Hinc in affectibus catarrhalibus frequentes sunt cephalalgia, hinc senibus frequentes & diuturni exinde oriuntur dolores. Quin etiam contumacissimæ & vix tolerabiles cephalalgia (scorbuticæ subinde periodicæ, speciatim nocturnæ ex lymphæ vitio oriri videntur, quatenus à sale acris scorbutico membranæ cerebri, tam internæ quàm externæ, vellicatæ dolores

Tom. II.

lancinantes & lacerantes crudelissimi excitantur. Imò serum sæpius causam conjunctam cephalalgia existere, non saltè ex observationibus anatomicis, quas collegit Pilo & Riverius, aliique, confirmare licet, quibus cephalæ sæpè pertinaces per excretionem feri diversi generis è naribus solutas, ac lympham copiosam in cerebro post cephalalgiam repletam fuisse constat; sed vel coryza incipiens, aut dolor ex sero quidem & lymphæ successiva collectione gravativus, sed simul interdum quoque tensivus, præcedens testatur: Sic cephalalgiam lethalem à copia humoris serosi notat Riverius *Cent. I. Observ. 37*. Nec, juxta Willisium, improbable est, chylum, utut legitime constitutum, in capite prædisposito idè præstare, fibrasq; ac membranas suo appullu gravare, cum non saltem hujus doloris paroxysmi post totidem à pastu horas repetant, sed mutata quoque victus ratione quoad quantitatem, qualitatem & assumendi tempora, varient.

Tandem III. propriæ digestionis privatæ errore quocunque occasione interna vel externa vitiata & circa membranosa capitis loca congesta, aut retenta aut genita, subinde oriuntur capitis dolores, iique ut plurimum diuturni, difficulter curabiles, unde in cephalæis, in hemicraniis, clavo etiam & ovo, ex hoc puncto causæ perscrutandæ sunt. Unde dolor nunc quasi ostocopus, ut plurimum simul rodens & pungens, observari solet, dum materia quædam viscida plus minus acris, vulgò dicta tartarea, aut sanguis congrumatus, sub cranio quovis in loco congestus, istos dolores inferunt. Hæc materia si in altera medietate in capite hæreat, ut sanguinis motum aliquantisper impediat, infert hemicraniam: Unde subinde senes decrepiti contumacissimis cephalæis sunt obnoxii, & vulgò vocantur cephalalgia & cephalæ à causa frigida, & in tali conjuncta est gravedo capitis seu dolor capitis gravativus: imò caput minus calet, quin potius friget, dolor est contumax, & quægros nocte dieque affligit. Hinc subinde graves cephalalgia sunt è vermibus in cerebro ex vitiata ejus partium digestionem genitis: qualis dolor gravissimus & ferè intolerabilis subinde occurrit in febre Ungarica, quæ ipsa propter capitis dolorem istum quibusdam *der Hirn-Wurm* dicitur, cum observatum sit, non rarò vermes rejectos per nares fuisse cum levamine: vid. Schenckius in *Observ. de Febre Ungarica*, & Rulandus *Tract. de Morbo Castrensi*; item Hildesheim in *suo Spicil. p. 41*. Bartholinus *Cent. 2. Epist. 74. & Cent. I. observ. 64*. ubi pariter post variolas vehementissimus capitis dolor à verme in cerebello fuit excitatus; item *Cent. 6. observ. 3*. Similia exempla contumacissimarum

(D d d d d 2)

cepha-



cephalalgiam reperietis in Schenckio *observ. de Cephalalgia*: Non secus ac Forestus *lib. 7. obs. 9. & lib. 21. observ. 28.* notat cephalalgiam admodum intensam, postmodum excreto verme per nares sublatam. Plura vermium post cephalalgias è naribus excretorum exempla habentur in Misc. A. N. C. *Ann. 1. observ. 99. pag. 229. & Ann. 2. observ. 174.* apud Schneiderum *de Off. cribrif. pag. 440.* Fehr in *Hiera Picra pag. 79.* Blegny *Zodiaco Gall. Mens. April. observ. 3.* Kerkringium *obs. Anat. 43.* Tulpium *lib. 4. cap. 11. pag. 251.* Borellum *Cent. 3. Hist. 45.* Hollerium *lib. 1. de Morb. Intern. cap. 54. in Schol.* Hildanum *Cent. 1. observ. 8. & Cent. 5. observ. 1.* Monardum *Hist. Med. simpl. cap. 14.* Marcellum Donatum *lib. 4. de Hist. Med. Mir. cap. 26.* Alsarium à Cruce *de Quasit. per Epist. Cent. 3.* Ebusina *lib. 3. fen. 1. tr. 2. cap. 3.* ex Medicorum quorundam Indorum fide, cephalalgiam quandoque generari jam edocuit à vermibus in capite generatis, motu suo, tensione & latione ludentibus, addens: *Nam vermes multoties nascuntur in anteriore capite & super locum, qui est in structura narium, &c.*

Post vermes subinde etiam calculi in cerebro geniti pertinaces dolores inferunt, qui per nares & alia loca postmodum excreti, cephalalgiae levamen intulerunt; Exempla videb. in Schenckio *in observ.* & etiam Bartholino *Cent. 1. observ. 33.*

Fit interdum, ut humor quidam lentus & viscidus & pius ex vitio digestionis propriae genitus se insinuet intra suturas cranii, quas sensim à se invicem separare, & mutuo discedere facit, cum intensissimo dolore, ut sensim spatium inter commissuram futuræ possit percipi. Exempla de hac futurarum cranii discessione videb. in Bootii *Tract. de affectib. omiff. cap. 4.* Exempla etiam nonnulla refert Hildanus *in suis observ. Cent. 2. obs. 8.* Bartholinus *Cent. 2. Epist. 74.* Schenckius *in obs.* Mindererus *in Med. Militar. pag. 327.* Aliquando B. Doctot Michaëlis in Principissa vidua Iienacensi observavit talem acerbum capitis dolorem, in quo manifestè cranii futuræ à se invicem discesserant, idque manifesto cum sonitu, *Es hat geknackt* / ut adstantes percipere potuerint, quem tamen feliciter curavit: & tales dolores sunt pertinacissimi & intensissimi.

Porro lues Venerea capitis dolores horrendos & implacabiles, in specie nocturno tempore affligentes, infert: Acor enim malignus luis Venereæ alimentum cranii proximè chylolum ita corrumpit, ut assimilari nequeat, sed in materiam viscidam & acidam corrosivam sensim degeneret, quæ coacervata super cranium, aut etiam sub cranio, tumores illos infert, qui etiam in aliis ossibus reperiuntur, & gumata Gallica vocantur: à quibus uti postmodum corroduntur ipsa ossa, & per conse-

quens ipsum cranium, unde caries cranii, cujus exemplum funestum habet Meara *in Hist. Med. pag. 136.* ubi habet cephalalgiam cum totius crani carie à lue Venerea, & Schenckius *in obs. pag. 51.* qui ex cranii carie interna similiter implacabilem capitis dolorem notat; ita ab eisdem vicinæ membranæ corrosæ pertinaces & implacabiles dolores inferunt. Sed tamen non tantum in ipsa lue Venerea fit dolor, quin & subinde post curam luis Venereæ, post inundiones Mercuriales minus ritè institutas, ex Mercurii virulentia pertinacissimi capitis dolores remanere solent, ex Mercurio scilicet, nervis membranosisque partibus inimicissimo, hinc inde in capite collecto: de quo vid. Poterius *Cent. 3. Cur. 6.* Riverius *Cent. 2. observ. 91.* item *in obs. communis.* Zwinger. *in Theatro Vita Hum. Tom. 1. fol. 20.* ex Cardano *de subtilis.*

Interdum abicellus interiores capitis partes occupant, qui ipsi contumacissimas cephalalgias inferunt, & abicellus hypocranii dicuntur. De his non paucæ prostant observationes cephalalgiarum, per excretionem puris per os, nares, oculos, aures, &c. solutarum: vid. Borellus *Cent. 1. obs. 73.* & Willif. *de Anim. Brut. Part. 2. pag. 203.* Bootius *de Affect. omiff. cap. 1.* Bartholinus *Cent. II. Epist. 74.* Sic Schneider. *obs. 223.* refert cephalalgiam crudelissimam à pure intra ossa cranii latente. Abicellus hi non semper ex causa externa, sed frequentissimè vitio digestionis vitiatur oriuntur.

Juxta abicellum sub cranio locisque vicinis, subinde læsiones capitis externæ, contusiones, vulnera, casus, gestationes ponderis seu oneris gravioris in capite, & similes causæ, etiam curatur, diuturnas cepheas & hemicranias post se relinquunt, quatenus aut cranium ipsum insigniùs lædunt, aut pericranium, vel fibras futurarum duræ meningi continuatas, aut quatenus fissuram quandam in cranio inferunt, imprimis in interiori lamina. Unde humor seu succus nutritivus extra duplicem lamellam per istam fissuram pedetentim desillat in tunicas cerebri, ibique corruptus, hinc acrior factus, gravissimos capitis dolores infert; vel quando aliqualis sanguis grumofus circa membranas hæserit: Quò etiam pertinet notabilis observatio Schenckii *lib. 1. pag. 51.* ubi graviore pondere in caput suscepto & congestato, laminæ cranii internæ portiunculæ nonnihil diffractæ duodecennalem dolorem capitis crearunt, quibus per nares excretis dolor ille remisit.

Speciatim viscida, tenax & firmiter impacta est materia, quæ ovum & clavum primariò efficit, vel proprio partis dolentis vitio genita, vel cum sanguine eò delata, vel denique externæ læsionis occasione relicta. Eadem suspicio est, quoad hemicraniam, cum & ipsa sit satis contumax, & in qua subinde simul vitium



vitium in sanguinis motu, in uno alterove vasorum ramulo alterius saltem cerebri medietatis conjunctum videtur: Nam dum mater ipsumque cerebrum in duas dirimuntur partes, hinc altera tantum in Hemicrania affici solet. Unde senes decrepiti contumaci Cephalalgia sunt obnoxii propter successivam recrementorum vitiosorum intra cranium collectionem.

Observandum hic est, non rarum esse, Cephalas observare certas periodos, uti etiam Hemicranias, ita ut subinde lunæ periodos, subinde solis periodum diurnum, subinde similes motus, regulariter soleant observare: Conf. Schenckius *lib. 1. obs. pag. 47.* ubi prostat exemplum doloris capitis, qui cum sole oriente inchoabat, circa meridiem maximè intensus erat, quò magis verò sol inclinabat ad occasum, eò magis remittebat: In eodem Schenckio *pag. 48.* est Hemicrania, quæ certis lunæ periodis tantum ægros infestat: Sic notabile exemplum est Plateri *lib. 2. obs. p. 346.* de Hemicrania periodica, singula hyeme certis noctis horis recurrente, & miserabiliter torquente. Sic idem Platerus *loc. citat.* de Hemicrania forti & continua quindecim annos durante à partu naturali, quæ postmodum post quindecim annos per foetus masculi exclusionem statim sine ullo medicamento fuit curata. Huc pertinet exemplum Ballonii *supra citatum conf. 40. in schol.* de muliere, quæ cum Hemicrania conflictabatur, dum non esset gravida, quàm primùm autem concepit, omnis Hemicrania cessavit. Sic Fonseca *lib. 7. consil. 87.* observat Hemicraniam lateris dextri periodicam, quæ singulis octo diebus die Lunæ tantum in eadem hora repetit, & per triginta horas acerbissimè afflixit, postmodum verò sine ullo symptomate æger erat sanus, usque octo dies fuissent præterlapsi: Conf. etiam M. A. N. C. *Ann. 4. Append. pag. 32.* item *Ann. 6. obs. 173. pag. 236.* Et talia exempla fere ubique plura observata præstant.

### DIAGNOSIS.

Capitis dolor indicatur ab ægris, cum sint satis queruli de eo, saltem signa distinctiva, à Medico præprimis sunt observanda ratione causarum, quas omnes accuratè distinguere arduum est, subinde impossibile. Distinguitur autem: an sit per consensum? an per essentiam? Et quidem per consensum esse dolorem capitis, ferè ex eo cognoscitur, ubi nulla causa evidens, caput lædens, præcesserit, aut ubi nulla insignior & pertinacior functionum animalium læsio simul juncta fuerit, partes verò corporis inferiores aliquo modo laborent, ac pro hujus diversa ratione dolores capitis exacerbentur.

Dolor itidem subinde varius est, nunc intensior, nunc remissior: qui verò capite primariò affecto accidit, sæpissimè est continuus: signa adsunt massæ sanguineæ non legitime constitutæ, aut etiam adsunt signa vitiatæ functionis in quadam parte inferiori læsa, simulque prout pars talis plus minus affici sentiatur, etiam dolor capitis aut intenditur, aut remittit, & quæ sunt alia signa ex circumstantiis haurienda, ex quibus prudens Medicus hariolari potest, an per consensum fuerit cephalalgia? In specie stomachi habeat rationem, quamvis non rarò dolorem capitis per consensum & essentiam conjungi experientia testetur.

Quod si verò dolor sit per essentiam, patet, si præcesserit capitis & cerebri læsio quadam notabilis: item si dolor secundum siderum motus & phases, præprimis lunæ variet: vid. Fonseca, Platerus: Item si vitæ genus est tale, ut facilè noxam quandam cerebri possit inferre. Continuus magis dolor esse solet: aut si est interruptus, erit tamen periodicus, & stato tempore recurrens, qualis per consensum excitari nequit, præsertim si causæ antecedentes respondeant, adeoque radicem & diathesin altius fundatam hoc ipso insinuat.

Quæ verò præcisè sit causa hujus doloris per essentiam? difficilior cognoscitur: nam vermes calculi, &c. alicubi coacervati, ferè nulla sui præbent signa.

Abcessus quoque hypocranii & similes difficiles sunt cognitu, utut, quantum possibile, eorum indicia describat Bootius *loc. citat.* saltim ergò conjecturæ locum habent.

A sanguine si fuerit vitium, facilè cognoscitur, cum ut plurimum sanguis, vel turgescens, vel in motu suo per vasa plus minus impeditus, affectum induxerit, dolor pulsatorius ardori capitis conjunctus est: vid. Forestus *lib. 9. observ. 10. & 11.* Item levamina ex sanguinis missione rem manifestant, vid. Rhodius *Cens. 1. obs. 73.* ac Riverius *observ. communic. 37. pag. 273.*

Si à chylo, id cognoscitur, quod certis post partum horis paroxysmi repetant, post somnum evanescant, & pro assumptorum circumstantiis variant.

A lymphæ aut simili serosa materia, aut etiam à materia viscida aut acida collecta, fieri cephalalgiam, monstrat gravamen capitis, somnolentia, dolor gravativus magis ac tensivus, qui nocturno tempore solet affligere, cum glandularum interdum morbis circa caput, frigus, ætas senilis & similia, quæ persuadent à tali causa oriri Hemicraniam, imprimis ubi reliqua consenserint signa. Et si hæc acrimoniam foveat, v. gr. scorbuticam, scorbuti quoque, similiumque recre-

mentorū salinorū signa præstō sunt. Quæ ex lue Venerea malè curata, ex hujus signis, item quod nocturnus magis & in uno loco instar clavi affligat dolor; vid. Riverius *Centur. 2. observat. 91*. Si vitium fuerit ex vitata digestionē propria, unde coacervantur recrementa & humores viscidī intra calvariam, dolor fixus est & pertinax, crebrior, recidivans, nullisque remediis cedens, & si acrimoniæ materia hæc expers, gravativus magis, cum sensu frigoris in parte affecta.

### PROGNOSIS.

Prognosis Cephalalgiae curam promittit vel faciliorem, vel difficiliorem, vel nullam: quorum intuitu accidentalis facilius curatur, quàm habitualis.

Habitualis tamen quoque, prout cum procatarsi sua magis inveterata, ita ut ejus paroxysmi à multis annis aut sponte aut à levi quavis occasione repetant, eò minus spei curationis habet, præprimis si maximam partem dolor hic continuus fuerit, utpote quem à causa magis fixa, scilicet pituita viscidiorē, tumore, abscessu, calculo, vermibus, &c. prodire, probabile fit, & quia à tali causa dolor immanis est, ut plurimum alia symptomata cephalica graviora, scilicet vertiginem, convulsiones, &c. item vomitum sibi comites assumit, & cum his interficit, aut in apoplexiam, epilepsiam, paralyin, cæcitatem, surditatem, &c. degenerat; vid. Hippocrates *Sect. 1. Coac. Prænot. 6*. Riverius *Cent. 1. observat. 37*. Rhodius *Cent. 1. obs. 33*. Paw *obs. Anat. 8. M. A. N. C. Ann. 1. obs. 68*. Willisius *loc. cit. pag. 296. 301. & 302*. Bonetus *Sepulchret. lib. 2. sect. 1. observ. 1. & 2*. & Boerhaave *de Affect. omiff. cap. 1*.

Nihilominus & qui per consensum oritur, nunc facilioris, v. gr. culpa ventriculi, nunc difficilioris, v. g. ex affectibus uterinis, hypochondriaco malo, item à lue Venerea, &c. curationis observatur.

Pariter in morbis aliis dolor capitis malus interdum propheta existit, quatenus in vehementi capitis dolore cum febre acuta, si urinae conspiciantur crudæ, seu claræ & albæ, pessimum signum est, deliria, convulsiones, & tandem mortem portendens; item si aliquod lethaliū signorum supervenerit; vid. Hippocrates *Prognost. Text. 22. §. 22*.

Item dolor capitis fortis, imprimis in febribus & morbis acutis, subito desinens, non sequente aliqua evacuatione per crisin, est lethalis, quoniam subinde signum est gangrænæ cerebri, aut omnimodæ insensibilitatis membranarum cerebri.

Simili ratione dolores capitis soporosi & gravativi, aut cum convulsione, gravidis ut plurimum periculosi existunt: vid. Hippo-

crates *l. 1. Prædict. Text. 14. §. 2. & Sect. 3. Coac. Prænot. 105*.

Ubi frigent extrema in vehementiori dolore capitis, pessimum est signum; periculum enim inflammationis internæ denotat.

Si dolor capitis circa frontem & tempora sit continuus & admodum vehemens, cum febre acuta, apparente die quarto, signo pernitioso, septimò fere die mors ingruit.

Si dolori capitis superveniat manifesta quædam excretio, aut aquæ, aut sanguinis, aut puris, sive sit per os, sive per nares, sive per aures, signum est solutionis morbi secundum Hippocratem *aph. 11. sect. 6*.

Facit huc notabilis aphorismus Hippocratis *sect. 4. aphor. 32*. *Quibus nempe ex morbis partium inferiorum convalescentibus dolor capitis vehemens supervenerit, si non præcedat excretio manifesta, iis in cerebro futurus est abscessus, morbi materiā ab inferioribus ad superiora conversā.*

Quicumque in febre non lethali cum capitis dolore & obscuritate præ oculis conquerruntur de cardialgia seu de morfu & angustia præcordiorum, iis subinde vomitus biliosus salutaris supervenire solet, præsertim si rigor intra hypochondria supervenerit.

Quibus verò in ejusmodi febribus caput dolentibus visus hebetudo contingit, aut splendores circa oculos obversantur, aut præ cordiismo aliquid tenditur in hypochondrio dextro, aut sinistro, neque cum dolore neque cum inflammatione, iis sanguis ex naribus fluit.

Dolores chronici extra morbos acutos minus sunt periculosi, nisi quatenus nimia molestia aut continuis vigiliis ad affectus melancholicos disponere solent.

In gravidis dolores capitis soporosi cum gravitate quadam obvenientes, sunt mali.

### C U R A.

Propter insignem causarum cephalalgiae varietatem, ipsa etiam cura varianda est, adeo ut non ita commodè determinatis regulis illa ipsa circumscribi queat, sed

Observ. I. ante omnia: an per essentiam, an per consensum sit cephalalgia? Hæc, præmissis universalibus, in specie vomitorio & laxativis convenientibus, & sublato affectu primario, facile sistitur; illa verò difficulter, adeoque ipsi capitis affectui appropriata remedia simul in usum adhibenda. Ad summum dolor idiopathicus accidentalis phlebotomia, quiete, sudore, & levis opii usu, tollitur: vid. Forestus *lib. 9. observat. 1. 2. & 3*. In habituali verò per essentiam tam sanguinis & lymphæ, quàm capitis dispositio prava corrigatur. Posterius rarò perficere licet.

licet. Nihilominus quia causam accuratè dignoscere haud conceditur, æger prognostico vix omnimodè linquatur, & si aliud Medicus hoc in passu præstare nequeat, morbi fomitem præscindendo ac intercipiendo, crebriores paroxysmorum accessiones inhibeat, cum experientia testetur, hâc ratione cephalalgias contumacissimas non rarò curari, i. e. fibras indispositas spontè suâ ad pristinum tonum redire. Observetur tamen insimul hic cautela nonnullorum practico- rum: In dolore capitis diuturno plus præstare caput frequentius roborare, quam evacuationibus pertinaciter insistere.

II. Opiatis & narcoticis in genere ut omnis dolor, ita & cephalalgia, compescitur; unde etiam subinde intermiscenda veniunt. In his autem ad capitis dolorem sistendum usurpandis sumus cauti; metus enim est, ne post narcotica non possimus denuo expurgare ægrum, uti rectè hoc monet Celsus: sæpè quippe accidit, ut in gravioribus doloribus parva & ordinaria dosis opii, aliquoties licèt repetita, nihil adjuvet, unde postmodum usurpata fortiori dosi, si dolorem aliquando sedat, subito lethargicus ferè superveniat somnus, ita ut vix ac ne vix denuo possint excitari ægri: aut humorum motum sistendo cephalæas graviores tandem reddit: vid. Forestus *lib. 9. observ. 14. & 57.* Anodyna ergò, quin & narcotica, quando usurpanda, adhibeantur primùm in parva dosi & levi, & successivè fiat progressus ad fortio- rem & majorem dosin, idque saltem appropriatis additis. Quodsi externis in locis applicanda sint narcotica, fronti saltem & temporibus, nullo modo futuris, eadem imponenda esse, monent Practici, metu soporosi affectus: Nec instante crisi adhibenda, quia periculum est, ne motus naturæ impediatur, & æger tandem ita interimatur. Sanè opiata utut sistant dolorem, quia tamen causam seu fomitem relinquunt, & cum magis fixum reddunt, morbum magis in deterius labi faciunt, & propterea magis in dolore per consensum, minus in eo, qui fuerit per essentiam, locum inveniunt.

III. Semper in omni cephalalgia, nisi forsan febris malignæ periculosiori conjuncta sit, ut alvus sit laxior & aperta; hæc enim quò magis obstructa, eò magis capitis dolorem exasperat; aperta verò, si non verum, certe palliativum maximeque lenitivum inter alia remedium erit.

IV. Ex omnibus doloribus dolor capitis scorbuticus est contumacissimus, simulque atrocissimus, lancinans admodum, rodens & lacerans, nocturno præsertim tempore gravissimè affligit, nec facilè nisi appropriatis scorbuticis tollitur. Hinc internè sal volatile succini, spiritus vitrioli volatilis cum

(spiritu liliorum convallium, tartari, & cochleariæ mixtus, cinnabaris antimonii, succinum, ambra, pilulæ ex ladano Hartmanni in *Pr. pagin. 48.* descriptæ, decocta sudorifera præsertim ex ligno juniperino, cui rasura ligni buxi addita remedium magis reddit appropriatum, sunt usitata. Hinc lac, quod sicut alias per consensum dolorem capitis inferre solet, ita idem in doloribus scorbuticis optimum est remedium, demulcendo acrimoniam salis scorbutici. Externè vesicatoria prope aures applicata; item epithema cancrorum; flores papaveris rhæados recentes contusi & applicati, item zedoaria & baccae juniperi cum aqua vel decocto verbenæ, florum sambuci ac betonicæ conveniunt.

V. In genere in quocunque capitis dolore, præter ordinaria evacuantia, per vomitum imprimis, si per consensum ventriculi fuerit, vel per alvum, non omittendam esse diætam sudoriferam, quæ interdum, imprimis in malo contumaciore, valdè conducit. In specie in cephalæis antiquis, aut etiam in Hemicraniis inveteratis, necessum est interdum ad decocta sudorifera lignorum accedere, imprimis à colluvie serosa aut pituitosa, per essentiam si fuerit dolor excitatus; quæ ipsa decocta etiam talibus in casibus optimum solent habere successum. Attenuant enim, dissolvunt, & mediante sanguinis circulo remonent ex capite causam materialem viscidiorē ac fixiorem, idque magis, quando ex feri aut lymphæ vitiiis malum ortum fuerit: de quibus conf. Forestus *libr. 9. Observat. 50.* Amatus Lusitanus *Centur. 4. curat. 95.* sicuti Poterius *Centur. 3. cap. 6.* Dolorem capitis continuum ab hydrargyri usu concitatum decocto cephalico cum china & oleo sulphuris curavit. Modum præscribendi & usurpandi notum præsuppono ex materia Medica, vel Morrello. Loco istorum vel essentia lignorum, vel ligni sassafras, interdum usurpari possunt in majori dosi.

VI. Chirurgica præsidia, præsertim circa humorum motum corrigendum occupata, multi usus sunt in Cephalalgiis, qualia sunt venæsectio, arteriotomiæ temporum, & incisiones venæ frontis, &c. quin & vesicantia, setacea, imò ipsum trepanum ad pertinaces & graviores cephalæas sunt optima: Illa, ubi in vasis sanguiferis vitium hæserit; hæc, ubi ex feri vitio malum oriatur. Sed necesse est, ut prius ritè præmissa sint universalia, alias metuendum esset, ne, parilira tione atque cucurbitulæ, non præmissis universalibus, in capitis dolore sint valdè noxiæ, (vid. Hildanus *Centur. 5. observat. 69.*) aut alia præsidia chirurgica malum augeant.

In



In specie venæ-sectionem quod spectat: in gravioribus cephalalgis à sanguinis aut copia aut turgescencia, ut plurimum malum levat, illam imminuendo, hanc compefcendo, affluxum verò illius ad caput moderando. In paroxysmo vena cubiti dextri (ob rationem ab Highmore *Corp. Human. Disquisit. Part. 1. libr. 2. cap. 2.* adductam) derivationis ac interceptionis gratiâ, extra eandem & revulsionis causa in partibus inferioribus, v. gr. in talo, aut hæmorrhoidales in affluetis.

De Arteriotomia temporum imprimis noto, quod eadem subinde nobile præsidium sit in contumacioribus malis, speciatim in cephalæa & hemicrania desperata, mirabilem habeat successum, uti refert Lindanus, cuius usum ipsa monstravit natura, vid. *Miscell. A. N. C. Ann. 8. observat. 72. pag. 120.* contradicente quamvis Willisio *l. 4. Conf. Pareus libr. 16. cap. 4.* Zacutus Lusitanus *Pr. Admirand. libr. 1. observ. 11.* Riverius *Cent. 2. obs. 56.* Tulpius *lib. 1. observ. 48.* Schenckius *lib. 1. observat. pag. 51.* & Severinus *Chirurg. Efficac. Part. 2. pag. 41. & 47.* item Riverius *observat. communic. à Jacoz. pag. 318. & observat. 31. à Fomio Comm. pag. 339.* Et jam olim Gesnerus *lib. 3. Epist. 95.* dolorem hemicranii quotannis redeuntem sectâ arteriâ in tempore affecto curavit. Refert namque Lindanus, sibi satis usitatam esse arteriotomiam celebrare in hemicraniis inveteratis desperatis, emittendo interdum in latere affecto largiter  $\frac{3}{4}$  v, x, etiam xij. ad  $\frac{3}{4}$  xx. vel xxx. sanguinis. Operatio non est difficilis, nec periculosa, modò peritus & artificiosus sit Chirurgus: nec est metuendum aneurisma, tumor nempe arteriæ, & intra biduum vel triduum hæmatite potest sisti; nam si tantum terra vitrioli dulcis cum terra sigillata mista, vel solitaria, vel cum albumine ovi subacta, externè applicetur, superinjiciendo fortem ligaturam, intra triduum arteria coalescit: Vid. Jobus von Meckren.

Alias post arteriotomiam, seu loco arteriotomiæ, inciso venæ frontis in doloribus contumacibus capitis etiam commendatur: Exempla habet Forestus *lib. 9. observat. 11. in schol. & observat. 54.* ubi observat cephalæam antiquam & diuturnam per sectionem venæ in fronte aliis non juvantibus curatam: Sic *observat. 20.* dolorem capitis quotannis in autumno admodum affligentem notat curatum per sectam brachii venam, & detonsis capillis in fronte: Item *observat. 22. in scholio* vir quadraginta annorum, cum in occipitio diuturnum capitis dolorem habuisset, neque medicamenta juvarent, in fronte venæ sectione curatus fuit: Vid. Riverius *Pr. libr. 1. cap. 16 ubi de cephalalgia;* item *Cent. 2. observ. 21.* & Borellus.

Loco hujusmodi arteriotomiæ interdum possunt adhiberi hirudines utrinque ad tempora, quarum admotionem commendat Zacutus Lusitanus *loc. alleg. observat. 9.* item ponè aures, item ad nucham: Confer, in specie *M. A. N. C. Ann. 4. Append. pag. 51.* ubi hemicrania hirudinibus fronti applicatis fuit curata: & *Ann. 6. & 7. observat. 9. pagin. 20.* idem effectus ab iisdem, arteriis temporalibus applicatis, fuit secutus.

Item hujus loco pro scopo aversorio cucurbitulas scarificatas post venæ sectionem in brachio, aut prope scapulas, applicant alii, v. gr. Forestus; imò ipsi capiti, ut parti affectæ, vid. Velschius *Episagm. observ. 10.*

Aliàs refert Rhodius *in Cent. 1. observ. 76.* quod incisio venæ inter indicem & pollicem manus præsentaneum observatum fuerit hemicranie remedium. Quod confirmare potest sententiam Riverii, qui ad cephalalgias contumaces fonticulum inter indicem & pollicem manus excitatum commendat in sua Praxi. Siquidem aliàs in diuturnioribus capitis doloribus aut sæpius recidivantibus fonticuli aut in brachio, aut in nucha, aut juxta scapulas, aut ipso loco dolenti ac vertici excitati non contemnendum sunt remedium quos quidem damnat Willisius *loc. all.* quasi humores magis ad partem affectam traherentur: commendant tamen alii, & quidem per experientiam, scilicet Zacutus Lusitanus *Pr. Admir. libr. 1. observat. 12.* Forestus *lib. 9. obs. 12. schol.* Petrus Salius Diverfus *in Altomar. cap. 11.* Rodericus à Fonseca *Tom. 1. Conf. 63.* Tulpius *lib. 1. cap. 32.* Riverius *observ. 31. à Fomio commun. pag. 339.* Poterius *Cent. 3. obs. 8.* & Velschius *obs. 11.* sic enim, evacuatâ acrilympha, tandem capiti levamen affertur. Quin imò interdum vesicatoria nuchæ, vel circa aures, vel toti cranio instar cucuphæ sunt applicanda pro cura pertinacium talium cephalalgiarum à sero natarum, lacerantium aut lancinantium, speciatim nocturnarum: vid. Meara *in observat. Med. pag. 128.* Simile exemplum reperietis in Riverio *Centur. 1. observ. 37.* Sic Tulpius *Cent. 1. observ. 37.* Dolorem capitis periodicum per vesicatoria occipiti admodum curavit: Hildanus verò *Cent. 4. observ. 6.* dolorem capitis vagum extra cranium contumacem, & alteram tantum capitis partem occupantem, setaceo curavit. Cujus tardiosissimi auxilii loco fonticulus infra nucham excitandus venit: Vid. *M. A. N. C. Ann. 3. observ. 156.* Apud veteres subinde occurrit mentio Fonticuli in capite, in concursu futuræ coronalis & sagittalis facti, ad graviora capitis & nervosi generis pathemata usurpati, qui jam ferè in desuetudinem abiit, dum cauterio ad os cranii adactò facile hujus & membranarum cerebri inflammatio excitari possit: cuius tamen medio cephalalgia inveterata

inveterata scorbatica curata refertur in M. A. N. C. *Ann.* 3. *obs.* 81 *pag.* 138. Sic Poterius *c.* 3. *observ.* & *curat.* *cap.* 3. *p.* 210. Dolorem capitis periodicum in vertice præcisè, ad ciccris tantum quantitatem se extendentem, sine ullo signo sensibus obvio, post paucam materiam purulentam loco affecto per potentiale causticum aperto curavit.

Trepanum tandem quod attinet: Dolorem capitis huius medio curatum, videb. in Rhodio *Centur.* 1. *observ.* 69. & 70. In specie Amatus Lusitanus *Cent.* 1. *Curat.* 4. refert capitis dolorem intensissimum à lue Gallica jam curata ortum & incurabilem, sed trepano, aperto cranio, curatum. Vix tamen, nisi à læsione externa malum, aut suspicio de abscessu latente, admittendum, vid. Forestus *l. a. observ.* 31. in *schol.* Severinus de *efficac. Chirurg.* *pag.* 137. Willilius *loc. alleg.*

Sunt denique, qui in casibus desperatis extra luis Venereæ suspicionem salivationem commendant, & quidem omnibus probè ponderatis circumstantiis, si non semper cum levamine, certè sine periculo, utut hoc Willilius *loc. alleg. pag.* 293. magnum admodum proclamer.

VII. Vomitoria in cephalalgia, quæ fit per consensum, esse tutiora; in ista verò, quæ est per essentiam, nonnisi cautissimè adhibeantur. Purgantia in hac conveniunt, quæ inter eminet colocynthis, radix jalappæ, scammonium, speciatim Mercurius dulcis ritè paratus: Conf. Velschius *Hecat.* 2. *pag.* 40. in cephalalgia per consensum stomachi aut uteri aliarumque partium abdominis pilulæ mastichinæ & de succino Cratonis sunt optimæ, v. g.

℞. *Pil. Mastichin.* ℥j.  
*Extr. Helleb. nigr.*  
*Castor.* aa. gr. v.  
*Trochisc. alhand.* gr. ij.

Cum f. q. *Elixyr. Propriet.* f. Pilulæ:

D. S.

### Hauptreinigende Pillen.

Poterius eleganter usurpat pilulas suas catholicas ad ℥j. quibus addit gr. jv. laudani opii; sic enim dolorem sedat & fomitem tollit: Id quod & nos facere possumus, præprimis si in alio doloris capitis pertinacioris casu Mercurius dulcis sit adhibendus: e. g.

℞. *Extr. panchym. Cr.* gr. xv.  
*Op. dulc.* ℥j.  
*Extr. troch. alhand.* gr. jss.  
c. f. q. *Ess. Croci* f. Pilulæ.

VIII. Ex Alterantibus, præter decocta lignorum supra laudata, quibus semper rosmarinus addendus est, conveniunt succinum & succinata quælibet. In specie ejus sal volatile, & cum eo paratus liquor cornu cervi: per Tom. II.

miscetur ☉ hoc volatile commodè cū cinabari, tam nativa, quàm artificiali antimonii, & cum hac parato cephalico specifico, aut cum Bezoardico Joviali aut lunari; aut etiam his additur aliquantulum de laudano opiato; item diaphoretica antimonialia, & salia volatilia urinosa jungenda, & imprimis camphora subinde permisceri potest, & sic fit pulvis compositus ad cephalalgiam. Est enim camphora mirabile remedium in cephalalgia à causa calida, si unum alterumve ejus granum internè usurpetur, aut externè spiritus vini camphoratus crocatus aut theriacalis crocatus, aut oleum camphoræ in epithematibus aut unctionibus applicetur, quod à Paracelso admodum commendatur. His etiam tinctura vel essentia lunæ genuina meritò accenseri potest. Tandem spiritus vitrioli volatilis, vel per se, vel addito spiritu vini paratus, est egregius & in frequenti usu. Quibus simul annumeranda est herba Thee, ejusque decoctum, Mæbio, & Tulpiolib 4. *observ.* 60. ad dolores capitis quoscunque admodum commendatum.

IX. Quod aliàs attinet externa in genere contra cephalalgias usitata, celebris est insigniter verbenæ, live interno usu ejusdem aqua aut essentia usurpetur, sive externè ipsa plantata, tam recens contusa & in forma cataplasmatidis, quàm succus, ac linteis duplicatis, fronti & temporibus applicetur, sicuti etiam herba amuleti instar appensa pertinacissimum capitis dolorem sistit, de qua virtute contra cephalalgias amuletica singularissima vid. Forestus *lib. 9. observ.* 52. utut non æquè ubique succedat. Sunt tamen qui floribus papaveris rhæados non minorem, quàm modò laudatæ verbenæ, laudem contra cephalalgias tribuunt: Confer. M. A. N. C. *Ann.* 4. *Append.* *pag.* 33. & sanè aliquando cephalalgiam pertinacè nocturnā floribus papaveris rhæados leviter contulis fronti & temporibus applicatis curavi. Juxta verbenam est Betonica, anodyna & egregia.

℞. *Betoniam.*  
Coque in *Vino.*

Colatura apponatur capiti per noctem, in dolore capitis ex apostemate.

Vel ubi virtute anodyna, discussione & resolutione opus est:

℞. *Herb. beton.* M. ij.  
*Abfynth.* M. j.  
*Cubebæ.* 3ij.  
*Vini tbij.* vel q. s.  
Decoqu.

Colatura hauriatur, vel instar epithematis applicetur capiti.

Sedum majus, item Matricaria recens contusa, & fronti applicata, capitis dolorem sistit; radix Rhodia etiam non inelegans experimentum est Petri à Castro, qui pertinacissimo capitis

(L e e e e)

capitis dolore recipit radicē Rhodiam recentem, eamque cum lapideo pistillo contritam irrorat cum *¶ a verbenā & fl. sambuc. ana*, & cataplasmatibus instar fronti applicat. Integra etiam planta contusa sub forma cataplasmatibus fronti circumponitur.

Alii pulverem radicis zedoariæ recipiunt, & cū aquis appropriatis capiti applicant; v. g.

*℞. ¶ a Verben.  
fl. sambuc.  
beton. aa. ʒj.  
Pulv. zedoar. ʒʒ.  
M. D. S.*

### **Lindernder Umschlag umbs Haupt.**

Et ita applicetur capiti, tam fronti, quā nuchæ. Sed hoc saltem valet in cephalalgia ex causa frigida.

Hiscē addatur ejusdem Petri à Castro evaporiston, nempe cortex medianus trunci arboris juglandis, qui contusus, & cum pauco sale mistus, utrinque temporibus applicatus ad quoscunque capitis dolores ab eo fuit usurpatus. Pertinent huc in specie & ea, quæ aliquali vi narcoticâ plus minus pollent: qualia sunt semina papaveris, anethi, nuclei Persicorum, semen hyoscyami & similia; ex quibus fiunt emulsiones, quæ nunc intrinsecus propinatæ, aut, quod ferè frequentius, extrinsecus sub forma epithematis applicatæ, admodum conveniunt;

*℞. Nucl. persic. ʒʒ.  
sem. papav. alb. ʒij.*

Cum s. q. *¶ a Verben. beton. vel flor. nymph. & solani* f. Emulsio.

Epithematis formâ tepidè cum linteis duplicatis fronti & temporibus applicanda.

Possunt etiam tales emulsiones fieri recipiendo loco liquoris in dictis emulsionibus decoctum rad. Rhodiæ, vel verbenæ, vel betonice, vel similia; quibus cum decoctis ex istis seminibus emulsiones efficaciores componuntur. Imprimis semen hyoscyami potens est remedium pro placando dolore capitis, uti quocunque, ita in specie scorbutico: unde quidam ceu certissimum hoc laudant:

*℞. Sem. hyoscyam. ʒj.  
Acet. rosac. ʒv.*

M. in phiola benè obturata, & ponantur in digestionem MB. per 5. aut 6. horas, ita tamen, ut ne bulliat.

Postea accipe fasciam ex linteo subtilissimo, qualiget caput infirmi, atque cum spongia hoc aceto madida, humectetur fascia, sicque subito dolorem capitis tolli asserunt.

Tandem & litus seu inunctiones conveniunt, ubi eminet unguentum alabastrinum, in specie in cephalalgia quarumcunque febrium, à quamplurimis, præsertim Foresto in lib. 9. obs. 33. cui pro circumstantiarum ratione nunc oleum papaveris expressum, nunc oleum hyoscyami expressum, nunc unguentum popule-

um, nunc camphora, nunc aliquid de laudano opiato, nunc aliud simile, addi potest: e. g.

*℞. & i expr. sem. papav. ʒj.  
nucl. persic. ʒʒ. l. ʒij.  
hyoscyami  
destill. aneth. aa. ʒj.*

(vel & i destill. aneth. & chamom. à ʒʒ.)

c. l. q. olei nucisæ expr.

f. Linimentum, temporibus applicandum: Item, quod in familiari usu habuit D. Michaëlis:

*℞. Extr. f. succ. inspiss. Verben. ʒj.  
& i expr. hyoscyam. ʒʒ.  
M. & f. Linimentum.*

Inungetur caput & tempora in doloribus capitis, præprimis scorbuticis.

Sed hæc & similia narcotica externa, uti in genere dolores sistunt capitis, ita in specie non nisi urgente gravius dolore, locum habent, idque magis in accidentalibus quā habitualibus, tutius verò in doloribus per consensum, item qui comitantur morbos acutos, conducunt; sicuti dolores Chronici, aut cephalææ, aut clavi, minus hujusmodi curari, leviter saltem palliari solent. Potius in chronicis doloribus seu diuturnis egregia sunt emplastra appropriata, v. g. de tacamahaca cum balsamo Peruviano malaxata, & capiti raso in forma emplastri applicata, quod etiam convenit in doloribus scorbuticis. Loco balsami Peruviani substituat oleum destillatum succini, imprimis, qui affectibus cerebri & nervorum sunt obnoxii.

X. Cum verò pro varietate causarum & circumstantiarum subinde varianda sint remedia, propterea ad cephalalgiam, quæ oritur ex sanguine, ejusque motu effervescente aucto & febrili, convenit sanguinismissio variis modis adornanda, de qua supra Nota VI. dictum. Antequam tamen sanguis educatur, clystere alvus expurgetur, postmodum verò interna propinentur, quæ febriles paroxysmos aut sanguinis turgentiam solvunt, nempe diaphoretica blanda, acidum temperantia, exabsorbentibus, modiceque condensantibus: v. g. lapidibus cancerorum, unicornu fossili, terra sigillata, &c. Quibus alterationis gratia decocta & Julepi cum blandis acidis, de quibus in curatione febrium dictum, jungere convenit. Externè verò conducit succus sempervivi majoris aut portulacæ cum pauco aceto rosaceo (si enim multum aceti sumitur, facit ægros agrypnos) fronti ac temporibus, item testiculis, instar epithematis applicatur, sed calidè. Convenit etiam emulsio seminis papaveris albi, cui aliquantulum camphoræ additum fuerit. Vel epithema cephalicum Hartmanni cum camphora, quod habet in *Prax. Chymiatr. lib. 2. cap. 1. §. 18.* vel quod describit §. 7. Imprimis epithemata ex gammaris fluviatilibus contusis & applicatis, aut ex succo cancerorum fluviatilium expresso instar epithematis



matris usurpato, egregia & singularia sunt in cephalalgia febrili: quibus ipsis etiam sub contusione acetum rosaceum, aut aqua papaveris rhæados, spermatis ranarum, phlegma vitrioli, aut alix quædam aquæ appropriatæ, addi possunt: sicuti etiam unguentum populeum vel alabastrinum cum oleo papaveris expresso, vel anethi, non sine fructu illinitur: Quibus in declinatione addenda magis appropriata, v.g. radix & herba verbenæ, radix Rhodia, zedoariæ, item opiata: v.g.

℞. Ungu. alabastr. ℥iij.

℞i papav. expr. ℥℔.

hyosc. expr. ℥j. M. S.

Eusselich Haupt-Salblein.

℞. Succ. 69. fluv. rec. expr. ℥iij.

△a beton.

fl. chamom.

sambuc. ana ℥j.

pulv. zedoar. ℥ij. l. ℥℔.

M. f. Epithem. D. S.

Eusselicher Umschlag umbs Haupt.

Quodsi in febribus ob nimios dolores capitis metuantur deliria aut convulsionem, adeoque, ut alias dicunt, raptus materix ad caput fiat:

℞. Fol. ruta rec. M. ij. l. iij.

rad. raph. incis. Num. ij. l. iij.

℞is comm. M. j.

ferm. acerr. M. ij.

Acet. rutæ. q. s.

M. f. Pulmentum.

Quod applicetur plantis pedum, item capiti & repetatur, si exsiccatum fuerit. Revulsorium est remedium ratione irritationis, unde in comate vigili febrium egregium est. Conf. Barbette in *Observ. de Peste*.

XI. A feri vel copia vel acrimonia peccante si dolor urgeat, pro illius affluxu sedando in subjectis plethoricis convenit ante omnia venæ-sectio, quatenus valis exinanitis serum non adeo copiose transsudat, quoque ejus exstillavit, à venis facilius resorbetur. Extra quem tamen casum post clysteris injectionem, aut laxantis blandioris usum, vesicatoria cervici aut pone aures, imò in dolore atrociori toti capiti applicentur: vid. Riverius *Cent. 1. observ. 37.* Tulpius *lib. 1. cap. 13.* & Meara *Hist. pag. 128.* simulque per opiatum dolor mitigetur, usque dum hocali quantum sedatò reliquias serosas per potentiora purgantia, diaphoretica & diuretica, educere liceat. Pro recidiva verò evitanda foniculus in brachio aut crure excitetur, prout scilicet alix circumstantiæ hunc locum determinabunt. Purgationis scopo inserviunt hydragoga communiter dicta, in principio tamen mitiora, scilicet radix Jalappæ, scammonium, massa pilularum de succino Gra-

Tom. II.

tonis, luna hydragoga, &c. Pro diaphoresi verò atque diuresi lignorum decocta & essentia cum catarrhalibus & nervinis aromaticis & diureticis miscenda.

XII. Quod attinet dolorem capitis fixum & nimis contumacem, seu cephalalgiam, quam vocant à causa frigida, seu potius cephalzæ à materia viscida aut glutinosa ac acri hinc inde impacta, in specie in cephalalgia senum), præter sudorifera lignorum decocta, aut similia medicamenta sudorifera, confert imprimis balsamum & oleum destillatum succini vertici illitū. Item præ cæteris præstantissimum est emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio, capiti raso impositum, quod ratione Mercurii penetrat, & causam viscidam acidam corrigit, quò ipso desperatas cephalzæ curavit Platerus in *obs. pag. 371.* & Praxi usurpatur vel solitariè, vel malaxatū cum balsamo Peruviano, oleo irino, destillato succini, unguento alabastrino, &c. Item emplastri hujus p. i. potest addi emplastri de betonica & unguenti de alabaistro p. ℔; & sic horrendam cephalzæ Platerus *loc. cit.* mirabiliter curavit. Ipse aliquando in verula octogenaria, quæ jam ab aliquot annis continua & gravissima occipitis laboraverat cephalzæ, felici cum successu hoc emplastrum, malaxatum cum oleo succini, usurpavi. Convenit etiam in dissectione suturarum cranii, unde Principissæ Isenacensi dissectionem suturarum, aliis irritis, curavit D. Michaëlis mediante hoc emplastro, & clysmatibus domesticis, in quibus tamen præscripsit dissolvenda sequentia: Nempe

℞. Elect. hier. picr. c. agar. ℥iv.

de bacc. laur ℥ij.

pulv. rad. helleb. nigr. ℥℔.

fell. tauri insp. ℥iij. M.

Cujus uncias duas semper clysmati domestico addendas jussit; capiti verò ad imitationem Plateri hoc emplastrum applicari præcepit.

℞. Empl. de ran. Vigon. c. ℥io

Cerat. de beton. usit. ana ℥℔.

probregm. ℥℔. ad ℥vj.

Mista malaxanda c. Unguento alabastrino.

Quod ipsum modo dictum emplastrum, de ranis cum Mercurio, egregiè etiam convenit in doloribus capitis nocturnis contumacibus Gallicis seu Venereis, hujusque mali reliquiis: vid. Bartholin. *Cent. 3. Epist. 55.* Ita tamen, ut ex Sylvatici Consilio stillicidium quoque aquæ calentis sulphureæ huic substitui queat: vid. Rhodius *Cent. 1. Observat. 75.* Non negligenda illa, quæ primario morbo appropriata deprehenduntur remedia, à qua etiam applicatione decente omnes cephalalgix per consensum exortæ tolluntur. Alias in hac suturarum dissectione jubet Mindererus in *Medic. Milit. pag. 327.* præmissa forti capitis ligatura & postmodum derafis capillis, ceratum ex pelle arietina cum gummi elemi

(Ecc ec 2)

& pau-

& paucō cerato de betonica loco affecto applicare. Vid. quoque Bootius loco citato.

XIII. Aliās, ubi opus est discussione, & hujus medio doloris sedatione, item resolutione in cephalalgia ex causa frigida, speciatim externo frigore, optimè conducunt sacculi ex milio & fale communi, qui mirè commendantur à Lindano: nempe

℞. Milii leviter tosti p. jv.

℞is communis tosti part. j.

Ex quibus fiant sacculi, suffumigandi cum gummi animæ, & ita applicentur capiti.

Varia appropriata addi possunt pro varietate circumstantiarum, verb. gr. origanum, cum floribus chamomillæ, thymus, flores sambuci, verbenæ, betonica: vid. Forestus l. 4. observ. 21. in schol.

℞. Milii tosti M. ij.

℞is comm. tosti M. j.

Herb. beton.

fl. Chamomill. ana M℞.

pulv. rad. Rhod. ℞℞.

M. f. Sacculi interpassat.

calidè capiti applicandi, & ita gestandi;

D. S.

**Eusserliche Säcklein gegen den Schmerz.**

Conducunt potissimum senibus.

XIV. Quod si dolor capitis sit à causa externa, ex vulnere vel casu ab alto, aut ex contusione, hincque relicta debilitate, ibi optimè convenit Cerotum Alexandri Benedicti, mediante quo curavit senem, qui ex percussione trabis quindecim dies & noctes obmutuerat: Nempe

℞. G. hederæ ℞iij.

Resin. purgat. ℞℞.

Cera.

Terebinth. ana ℞iij.

Ol. rosac. ℞iij.

G. ammon. aceto sol. ℞ij.

Succicorymb. heder. ℞iv.

farin. fabar. q. s.

ex quibus omnibus tritis f. Emplastrum.

Vid. de hoc etiam Henricus ab Heer in *Observ. obs. 21.* item Forestus lib. 9. obs. 35. in schol. & Valeriola lib. 5. observ. 9.

Aliās ad dolores ex percussione etiam unguentum alabastrinum proficuum observatum fuit. Convenit etiam sacculus Hartmanni & succino pulverisato, cum essentia piperis irrorato; aut racamahaca cum oleo succini in emplastrum redacta.

XV. Quod si cephalalgia sit à vermibus, horumque adsint suspiciones, sive in cerebro geniti fuerint, sive per loca externa ad cerebrū usque transierint, in tali casu gravis labor & Medico & ægro subest. Nemo ejus curandi methodum melius præscripsit, quàm Hildesheim in *Spicil. 1. de affect. cap. p. 45.* qui pertinacissimam à vermibus ita curavit: Habuit

curæ ægrum graviori cephalalgia correptum, in quo cūm, præmissis universalibus, & copiosis vermibus per alvum rejectis, nihilominus in gravis capitis dolore persisteret, ipse verò non vulgarem suspicionem haberet vermium in capite, propterea ante omnia syncipiti applicavit emplastrum:

℞. Pulv. aloës

lumbr. terr. ana ℞ij.

fell. tauri ℞j.

Ol. absynth.

Cera ana q. s.

M. in forma Emplastri.

Extendatur super alutam, & syncipiti applicetur

Hinc pro faciendo fumo pulverem ordinavit:

℞. Pulv. Centaur. min.

Marrub.

beton. ana ℞ij.

Zedoar. ℞℞.

rad. angel. ℞ij.

succini ℞j.

℞iicrudi ℞j.

Minii ℞iij.

Boli Arm. ℞j.

Aristol. rotund. ℞ij.

Absynth. ℞iij.

M. f. pulv. grossus pro fumo.

Cūm hoc emplastro usus esset, & fumum ter quaterque naribus & ore excipiendum admisisset, tandem tredecim oblongi vermes villosi seu lanuginosi vivi instar erucarum per fauces, nares & aures prodierunt, quos ipse digito apprehensos extraxit. Continnavit modò dicta, unde tantos dolores & cruciatus postea non sensit, quantos antea; sed tamen omnes nondum semotos dicebat ipse, cūm adhuc in syncipite laterent aliqui: unde post aliquot menses prodierunt adhuc duo, non tamen ita magni ac priores, & ita ægrum restituit. Quò etiam facit Zacutus Lusitanus *Prax. Admirand. lib. 1. obs. 7.* ubi potentiore sternutatorio ex pipere & castoreo vermem, cephalææ diuturnæ causam, rejectum testatur. Item hujus loci est fumus myrrhæ & spiritus vini, in quo nigellæ semen infusum, auribus immisus, quorum Schenckius *observ. pag. 176.* meminit; item Salmuth *Cens. 2. obs. 39.* qui suffitu amarorum & antimonii vermes per nares eductos refert. Sin oriantur à calculis, malum à priori non est curabile, nisi natura vias inveniat, & calculos foras protrudat.

XVI. Cephalalgia ab ebrietate & crapula, aliisque ventriculi cruditatibus, præmissio vomitorio, vel purgante, stomachicis atque nervinis sedatur: ex. gr.

℞. Pulv.

℞. Pulv. rad. asari  
crem. q̄i à ʒʒ.  
Gummi de Peru corr. gr. v.  
℞o destill. macis gutt. ij.

M. S.

### Haupt- und Magen-Pulver auff einmahl.

Inter stomachica convenit piper, vel integrum vel in partes divisum, deglutiendum, quia absumit cruditates in ventriculo; item mastix & hujus spiritus, essentia ligni aloës, spiritus vitrioli cephalicus, &c.

Hinc non adeò paradoxon videtur, quod Cardanus *Art. Parv.* refert, contumacem dolorem capitis cerato ventriculo imposito sedatum. Item quod Velschius *loc. all. observat.* 12. hemicraniam pane succo granatorum imbuto intra triduum solutam testatur: Vid. Forestus *libr. 9. observat.* 44. 45. & 46. Item caput leviter irrorandum, testes verò in aquam frigidam aceto mistam immergantur. Pari methodo tractandæ sunt cephalalgia ex liene, utero, scorbuto, &c. obortæ, morbi scilicet primarii, ante omnia semper rationem habendo.

XVII. Gravissima species cephalalgia est hemicrania, in qua præter arteriotomiam temporum, quam valdopere suadet Lindanus in *Colleg. Pract. super Hartmann. libr. 2. cap. 1. §. 17.* & aliis irritis aliquoties expertus est Pareus *libr. 6. cap. 4.* aut hirudinum applicationem ex Lindano & Riverio supra laudatam, aliaque universalia supra memorata, experimentum singulare est cataplasma factum ex radice cucumeris asinini seu sylvestris, aut bryoniae cum verbena & absinthio, quod applicandum est lateri dolenti; vel ex eadem radice additis emollientibus fiat cataplasma, in specie pro solvenda hemicrania per abscessum ac suppurationem, de quo vid. *curiosa observatio* Horstii *libr. 2. observ.* 10. Vel etiam fieri potest tale decoctum.

℞. Rad. cucum. asin. rec. ʒj.  
H. Absinth. M. B.  
fl. Violar. p. i.

Coqu. in ana Vini & ʒa.

& decoctum colatum subinde applicetur loco dolenti in hemicrania.

Nempe fit hoc ad imitationem Medici veteris Pauli, qui in hemicraniis recipiebat radicem cucumeris sylvestris viridem minutim concisam & absinthium: Hæc incoquebat Hydrolæo ad putrilaginem usque. Cum hydrolæo hoc calente mediocriter partem dolentem inungebat, hinc radicem & absinthium desuper applicabat. Loco hujus radice cucumeris sylvestris convenienter etiam radix bryoniae veræ recipi potest.

℞. Rad. bryon. ʒj.  
fol. absinth. M. ij.  
Coqu. in ʒ.

In decocto spongia nova subinde immergatur, & calidè locus dolens foveatur, idque aliquoties, inungendo postmodum unguentum alabastrinum.

Sanè Forestus *l. a. observat.* 13. Gabelchoverus, Fonseca, & plures alii Practici, multum commendant radicem cucumeris asinini ad hemicraniam. His quoque irritis, præprijis ubi pituita viscida, hinc frigoris sensus observatur, adhibentur oleum euphorbii seu costinum, item sequens inimentum, quod Forestus *libr. 9. Observat.* 7. & 58. in *schol.* describit:

℞. Euphorb. ʒj.  
ol. dulciss. lbj.

Dissolv. & ebulliant invicem.  
postmodum adde,

Cera ʒiij. F. unguentum.

Hoc ipso linimento dimidia frontis & temporis parti & musculis temporalibus commodè inungitur.

Alias euphorbium aceto dilutum applicant lateri dextro, dolente sinistro, aut contra; vid. etiam Binninger in *observationibus*.

XIIX. Denique in dolore capitis mulierum ex utero, seu dolore occipitis frigido, specificus est sacculus Hartmanni ex succino pulverisato, & spiritu vini, vel essentiâ piperis, cum spiritu vini extracta, irrorato, citato loco §. 19. Sicuti etiam emplastrum ex tacamahaca cum succino, & oleo succini malaxatum admodum convenit, rasis capillis loco dolenti applicatum; vid. Bartholinus *Centur.* 3. *Epist.* 14.

Hæc externa semper cum internis usurpentur, quia sola non sufficiunt.

## ARTICULUS VIII

De

*Doloribus Articulorum,*

Seu

*Arthritide.*

**D**olent præterea frequenter articulationes quælibet in affectu, arthritidis dicta in genere, quæ in specie, pro articulorum varietate, in pedibus podagra, in genibus gonagra, in manibus chiragra, in dentibus in Strobelbergero odontagra, in coxendicis articulis ischiadicus morbus seu dolor appellatur. Præter quas partes tamen & scapulas & vertebrae colli, & interdum sternum occupat: imò observavi in sene admodum podagrico & alteram nasi quasi medietatem fuisse affectam, arthritidis ferè per paroxysmos

(Eccc 3)

affli-



affligere solet, extra quos, nisi in inveterato malo, satis commodè habent ægri. Quoties imminet paroxysmus, alvus ferè segnior evadit, ægri molestiam quandam haud benè explicabilem circa præcordia sentiunt, consuetum excrementum intra pedum digitos non reperitur, & circa articulos tensio percipitur: Hinc supervenit dolor circa articulos, qui in incipiente podagra ut plurimum pollicem pedis majorem unius, hinc & alterius pedis, successivè occupat, hinc repetente aut procedente crebrius malo aliam etiam loca successivè, genua, hinc brachia, occupare solet: Dolor, quem percipiunt ægri, ferè triplex est, pungens, lacerans, & pulsans, plus minus tamen intensius: quibus interdum & ardens simul accedit, cum tumore simul erysipelaceo, in arthritide nempe sic dicta calida, quando acidum magis volatile & acre peccat, ruborque partis affectæ intensissimus & æstus accedunt: In qua etiam arthritide omnia symptomata sunt atrociora, sed simul paroxysmi sunt breviores, quàm in podagra dicta frigida, in qua acidum magis obtusum & viscidum, dolores remissiores, & tumor plus minus œdematosus, cum nullo vel levi saltem rubore, affligit, diutius tamen persistente paroxysmo, nec tam facilè evanescente tumore: Ægri ut plurimum anxii sunt circa præcordia in paroxysmo, præsertim in incremento ejus, minus in statu: Conqueruntur ægri de ardore seu æstu circa regionem stomachi, hinc frigida appetunt; item de gravissima siti & anxietatibus præcordiorum, stomachi monstrando regionem, quæ sunt eò graviore, quo minus potu se onerant: Appetitus penitus est prostratus, clysmata autem & blandè laxantia optimè anxietates has leniunt: Subinde accidit, ut cum crebrius repetito, sed inani vomendi conatu, affligat, sicque anxietates insigniter exacerbet: Imò observavi, quod cum lipothymiis gravibus, subinde repetentibus, paroxysmus in principio & incremento ægros, præsertim inveterato malo laborantes, vexaverit, quæ pathemata tamen in ejus statu, dum dolores & tumores increverunt; & plures partes occupatæ fuerunt, penitus remiserunt: Accedit ferè semper febris symptomatice continua, non adeò quidem acuta, minus tamen in principio paroxysmi affligens, mitius in statu, quam ad febrium catarrhalium naturam accedere asserit Sylvius *libr. 4.*

Hæc ipsa symptomata etiam in dolore ischiadico ferè occurrunt, ubi dolor & in articulo, ubi femoris caput inseritur coxendici, imprimis percipitur, etiam clunes seu nates hinc intra ossis sacri & lumborum regionem plus minus occupat; quin nervorum & membranarum connexarum & deorsum

protensarum ratione, inferiùs versus suram & pedem usque, & ad extremum malleolum tandem extenditur, nocteque ferè gravius affligit, & quia partes primariò dolentes in profundo, sub regimine copiosorum musculorum, delitescunt, ferè nulla extrinsecus mutatio facta conspicitur.

Sæpius equidem dolores alii istam superiorem cruris & coxarum regionem occupant, & subindè pertinaciter affligunt, non tamen præcisè dolorem ischiadicum constituunt: Confer. Sennertus *Tractat. de Arthrit. cap. 6. pagin. 45.* Quodsi crebrius redeant paroxysmi, ac pro more vehementius affligant, insigniter debilitantur articuli, ac motus eorum multum imminuitur, adeò ut tandem ad paralyticam quasi constitutionem redigantur, flaccescant simul, & in nutritione deficiant, subindè laxentur. Interdum circa articulos contrahuntur & rigida manent membra, aut saltem intra articulos contracturæ seu tophi & nodi colliguntur, qui motum articulorum impediunt.

Ischiadicus dolor speciatim ad claudicationem, nonnunquam coxæ luxationem, aliquando cruris atrophiam, disponit. Imò si inveteratum fuerit malum, præsertim si in paroxysmi declinatione sudores neglexerint ægri, pertinacia in articulis vestigia relinquit arthritidis, adeò ut levi occasione & vel fortiore saltem articuli motu & agitatione mox nonnihil recrudescat, aut saltem punitionibus supervenientibus se manifestet.

### PARS AFFECTA.

Pars affecta erit pars admodum sensibilis circa articulos saltem situata, adeoque nil aliud, quàm membranea ligamenta, ipsos articulos vincentia & colligantia. Quinimò his affectis ipsum periostium in locis ossium articulationi proximis pati simul, probabile videtur ex acerbitate lacerante doloris, in profundo imprimis siti & apparenter ossium capita immediatè afficientis. Sed quod articulos in specie afficiat, videtur esse ex synovia seu aqua glareali, quæ est ros dulcis chylusus, seu acido temperato turgidus, qui ceu nutrimentum ligamentorum & membranarum, ipsorumque forsan ossium, abundans intra articulos collectus pro motu facilitando, & instar axungie oblinens ossium articulationes: Hoc ceu appropriatum specifi arthriticorum acidi objectum inquinari imprimis solet, quò factò mox varia circa articulos pathemata superveniunt, dum partes vicinæ membranaceæ necessariò rodi incipiunt, hinc successivè synovia ista ab acido peccante instar albuminis ovi spissari, & tandem in cretaceam seu gypseam substantiam coagulari solet, ut patet ex tophorum seu nodorum

nodorum intra articulos collectione, qui incisionis viâ exempti calcem & gypseum topium omninò repræsentarunt, & effectum, non causam arthritidis, constituunt: quorum topiorum examen chymicum videb. in Kerkringii *Spicileg. observat.* 28. & M. A. N. C. *App. ad observ.* 65. pag. 395.

C A U S Æ.

Quoad causam efficientem: omnium optimè eadem in Tachenii *Morborum Principes* expressa & explicata videtur: Nempe acidum volatile spirituosum, sui tamen generis seu specifici saporis, spiritui influo maritatum, sinoviam imprimis & partes vicinas membranaceas inquinans & affligens, primarius tortor est. Prima hujus acidi spirituosii origo est ex primis viis, quam potius ex depravata digestionem prima cum Tachenio, quam ex pancreate aut glandulis cum Sylvio, derivare placet: adeoque non in pedum articulis ipsam podagram esse, rectè dicitur, sed ejus solum fructum, cujus radix habitat in stomachi fermento vitali, ita ut licet dolens pes abscinderetur, podagra proinde non sanaretur. Quodsi maturè non occurratur malo, acidum illud spirituosum furtivè & successivè acido stomachi fermentativo se associat, donec fermenti more pedetentim hoc superet, ita ut imposterum, nec naturali nec artificiali separationi obediat, adeoque inveteratum incurabile sit, ut eleganter loquitur Tachenius *cit. l. p.* 438. Hinc nempe

1. Hæreditaria observatur podagra, cum spiritu influo genitali odore acido podagrico communicato fœtui. Nobilem curavi juvenem, qui ab ineunte octavo ætatis anno sæpiùs podagra correptus fuerat, quod parens ejus & ipse insigniter podagricus in ipso paroxysmo eum genuerat.
2. Hinc etiam animi pathematibus gravioribus aut diuturnioribus curata observatur podagra, ut subitanea consternatione, aut ira insigni, aut mœnore diuturno, ut in divitibus vel pauperioribus factum: Conf. Bartholinus *Centur.* 6. *Histor.* 28. Lotichius *observat.* pagin. 489. Salmuth *Centur.* 1. *observat.* 48. Tachenius *Morbor. Princip.* pag. 356 quò etiam pertinet tortura ex Hildano *Centur.* 1. *observat.* 79. Nempe perturbatio animi & spirituum peculiaris motus ac alteratio extinxit fermentum podagricum, aut saltem plus minus alteravit illud, principaliter quidem in stomacho primariò, qui cum reliquis præsideat digestionibus, & has

exinde alterari necesse est: vid. Tachenius *cap.* 1. *pag.* 357. & 360. quantum nempe animi pathemata fermenti digestivi & hinc digestionis primæ negotium alterent; quò etiam confidentiam ægri erga Medicum vel remedia pertinere per se notum est.

3. Hinc ut plurimum etiam arthritici nephritici esse solent, eodem acido spirituosio utrobique autore.
4. Hinc Lacticinia modernorum methodo, sed continuato usu, ut invertantur quasi humores corporis, spiritus & fermentum digestivum, curant arthritidem.
5. Vini abusus volatilis acidi ratione spiritus imprimis afficiens, plures in hoc malum præcipitat. Observanda tamen differentia inter vina; dum ea, quæ plus de tartaro vel acido faciliè fermentante in nobis continent, nocentiora sunt. Quo alia vegetabilia plus minus tartarea pertinent, ut rectè asserit Glauberus. Ex spiritus vitrioli usu nimio Tachenius podagræ ortum notat, in *Hipp. Chim. Hinc*
6. Abstinencia vini contrà quosdam ab arthritide liberasse observata est: Videatur Sennertus *cit. loc. pagin.* 16. Sic Lotichius in *observat.* pagin. 488. refert, podagram ex abstinencia per integrum annum cessantem, sed hujus copiosâ ingurgitatione recidivantem.

Ex eo est, quod in arthritide producenda tria ista vulgò nota ceu causæ remotæ principaliores conspirare videntur, dum Bacchus, ceu pater vini, quo innuitur novicum acidum, ex nimio abusu à fermento stomachico minus debite superabile ac corrigibile; Venus ceu mater, quatenus repetito congressu post copiosos spiritus influos, chylo temperato alcalino prædives sub genitura forma succus nutritius excernitur, & hinc nervosum systema insigniter debilitatur; & ira, ceu obstetrix, commovendo contenta corporis & spiritus, & acidum volatile in nobis augendo, adeoque & spiritus influos asperiores reddendo, in producendo arthritidis fœtu occupata rectè dicuntur. Dictis ex causis & viri magis quàm fœminæ arthritidi obnoxii dicuntur, cum ex Hippocrate *Secl.* 6. *Apb.* 29. mulieres non laborent podagra, nisi menses deficient: utut hodie contrarium experiri liceat, cum secundum Senecam non natura, sed vita mulierum mutata sit.

Par ratio est eunuchorum, quos nec podagra laborare, nec calvos fieri olim Hippocrates

res pronunciavit; item puerorum, quos ante Veneris usum non laborare podagrâ asseruit. Quæ ita quidem sub prisca ævi innocentia & temperantia obtinuerunt; hodie verò ex parentum & avorum vitiis ipsa progenies adhuc vitiosior nata, & ulterius exorbitans, dictorum veritatem eludit: Non secus ac ciconia inter podagræ remedia relata, tamen & ipsa podagrica observata in Bartholini *Act. Hæfn. Vol. 4. pag. 154.*

Scorbutici quoque admodum obnoxii sunt podagræ, quæ subinde eos atrocius affligit. Curiosum est, quod contagiosa interdum observata fuerit à Bartholino *Hist. Med. idque mediantibus vestibus in M. A. N. C. Ann. 6. & 7. observat. 143. pag. 205. & Anno 9. & 10. observat. 44. pag. 118. & 119.*

Acido igitur arthetico spirituosissimo cum spiritibus quasi occasione insignius commoto, quod v. gr. in motu corporis aut animi, aëre frigido, humido, pororum aperturam debitam prohibendo, post effervescentiam in sanguine febrilem imprimis se insinuat sinovix, & hujus medio articulorum loca affligit, & cum hac ipsa simul aliqualem probabiliter effervescentiam facit, donec acido spirituosissimo maximam partem ab eadem intra articulos suscepto ulterius illa spirituum & humorum cesset agitatio, sed in articulis adhuc malum hæreat, non citius cessans, quam acido spirituosissimo saturato ab alcali, & in salsum volatile mutato; hinc dolore cessante, fibrarum contractura cessat, & pori aperti magis liberiores transpirationem permittunt, quo facto omnia reliqua symptomata absunt.

Sed observandum, crebrius vel recurrentes paroxysmos, vel diutius articulos affligentes, relinquere sui vestigia, hoc est, ultra partis dolentis debilitatem, ex spiritus infiti aliquali deficientia, obruti plus minus à spirituosissimo acido peregrino, & fibrarum nervearum relaxato tono, ipsis partibus membranis solidis antea dolentibus infixæ permanere de acido peccante occulta spicula, quavis & facili occasione ac motu in actum dolorosum excitabilia, & spirituum reliquorum hinc facta commotione paroxysmum novum provocantia. Nempe ex acido isto podagrico, imprimis in fermento digestivo stomachi commoto, & hinc totum corpus penetrante, anxia ista præcordiorum pathemata originem ducunt. Patet autem ex dictis, utut in quovis paroxysmo debilitentur plus minus articuli seu partes solidæ, fluidas tamen, tam humorosas, quam spirituosas, eo ipso quasi depurari: si quidem non tantum acidum illud spirituosissimum spiritibus satiatur, dum sinoviam inquinat, illorum spirituum consortium plus minus deserit, sed etiam subinde alia massæ sanguineæ hete-

rogenæ fermenta, febrili effervescentiâ secreta, nunc unâ circa loca dolentia colliguntur ex fibrarum partium dolentium contractura, nunc per sudorem excernuntur in declinatione; sicut in incremento hi ipsi moderatè proliciti maturant articulorum ab acido podagrico invasionem, & hinc abbreviant insigniter paroxysmi tempora.

Hæc ipsa etiam patefaciunt, quare tam varia & mirabilia pathemata subindè accidunt, acido podagrico alias partes, ac frequentissimè nervosos plexus, occupante extra articulos, quæ omnia superveniente paroxysmo cessant, vid. *Misc. A. N. C. Ann. 6. observat. 208. pagin. 307.* sic arthritidem in colicam, & contrâ, mutabilem refert à Castro, *Quæ ex quibus pag. 211.* epilepsiam gravem notat Lotichius: sicut paroxysmo non ritè procedente, nec acido volatili sufficienter excluso, vel ob internarum partium defectum spiritibus istis languentibus, & acido podagrico nimis in contentis corporis dominante, vel ob externorum ineptam applicationem, tam diuturna virium prostratio & languor & appetitus dejectus superant: Interdum palpitationes cordis, sæpius tussis sicca, aut sæpius adhuc asthmata occulta convulsiva, subinde ipsa mors, superveniunt.

Quoties arthritici, quibus plures articuli alias occupari solent, paroxysmo corripiuntur, qui non more consueto successivè articulationes istas quoque occupat (nisi per curam præservatoriam malum plus minus in radice mitigatum fuerit) ii vel diutius languidi permanent, vel brevi post novo paroxysmo corripiuntur, vel alius gravioris morbi, aut etiam mortis ipsius periculum subeunt. Id quod notavit etiam Sennertus *de Arthrit. cap. 4. §. 12.* ut & Hæferus *Herc. Med. pag. 222.* Hinc in podagricorum vel leviter confirmatorum & aliis morbis correptorum cura ad acidum podagricum simul respiciendum venit, quod in omnibus aliis morbis symptomata intendere, & morbum vel graviores aut contumaciorem reddere solet, idque tamdiu ferè, donec vel ipsum vi naturæ aut artis correctum fuerit, aut artus occuparit, quo facto omnia remissiora & leviora mox apparere solent.

#### PROGNOSIS.

Ex hætenus enarratis prognoseos maxima dependebit ratio. Nam arthritidis morbus lethalis non est: sæpe enim arthritici diu vivunt, senesque fiunt, unde quibusdam *ein gesunde Krankheit* dicitur, & potius ex podagra deficiente, quam eadem ordinariâ ratione superveniente, moriuntur.

Quoties alvus segnior est, & consuetum excrementum intra pedum digitos non reperi-



peritur, & crura intumescunt, paroxysmum instantem significari dicit Tachenius *Morb. Princ.* pag. 172.

Curatio ejus perquam difficilis est, tam in, quam extra paroxysmum, idque eo magis, quò magis inveterata fuerit: hinc quoniam sæpius in primis paroxysmis negligitur, facile successivè incurabilis evadit.

Rhumelius eleganter distinguit inter podagram hæreditariam, nodosam & solutam: & hanc curabilem, illam incurabilem ait. Sed tamen etiam soluta, nisi recens, subinde inter incurabiles refertur.

Inter omnes arthritidis species ischiadicus dolor gravissimus est: nihilominus tamen in principio facilius quam ceteri curari solet: sicut in progressu æquè rebellis esse solet.

In senibus arthritis incurabilis est.

Si articulos principio nervorum proximos afficit, & graviora symptomata conjuncta habet, difficilius curatur, & sæpè mortem portendit: vid. Sennertus *loc. cit.* p. 25. & Dravizius *de Scorbuto*, p. 22.

Si in arthritide contingat luxatio, difficulter sanatur, aut prorsus insanabilis est, membranæ & ligamenti nimis laxatis, repositum membrum membranæ & ligamenti non firmantibus. Ut taceam intra articulos ex synovia coagulata collectam materiam curam impedire: Hinc Hippocrates *sect. 6. aph. 59. Quibus diuturno coxendicium dolore infestatis coxa excidit, rursusque incidit, iis mucres superveniunt.*

Si dolores sensim ingravescentes ad jugulum & superiores partes transeunt, perniciem minantur: Item quo plura & frequentiora conveniunt symptomata, eo difficilius curatur, ut sit, quando ab externis repellentibus aut stupefacientibus ægri in anxietates, asthma, colicam, epilepsiam, convulsiones, palpitationem cordis, lipothymias, aut alia mala incidunt.

Dolor ischiadicus quidem acerbissimus est; in principio tamen sui interdum reliquis arthriticis doloribus facilius sanatur: sicut temporis progressu femoris luxationem, claudicationem, & atrophiam inducit; quod similiter in arthritide vaga attendendum: vid. Dravitzius *de Scorb.* p. 23.

Solvitur arthritis ferè quatuor modis:

1. Ordinariò fere in totum finito paroxysmo discutitur morbus in articulo, ut nullum sui relinquat vestigium, nisi successu temporis superveniant tophi.
2. Rarum est, quando tumor podagricus in materiam ichorosam aut saniem purulentam mutatur, quæ partibus intercutaneis erosio foras exsudat.
3. Quando tophi post paroxysmos relinquantur.

Tom. II.

4. Quando incipiens paroxysmus sua tempora non absolvit, aut planè deficit, acido podagrigo alias partes extra articulos occupante: id quod pessimum est, & mille mala post se trahit.

### C U R A.

Quoad curam, duo recipienda sunt tempora:

1. Tempus paroxysmi, ut curetur.
2. Tempus extra paroxysmum, ut præservetur.

Quoad paroxysmi tempus: cum in hoc imprimis motus naturæ vigeat, cujus impetu ille excitatur, unde ex deficiente naturæ robore deficientibus paroxysmis ægri in periculo sunt statu, ob id non sistendus, sed promovendus, impedimenta removendo acidæ speciei vim maturè infringendo, urgentia nimis symptomata mitigando, semper simul pro legitima remediorum administratione quatuor particularia morborum tempora attendendo: Adeoque

I. Ingruente podagra vomitus convenit, sed præmisso digestivo absorbente ex lapidibus cancerorum præparatis, osteocolla, & sale tartari. Nam acidum ejus oritur in stomacho, hinc imminente podagra appetitus, sine manifesta causa est prostratus, & sudores consueti aliàs spontè supprimuntur. De quo vomitus usu vid. Hildanus *Cent. 6. observ. 84.* Mercatus *de Morb. Intern. lib. 4. cap. 18* Riverius *Prax. lib. 16. cap. 1.* & Sylvius *in Prax. Tract. 8. §. 152. 154. & 156.* Sin minus vomitus institui queat, purgantia blanda, sed mistis acidum temperantibus, v. g. ossibus humanis præparatis, vel calcinatis, &c. in primo principio instituta, conducunt; aut si, præter clysmata, in cursu paroxysmi aliquid peragendum, infusum sennæ passulatum, aut pilulæ aloeticæ saltem, vel solæ, vel cum appropriatis propinentur, ad imitationem Tachenii *l. 4. p. 439.* Vel passulæ laxativæ, pruna laxativa: Vel

℞. Crem. ꝑi  
 Ss absinth.  
 Arcan. duplicat. 2a. gr. viij.  
 Diagryd. gr. iij.  
 M. f. pulvis: S.

Exterend Glieder-Pulver.

℞. Conf. rorismar.  
 salvia 2a. 3vj.  
 Pulv. antipodagr. purg. Parac. 3iß.  
 Mag. Ialapp. 3ß.  
 C. Syr. de spin. cerv. f. Electuarium.

D. S.

Exterende Glieder-Pattwerge auff etliche mahl.  
 (Fff ff) Aliàs

Aliàs purgantia quælibet viranda, urpote quæ in paroxysmo magis nocent, quàm profunt; æger enim, ut monet Hartmannus in *Prax. Chimiatri. cap. 32. §. 2.* in paroxysmo medicamentis purgantibus non defatigetur, sed afflictione liberetur. Sanè in arthritide, id quod peccat, purgando minus aufertur, sed contenta turbantur, ~irritantur, & malum exasperatur: Conf. Tachenius *l. a. pag. 149. & 151.* & Sennertus *Tr. de arthrit. Quæst. 11. pag. 104.* In statu tamen paroxysmi, ubi malum contumacius in articulis hæret, ac febris & alia symptomata planè intermiserint, purgatio blanda institui potest ad imitationem Riverii per Mercurium dulcem & scammonium datum; vel & dulcis misceatur cum aloë; vid. Velschius *Mistomim. 4. Cent. 1. annex. M. A. N. C. Anno 4. & 5.* Vel

℞. *MP. de trib. Ruffi.*  
*Extr. helleb. nigr. ā ʒß.*  
*Turb. mineral. cum ~u.*  
*Dis par. gr. j. ij. l. iij*  
*M. f. pilulæ, S.*

#### Purgierende Glieder-Pillen.

Laudatur etiam radix bryoniæ ad ʒß. in infuso, vel ejus syrupus ad ʒß.

II. Opiata sunt nunquam fere proficua, nec internè, nec externè; sic enim malum contumacius reddunt, utut dolores remittant, motumque naturæ impediunt, ut vocant: **Sie behalten das Podagra im Leibe.** Imò abusus opiatorum ad paralyin arthriticos disponit, vid. M. A. N. C. *Anno 4. & 5. Append. pag. 335.* Adeoque cautè usurpentur, nec, nisi præmissis universalibus, nec nisi adjunctis purgantibus, aut sudoriferis, aut specificis: vid. Hildanus *Cent. 6. Hist. 85.* Plateus *Prax. Tom. 2. cap. 17.* & Riverius *Prax. lib. 16. cap. 1.* Suspiciò tamen, commodè propinari posse eadem ingruente paroxysmo, præmissio vomitu cum specifico sudorifero. Quoad missionem cum purgantibus: illustrent hoc pilulæ antipodagricæ Rhumelii, quas vocat: Veni Amice, surge & ambula.

℞. *MP. aloëphang. ʒij.*  
*Laud. opiat. ʒß.*  
*M. f. Pilulæ.*  
*div. in 4. part. æqu.*

Quarum una pars in vino assumenda & tribus vel quatuor horis jejunium imperandum.

Conf. etiam quoad opiatorum usum Velschius *Hecat. 2. observ. 25.*

III. Venæ sectio in arthritide, qua tali, inutilis est; quin sine necessitate aut intempestivè adhibita potius multum nocet, vires debilitando, & naturæ motus ad articulos impediendo, ut observavit Beccherus *Phys. subterr. lib. 1. pag. 393.* Adeoque non nisi Plethoricis, aut quibus insigniter sanguis ebullit, id-

que saltem in principio, antequam plures articuli perfectè jam occupati sunt, eadem interdum locum habet: Vid. Crato apud Scholtz. *Conf. 239.* Mercatus *l. a.* Riverius *obs. 9. à Martino communic. pag. 195.* Sydenham *de podagr. pag. 35.* & Willit. *de Anim. Brat. lib. 2. cap. 14.* Loco venæ sectionis quidam in usu habent, ut sub incremento dolorû cucurbitulas scarificatas adhibeant, hinc loco scarificato sal commune probè tostum adspargunt, auxilio quidem doloroso, sed interdum proficuo. Probè tamen observandum, ubi affigantur cucurbitulæ, & incisiones fiant, ne tendines aut nervæ membranæ sub cute delitescentes periculosè lædantur: ac sanè in profundiore vulneratione aut apertura nos abstrahere debent ea, quæ habet Hæserus in *Herc. Med. lib. 4. cap. 1. pag. 220.* In dolore autè ischiadico in principio paroxysmi venæ sectio ut plurimum necessaria est, præsertim si dolor cum pulsatione est conjunctus: Vid. Poterius *Cent. 3. Cur. 94.* idque ferè in crure dolente, si fieri potest commodè ad derivandum, rarissimè in brachio ad revellendum, nec nisi in summe plethoricis, aut ubi aliæ circumstantiæ id urgeant. Et quidem si dolor in crure magis extrorsum vergat, secunda vena ad malleolum externum, ob usum insignem ischiadica dicta; si verò dolor magis introrsum vergat, vena saphæna aperienda. Quando autem venæ sectionem non instituere volumus, commodè ejus loco in lumbis potest scarificatio institui. Conferatur de venæ sectione & cucurbitularum & articulorum applicatione in malo ischiadico Sanctorius in *Meth. Vitandi Error. pag. 189.*

IV. Alvus ut plurimum segnior in paroxysmo esse solet, & qui purgantibus vix auscultat, hinc dolorem, febrem & anxietatem præcordiorum ferè intendit: adeoque clysmata emollientia & abstergentia sunt optima; vel usurpentur pilulæ aloëticæ saltem, vel alia blanda laxantia.

V. His ita pro circumstantiarum circumgrum ratione probè variè determinatis, in paroxysmo utramque faciunt paginam absorbentia, seu acidum invertentia, & blanda diuresi ac diaphoresi imprimis successivè ejicientia. Siquidem ex Cratone refert Sennertus: *quamprimum intus sudor detinetur aut inhibetur, maximè si consuetus foret, imminet paroxysmus podagricus*, adeoque ex opposito summe proficua erunt diaphoretica. Conveniunt autem tam fixa, si in primis viis adhuc persistat alteratio, in principio & incremento; quàm volatilia, si jam malum sit in articulis, præsertim in statu. Illa sunt partes animalium duræ, ossa microcosmi præparata, quæ commendat Tachenius *l. a.* salia fixa, antimonialia, antimonium diaphoreticum, bezoardicum solare, & cinna-

barina,

barina, &c. imprimis si cum sale volatili cornu cervi aut viperarum aut sanguinis humani acuentur.

Hæc verò sunt salia & spiritus urinosi volatiles, quos inter spiritus cornu cervi, cranii humani, spiritus tartari volatilis, spiritus carminativus, item spiritus salis Ammoniaci, proliciendo sudorem, præ ceteris primatum ducunt. Quin decocta lignorum temperatiora, in specie ex radice sarsæ-parillæ, chinæ, bardanæ majoris, aut ligno juniperino parata & subinde propinata, commodissima sunt: Sic Salmuth *Cent. 3. observ. 74.* refert podagram hæreditariam universalem, decocto lignorum curatam; item Riverius *Cent. 2. Observ. 50.* Dolores arthriticos contumaces per decoctum lignorum curatos refert. Et quidem, cum subinde apud nos radix podagræ sit à scorbutis, his commodè spiritus lumbricorum terrestrium per fermentationem paratus, item essentia contra arthritidem vagam, item spiritus cochleariæ, &c. istis diaphoreticis adduntur. Huc facit quoque trifolium aquaticum seu palustre, quod in cerevisia coctum & usurpatum mirè arthriticos juvat: M. A. N. C. *Ann. 4. observ. 123.* tam curandi quàm præservandi sine usurpatur: Sic Petrus Johannes Faber arthriticis antiscorbutica cum successu dedit, nempe succum cochleariæ & anagallidis aquaticæ cum spiritu vini tartarifato: Vid. Velschius *l. a. observ. 46.* De sudoriferorum usu conferatur Hildanus *Cent. 5. obs. 83. & Cent. 6. observ. 32.*

VI. Quoad topica seu externè applicanda, observandum:

1. Quod non debeant esse adstringentia austera, acida, aut cuti ejusque fibris molesta, quæ harum contracturâ & clausurâ malum potius exasperant, tumorem & igneum fervorem magis accendunt, repellentia ob id dicta; unde quælibet rejicienda.
2. Non nisi præmissis universalibus locum habent, adeoque non maturanda eorum admotio, cum vix præterquam in fine incrementi aut statu paroxysmi, articulo sint applicanda.
3. Sint talia, quæ & acidum blandè (hoc est, sine effervescentia excitata) corrigere, illud in falsum mutare, & hinc transpirabile reddere, ac simul dolorem suaviter lenire possunt; unde hic anodyna (narcotica enim quantum possibile fugienda, vid. Mercatus *l. a. & Sydenham pag. 114. & 118.*) ibi discutientia locum habent, utrobique alcalia temperata sunt optima.

Tom. II.

4. Habeatur simul eorum delectus debitus, considerando & cætera dolori adjuncta symptomata, ardorem, tumorem, ruborem, &c. utur, quoad externa talia, certi quid pro quovis subjecto universaliter determinari nequeat, quia uniuscujusque ferè ægri specialis idiosyncrasia multum variat, adeoque huic auxilium fertur à remedio, à quo alius detrimentum capit.

Ex innumeris pauca annotasse sufficiant: Nempe in podagra calida aqua spermatis ranarum legitimè destillata calida, vel spermaranarum per transcolationem depuratum cum aliquot granis camphoræ, vel paucospiritu salis Ammoniaci simplicis mistum, & in statu applicatum: vid. Tachenius in *Hipp. Chim. cap. 19. pag. 148. Ejusdem Clave pag. 204. & Princ. Morb. pag. 193.* ubi modus procedendi & cautelæ habentur; item Spiritus cancerorum fluviatilium non adeò exactè rectificatus, aqua articularis ad extra, magnanimitatis, spiritus lumbricorum terrestrium, formicarum, vel per se vel cum spiritu lumbricorum mistus, spiritus vini crocatus & camphoratus, præprimis à roremarino rectificatus, item spiritus vini camphoratus cum saccharo saturni, spiritus theriacalis camphoratus, urinæ, salis Ammoniaci cum spiritu vini mistus, aut mixturæ, ex calce viva & sale Ammoniaco affundatur spiritus vini, & huic destillato addatur camphora; sic optimum habebitur specificum in inflammationibus podagræ. Hæc acidum podagricum dolorosum & ardores potenter extinguunt, & sic arthritidem cum inflammatione junctam tollunt: e. g.

℞. ∇a articul. ad extr. 3vj.

~ Θ\*ci 3ij.

M. S.

Eusserlich Glieder-Wasser.

Applicetur, præmisso fotu auß der Berber-Lauge. Vel

℞. ∇a artic. ad extra 3ij.

~ lumbric. 3j.

Θ\*ci 3ij.

M. D. S.

Eusserlicher Spiritus.

Elegans existimo remedium, quod commendat Lindanus:

℞. Fl. Sambuc. contus. q. v.

Injice ollæ recenti, donec exactè plena sit: hanc benè clausam sub terra defode, donec flores in liquorem abierint: sed necesse est, stent per aliquot tempus, donec flores putruerint.

Hunc liquorem calidè cum linteo applica, egre-

(Fff ff a)

ca, egre-



ca, egregiè compescit dolores. Egregium etiam in erysipelate dicitur remedium.

Alii recipiunt flores verbasci, iisque ampullam vitream replent, & orificio obturato soli exponunt; sic enim in liquorem diffiunt, qui cum linteo parti affectæ impositus, dolorem lenit. *Res est mirabilis & expertissima in omni dolore podagrico sistendo*, dicit Rayus; Et credo, quod liquor talis propter acidum temperatum, putredinis motu extraversum, multum profit pro usu externo. Idem dicitur de liquore ex radice vitis albx ratæ seu bryoniæ, simili ratione, aut ex radice excavata, & proprio operculo tecta, parato, qui locis podagricis illitus egregiè confert; sicuti etiam cum floribus hyoscyami eodem modo liquor summè anodynus haberi potest. Vel flores sambuci in lacte cocti pro fotu subinde applicentur. Porro folia Valerianæ majoris recentius imposita, & subinde renovata, aut folia bardanæ majoris ob sal nitrosum conquassata nonnihil durioribus nervis & parti molliori imposita egregium levamen afferre observavi. Lac & omnia lacticina, alcali oleoso turgida, itidem mitigant dolorem & ardorem, præsertim quando cum hyoscyamo simul ebullierit; hinc usitatissimum est cataplasma, factum ex medulla seu mica panis albi in lacte decocta, additis aliquot ovorum vitellis cum croco; & cataplasma ex floribus chamomillæ & lenicula aquatica, in lacte decoctis, cum farina hordei applicatum: cui & inserviunt melilotus cum malva & althea, organum, satureja, artemisia, betonica, lavendula, &c. c.g.

℞. Medull. panis tritic. ℥iij.

pulv. rad. alth. ℥j.

fl. Chamom.

far. fabar. ana ℥℥.

sem. lini

Fenugr. ana ℥iij.

Coqu. in l. q. lactis ad consistentiam pulvis, adde

Ungu. anod. ℥j.

Bals. Sapon. ℥ij.

Vitell. ovi Num. j.

M. f. Cataplasma.

D. S.

**Schmerzstillender Bey- oder  
Umbschlag.**

Hinc caseus ovillus recens planè impositus egregium lenimen præstat. Item optimum malagma præbet vetus & vermiculosus caseus cum jure, in quo perna suilla ad tabem decoxerit, quod articulorum etiam tophis multum prodesse dicitur. Caro bubula, alcali dissoluta, lacti & prædictis ferè omnibus præfertur; hujus enim frustum crudum sine

pinguedine partem dolentem super-ligatum, manè & vespere mutatum, feliciter dolores compescit, locum nigredine contusum relinquens. Insuper pulvis radice cont. li. dæ majoris cum aqua communi in pulvem coctus, qui minimi digiti grossitie loco dolenti applicatus, podagram novellam invasionemque primam optimè mitigat: Vid. Tacchenius *Morbor. Princ. pag. 198. & seqq.* Hinc stercus bubulum, & quod præstantius, stercus humanum optimè dolores hos sistunt. Cataplasmate sequenti Hillerus feliciter usus fuit, quò unâ nocte dolorem & tumorem in genibus & pedibus maximum curavit:

℞. Sterc. bovis ℥bj.

Ua rosar.

veron. ana ℥ij.

Album. ovi, c. frusto alum. conquass.

Num. j.

Croci ℥j.

Camph. ℥j.

Misc.

Facit huc etiam urina humana, præsertim nonnihil putrefacta, egregia anodyna, vel per se, vel cum adjecto cinere communi ex balneo destillata; vel aqua absorptiva ex salis Ammoniaci pulverisati & alcali tartari ana in aqua simplici soluta: Vid. Tacchenius *l. 4. pagin. 197.* Hinc Cnæfeli in usu habuit extractum cassiæ fistulæ cum spiritu vini parti affectæ imponendo; sicut & stercus hircinum cum urina ægri subactum, & instar cataplasmatismatis applicatum, egregiè convenit. Vel recipi potest urina vaccæ mense Majo, & imponi pedes aliquamdiu: dein imponatur emplastrum Norimbergense, vel, quod melius, emplastrum de alcalibus Tacchenii, cum vel sine camphora pro circumstantiarum ratione, vel emplastrum de spermate ceti. Denique calx viva propter suum alcali hinc locum habet: nempe si aquæ calcis vivæ imponentur pedes, extrahit dolorem, & resolvit tumorem. Item urina, in qua calx viva extincta est, applicata benè convenit; loco cujus urina vetustior usurpari potest. Sunt, qui cœu singulare remedium podagricum laudant, recipiendo spiritum vini septies vel octies super sale tartari rectificatum, affundunt hunc calci vivæ, abstrahunt fortiter, hinc enim spiritus vini subtilissimam & penetrantissimam tartariarticulorum resolutivam acquirit, & ut per sudorem possit evacuari, hunc disponit. Quod si spiritus hic accensus deflagret in cochleari, relinquit pinguedinem butyrosum, & ipsam pro illitione contra podagram admodum accommodatam, meliorem, quam ipse ferè spiritus, qui citra metum applicari potest. Hauptmannus miscet

tin.

tincturam tartari acerrimam cum saccharo Saturni, quò, tanquam arcano in podagra, affectum locum illinire jubet, & mirandose effectus promittit. Denique suffitus iste ex decocto scobis corticum ligni abietini & querni coriariorum, **der gebrauchten Gerber-Loh** / cum urina humana, egregius ad quamcunque arthritidem est, ut partes affectæ eò foveantur; hoc ipso enim Comes quidam à podagra contractus factus restitutus dicitur: vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. observat. 229.* Forfan lotio cum ipso decocto non esset incongrua; Vel

℞. *Lixiv. Coriarior.* ℥ij.

☉ *human.* ℥iij.

M. S.

**Neusserliche Beshung.**

Pertinent huc Saturnina, in specie saccharum saturni cum appropriatis applicatum: nempe solutio ejus in spiritu vini aut spermate ranarum, additâ paucâ camphorâ. Hinc quidam emplastrum de spermate ranarum ritè paratum copiosiore addito saccharo saturni, non sine effectû applicant. Curavi virum, qui habuit dolores arthriticos in genu cum aliquali rubore erysipelaceo, cui optimè conferebat emplastrum de spermate ranarum, cum copioso saccharo Saturni: cum denuò posset ambulare, pro spina infixâ evellenda ordinavi aquam arthriticam ad extra cum spiritu salis Ammoniaci, optimè habebat per quinque vel sex dies: Sed abusu hujus spiritus recrudescerebat paroxysmus, & intensior fiebat. Pertinent huc emplastrum ex alcalibus Tacchenii, & emplastra bina Barbetæ multum laudata ad podagram, tam calidam quàm frigidam *libr. 1. cap. 4.*

Fugienda sunt nimis unctuosa pingua, quæ poros oblinendo malum sæpiusculè potius exasperant, & insensibilem transpirationem inhibendo, tandem contumaces contracturas inferunt; unde loco unguentorum emplastra varia nervina & cataplasmata dicta calidè adhibenda sunt. Hæc ipsa tamen sæpiùs renovanda, ne actuali suo frigore postmodum stricturam pororum inferendo, malum exasperent.

Quoad podagram frigidam sic dictam: spiritus vini cum spiritu salis Ammoniaci, præsertim cum calce viva parato, convenit. Sapo Venetus uti in quavis podagra, ita in specie in frigida laudatur: Nèmpè volatilibus subindè sunt jungenda oleosa quasi ferventia, v. gr. destillata tacamahacæ, fuliginis, tartari, &c. rectificata. Recipiatur sapo Venetus, solvatur in spiritu vini & aqua sambuci, & ita illinatur cum pluma parti dolenti. Vel ad imitationem Doctoris Michaelis:

℞. *Sapon. Venet.* ʒij.

*Camph.* ʒvj.

*Croc.* ʒij.

~ *lumbricor. terrestr.* q. s. pro solutione.

Misc.

quâ illinantur cum penna partes dolentes calidè.

Coincidunt hæc cum balsamo antipodagrico Rhumelii:

℞. *Coag. Lapis animalis & alcali,*  
i. e. *Sapon. Venet.* ʒj.

*Gumm. Gial. & Læa natura,*  
i. e. *Camph.* ʒij.

*Quint. Essent. Vegetabilis,*  
i. e. *Spirit. Vini* q. s.

Digerantur, & separatis fecibus reliquæ ad usum reserventur, & cum linteis parti dolenti applicentur.

Siquidem in forma liquida quæ adhibentur, majorem sæpè & tutiorem effectum relinquant. Loco spiritus vini melius recipitur spiritus lumbricorum terrestrum.

Alii saponem Venetum liquefaciunt cum spiritu vini super carbones, addito oleo juniperi & petroleo faciunt unguentum & applicant.

In specie oleum destillatum saponis Veneti est potens remedium, præsertim in arthritide frigida; hinc etiam in dolore ischiadico, vid. Horstius *libr. XI. observat. 23.* Sicuti præparationem ejus cum addita calce viva & camphora idem describit *lib. 8. observat. 2.* Oleum petroleum, in quo decocta est radix hellebori nigri, laudatur ab Hartmanno in *Prax. Chymiatr. ubi de Arthritide §. 14.* & confirmatur ceu expertum à Lindano, uti & balsamum Peruvianum cum vitello ovi & aqua articulari seu spiritu lumbricorum mistum. Aliàs convenienter usurpantur tacamahaca vel caranna malaxata cum oleo succini; emplastrum expice; ac Poterii ex pice navali & sulphure; vel emplastrum diaphoreticum Mynsichti, malaxatum cum oleo destillato tartari fœtido vel succini applicatum est egregium; Vel

℞. *Empl. diaphor. Myns.* ʒij.

liquefacto adde

*Theriaca.* ʒij.

Malax. c. *ol. philosophorum* vel *Qi fœtido*:

Si inflammatio circa articulos adsit, optimè miscentur cum camphora. Convenit etiam ad discutiendos tumores in declinatione podagræ relictos.

Hisce etiam opii ejusque tincturæ tantillum subinde addendum venit: magis tamen in arthritide calida quàm frigida. Theriaca emplastri modo applicata etiam vi anodynâ egregiè convenit, cui subinde in calida de sale absinthii, in frigida de spiritu salis Ammoniaci plus minus addi potest. Alia remedia

(Fffff 3)

externa,

externa. & compositiones elegantes & multiformes, videbitis in M. A. N. C. *Ann. 1. observat. 142. pag. 318. & Anni 6. & 7. Append. pag. 158. seqq. Ann. 9. & 10. observ. 80.*

VII. Vesicatoria ex cantharidibus an convenient? equidem doloris ratione dubium videtur: sed cum balsamus iste ex saponem Veneto, item inunctio cum oleo saponis, pustulas in loco dolente excitent, ex quibus ichor acris profluit cum tali ægri usu, & rarius redeat paroxysmus, sicut etiam observavit Horstius *libr. XI. observat. 23.* & illa ipsa vesicatoria subinde optimè contulisse visa fuerint, conf. *Act. Societ. Reg. Vol. 1. pag. 535.* sanè haud dubito, quin interdum, idque, ut suspicor, in podagra frigida, ubi acidum intimè magis viscidiori aut copiosiore synovia sociatum, pertinaciter circa profunda articularum & ossium loca hæret, proficua esse queant; cautè tamen, monente Sylvio *de Arthrit. §. 183.* in ischiade inveterata in loco affecto applicata proficua observata fuerunt: Vid. Borellus *Centur. 4. observat. 53.* siquidem in Schenckii *observation.* refertur ischiadici morbi fortuita, excitatis copiosis vesiculis, curatio. Ut sanè illud Moxæ, quæ haud ita pridem tanquam specificum ad hunc affectum innotuit, auxilium, cui tamen & nostratium vegetabilium lanugines substitui possunt, v. gr. artemisæ, marrubii aut stœchados, haud aliâ ratione, quàm ratione escharæ aut pustulæ, ceu cauterium actuale, licèt leviùs, prodesse videatur. Ut taceam externi ignis acidum in interno evacuando fortè non parum conferre.

VIII. Tophos quod attinet arthritidis paroxysmis residuos, de cura eorum vid. Hartmanni *Praxis*: præstans imprimis est emplastrum ejus attractivum, §. 39. etiam Cnoësselio usitatum in M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Append. pag. 165.* Præterea & casei veteris cum decocto carnis suillæ applicatio hic proficua est; nam cure disruptâ successivè tophis exitum parat. Emplastrum deranis cum Mercurio à quibusdam modò malagmate ex caseo putri & spiritu vini vidi obtemperare. Plumbea bractea subtilis imposita per mensem juvat, aut saltem uberius incrementum perhibet ex Zacuto Lusitano *lib. 2. Prax. Admir. observat. 178.* Egregius quoque est spiritus calcis vivæ, de quo supra dixi, si illinatur.

IX. Quoad malum ischiadicum, cujus cura nonnihil variat à cæteris in hoc, præmissa venæ-sectione, ut supra monitum, etiam præterea hirudines subinde locum habent, sive hæmorrhoidibus applicentur, sive etiam ipsi loco affecto. Quoad prius; Forestus *lib. 29. observat. 4.* refert, arthritidem quam plurimorum articularum tertianæ intermit-

tenti succedentem, ex hæmorrhoidibus restrictis, quibus denuò fluentibus arthritides cessarunt. In tali ergo casu hirudines applicatæ hæmorrhoidibus sunt optimæ: Nam Schenkius refert in *observat. coxæ* dolorem hæmorrhoidum fluxu curatum: sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. observ. 162.* Ischiadicum venæ sectione & aliis nil juvenibus, hirudinum usu ano affixorum, curavit. *Idem cit. l. observat. 159.* refert coxæ dolorem, hirudinum sucu supra partem affectam sanatum, quod idem in aliis arthritidis speciebus prodesse ait. His plus minus usurpatis, clysteres imprimis repetiti conveniunt, & quidem acres, necesse est, sint isti; unde hic clyster à quibusdam laudatur:

℞. *Pom. colocynth.* Num. j.

divid. in 4. partes æquales:

quarum prima in nodulo in *Vin.*

& ☐x puer. ana ℥bj.

addendo

*Herb. Matrisylvæ* M. j.

Coquantur, donec remaneat tertia pars, quæ clysteris loco injicitur.

De cætero tutius, quàm in alia arthritidis specie, purgantia in principio adhiberi possunt, præsertim vomitoria: sicut in progressu morbi subinde contumaciori & pleno statu, etiam ad fortiora purgantia, præsertim ex Mercurio dulci & trochiscis alhandal, accedi potest, cum in Sinovia glutinosiore aut copiosiore firmitus concentratum malum eradicandum sit: Sicut his præmissis sudorifera ex lignorum decocto aliquandiu continuata, aut his similia conveniunt: vid. Poterius *Centur. 2. cap. 85.* ubi & aurum ejus diaphoreticum, & hinc cinnabarina, salia volatilia, &c. sedulo in usum vocanda sunt: Vid. Tacchenius *Princ. Morb. pag. 204.*

Externè omnibus encomiis dignum est emplastrum Poterii de pice sulphuratum: vide *Cent. 2. observ. 10. 13. & 86.* Quod applicatum perquam proficuum est, ut expertus sum, ac præter dolorem ischiadicum etiam egregium est in dolore nephritico notho scorbutico, item in colica convulsiva lumbos lacerante, optimè iisdem applicatur; item in subluxatione vertebrarum lumborum supra os sacrum applicatum, etiam cum fructu adhibetur. Ob difficultatem detrahendi lapis calefactus ante remotionem applicetur.

Præterea etiam emplastra ex tacamahaca, galbano, gummi Ammoniaco & Opio, locis dolentibus applicantur, seu ex semine sinapi, erucæ, radice pyrethri, euphorbii, (quod cum oleo lini applicat Tacchenius *l. 4. pagin. 207.*) cum pice navali, gummi elemi, & tacamahaca exceptis, & emplastri forma applicatis: uti & acria antiscorbuti-



butica rubificantia externè imponuntur, qualia sunt cataplasma illud à plurimis commendatum ex piperitide, nasturtio, raphano rusticano, cum vino coctis, & hinc farina lupinorum, floribus chamomillæ & similibus misceantur, & applicentur, de quo confer. Sennertus *de Arthrit. cap. 6. pag. 47.* Radicem bryoniæ recentem cum oleo lini commistam & tepidè applicatam laudat Tacchenius *l. 4.* Veteres externis & aliis irritis candentibus ferramentis tribus aut quatuor locis supra costam inustionem instituebant, loco cujus apud nos ferè vesicatoria usurpari possunt.

Denique universi cruris frictio cum spirituosus, oleosis, & urinosus liquoribus, ut sunt spiritus formicarum, lumbricorum, &c. aqua articularis ad extra, cum spiritu salis Ammoniaci, & similia adhiberi possunt. Quæ inter non negligendum balneum ex vinaceis, item ex acervo formicarum.

X. Quod si finito paroxysmo doloroso nihilominus adhuc tumor adsit, hinc optimè discutitur vapore de eruca, absinthio, & artemisia, in aqua & vino coctis, ac pedibus calidè suffumigatis; Vel emplastrum Norimbergense dictum cum oleo tartari malaxatum, aut etiam solitarium, applicetur. Ut verò roborentur articuli, finito paroxysmo convenientissima sunt vina balsamica ex vegetabilium aromaticorum decoctis parata, qualia sunt decocta Poterii *Centur. 2. cap. 10. & 13.* aut qualia prostant in M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Append. pag. 165.* Quod si ægri extra paroxysmum præ nimia membrorum imbecillitate progredi nesciant, cum tamen tophi nondum appareant, iis fonticulos in diversis corporis partibus excitatos prodesse, ait Horstius *libr. 8. observat. 3.* aut usurpari potest emplastrum de pice, quod firmat tendines, & resolvit nimias humiditates; aut usurpentur remedia Barbette *ex Anat. Practica cap. 5. & 10.*

XI. Extra paroxysmum, omnis eò directæ sit cura, ut partim radix podagræ ex corpore evellatur, partim articuli antea affecti roborentur. Pro priori scopo inserviunt remedia tam diætetica quàm pharmaceutica, ac chirurgica. Quoad diætam, exactissimè est observanda arthriticis: sicut enim hæc neglecta fecunda mater podagræ est, ita observata eadem hunc suum foetum abortivum rursus abolet. Verùm de hac cum ubivis plura prosteat, eaque vel Sennertus *Tract. de Arthrit. c. 7.* & Tacchenius *l. 4.* recenseant, saltem adhuc sequentia observanda: Nempe nil melius est, quam omnia acida, & quæ in volatilem aciditatem citò transeunt, aut vim fermenti digestivi enervant, quantum possibile, vitare, convenienti diætæ regimine digestionis primæ negotium

& ceteras functiones quasvis sarras rectasque servare, & hinc specifico antipodagræ saporem acidum volatilem, spiritibus sociabilem, ex prima stomachi culina oriundum, corrigere, & in prima herba extinguere, idque per remedium pharmaceuticum, quale Cnæffelio fuisse dicitur, & hodie Tachenius jactitat. Sed, cum paucis liceat adire Corinthum, hætenus generalibus necesse est contenti vivamus: existimo tamen in Mercurio, & hinc solaribus ritè præparatis, vim absorbendi, & in radice corrigendi hoc acidum podagricum, delitescere. Lac & diætæ lactea quoque hinc remedii vim obtinent contra podagram, tædiosâ quidem methodo, sed aliquoties jam felici eventu, cum funditus eadem podagra eradicata sit. Utendi modum delineatum videbitis in M. A. N. C. *Ann. 1. observat. 141. pag. 310. & Append. hujus anni, Anno 2. annexi, pag. 33. Ann. 6. observat. 58. Sennerto de Febr. lib. 3. cap. 3. pag. 351.* Sicut de cura lactis in arthritide integrum Tractatum edidit Greifelius: Cui sociari poterit *disputatio lectu dignissima de cura lactis, podagricorum solatii*, à Dn. D. Waldschmidtio Marpurgi nuper habita. Iis autem saltem convenit subjectis, qui benè & sine corruptione in ventriculo illud perferre possunt, item qui graciles ac macilenti sunt, de quo vid. Tacchenius *l. 4. pag. 416.* Sub usu autem hujus æger ab omnibus reliquis alimentis abstineat: vid. Bonnetti *Mercur. Compital. pag. 35.*

XII. Quoad auxilia pharmaceutica: Vomitus primatum tenet, adeò, ut ab omnibus Practicis commendetur præservationis gratiâ. Crebrius aut rariùs, ad minimum omni verno & autumnali tempore circa solstitia, instituetur. Hinc, quoad evacuantia, per inferiora, Mercurius dulcis, Turbith minerale cum spiritu sulphuris paratum, & alia Mercurialia ex regno minerali sunt optima; sicut ex vegetabili helleborus niger, & hinc colocynthis, præ aliis conveniunt. Hermodactylorum laus non ampliùs tanta est ac olim, cum genuini apud nos vix habeantur, utut pulvis arthriticus Paracelsi, descriptus in Hartmanni *Prax. Chimiæ, de Arthritide §. 17.* & ex hoc natum electuarium caryocostinum, quod videb. in Sennerto *de Arthritid. pagin. 55.* pluribus sit commendatissimum; non secus ac electuarium catharticum violatum Mynsichti mirè laudatur à Lindano. Quo remedio aliquando Studiosum Juris hinc felicissimè curavi, qui pessimè habuit & arthriticus fuit adeò, ut quasi contractus videretur; unde etiam in purgandis arthriticis extractum hellebori nigri & hermodactylorum Poterio usitatum fuit.

Ast præ fortioribus purgationibus convenientiores longè arbitror blandas purgationes

nes per pilulas usuales, nonnihil acuatæ, qualium pilularum loco videntur optimæ pilulæ balsamicæ Cnœffellii *M. A. N. C. Ann.* 6. & 7. *Append. pagin.* 19. ex helleboro nigro & massa pilularum de tribus Ruffi concinnatæ, imprimis Mercurio fixo acuatæ, *cit. loc. pag.* 147. Sanè in ventriculi vigore conservando multum his tribuerem: alpe autem, pilulas de tribus Ruffi ingrediens, ita præparata sit, ut pars ejus gummosa magis extrahatur, resinosa verò separetur. His omnino vilunio reiterandis, tres vel quatuor dies ante usum adjungantur sudorifera, & alia appropriata, podagricum acidum & corrigentia, & correctum per sudorem eliminantia. Hinc quovis anni quadrante sudores per aliquot dies repetiti proliciantur, quocunque libuerit remedio, sæpius urinosa, tam fixa quam volatilia, hinc sulphurea antimonialia, item antimonium diaphoreticum & antihæcticum Poterii, continuando. Sanè spontaneos sudores seu potius madores vel omni manè in habitioribus & succulentioribus, vel quavis septimana semel aut bis expectando, proficuos admodum notavi, temporibus extra paroxysmum, præsertim si sub introitum lecti conveniens dosis spiritus salis Ammoniaci præmittatur. Post sudorifera etiam diuretica extra paroxysmum in cura præservatoria sunt optima, quæ duo in plurimis conspirant, ita ut unum alterum sublevet. Imprimis verò diuretica, tam in præservando quam curando, præmissio vomitu, sunt optima; magis tamen in præservando, & speciatim nulla purgantia, nulla violenta sudorifera, tantum valent, quantum appropriata diuretica, imprimis volatilia: qualia sunt spiritus salis Ammoniaci, vel simplex vel layendulatus, aut infusione aromatum cum spiritu vini oleosus factus, tartari volatilis, carminativus de tribus, (qui aliquoties multum præstitit in abusu vini ad præcautionem variorum malorum, quatenus urinam movit) spiritus cornu cervi, liquor cornu cervi succinatus, essentia lignorum, &c. Curavi aliquando podagricum, paroxysmo imminente subito præscribebam spiritum salis Ammoniaci & spiritum cochleariæ, ut temperaretur acidum. consilium erat frustraneum: cogitabam de sudore excitando, & continuabam spiritum salis Ammoniaci; sed nil profeci, quia ad sudorem adigi non poterat, potius superveniebat ardor urinæ dolorosissimus ob salia vitiosa, quæ cum per sudorem non discuterentur, per urinam deducebantur, & evanescebat podagra. Sic egregia sunt Lumbricalia in podagra ad diuresin; item arcanum duplicatum Mynsichti, præmissis fixis; vel sal Ammoniacum depuratum, borra, sal volatile succini, &c.

Hinc scarabzi, speciatim unctuosi, nobile suggerunt remedium ad podagram præservandam, & curandam per urinam, propter copiosissimum sal diureticum; quod habent, utut cum dolorosa stranguria operentur: Vid. Borellus *Cent.* 4. *observat.* 73.

Remedia alterantia quod concernit: eadem prorsus hinc conveniunt, quæ supra de doloribus in genere sunt laudata, varia nempe nervina, aromatica & volatilia, calefacientia vulgò dicta, quæ sale suo volatili acidum podagricum invertere, & per transpirationem insensibilem eliminare solent; quibus in specie semper adjungantur specifica & appropriata, chamædrys, chamæpitys, spiritus salis Ammoniaci, spiritus & sal volatile lumbricorum, carminativus, aliquoties in septimana bihorio ante prandium ad 40. vel 50. guttas, usurpati; item liquor betulæ, herba Thée, &c. Videatur Sennertus, Riverius, Willisius, alii, ubi & plures inde concinnatæ formulæ occurrunt.

De salivatione movetur dubium, annon & hæc aliquid usus conferre possit ad radicem podagræ extra paroxysmum exhaustendam? & videtur eam confirmare Kerkringius *Spicileg. observat.* 28. Conferatur in specie Sylvius *de Arthrit.* §. 170. & *seqq.* & Rolsinecius *Ord. & Method. special. Commentat. libr.* 6. *sect.* 3. *cap.* 1. & Wedelius *libr.* 2. *de Medic. Facultas. sect.* 2. *cap.* 12. qui successum salivationis adhibitæ exemplis confirmant. Tentari posset, sed malo nondum adeò confirmato; aliàs periculum esset, ne magis adhuc offensis articulis, & laxis partibus nerveis, paralytis ac contractura acceleretur.

XIV. Ex fonte chirurgico venæ sectio pro præservatione parum conferre videtur, nisi ordinariæ excretiones vel suppressæ vel imminutæ sint: sicuti suprâ exemplum ex Foresto *libr.* 29. *observ.* 4. allegavi. Quidam tamen scarificationem pedum juxta pedis pollicem, unâ vel alterâ horâ ante novilunium adornata, se præservare nituntur, de quo vid. Salmuth, *Centur.* 3. *observ.* 46. Fomiculi, ut alias, & hinc remedium sunt: parum quidem ex se proficiunt, nisi per accidens in voracioribus aut habitioribus, aut vitam sedentariam agentibus, aut quibus ulcera aut similia emissaria consolidata sunt, interdum conferant: In ferocioribus tamen non sine fructu in cruribus excitantur, in quibus paroxysmos arthriticos egregiè præservare solent. Præ ceteris in ischiadico malo conducunt, nunc in sura excitati, vid. Scultetus *in Armanent. Tabul. ult. lit. k.* nunc juxta popliteum, secundum Hildanum *Cent.* 4. *obs.* 75. nunc super locum affectum excitati, nunc in inguine, quâ ratione Willisius *Pharm. Rational. Volum.* 2. *p.* 450. Ischia-



Ischiaticam inveteratam per fonticulum in inguine curavit. Illustrat hunc in inguine fonticulum observatio, quam refert Fehr de Scorzom. pag. 114. de muliere, ischiade pertinaci laborante ex impuro concubitu, bubone, quo ea affligebatur, quo per apertionem curato, malum ipsum curatum fuit.

XV. Articulus denique firmant lixivium pro balneatione pedum, dum poros servant apertos, & alcali suo acidum spiritum ferè evocant, de quo præter experientiam conf. Hostius lib. 8. obs. 5. præsertim si bacca Juniperi fol. salvia aut rorismarini in aqua commun. & lixivii comm. ana incocta sint: Aut

R. Bacc. Junip. lbss.  
Herb. rorismar. M. vj.  
Serpilli, vel thymi  
Majorana, vel salvia à M. ij.  
Incis. & contus. D. S.  
Species zum Fußbad.

Coquantur in lixivio pro pediluvio, tempore vespertino sub introitum lecti instituendo. Sufficiunt species pro tribus vel quatuor vicibus. Post balneationem pes adhuc humidus linteis involvitur tepidis, & æger lecto committitur.

Præ ceteris conveniunt vinacea, exque iis parata balnea & fomentationes pedum subinde repetitæ: vid. Duræus in Holler. lib. 1. de Morb. Intern. cap. 63. & Solenander sect. 4. consil. 21. quæ cum non semper recentia haberi possint, quidam iis siccatis utuntur, in vino & aqua coquunt, salviæ aliæque nervina addendo. Theriæ huc pertinent, quæ cum remedium externum saltem sint, productis morboſis levandis saltem conferre poterunt, ipsâ radice ut plurimum in corpore relicta, unde incipientes podagrici aliquale levamen exinde percipere possunt, confirmati nullum, quin potius contractura acrigiditas articulorum sic acceleratur: vid. Sennerius de Arthrit. Quest. 12. Adhuc si adjuvanti quid adferunt, in frigida potius quam calida conferre videntur: Videatur Timæus lib. 5. Epist. 7. & Act. Societ. Reg. Volum. 1. pag. 822.

De transplantatione quædam adhuc monenda forent, sed sufficiant hic ea, quæ refert & per experientiam confirmat Timæus von Guldensee / lib. 7. Epist. 7. & 8. Catellus Melitenſis podagrâ afflictis appositus, anodynus est: vid. observat. Borelli & Bartholini, qui catellos hos podagricorum pedibus applicatos claudicasse referunt.

## CAPUT IV.

De

### Lesionibus Gustus.

Læditur Gustus, dupliciter; vel  
Tom. II.

1. Quando imminuitur aut aboletur, ita ut parum vel nihil gustare possimus.
2. Quando depravatur, ita ut res & objecta quædam alienum saporem, quam naturaliter habere solent, continuò in ore repræsentent, eumque putridum & foetidum.

## ARTICULUS,

De

### Gustu Imminuto & Depravato.

#### CAUSÆ.

I Mminuitur vel aboletur Gustus:

I. Vitio spirituum animalium ad linguam distribuendorum, qui vel vitio conformationis nervorum penitus in lingua deficiunt, quale exemplum habet Columbus in sua Anatomie de quodam vitri & carbonum vorace; quia varia sine gustu ullo devoravit, in cuius anatome post mortem invenit nervos naturaliter ad extremitatem linguæ derivandos, juxta spinam dorsi posteriora versus reflexos: aut quando præter hoc in apoplecticis, paralyticis, &c. affectibus cum sensu tactus & gustus etiam motus linguæ simul plus minus perit; quo ablato, cum voces articulari nequeant, loquela amissa appellatur.

II. Læditur gustus, quando lingua ejusque fibræ nervæ, specialiter harum extremitates papillares, à nimia eaque vitiata lymphæ irritatæ ita resolvuntur, & ob atoniam ita relaxantur, ut flaccidæ ac molles, & quasi paralyticæ, minus ab objectis sapidis moveri, & horum impressio percipi possit, pariter atque odoratus; unde etiam in gravedine & coryza graviore, aliique affectibus catarrhalibus, dum os continuò copiosâ tenui salsaque lingua scatet, cum coryza præter olfactum deficientem simul etiam gustus aut imminui plus minus aut aboleri solet.

Depravatum quod attinet gustum, in quo objecta peregrino videntur affecta sapore, fit hic imprimis vitio salivæ, vitiosis recrementis & humoribus variis vel salè imprægnatæ, quæ nunc per se, nunc rebus gustabilibus sub masticatione permixta, organum gustus simul afficit, & inde talem saporem vitiosum lymphæ imprimit: Hinc in ictero, inquinatâ saliva, omnia assumpta obscurè videntur amaricare: hinc similiter in scorbuto & malo hypochondriaco omnia plus minus acescere aut falsescere, in catarrhis omnia assumpta plus minus falsa muriatica apparere solent. Quò fortè picantium gustus referendus est, Interdum sapore putido & ferè inexplicabili & quasi cinereo, objecta infecta videntur; id quod fit imprimis, quando unum alterumve viscerum internorum ulcere aut apostemate incipiente laborat; uti subinde fit in  
(Ggg gg) phthi-



phthisi similibusque morbis, ac hinc est, quod observavit Meara *pagin. 160. in Histor. Med.* gustum depravatum, ortum ex auris ulcere, forsan purè successivè ad os delato, quem tamen ipse curavit per topica auri ad-mota. Rarum est, quod refert Deodatus *in Valetud. p. 272.* de sapore amaro in apice lin-guz perceptibili, idque ex affectu hypochon-driaco.

### DIAGNOSIS.

Affectus hi facilè patent ex ægri relatione; uti etiam causæ antecedentes per eundè & per adjunctas circumstantias aut pathemata ma-nifestantur. Ubi enim adsunt simul aliæ operationum animalium labefactiones, de affectu paralytico non est dubium: sin ad-sit simul vitium catarrhale, v.g. coryza, vel raucedo, & similes defectus, res est facilis co-gnitu. Causa, quæ gustum depravat & sali-vam inquinat, & affectu adjuncto per se patet.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Gustus læsiones in ca-tarrhis per se nullum periculum portendunt, quibus curatis sponte cessant. Idem de alijs enarratis hætenus gustus vitiis sentiendum. Sin verò inveteratæ sint, difficiles sunt cu-ratu.

### CURA.

In cura causæ sunt removendæ, & fibra-rum linguæ debitus tonus nervinis restituend-us & conservandus, aut acrioribus quasi sti-mulandus in imminutione ejus aut abolitio-ne: Illic ad catarrhum respectus est habend-us; Hic verò nervina varia & aromatica con-veniunt. Pro posteriori scopo in specie rapha-nus, antepastum usurpatus & masticatus gu-stum acuit, & eundem deficientem quasi sen-silem reddit, teste Hæfero *in Herc. Med. p. 75.* Hartmannus *gargarismum* habet, & *linimen-tum in Prax. Chim. c. 85. §. 3. & 4.* Egregius quoque est succus acetosæ, vel solum, vel ex ana succi acetosæ & portulacæ, cum ana sa-chari paratus syrupus, teste Zacuto Lusita-no *lib. ult. Prax. cap. 2. num. 10.* quo os & lin-gua subinde abluenda & abstergenda; quin & si deglutiatur, nihil incommodi affert, sed ventriculum simul egregiè abstergit. Quod si verò gustus sit depravatus, in specie tunc con-venit vomitus: quo præmissio usurpetur se-rum lactis acidulatū cum succo citri, vel cum spiritibus quibusdam mineralibus, vel etiam quæcunque acida conveniunt in gustu nimis amaro, non secus ac radix cichorii condita, item zedoaria, vel radix gentianæ crebrius affricta, eundem juvant. Locum etiam habet Gargarismus, item Linimentum Hartmanni jam allegatum. Sed curantur hæc vitia opti-mè, curatō primariō morbō. Hinc postmo-

dum nervinis appropriatis partium nervosarū linguæ tonus restituendus, & corrigendus.

Sed quæ in specie linguam roborant, ejus-que sensum & motum restituunt, sunt nervi-na & ea, quæ aliàs etiam ordinario in Apho-nia & loquela amissa, applicari solent, quas hac occasione jam tractabimus.

## MEMBRUM I.

### De

### Aphonia.

**D**istinguendum autem est inter loquelam amissam, & aphoniam.

Aphonia est, dum vox nulla editur: id quod fit vitio laryngis, ejusque musculorum mo-ventium, aut paralyticorum, aut convulsorum aut nimis humectatorum. Hac namque ra-tione in passione hysterica mulieres aphonz jacent, uti etiam fit in apoplexia graviore, pa-ralysi, & malo hypochondriaco; quam con-vulsionem percipientes quasi laqueo fauces constringerentur, molestiam se percipere as-serunt.

Loquela verò amissa fit vitio linguæ, quan-do quidem sonus aut vox, sed incondita, à larynge formata ob motum linguæ, sive ex to-to, sive ex altera saltem medietate paralyticæ, plus minus amissum aut non sufficientem, in verba articulari nequit, aut alia linguæ vitia suis signis se exhibent.

Aphonia dicitur aliàs Anaphtia, quæ Hip-pocrati sunt distincta, à modernis verò confunduntur: Aphoni enim Hippocrati idem ac apoplectici, cum aphonias nomine intelligat illos, quine motum quidem ullum voluntarium retinent: Anaphtos verò eos, quibus vitio laryngis vox deficit: Vid. Gor-ræus *in Definit. Med. pagin. 57. & 81.* Apho-nia ista, prout communiter accipitur, fit ex vitio nervorum & musculorum, nunc para-lytico, nunc spasmodico. Quoad vitium paralyticum, aphonia fit frequentissimè à paralyti musculorum laryngis, sive hæc vitio proprio, sive vitio nervorum recurrentium ad eos distributorum, accadat: Nam in ca-nibus dissectis, vellicatis illis nervis, aphonia in promptu est: sic videmus non rarò apho-nos fieri, qui magna raucedine laborant. Id quod fit probabiliter à nimia humiditate & consequenter resolutione musculorum laryn-gis, ut flaccidi fiant, & impotentes ad mo-tum. Manifestum hujus rei exemplum est, quod refert Tulpus *lib. 1. cap. 40. pagin. 78.* Hinc etiam tardior loquela cujusdam ob ab-undans phlegma, qui anno duodecimo de-mum loqui cœpit, teste Amato Lusitano *Centur. 6. curat. 5.* Pertinet huc etiam cra-pula, subinde aphoniam inferens paraly-ticam: Vid. Hæchstetterus *decad. 3. cas. 9.*

Quò

Quò etiam facit aphonia ex casu ab alto, & inde contracto vitio nervorum paralytico, quam refert Poterius *Cent. 2. cap. 11.* & jam olim notata observatio Galeni, quam videb. in Sennerto *lib. 2. Prax. pag. 354.* Sic ex terrore nervorum vitio oborta aphonia pro apoplectica restituta. Vid. in Bartholini *Act. Med. Hafniens. Volum. 1. observ. 101. pag. 193.* Curiosa etiam est aphonia paralytica ex globulo plumbeo per vomitum moto, indeque recurrentes nervos deprimente, de quo vid. Deodatus in *Valetud. pag. 97.* Ut taceam nervos recurrentes, quovis infortunio abscissos vel resectos: Conf. Sennertus *lib. 2. Prax. Part. 3. cap. 4. pagin. 355.* Observavi aliam aphoniam in virgine, quæ cubans noctu in hypocausto, ac suaviter dormiens; ob extinctam verò lampadem ex oleo constructam, & hujus fumo successivè inspirato altero manè surgens, cetera sanissima, aphona erat. Videbatur subesse vitium quasi paralyticum laryngis ejusque musculorum ex isto fumo inspirato læsorum. Curabatur per electuarium ex scordio pulverisato cum melle excepto, crebrius assumpto, & deglutito. Atque hæc aphoniæ ad constitutionem nervorum & musculorum paralyticam pertinent, si in paroxysmo apoplectico accedant, & hoc cessante etiam aliquamdiu affligant, sive sine eo, aliis functionibus omnibus salvis, ægros subito prehendant.

Quoad alterum aphoniæ fiendi modum: hunc ex convulsione musculorum & nervorum laryngis fieri insinuavi. Observatur tamen crebrò talis in graviore paroxysmo hysterico, in quo aphoniæ jacent ægræ, pariter ac epilepticis convulsionibus sæpius aphoniæ superveniunt. Speciatim vid. hic epileptica aphona per venæsectionem curata apud Hæchstetterum *Decad. 4. cas. 1. & cas. 2. & 40.* Item ex vermibus in ventriculo & intestinis subinde obmutescencia observatur, teste Foresto *lib. 21. obs. 28. schol. & lib. 14. obs. 33. schol.* Pertinere etiam huc videtur curiosa observatio in Bartholini *Act. Med. Hafniens. Volum. 1. obs. 86. pag. 170.* Nam ex constrictionis sensu in loco affecto spasmus nervi recurrentis adfuisse probabiliter concludi potest. Forsan & huc pertinet aphonia ista mirabilis M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 121. pag. 193.* sponte suâ ex improvilo affligens, & sponte sua denuò cessans ac recidivans, &c. Nempe vix paralyticum, sed potius convulsivum quid subesse videtur. Forsan etiam huc pertinet aphonia suborta ex retenta gonorrhœa virulenta, fonticulis in inguine apertis curata, apud Zacutum Lusitanum *lib. 1. Prax. Admir. obs. 97.* Nempe acre luis venenum facile nervos recurrentes vel musculos laryngis irritando, ex spasmo aphoniam inferre potuit. Quoad aphoniam in febribus interdum superveni-

Tom. II.

entem: res dubia, an paralyticū potius an convulsivum vitium sit? Sanè quantum colligere valeo, ad convulsiva vitia potius referrem: nam & quæ in variolis non rarò observantur aphoniæ, vid. Hildanus *Cent. 6. obs. 14.* ex convulsione laryngis potius esse videntur. Sed præter paralytin ac convulsionem etiam subitanea spirituum perturbatio ad aphoniam disponere valet: sicuti videmus, quosdam nimio terrore percussos planè obmutescere. Pertinet huc mirabile exemplum a *Φανίας* ex visis cancris in M. A. N. C. *Ann. 2. obs. 45. pag. 229. & Ann. 3. obs. 187. pag. 348.* Præ qua longè curiosior est subitanea ista aphonia cum perfecta in toto corpore *ἀναισθησία*, omnibus ceteris, tam vitalibus, quam animalibus, functionibus salvis in M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 251. pag. 454.* quæ omnia tamen symptomata beneficio venarum raninarum sectionis breviter evanuerunt.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Apoplexiæ juncta aphonia difficilius curatur, ac interdum diuturna esse solet.

Quæ cum singultu sunt aphoniæ, pessimæ sunt autore Hippocrate.

Balbi profluvio alvi maximè corripuntur, teste Hippocrate *sect. 6. §. 32.* & hoc ipso ferè sanantur.

Aphoniæ per se & solitariae, modò ritè tractentur ægri, successivè curabiles sunt.

### C U R A.

In cura ad primarium morbum, cujus symptoma est aphonia, aut saltem ad ejus causam antecedentem, respiciendum, ut his remotis facilius prædicti symptomatis fiat curatio. Pro quo curando ad laryngem & ejus musculos ac nervos recurrentes imprimis respiciendum, tam earundem paralytin undecunque natam, quam spasmus ex nimia irritatione removendo, internè per volatilia aromatica & nervina, aliàs cephalica dicta, ex gr. spiritum salis Ammoniaci castoreatum, succinatum, liquorem cornu cervi succinatum, subinde sudorem simul provocando, & ptyalismum masticatoriis promovendo. Imò in contumaciori malo præsertim paralytico, dicta sudorifera ex lignorum decoctis instituenda venit.

Hinc externa remedia topica collo, & imprimis regioni, ubi situs est larynx, sunt applicanda, spirituosae nempe & nervina appropriata, quæ inter est infusum majoranæ, florum chamomillæ, lavendulæ, & salviæ cum spiritu vini paratum, quo sub forma fots cum linteis multiplicatis calidè crebrius, donec vox redierit, admoto, aliquoties aphonias curavi: aut sacculi ex nervinis aromaticis, spiritu vini irroratis, exterius collo applicandi:

(Ggg gg 2)

vel

vel aqua articularis ad extra, maritata cum essentia castorei, aut spiritus apoplectici cum spiritu lumbricorum vel formicarum eodem in loco calidè cum linteis multiplicatis applicandi; aut olea destillata nervina, succini, lavendulæ, rutæ, juniperi cum theriaca, permista, ac cum baltamo Peruviano subacta, bidem frequentius illinenda; aut etiam essentia castorei, vel solitaria, vel istis lociata, sedulo admovenda:

Item

*℞. Herb. salu.*

*rorismar. ana M. j.*

*sem. Eruc. ʒij.*

Coqu. in f. q. *∇ a simpl.* in vase clauso:

Colatur. (b). adde

*— Ceras. nigr. ʒvj.*

*Θ\*ci ʒj.*

*Mell. anthosat. ʒj.*

M. pro Gargarismate

D. S.

### Sonderlich Gurgel-Wasser.

Convenit in aphonia, laryngis affectu, post paroxysmum apoplecticum.

Pro quorum omnium meliori successu, ubi circumstantiæ aliæ permiserint, & venæ sectio sub lingua interdum institui potest.

## MEMBRUM II.

De

### Loquela Amissa.

**L**oquelæ amissio est, quando sonus & vox formatur quidem à larynge, sed ob motum linguæ aut amissum, aut non sufficientem, vox formari & in loquelam articulare nequit. Vitium hoc paralyticis & apoplecticis imprimis familiare est, & subest paralytis linguæ major vel minor, ad quem pertinet suo modo balbuties ex deficiente itidem aut impedito linguæ motu oriunda.

### C U R A.

Hic affectus curatur in specie aromaticis oleosis aut spirituosus, linguæ extrinsecus admotis. Convenit hic decoctum gallitrichi, salviæ, hyssopi, pyrethri, zingiberis in aqua & vino, quo ipso lingua vel fauces eluendæ, vel etiam instar gargarismatis applicandum. Porro decoctum salviæ & crucæ vel sinapi in vino paratum propter hujus sal volatile acre à quibusdam tanquam singulare arcanum commendatur; Item decoctum pulegii & nasturtii in vino: quæ possunt acui cum salibus volatilibus, ut in ore detenta melius penetrent.

Præ cæteris salviæ succus in linguæ paralyti & loquela amissa commendatur, si eò fricetur lingua frequenter: cui tamen pulvis castorei aut semen sinapi contusum commo-

dè addi possunt; nam sic etiam frictio linguæ cum theriaca, addito pulvere seminis erucæ vel sinapi, quibusdam commendata esse solet. Pro gargarismate hoc commendat Stöckerus cum sequenti mistura:

*℞. Salu.*

*Hyssopi.*

*Acori, ana M. j.*

Coqu. in f. q. *∇ a.*

Colaturæ adde

*Oxym. Squillit. ʒj.*

M. pro Gargarismate.

Porro in affectibus paralyticis aut apoplecticis præ cæteris olea destillata spiritus aut aquæ spirituosæ, & essentia penetrantiores, sunt egregiæ, v. g. essentia florum anthos, salviæ, lavendulæ, castorei, cum penna sub lingua illita inferius juxta locum frenuli; aut ubi nervi sunt motrices. Castoreum ipsum sub lingua detentum, & omnia ex eo parata, uti in loquela amissa, ita etiam in aliis loquelæ vitiis, in specie in balbutie infantum aut puerorum corrigenda, & quando tardius loqui incipiunt, multum convenit, in quo affectu masticatio nucis moschatæ etiam confert. Fortius est, si essentia castorei fiat cum spiritu vini, sale volatili cornu cervi aut succini imprægnato, linguæ illita, vel sub lingua applicata. In specie spiritus cerasorum nigrorum, acuat cum aliquot guttis olei destillati caryophyllorum, apici linguæ illitus, aut ori infusus, in malo ab apoplexia est admodum efficax. Alias etiam oleum destillatum anisi apici linguæ frequenter illitum tanquam singula & specificum ad linguæ paralytin & amissam loquelam ab Hartmanno laudatur. Conducit etiam spiritus vitrioli cephalicus, mistus cum ana vel duplo spiritus cerasorum nigrorum, orique infusus, ac probè linguæ applicatus. Quò pertinet spiritus theriacalis camphoratus, mistus cum spiritu baccarum juniperi aut liliorum convallium, & similia penetrantia; non secus ac oleum destillatum succini ad gutt. viij. cum *∇* majoranæ vel liliorum convallium, vel cum aqua lavendulæ & salviæ, ori infusum. Vel fricetur lingua cum theriaca aut extracto theriacali; Vel

*℞. Mithridat. ʒij.*

*Extr. Castor. ʒʒ.*

*& i destill. lavend.*

*succini*

*anisi ana gutt. jv.*

M. pro illinitione aut frictione linguæ.

Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 207. Ann.*

*4. & 5. observat. 128. pag. 137. & Ann. 6 & 7.*

*Observ. 92. pag. 132.*

Ulterius in usu etiam sunt electuaria sub forma lituum linguæ applicanda; v. g. singulare electuarium in paralyti linguæ, loquela amissa & cognatis affectibus à Stöckero admo-



admodum laudatur, cujus crebrior facta est experientia, nempe

34. *Mithrid.* ʒiij.

*rad. acori condit.* & subtilissimè trit. ʒj.

*Zingib.*

*Nuc. Moschat.* ana ʒij.

*Θis comm.* vel potius

*Θis vol. succ.* ʒj.

M. omnia in mortario;

quibus adde

*Succ. Salv. depur.* ʒj.

*Mell. despum.* q. s. ad consistentiam debitam Electuarii.

quod irroretur cum oleo destillato anisi, Majoranæ, Salviæ, succini, &c.

Sumatur quantitas avellanæ, teneatur sub lingua, sensim ac sensim deglutendo, fricetur simul lingua aliquoties, tam in summitate quam in parte inferiori juxta frenulum, donec loquela redeat.

Si verò in senē adest difficilis loquela, optimum est euporiston essentia florum lavendulæ, infusa in spiritu vini, de quo infuso propinetur omni manè & vesperi sub introitum lecti ʒj. Sanè hoc ipso remedio Rulandus aliquando curavit loquelam amissam ex paralyſi linguæ in senē 86. annorum; sicut etiam in tali casu convenit nux moschata, si particula hujus probè masticaretur, & in ore agitur.

Tandem cum dictis internis subinde & externa in usum vocanda. Cataplasma factum ex fermento, addito simul pulvere succini aliisvè appropriatis nervinis, vertici impositum, experimentum est Rulandi in loquela amissa: sicut etiam oleum destillatum succini vertici aut nuchæ illitum, aut in aqua spiritiuosa vel lavendulæ vel salviæ linguæ admotum, & crebro applicatum, insigniter commendatur. Sic Forestus *lib. 14. cap. 32.* refert paralyſin linguæ ex catarrho, præmissis universalibus, per vesicatorium nuchæ applicatum curatam. Sic & apertio venarum sub lingua subinde cum fructu institui potest. Conf. curiosa observatio in M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 251.*

## CAPUT V.

De

### Lesione Olfactus.

**L**æditur olfactus tripliciter:

1. Quando imminuitur, odoratusque est nimis hebes;
2. Quando omnino aboletur, ita ut parum aut nihil odorare queamus;

3. Quando depravatur, dum odores alieni, in specie putridi & foetidi, continuo à nobis odorari videntur: id quod fit in ulceribus narium, imprimis ex lue Venerea interiora nasi occupante; item ex vitio dentium scorbutico, eorumque putredine, & similibus vitiis: de quo odore depravato, cum, curatis istis exulcerationibus, sponte cessare soleat, nihil amplius monendum est.

## ARTICULUS I.

De

### Olfactu Imminuto

aut

### Abolito.

#### C A U S Æ.

**I**mminuitur aut aboletur odoratus, triplici ex causa: primò ex vitio cerebri ac nervorum non dimittentium spiritus animales in organa odoratus, v.gr. in affectibus apoplecticis, paralyticis, & quando econtrà ex spirituum impetu convulsivi quid patitur membrana narium, uti fit in epilepticiis motibus & vertigine caduca, in quibus objectorum impressiones percipere nequeunt ægri propter spasmus membranæ narium internæ, unde olfactus ad tempus aboletur. Item obstructio summitatis narium, & hinc inducta filamentorum nerveorum ex matre per os cribriforme in nares protensorum compressio.

2. Imminuitur odoratus plus minus ob membranam læsam, quæ narium summitatem succingit, si vè lædatur à causa interna, si vè externa. A causa interna quidem, quando eadem nimis humectatur & à copiosiore lymphâ irrorata ac nimis relaxatur. Uti enim naturaliter hæc membrana madet blandâ lymphâ pro facilitatione odoratus, ita hæc ipsa nimis humectata inepta fit, quæ impressiones odoriferas recipiat, cum ex paralytica quasi constitutione, qua fibræ ejus nimis relaxatæ & humectatæ ad impulsum vel attractum rerum odoriferarum immobiles ferè sunt, & ipsi quoque animales spiritus eò delati à copioso humore inquinantur, segnes ac plus minus torpidi redduntur. Hinc in coryza & gravedine ac similibus affectibus narium & capitis catarrhalibus, odoratus omnino aboletur; hinc in constitutione aeris aquilonia, seu humidiori & frigida, odoratus insigniter hebetatur; unde etiam canes venatorii tunc temporis minus sagaces esse solent.

(Ggggg 3)

Inter

Inter causas externas membranam lædentes est continuus nimis fortiter odoratorum olfactus, aut etiam sternutatoriorum abusus. Ab his enim fortiter odorantibus & narium membranam nimis stimulantibus ex forti impressione, & hinc spirituum animalium nimia motione fit, ut postmodum leniora objecta vel omnino non, vel saltem parum, sentiant, quatenus in tono suo vitata est dicta membrana: ob id enim camphorata crebrius odorata olfactum lædunt, quia vis ejus odorifera est penetrantissima, vid. Bartholinus *centur. 4. Histor. 91*. Universale nempe hoc est omnibus sensibus externis, ut ex fortiori impressione & motione ab objecto facta in organum hujus fiat læsio, & sic cesset ejus actio, unde non nisi à valido objecto postmodum moveri & sensualis impressio excitari possit. In specie dum ista fortiter odorantia, aut acrius membranam ferientia, ita alterant membranam, ut postmodum leviora objecta vel omnino non, vel saltem parum sentiantur, imprimis in sternutationibus crispata, & quasi convulsivo motu affecta, narium tunica exinde in tono suo ita vitatur, ut non nisi fortissimorum objectorum impressione fibras ejus moveat. Observatur hoc in Italis, qui ferè semper secum gestant pulverem sternutatorium ex nicotiana, & quotidie cum naribus insufflant; hinc in his continuato abusu horum pulverum cessat tandem ferè in totum odor, adeò ut dum nos Germani ex simplici sternutatorii odore, aut ejus tantillo, ad sternutationem movemur, Itali, copiosè licet ingerant, nullam tamen sternutationem sentiant, & graviter odores percipiant: unde & iidem Itali interdum in junioribus annis cum imminuto olfactu hebetudinem visus patiuntur, cum sternutationes noceant oculis.

#### DIAGNOSIS.

Signa odoratus deficientis ex relatione ægri per se patent: sicut causarum diversitas ab eodem, simulque junctis circumstantiis aut pathematis aliis, facile colligitur.

Nempe affectus apoplectici & paralytici per se notis sunt: membranam narium esse humectatam aut ex excretionem, aut ex affectibus catarrhalibus patet, imprimis quando lymphæ destillans est copiosa, tenuis, &c. uti fit in catarrhis.

Denique abusus odoratorum & pulverum sternutatoriorum etiam ab ægro inquirendus est.

#### PROGNOSIS.

Pro varietate causarum majus vel minus periculum imminet ex olfactus læsione. Hinc quæ læsio odoratus fit ex vitio lymphæ catarrhalis, curatur facile; Nam curato catarrho, facile cessat; sin verò odoratus læsio sit antiqua, præsertim ex causis externis nimis

odoriferis, in membrana impressionem facientibus, inducta, talis rarò aut nunquam curari solet.

Porro quando æger in morbis acutis odores non consuetos sentit, utut non adsint objecta talia odorifera, v. gr. quando percipit odorem piscium putridorum, luti, butyri rancidi, &c. mala signa, & ferè fatum portendunt.

#### CURA.

Cura pro varietate causarum variat, adeoque

1. Pathemata cerebri & nervosi generis tollenda.
2. Affectus catarrhalis curandus, & hinc membrana narium nervinis aromaticis in tonum naturalem restituenda.
3. Externa quælibet, præsertim objecta nimis odorata, maturè sunt removenda.

Præmissis ergò præmittendis, & pro causarum varietate variantibus, imprimis excellent, majorana & nigella: Sic novi mulieres, quæ coryza laborantes, cum olfactu & gustu perduto, internè sumunt cochleare unum majoranæ arefactæ cum cerevisia vel alio vehiculo calido, idque summo cum levamine. Sic etiam extractum majoranæ ceu expertum remedium laudatur ab Hartmanno, si omni manè & vespere usurpetur à gr. vj. vel viij. ad ʒß. item essentia majoranæ cum essentia pulegii mista, vel extractum majoranæ cum saccharo mistum, addendo aliquot guttas olei destillati majoranæ, in forma eleosacchari vel rotularum accipitur. Conveniunt etiam pulegium, rosmarinus, & ex his parata olea, essentia, &c. Hinc etiam balsamus majoranæ ex ejus oleo destillato factus, naribus illitus præ reliquis confert; vel usurpetur oleum sequens:

℞. *Ol. nigell.*

*Ireos aa. ʒß.*

*Destill. major. ʒß.*

*M. D. S.*

*Oehl zur Nase.*

quo ipso illinantur interiora narium. Conveniens in specie est in odoratu deperdito, si simul ex affectibus catarrhalibus adsit obstructio summitatum narium. Quòd si volumus hanc reddere acriorem, addi etiam possunt aliquot guttulæ olei destillati anisi & succini: Vel fiant etiam noduli olfactorii ex majorana & semine nigellæ, v. g.

℞. *Herb. majoran. Mß.*

*sem. nigell. contus. ʒij.*

*irrorentur aliquot guttulis*

*Ol. destill. major. l. anisi,*

*f. l. a. Nodus c. stylo,*

*qui subinde naribus admoveatur.*

*D. S.*

*Riech-Püschel zur Nase.*

Deni-

Denique in odoratu deperdito experimentum Petri à Castro sequens laudatur:

*R. Sem. Nigell. in aceto fortiss. infus. & postea exsic.*

*Ruta.*

*Fumar.*

*Castor. aa. 3j.*

Subtilissimè trita, leniter subigendo miscantur cum urina pueri, ut fiant in forma mellis liquidioris seu syrapi tenuioris.

Hujus omni manè stomacho jejuno quinque vel sex guttas ægri attrahant per nares fortiter, & postea caput versus posteriora inclinent, & in ore aquam calidam detineant: continentur ad 3. 4. s. vel 6. dies, donec ægro odor redeat.

Plura qui vult de nigella, vid. Tabernæmontanum *de Nigella.*

Alias in abolitione olfactus etiam menthastrum foliis acutis & floribus albis sub forma extracti cum decoctæ rutæ, majoranæ, abrotani & nigellæ, interno usu laudatur: sicuti externè eodem decocto menthastrici caput est lavandum.

Denique suffitus ex succino, item gummi animæ, vel ex his duobus mistis, dum catarrhos sistit, etiam deperditum odoratum nonnihil restituit. Forsan & suffitus ex spiritu salis Ammoniaci, & aliis volatilibus spirituosus, nervinisque penetrabilibus, non erit inconveniens.

## ARTICULUS II.

De

### *Polypo Narium.*

**A**D narium obstructionem pertinet etiam polypus, qui est sarcoma seu excrescentia carnosa in naribus, ex earum summitate pronascens, & nasum nunc replens, nunc in fauces usque descendens. Ad imitationem polypi piscis ita dicitur, dum nunc una, nunc pluribus radiculis & pediculis, in loco, ubi excrescit, naribus se affligit.

#### *PARS AFFECTA.*

Pars affecta seu locus, unde excrescat, sunt nunc, idque rarins, membrana glandulosa in summitate narium, nunc, idque frequentius, filamenta nervea os spongiosum opplentia, ex quibus nunc uno, nunc pluribus pediculis, hujusmodi polypus excrescit. Excrescentia hæc nunc alba, nunc rubra, nunc livida, &c. apparet, nunc solummodò narem implet, nunc adeò increscit, ut etiam in fauces descendat, ac strangulationem miniretur. Quod si livida, dolens, &c. appareat, ferè cancerosam naturam sapit.

#### *C A U S Æ*

Causa efficiens hujus polypi, non secus ac aliarum excrescentiarum, est nutritio nimia naturalis, & idem dictarum partium nutrimentum plus minus alteratum, & acrimoniâ degeneri acidâ plus minus inquinatum; unde differentia polypi plus minus cancerosi. Omne punctum in efficiente occasionali situm est, quod est læsio unitatis in quodam loco dictarum partium, sive distensio, aut vellicatio, aut ruptio, aut exulceratio fuerit: unde in loco læso fibræ excrescentes copiosiore nutritu in tale corpus successivè excrescunt: Sic catarrhos acriores narium interdum insecutus polypus observatus fuit; à frequenti narium fricatione polypum lethalem notavit Kerkringius *Spicileg. observat.* 14.

#### *P R O G N O S I S.*

Quoad prognosin: quo magis mollis, albus ac indolens fuerit polypus. eò facilioris curationis: qui verò fuscus vel lividus est, præsertim acutè subindè dolens, vix curatur, quia cancerosam naturam sapit.

Quò profundius hærent ejus radices, adeoque, quò magis attingit filamenta ista nervea, eò periculosior: quia facilè sub radicum extirpatione occasione doloris inflammatio membranarum cerebri potest oriri; quod si verò radices penitus non extirpentur, semper de novo propullulat.

#### *C U R A.*

Quoad curam: Excrescentia hæc removenda & eradicanda, idque auxiliis præsertim externis, nunc pharmaceuticis, nunc chirurgicis. Rarum enim est, quod polypos duos per sola medicamenta interna, dietam, pharmaciam & sudorem, curaverit, Horstius *libr. 2. observ. 48.* polypum fonticulo curatum videb. *in Misc. Acad. Natur. Curios. Ann. 9 & 10. observat. 26.*

Antequam autem externa adhibeantur, si corpus est impurum, & universalis evacuantia & alterantia præmittantur, ne ex doloris ratione contenta corporis quovis modo intensius commota malum exasperent, aut ob plura symptomata curam difficiliorem reddant. Si verò ex vulnere malè curato sit malum, vel simili læsione externa in corporibus præsertim puris, non adeò necessaria sunt ista, sed statim polypus aggrediendus & extirpandus.

Quoad remedia ergò externa: hæc imprimis decrecente luna usurpanda veniunt; tunc enim tumor minor esse solet. Medicamenta ergò, quæ absumunt, & successivè mortificant, ac ita eradicant hoc sarcoma, sunt nunc lenia, nunc aciora, plus minus caustica.



caustica. Lenia sunt v. gr. succus granatorum acidorum, vel si ipsum pomum cum tota sua substantia pistetur, bulliat cum melle usque ad spissitudinem unguenti, ac imponatur polypo, carnem superfluam successivè erodit: Conferatur Forestus *libr. 13. observat. 18.* & M. A. N. C. *loc. all.* ubi pulvis ad polypum absumendum usualis extat: Vel sinapi pulverisatum, cum aceto mistum, ita immittatur & applicetur polypo. Succus onoposti (species est cardui) contusi specificus est, & sæpius admoveri debet. Sicut & ipsa herba contusa convenit etiam ad cancerum narium, mediante quo plures curavit rusticus, teste Borello *centur. 2. observat. 51.* Pulverem heliotropii specificè commendat Poterius ad polypum sine morfu absumendum, si cum gossypio naribus immittatur: vid. *centur. 3. observat. 63.* succus nasturtii aquatici crebrius cum gossypio admotus remedium dicitur, mediante quo plures curati fuerunt: Loco hujus per experientiam commendat Lindanus succum radices ari ex radice contusa expressus, cui intinctum gossypium naribus intrudatur, quod ter in die repetatur. Perinde autem esse dicit; an arum? an arisarum? an serpentaria pro hoc recipiantur?

Fortiores paulò sunt placentulæ ex Mercurio sublimato, ærugine, & fermento applicatæ, quas videb. in M. A. N. C. *Ann. 8. observat. 91. pag. 151.* spiritus minerales acidi quilibet successivè polypum absumunt: sic aqua forti tactus polypus statim flaccescit, cui tamen etiam aliquantulum auri pigmenti addi potest: Vel

℞. Succ. Granat. p. iij.

Ol. Oli. p. j.

Misc. S.

Verzehrende Mixtur.

Vel ℞. Ol. Oli. ʒj.

Alum. ussi ʒj.

¶ a Plantag. ʒj.

Misc. S. ut antè.

Irroretur hinc inde polypus.

Unguentum Ægyptiacum etiam eundem absumit: Sic Riolanus

℞. Cerati myrtin. ʒj.

Ungu. Ægypt. ʒij.

Misc. pro Linimento.

quò præterea feliciter uti solet in absumendis excrescentiis, callis, verrucis, condylomatibus. Hoc unguento attingendus sæpius polypus, aut turundæ extremum, quod attingit polypum, unguento eodem illinatur. Unguentum myrtinum, ubi non extat, ex tempore ita parari potest.

℞. Ol. myrtin. ʒj.

Palv. myrsill. ʒj.

Cera rubra q. l.

M. pro Cerato.

Ubi unguentum Ægyptiacum non suffecerit, acuetur Mercurio præcipitato, qui benè edulcoratus pluribus lotionibus additur: sarcoma egregiè absumit sine ullo aut exiguo dolore. Hic vel cum melle rosaceo miscendus, eoque intincta turunda in nares immittenda, vel hoc ipso imprægnetur unguentum ab Hartmanno, præsertim in *Praxi cap. 55. §. 1.* descriptum vel unguentum Ægyptiacum aut Apostolorum addatur: Vel ad imitationem Plateri:

℞. Unguentum Ægypt. ʒʒ.

Cort. granat.

Gallar. aa. ʒʒ.

Ol. Oli. ʒj.

Misc.

Quod si hujusmodi acria aut caustica adhibenda sint, cauti simus, ne partes narium vicinæ attingantur, adeoque vel per fistulam argenteam immittantur, ita, ut fistulæ extremitas polypum ambiat, & ita medicamenta ad eum ferri possint, intactis naribus: Aut gossypium aut turunda, medicamentis imbuta, applicentur, ita ut sarcoma tantum attingant.

Quod si cancrusus fuerit polypus, ne attingatur quidem metu majoris mali. Si exulceratus polypus sit, difficulter curatur, in eodem tamen aquæ & cineres ranarum & pulvis cancerorum, Saturnus calcinatus & dulcificatus, crocus Martis & similia adhibeantur: Vid. Hildanus *Epist. 61.*

Quoad remedia chirurgica: si à petiolo simplici hæreat polypus, ita ut commodè ferro possit rescindi, optimum est, ut abscindatur, aut saltem filo sericeo benè cerato circa radicem ligetur; sic enim intra aliquot dies nutrimento destitutus excidet; vel denique forcipe peculiari abscindatur, quem describit Sennertus *lib. 1. Prax. pag. 935.* Scultetus *Armamentar. pag. 9. & 10.* Abscissione facta adstringentibus hæmorrhagia sistatur. Ne verò redeat polypus, pulvis gentianæ cum succo scrophulariæ cum turunda naribus immittatur: de quo conf. Henricus ab Heer *observ. 28.*

## ARTICULUS III.

De

Odoratu Depravato

Et

Ozana.

Inter ea, quæ odoratum depravant, imprimis est ulcus vel abscessus in naribus latens, quod ubi vetustum est ac putridum, simulque foetorem tam ægro quàm adstantibus gravem continuò expirat, ozæna dicitur. Ulcus

Ulcus hujusmodi nunc successivè serpit, & partes vicinas erodit, nunc occasionem suggerit, ut polypus superveniat, nunc copiosam saniem plus minus acrem, plus minus sordidam, affluere facit, nunc graviolem hæmorrhagiam narium infert.

PARS AFFECTA.

Pars affecta sunt nunc partes solùm molles membranose in naribus, nunc verò etiam interstitia cartilaginosa & ossea, nunc ipsum os cribrosum, plus minus simul affectum.

CAUSÆ.

Causæ sunt nunc externæ, nunc internæ: Illæ varia inspirata: Hæ in specie lues Venerea, quæ inquinando lympham, membranas narium oblinentem, frequentes ozænas junctas habere solet.

PROGNOSIS.

Sunt autem quælibet narium ulcera curatu difficilia.

Recentia ac munda facilius curantur, immunda, sordida, crustosa, &c. difficulter curantur, præsertim si simul os ethmoides inferint.

Denique cautè tractanda sunt, ne cancrofa fiant.

CURA ODORATUS DEPRAVATI.

Cura odoratus depravati est facilis, modò curetur vel lues Venerea, vel ulcus. Interim tamen pro palliativo remedio optimum est, ut recipiatur Vinum, in quo decoctum fuerit centaurium minus & calamus aromaticus, quod omni manè & vespere è vola manus attrahatur in nares tamdiu, donec in palato sentiat, & ita ulcus mundificetur. Vel mel acuatur cum myrrha, saccharo candi & pauco cinnamomo: quod dilutum cum s. q. aquæ majoranæ intra nares attrahatur, ut ad palatum usque penetrare valeat.

CURA OZÆNÆ.

Quoad curam verò ozænæ, præmissis præmittendis, præsertim Mercurialibus internis, ulcus mundificandum, & hinc consolidandum. Si levius fuerit, curatur per folia nicotianæ recentia concisa naribus immissa, & cum per aliquot menses ibi sunt retenti, eximantur & illinantur:

℞. Ungu. de nicot. vel albi camph. ʒij.  
Bals. ʒis ad extra ʒj.

M. S.

Reinigende Salbe.

Continuato horum usu subinde cedit. Nam nicotiana & unguentum ex nicotiana, quod describit Weckerus in *Antitod.* perquam egregium est, hoc imprimis peculiare obtinens,

Tom. II.

quod ante mundificationem non consolidet: Hinc etiam unguentum nicotianæ laminæ Saturni inductum, ac ita applicatum, ceu expertum comendat Velschius *Hecat. 2. pag. 24.*

Quod si verò crusta adfuerit; vel oleo amygdalarum dulcium vel oleo rosarum vel butyro recent. non salito illita crusta prius removenda, & hinc mundificantibus pergendum. Vi excutienda crusta non venit, ne irritetur ulcus & fluxio exasperetur.

Inter mundificantia egregium est horminum sylvestre seu sclarea, decocta cum pauco melle rosato, & ita subindè applicata, & dein singulis mensibus repetatur, ne recrudescat malum: Aut recipiatur succus sclaræ, subigatur cum melle rosato, ut fiat unguentum bene mundificans: Quorum loco decoctum agrimonie & verbenæ cum melle, item urina pueri, subinde injici & applicari possunt; aut usurpetur unguentum mundificans Hildani expertum *Cent. 2. obs. 22.* Fumus quoque candelæ ex cera rubra naribus exceptus egregius est, & in ulcere inveterato à Rondeletio expertus: Nempe cinnabaris est, unde hæc efficacia dependet, unde aliis additis candelæ compositæ pro hoc usu fieri possunt. Formulas videbitis in Hartmanni *Praxi Chym. cap. 52. §. 6.* Aut etiam usurpentur alii fumi cinnabarini compositi ad imitationem Barbette *l. 3. Chirurg. c. 7.* Utilis quoque est aqua Sennertii *lib. 1. Prax. Part. 3. sect. 4. cap. 1.*

Quod si his ipsis contumacius malum cedere nolit, Mercurialia sunt optima: imprimis jam dictæ mixturæ Mercurii sublimati gr. vj. vel ʒß. addi potest, aut Mercurius dulcis cum aqua plantaginis subinde applicetur: c. g.

℞. ∇ a Plantag. ʒiv.

℞-si gr. xij. M.

solutio filtrata usurpetur pro mundificanda ozæna.

Poterius sanè mumiâ sua minerali, ex Mercurio dulci probe edulcorato cum unguento rosaceo plures, præmissis universalibus, maligno ulcere narium, herpete exedente, &c. curavit. *Cent. 3. Cur. cap. 80, 86, 13. &c.* In specie in ozænis Gallicis optimum est Mercurius præcipitatus cum unguento rosaceo subactus, & mediante turundâ locis affectis applicatus. Alias unguentum Ægyptiacum, item aqua viridis Hartmanni, cum penicillo contumaciores ozænas aut similes partium vicinarum exulcerationes curat: Videatur *Prax. Chim. cap. 53. §. 5.* Vel oleum vitrioli, in quo parum gossypii madefiat, eoque duabus vel tribus vicibus optimè tangatur, quo facto debitis unguentis curetur. Remedium est optimum ad interna narium ulcera, quantumcunque fuerint maligna: Vid. Ferrara *Obs. Chirurg. 88.*

(Hhh hh)

SECTIO

## S E C T I O III.

De

## SENSUUM INTERNORUM

ET

*Functionum Animalium Læsione.*

## CAPUT I.

De

*Vertigine.*

**V**ertigo, ita à vertendo dicta, est iste affectus, quo omnia extrinsecus circumagi, & tam ipsum caput & corpus ægri, quam omnia nos ambientia & oculis apparentia corpora, quasi in circulum rotari & gyri videntur, utut hæc omnia sint firmissima, nulloque pacto gyrentur. Per artem imitari possumus hunc affectum clausis oculis corpus celeriter circumgyrando; sic enim subitâ quiete apertis oculis tanquam vertiginosis omnia circumagi videntur: Nonnaturaliter hoc fit in ebriosis, quibus pariter omnia videntur in gyrum agi. Interim tamen non necesse est, ut semper fiat circumgyratio. Sufficit enim motus tremulus & undulatorius & similis: Nempe est similis affectus isti, qui nobis accidit, quando corpus in circulum agitamus, vel quando diutius aspicimus rotas circa axin circumactas.

Ratione graduum triplex esse solet Vertigo:

1. Vertigo simplex, utut promiscuè sic dicta, quæ Græcis *ἄνωγος* & *ἰσχυρὸς* audit, quando saltim corpus ægri & omnia exteriora circumagi aut circumgyrari, & omnia nunc sursum, nunc deorsum, nunc alio modo moveri videntur, subito tamen evanescente *φαινόμενον*.
2. Gradus secundus est *σκότωμα* & *σκοτόδιον* aut *σκότωμα σκοτεινόν*, Vertigo tenebrosa seu scotomia, in qua oculi simul velut affusâ caligine obscurantur, ita ut visus tandē omninò pereat, aut etiam varii colores, obscuri, flavi, cœrulei, virides, nigricantes, &c. coram oculis versari videntur, qui insequente tali caligine evanescent.
3. Tertius gradus est vertigo caduca, quando ista oculorum caligo vertiginosa in tantū invalescit, ut protinus æger concidat, nisi prehensus, aut proximis adminiculis prehensus, se fulciat.

Crebrò huic vertigini leves motus convulsivi, & deinde vera epileptica affectio, huic ultimo gradui superveniunt, unde proximus ad

epilepsiam, interdum apoplexiam, gradus haberi solet, propterea parva epilepsia quibusdam vocatur; cum econtrà epilepsia levioribus comitatæ convulsionibus Vertigines graviores interdum Practicis dicantur. Vix enim est insultus epilepticus qualiscunque, quæ non aut antecedit aut proximè comitetur vertigo gravior aut scotomia; Unde ingruente insultu epileptico ferè dicunt: *Es werde ihn gang wunderlich vor den Augen/schwarz/ grün und gelb*: sicut alias quæcunque spirituum animalium ecclipses & deliquia insigniora & in motu ataxias & antecedere & comitari solet vertigo, ut v.g. in lipothymiis, doloribus ingentibus, gravioribus paroxysmis hysteriis, &c. manifestum est.

A gyratione ergò & rotatione, ceu nobiliore symptomate, vertiginis ratio imprimis desumitur: Nihilominus tamen, præter oculos, & alii sensus simul afficiuntur, imprimis in secundo & tertio vertigis gradu: Nam sibilus & tinnitus, quin & raucus interdum & obtusus sonus in auribus percipitur; subinde in tertio gradu perit motus membrorum, & licet apprehendant ægri adminicula, quibus se fulciant, tamen sæpius eadem minus firmiter comprehendere valent, ita ut tandem concidant.

## PARS AFFECTA.

Quoad vertiginis subjectum: vulgò rotationem spirituum animalium in cerebro esse causam istius apparentiæ existimant, quod tamen falsum est: in oculis enim simpliciter, non vitio cerebri, fit ista rotatio seu motus iste inordinatus; nam visui res gyri & similia pathemata apparent. In organo ergo visionis seu oculo necessariò erit vitium, cum in cerebro non videamus. Nemo sanè concipere poterit, quomodo spiritus in cerebro agitatus apparere res faciat rotari extra oculum? Vertigo scilicet fit in medio videndi, non in vidente ipso, uti neque in objecto viso; Medium verò hoc est oculus. Par ratio est, quando oculis videntur obversari nubeculæ, flocculi, muscæ, &c. quæ res videntur esse in aëre, cum tamen revera sint in oculo, in specie in humore ejus aqueo, unde etiam dum res externæ gyri videntur, hoc fit in oculo, non extra oculum, vel in cerebro, vel objecto externo. Nemo est, cui non igniculi vel flammulæ noctu in tussi graviori vel percussione oculorū in aëre versa-



versari & extrinsecus moveri videantur, quæ omnia tamen revera sunt in oculo; hoc enim non saltem fit in tenebris, sed etiam in quibusdam interdiu; ita etiam dum externa objecta gyrari videntur, talis motus fit in oculo. Quod si quis vulgari scholasticæ Philosophiæ additus dicere velit; revera visionem formaliter fieri in sensu comuni, non verò in oculo, cum oculus non videat, sed sensus communis tantum, unde gyrati spiritus in medulla cerebri circa principium nervorum, ubi fit sensus communis, vertiginem inferant; Respondeo ipsi ex illius hypothésibus, quas tamen nullo modo facio meas, distinguendo inter circumgyrationem ipsam, & ipsius motus apparentiam, ejusque à nobis perceptionem. Concedo ex eorum hypothési, ipsam apparentiam quidem, seu representationem ipsius circumgyrationis, fieri in sensu communi, adeoque in cerebro, non verò actualement circumgyrationem, quæ causa est talis vertiginis. Totum hoc negotium, appposito simili, desumpto à speculo, illustrat Petrus Johannes Faber in *Pathol. sua*. Nempe si habemus vitrum aquâ plenum, & per hoc videmus objecta externa, illa videntur quæta, quamvis liquor agitetur; si verò accipimus speculum, hocque movemus, pro motu speculi etiam objecta externa simul moveri videntur; & si in gyrum rotatur speculum, etiam ipsa objecta circumvoluta apparent: conf. Willisius de *Anim. Brutor. Part. 2. cap. 7. pag. 204.*

## CAUSÆ.

Causa ergo vertiginis proxima & generalis, ad quasvis earum differentias se extendens, est inordinatus, confusus plus minus, ac interdum planè interruptus spirituum animalium in oculo motus: hic in secundo gradu ille in priore; & in partes externas influxus, unde omnia cetera dependent symptomata; quæ pluribus videantur adducta in Willisio *l. 2.*

Motus hic dum fit in oculo, & dum spiritus animales in oculo rotundo concamerato agitantur, hinc necessariò rotundo motu in gyrum agitantur & moventur. Quod si sub motu isto spirituum animalium, perturbato nimis, penitus deficiat spirituum dictorum radius in oculis, caligine & tenebris oculi obscurari videntur. Verum non in solo oculo, sed in reliquis etiam sensuum organis, præsertim auribus, similis fit inordinata agitatio, unde & sonitus aurium; in partibus verò externis minus firma objectorum apprehensio & casus contingere solet: adeoque sicuti visus naturalis fit per contactum radiorum visualium ad tunicam retinam, & sicut contactus seu appulsus aeris interni, moti ad tunicam cochleæ nerveam, auditum excitat; ita etiam

spiritus animales, qui in vertigine se habent instar aquæ communis in vitro, in oculo gyrati, dum sub motu illo illidunt in tunicam retinam, ejusdem fibrillas agitant, & ibidem impulsionem faciunt, talem objectorum visorum circumgyrationem apparere faciunt; sicuti appulsus ad tunicam cochleæ sonitus istos apparere facit. Sanè peculiarem & ipsius tunicæ retinæ simul concurrere motum, patet simul ex variis coloribus, imò & splendoribus, subinde in vertigine caduca, quando denuò ingruit paroxysmus, ante oculos apparentibus; item epilepticis, nec non mulieribus hysteriis, ingruente paroxysmo; item ebriis, tales colores & splendores interdum ante oculos versari videntur, flavi, cœrulei, virides, & similes; quia in dictis affectibus ab inordinato motu spirituum in fibris tunicæ retinæ talis impulsus seu motus fit, qualis aliàs fit à radiis visualibus ab objectis luteis vel cœruleis, aut splendentibus in oculum illabescentibus, & tunicam retinam determinato motu ferientibus, ut alius motus fit, quando objectum apparet album, alius, quando nigrum, &c. sic si à causa interna talis motus in tunica retina excitatur, simile fit in sensu communi iudicium, & similis apparitio, unde cogitamus, tales esse colores; vid. Boyle. Imò si nimis inordinatus & tantum non interruptus fit motus, præsertim ad oculum, in tantum visus exinde perturbatur, ut etiam obscuratio oculi & caliginis apparentia superveniat.

Quod attinet caliginem; hujus alia ratio est, quod nempe videantur tenebræ. Caliginis talis sensus fit, non tam ex perverso spirituum motu, sed quando nihil videmus, nocipimus tenebras, quando claudimus oculos, caliginem percipimus in oculo. Fit igitur, dum in interrupto spirituum animalium motu abruptitur eorundem ordinata & radiosa series, & in specie in oculis iidem deficere incipiunt, videntur adesse tenebræ, unde caligo quasi representatur. Ulteriùs, si ex spirituum istorum animalium inordinato motu ad mæculos usque fit continuatio, nunc ex eorum hinc inde quasi abruptorum defectu cessans objectorum apprehensio & casus, dum simul volunt cadere ægri, quia spiritus non sufficiunt pro apprehensione adminiculi; nunc ex inordinato influxu leves convulsiones, imò interdum graves epileptici insultus, superveniunt. Adeoque non solum spiritus visorius in oculis immediatè perturbari videtur in vertiginis affectu, quin totum spirituum animalium systema impetuosius in cerebro concitari in graviore vertigine videtur, ita ut & reliquorum sensuum organa simul afficiantur. Qui affectus verò, quia imprimis in oculo ste notabilis beneficio gyri, ob id à principali fit denominatio, & vertigo appellatur,

(H h h h h 2)

latur,

latur, cum posteriores duo gradus ad lipothymias vitio spirituum animalium propius accedant.

Quæstio jam est de causa remota; unde iste motus spirituum inordinatus in cerebro, & hinc in organis sensuum, dependeat, pro qua motus varietate variz fiunt apparitiones in organis sensuum? Hujus ratione vertigo est vel per essentiam, quæ morbum constituit, v. g. ab affecto cerebro qualicunque immediate orto; aut ratione vitii cujusdam in cerebro conturbantis spiritus animales, quando vertigo post plagas aut cerebri concussiones sequitur: vel per consensum, quæ est saltem symptoma morborum aliorum, quando v. g. vitio stomachi, aut partium quarundam inferiorum, uti à passione hysterica, &c. Vertigo oritur. Sed verum ut fatear, rarissima est vertigo per essentiam, quando quidem quotidiana Praxis & Practicorum observationes monstrant, vertiginem fere omnem esse ex vitio partium inferiorum, utut diutius affligens & sæpè recurrens usque eò spiritus animales & cerebri texturam per motus spirituum præternaturales alterare & immutare valeat, ut tandem ex vitio cerebri proximo affligere videatur. Adeoque si est per essentiam vertigo, ferè occasione causæ antecedentis externæ caput ac cerebrum plus minus lædentis successivè oritur; vel quod crebriore affectione vertiginis cerebrum & spirituum animalium systema ita sit dispositum, ut cerebrum quasi per essentiam videatur affici, ratò à causa interna. Utraque est vel habitualis, seu ferè nullo non tempore afficiens ac à causa interna ac radicata dependens; vel accidentalis, à causa tantum evidente oriunda, hinc non, nisi hac præsentè affligens.

Partes istæ, quarum consensu fit vertigo, primariò est ventriculus, speciatim à sordibus vitiosis in aut circa eum commotis. Hujus varis peccata, imprimis vitiosus sui generis acor volatilis, orificium superius affligens, vertiginem infert, propter spirituum animalium versus cerebrum recursum inordinatum. Hinc enim frequenter juvenes diligenter literis incumbentes, in specie etiam senes, sæpius sunt vertiginosi; quamdiu jejunus est stomachus; subitò verò atque unam vel alteram tantum panis buccellam aut similis esculenti comederint, malum cessat; unde etiam matutinis horis tantillum comedendo vertiginem talem sæpius præcavent. Hinc etiam qui laborant affectu hypochondriaco, ordinariò sunt vertiginosi, specialiter quando sunt jejuni. Pertinent huc hysterice mulieres, quæ admodum sunt vertiginosæ, & ut plurimum præcedentibus scotomiis suffocatio dicta uterina inchoat, aut etiam incipiente paroxysmo hysterico, & dum adhuc pri-

mos insultus sentiunt circa præcordia, vertigine gravi subinde corripuntur, in qua tamen malè uterus acculatur, utpote qui est insons; est enim saltem modus quidam affectus hypochondriaci hæc suffocatio. Senes etiam, ut dictum, sæpissimè vertigini, ex stomacho sunt obnoxii, concurrentibus tamen simul proximè spiritibus animalibus debilioribus, cum vitiata simul plus minus cerebri textura; unde vel levi occasione, nempe capitis refrigeratione, attentà meditatione, aut levi corporis agitatione, paroxysmo vertiginis corripuntur; imprimis pejus habent, dum sunt jejuni. Ebrietas quoque ad vertiginem disponit, unde ebriosi omnes vertiginosi sunt; **Sie sehen alle doppelt**; in paroxysmo quidem per essentiam vitio spirituum animalium ab alimento nondum ritè assimilato, ut & spiritu vinoso inordinatè vel confusè agitatorum; extra paroxysmum verò ebrietatis vertiginem saltem per consensum ventriculi patiuntur. Porro nonnulla assumpta, v. gr. flatulenti cibi sic dicti, ut cepæ, allium, nasturtium, rapa, brassica, raphanus hortensis & rusticanus, & similia oleracea, etiamnum in ventriculo hærentia, in quibusdam etiam spiritus salis Ammoniaci vertiginem & scotomiam in nonnullis excitant. Imprimis sordes præternaturaliter, fortius impactæ orificio stomachi, commotæ vertiginem inferunt, unde si proprium fermentum stomachi jejunum has sordes aggrediatur, vertiginem infert. Vitia quoque intestinorum, v. g. vermes, subinde graves inferunt vertigines & scotomias; sicut etiam interdum epilepticas convulsiones. Præterea tamen ex liene, utero malè constituto, renibus, aliisque partibus nerveis insignioribus, per consensum itidem oriri potest vertigo. Sic etiam calculus renum, ex pelvi in ureteres promotus, in quibusdam graves inferre solet vertigines & scotomias. Quò etiam facit vertigo à dolore acuto, ulcere, aut sphacelo artuum, cujus Willisius l. 4. meminit.

Sed quomodo fiat talis vertigo per consensum? quæstio est. Vulgò ad vapores, exhalationes, & effumationes ex inferioribus partibus in cerebrum elevatis confugiunt: Sed impossibilis est horum vaporum transitus, viis omnibus sufficienter munitis, imprimis cum etiam Helmontius in suis scriptis, & hinc Schneiderus de catarrh. libr. tribus, sufficienter hos discusserint. Dicendum potius, subesse tunc ut plurimum leviores partium internarum spasmos, quorum occasione spirituum versus cerebrum radiativorum inordinatus & quasi undulatorius in eo supervenit motus, & quasi resiliionis impetus, qui reliquas eorum copias in cerebro impetuosius commovens, eosdem in motus inordinatos & confusos cogit, sicque vertiginem infert: Vid. imprimis Willi-

**Willisius de Morb. convulsiv.** Dum verò spirituum iste recursus & resiliens plus minus vehemens ab objecto inadæquato, præternaturaliter partem sensilem nerveam vehementius afficiente, nata contingit, & ad cerebrum usque defertur, formicatio talis, seu velut auræ frigidae adscensus, persentiri videtur; ut hoc non in omnibus æquè contingat: e. gr. ex graviore in quodam loco dolore quidam vertiginosi redduntur objecti dolorifici occasione, spiritibus ad partem dolentem commotis, & aliquid spasmodici plus minus efficientibus: fortioris verò ab objecto doloroso impressionis ratione repulsi, iidem & quasi resiliens, vertiginis pathema inferunt. Exemplum dicta illustrans est, quod refert *Fonsæca libr. 2. consult. 30.* ubi refertur mulier, quæ incepit pati per intervalla hebetudinem quandam repentinam circa oculos, cum quadam ventris perturbatione, quo tempore corpus regere non poterat, ni caderet: tempore accessionis dicit se sentire fumum quendam ex partibus ventris sursum ascendentem, parum tamen durare hoc symptoma: simul admodum prompta est ad vomitum, ita ut quotidie ferè evomat biliosa ac bituitosa. Malum hoc est affectus ille, quem vertiginem per consensum uteri vocant, cum tamen circa hypochondria minora, materia & occasio sensibilis, delitescat, quod vomitus persuadet: quæ commotâ, & partibus nerveis istorum locorum alteratis, supra explicato modo fumi adscensum repræsentat, donec vertigo superveniat. Sic *Bartholinus Centur. 5. Histor. 74.* habet vertiginem quinque annorum vaporis instar ex pede sinistro in caput ascendentis, accedente simul vago capitis dolore: qui ascensus reverà nil aliud est, nisi spasmus nervorum ad pedes protensorum, qui antecedit occasione objecti irritantis: impetuosius autem inde resiliens spiritibus, nervi successive spasmò correpti talem motum adscensionis apparere faciunt, unde vulgò vapores & fumi adscendentes accusantur. In praxi sæpius occurrit, quando ægri dicunt: **Es freucht gang hinauff/ich kan es fühlen:** Pluribus deduxit *Willisius in Anat. Cerebri, Patholog. cerebri, & de Anima Brutor. lib. 2. cap. de Vertigine.*

Quod attinet vertiginem per essentiam, ferè triplici modo fieri solet:

1. A conformatione cerebri plus minus vitiosa occasione causarum externarum, quando per contusiones, plagas, concussiones cerebri, casus ab alto fortiores, vulnera capitis graviora, vel etiam sanata, & similes causas, quæ quoscunque poros cerebri, & canales ejusdem minutos, adeoque ipsam texturam, ita immutare valent,

ut spirituum animalium cursibus & expansionibus naturalibus impeditis hi ipsi postmodum vitioso & inordinato moveantur motu: Sic *Deodatus* observavit vertiginem ex casu ab equo, ita ut tandem supervenerit apoplexia lethalis; interdum, sed raro, sine talibus manifestis causis læsione cerebri interna, indeque collectio heterogenei, causa occasionalis vertiginis existit. Faciunt nempe huc fumi metallici, in specie Mercuriales, qui frequentius hausti per nares imprimis cerebrum affligunt, cujus exemplum recenset *Frambesarius lib. 2. consult. 3.* de vertigine tenebrosa, sine ulla intermissione in chirurgo, qui crebrò lue Gallica infectos curaverat beneficio inunctionis Mercurialis, unde à virulentia Mercuriali generi nervoso ac cerebro infecta, ipsi communicata, malum ortum traxisse probabile est.

2. Ab heterogeneitatibus cum sanguine ad cerebrum adductis: Heterogeneum istud in cerebro existens triplici modo vertiginem infert (1.) quando aliquid heterogenei sanguini & spiritibus animalibus est permixtum, ut fit v. g. in paroxysmo ebrietatis, vitio nempe spirituum animalium per spiritus vini copiam inquinatum; Idem etiam fit sub haustu fumi tabaci in non aduetsis: (2.) quando aliquid excrementitii præternaturalis cerebro immixtum fuerit cum sanguine aut sero influentibus; hinc enim suppressiones sanguinis consuetæ extraordinariè subinde vertigines inferunt: (3.) quando ex læsione ipsius cerebri quacunque ex vitio digestionis privatarum recrementa varia in eodem generantur, à quibus retentis spiritus animales turbantur, sic v. gr. ex sero caput & cerebri interiora replente vertiginem observavit *Platerus observat. pag. 102.* & *Sculdetus Armament. observat. 19.* Vertiginem in juvene ex vesiculis aqua limpidâ plenis in cerebri sinistra parte inventis, observavit *Wepferus Tract. de Apoplex. pag. 9. & 70.* & *Rosinckius Dissertat. Anatom. lib. 1. cap. 13.* Item similia exempla ferè habet *Sculdetus in Observat. Chirurg. observat. 10. 11. & observat. 25.* refert faminam ex contusione tyncipitis curatam, quam insecta vertigo gravissima, quæ tandem in apoplexiam desivit: aperto cranio repertus fuit tolliculus aquosus in cerebro, sic *Zacutus Lusitanus (Hhhhh 3) libr. 7.*



*libr. 7. Med. Princ. Histor. observat. 12.* observat paroxysmum vertiginis per abscessum materię purulentę ex aure aliquoties curatum. Facit huc vertigo singularis Schenckii *in observat. ubi de Vertigine*, curata ingenti purulentę materię per dentium alveolos & os excretionē: à vermibus vid. Bonetti *sepulchr. lib. 1. sect. 1. obs. 116.* & spacio cerebri, vid. Bartholini *Acta Hafniens. vol. 1. obs. 33.*

3. Ob sanguinis & spirituum defectum, v.g. in syncope, vigiliis diuturnis, longiore inedia, hæmorrhagiis, gonorrhæis, &c. Hinc ex nimia Venere vertiginem cum aphonía & intolerabili capitis dolore notat Ballonius *in suis Histor.*

### DIAGNOSIS.

Signa vertiginis partim ex antedictis per se patent, partim ex relatione ægri cognoscuntur, saltem observanda sunt signa distinctiva vertiginis per essentiam & per consensum.

Per essentiam vertigines fieri suspicio tunc est, quando morbi capitis præcesserint graviores, vel vertiginem concomitantur, v. gr. insomnia graviora, dolor capitis, aurium tinnitus, &c. aut etiam si externę quædam læsiones seu molestię, v. gr. vulnera, &c. antea acciderint capiti.

Per consensum verò fieri vertiginem suspicio est; quando non propriè affligit cerebrum, sed si sine dictorum præsentia & cum debilitate & noxa partium aliarum inferiorum, ut affectu hypochondriaco aut hysterico, vertigo observatur: Ita v. gr. ventriculū, vertiginis autorem, existere, dignoscitur ex hujus symptomatis, quando per vomitum vertigo aut levatur, aut insigniter curatur; item si vertigo ante pastum potius, quam à pastu affligat, aut post assumptum alimentum quodcunque vertigo fiat levior, &c. vertigines stomachales enim rarò affligunt à pastu.

Vertigines mulierum hysteriarum, & hypochondriacorum per se patent.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: observandum est, quod vertigo symptomatice accidentalis levior ac recens parum habeat in recessu, & curatu facilis existat: habitualis verò: gravior præcipuè & diuturnior, imprimis scotomia, in specie citra manifestam causam externam inchoans, hypochondriaci mali ferè sit indicium & difficulter curetur: ut plurimum verò in senibus apoplexiam, in junioribus epilepsiam, certissimè prænunciat.

Sanè in senibus vertigo confirmata rarò fallit, quin comitem secum ducat apoplexiam: Unde etiam vertigo in senibus longè periculosior ac difficilius curabilis, quam in junioribus.

Hinc pro varietate graduum etiam plus vel minus affligit: si quidem vertigo caduca omnium gravissima & periculosissima est; minus vertigo tenebricans, quando simul caput & corpus gyratur; minimè omnium vertigo simplex, in qua tantummodò externa circumagi videntur, non tamen caput aut totum corpus.

Quia autem modò anteriorem, modò posteriorem magis, capitis partem afficit, illa pariter magis tuta & curabilis est, dum nunquam vel hæmorrhagiæ narium, vel mensium & hæmorrhoidum fluxu solvitur: vid. Loffii *Observat. libr. 1. observat. 9.* ubi vertigo nullis cedens remediis tandem casu ab alto, superveniente hæmorrhagia narium, curata est: Quàm verisimile est, à sanguine provenisse, ex toto corpore per arterias in cerebri ventriculum anteriorem irrepuisse, qui in plexu choroide agitatus turbulentos sensus & motus reddiderit; quamvis interdum in cephalicam quoque commutetur: e contra hæc, quia spirituum ad nervos influxum magis turbat, longè periculosior observatur, quatenus frequentius in apoplexiam, paralytin & morbos convulsivos abit, vid. Willisius *l. 1.*

### CURA.

In cura hujus morbi duo tempora consideranda sunt:

1. Tempus extra paroxysmum, ut præservatio instituat; &
2. Tempus in paroxysmo, in specie vertiginis caducę, ut ritè sistatur, & curatio peragatur.

Quoad præservationem, seu curationem extra paroxysmum: ea respicit fomitem morbosum, ubi in specie causa antecedens vertiginis perferenda & removenda, adeoque præsertim viscerum abdominis ratio habenda, hinc spiritus animales appropriatis & roborandi, & impetuosus eorum motus sistendus: & cum malum frequentissimum sit per consensum ex stomacho seu primis viis, ob id vomitoria juxta Hippocratem *libr. 4. Aphor. 17.* & hinc remedia stomachica & aromatica communiter dicta, primatum obtinent; quibus subjungantur specifica, vertigini dicata. Vomitoriis, si fomes extra ventriculum & vertigo diuturna fuerit, substitui solent purgantia, eaque blandiora; nam fortia omninò erunt vitanda (juxta Hippocratem *Prorrhæ. l. 1. c. 9.*) utpote quæ vertiginosos motus etiam in non-vertiginosis cient; vid. à Cruce *de Quas. per Epist. Cent. 4.*

pag. 427. Cum verò in genere supra dictum sit, vertiginem graviolem esse parvam quasi epilepsiam, & hanc subinde illam insequi, hinc vertiginem in specie omnia ea appropriata sistunt, quæ epilepsiæ conveniunt; sicuti econtrà omnia antivertiginosa etiam epilepsiæ medentur.

Venæsectio per se vix convenit. Interdum tamen, ubi adest ordinaria sanguinis evacuatio suppressa, vel ubi est sanguis copiosus cum vita sedentaria, aut hic facile sit ebulliens ac turgescens, qui aliis flatuosus dicitur, aut quando à sanguine plus minus fovetur malum, tunc optimè conducunt venæ sectiones: de quo vid. imprimis Horstius in suis *Probl. dec. 2. Qu. 3.* item Sennertus *Prax. l. 1. Part. 2. cap. 4. pag. 269.* sicut etiam vertiginem diuturnam hæmorrhagiâ narium casuali solutam Loffius *lib. 1. observat. 18.* testatur: imò idem Horstius *l. a.* Platerus, & Sylvaticus *cent. 1. conf. 40.* arteriotomiam quoque interdum commendant.

Observandum: à Sternutatoriis omninò esse abstinendum, cum in vertigine per consensum nil conferant, in essentiali autem nihil evacuetur ex cerebro, sed saltem circa nares & partes vicinas: genus nervosum nimis commovent, indeque failè spiritus animales in inordinatos motus cogunt: & quamvis nonnulla vitiosæ materiæ pars evacuari videatur, tamen symptoma exinde potius magis concitatur quia metus est, ne excitetur convulsio thoracis, & sic ad epilepsiam promptius disponatur æger. Ut taceam sternutationem oculis minus esse convenientem, sed potius nocivam.

Fonticuli, vesicatoria, & setacea, in senibus & subjectis cacochymico-ferosis, in vertigine imprimis per essentiam inveterata, curativè, & ratione apoplexiæ præservativè, sunt optimi & singularis usus, brachio inusti, ubi affectus simplex: capiti verò aut nuchæ in vertigine caduca, aut apoplexiam aut epilepsiam minitante: vid. Zacutus Lusitanus *libr. 1. Prax. Admir. observat. 78.* Si verò ex suppressis hæmorrhoidibus, vitio uteri, ulcere aut fistula coalescente, cruribus inuendi.

Præmissis ergò præmittendis, factâ totius corporis purgatione, sedato paroxysmo, in præservatione opera danda, ne redeat malum, adeoque imprimis vel roboretur stomachus, & alteretur digestio vitiata, vel specificè vertigini resistatur.

Quoad stomachica: inter talia eminent aromatica volatilia & paulò acriora, ac vi aromaticâ prædita, quæ imprimis senibus conveniunt, v. g. galanga, zingiber, nux moschata, cubebæ, semen sinapi & similia. Idem etiam convenit senibus, quando sub vertigine metus est apoplexiæ, e. g.

℞. Galang. ʒʒ.

Cubebar. ʒij.

Sacch. ʒiʒ.

M. f. Tragea.

D. S.

### Haupt-stärkend Trisneeth.

de qua assumantur ʒij. cum pane biscocto, vino generoso intincto, horâ unâ alterâve ante cœnam & prandium.

Vel ad imitationem Lindani usurpetur pulvis:

℞. Gran. Pæon.

Coriandr.

Nuc. moschat.

Visc. querc.

Cubebar.

Galang. aa. ʒij.

Piper. long.

Zingib.

Rad. tormentill.

fol. rorismar. aa. ʒj. M. F. pulvis.

de quo sumatur mar. è & vesperi ʒiʒ. sive cum, sive sine saccharo pro lubitu.

Imò vel sola galanga mista cum succinò ab eodem commendatur ad curam vertiginis. Convenit itidem elixir proprietatis mistum cum spiritu mastichino, sicut in genere omnia mastichina, præsertim in vertigine à stomacho, sunt optima: item elixyr menthæ & similia cum spiritu mastichis mista, præservant à vertigine. In senibus ad præcavendam vertiginem simulque apoplexiam, convenit imprimis electuarium ex aromatibus stomachicis crebrius usurpatum:

℞. Conf. fl. anthos

salvia aa. ʒvj.

Majoran. ʒʒ.

Zingib. in Ind. cond.

Nuc. Mosch. cond. aa. ʒiij. l. ʒʒ.

sem. eruca

sinapi aa. ʒiij.

Succini præpar. ʒij.

Cardam.

Cubebar.

Galang. aa. ʒj.

His vol. Succin. ʒʒ.

~ Ceras. nigr. ʒj

Cum f. q. Syr. fl. tunica f. electuarium:

D. S.

### Haupt- und Magen-Parwerge auff etliche mahl.

Ditioribus addi potest aliquantulum confectiois alchermes, quæ ratione ambræ & moschi senibus imprimis conducit. Capiatur omni manè & sub introitu lecti quantitas nucis castaneæ; post pastum verò masticientur sem. sinapi pug. ij. l. iij.

His equidem vertigo accidentalis seu minus inveterata, præsertim per consensum, curari

curari solet: In habituali seu inveterato malo verò undecunque nato requiruntur præterea, ista tamen non neglectis, specifica vertigini appropriata: qualia ex regno vegetabili sunt radix doronici imprimis, cherefolium, calendula, salvia, rosmarinus, buxus, thea, cubebæ, semen sinapi, flores liliorum convallium, radix pœoniæ, de qua vid. Riverius *observat. communis*. & in genere quælibet cætera cephalica & epileptica. Doronicum quidem singulariter à quibusdam laudatur ad curam vertiginis: Sed vereor, ne ex præconcepta magis opinione, quam rei veritate fiat. Putant enim rupicapras alpinas ejus usu reddi aptas, ut citra vertiginem montes adscendant; quod ipsum tamen naturæ proprium & consuetudinis videtur beneficium. Unde etiam lapis in eorum stomachis repertus, seu, ut alii vocant, Ægagropila, pulverisatus assumtus commendatur à Wormio contra Vertiginem. Quidam parant ex doronico essentiam, eamque singulariter ad vertiginem commendant. Funambuli quoque ejus usu contra vertiginem se munire dicuntur, saltando in funibus, quod ipsi sibi tanquam singulare secretum reservant. Salvix decoctum in aqua vel vino, tam interno usu quam externo, si eo abluatur caput, ac applicetur fronti & temporibus, singulariter laudatur à Stœckero in *Praxi*. Essentia salvix cum spiritu proprio parata non est inconveniens. Sanè aliquando essentiam compositam ex solo cherefolio & roremarino proficuum in vertigine per consensum expertus sum; item essentiam catarrhalem Michaëlis, vel essentiam ex ana salvix, castorei, zedoariæ cum spiritu salis Ammoniaci paratam, ad 40. guttas exhibitam, vel aliud sal volatile aromaticum & oleosum à 30. ad 40. guttas. Rosmarinus ejusque essentia admodum commendatur à Ferdinando in contumacissima vertigine, in specie, si exasperetur malum in frigore hyberno, id quod senibus ferè familiare, tunc essentia modò ex roremarino admodum convenit.

℞. *Ess. cherefol.*

*salvia*

*Ocymis. basil. aa. ʒj.*

*Castor. ʒiʒ.*

*Ambra ʒʒ.*

M. D. S.

**Haupt: stärkende Essenz wider den Schwindel.**

Dosis 40. bis 50. Tropfen bis in die per biberium ante pastum.

Buxus, in specie ejus oleum destillatum, uti in epilepsia, ita in vertigine optimum judicatur remedium intus & extra, quod Fonseca *Consil.* 16. mirè laudat, singularem vim

habet narcoticam, extra quidem iungendo quotidie temporum arterias post aures, hinc pulsus in manibus ac pedibus; intus verò propinat,

℞. *Conf. fl. anthos vel calend. ʒiij.*

*ol. destill. buxi*

*Nuc. mosch.*

*Mentha aa. ʒiʒ.*

Cum f. q. *syr. cort. Citri* f. Electuarium.

Dosis est ʒʒ.

Imò si guttæ vj. viij, vel ad summum x, olei destillati buxi cum aliquot unclis aquæ pœoniæ exhibeantur, egregium esse remedium inquit; cujus defectu & oleum corylinum non inconveniens est.

Cubebæ masticatæ stomacho jejuno, aut etiam vino infusæ, sicque bibitæ, multum conveniunt; non secus ac semen sinapi crudum contusum, jejuno stomacho quotidie comestum, expertum est ad vertiginem, etiam senum, estque simul egregium antiepilepticum & apoplecticum. Expertum est etiam ad vertiginem cum caricis pinguibus & semine sinapi paratum electuarium. Lignum aloës, item santali, ab Hildesheimio *Spicil. pag. 455.* commendatur, & conserva florum calendulæ Riverio *Prax. libr. 1. cap. 9.* Ex compositis aliis in usu est quibusdam theriaca Hippocratis dicta:

Loco hujus usurpetur electuarium à Solenandro *sect. 1. conf. 2.*

Ex regno animali pavo ejusque stercus, mirè laudatur ab omnibus Practicis, cujus carnem comestam admodum laudat Bartholetus in *Encyclop.* Usurpari potest vel forma pulveris cum ana sacchari, ratione saporis, de quo pulvere æger crebrius capiat. Lindanus dicit: se felici cum successu expertum esse stercus pavonis, præcipuè præmissis universalibus propinatum in forma sicca, exsiccando stercus, & hujus ʒj. propinat in ʒij. aquæ appropriatæ: Sic in Quercetani *Diater. Polyhist.* illustre est exemplum curatæ vertiginis beneficio stercoris pavonis, *sect. 2. cap. 1.* Willisius in *Anim. Brutor. Part. 2. cap. 2. de Vertig.* habet pulverem compositum, cujus basis est stercus pavonis.

Potest etiam hoc stercus in forma electuarii usurpari.

℞. *Sterc. pavon.* mense Majo collect. & in sartag. leniter *exsiccatum*, ut pulverisari possit.

Misc. c. *Conf. flor. Rosmar. & Major.* vel *Melissa*, vel simil. q. f.

de quo quotidie bis capiatur; quò feliciter usus est Lindanus in *Praxi*.

Vel in forma liquida usurpatur, qua ratione quidam recipiunt M. j. fimi pavonis, subigunt



gunt cum f. q. vini, dividunt in tres partes: cujus duas partes post duos paroxysmos vertiginosis propinant, provocato sudore; & tertia dosis post bñdrium post tertium paroxysmum propinatur, & sic certò, inquirunt; curari vertigines.

Petrus à Castro remedium admirandæ virtutis ad præservandam vertiginem esse dicit:

℞. *Sterc. simi pavon.* masculi pro maribus, mense Maio collect. & exsic. ʒj.

macerat per noctem in vino albo, manè trahit per linteum, liquorem exhibet vertiginoso, continuando à novilunio ad plenilunium usque, manè expectando blandum sudorem.

Loco stercoreis pavonis, cati masculi pro mare, fœmiellæ pro fœmina; exsiccatum & pulverisatum commendatur.

A quibusdam laudatur cerebrum passerum, unde Bartholetti electuarius ex cerebris animalium in *Encyclop. pag. 166.* describit; quod vocat electuarius præsentaneum contra vertiginem.

Idem Bartholetus etiam cerebrum pavonis ad vertigem laudare solet.

Egregius etiam est liquor cornu cervi succinatus, castoreum & castoreata. Hepate rupicaprarum vertiginem curatam refert Velschius *Hecat. 2. pag. 6.* Dubium tamen, annon additum eleosaccharum citri paris cum hepate fuerit virtutis.

Denique ex regno minerali ad vertiginem remedia sunt succinata quæcunque, petroleum album, cinnabaris vel nativa depurata, vel antimonii cinnabaris, insigne remedium Cratonis, qui cinnabarin uti magnetem epilepsiæ, ita vertiginis, appellat. Unde super basin cinnabaris antimonii exstructi pulveres cephalici specifici erunt in omni vertigine convenientissimi.

℞. *Sterc. pavon. pulveris.* ʒʒ.

*Cinnab.* ʒij vel *nativ.* ʒij.

*Cubeb.*

*Galang. ana* ʒʒ.

*Œis vol. succ.* ʒj. M. F. pulvis.

cui addatur

*Eleo-sacch. anisi* q. s. pro gratia saporis & odoris v. g. ʒi. ʒiʒ.

M. D. S.

**Pulver gegen den Schwindel auff etliche Weis.**

De quo capiatur subinde, quantum cuspis cultelli capit.

Vehiculum hujus pulveris:

℞. *Œa Charesfol.* ʒij.

*Liqu. C. C. succin.* ʒi. M.

Cum cinnabari in specie salia volatilia & olea nobilia sunt contra vertiginem, internè & externè. Hinc internè sal volatile succini, succinum, liquor cornu cervi succinatus, in specie junioribus.

Tom. II.

Petroleum album, imprimis in senibus, usurpari potest in vertigine per consensum stomachi, præsertim in hypochondriacis.

Aliis nil juvantibus sacra anchora erit laudanum opiatum, imprimis appropriatis, præsertim succinatis, mistum; quod quoscunque spirituum animalium inordinatos motus compescit, eosque figendo promptè sedat.

Externè commendantur pinguedo sciuri, damæ, & serpentum, temporibus illita; item oleum buxi, & ab Hæfero pulvis bombycum capiti adpersus. *Herc. Med. Tom. I. lib. I. pag. 31.*

In ipso paroxysmo vertiginis graviore & crebriori, in specie caducæ, conveniunt præceteris mox infusa vomitoria, quæ eos optimè exsuscitant; loco quorum etiam clysteres acres applicantur, cum syrupo emetico vel infuso antimoniali infundendi, usitati aliàs in epilepsia, apoplexia, &c. Hinc præmissis vel omissis talibus, usurpetur mixtura ex spirituosissimis cephalicis, & aromaticis nervinis, qualia sunt spiritus vitrioli volatilis, aut cephalicus, spiritus cerasorum nigrorum & liliorum convallium, sal volatile succini, cornu cervi, & similia in aqua majoranæ, salviæ & cerasorum nigrorum. Castoreum etiam, ejusque essentia, commodè usurpatur simul, præsertim mulieribus. Item oleum succini ad aliquot guttas in aqua appropriata assumptum & propinatum imprimis convenit.

Externè vertici; temporibus; naribus; scrobiculo cordis & similibus; inungitur essentia castorei, spiritus salis Ammoniaci, oleum destillatum succini; aut etiam balsamus Peruvianus, vel apoplecticus, aut similia antapoplectica & antepileptica; aut obijcitur naribus nigella Romana, sive ejus semen aceto irroratum; radix pœoniæ ritè collecta, & de collo suspensa, vertiginem desperatam aliquando curavit. Uno nomine: simili ferè modo curatur in paroxysmo, atque aliàs tractari solent insultus epileptici, & passiones graviores hystericæ & similes in paroxysmo: quibus volatilibus in malo pertinaci interdum addantur opiata, & misceantur volatilia; v. g.

℞. *Œa salv.* ʒij.

*Menth.* ʒj.

*Lil. convall.* ʒij.

*Œci*, vel hujus loco *Liqu. C. C. succin.* ʒiʒ.

*Laud. opiat.* gr. ij. l. iij.

*Syr. vel fœnic.* ʒij. ad ʒvj.

M. S.

**Haupt-stärkend Träncklein gegen den Schwindel.**

(lii ii)

Huic

Huic in mulieribus essentia castorei commodè addi potest.

Si vertigo sit uterina, potest præscribi hæc mixtura in paroxysmo cochleatim assumenda :

℞. *∇æ hirund. c. Castor.* ʒiʒ.  
*Meliss. c. Vino* ʒj.  
 ~ *Lil. convall.* ʒj.  
*Salvia, vel cerasor.* ʒj.  
 Θ\*ci ʒʒ.  
 Θis vol. *succini* gr. xv.  
*Laudan. opiat.* gr. ij.  
*Syr. cort. aurant.* ʒʒ.  
 M.S. ut *suprà*.

## CAPUT II.

De

### *Spirituum animalium nimio & inordinato motu in partes externas.*

**Q**uodsi præter voluntatis imperium moveantur fibræ motrices, & ex iis constituti muscoli, vel non absque insigni dolore, aut cum insigni violentia contrahantur & agitentur partes, sive internæ, sive externæ, convulsio appellatur Latinis, Græcis spasmus.

Convulsio autem hæc seu spasmus in genere est duplex : vel conductio, vel concussio: de quo vid. Lindanus in *Melitem. Physiologicis*, qui hæc ex Hippocratis sensu rectè deduxit. Per conductionem intelligunt convulsionem in specie sic dictam; per concussionem verò motum convulsivum. Conductio dicitur convulsio tonica; concussio verò est convulsio clonica, *wenn sie zittern*: Nam κλονες significat præcipuè inæqualem membri motum, unde etiam vocatur motus convulsivus ultro citroque, seu quod idem est, invita membri contractio & extensio, unde σφυγμὸς κλονώδης seu pulsus vibrans, quando scilicet arteria quasi in motu retracta vibrando pulsum edit. Tonus verò est juxta Celsum immobilitas & rigor membri, quod membrum contractum sit immobile, ita ut conductio seu convulsio tonica membri rigidi contractionem, & in uno situ sive figura permanentiam, indicet; Concussio verò seu convulsio clonica innuit variam agitationem & vibrationem, modò extensionem, modò contractionem.

Contractura cognata est convulsioni tonicz affectio, quâ membrum semel convulsus semper postmodum rigidum manet.

Conductio seu convulsio vera varias sub se complectitur symptomatum species, nempe tetanum, emprosthotonon & opisthoto-

non: Quo & aliæ species pertinent; Nempe priapismus & satyriasis; item spasmus cynicus, cui adjunctum symptoma dicitur risus Sardonicus: Pertinet huc etiam, quando contrahitur brachium & obrigescit ex inepta venæsectione, quando nervus pun- gitur; item quando tendines obrigescent ex luxatione: Pertinet huc ille affectus inno- minatus, quando genua contrahuntur & ri- gida manent propter contractum nervum ac tendinem, quæ per cavum genu trans- eunt.

In specie famosi sunt isti tres capitis affe- ctus: *Εμπροσθότον*, qui est conductio mu- sculorum collo i-stratorum seu mastoideo- rum, hinc est, quod his mentum pectori af- figatur: Contrarium vitium est *ὀπισθότον*, conductio musculorum occipitis, quibus oc- ciput versus dorsum & posteriora detrahi- tur: *Τέταν* denique est conductio simul- tanea & anteriorum & posteriorum capitis musculorum; hinc enim caput ad nullum latus verti potest, sed caput & collum rigi- dum & immobile permanent. Sunt tamen qui non solum capitis versus truncum, sed totius trunci tales conductiones sub his no- minibus intelligunt: Conf. Sylvius *lib. 2. Præxeos cap. 23. §. 19.*

Ad emprosthotonon pertinet Aphori- smus 35. Hippocratis *sect. 4. Si febre deten- to repente collum intorqueatur, ac vix degluti- re queat, nullo existente tumore, lethale est*: quem vulgò, sed malè, de angina & luxatio- ne vertebrarum interpretantur. Compre- hendit enim iste casus morbum, quem nos vocamus, *den Hals umbrechen* / quando nimirum tunc musculus mastoideus convel- litur & rigidus manet; sic enim caput cir- cumducitur, aspera arteria comprimitur, & tales ægri tandem suffocantur.

## ARTICULUS I.

De

### *Convulsione clonica*

Et

### *Epilepsia.*

**Q**uoad concussionem seu convulsionem κλονικὴν, aut, uti vulgò appellatur, mo- tus convulsivos, quando unum seu plura membra moventur inæqualiter, sunt varii, pro varietate partium convulsarum, quales sunt omnes species epilepsiarum, pertinent- que huc cramba, seu, ut vocant, spasmus flatulentus, Germanicè, *der Krampf* / cui imprimis ebriosi, item qui ad arthritidem nonnihil inclinant, sunt obnoxii. Pertinet huc etiam experimento autorum ista con- cussio parva, quæ in emissionem seminis Ve- nerea accidit, unde quibusdam Philosophis & Medi-

& Medicis, in specie Democrito, coitus epilepsia parva vocari solet.

Dixi, quod ad concussiones etiam pertineat epilepsia. Epilepsias ergo quod attinet: hæ sunt revera tales concussiones seu motus convulsivi, in quibus universum corpus, aut plura ejus membra, diversimodè contrahuntur, vibrantur & agitantur, sensuum exercitio quocunque ut plurimum abolito, cujus sub sua latitudine tres sunt modi seu gradus.

Primus gradus, isque abusivè seu improprie epilepsie tributus est; quando ægri subito concidunt & corruunt, aut saltim, sive stent, sive sedeant, omnium sensuum functionibus ac motus exercitio subito privantur, & quasi somno arctissimo sepulti citra ullam animalem functionem ita persistunt, utut nullus spasmus sensatus seu externarum partium convulsio accedat; licet, si per consensum fiat partium abdominis, v. g. in hystericis aut spleneticiis & similibus, subinde spasmi partium internarum nervosarum concurrant, & sub lipothymie conceptu vulgò exprimantur. Hic epilepsie modus est potius tertius gradus ad vertiginem caducam pertinens.

Secundus gradus epilepsie est, quando variis motibus & agitationibus corpus universum percutitur & convellitur, sensibus quibusvis, tam internis quàm externis, & ratione aut integrè persistentibus, aut in delirium abreptis, dum interim quoad externas partes convulsi, sub convulsionibus istis saltant & cantant, interdum rident, nunc lacrymas fundunt, hinc inde percurrunt, petus percutiunt, interdum ridicula narrant, vociferantur, post paroxysmum verò omnium secum actorum, sive delirent, sive non delirent, in paroxysmo recordantur, eaque optimè, nunc nihil, sciunt. Exempli talia stupenda videb. in Willisii *Patholog. Cerebr. de Morb. convulsiv.* item in Riverii *Praxi*, qui refert talem epilepsiam in moniali, in qua sensus interni & externi viguerunt, tantummodo epilepticæ varizque partium convulsionibus adfuerunt. Conf. Neucranzius *Tract. de Purp. cap. 33.* Timæus non Gildeslee in *Epist. 9. pag. 22.* Bartholinus *Cent. 2. Hist. 90. pag. 301.* Nam certe tam stupendæ & tam variz eorum sunt gestulationes, motus, actiones, gyrationes, ut vix absque stupore legi, nedum aspicere possint. Talis epilepsia sæpe in melancholia hypochondriaca obvenire solet. Pertinet huc epilepsia cursiva Bootii *Tr. de Affect. Omiss. cap. 6.* qui refert exemplum pueri epileptici duodecim annorum, qui paroxysmo epileptico vexatus, continuo cursu semper rectà percurrerebat per ignem & aquam, per montes, per omnia loca, idque tamdiu, donec obstaculum offendebar, ut longius currere

non posset. Vocat ob id epilepsiam cursivam. Similem casum habet Valentinus *Tr. de Convuls.* qui & epilepsiam rotatoriam observavit: Vid. M. A. N. C. *Ann. 8. obs. 71.* Sic epilepsiam, in cujus paroxysmo diu & multum ægra ridet, videb. in M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 304. pag. 526.* Item epilepsias mirandas, in quibus sensus omnes & intellectus fuerunt illæsi, videb. in Fehr *de Scorzoner. pag. 96.* Et sæpius in his epilepsias tam mira sunt symptomata, ut vix commodè enarrari possint: Conf. Salmuth *Cent. 2. Hist. 41. & 42.*

Tertius gradus epilepsie, & quidem communior, est iste, qui ex utrisque modò dictis videtur conflatus, ita ut omnis tam sensus quàm rationis usus pereat, simulque variis motibus corpus ejusque membra agitentur & concutiantur, ad humum prosternantur, dentibus strideant, brachia jactitent, pollices arctè claudant in manus, pedibus tremant, corpus insigniter attollant, & denuò deprimant, instar globi incurvent, spuma per os rejiciatur, labia & lingua morfu lædantur, &c. Quibus omnibus successivè remittentibus æger tanquam sopore oppressus jacet, gravi suspiratione ad se rediens, nihil omnino scit, tantum de torpore & gravitate quadam capitis, & omnium artuum gravi lassitudine, conqueritur, quod fit ex laceratione fibrarum ex impetu spirituum ad easdem derivatorum.

Ex his patet, quod convulsio, motus convulsivi & epilepsia, non differant in radice, sed saltem modo fiendi. Epilepsia ergo consistit in motu depravato, nempe in motu involuntario, inordinato, interrupto & nimis impetuoso; Convulsio verò seu concussio consistit in motu involuntario aucto & continuo, à spirituum nimio & inordinato ac rapido influxu. Unde istud, quod subiectum est motus naturalis, id ipsum necessariò etiam subiectum erit hujus motus præternaturalis; & id, quod afficitur in naturali brachii contractione, aut involuntaria fecum alvi exclusione, id ipsum etiam afficietur in his motionibus præternaturalibus. Cum ergo fibræ nervosæ sint subiectum omnis motus naturalis in corpore humano, tam voluntarii in musculis, quàm non voluntarii in partibus corporis internis membranosis, & ubicunque sunt membranz, v. g. in intestinis, ob id etiam necessariò in convulsione & epilepsia fibræ istæ nervæ contractionum morbosarum subiectum erunt: siquidem in omnibus corporis partibus, ubi est motus, ibi sunt fibræ, & ubicunque sunt fibræ, ibi necessariò fit quidam motus; ita ut fibræ hæ nervæ sint subiectum commune, muscoli verò & membranz, ex istis fibris contextæ, sunt subiectum proprium seu speciale.



Fibræ nervæ dico : Nam ipsi nervi nil aliud sunt, quam congeries talium fibrarum juxta se variato nexu situatarum, quæ tunica duplici à meningibus cerebri continuatâ investitæ corpus nervi constituunt.

Ex dictis fluit differentia, cum epilepsiæ & spasmi dividuntur in internas & externas: Externæ sunt, quæ saltim membra externa cruciant & concutiunt, v.g. convulsiones brachiorum, capitis, oculorum, pedum, thoracis, &c. Internæ verò convulsiones sunt, quæ viscera interna membranosa variis convulsionibus mirè torquent, verbi gratia, in colicis scorbuticis convulsivis, item in passionibus hystericis, dum intestina, mesenterium, & annexæ partes convulsionibus spasmodicis mirè affliguntur, in paroxysmis nephriticis, singultu, vomitu, torminibus infantum, tussi & similibus; qui affectus apud Germanis mulieribus dicuntur: *Die schwere Noth im Leibe*; item *die innerliche schwere Noth bricht aus*. Pertinent huc tensiones abdominis & hypochondriacæ, quando conqueruntur de tensione regionis hypogastricæ, quæ frequenter eveniunt in subjectis scorbuticis, hypochondriacis & similibus; item tensiones circa tempora, &c. Et ubicunque sunt membranosæ partes, si illæ spasmò aut convulsione afficiantur, indurari, obrigescere & instar membranæ tympani fortius tendi solent ex fibris, ex spiritu impetu ita afflictis.

Talis etiam affectus est, quando in nephritide convulsus stomachus vomitus, & convulsa itidem intestina tormina colica patiuntur: item quando cor palpitat & convellitur: quales convulsiones etiam in hypochondriacis, ac quod idem est, hystericis, plures observantur, cum in his subjectis quamplurima vaga & subinde varia ac mira symptomata maximam partem ex talibus spasmis partium internarum oriantur, imprimis quando plexus nervei, quales plures sunt in abdomine, speciatim magnus iste in mesenterio, afficiuntur: Vid. Willsius l. 4. Cum enim ex his deriventur nervi in reliquas abdominis partes, faciliè totum abdomen, affectis his plexibus, aut saltem plures illius partes convulsiones patiuntur: Et cum hi plexus mesenterici ex pari nervorum vago, nempe octavo, oriundi conjuncti sint nervis intercostalibus, ob id sæpius affectis istis plexibus, & pectoris & capitis partium convulsiones tandem insequuntur, adeò, ut istarum partium internarum convulsiones sæpius ad radicem nervorum usque continuatæ, ibique systema spirituum in confusos motus agitantes, terminentur tandem in convulsiones partium externarum. Quâ ratione non rarò passionibus hystericis gravioribus associatur epilepsia universalis seu convulsio

partium externarum: ut & partui difficili non rarò supervenit epilepsia, toties repetens, quoties ad conatum parturiendi gravida se accingit. Nam isti dolores parturientium, nempe dolores abdominis & dolores post partum, nil aliud sunt, quàm partium abdominis, in specie uteri, mesenterii, & subinde intestinorum spasmis seu convulsionibus,

#### C A U S Æ.

Quoad causas: præsupposito spiritu animali, tanquam motore universali ex cerebro pro motibus voluntariis, ex cerebello pro motibus involuntariis seu naturalibus, per nervos distributo in omnes partes, qui, quacunque ratione fiat, fibras ad earum contractionem disponat, sive solitariè hoc faciat, sive adjutus simul copulâ elasticâ ex sanguine suppeditata, necessariò idem spiritus etiam movebit in contractione partium morbosa & præternaturali: verbi gratiâ uti spiritus per nervos brachii influens movet digitos & brachium ex meo arbitrio, ita si fiat punctura nervi, & inde convulsio brachii, sequitur necessariò, spiritum animale, qui secundum arbitrium movet brachium, etiam in convulso brachio ex rapidiore & impetuosiore ejus, propter irritationem & insequentem ejus continuum motum tremulum, influxu, istius convulsiones brachii esse autorem: Sic idem omnino est motus, sive sponte & per jocum rideam, sive epilepticus paroxysmus cum risu involuntario Sardonio eveniat: eadem nempe est musculorum in utroque risu actio & pars affecta, idem motus, ergò idem etiam efficiens seu movens, nempe spiritus animalis. Hæc tantum interest differentia, quod, ut ordinatè & placidè moti spiritus, idque distante prius sæpe anima rationali, dant motum naturalem partium & risum naturalem, ita iidem spiritus inordinatè, confusè & rapidè in stimulo morbozo agitati, & quasi cum impetu per nervum in partem explosi, convulsiones & motus convulsivos, & v.g. risum convulsivum, inferant. In epilepsiis tamen habitualibus, h. e. inveteratis, & sæpius levi ex causa recurrentibus, item hæreditariis, ferè suspicor deviare cum ipsos spiritus animales è naturali sua crasi & constitutione, & magis elasticos, faciliùs inordinatè, idque cum impetu mobiles reddi, utut in quo alterata hæc constitutio præcisè consistat, determinari certò nondum queat.

Causa ergò proxima formalis convulsiones & epilepsiæ cujuscunque erit impetuosus, rapidus, & maximè violentus spirituum animalium motus in partes fibrosas motui interviens, interruptus quidem diversimodè, inordinatus magis & confusus in concussionibus & epilepsiis; continuus verò & ordinatus

tue

tus in conductionibus seu in specie sic dictis convulsionibus.

Causæ rapidi & inordinati istius motus spirituum animalium generaliter considerati ad duo capita causarum, remotarum, seu materialium aut occasionalium, referri potest. Prima causa est irritatio quædam in parte quadam sensili ac nervea, quâ occasione spiritus animales in partem irritatam copiosè & impetuosius moti, convulsionem nunc leviolem nunc graviolem, nunc continuam in convulsione tonica, nunc interruptam in clonica seu epilepticis motibus, inferunt: Sic punctus nervus ob irritationem in loco puncturæ, quæ consistit in subtili & celerissima fibrillarum ejus motione, vibratione & vellicatione, ad cerebrum usque continuatâ, commoventur simul spiritus per nervum cum blandè influentes, quorum motu tremulo & celerissimo, unâ cum moto nervo concurrente, commoventur simul reliqui spiritus, ita ut hi ipsi aperto quasi tramite per nervum istum cum impetu ferantur, & ita convulsionem fibrarum istarum & musculorum, ad quos terminatur nervus, inducant: Hinc nervus per venæsectionem læsus aut punctus, brevi post brachio convulsionem insignem infert, vid. Sylvius *l. 2. Prax. cap. 23.* Sic ex irritatione stomachi à medicamento antimoniali, hujus fit convulsio seu vomitus: ex irritatione cordis fit hujus palpitatio: Sic notum est, quod, quando nares irritantur ab objecto acriori, superveniat sternutatio, hæc revera nil aliud est, quam motus epilepticus thoracis, consistens in convulsiva expiratione, unde & Salmuth *in obs.* ex suppressa sternutatione gravem epilepsiam ortam refert, quæ sequitur simpliciter irritationem aut vellicationem membranæ narium; Et quidem convellitur thorax, dum vellicantur nares. Jam cogitate, sicut tantillum acre, quod vellicat nares, tam insignem impetum, motum & convulsionem infert totius thoracis, ita & in aliis epilepsiis & motibus convulsivis tantillum irritans sæpe in loco remotiore existens, e. g. tantillum fermenti acidi circa membranas cerebri consiti, occasionem epilepsiæ suggerit: conf. hic notabilis locus in *M. A. N. C. Ann. 6. obs. 77. p. 112.* Sic tantillum acidi in plexu mesenterii tam insignes turbas inferre potest in abdomine: sic ex irritatione faucium, aut ex penna in gulam immisâ, sequitur vomitus: Sic hel-leborina ac similia notoriè convulsionem inducunt, vid. Tulpus *obs. 35.*

Secunda causa remota generalis est ataxia ipsorum spirituum animalium convulsiva, quando aliquid præternaturale excrementitium vel vitiosum, aut in cerebro hærens, certis intervallis commotum, eorum motum turbat, aut iis ibidem permistum, eosdem

vitiosè & cum impetu exagitat. Uterque modus, si spiritus in motus perturbatos, inordinatos, vagos & confusos, cogat, non tantum sensuum omnium, tam interiorum, quam exteriorum, hebetudines, sed etiam ex inordinato motu eorum in partes extra cerebrum, tam internas quam externas, varii motus convulsivi superveniunt. Nempe huc commodè vis elastica recrementorum præternaturalium potest applicari, dum sui generis recrementa spiritibus animalibus impermiscibilia, mutuò tamen concursu explosivum motum concipientia, epilepsias inferunt. Experimur hoc non tantum in febribus à sanguinis exagitationibus nimis, aut heterogeneitatibus ex hujus materia visceribus ac spirituum systemati suffusis; Sed eandem illustrant diversi animi affectus graviores, v. g. ira, terrores nimii, & similes, qui spiritus animales nimis exagitando, eorumque motum insigniter turbando, motus convulsivos aut epilepsias subitaneas non raro inducunt: id quod præsertim in infantibus notum: conf. Hæchstererus *Decad. 4. cap. 8. in schol.* Schenckius *in lib. 2. Observ.* & Gabelchoverus *in Centur. 4. Curat. 59. item Curat. 23. & 24.*

Ex fomite morbofo, ubi nempe vel vellicantur aut irritantur nervi, vel ubi sunt recrementa heterogenea spiritus turbantia, oritur divisio epilepsiæ in idiopathicam seu per essentiam, ut vocant, affecto primario cerebri aut cerebello circa principium spinalis medullæ, & spiritibus hujus incolis; & in sympathicam seu per consensum, quando ex alia parte affecta superveniunt convulsiva pathemata. Per consensum est frequentissima epilepsia, & sæpius irritationes nervorum sequitur. Quæ verò per essentiam est, existit rarior, nisi in membranis cerebri aut in ejusdem ventriculis fomes irritationis hæreat; tunc enim ferè per essentiam esse videtur: ut v. g. quando in contusione cranii occasione festucæ cerebri membrana gravius læsa epilepticis motibus occasionem præbet. Quæ ex recrementis heterogeneis, spiritibus permistis, contingit epilepsia, frequentior est per essentiam, nisi mediante massa sanguinea ex alia parte fomes morbosus instilletur cerebro, ibique spiritus plus minus afficiendo epilepsiam interat. Quod attinet istam irritationem, quam dixi frequentissimam epilepsiæ causam, fit hæc variis modis, & varias occupat regiones: nunc enim circa principium; nunc circa medium, præsertim circa plexus; nunc circa finem seu insertionem nervi cujusdam contingit. Ad principium nervi etiam cerebrum & cerebellum, itemque medulla spinalis pertinent; unde dum in loco irritationis ex aucto & simul nimis rapido & inordinato spirituum ad locum irri-

(lii ii 3)

tationis



tationis in nervo motu, sensim inchoat convulsio, hæc est primò tantum fibrarum levior contractura, quæ ipsa tamen ob continuatum spirituum impetum sensim continuata successivè secundum ductum nervi ipsique annexarum fibrarum sursum magis magisque pergit, indeque pars immobilis redditur, donec isto convulsionis motu, ad ipsum principium nervorum continuato, spiritus animales in cerebro violentius agitati, facto quasi agmine & impetu per eundem etiam & per vicinos nervos explodi quasi & expandi incipiant. Unde ex inordinato isto motu intra cerebrum non tantum omnium sensuum perturbatio, sed etiam ex simili depravato motu in partes externas convulsionem, tam partis istius primariò affectæ, quàm etiam partium aliarum non affectarum, sequuntur. Dum verò successivè inchoatus spasmus seu motus convulsivus secundum nervi ductum, ex spiritibus propter irritationem impetuosius irrudentibus, sed ex parte simul nonnihil resilientibus, sursum pergit, & urget istam fibrarum contracturam, unde membrum fit immobile, percipiunt aut imaginantur sibi ægri, præsertim cum formicationis quidam sensus interdum superveniat, quod materia subtilis seu aura quædam, ut vocant, aut spiritus quasi volatilis, ex uno vel altero membro ita sursum repat, & ubi ad cerebrum pervenerit, ibidem convulsionem epilepticam inferat. Confirmat hanc eorum mentem, quod ligatura strictior supra partem primariò dolentem, ubi aura ista residere creditur, injecta paroxysmum incipientem præcaveat, quasi auræ adscensus inhibeatur. Modum habebimus, v. g. quando ex pollice percipitur quasi adscensus auræ & hinc epilepsia, ligaturâ circa pollicem epilepsiam præcavet. Ipsa verò ligatura non convenit impediendo adscendentem auram volatilem, sed potius, quatenus eadem firmâ ligaturâ pars inferior quasi stupida, indeque minus sensibilis & minus irritabilis redditur; unde & irritationis sensus, & rapidus spirituum animalium impetus, & sic etiam fibrarum contractura & convulsio, aut omninò tolluntur, aut saltem, quò minus vehementes sint, impediuntur & suspenduntur. Par ratio est, quando in hysterica passione ligaturâ forti hypochondriorum nimium incrementum præcavetur. Exempla talium epilepticorum non sunt pauca: unum tamen atque alterum curiosum referam: Tulpus *Centur. 4. obs. 2. & 3.* talem refert epilepsiam ex pollice pedis: Pariter Borellus refert epilepsiam ex pollice ortam, per cauterium ibidem applicatum curatam, *Cent. 2. observ. 95.* Sic Henricus ab Heer *in obs. 24.* refert epilepsiam ex subita animi consternatione & terrore ob sollicitudinem stupri, in cujus pa-

roxysmo ægra continuò fricabat pollicem pedis, in quo facto cauterio cum butyro antimonii, fuit sanata: Salmuth *Cent. 1. obs. 90.* habet epilepsiam concitatam per auram ab extremis adscendentem, per ligaturas partibus istis injectas præservatam: Refert Lindanus de quadam muliere, quæ quoties paroxysmus epilepticus in procinctu erat, dicebat, intra pubem à regione pubis sentire se levem quandam morsiculam, post morsiculam sentiebat sibi aliquid surgere, & designabat accuratè locum: inde à medio corpore infra & supra umbilicum ad superiora, & ista aura, ut vocabat, non surgebat celeriter, sed paulatim, & cum appropinquaret circa cor, incipiebat illi cor palpitare, & tunc post unum vel alterum pulsus animi deliquio afficiebatur; postmodum, cum pulsus denuò inciperet, tota citò convellebatur, & superatâ illâ convulsione ad se redibat, donec novus succederet paroxysmus. Porro dicit idem Lindanus: *Curavi puellam octodecim annorum, qua laborabat epilepticâ obstructione lienis scorbutica. Hac à me examinata, retulit se sentire tempus invasionis paroxysmi, se enim sentire ex sinistro hypochondrio transversum quid, & cum ad medium perveneris corpus, retrogredi, & deinde sursum tendere, & quo ad cor pervenerit, animi deliquio corripì, & hinc epilepsiam subito supervenire. Eui præsens aliquando, & exactè designavit locum, quomodo moveretur ista aura.* Tertiò refert Lindanus de juvene Franeckeræ, qui habuit caviem ossis in pollice pedis, ex quo subinde sensit surgere auram instar aquæ fervidæ, qua, ubi supra regionem hypochondriorum pervenit, epilepsiam intulit. Poterat præagere paroxysmum, & quamprimum ille in pede sentiebat morsiculas istas, statim fasciis cruralibus, quas ex fune confecerat, supra genu arctissimè constringebat, & si hoc faceret, impediabat paroxysmum; si verò non faceret, statim epilepsia corripiebatur. Semper, dicit Lindanus, quasi ex eo, an sentiat aliquid in capite? qui respondebat, se nil in capite, nisi vertiginem quandam sentire. Ex contusione pollicis pedis vid. M. A. N. C. *Ann. 2. obs. 95. pag. 169. & Annus 6. & 7. obs. 77.* à genu intumescente, Rhodius *obs. 58.* Sic refert Helidæus *in suis Conf. pag. 29.* de epileptico, qui ante paroxysmum frigiditatem & dolorem pungentem in manu sinistra percipiebat, cujus annularis digitus antea ex vulnere sensum motumque amiserat: Bartholinus *Cent. 1. obs. 82.* refert epilepsiam singulis noviluniis cum tumore digiti pedum minimi recurrentem, cauterio isti inflicto curatam: Tandem notabilis est *Observatio 25. Cent. 6.* Hildani de muliere epileptica, ex aura quadam è sinistra manus medio digito adscendente reddita. Paroxysmus quoties redibat, de summo digiti dolore queritabatur:



tur: tum manus contrahitur, brachium convellitur, & tandem motu convulsivo totum corpus percutitur: Cùm nullis uti vellet medicamentis, factâ circa carpum & brachii partem musculosam ligaturâ fortî ex corio humano, evanere omnes insultus, nec ab eo tempore quicquam eorum percepit. Parile exemplum videbitis in *M. A. N. C. Ann. 3. obs. 336*. Vid. etiam Deckers in *Barbette Prax. pag. 2*, ex dextræ manus pollice Rhodius *Cent. 1. obs. 57*. Aura hæc assurgens, non nisi sensus fallacia est: Nec enim movens adest, quod auram istam propellere, nec spatium, per quod moveri aura ista queat, sed potius, dum in loco irritationis ex aucto & simul inordinato spirituum ad locum irritationis motu, in isto loco sensum inchoat convulsio aut convulsivus motus. Quod verò percipiatur ut plurimum frigidâ, sit (1) quod spiritus animales aliquo modo conferant ad calorem partium, hinc in paraplecticis partes ordinariò sunt frigidæ. (2) Per spasmum partium spirituum motus & influxus liber plus minus sufflaminatur, & (3) ordinarium est pathema, membrum dum incipit spasma convelli, quod refrigerationem videant percipere: Sic imminente vomitu percipimus quandam refrigerationem, & similia.

Partes, per quarum consensum epilepsiæ oriuntur, sunt varix, pro varietate nervorum affectorum in toto corpore: vid. hic Impri- mis Sennertus, *ubi de Epilepsia pag. 625*. Præterea ex retentis corruptis, v.g. suppressione mensium aut hæmorrhoidum, item ex defectu exercitii Veneri in mulieribus, non raræ sunt epilepsiæ per consensum, quam suppressa excretio liquoris seminalis, & inde nata acrimonia non rarò in mulieribus epilepsiam per consensum infert, irritando partes nervosas circa genitalia: Sic Forestus *lib. 10. obs. 115*. observavit convulsionem ex utero totius corporis, ob liquoris genitalis corruptionem: nil proficientibus remediis aliis, factâ titillatione per mulierem in genitalibus cum oleo liliaceo, cui zibethum immixtum erat, illicò sanata est. Sic idem Forestus recenset exemplum suffocatæ ex uteri affectu, quam tonsor crinibus pudendorum apprehendit, unde revaluit: sic Hildanus *Cent. 6. obs. 25*. refert, mulierem epilepticam ex utero cum convulsionibus ad eum modum, quo cum viro coire consueverat, à viro longè antea absente per coitum mox curatam, neque amplius, cum Medico illo conjugali viventem, convulsionibus correptam: Ex vicio stomachi frequens est epilepsia: Item lumbrici creberrimè tam in infantibus quàm in adultis efficiunt epilepsiam, qualem refert Bartholinus *Cent. 6. Hist. 20*. Zacutus Lusitanus *lib. 2. Med. Princ. Hist. cap. 17*. Piso

*lib. 2. de Morb. Cognosc. & Cur. c. 19*. Forestus *lib. 10. obs. 65*. Gruelingius *Cent. 3. obs. 74*. Mæbius *Instit. 1. 2. part. 2. c. 12*. & Rhodius *Cent. 1. obs. 59*. à prægnatione *obs. 60*. mulieres gravidæ, item mulieres parturientes, aut etiam quibus suppressa sunt lochia, sæpe incurrunt epilepsiam, quam ex utero cum insequente partu refert Tulpius *lib. 1. obs. 10*. Ex ulcere in crure sanato epilepsiam, quò rursus apertò eà cessavit, vid. in Amato Lusitano *Cent. 2. Hist. 6*. Item ab occluso ulcere in crure, ex quo ascendens aurâ epilepsiam infert, vid. in Bartholino *Cent. 3. Hist. 20*. Horstio *lib. 2. obs. 10*. Hildano *Cent. 3. obs. 10*. ab hepate in Rhodio *Cent. 1. obs. 62*. ex liene, idem *lib. 1. obs. 9*. Schenckius in *Observ.* Hotstius in *Obs. &c.* Ex renibus & vesica calculosa, Bartholinus *Cent. 5. Hist. 61*. Ex abscessu abdominis interno, Lossius *lib. 1. obs. 11*. ex mesenterio, Rhodius *Cent. 1. obs. 61*. Variolæ & morbilli ante sui eruptionem, vel etiam post non sufficientem excretionem, familiarissimè epilepsiam inferunt: Sic melancholia subinde in epilepsiam abit, vid. Salmuth. *Cent. 2. obs. 42*. sicuti econttà epilepsia subinde in melancholiam transit. Ante triennium sub cura habui puerum decem annorum epilepsiâ habituali correptum, noctu suaviter dormiebat, manè evigilans dolorem in sinistro hypochondrio percipiebat, & decem vel duodecim in die paroxysmos patiebatur: Curavi eum cum pulvere epileptico antimoniali, sed eò ipso puncto, quò epilepsia non redibat, aderat melancholia, & quidem ridiculosa; recidivante autem post aliquot septimanas epilepsiâ, melancholia evanuit. Colica non rara est, nempe convulsiva ista, quæ epilepsiam infert, non secus ac purgantiâ acriora. Arthritis desinens in epilepsiam terminabatur, quæ cessavit revertente arthritide, auctore Riverio *Cent. 3. Obs. 85*.

In specie, quod causas remotas attinet, si- ve per essentiam, si- ve per consensum epilepsiam inferant, causa irritans nunc externa quæcunque lædens, nunc interna est.

Ex internis frequentissima solet esse acidum vitiosum nervis inimicissimum; id quod in hypochondriacis, scorbuticis, hystericis, &c. manifestum est, quibus epilepsiæ habituales & chronicæ familiares sunt; Ita quidem, ut Hogelandus *Oecon. pag. 186. & 187*. epilepsiæ primariam radicem in lienis perverso fermento concipiat: qualis etiam aciditas causa videtur illius morbi convulsivi à lue Gallica, cujus Bartholinus *Cent. 6. Hist. 23*. mentionem facit. Uno nomine: est acidum vitiosum ex primis viis oriundum, sed volatile magis, minus fixum, hinc inde penetrans, quod vellicando nervos aut partes cognatas, huiusmodi mala infert.

Alteram

Alteram quod attinet causam remotam, recrementa nempe vitiosa plus minus explosiva seu elastica nitro-sulphurea, ut dicuntur Willisi, quæ per spiritum acidum volatilem explicat Sylvius, hæc in cerebro locisque vicinis congesta, aut spiritibus animalibus permista, eorum crasin vitiant, quæ quibusvis occasionibus, sive immediatè, sive mediante spirituum agmine vehementius commoto, v. g. in animi affectibus excitata, motus spirituum inordinatè turbando, & impetuosius agitando, graves epilepticos paroxysmos exsuscitat. Quicquid horum sit, sedulo habenda est ratio hujus epilepsiæ, etiam non adeò raræ. Pertinet huc epilepsia hæreditaria: Nam utut hæc ipsa etiam radicem possit habere in quodam abdominis viscere; nihilominus tamen certò spirituum vitiosè constitutorum, & in crasi sua deficientium, simul videtur subesse erratum. Crebrius observata fuit epilepsia, post cerebrum vulneratum & non ritè sanatum, propter fermentum quoddam acre malignum in & circa basin ejus collectum & relictum; item post casum ab alio in caput sanum, ubi sanguis hæret sub cranio, qui putredine corruptus & plus minus acescens, epilepsiam infert. Hæc enim causæ, quibus cerebrum lædi contingit, etiam spirituum ordinatum motum in consensum permutare valet, aut eos inficiendo, aut iis se permiscendo. Superiori anno cum quidam gravi vulnere læderetur in latere capitis dextro, quod os prægnatis penetraverat cum meningibus & cerebro, observavi pauci post diebus supervenisse convulsionem, sed levem, lateris læsi seu vulnerati; econtrà perfectam paralyin ac resolutionem totius lateris sani: sed cum paroxysmi epileptici subinde supervenerint, utrumque latus, ejusque partes promiscuè convellebantur: Sed extra talem paroxysmum paralyi pars sana, spasmo pars ægra laborabat. Potius huc pertinent febres malignæ, aut etiam benignæ continuæ malæ judicatæ, quæ occupando cerebrum, ibique spiritus animales turbando, præter deliria, convulsionem epilepticam ordinariò inferunt, quas tractio & subsultus, aut quædam vibratio tendinum circa carpum imminentes innuunt. Pertinet huc epilepsia lethalis post aurium dolorem discussâ, sed non suppuratâ, materiâ, quam refert Horstius in *Obs. lib. 2. obs. 21*. Item quando ex suppressâ hæmorrhagia narium paralyis lateris dextri, & ab hac sanata, epilepsia nata fuit, autore Bartholino *Cent. 4. Hist. 69*. Ex suppressâ quoque urina, renum vitio supervenire epilepsiam, urinario sero cerebrum inundante, non rarum est. Suppressi consueti sanguinis effluxus, v. g. hæmorrhoidum, mensium &c. subinde epilepsiam inferunt, cerebri ac spirituum alteratorum vitio. Quò etiam facit

incipiens gravidatio, cujus occasione quædam epilepsiæ fiunt. Præ cæteris sanguinis recrementa vitiosa & acria sub lymphæ vehiculo cerebro juxta ejus glandulas communicata, irritando hujus membranas, creberrimè epilepsiam hancce per essentiam inferunt, quocunque etiam in loco collecta fuerit peccans ista lympa, de qua vid. Schneiderus in *suo Tr. de Catarrh. lib. 2. pag. 103*. qui aliquot habet exempla epilepticorum post mortem dissectorum, in quibus serositates vitiosæ in ventriculis cerebri fuerunt reperiæ: Similia exempla refert Schenckius in *suis Observat. pag. 144*. & Bontius *Med. Indor. Observ. 1*. item Borellus *Cent. 2. Obs. 78*. habet exemplum epileptici mortui, cujus in cranio aperto inter cerebri ventriculos magnam materiæ adipis æmulæ copiam reperiit: Pus in cerebro observavit Tulpus *Cent. 1. cap. 32*. & quæ sunt similes causæ, quæ inferunt epilepsiam per essentiam. Denique apoplexia interdum in epilepsiam transit, & contra, vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observ. 212. pag. 311*.

Præ ceteris considerandus Mercurius & omnia Mercurialia, cujus etiam miasmata minima generi nervoso sunt infensa; Si enim tantillum ejus circa cerebri confinia hæserit, quocunque modo illi communicata, ad epilepsiam disponunt, propter irritationem, ab acrimonia Mercurialium particularum natam. Hinc enim unguenta Mercurialia capiti contra tineam infantibus illita epilepsiam non rarò inferunt, quale exemplum videri potest in Timæo von Guldenslee in *Resp. pag. 106*. Pertinent huc sumi Joviales, quibus per nares attractis, ob Mercuriales halitus adhuc latitantes, convulsionem & epilepsiam obortas notat Salmuth *Cent. 3. Hist. 39*. Ex coturnicum esu epilepsiarum & convulsionum exempla notat Scheerckius *lib. 1. pag. 124*. Vini etiam usus nimius convulsionem excitat ob aciditatem.

Inter paræhemata, quæ epilepticos vexant, non ultimum est stridor dentium, maxillarum vehementissima constrictio, idque ex convulsivo impetu. Sed dentium constrictio, quod probè notandum, extra epilepsiam interdum observabilis, ex paralyi aliquando musculorum, maxillam inferiorem deorsum trahentium, non semper ex convulsione est: Conf. Thyrmayer *Conf. lib. 2. pag. 174*. Item spuma, quæ ante os epilepticorum interdum conspicitur. Hæc saliva est rarefacta ab aëre, dum constrictis & coangustatis spasmo plus minus faucibus, saliva plus minus copiosè expressa ab aëre per illas angustias vi explosa agitata, in talem spumofam texturam abit; hinc etiam ex naribus interdum materia talis excerni solet. Conf. Pechlinus in *Tr. de Aëris & Alimentis defectu*.  
**DIFFE-**



## DIFFERENTIÆ.

Quoad differentias epilepsiæ: hæc est vel universalis; vel particularis, quando unum alterumve membrum, aut aliquot saltem partes corporis epilepticis convulsionibus vexantur: Vid. Sennertus *Institution lib. 2. Part. 3. sect. 1. cap. 9.* ubi curiosa epilepsiæ particularis recensentur exempla.

## DIAGNOSIS.

Quoad Diagnosin: Signis diagnosticis pro convulsionibus & epilepsia præsentibus determinandis vix est opus, cum per se sit aperta, & facillimè cognoscatur.

Convulsivus motus tremori equidem in pluribus est cognatus; in hoc tamen facillimè discernuntur: quod tremor semper jungatur cum motu voluntario, v. g. manus nunquam tremet, pes nunquam tremet, nisi ad cursum adigatur, ita ut semper motui voluntario jungatur tremoris symptoma: in motu convulsivo, ipso ægro inscio, aut præter voluntatem ejus, fiunt motus convulsivi: Denique tam in paralyti quam spasmotico motus membri voluntarius observatur; hæc tamen est differentia, quod in paralyti membrum resolutum sine omni difficultate trahi, flecti & tractari possit; contrarium fit in convulsione, in qua membrum est rigidum, & quod non sine acerbo dolore extendi potest.

Gradus epilepsiæ primus à lipothymia & caro distinguitur, quatenus in lipothymia pulsus parvus & rarus, in epilepsia robustus & frequens, carus verò similesque affectus soporosi periodico recursum haud obnoxii sunt, nec facillè cedunt; sicuti epilepsia per paroxysmos recurrens facillè solvitur.

Præterea in febribus ardentibus & morbis acutis malignis consultum est, prænoscere imminentem convulsionem & epilepsiam, quod ex eo patet; quod ægri ex improvviso aurium tinnitu, sensuum hebetudine, capitis gravitate, & cordis palpitatione corripiantur, splendores ac coruscationes, & variorum colorum apparitiones, ante oculos versari soleant, ac objecta peregrino colore vestita appareant; istiusmodi enim ignitos splendores celerrimè succedere solent funestæ epilepsiæ: vid. Bartholinus *Cent. 3. Hist. 45.* & M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 97. pag. 170.*

Si in principio morbi de dolore in bulbis oculorum sine ophthalmia conqueruntur, mox delirium & convulsionem adfuit, quod tanquam funestissimum signum sæpius observavi.

Quando muscas capiunt, & floccos colligunt, mala sunt signa: Illa delirium, & simul motum in oculis convulsivum, & convulsionem supervenientes innuit; Hæc jam

Tom. II.

instantem convulsionem denunciat. Item quando dicunt, se percipere motum quendam membrorum tractorium, aut ex iis aliquid sub auræ frigidioris specie verius caput terri: vid. Riverius *Prax. lib. 1. cap. 7.*

Spestat huc destillationis à capite ad pedus & ventriculum ruentis species, quæ quidam apud Tulpium *lib. 1. Obs. 15.* Convulsionem periodicam per abutium euphorbii contractam ante occiduum sibi prælagere poterat.

Observatur etiam duplex status: ægri enim nunc delirant, nunc non; si delirant, nihil percipiunt, & nihil dicunt. Quando igitur æger delirans talia phænomena aut non percipiat, aut indicare nequeat, v. g. in febribus continuis, & acutis, Medicus de imminetibus convulsionibus, iisque lethalibus certus sit, si scilicet quasdam tractiones ac tensiones, aut quosdam subsultus, aut quasdam vibrationes tendinum, qui frequenter supra carpum repunt, in his deprehendat, es suppet.

Vertigo citra causam manifestam juniores, præsertim non hypochondriacos, aut frequentius aut fortius affligens, epilepsiæ est prodromus.

Denique crebrior ephialtis seu incubi sub somnum invasio signum est imminetis epilepsiæ.

Speciatim quoque consideret Medicus; an convulsionem oriatur ex viscerum interiorum vel partium externarum spasmis? Convulsionem & epilepsiam partium externarum ex motu convulsivo membrorum facillè patent: Internæ verò cognoscuntur ex motu convulsivo, murmurationibus & borborygmis abdominis, ex subitanea abdominis aut contractione aut intumescencia, tensione & duritie, interdum cum sensatione superiora versus repentis, unde infantibus epilepticis imminente epilepsia solet indurari abdomen; interdum ex umbilici interiora versus retractione, ex acerbis doloribus contorquentibus in abdomine, in specie intestinorum & mesenterii, quos ægri, præprimis hypochondriaci, exprimere nesciunt; item ex præcordiorum tensione & constrictione, ex dolore lacerante circa lumbos, ubi annexum est mesenterium: superveniunt subitanea respiratio difficilis, interdum sensus suffocationis, aut quasi laqueus collo injiceretur. Subinde externarum partium epilepsia supervenit. Unde patet: quanta sit connexio hujus epilepsiæ internæ cum passione hysterica sic dicta, quæ cum epilepsia in radice conspirat, ut sit unus idemque effectus, & tantum circumstantiis quibusdam varient: hinc etiam omnia antepileptica hystericam passionem; quælibet e contra hystericam epilepticos curant.

(Kkk kk)

Pro



Pro investigando fomite morbi à Medico cognoscendum est ulterius : an per essentiam? an verò per consensum sit epilepsia? si per essentiam sit epilepsia, ferè nulla paroxysmi futuri seu invasuri præcognitio præcedit, nec jungitur sensatio quædam molesta in quodam loco, sed dictum factum ex improvviso eodem corripuntur ægri; jungitur quædam sensatio, quando nimis est rapidus spirituum motus, aut post paroxysmum pars dolore lancinante & lassitudine solet affici. Ubi verò est per consensum, ibi ut plurimum alteratio quædam, v. g. aut dolor, aut motus vermiculationis, aut simile quid, in parte quadam extra caput præcedit, ex quo postmodum epilepsia quasi surgere percipitur, modò dictus dolor aut motus comitatur, modò cessante demum paroxysmo observatur. Imprimis fit hoc, quando focus epilepticus est in partibus remotioribus. Quò etiam faciunt signa lumbricorum, calculi, &c. quæ spasmos ex improvviso & sine causa manifesta contingentes exinde exsurgere, probabile est.

Præprimis in epilepsia per essentiam capitis affecti signa adsunt torpor quidam in actionibus animalibus internis; aut saltem depravatio quædam, hebetudo sensuum, capitis gravitas, vertigo, &c. vid. Riverius l. 4. Interdum graviore in malo fatuitas sequitur, & præcesserunt ferè causæ externæ, quæ cerebrum aut capitis partes lædere potuerunt. Imprimis lunæ motibus auscultat epilepsia quævis, magis tamen ea, quæ est per essentiam, & nonnunquam ad lunæ varias periodos diversimodè afficit: id quod non æquè observari potest, quando epilepsia est per consensum, in qua ut plurimum adsunt signa visceris cujusdam viciati & ejusdem operationis labefactatæ, aut privatæ partis affectæ; utut interdum inveterata & gravior per consensum epilepsia etiam ad lunæ motus, alterato plus minus cerebro, variare soleat.

### PROGNOSIS.

Prognosis convulsionis & motuum convulsivorum pro varietate virium & circumstantiarum variat.

Convulsio, quæ fit per consensum, minùs periculosa est, & faciliùs cæteris paribus, curabilis, quàm ea, quæ ex cerebro per essentiam originem ducit.

In febribus acutis, præsertim malignis, supervenientes convulsionis sunt periculosæ & sæpius mortem portendunt, nisi per crisin solvantur: vid. Hippocrates sect. 4. Aphor. 10.

Epilepsia habitualis & per se morbum constituens sine periculo vitæ subinde ad plures annos durat, utut sæpius recurrens ægros

plus minus paralyticos, delirantes aut stupidos reddat; quamvis interdum suâ in subjectis junioribus circa pubertatem terminetur: vid. Forestus lib. 16. obs. 57. in schol.

Si toto corpore à convulsionibus immuni aut labium convellatur, aut palpebræ, aut lingua, pravum symptoma & periculosum putandum est; nam aut mors imminens, aut gravis epilepsia, innuitur.

Quò motus in convulsione est vehementior & diuturnior; aut plures, vel cerebro vicinas, v. g. labia, palpebras aut linguam, vel nobiles magis partes, v. g. præcordium afficit, eò periculosior convulsio est; hinc epilepsia reliquis speciebus semper periculosior.

Epilepsia hæreditaria, vel omninò nunquam vel rarissimè curatur.

Epilepsia ante pubertatem eveniens curabilis est; post annum verò vigesimum quintum superveniens ferè usque ad mortem durat, teste Hippocrate sect. 5. Aphor. 7. Willisio de Morb. Convulsiv. cap. 3. pag. 37. quod tamen non semper procerdit, quin prostant exempla aliquot in Observat. Rhodii etiam epileptiarum post vigesimum quintum annum curatarum: Vid. etiam Riverius l. 4.

Si quid magis universale, est aphorismus Hippocratis 45. sect. 2. *Epilepsia laborantes juniores cum ætatis mutatio, tum letorum & victus liberat*: Nempe quandoque in pueris pubertatis mutatio ac Venus; in puellis verò menstruorum initium, morbum hujusmodi tollere solet. Conf. Forestus lib. 10. Obs. 35. in schol.

Paroxysmi quò sæpius repetunt, eò graviores evadunt, & tandem totam functionem animalem evertunt.

Observatum etiam fuit, quod in paroxysmo epileptico, si æger ad usum sternutatoriorum non sternuteret, malum sit indicium, atque argumentum, naturam succumbere & prostratam esse.

Si mulierem utero gerentem fortis epilepsia invadat; magnum periculum minatur, saltem periculum abortus imminet: id quod tamen non semper absolutè verum deprehenditur, siquidem Rhodius, Cent. 1. Observ. 60. refert matronam prægnantem, quæ dum utero gereret, post sex septemvè menses epilepticiis insultibus affligebatur, partum verò enixa optimè convaluit: Sic etiam Schenckius in observat. non omnes prægnantes epilepticas abortum pati annotavit.

A copioso sanguinis fluxu singultus aut convulsio malum; vid. Hippocrates sect. 5. Aphor. 3. ac 36. & sect. 7. aphor. 9. *A sanguinis profluvio desipientia & convulsio malum*.

Pariter ab hypercatharsi convulsio aut singultus malum, Sect. 5. Aphor. 4. & Sect. 7. Aphor. 25.

Convulsio

*Convulsio ab helleboro lethalis sect. 5. Aphor. 1.* Rarò enim ægri à convulsionibus post purgantia talia fortiora obortis evadunt, utut non desperandum sit, quin opiatís & theriacalibus alexipharmacis denuò convalescant: sicuti nonnulla exempla eorum, qui evaserunt, adducunt Sennettus *Prax. lib. 1. pag. 565.* & Petrus Nosolog. *Harmon. lib. 1. Diss. 8.*

*Ab ileo vomitus, singultus, convulsio, aut delirium malum, sect. 7. §. 10.*

Huc facit ulterius *aphor. 66. sect. 4. In acutis febribus convulsio, & circa viscera dolores vehementes, malum.*

Item *aphor. 13. sect. 7. In ardoribus vehementibus convulsio aut tetanos, malum;* uti convulsiones, quæ graves phrenitides sequuntur, lethales sunt.

*A vigiliis convulsio aut desipientia, malum: sect. 7. §. 18.*

Febrim convulsioni supervenire, melius est, quam feбри convulsionem, vid. Hippocrates *sect. 2. aphor. 26.* Galenus *super aphor. 54. sect. 4.* modo febris non sit maligna: & spasmus aut tetano si febris accesserit, morbum solvit, Hippocrates *sect. 4. aphor. 57.* Conf. Sennetti *Prax. lib. 1. Part. 2. cap. 28. p. 566.* & Tulpius *l. 3. obs. 42.* Distinguendi autem sunt casus in horum explicatione: nempe intelligitur convulsio & motus convulsivus chronicus, circa quos observatum fuit, quod superveniens febris eosdem curaverit.

Quartanâ correpti non admodum convulsionem patiuntur: Si verò prius tentati sint, superveniente quartana liberantur, *sect. 5. aphor. 70.* Exemplum quartanæ solventis epilepsiam videb. in Salmuth *Cent. 2. Hist. 84.*

### C U R A.

Hiscè præmissis pergo ad ipsam curam epilepsiae adultorum: nam epilepsia infantum & mulierum ad morbos infantum & mulierum pertinent: Illa autem instituenda venit tam extra paroxysmum præservatoria, quam in paroxysmo curatoria.

Quoad præservatoriam: ante omnia attendendum est, ut causa remota materialis, nempe ea, unde oritur inordinatus spirituum motus, removeatur, corrigatur, & ejus crebrior recidiva maturè præcaveatur, sive per essentiam, sive per consensum fuerit orta epilepsia & convulsiones. Hinc cerebri seu nervorum ac spirituum animalium diathesis aromaticis ac volatilibus conservanda, perversus verò motus anodynus corrigendus. Pro varietate autem hujus causæ cum specifico rum usu varianda subinde nonnihil curatio, semper attendendo: an sit ex irritatione quadam partis nervæ? an inquinati spiritus animales? In specie considerandum, an con-

vulsiones & epilepsiae sint affectus primarius, & per se morbum constituent, adeoque plus minùs habituales sint? an verò saltem affectus sint secundarius, & symptomatis rationem habeant, adeoque accidentales? Hinc considerandum, an per consensum saltem? an verò per essentiam ortum traxerint? an causa remota externa vel interna fuerit? an sedes fomitis sit intra corpus? an verò extra corpus in membro quodam particulari?

Observandum igitur I. Cùm epilepsia & convulsiones, quæ in specie, ut morbi curantur, adeoque chronici sunt, & in genere ferè ex hypochondriaco aut scorbutico malo fluant, utut ab hoc minus affligi videntur ægri, ut plurimum originem ducant ab acido vitioso, eoque plus minus volatili, & hujus incunabula ferè semper in aut circa primas vias lateant, ob id in genere acidi destruendi & primarum viarum evacuandarum habenda est ratio. Pertinent nempe huc varia tentamina & experimenta curandarum epilepsiarum, v. g. per lac vaccinum cum sapone Hispanico decoctum, & medicamentum quoddam ex vitriolo Martis, quibus epilepsia hypochondriaca per annum durans curata: vid. Barbette *Prax.* Item M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 95. pag. 203.* vel acidulas, conf. Riverius *Prax. cap. 7.* aliaque Martialia: Sic Henricus ab Heer *Observ. 1.* Epilepsiam cum opisthotono gravissimo, cujus paroxysmos præcedebant oscitationes & pandiculationes cum cordis angustia, quarta vel quinta die recurrentes, per fontes spadanos curatam refert. Et quando marina, testacea, ossæa, ut ungula alcis, unicornu verum, crystallus, smaragdus, lapis ceratunus, & similia pro cura epilepsiae laudantur, hæc nonnisi absorbendo acidum operari possunt: Sic Borellus *Cent. 3. obs. 34.* refert epilepsiam, in cujus paroxysmo corpus instar dolii intumescebat, per sal absinthii, coralliorum & perlarum curatam.

II. In genere semper observandum, ut appropriata seu specifica antiepileptica, quæ per experientiam observata sunt, cum istorum membrorum appropriatis, ex quibus epilepsia oritur, misceantur, & simul continuentur. Hæc sunt varia. In hoc tamen conveniunt, quod vel virtute alcalinâ destruente acidum, vel virtute sulphuræâ temperante acidum & figente spiritus operentur. Et quidem appropriata talia antiepileptica conducunt nonnisi præmissis universalibus, speciatim ubi epilepsia est per essentiam, aut si per consensum sit, fomes ejus non præcisè in membro quodam externo, sed in partibus internis hæreat. Hinc

III. In his epilepsiis per consensum partium internarum vomitus antimonialibus pro-

(Kkk kk 2) vocatus



vocatus primatum obtinet, si malum potissimum fuerit recens: vid. Riverius *Prax. l. 4. pag. 61.* aut fomes mali hæreat in primis viis, singulis mensibus quatrduo ante plenilunium repetendus, vid. Zacutus Lusitanus *Prax. Admir. lib. 1. Observ. 24. & 31.*

IV. Purgantia sint mitiora; secus ac Riverius *Prax. pag. 60.* suadet, cum frequentiora & potentiora sæpius plus noceant quam profint. Inter purgantia cum aliis permixtus Mercurius dulcis primatum obtinet. Purgantia hujusmodi vel propriè talia, vel etiam saltem laxantia, convenientissimè quatrduo ante novi vel plenilunia usurpari solent: Sicuti etiam aliàs appropriata epilepsiæ remedia ante lunæ imprimis mutationes, præsertim ante novilunia & plenilunia, aut ejusdem quadraturas, seu tempore harum mutationum, optimè usurpantur.

V. Observandum; quod si ex fomite in humoribus à nativa crasi degenerantibus, non adeò exactè à priori cognito, oriantur convulsiones, pro istis emendandis diætæ sudoriferæ ex decoctis lignorum, si reliquorum remediorum vis minus proportionata fuerit, observantur proficue: Vid. Sennertus *lib. 1. Prax. Hæsterus Hercul. Med. pag. 10. Fonseca lib. 2. obs. 8. & Thonerus lib. 2. obs. 94.* Commodè his decoctis lignorum viscus corylinum, quercinum, tiliaceum, radix pæoniæ, stercus pavonis, ac similia, tanquam appropriata, addi possunt, vid. Horstius *Decad. 2. Probl. 9.* Sic de ligni guajaci usu in epilepsia conf. Scholzius *Consil. 40. & 41.* Jachinus in *lib. 9. Rhafis c. de epilepsia*, & Alphonsus Ferrarius: Thonerus epilepsiam à colica per decoctum lignorum curavit *lib. 2. Observat. pag. 92.* Non secus ac Schenckius in *Observat.* Vertiginem difficilem per decoctum lignorum cum appropriatis curatam refert. Sed benè prius præmissa debent esse universalialia ac primas vias evacuantia.

VI. Interdum & in casibus desperatis salivatio Mercurialis convenit; vid. Willisius *loc. all. pag. 46.*

VII. Sternutatoria singulis matutinis horis attrahenda, vid. Willisius *loc. all. pag. 44. ex. gr.*

℞. *Fol. Majoran.*

*Ruta ana ʒij,*

*fl. Lil. convall. ʒj.*

*helleb. alb.*

*Castor. ana ʒʒ.*

*M. F. pulvis: S.*

**Reinigend Hirn- und Niese-Pulver.**

VIII. Præter ligaturas fortes, fonticulos & cauteria, similia auxilia chirurgica, setacea, vesicatoria, & cranii apertiones, juvare observantur, ad naturæ nempe imitationem, quæ non saltem digito quasi monstrat, illam

per sponte erumpentia ulcera sanando: qualia exempla Tulpius *lib. 1. cap. 8.* suppeditat de duobus infantibus, per ulcera capitis spontanea ab epilepsia curatis, & refert epilepsiam sponte à natura per lenem in fauces influxionem curatam, in Hildano *Cent. 1. obs. 41.* Sed accidentaliter & per infortunium excitata idem præstant, quale quid v.g. Willisius *La. de puella quadam*, per motus convulsivos super carbones accensos devoluta, hinc caput diversis in locis concremente refert. Quo etiam facit Rhodius *Cent. 1. obs. 62.* qui cuidam ab humore calido herpete sanato epilepsiam contigisse refert, brachii setaceo solutam. Sicuti ex scabie retropulsa aut similibus occasionibus nata epilepsia per vesicatoria curanda venit, teste Hildano *Cent. 3. obs. 10.* Sic Lugdunensibus familiare est vesicatorio suo epilepsias curare, ulcere ad annum aperto servato, quod videb. in Velschii *Mischimim. 32.* Conf. M. A. N. C. *Ann. 9. obs. 14.* Imò cranii apertio interdum proficua observatur, nempe, ut refert Schenckius in *Observat.* quidam vulneribus capiti inflictis ab antiqua epilepsia fuerunt curati: Item Rhodius *Cent. 1. obs. 66.* refert, juvenem quendam nobilem Patavinum sæpius epilepsiâ afflictum ob gravem lapsum à scalis, à Fabricio ab Aquapendente apertione cranii per terebram curatum: Vid. etiam Riverius *loc. all.* Sic quando ex calvaria, ex lue Venerea cariola facta, oritur epilepsia, præsertim mediante ustione eradicanda venit, vid. Schenckius *lib. 6. observat.* Panarolus *Pentec. 4. obs. 30.* narrat, puerum epilepticum, aphonium, stolidum, vesicatorio in sutura coronali sanatum. Si à nervo læso in quacunque, remota quoque, corporis parte oriatur, uti supra ex citatis M. A. N. C. patet, cauterio potentiali loco affecto applicato, curatur.

IX. Observandum, quod si cum epilepsia juncta sit sanguinis consueti suppressio, vel hujus occasione excitetur plus minus epilepsia, venæsectio aut alia quævis sanguinis missio erit proficua locis in variis, pro circumstantiarum varietate: sic enim epilepsiam apertis hæmorrhoidibus curatam refert Rhodius *Cent. 1. obs. 65.* Idem *observ. 64.* epilepsiam in puero octenni ob sanguinis abundantiam venæ sectione curatam refert: Item Zacutus Lusitanus *l. 1. Prax. Admir. obs. 26.* refert, epilepsiam sævam post partum hirudinibus internæ uteri parti applicatis curatam: Idem *obs. 27.* gravidam septimo mense epilepticam venæsectione in talo tuto curatam memorat: Item gravida nonimestris ex suppressione hæmorrhoidum epileptica, sectis in talo venis, & hirudinibus ano applicatis, curata fuit *obs. 25.* De venæsectionis in talo usu in epilepsia videb. in M. A. N. C. *An. 4. & 5. obs. 81.* Imprimis notabile



bile videtur, quod idem Zacutus Lusitanus *lib. 1. Med. Princip. Histor. 26.* notat, gravidas epilepsiâ ab utero correptas, sectâ in brachio vena periisse, in talo verò non.

X. An opiata & narcotica in paroxysmo convenient? disputant autores. *Illorum usus utilis & noxius est, benè distinguere experti est Doctores*, inquit Barbette *Prax. pag. 5.* Imò Deckers *loc. all.* eadem planè rejicit: Econtra tamen Platerus *in Praxi*, & Schmizius *in Encheirid. Pract.* leniora in gravioribus insul-tibus commendant. Opiata magnâ sunt remedia epilepsiæ, inquit rectè Fonteca *l. 2. Conf. 80.* Nam ferociiores spirituum motus compescunt, indeque sensuum perturbationes & motus inordinatos tollunt. Hinc ad præcavendum paroxysmum epilepsiæ, tam internæ quàm externæ, mirè conveniunt opiata, & nunquam omittenda, appropriatis & specificis epilepticis mista, imprimis cum camphora, vid. Wedelius *Opiolog. pag. 107.* Hac ratione pilulæ ex laudano opiato cum oleo camphoræ paratæ ad imitationem Hartmanni *in Prax. Chymiatr.* sunt egregiæ; unde etiam hic laudanum hystericum suum usum obtinet egregium, & externè Fonteca *loc. cit.* inunctionem cum oleo buxi tanquam insigni narcotico in temporibus, naribus & pulsibus, propter vim anodynam imminente paroxysmo (cui alia anodyna vel narcotica substitui possunt) optimè convenire dicit. Sed abstinemus ab his narcoticis, ante præmissa universalia. Deinde non tam ad curationem crebrius, sed saltem ad præsertionem aut atrocioris paroxysmi mitigationem, adeoque rariùs usurpentur, quia epilepsias diuturnas subinde fatuitas supervenire solet, & periculum, ne opiatorum abusu hæc ipsa magis promoveatur.

Universalia ergo remedia præter vomitum sunt, v. g. helleborina ex colocynchide, & Mercurialia: Helleborus nempe niger ritè præparatus, ejusque extractum cum Mercurio dulci: Semper autem in epilepsia per essentiam fortiora purgantia requiruntur.

*℞. Extr. belleb. nigr. gr. xv. ad ʒj.*

*q̄ss dulc. gr. xv.*

*Extr. troch. allhand. gr. j. ii. vel iij.*

*℞o destillat. succini gutt. ij.*

Cum f. q. Ess. Myrrhæ, vel Castor. f. pilulæ.

Vel ad imitationem Riverii præscribatur:

*℞. q̄ss dulc. ʒj.*

*Scamm. præp. gr. iv. vel v.*

Misc. sub forma pulveris pro dosi una.

In vulgari usu sunt pilulæ Cochiz, Arabicæ, fortidæ, imprimis in convulsionibus partium internarum, suffocatione uterina, & similibus; Optimè conducunt ad gr. xv. præscribuntur cum stimulo appropriato, addito

Mercurio dulci; aut quod convenientius est, pulvis panchymagogus mineralis Hartmanni ex Mercurio dulci cum Mercurio vitæ, forti ac largâ trituratione probè unitæ, amittit enim sic Mercurius vitæ vim vomitoriam, quatenus hæc corrigitur ab acido salis in Mercurio dulci, & fit pulvis purgans antimonialis Mercurialis optimus, qui subinde cum aliis miscetur: Vid. Hartmannus *in Praxi Chymiatr. ubi de Purgantibus Mineralibus.*

Quod ergo attinet specifica antiepileptica, ex toto acervo & cumulo omnium antiepilepticorum tantum pauca & magis probata referam. Eminent ex regno vegetabili imprimis ruta, dentaria, anagallis, hyssopus, cujus infusum cum spiritu vini Rulandus *Cent. 10. Curat. 95.* commendat: Pæonia jam à Galeni temporibus laudata, eaque mas, cujus radix, sole in leonè existente, tempore meridiei, mense Martio vel Aprili in ariete, vel luna & sole in ariete existentibus, ante solis ortum lunâ decrecente collecta mirabilis est ad curam epilepsiæ, tam pulverisata ad ʒj. interiùs usurpata, ejusque aqua & syrupus, quàm eadem appensa & instar amuleti gestata; aut grana seu semina nigra pæoniæ interno usu laudata in forma emulsionis. Ratio, quod in desuetudinem abiit, fuit deficiens selectus. Expertus est ejus vim amuleticam jam suo tempore Galenus, cujus experientiam confirmat Forestus *l. 10. obs. 59.* Bartholinus *Cent. 4. Hist. 69.* Riverius *Obs. à D. des Grands Prez communicata*: Vid. item Simon Berger *de Pæonia*, qui quinque tempora habet colligendi, ut & Hartmannus *pag. 71.* Amicus retulit, se aliquoties radice maris pæoniæ, effossâ die Julii 12. intra horam undecimam & duodecimam, amuleti instar appensâ aliquoties curasse epilepsiam; tunc nempe temporis ordinario sol leonem ingreditur: Conf. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Append. pag. 63.* Post pæoniam est imprimis lilium convallium, cujus aqua & spiritus legitimè paratus, non tamen sulphureus per fermentationem, sed ad imitationem Lindani paratus, & essentia sunt optima. Ut autem legitimè destilletur lilium convallium, jubet Lindanus recipere flores liliorum convallium benè maturos, adhuc rore matutino madidos ante solis ortum; hinc protinus, atque collecti fuerint, abscindendi à suis petiolis, & immittendi in lagenam, iisque affundatur vinum Hispanicum, lagena benè claudatur, deinde ita per cucurbitam destilletur aqua egregiè spirituosâ, quæ recentibus floribus, similiter rore madentibus affundatur, & in balneo iterum abstrahatur, idque aliquoties ita repetatur, donec acquiratur spiritus liliorum convallium egregius & anti-

(Kkkkk)

epilepti-

epilepticus : qui postmodum castoreo affusus, suggerit vel destillando spiritum, vel extrahendo essentiam castorei, quæ à ʒss. vel ʒj. potest dari adulto. In usu etiam sunt flores lavendulæ, pæoniæ, hyperici, anethi, radix angelicæ, Valerianæ sylvestris, annotante Panarollo *Pentec. 1. obs. 33.* antequam caulem contrahant, vincetoxici, acori, de quo vid. Heurnius in *Secl. 2. Aphor. 44.* bryoniæ, cujus succum Reusnerus *obs. 158.* commendat; semen saponariæ ante paroxysmum assumptum, semelque in mense per tria novilunia ad ʒj. paroxysmos valde imminuere dicitur; & rutæ M. j. in vini amphora infusæ, & per tres dies sumptæ, idem præstare observavit Borellus *Cent. 1. obs. 18.* Quin & si appendatur viscus corylinus, amuleti instar contra epilepsiam laudatur. Lignum sanctum, sassafras, item viscus quercinus, inter 15. Augusti & 8. Septembris collectus, hinc tiliaceus, & qui omnium optimus est corylinus, contra epilepsiam contumacem, seu habitualement inveteratam, præmissis præsertim vomitoriis, multum conferunt, pulverisati à ʒss. ad ʒj. in aqua appropriata assumptus viscus quercinus nobilissimum est ad convulsivos spasmos specificum Boylei *pag. 185. in Philosophia Experimentalis*: quæ ipsa tamen potiori jure intelligenda de visco corylino, qui quercino adhuc potentior est, mense Martio decrecente luna collecto: vid. Hartmannus *loc. alleg.* Sed observandum, hujusmodi viscos repetito usu figere & concentrare fermentum epilepticum in sua quasi minera, unde facile fieri potest, ut alii morbi, præsertim febres acutæ, exinde superveniant; quippe post eorum usum subjungenda sunt subinde purgantia, ne quid remaneat, quod alios morbos inferre queat. Quin & instar amuleti appensus idem viscus quercinus, similiter est admodum laudatus. Viscus tiliaceus in memoriam revocat curam epilepsiæ per acidulas vegetabiles ex tilia, de quo vid. Misc. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Append. pag. 52.* Vix cedit his lignum buxi, ita ut etiam oleum buxi destillatum habeatur succedaneum olei ligni Heraclini, si à gutt. 4. 7. 8. 9. ad 10. in aqua florum tiliæ ad aliquot dies propinetur, vi anodynæ & nonnihil narcoticæ celebre: vid. Fonsæca, qui internè propinat aliquot guttas, & imminente paroxysmo externè illitum commendatur etiam; loco quorum autem oleum destillatum succini non incongruè substituitur. Pertinet huc fungus quercinus, de quo vid. Borellus *Cent. 2. obs. 95.* cerasa nigra, acetum, spiritus cerasorum nigrorum, de quo vid. Riverius *Cent. 4. obs. 10.* asa foetida, camphora, spiritus fuliginis, extractum & essentia agallochi. Post hæc singulare quid obtinet sulphur vegetabile, quod colligitur ex lycopodio seu

musco terrestri clavato. Colligatur mense Augusto. Nobilius tamen est sulphur simile tempore verno ex julis coryli collectum. Sulphura hæc dosi ʒj. ad ʒj. singulari vi polent acidum destruendi, quod excitat epilepsiam per consensum: Imprimis in junioribus sunt elegantia: Vid. M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 97. pag. 225. seqq. & Ann. 3. obs. 15.* Carbo artemisæ rubræ circa festum Johannis, ipso potius Johannis die ante solis ortum, circa meridiem, sub ejus radice effusus, etiam nobile est specificum ad epilepsiam, uti per experientiam in illustri persona factam allegat Petrus in *Diff. Harmonic. lib. 1. Dissert. 6. §. 53. pag. 112.* uti etiam Joel in *Praxi de Epileps. pag. 85.* Quid sint? vid. Deckers in *Comment. in Praxin Barbettianam, ubi de Epilepsia pag. 7.* qui fraudem detexit, quod sint radices annosæ artemisæ, quas vulgus pro carbonibus peculiaribus habet. De floribus tiliæ res nota est, unde liquor radice tiliæ, de quo vid. Tilemannus de *Mat. Medica*, & aqua & spiritus florum tiliæ sunt in vulgatissimo usu. Florum aramanti conservæ cum oleo succini feliciter est usus Petrus Affelinæus, vid. Velschius *l. 4. N. 19.* Syrupus nicotianæ mirificè commendatur à Zacuto Lusitano *lib. 1. Prax. Admir. obs. 23. & 24.* paratus nempe ex succo foliorum viridium cum melle: Hôc syrupo, aliis omnibus irritis remediis, pertinacissimam epilepsiam, quotidie quadraginta dierum spatio assumpto, curavit. Primaria ferè hæc sunt ex regno vegetabili, quibus tamen subinde etiam alia remedia cephalica quæcunque in specie & aromatica ex eodem regno addi possunt; Ex hisce enim emergunt compositiones aquarum epilepticarum admodum multiplicium, ut aqua epileptica Langii, Kolreuteri, Dorncrellii, & similes alia. Exempli gratia sit sequens aqua cephalica, epileptica & apoplectica:

℞. *Herb. & fl. salvia* ʒvj.  
*fl. lil. convall.* ʒiij.  
*lavend. odorat.* ʒij.  
*rad. Pæon. mar.* ʒiij.  
*fol. & fl. Majoran.* ʒj.  
*cinnam. elect.* ʒvj.  
*cubebæ.* ʒj.  
*caryophyll.* ʒiij.  
*Macis* ʒij.

Infund. c. Vin. Malvat. aut Rhenan.  
 opt. lb. xiv.

Macerentur per dies 14. hinc destillentur in MB.

Potest parari cum & sine castoreo: item post rectificationem potest addi q. s. de spiritu salis Ammoniaci, vel simili volatili, ut fiat remedium eò generosius.

Ex regno animali ad epilepsiam commendantur imprimis remedia humana seu ab homine



mine desumpta; quæ inter eminet sanguis humanus, & remedia ex hoc parata, spiritus nempe, sal volatile & oleum, imprimis spiritus sanguinis humani cum sale volatili acuat, tanquam nobilissimum remedium in epilepsia hæreditaria, si quid aliud, conferre dicitur ab Helmontio. Sed observandum secundum Lindanum, eligendum esse sanguinem humanum ab homine recenter decollato collectum, cum alius sanguis vix talem efficaciam habeat, qui vel per se destillandus, vel in vase vitreo prius cum pauco spiritu vini circulandus. Ipse reddit rationem hanc, quod scilicet in homine decollato præ metu mortis spiritus ejus quasi coaguletur & concentretur. Doctor Michaëlis sanguinem dicto modo collectum & congruatum decantatq; sero deponebat, donec situm contraheret: Sic enim copiosiores spiritum ac sal volatile eliciebat, quò læpius utebatur in epilepsia, nunc solo, nunc cum spiritu vitrioli cephalico, evadit exinde mistura subviridis & subcærulea elegans, quâ ipsa etiam hæreditarios epilepticos se curasse idem testabatur. Secundina humana putrefacta dat spiritum volatilem, qui præter effectus singularissimos in affectibus mulierum, præsertim puerperarum lochiis, epilepsiam potenter curat: Secretum fuit Cnæfælii, quò aliquando Rex Poloniæ fuit curatus: Datur dosi à guttis xv. ad xxx. xl. vel 3ß. sub insignibus lunæ mutationibus. Vel ipsa secundina in clibano blandè torrefacta, pulverisata dosi 3ß. ad 3j. lunâ imprimis decrescente in aqua spirituosâ florum tilia aut liliorum convallium propinanda venit. Cranium humanum ex homine violenter interempto desumptum, in specie quidem os triangulare vel triquetrum ex concursu futuræ sagittalis & lambdoideæ, quod juxta Paracellum in epilepticis reperitur, tam rasura ejus simpliciter pulverisata, quam quocunque modo præparatum, vel Philosophicè aut cum igne calcinatum, vel, quod omnium optimum, ejusdem sal volatile ac spiritus urinosus, sale volatili concentrato turgidus, egregiè conducunt ad curandam epilepsiam. Primus hæc manifestavit Paracellus, qui præter gelatinam, spiritum & sal volatile, oleum cranii humani, quod simul prodit per destillationem, rectificatum à capite mortuo, & vertici inunctum, præsentissimum dicitur remedium ad arcendum paroxysmum epilepticum. Quin & oleum succini, aut succinum permixtum cum cranio humano pulverisato, denuo destillatum forti igne gradatim, dat oleum antepilepticum penetrans & excellens. Si fortior est inimicus, circuletur oleum prius ante usum aliquamdiu cum spiritu vini rectificato vel tartarisato, & ita cum eodem leni igne à cal-

cinatis destillentur, dat oleum suavius, & egregiè penetrans. Cerebrum humanum est egregium antepilepticum, cujus spiritus & oleum ad imitationem Hartmanni præparata sunt egregia antepileptica. Hæc ipsa pariter & multò magis de usnea cranii humani, ex patibulo seu capite rotâ fracti collectâ, intelligenda sunt. Quin & ossa hominis reliqua, ex homine violenter occiso desumpta, destillata aut præparata, ad affectus convulsivos sunt egregia; uti & aliorum animalium partes ossæ & corneæ, imprimis unicornu marinum, dens hippopotami, spina mustelæ pitcis, dens lupi, lapilli capionum, rasura cornu cervi, unicornu fossile, & ex his quæcunque præparata, salia etiam volatilia, spiritus cornu cervi, item liquor cornu cervi succinatus, sunt egregia antepileptica. Dens hippopotami (vid. Wormius in Museo) est durissimus, & singulare specificum in convulsione quacunque per consensum abdominis, qui præparatus sine igne, aut ex eo destillatum sal volatile, mirè confert ad convulsivos affectus, internos & externos. Externè quoque ex hoc dente à quibusdam fiunt annuli, vid. Wernerus, qui membro seu digito convulso inserti, aut etiam digitis pedum, in spasmus flatulento sive cramba applicati, imprimis gravidarum, sunt perquam proficui. Laudantur etiam epata ranarum viridium, de quorum præparatione vid. Hartmanni Prax. pag. 67. & Finckii Encheir. Pract. pag. 29. coagulum leporis, coturnicum ova, pulvis millepedum, epar lupi, cujus usu quendam epilepticum perfectè sanatum fuisse, qui postmodum multos similiter hoc remedio curavit, vid. apud Borellum Cent. 2. obs. 95. testiculi apri, vid. Augenius Tom. 2. l. 8. Epist. 2. fel catuli nigri, vid. Unzerus de Epilepsia pag. 245. corpus thuri simile, quod in acervis formicarum reperitur, vid. Reusnerus obs. 15. picæ, corvus combustus, & mus calcinatus, vid. Idem obs. 13. & 152. materia, quam pullus equinus vomitu rejicit, vid. Hieronymus Donzerinus l. 6. Consil. 35. à Schulzio editus, spiritus urinæ, sanguis leporis in venatione probè agitati, hinc pavore capti & jugulati, collectus & exsiccat, ad 3j. assumptus, singulare Helmontii est remedium, aut sumatur linteum eo tinctum, infundatur in haustum vini, donec omnis color extractus, postmodum hauriatur, & remedium erit planè singulare. Pertinet huc castoreum, nobile & singulare antepilepticum, & ad affectus quoscunque nervorum, imprimis quidem, si ad imitationem Barbette cap. 1. Prax. junctum salibus volatilibus infundatur in spiritu vini, vel liquore alio spirituoso salino-volatili urinoso.

Vel



Vel spiritus salis Ammoniaci vinosus cum calce viva & spiritu vini paratus, castoreo affusus, egregiam quoque essentiam & tincturam extrahit. Imprimis autem convenit castoreum ejusque essentia, uti & ex castoreo & alâ foetida cum tinctura aut spiritu tartari parata, in epilepsia & convulsionibus internis seu spasmodicis partium internarum, per consensum abdominis & viscerum inferiorum enatis: quales sunt colica convulsiva, suffocatio hypochondriaca, hysterica, & similes: Sicut etiam in quacunque partium convulsione tonica; quin & applicatum cum clysteribus in epilepsia interdum admodum conducit. Quæ supra de vertigine dicta fuerunt de stercore pavonis, & ipsa similiter valent in epilepsia. Videbitis egregiè de hoc differentem Scholizium *Conf.* 42. Borellum *Cent.* 3. *Observ.* 15. qui habet experientiam de cura epilepsiae per stercus pavonis, quacunque ratione applicetur; sive in substantia sub forma pulveris cum appropriatis; sive infundatur in vino, maceretur & propinetur. De alce, ejusque ungula, horumque salibus volatilibus & spiritibus, de hirundinibus, & earum aqua cum & sine castoreo, nil dico, cum hæc per se notissima sint, quod convenient singulariter in epilepsia. Adhuc ova coturnicis huc pertinent, quæ exsiccata, & pulverisata ad 3℔. propinata, sunt expertum specificum Hœferi in *Herc. Med.* pag. 12. De his & similibus ex animali regno antepilepticis remediis judicium videbitis in Ludovici *Pharm.* pag. 639.

Pergo ad regnum minerale, in quo primatum ducunt ad curam morborum convulsivorum sulphura antimonii plus minus fixa, de natura solis participantia; partim quod generalem habeant vim temperandi quodcunque acre excessivum, partim anodynam, adeoque spirituum animalium feroces motus sedent, ubi sulphur antimonii fixum multum in recessu habeat; partim etiam, quod vi emeticâ tollant fomitem morbi, si est in primis viis. Observatum enim est, si fomes fuerit in primis viis, excitasse vomitus, hinc fomite sublato, vomitus non amplius movisse. Hæc inter eminet primò cinnabaris antimonii, aliàs magnes epilepsiae appellata; sed necesse est, legitimè sit præparata, aliquoties sublimando ab omni volatili sulphure purgata & separata, ac cum aqua spirituosa quacunque in aëre libero super porphyritidem lævigata. Optimum est, in specie si supervenit epilepsia aut motus convulsivus morbis acutis, ubi nunc solitariè usurpatur, nunc cum salibus volatilibus, cum quibus ejus color augetur. Qui norunt ex hac cinnabari antimonii parare cum spiritu quodam vegetabili tincturam, habebunt egregiè antepilepticam. Huc fa-

cit remedium, quod vocatur quibusdam astrum Mercurii secretum, factum ex cinnabari antimonii beneficio menstrui ex nitro & 8x parati, quod tandem præcipitatur in crystallos auratas instar croci, quæ mirificè conveniunt in epilepsia. Verùm præter cinnabarin hanc antimoniam adhuc est subtilissimum & fixius sulphur antimonii, ex scoriis reguli antimonii; dum nempe more solito per secundam præcipitationem ex his separatum fuit sulphur antimonii, auratum dictum, adhuc semel ex liquore isto filtrato simultanea injectione aceti destillati & spiritus urinæ aut salis Ammoniaci præcipitatur sulphur subtilissimum & admodum elegans, coloris aurantium, quod in minima dosi, ad unum alterumve granum, mirabiles effectus anodyno-epilepticos exserit in curanda epilepsia infantum & adultorum, & cinnabarin antimonii longè superat. Interdum ratione circumstantiarum prius facit vomitus, interdum prius somnum, interdum sudorem. Dosis infanti unius anni ad usque duos gr. ℔. ad gr. j. adulto 9. vel 10. annorum, gr. iij. præter propter. Juxta antimonii cinnabarin etiam cinnabaris nativa selectior, & ex eadem parata remedia varia, non infimæ notæ erunt. Cinnabaris hæc nativa Ungarica multum de sole habet, & optimè cinnabari antimonii substituitur, vel coctione vel lotionem purgata, meritò dicitur à Cratone Magnes epilepsiae. Commendatur etiam minera argentea instar rubini transparens, Germanicè *roth gülden Erz*. Vitriolum optimum est remedium, mirè commendatum à Paracelso: Sed hæc intelligenda sunt de ejus substantia sulphurea, sulphure vitrioli anodyno fixo, de quo tantæ laudes Helmontii hinc inde prostant; & deinde etiam de spiritu vitrioli volatili egregiè sulphureo anodyno, qui per nonum alembicum est prolektus, uti loquitur Paracelsus. Hic spiritus vitrioli est genuinum ingrediens mixturæ simplicis, quam Paracelsus sub nomine specifici in peracutis, primitus commendavit ad affectus epilepticos. Quoad urinam humanam notus est spiritus vitrioli volatilis antepilepticus, è vitriolo Veneris cum urina humana præparatus, juxta Quercetani descriptionem in *Tetr.* quæ etiam reperitur in Hartmanno. Hic spiritus est maximè sulphureus volatilis salis, non acidus, de quo retulit D. Michaëlis, se etiam hujus usu epilepsiam hæreditariam curasse.

Succinum, ejusque essentia cum spiritu vini extracta, sal volatile ac oleum, egregia & potentia ad integrum systema nervorum, & epilepsiam, & convulsiva pathemata remedia, imprimis si febribus malignis & affectibus hystericis superveniant. Hinc liquor cornu cervi succinatus, tam solitarius, quam

quàm idem liquor aut sal volatile succini eadem methodo cum spiritu sanguinis humani mistum. Quibus ipsis interdum camphora additur, quæ figit quodammodo spiritus animales & ad motum naturalem reducit eosdem; Unde & camphora vim somniferam obtinet: Sicut & Hartmanni secretum in epilepsia & suffocatione uteri, seu molestia quavis uteri ex laudano opiato & camphora, ante paroxysmum præservationis gratiâ porrigi potest. CrySTALLUS denique montana præparata in epilepsia per consensum abdominis multum præstat.

Ex modò dictis simplicibus & similibus plures & innumerabiles ferè possunt fieri compositiones & formulæ antepilepticæ, verbi gratia:

℞. *∇ a fl. tilia,*  
*salvia*  
*Meliss. ā ʒij.*  
*Liqu. C. C. succin. ʒiij.*  
*~ theriacal. camph. ʒiʒ.*  
*Ess. Opii ʒj.*  
*Syrup. fl. Pæon. ʒj.*  
*M. S.*

### Tranklein gegen die schwere Noth.

De quo ter vel quater de die, duo, tria vel quatuor dentur cochlearia pro dosi.

℞. *∇ a flor. Pæon. ʒiij.*  
*cerebr. hum. c. vin. ʒvj.*  
*~ sangu. hum. essent. ʒiʒ.*  
*Unicorn. ver. præp. ʒj.*  
*Cinnab. ʒii ʒʒ.*  
*Laud. opiat. gr. iʒ.*  
*Syr. stachad. Arab. ʒiʒ. M.*

℞. *Cran. human. f. Δe vel*  
*Unic. marin. ʒj.*  
*Cinn. ʒii ʒʒ.*  
*Θis vol. Succini*  
*C. C. ana gr. jx.*  
*Camph. gr. iij.*  
*M. f. pulv. pro quatuor dosibus. D.*

℞. *∇ Lil. convall.*  
*Ceras. nigr.*  
*fl. tun. ana ʒj.*  
*Ess. Castor. ʒij.*  
*Syr. fl. tunic. ʒvj.*  
*M. pro vehiculo pulverum.*

Inter externa ad epilepsiam commendata eminent amuleta: quæ inter primatum obtinet sambucus super salicem crescens, cujus applicandi rationem & usum videb. in Hartmanni *Praxi Chim.* Simonis Pauli *Quadrip. Botan. class. 2. pag. 140.* Experimentum verò egregium ejus videb. in Bartholino *Cent. 4. obs. 69.* Radix ostentii recens disiecta & pollicibus manuum ac pedum alligata commendatur in *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. Obs. 42.*

Tom. II.

pag. 38. Bootius de *Lap. & Gemmis lib. 2. cap. 53.* & Zecchius *conf. 44.* Smaragdum commendant: Alii radicem & semen Pæoniæ, vid. Forestus *lib. 10. obs. 59.* & Boyle *loc. alleg.* alii ungulam alcis, alii viscum quercinum, alii dentem hippopotami & exinde paratos annulos. Crines canis nigerrimi cum aliis in amuleto appensos laudat Forestus *lib. 10. obs. 60. pag. 391.* De amuleto ex electo majori Paracelsi notum est. Cinnabarinativam externè collo appensam, vel carpis manuum annexam in paroxysmis epilepticis convenisse observatum est. Ulteriùs vertici, spinæ & partibus convulsivis applicari possunt cucuphæ, emplastra, olea & inunctiones cum oleis recensitorum cunctis: v. g. oleo destillato succini, si epilepsia est per consensum, ubi cum oleo spinæ illinatur abdomini; cum oleo lavendulæ, anthos, rutæ, serpilli, majoranæ, castorei, coryli, & similibus; item cum balsamo Peruviano egregiè conducunt. Misceri possunt dicta olea destillata cum oleis infusis & coctis, lumbricorum terrestrium, rutaceo, mastichino, castorei & unguentis nervinis; item emplastro Cratonis, quod *lib. 4. epist. ad Jordanum pag. 282.* describit; item emplastrum, ex emplastri diacalcith. ʒij. diachyl. ireat. ʒiʒ. & de betonica ʒj. compositum. Speciatim pinguedo cati sylvestris in paroxysmo, aut eodem imminente, umbilico illita singulare est remedium ad epilepsiam, & quæcunque convulsiva pathemata, secundum Schmuckium, habito tamen respectu sexus, &c. In epilepsia ab affecto splene, cum vel sine tumore scirrhuso, optimum est emplastrum de ranis cum Mercurio, in subjectis robustis cum dupla dosi Mercurii. De cingulo ex corio humano res nota est, si lumbis spasmo correptis seu convulsis circumligetur, aut etiam hypochondriorum regioni circumducatur. Hoc ipso efficacior dicitur nervus crurum insignior parti convulsæ circumligatus. An verò corium humanum habeat vim specialem ab aliis cingulis fortiter ligantibus distinctam? dubitatur.

Quod curam attinet in ipso paroxysmo: Si sit gravior, ad excitandum epilepticum mirè conducunt omnia ea, tam interna quàm externa, quæ quosvis sensus seu eorum organa fortiter vellicare, & ita spirituum inordinatas commotiones seu fortiora objecta in ordinem revocare possunt. In graviore malo mirè conveniunt vomitus, qui aliis irritis sunt nobilissimi. Cæterùm duo urgent incommoda, quæ hujus excitationem præpripis inhibent: Scilicet quando arctè clausa labia sunt, & propter convulsos temporales musculos maxillæ arctius servantur; & secundo, quod in graviore paroxysmo, propter musculorum œsophagi & pharyngis

(LIII)

con-

convulsionem, non possunt deglutire. Propterea cum non potest aperiri os, ad modum Borelli in *Observat.* os ac dentes aperiendi, admovendo nempe pollicem cum minimo digito, vel spatulam aut cochleare, ad oris latera & intra dentes inferendo, fortiterque comprimendo; sic enim licet cum dolore facile os aperietur, quod beneficio cochlearis potest servari apertum: quo facto instillandum est ori vel medicamentum forte vomitorium. In posteriore verò casu, si non possunt deglutire, penna oleo irino aut alio acriori intincta, granis aliquot, tribus aut quatuor, Mercurii vitæ vel florum antimonii, aut syrupo emetico cum grano Mercurii vitæ acuato, imbuta faucibus immitenda, & in specie pharynx illinatur, & ita vomitus stimulandus: vid. Fonseca *Consil.* 15. lib. 1.

Aut fumus nicotianæ faucibus infletur, vid. Riverius *Cent.* 2. *obs.* 60. Præprimis tamen vomitoria locum habent, si ex ventriculo & hypochondriis, item ab assumptis malum fuerit, vid. Sennertus *Prax.* lib. 1. pag. 596. & Wepferus de *Cicut. aquat.* pag. 319. & 324. Hinc pueris quoque ex cruditatibus aut lactis coagulo tale quid contrahentibus proficua observantur, vid. Riverius *Cent.* 4. *obs.* 59. Loco vomitorii, præsertim si nequeat adhiberi, & tamen novus instet paroxysmus, clysteres acres frequentius injiciantur, imprimis si morbi convulsivi sint per consensum: quibus semper sterco pavonum, castoreum, aut ejus essentia socianda, & pro stimulo aqua benedicta, syrupus emeticus, aliaque infusa similia antimonialia addenda: sicuti commodè olea destillata fortiter penetrantia, aut salia volatilia à 3j. ad 3ss. verb. gr. spiritus seu sal volatile sanguinis humani vel cornu cervi vel sal succini addi potest. Ulterius sternutatoria ex radice pyrethri, hellebori albi, castoreo, vitriolo calcinato, & sale vitrioli & similibus naribus insufflata, interdum potentioribus, v. g. succo aquilegiæ, cum succo lumbricorum terrestrium, quibusdam in usu sunt. Cautè tamen hæc fiant, (nisi in primo epilepsiæ gradu, & ubi convulsionum manifestarum nulla adhuc comparent indicia, eaque moderatissima, & in declinatione demum paroxysmi adhibenda: vid. Wedelius de *Facult. Medic.* pag. 215.) ne per sternutationis convulsivum motum epilepsia aut suscitetur, aut exasperetur: Nam aliud est in apoplexia vel comate aliisque affectibus soporosis, ubi excitandi sunt spiritus: aliud in epilepsia, in qua spirituum exagitatio & orgasmus nimius potius sedari, quam per sternutationem excitari debet. Est enim sternutatio per se motus convulsivus, & quasi particularis thoracis convulsio & epilepsia. Propterea loco talium potius sa-

lia acria volatilia macra, fortiter penetrantia, eorumvè spiritus, in vitro longi colli naribus admovenda erunt, v. g. spiritus salis Ammoniaci cum calce viva, sal volatile & spiritus urinæ, & similia; aut urgente necessitate naribus ac linguæ instillanda, ut excitentur epileptici.

Suffitus succini admodum convenit etiam in suscitandis epilepticis; aut etiam olei destillati succini, guttæ tres, quatuor vel quinque, in aqua appropriata intus propinatæ, in paroxysmo optimè conducunt, quæ tamen extra paroxysmum lædere dicuntur. Quin & similia spirituosa antispasmodica volatilia & discutientia, v. g. ex spiritu theriacali simplici & camphorato, cerasorum nigrorum, sanguinis humani, salis Ammoniaci simplici, succinato, lavendulato, urinæ, sale volatili succini, castorei, essentia castorei, liquore cornu cervi succinato, &c. per os injicienda in paroxysmo, ut faciliùs & citiùs ad se redeant agri.

De cætero revellendo & avocando quasi in paroxysmo quoque agunt frictiones extremorum, & partium convulsarum extensiones; quas tamen moderatas jubent Sennertus *loc. cit.* p. 595. Decker & Willisius *loc. cit.* partim ne duobus laboribus fatigetur æger, partim ne materia peccans motu externo cohibito intra cerebrum retineatur, partim ne ossa luxentur aut frangantur. Hujus etiam loci sunt ligaturæ, communicationem spasmodicam inhibentes, si scilicet ab extremitatibus convulsiones inchoentur: vid. Bartholinus *Cent.* 6. *Hist.* 78. Decker in *Praxi Barbett.* pag. 2. & Salmuth *Cent.* 1. *obs.* 90. Item huc spectant spinæ dorsi & extremorum per nervina inunctiones, imò rubificantium usus; vid. Hollerius *lib.* 1. de *Morb. internis cap.* 15. & Henricus ab Heer *observ.* 24.

Lingua, in paroxysmo vehementiùs sauciata à dentibus, curatur inspersione pulveris lapidum cancerorum, & illinitione extracti cujusdam vulnerarii saccharati: Vid. Misc. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *obs.* 209. pag. 295.

## ARTICULUS II.

De

### Convulsione Tonica.

Modò dicta in genere omni convulsioni, & in specie convulsioni clonicæ seu epilepsiæ, conveniunt: eadem tamen etiam convulsionibus tonicis accommodari possunt.

### C A U S Æ.

Causa hujus convulsionis in specie sic dictæ est irritatio partis nervæ, admodum sensibilis, conti-



continua, in eodem loco, & eodem ferè modo. Cujus occasione continuato nec interrupto radio capiosè influunt spiritus animales, & ita in continuata contractura fibras, & consequenter partem ipsam retinent. Irritatio hæc nunc est manifesta, seu ab agente, quod sensibus patet, inducta, nunc est occulta, seu ab agente minus sensibili nata. Ex manifesta irritatione fit convulsio in venæsectione, si nervus lædatur punctim; vid. Schenck. *obs.* item in purgationibus nimis, quâ ratione ex assumptione vitrioli albi vel gillæ vomitivæ Theophrasti convulsionem triginta horarum lethalem refert Heer *observ.* 26. Pariter Antimonialia & Mercurialia non ritè præparata, & intempestivè adhibita, eandem dant calamitatem: De euphorbio simile exemplum habet Tulpus *l. 1. obs.* 15. Item læsiones partium externæ, ut cum ex fractura tibiæ, ex ictu sclopeti, spasimum opisthotonum, tandem tetanum, & sic mortem notavit Hœchstetterus *Dec. 5. cas. 6.* Sic ex clavo pedis digito infixo opisthotonum refert Schenckius *in observat.* Ex læsionibus nervorum in cruribus spasimum cynicum notat Schenckius *l. c.* Et in genere, quævis læsiones nervorum, membranarum, tendinum, præcipuè in articulis, convulsionem inferre solent. Vulnere capitis quoque huc pertinent: Siquidem ex cutis vulnere in latere sinistro capitis spasimum ingentem cynicum, & universi corporis tetanum, observavit Hildanus *Cent. 5. obs.* 9. Mercurialia unguenta huc pertinent, ex quorum usu convulsionem capitis ad latus sinistram, ut nasus & humerus recta linea copularentur, refert Bartholinus *Cent. 4. Hist.* 48. Conf. Heurnius *de Affect. Capitis cap.* 23. Denique ex epota aqua forti membrorum insignem contractionem videb. in *Act. Med. Hafniens. Volum. 1. pag.* 210.

Quoad irritationem occultam: non rarum est, febres quasvis, præsertim acutas & malignas malè judicatas, terminari in convulsionem: sic convulsionem à tertiana per metastasin febrim solvisse, testatur Bartholinus *Cent. 1. Hist.* 93. Ex erysipellate & febre spasimum opisthotonum refert Schenckius *in Observ.* Hinc podagrâ laborantibus supervenit interdum convulsio, contra Galeni assertum: de quo vid. Hæferus *Hercul. Med. pag.* 14. Nec rarum est, in arthriticis, item hypochondriacis, & similibus, si acidum illud volatile peccans se insinuet profundius in partes musculorum fibrosas & tendinosas, easdemque rigidas, duras & intractabiles reddat, ibidem nutrimentum earum spermaticum chylosum coagulari, & in materiam tartaream quasi gypseam transire; Unde omni penitus motu sublato, pars ista per se modum contracta & immobilis manet. Per-

Tom. II.

tinent huc varia recrementa intra cerebrum deposita, spasmos inferentia: sic Rhodius *Cent. 1. obs.* 49. refert de muliere convulsa, in qua omnes cerebri ventriculi sero limpidobiliolo referti fuerunt, ex quibus etiam in spinalem medullam profluxit: Et Schenckius in opisthotono mortui capite duo cochlearia aquæ acris intra membranam duram & cerebellum invenit. Facit huc observatio Tulpii *Cent. 1. cap.* 32. ubi convulsionem corporis cum dolore capitis, expulso pure ex naribus, curatæ. Huc quoque referendi vermes, brachiorum pedumque contracturas excitantes: quo in casu tamen ut plurimum tumor ventris simul adest; vid. Forestus *lib. 10. obs.* 117. Schenckius *l. 1. obs.* 217. Drawizius *de Scorb. Tit. 2. pag.* 127. M. A. N. C. *Ann. 3. obs.* 63. & *Ann. 6. & 7. obs.* 136. Denique in India Orientali epidemicum malum est varii generis convulsio, de quo eleganter scribit Bontius *de Medic. Indodorum, cap.* 2. Pertinet huc spasmus flatulentus, vulgò dictus *der Krampf*; non crurâ saltem, sed etiam alia musculosa loca subinde affligens, ex subtili acri humore seroso, musculos subinde affligente, oriundus.

Ex dictis patet, quodnam sit subiectum convulsionis? ita quidem, ut nunc in ipso subiecto in læsionis seti parte contracta simul sit fomes seu radix mali seu subiectum radiationis, nunc vero differant; unde Convulsio partis, nunc per essentiam, nunc per consentum esse dicitur.

## CURA.

Quoad curam: In hac imprimis causa removenda, partes nervæ leniendæ, ac irritatio earum sopiendæ; hinc eadem roborandæ, adeoque semper universalia præmittenda sunt: quæ inter clysmatum injectio perquam proficua observatur, sicuti urgente interdum graviore dolore simul ad opiata, sed appropriatis mista, accedendum.

Remedia interna sunt quælibet carminativa, cephalica, & antepileptica, in specie castoreum, & omnia ex hoc ipso præparata, salvia, lavendula, succinum, rosmarinus, ejusque decoctum, spiritus vini theriacalis, spiritus vini camphoratus, item pertinaciori in malo decoctum lignorum, præsertim guajaci & juniperi, hinc cinnabaris & quælibet alia epileptica, præsertim volatilia, conducunt.

Quoad externa: conveniunt ea, quæ sub forma inunctionis oleosæ & spirituosæ applicantur: quæ ipsa tamen in genere, quò minus sunt unctuosæ & viscida, minusque oblinunt aut infarciunt poros, magisque sunt penetrantiora, & spirituosiora, eò melius conferunt. Præ cæteris lumbrici vivi applicati &

(LII II 2)

lum-

lumbricalia profunt. Nempe, liquor oleosus per deliquium in elibano ex lumbricis terrestribus, item oleum decoctionis lumbricorum terrestrium, spiritus lumbricorum terrestrium: quæ ipsa quoque de formicis intelligenda sunt. Aut sequens linimentum, quod expertus est Forestus *lib. 10. obs. 110.* in convulsione à cholera, cum intensissimo dolore juncta:

℞. *Ol. irin.*  
*Verm. terrest. aa. ʒij.*  
*Castor. pulverisat. Div.*  
 M. continuo agitando:

Ubi ab inunctione abstinébatur, statim redibant convulsiones, continuatâ verò inunctione cessarunt.

Præterea spiritus vini crocatus, spiritus aut aqua theriacalis camphorata, essentia ex infusione nervinorum; &c. Oleosa & pingua quæ usurpantur, sunt oleum vulpinum, de castoreo, ex catellis; imprimis oleum vel axungia anseris assando destillans ex anseris, simplicibus aromaticis cephalicis & nervinis prius repleto, optimè confert in convulsionibus partium externarum. Pinguedo hæc per assationem ita prolecta unguentum dicitur, quò unicò saltem convulsio curata fuit in *Praxi Riverii*, & *observat. 8.* à Pacheco communicata.

Sunt, qui convulsos & membrorum contracturâ laborantes sic sanant:

℞. *Em veterem:*

Coquunt cum mica panis filiginei, addendo parum asæ foetidæ; & ita inungunt parti affectæ.

Porro oleum laurinum, oleum lini, cuius inunctione duos tetano affectos curavit Rulandus in *Curat. Empiric. pag. 51.* Pinguedo humana & canina, vid. Forestus *l. 10. obs. 122.* castorei, medullæ animalium. Olea acriora ac penetrantiora contra convulsiones sunt: oleum succini, quod cum petroleo mistum, illitum in contracturâ rigida, à causa frigida occasionali orta, admodum commendatur; oleum Philosophorum, olea item destillata juniperi, succini; spicæ, terebinthinæ, galbani, hinc galbanetum Paracelsi, quibus etiam subinde oleum de euphorbio additur, quod quia nimis forte, cautè adhibendum. Hinc

℞. *Ol. Terebinth.*  
*lumbric. terr. aa. ʒiʒ.*  
*Pingu. human. ʒj.*  
*canis ʒʒ.* M. f. Litus.

Penotus sequens linimentum mirè prædicat ad convulsionem brevi tempore dissolvendam:

℞. *Ol. terebinth. ʒʒ.*  
*dest. Caryophyll. gutt. vj.*  
*Mucil. bryon. q. l. pro consist.*  
 Misc. & inunge locum affectum.

Denique unguentum spasmoticum Mynsichti, nervinum, dialthææ, &c. commodè applicari possunt, imponendo desuper emplastrum nervinum usitatum.

Speciatim si est convulsio ex læso nervo per puncturam in inepta venæ sectione, vulnus dilatetur, & olei destillati terebinthinæ calidi pauxillum instilletur; vel oleum laterinum, vel oleum ceræ, applicetur. Sed consideratur in specie hîc Sylvius *l. 2. Prax. ubi de Convulsion. cap. 23. §. 84.* Vel si vulnus fuerit grandius, ut imponi possit emplastrum, imitemur Scultetum in *Armam. Chir. obs. 64.*

Quodsi verò fiat, ut post scarificationem & venæsectionem ineptam pars quædam dolens aut tumida fiat,

℞. *Pingu. Vulpis.*  
*taxi aa. ʒij.*  
*ol. dest. spicæ ʒʒ.*  
*masticin. ʒij.*  
*Vini ʒij.* M. ad ignem.

Illinatur crebrò calidè totum membrum.

Pertinet huic balsamus spasmoticus Mynsichti, & pinguedo anserina suprâ laudata, sicut in dolore, tumore ac livore partis cataplasma sequens egregium est:

℞. *Herb. agrimon.*  
*Cheremol.*  
*fl. Chamomill. aa. M. j.*  
*rad. Consolid. maj. ʒij.*  
*Sigill. Salom. ʒiʒ.*  
*sem. lini*  
*fennugrac. aa. ʒʒ.*

Coqu. in l. q. v. x simpl. ad consistentiam cataplasmatidis: per setaceum trājiciatur, & subinde applicetur.

D. S.

### Brey wider die Geschwulst.

Sin ex luxatione articulorum aut ejus restitutione superveniat convulsio, quomodo curari debeat? vid. Scultetus in *Armament. Chirurg. Tab. 8. obs. 28.*

Quodsi ex vulnere partis fiat convulsio, illinatur pars oleo seu potius liquore oleoso lumbricorum terrestrium, oleo destillato terebinthinæ, vel vulnere instilletur balsamum sulphuris terebinthinatum.

Quodsi fiat convulsio ex ictu venenati animalis, vel in leviori malo oleum scorpionum illitum convenit; vel in graviore cucurbitulæ scarificatæ, vel cauterium actuale supra partem læsam imponatur, aut etiam emplastrum magneticum arsenicale, malaxatum cum oleo bufonum aut scorpionum, imponatur. Internè theriaca cum gentiana mista propinetur, imperando subinde sudorem.

Si ex hypercatharsi, oriatur convulsio, internè opiata & theriacalia sufficiunt.

In spasmo flatulento seu cramba frictio levis partis aut panno aspero & calido, aut manu

manu calida; intincta spiritu baccarum juniperi aut spiritu theriacali, vel spiritu vini rectificato, vel inunctio pauxillæ theriacæ, cum aqua juniperi, statim cessare facit malum. Vel si malum sit gravius; fiat refugium ad expertum unguentum Cratonis:

12. *Axung. anser. rec. 3iv.*

*Ol. dest. Caryophyll. 3ß.*

*Cinnam. gutt. v. M.*

Nervi ungulæ alcis à quibusdam circumligantur membris spasmobnoxiis.

In spasmogavidarum, præsertim flatulento, euporiston est matricaria: Herba contundatur, imponatur cervici, nunc sola, nunc verbenzæ mista.

In contractura à causa interna volatilia acidum corrigentia, & hinc temperata, illud obtundentia; & succum nutritium laudabilem suggerentia, sunt optima. Sic contracturam totalem ex arthritide relictam; continuato lactis usu curavit Tackius in *Phaf. Soph. 2. pag. 148.*

### ARTICULUS III.

De

*Tremore.*

**M**otibus convulsivis affine malum est tremor, in quo cum motu naturali & voluntario simul aliquid convulsivi concurrat, dum in motu membri, v. g. sursum erecti, membrum subinde remittit, & in contrariam nonnihil partem abducitur, prævalente tamen motu intento primario. Unde prout ratione graduum tremor est vel major vel minor, sic etiam vel simplex est; vel convulsivus: Simplex est minor & vulgaris tremor, qualis v. g. post crapulam, aut post affectus animi graviores, in specie iracundiam, subinde apparet: Tremor verò convulsivus est major, & qui interdum in remissione paroxysmorum epilepticorum accidit, donec omnino cesset cum ipso paroxysmo. Et dicitur hic tremor convulsivus, *σπασμους τρεμωδης*, adeò ut tremor ad motus corporis depravatos omnino revocandus sit; Quia in tremore ægri membra libere movere; & protensa ac suspensa sufficienter continere nequeunt, quin vibratione potius, & modò subsultatione, modò declinatione variâ, depravetur motus, sive totum corpus omnesque artus quacunque ratione, sive unum tantum alterumvè membrum particulare ita sit affectum. Tremor ipse nunc est universalis, nunc particularis.

C A U S A E.

Vulgò causa tremoris rejicitur in facultatem motricem debiliorem & gravitatem membri, ita ut illa sufficienter movere mem-

brum nequeat, quia hujus gravitas ob facultatis motricis imbecillitatem præponderat. Sed quacunque ratione explicetur hæc sententia; & quicquid etiam intelligatur per facultatem motricem, tamen insufficiens est. Ratio, quia in tremore omnino sufficienter movetur membrum, extenditur pes; arripitur aliquid brachio & manu; & etiam retinetur, sed depravatè. Vitium nempe cujusdam inquietudinis, & præterea inordinati membri motus, adjunctum est, adeoque non imminutè, sed depravatè, membrum movetur. Facultas enim motrix debilitata præsupponit motum imminutum; non depravatum.

Causa igitur genuina tremoris est actio duorum pluriumvè musculorum simultaneâ, seu eodem tempore institutâ, sive sint antagonistæ musculi, sive non, sed tantum tales, qui aliquomodo ad membri motum concurrere solent, vel eum adjuvant. Inter tales musculorum actiones, alia est principalis & intenta, alia minus principalis & præternaturaliter adjuncta; ita & dum unus musculus brachium extendit, alter simul agens eundem nonnihil torquet & flectit, vel alio modo vitiosè movet. Unde prior actio dat motum voluntarium intentum; posterior verò dat motum præternaturalem & convulsivum quasi supervenientem.

Causa duplicatæ hujus musculorum præternaturalis actionis sunt spiritus animales, qui uti naturali motu influentes movent membra naturaliter, ita etiam præternaturali motu depravatè eadem agitant: Et quidem vitium spirituum animalium in tremore est talis motus inordinatus, ut cum in unum musculus agilius & copiosius influere debeant, motu ferè uniformi in geminos seu binos pluresvè distinctos distribuantur; & ita difformem motum inducant; idque vel ex proprio vitio; licet rarius, vel ex vitio ipsius partis recipientis, idque frequentius.

Proprium vitium est, cum iidem spiritus confusè admodum & inordinatè moventur in affectibus animi gravioribus, ita ut pro voluntatis arbitrio minus ordinatum motum instituere queant, v. g. in ira, metu, terrore; & similibus. Aut cum iidem facultate narcotica sunt nonnihil fixiores, depravatè & inordinatè per nervos feruntur: Quâ ratione post potum vini generosi nimium ex vi ejus narcotica membra subinde tremunt; non secus ac post inconcinnum narcoticorum usum: sic *Fonsæca lib. 1. Consil. 38.* tremorem ex largo vini ejusque semicorrupti potu refert: *Consil. Bartholinus Cent. 5. Hist. 38.* Sed hujusmodi tremores magis transitorii & accidentales videntur, & qui facile denuò cessant.

(LII II 3)

Paris



Partis recipientis vitio fit tremor, quando vel nervus, per quem influere, vel musculus, in quem evibrari debent spiritus animales, ita sunt vitiiati, ut ob poros aut meatus in situ mutatos & malè conformatos, aut propter fibras non legitimè sitas aut dispositas, aut etiam propter quosdam meatulos, ob lapsum vel ariduram, aut causam aliam variam, omninò interceptos vel obstructos, legitimus motus spirituum animalium nonnihil pervertatur, ita ut & in musculum primario motui intento destinatum, & simul quasi quadam deviatione in vicinum ferantur. Sæpius enim in tremore aliquid irritativi circa nervi principium, progressum, aut insertionem occurrit, cujus occasione sub motu voluntario spiritus influi non præcisè ad determinatum musculum, sed simul ad alios vicinos feruntur. Hinc Castro *Tract. Quæ ex quibus pag. 102.* Tremores, qui febribus superveniunt, revera motus convulsivos esse asserit, & Hæchstetterus *Decad. 4. cas. 7. pag. 415.* Tremores ad convulsivos motus non absurdè refert; Adeoque in omnibus tremoribus gravioribus plus minus inveteratis aut habitualibus aliisque, ad partem ipsam spirituum motum recipientem respiciendum est.

His ipsis causis ac fiendi modis facilè causæ remotiores occasionales accommodari possunt: quas inter eminent imprimis fumi Mercuriales, auri & argenti; hinc enim operarii, qui talia tractant, v. g. aurifabri, subinde tremunt. Item qui incautè cingulo sapientiæ contra scabiem utuntur, subinde tremore corripiuntur. Ad tremorem etiam sæpè disponit Venus nimia, & partis refrigeratio: Sic Borellus *Cent. 1. obs. 84.* Tremorem à nimio frigore venæ sectione curatum refert. Hinc etiam potus nimis frigidorum, v. g. copiosæ aquæ frigidæ in febribus, aut potus nive vel glacie immoderatè refrigeratus, autore Sennerto, interdum tremores partium inferunt. Excretiones sanguinis salutes suppressæ & ipsæ suo modo tremorem inducunt; aut saltem mala tremori vicina; quæ inter sunt primariò mensium & lochiorum suppressiones, item secundinæ foetusque mortui retentio: vid. Langius *lib. 3. Epist. 2.* quo refert tremorem brachiorum & cordis ob defectum evacuationis lochiorum in puerpera. Facit huc etiam observatio curiosa Foresti *in lib. 10. Obs. 100.* mulieri ob obstructos menses vitio uteri singulis diebus vapor quidam seu spiritus adscendebat, potissimum sub noctem ex imo ventre, qui tandem repens per venas & arterias, etiam colli, ita ut ipsamet interiùs sentiret, qui ad musculos maxillarum adscendens, ad tempus hærebat, palpitationem quandam & jectigationem manifestam indu-

cens, mox in genis ruborem inferens & dolorem, sine tamen epileptica procidentia, per uterina aperientia autem curatus fuit. Idem Forestus *obs. 101.* mulieri fluentibus mensibus mense Majo venam secavit, undè mentes statim retracti ad superiora & restricti fuerunt: post singulis mensibus minus profluebant, & semper eodem tempore simul experiebatur palpitationem tremulam in brachio, eodem speciatim in loco, in quo venæ sectio prius fuerat instituta, non sine molestia ac magno dolore, atque hæc singulis mensibus patiebatur: tandem ad ciendos menses sectâ vena saphæna curata fuit.

Denique notum est, quod in febribus malignis etiam interdum tremor, sicut convulsio non rarò supervenit; Sic etiam Epiphanius Ferdinandus *Hist. 41.* observat tremorem criticum tertianam continuam solventem. Salmuth *lib. 3.* de tremore periodico exemplum habet.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica: Tremor seipsum oculis prodit. Et ab aliis affectibus, in specie paralyti, & motibus convulsivis propiè sic dictis, ex eo distinguitur, quod semper conjunctus esse soleat cum motu voluntario. In motu verò convulsivo, ipso ægro nescio, ac præter voluntatem ejus, motus convulsivi accidunt.

Diagnosis causarum ex antecedentibus & adjunctis circumstantiis facillimè cognosci possunt: Si enim vitium sit spirituum animalium, & alia signa facultatis animalis læsæ simul notantur: Si verò in ipsis membris resideat vitium, ferè particulare est symptoma, præcesserunt causæ speciales, membrum plus minus lædentes.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Per se nihil periculi portendit.

Si superveniat aut succedat paralyti, non est malum, indicium enim est paralyseos remittentis, & motus naturalis nonnihil redeuntis.

Tremor à causis internis pendens, utut in se non sit periculosus, quoniam tamen facilè degenerat in alios graviores affectus nervinos, v. g. in paralytin, apoplexiam, lethargum, spasmodum, &c. ob id ratione horum consequentium, non est negligendus.

Tremor senum vix curari potest, quia ut plurimum hos ad mortem comitatur.

Tremor hæreditarius, item qui ex vitiosa diætâ successivè genitus, sed jam confirmatus est, rarò etiam perfectè curatur.

Tremor si permutetur in convulsionem, periculosum est.

Item, si in febre ardente tremoribus succedat delirium ex metastasi materiæ morbi- ficæ, periculosum est.

Item

Item Hippocratis est prænotio : *Qui tremores ad manus resiliunt, mali sunt.* Interdum enim, si ægri manus attentè consideratur aut attingatur, contremiscentem illam quasi subito revelli animadvertimus. Est spasmus tremodes, seu motus ex convulsivo & tremore compositus, & periculum non leve portendit, imminentem scilicet convulsionem, similiaque pathemata, idque in specie in morbis ardentibus.

Tremor, qui supervenit mulieribus post partum, ex retentis quibuscunque in utero, periculosus est affectus, subinde enim epilepsias lethales infert.

Et denique tremor in apoplexia aut lethargo accidens, malum signum est, prostratæ scilicet ferè penitus facultatis animalis, ejusque functionum.

Si tremor est in labio inferiore, notum est sequi vomitum; qui tamen tremor in labio est potius motus convulsivus, quàm reverrà tremor.

### C U R A.

Quod attinet curam: in hac removendæ imprimis sunt causæ quæcunque remotæ; hinc appropriatis nervinis & cephalicis, tam internis quam externis, tremori succurrendum; quæ inter sunt omnia ea, quæ in paralyticis, apoplecticis & convulsivis morbis conveniunt. Adeoque pro varietate causarum determinanda nonnihil cura, in malignis nempe usurpantur alexipharmaca: in retentis vitiosis uterinis usurpantur expellentia, e. gr. secundina: si ex fumis metallicis & Mercurialibus, imprimis mineralia conducunt: Quodsi evacuandi sit scopus in tremore, pilulæ arthericæ officinales, aut extracta catholica, aliaque laxativa cum Mercurio dulci in usu esse solent.

Aliàs remedia appropriata ad tremorem sunt, nervina imprimis, tam interna quàm externa. Hæc inter sunt primariò salvia, & quæcunque ex hac parata. Inter plura autem essentia salviæ, spiritus salviæ, &c. quâ ratione Forestus *l. 10. obs. 99.* cerevisiam salviatam pro potu ordinario mirè commendat. Unde etiam essentia salviæ cum spiritu lillorum convallium parata, & cum essentia castorei mista, internè sunt usitatissimæ; sicuti etiam pro usu externo infusum salviæ cum vino aut aqua, & similia laudantur, si nempe quotidie his laventur manus aliquoties, & per se sicari permittantur. Aut etiam spiritus salviæ infusione castorei imprægnatus, vel etiam essentia salviæ, mista cum castoreo aut ejus essentia, fricando aut inungendo partem affectam, usu externo adhiberi solet: Conf. Bartholinus *Hist. Anat. Cent. 5. Hist. 58.* Juxta salviam eminet stœchas Arabica, primula veris, rosmarinus, melissa, & ex eadem re-

media spirituosa parata, radix acori veri, uti etiam acorus conditus, radix pœoniæ & helenii, semenque pœoniæ. Baccis juniperi uti egregia inest vis nervina, ita speciatim essentia baccarum juniperi per spiritum vini tantum parata, spiritus ac oleum, malvaticum juniperinum, continuato aliquamdiu usu interno & externo, item rob juniperi, imperando simul sudorem, sunt convenientissima; aut ipsæ baccæ spiritui vini infusæ, ita ut quotidie tantillum hujus infusi bibatur, simulque quotidie decem grana baccarum infusarum devorentur; sic enim & nervi roborantur, & tremor tollitur: Item decoctum ligni juniperini per modum diatræ sudoriferæ propinatum. Substantia nempe aromatica dicti decocti mediante sudore penetrat undique per universi corporis poros ac meatus, dissolvit mucositates, abstergit sordes, purificat sanguinem & corporis habitum, & ita in paralyticis convulsivis, tremoribus, apoplecticis, & similibus morbis æquè polychrestus eorum est usus, ac in catarrhalibus affectibus. Quidam decoctum aliaque medicamenta ex fraxino, ob signaturam tremuli seminis laudant.

Aromata, ceu egregia ad affectus nervinos per se sunt nota, in specie nux moschata, caryophylli, & cinnamomum. Castoreum & omnia ex castoreo parata, interno & externo usu singulariter laudantur: quò etiam facit essentia fiorum anthos, chamædryos, summitatum hyperici, ambræ, aqua theriacalis Stapediana, pulvis analepticus Mindereri, confectio alchermes, &c.

Cerebrum leporis assatum & comestum ab antiquis admodum laudatur. De hoc ipso refert Forestus *lib. 10. obs. 99.* sibi esse relaturn à pharmacopœo fide digno, artificem Bruxellensem esu continuo cerebri leporis assati solum à tremore liberatum fuisse. Aliàs notum est, quod usus ciconiarum, usus palumborum in cibis, item solum cerebrum palumborum assatum & devoratum, conducant contra tremores.

In tremoribus senum nimis laudatur præ ceteris simus pavonis, cum s. q. spiritus vini vel aquæ vitæ subactus, & in potu usurpatus temporibus matutinis, pro una vice 5j. sufficit: Vid. Borellus *in Observ. Cent. 3. obs. 98.* Quæ supra de oleo buxi, corylino, &c. contra convulsiones fuerunt insinuata, pariter etiam tremori applicanda sunt. Aliàs etiam cinnabaris antimonii, specificum cephalicum, antimonium diaphoreticum, & similia sulphurea antimonialia, cum ossibus humanis præparatis mista & propinata, blandum sudorem expectando adhiberi solent. Præsertim quidem, si à mineralibus, imprimis Mercurialibus, excitatus fuerit tremor, insigniter conducunt talia mineralia, ad hoc nempe, ut bene-

beneficio eorum eliciatur foras Mercurius, quò sublatà causà tollatur effectus. Aliàs decoctum helenii & fœniculi experimentum est Hœchstetteri in *Observ. Decad. 3. cas. 4. pag. 231.*

Aliàs in tali casu remedia solaria, ac ipsum adeò aurum foliatum assumptum, non omit- tenda sunt; Zacutus Lusitanus inungit un- guentum ex auro.

Inter externa contra tremorem quemcun- que, à quacunque causa excitatum, ceu sin- gulare & indubitatum experimentum com- mendat Forestus *lib. 8. obs. 5.* frictionem & lotionem membri cum urina propria recens excreta: Loco cujus spiritus formicarum, item lumbricorum terrestrium, & cum his paratæ aquæ articulares ad extra, item spiri- tus salis Ammoniaci conducunt.

*Re. Va articul. ad extr. ʒiij.*

*~ lumbr. terr. ʒiij.*

*formicar. ʒj.*

*Ess. Castor. ʒiij.*

M. D. S.

**Eusserlich Glieder-Wasser.**

Aliàs partibus trementibus utiliter Petrus à Castro illinit aquam destillatam ex urticis minoribus, mense Majo collectis & destilla- tis. Fraxinus, cum ejusdem semen sit in continuo tremulo motu, ob id commenda- tur à quibusdam lixivium imprægnatum seu superfusum foliis fraxini, quo lixivio partes trementes lavandæ, & spontè exsiccandæ. In malo diuturno conveniunt thermæ, item infessus seu balneum ex cubili formicarum subinde repetitus.

Præter dicta conveniunt oleum nardinum & costinum, castorei, lumbricorum terre- strium, laurinum, oleum destillatum junipe- ri, salviæ, majoranæ, & ex his parata bal- sama pro inunctione membrorum tremen- tium.

## CAPUT III.

De

*Spirituum animalium influ-  
xu abolito.*

### ARTICULUS I.

De

*Apoplexia.*

**D**Um omnes functiones animales in sen- su & motu subito cessant, ita ut taliter affectus non secus ac ex improvise quasi ful- mine in terram percussus & attonitus jaceat, simulque vox auferatur, respiratione ipsa

plus minus imminutâ, cum aut sine sterto- re, dicitur apoplexia *der Schlag*: Nem- pe ut plurimum saltem functiones & actus spontanei seu voluntarii læduntur, minus verò motus naturalis, utut interdum & hi afficiantur: color faciei & oculorum ut plu- rimum rubet, facies tumida est, & corpus simul calet, utut interdum & in paroxy- smo diuturniore facies pallere observetur: Membra omnia sunt laxa, & si brachium vel pes levetur, pondere suo statim dilabi- tur: Ager fortiter tactus, irritatus vel ac- clamatus, nec sentit nec loquitur, ore hian- te, & interdum stertente, profundum dor- mit: Resolvitur subinde simul vesicæ & ani sphincter, unde feces alvi, aut injecta ene- mata, & urina sponte sua & involuntariò effluunt. Verbo: Apoplectici non differe- runt à mortuis, nisi quod supersint vestigia respirationis, pulsus & aliquis color in facie. Supervenit tandem & spuma circa os, unde respiratio cessat. Hæc dum ita fiunt, est apoplexia universalis seu fortis. Dividitur enim communiter ratione pulsus & respira- tionis superstitis in levem, vehementem, fortem, & fortissimam; ita ut in priore pul- sus & respiratio sint adhuc satis naturales, in reliquis speciebus magis magisque deficient cum sudore frigido; & quidem in forti cum stertore & spuma, in fortissima respiratio ad sensum omnis aboleatur, pulsus verò lan- guidus, parvus ac celer evadat. Deinde ra- tione subjecti dividitur apoplexia in univer- salem & particularem; quatenus illa cum capite totum corpus; Hæc modo dimidium caput & trunci mediam partem affligit, di- citurque hemiplegia seu hemiplexia; nunc hoc vel illud tantum membrum motu ac sensu subito privat; sub paraplexiæ & para- plegiæ nomine. Hemiplexia est affectus ta- lis dimidii corporis, quando homo quoad omnes, vel dextras vel sinistras tantum, par- tes ita afficitur, inde à sagittali futura per mediam lineam exactè usque ad perinæum; ita ut mirum sit, quod una saltem medietas privetur sensu & motu, altera verò & sentiat & moveatur. Denique addit his Lindanus quandam speciem apoplexiæ, hætenus in- nominatam, quando nempe toti corpori pe- rit sensus & motus, excepto tantum capite. Quoad ultimam apoplexiæ speciem, para- plexiam seu paraplegiam, ea tantum in uno alterove membro, majore vel minore, con- tingit, ut ejus sensus & motus subito in to- tum pereat. Hanc ipsam speciem, qui mo- dus apoplexiæ particularis, autores passim solent referre ad paralyin; sed malè, ut re- ctè demonstrat & asserit etiam Lindanus, Hippocrates, Aretæus, & alii autores, imò omnes antiqui, qui distinguebant accuratè paralyin ab apoplexia: Et quos affectus ex interna



interna causa natos hodiè ad paralyfin referimus vulgò, illi ad apoplexiam retulerunt; quo sensu etiam Hippocratis *sect. 2. aphor. 42. Apoplexia levis facillè solvitur, apoplexia vehemens nunquam sine febre*, interpretandus venit. Commendatores super hunc aphorismum variè se torquent, Galenus obiter transcurrit, & ipse Cardanus tantummodo Grammaticum agit, non Medicum: Sed ex dictis explicatio facilis est, dum per vehementem apoplexiam intelligit Lindanus illam totius corporis universalem, & de illa nemo curatur, nisi superveniat febris; per apoplexiam verò levem intelligit hemiplegiam vel innominatam, vel aliam. Levis est dicta respectu nempe totalis & universalis, & videmus, quod tales hemiplectici diu supervivant, cum omnes affectus apoplectici & paralytici sint difficulter curabiles.

C A U S Æ.

Circa causas apoplexiæ considerandæ sunt & causæ generationis & causæ permutationis: Causa proxima generationis formalis est deficiens spirituum animalium motus in cerebro, interdum simul etiam cerebello, & hinc eorundem cessans influxus in membra reliqua. Et quidem si cerebelli culpa fiat, non tam apoplexia erit (in qua, nisi fortissima fuerit, saltem motus spontanei plus minus abolentur, non verò naturales in pulsu & respiratione:) quam syncope cardiaca, in qua cordis motu penitus sublato circulationis sanguinis cessatio, ejusdem in cerebrum distributio, & spirituum animalium & vitalium necessaria annexio, omninò tollitur, & mox pulsu & respiratione plus minus interdum ad sensum penitus sublatis sine sensu & motu mortuorum instar jacent; siue sanguinis vitio, quod rarius; siue nervorum cardiacorum culpa, v. g. convulsorum, ut in affectibus hysterici & similibus; siue spirituum in suo ex cerebello influxu inhibitorum causâ eveniat. Conf. Willisius *de Anim. Brutor. Part. 2. cap. 8.*

Causa remota materialis seu occasionalis est vel interna vel externa: Utriusque, præcipuè internæ, ratione fit apoplexia vel accidentalis, vel habitualis: Habitualis est, quæ post certas prægressas in corpore occasionis & dispositiones interdum supervenit; Accidentalibus verò, quæ subito, interdum fortuito, sine præcedente certa in corpore alteratione, ægrosprehendit: quod frequentissimè à causis externis oritur.

Utraque est vel privativa, vel positiva, secundum Helmontii doctrinam *Tract. de Lithiasi cap. 9.* ita distinguendo: Privativa est, quæ citra directam activitatem in spiri-

tus animales, aut citra peculiarem iis indutam alterationem, saltem impedimenta quædam infert, propter quæ legitimè iidem aut generari aut distribui nequeunt; adeoque talis causa à posteriori & indirectè saltem, vel spiritibus animalibus producendis materiam subtrahendo, vel eorum motum atque emanationem inhibendo, apoplexiam infert, v. g. qui ex suspensio aut casu ab alto, aut sanguinis intra cranium effusione, aut meatuum cerebri obstructione qualicunque, apoplexiam patiuntur: Positiva verò apoplexia est, quæ à tali fit causa, quæ spirituum animalium crassi & constitutionem vitare, eosdem ad motum & inde dependentes functiones planè ineptos reddere, narcosi & stupore quodam afficere, aut instar liquorum fermentescentium gas eosdem quasi extinguere & suffocare valet: qualis vis in opiatibus, carbonum fumo, fulmine, & similibus notissima est.

Quod attinet apoplexiam privativam: ea fit vel ob sanguinis deficientem naturalem circulum ad & per cerebrum, & incessantem spirituum animalium generationem; idque vel viarum vel sanguinis ipsius culpa; vel ob spirituum denegatum motum in cerebro, & consequenter effluxum, ob pororum cerebri & meatuum ejus vitium, vel obstructorum vel compressorum, siue in ejus centro medullari, adeoque in ipso corpore calloso fiat, siue in ejusdem progressibus, scilicet corporibus striatis & caudicis medullaris initio; idque nunc in universo cerebro, nunc in altera saltem ejus medietate.

Sanguinis motus & influxus ad cerebrum deficit vitio vasorum, arteriarum nempe carotidum & vertebralium obstructione, aut compressione, aut penitus laceratione. Sanguinis hunc motum circulem deficientem, & inde natam apoplexiam, illustrat ligatura fortis collo injecta: hanc enim, si fortius stringas tanquam hominem suspensurus, eo ipso momento, quò arteriæ carotides & venæ jugulares in collo constrixtæ sanguinis motum ad cerebrum tollunt, eo ipso quoque momento omnis motus sensusque perit in talibus, utut adhuc ad tempus & aliquot horas supervivant. Patet hoc etiam in canibus, si factâ cutis colli apertione ligentur fortiter arteriæ carotides, ita tamen, ut parvæ arteriæ cervicales adhuc liberæ relinquantur, canis exinde somnolentus, torpidus & stupidus jacet, & tamen ad biduum ferè supervivit, actionibus tamen animalibus maximè imminutis, de quibus quicquid superest, id obtinet beneficio arteriolarum cervicalium adhuc liberarum, tandem tamen moritur.

(M m m m m)

Causa

Tom. II.

Causa ergo hujus apoplexiæ, ut loquitur Hippocrates, est obstructio venæ. Per venam verò hoc loco tam vena propriè dicta, quàm arteria intellecta fuit apud veteres.

Verùm hîc loci non existimandum est, deficientem influxum sanguinis per unum alterumvè arteriarum carotidum ramum inferre apoplexiam, sed potius ex impedito sanguinis per venas refluxu, & hinc ejusdem in cerebri cerebellique confiniis, aut stagnatione aut extravasatione immodica potius, aut externorum comprimentium violentia, v. g. luxatione vertebrarum colli enormi, apoplexiam oriri, Wepfero concedimus. Contra hanc enim hypothèsin arteriarum nempe carotidum ac vertebrarum à causa interna angustiam, & hinc sanguinis denegatum affluxum ad cerebrum, rectè & eleganter disputat Willis. *de Anima Brut. S. II. c. 8. p. 265.* & majus periculum ex sanguinis abundantia, quàm defectu apoplecticis imminere asserit, cum arteriæ carotides vel vertebrales mutuis anastomosibus coëant, adeoque quamvis forsan in uno latere arteria sit compressa aut obstructa, alterius tamen lateris arteria sanguinis transcolationem peragere, & totum cerebrum irrigare possit. Unde & Sylvius *lib. 2. Prax. cap. 21. §. 36.* minus hoc concedere vult, dum vasa arteriosa obstrui aut comprimi posse, indeque apoplexiam oriri non putat: ita ut non nisi raram, & saltem propter externæ causæ violentiam talem apoplexiam, ex denegato sanguinis per arterias influxu dependentem, oriri æstimem, quin potius propter impeditum circulum ex denegato refluxu, & hinc cerebri aut repletionis, aut compressionis, aut à sero extravasato repletionis, sicque spirituum impedito motu in cerebro, & impedito influxu ad partes reliquas, apoplexias hujusmodi privativas, vitio sanguinis circuli contingentes, oriri arbitrer.

In sanguine verò hæret vitium seu causa ejus stagnationis, quando hic crassus, grumulosus, aut nonnihil coagulatus existit, & ita in vasis stagnat aut hæret; sive in vasculis meningum: sive in sinibus cerebri: sive in ramis carotidum aut jugularium, sive denique in ramis pulmonalibus: Nam & in his si coagulatus existat, syncopen cardiacam aliis dictam, vitio sanguinis natam, aliis vero catarrhum suffocativum dictum, infert. Nam hic affectus est finitimus & simillimus apoplexiæ, adeò ut catarrhus talis suffocativus ex sanguinis stasi in pulmonibus, & apoplexia ex sanguinis stasi in cerebro aut ejus vasis, loco tantummodo differant. Qua ratione etiam syncope ab hermeticis dicitur lunaris eclipsis: apoplexia verò solaris eclipsis. Nec ullum est dubium, tales ægros sive à sanguine stagnante suffocatos, sive apoplecticos, eodem modo interfici: Unde etiam teste Fracassato

*in Epist. de cerebro ad Malpigh.* apoplecticorum vasa sanguifera in pulmonibus interdum admodum turgida aut penitus disrupta, inventa fuerunt. Facit huc etiam exemplum Pannarolli de quodam morbo, apoplectico insultui simillimo, orto ex sanguinis copia & unâ stagnatione. Sed de his & similibus pluribus & apoplexia ex hac causa nata, vid. imprimis Wepferus *de Apoplex. & de loco affectu in apoplex.* Schneiderus *Tract. de Catarrhis*, in specie ubi *de Catarrho suffocativo, & de Catarrho sanguinis.*

Communis veterum sententia est, in apoplexia cerebri ventriculos repleri, & exinde spirituum animalium motum tolli: Sed experientia testatur, sæpiùs aliis morbis mortuos exhibuisse ventriculos cerebri repletos & obstructos, cum tamen nulla secuta sit apoplexia: Sic refert Lindanus, Amstelodami dissectum fuisse caput viri, qui per tres annos dolore capitis acerbissimo laboraverat, cujus ventriculi ita repleti fuere humore seroso aut limpidò, simili lymphæ vasorum lymphaticorum, ut integra pinta Hollandica exinde potuerit eximi, nunquam tamen fuerat apoplecticus: Sic Fernellius exemplum recenset inter alia aperti cujusdam capitis apoplectici, in cujus cerebro nihil noxæ inventum fuit, sed tantummodo in vena jugulari sanguinis grumi: id quod convenit cum Nymmanni sententia *de Apoplex.* qui sedem apoplexiæ statuit in torculari herophili seu loco concursus quatuor sinuum duræ meningis, & dicit, sanguinem abire in grumos, & grumositates ibi stagnantes impediendo motum humorum apoplexiam inferre: quo etiam videbitis accedere Hofmannum *in Institut.* Ignoravit autem Nymmannus circulationem sanguinis, unde spirituum influxum cum sanguine denegatum causam asserit, cum potius ex impedito refluxu, hinc sanguinis stagnatione, & cessante in cerebro circulo, apoplexia inde oriatur. Rarissimæ sunt ergo apoplexiæ ex impedimento sanguinis versus cerebrum, nisi fiant à maxima violentia externa: Sic aliàs notum est ex concussio aut depressio cranio secutam apoplexiam: ex porulis ac meatibus cerebri nimium depressis, & invicem conniventibus; unde & sanguinis & spirituum animalium motus omnino fuit interceptus.

Ex dictis patet, quod apoplexiæ causæ proximæ sint vel impeditus spirituum animalium motus in cerebro, vel impeditus sanguinis circulus per cerebrum. His causis proximis adjungendæ causæ remotiores, quæ quacunque ratione proximæ inferunt, & per consequens apoplexiam causant. Hæ verò omnes cōducunt, quatenus sanguinis ut & spirituum animalium influxum & motum & sanguinis circulum tollunt.

Remotio.



Remotiores causæ, quæ ad apoplexiam hanc, ex sanguinis deficiente motu oriundam, disponunt, sunt variæ: nempe frigus repentinum aut nimium congelando quasi sanguinem, & ita inspissando ejus motum impedit, aut quocunque modo alterando sanguinem aut spiritus, ad apoplexiam disponit. Facit huc, quod juxta Hippocratem *Aphor. 16. & 23. l. 3.* aër frigidus & humidus, hyems, autumnus; item aër aquilonius continuus imbribus irrigatus, ad apoplexiam disponat: quæ ipsa & confirmantur à Foresto *lib. 10. obs. 70.* Econtra verò æstus nimius aut calor ambiens nimius, aliquando nimis massam sanguineam, disponere potest ad apoplexiam, teste Schenckio *lib. 1. de Apoplex. observ. 1.* vid. Piso *de Colluv. serosa.* Forlan & huc pertinet suo modo lauta nimis & larga diætâ cum vita sedentaria conjuncta; hinc enim rectè dicit Henricus ab Heer *obs. 18.* quod nos septentrionales imprimis ex ingluvie & comestationibus corripimur apoplexia. Quò facit lotio capitis illegitima cum aqua tepida, si scilicet subito caput exponatur aëri frigido: Exemplum tale observavit Amatus Lusitanus *Cent. 1. Curat. 36.* Ex tumore cranii externo sanato apoplexiam natam refert Bartholinus *Cent. 4. observ. 86.* Morbi melancholici in apoplexiam quoque abeunt, quod præter Mœbium in *Instit.* etiam observavit Forestus *lib. 10. observ. 78.* Post nimia purgantia sanguis draconis pro adstrictione alvi adhibitus apoplexiam intulit, teste Bartholino *Cent. 2. Epistol. pag. 680.* Speciatim suppressæ quædam solennes sanguinis evacuationes per hæmorrhoides aut uterum, aut hæmorrhagiam narium, &c. frequenter admodum ad apoplexiam disponunt: sic ex suppressa narium hæmorrhagia consueta apoplexiam observat Hildanus *Cent. 3. observ. 11.* Conf. Zacut. Lusitan. *lib. 7. Hist. Med. Princ. c. 7.* & Fontanus *l. 1. Curat. & Respons. pag. 25.* Et hinc est propter talem sanguinem extravasatum, aut ex anastomosi effusum, quod tam sæpè in apoplexiâ mortuis sanguis congruatus & coagulatus in cerebro ejusque ventriculis fuerit repertus: sic Bartholinus *Cent. 2. Hist. 60.* & Rhodius *Cent. 1. Observ. 67.* ex sanguine congruato & extravasato, ventriculos cerebri replente, ex plexibus choroidæ eò effuso apoplexiam lethalem observant; sicut etiam in occipitio sanguis congruatus sæpè repertus fuit: Sic Hildanus *Cent. 3. obs. 12.* observat mulierem, quæ menstrua suppressa sæpius per os & nares excrevit, quæ tandem & hæc suppressâ excretionē apoplexiâ lethali correpta fuit, & post mortem post triginta sex horas sanguinem adhuc per dicta loca excrevit: sicuti etiam in *Observat. 11. citata Cent.* idem Hildanus tale refert: Vid. Borrellus *Cent. 2. Hist. 34.* Venus è con-

Tom. 11.

trâ nimia potissimum in senibus ad apoplexiam multum disponit: Vid. Henricus ab Heer *observat. 18.* & Platerus in *observat.* Pertinent huc imprimis affectus animi graviores quicunque, quos inter imprimis est ira, quæ cum inducat sanguinis ebullitionem ejusque insignem fervorem, in prædisposito cerebro facilè stagnationem sanguinis & apoplexiam infert. Et cum prius homines *εὐταρχει* subinde apoplexiâ correpti observantur ex iracundia, monente Foresto *lib. 10. obs. 70.*

Spirituum animalium quod attinet deficientem motum: cessat hic serè ex pororum ac meatuum conniventia & subsidencia quasi, cujus plures possunt esse occasiones, contusione, v. g. à cerebri & valida commotione; item à materia tenui, subtili & quasi lymphatica, successivè circa cerebri corticem glandulosum congesta, subito & impetuosè interiora versus irruente, & ita poros & meatus obstruente: quam causam in habituali apoplexia imprimis accusat Willis. *cit. loc.* Item à sanguine grumoso, v. g. post capitis contusiones extravasato: Item ab abscessu in meningibus rupto, aut alia vitiosa materia extrinsecus cerebro instillata, aut intrinsecus in cerebro collecta, aut circa ejus basin congesta, ibique compressionem cerebri & in specie radices medullaris & nervorum principii inferente.

An etiam mucus viscidus & pituita præternaturaliter extrinsecus circa medullam spinalem colligi, eandem comprimere & ita apoplexiam aut cognatos affectus inferre valeat, prout asserit Sylvius *l. 2. Prax. cap. 21. § 49. pag. 162.* ceu dubium & minus probabile in medio relinquo, ob lentum pituitæ motum, nisi vehiculo feri aut lymphæ, à motu naturali quacunque causa oberrantis, ad ista loca delata & collecta fuerit: vid. Helmontius *Tr. de Lithiasi.*

Disponunt ad hanc apoplexiam contusiones, & concussiones capitis, tam cum quam sine manifesta ejus læsione tactæ; sive collabuntur & angustentur saltem pori, sive sanguinis simul vitietur circuitus intra cranium, v. g. ex nimio sonitu: commotum enim & concussum cerebrum subsidet quasi, ita ut poris ejus sic collabantibus & angustatis, aut distortis, aut vitiosè difformatis, spirituum meatus & viæ delectantur: Sic ob casum ab alto, ex gravi cerebri concussione, apoplexiam lethalem observavit Horstius *lib. 2. obs. 13.* sicut etiam Deodatus in *Valetud. pag. 121.* ex casu ab equo vertiginem, quæ tandem in apoplexiam lethalem desit, observavit: sic notum est ex alapa inflicta, apoplexiam fuisse abortivam, qualia exempla habet Schenckius ex Benivenio in *observ.* uti etiam Hildanus *Cent. 5. obs. 85. & Cent. 6. obs. 11.*

(Mmmmm 2)

Item



Item ex ictu oculi nimio, indeque valida capitis & cerebri concussione, apoplexiam in puero observavit Fernellius *l. 2. de Abdis. Rer. Causis cap. 15.* Non secus atque idem Fernellius *cod. loc.* refert, virum quendam ex vulnerato oculo apoplecticum, in quo dissecto sanguis grumulos copiosus circa cerebri basin decubuerit: sic ex percussione oculi cum raphano apoplexiam vidit abortam Scultetus *in Armament. Chirurg. observ. 21.* Apoplexiam à cranio depresso & sanguine extravasato, præter quotidianam experientiam, etiam testantur Durerus *in Hipp. Coac. Prænot. pag. 366.* Borellus *Cent. 2. obs. 34.* Henricus ab Heer *obs. 12.* Wepferus *de apoplex. observ. 1. & 2.* Bartholinus *Cent. 2. Hist. 60.* & Bonettus *Sepulchret. lib. 1. sect. 2. observ. 7. 8. 12. ac 13.*

Præter sanguinis collectiones intra cerebrum, pertinent huc etiam vitia feri & lymphæ, quatenus, ut supra monitum, inundando cerebrum, & omnes ejusdem poros replendo, apoplexiam non rarò periculosam inducere possunt, autore Marcello Donato *lib. 2. Hist. Med. Mirab. cap. 6.* qui refert de quodam forti apoplexia peremto, in cujus aperto cranio tota cerebri substantia aquoso humore perfusa & oppleta fuit reperta, qui ipse humor etiam in cerebri ventriculis redundavit: dissectis carotidibus ingens sanguinis crassi melancholici emanavit copia: sic affirmat Columbus *in sua Anat. cap. 15.* quod apoplecticorum capita dissecta exhibuerint sæpissimè cerebrum magna aquæ glutinosæ copia distentum. Facit huc observatio Johannis Danielis Horstii *in Obs. Anatom. 3.* de Principe apoplectico mortuo, in quo præter alia observatum fuit cerebrum magnū & grande, sero & pituita plus quam refertum, maximè in ventriculis; arteria autem venosa ac aorta nigro humore, atramento simili, fuit repleta & perfusa, qualem Princeps ante apoplexiam ad aliquod tempus in lingua & faucibus habuerat. Plura exempla vid. apud Wepferum *obs. 4. & 15.* Willisium *Anat. Cerebri c. 12.* Facit huc suo modo potus vini nimius & crebrius repetita ebrietas, quæ multos, & quidem ætatis consistentis, & alias optimi habitus, ad apoplexiam disponit; Nam ex his ortam apoplexiam refert Fonseca *l. 2. conf. 89* uti etiam Forestus *l. 10. conf. 69.* Non enim solum vis narcotica spiritus vini spiritus animales alterare & apoplexiam inferre potest, sed & copiosa lymphæ generatio & cerebri inundatio à potu vini copiosi huc pertinet, dum post nimium ejus potum apoplexiam & inde paralytin linguæ & lateris dextri observat Piso *Tr. de Colluv. serosa. pag. 88.* Apoplexiam à tumore, v. g. scatematico, vid. apud Bonetum *loc. all. Observ. 53. serosa*, Panarol-

lum *Pentec. 1. observ. 17.* Pertinet huc etiam scabies retropulsa; ex qua apoplexiam in viro ætatis consistentis observavit Mæbius *in Instit. pag. 265.* Variolæ etiam huc videntur facere nonnihil repulsæ apoplexiam inferentes, teste Foresto *lib. 10. observ. 70.* Ita ut privativa apoplexia, quatenus ex causa saltim externa oritur, pro faciliiori praxi nunc sanguinea, vitio nempe sanguinis in cerebro extravasati, & grumis suis cerebri structuram & spirituum motum lædenti, nunc serosa seu lymphatica dicenda sit: Vid. *Observ. Anat. in Bonetti Sepulchreto*: quorum ista hominibus mediæ seu consistentis ætatis, iracundis, corpulentis, obesis, ebriosis, & aliis apparenter sanissimis; posterior verò senibus decrepitis, catarrhosis, & similibus, obvenire solet.

Vapores Mercuriales pariter apoplexiam inducunt, vid. Langius *Epist. l. 1. Epist. 43.* hinè qui Venetiis specula Mercurio illinunt, ad apoplexiam declinant: Vid. *Acta Societ. Reg. Vol. 1. pag. 18.* Præterea vapores thermarum sulphurearum apoplexiam inferre notat Schenckius *l. 1. obs. 2.* Sicuti ex nimio fœtore ex vaporibus puteorum canosorum apoplexiam refert Marcellus *l. 2. c. 6.* Fumi narcotici metallici, carbonum, cerevisiarum & vinorum effervescentium, etiam referuntur à quamplurimis ad causas apoplexiæ privativæ remotas, quatenus spiritibus animalibus vincula injiciunt, ut ipsa experientia loquitur.

Cui etiam causarum generi adscribendus venit terror ac gaudium immodicum: de quorum priore vid. Hildanus *Cent. 6. obs. 12.* & Lossius *l. 1. obs. 14.* qui refert, terrorem ex sclopeto exploso apoplexiam intulisse, quatenus spirituum motum & agilitatem sistendo, horum influxum ad inferiora inhibent: Sicut ex nimio sonitu apoplexiam abortam etiam notat Fontanus *in Curat. & Respons. l. 1. pag. 49.* & Amatus Lusitanus *Cent. 3. obs. 26.* à tonitru Behvenius *c. 23.* Quò etiam pertinent apoplexiæ ex fulmine, quæ notæ sunt ex Marcello Donato, & Schenckio.

Sed ultra hanc privativam apoplexiam, etiam alteram dari positivam, confirmant tam opiata in majori dosi usurpata, quam gas carbonum, aut liquorum fermentescentium, quando in cellis vinariis subito apoplexiâ instar suffocatorum intereunt; uti & spiritus vini vel vini generosioris abusus, quæ positivâ efficaciam narcoticâ, & stupefactivâ qualitate apoplexiam inferunt, spiritus animales alterando & stupefaciendo, unde in motu cessant. Sed cum hæc fiant saltim à causa externa; attamen talem etiam à causa interna oriri, primus docet & accuratè defendit Helmontius, & probabile sit ex eo, quod alii affectus soporosi, speciatim comata, lethargi & cataleptici, ex causa interna oriantur: quidni ergò

ergò & apoplexia? quæ vix essentialiter ab illis differre videtur: Scilicet Helmontius *Tr. de Lithiasi cap. 9. à §. 41. ad §. 90.* in eo est totus, ut propriè sic dictam apoplexiam à causa interna enasci asserat, eaque positivâ, nempe à certo quodam veneno anodyno & glaciali in stomacho hærente, ex digestionis propriæ errore enato, occasione cujus archæus horrefcat, fugiat, & ideas cadaverosas illius recrementi pariat, quò ipsò cerebrum cum pedisequis potentis, horum nempe spiritum insitum, in sui obsequium trahat, per actionem regiminis stomachi aut duumviratus. Unde talis terror in spiritibus dictorum locorum incolis excitatur, propter quem terrorem nunc utrumque, nunc debilius medullæ latus, contrahitur, unde paralytis apoplexiæ supervenire dicitur. Quia Helmontius est obsecutus, conferatur Grembs *Tr. Arbor Ruinosa & Integra Hom. l. 2. c. 1. §. 43. & seqq. pag. 268.*

In hac hypothese duo consideranda:

1. Res ipsa, an sit talis apoplexia positiva?
2. Modus rei, quo se habeat, ut ex tali fomite morbofo in præcordiis hærente inferatur apoplexia?

Quoad prius: excitari apoplexias à causis internis, spiritus animales vitiantibus, & stupidos ac torpidos reddentibus, & ita positivè operantibus, lisque circa stomachum seu ventriculi superius orificium consitis seu hærentibus, h. e. dari apoplexiam positivam ex præcordiis excitatam, verissimè arbitror: idque (1.) à juvantibus: Observatum enim frequenter, quod vomitus optimum sit in quamplurimis apoplexiis etiam fortissimis remedium, quò citius provocatur, eò melius. Præter Helmontii effata vid. Langius in *Misc. pag. 11. & 12.* Henricus ab Heer *obs. 18.* ex observationibus præfert vomitus venæ sectioni in apoplexia: quod etiam observavit Barbette in *Praxi.* Item subtilia aromatica, odorifera & omnia stomachalia, brevi recreant tales apoplecticos. (2.) A nocentibus: Nempe gas seu halitus carbonum oretenus inspiratus interdum apoplexiam, utut ad cerebrum non perveniat, sed dum affligunt orificium stomachi, graves vertigines, item caroticos affectus infert, ex affecto imprimis stomacho. Dicunt: afficiendo sanguinem etiam successivè afficit cerebrum: Sed posito, rem ita se habere; certum tamen est, quod hoc gas imprimis simul afficiat orificium stomachi; unde ex stomacho affecto vertigo & apoplexia superveniunt: qua ratione imprimis ex stomacho affecto apoplexiam deducere conatur Helmontius, utut non possit dici modus aut ratio fiendi; Nam ob id vomitus juvat: Hinc cupediarum artifex ex carbonum gas inebriatus, mortui instar in carbonem incidit candentes, sine sensu totum femur

comburens. Par ratio est in iis, qui vaporibus vini ac cerevisiæ fermentantis subito suffocati intereunt; Nam vel vomitus superveniens, vel mox institutus, est salubris. Facit huc vini generosioris abusus, item nicotianæ fumus, qui manifesto apoplexiam talem positivam ex præcordiis oriundam infert: Vid. Grembs *l. 3. c. 1. §. 37. pag. 465. cit. Tract.* Sic ex esu fungorum excitatam apoplexiam, vomitu imprimis curatam, videb. in Bartholini *Act. Hafn. Volum. 2. p. 295.* (3) Ab adiunctis, quæ in talibus observata sunt: Curavi ante biennium mulierem quadraginta annorum, ex causa interna apoplexiâ forti ex improviso enatâ correptam, quæ brevi in hemiplexiam totius lateris sinistri desinebat: Hæc in insultu & post conquerebatur in paroxysmo de gravissima angustia & anxietate præcordiorum, simul cum insigni in somnum propensione; Aliud enim est defectus virium ex spirituum animalium defectu præcisè, aliud somnolentia ex eorum torpore. Summè debiles ex spirituum animalium defectu ad ultimum vitæ articulum sunt insomnes: isti verò aliàs validi ex improviso somnolenti fiunt. Et quidem recrudescente subinde paroxysmo, præcedebat præcordiorum angustia, cui superveniebat somnolentia: illâ cessante & hæc cessabat. Unde & alio tempore, sex vel octo septimanis à primo insultu, propinatum ex alia causa vomitorium antimoniale, cum anxietate præcordiorum virium imbecillitatem & insignem ad somnum propensionem inferebat. (4) Ab antecedentibus: Sic vertigo diuturna, per consensum stomachi enata, est prodromus apoplexiæ in senibus. Plura hujus novi exempla: Parenti meo certò imminet apoplexia: Plures sunt anni, quod vertigine per consensum stomachi laborat, & hæreditario vitio ad apoplexiam inclinat: unde certus sum, quod hæc vertigo ex stomacho certò prædicat apoplexiam. Omnes ejus ex materna linea parentes apoplexiâ tacti fuerunt: Avia materna hoc affectu interiit, & mater jam semel apoplexiâ correpta fuit: Unde hæreditarius character à parentibus apoplecticis in liberos delatus patet. Conf. Forest. *L. X. o. 75.* Sed talis character hæreditarius apoplecticus, qui à parentibus transfertur in liberos, antequam ipsi apoplexiâ correpti fuerint, revera positivum quid in apoplexia subesse innuit, à quo vertigo etiam ex stomachi consensu, & tandem apoplexia, supervenit. (5) A remediis quibusdam appropriatis, v. g. cinnabaris antimonii, ☉ diaphor, non nisi intra primas vias positivè operantia, ad apoplexias & paralytes sunt egregia. (6) Modus fiendi subitaneus & frequenter momentaneus rem per humorum defluxum, aut viarum oppilationem, quæ per successionem saltem fit, vix

(M m m m m 3) suffi-



sufficienter explicat, adeoque aliud quid sub-  
sit necesse est, quod tam subito malum infer-  
rat. Sed hoc gas rerum fermentescentium suâ  
penetrante narcosi & momentaneâ operatio-  
ne optime illustrat. Ob id etiam Willisius non  
acquiescit in solo humorum serosorum alio-  
rumve in cerebri medullarum præternaturali  
translatione, sed simul vim virulentam, spiri-  
tus animales fugantem & extinguentem, unâ  
accusat. Equidem sæpissime signa quædam  
circa caput & animalem facultatem præce-  
dunt, quæ imminentis apoplexiæ metum in-  
cutiunt: vid. Sylvius *l. 2. cap. 21. §. 22. & seqq.*  
Sed hæc ipsa medio se habent modo, ita ut ca-  
pitis affectum per essentiam, ut & per consen-  
sum insequi possint; sicut vertigo ex stomacho  
in senibus tale existit prodromum symptoma  
in habituali apoplexia. Unde sedulo semper  
investigandum: an aliæ concurrentes circum-  
stantiæ generales plus minus affectum capi-  
tis per *πρωτοπάθειαν*, an verò per *δευτεροπάθειαν*  
designent? Sicut non rarum est, epilepsias uni-  
versales per abdominis consensum excitari, &  
remedia, quæ abdominis aut hypochondrio-  
rum spatia non excedunt, & deliriis & spasmis  
& cephalalgis optime subvenire, v. g. Mar-  
tialia, cinnabarina, vomitoria, clysmata, &c.

Quoad posterius: Ad veterum vapores &  
halitus, aut chimistarum effluvia vitriolica  
stupefactiva adscendentia, effugere est ridicu-  
lum: Ignoram actionem regiminis Helmon-  
tii profiteri, est palliare propriam ignoran-  
tiam: Consensus, qui per nervos saltem ex-  
plicabilis est, & hic vix locum mereri vide-  
tur, cum hic semper sensum, & huius demum  
ratione consensum præsupponat; qui in apo-  
plecticis penitus torpet; nisi dicere velimus,  
per consensum irritatorum nervorum circa  
præcordia stringi cerebri fibras nervorumque  
principium, cujus contracturæ occasione spi-  
rituum in partibus externis deficiat motus,  
qui in cerebri medulla perturbatus sensum  
& rationem tollat: Per sanguinis & spiritu-  
um animalium circularem motum negotium  
quodammodo illustrari posset, sed & hic  
quamplurima obstant. Res ergò difficillima  
est. Narcosi quidem percuti & stupefieri spi-  
ritus animales, seu figi & quasi plus minus coa-  
gulari, plausibile est: quomodo verò hoc ex  
præcordiis fiat, res hæret & à priori latet.  
Nempe sicuti opiata vel semen hyoscyami,  
fungi vel gas carbonum in stomacho adhuc  
hærentia, inferunt affectus soporosos & ca-  
roticos, & hac ratione spiritus animales infi-  
ciunt & torpidos reddunt; ita etiam similis  
virulentia narcotica ex causis internis in cor-  
pore nata, & circa præcordia existens in re-  
gione stomachi, spiritus animales afficiendo  
apoplexiam positivam inferre solet. Sufficiat  
pro meliori doctrina, & ad praxin manu-  
datione, differentiam apoplexiæ in privativam

& positivam insinuasse; observando simul,  
ex causis externis frequentiore esse acci-  
dentalem; sicut ex internis habitualement, & has  
inter, quæ ex causis internis oriuntur, ferè fre-  
quentiores esse positivas quàm privativas.

Causas remotas recensitas quod attinet,  
si has ipsas, prout à Scriptoribus consignatæ  
deprehenduntur, consideremus, eadem ferè  
ad privativas, minùs ad positivas apoplexias  
pertinent, ut notabilis & curiosa sit obser-  
vatio Willisii *de Anima Brutor. Part. 2. cap. 8.*  
Deinde magis accidentales ferè, quàm habi-  
tuales sunt. Adhuc remittæ istæ causæ exce-  
pris iis, quæ manifestâ læsione caput affici-  
unt, potiùs *προνυμψύαι* sunt seu antecedentes,  
quæ causam continentem movent; aut saltem  
sunt subinde causæ procatactica, quæ dispo-  
sitionem morbosam internam commovent,  
ut ex proximis constituant. Ut taceam in  
observationum anatomicarum consideratione  
ex inspectis cadaveribus facillimam, modò  
non frequentem esse fallaciam à non-causa  
ut causa; ita ut vel præternaturale quid for-  
san repertum, pro causa morbi mortisque ha-  
beat; vel etiam productum quoddam mor-  
bosum pro genuina illius habeatur origine.

Quoad causas permutationis apoplexiæ:  
tribus fit modis permutatio hæc; vel ter-  
minatur ad salutem ægri integram, remotâ  
& correctâ plus minus causa proxima; vel  
terminatur ad mortem, cessante tandem cor-  
dis motu pullatorio, unde suffocati intereunt  
ægri; vel denique ex universali in particu-  
larem transit apoplexia, nunc pauciora, nunc  
plura occupant membra.

Quoad (1.) fit, quando post successivam  
evacuationem, sive sanguinis, sive per vomi-  
toria, sive per alvum, in specie per sudorem  
solvitur pedetentim apoplexia ad perfectam  
ægri salutem. Quò pertinet, quando median-  
te salivatione uberiore, vel spontanea, vel re-  
mediis Mercurialibus instituta, successivè cu-  
ratur apoplexia, quod observavit Sennertus  
*in Praxi lib. 1. Part. 2. c. 33. p. 664. ubi de Apo-  
plexia, & Deckers in Barbet. Prax. p. 21. & 29.*

Si verò (2.) terminatur ad mortem, fit, quan-  
do successivè ægri suffocati intereunt. Fit, qua-  
tenus cessat plus minus spirituum animalium  
motus, etiam ex cerebello ad cor & organa re-  
spiratoria, deficit pedetentim pulsus & respi-  
ratio, quibus cessantibus ægri suffocati inter-  
eunt: cujus rei prodromus est stertor profun-  
dus, cum spuma per asperam arteriam eleva-  
ta, & pedetentim circa os apparente.

(3.) In paralyin seu in apoplexiam parti-  
cularem paroxysmus mutatur, quamvis nec  
hoc modo æger semper servetur, sed sæpe aut  
prior morbus redeat, aut sopor lethalis super-  
veniat. De modo, quomodo aut hemiplexia  
aut paraplegia seu apoplexia particularis qua-  
dam apoplexiæ universali succedat; v. g. ut  
brachium



brachium post universalem apoplexiam maneat tantum paraplecticum, reliquis partibus omnibus sensum & motum recuperantibus? res difficilis est. Equidem cum apoplexia sanguinea in paraplegiam transeat, quodcumque etiam sanguinis, vel motu deficientis, vel extravasati, fuerit vitium, ferè hæreo: quin potius talem apoplexiam ut plurimum lethalem, rariùs curabilem perfectè, existimo, nisi forsàn venæsectio largior opem ferat: vid. Tulpus *lib. 1. cap. 7.* & Zacutus Lusitanus *Med. Princ. Hist. cap. 7.* Aut si paraplegia supervenerit, probabile est, ex sanguine congruato aut plus minus subsistente laticem aquosum fecisse secessum; & vel interiùs profundius penetrans, scilicet per cerebrum in caudicem medullarem; vel exteriùs defluxisse secundum situationem spinalis medullæ, & ita unius alteriusve nervi læsione vel oppressione paraplegiam intulisse. Privativa verò lymphatica apoplexia successivâ lymphæ materiæve peccantis ulteriori progressionē, & in caudicem medullarem interiora versus insinuatione, adeoque certis in locis vel obstructione vel compressione paraplegiam inferre posse, satis plausibile videtur, in qua nunc motus solum deficiat in leviori malo, nunc sensus tantum in graviore, & in quo omnis spirituum animalium transitus penitus intercludatur. Positivam etiam excipere paraplegiam res nota est. Paraplegiam esse contracturam partium nervosarum; quâ impediatur spirituum pro motu transitus, non improbabilis est Helmontii assertio: sed quomodo fiat? & quibus differentiis à propriè sic dicta contractura seu spasmo partium differat? difficile est determinatu, nisi forsàn dicere velimus, nervos eorumque fibras circa radicem aut prope exortum ex caudice medullari contractos, inducere paraplegiam; sicut ipsi nervi in progressu sui ipsius cum toto nervorum & fibrarum nervosarum, cum quibus connectuntur, systemate contracti, dare convulsionem.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Apoplexiâ tactum esse hominem facile patet, si subito omnis sensus ac motus pereat & simul vox repente auferatur, solâ respiratione nunc liberâ, nunc satis difficili remanente, prout in historia morbi dictum.

Ut autem ritè distinguatur apoplexia, qualis sit? an positiva? an privativa? ab antecedentibus, & hinc ab adjunctis cognosci debet: Illam causæ externæ, vitæ genus, habitus ægri, diæta, &c. suggerunt; facile tamen positivæ privativa supervenire, & invicem complicari possunt: illius occasione sanguinis motu sufflaminato, & ita circa cerebrum eodem stagnante.

Dixi, quod vicinissimus affectus sit apo-

plexia cum syncope cardiaca seu catarrho suffocativo, & differant tantum loco affecto, adeo ut quidam etiam apoplexiam ad affectus cordis referant, & eodem modo curent. Signa ergo, quæ pro distinctione apoplexiæ & catarrhi suffocativi observentur, sunt hæc: quod in syncope cardiaca, ex sanguinis stasi in pulmonibus, æger difficillimè respiret, & signa adsint gravissimæ in pectore angustię, ipse æger omni etiam conatu membra & artus movere conetur, utut mortuorum instar jaceant. Qui autem apoplexia graviore corripitur, is vix manifesta vitæ habet signa, neque tamen tanta spirandi difficultate vexari solet. Pulsus quoque, qui in syncope cardiaca ferè deficit, in affectibus apoplecticis ferè durus observatur, ita ut aliqui pulsum servant, alii pusillum habeant, rarò, nisi in fortissima apoplexia, nullum, prout nempe plus vel minus præcordiorum sanguis stagnat, aut nervus cordis afficitur. Præterea in syncope cardiaca externa frigent, facies pallescit, sudor frigidus erumpit, pulsu evanescente, & respiratione penitus ablatâ. In apoplexia, abolitis functionibus animalibus, nihilominus respirant, arteriæ pulsant, extrema calida ut plurimum deprehenduntur, & facies rubicunda observatur: Vid. Wepferus *de loc. affect. in Apoplex.* Præterea in apoplexia quavis fortis stertor est, quia spiritus animales, qui à cerebro accedunt musculis thoracis ad complementum respirationis, solum sunt ablati, durante adhuc per cor & pulmones sanguinis circulo; unde in syncope cardiaca nullus est stertor, quia cor ipsum subito occupatur.

In gravi passione hysterica etiam ægræ instar apoplecticarum jacent, unde confunditur cum apoplexia interdum. Distinguuntur tamen facile, quod in suffocatione uterina dicta præcesserint symptomata affecti abdominis; item quod in suffocatione uterina interdum vis sentiendi persistat, nec respiratio tam facile impediatur; & quod in suffocatione hac pulsus fiat obscurus, debilis aut parvus, aut ferè nullus, qui sæpe in apoplexia admodum sensibilis est. Et in specie cum subinde in apoplexia faciei color ferè persistat, imò rubicundi ac tumidi subinde in facie appareant, hinc in suffocatione uterina omnino color perit, quin potius facies palleat.

A caro facile distinguitur apoplexia in eo, quod sensim invadat, non adeo subito ac apoplexia: item caro etiam laborantibus est respiratio facilis sine omni stertore; aut si adsit stertor, adest cum somno, eoque satis profundo.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: notum est, quod apoplexia sit acutissimus & periculosissimus affectus, qui ægrum ut plurimum trucidet; & licet.

licet non semper exin moriantur ægri, paralytici tamen evadant. De hoc dicit Hippocrates *sect. 5. Aphor. 5.* item *sect. 6. Aphor. 51.* quod quicumque sani repente doloribus capitis tententur, statim obmutescant & stertent, in septem diebus pereant, nisi febris eosdemprehendat, quæ apoplexiæ superveniens conducit.

Febris tamen non sit à stagnatione sanguinis circa cerebrum aut phlegmonode hujus constitutione, nec lenta: Imò & hoc addere convenit, nisi à comprimente extrinseco fuerit malum, illudque tempestivè tollatur.

Dicit etiam *sect. 2. Aphor. 42.* quod apoplexiam fortem solvere impossibile sit, debilem verò non adeò facile. Interim vitæ periculum variat pro diverso morbi gradu, huicque magis aut minus difficili combinatâ respiratione. Vehementia autem hæc & periculum apoplexiæ ex noxa, quam respiratio affert, imprimis cognoscitur; nam qui apoplexiâ moriuntur, omnes suffocati intereunt.

Imprimis quidem, ubi apoplexia in tantum lædit respirationem, ut præter stertorem etiam spuma circa os apparere incipiat, ferè lethale apoplexiæ signum est, ut rectè hoc affirmat Forestus *lib. 10. obs. 74. in schol.* ubi dicit, quod spuma circa os apparens sit unum è præcipuis signis lethalibus, cum sit extremum signum, à quo rarò evadunt: Item Tulpius *lib. 1. obs. cap. 51.* refert, quod in iis, qui apoplexiâ moriuntur, aspera arteria reperiri soleat post obitum spumoso sanguine repleta.

Spuma ista, ut jam supra *sect. 14. cap. 3. art. 4.* de catarrho suffocativo monui, certum & infallibile signum est sanguinis motus omninò per pulmones impediti: ex quo sanguine in pulmonibus, & tandem in ipso corde, stagnante per aëris validam & reciprocam, sed frustraneam, respirationem elewantur spumæ, unde hæ ipsæ etiam non nisi in ultimo ferè articulo apparere solent. Unde dicit etiam Hippocrates *sect. 2. aph. 43.* quod strangulati & suffocati, nondum tamen mortui, ad se non redeant, quorum circa os spuma collecta appareat. Nempè spuma non præcisè mortis, sed supremus viventium conatus est in talibus ægris; hinc non semper & necessariò mortem portendit, quemadmodum Tulpius *lib. 1. obs. 7.* testatur, cum materia spumæ hujus modò serum ex pulmonibus transudans, modò salivæ humiditas ad os deposita, & per difficiliorem & crebriorem respirationem in spumam redacta sit: quorum illud suffocationis instantis signum, apoplexiam semper lethalem; hæc non semper, indicat, vid. Sennertus *Prax. lib. 1. Part. 2. cap. 33.* & Tulpius *lib. 1. obs. 6.* Observandum ergò est hic, ne confundatur spuma vera cum viscoso quodam liquore vel saliva vi-

scida effluente. Non ergò levis ista spuma adeò periculosum signum est, quæ ex saliva intra fauces agitata oritur, & qualis in paroxysmis epilepticorum ordinatiò observatur; sed illa terè fatalis est, quæ ex imo pectore seu ipsis pulmonibus ex sanguine plus minus stagnante, per aëris reciprocum motum attenuato, & ita in spumam rarefacto, oritur, & ita in fauces foras bullit: adeò ut observati sint apoplectici in Schenckii *Observationibus*, quibus etiamnum post mortem talis copiosa fervida spuma, per nares, os & prominentes oculos fuerit excreta.

Deinde de stertore equidem certum est, & illum ut plurimum, quò vehementiorem, eò difficiliorem morbum ostendere; nihilominus etsi hic remittat, reliquis symptomatibus tamen non simul remittentibus, non salutis, sed mortis certissimæ signum evadit; & contra, ubi mox cum sensu & motu respiratio aboletur, quamvis nec stertor nec spuma appareat, fortissima & lethalis apoplexia erit dicenda.

Denique apoplecticis, si in difficillima respiratione supervenit sudor, lethale est; est enim sudor symptomaticus, & quasi syncopicus, non verò naturalis sudatio, & signum est deficientis planè facultatis vitalis.

Apoplectici curati faciliè recidivant, & hi ipsi melius habentes post universalia, bonum est; aut aliquomodo excitati, si denuo somnolenti aut plus minus torpidi fiant, iisdem periculum recidivæ imminet, siquidem apoplectici, perfectè licet curati, faciliè tamen recidivant.

De cetero si erecto corpore locatus æger, aut post sanguinis missionem, aliquantum ad se redeat, aliqua spes affulget: sin verò post hæc & alia remedia affectus ultra 24 horas in eodem statu permaneat, aut cum somnolentia, vertigine, ac torpore recrudescat, de ægro actum erit.

In apoplexia correptis imprimis habenda distinctio ætatis, & hinc dependentis corporis status; cum apoplexia juvenum, aut medietatis ætatis sanguinem corripit, vix sit ejusdem rationis cum apoplexia, quæ senem, aut debilem, aut emaciatum, aut similem affligit.

Solvitur apoplexia, quando evacuationibus per inferiora aut per sudorem tota discutitur; aut si eadem in paraplegiam quandam aut etiam hemiplexiam definit. Observatum fuit, terminari interdum apoplexiam fluxu auris lymphatico, qualis luc Veneræ laborantibus post inunctionem Mercurialem accidit. Unde etiam Barbette in curanda apoplexia talem inunctionem commendat. Aut etiam ipsa apoplexia facie somni admodum profundi, ægrum interimit. Cetera videb. in Schenckii *Observationibus*.

CURA.

## C U R A.

Quod ergò attinet curam, hæc duplex est: curatoria, seu quæ instituenda est in ipso paroxysmo, in quo exsuscitandus quasi est æger, ut spirituum animalium motus redeat; ac præservatoria seu extra paroxysmum, quæ causarum antecedentium tantum rationem habet, quo tempore observatis debitis evacuationibus, simulque usurpatis caput ac ventriculum roborantibus aromaticis, reditus paroxysmi est præcavendus. Neque enim cum æger apertè reconvaluit, scopi curationis sunt negligendi; nam tales sæpius diu stupidi manent, variaque accidentia eos vexant.

In ipso paroxysmo duo imprimis præsidia generosiora sunt, quæ aut liberant ægros rectè administrata, aut eos trucidant, malè applicata: & hæc sunt vomitus & venæsectio, quorum unum ut plurimum necessariò adhibendum est, interdum utrumque simul. Nam de clysteribus eorumque usu, item de suppositoriis, quæ acriora & fortiora semper sunt applicanda, etiam omnes concordant Medici Præctici, quod in omni paroxysmo apoplectico, & post eundem etiam, tutissimè & etiam necessariò usurpentur. Clysteres tales acres in minore copia subindè injiciuntur, nempe à ℥ss. ad summum ℥viii: quia sic diutius retinentur & melius operari solent. Quodsi non retineantur, aut saltem non satis diu persistant in corpore propter sphincterem ani resolutum, repetendus est eorum usus, idque eò frequentius, quò magis urget morbus: Si verò nullo modo in actum deduci possit clyster, tunc remanentia clysmatis, seu materia decocti remanens, instar pultis est coquenda, super pannum extendenda, & toti abdomini instar cataplasmatismatis imponenda. Hoc enim remedio feliciter usus fuit D. Mæbius in curando Slevogtio apoplectico:

Sed ut redeam ad vomitum & venæsectionem, metus admodum est in vomitu, ne suffocationis imminens acceleretur periculum, cum deficiat motus corporis, & etiam partium internarum: Et sanè posito, quod ex impedito sanguinis motu fiat apoplexia privativa, vix tamen videtur conveniens vomitus & necessarius, sed nocuus dicitur, imò periculum est, ne sub vomendi conatu sanguis ac serum circa collum & caput retineatur, & hinc istæ partes magis obruantur, cum naturaliter sub vomendi conatu facies rubescere, oculi tumescere, & collum inflari soleat. Econtra venæsectionis medio sanguinis circularis motus in quavis apoplexia plus minus inipeditus promoveri potest. Interim de venæsectione ipsius Celsi est pronuntiandum, quod sanguinis detractio in apo-

plexiæ paroxysmo adornata aut occidat aut liberet ægrum, i. e. prout tempestivè vel in-tempestivè magis applicatur. Unde etiam venæsectionem rejicit Barbette, per experientiam confirmatus, in sua *Praxi* cap. 2. tanquam frustraneam, sæpiusque nocivam: uti etiam observandum est imprimis illud, quod habet Henricus ab Heer in *Obs.* 18. quod nempe nostrates, qui ingluvie & comestationibus ferè apoplexiam incurrant, phlebotomiâ vix unquam curentur, ob id etiam vocat dubium remedium venæsectionem in apoplexia, adeò ut centesimus ægrè educto sanguine, evadat. Et in tali casu reverà vomitus præ venæsectione longè magis necessarius videtur. Res ut aliquantisper fiat clarior, pro decisione observanda est differentia apoplexiæ, quàm suprà insinuavi. Si enim signa adsint, vel suspicio quædam saltem probabilior, sanguinem imprimis peccare, & sui stagnatione aut in cerebro aut in pulmonibus inducere apoplexiam, tam positivam quàm privativam, ut in iis, imprimis junioribus, qui sunt corpore *εὐσάπης* & succi pleno, qui vitam agunt sedentariam, in quibus facies insigniter rubet sub paroxysmo apoplexiæ, quibus confusa sanguinis per uterum, nares, &c. evacuatio fuit suppressa; in talibus pro imminuendo sanguinis quanto & ejus circulo promovendo venæsectio instituenda est, quàm pluribus commendat Sylvius *lib. 2. cap. 21. §. 96.* Corthnummius *de Morbo Attonito* cap. 60. Nymmannus *de Apoplex.* cap. 39. idque quocirum, eò meliùs, ut sub liberiore circulo fiat melior respiratio: Hinc Zacutus Lusitanus *Prax. Admir. lib. 2. obs. 104.* fæminam suppressione mensium laborantem & venæsectionem negligentem, apoplexiâ mortuam; in alia vero apoplectica, ritè quamvis fluentibus mentibus, eandem cum euphoria administratam, *lib. 1. de Medic. Princip. Hist.* 38. testatur. Ubi verò à sero malum, præservativè tantum V. S. agit, i. e. vasa deplendo ab affluxu sanguinis præservat, & ut serum faciliùs intra lymphatica & venas resorbeatur, præstat. Ast in positiva à narcosi, sive interna, sive externa, per se nihil, sed per accidens tantum aliquid levaminis præstat, stagnationem sanguinis circa præcordia declinando & solvendo: qua ratione in omnibus quoque reliquis apoplexiæ speciebus, item in illa, quæ à terrore, similive affectu animi, non inutilis videtur: vid. Prosper Martianus in *lib. 4. de viët. Acutorum* §. 43. Hildanus *Cent. 3. Observat.* 11. & 12. Nymmannus *de Apopl. pag. 216. & 217.* ac Sylvius *Prax. l. 1. §. 114.* Cautè nihilominus illa est adhibenda, aut de quorum virium debilitate (ante paroxysmum) constat, ne simile contingat, quod mulieri Hebrææ apud Ama-

(Nnn nn)

tum



tum Lusitanum *Cent. 4. Hist. 23.* vid. Henricus ab Heer: Adeoque pariter vix locum habet, ubi sanguinem viscidiorum & mucosum hauriamur; vid. Wepferus *de Apopl. pag. 218.* Sed in senibus aut in debilibus ante paroxysmum, aut in ebriosis, & qui ex ingluvie præcedente corripiuntur apoplexiâ, ubi cruditates ventriculi, ubi narcosis, sive interna sive externa, aut quibus jam vertigo & alia signa quædam capitis affecti præcesserint, ubi potius videtur subesse lymphæ vitium, aut saltem in quibus nullum sanguinis primum deprehenditur vitium, his convenit potius vomitus, & nociva est venæsectio. Uno nomine: In apoplexia privativa magis venæsectio, aut loco ejus in senibus cucurbitulæ, scarificationes, &c. in positiva magis vomitus, & loco hujus, præsertim in senibus, clysmata acra conveniunt. Hinc illis præmissis in privativa sudorifera volatilia, vesicatoria, fonticuli, cucurbitulæ, &c. in positiva verò aromatica, metallica sulphurea, & sublimiora arcana, & stomachica conducunt. Quæ omnia ex circumstantiis secundum res naturales, non-naturales & præternaturales, in cujusvis ægri cura semper observandis, diversimodè adhuc limitantur.

De venâ incidenda eadem observanda, quæ circa affectus soporosos monita, imprimis verò jugularium venarum incisio maxime commendatur: vid. Bayle *de Apopl. cap. 11.* aut in plethoricis utriusque brachii venæ; vid. Tulpus *lib. 5. obs. 7.*

In genere verò & ut plurimum tutius & simul potentius remedium in paroxysmo est vomitus quàm venæsectio, quem etiam suadet imprimis Lindanus; adeò ut vomitoria fortiora Galia, in specie ex Mercurio vitæ, admodum commendat, ubi non opus venæ sectione; quam ipsam tamen rarissime adhibendam suadet. Et quidem vomitus optimè suscitatur ægros, & quod aliàs irritando clysmate intendunt Practici, hoc efficacissime obtinemus vomitu. Quantum enim in apoplecticis valeat vomitus, duo egregia habebitis exempla in *Misc. Curiosis Langii pag. 1. & 12.* & Petrus à Castro in *Meth. Med.* se vomitoriis ultra spem plurimos desperatos excitasse affirmat, & antimonialia valdè commendat. Conf. ulterius Julius Cæsar Claudinus in *Empyr. pag. 349.* & Poterius, qui croci metallorum vulgaris granis tribus vehementissimum apoplecticum excitavit, inuncto simul ori oleo cinamomi; item Riverius, & alii plures. Infundenda ergò semper vomitoria in forma liquida, ut spontè quasi per gulam defluere queant miscendo eadem unâ cum vehiculis spirituosissimis, cum aqua cinnamomi spirituosissima, sicut facit Faber, cum aqua & spiritu salvæ, spiritu ce-

raforum nigrorum, & similibus, quæ valent excitare apoplecticos; ut horum medio simul spirituum vigor nonnihil promoveatur. Et quidem augenda nonnihil in paroxysmo vomitorii dos, ut & aliorum remediorum, quæ excitare debeant ægrum; cum torpor ægri aliàs efficaciam ejus eludat: imò, monente Hartmanno in *Praxi Chim.* dupla dosi dentur, prout scilicet torpor major minorve est. Hinc syrupus emeticus ad ʒvj. & ʒj. præscribendus, item v. benedicta Rulandi. Essentiam quoque nicotianæ ad ʒij. cum melle exceptam, & in os infusam, potenter educere, laudant Riverius *Pr. lib. 1. cap. 2.* & Hartmannus *l. 4. p. 74. & 81.*

In paroxysmo igitur ante omnia operanda, ut excitetur æger, & ut servetur respirationis actio & usus integra. Hinc prioris ratione sensuum organa quæcunque & partes quævis sensiles fortius affricandæ: posterioris ratione in loco non nimis clauso, aut vapido, sed temperato, & aëre libero perflato, sive extra lectum, si viribus potens, sive intra hunc, ita situandus est æger, ut corpore erecto quasi sedeat, partim pro liberiore respiratione, partim pro humorum affluxu moderando, partim pro somnolentia arcenda, ac sanguinis ebullitione vitanda; quin & ventus artificialis subinde circa eum faciendus. Mox igitur venæsectio instituenda in brachio dextro: quâ peractâ vel vomitorium ordinandum, vel clyisma acre, quod juxta Walæum sanguinem etiam proliciat, injiciendum. Non differenda vomitoria, ut monet Lindanus cum in forti apoplexia occasio præceps. Horum ergò uno alterove administrato, aut etiam leviori in malo his penitus omissis, clysterium acrum & fortiter stimulantium usus semper est commendatus. Perinde enim est, sive stimuletur anus, sive vomitus excitetur; quia intestina sunt ventriculus continuatus.

Parantur autem ejusmodi clysteres ex salvia, lavendula, majorana, origano, calamintha, centauro minori, ruta, serpillio, foliis nicotianæ, asari, radice cyclaminis, pyrethri, ireos nostratis, cortice radice ebuli, cortice mediana sambuci, semine urticæ, &c. Quibus incoquatur pulpa colocynthidis in petia ligata, aut addatur infusum aut decoctum croci metallorum ab ʒj. vel ʒij. usque ad ʒiv. quod Riverio in usu fuit: item adduntur commodè Θ gemmæ aut Θ\*. Oleosa omitenda sunt, quoniam temperando & oblinendo acrimoniam stimulum tollunt, non secus quàm mellita. His ipsis clysteribus commodè etiam addi possunt Θia volatilia, ut penetrent, & exsuscitent ægros. De horum usu revulsorio vid. Corthnummius *de Morbo Alton. c. 66. §. 23. p. 347.*

℞. HB. *serpilli*  
*fol. nicotian.*  
*summ. centaur. min. ā M. j.*  
*flor. lavend. Mß.*  
*Rad. pyrethri*  
*ireos nostrat. ā ʒiij.*  
*sem. urtica ʒij.*  
*pulpa Colocynth. in pet. lig. ʒiß.*

Coqu. in l. q. ☐æ humanæ:  
 In Colaturæ ʒviii. dissolve  
*Elect. hier. c. agar. ʒj.*  
*Ext. troch. alband. ʒß.*  
*Ess. castor. ʒj.*

M. pro Enemate.

Cautelas circa horum compositionem videbitis in *Corthnummio l. 4. p. 311.*

Quinimò urgente necessitate clyisma ex jusculo quodam communi, addito lixivio, vel c. M. j. aut ij. ̄is communis acuato, addito infulo vel syrupo ʒali in dupla vel tripla dosi, imò interdum quadrupla dosi, ex tempore infundi potest.

Adeoque hæc enemata frequentius erunt repetenda, præprimis si non adeò diu subsistant, aut ipsis substituantur suppositoria pariter acerrima, e. g.

℞. *Rad. helleb. albi pulveris.*  
*scamm. ʒat.*  
*troch. alband. ā ʒß.*  
*castor. pulver. gr. viij.*  
 ̄xi ʒj.

Cum l. q. Mellis f. Suppositorium.  
 D. S.

**Geschärffte Stul-Zäpflein.**

Cum his ipsis & aquæ vitæ spirituosæ, apoplecticæ, ut vocant, &c. instillantur ori & faucibus, acuandæ præsertim salibus & spiritibus urinosi & oleosi: v. g. Mixture in paroxysmo usurpanda præmissis præmittendis sit talis:

℞. ☐a apoplect. opt. ʒj.  
*lil. convall. ʒiß.*  
*Q. E. Marthiol. ʒij.*  
*Liqu. C. C. succin. ʒj.*  
*Syr. fl. tunic. ʒß.*  
 M. S.

**Erweckende Haupt-Mixtur Löffelweise einzugieffen.**

Vel;

℞. ☐a *lil. convall. vel Cerasor. nigr.*  
*Mentha aa. ʒiß.*  
*~ Ceras. nigr. ʒvj.*  
*Liq. C. C. succin. vel ~ ̄xi. ʒiß.*  
*ol. dest. succini gutt. vj.*  
*Syr. fl. tunic. ʒß.*  
 M. S. ut antè.

Cochleatim usurpetur crebrius in paroxysmo apoplectico.

Facit huc electuarium arcanum Timæi von Guldenslee/ contra apoplexiam & epilepsiam, præsertim si juncta aphonia, quæ in-

Tom. II.

ter symptomata apoplexiæ maximè terribilis est; imò contra omnes soporosos affectus, uti & contra suffocationem hystericam:

℞. ̄is vol. succin. ʒß.  
*Theriac. Androm. ʒiß.*  
*Pulv. castor. ʒij.*  
*☉o destillat. ruta*  
*succin.*  
*rorismar. ā gutt. iij.*

M. f. Opiata:

De qua, quantum culpis cultelli capit, dissolvatur in ☐ quadam apoplectica, vel epileptica Langii, vel in ☐ hirundinum cum castoreo, vel in ☐ spirituosæ lavendulæ, & ægro in os infundatur, ut deglutiat, simulque lingua, palatus & partes vicinæ hoc ipso electuario fortiter fricentur.

Porro Theriaca & extractum theriacale cum extracto salviæ, rutæ, castorei, &c. & cui aliquid ̄is volatilis succini, olei destillati succini, rutæ, &c. & camphoræ additum fuit, pro fricanda lingua, palato, & partibus vicinis admodum laudantur. Dictæ etiam partes fricari possunt cum spiritu theriacali, vel simplici vel probè camphorato; item cum spiritu liliorum convallium, melissæ, cerasorum nigrorum rectificato, vel solitario, vel cum paucis guttis olei destillati cinnamomi aut caryophyllorum acuato; item essentia castorei & similibus.

Si his præmissis post horæ quadrantem non redeat ad se, æget, repetatur, & naribus sequens sternutatorium forte & acre infletur:

℞. *Rad. helleb. albi*  
*pyrethri*  
*fol. major.*  
*flor. lil. convall.*  
*Castor. ā ʒj.*

M. f. pulvis sternutatorius, naribus insufflandus:

D. S.

**Erweckend Niese-Pulver.**

Naribus etiam, pro suscitandis apoplecticis, subinde obijciuntur odores acres, præsertim ex ̄ib. volatilibus & spiritibus urinosi penetrantioribus, in liquore aqueo dissolutis: imprimis ☐æ, liquor C. C. succinatus, & ̄xi: item ballama apoplectica, & cephalica, e. g. rutæ, Scherzeri, &c. Vel pro temporibus & naso.

℞. ☐ meliss.  
*lil. conv. c. V. ʒij.*  
*apopl. ʒj.*  
*acet. ruta ʒij.*  
 M. D. S.

**Anstreich-Wasser.**

Convenit etiam suffitus castorei, & succinatus, naribus admotus;

Hinc succinum & omnia succinata, uti in hystericis aliisque spasmodicis affectibus nulli cedunt. Imprimis in apoplexia curanda ☉

(N n n n 2)

& ☐

& ☉ volatile præcellit, in præservanda verò succinum præparatum, vel etiam succinata quæcunque. Guttæ 3. vel 4. olei destillati succini, cum ☐ appropriata in paroxysmo infusi, mirificè commendantur: hinc Rhumelius *in suo antidot. P. 1. pag. 167.* parat ☉ peculiare ex succino, quod vocat apoplecticum, dum ☉ succini non rectificatum miscet cum dimidio oleo rosmarini, superafundit ☐ fontanam, & ita per velicam destillat: sicque ☉ rectificat. Dosis sunt guttulæ 6. ad 12. vel 15. pro usu interno in ☐ appropriata. Externè eodem inunguntur vertex, tempora, nucha, & spina dorsii: additâ camphorâ paucâ efficacius medicamentum fit. Similiter digerendo succinum cum oleo fuliginis insigne aliquod apoplecticum fieri potest: hinc sola essentia succini, præsertim cum spiritu ceraforum nigrorum, vel liliorum convallium mediante ☐ Malvatici abstracto, parata à guttulis 30. vel 40. orindita, loquelam restituit apoplecticis. Item à quibusdam instillantur auribus ☐ apoplecticæ: nam Petrus Johannes Faber apoplecticis propinat vomitorium internè, & auribus atque naso instillat essentiam caryophyllorum, essentiam thymi cum tantillo oleo cinnamomi: vid. *in Curat. 40.* Camphora pariter & ☉, & omnia camphorata, his ipsis instillandis & affricandis commodissimè adduntur.

Cum dictis subinde simul fiant externæ inunctiones verticis, nuchæ & temporum, cum oleis destillatis, & ex iis paratis ballamis apoplecticis, aut cephalicis. Sufficiunt ☉ destillatum succini, majoranæ, lavendulæ, spicæ, rosmarini, salviæ, cinnamomi, caryophyllorum, & similia: item emplastrum nervinum, malaxatum cum oleo destillato lavendulæ & succini, vertici imponitur, vel unguentum, quod describit Deckers *in Praxi Barbette p. 21.*

℞. ☉ *expr. nucist.* ʒiʒ.

*destillat. rutæ* ʒj.

*spicæ*

*succini* ā ʒʒ.

M. D. S.

**Haupt Balsam.**

Eiusmodi inunctiones etiam commodè regioni stomachali possunt inungi, superimponendo laterem calefactum.

Sed observandum, ut huiusmodi odorata oleosa non nimis largiter aut copiosè dictis locis illinantur: nam non omnes eadem ferre possunt, & redeuntes ad se ægri de insigni capitis perturbatione & gravitate ex oleorum huiusmodi fumosorum illinitione conquerruntur.

Si non redeat ad se æger, unum alterumve repetendum venit, v. g. vomitoria subinde reiteranda, injectis desuper clysteribus, ex-

tremorum vellicationem, punctionem, & similia, quæ externos sensus afficiunt, continuando. Horum quidem effectum Sylvius *Pr. l. 4. §. 99. 100. &c.* in dubium vocat: Verum quantum frictio plantarum pedum cum muria acri, aut huius loco cum aceto & sale, cum setaceo profit ad excitandos tales, videbitis in *M. A. N. C. Ann. 8. observ. 96. p. 160.* Punctionarum verò efficaciam videbitis in Henrico ab Heer *obs. 21.* Quin etiam rubefacientia & velicatoria ampla juxta Willisium pone aures, cervici, brachiis, præsertim in carpi parte interna, & cruribus prope inguina, luras, &c. applicanda. Si redierit æger ad se nonnihil, sed non sufficienter, interna spiritiosa continuanda, velicatoria applicanda, quin & cucurbitulæ, nunc cum nunc sine scarificatione, scapulis & brachiis admovendæ: qualia Henricus ab Heer *Obs. 21.* commendat, aliaque administranda, prout æger ad se rediens de uno alterovè symptomate magis vel minus quæculus fiat.

Cura præservatoria instituenda est tam in iis, qui jam semel apoplexiâ tacti fuerunt, ut præcaveatur crebra recidiva, quàm in iis, qui futuram aliquando apoplexiam metuunt: Cujus prodromi sunt: (in habituali tunc dicta) dolor capitis, vertigo, tumor carotidum, memoriæ debilitas, spontaneæ oculorum illachrymationes, leotomiæ, incubus, vocis tarditas & hæsitantia, oris distorsiones; dentiumque stridores in somno, stupor frequens brachii aut pedis, aut etiam refrigeratio extremarum partium. In his pro præservatione, præmissis digestivis purgatio conveniens instituenda, & postmodum sudori præ cæteris opera danda. Simul quoque stomacho prospiciendum, ut digestio prima, quantum possibile, conservetur in naturali statu, idque respectu apoplexiæ positivæ aromatibus.

Inter remedia salvia hic est in usu, cujus continuatus usus, & quælibet ex hac parata, item vinum salviatum, &c. mirè commendantur à Kypero *in Colleg. Pract.* In cubebis, cardamomo, semine sinapi & erucæ, singularia latent in hoc casu, si omni manè vespere aliquantulum & crebrius sumatur, vid. Tabernæmontanus & Scheunerus *de Catarrhis*; Stæckerus *in Praxi* expertum remedium contra apoplexiam sequentem pulverem dicit esse:

℞. *Cardamom.* ʒʒ.

*Sem. Coriandr.* ʒij.

*Eruca vel sinapi albi* ʒʒ.

Misc. f. pulvis pro aliquot dosibus.

De hoc sumatur circa introitum lecti. Vel

℞. *Caric. pingu.* Num. vj.

Incis. & contus. adde

*sem. sinapi alb. f. eruca* ʒvj.

*Cardamom.* ʒj.

Misc. exactè; adde simul

☐ *lavem.*



~ *lavendul.* Cochl. j.  
vel c. *Syr. flor. tunica* vel *borrag.* f. Electuar.  
D. S.

**Haupt-stärkende Latwerge.**

De quo omni manè dosi juglandis magnitudine capiendum; à meridie ~ carminativus de tribus, vel *Θξci anisatus*.

Notum aliàs etiam est, quantum valeant omnia remedia ex cerasis nigris dulcibus parata; imprimis spiritus ceralorum nigrorum mirificè à Keslero extollitur, *Process. pag. 370.* Ad hæc volatilia, tam in paroxysmo quàm extra paroxysmum pertinet spiritus vitrioli volatilil quicunque.

Ex dictis & similibus fiunt simul ordinariò aquæ apoplectica spirituosæ, quæ sunt spiritus volatiles inflammabiles ab aromatibus largiter imprægnatæ. Ordinariò parantur ex aromatibus, in specie salinis volatilibus oleosis, v. g. ex salvia, roremarino, ruta, floribus liliorum convallium, origano, sceniculo, floribus lavendulæ, stœchados Arabicæ, anthos, & similibus.

Cum autem has non omnes æquè bene ferre possint, hinc magis laudantur salia volatilia oleosa, i. e. salia volatilia oleis destillatis juncta, vel hujusmodi spiritibus sociata, ita ut aromatum efficacia à spiritibus urinosis intendatur, & noxa à spiritibus sulphuratis metuenda præcaveatur. Plethorici tamen ad apoplexiam proni salia volatilia oleosa internè non ferunt, utut optimè externè, sed potiùs macra. Spiritus ergò urinosi volatiles, & salia volatilia urinosa macra, ad sudorem maximè disponentia, magis conducunt.

Porro castorei essentia, & omnia ex castoreo parata remedia, spirituosiss mista, specificè commendantur & insigniter conducunt: quibus addantur spiritus vegetabiles liliorum convallium, baccarum juniperi & cerasorum nigrorum, serpilli, lavendulæ, theriacalis camphoratus, spiritus vini camphoratus alii admistus, vel etiam ori infusus: aqua magnanimitatis, aqua & spiritus apoplecticus Mynsichti, aqua apoplectica Kolreuteri, Langii, & Hartmanni, aqua & elixir vitæ Matthioli, aqua Anhaltina, hirundinum cum castoreo: aqua angelicæ, serpilli, cinnamomi, liliorum convallium, salviæ, &c. cum vino paratæ. De essentiis vegetabilium nihil addo. Spiritus & sal volatile secundinæ humanæ specificum fuit Cnœsseli in curanda epilepsia & apoplexia. Præ ceteris spiritus sanguinis humani est commendatum remedium Grafeccii, & quem etiam, ceu singulare specificum, admodum laudat Hartmannus in *Praxi Chimiæ*, & Helmontius *Tr. Spiritus Vitæ*; uti etiam spiritus cranii humani & post hunc sal volatile, spiritus & aqua spirituosæ cerebri humani, etiam sunt egregia remedia in apoplexiis: quibus ab aliis simul additur

spiritus fuliginis; item spiritus salis Ammoniaci, tam simplex quàm cum camphora junctus & legitimè unitus, fit spiritus volatilil penetrantissimus; item spiritus salis Ammoniaci succinatus ac lavendulatus.

℞. *Q. E. Rorismar.* ʒiij.  
*Lavend.* ʒiij.

M. S.

**Haupt-stärkende Essentz.**

Dosis 20. gutt. omni manè: Vesperis usurpari potest spiritus salis Ammoniaci ad 30. gutt. vel liquor cornu cervi succinatus.

℞. *Ess. Castor* ʒiij.  
*Q. E. Rorismar.* ʒj.  
M. S. ut suprâ.

Dos. ad 30. vel 40. guttas.

Quò etiam pertinet essentia composita ex ana salviæ, zedoariæ & castorei cum spiritu salis Ammoniaci extracta. Vel

℞. *Essent. succini* vel *cast. vinos.* ʒiij.  
~ *Θξci anis.*  
*succin.* ana ʒj.

M. S. ut suprâ.

Dosis 30. ad 40. gutt. bis in die.

Hiscæ tandem meritò annumerandum est aurum diaphoreticum Poterii, quod ritè paratum, cum conserva florum tunicæ assumptum, est perquàm egregium; item cinnabaris antimonii, & cinnabarina.

℞. *Corall. rubr. præp.* ʒj.  
*Cinnab.* ʒiij ʒss.  
*Θis vol. succini* ʒj.  
*Cubeb.* ʒss.  
M. f. pulv.  
D. S.

**Haupt-stärkend Pulver.**

Ad præservationem aliàs usurpantur Electuaria: v. g.

℞. *Conf. fl. salvia*  
*rorismar.*  
*tunic.* ana ʒss.  
*Conf. alchem.*  
*sem. sinapi* ana ʒiij.  
*Cardamom.*  
*Cubeb.*  
*Macis* ana ʒss.

Cum f. q. *syr. flor. tunic.* f. Electuarium:  
D. S.

**Haupt-Latwerge.**

Inter evacuancia, extra paroxysmum usurpanda, primatum obtinent vomitoria, & quidam ðalia.

Præter vomitorium conducunt etiam purgantia, e. g. helleborus niger, pilulæ scetidæ, cochix, pilulæ proprietatis Mynsichti, pilulæ polychrestæ ejusdem, extractum hellebori nigri, agatic. Mercurius dulcis: quibus pro stimulo semper extractum alhandal addendum est: vid. Corthnummius *l. c. cap. 70.*

Sudorifera ex lignis declinante paroxysmo aliquamdiu cõtinuata, sunt maximè proficua.

(Nnn nn 3) Si his

Si his remediis non satisfacimus scopo, etiam cucurbitulæ, setacea, fonticuli & similia adhibeantur.

Aliàs fonticuli in apoplexia, tam præservativè quàm curativè, præsertim in senibus vel decrepitis, ubi affectus catarrhales sunt frequentes, familiari sunt in usu, & multum conferunt, & quidem veteres setaceum in nucha usurparunt, cujus usum videbitis in Horstio *lib. 1. observ. 14* sed est remedium admodum molestum; potius fonticulus in nucha inustus, vel homoplati, aut etiam fonticulus unus in brachio, alter in crure paratus, est egregius. Veteres etiam fonticulum inusserunt in vertice, sed est ridiculum remedium, & propter inflammationem plerumque periculolum. Interim cum distinctione agendum. Saltem ergò in apoplexia privativa fonticuli & cucurbitulæ in regione dorsi intra scapulas commodè adhiberi possunt; in positiva enim præcavenda parum auxilii afferre solent.

Denique salivatio in declinante apoplexia pro eradicando morbo non ineptè à Barbette in *Praxi* proponitur, & à Deckero in *Comment.* commendatur pag. 23.

## ARTICULUS II.

De

### Paraplegia.

**Q**Uoad paraplegiam: hæc nunc apoplexiam sequitur, sicque morbus secundarius est, nunc verò per se inchoat, utut plus minus alios morbos sequatur, estque apoplexia particularis. Notabilis est permutatio ista, cujus meminit Forellus *lib. X. observ. 80.* ubi apoplexia mutata in paralyin (rectius in paraplegiam) deinde in epilepsiam, & ex ea denuò in apoplexiam lethalem. Sanè apoplexiæ & hinc natæ paraplegiæ ac epilepsiæ singularem habent & mutuam convenientiam, & quasi in radice identitatem. In modo fiendi saltem aut affligendi differunt, hinc & permutatio mutua eorum & quoque in cura remediorum identitas. Hinc certè Gorræus in *Defin. Medicis* inquit; paraplegiam signare Hippocrati paralyin, quæ apoplexiæ vel epilepsiæ succedit. Epilepsiam, quæ in paralyin totius ferè corporis, excepto brachio dextro, abiit, in qua sensus, ablato motu, persisterunt, notat Hildesheim in *Specileg. de Affect. Capitis cap. 7.* Item Schenckius in *observ.* refert, epilepsiam ex terrore contractam post biennium in paraplegiam alterius lateris transisse, nihilominus singulis mensibus circa novilunium affligens: item Fontanus *Respons. & Curat. lib. 1. pag. 32.* Paraplegiam oculi sinistri post epilepsiam in gravida observat, quæ post partum gemello-

rum mortuorum apoplectica interiit: Horstius *lib. 2. obs. 41.* notat ex epilepsia paraplegiam lateris dextri, & hinc denuò insultus epilepticos. Pertinet huc notabilis observatio *Ann. 6. & 7. M. A. N. C. obs. 212.* ubi mutuo paralyis & epilepsia se exceperunt: Item confirmat hæc Bartholinus *Cent. 4. observ. 3.* dum paraplegiam lateris sinistri & convulsionem lateris dextri in febre petechiali annotat. Sanè non secus in apoplexia & paraplegia, quàm epilepsia, simul aliquid convulsi subesse videtur: Notabilis hinc est Hildani *observatio 4. Cent. 1.* ubi ex sola nervuli in aure irritatione, ob immisum globulum, stupores quasi paralytici, dolores & atrophia brachii istius lateris, ac tandem epilepticæ convulsionem excitabantur. Ex irritatione ista, quid aliud quàm spasmus fieri potuit? Similem observationem de dolore & stupore cum ejusdem atrophia ex corallina sphaerula in aurem illapsa refert Schenckius in *observat.* Hujusmodi paraplegiæ, quæ apoplexiam, epilepsiam, aliosque morbos immediate sequuntur, vulgò paralyse vocantur, & hoc nomine tractant theoriam earum ac praxin Practici, præsertim veteres. Omnium loco sufficiat Willisius de *Anima Brutor. Part. 2. cap. 9.* cum tamen propriè loquendo paralyis longè alius affectus sit ab apoplexiis particularibus sive paraplegiis, ut infra monebitur. Probè hoc observetur in autorum lectione, qui ordinariè paralyse & paraplegiam confundunt, unâque methodo theoriam & praxin tractant.

In hemiplexia, & multò magis paraplegia sive apoplexiam, sive alium similem sequatur affectum, tres gradus observandi sunt:

1. Enim motus solum deficit superstite sensu.
2. Sensus & motus planè deficiunt in parte, restitante tamen adhuc partis calore naturali.
3. Istis deficientibus etiam calor partis evanescit, eaque simul ferè continuò frigida percipitur, quam constitutionem partis insequi solet ejus flacciditas notabilis ac mollities, & hinc marasmus.

### C A U S A E.

Quoad causas paraplegiæ: communiter obstructionem nervorum accusant, quæ tamen nec cum modo fiendi, nec cum cura bene convenit. Saltem non universalis causa hæc esse videtur; siquidem & per consensum aliarum partium remotarum paraplegiam fieri observatum fuit: Nempe sicut notum est, quod graviores passionnes hystericas subinde epilepticæ convulsionem superveniant; ita iisdem paralyse & hemiplexias supervenisse observatum fuit, in specie à Quercotano

*in Terr. gravissimor. affect.* Item lumbrici uti convulsionibus & epileptias excitant, ita etiam ad paralytes terminantur, teste Salmuth *Cent. 2. obs. 45.* hinc etiam apoplexiam paraplegia lateris sinistri & convulsio dextræ insecutæ fuerunt: vid. Schenckius *in observ.* Ut taceam paraplecticos desperatos quosdam subinde ex graviore animi pathemate, ira vel terrore, ex improvise curatos fuisse, autore Horstio *lib. 11. observ. 15.*

Adeoquæ paraplegiæ istæ pro fiendi ratione nunc privativæ, nunc positivæ esse videntur; & in his positivis aliquid convulsivi omninò intercedere, dicta modò ratio, & cum affectibus convulsivis faciles permutationes, omninò persuadent. Sed cum in specie apoplexias non lethales ferè ordinariò insequantur paraplegiæ, hujus permutationis ratio est inquirenda. Equidem apoplexiam sanguineam universalem, quæ ex sanguinis extravasatione evenit, ut plurimum lethalem esse existimo. Aliàs sanguinea privativa, quæ tantum ex motu sanguinis intercepto in vasis cerebri oritur, si universalis sit, quomodo in paraplegiam transeat, sanè obscurissimum, nisi forsitan venæ sectio largior, sanguinis motum promovendo, saltem alterius cerebri lateris affectum particularem reddat, qui antè universalis erat, ita ut saltem in altera cerebri medietate, aut saltem circa nervorum exitum, & sanguinis consistentis & turgescientium inde vasorum vitio, paraplegiæ oriuntur. Imò si apoplexiæ privativæ sanguineæ paraplegia supervenerit, probabile est ex sanguine congruato & subsistente plus minus laticem aquosum fecisse secessum, & vel interius profundius penetrasse in cerebrum per caudicem medullarem, vel exterius defluxisse secundum ductum spinalis medullæ, & ita unius alteriusve nervi læsione vel oppressione paraplegiam intulisse. In privativa verò lymphatica, aut huic cognata, si unquam observetur, pituitosa apoplexia, lymphæ materiæve peccantis in caudicem medullarem interiora versus progressus, adeoque obstructions, vel ejus secundum radicem spinalis medullæ defluxus, & certis in locis compressio, paraplegiam inferre potest. Imò forsitan aliqualis irritatio contractioni fibrarum & membranarum circa principium nervorum originem subministrare & hinc sufficientem spirituum influxum impedire poterit.

Positivam apoplexiam etiam excipere paraplegiam, res nota est, sed modus est admodum obscurus. Esse tunc paraplegiam contractionem partium nervosarum circa radicem spinalis medullæ, quâ impediatur spirituum pro motu transitus, ut Helmont. asserit, non improbabile est: sed quomodo fiat? revera intricatum. Interim tamen sicut calculus in

rene subinde crura istius lateris stupidum & semiparalyticum reddit, aut quando colicam intestinorum convulsivam ex improvise vel crurum paralytis, aut hemiplegia insequuntur, si causa materialis communicetur ex simplici partium nervosarum concursu, ita similiter probabile est, per consensum nervorum, eorumque fibras circa sui radicem in caudice medullari, aut in hujus progressu contractas, spirituum sufficientem pro motu impediri influxum, sicque partes, ad quas isti nervi distribuuntur, sensu & motu plus minus privari. Ex hoc enim permutationis ratio effectuum paralyticorum & convulsivorum, & earum identitas, optimè explicari possunt.

#### PROGNOSIS.

Paraplegia quævis malum difficile est curatu.

Primus gradus levissimus est, & qui cæteris paribus facilius curatur: ultimus gradus difficillimus curatu, & etiam periculosissimus est.

Si parti paraplexiâ correptæ vel tremor superveniat, aut formicationis sensus, aut doloris molestia, bonum signum est pro restitutione.

Quò magis calor membri paraplectici deficit, eò minor spes superest.

#### CURATIO.

Quoad curam harum apoplexiarum particularium: In hac eadem ferè, quæ in apoplexia universali curanda, observanda sunt. Remedia verò ipsa appropriata sunt eadem, quæ epilepsiæ aut apoplexiæ medentur.

Vomitum in quavis paraplegia est optimus, idque quando eadem supervenit apoplexiæ positivæ, & quidem forte necesse est vomitorium, quem in finem Mercurius vitæ cum scammonio sulphurato ab Hartmanno *in Prax. Chimiæ* laudatur.

Sin vomitoria non velimus usurpare, instituantur fortes purgationes: quibus addendus est semper stimulus acris est colocynthide.

Item subinde necesse est, ut venæ sectio instituat, sed in latere opposito, non tamen semper æquè necessaria est. Lindani verba sunt: *Venæ sectionem instituere, nisi plethora adsit, magis jugulat, & puto idè multas curationes malè succedere, quod in principio sanguinem mittimus; statim vomitorium propinandum, idque ab initio.* Adeoque vomitoria imprimis in paraplegia, quæ sequitur apoplexiam positivam, conveniunt. Sicuti venæsectio magis locum habet in ea, quæ sequitur post apoplexiam privativam, ubi etiam fonticuli, item vesicatoria nuchæ admota, & cucurbitulæ scarificatæ intra scapulas conveniunt. Utrobique verò venæsectio adhibenda in plethoricis, aut in quibus solennis quædam sanguinis excretio suppressa fuerit.

His



His & similibus præmissis, inter remedia interna præ cæteris sudorifera laudatissima sunt, nunc communia, nunc specifica. Communia seu generalia ista in apoplexia commendata sunt speciatim salia volatilia in paulò majori dosi, & spiritus sanguinis humani, cranii humani, & similia, in paulò majori dosi: nempe spiritus ad integras drachmas, salia à ℥j. ad ℥ss. Liqueur cornu cervi succinatus est egregius. Loco horum veteres etiam usurpant decocta sudorifera lignorum, quæ interpolitis appropriatis sunt optima. Speciatim decoctum ligni sassafras egregiè confert, ex quo & baccis juniperi vel lauri paratum decoctum efficaciter paralyticum restituit, teste Poterio *Cent. 2. observ. 26.* Item decoctum sassafras cum roremarino imprimis convenit. Item helenium ejusque radix dictis decoctis additum, benè convenit: verbi gratiâ ad imitationem Poterii præscripti:

℞. *Rasur. ligni sassafr. ℥ij.*

*Herb. rorismar. rec. M. j.*

*bacc. junip. rec. succul. vel lauri ℥ij.*

Coqu. in Vin. & 7x aa. tbiß. per MB.  
in cucurbita, cum suo alembico  
munita:

Colaturam & destillatum misce,

adde

~ *bacc. Junip. ℥iv.*

Θ \*ci ℥iij.

*Syr. fl. tunic. ℥iij.*

M. S.

#### Glieder-stärkender Trank.

De qua potione ter quotidie, manè, à meridie & ingruente nocte bonum haustum capiat æger aliquamdiu, blandum sudorem expectando.

Specifica verò sudorifera sunt aurum diaphoreticum Poterii, cinnabaris antimonii, corallata, cranium humanum, aurum diaphoreticum certè in frequentissimo usu habuit Poterius. Aliquando viro adulto affectu quasi paralytico correpto dedi duas doses auri diaphoretici cum conserva florum tunicæ: Prima dosis cum blando sudore tormina abdominis & mirabilia excreta excitavit, alterâ vice verò copiosum sudorem emanare fecit cum euphoria.

℞. *Consf. fl. tunic. ℥j.*

*Os diaph. gr. xv. ad ℥j.*

M. f. Polus:

div. in 2. part. æqu. S.

#### Schweiß-treibender Haupt- und Glieder-Zucker.

Assumptâ unâ dosi hauriatur desuper spiritus theriacalis cochleare j. vel ij. & ita per sudorem repetitum præmissis præmittendis, malum curabitur.

Cum his internis optimè simul externa regioni spinæ dorsæ, item vertici, aut saltem loco, unde exoritur nervus partis affectæ, il-

linenda conveniunt: Unde in manuum apoplexia admoveantur nuchæ, in apoplexia crurum ossi sacro, regioni lumberum, & similibus. ipsa membra apoplectica illinire superfluum videtur, cum malum in illis non hæreat, sed ipsa saltem passivè se habeant. Hæc inter conveniunt olea destillata vel spirituosissima vel emplastra. Olea destillata sunt succini, lavendulæ, spicæ, galbanetum Paracelsi, quibus petroleum album nativum, aut etiam petroleum cum cineribus destillatum, potest addi. Juxta hæc in usu sunt spirituosissima, ut essentia ex infusis nervinorum, & aqua articularis ad extra.

Item essentia castorei, extracta cum aqua spirituosissima liliorum convallium cum vino, pro frictione spinæ dorsæ vel alius loci commodi calidè, est egregia, in specie post sudores, ut poris apertis melius possint penetrari: Item spiritus vini camphoratus ter quotidie in loco calido benè affricando parti paraplecticæ. His ipsis spirituosissimis aquis & salia volatilia, in specie spiritus & sal volatile lumbricorum terrestrium ac formicarum, addi possent; Vel

℞. *Spir. vini camphor. vel formicar. vel  
artic. ad extra ℥iij.*

~ *lumbr. terr. ℥iij.*

*Ess. Castor. 3vj.*

~ *Θ \*ci c. Ψ ℥iij.*

M. D. S.

#### Eufferlicher Spiritus.

Quodsi spina dorsæ probè his ipsis perfricata fuerit, applicandum desuper linteam cum gummi animæ probè suffumigatum atque calidum; vel præmissis cum aquis spirituosissimis frictionibus istis olea supra laudata desuper illinenda sunt, ut apertis poris, penetrantioris efficaciam sint hæc ipsa; quibus etiam imprimis oleum destillatum tartari, & olea ex pinguedinibus aut partibus animalium durioribus destillata addi possunt, utut horridè fœteant; tamen aliquoties cohobando super caput mortuum, aut ossa calcinata, à nimio fœtore liberantur. Illinuntur hæc olea nunc ita simpliciter, nunc ubi nimis acris fuerint, parvasque pustulas excitent, subigenda sunt cum oleo lumbricorum terrestrium per decoctionem. Possunt etiam fortibus frictionibus & ltribus asperis, calidis ac penetrantioribus illiniri totæ partes paraplecticæ, ut irritentur partes sensiles, & hujus medio provocetur plus minus spirituum impetus: propterea & ipsas partes ita resolutas his modis tractare consuetum est & propter hunc finem dictis ltribus alumen plumeum, tam crudum, quàm, quod præstat, ex hoc pararum arcanum aluminis Wurzii, simul addendum est, in specie quando ad atrophiam seu marasmodum membrum paraplegiâ affectum inclinare velit: e. g.

℞. *Liqu.*

℞. *Liqu. lumbr. terrestr. inclibanoparat.*  
℥iij.

*Ol. destill. Spica*  
*Iuniperi* an. ℥i℥.  
*lavend.*  
*Majoran.* aa. ℥℥.  
*succini* ℥ij.  
*Alum. plum.* ℥j.  
M. S.

### Glieder: Gäßlein wider das Abnehmen:

Partibus attricetur.

Qui autem acria terre non possunt, ut scorbutici, & in quib<sup>9</sup> atrophiam membri metuitur.

℞. *Pingu. hum. vel anser. vel Butyr. Majoral.* ℥iij. jv. ad vj.

*Ol. dest. cereb.* ℥iij.  
*bacc. Iunip.* ℥ij.  
*spica* ℥℥.  
M. S. ut *suprà*.

Quibus & desuper subinde circa locum affectum, in specie spinæ dorsi, emplastra ex nervinis & aromaticis imponi possunt, imprimis ex gummatibus penetrantibus:

℞. *Gum. Galbap.* ij.  
*Caranna* p. j.

Malax. e. *Petrol.* in consistentiam Emplastri.  
D. S.

### Glieder: stárkend Pflaster.

Quod in regione spinæ dorli agglutinandum erit.

Pertinet huc unguentum & emplastrum paralyticum Mynsichti, & similia.

Alia plura remedia contra paraplegiam videb. in M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Append. pag.* 44.

Balnea denique ex formicis, revera lingulare quid obtinent in paraplegiis curandis: Conf. M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *Observ.* 128. *pag.* 137.

## ARTICULUS III.

### De Paralyti.

**C**Ognata pathemata sunt paralysis & stupor, unde etiam propter summam, quam habent, affinitatem vulgò & non absque errore confundi & promiscuè tractari solent. Nam quod attinet paralytin, *die Lähmung*: ad illam vulgò etiam referunt hemiplexiam, item speciem innominatam & paraplexiam; cum tamen hæ species reverà sint species apoplexiæ, nempe particularis, & oriuntur ex affectis nervis. Paralytes verò sunt resolutiones membrorum tales, in quibus primariò motus deficit, superstitie plus minus sensu, ob spirituum animalium motum & activitatem denegatam. Stupor econtrà est affectus, in quo, deficiente in partibus sensu, superest mo-

Tom. II.

tus, Græcis ἀναισθησία dictus, symptoma tactus est, quod ad paralyticos affectus nullo modo referri debet.

Hæc tria mirum invicem confunduntur, quia explicantur ex Arabum & Galeni scriptis. Genuino verò sensu apud Veteres paralytis, propriè significabat laxationem & resolutionem nervorum; à πῶς & λύω, penitus resolvo, idq; imprimis interprete Celsò. Nervus autè, Græcis dictus νῆρον, ab ipso dicitur vel tendo musculorum, vel ipsum ligamentum, quò neuntur artus: Et id, quod nos hodie vocamus nervum, prisca generali nomine venarum complexi fuerunt: vid. Lindanus in *Colleg. Pract. ad Hartm.* & Celsus.

Paralytis ergò ex genuino sensu erit resolutio & relaxatio istius adstrictionis, quem debet habere nervus seu tendo & ligamentum, quibus mediantibus connectuntur & proximè moventur artus; quæ ipsa instrumenta, tendines, fibræ & ligamenta, quando sunt laxiora, vel humidiora & flaccida, sunt inepta pro movendis istis partibus, & tunc dicitur paralytis. Talis affectus est, quem describit Bontius in *sua Med. Indorum cap.* 1. tanquam malum Indis familiare, sub nomine Indico Beriberi: Conf. etiam Tulpus *observat. lib.* 4. *cap.* 5. Item Bartholini *æst. Med. Hafniens. Volum.* 4. *pag.* 145.

Ex dictis patet, quod paralytis propriè sit atonia fibrarum nervearum & musculorum, præcipuè autem in tendinibus & ligamentis; quæ partes propter atoniam resolutæ, flaccidæ, molles & relaxatæ, ineptæ fiunt, ut trahere aut convenienti robore firmare possint membrum, qui levior affectus dicitur paresis, fortior paralytis.

Malè ergò & ex falsa hypothese paresin paralytin notham vulgo indignant. Putant nempe, paralytin oriri ex obstructione nervorum, & insequi apoplexiam (id quod tamen dat paraplegiam) qualis obstructio cum non sit obvia in paresi, propterea eam paralytin notham indignant; cum tamen revera paresis paralyseos sit species, sed levior, in qua nervi non primariò, sed tantum consecutivè, affectis fibris & tendinibus laxatis, & ipsi afficiuntur.

Facilis aliàs est distinctio inter paraplegiam supervenientem apoplexiæ, & paralytin. Differunt enim (1.) Origine; Nam paraplegia sequitur imprimis cerebri & spinæ morbos, & frequentissimè comitatur apoplexiam, epilepsiam, convulsiones, &c. cum dicti affectus subinde sint mutuo permutabiles, & desinant in paraplexiam; paralytis verò sequitur alios corporis affectus, in specie post scorbutum, malum hypochondriacum, & colicam convulsivam: frequentior est regionibus, ubi copiosum hauriunt vinum, aut oritur etiam subinde à causis externis.

(O o o o o)

(2.) Sub-

(2.) Subiecto ; Nam in paraplexia primario afficiuntur nervi, quoad exortum ; in paralyfi verò iidem in progressu & insertione imprimis muscoli, & in specie tendines & artus. Hinc medicamentorum topicorum diversa in utroque affectu applicandi ratio, quæ in paraplegia magis origini nervorum partis affectæ, in paralyfi ipsi parti affectæ applicanda.

(3.) Symptomatis : Nam in legitima paraplegia sensus tactus ut plurimum cum motu voluntario simul perit & tollitur ; in paralyfi verò subinde sensus tactus superest, quandoque etiam, ut in scorbuticis, cum sensu doloroso, formicante, lacerante, & simili, tantummodo motus tollitur, & labefcit.

(4.) Genuina nervorum resolutio seu paraplexia à principio ad finem eodem ferè habitu est constans, aut quodammodo perpetua ; econtra paralyfes & pareses sæpius per intervalla ægros magis & minus vexant, labefaciunt, cessant & redeunt, quandoque cum arthriticis quasi doloribus complicantur, ut quotidie evenit in paresi scorbutica, donec habitum in membro contraxerit. Quin & interdum in convulsiones abeunt, & in malo confirmato pertinacem contracturam post se trahunt, nec tamen adeò rebelles sunt exercitatis Medicis, ut paraplegiæ, quin nondum confirmatæ facile tolli possint : Vid. Dravvitzii *Schmerz-machender Schaarbock*.

### C A U S Æ.

Causas paralyseos quod attinet ; hæc, pro ut à paraplegia distinguitur, ratione causæ est vel privativa improprie sic dicta, vel positiva ; quarum illa nervos afficit, & spirituum emanationem inhibet ; hæc narcosin seu simile quid, quod spirituum animalium activitatem turbat, præsupponit.

Causæ ergò paralyseos revocari possunt ad duplicem classem ; nempe spirituum torporem, & viarum angustiam seu interceptionem. Siquidem privativa in viarum seu nervorum, medullæ oblongatæ, ac tendinum dissectione in vulneribus, distorsione aut compressione, aliove vitio consistit, quæ nunc hunc, nunc istum nervum sine præcedente affectu apoplectico solent affligere : quo etiam pertinet, quando nervorum quorundam particularium per *παράσσειν* causæ morbosæ sit obstructio, aut compressio, vel superficie tenus, vel intra membranas, aut alia nondum satis cognita affectio, quo minus possit sensus & motus communicari partibus, v. g. post variolas retropulsas aut malè curatas, uti habet Lotichius *lib. 2. observat. cap. 1. observat. 15.* aut post erysipelas capitis ma-

lè curatum, vid. Salmuth. *Centur. 2. observat. 43.* item à varis faciei retropulsis, notante Salmuth. *l. a. observat. 35.* quæ tamen omnes à causa privativa excitatæ paralytes reverà potius paraplegiæ sunt, hodie consuetâ confusione invicem confusæ. Facit huc etiam, quando per vulnera cerebri & medullæ spinalis aliarumque partium, dissecantur nervi ; aut quando nervi in medullæ spinalis compressione, ex luxatione ac fractura vertebrarum inferiorum partium dorsii, aut casibus ab alto, sunt distorti aut compressi, quod observavit Hæfferus in *Herc. Med. p. 9.* & Amatus Lusitanus *lib. 1. Curat. 19.* Sic percussiones capitis excitant paralytin vel potius paraplegiam in opposito latere : hinc quidam ex arbore decedens in os sacrum, ex hujus contusione in paralytin distam pedum inciderat, ut hoc observat Bartholinus *Cent. 5. observat. 8.* similiter paralytin sinistri lateris, convulsionem & mortem, ex contusione musculi temporalis à lapsu notavit Glandorius *Specul. Chirurg. observat. 10.* Quo pertinet gibbus paralytin sentim inducens, cujus curam videb. in M. A. N. C. *Ann. 2. observat. 230 pag. 333.* Sed hæc ipsa modo allegata potius paraplegiam, quàm paralytin inducunt.

Positiva verò paralytis est, quæ proprie paralytin constituit, & nunc ab externa, nunc ab interna oritur causa.

Externas inter nimia humiditatio ac nimia refrigeratio, e. g. aer frigidior ac pluviosus indeque nata resolutio & flacciditas fibrarum ac tendinum infert paralytin : Sic enim non solum Galenus jam suo tempore ex mora diuturna in aqua frigida, & ex balneo aquæ frigidæ ; sed etiam Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Admir. observat. 34. & 37.* ex diuturniore mora in aqua frigida pluviosa, item ex frequenti natatione in aqua frigida, paralytes observarunt. Hinc etiam senes, item infantes, sunt quasi semi-paralytici ; quia in infantibus fibræ & tendines copiosiore nutritio irroratæ, laxæ & flaccidæ sunt, & propter deficientem robur, vix valent membris movendis ; in senibus verò deficiente rore nutritio succedit sæpius aquositas serosa, aut alia, quæ laxando fibras & tendines tales semi-paralyticos reddit. Unde etiam ii, qui diutius in pluvia versantur, & vestimenta madida in corpore exficcare permittunt, in uno alterove membro fiunt paralytici teste Horstio in *observat.*

Imprimis autem & sæpissimè à causa interna fit paralytis positiva ex lymphâ acida seu ex materia quadam vitiose acida, lymphæ cognata, quæ lymphæ aut feri vehiculo ad quoddam membrum delata, nervo-



nervosas partes istius loci irrorans earum tonum successivè corrumpit, aut ineptæ fi-  
ant istæ partes nervosæ movendis ossibus &  
membris, unde consequenter motus defectus  
cum sensu plus minus deficiente, aut saltim a-  
liquali stupore juncto. Exemplum talis para-  
lyseos positivæ à causa interna, v. g. à sero ad  
spinam descendente, videb. in Platero *Præ-*  
*xeos Tom. 1. lib. 2. cap. 2.* Volchero Coiter  
*observat. miscel. pagin. 114.* & Bonetti *Se-*  
*pulchreto lib. 1. Section. 15. observat. 3.* item  
ab abscessu cerebri, vid. Scultetus *observat.*  
*Chirurg. 19.* à tumore scirrroso vid. Willi-  
sius *de Anima Brutor. lib. 2. cap. 9.* Hac  
ratione potatores vini in quibusdam regioni-  
bus subinde fiunt paralytici, & quidem cum  
tali paralyti ex acore contracta etiam subin-  
de sensus quidam molestus, si non doloro-  
sus, saltem nunc formicans, aut tantummo-  
modo titillans, aut lancinans, nunc cum  
stupore, conjunctus est, qui in principio nunc  
est gravior, nunc remissior, donec successi-  
vè superveniat partis magis magisque immo-  
bilitas, & tandem planè deficiens motus.  
Sensus formicans oritur ex acido primitivo  
vellicante, & præternaturaliter rodente fi-  
bras, nervos verò non tangente, unde ta-  
ctus est salvus. Et tales paralytes frequen-  
tes sunt in Austria, Moravia, & similibus lo-  
cis, ubi copiosum potatur vinum, acore in-  
signi tartareo satis volatili turgidum; Nemp-  
pe ab occulto acido volatili plus minus au-  
stero irroratæ fibræ, tendines, &c. rigidio-  
res quodammodò & minus mobiles fiunt,  
hinc enim & contractura interdum superve-  
nit: acida enim corrugant quodammodo  
partes nerveas, adeoque in his casibus primò  
sequitur paresis, hinc tonus fibrarum natu-  
ralis solvitur & perfecta paralytis, & tan-  
dem earum corrugatio præternaturalis, o-  
mnimoda membri immobilitas & contractu-  
ra inducitur: quæ illustrat Bartholinus in  
*Act. Med. Hafniens. Volum 1. pag. 210.* Conf.  
Tackius in *tripl. Phasi Soph. p. 148.* & M. A.  
N. C. *Ann. 2. observat. 39. pag. 70.* Quodsi  
magis volatilisatum, adeoque & spirituosius  
vinum fuerit, ac synoviam articularum infe-  
cerit, podagram infert, aut inficiendo spiri-  
tum insitum: aut fermentum renum, lithia-  
sin. Unde præmissis præmittendis paraly-  
tes tales, & hinc natæ contracturæ, lactici-  
norum usu inter alia optimè curantur.

Scorbutici etiam ex vitiato acido, simi-  
li ratione paralytin & paresin incurrunt.  
Sensim inchoat & procedit, & primò sal-  
tem vagus stupor aut insensibilitas cum formi-  
cationis sensu partemprehendit, unde suc-  
cessivè labefactari tonus membri, & magis  
magisque paralyticus reddi incipit. Est au-  
tem vaga vel minus constans, nisi nimis in-  
Tom. II.

veterata fuerit, ita ut æger uno die melius, in  
altero pejus habeat, uno die ferè incedere,  
altero die decumbere cogatur: hinc nunc  
digiti, aut manuum aut pedum, intumesce-  
re, nunc detumescere observantur; nunc u-  
nus altervè digitus stupet, qui brevi melius  
se habet: Sensus manet ut plurimum, aut  
saltim aliqualis stupor inducitur; subinde  
cum dolore gravi ut plurimum vago, rarò fi-  
xo, juncta est: Jacentes verò commodè mem-  
bra movere possunt, sed stantes vix denuò  
pergere, nec absque dolore aut stuporis sen-  
su incedere possunt; sicuti hunc ipsum affe-  
ctum omnium optimè delineat Drawizius  
*de Scorbut. Sect. 3.* Sanè acidum volatile au-  
sterum est, quod hic peccat, quod nerveas  
fibras diversimodè afficiendo, nunc aliquid  
convulsivi, nunc paralytici infert, ita ut hu-  
jusmodi paralytis quasi medium quid sit inter  
morbos paralyticos & convulsivos in specie  
sic dictos. Unde non rarum est, ut in ta-  
libus ægris scorbuticis membrum nunc spa-  
sino contractum rigidum reddatur, nunc pa-  
ralysi affectum idem flaccescat, & plus mi-  
nus stupeat, prout nervi aut fibræ tendinum  
vel acido irritantur, vel eodem austero in-  
torquentur. Huc quoque pertinet lues Ve-  
nerea, paralytin producens, vid. Rhodius  
*Cent. 2. observ. 34.*

Par est ratio istius paralyseos, quæ insequi-  
tur colicam, & quidem istam, quæ est magis  
habitualis, & quæ vulgò à tenui acri humo-  
re oriri dicitur, & aliàs à Practicis colica bilio-  
sa vocatur. Alvus est pertinaciter clausa,  
tormina atrociora & contumacissima vexant,  
purgantibus quibusvis per os assumptis ma-  
ximè exasperatur malum, umbilicus interio-  
ra versus retrahitur. Quodsi vel malè tra-  
ctetur, quod imprimis fit, si irritetur actio-  
ribus aut purgantibus aut plus minus deævi-  
re videtur, successivè unius alteriusve aut  
plurium membrorum stupor, hinc subita  
motus impotentia, tandem perfecta para-  
lytis, supervenit. Si negotium hoc rectè  
consideretur, revera est colica ratione mo-  
di convulsiva; ratione causæ occasionalis ma-  
terialis scorbutica, nidus verò & fomes in  
plexibus mesenterii nerveis est; nam in ista  
colica non tam intestina affliguntur, quàm  
mesenterium. Acidum austereum, impri-  
mis scorbuticum, est, quod has turbas, nem-  
pe convulsiones partium internarum & co-  
licam dat in abdomine. Dubium saltim est,  
quomodo colicam talem paralytis artuum  
insequatur, cum interdum tam subito, atque  
cessat dolor, membra observentur paraly-  
tica? Nempe in principio mali paralytici  
saltem convulsivi quid subest, unde spiri-  
tum interrupto fluxu stupor & aliqua-  
lis insultus paralyticus supervenit. Hinc  
(O o o o o 2) colica

colicatalis in paralyfin, subinde in convulsionem, subinde in arthriticos dolores, in principio mutationis suæ terminatur, donec ipsum acidum volatile circa mesenterii plexus resolutum, materialiter partes istas ita male affectas attingens, perfectam paralyfin, & tandem ex fibrarum tendinosarum congregatione contracturam, efficiat. Nempe sicut renum calculum stupor crurum non raro comitatur, ita & hoc malum non nihil remittens, & simplici consensu unius alteriusve membri ex nervi spasmo & spirituum interrupto motu paralytica dispositio insequitur, donec malo inveterato ipsum quasi per *πρωτοπάθεια* fiat, quod quoad originem, saltem per *δευτεροπάθεια* erat. De cætero par ferè hujus cum paralyfi scorbutica videtur esse ratio, partim ergò ex mutuo membrorum consensu, partim ex metastasi materiarum vitiosæ in membra externa, fibras corrugantis, fiunt pareses: hinc enim etiam suffocationi matricis paralyfin supervenire notat Quercetanus, sicuti epilepsia & ipsa interdum paralyfin post se relinquit: ut etiam ex vermibus intestinorum interdum paralyfin oriri, observat Salmuth, *Cent. 1. obs. 44. & Cent. 2. obs. 45.*

Hiscæ addenda sunt porro corpora quædam specialia, quæ singulari virtute membris & nervis torporem paralyticum inferunt. Quò pertinet torpedo piscis non tantum; (de quo notum est, quod piscatoribus & aliis sub tactu inferat stuporem & torpedinem, unde etiam nomen accepit, vid. Redi *in observat.* & Stephanus Florenzin., qui de hoc pisce accuratam anatomen edidit, ubi observat, in certo quodam corporis ejus loco saltem residere vim istam, unde emissæ effluvia torporem inducant) sed etiam in India Occidentali noviter reperta est certa species quædam conchyliorum, quæ ipsa similiter solo sui tactu manibus & brachiis ceterisque membris stuporem paralyticum infert: Vid. Kircherus *in Regno Naturæ Magnet. Sect. 4. cap. 4. pag. 182.* Ulteriùs Mercurius & omnia Mercurialia, uti fibris & nervosis partibus sunt inimicissima, ita etiam ii, qui tractant Mercurialia, ut aurifabri, item qui specula inargentant, subinde partium paralyfin incurrunt, uti, præter Sennertum *in Prax. Forestus lib. 8. obs. 5.* observat; hinc etiam ii, qui in fodinis Mercurii in Foro Julii laborant: Vid. *Acta Societ. Reg. Angl. Vol. 1. pag. 18.* Huc etiam pertinent antimonii, similiumque mineralium exhalationes & fumi, omniaque narcotica, spiritus animales, prostermentia.

Interdum fit, ut solennes sanguinis evacuationes suppressæ paralyfin inferant: sic mulier propter suppressa post partum lochia paralyfi crurum cum febre ardente fuit correpta, quæ sectâ venâ in talo fuit curata: Vid.

Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Admir. obs. 37.* item Deodatus *in Valetud. pag. 212.* Sic ex suppressa hæmorrhagia narium notat paralyfin lateris dextri Bartholinus *Cent. 4. obs. 69.* & Zacutus Lusitanus *l. 1. observat. 39.* Nempe non rarum est, venæ sectioni adsectos, si eam intermittant, torporem quendam & lassitudinem quasi paralyticam in uno alterove membro percipere, non nisi sanguinis missione solvendam.

Porro affectus animi graviores, terrores, mœrores, pavores, iracundiæ, &c. inducunt paralyfin. Exempla habet Cornarius *in observat.*, Item Zacutus Lusitanus *lib. 1. Med. Princ. Histor. 46.* ex nimio mœrore & inedia paralyfin natam refert: Sic ex subita consternatione natam paralyfin videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. obs. 9. pag. 14.* Interim tamen & è contrario pertinaces etiam paralyfes, & à Medicis pro desperatis habitæ, curatæ observatæ sunt ex subitaneis animi affectibus, ex ira, ex candescencia, & similibus: qualia exempla Horstius *lib. 10. observ. 15.* Item Schenckius *in observat.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet paralyseos signa, ea ipsa per se satis patent; cessante enim sensu aut motu, aut pereunte utroque, unicuique notum erit, membrum affici paralyfi, quam subinde atrophiam membri, ejusque contabescencia, das *Gliederschwinden*/ insequi solet.

Cum verò à tam variis causis oriatur paralyfis, in his cognoscendis imprimis sedulus sit Medicus; hinc in loco affecto, an muscoli? (quod paralyfis positiva propriè dicitur) an tendines? an ligamenta? an ipsi nervi primariò afficiantur? pro meliori Praxi probè observandum est. Ubi enim vitium est in nervo, medicamenta ejus principio applicantur: ubi est in parte tota, pars ipsa externis est medicanda.

Quoad causas remotas: semper Medici judicio relinquitur pro expiscandis iis, non secus ac proximis. Imprimis antecedentia hic probè consulenda sunt.

Quod attinet locum affectum: Si oriatur paralyfis seu paraplegia post apoplexiam, res clara est, medicamenta primario principio nervorum applicanda esse.

Si à læsione externa, à casu, vulneratione, &c. oriatur malum, ut plurimum nervus est affectus, adeoque ad hujus ortum & progressum respiciendum in cura.

Si nullæ tales præcesserint causæ, sensus est perferendus: quò enim plus restitit tactus, eò minus afficitur sensus; quò verò plus de tactu periit, eò magis sensus seu nervus affectus.

Interdum ubi cessat motus, restitente tactu, ferè insons solet esse nervus, & ligamenta ac tendines magis sunt in culpa.

In spe-



In specie, quoad paralyfin faciei, benè est distinguenda convulsio faciei canina seu spasmus cynicus ab ejusdem paralyfi, sive enim medietas faciei sit paralytica, sive sit convulsa, semper contractio canina oris sequitur, quæ tamen faciliè hoc modo distinguuntur. Nam si distortio oris oritur ex paralyfi pars ista, quæ trahitur & paralytica est, mollis & flaccida percipitur, & ad partem sanam trahitur, & hæc ipsa pars faciliè potest in naturalem situm per manuum operam deduci, quia mollis & flaccida est. Contrarium fit in convulsione: Nam in hac pars convulsa dura & firmiter contracta percipitur, & denique si volumus partem convulsam retrahere, dolor oritur, quod non fit in Paralyfi.

### PROGNOSIS.

Pergo ad prognosin: Præter eam supra artic. anteced. de paraplegia notatam, paralyfis seu paresis omnis; cæteris paribus, facilius curatur, quàm paraplegia, quæ omnem Medici operam eludit, nisi fortioribus & generosis instructus sit remediis.

Quælibet tamen paralyfis positiva curatu est difficilis, eò magis, quò magis inveterata est, & partes contractæ. Quò magis vagum est malum, eò major curationis spes.

Paralyfis, in qua saltem motus læditur, superstitie sensu, secuta est, & faciliè curabilis; & vice versa, quò magis in paralyfi læditur sensus, eò gravior est affectus, & difficilioris curationis.

Paralyfis privativa, quæ fit à causa evidente solitaria scilicet ex ictu, vulnere, luxatione valida, & subitanea vertebrarum aut dorfi, aut in specie cervicis, ut plurimum est lethalis.

Quæ apoplexiæ aliisque cerebri & nervosi generis affectibus supervenit, si non brevi in melius mutetur, plerumque incurabilis evadit, potissimum si sensus & motus simul aboliti fuerint: imò quæ apoplexiæ succedanea, plerumque incurabilis evadit. Nihilominus, qui à paralyfi, cujus causa evidens solitaria semel curatur, rarius recidunt, quàm ubi morbus à causa interna dependerit.

Facilior est cura à causa positiva, potissimum si fuerit recens, membrum adhuc calidum, ac nondum contracturam minetur: è contra quo magis calor membrorum resolvitur, ac atrophiam corripitur, eo minus spei pro salute recuperandâ affulget; item si resoluti lateris oculus imminuatur.

Quò magis pars paralyfi saltem laborat, & minus inclinatur ad contracturam; eò facilior est cura: si verò superveniat successivè contractura & immobilitas, difficilior & gravior solet esse curandi ratio.

Si paralyfi superveniat tremor partis, bonum signum est recuperandi motum; resusci-

tari siquidem, aut influxum novum moliri spiritus animales, indicat.

In senibus cacochymicis & cachecticis, & si levior sit paralyfis, rarò tamen aut difficillimè curatur, quin ad mortem eos comitetur.

Diarrhœa paralyfin debilem solvit; apoplexiæ verò, seu paralyfi, seu paraplegiæ forti, superveniens febris acuta, uti similibus affectibus nervosis, ita hic admodum conducit, & bonum est, quia sæpius morbum tollit.

### CURATIO.

Quod attinet curam; in ea observanda est distinctio affectuum, eorumque origines, quæ generali paralyseos nomine appellantur. Alia enim est cura in paralyfi privativa, alia in positiva: Privativa enim paralyfis plus minus paraplegiis cognata, si ex causis internis præsertim ex metastasi materiæ morbificæ oriatur, eodem ferè modo curatur, atque paraplegia: In quem finem sudorifera & nervina moderato usu sunt optima; quin & in malo contumaciori nil obstat, quo minus salivatio instituatur, de qua vid. imprimis Willisus *de Anim. Brutor. Part. 2. cap. 9.* Sin verò à vitio externo, contusione, luxatione, laceratione nervorum, &c. malum ortum fuerit, causæ hæc removeantur, adeoque v. gr. vertebra luxata, si fieri possit, reponatur. Contusioni verò medela fiat, per externa, fomenta, linimenta, aut balsama fortia cephalica & nervina, partibus applicata, scilicet fomenta ex herba torismarini, salviæ, menthæ, floribus lavendulæ, chamomillæ, & similibus cum vino cocta. Post hæc conveniunt ex linimentis aromaticis aqua Reginæ Hungariæ oleum chamomillæ, hyperici, lumbricorum terrestrium acuata cum oleis aromaticis destillatis, succini, lavendulæ, salviæ, chamomillæ, torismarini, & similibus. Litus quoque cum petroleo, vel solo, vel oleo juniperino nonnihil acuato, hic est egregius; item spiritus vini cum oleo salviæ vel lavendulæ imprægnatus. In specie balsamum Peruvianum præ cæteris est nobile externè illitum calidè; item balsamum paralyticum Mynsichti, emplastrum nervinum cum tacamahaca mistum. Internè vix præstantius datur remedium oleo destillato lavendulæ, quod ad aliquot guttas, jv. vel vj. assumptum, expectato sudore inlecto, egregium est; quò etiam spectat oleum destillatum succini, simili modo ad plures guttulas usurpatum.

In paralyfi verò propriè sic dicta & positiva attendendum,

1. ut causa materialis seu materia peccans, & nervos aut tendines fibrasque insectans, corrigatur & removeatur; id quod speciatim præstant diaphoretica, præsertim volatilia, & aromatica resolventia & discutientia.

(Ooooo 3)

2. ut



2. ut partium nervosarum affectarum tonus debitus restituatur & roboretur appropriatis, & in specie nervinis aromaticis ac volatilibus, vulgo calefacientibus & siccantibus dictis, idque fere imprimis applicatis remediis externis, sed non nimis unctuosus:

Pro his scopis obtinendis observetur:

I. Cum tam paraplegia, quam paralytis à causa interna nata, fomitem aliis, tam in massa sanguinea & lymphâ, quam etiam in officina digestionis & primis viis, præsupponat radicatum, v.g. in scorbuto, colica convulsiva, malo hypochondriaco, arthritide, ischiadico affectu, passione hysterica, &c. tunc præter specialem paralyseos curam simul, præmissis debitis alterantibus & appropriatis, fomes iste evacuandus & corrigendus, semperque ad acidum austerum plus minus volatile respiciendum. Ob id fomes morbi, digestivis salinis resolutus & absterfus, convenientibus evacuantibus est expurgandus: quæ inter præter clysinata acriora, & purgantia blanda per inferiora, in specie vomitoria sunt, quæ præ aliis evacuantibus à Riverio commendantur & à Lindano mox in principio instituenda præscribuntur. Fortiora autem per inferiora purgantia sedulo hîc fugienda: nam multi in uno latere resoluti seu paralytici, si in principio fortiora præscribantur purgantia, etiam in altero latere paralyti tentati & tandem extincti fuerunt, uti hoc observavit Solenander & ex eo Thonerus in *Observationibus*.

II. Dixit temperata & probè nutritiva lactea, acidum quodcunque corrigens, & copiosum chylum subministrans (pro quo scopo lac præmissis præmittendis est optimum) instituat, ne copioso sudore loca nervæa succo nutritivo defraudentur.

III. Ubi à colica fuerit paresis, cautus vel maximè sit Medicus in purgantibus fortioribus, cum ejusmodi colicæ exinde exasperentur, & metus sit, ne sequantur convulsiones & similia mala. Hinc Poterius in hujusmodi affectibus utitur decoctis melanagogis blandis, & ex basi hellebori nigri paratis: saltem ergò helleborinis mitioribus iisque partitis vicibus, purgatio blanda instituenda venit: id quod etiam in scorbuticis probè observandum est, qui ipsi etiam fortiores purgationes vix aut rarò ferunt; Imò si scorbuticis membrorum affectibus correptis, imprimis paralyticis fortiora propinentur purgantia, facillimè morbi convulsivi iisdem excitari possunt. Nervus totius curæ ad abdomen dirigendus est, adeoque potius frequentes conveniunt clysteres: quibus olea carminativa & nervina adduntur, v.g. oleum angelicæ, salviæ, succini, cumini & carvi, sintque in principio saltem emollientes & lubricantes; item ex lacte & terebinthina. In progressu verò, imprimis si

fomes morbi hæret circa viscera abdominis, & patiens nullum exinde sentiat levamen, tunc aciores nonnihil clysteres interdum adhiberi possunt. Quò frequentius injiciuntur, eò magis profunt, & eò magis paralytin præservant.

IV. Externa remedia usurpanda sunt ad restituendum tonum partis, imprimis post provocatos sudores eorumque absterfionem: pori enim tunc aperti facilius remedia externa admittunt ingressum. Observandum tamen hic, si scorbutus subsit, non semper calida acria convenire, quoniam interdum magis videntur exasperare malum; potius igitur temperata prius tentanda, antequam ad acriora illa fiat accessus. Observandum quoque, non semper convenire unguenta pingua, viscida aut glutinantia, poros cutis plus minus obstruentia, quæ non penetrant, adeoque præstat interdum uti suffitibus, fomentis, lotionibus. In specie tamen observanda cautela Quercetani, qui monet in administratione topicorum remediorum, quæ ut plurimum calefaciunt & attenuant, quod accuratè debeat expendere Medicus, ut si paralytis sit ab humore aquoso aut pituitoso, i.e. à lymphâ vitata plus minus acida, & æger sit similis ferè constitutionis, parsque paralytica intumuerit, quod medicamenta tunc adhibenda sint subtilia & penetrantia, nunc volatilia, nunc spiritiosa, nunc salina. Sin verò pars affecta jam marcescat, & plus minus in atrophiam labatur, & æger ipse quodammodo constitutionis sit biliosioris, ab iis abstinere debet Medicus.

V. Si paralytis sequitur solennem sanguinis suppressionem, idque in corpore evlarco & juvenili, solet eam curare venæsectio subinde repetita: Exemplum videb. in Valeriola *libr. 4. observat. 4.* Post venæsectionem sudor convenit.

Quoad sudorifera à Platero *Prax. p. 1. l. 2. cap. 1.* commendantur v.gr. Decoctum guajaci & chinæ, rob. ebulli aut hujus decoctum à Riverio laudatum, item bardanæ & volatiliū atque aromaticorum plurium, e.gr. decoctum torismarini, helenii, &c. Quamvis Willsius de *An. Brutor. Part. 2. cap. 9.* de sudoribus annotavit, illos sæpius quidem multum juvare, nonnunquam tamen valde etiam obesse; adeoque non convenire subiectis illis, quorum sanguis sale fixiori minusque diffilibili gaudet, sed tantum his, quibus à sero magis insipido & aqueo hic diluitur.

Inter appropriata remedia sunt apoplectica & epileptica. In genere ergò conveniunt, salvia, chamædrys chamæpitys, & rosmarinus, cujus decoctum factum lento igne in Mariz balneo, propinetur ægro jejuno ventriculo liberaliter; movet enim sic blandum sudorem, & egregiè destruit paralytin; cui additum sit extracti seu essentia castorei, quantum placet, cum

cum successu magis felici. Primula veris vocatur herba paralysis, propter insignem vim, quam obtinet in paralyticis curandis, quocunque usu adhibeatur. Stœchas Arabica & ipsa interno usu singularis; item omnia aromata, uti & ex his & similibus parata, essentia, extracta, olea destillata, v. g. infusum salviae cum vino, essentia salviae, oleum florum anthos, oleum destillatum succini, quod commendat *Fonsæca lib. 1. cap. 17.* oleum destillatum florum lavendulae & similia ad aliquot guttas interno usu in aqua betonicae propinata admodum laudantur; ut & nervina cuncta supra in *Apoplexia* allegata, item *castoreum, theriaca, & extracta theriacalia* & similia. Aliàs helenium quoque admodum laudari solet, imprimis in paresti ex colica, aut abusu vinorum, & quælibet ex helenio parata remedia, vinum, decoctum, essentia & extractum helenii. In specie decoctum radice enulae & fœniculi Hœchstederi *decad. 3. observat. 1.* Decocta lignorum cum roremarino laudat Lindanus, qualia etiam Bontius in *Beriberi Indorum* commendat. Hæc inter sassafras primatum obtinet: Post hoc optimum est lignum guajacum; vid. Hartmannus *Prax. Chimiæ. pag. 85. §. 3.* Quibus decoctis speciatim rosmarinus, baccæ juniperi, vel baccæ lauri sunt addendæ Poterius *Cent. 2. Curat. 26.* hoc habet decoctum, quo paralyfin cum gravissimis symptomatis stipatam curavit ex

*rasur. ligni sassafr. ʒj.  
bacc. lauri ʒiij.*

quæ in lbvj. vini ad medias decoxit.

Horum loco & essentia lignorum cum spiritu sambuci parata, vel essentia ligni sassafras cum spiritu serpilli, vel essentia catarrhalis ex ligno sassafras cum succino misto conducunt. Hinc spiritus lignorum, cum spiritibus simplicium nervinorum misti & conjuncti, erunt egregii. Modernis quibusdam Belgis, imprimis Lindano, in usu est lignum ex Indiis noviter allatum dictum Pavana.

Milium imprimis ex colica, per copiosum admodum sudorem sæpius repetitum hunc morbum curans, vid. Schenckius in *observ. de Paresi ex colica.* Juxta hæc tartarus admodum se commendat in affectibus paralyticis, & imprimis volatilia ex tartaro, spiritus, & sal volatile tartari, & hinc tinctura bezoardica ritè parata.

Quæcunque etiam alia salia volatilia, eorumque spiritus, præprimis aromatizati, suam merentur laudem, ut spiritus & sal volatile urinæ, per putrefactionem parata, spiritus salis Ammoniaci simplex, lavendulatus, succinatus, & sassafratus, sal volatile oleosum D. Sylvii. Porro laudati solent insigniter medicamenta viperarum quæcunque, exterius oleum, internè verò spiritus & sal volatile viperarum; sicut & paralysis ab omnibus, cu de-

sperata relicta, curata dicitur decocto viperarum. Nec minus laudatur liquor cornu cervi succinatus, sal volatile succini, si conjungatur cum pulvere paralytico Hartmanni ex cinnabari Antimonii, & magisterio perlarum: vid. *Prax. Chimiæ.* Quibus præferuntur volatilia ex lumbricis & formicis parata; unde etiam aqua magnanimitatis & similes non tantum externè, sed etiam in specie internè, hic suam merentur laudem, in specie, si spiritus quidam vegetabilis affundatur formicis, digerantur ad tempus & postmodum aliquoties cohobentur.

Verum in usu horum volatiliū observetur, quod non semper ac promiscuè conducant, in specie sub primo morbi insultu, quia videntur affectus exasperari propter effervescentiam, quæ cum acido excitatur, ratione cujus varia pathemata inferuntur. Quod si hoc observatur, prius fixiora & acidum primarum viarum absorbentia præmittantur. Inter fixa eminent antimonialia & Martialia sudorifera, ut antimonium diaphoreticum Martiale, bezoardicum Martiale, unicornu verum, præsertim cinnabaris antimonii, quam Hartmannus & B. D. Michaëlis semper combinavit cum osse humano præparato.

*R. Off. microcosm. præp. ʒj.*

*Cinnab. ʒiij gr. xij.*

*Sis. vol. succini ʒß.*

*M. f. pulvis:*

*div. in 2. part. æqual. S.*

**Stärkende Haupt- und Glieder-  
Pulver.**

tempore vespertino assumendo in aqua spirituosâ lavendulae.

Quod si oriatur paralysis positiva ex nimia refrigeratione, humectatione & relaxatione fibrarum, tendinum ac ligamentorum, sive à causa interna sive externa oriatur, cuncta ea locum habent, quæ supra in paralyfi privativa dicta sunt, non tantum membrum affectum, sed spinam quoque dorsii cum his aut unguento Zacuti Lusitani, quod *libr. 1. Prax. Admir. Observat. 37.* describit, fricando. In specie convenit oleum terræ cum axungia humana & anserina mistum & parti affectæ illitum.

Item tacamahaca cum balsamo Peruviano commista, vel emplastrum nervinum ex tacamahaca & galbano, cum oleo destillato succini & Philosophorum malaxatum, & circa articulos applicatum. Item si eò usque procedat malum, ut ligamenta ita quoque resoluta paralyfin aut relaxationem ferè membri inferant, confert emplastrum sticticum Crollii cum oleo Philosophorum & terræ malaxatum: internè cum theriaca sudor crebrius provocetur. Sed de his affectibus vid. imprimis Barbette in *Anatom. Pract. cap. 5. & 10.*

Sin

Sin à Mercuriali veneno malum ortum fuerit, convenit imprimis decoctum fœniculi & helenii, vid. Hœchstetterus *l. 4.* sicuti ubi per sudores venena Mercurialia sufficienter exclusa fuerint, lac & serum lactis commodè propinari possunt: Sic enim Hœferus in *Hercul. Med. pag. 9.* Paralyfin ex fumis metallicis, Mercurii & Antimonii, in auritabro, omnibus aliis frustraneis, per serum lactis à Foresto curatam refert.

In Pareli scorbutica volatilia urinosa & lacticia locum habent. Observandum autem in specie, quod juxta volatilia ista urinosa primatum obtineant remedia ex bino & abiete, ex ejus in specie strobilis molliusculis:

℞. *Turion abiet.* ʒiʒ.

rad. *China* ʒj.

Incisa & contula coqu, in ▽ & cerevisia ad medietatis consumptionem:

Colatura D. S.

### Scorbutischer Glieder-Transf.

Decoctum bibatur bis quotidie, expectando præsertim manè sudorem blandum. In lacte quoque alterationis gratiâ coqui possunt.

Egregium quoque est decoctum Deckers in *Notis ad Praxin Barbett.* Decoctum betonicæ cum baccis juniperi quoque laudatur, vid. Drawizius de *scorbutico pag. 167.* Præter decoctum strobilorum etiam essentia ex eorum Rob cum spiritu antiscorbutico, vel proprio, parata, item essentia contra arthritidem vagam ex simplicibus artheticis cum spiritu lumbricorum terrestrium per fermentationem & cum spiritu cornu cervi parata, in his paralyticis affectibus est optima, cum his semper jungendum est castoreum.

Istis debitè præmissis serum lactis cum antiscorbuticis mistum, & ipsum quoque lac egregium est, curamque absolvit: sed, necesse est, præmissa sint universalia, non tam laxantia, quam primò fixa absorbentia, hinc volatilia.

Spectant huc fonticuli & setacea, de quibus vid. Sylvius *Prax. lib. 2. cap. 22. §. 54. & 71.*

Quodsi denique colicam insequatur paralyfis, cautus vel maximè sit Medicus in purgantibus fortioribus, cum ejusmodi colicæ exinde exasperentur, & provocentur magis paralyfes & convulsiones. Nervus totius curæ ad abdomen dirigendus, adeoque clysmata lenientia & abstergentia, item ex lacte & therebinthina optima sunt. Hinc internè semina quatuor calida majora, eorumque in fine decoctum, aut alia ex iisdem parata remedia, teste Helmontio, sunt appropriata, quibus & adjungatur helenii decoctum, ejusvè essentia pro blando sudore propinata. Decoctum milii mirabiliter laudatur, per sudorem hanc ipsam removens: Quibus si lignum sassafras addatur, foret eò melius. Serum lactis cum antiscorbuticis & similibus medicamentum nobile est. Hinc ceu summum appropriatum accensetur

Galbanetum Paracelsi, tam simpliciter secundum modum Hartmanni paratum *Prax. Chimiatri. cap. 12. §. 8.* quam præstantius illud Drawizii *pag. 193.* Hoc ipsum non solum modò umbilico inungitur frequenter, sed etiam ipso membro paralytico, si prius spiritu tartari, aut spiritu salis Ammoniaci vinoso fuerit probè perfrictum, quod galbaneto hoc quotidie ter ungatur ad imitationem Hartmanni *l. 4. cap. 13. §. 4.*

Quoad externa, quæ tonum fibrarum & motum partium restitunt, sunt nunc spirituosæ & aromatica, nunc salina oleosæ, nunquam viscidæ & glutinosæ, nisi forsitan tabes, atrophia & contractura imminens, aut superveniens, volatiliū ejusmodi usum inhibeat, & blandiora, v. gr. pinguedines oleæque infusæ commendet. Tempora igitur sunt distinguenda: morbus enim est vel inveteratus vel non; si est inveteratus, ad atrophiam & ariduram partes inclinant, si non, saltem motus deficit, superstitè plus minus sensu. Quoad ergò posterius; eminent omnes aquæ apoplecticæ dictæ, spiritus vini rectificatus, & aquæ articulares ad extra. A Cratone trictio spinæ cum radice iridis nostratis & bulbo lilii, ab aliis cum radice bryoniæ aut hujus decocto præscribitur.

℞. *Fol. Nicotian. rec.*

*Origan.*

*fl. sambuc. aa. M. j.*

rad. *Angel.*

*Pyrethr.*

*Aron. rec. aa. ʒj.*

*Euphorb.*

*Castor.*

*Myrrh. aa. ʒvj.*

*Piperis utriusque aa. ʒiij.*

*fl. Stachad. Arab.*

*lavend.*

*lil. convall. aa. ʒʒ.*

*sem. cruce*

*Siler. mont. aa. ʒvj.*

concisis & contusis affundantur

*spir. vini rectif. part. ij.*

*lumbr. terrestr. pars j.*

Digerantur in MB. & vel filtrando separantur, vel destillatione ~ abstrahatur.

Liquore hoc fricetur aut inungatur pars paralytica post absterfionem sudoris, & aliqualem ægri requiem, dum poti adhuc sunt aperti, linteis thure & iuccino suffumigatis: aut spiritus vini à speciebus aliquoties cohobando abstractus, tanquam aqua articularis ad extra applicandus.

Cum his aquis articularibus ad extra optimè etiam quarta vel quinta pars spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem aut spiritus formicarum permiscetur. Quò etiam facit spiritus primulæ veris. Hisce comodè, in specie si dolores scorbutici adsint, addantur quæ-



quædam salia volatilia, quæ inter excellit spiritus salis Ammoniaci cum calce viva.

℞. *¶* *articul. ad extr.* ℥ij.

~ *Θ* \* *ci c.* ℥ ℥j.

*lumbr. terr. per putr.* ℥℔.

M. S.

### Glieder-stärkender Spiritus.

Fricentur membra ter in die cum spiritu vini camphorato in loco calido, ut incallescant, & pori hient.

Loco talium spiritus tartari rectificatus, mistus cum ana vel duplo spiritus vini tartarifati, & cohobatus, perquam egregius est, præsertim in paralyfi ex colica. Porro tinctura seu essentia succini cum spiritu vini rectificato parata, membris paralyticis contractis, aut quomodocunque refrigeratis, cum successu affricatur, vid. Kunrath. in *Medull. destillator.* Quin & his aquis externis balsamus Peruvianus commodè admodum addi potest. Scilicet subigatur balsamus Peruvianus in parva quantitate cum vitello ovi, unde aquis articulis vel spiritui lumbricorum terrestrium aut formicarum potest misceri: Applicatur etiam externè, quando nervi sunt lassi, contorti, &c. & ita in paralyfi privativa. Hinc etiam notus est spiritus seu essentia foliorum tabaci cum vino malvatico parata, de quibus vid. Hartmannus in *Praxi Chimiæ* §. 4. cap. 11. Pertinet huc urina humana, quæ ratione salis volatilis itidem pro membris laudatur paralyticis, & hinc lotiones & frictiones membrorum cum urina propria vel pueri calida vulgariter commendari solent. Melius est, si urtica major coquatur in urina, & cum hac pars paralytica subinde lavetur, bene fricando: Sic spiritus urinæ phlegmaticus etiam non est inelegans; vel ad imitationem Stöckeri in *Praxi*:

℞. *Urtic. major.* M. iij.

*Chamomill.* M. j.

*sem. Cumin.* ℥j.

*Θis* ℥ij.

Pistentur omnia probè in mortario, & decoquantur in urinæ humanæ pinthis duabus seu s. q. ad consumptionem quartæ partis.

Quo ipso decocto balneetur mane & vespere pars affecta. Quin etiam postea pannis ex decocto madefactis involvatur pars de nocte & die, & ita per tres vel quatuor dies, aut amplius, continuetur, hincque postea membrum oleo vulpino inungatur.

Quò etiam facit unguentum catulinum Faventini in *Præcap.* 7. pag. 36. vel oleum catellorum, vid. Riverius *Cent.* 1. *obs.* 52. unguentum Hildani *Tract. de Gangr.* cap. 24. & nephriticum ad imitationem Prottenii.

Membrum post apoplexiam paralyticum seu paraplecticum factum fricandum est ter in die cum spiritu vini camphorato in loco cali-

Tom. II.

do; Urticæ quoque & urticationes vetus jam sunt remedium, conveniens tamen imprimis in paraplegiis, quod Epiphanius Ferdinandus multoties expertus est, qui *Histor.* 46. dicit, quod præmissis universalibus optimum sit pungere corpus urticis: Et testor Deum, me hoc genere remedii pluries esse usum, & semper maximâ cum utilitate & felicitate, & nunquam votis sum deceptus.

Pariter hujus loci sunt balnea seu infessus ac fomenta, v.g. ex decoctis nervinis, vinaceis fermentescentibus, & formicis: Vid. Julius Cæsar Claudinus *de Ingress. ad Infirm.* sect. 16. pag. 503. & 512. M. A. N. C. *Ann.* 4. *observat.* 128. Balnea ex vinaceis, auß den Weindrüsen / mirabilem habent effectum in paralyfi icorbutica, paralyfi ex colica; aliisque ex acido vitioso natis, præsertim in malo pertinaciori, si iisdem sibi mutuò impositis, vel sponte fermentationis motu calefactis, vel, si sponte suâ non incallescant, in spersione pulveris calcis vivæ incallescantibus, immergatur membrum affectum fortiter sudando, ut tartarus volatilis in membra se insinuet. Hoc ipso enim desperati ischiadici, & ex ischiade facti paralytici à Petro à Castro curati fuerunt. Conf. Borellus *Cent.* 2. *observat.* 42. & Zvvelfferus in *Apol. contra Tacchen.* Nec minoris usus sunt balnea ex formicis parata, in paraplegiis, item in paralyfi ex resolutione & relaxatione tendinum ac ligamentorum, si integer eorum acervus, vel solus, vel cum speciebus appropriatis antiparalyticis, sacco inclusus injiciatur aquæ ferventi, cujus vapor excipiendo insideat æger in vanno probè tecto: Postmodum ac sequentibus diebus etiam insideat isti decocto semper cum sacco denuò calefacto, idque aliquot vicibus, donec melioratio percipiatur.

Tandem aliis ferè nil juvantibus, ultimum asyllum sunt thermæ artificiales, sed cautela opus est. In paraplegiis magis, quam paralyticis, convenire videntur, & in illis magis post privativas apoplexias, quam positivas. In paralyfi quæ est ex colica, vino & similibus, non conveniunt, quia arthriticis affectibus sunt noxiæ, & podagrici ex thermis subinde redduntur contracti. Metus ergò, ne nimis maturè promoveatur contractura. Cum discretionem quoque instituantur, nec omnibus sine discrimine adhibendæ, dum melius conducunt iis, qui constitutionis sunt sanguinæ & phlegmaticæ, minus qui constitutionis biliosæ seu cholericæ.

Quoad fomenta; convenit fots seu inunctio per spiritum vini appropriatum, vid. Horstius *obs.* pag. 108. 109. & 111.

Suffitus fiat beneficio silicum vel laterum candefactorum, pro membro stupore affecto vel paralytico.

(Ppp pp)

Præ

Præ ceteris galbaneta, & balsama seu olea destillata ex galbano parata, pro externa inunctione mirè conveniunt: imprimis in usu est galbanetum Paracelsi & omnia cum eodem parata.

Juxta hæc petroleum, & oleum terræ dictum potenter penetrant & paralyticos restituit, sicut etiam alia olea destillata conducunt, v. gr. baccarum juniperi, succini, spicæ, lavendulæ; salviæ, menthæ, terebinthinæ, item olea destillata rectificata ex tartaro, lignis, in specie de ligno fraxini, galbano, &c. Hæc olea, oleo nucistæ, vel laurino excepta, illinuntur & affricantur partibus affectis, & regioni spinæ dorsii, idq; aliquoties interdum.

℞. Ol. Petra alb. ʒij.  
destill. succin. ʒß.  
lavend.  
major.  
spica aa. ʒj.

M. pro Inunctione membrorum,  
D. S.

#### Eusserlich Glieder-Dehl.

Ad emplastra quod attinet: extacamaha-ca imprimis sunt paranda, quæ applicari solent in paralyti ex humectatione nervorum nimia externa. De his vid. Barbette in *Anat. Pract. pag. 51.* ubi loco olei terræ in ejus defectu oleum petræ substitui potest.

Quibus verò acria ejusmodi non æquè conferunt, ut sit quibusdam scorbuticis, temperata magis conducunt, atque tunc imprimis conveniunt animalium pinguedines resolutæ, ut axungia humana, viperina, serpentis, ciconiæ, castorina, felina, vulpina, muris montani, canina, in specie pinguedo anserina, de qua vid. Crato *lib. 6. consil. 50.* Hæc ipsa nunc solitariè, nunc cum petroleo aut oleo terræ, & paucò oleo quodam destillato, nonnihil acuata & benè calida, præmissâ debitâ frictione, applicari possunt, idque imprimis, ubi jam imminet rigiditas & contractura, aut metuitur atrophia membri, &c. ʒ.

℞. Pingu. anserin. vel human. ʒiij.  
iv. ad ʒvj.

Ol. dest. terebinth. ʒiij.  
bacc. junip. ʒj.  
Spica ʒß.

M. S.

#### Eusserliche Glieder-Salbe.

Vel, quæ hoc in passu reliquis præfertur, pinguedo anseris aromatica assando destillans, dum impletur simplicibus balsamicis vel nervinis.

℞. Anserem masculum deplumatum & exenteratum, vino lavatum: tum

℞. Thuris alb.  
Myrrh.

Mastich. aa. ʒij.

Ungu. Martiat. ʒvj.

Repleatur iis mixtis venter anseris, assatur in veru, phlegma, quod prodit, abjicitur, pinguedo verò stillans asservatur pro usu.

Hujus liquoris cuilibet unciz adde pulveris vermium terrestrium ʒj. quò illinuntur membra.

Quidam canem ruffum cum herbis appropriatis, item myrrha, mastiche, galbano, &c. assant. Parili ratione venter ciconiæ impleri & hujusmodi linimentum elici potest.

Hic accedunt olea cocta quædam, v. gr. vulpinum, lumbricorum terrestrium, euphorbii, de piperibus, & feminis trifolii asphaltitis à Sylvio *Prax. lib. 2. cap. 22.* commendata. His addenda unguenta, de bdellio, de quo vid. Amatus Lusitanus *Cent. 4. Curat. 22.* Agrippæ, Martiatum, nervinum, paralyticum Mynsichti, balsamus Guidonis. Quibus alumen plumosum admiscere jubet Sylvius *loc. all.* si aridura subsit; Item cataplasma ex radice Symphyti majoris, cujus usum videbitis in Hartmanno; & similia remedia.

## CAPUT IV.

De

### Operationum Rationalium Læsionibus.

Vitiatur ratiocinatio duobus modis: nempe

1. Imminuitur, ut in stupiditate seu tarditate ingenii; aut aboletur, v. g. in stultitia, amentia, & fatuitate; vel etiam in senibus ex naturali causarum ordine;
2. Depravatur; id quod fit in omnibus deliriis, tam in genere, quàm vario modo in diversis deliriorum speciebus.

## ARTICULUS I.

De

### Ratiocinatione Imminuta & Abolita, & inde natâ Memoria Læsione & Stupiditate.

Quoad imminutam aut abolitam ratiocinationem, notandum: Ratiocinationem ex se nunquam imminui aut aboleri, nisi etiam in memoria simile adsit; hinc enim senes sunt stolidi, quia eorum memoria deficit: & qui nullam habent memoriam, semper manent pueri, dum nihil addiscunt; & licet

licet ſapientiſſimi, ſi ex morbo quodam vel cauſa quadam externa memoriã lædant & amittant, ſtupidiſſimi & ſtolidi fiunt. Tantum nempe ſaltem ſcimus, quantum memoriã comprehendimus, & cum iudicio ponderamus & applicamus.

Hujus ergo memoriæ læſiones hic imprimis ſunt conſiderandæ, quibus ipſa aut imminuitur, aut prorsus aboletur; depravari enim aut morboſe augeri nequit: Nam memoria non recte aut vitioſe retinens, eſt memoria deficiens ſeu imminuta.

C A U S Æ.

Hujus ergo ſeu imminutæ aut abolitæ cauſam proximam & univerſalem certò determinare impoſſibile eſt partim quoniam nondum à priori cognitum, quomodo naturaliter ſiant memoratiõis actus? aut in quo conſiſtat? & in quantum etiam in hoc negotio explicando Guilhelmus Gratarolus *Tract. de Memoria conſervanda* inſcripto, conatus eſt, ſaltem tamen ſunt verbalia, adeoque in modo memorandi genuino omnes impingunt, utut præ ceteris Carteſius rem nonnihil clariùs aggreſſus fuerit; partim verò quoniam tam multæ, exque tam variæ remotæ cauſæ memoriã lædere valent. Hoc ſaltem obſervandum: (1.) memoriã nobis communem cum brutis eſſe, prout nempe reminſcentiæ opponitur, quæ nobis eſt propria, & fit per ratiocinationis diſcurſum, (2.) læſiones memoriæ ſequi læſiones capitis certò modò.

In capite quoad hoc negotium ſaltem ſpiritus animales & cerebrum conſideranda, in quorum altero, tanquam radice, fundata erit memoria: Spiritibus autem, ceu ſubſtantiarum continuo mutabili, non erit impreſſa memoria, quia memoria fixam habet ſedem. Certum ergo eſt, quod cerebrum ſubjectum radicale ſit memoriæ; Jam verò & omnes cauſæ remotæ, quæ lædunt memoriã, triplicis ſunt generis, & ferè eò collimant, ut aut

1. Cerebri conformationem & texturam mechanicam, & hinc natam temperaturam, imprimis in humiditate aut ſiccitate; aut
2. Univerſum ſanguinem & ſpiritus vitales certò modò vitient aut corrumpant, hinc aptam ſpiritibus animalibus materiam ſubtrahant;
3. Denique ſpiritus animales præter modum conſumant, diſſipent, aut quocunque modo torpidos reddant.

Quarum cauſarum variarum omnium ad unam proximam reſtriçtio vix poſſibilis eſt.

In conſideratione ergo læſionis memoriæ probè ſemper attendantur cauſæ ejus remotæ,  
Tom. II.

ut iſdem quaſi manuducantur ad feliciorem praxin:

I. Prioris claffis cauſæ remotæ ſunt: (1.) Res fortuitæ & caſuales, v. gr. caſus ab alto, vulnera, & contuſiones capitis enormes, & cranii violentæ depreſſiones, ac ictus in caput, & ſimiles externæ læſiones, memoriã deſtruentes: qualia exempla Plinius *Nat. Hiſt. lib. 7. cap. 34.* Rondeletius *Meſch. Med. pag. 314.* Horſtius *L. II. o. 7.* Platerus *obſervat. pag. 13.* Borellus *Cent. 2. obſervat. 37.* & Tulpus *lib. 4. obſervat. 15.* Hildanus *Cent. 3. obſervat. 1.* allegant. Item nimia & frequens capitis lotio memoriã lædit. (2.) Conformatio capitis & cerebri à primo ortu vitioſa, ita ut qui pravam cerebri figuram habent, ut plurimum ſtolidi, obliſioſi, &c. obſerventur; vid. Bartholinus *Cent. 2. Hiſt. 20.* Willifius *Anat. Cerebri lib. 1. cap. 3. fig. 4.*

II. Secundæ claffis ſunt cauſæ naturales, aut ex claffe rerum vel nonnaturalium vel aſſumpta diverſa, vel excreta & retenta, vel animi pathemata. Quoad (1.) aſſumpta; v. g. vini generoli immoderatio uſus ſeu potiùs abuſus, ut & crebrior ebrietas, memoriã labefactare ſolet. (2.) Inedia gravior & diuturnior: Sic obſervatum fuit in virgine poſt diuturnam & tantùm non miraculoſam inediã, cùm denuò comedere inceperit, obliſionem & mentis ſtuporem ſucceſſiſſe, teſte Horſtio *lib. 2. obſervat. 29.* (3.) excreta. Suppreſſa ſanguinis evacuatio conſueta & ſimilis memoriã hebetare poteſt: Exemplum ſuppreſſionis menſium obſtinatæ, obliſionem inducentis, per cauterium in occipite curatæ, videb. in *Aſt. Hafnienf. Volum. 2. pag. 196.* Item curioſam obſervationem habet Zacutus Luſitanus *lib. 1. Prax. Admir. obſervat. 47.* de inſania, orta ex ſuppreſſis hæmorrhoidibus, poſtmodum tamen ſponte curata ex diuturna hæmorrhagia, facta in interfaminea per porum quendam inſenſilem: Sic ex ſuppreſſis lochiis puerperæ obliſionem cum melancholia natam obſervat Salmuth. *Cent. 1. obſervat. 72.* item (4.) hæmorrhagiæ nimix, præter ſtuporem mentis obliſionem quoque inducunt.

III. Terti denique generis ſunt (1) aſſumpta vitioſa, ſpiritibus animalibus minus congrua; vid. Riverius de quodam, qui poſt longum uſum aquæ papaveris rhæados memoriã fuit deſtitutus & fatuus factus, in cujus ventriculis cerebri poſt mortem niger ſeu atramentarius humor inventus fuerit. Opii abuſus mentis ſtuporem & obliſionem ſubinde inducit: Sic Willifius *Pharm. Ration. Part. 1. pag. 306.* ab opii abuſu mirabilem & particulare memoriæ amiſſionem refert. Philtra multum etiam in reſeſſu habent, quæ uti non rarò varias mentis læſiones, in ſpecie manias,



manias, ita etiam fatuitatem & gravem memoriz læsionem inducunt, teste Schenckio exemplum notabile refert Henricus ab Heer *in observat.* 13. de juvene quatuordecim annorum, stupendi aliàs ingenii, qui quatuor condiscipulis diversa dictabat carmina, ipse verò quintum scribebat, & nihilominus tamen postmodum per philtum omnium rerum, imò etiam proprii nominis oblitus fuit, & alphabetum rursus addidit: De philtis, felis cerebro, aliisque narcoticis internè & externè applicatis, oblivionem inductam Senectus *Prax. lib. 1. pagin. 241. 242. & 296.* restatur: Sic etiam venena nonnulla assumpta omnem memoriam perdere solent: vid. Schenckius. (2.) Venus nimia; quæ quò largiùs exercetur, eò magis memoriam debilitat, aut ad fatuitatem disponit, vid. Schenckius *in observat.* ac curiosum est, quod Salmuth, *Cent. 1. observ. 61.* refert de viro docto, qui, ut conjugii placeret, usus fuerit stimulantibus Venerem, unde sine memoria redditus fuerit fatuus: Eodem loco refert de quodam, qui ex nimio Veneris abusu adeò exsiccatum habuit cerebrum, ut illud intra cranium hinc inde moveri perciperetur. (3.) Affectus animi diversi, diuturnæ curæ cum vigiliis conjunctæ, & studia immodica, præprimis circa diversa objecta; nam ex terrore memoriam sæpiùs lædi, notissimum est; item ex terrore repentino quosdam memoriâ subito privatos refert Schenckius. (4.) Morbi varii cerebro & spiritibus animalibus infesti, in specie affectus soporosi, item diuturniores epilepsiæ. Vid. Platerus *observ. 7.* & Hildesheim, *Spicil. 3. pag. 315.* Apoplexiam subinde oblivionem lectionis salvâ scriptione excitare, videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. observ. 154. pag. 196.* sicuti etiam interdum ex febre ardente vel acuta resurgentes omnino obliviosi redditi observati fuerunt in Schenckii *observat.* & Christophorus à *Vegalib. 3. Artic. Med. cap. 30.* refert de quodam Franciscano, à febre acuta memoriam amittente; hinc etiam post pestem memoriam abolitam observat Schenckius. Ex mania omnium rerum oblivionem habet Timæus von Guldensee / *in casib. pag. 19.* Ut taceam, quæ de peste illa Atica famosa referunt, quod in hac homines tanta omnium rerum ceperit oblivio, ut nec familiares nec se ipsos agnoverint: Tandem Henricus ab Heer *in observat. 3.* refert exemplum de viro quodam quadraginta annorum fatuo & oblivioso facto, qui mortuus, cum cranium fuisset apertum, cerebrum siccissimum & durum, adeoque in summa sui parte digitis friabile repertum fuit, unâ cum flavedine citri æmula, undiquaque ad digiti altitudinem imbutum, circa ventriculos tantum & basin mollius tamen inventum fuit: quo non abludit Salmuth, *Cent. 1. observ. 61.*

(1.) Senectus, dum v. g. Bassianus Landus de *Humana Historia Franciscum Barbarum Græcarum literarum*, quatum erat doctissimus, in extrema senectute planè oblitum fuisse refert.

In quibusdam à natura memoria & ratiocinatio est deficiens; in aliis verò per naturam percipitur admodum subtilis memoria, & acriter ratiocinatur. Naturalem autem ad memoriam inhabilitatem, adeoque naturalem stupiditatem, ceu difficulter aut planè non curabilem, prætermitto.

Interim in memoriz læsione pro meliori medendi ratione in genere observetur diversitas subjectorum (si est à causa interna) an sit in corpore senili? an verò in corpore juvenili? & si in corpore senili memoriz læsio, in his pro medendi methodo ante actæ vitæ ratio consideranda est, an vita præcedens fuerit sedentaria & quieta magis ab animi & sensuum internorum motibus? an verò semper actiosa: v. g. in studiis, curis, &c. Nam juvenes, imprimis malo hypochondriaco gravius obnoxii, item qui interdum epilepsiâ corripiuntur, debilem habent memoriam, qualia ego hic jam habeo exempla; quod si ista memoriz læsio est in corpore senili, ut plurimum etiam reliquarum actionum animalium torpor quidam conjunctus esse solet propter spirituum similem torporem, idque ferè ob cerebrum lymphâ copiosiore nimis inundatum, præprimis quando rejiciunt copiosa phlegmata per os & aures: id quod fit imprimis in senibus, quorum ante acta vita multis curis aut studiis sublimioribus non fuit agitata, & judicium adhuc aliquomodo valet: Nam in senibus doctis, quorum nempe vita occupata fuit in studiis, meditationibus, curis ac negotiis urgentibus, in his adhuc est sæpè judicium, & in talibus, quod probè observetur, cerebrum aridum, siccum, ac quasi porosum nimis existit, uti etiam in his habitus corporis aridior, somnus paucus, & rarò excretio per nares & os adest, & licet dormiant, facile tamen evigilant.

In junioribus, cum memoria nonnihil læsa, judicium tamen & similes rationales operationes, sint ut plurimum vegetæ & firmæ: id fit ob spiritus animales subtiliores, agiliores, fervidiores ac ferè igneos, unde cerebrum similiter aridum & exsuccum, minusque nutritio succo irroratum: Hinc judicium quidem ad tempus habile, sed memoria nonnihil debilis, & tales in senili ætate omninò judicium & memoriam amittunt, imprimis si sint studiis dediti, & sic sponte tandem fatuantur. Sin verò simul judicium cum memoria firma adsit in juvene, præcox est ingenium, sed rarò durabile, quin solito citiùs judicium

dicium & memoriā amittunt. Quod si juvenis sit, qui conqueritur de aliquā memoriæ debilitate, ita ut accedat torpor sensuum internorum, in tali actiones istæ, nempe ratiocinatio & phantasia, sunt obtusæ ac minus acutæ, quæ præter naturam statum cerebri humidiorē & spirituum animalium defectum innuunt, & cæteris paribus facile corriguntur.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa memoriæ & ratiocinationis vitiatæ, ex relatione ægri patent: imò & hujus causæ remotæ ex vitæ genere, actionibus animalibus & similibus antecedentibus ac concomitantibus, partim à Medico dignoscuntur, partim ab ægro confirmantur.

### PROGNOSIS.

Quod attinet prognosin: hæc variat pro causarum remotarum varietate. Hinc memoriæ læsio in iis, qui nimis studiis sunt dediti, idque ex fervore & activitate spirituum animalium, & siccitate cerebri, difficillimè curantur; & tales, si volatilibus analepticiis & aromatibus spirituosus utuntur, planè fatui tandem redduntur; sicut olim ex frequentiore usu confectionis anacardinae cuidam contigisse ex relatione D. D. Michaelis recordor; & ambrata pro confortanda memoria ab his, quibus phantasia potentior est, assumpta, stuporem tandem mentis inducere, notissimum est.

Econtra facilius & etiam melius est in iis, quibus cerebrum lymphā copiosiore madidum, & spirituum aliquālis torpor est.

Præterea memoriæ subitanea magis læsio absque causā externā orta imminentis apoplexiæ & paralyseos, quin & interdum epilepsiæ, indicium est: sin verò ægro viribus jam dum fracto hoc contingat, mortis imminentis signum existit.

Naturalis stupiditas, & à capitis conformatione vitiosa, est incurabilis.

In specie, quæ est ex philitris, rarissimè & difficillimè curabilis est, quia, uti suprā dictum est, cerebrum tam acriter afficitur ab iis, & facile in maniam degenerat.

Quæ ab inveterata epilepsia, similibusque capitis affectibus, morbis malignis & acutis, item venenis oritur memoriæ læsio, exindeque stupiditas ferè incurabilis est.

### C U R A.

Quod attinet curam: in hac ipsa

1. Ante omnia causarum remotarum antecedentium activitas & conditio benè est pensanda, & quomodo noceant, maturè considerandum, & iis obviam eundum, & inducta

labes emendanda & sistenda; unde e. g. hæmorrhagia sistenda, evacuationes consuetæ suppressæ promovendæ, humoris genitalis dispendia immoderata, ac inedia diuturnior evitanda.

2. Constitutio cerebri an illud aridum nimis? an humidum? & spirituum animalium ratio probè consideranda est; & ubi illi sunt nimis ignei & fervidiores, & cerebrum aridius, hæc sunt attemperanda, & ad statum naturalem reducenda, solâ nempe diætâ lautâ & evpepta, & alimentis succulentis & benè nutritivis, v. g. lacte & lacticiis, chocolata in lacte vel vino assumpta, &c. spirituum volatilitatem blandè temperantibus, & chyloso rore imprægnatis, irrorantibus, quiete, &c. Ubi vero cerebri nimia humiditas præpoller, & spiritus sunt torpidi, minus agiles, volatilibus quasi sunt excitandi, & subtilisandi, aromaticis cephalicis acris spirituosus & similibus crebrò adhibitis.

Remedia ergò quod attinet: in genere omnia cephalica dicta, salia volatilia, spirituosus odorata & aromatica ad roborandam memoriā & acuendum ingenium multum laudantur, non tamen semper aciora; v. gr. profunt rosmarinus, melissa, ocyum, flores liliorum convallium, stæchados Arabicæ, tunicæ, primulæ veris, spicæ, serpillum, cubebæ, caryophylli, cardamomum, cinnamomum, &c. Et imprimis cubebæ, numero tres manè jejuno stomacho comestæ, acuunt insigniter ingenium & memoriā: siquidem ipse adhuc puer, cùm ab informatoribus coactus fuerim ad ediscendas lectiones, si voluerim aliquid retinere, assumpsi cubebas tres vel quatuor jejuno stomacho, & percepi operationes mentis insigniter acutas. Quod etiam faciunt grana cardamomi: sed in juvene studioso cautè applicentur, propter nimiam volatilitatem & acrimoniam aromaticam, in senibus verò tutiora sunt: præterea thus, castoreum, succinum, thus album pulverisatum, circa plenilunium & novilunium assumptum, laudatur. Ex præparatis & compositis conservæ recensitorum vegetabilium, horumque olea destillata, imprimis cinnamomi, sunt præscribenda. Sic quoque pulvis Trithemii admodum laudatur, cujus descriptionem videb. in *Praxi Chimiætr. Hartmann. cap. 14.* & Schrædero in *Pharmac. Medico-Chim. Part. 2. pag. 272.* Item pulvis analepticus Minderrii, species aromaticæ rosatæ, species dianthos, diambæ, diamoschi dulcis & similes, sunt admodum convenientes. De Ambra noto, quod sit omnium optima, & quod non habeatur par remedium in firmandis viribus animalibus; & roboranda memoria, omnibusque mentis actionibus: sive sub forma pulveris cum ana sacchari, sive sub forma essentia vel tincturæ, parandæ cum spiritu rosarum.

(Ppppp 1)

rum

rum aut ceraforum nigrorum, vel cum spiritu melissæ præparandæ, propinetur. Item elegantissima etiam fit tinctura cephalica ex granis chermes & ambra, cum spiritu liliorum convallium, vel aliis dictis spiritibus extractis.

Sed observetur de his ambratis, quod cautè admodum internè sint usurpanda, speciatim in juvenibus calidioribus, aut ubi ex aridura cerebri memoriæ læsio metuitur; tutius autem senibus. Nam sicut verum est, quod ad tempus quidem fulciat memoriam, & reddat mirabilem; ita crebriori usu data postmodum plus nocet, quàm prodest, cum præmaturam stupiditatem post se relinquit; vim enim aliqualem inebriativo-narcoticam ambra habet conjunctam.

Porro ambra ratione confectio al-chermes memoriæ firmandæ, imprimis senibus, conducit; sicut etiam ab aliis commendari solet confectio anacardina; sed cautè admodum usurpetur propter ingredientia vegetabilia nimis acria, nimisque volatilia; unde ejus abusu quidam insani, alii acutè febricitantes facti fuerunt, adeò ut rarissimè vel nunquam sit usurpanda.

Insuper spectant huc omnia spirituosa ex formicis parata, quæ omnibus functionibus animalibus robur addunt, ac speciatim aqua magnanimitatis Laurembergii ad memoriæ robur & ingenii acumen laudatur; vid. Laurembergius *in libello suo rarissimo Mnemonica dicto in Ann. 3. M. A. N. C. in Append. pagin. 599.*

Cum dicta aqua magnanimitatis Laurembergii quidam faciunt essentiam ex confectioe anacardina, & sic tutius ferè usurpantur remedia anacardina: Conf. Hartmannus *Prax. cap. 14. §. 2.* Porro nota est aqua sophorum Dorncrellii, item aqua cephalica Mynsichti, quinta essentia Matthioli, aqua & spiritus cerebri humani: quæ omnes commendatæ sunt pro robore memoriæ à Bartholeto. Myrobalani conditæ, in specie chebulæ laudantur insigniter à Montagnana ad conciliandam memoriam firmam, si subinde æger unam alteramvè comedat. Idem Montagnana *consil. 71.* commendat sequentes pilulas, quas bonum secretum vocat ad memoriam, quibus virum antea doctum, sed memoriâ privatum, restituit:

℞. Cubebar.

Calamintb.

Mastich.

Nuc. moschat.

Caryophyll. aa. ʒj.

Ambr. Orient. ʒʒ.

Moschi gr. v.

Misc. &c. succ. majoran. f. pilulæ.

De quibus omni vespere, dum vadit ad lectum, deglutiat aliquot, manè verò capiat duplum, hinc jejundet duas vel quatuor horas.

His adnumeranda est herba thée, egregiè facultates animales & operationes mentis internas confortans; & quidem decoctum ejus mirabile est, dum judicium & memoriam maximè auget, magis tamen senum quam juvenum, ita ut sine somno & torpore aliquamdiu persistant, nempe in vino bullita, cujus haustulus omni manè assumatur.

Hæc sunt interna, quibus addi possunt spiritus & essentia salviæ, torismarini, melissæ, ligni aloës, liliorum convallium, cinnamomi, castorei, ambra, & similes.

Remedia lunaria pariter & hic locum inveniunt. Notum est de lunæ rasura memoriæ robur conciliante, quare resolutio lunæ cum spiritu salis Ammoniaci vinoso ad imitationem Kunckelii parata hinc proficua foret.

Externè pauca sunt, quæ locum inveniunt, oleum myrrhæ per deliquium factum solet insigniter commendari, vid. Schræderus *in Pharm.* quod divinum remedium vocat Hildesheim *in Spicil.* ad memoriam. Oleum hoc myrrhæ per deliquium si temporibus & occipiti inungatur, mirificè memoriam restituere astringit; Sic Zapatha curavit memoriam imminutam ob abundantiam succorum frigidorum in capite per spiritum vini, cui piperis parum infusum fuerat, inungendo hoc ipso subinde futuram coronalem & sagittalem, vid. Zapatha *cap. 4. in Cl. Medic.* Simile quid est, quod commendat Hildesheim *in Spicileg. 3. pagin. 319.* ubi laudat sequentem essentiam ad memoriam conciliandam: nempe

℞. Fol. betonic.

salvia

lavend.

torismar.

fl. Ros. rubr. aa. M. i.

Nuc. moschat.

Piperis long.

Galang.

Cyper. rotundi aa. ʒjv.

Castor. ʒij.

Nuc. Indic. ʒʒ.

Myrrha

Thuris aa. ʒiij.

Croci ʒʒ.

Infundantur in vino vel spiritu vini, aut spiritu appropriato, digerantur in Mariæ balneo & filtrentur.

Hoc ipso liquore seu, ut vocant, oleo nares & tempora & vertex largiter illinantur pro ingenii robore firmando.

Con-



Conveniunt quoque balsamum memoriæ Mynsichti, & lixivium sapientiæ Mynsichti. Aliàs etiam pinguedo ursina temporibus & fronti illita ad roborandam memoriā commendatur; item unguentum Caroli, Ducis Burgundiæ. Præparationem videbitis in Sennerti *Praxi*.

## ARTICULUS II.

De

### *Deliriis ingenere.*

**Q**Uando depravatur ratiocinatio occasione læsæ imaginationis seu phantasiæ & memoriæ, ita ut à consueta lege & ordine aberraret, dicitur delirium.

Aberratio hæc observatur nunc conjunctim, nunc seorsim secundum omnes tres mentis operationes: Nam

1. in simplicium objectorum indeque formatorum conceptuum apprehensione: v. g. cum delirans quid pro quo, vel aliud pro alio, concipit, ut dum quendam vulgarem hominem Regem Hispaniæ appellat.

2. & 3. in ipsorum conceptuum apprehensorum compositione & divisione, indeque facta conclusionem & ratiocinationem; v. g. dum aliquis putat, se constatum esse ex butyro; unde ignem horret, ne liquecat: vid. Schenckii *Observationes*.

Omnes hæ aberrationes à recta ratione uno nomine delirium appellantur, Græcis *ἁπλοῦς*, nempe depravatio rationis, & aberratio ejusdem ab ordinaria cogitationis lege, qua deliria varia, nunc ridicula & jocosa cum ægri gaudio & voluptate conjuncta, quando nempe rident, cantant, jocosa narrant; nunc etiam morosa seu seria, ubi cum quodam impetu, furore, &c. delirant, sed absque nexu & ordine, & sine fundamento, confusè ut plurimum producuntur.

### C A U S Æ.

Causa horum deliriorum in genere consistit in spiritu animali, in substantia nempe & motu plus minus alterato & vitiato, ita ut spiritus à debita crasi degenerent; unde prout variat crasis spirituum & eorum motus præter naturam, variant etiam deliria. Mens enim, id est, anima rationalis, utpote immaterialis & immutabilis, eadem semper manet, & à nulla alia causa materiali lædi & inquinari potest.

In spiritu ergò hæret vitium, idque varium & diversum, prout ipsius alterationis inductæ & causarum occasionalium multiplex est varietas, unde etiam varia deliria varietate eorundem species. Quemadmodum in ebriis idem vinum sub ebrietatis exorbitantia di-

versa parit deliria in diversis subjectis, dum unus sub delirio vinoso fit iracundus aut furiosus, alter amarus, tertius canorus seu cantans, quartus jocosus & ridiculus, quintus somnolentus, sextus se æstimat maximè divitem, septimus omnium evadit sapientissimus, octavus alio phantasmate afficitur, &c. in his affectibus, utut unum sit vinum, quod omnes inebriat, indeque omnes etiam delirantes reddit; nihilominus tamen pro diversa constitutione subjectorum, eorumque alia habitudine diversa, ex massæ sanguinæ crassi materiali & seminali distincta, & inde pro varia spirituum animalium constitutione varia tamen & distincta fiunt deliria.

Quoad differentias deliriorum; ingenere omnia vel ex interna oriuntur causa, seu quæ habent fomitem quendam internum in corpore stabulantem, vel ab externa. Ab externa quæ proveniunt causa deliria, originem ducunt vel ab assumptis intra corpus, vel extrinsecus admotis, utraque sive ex vegetabili sive animali ex regno oriuntur. Ex regno vegetabili sunt liquores spirituosus & temulentiam inducentes, item omnia narcotica stupefactiva, quæ simul cum virtute fixativa & quasi ligativa spirituum animalium, certam vim simulectiam obtinent determinandi certo modo spirituum animalium motum, cujus immutati occasione diversi & extraordinarii conceptus in mente formantur, indeque varia deliria oriuntur: v. gr. refert Kircherus, *Tract. Scrutinium Pests*, exemplum de duobus Monachis, qui ex esu radicum cicutæ prope aquas crescentis loco petroselini in tale inciderunt delirium, ut se in anseres & anates transformatos putarint, indeque isti Monachi piscinis, stagnis & plaudibus se immerferint, & anatum instar natare voluerint. Conf. etiam Wepferus *de Cicuta Aquatica*. Pertinent huc, ferè universus solanorum exercitus, quos inter in specie eminent nicotiana, hyoscyamus, datura, stramonium, solanum maniacum, &c. Item pharmacum phantasticum Bartholetti ex stramonii semine paratum, quo ipso determinare vult deliria pro lubitu ad certum conceptum & certam imaginationis speciem, pro additorum aliorum varietate: de quo prolixè agit in *Tractatu de Respirationis Vitiis libr. 5. cap. 1. & 3. pagin. 405. & seqq.* Sic opium & opiata, copiosius & frequentius propinata, (uti mos est in provinciis orientalibus, in India, Persia, & similibus) similia narcotica, nobis occidentalibus & septentrionalibus somnum cum insomniis horrendis & admodum terribilibus, de dæmonibus aut spectris inferunt, quasi vexaremur à dæmone, quasi vulneremur & versemur in jurgiis; orientalibus autem, sub somno insomnia suavia, quasi in viridariis versentur, in para-

paradiso, ibique hilariter & jucundissimè vivunt, excitat. Conf. M. A. N. C. *Ann.* 2. *observat.* 69. sic hyoscyamus assumptus quibusdam ridiculum infert delirium cum jurgiis & contumeliis, vid. Borellus *centur.* 4. *observat.* 45. Pertinet huc vis narcotica nucis metelæ Arabum, quæ idem est atque datura Turcarum, à cujus semine, ad certum pondus dato, risum effici; aut stultitiam cum risu & jucunda animi hilaritate, & cum insigni liberalitate, ita ut qui sumpserit istud semen liberali manu omnia suadet & offerat, omnia delicta profiteatur, & omnibus jussis obsecundet: ac reverà hyoscyami est species, vid. Bartholetus *loc. allegat.* Econtrà semen & cortex hyoscyami Peruviani, eodem autore referente, delirium facit ecstasticum, quo delirantes putant se versare in viridariis in conversatione Angelorum: de hujus narcosi vid. Mandels-Lo in der Ost-Indianischen Reise-Beschreibung/ pag. 133. cujus narcotice virtutis medela est acetum; v. Hæchstetterus *decad.* 7. pag. 156. sicut semen hyoscyami nigri infert delirium cum jurgiis & contumeliis; & semen solani majoris dat delirium, quo se à dæmonibus vexari & à serpentibus ac satellibus malè tractari existimant. Plura similia, eaque non inelegantia & admodum curiosa, de ejusmodi artificiali quasi dementia per externa excitata, vid. in Dœringio *Tractat. de Opio cap.* 7. pag. 72. & 79. An verò semper in diversis subjectis deliria determinata inferant, aut arte per addita ita specificari queant, ut saltem determinatum efficiant delirium, de hoc admodum dubitare quis potest, cum & hyoscyamus pro subjectorum varietate amentias diversas inferat; parili ferè modo, atque suprà de vino monui: Conf. M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *observ.* 124. pag. 134. Huc pertinet crocus, de quo vid. Kircherus *loc. allegat.* Sulphura enim vegetabilium minus tuta sunt, quia stupefactiva & narcotica sunt; sulphura verò ex regno minerali sunt tantum anodyna, non verò stupefactiva.

Sed præter vegetabilia etiam animalia certa & determinata inferunt deliria, in specie animalia nobis dicta venenata, & hinc etiam rabida, canis seu felis, &c. Vid. Bauhinus. Sic in rabie notum est, quod à cane rabido demorsu simile delirium rabiosum contrahant, sub quo in canes semutatos existiment, unde in mores caninos ferè transformantur: sicuti iidem semper hydrophobia seu insigni omnium liquidorum & aquarum metu corripuntur. Notus quoque præterea est tarantismus, quando à tarantulis demorsu earundem gestus, telarum texturam, & ad determinatam musicam amorem, & similia exactè acquirunt. Nota etiam est rabies felina, dum tres Helvetii juvenes à fele rabida interfecta

comedentes deliri exinde & rabidi fuerint, ut felium instar unguibus & dentibus se lacerrant, & morficando invicem congressi fuerint: Vid. Kircherus in *Scrutin. Pestis* pagin. 207. & Weinrichius *Tractat. de Monstris.* ubi habet exemplum morum felinorum, ex sanguine felis assumpto inductorum. Quò similiter lupina & suilla rabies pertinet, quorum esu similiter homines in talia deliria feruntur: Exempla prostant hinc inde, imprimis apud Bauhinum. Pertinent huc quoque philtrea, tam vera quàm falsa: Falsa sæpius maniam inferunt & furorem; vera per muiæ animalis confermentationem cum certo subjecto habent simul vim determinandi spiritus animales, ita ut exinde ferantur in determinatam personam suâ inclinatione, unde consequenter amor; in Suecia septentrionali est hulo, animal sic dictum voracissimum, cujus pellis pretiosissima, si dormientibus obtegatur, facit insomnia animali congrua, nempe voracissimi hominis. De Marte, quod quod faciat delirium ridiculum, vid. Bartholetus *loc. alleg.* Ab his ergò & similibus externis certo modo determinantur spiritus animales, quatenus horum crasin certo modo alterant, & motum in cerebro variant, ut hujus motus occasione anima rationalis exinde tam miros ac deliros formet conceptus, ut antea dixi. Quod quomodo fiat, ut externè admota determinatum ac specificatum delirium inducant, certò nondum constat, & adhuc perscrutandum est.

Præ cæteris operosus hîc fuit Helmontius in suis scriptis, & hinc Marcus Marci *Tractat. de Ideis operatricibus*; item *Tract. de Philosoph. veterum restituta*, qui per ideas naturam determinantes negotium explicare nituntur, quæ hypothesis, si rem exactè consideremus, plausibilis primò videtur, & maximâ probabilitate conceptibili nobis imponere solet. Sed tamen si exactius paulò ad rectæ rationis trutinam examinetur, & ad prima usque fundamenta vera fiat inquisitio, si etiam paulatim in nosmet ipsos faciamus reflexionem, ut possimus concipere, quid & quale sit, & quomodo operari possit talis entitas idealis seu intentionalis & immaterialis sub compage materiz? aut quomodo hæc ipsa aut involvi aut evolvi possit? certus sum, quod tunc omnis ista idealis imaginatio instar fumi seu vanæ cujusdam ideæ subito sit transpirtura & evanitura.

Et quidem fundamentum istius opinionis, ex quo subinde probant existentiam talium idearum Helmontio seminalium, Marco Marci operatricium dictarum, desumptum est à formatione fœtus in utero, ejusque per ideam ab imaginatione materna conceptam transformatione. Hoc ipso tamen obscurum per

per æque obscurum declarare nituntur, æque enim obscurum est formationis fœtus & transformationis ejus per maternam imaginationem negotium, quam tota superstructa eidem *Φαινομένω* modò allegatorum explicatio.

Ea deliria verò, quæ sunt à causa & occasione interna, adeoque sponte fomitem intra corpus continent, & ipsa pro fomitis interni varietate, & prout diversimodè spiritus afficiuntur, sunt varia & diversa, nunc quidem vaga seu indeterminata, ut in febribus ardentibus & malignis; nunc verò sunt fixa, ut in pluribus melancholicis, & quasi ad certum objectum determinata. Quod autem à talibus causis internis possint determinari spiritus in suo motu, ut hujus occasione depravetur ratiocinatio ad certum objectum, ac certum superveniat delirium, per manifestum exemplum declarabo: consideremus v. g. picientes; sanè pica est appetitus carbonum, cretæ, halecis, &c. delirus, qui tamen excitatur occasione positiva in stomacho fundata: sic etiam ponamus v. g. quendam, qui tempore nocturno in somno patitur distensionem vesicæ ex collecta inibi urina, vel quando genitura turgescens in vasculis & vesiculis seminalibus titillationem suavem excitat, in talibus certe exinde ita determinantur spiritus animales, ut superveniat somnium, & quidem in priori, quasi emitteret urinam, adeoque stragula permingit; in posteriori vero causa patitur somnium Venereum, quo somniando imaginamur, nos exercere Venerea negotia cum formosis puellis, indeque etiam seminis excretio seu pollutio nocturna ordinariò succedit. Par ratio est cum pica, in qua determinatum est delirium. Rectè enim in dormientibus insomnia dicuntur dormientium deliria; sicuti contra deliria vera sunt vigilantium insomnia, cum sanè tale quid patiantur delirantes vigilantes, quod patiuntur somniantes. Unde etiam delirantes vigilantes interdum recordantur eorum, quæ sub delirio fecerunt, interdum verò non, non secus atque fit interdum cum somniis paulo profundioribus; interdum verò obliviscuntur; adeò, ut qui rectè noverit declarare naturam & fiendi modum insomniorum, hic ipse quoque manifestam habebit theoriam deliriorum, quatenus nempe ea ex fomite interno originem habent, cum aliàs notum sit, quod somnia naturali ordine soleant insequi temperaturam, ut vocant, seu naturalem humorum ac spirituum crasin. Quò etiam pertinet delirium, dictum furor uterinus, ubi manifestum est delirium, ex liquoris seminalis circa genitalia turgescens, simili ferè ex causa, atque in maribus pollutio nocturna, mulieribus superveniens.

Tom. II.

## ARTICULUS III.

De

### *Deliriis à Causis internis.*

**U**T verò singulas & frequentiores eorum species sigillatim absolvamus, initium faciamus ab iis, quæ à causa interna oriuntur.

Deliria, quæ ab interna oriuntur causa, rursus sunt varia: Et primo quidem sunt vel cum febre, vel sine febre. Delirium cum febre aut levius est aut gravius: Illud communiter delirium simplex appellatur: Hoc verò, quod gravius & ferocius, hodiè ordinaria appellatione phrenitis audit, quod mitius paraphrenitis. Delirium sine febre est mania.

## MEMBRUM I.

De

### *Phrenitide.*

**P**hrenitidem ex inflammatione membranarum cerebri, ejusque substantiæ cineritiæ, oriri vulgo æstimant. De hac phrenitide ita explicata jam suprà monui, quod secundum primos Medicinæ Autores propriè diaphragmatis inflammationem innuat, secundum quos inflammatio cerebri ejusque membranarum vocata fuerit sphacelus, malum, ut rarum, ita ut plurimum funestum ac lethale. Verùm cum loquendum sit cum vulgo, sentiendum autem cum paucis, ob id etiam nos hac vice phrenitidis nomen in vulgari sensu retinebimus, idque imprimis, quia ratione methodi medendi & in diaphragmatis inflammatione, & in sphacelo cerebri, eadem sit curandi ratio, quæ in vulgò sic dicta phrenitide.

### *C A U S Æ.*

Causa ergò proxima tam levioris quàm gravioris delirii febrilis est in genere spirituum animalium varius, velocissimus & confusus in cerebro, præsertim ejus corpore calloso, motus, cujus occasione fit, ut ratiocinatio & imaginatio pervertantur; unde & post tam varia & minus cohærentia phantasmata ab anima efformantur, quorum index & nuntius sunt inconditi sermones, risus aut fletus, flocculorum collectiones, vigilæ, muscarum insolitæ venationes, & varix artuum motiones, &c. donec aucto & nimis impetuoso, penitusque inordinato factò spirituum jam deficientium motu, convulsiones sæpè lethales superveniant, aut tandem spiritibus tantùm non absumptis per inconditum narcoticorum usum penitus fixatis, phrenitis in lethargum, aut in affectum soporosum potius, mutetur, aut successivè superato-

(Qqqqq)

roma-



to malo æquabilis ordo ac circuitus spiritibus redeat.

Causa verò remota inconditi istius spirituum animalium motus in cerebro est nimia eorum & cerebri æstuatio & incalescentia, nunc minor, nunc major, idque vel simpliciter ob sanguinis nimiam incalescentiam, & pulsum in cerebro frequentiore, ex ejus effervescencia natum in paraphrenitide, vel ob stagnationem, & exinde membranarum aut corticalis cerebri substantiæ inflammationem in phrenitide propriè dicta. Cogitemus saltem æstum febrium talium acutarum, & vasa insignia & numerosa ad cerebrum distributa, & tunc hujus fervor facilè & sponte patebit: quod multo magis fiet, si cerebrum ipsum patiatur inflammationem, in quo casu dum cerebrum adeò fervore & ardore æstuat, necessariò spiritus animales fervidi movebuntur, & imaginatio ratiocinatioque lædentur. Unde primò in principio febrium talium acutarum vigilæ pertinaces tanquam delirii prodromus seu primus gradus ex spirituum continuo motu, secundò in incremento & statu deliria ipsa ex eorundem motu perverso, ac tandem tertio convulsiones, ex spirituum quasi ultimo nixu in membra se mutuò subsequuntur; & hi termini mortis prodromi ferè esse solent.

Unde etiam in incremento febrium talium ardentium continuarum superveniunt, ubi nempe maxima est sanguinis effervescencia. Ubi enim in principio morbi aut incremento, absque tamen insigniori febrili sanguinis effervescencia, vigilæ pertinaces cum leviori delirio imminente se manifestare incipiunt, gravioris malignitatis anguis latet sub herba, & virus malignum perturbati spirituum animalium motus est origo, uti fit in peste & similibus morbis malignioribus. Subesse autem, præter simplicem cerebri exæstuationem, subinde etiam membranarum aut corticis ejus inflammationem, confirmarunt exempla phreniticorum post mortem dissectorum: Sic enim refert Rhodius *Cent. 1. observat. 39.* phreneticum biduo extinctum, in cuius capite aperto cerebrum & membranz ejus cum intenso rubore adeo tuebant, ut facilè venæ ab ipsius substantia potuerint separari; & *observat. 40.* Phrenitidem sic dictam à piæ matris inflammatione: Sic Nicolaus Fontanus in *Analect. cap. 2.* in juvene febre continua perniciofa laborante, symptomatis horrendis stipata, ingentem cephalalgiam observavit, accedente vigilia & paraphrenitide, ex qua paulatim phrenitis subnata nullis auxiliis levare potuit, sed furiosus, amens & inquietus, ac in somnis decimo octavo die occubuit: resecto cranio cerebrum sine læsione fuit, sed maculis sanguineis undique conspersum, & meninges, in specie pia ma-

ter, tumida admodum & sanguine nigriusculo turgens visa fuit, & omnes ejusdem rami per cerebrum dispersi, sanguine congrumato tumidi reperti fuerunt: Sic Paw *observ. Anat. 8.* in cujusdam phrenitide & convulsione mortui cadavere abcessum in cerebello & exesione duræ matris observavit. Tunc quoque inflammationem membranarum cerebri ejusque corticis adesse suspicio est, quando per metastasin aliarum inflammationum oriuntur phrenitides, v. g. quando post erysipelas externum, aut post pleuritidem, aut peripneumoniam, aut post anginam subito evanescentes insequitur phrenitis, inflammatione partes assuetas saltem mutante: in talibus non dubium est, sanguinem in aliis locis coagulatum, solutum verò denuò, stagnare in membranis cerebri, aut ipso cerebro, & ibidem novam inducere inflammationem.

Causas quod attinet remotiores procatarticas, à quibus corpus disponitur ad febres acutas, & consequenter harum pedissequas, deliria, vel simplicia, vel phrenetica: ex variz quidem sunt, omnes tamen coincidunt cum iis, quæ inferunt sanguini motum impetuosorem & febres ardentes: sic v. g. notum est, quod ætas juvenilis, aer æstivus, crebrior ebriositas, & abusus potuum generosorum, in specie vini & spiritus vini, nos reddant admodum promptos, uti ad febres ardentes, ita etiam ad deliria & perfectas phrenitides, uti hoc ferè videmus in ebriosis: Sic enim Horstius *lib. 2. observat. 25.* phrenitidem post nimiam vini ingurgitationem refert, Suppressæ quoque sanguinis evacuationes solennes, uti febres, ita etiam stagnationem sanguinis in cerebro, & phrenitides subinde inferunt; quâ ratione ex lochiis puerperæ non ritè expurgatis phrenitidem, abortam refert Horstius *lib. 2. observat. 25. & observ. 26.* idem malum ex retentione hæmorrhoidum in viro annotat. Tandem etiam huc affectus animi graviores pertinent: quos inter in specie primatum obtinet ira, quæ admodum nos disponit ad febres acutas, ipsæque conjuncta deliria: Sic phrenitidem ex ira sub mensium fluxu hunc coercente referunt Bartholini *Acta Hafn. Volum. 2. pag. 138.* Febres malignæ quoque, uti monui, læpissimò conjuncta habent deliria & phrenitides tam in principio, quam in incremento. Et quidem hæ phrenitides in febribus malignis supervenire solent interdum citra insignem corporis incalescentiam, aut massæ sanguineæ effervescenciam; unde talia deliria in principio cautum reddant Medicum in instituenda cura, ne perditos reddat ægros. Omnia illa, quæ febres magis acutas excitant, deliria & phrenitides inferunt; ita tamen ut phrenitis, quamvis semper cum febre, non tamen semper à febre sit. Notabile est, quod refert Pla-

Platerus *lib. 1. observat. pag. 87.* ubi delirans in febre continua uxorem per vim comprimit, mox expirat, uxor verò mox eodem morbo correpta, licet fuerit sanata, mens tamen nunquam se rectè habuit. Denique gonorrhoea virulenta suppressa phrenitidem quoque intulit, curatam post universalia per 3j. Philonii Romani à Fontano *Curat. & Resp. lib. 1. pag. 21.*

### DIFFERENTIÆ.

Differentias quod attinet; præter has, ut suprà fuit insinuat, quod deliria febrilia, phrenitis & paraphrenitis, sint nunc graviora, nunc leviora, eadem porro, in phrenitide præprimis, sunt nunc ridicula, nunc sunt seria. Illa sunt, quando ægri varia absurda, incondita, & minus coherentia, cum quadam plus minus hilaritate, interdum & cum risu & aliquali facilitate, proferunt. Serium verò delirium est, quando ægri, quicquid faciunt, quasi aliquantisper irati cum impetu, quodam furore & morositate proferunt varia & incondita, idque non tam inscii, ut videri volunt, quàm quod quasi præmeditato & summo studio factò (*μετὰ σπουδῆς*) hoc faciant.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa duorum horum deliriorum, phrenitidis nempe & paraphrenitidis: primò quidem in febribus necesse est, ut delirium imminens præcognoscatur, ut possimus ejus ferociam præcavere.

Imminens autem delirium ferè patet ex quadam garrulitate insolita, & nimia loquendi promptitudine plus minus audaci, & cum ferocia; sicut & imminente delirio insignis mutatio morum adesse solet, ita ut, si is, qui aliàs fuit mitis & facilis in respondendo, fiat nonnihil ferox & temerarius, aut facile proclivis ad iram; & qui antea fuit compositis moribus, & quietus in lecto, jam fiat inquietus, item si is, qui aliàs est taciturnus, evadat loquax, si corpus indecorè moveat (quod signum mortis certum) si etiam corpus aut membra quædam denudet, si eorum, quæ legerit vel locutus fuerit, subito obliviscatur, si eundem sermonem sæpius citra rationem repetat; item, si vigilæ aut cephalalgæ pertinaces adsint, aut saltim somnus admodum interruptus & turbulentus præcesserit, jactitant membra variè, & mille inconcinnitates solent exercere actionibus & sermonibus.

Quod si verò jam dicta deliria adsint, ægri solent esse morosi, varia incondita loquuntur, sunt furiosi, ex lectis prosiliunt; accedunt his simul urina primò crassa, mox tenuis, imò diaphana, capitis tactus calidior, item oculi; qui enim, si fiant aliquantisper mobiliore,

Tom. II.

si fiant quasi rigentes, & aspectus sit nonnihil ferox, *er siehet einen so scharff an* / facile delirium non leve, sed furiosum infallibile cognoscitur.

Si in principio morbi acuti de dolore in bulbis oculorum seu ophthalmia conqueruntur ægri, funestissimum signum est; mox enim delirium & convulsiones adsunt, quod sæpius observavi.

Colores varii ante oculos apparentes, & objecta peregrino colore vestita, convulsiones, deliria, &c. innuunt. Visitavi aliquando ægrum maligna febre correptum, licet aliàs benè se haberet, dicebat: me indutum esse pallio & veste cœrulea; imò omnis niger color cœlureus illi videbatur: signum hoc aderat manè, à meridie subsequiebantur delirium & convulsiones, & tandem interibat.

Alvi dejectiones & urinæ interdum sine sensu effluunt.

Quod si verò porro in delirio febrili adsit inflammatio cerebri, vel potius membranarum ejus, aut verò tantummodò incallescencia nimia, & fervor ejus ac spirituum, adeoque vera modernorum phrenitis, hisce ferè modis distingui potest: quod nempe tunc, præter delirium summè ferox, immanis capitis dolor, præprimis circa occiput, adsit in phrenitide, in qua est inflammatio cerebri, unde hoc sæpius fricant, cum respiratione difficili, magna & tarda, quia non percipiunt ægri, cum febre continua & siti nullâ, ut ut hujus causæ adsint. Nam ex natura partis facile patet, quod dolor sit vehementissimus, cum dura mater cerebri simul sit affecta, quæ est sensibilissima.

Dum autem membrana cerebri, aut corticalis ejus substantia, inflammationem patiuntur, non potest non fieri ardoris sensus: unde est, quod veri phrenetici soleant avellere capillos, inscii tamen, propter immanem & acutissimum dolorem, quem percipiunt: Item manus perpetuò capiti admovent, & vario ac quasi furioso motu caput agitant hinc inde, propter quos acerbissimos dolores etiam adeò brevis est affectus, cum non possint superare spiritus cum immani adeo dolore. Accedunt præterea interdum convulsiones, idque, quando inflammatio cerebri incipit abire in gangrænam; nam omnis inflammationis finis est gangræna, ubi ferocia remittit, & qui antea ex lecto prosiliebant, subito fiunt mitres, taciturni, oculis clausis prostrati decumbunt, & lethargici evadunt ægri. Adhæc in vera phrenitide pulsatio adest vehementissima in & circa caput, de qua etiam ante delirium conqueruntur ægri, quæ, quanta sit? percipitur, si attentè conspiciatur collum; ibi enim arteriæ carotides quàm impetuosisimè pulsant propter sanguinem influentem, & ob in-

(Q q q q 2)

flam-



flammationem in cerebro: Unde etiam Hippocrates pulsationes seu arteriam pulsantem in temporibus prænuntium æstimat phrenitidis imminantis.

### PROGNOSIS.

Quod attinet prognosin: Phrenitidis omnis malum periculosum est & acutum, imò ut plurimum lethale, cum intra quatuor aut septem dies frequentius terminetur ad mortem, raròque ad salutem, nisi in ætate juvenili & temperamento sanguineo per sudorẽ aut hæmorrhagiam narium criticam solvatur. Magis tamen est periculosum, in qua simpliciter inflammata sunt membranæ vel ipsum cerebrum; nisi vires optimè constent, ut plurimum moriuntur ægri; minus periculosum, ubi saltem adest spirituum tantum fervor & sanguinis incallescencia, ut in paraphrenitide & delirio febrili, utpote quæ ex se & per se absque aliis pravis symptomatis & cum signis criticis parum in recessu habent, cum ordinarium febrium ardentium acutarum & malignarum graviorum symptoma sit.

De cætero, si interdum quædam intervalla habet, melior, quàm in continua, observatur: si autem post somnum delirium contingat aut exacerbetur, pessimum est, præprimis si non cum risu, sed cum ferocia, hoc fiat; jocosæ verò deliria minus funesta sunt, è quibus ægri faciliè evadunt.

Si vires mox sint languidæ in vera phrenitide, si difficilis respiratio, si facies cadaverosa, si oblivio rerum adsit, rigor, si floccos legant ægri, stillicidium narium, signum est lethale.

Quod si caput sudet particulariter sine alio corporis sudore, in specie, si sudor sit glutinosus & subfrigidus, semper lethale signum est.

Si accedant phrenitidi convulsiones, vel diurnæ vigiliæ, aut cephalalgia, à quibus jam vires attritæ, aponia, aut singultus, aut dentium stridor, (quod ex convulsione muscoli temporalis provenit) aut vox, lingua & manus tremulæ, aut urinæ minus tinctæ, aut fecum & urinæ inscia dejectio, hæc semper phrenitidem lethalem innuunt.

Si febre mitescente delirium non cesset, ut plurimum in lethargum, (qui etiam ut plurimum lethalis est) maniam aut melancholiam mutatur.

Phrenitis si mutetur in lethargum, aut affectum comatosum, rarò curatur, & ut plurimum lethalis est; extinctionem enim spirituum animalium ferè innuit: hinc notatu digna est observatio Zacuti Lusitani *lib. 1. Prax. Admir. observ. 15.* quamvis in illo subiecto somnus non adeò profundus extiterit.

Observandum autem quoad deliria febribus acutis supervenientia: eadem nunc esse symptomatica, speciatim curanda; alia verò

esse critica, in quibus naturæ saltem motum observet Medicus aut ut plurimum hæmorrhagia narium critica insequi soleat.

Signa ergo delirii critici, quod ut plurimum hæmorrhagia narium sequitur, sunt sequentia: Si coctionis signa appareant in urina, & pulsus sit inæqualis, nonnihil magnus & nonnihil validus; item si tranquillitas quædam in symptomatibus sit in ægro; si ex oculis splendores videantur elici; si delirium superveniat à subito nata cephalalgia; item si adsint circa aures murmura, aut strepitus vel sonitus; si nares pruriant; si facies rubeat, & adsit tensio mollis hypochondriorum, ætas sit juvenilis, & forsan aliàs æger consuetus sit sanguinem per nares excernere: Vid. Senertus in *Instit. ubi de sign. criseos.*

Reliqua verò, quæ apparent cum signis cruditatis, diurnis vigiliis & pulsu malo, sunt symptomatica.

### CURA.

In cura deliriorum, tam simplicium quàm phreneticorum, ante omnia

1. Sanguinis turgescencia febrilis compescenda, imprimis sanguinem evacuando, & ejus stagnationem, & inde natam cerebri membranarum inflammationem in phrenitide vera resolvendo ac maturè discutiendo.

2. Inde natus spirituum fervor, & impetuosus ac perversus motus, figentibus nonnihil, tam internis quàm externis, compescendus est & sistendus. Adeòque cum delirium saltem sit symptoma in his febribus, unde principali morbo curato, nempe febre, ipsum delirium evanescit sponte, & hujus ratione saltem anodyna interna, & hinc varia externa saltem conveniunt.

Aliàs eadem fere febrium cum deliriis conjunctarum, ipsarumque phrenitidum, curandi est ratio, quæ esse solet in aliis febribus acutis, in specie cum inflammatione conjunctis. Delirium autem si criticum fuerit, vix peculiarem indicationem habet.

Pro ritè instituenda cura observandum:

I. Ut sibi caveat Medicus, ne ad ebrium vocatus ejus ceu morbo delirioso correpti aut phrenetici curationem instituat, ut aliquando factum fuisse ab incautis Medicis observatum fuit: vid. Bartholetus, & Henricus ab Heer.

II. Quod cum phrenitide & deliriis, effusus sit spirituum motus, hinc somnus deficiat, & cephalalgia adsit, quæ delirium admodum exasperant, subinde blandis anodynis & hypnoticis plus minus narcoticis utendum erit, idque tam in medicamentis internis, quàm externis. Cautè autem usurpentur talia internè, in specie opiata: Nam si opiata non sistant spiritus, eorumque motum compescant, potius delirium gravius reddunt, cum ipsum opium



opium somnia turbulenta & truculenta inducat. Sin verò narcoticis nimis continuatis spiritus nimis figantur, metus est, ne, ægrum sopiendo, idem non possit amplius exuscitari, aut metus est, ne per opiata phrenitis in lethargum transmutetur. Cum enim spiritus in phrenitide sint admodum volatiles & subtiles, & simul propter motum continuum auctum pauci, ob id facile ex narcoticorum dosi aucta permutari in lethargum seu carum potest, quæ mutatio est periculosissima.

In eorum ergò usu observetur:

1. Quod pro usu febrili legitime præparanda sint, in morbis quidem hujusmodi ardentibus & acutis cum acidis, nempe aceto.
2. Ratione temporis adhibeantur opiata non nimis tardè, sed maturè, nempe in incremento morbi, dum æger pertinaciùs vigilat, & delirium imminet; meliùs enim est, tempore vigiliarum, quàm delirii, adhibere narcotica. Non adhibeantur statim in principio, neque statu morbi; quia in principio morbi turbant naturæ motum; in statu verò eorum usus frustraneus & magis adhuc nocivus est, dum somnum non inducunt, delirium ingravescit.
3. Nec viribus jamdum fractis, ne veterum similesque affectus comatosos excitent: vid. Riverius *Prax. libr. 1. cap. 11.* & Willisius *de Anima Brutor. libr. 2. cap. 10.* quamvis etiam septimo delirii die Zacutus Lusitanus Philonium Romanum cum successu se dedisse *libr. 1. Prax. Admir. observat. 16.* perhibeat.
4. Ut his opiatibus semper addantur appropriata, diaphoretica, & bezoardica, v. gr. antimonialia fixa, cinnabaris Antimonii, Antimonium diaphoreticum bezoardicum Joviale, cranium humanum, &c. non tantùm, quod in talibus febribus dolorosis, ipsaque phrenitide, sæpiùs subit malignitas, sed etiam, quia blandâ diaphoresi concitata effervescentia sanguinis febrilis insigniter placatur & mitigatur. Unde etiam per consequens talibus ipsa phrenitis non rarò tollitur.

III. Observandum, quod in delirio phrenitico ante omnia larga venæsectio sit instituenda, quò citius, eò melius, nisi tempus & conditio febris, v. g. malignitas juncta, illam inhibeat; cum econtrà, si febris symptomatrica, semper locum habeat. Si ergò fuerit febris ardens phrenetica absque insigniore malignitate, optimè convenit hæc ipsa; aut licet adsit malignitas, illa etiam in principio,

imò sine tanto periculo, commodè potest secari. Larga autem sit venæsectio, cum morbus sit peracutus, vid. Zacutus Lusitanus *libr. 1. de Medic. Princ. Histor. 10.* ut hoc medio acquiramus occasionem melius adhibendi remedium, ne in pejus malum cedat. In specie in inflammatoria plus minus constitutione membranarum cerebri larga sit venæsectio, autore Lindano, qui refert: suum parentem cum D. Tulpio viro cuidam phrenetico primâ die uncias triginta sex sanguinis emisisse, tertiâ die totidem, & quarto die uncias viginti quinque; sic enim, inquit, Medicus, si adest furor, Medicum se præstare debet.

Verum in ipsa venæ-sectione est notandum:

1. Quod si forsan præcesserit suppressa quædam sanguinis evacuatio, ut in puerperis, in partibus inferioribus, nempe in talo, & postmodum in brachio secanda sit vena; sicuti in genere in phrenitide, si repetenda fuerit, in quocunque casu primò vena poplitea pro revulsione, hinc in brachio pro aversione, imò tandem in fronte pro derivatione, commodè celebretur: quamvis si necessitas urgeat, & ubi in extremis commodè venam secare non licet, statim ad venæ frontis similiumque vicinarum aperturam transire liceat: vid. Zacutus Lusitanus *libr. 1. de Med. Princ. Histor. 10. observat. 12.* & *libr. 1. Prax. Admir. Observat. 13.* ac Riverius *loco alleg.* De arteriotomiarum temporum usu in phreneticis multum laudato vid. Panarollus *Pent. 1. Observat. 30.* Loco venæ frontis forsan cucurbitulæ scarificatæ locum habent, quâ syncipiti admota phrenitidem confirmatam curavit Zacutus Lusitanus *libr. 1. Prax. Admir. observat. 11.*

2. Quod tempore venæsectionis Medicus ponat manum super caput ægri, ut expulsu cognoscat, quando forsan sit sufficiens sanguinis evacuatio; item an æger sit animo defecturus? & magis vel minus ferat sanguinis evacuationem?

3. In ipsa sanguinis evacuatione subindè digito foramen obturandum est, denuò aperiendum ac denuò obturandum, bis vel ter repetendo; donec sufficiens sanguinis quantitas sit extravasata; sic enim cum meliori euphoria & minori ægri debilitate sanguis evacuetur.

IV. Observandum; In topicis seu externis, utut aliquantisper aceti addere quibusdam placeat; tamen non nimium ejus addendum,  
(Qqqqq 3)

dum, quoniam odoratu suo acri somnum impedit, & vigilias & agrypnias auget, cum somnus ad deliria sistenda optimus sit. Unde etiam nimis gravia odorata in externis sunt vitanda, ne talibus volatilibus augeatur phrenitis propter continuam spirituum incitationem, utut camphora videatur excipienda, quæ in deliriis quibusvis, præsertim febrilibus, tam interno quàm externo usu, singulare quid obtinet.

Medicamenta ergò, quæ conveniunt in cura deliriorum febrilium, ac ipsa adeò phrenitide, non sunt adeò prægnantia, quia deliratio est symptoma superveniens morbis: Unde patet, quod morbo primario curato, delirium sponte cesset, & quod saltem delirium, qua tale, opiata internè & externè, ut & refrigerantia, imminuat; ipse verò morbus primarius, nempe febris ardens, aut benigna aut maligna, aut inflammatio cerebri, methodo ordinaria curandus sit.

Externè epithematibus & frontalibus commodè etiam additur saccharum Saturni cum spiritu nitri factum, & medicamenta similia Saturnina mixtura ulterius simplex, tinctura bezoardica, uti etiam nitrum antimoniatum largiter in potu ordinario dissolutum, frequenti in usu esse solent. Hisce addatur tanquam singulare specificum herba & flores anagallidis flore phœniceo, usu interno & externo ad deliria febrium admodum commendata, de qua vid. Gabelchoverus *Centur.* 6. *Curat.* 13.

*℞. Herb. Anagall. c. flore M. ij.*  
*Coron. cap. papav. albi No. xx.*

Hæc contusa invicem coqu. in  $\text{℥xvj.}$  vini Malvatici & Rhenani ad casum  $\text{℥vj.}$  colaturam fortissima expressione trajice, & pro duabus vicibus hauriendam vid. Hildesheim in *Spicileg.* 2. *pag.* 190.

Exultimarem tamen, generosum hunc nimis esse potum: propterea aquam simplicem cum paucio vino Rhenano acuatam potius seligerem.

Post anagallidem etiam est lactuca, nymphaea, sedum majus; item semina quatuor frigida majora, & papaveris, & exinde paratæ emulsiones.

Sed juxta hæc primatum obtinent opiata legitimè applicata. Bartholetus non immerito commendat essentiam opii cum spiritu vitrioli volatili paratam. Veteres in usu habuerunt Philonium Romanum, syropos diacodion, requiem Nicolai, & similia; loco quorum nos hodie laudanis opiatibus utimur. Horstius aliquando curavit phrenitidem post vini generosioris abusum per potionem narcoticam ex uncis duabus syrupi papaveris, aliis additis, idque jam die sexto, uti refert *libr. 2. observat.* 12. Pariter atque Fontanus

in *Cur. & Respons. libr. 1. pagin. 20.* refert juvenem viginti duorum annorum ex gonorrhœa virulenta phrenitide correptum, qui post universalia remedia per drachmam unam Phylonii Romani fuit curatus. Præscribi ergo potest in phrenitide speciatim maligna sequens pulvis:

*℞. Cinnab. ℥ii ℥ss.*  
*Bezoard. Lunar. gr. xv.*  
*Laud. opiat.*  
*Camph. aa. gr. j. l. gr. iß.*  
*M. f. pulvis:*  
*dentur 2. doses: S.*

### Bezoardisch Haupt-Pulver.

Propinetur in decocto anagallidis rubræ, vel in qua anagallidis, aut in emulsione tenui seminis papaveris albi, parata cum aqua anagallidis, nymphaeæ, hyperici, & similibus.

Juxta hæc simul pro scopo alterativo & julebi aciduli, in specie spiritus nitri dulcis, propinentur, dum effervescentiam sanguinis compescunt; quibus pro alvo reseranda, si adsit obstructa, commodè tamarindi incoqui possunt, quia laxant blandè, & simul sanguinis effervescentiam plus minus compescunt. Revulsionis scopo etiam cæteris paribus satisfacerent clysteres, modò eosdem applicare commodè liceret.

Inter externa pro revulsionis scopo commendantur admodum cataplasmata plantis pedum admovenda ex ruta, chamomilla, verbenæ, radice bryoniæ, & sapone; vel cataplasma ex raphano, sale & fermento cum aceto acerrimo; item sedum majus contusum & instar cataplasmatibus cum aceto spinæ dorsii, plantis pedum & testibus applicatum.

Item commendantur pedum lotiones à Mercato, aut vesicatoria brachiis aut cruribus admota. Discutiendo operantur cataplasmata ex portulaca ac sempervivo recentibus & rosis, similibusque refrigerantibus, capiti naso fronti & temporibus largiter imposita; quibus etiam nonnulli addunt nymphaeam, chamomillam, & melilotum. Bartholetus *Tractat. de Dyspn.* in graviore delirio quasi phrenitico commendat carnem cucurbitæ contusam, & abrafo capiti impositam, quæ præter omnem spem desperatus phreneticus fuit curatus: Facit etiam huc observatio Borelli *Centur. 4. Observat.* 94. de rustico, qui alterum phreneticum per taleolas cucurbitæ capiti impositas curavit: Confirmant etiam hæc, quæ habet Gabelchoverus *centur. 3. Curat.* 23. in *schol.* quod scilicet, si excavetur cucurbita per medium dissecta, & in utramque cavitatem æger immittat pedem ad tempus, idque cum cucurbita recenti tribus vicibus repetatur, tollat insigniter & fervorem febrilem, & etiam ipsum delirium phreneticum.

neticum. Commodè etiam plantis pedum & syncipiti admoventi potest cataplasma & epithema ex sedo majori & aceto superius laudatum, quia fervorem cerebri, & spirituum morum, adeoque delirium blandè demulcet; sed detrahatur, quando æger incipit dormire: Epithema fronti admovendum conducit ex mastiche & myrrha cum tinctura fantali, vid. descriptionem in Riverio *loc. alleg. pagin. 117*. Deroctum radice mandragoræ & hyoscyami, cum similibus externè applicatum tepidè fronti, commendatur à Zacuto Lusitano. Egregius quoque est succus cancerorum fluviatilium vivorum recentè expressus, ad imitationem Rulandi sub epithematis forma largiter fronti applicatus: Sicuti idem Rulandus sequens epithema cum linteis duplicatis temporibus admovent:

℞. ▽ Rosar. ʒx.

Opii ʒj.

Croci ʒß.

Misc. pro epithemate.

Vel fiat epithema ad imitationem Hartmanni *Prax. cap. 8. §. 4.* ubi & alia externa opiata præscribuntur. Bartholetus commendat usum aquæ spermatis ranarum extrinsecus applicatum; potentius est, si misceatur cum succo cancerorum fluviatilium, addendo opium & camphoram, ut fiat epithema cephalicum compositum, ad imitationem Rulandi:

℞. Sperm. ranar. per transcolas. vel ▽ sperm. ranar. ʒviii.

Succ. Dr. fluvi. rec. expr. ʒij.

Opii aceto solut. ʒß. ad ʒij.

Camph.

Croci aa. gr. vi.

M. pro epithemate.

Tepidè vel subtrigidè syncipiti, fronti, ac temporibus admoveatur.

Veteribus in usu fuit, animalcula viva, v. g. anseres, anates, catellos, gallinas, columbas aut palumbes, per medium dissecta, & ita cruenta ac calida syncipiti aut toti capiti raso applicare: conf. Hartmannus *cit. loc. §. 7.* nihilominus tamen jam apud nos ferè in desuetudinem abiit. Lindanus interim dicit: hoc remedium esse inæstimabile ad curandam phrenitidem, qui curat phreniticos sanguinem mittendo primum, hinc propinando sub noctem opium præparatum, vel uncias duas syrupi papaveris: Tum adhibet columbam viventem, vel gallum viventem, vel catellum vivum; hæc animalia secatur per pectus, & statim cum omnibus interraneis ita applicat capiti, si fieri potest, raso. Et applicato ita animalculo imponuntur lintea, vel culcitra, ne subito cesset omnis calor, mirum, dicit, quantum juvent hæc animalcula. Remoto uno,

post hoc subito applicetur aliud, idque aliquoties repetatur, donec dolor cesset, & ipsum delirium imminuatur. Dicit, si per horam relinquatur, & postmodum removeatur, horrendum emergere fœtorem ex animali applicato, ut necesse sit, subito immergere in aquas propter fœtorem intensissimum. Animalia verò illa non statim in principio admoveantur, ubi affluxum potius augerent. Præter hæc & similia observanda sunt ea, quæ alias conveniunt in febribus ardentibus.

Fit interdum, ut phrenitici non percipientes urinæ stimulum, continuo eandem retineant non absque nocumento. In tali casu impositæ perinzo cepæ coctæ cum pinguedine anserina, urinam provocant; aut

℞. Fol. Parietar. M. ij.

Herb. Petrosel. c. rad. M. j.

f. decoctio cum ▽:

Pulpæ contusæ

adde

Ol. scorp. ʒij.

& ita f. cataplasma propube.

D. S.

**Harn-treibender Umschlag.**

Post fotum:

℞. Pingu. cunic. vel ungu. dialth. ʒj.

Ol. scorpion. ʒß.

M. S.

**Harn-treibend Sälblein.**

Illinatur, quod solum etiam sine cataplasmate adhibetur.

## MEMBRUM II.

De

### Deliriis Melancholicis.

**P**Ræter deliria febrilia etiam alia adhuc ab interno fomite proveniunt, quæ vulgò generali nomine deliria melancholica appellantur; eaque vel simpliciter talia & mitiora; vel in summo gradu maniaca seu graviora; & per se absque febre affligere solent, aut saltem in paroxysmo graviore aliquid febrile subesse videtur, dum pulsus celeriores & frequentiores habent, æstuationibus corporis vagis & capitis in specie incalescentia, vexantur, sitis tamen nulla adest, nec propriè febris dici potest, quanquam Forestus *Observat. libr. 10. observat. 7. in schol.* melancholicorum febricitantium exempla describat.

De his ante omnia observetur; aliud esse melancholicum affectum seu melancholicam, & aliud esse melancholicum: Rectè enim hæc duo distinguit Stephanus in *Oper. Med. Comment. de Morbis Virg. pagin. 41.* Nam affectus melancholicus seu melancholia est, quando homo fit nonnihil mœstus & morosus,



sus, cum omnium ferè rerum aliàs gratarum abominatione, quin subinde facillè irascatur, & quidem sine manifesta causa, si ipsi nihil arridet, si tristis & cogitabundus est, sine occasione externa; item quando interdum facillè terretur, quando citra manifestam causam angustias & anxietates quasdam circa præcordia percipit, & quasi rei gravissimæ perpetrata sibi conscius esset, & similes cogitationes oriuntur, dicunt: *Es sey ihnen Himmel und Erde zu enge/ das Herz sey ihnen so schwer/ und wissen nicht/ was es ist.* Postmodum verò, ubi talibus subjectis supervenit tandem phantasma, constituit delirium melancholicum, & dat delirantem ex melancholia. Scilicet aliud est ipse affectus, & aliud est ipsi adjunctum seu superveniens delirium. Videmus hoc in nobis ipsis, quando nempe hyberno tempore ex tempestate obscura nubilosa humida & ingrata reddimur melancholici, anxii & tristes sumus, sentimus gravamen quoddam non bene explicabile, facillè irascimur, est sanè hic affectus à causa externa, ex mutatione tempestatum oriundus, & quasi affectus melancholicus naturalis; ad cuius imitationem quidam à causa interna fiunt morbosè melancholici, quibus delirium melancholicum supervenit, pro varietate objectorum, phantasmatum ac symptomatum varium: Nempe aliud est amorosum seu eroticum, aliud ridiculum, aliud rabiosum, aliud melancholico - maniacum desperabundum, meticulosum, &c.

Melancholia hæc sine delirio simpliciter solet vocari apud Practicos perturbatio mentis, quæ satis sunt frequentes, ita ut adhuc recta ratio sine delirio constet: sic Platerus observat talem animi perturbationem in muliere, quæ subinde stimulabatur, ut interficeret infantem; erat tamen adhuc compos rectæ rationis, & resistebat istis cogitationibus.

Dicitur melancholia & delirium melancholicum, non quod semper cum mœrore & tristitia conjunctum sit, ut vulgò equidem volunt, & falsò, sed propterea dicitur melancholicum, quod oriri dicatur ab humore melancholico secundum veteres, i. e. vitioso acido fixo.

Verùm varia melancholicorum delirantium sunt exempla, admodum inter se diversa, omnia tamen quoad theoriam in certis quibusdam punctis fundamentalibus, in quibus radix consistit, conveniunt. Et

I. Quod in omnibus delirantibus & melancholicis talibus observetur cogitatio & meditatio intensa & assiduâ, defixa in uno saltem objecto; utut interdum aliquot objecta ordine sibi invicem succedant, à quibus unum delirium diversimodè variatur, circa

eadem tamen objecta occupata continuò videbitur.

II. Omnes tales ægri timidi, anxiosi non-nihil, & quasi in angustiis constituti videntur, adeoque quæcunque vident vel audiunt, sibi pejora & periculosiora persuadent: & licet interdum videantur esse ridentes, hilares & læti, v. g. quando quis putat, se esse divitem; nihilominus tamen non est reverà hilaritas, non verum gaudium, sed potius est apparens, & aliquid conjunctum cum risu Sardónico; estque hæc hilaritas tantum transitoria, & facillè succedit novus mœror & præcordiorum anxietas, sine causa iterum torvum vident, & parum aut nihil omnino dormiunt, imò licet etiam Principes & Monarchas magnos se concipiant, adeoque fastuosi potius videantur, anguntur nihilominus à cultu & veneratione ipsis denegata. Rectè itaque Aretæus *lib. I. de Caus. & Sign. Morb. diuturn. cap. 5.* describit melancholiam, quod sit animi angor in una cogitatione defixus atque inhærens, absque febre & furore, à phantasmate melancholico ortus.

III. Omnes somnum admodum paucum & turbulentum satis patiuntur, & cum infomniis gravioribus, ita ut experientia testetur, quosdam in malo inveterato plures non saltem noctes, sed septimanas & annos quoque, infomnes transegisse; aut si capiant somnum, turbulentus est, cum turbulentis infomniis, adeoque cum terrore evigilant.

IV. Deliria subinde remittunt, ita ut recta ratio restituta denuò videatur; subinde tamen vel pro diversitate causarum internarum, v. g. fluxus menstrui imminens, vel externarum, scilicet sub mutationibus tempestatum insignioribus, vel ex lunæ motibus, vel mutatione temporum anni, vel etiam, idque sæpius ex gravioribus animi pathematis, subinde recurrunt & recidunt.

V. Quoad Praxin; quod malum sit contumacissimum, & nulli ferè cedat arti, quin interdum citra adjumentum Medici, & quidem in ejusdem dedecus, sponte non rarò remittat, idque imprimis per insignem quandam in dicta mutationem, v. gr. aëris, victus, motus corporis, &c.

VI. Quod in iis non tam ad caput, quàm massam sanguineam, & imprimis ad viscera abdominis in hypochondriis sita, sit respiciendum, quoad curationis fundamentum. In hypochondriis enim semper nidus & fomes morbi melancholici est, supervenientibus tandem deliriis; unde à vomitoriis imprimis curatio & inchoanda & persequenda: Imò non dari puto delirium melancholicum absque melancholia hypochondriaca, quæ non habeat fomitem in hypochondriis. Sicut enim pica, quæ est delirium mulierum picantium, idcirco objectum aliquod fomitem in stomacho

cho habens ; ita etiam deliria melancholica habent ut plurimum interdum sedem in hypochondriis & primis viis.

VII. Agrypnia omni studio profliganda , cum, quò magis vigilant , eò pertinacius malum reddi solet, quò minus, eò facilius curabile fit.

IX. Observandum, quod in genere præmissis præmittendis omnia deliria stulta stultis quoque interdum curentur remediis, adeo ut ridiculo modo ridicula deliria fuerint curata, ut scilicet semel impressum phantasma per aliud contrarium quali deleatur & extingatur : vid. Thonerus *lib. 2. observat. 1.* Platerus *lib. 1. observat. pag. 40.* Bartholinus *Cent. 2. Histor. 26.* Sic enim v. g. refert Forestus *lib. 10. observ. 13.* de quodam melancholico deliro, putante se habere in abdomine serpentes, unde præmissis præmittendis excrementis alvi redditis serpentes addendos iussit, quos cum vidisset æger, restitutus est : Quidam putans, se habere in capite passerem, curatus fuit per Medicum, qui passerem vivos applicavit naribus, quorum morsu unculas perlentiscens æger, putans eos esse extractos per nares, ad sanam mentem rediit : Alius nasum sibi instar pedis bubuli constare putabat, qui curatus est intestino alicujus animalis appenso, quod Medicus abscindebat, & ita se nasum abscidisse dicebat, & curatus est, referente Foresto *lib. 10. observat. 13. in Schol.* Alius putavit, se gestare cornua, qui fuit curatus cornuum cervinorum alligatione, & postmodum per terram abscissione : Alius putavit se carere capite, quale exemplum habet Forestus *lib. 1. observat. 12.* unde ille fuit curatus per impositum pileum plumbeum, cujus gravitate fuit persuasus se habere caput : Aliud ridiculum delirium, parilemque ejus curationem videbitis in M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 49.*

### C A U S Æ.

Quoad causas & fiendi modum, unde & quomodo in melancholicis oriantur deliria? res à priori & adeo perspicuè determinari prius nequit, quàm quomodo iste sensus internus, quem imaginationem vocamus, fiat, declaretur ; nescimus enim, quomodo imaginatio peragi solet. Interim certum est, animam rationalem esse insontem, ac proin totum negotium erit in facultate animali situm, non in sensu communi, non in memoria : ergo in imaginatione seu phantasia, quæ consistit in unione variorum objectorum cum spiritibus animalibus per sensus externos perceptorum & spiritibus impressorum ; adeoque probabilissima eorum est opinio, quod certus motus spirituum animalium in cerebri medullis, nunc ab externo objecto, nunc ab anima rationali excitatus, eandem peragi asserunt, occasione cujus varii motus spirituum

animalium, à natura volatili temperata lucida deflectionem, anima rationalis varias concipit ideas. Motus autem hi spirituum animalium dependent nunc ab objectis, sensus externos afficientibus, nunc ab anima rationali diriguntur ; unde etiam perturbato ac læso spirituum animalium motu & perturbari imaginationem, & hinc deliro modo lædi ratiocinationem sequitur.

His præmissis, considerabimus adhuc aliquot exempla eorum, qui his deliriis melancholicis fuerunt correpti. Nonnulli, in specie pauperes, vel servili conditioni addicti, putant se esse monarchas totius mundi, quale exemplum habet Senertus *lib. 1. Prax. Part. 2. cap. 8. pag. 339.* item Thonerus *lib. 2. observat. 1.* Alii tactuosi multa magna sibi imaginantur : confer. M. A. N. C. *Ann. 3. obs. 84. pag. 284.* Sic mulier quædam se in speculo vidisse ore aperto frustum aliquod carnis supernè ad fauces dependere, quod suffocationem sibi minari valdè intenderet, sibi imaginabatur, vid. M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. observat. 41.* Alius pistor, panem intoxicando, vitæ suæ insidiari querebatur, *loc. alleg. observat. 46.* Quidam butyrum comedens se ex butyro totum constare arbitrabatur, indeque ignem accedere nolebat, ne liquesceret : sicut strenuus potator mingere nolebat, metuens, ne, quando mingeret, mundus diluvio interiret, qualia exempla refert Langius in *Comm. in Fabrum.* Quidam se ranam vivam in corpore gestare putabat, referente Foresto & Platero *lib. 1. observ. pag. 40.* Alius putavit se biblia in capite gestare : Exemplum hoc refert Forestus *lib. 1. observat. 13.* Sic puer lapide in caput ictus, & postmodum melancholicè delirus semper syllogismos optimos in lingua Germanica confecit, quos ipse postmodum componere nesciebat, postquam curatus fuit : Sic Lindanus in *Colleg. Practico* habet exemplum mulieris, indoctæ aliàs, quæ in delirio versus concinnos elaboravit : Rusticus quidam semper sub novilunio carmina conficiebat, sed post novilunium ne verbum quidem Latinè proferre poterat. Alius fuit melancholicus, qui putavit se semper frigere, seu se summo frigore esse affectum : hic fuit arte curatus postmodum, dum ipsi applicata fuit vestis ex pelle agnina spiritu vini seu aqua vitæ imbuta, qua accensa æger non amplius se frigere dixit, & ita curatus fuit, uti habet Zacutus Lusitanus *lib. 1. Prax. Admir. observ. 41.* Rulandus refert exemplum piscatoris, qui cantabat, ridebat, concionabatur, disputabat cum adstantibus, uno nomine se omnium doctissimum putabat. Rarum est exemplum, quod habet Henricus ab Heer *observat. 27.* de quodam melancholico, qui singulos menses in tres dividebat partes ; in



prima parte erat solus & meditabundus, in secunda venationi operam dabat, in tertia cantationibus musicis se delectabat, & mirè hilaris erat. Tulpus *lib. 1. observat. cap. 20.* refert; alium melancholicum putasse, se carere furis, qui fuit curatus postmodum percussione forti furarum. Bartholinus *Cent. 2. Hist. Anatom. 26.* refert melancholicum Medicum Venetum quotannis sub diebus canicularibus sub lecto sedentem, qui se testem esse putabat, finito verò tempore caniculari & mense isto sanus evasit, & per totum annum ita mansit, donec redirent altero anno dies caniculares. Refert Salmuth. *Cent. 1. observat. 63.* delirium melancholicum singulis septem annis recurrens periodicè, semper durans integrum annum in chirurgo, finito anno iterum cessavit, & post exactum septennium rediit. Mulier quædam se Regi cuidam esse desponsatam imaginabatur; unde vitra perforata quasi gemmas à sponso datas diligenter asservabat, ut refert Sennertus *de Melanchol. pag. 339.* Alia Venerem se esse aiebat, & ut eò facilius crederent, vestes omnes exuebat. Alius se granum milii esse cogitabat. Brendelius *in Consil. 24.* refert, concionatorem quendam sibi imaginatum fuisse, se audire vocem Dei & Angelorum. Quidam se anferem credebat, a notante Salmuth. *Cent. 3. obs. 92.* Alius juxta Tulpium *lib. 1. obs. 18.* cuncta ossa sibi mollia contigisse. Fœmina *loc. alleg. observ. 19.* se molam gerere, postmodum se fato functam, & in mundo sine corde remissam esse, somniabat. Ut taceam illorum, qui mortuos se concipiebant, qualium Marcus Marci *Philos. vet. restit. pagin. 396.* meminit. Lossius *lib. 1. observ. 21.* refert quendam cibum & potum eò detrectasse, quod ad gulam usque fecibus & urina se repletum esse crederet. Et quæ sunt similia varia melancholicorum phantasmata, quorum multa egregia exempla videbitis in Caspari à Reyes *Camp. Elys. Lucund. Quæst. Quæstione 73. pag. 966.*

Ex his modo allatis exemplis hoc perspicuum est, utut varia sint delirantium phantasmata in diversis subjectis, nihilominus tamen unum saltem sit, circa quod occupantur ordinariò, & quod ut plurimum pro determinatione phantasmatis habeant causas externas vel objectum quoddam, quod aut fortius placet aut displicet; unde ibi desiderium, hic fuga, adeoque affectus insignes excitet; aut quod sæpius recurrit, aut super quod certam reflexionem faciunt melancholici. Quod objectum per sensus externos spiritibus animalibus viciosè constitutis fortius impressum, eos subinde iisdem motibus in cerebro sæpè reiteratis cieri vel rotari facit, cujus continuati motus occasione anima rationalis idem phantasma seu eundem con-

ceptum vel ideam seu speciem intelligibilem & intentionalem continuò format & elicit.

Ulteriùs in his deliriis determinatis solet fieri, ut in ægris jam melancholicis, nondum tamen delirantibus, ab objecto quodam externo fortius affectis ejusque vel ratione complacentiæ vel displicentiæ, impressione fortioriantur affectus animi graviores, ratione quorum certum & determinatum delirium patiuntur melancholicum super unum objectum; ita enim evenit, ut spiritus animales fortius moti sibi novos quasi & aptos meatus exsculpant, & sic motibus agitati in alios tramites redire nesciant. Quod ipsum ita declarabo: scilicet idem in talibus contingit ac in iis, qui graviore quodam negotio aut intensiore cura pressi, aut qui graviore affectu, ira, terrore, mœrore, &c. perculsi, eidem sedulo & obstinatiùs incumbentes, tempore nocturno ob negotium, continuò mentem occupans, dormire nequeunt; aut licet dormiant, propter actionem tamen & tractationem diurnam spiritus animales motibus iisdem & tractibus, quos sæpius percurrerant, adsueta in cerebro, licet parcius in organa externa influant, eodem tamen modo in somno moventur, adeoque eadem objecta, circa quæ versata fuit de die mens, eidem repræsentant, & ita somniis variis somnum turbatum efficiunt, ubi sane id, quod hic fit in dormiente, parili ratione in delirantibus melancholicis, licet vigilantibus, evenit. Unde etiam est, ut subinde ex talibus curis & negotiis, cum summa intentione tractatis, interdum tales fiant delirantes melancholici; v.g. si studiosus impensius dat operam studiis Theologicis aut concionibus, atque studium hoc concionatorium sibi continuò inculcat, ut evadat egregius Theologus aut concionator, adeoque semper divina tractet, non tantum fit, ut alteretur successivè corporis habitus & sanguis, & in constitutionem melancholicam abeat, sed alteratione hac spiritus continuò occupati tandem cum reddunt delirum, ut putet se summum esse concionatorem, & cum Deo, Angelis aut Dæmone confabulari.

Imprimis verò notanda est differentia delirii melancholici, quando aliud est fixum aliud vagum: Hic in plerisque ferè actionibus aberrant à recta ratione, & vana atque deliralia loquuntur: Illic verò circa unum & determinatum versantur objectum, circa quod varia sibi phantasmata fingunt, aut concupiscendo, aut averfando. Vagum delirium fit, quando spiritus animales planè deficiunt ab ordinato suo motu, ac novos poros in cerebro quasi exsculpunt. Fit tamen sæpe, ut melancholia & delirium melancholicum, quod primò & in se vagum erat & indeterminatum, paulò post,



post, quando objectum aliquod excellentius aut gravius in sensus occurrit, & mentem potentius afficit, quod fortius moveat, & validiori impressione afficiat spiritus animales, qui unum eundemque motum continuo tenent, & exinde motuum suorum manifesta relinquunt vestigia intra fibras cerebri medullares, quæ continuo peraguntur ab iisdem, unde certò modo delirium determinatū redditur, & circa tale objectum quasi fixum, quando quasi delirans se esse monachum putat, & in hac ratione continuo occupatus est: V.g. sit melancholicus nondum quidem delirans, sed tantum solitudinarius, mœstus, meditabundus & morosus, hic transiens casu per locum, ubi vidit peponem putridum, facile incidet in cogitationem: quid dum tu ita debes putrescere, & si jam putresceres? unde perterritus, sicut tales semper sunt anxii & mœsti, adeò afficiuntur inde spiritus, per terrorem nempe, ut superveniat delirium melancholicum, quò putet se esse putridum, vel se etiam esse putridum peponem: nempe hac impressione facta, quasi vivus putresceret, fit ut moti spiritus animales continuo easdem orbitas repetant, adeoque obvenit delirium: Vel si talis melancholicus, qui audiens frangi vitra, statim ei potest venire in mentem: quid si tu etiam tali ratione frangaris? unde delirium determinatur, ut putet se esse vitru, & metuat, ne frangatur: Sic sit hypochondriacus ad melancholiam inclinans, qui percipit ructus, sonitum & murmurâ, & quasi coactiones in abdomine: his sonitibus perterritus melancholicus, & circa eosdem fixis cogitationibus inhærens, facile exinde potest incidere in istud delirium, ut putet, se habere ranas viventes in ventre; & ut ut aliâs benè ratiocinetur, tamen continuo meditetur de suis ranis, ratione quarum anxius est; unde dum ab objecto fortiori sibi incurrit metum, spiritus animales continuo moti delirium excitabunt: Sic ponamus juvenem amatorem, qui licet per se sit sanissimus, hic primo sibi admodum placet circa præsentiam amasæ, postmodum absens meditatatur subinde de ejusdem pulchritudine, cogitat, quomodo de novo possit acquirere ejusdem præsentiam; hinc meditatatur confabulationes, &c. porro cum semper mens & spiritus animales occupati eodem modo moventur, fit, ut subinde in somno postmodum species amasæ & actiones cum eadem occurrant: tandem ita determinantur spiritus, ut non nisi amasiam repræsentent, hinc tale sequitur delirium eroticum sive amatoriu, ut æger continuo putet, se habere præsentem amasiam, unde incipit cum eadem confabulari, adulari, &c. talesque facit ceremonias, quasi ipsa amasia esset præsens, ut ut neminem præsentem habeat. Hæc & similia tali modo se insequuntur. Multum

Tom. II.

hic faciunt pro determinandis deliriis terrores, tristitia, mœror, vel similes animi insigniores affectiones, idque in specie in iis, qui jam habitu melancholico præter naturam sunt præditi; qua ratione v.g. mulier perterrita ex viso suspenso gravissima melancholia correpta fuit, teste Platero *observat. lib. 1.* & Schenckio *observ. lib. 2.*

Nam observandum quoad causam remotam ad melancholiam, & hinc deliria melancholica disponentem, eam ferè esse duplicem: nempe quod vel à causa externa vel graviore animi affectu primò oriatur, vel à causa interna, constitutione nempe massæ sanguineæ successivè alterata, originem ducat, quibus constitutionibus melancholicis inde natis demum deliria superveniunt.

Deliria ergo quælibet, undecunque aut quocunque ab objecto oriuntur, quare non æque in omnibus oriuntur, seu v.g. quare non in omnibus ex animi affectibus gravioribus oriuntur deliria melancholica? Hic consideranda est certa subjecti conditio; nam certum est, quod unum magis promptum sit ad delirium, alterum minus, prout constitutio melancholica in uno plus, in altero minus fuerit confirmata. Causa ergo hujus promptitudinis ad deliria remota est in massa sanguinea: proxima vero hæret in spiritu animali. Nempe ex superioribus innotesceat, in deliriis melancholicis duo probè distinguenda esse.

1. Habitum seu constitutionem massæ sanguineæ & spirituum melancholicam plus minus naturalem vel præternaturalem seu morbosam.
2. Superadditum huic ipsum delirium melancholicum dictum idque vel vagum sive indeterminatum, circa quæcunque objecta oberrans, vel determinatum circa unum saltem objectum.

Deliriorum constitutioni melancholicæ supervenientium rationem hætenus consideravimus, constitutio ipsa melancholica jam pensitanda venit, quæ oritur nunc à causa externa, nunc ab interna: Externa est objectum quodvis, insigniorem animi affectum concitans; tunc enim v. gr. ex mœrore diuturno, tristitia protracta, terroribus frequentioribus, curis intentis, &c. afficiuntur spiritus animales; unde alteratur successivè ab iisdem tam sanguinis motus, quam digestio prima, sicque supervenit constitutio melancholica: causa interna est ipsa alteratio contentorum successiva, vitio dietæ, &c. nata, sanguinem & spiritus successivè afficiens, sicque ad constitutionem melancholicam perduens. Quæ duæ remotiores causæ semper probè distinguendæ & attendendæ sunt.

(Rrr rr 2)

Con-

Constitutionem ergò sanguinis & spirituum melancholicam quod attinet: notum est, quod, prout variat massæ sanguineæ crasis naturalis ex semine oriunda, ita etiam hominum mores subinde variare, & hoc est, quod jam olim suo idiotismo optimè dixit Galenus, quod mores animi sequantur temperamentum corporis. Nempe nonnullis affectus hic merè est naturalis, & totâ die experimur, quosdam naturâ esse lætos, quosdam iracundos, quosdam tristes & meditabundos, idque pro varietate sanguineæ craseos, & inde dependentis variæ spirituum animalium constitutionis, unde etiam morum ista & ingeniorum diversitas. Ob eandem etiam crasin hic affectus in posteros, ut alii morbi hæreditarii, transfertur, in specie in mulieres frequenter propagatur, ita ut eadem, licet antea sanæ videantur, tamen gravidæ factæ ad minimum deliriis melancholicis vexentur. In his verò qui dispositi sunt ad melancholiam ac deliria melancholica, illi ut plurimum sunt hypochondriaci, unde etiam malum hypochondriacum confirmatum sæpius delirium melancholicum post se trahit, quod melancholia hypochondriaca audit; aut, si non sunt apertè hypochondriaci, simile tamen vitium in stomacho ac primis viis ferè patiuntur, unde subinde acida eructant, egregium appetitum habent, alvò obstructâ plus minus laborant.

Sanè non arbitror, dari perfectam constitutionem melancholicam, quæ disposita sit ad deliria talia, quæ non fomitem aut radicem habeat in primis viis ac circa hypochondria, in specie ventriculo, ejusque digestionem & fermentationem plus minus læsa, sive occasione graviorum animi affectuum, & ita quasi ab extra orta fuerit, sive ex causis internis nunc per se inchoaverit, nunc alios morbos, subinde febres acutas, insecuta fuerit: Nam utur, quoad remotam causam, affectus melancholici à causa externa, pathemate scilicet quodâ graviore animi, amore, terrore, &c. nonnunquam oriuntur, in perfectum tamen delirium non degenerant, nisi hypochondriis eorumque visceribus character vitiosus imprimatur; ut etiam ea, quæ sunt ab animi pathemate, graviora sunt, quàm quæ sponte nascuntur. Et talis melancholia, quæ manifestò fomitem in primis viis latentem exhibet, per consensum hypochondriorum oriri dicitur: sicuti, ubi nulla manifesta talis consensus signa adsunt, per essentiam cerebri oriri putant, quæ tamen ceu non-ens rejicienda: sicuti, quæ insequitur post suppressas hæmorrhoides aut restrictos menses, melancholia ex utero vocari solet. Equidem nota mihi est differentia illorum, quam communiter Practici inculcant, dum melancholiam ratione fomitis dividunt per essentiam, dum fomes materialis in ipso

capite & cerebro hæret, & eam, quæ est per consensum: Sed hæc differentia nil valet. Nulla enim datur per essentiam capitis, quin revera omnis, si à causa interna, sub hoc sensu per consensum dicenda venit; unde etiam Hoffmannus in *Institut.* melancholiam cordis affectum, non cerebri, esse ostendit. Sed potius fundamentum melancholicum semper circa hypochondria consistit, utut remotior causa interna subinde aliunde oriatur, in quo puncto frequentissimè lien & uterus incusari solent.

Communiter melancholiam ex splene oriri volunt, & omnes spleneticos obnoxios esse dicunt melancholiz: Sed non video, quare splen affectus præcisè melancholias inferre soleat, nisi ad humorem melancholicum, cujus receptaculum veteres lienem dixerunt, respicere velimus: unde splenis viscus, si non semper, ut plurimum saltem in his casibus insons arbitror, etsi in insigniter melancholicis simul varia splenis pathemata, splen scilicet infarctus & tumidus reperiatur, unde fortes in hypochondrio sinistro pulsationes succedunt, ob sanguinis in arteriis stagnationem. Exinde patet, quod verum dicit Hippocrates, dum affirmat: quibus vena fortiter in hypochondriis (arteriam intelligit) pulsaverit, iis mens ægrotat: siquidem tumidus aut infarctus splen aut vasa ejus propter fibrarum nervearum implicationes harumque spasmos plus minus contracta reverà sanguinis motum per arterias remorant, & inde pulsationis manifestum sensum in hypochondrio sinistro inferre possunt. Verum est, subinde in hypochondrio sinistro graves alterationes & passionibus ab ægris melancholicis percipiuntur; sed cum hypochondriaci spasmis partiū membranarum sint obnoxii, & cum splen habeat copiosos nervos, ob varios nexus cum pari vago & intercostali consentientes, quid mirum est, ex iis spasmis continuato affectis, quod superveniant pulsationes hypochondrii & cordis, & hinc abdominis pathemata & difficiles respirationes seu convulsiva symptomata? ut adeò, si splen simul affectum deprehendatur, id fiat saltem per deuteropathiam. Quod si digestionem primæ vitiatur viscerum aliorum pathemata superveniant, speciatim hypochondriacis lienis mala, ab his primariis affectus eò magis nunc confirmatur, nunc deterioratur. In his ergò subjectis melancholicis seu melancholia hypochondriaca imprimis acidum vitiosum in primis viis abundare, indeque digestionem primam in stomacho vitare, quin etiam ipsam massam sanguineam exinde firmiorem seu spissiore, minusque fermentativam ac minus spiritua scibilem esse, multa adjuncta symptomata persuadent, non minus quàm cura etiam. Quoad symptomata: omnes melancholici sunt egregiè voraces, & alvi naturaliter ut plurimum adstri-



adstrictioris, simulque observantur ructus acidi, quæ pathemata omnia acidi peccantis in primis viis signa sunt; quoad curam verò, ea fundamentalis consistit in eo, ut per acidum vitiosum absorbentia & destruentia, Martialia quippe & tartarea, instituantur.

In taliter constituta massa sanguinea non tantum fermentatio ejus vitalis in præcordiis lentè nec rectè procedit, unde anxietates istæ, imò non rarò graves cordis palpitationes sine causa manifesta superveniunt; sed etiam ex deficiente fermentatione spirituscentia massæ sanguineæ, ejusque in spiritus subtilis volatilifatio, minus convenienter perficitur, idque eò magis, si in aëre crasso aut cœnoso aut paludoso habitet talis æger: nam aër multa tribuit ad volatilisationem spirituum, hinc etiam ex sola aëris mutatione in clarum, tenuem & subtilem, accedente corporis motu, melancholia curata observata fuit. Ex massa ergò sanguinea minus spirituscente spiritus vitales, & consequenter quoque animales, minus volatiles minusque subtiles, minus puri aut minus mobiles generantur, sed quodammodò texturæ fixioris, & quasi subacidæ & crassioris, adeoque, ut probabiliter multi affirmant, minus lucidæ, sed tenebrosæ: vid. Bartholinus *de Luce animal.* unde iidem animales facti minus apti sunt ad varias motiones & expansiones pro multitudine objectorum sensilium variâ, in cerebro perficiendas, sed potius quasi fixiores, & à naturali crassi volatili temperata plus minus in acriorem, asperiores & quasi acidulam degenerantes, ab uno objecto suprâ dictis modis fortius affecti, non possunt non iidem quoad motum suum in cerebri medullis vitari, hinc vel inordinatè & vagè movebuntur, vel pertinaciter iisdem motionum orbitis insistent. Si prius contingat, oriuntur deliria melancholica vaga, circa quæcunque objecta directæ: sin ab objecto externo quodam fortius affecti, unam eandemque in cerebro motionis orbitam servant, i. e. in semel inchoato tramite inter fibras nerveas cerebri eodem cursu & recursum continuo pergunt, unde subministratur occasio animæ rationali immutabile & unum tantum phantasma formandi & subinde repetendi. Nam anima non afficitur rationalis, sed læditur in talibus saltem imaginatio seu phantasia, circa objectorum sensilium per certos spirituum motus in cerebri medullis representationem occupata. Dum ergò hæc læditur, ita ut continuo circa unum objectum versetur, ex identitate motus vitiosorum spirituum circa idem objectum delirium postmodum supervenit. Sed ex eo, quod anima rationalis sit sana, evenit, ut hujusmodi melancholici, determinata deliria patientes, circa illud objectum, circa quod delirant, subinde in re-

liquis satis prudentes sint: Sic enim legimus in Amato Lusitano exemplum pueri, qui se putabat esse regem ingentem, sub quo delirio loquebatur de ratione status & arcanis politicis, & tam subtilia & acuta republicam gubernandi promebat consilia, ut omnes in sui admirationem raperet: postmodum curato delirio, puer de talibus politicis parum vel nihil sciebat. Satis ergò prudentes sunt melancholici circa objectum delirii: Id quod non minus est mirum, quàm quod observationes Practicorum docent, somnambulones noctu surrexisse, & versus admodum concinnos scripsisse, manè tamen eorum, quæ noctu egerint, nihil scivisse. Nam circa idem objectum semper occupata est anima rationalis, quia tota ejus essentia, prout equidem à nobis cognoscibilis est, consistit in eo, quod sit substantia immaterialis, quæ semper ratiocinatur, & aliquid cogitat. Hinc anima rationalis indefessè semper ratiocinando circa idem objectum subinde occupata, necessario de eodem elegantes & rationales formabit discursus, quoniam à nullo alio objecto interturbatur & impeditur, & utut in uno erret, tamen in reliquis suas potentias exercere potest.

Cum verò à rebus non-naturalibus factæ mutationes in alteranda massa sanguinea & afficiendis spiritibus animalibus magnæ sint potentiz, ut quotidie in brutis videmus, non mirum est pro varietate v. gr. tempestatum, secundum mensium decursum, etiam mutari melancholicos, ita ut nunc melius nunc pejus habeant; unde temporibus successivè correctis, corriguntur etiam constitutiones: ac hinc est, quod sub isto delirio per mutatum victum, per continuas vigilias, & subinde alias res non-naturales, mutetur insigniter massæ sanguineæ crasis, & consequenter spiritus animales (videmus enim, quod tales melancholici fiant subinde admodum pingues) hinc fit subinde, ut interdum sponte nonnihil cessent deliria, quæ tamen nova alteratione, per graviora objecta inducta, denuò recurrant; quin & ex tali mutatione craseos massæ sanguineæ & spirituum fit nonnunquam, ut delirantes melancholici ex uno objecto in aliud successivè dilabantur, parili ratione, atque videmus quosdam sub ebrietate ex vini potu fieri primò hilares, hinc admodum loquaces, tandem rixosos, & quasi maniacos & furiosos, denique somnolentos & torpidos, qui altero verò die subinde sunt mæsti, tristes, plus minus turbulentissimi, & quasi melancholici. Unde, sicut hoc facit vinum mutando crasin massæ sanguineæ & spirituum, cum sit causa externa, ita simili ratione successivè à causis internis facta alteratio deliria subinde & melancholias mutat.

(Rrrrr 3)

Ratione



Ratione fundamenti hujus melancholiæ, in massa sanguinea & spiritibus inveteratus semel affectus melancholicus non saltem contumax est, & per paroxysmos sæpius recurrit, sed etiam subinde hæreditarius, ita ut à parentibus melancholicis sæpè in liberos transplantetur, & hi tandem ad melancholiam deducantur, in specie in mulieribus (quamvis hæc à matribus melancholicis editæ semper alias videantur sanæ mentis) præsertim gravidationis vel puerperii tempore character hæreditarius evigilare solet.

Quod verò tales stulti stultis & ridiculis interdum curentur remediis, & quod talia ridicula remedia curent subinde ridiculos ægros, ex eo ferè est, quod anima rationalis, circa unum tantummodò objectum occupata, ex firma tali persuasione ab objecto novo, & dum objectum morbosum remotum videt æger, & exinde lætitiâ vel alio affectu alteratur, spiritibus animalibus novum conciliet motum; vel si ex superveniente contrario aut fortiori objecto etiam alio modo moveantur spiritus, fit, ut tale fortius objectum, & quidem aliud ac novum, ex immutato spirituum motu animæ rationali præbeat occasionem variandi conceptus & speculationem, & ita omnes priores ridiculi conceptus à supervenientibus novis quasi omnino in momento cum manu delentur & expunguntur: quâ ratione v. gr. immersio subitanea in fluvium curat delirium manicum, hac ratione stratagemata per assensum, delendo quasi conceptus deliros, & removendo objecta, quasi talia deliria auferunt; quæ etiam cura eo magis vel minus erit diuturna vel constans, quò magis vel minus restituta simul fuerit massæ sanguineæ depravata crasis: sic melancholia observata est, quæ curata fuit per gaudium nimium & profusum, ex improvise concitatum, quoniam fortius objectum delevit prius.

Plura quoad hanc theoriam videb. in Wilisio de Anima Brutor. Part. 2. cap. 11.

### DIAGNOSIS.

Necessum est autem imprimis, ut nimius progressus melancholiæ maturè præcaveatur, in quem finem imminens ea præcognoscenda venit.

Signa autem, quendam esse habitus melancholici, vel naturalis, vel præternaturalis, tunc colliguntur, quando talis æger gravioribus subinde insomniis terretur, quando somnum habet turbulentum & insomniis intermixtum, quando evadit solitudinarius, quando præter solitum fit morosus vel tristior, etiam invitatus, quando funesta cogitat & tristitia, quando meticulosus est sine manifesta causa, quando vel levissimo objecto

subinde terretur, item si in una cõgitatione subinde fixior hæret, si meditabundus & cogitabundus fuerit, *sichet immer vor sich hinweg* &c.

Quod si æger postmodum incipiat fabulari ridiculè de uno alterovè objecto, quando putat se esse sapientissimum, & sic porro, tunc delirans melancholicè seu delirium melancholicum faciliè manifestum evadit.

Verùm ipsa melancholia eiusque delirium per se patet faciliè: Speciatim fomes & causæ remotæ melancholiæ diligenter sunt considerandæ pro felici instituenda cura; adeoque cognoscendum est: an causa occasionalis externa seu animi affectus quidam gravior, terror, ira, timor, primam dederit occasionem melancholiæ, ratione cujus inferunt spiritus animales delirium? an verò ex interno vitio & depravatione ipsius massæ sanguineæ melancholica seu hypochondriaca affectione successivè primam originem duxerit melancholia sine causa externa signa hæc observanda esse inculcat Lindanus, dum dicit: Quando inciditis in melancholicos, hoc agite, ut noscatis originem mali, an v. gr. sit ex tristitia? nisi enim hoc agitis, laterem lavatis. Multæ enim res sunt, quæ homines tristiores, & sic longo tempore perseverantes, in melancholiam deducere possunt: Vid. Hippocrates *libr. 6. aphorism. 26*. Et hæc est ratio, quare tam rarò restituantur in integrum melancholici. Didici ex pulsu cognoscere, an sit melancholia ex animi affectibus? an sit ex sanguine melancholico? Nam si est ab animi gravioribus affectibus, pulsus in illis est valde obscurus, quasi contractus & inconstans, quandoque æqualior, sæpius verò inæqualis, & deinde qui habet plerumque speciem deficientis. Vermicularis est interdum, interdum non. Frequenter enim hæc inæqualitas & inconstantia pulsus certum signum est melancholiæ ex animi affectibus: quoties enim animus parum relaxatur, statim etiam mutatur pulsus, unde faciliè animi affectus exinde patefcunt. Hæcenus Lindanus.

Hoc observavi nupera æstate in muliere 75. annorum, aliàs devota, dicente, se rem Veneream per viginti annos cum dæmone habuisse: hoc confirmabat, dum falsa esset, aurigæ equum se fascinasse, & parere infantes dæmonicos per vulvam, adeo ut ferè ad rogam damnaretur. Advocatus tunc Medicus inquebat rem veram esse. At aliter se res habuit: nam interrogata à me, ubi toleret? monstrabat superiorem regionem hypochondriorum, pulsusque octavâ vel nonâ vice deficiebat, ac uno nomine, perfecta erat melancholico hypochondriaca; alvus enim adeo obstrueta, scybala erant dura, sibi invicem im-

imposita conglobataque, eademque sub primo somno patiebatur incubum cum insultibus epilepticis, unde custodes excubantes baculo tetigerant alvum ejusque abdomen, putantes quasi, sic se posse dæmonem superincumbentem fugare, aliquot septimanas insomnes ducebat. Huic autem delirio melancholico ansam dedit, quod audivisset de fascinatione, adeoque cogitasset, quid si tu hoc fecisses.

Facies quoque in melancholicis nunc rubore nunc pallore suffunditur, angustis ejusmodi homines variè corripuntur, prout objecti simulachra variant; sicuti testantur historiae melancholice ex amore detectæ, quas Galenus *libr. de Præcogn. ad Posthum. cap. 6.* Aretæus *libr. 1. de Caus. & sign. diuturnor. morbor. cap. 5.* & Zacutus Lusitanus *libr. 1. de Med. Princip. Histor. 40.* adducunt.

Si causa remota sint suppressiones hæmorrhoidum vel mensium, ex ægro cognoscitur.

Quod si verò pedetentim & citra objectum externum fiat melancholia, tunc tales ægri habent deliria vaga, quorum causa remota est affectus hypochondriacus. Hujus affectus signa propria erunt præsentiora, vel majora vel minora: In specie ægri tales conqueruntur de palpitatione cordis, de anxietate cordis & ructibus acidis; item conqueruntur de pathematis abdominis, de borborygmis & murmuribus intestinorum, de alvo obstructa, flatibus, de sensu molesto plus minus obscuro in hypochondrio sinistro cum sensu pulsationis in dorso aut dicto hypochondrio, mala quæ ex splene videntur oriri, somniaque habent turbulenta (ex quibus mox suspicio venit, adesse melancholiam hypochondriacam) phlogosi vaga crebrius afficiuntur, & circa frontem in facie calent, &c.

Ipse affectus melancholicus, specialius ex vitata tantum massa sanguinea, suas habet exacerbationes & remissiones, item ægri admodum sunt anxiosi & queruli, palpitatione cordis subinde est frequens, item præ aliis sunt tristes & mœrentes, & quæ sunt similia signa affectæ massæ sanguineæ.

Metus tamen & tristitia præ cæteris etiam sunt pensanda in melancholicis; quidam enim interdum singulares, pusillanimes, & plus minus desperati sunt. Non quidem raram, inquit Petrus in *Dissertat. Harmon.* est, quod gaudere & ridere videantur: minime tamen gaudium est verum & verus risus, sed quasi cynicus, & sarcasticus, quin paulò post mœsti & tristes evadunt, unde etiam solitudines amant, & conversationes hominum pertimescunt.

## PROGNOSIS.

Quoad prognosin melancholia ut talis, licet nunquam lethalis existat affectus, ratione tamen eventus, temporis & modi, valdè incerta est ejus prognosis, quatenus ex illa nonnulli brevi reconvalescunt, alii non nisi tardiùs, alii nunquam.

Ut plurimum tamen melancholia, quæ ab occasione evidente & ab affectu animi est, longè felicius curatur, quàm quæ post diuturnam demum procatarxin seu prædispositionem melancholicam intrinsecam sensim invadit. vid. Lossius *libr. 1. Observat. 22.* Ita enim sublatâ dictâ causâ evidente sæpe spontè cessat delirium; hinc plures ex crumena quàm ex pharmacopolio levamen suspiciunt, cum in posteriori casu, quo sanguis & spiritus ab ordinaria & debita crasi recesserunt, imò ipsa cerebri tandem conformatio temporis successu incorrigibiliter mutatur, res difficilior sit.

Pariter malum recens & quod nondum diu duravit, & cui nondum supervenit delirium, semper facilius curatur, subinde etiam à sola ferè conveniente victus ratione, & familiari conversatione cum jocosis, & mutatione aëris, sic laudibilis, tenuis & spirituosus generatur sanguis: Inveterata verò melancholia, & orta ab animi pathemate externo, aut studiis immodicis in noctem protractis, in specie cui pertinax delirium accessit, aut quæ hæreditaria est, aut quæ subinde repetit, rarò aut difficillimè curatur, quin ægros ut plurimum ad mortem comitetur.

Delirium ascititium facilius cedit præ hæreditario.

Melancholia quæ post morbos alios, ut post febres diuturnas aut acutas, aut post phrenitidem supervenit, facilius aliis, mutato scilicet corporis habitu, & sæpe per solam diætam curatur.

Porro in viris familiarior & frequentior ferè est melancholia, sed minus difficilis curatu: in sceminis quidem rarior, sed diuturnior & pertinacior, speciatim si mensium jam deficiat excretio aut gravidæ existant, tum etiam harum nonnullæ, quæ è parentibus melancholicis natæ, etsi aliàs semper sanæ mentis observentur, prægnantes tamen hujus quasdam hallucinationes ostendunt.

Præterea melancholia, quæ est cum visu, joco, seu gaudio, & hilaritate quadam intermixta, mitior, tutior, & ceteris paribus tractabilior est, quàm quæ est cum studio aut cum quodam furore aut tristitia continua ac cum summo mœrore.

Melancholia, quæ à charactere seminali per parentes in liberos fuit transplantata, rarò potest curari.

Si

Si melancholicus præter solitum in ritum, aut fletum, aut lachrymas solvatur, metuedum est, ne in morosin, imò maniam transcat, nonnunquam in paralyfin, & quamvis rariùs, in morbos convulsivos, item in apoplexiam.

Ad salutem monstratur via, si successivè mitiora deliria fiant, si superveniat hæmorrhoidum, aut etiam uteri fluxus, si superveniant varices, quos ipsos commendat Hippocrates *Secl. 6. Aphor. 11. & 21.* & Riverius *Prax. libr. 1. cap. 13.* Item si in scabiem & similia cutanea vitia fiat transmutatio; item si urina hæctenus tenuis, cretæ, turbida, opaca & nigra evadat. His enim modis interdum ferè aut remittit aut planè cessat melancholia.

Ad interitum verò declinant ægri, si omnem cibum & potum pertinaciter aversentur, quin etiam quando nihil dormiunt, aut tandem vires successivè fatiscunt; nam observatum fuit, melancholicos interdum ad aliquot menses ne momentum quidem dormivisse, & ita tandem collapsis viribus intereunt.

Denique rariùs fit, quod deliriis melancholicis superveniant convulsiones aut epilepsie, quæ cerebrum afficiunt.

#### C U R A.

Quod attinet methodum medendi ad curandam melancholiam & deliria melancholica, est hæc vel præservatoria, & quæ causam antecedentem respicit, vel curatoria, scilicet ipsius delirii huiusque causæ proximæ. Ad duo igitur, ut jam supra monitum, respiciendum est:

1. ad constitutionem massæ sanguineæ & spirituum melancholicam.
2. ad superinductum delirium.

Unde ratione prioris curandi tales ægri, ut malo hypochondriaco affecti, hinc vomitoria & Martialia sunt proficua. Tota cura consistit in rectificatione massæ sanguineæ, in correctione ejusdem vitiorum, & regeneratione massæ sanguineæ spirituosa & volatili: sed hoc etiam non caret difficultate, partim quod malum per se sit contumax, partim etiam quod melancholici statim omnium remedium sint pertæsi, & aliàs etiam per se satis immorigeri.

Ratione posterioris humores educantur & alterentur, atque spiritibus animalibus aliqualis tranquillitas concilianda, illique à perverso & inordinato motu sunt avocandi, & in circulos pristinos redigendi: idque vel medicamentis vel rationibus, h. e. auxiliis vel Medicis vel Ethicis: Medicis, h. e. medicamentis anodynis, tam mineralibus, quàm opiatibus & camphoratis: Ethicis, vel eorum conceptibus assentiendo per stratagemata & fraudes; vid. Forestus *libr. 10. observat. 13.* & Tulpus

*libr. 1. observat. 18. & 19.* vel dissentiendo & corrigendo per perturbationes rationales, variis confabulationibus, recreationibus, negotiorum commissionibus.

Propterea promeliori cura observetur:

I. Ut causa remota removeatur; quæ si sit affectus animi gravior, removenda est non tam per Medicum quàm per Ethicum seu Moralistam, nempe per rationes; sin verò causæ sint internæ, menses suppressi, malum hypochondriacum, &c. tunc hæc primitus curandæ. In genere habito causæ remotæ respectu per omnia ea remedia, quæ in affectu hypochondriaco usurpantur, tractandæ sunt melancholiz & omnes ejusdem species, tam per digestiva quàm laxativa: quibus addenda postmodum appropriata confortantia dicta, quæ spiritus animales volatiliores, subtiliores & agiliores reddere, & fermentationem sanguinis naturalem restituere, ejusque crasin attemperare valent. Inter priora ista ad massam sanguineam corrigendam & spirituascentiam instituendam primum obtinent tartarea & Martialia, vel laxativa, vomitoria, &c. Inter posteriora verò confortantia sunt imprimis vinum, crocus, melissa, ambrata, & omnia cephalica spirituosa.

II. Observandum rectè monent Autores, omnia in cassum circa melancholicorum & maniacorum curam tentari, nisi quàm studiosissimè emeticorum usus observetur. Nam in vomitoriis revera consistit radix curæ omnis melancholiz, deliriorum & maniz, quæ in majori malo, & pro ratione circumstantiarum, etiam subinde repetenda, & non una vice ipsis insistendum.

III. Caveat sibi diligenter Medicus, ne solus melancholicos aut maniacos adeat, aut iisdem propius accedat. Nam hi ipsi admodum intenti sunt Medicis, & simulantes licet pacem, eos subinde malè tractant, verberibusque onerant, in specie maniacy. Exempla talia videb. in Hildano *Centur. 4. observ. 9.* & Foresto *lib. 10. observat. 22. in schol.* Quin etiam, curati licet, ferè odio suum habent Medicum, ut rectè observatum fuit à Borrichio in Bartholini *Act. Hafniens. Vol. 4. pagin. 148.*

IV. Observandum, quod in malo pertinaciori, & ubi ægri tales delirantes firmiter conceptæ hypothese insistant, præmissis jam præmittendis nil melius sit, quàm cauto quodam stratagemate eos decipiamus, & à semel concepta opinione etiam ridiculis remediis nonnunquam deducamus: Vid. Forestus *loc. cit. observat. 13.*

V. Observ. Alvus contumacior semper & quotidie mollis & lubrica servanda. Nihil enim est, quod magis hypochondriacos intellat,



infestat, quàm alvus obstrueta; Quò magis enim obstructio affligit alvina, cò magis iidem sunt morosi & insomnes, omniaque exasperantur symptomata. Unde alvus quotidie respondere debet, aut arte aut natura, cui scopo omnium optimè satisfaciunt passulæ & passulata, quæ pro scopo tam alterandi contenta quàm emolliendi sunt optima; hinc tartarea item gummata: NB. Clysmatum quoque humectantium, item ex & cum lacte paratorum usus hic admodum est proficiuus.

VI. Cum melancholici, qui semel delirantes fuerunt, subinde recidunt circa anni cardines, solstitia & æquinoctia, ob id opportunè & tempestivè vere & autumnò nonnunquam cura prophylactica per laxativa & alterantia appropriata spiritiuosa instituenda.

VII. Quidam venæ-sectionem adhibent, sed nescio, ob quam causam. Utut enim venæ sectio in mania conveniat, non tamen video, quomodo melancholiæ conferat, cum melancholici debeant curari per alimenta eupepta. Quàm injuriosum ergò est, si sanguinem eorum exauriamus, quin potius alteretur sanguis ope medicamentorum infra dicendorum, non verò protervè evacuetur. Platerus quidem reiteratam venæ sectionem commendat, cujus rei hanc rationem reddit Willisius, quod nimirum sanguine effæcto toties educto novus facilius generetur; sed errant, cum nihil sanguinem generet, nisi ipse sanguis; & observatur, quosdam ex melancholia per venæ sectionem, intempestivè & crebrò nimis administratam, in morosin & stupiditatem conjici. Habenda siquidem ratio est causarum antecedentium & virium, quorum intuitu in plethoricis, ac non adeò torpidis, venæ sectio locum habet, sicuti etiam, quando vel suppressio evacuationis consuetæ præcesserit, vel nimix phlogoses, aut æstuationes subinde observentur, vel caput circa frontem intensius subinde incalescat, metu majoris periculi, aut ne in maniam degeneret, vena brachii aperienda, item frontis in declinatione, aut saphæna in feminis, incidenda. Quò etiam spectant varicum, & hæmorrhoidum per hirudines in naribus apertura. Imò melancholia aliis irritis per hirudines temporibus admotas curata refertur à Fontano in *Consil. & Respons.* pag. 112. Evacuationibus quoque accentienda est trepanatio, & fonticulorum suprà futuram coronalem inustio profundior, à Rondeletio *Prax. lib. 1. cap. 41. & 43.* commendatæ, ideò quod nonnulli fractio fortuito cranio curati fuerint; Huic adstipulatur Rhodius *Cent. 1. Observ. 43.* per experientiam Casserii. Nuperrime mulieri melancholicæ crebrioribus æstuationibus corporis vagis afflictæ, &

Tom. II.

præsertim intenso frontis æstu subinde correptæ, vesicatoria utrique brachio admove-re jussi, ut doloris ratione impetum spirituum & humorum à capite averterem, ne mania supervenire queat.

VIII. Observandum, quod præter Vomitoria in principio mali purgantia per inferiora conducant. In principio dico: Purgantia enim propriè dicta in morbi cursu minus commoda sunt, parum aut nihil operantur, potius nocent. In principio ergò melancholicos semel & iterum purgare licebit, monente Lindano; in progressu verò morbi plus nocebitis, quam proficietis per purgantia: quin potius loco illorum malum optimè per urinas, & hinc per leves & repetitos sudores tollitur, uti disserit Lindanus. Nam (1.) melancholici ordinariò plus mingunt quam alii; & quoniam (2.) rarò sudant ob habitum corporis densiorem, & constipationem pororum cutis, materia urinæ subinde augeri solet.

IX. Diuretica sunt optima. Et in genere hic monendum, quod omnes ii affectus, qui dicuntur splenetici, aut qui dicuntur oriri ab humore melancholico præmissis præmittendis, h. e. purgantibus, præsertim vomitoriis, & hinc alterantibus Martialibus, optimè per diuretica & salsa curantur. Et observatum fuit, quod in talibus urina turbida & crassa, opaca, interdum etiam nigra reddita, & copiosis contentis saturata, signum sit declinantis in talibus morbi & imminentis sanitatis: adeoque hic diuretica, & tanquam alterantia & tanquam evacuantia, optimè hic conducunt, v. gr. arcanum duplicatum Mynsichti, nictum antimoniatum in potu solutum, & hinc remedia tartarea, in specie tinctura tartari, tinctura nephritica Amelungii, spiritus tartari volatilis.

X. Rectè monet Riverius, semper ad hypochondria præcipuam dirigendam esse curam, undecunque etiam malum primitus traxerit originem; unde curatio pro malo hypochondriaco ad reliquarum melancholiarum curationem sufficit. Unde etiam Bartholetus *Tract. de Respirat.* inquit, quod melancholia, quæ ex consensu totius cum corde derivatur, respondeat quartanæ exquisitæ, adeoque etiam esse tractandos melancholicos ut quartanarios.

XI. Quantum fieri potest, operanda, ut Agrypnia coërceatur, & somnus aut conserve-tur, aut restituatur, vid. Horstius *lib. 2. observat. 18.* Id quod interdum post vomitorium facilè evenit, ut tunc plus minus lassati ægri vel sponte in somnum inclinent, & ut facilius ad somnum disponantur. In specie ad somnum promovendum alimenta, quæ sunt humida, ac bono nutrimento rorido turgida, qualia sunt juscula, ova, carnes facilis digestio-

(Sss ss)

nis,

nis, serum lactis, lacticia, *Reis / Sirse / x.* ipsis primario conveniunt; ita enim temperatur massa sanguinea, & humectatur cerebrum, adeoque multum diæta habet in recessu. Certè quamdiu adhuc dormiunt, minus grave malum esse solet, aut si post agrypnias somnus redeat, faustissimum signum esse solet.

XII. Opiata sola, & nisi præmissis universalibus, nunquam danda sunt. Nam in talibus opiata parum vel nil operantur, præsertim in principio, & subinde duplicata aut triplicata dosi nihil faciunt, ob acidum in primis viis stabulans, eorumque vim destruens; idque eò magis, quò diutius somnum non viderit æger, eò minus narcotica & opiata operantur; sed potius, dum non faciunt somnum, gravant malum, & reddunt ægros quasi delirantes, cum talia narcotica per se sæpius aut in majori dosi usurpata somnia nonnihil turbulenta & quasi delira inferant. Internè ergò semper appropriatis specificis miscenda opiata, in specie humectantibus, & etiam occurrendum simul externis epithematibus capiti & fronti applicandis; item pediluvia ac similia pro scopo hypnotico melancholicis optimè conferunt.

XIII. In tota cura studiosè semper diæta observanda est, ut sit lauta & nutritiva, unde dentur alimenta & potulenta, quæ blando humore temperato & nutritivo probè sint turgida & imprægnata, ut lacticia, passulæ, & similia humectantia communiter dicta; siquidem notante Loffio *lib. I. observat.* 21. melancholici non diutius curantur, quàm humectantur; unde & passulata, item poma dulcia, mirè conveniunt melancholicis. Nec negligendus haustus vini generosi, quod vinum optimè exhilarat melancholicos; sicuti etiam motus corporis & excernendorum excretio, quantum possibile, promovenda. Vid. Gabelchov. *Cens. III. Curat.* 80. & Thonerus *Lib. II. Observ.* 3.

Quod ergò attinet ipsam materiam medicam hisce scopis inservientem, radix extirpandæ melancholiæ rectè à Paracelso dicitur consistere in antimonio, cujus præparata sunt varia, imprimis vomitoria antimonialia, & hinc remedia quædam ejus per inferiora purgantia. In specie hîc observandum est, eadem in paulo majori & sæpè dupla vel tripla dosi esse usurpanda, si aliquid agere debent, ut rectè observatum in Bartholini *Ad. Med. Hafniens. Volum. 4. pagin.* 148. quia melancholici ordinaria dosi non moventur, sed saltem per inferiora, minus per superiora, dum per inadvertentiam animi & objecta fortiora spiritus animales in cerebro & reliquis locis non solent percipere alterationem. Certè nonnunquam observavi, quod tartarus emeticus Mynsichti, in hypochondriacis & melancholicis à gran. vj. ad viij. imò ad xvij,

aut in forma liquida syrupus emeticus Salæ à drachm. vj. ad unc. j. propinatus fuerit. Et sanè tales ægri longè commodius etiam ac facilius perferunt vomitoria paulò fortiora, quam alii. Præstat tamen prima vice ordinariam dosin propinare, ut ex hujus operatione pauca vel nulla concludere possit Medicus, in quantum augmentanda dosis. In specie flores antimonii commendat Paracellus. Aliàs pro vomitorio sit aurum vitæ seu præcipitatum Mercurii cum auro (imprimis Kegleri) item infusum Mercurii vitæ repetitum interdum confert. Sapa vomitoria Sylvii ex musto & Mercurio vitæ est etiam egregia; item syrupus emeticus ad unc. j. & ultra. Aliquando cuidam melancholico propinare coactus fui:

℞. *▽ Fumar.* ʒj.  
G. *Amm. in vino solut.* ʒj. ad ʒss.  
Syr. *emet. concentr.* ʒjss.  
Scamm. *Δat.*  
Extr. *troch. alhand.* aa. gr. j.  
Syr. *rosar. simpl.* ʒij.  
Misc. pro Potione.

Cujus una vice sumpti usu æger ter vel quater viscida commodè per vomitum evacuavit, & bis per alvum laxavit cum euphoria.

Par ratio est purgantium, quæ sine addito stimulo salino, præsertim tartareo, in ordinaria dosi non operantur, quin hæc potius ordinario augmentanda venit.

Inter purgantia Mineralia eminent antimonialia: Nam antimonium peculiare alexipharmacum debellans melancholiæ videtur; unde ex antimonialibus per inferiora purgantib⁹ eminet Mercurius vitæ per sal tartari cicuratus, aut multis aliis modis parabilis. Inter vegetabilia vero imprimis sunt helleborus & helleborata, quæ non tam propter laxationem simpliciter, quam propter vim alterativam specificam in affectibus melancholicis, & in deliriis melancholicis conducunt. D. Michaëlis refert exemplum delirantis, ex quo Dæmon locutus, purgati per elleborata; unde nidus fuerit destructus, & cedere oportuerit. In malo verò contumaciori & mania helleborus albus; in melancholiis verò reliquis helleborus niger palmam obtinet; vid. Velschius *Hecatoß. 2. pag.* 11. Unde extractum cum phlegmate vitrioli spirituosum paratum, & exinde paratæ pilulæ cum antimonio per inferiora purgante hoc modo conveniunt:

℞. Extr. *helleb. nigr.* ʒj.  
troch. *alhand.* gr. ij.  
ʒiis *vita per infer. purg.* gr. v.  
Cum *Ess. Martis*, vel *Tinctur.* ʒi. f. Pilulæ.  
D. S.  
Purgierende Pillen.

Vel, quod melius, c.  $\nabla$  *Anagallidis & flor. hyperici* f. Potiuncula, edulcoranda c. sypode pomis laxativo.

Extractum trochiscorum alhandal hic adhibetur partim pro stimulo, partim ut corrigat simul viscidum præternaturale, quod, ut in omnibus chronicis morbis, ita & melancholicis pathematis ceu subjectum causæ materialis simul peccare observatur. De usu extracti colocynthidos & trochiscorum alhandal, vid. M.A.N.C. *Ann.* 3. *observ.* 202.

Item possunt fieri noduli vino infundendi ex appropriatis ad imitationem Hartmanni *cap.* 5. §. 7.

℞. *Passul. min. cons.* ℥ij.  
*fol. Senn. f. st.* 3vj.  
*Cinnam. el.* ℥ij.  
*Caryophyll.* 3℥.  
*Crem. tartari* ℥ij.

Contusa includantur nodulo, & infundantur in aquæ simplicis ℔ij. stent per noctem in digestionem.

Loco horum conveniunt etiam pro scopo laxativo massa pilularum de Ammoniaco Quercetani, massa pilularum tartarearum Quercetani, massa pilularum de fumaria, item, de lapide lazuli, & extractum melanagogum Quercetani.

Quoad remedia alterantia; ea vel respiciunt acidum corrigendum, vel crasim sanguinis emendandam, & per urinam purificandam, & quasi curandum malum hypochondriacum. Unde ex simplicibus specificè conveniunt omnia ea, quæ in malo hypochondriaco & melancholia hypochondriaca usurpantur: quibus addenda simul splenetica antiscorbutica. Et quidem acidum corrigunt Martialia, Saturnina, corallia, aliaque quibus addenda est tinctura lunæ vera. Sanguinem alterant & per urinam mundificant tartarea, tam fixa, quàm volatilia urinosa, aliàs contra malum hypochondriacum usitata. Quibus tamen in specie vegetabilia temperata, aliàs cordialia dicta, à Veteribus ceu specifica contra affectus melancholicos laudata; item splenetica quælibet sedulo addenda sunt. Talia revera temperando specificum acidum in melancholicis saporem operantur, suntque fumaria, anagallis, hypericum, borrago, buglossa, poma dulcia, præsertim Borsdorffiana, flores tunicæ, &c. in specie crocus & camphoræ, quæ immediatè agunt in spiritus & eorundem dyscrasiam alterant.

Martialia quod attinet; convenit horum usus pro scopo alterandi in cursu curæ, imprimis infusum Martis cum succo pomorum Borsdorffianorum, item fiat extractum Martis cum succo pomorum, (pomorum succus cum Marte se saturat, & non fermentat, sed

Tom. II.

liquor nigrescit, & perquam diu perstat.) Porro omnes croci Martis aperitivi, non saturati, item tinctura Martis Mynsichti, essentia Martis liquida, tinctura vitrioli Martis Zwelfferi, liquor Martis solaris gutt. xx. ad xxx. manè pulvis cachecticus Hartmanni, & similia, inter alterantia primatum ducunt. Faciunt etiam huc acidulæ: Sic Gabelchoverus *Centur.* 2. *Curat.* 69. refert mulierem melancholiâ hypochondriacâ gravissimè laborantem, per potum acidularum curatam, sed quæ ex balneo eorum pessimè habuit: Sicuti etiam thermæ melancholicis maximè nocent, Conf. Brunnemannus *Conf.* 5. *de Melanchol. Hypochondr.*

Post hæc quoque excellit Saturnus, & ejus imprimis saccharum, & ex hoc ipso parata tinctura cum vitriolo Martis, aliàs tinctura antiphthifica dicta. Loco hujus etiam crystalli mineræ Saturni cum spiritu nitri aceto acuato paratæ specificæ sunt. Sanè juvenem philiatrum novi, per solum & frequentiore Saturni sacchari usum à melancholiâ gravi hypochondriaca curatum.

Cognata sunt Martialibus corallia rubra, vel cruda, vel quæcunque ex iis parata, non saltem quod acidum simpliciter destruunt, sed & quod sulphur eorum contra tristitiam, anxietatem, melancholias & deliria, appropriatum sit + unde tam in substantia propinari possunt, quàm in specie eorundem tincturæ veræ, quæ præmissis universalibus singulare quid obtinent in deliriis melancholicis, imprimis si reducantur ad statum volatilitatis. Sed quia ejusmodi tincturæ sunt raræ, usurpetur loco harum tinctura coralliorum cum spiritu ligni assafras parata, item cum spiritu cordis cervi, additâ essentiâ ambræ.

Huc spectat R lunæ vera, vel hujus loco magisterium lunæ, ob id à quibusdam **das Narren-Pulver** dictum; videatur Rolfinckii *Chim. sub. tit. Luna*; Fatui enim restituantur beneficio hujus medicamenti. Potest cum aliis absorbentibus misceri, v.g. corallii rubris præparatis; aliàs ingratum habet saporem, vomitus & nauseam concitat. Item aqua cephalica, in qua extinguitur luna cum sulphure calcinata, extinguendo eandem ab omni calcinatione, in affectibus melancholicis præstans est.

Maxime quoque à quibusdam laudatur lapis lazuli, tam in forma pulveris ad imitationem Hartmanni propinatus, quàm sub forma tincturæ smaragdinae cum spiritu vini & spiritu urinæ. Verùm lapis hic sanè est concretum hermaphroditicum, participat itidem de luna & Venere, unde in quibusdam non ritè præparatus facit vomitus. Ratione ergò lunæ affectui melancholico succurrit, unde patetur ita, ut eliciatur saltem

(S s s 56 2).

vis



vis lunaris, relicta substantia Venera, & pro usu servetur; Dosis à guttis xij. ad xx. Miscetur commodè cum essentia anagallidis composita.

Ratione hujus lapidis confectionem alchermes optimè convenire ad melancholiam, præmissis medicamentis hypochondriacis, dicunt; maxima tamen vis dependet ab ambrâ, quæ confortat melancholicos, hinc etiam usurpari potest essentia ambræ.

Juxta hæc inter alterantia appropriata eminēt speciatim arcanum duplicatum Mynsichti, quod est egregium in omnibus deliriis melancholicis, & mihi frequentis usus medicamentum, hinc quoque nitrum antimoniatum, in specie cum camphora.

Insuper ex regno vegetabili quædam temperata afferuntur. Præ ceteris tartarus & tartarea quælibet sunt optima, sive pro scopo digestivo humorum in primis viis usurpentur, sive pro scopo alterativo & diuretico: hinc cremor tartari, tartarus vitriolatus, cremor tartari mistus cum salibus aliis lixivialibus, in specie cum sale absynthii, fraxini; item cum ana salis tartari. Imprimis conveniunt volatilia, quæ vi diureticâ & acidi destructiva melancholicos juvant: Talia sunt imprimis spiritus & sal tartari volatile, tinctura tartari, aut etiam spiritus vini tartarificatus. His præfero spiritum carminativum, ex nitro, tartaro, spiritu vini, &c. dum in paroxysmo hypochondriaco & melancholiâ gravior mœstitia, angustia & anxietates cordis, palpitationes ejus, &c. gravius urgent: in tali casu, præter coralliatâ, spiritus hic carminativus est optimus à ʒβ. ad ʒj. propinatus, nunc solitarius, nunc spiritui salis Ammoniaci sociatus; in cujus locum tinctura nephritica composita seu clyssus urinosus substitui potest. Pertinet huc etiam liquor tartari diaphoreticus cum succis Dn. D. Rhefeldii.

℞. Succ. express. Piperit. ʒiv.

Cochlear.

Raphani mar.

Nasturt. aquat.

hortens. aa. ʒj.

℞i probè rectif. lbj.

mista hæc omnia & digesta aliquandiu, destillat aliquoties lento igne in Matre balneo dosis ʒij. ad ʒβ.

Remedia ex borragine, buglossa, fumaria, & similibus, quæcunque eorum alterantia appropriata per se nota sunt, & speciatim in largiori dosi pro vehiculo reliquorum inseriunt. In specie tamen fumaria præ ceteris est utilis, & omnia ex fumaria parata remedia; Unde essentia fumaricæ composita nostra pro scopo alterandi optimè convenit, si misceatur cum essentia seu tinctura Martis liquida.

Post fumariam succus pomorum Borsdorfianorum depuratus, vel etiam omnia ex pomis parata remedia, v. g. syrupus de pomis, extractum Martis cum succo pomorum diutius continuandum, vel solitarium vel camphoratum, interponendo interdum usum spiritus salis Ammoniaci; extractum granorum chermes cum succo pomorum ex Hartmanno & similia; item extractum & syrupus de succo borraginis, item buglossæ, à veteribus laudantur in majori dosi, essentia splenetica, medicamenta quæcunque ex lupulo, & similia. Apud Rhodium *Cent. 1. observat. 44.* Jusculis cichoreaceis in ptima menta haustis melancholia hypochondriacâ profligata fuit. Eminent quoque anagallis flore Phœniceo, quæ communiter dicitur *Vernunft's Kraut* / & hinc hypericon: Hæc enim duo mirè conferunt contra phantasmata melancholica, sive tantum coquantur in aqua appropriata, & propinentur, sive fiat essentia & tinctura composita: quod pertinet tinctura hyperici Mynsichti, quotidie bis vel ter usurpata; item essentia anagallidis composita D. Michaëlis, quæ ad 50. vel 60. guttas bis in die sumatur: Satyrium, ejusque conserva, item essentia satyrii, magnam vim habet mœrores & tristitias pellendi, sed observetur, ne sit melancholia erotica, utpote quam potius aggravat. Helenium miram vim ad spiritus excitandos habere Rondeletius *Prax. l. 1. cap. 9. docet.* Crocus præ reliquis singulare quid obtinet, nam insigniter convenit ad volatilifandos & subtilifandos spiritus, ut ut occultâ narcoticâ vi eos figat; hinc Hartmannus in *Praxi Chimiæ* meritò commendat essentiam croci cum aqua vitis destillata paratam; cui tamen meritò præfert Lindanus croci essentiam cum aqua betulæ, mensæ Martio ex surculis profluente paratam, utpote cum dicta aqua betulæ per se sit egregia pro scopo alterativo humorum & diuretico in melancholiis, sive sit aqua destillata betulæ, sive per fermentationem purificata, & ita propinata. Essentia croci summa cordis lætitia à Paracelso vocatur, cum simul habeat vim sudoriferam, & pro scopo afficiendi spiritus mirè convenit; unde etiam Lindanus meritò syrupum ex succo borraginis, cui crocus additus sit, singulariter commendat. Siquidem & externè crocus in nodulo circa scrobiculum cordis appensus egregiè convenit, uti Borellus *Cent. 2. observat. 99.* de muliere melancholica continuò mœstante, gestatione croci super cor curatâ, refert. Melius tamen est, quod soleo facere, ut croco huic addatur camphora, & appendatur dicto loco, Stöckerus in *Praxi* insigniter commendat in affectibus melancholicis hanc aquam destillatam:

℞. Fl. Anthos,  
borrag.  
bugloss. aa. ʒiv.  
Crocī ʒj. •  
Mal. Coron. ʒiv.  
Vini albi gener. lb. ij.

Mista digerantur per 15. dies, & destillentur.

Aqua propinetur ad ʒj. quam jubet asservandam tanquam pupillam oculi. Sed an tantæ sit efficacix, dubito.

Croco non cedit camphora, & ejus essentia, quæ uti singularissima est in mania, & omnium optimè conducit; ita etiam in reliquis deliriorum melancholicorum speciebus, tam internè cum saccharo Saturni, vel arcano duplicato permista, quàm cum croci ʒj. noduli forma suspensa & aliquamdiu gestata. Exemplum novi in quodam amico, qui terroribus subinde affligitur, & hoc ipso amuleto egregiè levatur. In forma quoque epithematis externè capiti applicari potest, quando deliri conquerruntur de perturbatione capitis, v. g. hoc modo:

℞. ▽ fl. sambuc.  
hyperic. aa. ʒiʒ.  
adde  
Camph. gr. vj. l. ix.  
M. f. epithema: S.  
Aeufferlicher Umschlag.

Vel

℞. ▽ a anazall.  
fl. hyperic.  
Cordial. H. S. frig. aa. ʒj.  
Ess. fumar. compos. ʒiij.  
Crocī ʒj.  
Tinct. corall. c. spir. cord. cervi ʒiʒ.  
Ess. ambre gr. xv. ad ʒj.  
V. camphor. ʒiʒ.  
Syr. flor. tunica, vel borrag. ʒj.  
M. S.

Stirck & Träncklein auff etliche mahl.

Ubi phlogoses frequentiores adsunt, ac æstuationes vagæ, item ubi humorum alteratione & per urinam evacuatione magis indigemus, arcanum duplicatum, nunc solitarium, nunc aliis sociatum, est optimum.

Denique pro scopo analeptico, unâ cum laudabili diætâ, convenit essentia melissæ, corticum citri vel aurantium, elixyr citri, tinctura solis cum oleo cinnamomi Mynsichti, tinctura coralliorum, essentia helenii, & similes.

Externè, præter epithema camphoratum, & nodulum ex camphora & croco, emplastrum ex tacamahaca capiti raso applicatum commendatur ab Hæchstettero Dec. 9. pag. 316. Vel

℞. Tacamahac.  
G. Carann.  
Anima aa. p. æqu.

Ex his liquefactis faciunt emplastrum simili modo applicandum.

Quod si junctum sit splenis vitium, præter interna Saturnina emplastrum de nicotiana splenis regioni applicatum convenit.

Quod si phlogoses frequentiores adsint, aut caput nimis æstuet, ita ut mania metuat, observavi limum recentem cum aceto subactum, plantis pedum & cervici applicatum, nonnihil prodesse, renovando subinde; nam fortiter adhæret, ita ut vi avellendus sit.

### MEMBRUM III.

De

Mania.

SUPEREST adhuc summus deliriorum melancholicorum gradus, & magis crudelis species, ex eo, quia homines omnino quasi in bruta transmutantur; estque ista melancholia, quæ aliàs *μανία* dicitur Græcis; Latinis, infania; Germanis *die Raserey* oder *die Unsinnigkeit* / quæ tale est absque febre delirium (utut mania quoque febris corripere possit) quò correpti ægri melancholici cum insigni furore & audacia, deposito omni pudore, & exutâ quasi omni ratione, plane feroces redduntur, ita ut, quæcunque objecta aggrediuntur, eadem diffingant & lacerent, multa absurda loquantur & faciant, cum insigni furore sæviant in alios, etiam in seipso, adeò ut quoscunque homines obviam venientes verberibus malè mulctent, & impediti gravioribus contumeliis & conviciis eisdem lacestant, ita ut ob furorem & quæcunque perpetrandi audaciam catenis subinde devinciendi & arctè incarcerandi sint ægri, & si sui juris sunt, interdum aufugiunt, quin & sese, nisi defendantur, nonnunquam jugulant aut suspendunt, & horrenda peragunt. Pertinacissimè vigilant, ita ut Fernellius referat, quendam maniacum per quatuordecim menses insomnem fuisse.

In his deliriis maniacis verò observandæ sunt tres circumstantiæ: nempe furor, robur, & frigoris tolerantia mirabilis. Imprimis considerabilis est furor iste, quò tales ægri quæcunque perpetrare audent, qui tamen furor insignis, & hæc apparens audacia non est plane absque aliquali meticulositate & absque timore interno, imprimis erga custodes suos. Nam si furiosi aut maniaci aliquem metuentem vel pavidum vident, in eum audaces promptè irruunt; sed si audacem & constantem quem vident, eundem formidant; quin &, si ab aliquo aliquando verberibus

(Sssss 3)

beribus excepti fuerint maniacy, eundem admodum metuunt, & quacunq; ratione possunt, fugiunt. Audaciæ huic, vel potius temeritati, conjunctum est insigne, & tantum non stupendum in maniacis robur, cum validissima ferramenta diffingant & disjiciant, & quæcunq; obvia subito conterant & devastent: Sic Benivenius observat nutricem maniacam, quæ dentibus quæcunq; obvia comminuit, & etiam validissima diffregit. Conf. Bartholinus *Cent. 2. Histor. 69.* Quod ipsum tamen non adeo proprium est solis maniacis, quin & interdum in graviore febrili quasi phrenitico delirio observetur; quale exemplum refert Panarollus *Pent. 4. Observat. 49.* ubi quidam phreniticus in vigore febris cancellos ferreos, ac si cerei essent, tractavit, & pondera ingentia facillimè elevavit, qui tamen transacto morbo vigore adeo imbecillis fuit, ut vix surgere potuisset. Aphrenitide hinc maniaci distinguuntur, quod nulla iis adsit febris prægressa, nullum signum graviter affecti capitis aut cerebri. Cum demoniacis quidem subinde confunduntur: sed in hoc ferè differre observantur, quod hi sæpius per vomitum ferramenta, crines, aliaque inconsueta soleant rejicere. Accedit his tertium notatu & consideratione dignum in maniacis, insignis nempe frigoris, etiam intensissimi, tolerantia. Ut plurimum enim maniaci omnes vestes lacerant, & inde etiam in gelu hyberno ita jacent, aut per vias ambulant, idque sæpè membris nudis, aut solo indusio amictis, sine ulla corporis exinde contracta læsione: Sic Lindanus refert, vidisse se Amstelodami Gallum quendam maniacum in ergastulo, qui nudus in intensissimo frigore hyberno solo indusio amictus incedebat, quamdiu nempe furor perduravit, quique accedente paroxysmo caput antliæ submittens, aquam frigidissimam capite excipiens, levamen sentiebat. Quo etiam facit exemplum Foresti *libr. 10. observat. 20.* de muliere maniacæ, quæ in hyeme nuda in lecto jacens, corpus tamen habuit admodum calidum, ubique rorido sudore perfusum; hoc ipsum fit partim ex statu massæ sanguinæ, quæ intus vitiosè exæstuat, partim verò ex eo, quod maniaci in furore constituti vim frigoris minus sentiunt atque percipiunt. Hoc ipsum tamen, nempe tolerantia frigoris, ut plurimum equidem adest in maniacis, non tamen semper, nec in omnibus observatur, sed tantum ut plurimum: Interdum enim observati fuerunt maniaci vestibus contexti, aut vestes sub gelu hyberno postulantes & de frigore conquerentes, quale exemplum Riverius in *observat.* habet. Quod etiam facit observatio rarissima Plateri *libr. observat. pag. 82.* de quodam maniacæ, qui hyeme, frigore intensissimo, periit, & manè congelatus inven-

tus est. Interdum quidem, sed rarò, conqueruntur de frigore, quod, si accidit, bonum signum est.

#### C A U S Æ.

Arbitror deliria maniacæ non differre radicaliter à reliquis melancholiis, & deliriorum melancholicorum speciebus, sed saltem circumstantiis quibusdam observabilibus, ob crasin spirituum animalium plus minus læsam. Nam quod non differant in radice, patet, quod nonnunquam ambo hæc inter se transmutentur, cum videamus, quod mania confabulationes & cantus, similiaque hilaritatis phænomena, nonnunquam interjecta habeat, & melancholicos fieri maniacos, & melancholicos subinde manere, qui ante fuerant maniaci; quo imprimis pertinet observatu dignissima observatio Riverio à Formio *communicata 32.* de mania gravissima, post quælibet extrema remedia, nempe arteriotomiam, persistente in juvene, quæ tandem castratione fuerit curata, ita tamen, ut per castrationem cessarit ista mania, & remanserit delirium melancholicum. Conf. etiam Lossius *libr. 1. Observat. 23.* Sicuti econtrà non rarò melancholici mœsti & tristes, aut aliàs deliri, interdum in maniacos planè exacerbantur & transeunt: imò mania paroxysmi cum melancholico delirio alternare solent, hocque illius gradus tantum remissior videtur; unde etiam mania, non secus ac aliæ melancholiæ species, iisdem omninò remediis, eademque medendi methodo, curari solent, saltem quod in mania remedia in majori dosi adhibeantur. Nempe, ut loquitur Lindanus, in melancholia sanguis frigidus & siccus, in mania calidus & siccus, h. e. textura talis est sanguinis asperior, minusque succulenta nutritiva, ut utrobique dominetur acidum, sed mitius & fixius in melancholicis, acrius & subtilius in maniacis. Est nempe mania talis melancholiæ species, quæ cum summa morositate & omnium objectorum tædio, adeoque facili iracundia, eaque subinde intensa, conjuncta est: uti enim observantur melancholiæ cum tristitia, uti dantur melancholiæ cum risu, cum cantilenis, cum amore; ita simili ratione datur melancholia cum intensa iracundia seu furore, quæ est mania. Hoc ut fiat clarius, consideremus saltem hominem aliàs sanum & rectâ ratione utentem, summè tamen & admodum iracundum; aut saltem consideremus ebrium ad iram provocatum, in quibus sanguinis status & motus turgescientiam febrilem, spirituum verò alteratio & impetus eorum sub mania constitutionem ferè repræsentat. In talicasu, præsertim ebrii, considerate actiones, & videbitis in his ipsis quandam maniam naturalem. Quæ enim non aggrediuntur, & quæ



& quæ non perpetrant tales ebrii? Mirandum, quantâ audaciâ instructi sint, & omnia tentent, & quantum caleat subinde eorum corpus. Similiter, si in melancholia ex quacunque causa, subinde ex irritatione externa, aut ex positu astrorum, aut ex interna massæ sanguineæ aucta nonnihil fermentatione, & tunc acido melancholico volatilifato magis assurgunt affectus iracundiæ, perfectum habebitis maniacum. Nam omnis iracundus solet esse robustior, quàm quando est animo pacato, & ratio inepta est regimini spirituum animalium in ebrietate admodum ferociendum. Ipsi melancholici ordinariò sunt morosi, facilièque ad iram provocari possunt; unde etiam melancholici facile ad verbera prorumpunt, quo facile fit, ut auctâ in iis morositate, & inde nata iracundia, in maniam degenerent. Cum ergò in radice & essentia conveniant melancholia & mania, dum hæc, sedato spirituum impetu & fervore, v.gr. per castrationem in melancholiam degeneret, illa verò concitato spirituum jam malè constitutorum impetu in maniam assurgat, sequitur, differentiam harum proximè in spiritibus animalibus eorumque constitutione & motu consistere, qui in constitutione melancholica quidem alterati, obscuriores & fixiores existunt, & quasi ad acetosam naturam accedunt, acerrimi, & aquæ forti seu stygiæ analogi quodammodo fiunt in maniacis, ut pluribus hoc deducit Willisius *de Anima Brutor. Part. 2. cap. 12.* qua acri volatili aciditate illorum extraordinaria ista caloris in toto corpore impressio, & hinc frigoris tolerantia. Verùm sicut in omni irato & iracundo est quædam exæstuatio & agitatio extraordinaria massæ sanguineæ, unde etiam totum eorum corpus calore plus minus excessivo percipitur perfusum; ita in maniacis & ipsa massa sanguinea, unde generantur tales spiritus, crassa quidem & spissa, plus tamen solito agitata, sub rapido circulo movetur, & à spirituum consortio vehementiorem concipit æstum, quàm naturaliter: id quod manifestatur partim per pulsum, partim per respirationem: Nam pulsus in maniacis est plenus, frequens & satis magnus; respiratio ipsa est frequens, alta & satis magna. Ipse verò sanguis venæ sectione emissus observatus fuit à Lindano crassus, spissus, & intensè calidus, ita tamen ater, ut atramenti speciem retulerit. Et ita in maniacis massa sanguinea acido quidem vitioso abundante turget, volatiliiori tamen & facilius mobili, unde intestino motu fermentativo intensius agitata simul plus solito vehementiorem concipit calorem, indequè corpus calidum & frigoris tolerabile redditur; quin etiam iisdem, ut iracundis, audacia ex spiritibus nonnihil velocius motis intensè conciliatur,

Vulgò juxta Galenum à temperie cerebri calida & sicca seu atrabile, hoc est, melancholia adusta, derivant maniam, quam Riverius *libr. 1. Prax. cap. 13.* rejicit: Hanc autem atram bilem ex pathologicis præsuppono nil aliud esse, quàm vitiosum acidum effervescentiò exasperatum, ac ita quodammodo volatilifatum & acrius redditum. Ab hoc enim vitioso, sed admodum acuto acore humor atrabiliarius aquæ & terræ injectus effervescente & ebullire, vel fermentare veteribus dicitur: Unde etiam faciliè in melancholicis ac maniacis vitiosus acor inductâ effervescentiâ exasperari & volatilifari potest, ut ita majorem & intensiorem acquirat gradum, quam etiam atram bilem appellant: Vid. Willisius *de Anima Brutorum loc. alleg.*

Causæ igitur remotiores sunt ferè eædem, quæ reliquarum melancholiarum, ita ut, quoad causas internas remotas, ad primas vias & viscera hypochondriaca, eorumque functiones, nunc immediatè nunc mediatè vitiatas, semper respectus habendus sit: v.g. excretio sanguinis solennis suppressa, in specie hæmorrhoidum, menstruorum, lochiorum, &c. in iis, qui inclinant ad habitum melancholicum, uti melancholiam, ita interdum etiam maniam inducit, quod Forestus *libr. 10. observat. 24.* testatur: sic ex hæmorrhoidibus suppressis maniam notat Zacutus Lusitanus *libr. 1. Prax. Admir. Observat. 51.* Sic etiam ex ulcere intempestivè clauso orta mania observata fuit: sed aperto rursus ulcere æger convaleuit. In specie ulcerum antiquorum & varicum curationem & occlusionem insequitur mania; sicut varices & ulcera sponte exorta maniam non rarò solvunt: nam hoc jam satis de Marco, antiquo Romano, constat, quod ex occlusionem varicum in cruribus fuerit redditus maniacus; sicuti econtrà Hippocrates *sect. 6. Aphorism. 21.* inquit: si insanis varices & hæmorrhoides superveniant, solutionem fieri manix. Facit huc, quod refert Forestus *libr. 10. Observat. 24.* de puella, quæ post ulcus in crure inveteratum nimis cito curatum & propter menstruam purgationem longè suppressam, in maniam incidit, quæ postmodum curata fuit & restituta sectâ sapharnâ menstruis fluentibus. Item Henricus ab Heer *observat. 14.* recenset furorem in puerpera ob malè tractatas mammas, in quibus apertis pustulis & evacuato pure, omnis mania omninò cessavit. Subinde etiam febres ardentes acutæ, pleuritides & epilepsiæ diuturnæ in maniam degenerant: Sic enim Henricus ab Heer *observat. 3.* observat insaniam post febrem acutam ex melancholia contractam, & post quartanas diuturnas singularis quædam manix species singu-

singulariter quoque tractanda; vid. in Sydenhamo *observat. de Morb. Acut. pag. 112.* Sic post variolas maniam natam videbitis in M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. observat. 93. pag. 133.* Pariter melancholico & maniaco delirio communes existunt graves animi affectus. Seminis retentiones diuturnas maniam inducere, probat furor uterinus. De hæreditario charactere res aliàs nota est.

Quoad causas externas: in specie venena nonnulla narcotica assumpta vim habent specialiter inducendi maniam, seu potius affectum quendam maniae similem: Sic Bartholetus *de Respir. libr. 5. cap. 3. pag. 405.* refert: *Radicem solani furiosi infusam vino amico semel propinari vidi, qui post ejus haustum ita extra rationis lyram emotus est, ut delirans extra fenestram magnâ vi se dejicere tentaverit quem ilico vomitus citri succo & frigido potu excitatus in rectam rationem reduxit: Idem etiam vidit hyoscyami nigri sem. certâ dosi datum jurgiosam & contumeliosam effecisse stultitiam: Ex esu napelli maniam lethalem notat Willisius loc. citat.* Sed differentias maniae à medicamento extrinsecus assumpto ab ea, quæ ab interna oritur causa, idem Bartholetus *cit. loco* refert. Nempe in illa somnolenti somnia concepta firmiter impressa effutunt & ajunt, cum in vera mania valde vigilant, & quasi cum ratione insaniant: Sic cerebrum felis comestum maniacam insaniam inducere dicitur, vid. Salmuth *Centur. 3. observat. 100.* In specie philtrea subinde juvenibus manias vel dementias potenter inducunt, speciatim si parata sunt cum menstruo muliebri, præsertim primo, ut refert Petrus in *Diff. Harmon. 3. libr. 1. §. 16.* & confirmat Borellus *Centur. 1. observat. 65.* ubi dicit, Theologum prope urbem Castrensem à philtro menstruorum muliebrium, cum leporis sanguine in condimento sumpto, in maniam tantam incidisse, ut patrem proprium occiderit. Veneni illius remedium sunt margaritæ præparatæ. Sic Rulandus refert à propinato per veneficam veneno quendam per sexennium quotannis bis epilepticum & maniacum factum, tandem evacuatione forti particulari per sternutationem, & universali per infusionem croci metallorum, curatum fuisse. Jucundum est, quod rusticus maniacus sternutamento forti excitatus excretâ crucâ curatus fuit; vid. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Observat. 37. pagin. 35.* ut ut minus propriè dicta mania videatur.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa maniarum: Mania levi admodum negotio cognosci potest, cum illa satis pateat.

Imminentis verò duo signorum genera ob-

servantur; quorum alia remotiora sunt, & dispositionem tantum ad hunc morbum denotant; alia affectum proximè imminuentem indicant: Illa sunt; (1) ægri temperatura a-trabilaria vulgò dicta; (2) sexus, ratione cuius viri ad maniam magis proclives sunt feminis, nisi ex utero & partibus spermaticis tale quid contrahant; (3) ætas juvenilis præ senili: Propinquiora verò denuò observantur vel communissima, vel communia, vel propria. Communissima delirium in genere portendunt, scilicet dolor & gravitas capitis assidua, vigilæ contumaces, aut somni interrupti, insomnia turbulenta, & aurium sonitus. Communia maniae cum morosi & melancholia observantur curæ & sollicitudines molestæ, ac terrores ex levi causa. Propria denique maniae signa sunt, quando ægri continuò & multa absurda loquuntur & faciunt, hisque interjicitur taciturnitas meditabunda, sæviunt cum quodam furore & temeritate in obvios, & etiam in seipsos, adeò ut quoscunque obvios unguibus & morfu instar bestiarum aggrediantur; quin & interdum, nisi prohibeantur, se ipsos interdum interimant, aut suspendant, aut jugulum abscindant. Præterea & pertinacissimè vigilant maniacy, accedit robur insigne, tolerantia frigoris, &c. Oculi nonnullis sanguinolenti, itera torvi & truculenti conspiciuntur, præceps & frequens iracundia, ex minima vel nulla iusta occasione, splendoribus oculis obversantes, proclivitas ad Venerem incon-sucta, pollutio nocturna frequentior, risus præter consuetudinem & rationem, &c.

Porro cognoscendum, quomodo distinguatur mania ab aliis affectibus cognatis? Et quidem à phrenitide differt in eo, quod nulla adsit febris, nullumque signum graviter affecti ipsius cerebri. A dæmoniacy verò quod hi perpetrant talia quæ superant humanam potentiam, in natura non sunt perpetrabilia, quando sæpius per medicamenta vomitoria, ferramenta, frustra lignorum, animalcula viva, aliæque in corpore aliàs non reperibilia, aut non ingesta antea, solent rejicere, quod semper dæmonis ope à veneficis & incantatoribus oriri solet.

### PROGNOSIS.

Quod attinet prognosin. Mania à causis internis excitata in genere est malum admodum diuturnum & curatu difficillimum, quod, etsi interdum per menses & annos quosdam remittat, subindè tamen melancholiam post se relinquit; quæ facili ratione exasperata, postmodum novâ atrocità recurrit, & sæpe ad mortem usque comitatur ægros, imprimis si melancholia & mania fuerit hæreditaria; quæ semper est incurabilis, nisi palliativè, certis anni temporibus reiterans,

Quæ



Quæ tamen mania est cum risu & actionibus ridiculis, mitior est & tutior, quam ista, quæ est cum temeritate & quâdam sævitia, nimio furore & audacia.

Porro in maniacis, si alvus sit ritè aperta, & in specie, si menses & hæmorrhoides ordinario naturæ cursu fluant, bonum est signum, si verò mania superveniat hujusmodi fluxus suppressio, vel si sub mania supprimatur, pejor est; mania enim degenerat interdum in alios morbos.

Mania per metastasin superveniens sudor, aut alvi fluxus, aut hæmorrhagia narium, hæmorrhoides uteri, dysenteria, aut hydrops, aut tertiana, aut quartana, aut varices aut scabies, item alius quidam morbus, præsertim abdominis, maniam terminat. Sola dysenteria sæpius est funesta, propter acerrimam acrimoniam humoris corrodentis intestina, quæ ad gangrænam terminat; subinde tamen etiam in hydropem terminasse observatum fuit, sed periculosum.

Dum intereunt maniaci, virium fatiscentiam ex vigiliis, inediis & continuo motu ferè vitæ terminum patiuntur.

### C U R A.

In cura ante omnia opera danda est, ut furor mitigetur, & eò facilius tractabiles fiant infanti, pro medicamentis melius adhibendis. Id quod optimè fit per venæsectiones iteratas, & valida vomitoria; quibus subjungenda sunt appropriata alterantia, dyscrasiam spirituum & sanguinis emendantia. Spiritus imprimis reficiunt camphorata & moschata, sanguinem verò ceterosque humores Martialis & Saturnina, somniferis maritata; de cætero, si paroxysmus furoris est sedatus, simul observanda sunt etiam ea, quæ supra monui in melancholicis.

Radix ergo curationis consistit in vomitoriis validis & generosissimis; sic habent *starche Ross-Natur* / quæ omnibus maniacis (si ab animalibus venenatis demorssi & isti, excipiantur) non tantum in principio, sed morbi etiam progressu, maximè proficua sunt; non tantum, quod radicem mali, si ab assumptis siue dispositione intrinseca illud fuerit, præscindant, sed quod mites & tractabiles admodum ægros reddant, adeoque non tantum indicationi præservatoris, sed curatoris quoque satisfaciant, spirituum efferationes aliquantum supprimendo; hinc ad venæ sectionem aliorumque remediorum admissionem disponant. Veteres in hoc casu, & primus autor Hippocrates, helleboro albo usi fuerunt cum felici successu & optato cum eventu, vel quia ex climatis ratione mitior his ipsis fuit, vel quia concinnius ac nos præparare & propinare eun-

dem noverunt. Facile quidem nos posset terrere Geigerus in *Tract. de Microcosm. Hypochondr. cap. 23.* qui refert, quendam maniacum ex usu decocti hellebori albi convulsus interisse: id quod etiam Hippocrates in *Aphor.* observat, dum inquit: Convulsio ab helleboro lethalis. Simile exemplum recenset Helmontius *Dispens. Modern. § 50.* Felicem ejus usum suadet Lindanus *super Hartman. Prax. Chimiatri.* per propriam experientiam confirmatus; hic enim refert curam melancholici per helleborum album per se institutam: Dicit nempe quod pro ablatione mania non cognoscat generosius remedium, quam helleborum album & oxymel helleboratum. Cum impetu sursum & deorsum evacuat, & maniacos insigniter curat.

Aliàs loco hujus helleborismi ad maniam & reliquas melancholias in usu etiam sunt infusa vomitoria antimonialia, & dicit Lindanus, quod aqua benedicta antimonialis ipsi sit successoria: sed vitæ semper sufficiunt, quia sunt nimis debilia, nisi Mercurium vitæ excipere velimus. Eiusdem generis est aurum vitæ Kegli, à Poterio & Fabro valdè commendatum; item folia asari: cuncta tamen in majore, quàm aliàs, dosi propinanda, prout de delirio melancholico dictum.

Si in principio morbi interdum per inferiora fieri debeat purgatio, usurpentur superius in melancholia allegata, imprimis helleborus niger, qui secundum Freitagium optimum in hoc affectu purgans est, ejusque extractum & extractum melanagogum Quercetani, item syrupus de helleboro nigro, & oxymel helleboratum Gesneri. Quibus semper addendus est stimulus validior ex antimonio per inferiora purgante, aut ex Mercurio vitæ laxativo, &c. cum, secundum Paracellum, appropriatum purgans melancholicorum sit antimonium.

Post purgationem validam venæ sectio instituat, eaque copiosa, & quidem sæpius reiteranda. Nam interdum empirici per solam venæ-sectionem curant maniacos. Primò instituenda in malleolo, postmodum in brachio & fronte: vid. Sylvius & Riverrus. Platerus *Tom. 1. cap. 3.* & Bartholetus de *Respir. lib. 5. cap. 3.* Sed non prius potest institui, quam post vomitoria, paroxysmo cicurato & furore mitigato, propter intractabilitatem, tunc larga instituenda, quia optimè ferunt. Confirmat hoc Platerus *lib. 1. Observat. pag. 80.* Arteriotomia quoque nonnullos maniacos sanatos Marcus Aurelius Severinus *Angiolog. pag. 45.* & Panarollus *Pentec. 1. observat. 29.* testantur. Spectant huc cauteria & trepanationes calvarie, ut remedium tutissimum ac

(T t t t)

uti-



utilissimum, à Sylvatico *l. 4. Observat. 59.* & Hartmanno *Prax. pag. 57. & 64.* deprædicatum. Quorum tamen hæ secundum Sylvaticum ad alteram tantum laminam sunt adigendæ, confirmatque præter experientiam Severini *de Efficac. Chirurg. pag. 54.* Mercurialis *lib. 1. cap. 16.* & Glandorpius *Gazophylac. pag. 110.* cauteriorum & terebrationum vim Gordonius per historiam maniacy, qui quamdiu vulnus & fractura cranii, quæ passus, aperta, benè se habuit; clauso verò vulnere rediit, ad pristinam insaniam: Ut taceam eorum, quæ superius de ulceribus clausis & apertis monita. Imò non tantum vertici & nuchæ, sed brachiis & cruribus quoque, cauteria inusta magnæ efficaciz observantur, vid. Epiphanius *Ferdinandus Hist. 91.* Rolfinckius *Meth. pag. 413.* & Glandorpius *l. 4.* Salivationem quoque per Mercurium commendat Rolfinckius *lib. 2. Consil. 8.* eaque levioze quendam restitutum *Meth. special. pag. 590.* testatur: quamvis circa applicationis rationem non levia existant dubia.

Quæ omnia interim dum fiunt & vomitoria etiam repetita sunt, ejusmodi exhibentur alterantia, quæ sanguinis & spirituum ferocem magis turgescientiam & efferrum motum refrænant, varii generis à Practicis annotata, eaque vel interna vel externa. In principio hujus morbi mox excedendus est modus solitus in exhibendis remediis generosis, quia spiritus animales, quando occupati sunt in alio, vix adjuvant in actum deducere medicamenta. Mox ergò in principio insaniz pro effero spirituum motu & effervescentia sanguinis aucta compescenda, una cum alterantibus opiata & sulphura mineralia, fixa anodyna propinentur. Nam quò diuturnior fuerit affectus, eò minus opiata juvant. Propinanda imprimis sunt in dosi satis valida, aliàs nihil operantur. Et si hoc obtinemus, ut obdormiscant, statim post ad validum vomitorium properandum; sic enim feliciter operatur. Nam dicit Lindanus: *Quoties potui somnum conciliare, feliciter curavi, alias enim propter morositatem parum vel nihil admittunt.* De cætero, quod attinet reliqua remedia alterantia & appropriata: conveniunt etiam hic omnia ea, quæ aliàs in melancholia *supra loc. all.* fuerunt laudata, in specie tartarea, Martialia & Saturnina. Præterea etiam huc facit nitrum crudum & omnia nitrata, quæ studiosissimè usurpentur: singularem enim vim sanguinis æstus & orgasmos domandi habent; in specie quidem nitrum antimoniatum & vitriolatum, aut etiam nitrum saltem purificatum, copiosius cerevisiæ aut potui ordinario, in

mensura nempe una potus unc. ss. ad unc. j. injiciendum, & ita una propinandum.

De nitri efficacia res curiosa videtur: Nam notum est ex casibus Timæi von Guldenslee / quod aliquando curaverit musicum lalacissimum (qui propter intolerabilem salacitatem castrationem postulavit) per continuum usum nitri crudi. Porro juvenis maniacus ex Riverio per castrationem fuit curatus. Cum ergò nitrum artificialiter castret, hoc effectu maniacos feroces curare videtur.

Præmissis ita universalibus & generosis, tandem & appropriata specifica sunt subjungenda, quæ inter tamen ex appropriatissimis remediis est sanguis asininus arteriosus, prope aures decresciente verno tempore vel linteo mundato excipiendo collectus, & ita exsiccatus, vel per se collectus, quando grumescit, qui in fumo exsiccari patitur: Linteum tale longitudinis & latitudinis digitorum duorum cerevisiæ vel vino vel aquæ fontanæ aut anagallidis rubræ vel hyperici vel fumariz infusum, maceratur tamdiu, donec liquor contrahat colorem: qui cum forti expressione propinatus, & aliquoties repetitus, largo sudore, præmissis reliquis, maniacos curat. Quandoque etiam pulvis istius sanguinis exsiccati ad drachm. j. usurpatus in aqua anagallidis simili sudoris effectu maniacos curat. Hartmannus in *Prax. Chimiatri. cap. 3. pag. 55.* Prænotius & alii meritò hunc sanguinem commendant. Torpor nempe asini sistit furorem maniacum, sic werden Esel-saut.

Post asini sanguinem vix melius est remedium quam anagallis flore Phœniceo. Hujus decocto scilicet Quercetanus & Hartmannus gloriantur se mira præstitisse in maniacis, quod etiam frequentius in usu fuit D. Michaëlis, qui aliquando tutoris filium catenis alligatum, præmissis præmittendis, beneficio essentiz suæ anagallidis compositæ restituit. Hinc est, quod anagallis hæc quibusdam dicatur salus fatuorum, Germanis *Bernunft-Kraut* / quia contra maniam & maleficia est adeò commendata, è qua Dn. D. Michaëlis etiam præparavit essentiam compositam cum spiritu proprio: cui autem merito præfertur decoctum. Juxta anagallidem porro imprimis non minimam laudem meretur hypericon, quacunque ratione usurpatum, unde etiam tinctura hyperici composita Mynsichti laudata est in mania. Porro fumaria, nymphaea, borrago, melissa, ceterach & similia, cum alimentis crebrius usurpata, aut alio modo adhibita, pro maniacis in usu sunt. Hinc solanum tetraphylon seu herba Paris, quæ 20. diebus continuis ad dimidii cochlearis quantitatem sumpta, laudatur,

datur, cuius etiam baccas, folia, semen & radicem pulverisatam Velschius *Observ.* 15. exhibet. Succus polypodii quercini expressus in Mariæ balneo digestus & clarificatus ad unc. jv. vel v. propinatus, nonnullis in usu est, maximè laudatur à Bartholeto *de Respirat. lassa pag.* 412. ejus decoctum compositum.

Hiscæ associanda simul studiosè remedia lunaria superius insinuata. De foliis buxi, eorumque ad maniam usu, vid. in Hartmanni *Prax. Chimiatri. cap.* 4. item Sennerto, ubi *de Mania*. Aliquando enim cum ordinaria dixta hæcæ folia minutim incisa continuo ordinata fuerunt egregia, licet de his propriam experientiam adhuc etiam neget prior; forsitan tamen eorum vis est à blanda narcosi, quâ vegetabile hoc gaudet. De opiatīs res clara est, quod etiam subinde in usum vocanda, & semper cum aliis miscenda, in specie quidem cum medicamentis ex anagallide & ex hyperico; item pilulæ ex laudano opiato & camphora, vel cum oleo camphoræ quacunque ratione paratæ, crebrius vespertino tempore, præmissis validis vomitoriis, exhibitæ. Ordinaria tamen dosis parum præstat, quin dupla aut tripla ferè conveniat. Quod si eorum usu sequatur somnus, res bona est, si verò non, deterius ferè habent ægri, cum turbulenti magis ac morosi exinde fieri soleant. Propterea benè, præsertim per alcalia, correctum saltem usurpetur opium, præsertim pilulæ ex laudano opiato cum oleo camphoræ singularissimæ sunt. Serum lactis denique pro potu frequentiori largiter concedi potest ceu optimum alterativum, nunc simplex, nunc medicatum. Essentia anagallidis, essentia fumariz, seu fumariz sero lactis infusa, essentia croci, hyperici, & ex his parata varia composita, spiritus secundæ humanæ, tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, & aliæ coralliorum tincturæ, hic admodum commendantur. Riverius ceu specificum in illustri quadam familia secretum hoc dicit esse *in sua Praxi*:

℞. Fol. Melissæ M. j.  
quæ minutim incisa infundit  
~ vini ℥iv.  
& addit  
Margarit. præp. ℥ss.

Dosis sunt cochlearia ij. quotidie repetendo.

Arcanum sanguinis humani commendat Faber *Curat.* 1. Nec saccharum Saturni, item crystalli mineræ Saturni, & balsamus Saturni, inefficacia planè hoc in passu observantur.

His omnibus semper camphora est addenda. Ex Paracello ab Hartmanno & Jonstonio admodum laudatur hujusmodi mistura.

Tom. II.

℞. Ol. Camphor. ℥j.  
Moschi ℥ss. ad ℥j.

Misce, & administra qualibet vice ℥ss.

Quid autem per hoc oleum musci intelligat, omnes ignorant; unde vel camphora in substantia à scrup. ℥. vel scrup. ij. & hujus oleum ad guttas viij. vel xij. propinatum sufficit, præprimis si opio connubant. Confirmat hoc Prævotius, qui dicit: oleum camphoræ cum bolo destillatum ad scrup. ℥. si propinetur, mirabiliter furorem maniacum intra aliquot horas sistere. Quò etiam facit mistura Fabri *in sua Pathologia*.

℞. Ol. Camph. per dissolut. ℥ss.

Ess. hni gr. x.

℞. gtt. vi.

Misc.

& cum aqua appropriata, vel, ut vult Langius, cum aqua spermatis ranarum, internè propinetur.

Sic quoque cum saccharo Saturni vel arcano duplicato Mynsichti propinari potest. Sine camphora immediatè videtur agere in spiritus, eorumque dyscrasiam ac motum efficaciter corrigere.

Nec tantum internè, sed etiam externè camphora utilissima est maniacis, capiti applicata, uti hoc constat ex epithemate ex sale prunellæ & camphora Riverii *Prax. lib.* I. *cap.* 13. Hinc enim ad capitis perturbationem sistendam,

℞. ∇ a fl. samb.

hyperic. aa. ℥ss.

Camph. gr. vj. ad ℞.

Misc. pro epithemate, crebro capiti applicando.

D. S.

**Eusserlicher Umschlag umbs Haupte.**

Vel ad imitationem Hillerii *in suis Observat.* qui ad maniam commendat ablutionem temporum tali liquore:

℞. ~ Vini ℥iij.

in quo dissolve

Camph. ℥ss.

Misc.

Huic spir. vini imponit nodulum ex Opii ℥ij. & Moschi gr. jv.

Hoc ipso liquore tempora frequenter ilinenda, nodulus verò subindè odorandus est ad extinguendum furorem maniacum, & blandum somnum conciliandum.

Pertinet huc experimentum Penotti, cui etiam adstipulatur Clusius, quibus mirè sisti phreneticos & maniacos asserunt, applicando præmissis universalibus:

℞. Moschi gr. xij.

Camph. ℥j.

∇ a Rosar. rubr. c. Tinct. santali rubri impragn. ℥xv.

(T t t t 2)

Mista

Mista probè & capiti derafo cum linteis multiplicatis, temporibus & per omnes futuras applicetur, ubi linteum iterum siccatum fuerit de noxo humectetur, & applicetur, & ita per 24. horas continuetur. Conf. Rive-  
rus *loc. all. cap. 11.*

Capiti & temporibus etiam facculus ex baccis lauri, hellebori nigri cum decocto herbarum cephalicarum admovendus, modo illo, quem Hartmannus *Prax. pag. 56.* describit.

Aliàs etiam in mania commendatum est externè epithema Rulandi quod *Curat. lib. 1. pag. 14.* describit, & Thonerus in *Observat. pag. 260.* commendat tanquam à se maximè expertum:

℞. *℥a Rosar. 3x.*  
*Opii drachm. ʒ.*  
*Croci scrup. ʒ.*

M. pro epithemate, fronti & temporibus admovendo.

Aqua spermatis ranarum erit melior loco aquæ rosarum. Excellens est epithema hoc, cuius usu non semel ad se redierunt maniaci, dicit Thonerus *lib. 5. Consil. 10. pag. 260.* Camphora addenda foret. Nam in capitis perturbationibus melancholicis & quasi maniacis simplex hoc epithema aliquoties cum fructu applicavi:

℞. *Sem. Papav. alb. ʒiij.*  
*℥ fl. Nymph. vel samb.*  
*Verben. vel flor. hyper. ā ʒiʒ.*  
f. Emulsio. adde

*Camph. gr. 1x. scrup. ʒ. ad gr. xij.*

M. pro epithemate aliquoties applicando.

Quin & solus succus cancerorum fluviatilium expressus instar epithematis applicatur.

Aut ipsi cancri viventes contusi instar cataplasmatum apppositi fronti ac temporibus expertum esse remedium, una cum aliis in mania & phrenitide dicitur, modò perferant ægri. Sanè retulit mihi quidam, se per hoc ipsum servum suum maniacum solum ferè curasse. Non minus quàm decoctum musci tectorum fronti applicatum admodum commendatur ad curam mania, sed observetur, quod cautè applicandum sit & non nisi urgente summa necessitate. Omnia epithemata, præmissis præmittendis, dum nempe furor maniacus fuerit mitigatus, applicentur.

Porro cerebrum canum, imprimis juniorum commendatur à quibusdam insigniter. Exemplum videbitis in Sennerto *lib. 1. Prax. cap. de Mania pag. 421.*

Tandem etiam nonnunquam observatum est, immersione subitanea in aquam frigidam vel fluvium maniacos restitutos esse præmissis præmittendis, quod non ita absurdum videtur. Alii aquam tepidam, alii frigidam volunt, sive dulcis sive salia fuerit, vid. Be-

nedictus Sylvaticus *Cent. 1. obs. 54.* & Faber *Myrothec. Spagyric. Curat. 1. & 8.* Verùm non tam balneatio simplex, quàm improvisa in aquam demissio, & hinc orta formido seu terror, effectum desideratum præstat, simili ferè ratione atque rabidi curari solent; id quod experientia crebriori confirmatus suadet Helmontius *Tr. Deniens Idea §. 49.* Conferri etiam potest Borrichius *de Hermet. Medic. pag. 168.* In pavore mortis enim fiunt placidi & tremuli, & phantasma mortis in aliud mutatur. Nempe furorem maniacum subita alteratio ex inducto gravissimo terrore extinguit, sed tamen melancholia adhuc remanet.

## ARTICULUS IV.

De

### *Deliriis à causa externa.*

Sequuntur jam deliria à causa externa, quæ ipsæ causæ externæ singulari virtute spiritus animales determinant, adeò ut ex iis lædatur imaginatio, ac subinde stupenda & miranda inducantur deliria. Hæc sunt duplicia: vel

1. à morfu animalium iratorum, & in specie rabidorum; vel
2. ab absumptis malignis narcoticis.

Illic rabies & hydrophobia, hic philtre sunt consideranda,

## MEMBRUM I.

De

### *Rabie.*

Hæc inter præ ceteris eminet, præter vegetabilia narcotica, morsus animalium rabidorum ac venenatorum, in specie morsus canis, seu frequentissimus, unde delirium rabiosum seu rabies oritur, in specie mirabile adjunctum symptoma, hydrophobia. Rabies autem est talis affectus, in quo ipso simul homo planè rabiosus redditur, & omnino in mores brutales transmutari videtur, ut nihil ferè humani apud se retineat, quin homo rabiosus exactè illius bruti mores, gestus, &c. referat, à quo rabido demorsus fuerit.

Frequens imprimis est canina rabies, excitata à morfu canum rabidorum, cum præ reliquis brutis canes frequenter rabidi fiant. Præter canes tamen etiam feles, galli gallinacei, lupi, equi, muli, & similia animalia, fiunt rabida, quorum non raræ prostant observationes: Sic enim de mulo rabido refert Schenckius *lib. 7. Observ.* quod mulus rabidus flumen tranans ac assatim potans fuerit curatus: Sic etiam boves interdum fiunt rabidi, idque imprimis à cane rabido demorsis, teste Bartholino *Cent. 2. Hist. 89.* qui etiam *Cent. 5. Hist. 52.* varia habet exempla vario-  
rum



rum animalium rabidorum, in specie rabiei humanæ ex morfu galli gallinacci; & conferatur simul *Cent. 3. Epist. pag. 199.* ubi habetur rabies equorum, qui natando in mari curati sunt. Nec solum per morsum ab animalibus rabidis reddimur nos homines rabidi; sed etiam ipse homo, aut jam rabiosus factus, aut sine rabie, modò graviori ira sit percitus, morficando alios similiter potest reddere ferè rabiosos, aut si non rabiem, revera læsiones malignas ac admodum periculosas intert: Nam, uti rectè refert Hildanus *Cent. 1. Observ. 84.* morfus ab homine rabido malignus est summe, & noxius, & non secus ac morfus à cane rabido curandus; item Beccherus in *Microscop. Med. lib. 1. cap. 3. pag. 10.* observat hydrophobiam ex morfu humano obortam. Et notabile exemplum habet Bartholinus *Cent. 2. Hist. 89.* de muliere hydrophobica in Belgio, in Rheno abluta, quæ cum in curru in civitatem reversura vomeret, animam simul evomuit; socia verò venenato vomitu adpersa quinto abhinc die exspiravit: vid. etiam Zacutus Lusitanus *lib. 3. Prax. Admir. Observ. 88.* qui observat mortem ex morfu hominis irati. Nam omnium animalium iratorum morfus, & adeò etiam hominis, est venenatus & malignus, ut rectè hoc suo tempore observat Celsus. Id quod pluribus confirmat Hildanus *Cent. 1. Observ. 86.* ubi præter morsum feræ, etiam hominum iratorum morsum lethalem, vel saltem venenatum, pronunciat. Vid. etiam *Diff. nostra de morfu Viperae*, & Hildesheim in *Spicil. cil.* Ex hoc ipso tamen non sequitur, venenum animalium solùm consistere in idea furoris, morfu in archæo nostro sigillata, quæ post mortem cessante etiam venenum animalibus deficiat, quæ est sententia Helmontii in suis scriptis, cujus vestigiis etiam insistit Zwelferus. Contrarium, nempe revera in subiecto materiali hæere venenum animalium, ostendit Rhedi de *Vipera*: cui licet se opponat Charas *Tr. Experiment. de Viperis*, qui Helmontii hypothesin defendit mordicus, nihilominus tamen & huic satisfactum est à jam laudato Rhedi in *Epist. Respons. 1.* Vid. in *Ann. 2. M. A. N. C. Append.*

In his rabidis notatu digna quædam occurrunt: (1) quod etiam levissimus morfus, levissima læsio, vel etiam tantillus salivæ contactus, receptus in homine ab animali rabido, nihilominus suo tempore rabiem inferat, ut refert Hildanus *loc. cit.* ubi quidam à sefe rabido sola sculptura per unguem in dextro pollice, vix epidermide læsa seu affecta, nihilominus tamen rabiosus in summo gradu factus est, & omnia symptomata morsum canis insequentia perpessus fuit: *loco citato* idem refert Hildanus de muliere, cujus vestis à cane rabido fuit lacerata, unde mulier consuendo

vestem laceratam filum dentibus amputavit, & sic post tres menses hydrophoba facta periiit: Par ferè est exemplum, quod ex alio auctore refert Hildesheim in *Spicil. pag. 193.* cujusdam sartoris, quæ cum chlamydem rabidis morfibz scissam sarciendam tumeret, atque ore stamina componeret, & linguâ pannorum futuras lamberet, tertiâ die rabiosam factam esse. Imò levis tantùm resperio aut aliqualis saltem contactus idem malum infert: Quin & infusio silicis à cane rabido demorfi potest hominem furiosum & rabidum reddere, teste Borello *Cent. 4. Observ. 22.* Mirabilius est, quod *c. l. Observat. 83.* refert, quendam cum gladio vulneratum, quo ante octo annos canis rabidus occisus erat, post triennium rabidum interiisse. Matthiolus asserit, se duos vidisse, qui spumâ tantum perfusi, nullo accepto ex morfu vulnere, rabiem contraxerint: Facit huc exemplum Codronchii & Palmarii, de *Morb. Contag.* qui inquit: *Vidi ex straminis, in quo rabie perciti sues decubuerant, esu, equos, boves, oves, & reliqua animalia, quæ stramina degustassent, rabiem contraxisse, tandemque periisse.* Rusticus quidam rabie percussus, cum brevi sibi è vivis emigrandum intelligeret, assidentes rogavit, ut sibi liberos exosculari liceret, quod cum fuerit concessum, liberisque oscula vibraasset, extinctus est: intra septem verò dies & noctes liberi eadem rabie percussi, iisdemque cruciatibus torti, brevi interierunt. Cardanus testatur, Venetum Patricium exosculatione canis rabidi, quem amabat, antequam mitteret ad occidendum, rabidum fuisse factum: item Zacutus Lusitanus *lib. 3. Prax. Admir. Observ. 82.* exosculatione demortui canis rabidi rabiem contractam refert. Adeò penetrans, & adeò malignum est istud seminium, quod rabiem infert.

Præter hoc, (2) notabile est in rabie sive morfu rabiosorum symptoma, hydrophobia, sive liquidorum omnium fuga & metus, qui omni rabiei, à quocunque malo ortæ, solet esse conjunctus. Nempe tales ægri non possunt ferre liquida, sed aspectu eorum contremiscunt toti, anxietatibus affliguntur, & miserabiles torturas perferunt; imò potius sitit intereunt, quàm tantillum humidi gustent. Proprium ergo videtur rabidis, ut aquam metuant. Nihilominus tamen, an solùm animalium rabidorum morsum sequatur hydrophobia? res adhuc dubia ex eo videtur, quoniam prostare videntur auctorum observationes, citra animalium morfus eas esse ortas. Exemplum recenset Marcellus Donatus *Med. Hist. Mir. lib. 6. cap. 1.* item Platerus *lib. 1. Observat.* de femina quadam, quæ noctu extra urbem relicta, ac solitudine territa, domum reversa nihil liquidi deglutire potuit, quin illis oblati suffocationis periculum

(T t t t 3)

culum incurrit, & octavâ die extincta est: Conf. Borellus *Cent. 3. observat. 38.* Sic hydrophobiam in febre maligna citra morsum animalis rabidi obortam refert Salmuth *Cent. 2. observ. 52.* de quo etiam videndus Codronchius in *Tract. de Hydrophobia cap. 10.* Duo exempla admodum notabilia hydrophobiæ gravioris in febribus malignis enatæ quartâ, item quintâ, die citra morsum alicujus animalis seu canis rabidi, habet Sanchez in *suis Operibus Med. in observat. pag. 378.* Et in mulieribus vitio uteri hydrophobiam sine morfu canis rabidi annotavit Sennertus *Prax. lib. 4. pag. 277.* vid. etiam *lib. 6. part. 2. cap. 5. pag. 81.* Verùm in his ipsis hydrophobiis, sine faucium aut gulæ ulla affectione, etiam citra morsum animalis rabidi enatis, adhuc hæreo dubius, annon aliquando morsus quidam à cane rabido, aut contagium seu inquinamentum ab animali rabido præcesserit? Nam notum est, quod tantillus ex saliva animalis rabidi contactus inferat hydrophobiam, utut sæpius per decem vel plures annos contagium hoc lateat in corpore, antequam virtutem suam exserat, quod ipsum ulterius adhuc investigandum venit.

(3) In rabie notabile est, quod contagium rabiei istud malignum, ab animalibus rabidis communicatum, subinde ad biennium & triennium, item ad plures annos, absconditum lateat in corpore, donec evigilet, & in actum secundum erumpat: vid. Sennertus *Prax. lib. 6. part. 8. cap. 30. pag. 353.* Sic Lindanus *super Hartman.* refert exemplum hydrophobiæ lethalis in agyrta decimo tertio anno post morsum canis rabidi eventientis: & Borellus *Cent. 1. obs. 74.* refert, quendam septem annis demum à mortu hydrophobum factum esse: Alius in crure morsus & curatus, longo post tempore tamen eodem die, & in eodem loco, in quo morsus fuerat, dolore magno in parte demorsa correptus fuit, veneno quasi per integrum annum in eodem loco sopitò jacente: Imò per viginti annos hydrophobiam occultatam videb. in M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. obs. 43.*

(4) Notabile est, quod subinde animalcula generentur vel conspiciantur in saliva vel lotio animalium rabidorum, similia iis quodammodò animalibus, à quibus rabies fuit inducta; unde v. g. vermes catelliformes, aut capitulis catulorum similes in urina taliter ægrotantium observarunt. Notarunt hoc jam suo tempore veteres Arabes, in specie Avicenna & Avenzoar, quod tamen rarum est. Fidem facere aliqualem videretur exemplum illud notabile Salmuth *Cent. 2. obs. 83.* de muliere, quæ fuit in fimbria vestis morfa seu lacerata à cane rabido, & ista fimbria saliva adpersa; Unde mulier suspendit vestem laceratam aëri libero, ut exsiccaret, & post

unum vel alterum diem in loco, ubi fuit saliva, percepit parva animalcula, quorum capita simillima fuerunt capiti canino: Mulier verò à canis morfu rabida octodecim frustra catellis similia per alvum ejiciens, refertur in M. A. N. C. *Ann. 8. obs. 58. pag. 95.*

Denique (5) notabile est, animalia rabida, quæ fiunt rabida ab alio animali rabido; v. gr. homo rabidus, qui ab alio animali, per morsum nempe canis, vel felis, fit rabidus, exactè imitari istorum animalium rabidorum antea lædentium mores & actiones, latrando & ringendo instar canis, vel morficando & lacerando instar felis: Sic Colle in *Cosmitore Medico pag. 319.* refert rabiem à morfu felis in indice digito, post duas horas lethalem, in quâ æger volebat mordere: Quò facit curiosa Borelli *Observatio Cent. 3. observat. 68.* de quodam à cane rabido demorso, qui non tantummodò subito factus est rabidus, sed simul etiam instar canum adeò sagax, ut accedentes amicos, etiam adhuc aliquatenus è longinquo, quamvis non videret, tamen odorari & nominare potuerit: vid. quoque *Cent. 1. observat. 74.* & Rhodius *Cent. 1. observ. 46.* Sic qui à fele rabida redduntur rabidi, mores felinos sono oris, unguibus & digitis mutuo in alios invadendo imitantur, vid. Kircherus in *Scrutin. Pestis, loco supra citato.* De quo ipso, ut & aliis subinde apud Practicos observabilibus sit fides penes autores.

#### C A U S Æ.

Quod attinet causas hujus rabiei, & factæ inde transplantationis motum animalis lædentis in animal læsum sub tantillo contagio, istud à nemine hætenus perspicuè explicatum fuit. Præ reliquis tamen curiosè & acutè rem attigisse videntur idearum assertores, nempe Helmontius *Tr. Demens Idea, de Morbis Idealibus,* & simil. & præsertim Marcus Marci in *Philosophia Veserum Restituta*; item David von der Beeke / & qui talem sequuntur doctrinam, quod nempe ideæ seminales transplantentur ab animali rabido in animal quod lædunt, mediante contagio spirituosum, à quibus ideis archeus animalis læsi determinetur ita postmodum, ut pro illorum directione, & non aliter, operari queat: Nec adeò abluere videtur Borellus *Cent. 1. observ. 74.* dum vim seminalem veneni accusat. Hi ipsi quidem præ ceteris omnibus nonnihil plausibiliter rem explicant; sed idealis hæc hypothesis, utut subtilis admodum & prima facie plausibilis videatur, illis tamen, qui intelligibilem, seu, ut vocant, sensatam amant Philosophiam, nullo modo satisfaciunt. Nam si ad ipsum fundamentum perveniamus, est hæc hypothesis simpliciter idealis. Unde & hic profitendum est, aquam in hisce nobis

bis hærere, & rem à priori non esse explicabilem.

Doctrinæ gratia fermentum hîc peculiare accusamus ab animali rabido per morsum communicatum: nam, quod alii de veneno peculiari habent, id omne ad fermentum est applicandum. Hoc fermentum ideas, ab animali furente impressas, homini communicat, primariò spiritus animales, quod etiam confirmant pathemata convulsiva; secundariò massam sanguineam afficit, ita ut ferè similes evadant spiritibus & sanguini animalis furentis: hinc fieri non potest, quin easdem quoque actiones edat, quas canis v. g. aut aliud animal rabidum edit. Notandum autem, animalia in se venenata non esse, hinc neque omnis morsus rabiem parit, sed animalis, aut irati aut rabidi; ira enim & furor nocent, & ita maximam partem ideale est; tamen & his adjuncto fluido aliquid acrimoniæ malignæ subesse, confirmat cura per cancrina, terram sigillatam, radicem gentianæ, &c.

Causa occasionalis & propinquior est saliva fermentescens & effervescentes, per morsum insimul vulnere infusa, systemati nervoso, & hinc spiritibus ac massæ sanguinæ communicata; hinc nisi vulnus sit factum, ita ut spiritus animales afficere possit, furor non fit.

#### DIAGNOSIS.

Hiscæ relictis pergo propiùs ad ea, quæ potiùs praxin spectant, ubi ante omnia observandum: an animal, v. g. canis, fuerit rabidus, qui momorderit, vel à quo quis demorsus, rabiosus fuerit, an non? ut nempe præcaveatur imminens tandem rabies. Quod ut cognoscatur, nonnulli accuratiores in hoc puncto præcipiunt, ut nuges jugulandes recentes contritæ imponantur vulnere factò, & ad aliquot horas super vulnere relinquantur, quæ postmodum devorandæ objiciuntur gallo gallinaceo vel gallinæ: Quod si animal non fuerit rabidum, gallina non moritur; si verò fuerit rabidum, altero die interit.

Idem applicandi & judicandi processus est de sanguine: quando alii sanguinem, vel per se, vel per scarificationem, ex vulnere eliciunt, ex eoque cum farina pastam formant, & gallinæ objiciunt, quæ si moriatur, signum est, animal fuisse rabidum.

Simili ratione Avicenna præcipit medullam panis vulnere factò affricare & applicare, & sanie vulneris imprægnatam postmodum cani objicere devorandam; nam si illam medullam non comedere neque olfacere voluerit, aut si moriatur, signum est, fuisse rabidum.

Ipsam canem esse rabidum facillimè ex eò cognoscitur: quod tales canes rabidi omnem cibum & potum avertentur, multam materiam viscidam sputumque circa

dentem, linguam & fauces habeant, interdum ex ore & naribus emittant, torvum videant, oculos habeant rubentes & igneos, quoscunque obvios invadunt, notum pariter & ignotum similiter lædunt.

Uterius canes rabidi sunt macilentî, caudam demissam sub ventre reflectunt, linguam exserunt, eamque rubram, sæpiùs croceam, interdum nigram, velociter currunt, & sub isto cursu in obvia quæque impingunt, omnes alios canes adoriuntur, & omnes alios fugant.

De cane rabido vulgo affirmatur, sub lingua ejus latere vermem quendam oblongum, quem alii à se ipsis visum testantur, quo maturè dempto nullus canis rabidus fiat; eodem verò incrementum, rabiem necessario supervenire; unde quidam ad præcautionem solent extrahere hunc vermiculum; quidam existimant, non esse vermiculum, sed pro sanguinis congrumati particula in venis ramis sub lingua collecti & stagnantis habent. Rem hanc ceu nondum sufficienter exploratam in medio relinquo.

Interim rabiei & impotentia lumbaris causa in lupis, vermes copiosi, in eorum renibus & aliis locis geniti, observati fuerunt: vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 193. *pag.* 365.

Ubi contagio inquinatus fuerit homo, in specie morfu, sive mox sive post plures annos etiam afficiantur rabie & hydrophobia, rabiei incipientis & etiam jam factæ signa sunt; si se offerat anxietas præcordiorum, iracundia citra causam manifestam, si conqueratur æger de molestia aëris ambientis, de corporis gravitate & ineptitudine in actionibus & variis impedimentis, aut de inquietudine, ægri sunt solitarii & morosi, mœsti, tristes, uno nomine melancholici, semper murentur; subinde lucem fugiant, & abstineant à potu.

In parte olim vulnerata solet adesse aut sentiri morsicatio & titillatio, aut etiam quidam dolor.

Quod si jam perfecta rabies inchoet, adest membrorum distensio & quasi convulsiva explicatio corporis, facies rubet, ægri sunt anxii, spumant circa os, oculos horridos habent, quidam lairant instar canum, si à cane rabido morfi sunt; collum & fauces ringunt, & si à cane sit, obviam factos invadunt, & dentibus impetunt; sin à fele, unguibus lacerare tentant, & denique omnibus commune est, ut liquida & aquea horreant, quorum præsentia etiam admodum anxiosi, interdum etiam convulsi fiunt, deliquium quasi animi patiuntur; quin imò nunc vociferant, nunc ferè sonos edunt, lædentibus eorum bestiis similes, nunc sibi propiores lædunt & infestant, facie sunt horribili, sine ullo somno, inquieti, loca tenebrosa amant, &c.

Febris



Febris rabiosis interdum adest, interdum abest; utut Palmarius existimet, rabiei perpetuam esse comitem febrem.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Imminens rabies, aut jam incipiens, appropriatis remediis curari potest.

Si verò jam perfecta rabies adsit, præsertim cum hydrophobia, est affectus satis acutus, qui rarò perfectè curatur, & spes in angusto hæret; quin sæpillimè, si diutiùs lateat in corpore seminum rabiolum, homines jugulet, sæpiùs nempe secundo vel tertio, ad summum quarto die ab eo tempore, quò hydrophobia eos corripuerit, moriuntur.

Antequam verò rabies post læsionem insequatur, observandum est, quod quando in principio, ubi sanguis copiosè è loco vulneris evacuatus & extractus fuerit; item si largiter fluxerit sanies, aut ipsum vulnus recens ritè tractatum sit, spontè vel sudor multus, vel urina, præcipuè nigra, evacuetur, præservari potest rabies & hydrophobia. Nam quò diutiùs vulnus factum apertum fuerit servatum, eò minor metus adest: Econtrà post factam ejus consolidationem ineptam, citiorem justo scilicet, & quò magis fermentum rabiosum intraverit partes nerveas, eò certius hydrophobia metuenda est. Unde præservativè possumus aliquamdiu ægros detinere.

### C U R A.

Hanc quod attinet; in hac duo tempora observanda; (1) ipsum tempus primæ læsionis seu vulnerationis & inquinamenti, facti ab animali rabido: (2) tempus ipsius rabiei supervenientis, ubi, licèt diu consolidatum sit vulnus, nihilominus tamen venenum jam tum in actum secundum deducitur, & delirium inducitur; ipsiusque adeò hydrophobia, ejusque vel imminens, vel jam præsentis.

1. Ergo quoad prius tempus, ex vulnere facto, quantocyùs fieri potest, malignum virus per morsum, extrahendum aut delendum, & ob id hujus sanatio non adeò citò perficienda. Quod ipsum vulnus à rabido animali inflictum attinet, quantum fieri potest, apertum servandum, ac præsertim id, quod de saliva adhæret, magno studio removendum: Quem in finem vulnus est ampliandum, ut cum sanguine saliva potiùs effluat, quam retrocedat.

2. Quoad posterius tempus: observandum est, ut venenum rabiosum, quacunque ratione communicatum, sive jam adhuc recens, sive jam inveteratum fuerit; sive ipsam jam rabiem indu-

cere incipiat, per appropriata, vel sudorifera, vel diuretica, aliisve mediis per experientiam cognitis, extinguatur.

Pro his scopis obtinendis, in posteriori, scilicet rabie, id unicè agendum, ut fermentum massam sanguineam jam occupans ex corpore expellatur. Ea autem, quæ huic fermento contraria sunt, & venenum expellunt, sunt interna alexipharmaca, tam communia, quam specifica per experientiam cognita, quæ conveniunt tam præservativè, quàm curativè. Nam propter rationem rabiei adhuc incognitam non possumus invenire remedia à priori. Appropriata talia sunt in specie radix gentianæ, vincetoxici, alysson Galeni, ruta, hypericon, pimpinella, carduus benedictus, & in specie carduus fullonum, salvia, betonica, myrrha, & similia. Ex his ferè primatum obtinet alyssum verum Galeni, quò jam suo tempore Galenus curavit suos ægros; quamvis, quid hoc propriè sit? dubium inter autores existat: cujus tamen descriptionem restauratam videb. in ultima editione Tabernæmontani pag. 928. sub nomine alyssum primum Hispanicum Galeni. Ex his & similibus conflatus est pulvis Palmarii cap. 3.

Præter Palmarium felicem hujus pulveris usum expertus est Sennertus lib. 1. *Prax. Part. 2. cap. 16. de Hydrophobia*, item Timæus von Guldenslee in *Epist. lib. 5. Epist. 17. pag. 376.* Ex similibus ferè etiam concinnatum est euporiston illud infallibile contra morsum canis rabidi in Bartholini *Act. Med. Hafn. Vol. 2. observ. 110. pag. 275.*

Aliàs semen cardui benedicti, & lactei seu cardui Mariæ, & quod præstantiùs habetur, cardui fullonum seu diplaci, ad ʒij. pro dosi aliquoties manè assumptum expectato sudore, tanquam egregium specificum experimentum commendatur à Lindano *super Hartman.* Item contra morsum à cane rabido radix vincetoxici ad ʒiſs. vel ʒij. cum aqua cardui benedicti ad 40. dies omni manè propinata laudatur à quibusdam specificè contra morsum canis rabidi, expectando sudorem, vehicula, in quibus assumuntur hujusmodi pulveres, optima sunt aqua scordii, aqua cardui benedicti, uti aqua tormentillæ, theriacalis, rutæ capraræ, cancerorum fluviatilium, & similes cum spiritu theriacali.

Porro terrasigillata, item terra Lemnia, & imprimis terra S. Pauli seu terra Melitæa itidem internè ad morsum canis rabidi conducunt. Theriaca etiam & theriacalia, Mithridatium, electuarium de ovo, &c. præcipuum obtinent locum, & sunt in frequenti usu, à ʒj. ad ʒij. assumpta. Sed præ his magistralibus compositionibus præ ceteris theriaca diatessaron est præferenda, quoniam ejus quatuor

tuor ingredientia, nempe gentiana, myrrha, &c. terè sunt specifica contra morsum canis rabidi. Hoc ergò, modò cum opio acuetur, erit remedium maximè appropriatum ad rabiem. Aliàs mistura simplex laudatur ab Hartmanno, propinandum cum copiosa aqua cancerorum fluviatilium, aqua Poterii; prout B. D. Michaëlis tincturam bezoardicam, vel misturam simplicem non absque successu, propinare consuevit fuit; item essentia theriacalis, cum essentia absinthii; sed omnia in dupla dosi exhibenda.

Ab his autem alexipharmacis per integrum anni quadrantem non est desistendum: Nam sæpe post 40. dies, aut aliquot menses interdum & post integrum annum, iterum se prodidit hydrophobia.

Quodsi verò sudoriferorum usus intermitatur, tamen specifica adhuc aliquamdiu continuanda. Lapilli cancerorum unum ex optimis specificis sunt, unde & bezoar rabidorum audiunt.

Nam si quid aliud, in cancris fluviatilibus est vis certa & specifica contra morsum canis rabidi, jam à Galeni tempore laudata. Recipiuntur nempe cancri, non isti, qui dicuntur gammari seu astaci, seu qui caudis sunt longis; sed eligendi sunt speciatim cancri non caudati seu rotundi, *Taschen-Krebse* / quales reperiuntur ad loca maritima, tam in Italia quàm Belgio. Hi enim sunt genuini cancri ad morsum canis rabidi à veteribus commendati; conf. Bartholinus *Cent. 2. Hist. 89.* quorum tamen defectu etiam nostrates cancri fluviatiles non penitus privandi sunt virtute contra morsum canis rabidi. Nam loco cancerorum fluviatilium etiam testæ ostrearum superiores calcinatæ, simili modo applicatæ & usurpatæ, proficue sunt. Colliguntur cancri post ortum canis seu tempore canicularium, quando sol leonem transit, v.g. 18. Julii capti, & calcinantur vivi; quorum cineris dantur 3j. vel 3ij. & pulveris gentianæ 3j. & in cyatho vini boni propinatur ægro, expectando bonum sudorem, idque repetierunt tam in metu imminentis quàm præsentis rabiei. De hac præparatione, & præparationis ratione, vid. Palmarius *loc. all.* & Schenckius *Obs. pag. 856.* Ne autem sub calcinatione oleum & sal volatile pereat, melius est, ut tales cancri, sique vivi probe contusi, destillentur per alembium in Mariæ balneo, ut ita accipiat aqua cancerorum, adco à Poterio decantata in *Pharm. Spagy. pag. 47.* Id quod remanet, seu pulvis cancerorum, postmodum pro usu interno etiam usurpari potest à 3. ad 3j. cum aqua destillata propria jam dicta, vel succo cancerorum fluviatilium, in specie addito pulvere radicis gentianæ, vel pimpinellæ.

Juxta quem pulverem etiam modò dicta

aqua destillata, item decoctum cancerorum, ut & succus, commodè usurpari potest, quæ optima sunt vehicula remedium contra hydrophobiam. Pertinet huc pulvis Heurnii expertus contra rabiem:

℞. Rad. Gentian. drachm. ij.  
 ℞. fluv. calc. drachm. iij.  
 7a Sigill. 3ß.  
 M. f. Pulvis.

Hujus pulveris compositi drachm. j. præber in decocto cancerorum fluviatilium imperando sudorem, subinde repetendo.

Vel secundum Henricum ab Heer,  
 ℞. Pulv. Gentian.

Myrrh. aa. 3j.

℞. fluv. d. m. præpar. 3ij.

M. cum vino, vel decocto vel aqua cancerorum fluviatil. imperando semper sudorem, dosis est 3ß. ad 3j.

Conf. Bartholini *Act. Med. Hafniens. Vol. 2. Observ. 110. pag. 276.* & Sachlii *Gammariol. lib. 2. Sect. 3. pag. 638. sequ.*

Præter dicta radix rosæ lyvestris seu cynorrhodi jam ab antiquissimis temporibus est commendata. Sunt tamen, qui præferunt huc radici spiritum seu essentiam vermiculorum cynosbati. Aliàs experimentum Stæckeri, quod nunquam eum decepit, uti asserit, est sequens, idque contra quoscunque animalium, tam venenatorum quàm rabidorum morsus:

℞. Gentian. pulveris.  
 cum Theriac. ana 3j. miscuit.

Tribus diebus continuis, omni manè propinavit, jejunando desuper vel quinque vel sex horas, simul expectando sudorem. Super morsus verò locum allium, rutam & sal, eaque contusa & mista in forma cataplasmatibus, apponit.

Uterius medicamenta, quæ ipse canis rabidus suggerit, præ cæteris sunt laudata, quæ ratione sanguis canis rabidi pulverisatus, & per triduum dosi drachm. j. usurpatus, certò juvare rabiem & hydrophobias dicitur à Palmario *loc. all.* Item crines vel pili canis rabidi, quos præter Palmarium commendat Schmuckius, vel cor & hepar animalis mordentis decoquantur & patienti propinentur; vel in pulverem redacta dentur ad 3j.

Præ cæteris optima cura est immersio ægri in aquam frigidam, quod remedium ceu expertum ubique commendat Helmontius in *Tract. Demens Idea pag. 278. §. 47. 48. & 49.* Confirmatur etiam per experientiam Foresti *lib. 10. Obs. 27. & 28.* item Tulpii *lib. 1. Obs. 20.* Schenckii *lib. 7. Observat. vid. etiam Pareus lib. 20. cap. 14.* Remedii hujus prima vestigia reperiuntur in Celso, qui tales ægros in piscinas injiciendos suadet. Et quidem circa hanc submersionem notandæ sunt duæ circumstantiæ:

(Uuu uu)

1. Ex



1. Ex improvise immergendi ; &
2. Aliquamdiu ita relinquendi sunt tales ægri sub aquis, ut post terrorem injectum ex suffocatione imminente eò efficacior pavor mortis ipsis imprimatur, sicque felicius idea deletur, & delirium curatur.

Immersio ista fiat bis vel ter pro ratione circumstantiarum, si multi fuerunt curati.

Controversia est aliàs inter autores, an convenient purgantia in & circa curam hydrophobiæ & rabiei? Et notandum, quod per se nihil conferant, quia humores exagitant, & ab habitu ad interiora venenum derivant; econtrà solà appropriata alexipharmaca, imprimis sudorifera, sufficiunt, & utramque absolvunt paginam. Nihilominus tamen si sit jam longum tempus, ex quo æger fuerit commorsus, & tamen nondum perfectè sit rabiosus, utut signa imminents rabiei se manifestent, ægerque talis non evacuatus fuerit, in his & similibus casibus pro metu subsequents rabiei felicius tollendo utilem commendant catharsin per superiora aut inferiora, scilicet helleborum album & nigrum, item agaricum, utpote quæ vim simul alexipharmacam habent; vid. Sennertus *Prax. lib. 1. Part. 2. cap. 16. Quæst. 3.* Nam testatus est jam suo tempore Dioscorides catharsin his tantum opem ferre, qui jam hydrophobiam seu aquæ metum incipientem tantummodò sentirent: Et sumpto helleboro simul ac primum morbi impetum experirentur, cum impetu expurgati, multi certa experientia fuerunt servati: Sic quidam referunt, multos canes rabiosos helleboro cum polento accepto vomuisse, & statim à rabie liberatos ad se rediisse. Hinc post helleborum etiam Hiera, quæ colocynthidem recipit, non parum commendatur. Palmarius affirmat, se multos nosse rusticos, qui propinato pharmaco vehementi, quo una eademque operâ suprâ & infrâ supervacanea omnis generis è corpore excluderentur, ab hydrophobia evaserint.

Post purgantia faciunt huc simul fortiora diuretica, per urinam, præsertim cruentam, virus alterantia & eliminantia: quæ inter Valeriana, imò cantharides vim specificam obtinent. Hos Avicenna commendat contra rabiem & hydrophobiam, ut etiam asserat, si rabidus exinde sanguinem minxerit, securum esse ab hydrophobia. Quibus vulgo nostrates scarabæos Majales, & vermes Majales substituunt: vid. Sennertus in *Praxi Part. 2. lib. 2. ubi de rabie pag. 440. & 441.* Remedium Avicennæ hætenus apud Practicos sepultum est, cujus tamen mentio fit in *M. A. N. C. Ann. 1. Observat. 133. & in Append. pag. 32.* ubi cantharides ab Ungaris in aceto fortissimo asservantur, & postmodum

N. 4. 5. vel 6. in haustu spiritus vini contra venena rabiosorum animalium sine dysuria aut mictu sanguineo propinantur; unde saltem per fortem diuresin liberati sunt. Sicuti etiam in dictis *M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 302. pag. 524.* prostant exempla rabiei beneficio scarabæorum aut vermium Majalium curatæ. Alii recipiunt cantharides vel scarabæos pulverisatos, cum melle miscent & asservant, & propinant ad unc. j. Vid. Sennertus *l. 4.*

Quod vulnus à rabido animali inflitum attinet: hoc ipsum, dum recens est, non statim claudendum aut sanandum, sed aliquamdiu apertum servandum, vel ampliandum, quantum fieri potest, ut cum sanguine saliva potius effluat, quàm retrocedat; aut id, quod de saliva adhæret corpori, licet non vulnerato, diligentissimè & magna cura est removendum, ut omnis virulentia beneficio tumoris, inflammationis & suppurationis ex ipso loco eliciatur. Et quidem in specie maturanda sunt auxilia chirurgica; nam nisi primis statim horis ac diebus fuerint adhibita, ut virus malignum citò contrahatur, alio tempore in cassum ferè adhibentur, quando scilicet virus jam ad interiora penetravit. Ob id statim est properandum, & imponendi sunt primo pili canis ipsius rabidi, qui tanquam singulare experimentum vulnere, à cane rabido inflito, apponuntur ex Pareo, ut venenum magneticâ vi extrahatur; id quod etiam confirmat Schmuck in *Curationibus Magico Magneticis pag. 38.* vel theriaca cum succo rutæ & alio subacta, morlui imponitur, conf. Wedelius *de Med. Facult.* Præ cæteris cepæ sub cineribus assatæ, & cepacea vulneri imposita, multum conducunt, præmissa in loco affecto scarificatione: sic enim Amatus Lusitanus *Cent. 5. Curat. 45.* puerum duodecim annorum in crure à rabido animali demorsum ita restituit, dum accersito chirurgo locum læsum profundioribus incisuris scarificare, & calido vino vel aqua salina lavare jussit: hinc loco optimè absterfo hoc cataplasma admovit:

℞. *Cepam acrem* No. j.

*Alliorum capit. 5. radicem mediam.*

*Theriaces opt. 3vj.*

*Fermenti 3℔.*

Omnia pistentur, & loco affecto forma cataplasmatidis supponantur: quibus puer brevi sanatus est.

Helidzus Paduanus, præmissa loci scarificatione cepam cum melle contusam simpliciter imponit; vel loco mellis cepam cum theriaca subactam, & ita morlui applicat, aliquot dies continuando. Horstius *lib. 7. Observat. 23.* commendat emplastrum ex alio, sale & terebinthina. Sunt, qui cataplasmatidis his scordium & semen sinapi addunt.

Conf.



Conf. Hildanus *Cent. 1. obs. 87.* & Lotichius *Cent. 6. Obs. 1. cap. 5.*

Scarificatio profundè satis fiat, nisi loci conditio, v. g. ratione vasorum subjacentium, hoc impediat. Alii hepar animalis imponunt, vel partem carnis. Quo & columbarum vivarum & dilaceratarum applicatio pertinet. Quidam ligaturas magni æstimant. Præ cæteris insigniter etiam conducit emplastrum magneticum Angeli Salæ ex magnete arsenicali paratum, scilicet post scarificationem vulneris, sanguinisque per cucurbitulam extractionem, loco demorsus applicatum & impositum; vel locus scarificatus eluendus est cum spiritu vini theriacali aut camphorato, aut muria, aut vino, aut aqua salina, aut decocto scordii & radice gentianæ cum vino aut aqua parato, cui salis, vel spiritus salis parum admistum sit, & hinc emplastrum magneticum applicari, vel solitarium, vel etiam ʒj. vel ʒij. pulveris cancrorum fluviatilium siccatorum aut calcinatorum potest admisceri, continuetur quotidie repetendo bis: vid. Agricola in *Chirurg. Parva pag. 448.* Quodsi velit hoc emplastrum magneticum dolorem vel inflammationem, vel excoriationem excitare, tunc optimum est, ut saltem oleum scorpionum vel hyperici cum saccharo Saturni mistum, vel unguentum nutritum, aut simile Saturninum, circa vulnus illinatur; vel recipiatur oleum ceræ, addatur parum sacchari Saturni, & ita illinatur, istudque emplastrum repetatur: vel imponatur tale emplastrum:

R. Cera ʒvj.

Ol. Olivæ.

Servi hircin. aa. ʒiij.

liquefactis adde

Thuris elect. ʒß.

M. f. Emplastrum: S.

Sonderlich Pflaster.

Alii imponunt emplastrum de ranis cum Mercurio, vel ceratum dia-dictamni, quod sacrum Galeni aliàs appellatur.

Verum promptissimum remedium externum est ustio loci affecti cum ferro candente seu cauterio actuali, cum ustio omnem virulentiam penitus destruat; hoc enim securissimum & tutissimum remedium est curandi morsus animalium rabidorum, de quo præter alios, vid. Hildanus *Cent. 1. Observat. 84. 85. 86. 87.* & *Cent. 2. Observat. 97.* Simili modo admotione ferramenti igniti citra ustionem curat Boyle in *Philosophia Experimentalis* morsus viperarum. Quodsi verò tardiùs talia externa administrantur, aut, si consolidato jam vulnere rabies postea superveniat, optimum est denuò scarificando aperire locum, cucurbitam cum magna flamma

applicare, & præter dictam elotionem mortuum cauterio actuali profundè satis, imò diversis in locis, adurere; ustionis verò loco spiritus vini theriacalis, aut in quo aliquid theriacæ solutum, cum gessypio impositum, ac vulnere cataplasmata modo descripta insternantur: sequenti die incidenda est eschara, undique eadem topica continuando, usque dum illa secedat: quo facto mediante pisso ulcus per aliquot menses apertum servetur, singulis septimanis bis vel ter Mercurium sublimatum simplicem, vel compositum Hildani *Cent. 1. Observat. 87.* descriptum, inspergendo, & sudorifera interdum propinando. Imò placet consilium Sennerti *lib. 1. Prax. ubi de rabie*, ut quocunque tempore fonticulus in aut proximè loco affecto excutetur, ut continua illa evacuatione quasi revulsoria veneni naturæ opem feramus.

## MEMBRUM II.

De

### Tarantismo.

Vicinum ferè malum est tarantismus seu rabies eorum, qui à tarantulis sunt morfi. De hoc tarantulæ veneno, indeque orto delirio musico, jam quædam monenda forent; sed cum morbus hic in Europa, præter Apuliam, nullibi cognitus & jam ab aliis sufficienter explicatus sit, qui de tarantismo scripserunt, in specie à Kircherò in *Musurg. Magna & in ejus Arte Mag. vet. à Schotto in Magia Naturali Part. 2. ubi de Auditu à Ferdinando in Hist. Med. nec non à Senguero de Tarantula.*

Primariò spiritus animales affecti sunt, & ita maximam partem affectus idealis est: tamen & his hoc modo affectis in juncto fluido aliquid acrimonix malignæ subesse, præter convulsiva pathemata, imprimis cura, quæ per lac in Persia instituitur, confirmat.

### C U R A.

Cura ejus aliàs est Musica, cujus rationem Willisus *de Morb. Convuls. cap. 7. pag. 65.* ita deducit: Venenum hoc mitius esse, quàm ut spiritus animales penitus extinguere valeat, aut distractos prorsus dissipare; sed eos tantum in fugam conjicere, fugatosque in spasmos leviores incitare: at vero musicam spiritus faciliè congregare ac mutuò associare, hinc serie quadam nervorum corpora subeuntes certis velut in cancellis ferri, donec veneno dissipato paroxysmus cesset.

## MEMBRUM III.

De

*Amore infano.*

**A**D deliria, quæ extrinsecus adveniunt, pertinet etiam amor infanus, qui à philtris probè distinguendus. Nam amor infanus est species quædam melancholiæ, quam ex nimio, sed vero amore nonnulli contrahunt: non secus ac alii ex nimia mœstitia, molestia & curis melancholici fiunt, & ad deliria melancholica disponuntur: ita etiam tales amantes ex nimio amore in graviore malo nonnunquam in maniam dilabuntur, & amantes fiunt.

## DIAGNOSIS.

Quoad signa cognoscendi amorem infanum: ex primariis signis est pulsus, quod affectus animi ex pulsu cognoscantur.

Controversia alias est: An detur pulsus amatorius, qui proprius sit intensè amanti-bus? seu an expulso certo cognosci possit, quendam amore nimio laborare? Negatur: Non datur pulsus amatorius ab aliis pulsibus specie distinctus, utut ex nimia pulsus perturbatione inæqualitate, concurrentibus simul aliis symptomatis, probabilis conjectura haberi possit. De hac controversia vid. Horstius in *Oper. Med. Tom. 1.* circa finem, cui annexa est dissertatio quædam de pulsu amorio, an detur specialis? ubi idem negatur. Saltem hoc obtinet, ut in talibus soleat esse admodum varius, & insigniter inæqualis, turbulentus & inordinatus: sed simul atque fiat mentio personæ amatæ, subito alteretur & mutetur pulsus in majorem, celeriore & vehementiorem: Postmodum verò, ubi mentio istius personæ amatæ cessat, pulsus obscurus, turbulentus & inordinatus denuo fiat; & ita tandem subindè repetenda mentione istius personæ amatæ, ex pulsu tali mutatione facilè pervenire possimus in cognitionem hujus affectus. Exempla videb. in Foresto *lib. 10. Observat. 30.* Sicuti etiam jam Galenus tale exemplum annotavit. Sed hoc nil est peculiare, commune enim hoc habet cum omnibus melancholicorum pulsibus.

## CURA.

Amor infanus removendus est, partim remediis ethicis, partim remediis Medicis: Illis, persuasionibus rationalibus, ut amor iste infanus & nimius removeatur, & impetus iste cæcus amorosus corrigatur & emendetur: His, similibus ferè, quæ aliàs in melancholia & affectibus melancholicis solent commendari & præscribi. Mitiora tamen ut plurimum usurpanda, aut pro circumstantiarum diversitate diversimodè immutanda,

cùm affectus animi hic prævaleant, qui persuasionibus imprimis curandi sunt.

## MEMBRUM IV.

De

*Philtris.*

**P**hiltra sunt media, quibus amor & affectio quædam unius personæ singularis erga aliam personam determinatam conciliatur; ita quidem, ut ex præsentia talium subjectorum facultas animalis, in specie quoad affectus animi, se optimè habeat; sicuti talium personarum absentia est plus minus molesta, aut gravioribus animi anxietatibus & quasi deliquis obnoxia. Unde philtra possunt usurpari inter mares & mares, inter fœminas & fœminas, inter mares & fœminas, inter homines & bruta, inter bruta & bruta, ut sic mutuus amor concilietur. Hæc ipsa philtra sunt vel vera vel falsa. Philtra falsa seu notha sunt, quæ à plebeculis, vetulis, & mulieribus, aut etiam prostibulis & similibus, subinde propinantur. Sed hæc ipsa sunt vel vana, vel frustranea, vel alio passu nocent; aut sunt præternaturalia, aut magica, aut si non sunt magica, saltem virtute verorum philtrorum carent. Vana & frustranea ex variis subjectis parari solent, & ordinatio ferè & frequentissimè ex eorum menstruo sanguine nunc solitario nunc adjecto sanguine leporino, tanquam animalis fœcundi & salacis, componuntur. Alii ex parte umbilici infantum decidui singularem amorem conciliare volunt; alii secundinas adhibent; sunt, qui beneficio seminis humani philtra magnetica seu amorem conciliare volunt. Alii testiculis animalium salacium, sudore certi hominis probè irrigatis, homines in amorem cogere volunt. Sed hæc omnia & similia sunt ludicra & falsa, ut & magica & præternaturalia, quibus nil obtinetur: Nam loco cupiti amoris talibus, qui postulantur, ut ament, subinde gravia & periculosa symptomata, subinde maniam, dementiam & stupiditatem inferunt. In specie exemplum hujus rei stupendum videb. in Henrico ab Heer *Obs. 13.*

Vera quod attinet philtra; ea sunt talia, quibus verus amor & naturalis quædam inclinatio unius personæ in aliam excitari potest, idque medio quodam naturali, tanquam magnete transplantatorio perficitur, ut exinde sequatur mutuus affectus. Vid. D. Clauderi *Disputatio de Philtris*. Quæritur hic: an dentur talia philtra, & quæ sine metu manie in determinata persona inclinationem & amorem excitare & conciliare valeant? Communiter propter ignorantiam modi, quò fiat, etiam res ipsa negatur: sed malè & contra experientiam. Veritatem confirmat experientia; nam (1) res certa est, quod legitime instituta

instituta & usurpata philtrea omnino hanc vim obtineant, tam in hominibus, quam etiam in brutis: sic quidam Studiosus in ædibus meis paternis à lotrice sua in balneo intritum (falte Schanle) benignum, ast satis potens amorificum accepit, per cuius esum tanto amore erga eandem deslagrabit, ut planè anxius redderetur, nisi quotidie eam visiteret. De cane notum est, quod si quis recipiat frustum panis, & sub axillis detineat, ut insensibili transpiratione & sudore proprio benè imprægnetur & madescat, & ei postmodum propinetur, tunc canis talem hominem vix unquam deserit, & ad heri sui amorem singularem alicietur. Notum exemplum Helmontii, quod refert in suo *Tract. de Magnetica Vulnerum Curatione* §. 27. quod nempe receperit herbam, quam ad tempus detinuerit in manu, & postmodum pedem cuiusdam catuli itidem ad tempus detinuit in manu ista, unde factum fuit, ut postmodum catulus eum amicè secutus fuerit, relicto antiquo hero. Præterea & Dn. D. Hauptmannus habuit passerem, cui similiter tale philtrum, eorum vim & virtutem probaturus, propinavit medio vegetabili, ita ut exinde passer eum nunquam deserere potuerit, sed in museo illi semper adstiterit: visitans ægros cum eodem hinc inde circumvolavit, & nunquam eum deseruit, referente D. Michaëlis. Conferantur hic ea, quæ habet Helmontius *loc. cit. pag. 599.* de cura vulnerum transplantatoria, quæ fit cum pulvere symptomatico, persicaria, & similibus, quæ si in manu detineantur, ut benè intepescant, & hinc manus abjectâ herbâ porrigatur virgini, ita ut illius manus probè detineatur, ut similiter incalescat, hinc amor mutuus conciliatur, certus, non tamen diu durans, sed tantum per quatuor aut quinque dies. (2) Confirmant philtorum possibilitatem exempla analogæ sympathiarum mutuarum, in natura obviarum, inter quædam animalia, ad quæ pertinent curæ magneticæ, in morbis, ut nempe certo medio morbus possit transferri ex uno animali in alterum, ita tamen, ut morbus curetur affecto altero. Sic, ut nihil dicam de pulvere sympathetico, in iætero ex urina ægri & farina sunt placentulæ, quæ pro transplantatione morbi propinantur cani, vel feli, & iæterus exinde sanabitur: vid. Bartholinus *Cent. 3. Histor. 66.* Marcus Marci in *Philos. Vet. Restit.* & Helmontius. De atrophia per sanguinem ægri ovo inclusum curanda, vid. Hartmannus in *Praxi Chimiæ*. & Burggravius de *Biolychnio*, cuius experientia certa facta est in Anglia, referente hoc Boyle in *Philos. Experiment.* quali sympathia & mariti per incantationem fascinati curantur. Nihil dico de podagræ curatione per transplantationem in quercum, &c. Hæc & similia

omnia innuunt correspondentiam totius cum partibus à toto secretis. Conf. Borellus *Cent. II. obs. 47.* Bartholinus *Cent. V. obs. 79.* Misc. Nat. Cur. *Ann. II. obs. 215.* (3) Ex opposito notum est, quoad certas idiosyncrasias, secundum quam certa objecta abhorrentur, ubi quidam, v. g. felem etiam invissam maximè horrent & anguntur; ita quid obstat, quò minus fieri possit, ut certa objecta amentur? Conf. Borellus *Cent. I. obs. 91.* de odio singulari arte inter conjuges concitato. (4) Nemo negabit, quod dentur philtrea magica, h. e. quando inlito cum dæmone pacto huius ope alterius conciliatur amore. Adeoque necesse est, ut dentur etiam naturalia philtrea, cum dæmon nec supra naturam, nec contra naturam, nisi Deo specialissimè concedente, agere queat; hinc non, nisi per media naturalia, necessario, quicquid agit, perficiat.

C A U S Æ.

Causa proxima, scilicet qua mediante operentur talia philtrea determinata ad certam aliquam personam, optimè declarari videtur ab Helmontio *loc. supra cit.* dum dicit; quod philtrea requirant mumialem confermentationem, mediante qua ad certum objectum trahatur alterius delectio. Reddit ita rationem, quare contactu herbæ prævio, ejusque benè tepescentis auxilio, in brutum vel hominem fiat amoris transplantatio: *Quia, dicit, calor prius herbam calefaciens, isque non solitarius, sed effluvio quodam spirituum animalium imprægnatus, herbam ad se determinat, individuatque sibi, & assumpto hoc fermento per magnetismum alterius subjecti contacti spiritum trahit, ut superveniat mutuus amor.* In his nempe nervus est omnis actionis transplantatoris & curationis magneticæ, & etiam in his consistit fundamentum ipsorum philtorum genuinum. Per mumiam autem stylo Helmontiano intelligitur primariò spiritus insitus, idque imprimis in cadaveribus, in quibus insui evanuerit spiritus, relicto saltem insito; secundariò tamen & in viventibus spiritus insitus mumie spiritualis nomine subindè venit, & hic ipse sufficiens est pro tali transplantatione instituenda, modò mediò quodam tertio, quod Helmontio vocatur Magnes, v. g. planta quadam; ita ut spiritus iste mumialis mediante magnetismo ex uno subjecto haustus, & certo modo alteratus & determinatus, conferatur in alterum subjectum, cuius spiritui mumiali, tam insito quàm insuo, arcte nubat, eique se jungat, ex qua conjunctione & unione postmodum inter hæc duo subjecta mutua combinatio & inclinatio concitetur, magnetismo mumiali in distans mutuò agente.

(Uuu uu 3)

Hæc



Hæc philtrea vera, cum tantum honestatis & amoris gratiâ instituantur, &, quâ talia, nullum nocumentum inferant, non etiam est occupatus circa eadem Medicus, nec ullo modo sunt impedienda & curanda. Verum cum sæpissimè fiat, ut loco philtrei veri propinetur philtrem falsum, aut per magiam illicitam & incantationem concilietur amor, ob id necesse est, ut pessimis inde oriundis symptomatis, non raro maniacis, sedula cura à Medico adhibeatur.

#### DIAGNOSIS.

Cæterum quaeritur: an possit cognosci philtrem tale nothum propinatum? Neg. signa enim, quibus philtrea falsa à veris distinguenda, certa sunt nulla; nulla enim nocumenta inferunt, nisi quod subinde à falsis gravium mox symptomatum superventus fraudem latentem manifestet. Ob id omnes circumstantiæ morbum, qui à philtro falso oriri putatur, antecedentes probè perpendendæ, & saltem artificiosis conjecturis, partim ab ægro, partim à Medico, cognoscendæ. Primatum obtinet, quod subinde ægri tales mox post assumptionem cujusdam rei, vel esculentæ, vel potulentæ, se malè habent circa stomachum; quando & ipsi interdum subinde suspicionem habent, à tali vel tali persona propinatum fuisse philtrem. In specie tamen, & tantum non semper, post philtrea falsa de anxietatibus præcordiorum, imprimis de pessimo stomachi habitu, & hinc de sensuum internorum læsione tales ægri post propinata philtrea falsa conqueruntur. Stomachi vitium nonnunquam solet esse pertinacissimum, etiam aliquot annos à propinato philtro interdum duram, & semper eò pejus malum, quò diutius durat malum à philtreis inductum. Hisce superveniunt mentis perturbationes, & deliria patiuntur, vel insaniam. Mirum est, quod interdum periodicè impetus talis amatorius & morbosus ex philtro causatus, repetat: Sic namque refert Agricola *Comment. in Popp. ubi de Antimonio*, de amore per philtrem inducto, cujus paroxysmus singulis pleniluniis repetebat, & per sex dies continuos durabat, intermedio tempore ægro satis benè se habente: Sic B. D. Langius curavit aliquando hîc quendam juvenem, qui postquam à levioris notæ fœmina philtrem quoddam sub dimidio pommo citrio hora quarta pomeridianâ comesto accepisset, quotidie postmodum per horæ spatium, idque sub eadem hora, tanto desiderio & anxio amore in istam fœminam flagravit, ut planè anxius hinc inde cursitaret, & inquieto animo ejus præsentiam flagitaret, eamque amplecti desideraret. Cum verò aliquando voti sui compos reddi requireret propter absentem tunc mulierem, malum indices

succrevit eadem horâ in tantum, ut exinde in pessimum habitum degenerarit, donec curatus fuit.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: In hac prout variant subjecta, quæ pro mediis amatoriiis in philtreis falsis assumuntur, etiam variant nocumenta ab iisdem inducta.

In specie tamen post philtrea falsa, præter ventriculi insignes noxas & inde derivata pathemata plurima, frequentissimè supervenit melancholia & delirium melancholicum, sæpiùs mania, interdum amentia, tandem lenta mors infertur.

#### CURA.

Quoad curam: in hac exhibenda sunt:

1. Universalia, imprimis vomitoria;
2. Specifica.

Illa inter eminent vomitoria, sine quibus vix aliquid laude digni potest perfici; quod si illa ferre nequeat æger, purgantia usurpentur, & his præmissis sudorifera, quibus commodè etiam admisceri possunt specifica.

Deinde ante omnia, quantum fieri potest, laborandum est Medico, ut æstimatis omnibus circumstantiis, & perpensis minimis conjecturis, possit invenire materiale causam, quæ applicata vel usurpata fuit in philtro falso. Inquiratur igitur, an scilicet solum inductus sit amor per media magica illicita, seu signum magicum & superstitiosum? an verò naturalia, nempe per sanguinem menstruum, aut semen, aut urinam, aut alvi excrementa, aut similia? Nam si suspicio sit, quod mediis magicis philtrem fuerit inductum, præmisso vomitu antimoniali, etiam interdum repetito, adhibeantur remedia contra incantationes directæ, aut contra morbos à veneficio natos vulgò alias usitata: quæ inter præcipuè excellit viscus corylinus, legitimo tempore collectus, tam solus internè assumptus; quàm externè: vid. Henricus ab Heer *loc. supra cit.* uti habet unguentum seu linimentum ex visco corylino, cum axungia cati, ursina & caponum paratum: vid. Carrihterus in *Herbar. edit. in 8.* Item juxta hunc viscum valet Valeriana minor seu phu Ponticum Dioscoridis, vid. Matthiolus; carduus benedictus, flores hyperici, flores & folia aquilegiæ & corallia quoque usurpari solent internè, & externè in forma amuleti. Facit huc emplastrum fœtidum Mynsichti, item electrum artificiosum è septem metallis compositum, & certo tempore confectum amuleti forma applicatum, vid. Helmontius *Tr. Injaculatorum Modos Extrahendi*. Convenit etiam electrum immaturum Paracelsi, etiam ab Helmontio commendatum, sed incertum adhuc est, quid sit: Alii zincum, sed male; alii gûlden Erg; alii folia auri Hungarici sub-

substituunt, &c. Sin verò de philtis, quæ per media naturalia, utut frustranea, v.g. menstruum sanguinem, inducuntur, sit suspicio, tunc optimum est, ut præmissis universalibus remedia philtis aliàs appropriata, mista simul cum specificis istius rei, à qua inductum philtum, usurpentur. Propinatis etiam universalibus, sudoris provocatio per appropriata imprimis est conducibilis, & subinde necessaria. Ante omnia autem vigilet Medicus, præsertim in melancholia aut mania amatoria, ut dormire possint ægri, quò placidiores reddantur, ac ferociam deponant.

Universalis sunt imprimis vomitoria, quæ sæpius totam curam absolvunt, cujuscunque etiam generis ista fuerint, vid. Rulandus *Cent. 3. Curat. 9.* & Faber *Curat. 94.* in specie infusa antimonialia, eaque valida & magna dosi usurpanda, ut infusum vitri antimonii ad ʒiʒ. aqua benedicta, aurum vitæ Kegleri, Mercurius vitæ in substantia, & similia, præ reliquis conveniunt: sic enī D. Langius supra dictum juvenem curavit propinatio vomitorium ex butyro antimonii cum sole & luna destillato secundum methodum Fabri in suis scriptis, è quo præcipitatus est Mercurius vitæ cum sole & luna compositus. Unde ex propinata prima dosi multum quidem, sed absque levamine, evomuit; hinc tertio post die illud idem vomitorium antimoniale mox ante ingruentis paroxysmi tempus iteratum ipsi dedit, & ita supra ac infra materię tætidissimæ & nigerrimæ ejecit saburram, quibus duobus vomitoriis convaleuit: Sic Halæ Saxonum fuit juvenis, qui certis horarum intervallis irā adeò faviret, ut ex ædibus aufugeret, ac si maniacus esset: Unde cum in hoc esset suspicio philti propinati, propinatus ipsi fuit Mercurius vitæ ad gr. v. quibus supra & infra multum evacuatus est; sed nondum tamen ritè restitutus, data fuit altera die theriaca cum drachm. j. pulveris serpentum cum aqua theriacali vel cardui benedicti; unde secutus est sudor copiosus, quò omninò curatus fuit: Rulandus *lib. 1. Curat. Empir. pag. 32.* refert infanum ex philtro, à malefica in placentis accepto, datâ aquâ benedictâ feliciter evomuisse placentas quæ in terram projectæ effervescebant & ebulliebant, non secus ac cibus super ignem. Aliàs oleum sambuci ex arillis à drachm. j. ad drachm. iʒ. laudatur. Ad talia remedia generaliora etiam videtur pertinere urina equina recens emicta hausta, quæ subinde per superiora & inferiora philtro evacuat. Historiam elegantem recenset Salmuth, *cent. 1. Observat. 70.* Datum potum in quo reconditum philtum, tepositum intrâ nigricans apparet, & rursus intra triduum ranæ plurimæ ex eo progenitæ fuerunt, lacte calido affuso valdopere increve-

runt; sed urina equina recens emicta interfecta fuerunt: Serva quædam accepto philtro & cruciatibus afflicta, evomuit post sumptam urinam equinam duas lacertas & duas ranas. Nempe non novum est; post propinata talia philtro varia insecta intra corpus fuisse generata: Sic D. Michaëlis observavit aliquando ab assumpto philtro vermes tres oblongos nigros excretos fuisse. Conf. etiam Schenckius *lib. 7. Observat.* de quodam, qui philtum accepit, ac postmodum varia animalia viva observavit vomitu excreta. Unde in talibus casibus urina equina propinata non erit inconveniens remedium.

Præmissis ergo vomitoriis & sudoriferis, appropriata magis remedia sunt usurpanda: quæ inter eminet imprimis nasturtium aquaticum, succus, & quæcunque ex eo parata, quod etiam convenit, ubi ex philtis ad maniam jam inclinant ægri, de quò vid. Monavius *apud Cratonem lib. 7. Epist. 23.* uti etiam aqua nasturtii aquatici ceu conveniens vehiculum usurpatur. Mirabiles effectus, si non ficto exemplo, nasturtii hujus usu contra philtro confirmat Schenckius *in Obs. lib. 7. pag. 839.* ex quo delumpfit Bonettus *in Sepulchreto pag. 620.* Præterea misturam simplicem ceu appropriatum sudoriferum contra philtro commendat Hartmannus hinc & tinctura bezoardica parari potest. Singulare specificum est secundina humana, ejusque spiritus urinosus volatilis per putrefactionem paratus, item pulvis per phlegmatis abstractionem in Mariæ balneo paratus.

Et quidem datur pulvis secundinæ à ʒj. ad ʒiʒ. vel ʒij. Spiritus secundinæ à ʒʒ. ad drachm. j. vel drachm. ij. eaque cum vehiculo aquæ nasturtii; nunc solitariè; nunc cum tincturæ bezoardicæ nonnihil, nunc spiritu theriacali camphorato mistis, expectando sudorem, non absque felici successu propinari solent: e. g.

℞. ~ theriacal. campb. ʒj.  
secundina hum. scrup. j.  
M. pro sudorifero:

D. S.

Schweiß-treibender Spiritus auff einmal.

Et speciatim quælibet remedia ex secundina parata conveniunt, ubi ex sanguine menstruo paratum fuit philtum.


His succedit spiritus theriacalis camphoratus, & omnia ex theriaca parata, spiritus cancerorum, extractum theriacale, item hypericon, anagallis, & omnia ex hac parata, absinthium, hinc vinum absinthites Rulandus *loc. all.* propinavit, baccæ herbæ paridis & ipsæ pulverisatæ ad ʒj. expectando sudorem. Corallia, & ex his paratæ tincturæ elegantiores, terra sigillata Lignicensis vel Strigenfis, vel etiam, uti vocant, axungia solis,

lis, tam ad absorbendum, quam per sudorem discutiendum philtrum adhibetur: nempe in principio ad ʒj. cum extracto theriacali mixta: ubi verò se diffudit philtrum, per sudorem dispellendum. Decoctum corticis mediani sambuci in sero caprillo manè & vespè aliquoties datum, etiam ante triennium propinatam materiam noxiam pro philtro expellit. Autore Blochwizio in *Anat. Sambuci*. Essentia mumie humanæ, & essentia serpentum, pulvis serpentum, imò & reliqua quæcunque, tam ex homine quam serpenti- bus, vel viperis, item ex mumia humana parata remedia, præmissis universalibus, sunt maximè appropriata. Nam etiam calculus humanus pulverisatus, à ʒj. ad ʒj. in aqua nasturtii aquatici assumptus, contra philtera & melancholiam eroticam plurimum confert, expellendo simul urinam plurimam, imprimis si à sanguine menstruo, teste Henrico ab Heer in *observat.* 13. & in *observat. Spadanis*: vid. Schræderus *Dilucid. Part. 1. sect. 1. pag. 23*. Tandem Hartmannus in *Praxi Chimiæ* habet electuarium ex lapide magnete cap. 7. §. 13. descriptum contra philtera, quod præmissis universalibus experimentum planè singulare & verissimum est, & cujus felicem usum B. D. Michaëlis in Studiosis graviter afflictis aliquoties observavit. Præ- vortius commendat corymbos hederæ albican- tes per octo dies ex vino vel decocto cicerum exhibitos ad ʒj.

Quodsi jam philterum ad maniam proce- dat, tunc optimum experimentum habetur nasturtium aquaticum. Sunt, qui dicunt, e. gr. Schmuckius in *Cur. Magico-magnet.* pag. 72. quod contra maniam ex philtro sit admodum certum, si quis accipiat calceos novos, in illis probè currat, donec incale- scant, & sudore pedum madescant, hinc po- tum infundat & hauriat: fides tamen sit pe- nes experientiam. Tandem margaritæ præ- paratæ contra philtrum in specie ex menstruo mulierum, item cum sanguine leporino, lau- dantur à Borello *Cent. 1. observat. 65*. Qui- bus & alia alexipharma theriacalia & sudo- rifera aliàs etiam usitata commodè addi & subungi possunt. Unum adhuc referam, mihi à quodam fide digno narratum: Vir quidam loco philteri ab uxore aliquid de ejus sanguine menstruo accepit iacens, unde fit, ut tridui spatio mirum quantum totum cor- pus intumuerit, omnesque partes mirabiliter inflammatæ fuerint. Pro cura propinatum fuit illi pulveris cardui benedicti & theriacæ ana in aqua cardui benedicti; umbilico ve- rò appositum dimidium panis recentis ex fur- no extracti, parum excavati, & similiter the- riaca & pulvere cardui benedicti impleri. Sicque provocatus sudor: unde tumor cef- savit, & remoto pane dimidio, livido & sub- cæruleo, secuta levis diarrhœa, à qua ipsa tandem æger fuit perfectè curatus.







# LIBER III.

De

MORBIS SEXUI VIRILI PROPRIIS.

## SECTIO I.

De

SEMINIS VIRILIS LÆSA GENERATIONE.



Æditur generatio seminis seu genituræ tribus modis:

1. Quando deficit, aut imminuitur.
2. Quando abundat.
3. Quando depravatur, aut

vitiosa redditur, dum nempe non tale semen, quale generatione aptum, sc. aut acre nimis, aut aquosius, aut putulentius producitur, aut alio peregrino colore est insignitum.

### CAPUT I.

#### ARTICULUS I.

De

*Seminis Defectu aut Insufficiencia.*

Cum autem posteriores modi rarò occurrant, in hac sectione primariam considerationem meretur deficiens & insufficiens seminis generatio.

#### C A U S A.

Causa duplex est: aut fit

1. Ex vitio & defectu materiæ, ex qua genitura elaboranda est; aut

Tom II.

2. Vitio testium, qui istam elaborare debent.

In priori causa, quibus genitura planè deficit, præter hoc, quod careant stimulo Venereo, sunt etiam effœminati, torpidi, languidi, minus alacres, & eunuchos omnibus moribus imitantur.

Quod attinet materiam seminalem, seu ex qua genitura elaboranda venit, est hæc pars sanguinis chylosa, subdulcis & pinguior, adeoque plus minùs viscosa seu mucilaginosæ. Jam ergò, quicquid hanc materiam sanguinis chylosam absumere potest, illud etiam omne genituræ defectum inducit, uti fit in vita nimis laboriosa, inedia, pravo victu, læsa chylicatione, & aliis vehementioribus animi affectibus, evacuationibus immodicis, vigiliis, &c. quò etiam fonticulorum abusus spectat. In specie vitalaboriosa, exercitia, & alii graviores animi affectus, quæ acuendo quasi sanguinis fermentationem, & consequenter sanguinem nimis rarefaciendo, attenuando & acrem reddendo, eo ipso citam chyli assimilationem producunt, & sic materiam seminalem exhauriunt. Unde etiam est, quod pingues & corpulenti non semper geniturâ abundant, sed sæpè defectum illius patiantur, utut lacte chyloso sanguis eorum scateat. Ratio est, quia iste chylus subdulcis nondum sanguini assimilatus in pinguedinem facessit: Facit hûc appositè tritum istud proverbium: Sine Cerere & Libero friget Venus.

(Xxxxx)

Pergo

Pergo ad alteram causam, dum testium vitio deficit seminis generatio, quod multiplex est, & vel in defectu fermenti seminalis, vel in conformatione, in specie testium tumoribus, consistit.

Quoad I. Genituræ elaboratio impeditur, si fermentum ejus spermatis effectivum sit nimis torpidum, enervatum aut minus activum. Spirituosum enim hoc fermentum ubi torpet, minusque est volatile, est causa deficientis seminis. Spirituosum dixi, adeoque acidum oleosum volatile. Confirmatur hoc, quod omnia, quæ spiritus animales figunt, genituræ elaborationi obicem ponunt v. g. acida nimis fixa, vitriolata, nitrata, &c. Hinc est, quod e contra acria volatilia, imprimis aromatica & spirituosas, spiritus excitando acuant hoc, & stimulent Venerem: hinc acida, in specie spiritus vitrioli aut nitri crebrius usurpatus, notabiliter genituræ elaborationem in testibus enervat, quod confirmat historia notabilis, quam refert B. noster Langius in *Discurs. super Fabrum*, dum refert, quendam ex nimio abusu spiritus vitrioli adeo immutatos acquisivisse testiculos, ut tandem ad pisorum quantitatem redacti fuerint: Postmodum intermisso vitrioli abusu sensim sensimque eodem recuperaverit. Item quod nitrum crudum, copioso acido turgidum, copiosius assumptum, Veneris impetus cohibeat; hujus rei imprimis habet notabilem casum Timæus von Guldensee / *lib. 3. Casib. 52.* de quodam Mulico ad Venerem hiante, adeo, ut nullo modo saturari posset, idque ex acriore Veneris stimulo; qui tamen fuit curatus continuo usu nitri crudi, seu nitri tantummodo depurati, in quo semen ita extinctum est, fermento testium destructo, ut vix propriæ uxori postmodum satisfecerit. De ruta & mentha dicunt quidam, quod Venerem extinguant, ut & de lactuca, sed sine ratione. Ad hujusmodi torporem testibus inducendum, vel fermentum testium extinguendum, multum etiam facit refrigeratio, aut nimium frigus externum; hinc enim & testes languent, generatio sanguinis imminuitur, & ipsum corpus denique totum insigniter alteratur. Facit nempe huc, quod observavit Salmuth, *Cent. 3. observ. 91.* quod milites, dum fluvia transcunt, si iisdem nimis refrigerentur & humectentur testes, quod exinde admodum efflorescentur, & animositas in iis immutetur. Id quod illustratur ex eo, quod ebrietas, hæmorrhagia narium, &c. applicatis externè testibus frigidis & humidis, sedentur; hinc enim acetum testibus applicatum ebrietatem subito discutit; item simili ratione succus sem-

pervivi cum aceto & nitro mistus & applicatus scroto sedat hæmorrhagiam narium, à nimia sanguinis effervescencia & turgescencia, ex causa interna obortam. Faciunt huc etiam suo modo Mercurialia seu Mercurius vivus, imprimis externè circa genitalia illitus; nam & hic ipse, uti nervis inimicus, ita etiam testibus hostilis est: Refert enim Schenckius in *observat. lib. 4.* de virilitate & stimulo Venereo inunctione per unguentum Mercuriale ad fugandos pediculos pubis omnino adeptis, litu tamen olei destillati spicæ tanquam aromatici, omisso hoc linimento Mercuriali, restitutis, quo & pediculi enecati sunt. Facit huc etiam Venus nimia, quæ vim genitalem insigniter enervat, partim, quatenus testium fermentum successivè hebetat, partim quatenus digestionem primam, subtrahendo nimis spiritus, notoriè turbat & imminuit, & ita, dum chylus non subit rectam spirituaſcentiam, cruditatibus occasionem suggerit. Imprimis ad vim testium genitalem conservandam multum hæret in negotio digestionis; Omnes enim, in quibus deficit naturaliter vigor genitalis & appetitus Venereus, ii etiam simul laborant defectu digestionis primæ, cruditatibus & anorexia: In his nullus vel exiguus Veneris appetitus, pulsus parvus, corporis gravitas ac pigrities, ipsiusque ac præcipuarum partium intemperies frigida observatur, genitura cruda, aquosa & liquida est, sub cujus emissionem etiam exiguam vel nullam voluptatem percipiunt. Hinc ebriosi, qui nimio potu corpus obruunt, hinc hydropici & cachectici, sterileſcunt. Facit huc etiam abusus Veneris, imprimis, si nimis citò & in prima juventute & nimis crebrò, instituatur; Nam in nimio Veneris abusu & in manuſtuprationibus, continuatâ genituræ elaboratione necessariò vis fermenti genitalis testiculorum deficit tandem, & continuo usu quasi attritum torpescit, & minus volatile evadit; unde genitura prius aquosa, postmodum defectuosa, reddi solet; In tantum enim exhauritur fermentum, ut non possit iterum restitui. In quo casu & laxior & flaccidior testium accedit structura, eorumque tonus omnino destruitur, cum à copioso & frequentiore materiæ transitu tandem vix ita laxantur, & patulæ fiunt, ut postmodum nihil amplius legitime ſecernatur & elaboretur, quin ex hoc tono testium læſio, apertis sanguinis vasculis, loco genituræ sanguis tandem purus in coitu effundatur, cujus non pauca proſtant exempla; videb. Zacutus Lusitanus *lib. 3. Histor. 18. & Prax. Admir. lib. 2. observat. 102.* imprimis quando præceſſerit illegitimus cantharidum usus, qui acrius stimulando, san-

sanguinem loco genituræ effundere facit. Huic malo etiam non rarò diuturnior à Venere abſtinentia anſam ſuggerit, quemadmodum de monacho quodam Vidus Vidiuſ lib. 11. *Curat. Membr. cap. 2.* refert, cujus teſtes licet in adoleſcentia juſtā magnitudinem adepti fuerint, progreſſu nihilominus temporis, ob votum caſtitaſis inviolabiliter ab ipſo obſervatum, cum valis ſpermaticis ferè penitus exaruerint, ut hæc poſt mortem inſtar duorum ligamentorum fuerint viſa.

Deficit II. Genituræ generatio ex teſtium defectu, aut naturali, aut morboſo; imprimis ſi ambo deficient, uti fit in caſtratis, quia etiam cum unico teſte ſatis fecundi obſervati fuerunt: Sic in M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. obſ. 13.* mentio fit monorchidis, plurium liberorum patris. Hic tamen non confundendus eſt defectus teſtium cum eorundem ſitu mutato, ſcil. retractione ſeu occultatione intra abdomen, cum ſæpius obſervatum fuerit, nunc teſtes in abdomine latuiſſe, nunc in oſſe pubis ſubſediſſe & ibidem tumorem inſtar herniæ induxiſſe. Nec tamen proinde tales pro impotentibus habendi ſunt: Sic Brechfeld Bartholini in *Aët. Haſſniens. Volum. 1. pag. 197.* refert, teſticulum alterum circa annos pubertatis primùm erumpentem; unde etiam monorchides an reverà ſint tales? non ſine ratione dubitat Borrichius in *Aët. Haſſniens. Volum. 4. pag. 169.* Exempla talium non ſunt pauca: Sic Schenckius lib. 4. *obſerv.* quendam equitatione vehementi teſticulorū alterum in ephippio contorquendo ita præſiſſe refert, ut ad abdominis muſculos ad inguen retrocederet: Sic Salmuth. *Cent. 1. obſ. 91.* obſervat teſticulum per 13. annos in abdomine latentem, qui decimo quarto poſtmodum ſpontè in ſcrotum prorupit. Imò interdum fit etiam, ut unus, altervè teſticulus ex ſcrotis ſurſum in abdomen retrahatur: Sic ſcil. idem Salmuth *obſervat. 91. Cent. 1.* obſervat retractionem teſticuli in paroxyſmo epileptico, ex convulſione ſc. muſculi cremasteris: item *Cent. 3. obſerv. 63.* obſervat teſticulum ſiniſtrum intra peritonæum retractum ex nimio Veneris uſu, & teſticulum alterum in abdomine latentem: Vid. in Bartholino *Cent. 1. obſ. 36.* Conf. hic Laurentius *Conf. 11.* de juvene 30. annorum, qui teſtibus vacuum omninò habuit ſcrotum, in quo tamen ſigna virilitatis apparebant, ut vox gravis, hirtiuties, barba, &c.

Deficit III. Genituræ generatio vitio teſtium malè affectorum, quando nempe læditur plùs minus teſtium conformatio; quo pertinent imprimis eorum tumores varii, cum in tumidis & inſarctis teſtibus nulla, aut materiæ ſeminalis collectio, aut collecti elaboratio fieri poſſit, quin neceſſariò genitura deficiat: De quibus tumoribus paulo poſt.

Tom. II.

# DIAGNOSIS.

Deficere vim genitalem, indeque productam genituram, patent ex relatione ægri, & in talibus vel nullus, vel exiguus Veneris appetitus adeſſe ſolet, corpus ipſum ſimiliter grave, pigrum, minusque agile exiſtit, ipſeque æger minus activus, & præſertim in actionibus animalibus deficiens obſervatur.

Cauſas quod attinet differentes; hæ ipſæ ex antecedentibus, & ex adjunctis imprimis, expiſcandæ erunt: Nam ſi nullum vitium in ipſis teſtibus deprehendatur, vel materiæ defectum, vel fermenti teſtium inertiam, in culpa eſſe, patet. Utrum horum ſit? antecedentes circumſtantiæ oſtendunt: Nam ſi ex defectu materiæ chyloſæ ſit, ex vitæ genere, diætâ, exercitiis, &c. pateſcit. Si vitio teſtium, vel ex defectu fermenti teſtium contingat, præter appetitus Veneriei defectum, corporis gravitatem & pigritiem, patet, quando in coitu genituræ aliquantulum emittitur, hæcque tenuis & aquoſa, minusque calida ſeu fervida, emitti percipitur. Quod ſi præceſſerit cauſa, quæ teſtes labefactare potuerit, ſuſpiciones hæ ſunt eò clariores.

Defectus denique teſtium per ſe ſpontè patet.

# PROGNOSIS.

Quoad prognosin: facile patet, quod læſa genituræ generatio non ſit periculofus affectus: admodum tamen eſt moleſtus, quia impedit opus generationis, & unde ſpeciei quidem, non autem individuo nocet; utut interdum per accidens vel ex animi mœrore, vel ex deficiente ſanguinis alteratione à teſtibus inductâ, languor univerſalis & quaſi tabes ſuperveniat; unde &, quatenus virili mente præditos effæminatos facit, & actionibus obeundis minus agiles reddit eosdem, omninò curandus eſt.

Senibus eſt incurabilis ferè, uti etiam is, qui in juventute ex nimio Veneris uſu fermentum teſtium labefactarunt, eſt difficillimæ curationis; Cum ſemel deſtructurum fermentum teſtium non poſſit reſtitui.

# CURA.

Variat hæc pro varietate cauſarum remotarum:

1. Per alimenta temperata, ſucco chyloſo pingui & dulci turgida, materia ſeminiſ copioſa ſubminiſtranda.

Quibus

2. Simul intermiſcenda ſunt ſpirituofa & volatilia, imprimis acriora & aromatica, quæ fermentum teſtium transmutativum acuunt, ipſique ſtimulum quaſi addunt, & robuſtius reddunt.

(Xxxxx 2)

3. Tu-



3. Tumores testium autem sunt maturè discutiendi, aut resolvendi & emolliendi, aut ad abscessum perducendi & aperiendi, aut quacunque ratione aliis irritis, ubi majus imminet periculum, Chirurgicâ methodo, sectione sc. sunt tollendi.

His scopis ut satisfaciamus, inter ea, quæ defectui materiæ, & enervato fermento testium, dicata sunt, eminent alimenta temperata, quæ vel copiosum succum chylosum & subdulcem suppeditant, vel quæ acria aromatica existunt, adeoque Venerem plus minus stimulant; ubi observandum est.

I. Ut semper simul cura stomachi habeatur, & digestio prima promoveatur, & in debitis functionibus conservetur; quâ deficiente, deficit etiam vis genitalis: Conf. Ludovici *Pharm. pag. 719. & 720.*

II. Remedia ista inservientia sunt vel talia, quæ materiam genituræ suggerunt, vel quæ saltem Veneris impetum stimulant. Nam semel pro semper moneo: ubi Venus est stimulanda, ibi non tantum aromaticis, stimulum augmentibus, sed etiam temperatis, quantitatem seminis majorem suppeditantibus, esse studendum; vix enim citra damnum ægri sola stimulantia usurpantur: Ita v. g. sunt imprimis semina succo lacteo turgida, ut amygdalæ dulces, pinæ, pistacia, castanæ, &c. ex quibus parantur emulsiones, hinc oleum pistaciorum & nucleorum pini recens expressum; item dactyli, ostrea & conchæ, chocolata Indica, lac, & omnia ex lacte parata, imprimis tamen muliebre ex matris sudum, item vinum dulce & generosum, imprimis Hispanicum & Malvaticum, sub introitu lecti haustum convenit. Hinc piper, eruca, formicæ, &c. neutra horum solitariò usurpanda, sed ferè semper Venerem stimulantibus copiosum semen generantia jungenda: Non aromatica nimis acria sola, quia imbecilles reddunt: non lactea sola, quia materiam feminalem minus spirituosam reddunt; ambo ergò combinanda: Vid. Velschius *Hecat. 2. p. 10.* Ista ergò, quæ materiam genituræ suggerunt, ova recentia, aut etiam sorbilia, hinc vitellum ovi recens unum alterumvè haustum, seu totum conquassatum, & cum vino Hispanico mistum & ita bibitum est optimum, teste Lindano. Huic misturæ si addantur aliquot grana ambræ, aut quædam aromatica, ut sunt cubebæ, nuxmoschata, aut etiam species diapipecon, erit mistura, quæ mirè armat in Venerem, & semen augendo, & simul membrum genitale stimulando. Hinc optimum est ad imitationem Solenandri *Scet. 4. Conf. 17.* ut lac dulce recipiamus cum pipere, quod in specie tempore æstivo ad augmentandum semen tanquam optimum commendat pro usu quotidiano:

℞. Lactis ℥iij.

sacch. ℥iij. ℥℥. l. ℥j.

piperis ℥℥.

Milta hauriantur pro una vice.

Hiscæ accensendi sunt testiculi gallorum exsiccati quorum efficacia nota est ex Amato Lusitano *Cent. 2. Cur. 18.* & Schenckio in *observ. l. 4.* Unde Itali farcimina ex cristis & testiculis gallorum cum sanguine galli irroratis parata, mirè commendant. His & similibus simul acria stimulantia, & specificè Venerem excitantia adduntur.

Quæ spirituositate & acrimoniâ aromaticâ volatili fermentum testium acuunt, sunt radix zingiberis, tam pulverisata, quam in India condita, ejusque syrupus conservativus, cubebæ, caryophylli, galanga, cinnamomum, macis, crocus, cardamomum. Præter hæc aromata verò sunt semen fraxini seu lingua avis, semen sinapi, anisi, fœniculi, nasturtii, erucæ. Pertinet huc etiam castoreum, baccæ sabinæ pulverisatæ, & borra Veneta, de qua vid. Amatus Lusitanus. Ex dictis aromatibus fiunt varix species officinarum, species diatrion pipereò, diambra, diamoschi, Veneræ Mynsichtii, dia-galangæ, &c. rotulæ stimulantæ Mynsichtii cum ambræ & opii gr. j. l. ij. item ∇ magnanimitatis Laurebergii cum cephalicis & vino Malvatico, & spiritus formicarum. Præter testiculos & cristam galli habetur singularissimus sanguis galli ex sanguine aliquantulum putrefacto destillatus; vel exsiccatum hujus pulvis cum pauco ambræ. De Satyrio condito res nota est, sc. ista species, quæ cynosorchis vocatur. *Knaben-Kraut/Hundes-Hauptlein/xc.* Hæc duos habet bulbos, unum turgidum, alterum flaccidum, quorum is, qui hoc anno fuit turgidus, altero sit flaccidus, & qui fuit flaccidus, turgidus: Jam bulbos iste cynosorchidos turgidus insigniter commendatur ad Venerem stimulantem, & augendam genituram; sicut contrà alter bulbos flaccidus Venerem imminuit, unde ex hac radice satyrii paratur electuarium diasatyrii Augustanum, & essentia Satyrii Crollii: imprimis si miscetur cum aqua magnanimitatis, simulque addatur spiritus sanguinis galli. Etiam radix eryngii condita laudatur, ut & Electuarium magnanimitatis Mynsichtii. De ambra res nota est, quod in forma essentia, imprimis si cum certa quantitate opii fiat, aut quacunque ratione usurpata mirè spiritus reficiat, & insigniter Venerem stimulet. Ex opio & ambra etiam parantur pilulæ ad diuturniorem Venerem reddendam. R auri cum oleo cinnamomi, cantharides aliis permisti, multum valent ad intensius stimulantem Venerem: exemplum videb. in Platero *obs. pagin. 139.* pro quo scopo etiam paratur essentia cantharidum ad imitationem Bartholini cum infusione vini.

Cau.

Cautè verò adhibendi sunt cantharides. Sanguis & cerebrum cervi aut tauri Veneri inhiantis, ex eoque parata remedia, insigniter Venerem stimulare solent. Sanguis & cerebella passerum, præcipuè in actu Venereo transossorum, fuit secretum pro stimulo Venereo Comitit à Pappenheim, in re Venerea & Martiali excellentissimi. Sanguis & testiculi cervi in actu Venereo transossi fuit singulare arcanum Venereum cujusdam Principis. Alii commendant potius priapum cervinum excisum ex cervo interfecto, dum in amore est; Nam 3j pulveristalis priapi cervini cum ovo sorbili misti, & paucò vino generoso superlito, egregiè profuit: vid. Solenander *Conf. 19. Sect. 4.* Tauri priapus laudatur apud Bartholinum *Cent. 6. Hist. 60.* Notabile est & hoc, quod rasura cornu tauri in ipso coitu abrasa mirè conducat Venerem conciliando & excitando: Et hæc fuit secretum Comitit *Solmensis*. Hisce addantur, quæ κατ' ἐξοχήν Venerem amare dicuntur, ut ambra, moschus, zibethum, cum oleis destillatis aromatum subacta & imprægnata.

Ex quibus varia in usu sunt simplicia & composita, v. gr. borra in ovo sorbili assumptus, item cum saccharo mixtus, & cum pomo assato assumptus, quo utitur Dux Saxo-Lauenburgicus, &c. Nonnullis tale remedium in usu est: Recipiunt vinum generosum malvaticum, addunt vitella ovorum recentia, acuata cum aliquot granis ambræ, vel aliis aromatibus, vel speciebus aromaticis, & exhibent pro potu, qui unâ vice stimulat Venerem. Principis cujusdam secretum fuit sequens:

℞. ʒo pistac. rec. express. cochl. j.  
vitell. ovi. No. j).  
ambra, quantum capit cultelli  
cuspis.  
sacchari Candi, quantum capiunt 3.  
cultelli cusps.

In cineribus calidis mista egregiè Veneri prodesse dicunt.

Faciunt huc mixturæ, essentiz, electuaria, morsuli, rotulæ stimulantés Mynsichti, tabulæ viriles Paracelsi, Hartmann. *Prax. cap. 204.* Mixtura virilis Hartmanni *cap. 204. §. 4. & similia.*

Trochisci viperini etiam hic locum inveniunt: *Conf. M. A. N. C. Ann. 6. & 7. p. 130.* item Hæferus *Herc. Med. pag. 209.* unde pulli viperis nutriti, & cum testiculis gallorum pro alimento assumpti, Principibus inserviunt: Imprimis electuaria formâ remedia hic propinari solent, c. g.

℞. Spec. dia-satyr. ʒij.  
galang. ʒij.  
ambra.  
moschi dulc. à ʒij.

rasur. priap. cervi. cum hiat in Venerem interfect. ʒiij.

pinear.  
pistac.  
amygd. dulc. à ʒß.  
sem. eruce  
nasturt.  
urtic. l. sinapi à ʒj. ad ʒj.

Terantur, & cum melle F. Conditum l. Electuarium.

Conveniens est, si tale conditum sæpius irroretur c. v. cinnamomi, aut magnanimitatis, vel spiritu sanguinis galli, aut formicarum. Loco mellis simpl. convenienter conf. alchermes recipi potest:

℞. Conf. rad. eryng.  
satyr. à ʒij.  
cortic. citri condit.  
zingib. in Ind. cond. à ʒß.  
amygd. dulc.  
nuc. pinear.  
pistac.  
carn. dactyl.  
pulp. nucismyrist. à ʒj.  
priap. tauri  
sem. eruce  
pastinaca  
sinapi à ʒij.  
cinnam. l. cubebæ.  
galang.  
piperis albi à ʒj.  
ʒo destillat caryoph. ʒß.

Cum brod. zingib. f. electuarium: S.  
Starck: Latwerge.

Quidam addunt pulverem cantharidum, sed non convenit: conveniunt saltem cantharides, ubi deficit erectio penis. Platerus *Observat. libr. 1. pag. 256.* pulverem hunc tanquam efficacissimum commendat. Pertinet huc electuarium ad coitum Comitit à Wallenstein, quod sequenti modo componitur:

℞. Sem. eruce  
satureja,  
urtica aa. ʒj.  
priapi cervi in coitu transoss.  
ras. cornu tauri in coitu abr. aa. ʒij.  
ambr. grise. ʒj.  
moschi ʒj.  
conf. alcherm. ʒx.  
mell. despum. q. s.

M. f. electuarium.

Dosis magnitud. juglandis manè & vesperi.

Cum hisce sociantur externa nonnulla, quæ & ipsa glandi, perinæo, scroto & testibus, item circa inguina, illinantur: quæ inter est imprimis balsamus apoplecticus, aut balsamus Venereus Mynsichtii, ʒo destillatum piperis, nucis moschatæ. Loco horum ʒo destil-

(Xxxxx 3)

destillatum macis dictis locis blandè illitum est egregium: possunt addi, si placet, aliquot guttæ & ei destillati caryophyllorum & spicæ: vel ex dictis oleis cum axungia castorei vel corpore probalans fiat balsamus. Glans moscho aut zibetho vel balsamo apoplectico inuncta, Venerem stimulat, voluptatem auget, & facilitatur in mulieribus conceptio: item spiritus formicarum externè etiam potest inungi. Tandem fiat linimentum seu balsamum Venereum ex oleo nucis moschatæ expresso, quod misceatur cum aliquot guttis olei destillati caryophyllorum, sic mollescit, hinc adde aliquot grana zibethi & moschi q. pl. quo scrotum, testes & regio pubis inungantur: vel succo ex ovis formicarum expresso parum zibethi admisceatur. Verùm observandum, ubi talia sive violentia inungantur testibus pro excitanda eorum vi, aut inungantur peni pro augenda voluptate in actu Venereo, ne odor nimis feriat nares, nec simul inungantur talibus nares, aliàs plus nocent, quàm profunt; nimis enim tunc spiritus afficiuntur, ut minùs possint sufficere actui ipsi seu exercitio Venereo.

Quod attinet defectum testium, si scil. lateant in abdomine, tunc ad restituendos testes in naturalem locum, ut scil. in scrotum descendant, optimus est motus corporis, saltatio ac similia exercitia. Rulandus in *Thef. Pract. pagin. 282.* curavit 2. adolescentes, quorum scrotum testibus erat vacuum, & qui super os pubis jam à nativitate usque retracti fuerant, beneficio balnei emollientis: post quem in fessum inunxit locum, ubierant testiculi cum balsamo sulphuris, hinc successivè detrusit testes in scrotum infra, & hinc sub virga laxiore, injectâ ligaturâ eorum retractionem impedivit.

## ARTICULUS II.

De

### *Testium Inflammatione.*

**I**Nter testium tumores primatum ducit inflammatio testium & scroti, quæ fit ob sanguinis circulum per testium canales impeditum, indeque obortam sanguinis stagnationem, quæ, cum continuo affluxus sanguinis augeatur, in tumorem inflammatorum convertitur.

Causa inflammationis testium, uti rarò est interna, ita sæpissimè externa, ut concussio scroti & testium, v. gr. sub equitatione compressio violenta, wenn man sich an den Sattel knopff stößet / vid. M. A. N. C. ann. 6. 7. *observat. 47. pag. 81. & 82. & ann. 9. & 10. observat. 158. pagin. 349.* contusio, plagæ & crebra verberum inflictio, ligaturæ violentæ, & quæ sunt aliæ. Interdum go-

norrhææ, in specie virulentæ seu malignæ; suppressio etiam causa solet esse periculose testium inflammationis.

### DIAGNOSIS.

Inflammatio testium facillimè cognoscitur ex tumore tam testium, quàm interdum simul scroti à latere testis affecti, conjuncto cum dolore gravi, partim lancinante, partim vehementer pulsante, orto ex sanguinis impedito motu & circulo, cum calore ardente, & denique ex partium vicinarum, sæpissimè scroti, rubore & incalescentia: sicut febris plus minus lentæ pro inflammationis ratione observatur. Tactū imprimis dolor exasperatur, & sensus doloris sursum usque ad lumbos ferè porrigitur ratione membranarum, vala spermatica & testes involventium, membranis circa lumbos continuarum.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Inflammatio testium non contemnenda est, propter gravem dolorem interdum convulsiones inferentem, & metum gangrænæ, in quam, nisi citò discutatur, transit.

Ubi est inveterata, & ad statum perducta, periculosa est sæpissimè propter abscessum, cui pariter facilè gangræna supervenire solet, faciliùs tamen in scroto inflammato (ut aliquoties vidi in Italia, imprimis ubi causa remota est venenum Venereum) quàm in testibus inflammatis: cui tamen per gangrænam absumpto natura provida substantiam carnosam substituit, quâ muniuntur testes: Vid. Panarollus *Pent. 1. cap. 25.* Bartholinus *Centur. 6. Hystor. 69.* Timæus von Guldentlee / in *Casibus pagin. 296.* Sennertus *libr. 3. Prax. ubi de scroti morbis pag. 911.*

### CURA.

Quoad curam testium & scroti inflammationis: hæc ipsa vel

1. Discutienda; idque diversimodè pro causarum ratione, quod ut melius fiat, dolor imprimis sistendus est; vel
2. Suppurandus; hinc
3. Abscessus aperiendus, & ulcus mundificandum.

Præmissis ergò universalibus internis, & venæsectione, ubi opus est, curatur per diaphoretica, inflammationem discutientia, imprimis per ea, quæ blando sudore sanguinis circuitum promovent, & quæ aliàs in omnibus inflammationibus in usu sunt.

Externè pro discutiendo tumore & resolvendo præ cæteris expertissimum est cataplasma ex farina fabarum, cum aceto vini, vel solo, vel cum oxycrato, cocta & applicata: cujus aliquot experientias videbitis in Riverii

*Obser-*



*Observ. Centur. 2. observat. 37. Cent. 3. obs. 1. Cent. 4. obs. 74.* uti & in *Observationibus communicatis*. Addi etiam commodè potest semen cumini, item flores chamomillæ & meliloti, & magis discutit. Quod si acrius fuerit cataplasma propter acetum, & scrotum excoriari velit, sub decoctione lithargyrii vel cerussæ parum commodè addi potest.

Sic tumor scroti ex percussione curatus fuit per cataplasma ex farina fabarum, hordei, semine cumini, floribus chamomillæ, meliloti, rosarum cum oxymelle, vid. *Riverius observat. commun.*

Posthæc convenit cataplasma ex herba *Paridis* contusa. Aliàs fieri possunt similia cataplasmata & fots ex cicuta, solano, agrimonia, vel radice cucumeris asinini, verbena, foliis rutæ, chamomillæ, & similibus, in vino vel posca coctis, & partim tanquam fomentum, partim tanquam cataplasma applicentur: vid. *Forestus lib. 27. observ. 1. in schol. & observ. 4.* Cataplasma *Hartmanni* ex *foliis nymphææ & nasturtii aquatici*, si ana coqu. in aceto rosaceo & vino, & permisceantur cum pauxillo olei rosarum, applicari potest. Quod si testes & scrotum inflammantur ex contagio Venereo post coitum cum meretrice, aut inflammatio dictarum partium conjuncta sit cum gonorrhœa, vel benigna vel maligna, cataplasma ex foliis rutæ & ebuli cum posca coctis applicatum, laudatur ab *Hartmanno*. Melius adhuc est fomentum *Lindani* ex decocto radicis chinæ & florum sambuci in cerevisia generosa, aut loco hujus in vino; quo sæpius fomententur partes. Fit interdum, ut ex applicatis acrioribus externis oriatur inflammatio dictarum partium, in qua optimus est fots ex lacte, cui incocti sunt flores chamomillæ & sambuci. Subindè fit, ut acerbus dolor conjungatur cum inflammatis testibus, hic ut sedetur, modò dictis externis optimè adduntur folia hyoscyami.

Aut adduntur his ipsis mucilagines seminis psyllii cum  $\nabla$  spermatis ranarum extractæ. Tandem balsamus sulphuris *Rulandi* ad extra cum oleo nucum paratus, reliquias tumoris absomit.

Quod si modò dictis remediis nequeat discuti inflammatio, sed ad suppurationem tendat, necesse est, ut adjuvemus naturam in suppuratione, & suppuratæ inflammationis apertione. Pro maturanda ergò suppuratione conveniunt maturantia & emollientia in lacte cocta. Præ aliis expertum est emplastrum filii *Zachariæ*, malaxatum cum balsamo  $\Delta$ isterebinthinato: item ubi dolor simul urget in suppuratione, qui semper est præsens, tunc recipiantur folia hyoscyami sub

cineribus cocta & contusa, excipiantur cum axungia porcina, & reducantur ad formam cataplasmatæ, quod dolorem sedat, & simul inflammationem maturat. Quò etiam pertinet unguentum dialthææ, populeum, unguentum dia-chylon, & similia, quæ alias solent maturare tales inflammationes. Maturatus tandem debite abscessus aperiendus est manu chirurgi, lancettâ, & hinc suppurantibus & exsiccantibus curetur. Vid. *Barbette Anatom. Pract. Part. 2. cap. 2.* item *M. A. N. C. Ann. 2. observat. 235. pag. 337. Ann. 6. & 7. observat. 47. pag. 87. & Ann. 9. & 10. observat. 158.*

## ARTICULUS III.

De

### *Pneumatocèle.*

**P**neumatocèle est tumor, qui oritur à flatibus, imprimis intra membranas testes involventes collectis; estque saltem inflatio testium, nunc unius solum, nunc utriusque, nunc testis solius, nunc etiam scroti. *Pneumatocèle* hæc nunc est solitaria, nunc, idque ut plurimum, cum hydrocèle juncta.

### C A U S Æ.

Flatus hi nunc, idque rarius, in scrotum aut vicina loca ex abdomine transmittuntur, nunc, idque frequentissimè, in ipsa parte affecta oriuntur ex nutrimento spermatico membranarum testes obvolvendum, quod vitiosè alteratum & corruptum, plus minus, ab acido vitioso per fermentationem inducto transmutatur in flatus; quod malum pueris ferè est familiare.

### DIAGNOSIS.

*Pneumatocèle* cognoscitur, quando testes successivè fiunt tumidi insigniter, sine pondere tamen & gravitate, cum dolore tensivo, simulque scrotum in se est adhuc rugosum & flaccidum. Si verò flatus ipsum scrotum occupant, hoc, si manibus premittur, facilè de loco in locum movetur.

### P R O G N O S I S.

*Pneumatocèle* est sine periculo, nisi propter dolorem & tumorem sit molesta.

### C U R A.

*Pneumatocèle*, seu hernia flatulenta est omnium levissima & curatu facillima, discutientibus & carminantibus saltè tractanda. Unde interna, quæ

quæ de flatibus & de colica flatulenta dicta sunt, adhibeantur; in specie remedia ex feminibus 4. calidis majoribus, ex corticibus aurantiorum, floribus chamomillæ, baccis lauri, &c.

Externè ex similibus parentur cataplasmata cum oleo rutæ, chamæmelino, costino, &c. addito V, ut eò melius penetrent: Agrimonia in specie valet ad inflammationem testium, vid. Hildanus *centur. 3. observat. 87*. His accedunt fofus discutientes, inter quos usitatus est iste ex duplo fabarum farinæ, & parte j. seminis cumini: in quorum defectu commodè usurpari possunt baccæ lauri, imprimis subacti cum fimo vaccino recenti, quod cataplasma mirè discutit; laudatum à Foresto *libr. 27. observat. 25*. Optimè convenit fofus, quo Solenander *conf. 15*. tumorem scroti & testium ab humore influente & flatu enatum curavit, cum pannis ibidem intinctis crebrius applicandis:

℞. sem. coriandr. ʒß.

cumini,

anis. ā. ʒij.

alum. ʒß.

vini

℥a commun. ā lbj.

Coqu. invicem leviter, & dicto modo applicetur loco hernioso ex flatibus.

## ARTICULUS IV.

De

### Hydrocele.

**H**ydrocele, seu tumor testium aquosus, qui tumori scroti & testium hydropico contradistinguitur, ita dicitur ab aqua, intra testium membranas contentâ. Aliàs tumores testium dicuntur herniæ, proptereâ saltem, quia cum scroti tumore conjuncti sunt, sed impropriissimè; quia tamen aliquam similitudinem habent cum hernia vera, quæ fit ex descensu intestinorum in scrotum, sic appellari possunt.

### C A U S Æ.

Hydrocele oritur à lymphæ recursu ex testibus impedito, dum nempe vasa lymphatica in quodam loco obstructa, & lympham effundunt intra membranas testes involventes. Quod si hæ rumpantur tunice, ipsum scrotum in medietate testis affecti etiam impleri solet: sed ferè membrana, in qua colligitur aqua, quò diutius stagnat hæc, eò solet fieri spissior, crassior & densior, unde malum redditur contumacius, adeò, ut nec facile rumpatur, sed potius tumorem plus minùs duriusculum repræsentat.

### DIAGNOSIS.

Hydrocele non facilè cognoscitur, in specie quando malum est confirmatum, & membranz, in quibus collecta aqua, admodum spissæ ac crassiores fiunt; tunc enim subindè tumorem duriusculum, renitentem tactui, repræsentant, adeoque hydrocele similis est herniis carnosis. Interim testi, si herniâ aquosâ laborat, utut sit durus, potest induci fovea, quod in carnosâ hernia non fit.

Patet aliàs hydrocele ex sensu fluctuationis cujusdam in scroto seu locis vicinis, dum scil. testes premuntur intra membranas internas, tumor nunc molliusculus, aut facilè tactui cedens percipitur: item scrotum, vel ex toto, vel ex dimidio quasi lucidum ac minùs rugosum apparet, præcipuè si ex opposito candela ponatur, ægerque de pondere & gravitate conqueratur, nec tumor per compressionem aut decubitus resupinatus facile in abdomen recedat, ut in enterocoele fit, sed semper ferè ejusdem magnitudinis, rotundus, paulò longior, instar ovi, apparet, neque habet suas vicissitudines, & potius incrementum, quàm decrementum sumit, testiculus econtrâ tactui ferè occultatur.

Quod si testes soli intumescant, scrotum adhuc rugosum aliquomodo apparet; quod non evenit, ubi præter testes intra scrotum jam aqua collecta fuerit, quod ipsum tunc expansum, & sine rugis conspicitur.

Si verò collectus est humor intra tunicas intimas non potest percipi; nam hic ipse testem relaxare solet.

Prout autem humor lymphaticus aut intra scrotum, aut intra tunicas testium, nunc in superiori, nunc in inferiori loco includitur, etiam diversam tactui formam cum teste plus minùs manifesto aut occultato repræsentat.

### PROGNOSIS.

Hydrocele periculo caret, & tantum dolore & tumore molesta est. Si verò sit inveterata, ita, ut membranz istam investientes jam tenaciores & firmiores redditz fuerint, vix sine chirurgia curatur, recens verò adhuc medicamentis discuti potest.

### C U R A.

In hydrocelis cura imprimis in principio discutientia & resolventia valida applicata conducunt, præmissis & annexis internè essentiâ & extracto elaterii, radice gialappæ, gummi de Peru, & similibus serum superfluum evacuantibus: quin & præmissis diureticis, specialiter succinatis & arcano duplicato, quod feliciter adhibuit Ludovici in *M. A. N. C. ann. 9. & 10. obs. 158*.

Externè

Externè conveniunt, discutientia & resolutiva : quæ inter convenit emplastrum hydropicum Augustanorum, item emplastrum ad hernias Schrœderi cum exuviis serpentum, loco anguillarum, paratum : Vel illinatur balsamum sulphuris Rulandi, vel solum, vel cum unguento althææ mistum.

Si est debilius, convenit hoc emplastrum :

℞. *emplastr. de bacc. lauri*  
*stercor. caprill. ana ʒiʒ.*  
*sem. cumini*  
*℞. ʒis, aut ʒis pulverisat. ana ʒij.*  
 Misc. & malax. c. ʒo *ruta & chamomilla*  
*ana q. l. f. Emplastrum.*

Parti tumenti, tam in hernia aquosa quam in tumore scroti hydropico, admoveatur.

Loco hujus emplastrum carminativum Mynsichtii scroto applicari potest. Primitum obtinent cochleæ cum suis testis contusæ, & cataplasmatibus modo applicentur, vel solæ, vel cum stercorebus animalium, in specie caprino & vaccino & semine carvi. Vel, quod mirè commendat D. Michaëlis in tumore hydropico conveniens.

℞. *flor. chamom.*  
*HB. Parid. ana M. ij.*  
*farin. fabar. ʒʒ. l. ʒj.*  
*sterc. caprill. ʒij.*  
*pulv. testar. cochlear. ʒij.*  
 Coque in  
 ▽ *chamom. part. jv.*  
 + *i destill. part. j. l. ana part. x equal.*  
 ad consistentiam cataplasmatibus scroto applicandi:  
 D. S.

### Zertheilender Umbschlag.

Decocto prius fomentetur scrotum, & demum desuper applicetur cataplasma.

Quod si forsan ex ascite imminet hydrocele, aut tumor scroti hydropicus, tunc petroselinum viride contusum; & scroto impositum, domesticum quidem, sed laudandum est remedium.

Item

℞. *nasturt. aquat.*  
*nymph. ana part. x equal.*

Ex quibus cum aceto rosaceo contusis, addito ʒeo rosaceo, paratur cataplasma, quo tumorem testium magnum dolorificum in hydrope, aliis irritis, curavit Rulandus in suis curationibus.

Cataplasma ex farina fabarum cum vino & oxymelite supra laudatum etiam in hydrocele confert. Conf. Riverius *Centur. 2. Observ. 4.*

Tom. II.

Sed nihil nobis negotii est cum tumore scroti hydropico, potius ad hydrocelen pergitur, quæ si confirmata, medicamentis non potest resolvi aut discuti, quin pertinacius resistat, aut si simul substantia corrosa adesse observetur, quæ facile in cancerum degenerat, ad Chirurgiam accedendum est, quæ duplici modo instituitur: vel in puncturâ, vel castratione. Quoad puncturam: perforatur scrotum; quo perforato simul pertunditur membrana testium extima, in qua solet esse conclusus humor seu lymphâ. Hæc aperiatio in hydrocele simplici nullum habet conjunctum periculum, & tutissimè instituitur, utut aperiatio scroti & testium in tumore ejus aquoso hydropico sit periculosissima: Nam in tumore testium scrotique hydropico aperto ut plurimum supervenire solet gangræna, sive per cauterium potentiale, quod minus tutum, sive cum ferro, aperiatio instituitur: Conferatur Bartholinus *Cent. 3. Histor. 69.* Confer. Hildanus *Cent. 4. observ. 68.* Verum, utut aperiatur & extrahatur seu evacuetur liquor, nihilominus tamen non semper radicaliter malum curatur, quin periculum est, ne crebrius recurrat, unde sæpe necesse est, ad tollendam hydrocelen amputatio integri testis hydrocele affecti ut instituitur, præprimis si durior ac spissior fuerit membrana, aut testis gangrænâ affectus sit, ne partes vicinæ corruptæ ex superventu gangrænæ vitæ periculum inferant. Operatio est tuta & extra periculum, modò cum dexterritate obeatur: sc. in latere, ubi est tumor testium aquosus, instituitur aperiatio scroti inferius, & super tumorem vasa præparantia filo interjecto fortiter constringuntur & ligantur, quod celeri manu fiat, quia dolorosum est, postmodum infra ligaturam abscinditur testis unâ cum tumore. Vulnus scroti lentè curatur, ut filum, quod extra scrotum propendet, spontè separetur, & tunc citra periculum vulnus scroti coit. De cura hydroceles per sectionem vid. Amatus Lusitanus *Cent. 4. Cent. 2. Cur. 84. & Cent. 5. Cur. 69.* ubi singulis 6. mensibus humor sectione evacuandus venit. Sunt etiam, qui ad hydrocelen laudant punctum aureum, quo ipso & solent curare herniam intestinalem, sed minus tutum, minusque certum est hoc auxiliigenus.

## ARTICULUS V.

De

### Testium Scirrho.

SEquitur tumor testium durus, qui in specie ex inflammatione eorum malè curata oboritur, sine calore, sine febre,

(Y y y y)

CAU.



## CAUSÆ.

Oriuntur imprimis & sæpissimè ex vitiosa inflammationis curatione, aut insufficiente discussione, quatenus acidum in omni inflammatione præsens & concentratum per modum coagulationis materiam inspissat & indurat; tales scirrhi involvunt interdum nonnihil maligni, quasi cancerosi, præsertim, si punctiones subindè acutæ in iis observentur. Interdum etiam durities seu scirrhus in teste à calculis observatus fuit, post mortem inventis, teste Platero *observ. pag. 664.*

## DIAGNOSIS.

Scirrhos testium facillimè cognoscimus tactu: Imprimis tumor durus renitens tactui & indolens, sine calore vel inflammatione, eamque minùs concinnè tractatam sequens, vel alio modo superveniens, scirrhum innuit.

Quod si subindè punctiois percipiatur sensus, aut cujusdam lancinationis, latentis tumoris cancerosi seu scirrhi nothi oritur suspicio.

## PROGNOSIS.

Tumores testium scirrhosi per se parum periculi habent conjunctum, nisi interdum dolor punctorius accesserit; tunc enim ad cancerum inclinant, & ita periculum latentis canceri incutiunt.

## CURA.

Quod si testes inflammati ex perversa cura in tumores & scirrhum degenerent, fiatque tumor durus ac scirrhosus, hic emolliatur ac discutiatur materia collecta: id quod tamen difficulter fit.

Pro quo scopo conveniunt præ cæteris gummata in aceto soluta, & sunt primariò Ammoniacum, hinc galbanum, bdellium & similia; item emplastra officinalia de cicuta, de Ammoniaco; (Nam hoc ipso Forestus curavit testem insigniter scirrhosum post inflammationem, idque omnibus remediis aliis irritis in *lib. 27. observ. 5.*) Balsamum sulphuris & emplastrum diasulphuris Rulandi. Convenienter etiam cum emplastro Ammoniaci miscetur emplastrum de cicuta, si ambo malaxentur cum oleo chamomillæ, ac ita applicentur; resolvunt namque testium scirrhos, e. g.

*Rx. Gum. Amm. c. + solut.*

*empl. de cicut. ana q. s.*

*Dissol. malax. q. s. q. ʒo destillati ʒi l. ligni Guajaci, & inducantur super linteam.*

Imponitur loco affecto, alternis diebus novum imponendo.

Quibus etiam semen & folia hyoscyami addere licet; nam tali cerato apostema fri-

gidum & durum scroti ac testium curatum fuit à Foresto *l. a. observ. 7.* Efficacissimum quoque est hoc:

*Rx. Rad. alth.*

*fr. halicacabi ana M. j.*

*rad. mandrag. rec. ʒvj.*

Coqu. in l. q. *sapa*, & contundantur, & per cribrum trajiciantur: adde

*opopan.*

*bdellii*

*g. amm. in vino sol. ana ʒvj.*

*styrac. ʒiij.*

*c. f. q. ʒ chamom. f. Cataplasma, vel cum cera f. Emplastrum.*

Aliud Emplastrum expertum videb. in Timæo von Guldentsee / in *Cas. lib. 6. Conf. 12. pag. 271.* quod præmissio foru emolliente, & suffitu vaporis aceti ex lapide lateritio seu silice candente excitati applicavit, & quo ipso discussit scirrhum.

Observandum tamen in scirrho testium, si simul is sit dolorosus, cautè esse procedendum, ne in cancerum degenerare faciamus eundem; unde oleosa mucilaginosa, & quæ aliàs propriè emollientia dicuntur, sunt omittenda, & in solis Gummatibus & similibus persistendum.

Forfan vinacea hic non sunt inutilia: Sic enim Borellus *Cent. 2. observ. 42.* refert dolorem & tumorem cum inflammatione sæpiùs recurrentes, demersione femorum in vinacea calida curatos.

Quod si à suppressa gonorrhœa, præsertim Gallica, supersit tumor durus, applicari potest emplastrum de ranis cum Mercurio, vid. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Append. pag. 62.*

Quod si in pus abeat substantia tumoris, maturè apertio fiat, ne integra testis substantia corrumpatur, aut gangræna superveniat, quin & subindè necessum est, testem tum excindere.

## ARTICULUS VI.

De

*Sarcocele.*

PRÆter dictum tumorem scirrhosum & aliud tumor durus supervenit testibus, qui affectus vocatur sarcocele seu hernia carnosæ: nempe caro quædam superflua his interdum adnascitur, nunc tantum alteri, nunc utrique, quando occasione quadam externâ læduntur partim fibræ nervæ, partim carnes, ubi circa dictas fibras læsas coagulatur & exoritur excrecentia quædam carnea, medii generis intra fibras carneas & nerveas, eaque duplex: nunc dolens, maligna, cancerosa, cum punctioibus variis mole-

molesta ; nunc indolens. Hæc ipsa sarcocele communis est ambobus testibus ; Siquidem tam in dextro , quàm in sinistro & hydrocele & sarcocele observata fuit , quod observandum contra Hildanum *in observ. Chirurgicis Centur. 4. observat. 64.* qui refert, dextrum testiculum imprimis sarcocele , sinistrum verò testiculum hydrocele laborare. Nam Riolanus *Anthropologia lib. 2. cap. 31.* in dextro testiculo ter hydrocelen vidit ; sicuti etiam aliquando in sinistro teste herniam carnosam , quin & talis caro non solum testibus , sed etiam membranæ dartos seu scroti internæ non raro adhæret , citra testium contactum. Tumor observatur in scroto durus , successivè auctus , ferè indolens , interdum , si malignus , punctorius dolor adest.

## CAUSÆ.

Oriuntur hi tumores carnosii ut plurimum à læsione testium externa , contusione , ictu , lapsu , laceratione , &c. Nam uti hæc , & similes causæ aliæ , inflammationem interdum inducunt ; ita etiam interdum , laceratis fibris atque membranis , & vasculis testium ruptis & laceratis , alimentum proximum & sanguis in motu non nihil sistuntur , & in poris hinc inde uberius coacervantur & alterantur , & tandem successivè in substantiam talem carnosam , plus minus notham assimilantur ac transmutantur , simili modo , ac si , ut rectè loquitur Sennertus , in arboribus cortex externus lædatur , ex affluente alimento nodi fieri solent. Probè tamen hinc quoque observandum est , ne , ut suprà monitum , lymphæ intra crassèfactam membranam densius constricta ramicis carnosii seu sarcoceles facie imponat. Neque confundenda est hæc cum tumore epididymidum , quæ seminali materiâ tumidæ speciem sarcoceles incautis inferre solent , vid. Barbette *in Chirurg.* Siquidem subindè præ seminalis succi copia epididymides ita tument , ut non rarò testium molem repræsentent ; aut superent ; idque propter sui extensionem non absque duritie ; aut quando testiculi sunt scirrholi , unde in epididymides copiosius sanguis influit ; aut etiam quando copia talis adest succi seminalis , ut copiosius collectus in epididymidibus , & ibi suppressus. Epididymides tumere faciat , adeò ut ex tali causa observatum fuerit , epididymides mole interdum ipsos testes , æquasse. Inveterata etiam hydrocele propter densitatem membranarum sarcocelen interdum mentitur.

## DIAGNOSIS.

Sarcocele ex tumore duro indolente , & ferè scirrholo , vel teste incumbente aut ad-  
Tom. II.

nato , vel ipso scroto adhærente , patet , immutabilis est , constans potiùs , subindè accrescens quasi ponderis testi adhærentis sensum percipiunt ægri : Sin verò simul dolet , periculum est , ne sit caro cancrosa.

Successivè ad molem talem succrescit caro hæc , & ex insensibili principio sensim augetur , secus ac in aliis testium tumoribus.

Interim tamen non confundenda est sarcocele cum tumore prostatico , quorum signa distinctiva jam explicui.

## PROGNOSIS.

Tumores testium carnosii non admodum periculosi sunt , nisi quod propter accedentem dolorem punctorium cancer metuendus sit. Sarcocele ergò si est dolens & maligna cancrosa , non est tangenda.

## CURA.

Sarcocele incipiens curatur internè per medicamenta , imò si tantillum inveterata , non nisi vel ipsius carnis , abscissione , vel testis ipsius ex sectione : Vid. Barbette *in chirurg. p. 1. cap. 25.* Hieronymus ab Aquapendente , & Scultetus *in Armament. Chirurg.* In cura ergò , præmissis universalibus , attenuantibus & exsiccantibus , aut tumoris incrementum præcavendum , aut ipse tumor successivè absumendus : Pro hoc scopo inter remedia interna conveniunt terrea calcinata & alcalisata , quæ in strumarum cura solent esse in usu , v. g. pulvis contra strumas usitatus Arnoldi Villanovani : Lotichii *in obs. pag. 514.* ex spongiis combustis , cynosbati , lapide spongiæ , ex radice consolidæ majoris , herniaria perfoliata , terra sigillata , &c. conflatus. Item pulvis radice ononidis meretur laudem , qui ad 3j. per plures menses usurpatus non tantummodò à Matthiolo , sed etiam ab Hornio *in Cista Medica* , Sculteto *in Armam. Chirurg. obs. 74.* Bartholini , *Act. Med. Hafn. Vol. 1. pag. 189.* & in *Ep. Cent. 4. Epist. 13. & 14. pag. 52. & 57.* admodum commendatur ; item ejus decoctum & essentia , ut & spiritus Ois dulcis , tam internè assumptus , quàm tumori externè illitus , ab Agricola commendatur *Comm. in Poppium*. Verùm interna parùm præstant , cum & externa non semper satisfaciunt scopo. Antequam tamen ad excissionem testis sarcocele affecti perveniamus , applicanda sunt externa potenter emollientia & resolventia : quæ inter imprimis sunt fofus ex cineribus sarmentorum vitis cum nitro & acetomistus & applicatus , emplastrum diasulphuris Rulandi , item cataplasma ex  $\Delta$ e , & testis cochlearum cum aceto ; Item luta thermarum in ipsis thermis applicata scroto , usurpantur. Primatum ducunt gummata penetrantia & resolventia , & hujusmodi tumores nunc emollientia , nunc suppurationem eorum  
(Y y y y 2) rum

rum promoventia; unde gummi Ammoniacum, & ex eodem paratum cerotum & emplastrum, hic suam meretur commendationem: Sic in Sculteti *Armam. Chirurg. obs.* 47. habetur emplastrum ex Ammoniaco expertum contra sarcocelen vel usurpetur emplastrum, quod præscribit Lotichius *in observat. pag.* 514. & ipsi tanquam secretum communicatum fuit à quodam Lithotomo, tam contra aquosam, quàm carnosam herniam.

Emplastrum aliud ad hernias carnosas commendatum videb. in Scriptis Paracelsi, *Tom.* 5. *Conf.* 3.

Si suppuratur, loco convenienti aperiatur, aut facta apertura spontanea, apostemati aperto imponendum est emplastrum ex gummis & colophonia, donec materia resoluta evacuetur, quod emplastro stiptico debito modo ulterius tractandum & consolidandum venit. Si non metuat æger de impotentia Venerea, optimum est applicare emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio, sed propter Mercurium periculosum est, ne destruat vis testium. Thermarum usus sarcocelen si non planè discutit, earundem tamen incrementum avertere solet. Ubi talia & similia non juvant, sectio instituenda, & cum tumore testiculus amputandus: Apertio facienda, ubi tumor fuerit minor, in scroto à latere: Ubi verò altius in vasa præparantia adscenderit tumor, apertio faciendain sanguine supra os pubis ubi vasa spermatica descendunt ad scrotum, & ibi vel substantia carnosafolitaria sectione tollenda, vel unà cum teste excreſcentia excindenda, & ligatio, uti artis est, faciendaa.

## ARTICULUS VII.

De

### *Hernia Varicosa.*

**P**ars affecta tumoris testium varicosi, dicti hernia varicosa seu *κισσοκήλη*, sunt vasa spermatica, præsertim venosa, ad testes protensa, quæ subinde dilatantur, & tumorem circa testem in scroto efficiunt: Nam vasa hæc super testes in varios anfractus, in varias inter se anastomoses, invicem intexuntur & contorquentur, ut inde vasa pampiniformia dicantur. Quod si fiat, ut sanguis refluens crassior ob aliquod impedimentum in ejusdem motu circulari, in his anfractibus seu amplexibus circa valvulas hærens, ibidem stagnet, fit, ut venæ circa valvulas laxatæ in uno loco plus, in altero minus & inæqualiter distentæ hinc inde circa testem tumeant, & tandem talem tumorem interruptum seu inæqualem & varicosum, nunc eminentem, nunc depressum constituent, ubi contactus testium inæqualis est, tuncque hinc inde crispaturæ quasi se offerunt. Tumor rarò est adeò ingens, & cum

testis tumidus tangitur, quasi funiculi tenſi hinc inde oblique distributi, & nodi inæqualiter uvæ in modum conglomerati observantur cum testiculi plus minus relaxatione. Indolens ferè est malum, interdum tamen, dum intestina flatibus sunt distenta, aut pedes refrigerantur, aut vasa ista quavis ex causa dilatantur, dolor aliqualis percipitur. Fit ut plurimum à causa externa, saltu nimio, casu, interdum etiam refrigeratione & humedatione scroti nimia.

## DIAGNOSIS.

*Κισσοκήλη*, seu hernia varicosa tactu patet; dum vasa testium tumida hinc inde percipiuntur instar funiculorum hinc inde complicatorum; teste ipso laxius ut plurimum propendente, nisi cum flatibus intestina distendunt, aut pedes refrigerantur, aut graviore conatu feces alvinæ excernuntur. Dolor subinde hunc tumorem comitari solet.

## PROGNOSIS.

Cirfocele difficile malum est, & quod etiam interdum cancri aliquid occultum habet.

## CURA.

Quoad curam: Tumor varicosus medicamentis internis curatu difficilis est: attenuantibus tamen & dissolventibus curatio tentanda, in quem finem laudatur imprimis unguentum basilicum, pinguedinibus emollientibus & medullis animalium si imprimis jungatur & applicetur, donec emolliatur tumor varicosus, Autore Ferrara *obs. Chirurg. lib.* 1. *pag.* 58. Item applicari potest emplastrum de mucilaginis, mixtum cum ana gummi Ammoniaci in vino soluti, & emplastri de Ammoniaco; vel solum & Philosophorum probè rectificatum illitum loco hernioso discutit eosdem tumores. Thermarum etiam externus usus observatus fuit admodum proficiuus, si non planè discutit, earundem tamen incrementum inhibet. Hernia autem varicosa inveterata non curari potest citra chirurgiam.

## CAPUT II.

De

### *Laesa Genituræ Virilis Retentione & Excretionem.*

**L**æditur naturalis genituræ retentio & excretio 4. modis:

1. Quando genitura citra coitum effluit.
2. Quando in coitu nimis citò ejaculatur.
3. Quando in coitu nimis tardè emittitur; &
4. Quando nulla genitura neque in neque extra coitum excerni potest.

ARTI-



## ARTICULUS I.

De

*Genitura citra Coitum Excretionem.*

**Q**Uoad 1. quando citra coitum genitura effluit, vel hoc interdum tantum nocturno tempore moderatè cum insomniis, & juncta voluptate Venerea effunditur, diciturque tunc pollutio nocturna, quæ res est omninò naturalis, & quæ, quâ talis, Medico Practico non subjicitur.

Vel semen effluit noctu sæpiùs, idque imprimis citra sensum Venereum, imò etiam subindè interdium, frequentius, aut rariùs, citra voluptatem, interdum cum dolore, ac sine seu citra membri tensionem, &c. tunc talis fluxus genituræ gonorrhœa appellatur, à *πρω* suo, & *γονη*.

Hanc gonorrhœam melioris methodi ergò distinguam in veram & notham: Gonorrhœa vera est, quando vera materia seminalis, aut ipsi saltem proximè similis, in testibus tamen elaborata, crebrò nimis & copiosius effluit, tam noctu, citra tentiginem, quàm interdium, flaccido etiam pene: Nota gonorrhœa verò est, quando alia materia vitiosa, vel liquamen ferosum plus minus acre, aut decolor aut fœtidum, loco seminis ex pene continuò effunditur, eaque ex prostaticis.

## MEMBRUM I.

De

*Gonorrhœa Vera.*

**I**N gonorrhœa vera ægri fiunt graciles circa lumbos, & impotentes in motu: Conqueruntur de lassitudine & debilitate crurum capitique: Supervenit huic ipsi atrophia corporis, & imprimis debiles & pallidi fiunt, oculorumque orbitæ excavatæ apparent: Visus & oculorum fulgor perit, quin potius oculi quasi opaci aut cornei, & minus lucidi solent perspicui: Tandem fiunt tremuli, appetitus perit, functiones animales sensim deficiunt, cum semper cum genitura aliquid spiritus genitalis simul effluere soleat, & ad tabem dorsalem pergunt, eamque duplicem: de qua vid. Willisius *Pharm. Ration.*

## PARS AFFECTA.

Pars primariò affecta sunt vesiculæ seminales, in quas ex vasis deferentibus defertur genitura, & in quibus solet retineri, donec vel spontaneo impetu, vel in coitu debeat effundi.

## CAUSÆ.

Gonorrhœa vera triplici fit ex causa: nempe 1. à nimia copia aut abundantia genituræ, unà cum laudabili ejusdem consistentia, aut

nimia ejus excitata turgescencia; unde non tantum uberius & continuus Veneris stimulus adest, sed etiam, ubi genitura paulatim turgescere incipit, levi occasione, impetu facto, ex vesiculis seminalibus mox erumpit, & cum voluptate ejaculatur.

Causæ remotæ sunt victus largior & lautior, potus vini dulcis generosi, vitæ genus laboribus, tam corporis quàm animi, vacuum, meditationes & conversationes circa objecta Venerea, Veneris consuetæ abstinencia, &c. quò etiam facit situs corporis, quando dormientes nocturno tempore imprimis dorso diutius supini incumbunt; tunc enim sanguis in regionibus abdominis posterioribus & exterioribus uberius coacervatus, indeque magis incalescens, etiam per vasa spermatica aliæque ad pudenda derivata, intensè calefaciendo genituram abundantem, hinc turgere, hinc stimulare, & tandem, spirituum animalium superveniente impetu, erumpere facit: id quod fit non tantum juvenibus, sed etiam in viduis, quæ à Venere solita abstinere coguntur. Par quoad effectum est ratio flagrorum ad rem Veneream interdum utilium: de quo vid. Meibomius *Tract. de usu flagrorum in Re Venerea*. Gonorrhœa talis nocturno imprimis tempore accidit.

Sin verò cum dicta genituræ abundantia seminales vesiculæ simul nonnihil laxæ & flaccidæ, aut etiam meatus in urethram, ex iisdem nempe vesiculis, patentiores solito sint, in talibus levi datâ occasione & turgescencia etiam interdium genitura subindè elabi solet, accedente membri tensione, & aliquali Venereo pruritu, idque, quod excernitur, est copiosum, crassiusculum, candidum, glutinosum, & naturaliter constitutum, uno nomine: genitura naturaliter constituta, idque imprimis cum stimulo aut pruritu Venereo. Unde mulieres frequenter vel intensius cogitantes de re Venerea, ut noctu facilè genituram ejaculantur, ita etiam interdium quandoque.

2. Fit etiam gonorrhœa vera à nimia acrimonia genituræ, specifico sapore acido, aut falso, seu aromatico imprægnatæ; unde & irritantur partes genitales, in specie vesiculæ seminales, continuo pruritu Venereo, & præterea ista irritatione fibræ vesicularum seminalium & vicinorum muscutorum, in specie elevatorum, ad sui contractionem coguntur, adeoque ita genitura effunditur: hæcque una ex frequentibus gonorrhœæ est causis. Genitura in principio apparet laudabilis, attamen nunc est magis tenuis, &c. Acrimonia tunc peccans solet esse acida ut plurimum, quæ cum sero ad dictas partes delata, solet irritare has partes.

Causæ remotæ, quæ vel genituram acriorem generare & alterare, vel vesiculas seminales & vicinas partes magis stimulare valent, (Yyyy y)

sunt

sunt imprimis copiosius assumpta acriora, aromatica, sinapi, eruca & in specie piperata. Item in iis, qui jam hoc vitio laborant, acida volatilia plus minus vinosa, ut sunt præter vinum, cerevisiæ triticeæ, &c. Sic enim Schenckius *l. 4. observ. pag. 536.* ex Bruyerino *l. 8. cap. 43. de recibaria*, refert, quendam gonorrhœam lisymbrio seu nasturtio aquatico comesto semper pro lubitu, quoties voluit, provocasset: Hinc etiam purgantia assumpta acrimoniâ volatili nimîâ quosdam sæpius partes genitales stimulo, ad Venerem & gonorrhœam stimulant. Exemplum videbitis in Timæo von Guldenslee/ & Platero. Cantharides quoque perversè usurpatæ gonorrhœam, acrimoniâ suâ acuendo semen, & vellicando vesiculas seminales, inferunt. Facit & huc constitutio massæ sanguineæ paulò acrior, aut sero saliore prædita, quod immuens chylosam materiam, genituram reddit acriorem & stimulantem: hinc in scorbuticis, & iis, qui laborant malo hypochondriaco confirmato propter serum massæ sanguineæ, falsius & aerius, genituræ simul plus minus commistum, adeoque acriorem ferè genituram reddens, stimulo hoc malum subinde infertur. In tali casu genitura nocturno pariter ac diurno tempore, nocturno tamen frequentius, cum voluptate Venerea effluit, prout plus minus spirituosâ fuerit genitura, aut prout plus minus à naturali statu recesserit, licet non absque pruritu fortiori, continuo stimulo Venereo ac tentigine sæpius urgente; unde & priapismus interdum conjungitur, vel dolor. In specie observanda est materia excreta, quæ nunc tenuior & liquidior, nunc spissior; illa acrior, hæc minus acris.

3. Fit gonorrhœa vera ex nimia tenuitate genituræ, concurrente tunc simul nimîâ seminalium vesicularum laxitate & flacciditate, non secus ac prostaticarum glandularum, nimîâque aperturâ seu hiscentiâ meatuum ex dictis vesiculis in urethram patentium. Unde & aquosa genitura, dum non ritè continetur, facile effluit: quia laxatis ac atonia seu nimîâ relaxatione affectis vesiculis, ista contineri aut retineri nequit: quæ laxitas vix spontè à causa interna induci potest, sed ferè semper agnoscit causam antecedentem, & fit vel propter nimium, præsertim junioribus annis, Veneris abusum, vel ut plurimum propter nefariam masturbacionem, quâ sæpius reiteratâ & testes laxantur & fermentum eorum debilitatur: Exemplum hujus rei habet Timæus von Guldenslee/ *Cas. 49. libr. 3.* de Studio J. ris, qui tali damnato modo gonorrhœam sibi contraxit. Patent etiam glandulæ prostaticæ poris quibusdam in urethram, quod evidenter apparet in iis, qui gonorrhœa obiere, cujus gonorrhœæ non rarò hi pori dilatati propria sedes sunt: Vid. Bartholinus

*Anat. pag. 144.* Genitura quæ tunc effluit, est vel crassa & laudabilis, vel tandem tenuis admodum, aquosa & serosa plus solito: Illud evenit, si nullum in testibus junctum est vitium, eorum vis est adhuc laudabilis: Hoc vero, si testes simul laborent. Hinc etiam vesiculis seminalibus nimis laxatis, sine insignioris voluptatis aut sine vehementioris tentiginis sensu, interdum non advertentibus, elabatur talis genitura, vel statim ad levem imaginationem Veneream, vel ad levem tæminæ contactum hoc ipsum spontè exilit, effluit, interdum pariter ac noctu, aut ad alvi exoneracionem paulò laboriosiore exprimitur. Adeoque pars affecta in gonorrhœa vera primariò sunt vesiculæ seminales.

#### DIAGNOSIS.

Species gonorrhœæ veræ sunt variz, cujus diagnosi & causarum distinctio partim ex ægro, partim ex recensitis est manifesta. Hoc tantum addo: quoniam genitura semel excreta novo subindè supplemento ex massa sanguinea refarcitur, fit exindè, ut defraudato corpori succo suo rorido & chylo nutritio, tales ægri gracilescant, & tabe dorsali corripiantur.

#### PROGNOSIS.

Quod attinet prognosin gonorrhœæ: Recens facilis curatu, minusque periculosa est: inveterata verò grave est malum, & difficilius curatur. Dum enim diutius continuatur, hominem tandem contabescere, & succumbere lethaliter cogit: vel eosdem in operationibus animalibus hebetat: supervenit imprimis febris hæctica similis, cum tali atrophiz specie, qualis est tabes dorsalis noviter nuptorum: qualis hæctica tunc difficillimæ est curationis.

Uterius gonorrhœa diuturna non subito nimis suppressenda est, imprimis ubi inclinatur nonnihil ad virulentiam Veneream: Metus enim est, ne materia antea copiosius affluens suppressa, & interdum à naturali statu deficiens, inflammationem, aut supervenientem durum tumorem plus minus scirrhum, ac varia symptomata testium inducat, ex stagnatione & regurgitatione materiæ excerni consuetæ.

Gonorrhœæ deploratæ indicium habetur, quæ digito in anum immisso renitentiam habet ad sensum, aut si catheter argenteus intrusus sublividus extrahatur: Tumoris nempe aut abscessus ulcerati illud: hoc verò ichoris gangranosi, indicium est: quod tamen potius de gonorrhœa notha maligna, quàm de gonorrhœa vera, intelligendum videtur. Conf. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. App. p. 59.*

#### CURATIO.

Quod attinet curam: In hac causæ imprimis removendæ sunt, adeoque aut genitura

tura imminuenda, aut ejus fervor & acrimonia temperanda, aut denique testium fermento roborato partes laxæ constringentibus firmandæ.

Pro quibus scopis obtinendis semper observandum simul:

1. Ut habeatur ratio acidi aut acris in quavis ferè gonorrhœa, plus minus peccantis.
2. Habenda est ratio testium, an ritè constituti sint, ac genituram vel naturaliter, vel defectuosè conficiant: id quod præter eorum flacciditatem & mollitiem, & pendulum nimis situm, & ipsa genitura excreta plus minus à naturali statu degenerans, ostendit: adeoque cavendum, ne remediis quibusdam præposterè abhitis destruat vis generativa.

Remedia ergò, quæ in genituræ copia conveniunt, sunt ea, quæ materiam feminalem imminuunt: aut genituram turgescens compescunt, & fermentum testium plus minus enervant. Instituatur ergò diætâ parcior ex alimentis parum acidioribus, minus chylosum succum suggerentibus, unâ cum vigiliis & exercitiis corporis, quæ partim chyli cum sanguine assimilationem faciunt, & partim per transpirationem eandem imminuunt. Quæ fermentum testium enervant, sunt imprimis acida, vitriolata & nitrata, quæ vim genitalem admodum infringunt: Præ reliquis ~ Oli, & ~ Crudum dosi ℥j. bis vel ter assumpta, sunt egregia. Loco horum temperata sunt succus citri, granatorum, succus limonum: unde experimentum Sylvatici *Cent. 4. Conf. 1.* non est inefficax.

Petrus Johannes Faber ad curandam gonorrhœam propinat succum limonum, cui instillavit spiritum terebinthinæ, unâ cum tantillo camphoræ. Solutiones coralliorum cum succo citri etiam laudantur. Porro radix & flores nymphææ albæ, nec non absinthium, commendantur; item millefolium album, myrrha, sperniola Crollii, semen agni casti seu viticis: uti etiam semina cannabîs, papaveris albi, lactucæ, plantaginis, &c. quacunque ratione usurpata. In specie semen cannabîs ad inveteratas etiam, & tantum non desperatas gonorrhœas commendatur, si ex eodem, non secus ac ex reliquis seminibus, cum aqua castitatis fiant emulsiones; quæ tamen emulsiones cum cautela usurpandæ, cum semen cannabîs propter vim narcoticam sit hostile spiritibus animalibus.

Convenit præterea urtica mortua seu galopis flore albo, quæ ex signatura commendatur à Carrichtero, si decoctum propinetur cum vino: Præterea res nota est de mentha, item de ruta, de portulaca & similibus; unde sunt, qui insigniter commendant sequentem pulverem: scil.

℞. *fol. mentha*

*ruta*

*sem. agni casti*

*gall. pulveris. a. q. v.*

Cujus pulveris ℥ij. propinaretur in vino chalybeato, quotidie repetendo. Conf. Helidæus Paduanus *in observ. pag. 170. & 171.*

Succus item milletolii ad ℥ij. cum lacte dulci exhibitus gonorrhœam totaliter curare referunt, imprimis ubi succus simul lactucæ cum camphora externè testibus applicetur. Alii succum malvæ expressum, & in dicto vehiculo adhibitum laudant. Pertinet huc quævis essentia castitatis, quam videb. in Mynsichto & Riverio. Præ cæteris efficax est, idque propter admistam terebinthinam, ∇ ad gonorrhœam Riverii, *Centur. 1. Observat. 25. & in Cent. 2. Observat. 30.* Prostat etiam in officinis nostris ∇ castitatis Mynsichti, sed compositio ejus est admodum inepta; multa enim continet, quæ nihil per alembicum transmittunt; vid. Zwelfferus *in Pharm. Reg.* Potius loco ejusdem è seminibus ingredientibus fiat emulsio cum aquis destillatis illarum plantarum: cui postmodum addi possunt & res reliqui appropriati, & sigillata, camphora, saccharum Hi, &c. Terebinthina imprimis conducit, in specie ~ terebinthinæ, si ipsi addatur saccharum Saturni; hinc enim evadit mistura elegantissimè rubicunda, quæ crebrius usurpata mirè compefcit gonorrhœas.

Quoad secundum scopum: quando gonorrhœa est à causa interna, genituræ nempe acrimonia nimia, conveniunt, quæ acrimoniam istam temperant & corrigunt, & simul aliquali vi stypticâ prædita sunt. Conveniunt ergò corallia rubra, imprimis earundem solutio & R cum spiritu lignorum, aut etiam R coralliorum assafrata: Deinde Martialia, ut crocus ♂is adstringens, R ♂is adstringens, ♀is Oli, & Saturnina, & imprimis succinata, ac quævis ex succino præparata, quæ simul vi diureticâ & abstergerendi partes genitales vim habent: scil. succinum album præparatum, quotidie propinatum in jussulo calido, jejuno stomacho, mirè ad gonorrhœam valet, quo Dn. Ellenbergerus in gonorrhœa usus est: quin & succini aliis additum in tali casu usurpari potest; per se enim est paulò acrius, ita, ut tutius solus pulvis usurpetur; Ulteriùs crystallus montana præparata acrimoniam genituræ temperat, & gonorrhœas nimias compefcit. Trochisci etiam de carabe possunt usurpari, item mandibulæ lucii piscis. Pertinet huc electuarium seu conditum Lindani; ad cujus imitationem

℞. *Conserv. ros. rubr.*

*menth. crisp. ana ℥iβ.*

*off. sepia præp. ℥ij.*

*borrac.*



*borrac. instar alum. calc. 3j.*

*nuc. mosch. 3ß.*

*syrup. de ros. sic. q. s.*

M. f. exinde electuarius;

D. S.

### Temperirende und anhaltende Latwerge.

De hoc quotidie bis vel ter usurpetur.

Facit huc succus millefolii, vel succus lactucæ mixtus cum camphora; item pulvis Hartmanni. Item emulsiones ex seminibus 4. frigidis cum temperantibus, plantago, decoctum radices nymphaeæ albæ, &c.

Ulterius terebinthina & quælibet terebinthinata, vi diureticâ genituram vitiosam corrigentia, sunt optima; hinc B. D. Michaëlis militem quendam diu gonorrhœâ afflictum curavit pilulis de terebinthina Cypria cum croco & is subactâ nullis aliis adhibitis remediis; vel fiant pilulæ ex terebinthina cum rhabbaro.

Sicuti os sepiæ præparatum singulare specificum contra has gonorrhœas fuit Hartmanni, & jam laudati Domini D. Michaëlis, qui ipse ordinariò & feliciter utebatur pulvere ex osse sepiæ & 3io diaphoretico, seu cerussa antimoniali, quæ mista à 3ß. ad 3j. per aliquot dies propinavit, nullis aliis adhibitis remediis, nisi quod interdum succinum præparatum, aut trochiscos de carabe simul adhiberet: nam & 3io diaphoreticum simplex & Martiale cum aqua plantaginis haustum gonorrhœas sistit; sicuti etiam bezoardicum Martiale, item Venereum, usurpari solet.

Modernorum experimentum est balsamus de Capaiwe ex Indiis allatum, cujus 10. aut 15. guttæ propinantur cum vino Hispanico, vel alio liquore appropriato. Saccharum Bni, & cum eodem parata R antiphthifica est admodum egregia, propter & is & sacch Bni, præsertim quando in gonorrhœa, in specie in lumbis circa regionem renum, ardoris sensus percipitur, unde etiam balsamus Bni terebinthinatus, quem describit Hoffmannus in *Clave pag. 251.* multum contra gonorrhœas laudatur.

Ubi ab acrimonia genituræ penis exulceratio,

*℞. lact. muliebr. l. bubul. 3jv.*

*tutia præp. 3ij.*

*aloës epat. 3j.*

*sacch. cand. l. albiss. 3ß.*

M. D. S.

### Temperirende Einspritzung.

Cum syringa injiciatur pro una vice 3ß. ad 3vj. & aliquandiu retineatur.

Quod si verò præter dictas causas genitura aquosa ac vesicularum seminalium laxitas inducat gonorrhœam veram, in tali casu internè medicamenta ex mentha & absinthio, succino, thure, mastiche, & similibus conferunt. In specie corallia alba, essentia item ligno-

rum, & essentia ligni sassafras, R coralliorum cum spiritu lignorum, item R & is adstringens admodum laudantur: succus menthæ cum melle coctus, & ad consistentiam syrupi inspissatus, si ad 3jß. usurpetur, commendatur à Foresto: Item thus pulverisatum, & cum 7 plantaginis ad 3. vel 4. dies propinatum, feliciter has gonorrhœas sistit, quod Burleri est secretum. Sed non est adeò sæpè hoc ipsum repetendum, quoniam aliàs etiam urinæ fluxum cohibet. In genere omnia adstringentia blanda conveniunt, quæ inspissant, & fluxilia coagulant, præsertim Martialia & terrea; hinc crocus & is quilibet, R & is vitrioli, R & is adstringens, terræ sigillatæ, bolus Armena cum aceto vel acidis usurpata sunt optima: hinc corallia cum acidis, saccharum Saturni, trochisci de carabe, trochisci de terra sigillata, radix tormentillæ, ejusque extractum, &c. cum saccharo Saturni, & similia sunt optimi usus. Quidam ergo præscribunt pilulas contra gonorrhœam hoc modo:

*℞. Extr. torment. 3j.*

*sacch. Saturni 3ß.*

*camph. 3ij.*

M. f. pilulæ, quæ subindè usurpentur.

Vel usurpetur decoctum adstringens & electuarius cum simili regimine, quibus Timæus von Guldentsee gonorrhœam ex frequenti masturbatione natam curavit in *Casibus pag. 191.*

Non rarum est, ut post curatas gonorrhœas saltem subtilis liquor aquosus adhuc guttatim interdum prodeat, pro qua gonorrhœa declinante penitus extirpanda conveniunt imprimis pilulæ Riverii *Cent. 2. Obs. 74.* ad cuius imitationem aliquando præscripsi:

*℞. g. Arab.*

*tragac.*

*succini albi præp.*

*Mumia præp.*

*boli Arm. ana 3j.*

*Laud. op. 3ß.*

C. f. q. R. catechu f. pilulæ, pondere gr. j.

Dentur pro s. dosibus.

Sic & thermæ ac balnea aluminosa naturalia in malo vel graviore, vel contumaciore, conveniunt.

Externè etiam fiant fomenta adstringentia cum vino austeriore, in quo decoquantur cortices granatorum, balauſtia & rosæ; item radix consolidæ majoris, plantago, & similia: aut fiat inunctio perinei ac radices penis cum oleo myrtillorum, scil.

*℞. 00 myrtill. 3iij.*

*destillat. mastich. 3j.*

*caryoph.*

*express. nuc. mosch. ana 3ß.*

c. pauca cera f. linimentum,

D. S.

Anhaltend Sälblein.

quod

quod vesiculas seminales nimis laxas nonnihil roborabit atque adstringet.

Externa plura vid. in Wedelii *Tract. de Med. Facultat. pag. 223.*

Quod si aquosior, serosior & tenuior simul genitura fuerit, quæ in gonorrhœa prodit, idque ferè testium vitio, victus nutritivus temperatus ex lacte, oryza, ovis, &c. quæ genituram semper lacteam reddunt, & ejus acrimoniam temperant, imprimis adhibenda sunt: Conveniunt etiam ova cum aromatibus.

Quod si necessum fuerit, ut etiam interdum sub cursu vel sub principio morbi purgatio instituatur, præ cæteris in usu erit terebinthina cum purgantibus, v. g. Pilulæ de terebinthina Mynsichtii, ʒß, ad ʒij. vel etiam pilulæ factæ ex sola terebinthina cum rhabbaro pulverisato; item pilulæ factæ ex massa pilulari de fumaria & terebinthina cum Mercurio dulci, ubi suspicio subest luis Venereæ.

## MEMBRUM II.

De

### Gonorrhœa Notha.

**Q**UOD attinet gonorrhœas nothas: in his loco genituræ genuinæ alia materia vitiosa, vel liquamen serosum, plus minus acre aut decolor, aut foetidum, nunc cum nunc sine dolore, nunc cum aliis symptomatis, ex pene continuò effunditur: Sic seminis calidissimi & foetidissimi excretionem videb. in M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Append. pagin. 67.* Hæc ipsa denuò est duplex: vel benigna, vel maligna, seu ut aliàs vocatur, virulenta. De maligna seu Venerea jam supra *l. i. suo loco* actum. Benigna est, quando citra causam manifestam, v. g. citra prægressum actum Venereum suspectum, effluit continuò ex pene materia seu liquamen aquosum & copiosum, idque citra pruritum Venereum, aut citra membri tentiginem, fluxus talis aquosus die nocteque diutius subindè continuatur, ita, ut citra omnem intermissionem etiam ad aliquot annos protrahatur citra insignem noxam. Respondet hic fluxus gonorrhœæ nothæ virorum, fluori uterino albo mulierum. Aliàs à quibusdam etiam, utut paucifuerint Autores, qui ejusdem fecerunt mentionem, gonorrhœa catarrhalis vocari solet.

### PARS AFFECTA.

Si pressius examinemus hanc gonorrhœam notham, inveniemus, quod pars affecta sint glandulæ prostaticæ, vel laxiores factæ, vel leniter excoriatæ, vel penitus exulceratæ, id quod sufficientissimè probat Graavius de  
Tom. II.

*Organis virorum & Generat. inservientibus, pagin. 119.* Naturaliter enim substantia hæc glandulosa & spongiosa præparet & secernat lympham quandam sui generis, tenuem & lubricantem, pro vehiculo genituræ ex vesiculis seminalibus in urethram expressæ. Quod si ergò fiat, ut laxatis his ipsis substantiis glandulosis nimium, copiosius & frequentius ex massa sanguinea talis lympa excernatur in urethram, quid miri; si talis humor copiosus & frequenter excernatur? qui tunc simul in naturali statu ad quandam viscositatem inclinatur, & sic continuò citra Veneris exercitium effluit ad purgamentum totius massæ sanguineæ.

### CAUSÆ.

Causa ergò materialis hujus gonorrhœæ erit dyscrasia sanguinis seroso-cachectica, seu in qua sanguis crudior copiosiore latice aquoso seu sero chyloso, ex deficiente tam chyloso quam hæmatosi, est imprægnatus, qui per hanc substantiam prostaticarum glandulosarum, tanquam per colatorium, copiosius excernitur & separatur.

Causæ remotæ ad hanc gonorrhœam disponentes erunt omnia, quæ quacunque ratione serum sanguinis coacervare solent, stomachi nempe labes non ritè dirigentis alimenta, sed hæc in cremorem aquosum & falsum pervertentis; unde etiam subjecta talia exinde vitiosum sanguinem generare, & ad cachexiam nonnihil inclinare solent: aut si non mox in principio resolvatur talis gonorrhœa, postmodum cachexia supervenit.

Causa efficiens formalis hujus excretionis, seu quare in specie per hanc partem fiat ista transcolatio & secretio? est laxitas nimia, adeoque insignis porositas ipsarum prostaticarum glandulosarum, unà cum crebrioris excretionis provocatione, tam per masturbacionem, quam per crebrius repetitum actum Venereum, unde promptè per eos serum sanguinis nimium cribrari, & quasi filtrari potest. Ubi ergò hæc ipsa corpuscula aut ex equitatione nimia, aut ex lapsu, aut ex alia quacunque ratione, erunt relaxata, aut distenta, aut alio modo viciata, tunc talis latex massæ sanguineæ superfluous per has ipsas prostaticas glandulas, tanquam colatorium, excernitur, & ita gonorrhœam talem notham constituit, ut etiam sanguis subindè loco genituræ excretus observatus fuerit.

### DIAGNOSIS.

Signa hujus gonorrhœæ ex ejus historia sunt manifesta.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Expurgatur equidem sub forma talis gonorrhœæ universa massa  
(Zzzzz) san-

sanguinea, sed tamen simul plus minus de-  
pauperatur; adeoque caveant sibi agri, ne  
tandem in cachexiam cum tabe dilaban-  
tur.

### C U R A.

Cura ad gonorrhœam seu superveniens  
quoddam symptoma, minus dirigenda venit,  
sed potius radix morbi & primus fons est cor-  
rigendus: nempe

1. Stomachus est roborandus, ejusque di-  
gestio rectificanda.
2. Massæ sanguineæ cruditates emendan-  
da & corrigenda, ejusque serum su-  
perfluum per sudores & vias urina-  
rias amandandum; Denique
3. Partes genitales abstergendæ seu mun-  
dificandæ, & externis blandè adstrin-  
gentibus prostaticæ glandulosæ firman-  
dæ, & in tonum naturalem restitu-  
endæ.

Ex quibus Indicationibus vel spontè me-  
thodus medendi & materia medica patent.  
Præ cæteris remedia, quæ his satisfaciunt  
scopis, ex illis, quæ superiùs de cachexia,  
& affectibus catarrhalibus dixi petenda; un-  
de ratione cachexiæ & digestionis primæ a-  
maricantia aromatica, ut absinthium, men-  
tha, rosmarinus, & ex his parata remedia,  
quæ & stomacho & gonorrhœæ satisfaciunt;  
ratione autem seri superflui juniperina, & ex  
ligno sassafras parata remedia ejusque essen-  
tia cum spiritu serpilli, crebrius & in majori  
dosi assumpta, conducunt; item decocta &  
essentia lignorum cum tormentilla paratæ.  
Observatum quoque fuit, acidularum potum  
uti in aliis morbis chronicis, ita in hac go-  
norrhœa diurna conducere, item succinata,  
in specie  $\ominus$  volatile, quod cachexiam immi-  
nentem subinde pervertit, diureticâ vi, cujus  
ratione etiam terebinthinata, & pilulæ ex te-  
rebinthina, pilulæ Riverii suprâ laudatæ, ap-  
primè conveniunt. Pulvere thuris, ad  $\mathfrak{z}$ j.  
ex ovo sorbili sæpiùs dato, plures curavit Pe-  
trus Asselinæus, vid. Velschius *Miscromim.*  
*Cent. 2. observat. 50.* quod etiam facit ma-  
stix & gummi animæ: quin &, si forsan scor-  
butus subsit, à quo foveatur malum, & hujus  
ratio simul habenda. Conf. in specie M. A.  
N. C. *Ann. 4. & 5. observ. 20.*

Thermarum tandem usus externus, impri-  
mis post bibitas acidulas, præ restaurando  
tono prostaticarum læsarum est convenientis-  
simus, & gonorrhœæ hujus curam absolvit:  
Conf. Sennertus *lib. 3. Prax. pag. 963.* aut et-  
iam balnea aluminosa artificialia aut simi-  
li adstringentia erunt commodè in usum  
vocanda. In specie non nimis citò suppri-  
menda est hæc gonorrhœa, nisi universalia  
præmissa sint, quoniam natura abutitur his  
viis ad evacuandam massam sanguineam: e-

mendetur saltem priùs imminens cachexia,  
& vitium stomachi, & ferè semper spontè  
cessabit gonorrhœa.

Quod si verò vel suppressa sit intempesti-  
vè, vel supprimenda sit, fonticulus in ingui-  
ne aut altero crure aperiendus, ut quasi de-  
rivando alia mala præcaveamus, ad imitatio-  
nem Zacuti Lusitani *lib. 1. Prax. Admir. ob-  
servat. 97.*

## ARTICULUS II.

De

### Nimis cita Genitura Ejacu- latione.

#### C A U S Æ.

**C**ausa ejus est duplex: Aut enim

1. Nimis laxæ sunt vesiculæ seminales, ea-  
rumque meatus nimis aperti, unde  
vel sub levi partium attritu, & prima  
genituræ turgescencia, hanc elabi po-  
tius sinunt, quam ejaculantur: aut
2. Nimis spirituosæ ac fervida, indeque  
nimis turgida est genitura, ut fit in  
adolescentibus, Veneri rariùs, sed  
tamen acrius operam dantibus, ita  
ut primo impetu turgescit à spiritu-  
um animalium uberiore agilitate, &  
sanguinis fervore prorumpat foras, ut  
fit in Italis.

#### C U R A.

Prius vitium commodè adstringentibus  
blandis imprimis curatur, tam internis, ta-  
libus nempe, quæ modò in gonorrhœa ex la-  
xitate vesicularum seminalium fuerunt pro-  
posita, partim externis, infessibus nempe, bal-  
neis, thermis, & similibus, quæ in gonorrhœa  
notha benigna externè usurpanda dixi.

Posterius verò vitium, ubi nimius spiritu-  
um impetus genituram ejicit, opio & opia-  
tis imprimis est sistendum; hoc ipsum enim  
nimium spirituum animalium impetum figit,  
& hinc subitam genituræ turgescenciam co-  
hibet. Nam, utut verum sit, quod opium  
tam ab Indis Orientalibus, quam à Turcis  
usurpetur, ut sc. hanc voluptuosiores red-  
dant, fit tamen hoc, quatenus opium, refræ-  
nando spirituum animalium impetum, remo-  
ratur nonnihil genituræ citam ejaculationem,  
& ita per consequens ipsum coitus actum  
longiorem reddit. Mulieres sanè Indæ sunt  
admodum voluptuosæ, testibus rerum Indi-  
carum Scriptoribus, quæ non tam sæpiùs re-  
petitum, quam unâ vice longiùs continua-  
tum exoptant actum Venereum. Verùm ne  
opium spiritus figendo nimis noceat, & cum  
in actu ipso spiritus copiosè excernantur, re-  
liqui autem resistentes torpidiores ab opio,  
men-



mentis tandem stuporem inducant ; item cum spiritus genitales conjugum in actu coitus fecundo transplantentur in foetum, ne exinde fatui generentur foetus, stupor, aliudque facultatis animalis ipsi inducatur vitium, ob id consultum est cum opio preparato in his casibus miscere ambram, ex quibus mistis potens sit confortativum spirituum, & egregium remedium Venereum, idque innocuum adhibetur, quod & Veneris actum ratione opii protrahendo voluptuosiores, & ratione ambræ spiritus confortando minus nocivum redditur. Hinc tali in casu essentia ambræ, cui in præparatione simul opium certâ quantitate additum, cum spiritu rosarum parata, & essentia ambræ anodyna vocata, in  $\nabla$  cinnamomi vel haustu vini Malvatici propinata, egregium erit remedium Venereum. Alias in tali casu ceu singularis commendatur globulus, factus ex sanguine cervino cum Venerem stimulantibus misto, ac coitus tempore in manu detentus.

Pertinet ad hos affectus singularis illa observatio notatu dignissima Heinrichi ab Heer *observat.* 10. de cita nimis, & ex primo quoque penis contactu, excretionem genituræ, ob ulcus, in intestino recto latens, à quo ipso vesiculæ seminales (sic *stossen an das Intestinum rectum*) per consensum affectæ & irritatæ, genituram retinere nequeunt, sed illam præmaturè ejiciunt.

### ARTICULUS III.

De


#### Genitura Excretionem nimis Tarda.

**O**ritur hæc à defectu spirituum animalium & turgescentiæ genituræ ipsius hinc oriundæ debita. Quin & vesicularum seminalium laxitas seu flacciditas, earumque & muscutorum penis vicinorum aliquis languor, & hinc ad expressionem genituræ minus turgentis ineptitudo, multum huc facit. Huc pertinet etiam vitium istud, quod in coitu, erecto licet & agitato membro, nulla tamen genitura effluit, quæ tamen postea flaccido membro in somno, in-

vito etiam effluit : qualia exempla videb. in Zacuto Lusitano *lib.* 3. *Medicor. Princip. Histor.* 29. Sic Veslingius in *Observ. & Epistol.* à Bartholino editis, *Epist.* 38. *pag.* 150. similem refert historiam de viro, qui pene licet erecto genituram in coitu effundere non potuit; pene autem jam flaccido illam spontè, & ad levissimum contactum genitalium muliebrium, effluxit. Ratio hujus affectus ex modò dictis patet, & etiam à Veslingio concinnè *e. l.* traditur : Nempe consistit in defectu spirituum animalium genituram ad debitam consistentiam non imprægnantium, & postmodum in laxitate & flacciditate tam vesicularum seminalium, quam in specie muscutorum penis : his enim turgidis factis in coitu, non potest genitura per porulos & meatus angustos in pene erecto ac turgido quodammodo occlusos cum impetu ac robore solito excerni & exprimi; siquidem & prostatae intumescunt ita superent impetum excretorium ex vesiculis, ut arctatis osculis earum non absque impetu ejaculatorio genitura exprimitur, quo robore vesicularum deficiente, erecto membro, & turgescunt vicinis partibus, minus genitura excerni poterit; quin potius remittente penis rigore, & hinc hiantibus & apertis quasi magis meatibus genitura, adhuc aliquantisper turgida, spontè postmodum elabatur; unde etiam in tali casu tensio penis solita circa radicem ejus à musculis non percipitur, propter earum flacciditatem,

C U R A.

Unde etiam rectè calida nervina acris & aromatica, quæ spiritus animales augent, & genituram ad excretionem promptiorem reddunt, tam internè quàm externè adhibita, ad curam commendat Veslingius; sicuti similibus, speciatim castoreo, præfatum ægrum suum curavit Zacutus Lusitanus. Fiac ergò præmissis internis & stimulantibus inunctio radicis penis & perinæ ex oleo nucis moschatæ expresso cum oleo macis destillato, caryophyllorum & similibus : quibus vel zibetum, vel moschus, item oleum formicarum, item ~ formicarum volatilis, addi potest.



## S E C T I O II.

De

## LÆSA PENIS ERECTIONE.

**P**enis deficiens erectio, vulgo impotentia virilis dicitur, utur & deficiens genituræ excretio ita dicitur: Impotens enim est is, qui non potest id, quod maritum decet. In duobus enim consistit impotentia propriè sic dicta virilis: nempe in deficiente membri erectione, deficiente per istud seminis ejaculatione: Nam prius deficiens erectio impotentem ad coeundum: posterius ad generandum reddit. Læditur autem hæc erectio penis ad coitum necessaria, & hinc copula maritalis debita, tribus modis:

1. Quando deficit, seu est imminuta.
2. Quando excedit, estque nimia.
3. Quando depravatur, dumque penis non conveniente modo & figura turgescit & erigitur.

## CAPUT I.

De

*Penis Erectione Deficiente,*

&amp; hinc oriunda

*Impotentia Virili.*

C A U S Æ.

**D**eficit erectio vel distensio penis triplici imprimis ex causa:

1. Vitio instrumenti erigentis, musculorum nempe & spirituum animalium.
2. Vitio stimuli in genitalibus, spiritus animales ad determinatum motum excitantis.
3. Fascino seu maleficio.

Quod ergo attinet musculos: laborant hi, quando ita sunt affecti, ut se proprio motu contrahere nequeant: id quod fit in paralyfi & resolutione ipsarum fibrarum. Resoluti sunt musculi penis erectores ex affectione ipsorum nervorum, spiritus ad animandas eorum fibras devehentium; quâ ratione è causis remotioribus, interdum equitatio nimia, comprimendo, & in se cogendo hos musculos, & quasi contundendo, erectioni penis ineptos reddit: Tale exemplum recenset Jacobus Fontanus *Conf. 2.* Dico: equitatione nimia; Nam moderata potius prodest ad erectionem: Sic enim Ferdinandus *Hist. 26.* post gonorrhœam benignam ex equitatione priapulum ingentem observavit. Casus item ant percussio super os

sacrum, vicinas partes, ubi nervi horum musculorum originem ducunt; item in dorsum, ut paralyfin aliorum locum, ita etiam penis, propter affectos nervos infert: vid. Jacobus Fontanus *l. 4.* & Hildanus *Cent. 6. observ. 59.* Conf. etiam M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 104. pag. 177.* Pertinent huc Mercurialia, siquidem virilitas inunctione per unguentum Mercuriale adempta, per op. spicæ verò fuit restituta, observante Schenckio *lib. 4. obs. 1.* cui analoga est observatio Panatolli in *Pent. 5. obs. 39.* Facit huc etiam frigus, cujus occasione etiam non pauci impotentes fiunt, resolutis quasi musculis.

Spiritus animales quod attinet, musculos hos moventes, & ita ad penis erectionem facientes: horum defectus imprimis erectionem deficientem facit, dum musculos non contrahunt, quibus non contractis venula laxata est, ut penis flaccescat. Deficiunt hi in musculis istis vel in genere ex eorum defectu universali, ut fit in senibus debilibus & languidis ex morbo, unde in morborum acutorum statu & declinatione erectio membri naturalis rediens, faustum signum esse solet spirituum animalium regenerantium, & in debitas motiones concitatorum: Vel in specie deficiunt spiritus animales in pene, & specialiter in ejus musculis, quando in motu suo perturbati sunt & plus minus languent in perturbatione mentis, quando animus aut imaginatio circa illud objectum occupata eos in cerebro ac aliis partibus detinet, & minus ad penem influunt spiritus. Hac ratione & pudor, terror, pavor & similia interdum, imò sæpius, penis erectionem prohibent, aut eam factam denuò tollunt, quatenus aliò vocant spiritus per imaginationem pudibundam, &c. sicut e contra meditatio rerum Venerearum, aut titillatio membri, spirituum motum ad illud ejusque musculos dirigit, sicque penis erectionem promovet. Ex hac causa, nempe pudore nimio & intempestivo, interdum evenit, ut noviter nupti se maleficiatos putent (*es sey ihnen ein Vossen geschehen*) cum tamen potius ex nimio pudore impediatur debita membri erectio, quo tandem discusso, res alacrius succedit. Pertinent huc ii, qui melancholia hypochondriaca laborant, qui ut variis subindè conflictantur phantasmatibus, ita & tales subindè imaginatione propriâ decepti se impotentes æstimant, & reverà tunc minus comòdè rem peragunt, qui, curato malo hypochondriaco, sponte sua

sua ad rem familiarem postea redierunt, qualia exempla habentur in Salmuth *Cent. 2. Observ. 78.* Simile exemplum est, quod habet Sylvaticus in *Cent. 4. Conf. 4.*

Secunda causa est deficiens stimulus Veneris à genitura minus copiosa, minusque turgesciente: sicut enim ab hujus turgescencia aut copia, indeque facta partium istarum irritatione, & hinc dependente determinato spirituum animalium motu ad istas partes & stimulat, & pollutiones, tam nocturnæ, quam interdum etiam diurnæ, oriuntur: ita à deficiente irritatione & erectiones & pollutiones consuetæ sistuntur, membraque flaccida & pendula fiunt.

Pertinent huc imprimis quælibet vitia testium, & vesicularum seminalium, genituræ præparationem & retentionem vitiantium. Tales aliàs dicuntur frigidi, cum nullo stimulo in Venerem ferantur, nullaque aut paucâ libidine tententur; unde etiam, si quid emittant genituræ, aquea ferè, minusque spumosa existit, quin & spontè sine voluptatis sensu exit: Tales naturaliter sunt senes, qui in hoc negotio naturaliter tandem deficiunt. Sic Hildanus *Cent. 5. Obs. 40.* refert impotentiam ad coitum ex defectu testiculi sinistri, & depravatione vasorum spermaticorum. Pertinent huc huc camphorata, vigorem genitalem suppressoria: Sic Loffius *observat. pag. 314.* observat virilitatem amissam ex solo continuato odore camphoræ. De nitri usu frequentiore Venerem extinguente constat ex Timæo von Guldenslee.

Huc faciunt flagra natibus infligenda quorum flagrorum ad rem Veneream magnus est usus: de quo vid. elegans *Tractatus* Meibomii *de usu flagrorum ad rem Veneream*, quem nuperimè notis illustratum edidit Bartholinus, ubi refertur exemplum cujusdam, qui nunquam potuit amariæ satisfacere, nisi prius virgis caderetur ab hac: unde postmodum ita cæsus egregiè officio præstando functus est. Causis hisce simul tertia causa, nempe extraordinaria & magica addenda venit, quæ est fascinum seu maleficium, aut incantatio noviter nuptorum, dum sc. sub ipso puncto copulationis matrimonialis sacerdotalis per maleficia, v.g. per seram clausam, per ligulam constrictam, aut cultrum parieti infixum, aut aliis ultra 50. modis, quos taceo, ita ligatur sponsus, ut postmodum stimulante licèt natura, & erigente se membro, sponsæ zonam solvere, coitum celebrare, & cum sponsa gaudia optata peragere nequeat: quinetiam, ubi armatus propius accedit, subito membrum jam erectum iterum flaccescat, & tamen cum alia quacunque, exceptâ sponsâ, faciliè & optimè, nisi ex aliis causis simul sit impotens, coire potest. Existimant equidem multi, quos inter est Wierus de *Præstigiis Damon.* Salmuth *Cent. 2. obs. 78.*

& Borellus *Cent. 4. observ. 65.* hæc vana esse, falsaque & provenire solummodò ex animi affectibus, à nimio gaudio, aut pudore, aut motu, aut aliâ quacunque causa, vel etiam ex imaginatione falsa, & in specie melancholia hypochondriaca, spirituumque animalium hinc avocatione: Contrarium tamen loquitur experientia, & cum eadem Bartholinus *Cent. 3. Hist. Anat. 71.*

Causa malefici formalis, seu quomodo fiat? si non omninò imperscrutabilis, nec præcisè à Diaboli est præstigiis, forsan à sola dependet imaginatione ligantis: Quorsum non tantum inclinatur Verulamius in *Sylva Sylvarum*, sed præterea etiam Helmontius de *Magnet. Vulner. Curatione* & Marcus Marci in *Philos. Vet. Restituta*, aliisque scriptis.

### DIAGNOSIS.

Quoad signa de erectione membri læsa: res per se patet, & ab ægro querulo, seu potius uxore ejus, faciliè manifestatur, saltem causæ perscrutandæ sunt proximæ, & omnes remotæ probè pensandæ à Medico.

Si ergo vitium adsit quasi paralyticum, membrum flaccidum est, nec ullo unquam obiecto, etiam si Veneris desiderium adsit, moveri aut erigi potest.

Spirituum animalium defectus ex universali corporis languore ac imbecillitate, & actionibus reliquis animalibus, manifestus est.

Si ex animi affectu aliò vocentur, præprimis in hypochondriacis, ab ægro cognoscitur: quia variz cogitationes, varia phantasmata, & similia subiecta actu se repræsentabunt.

Quod si verò nullus adsit stimulus Veneris, ab ægro etiam hoc ipsum faciliè cognoscitur, quod ipse patiens nullum appetitum habeat ad tales actiones.

Denique ab incantatione seu maleficio affectum ortum habere, manifestatur, si homo aliàs ad Venerem satis aptus fuerit, nec ulla causa manifesta præcesserit, quæ id ipsi, & præcipuè subito, inducere potuerit; aut etiam: quando cum alia quacunque coire potest, exceptâ solâ sponsâ.

### PROGNOSIS.

Prognosis est, quod tales sint infœcundi, tamdiu sc. quamdiu debite adire nequeunt.

Per se nihil mali inde imminet ægris; per accidens verò, propter oriundum inde mœrorem, tristitiam, & alia animi pathemata, alia mala supervenire possunt.

Malum ab incantatione naturalibus pariter remediis depelli potest, cum ipse Satan operetur secundum naturam, modò adsit v.g. suspicio de ligatura.

### CURA.

Cura varia est, in qua observandum est, ut

1. Volatilibus spirituosus spirituum animalium impetus & influxus promoveatur.
2. Ut aromaticis volatilibus acrioribus aphrodi-

(Zzzzz 3)



phrodisiacis feminis impetus & acrimonia intendatur.

3. Fascinum, si quod fuerit, quantum possibile, empiricis removendum.

Pro duobus ergo prioribus scopis conveniunt omnia ea, quæ suprà in deficiente genitura elaboratione fuerunt allegata, interna & externa, imprimis aromata & omnia aromatica, ut cinamomum, cubebæ, caryophylli, grana paradisi cibis permixta, sinapi, eruca, macis, piper, semen coriandri, aut vinum cinnamomo maceratum, & quælibet ibidem laudata, egregiè conducunt. Sic ovum forbile, in quo veretrum cervi vel tauri, in Veneris actu interfecti exsiccatum & pulverisatum, cum cinnamomo convenit, cujus usus internus qualiscunque ante coitum, validam erectionem facere dicitur. Item ex formicis, ex ambra, ex sanguine galli, &c. parata remedia sunt proficua: Sic radix satyrii condita & essentia satyrii cum spiritu formicarum parata, in haustu vini malvatici sub introitum lecti assumenda; borra in ovo forbili ana gr. xv. ʒj. ad ʒß. vid. Amatus Lusitanus *Cent. 2. Cur. 18.* & Mercurialis *Cas. 48.* Pineæ, amygdalæ dulces, pistaciæ, lac, &c. materiam seminalem augment, unde quidam lac muliebre in ipso actu hauriunt; item oleum ex pinis expressum. Angli pro Venere roboranda usurpant electuarium ex ambra & laudano opiato in parva dosi, excipiunt cum syrupo quodam. Spiritus genitales seu animales augmentat spiritus sanguinis galli cum spiritu formicarum, & electuaria suprà præscripta.

In specie cantharides acrimoniâ suâ potentissimè irritando vesicæ collum, & hinc stimulo musculos penis ibidem situatos potentior erectionem solent inducere, sicut Platerus *obs. pag. 239.* refert impotentiam ex imbecillitate vasorum seminalium seu genitalium ob Veneris nimium usum, refrigeratis iis & relaxatis, contractam, aliis irritis per usum cantharidum cum speciebus aliis aromaticis curatam.

Externè huc facientia sunt v.g. calor, dum e.g. membrum virile igni admoveatur & titilletur pro membri erectione, vid. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. observ. 179.* Balnea nervina, infusus, fofus nervini vel inunctiones contra paralyfin penis secundum Zacutum Lusitanum *l. 7. Prax. Histor. c. 10.* aliàs usitata, sunt instituenda. Cubebæ bulliant in vino generoso vel liquore appropriato, & decoctum ita applicetur testibus & locis vicinis: item balsamum Venereum Mynsichti in *Armament. Chym.* nunc solitarium, nunc cum oleo formicarum mistum, simul ad erectionem & ad voluptatem prodest perinæo & radici penis, item scroto & testibus, inunctum.

xx. succi pastin.

ol. sinapi à ʒij.

Ovor. formic. magnor. ʒj.

Pistentur ova, & exponantur soli per diem 1. aut 2. deinde permisceantur in formam linimenti, quo glans ante coitum est illinenda. Si membrum post coitum adhuc rigeat, abluatur ∇ calidâ.

Junctio pectinis vel glandinis cum felle apri magnam erectionem & delectationem facere ab Hartmanno in *Crollium pag. 357.* & Montagnana, asseritur, radix hellebori nigri pulverisata, vel pulvis radice pyrethri cum pinguedine coturnicis commixta, & hoc ipso linimento radix penis vel glans illita, singularissimum est: Hoc enim non tantummodò validam facit erectionem: sed & hoc præstare dicitur, ut & mulier virgo, & ipse maritus magis hastatus, appareant: Item ∇ & ~ fornicarum, ∇ destillata & succus ovorum fornicarum expressus, cui parum zibethi additum sit, vel cum oleo de piperibus & costino, vel de castoreo mistus, aut testibus aut perinæo inunctus, cui & in specie oleum caryophyllorum permisceri potest. Aliàs ∅ costinum, ∅ nucis moschatae, macis, ∅ euphorbii, ac similia in usu sunt: aluminis plumosi aliquid addi potest ad imitationem consilii eruditi in M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. App. p. 143.* unde decoctum pyrethri & euphorbii cum vino parat Forestus *lib. 10. obs. 92.* pro abluendis genitalibus.

Balsamus apoplecticus Venereus Mynsichti aut similis, cum zibetho, moscho, aut aliis paratus, radici penis vel perinæo, ubi musculi siti sunt, ad firmam erectionem illitus, sufficit: sicuti glans eodem illita utrique sexui voluptatem auger. Unde etiam præcipitur, ut in passione hysterica, & ejus paroxysmo desperato ferè, vir glande ita inunctâ uxorem comprimat, pro solvendo paroxysmo.

Pertinent huc poma ambrae in manu tenenda pro promovenda erectione & continuando congressu, senibus & iis conducibilia, in quibus calor naturalis imminuitur, & qui in morbo chronico, vel arte quadam veneficâ, in virilitate debiles facti, quæ vid. in M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 41. p. 77.* Quibusdam sequens pro singulari habetur secreto:

xx. sang. ex cervo, dum Veneri inhiat, sclopeto interfecto rec. collectum:  
cui adhuc calido adde:

pulv. tragac. ʒij.

nuc. mosch.

caryoph.

cinnam. à ʒß.

camph.

moschi

ambr. à ʒj.

F. c. f. q. sanguinis illius massa in formam globi, exsiccetur & asservetur.

Ii, qui nimis citò genituram in coitu emittunt, dum coeunt, hoc pomum in manu detineant, quamdiu continuerint, tamdiu continuare poterunt Venerem, citra spiritus aut geni-

genituræ emissionem. Quando autem pommum deposuerunt, genituram mittunt. Sit tamen fides penes experientiam.

Ab incantatione si fuerit malum, aliis opus est remediis: Conducunt vomitoria galia, ut  $\square$  emeticus Mynsichtii, & ex helleboro albo. Post hæc convenit imprimis betula; miſtus nempe per scopas betulinas recentes à Carrichtero laudatus, qui, si quis alius, in morbis ab incantatione oriundis exercitissimus est: Potus cereviſiæ betulinæ, seu in qua decocti sunt surculi betulæ recentiores, experimentum est Helmontii, *Tract. de Lithiasi* cap. 8. §. 25. cujus loco substitui potest succus betulinus ex ramo ejus sauciato fluens. Ganſius *Tract. de Coralliis* commendat pulverem sequentem:

*℞. Corall. rubr.*

*dent. hom. mort. maris ana ʒj.*

*sem. & herba antirrh. ana ʒβ.*

*M. f. pulvis pro suffitu.*

Hypericon, ejusque essentia Mynsichti, tinctura coralliorum, quæ laudatur maximè ab Helmontio contra veneficos morbos; Valeriana, in specie pratensis, & phu vulgare, quod à Carrichtero in *L. von der Heyeren* laudatur; abrotanum, momordica, artemisia rubra, plantago  $\nabla$ tica, HB. Paris, quæ pulverisata, & ad ʒj. assumpta, uti & sorbus, vel decoctus, vel pulverisatus in syrupo, singulariter à quibusdam comendatur, haustus etiam bonus lactis muliebris laudatur. Porro valent origanum, aquilegia cum toto, antirrhinum, adiantum album & nigrum, ricinus Americanus, radix contrajervæ, aristolochiæ rotundæ, quæ multis præfertur. Aliàs tanquam secretum habetur pulvis factus ex rasura campanæ ex eo loco derasa, ubi pistillū eam ferit, rasura hæc etiam miscetur cum pulvere priapi tauri & croci modico, & sponso propinatur. Mercurius vivus in nuce avellana, vel in calamo scriptorio, collo appensus præservativum est certum sponſorum, ne ligentur in copula sacerdotali. Quibusdam placet una cum hoc Mercurio, calamo scriptorio incluso, plantas quasdam appropriatas, e. g. hyperici, capillorum Veneris, sem. antirrhini, herbam & baccas paridis & similia nodulo includere, & ex collo suspendere. Fuit experimentum D. Michaëlis, & ab aliis hinc aliquoties expertum: e. gr.

*℞. ʒij viv. calamo incl. ʒij.*

*capill. Veneris*

*flor. aquileg.*

*hyperic.*

*sem. hyperici*

*grana parad. ana ʒj.*

*Misc.*

In linteo gestentur contra omnes incantationes, veneficia & ligationes conjugii.

Helmontius laudat electrum immaturum Paracelli, quod Zwelferus in *Mantiss. spagy.* cap. de auro aurum embryonatum, nondum satis fixatum, esse putat. Observatum aliàs fuit, quod primatum ducat viscus ex corylo, quod cum adipe canis, caponis vel ursi redigitur in unguentum contra veneficia: vid. Carrichter, & Henricus ab Heer in *Obs.* Valent item viscus quercinum & tiliaceum. Laudatur quoque fel corvi, & canis nigri illitum. Mynsichtius habet emplastrum fœtidum, quod etiam D. Michaëlis expertus est in veneficiis. Burrhus emplastrum antidiabolicum ex cera benedicta & asa fœtida parat. Hartmanni experimentum certum, & aliquoties probatum, quod ipse recenset in *Praxi Chimiſtr.* pag. 265. fuit lotio pudendorum utriusque sexus cum decocto herbæ, florum ac seminis aquilegiæ post lotionem fecit suffitum dictis partibus excipiendum ex dentibus hominis mortui pulverisatis super carbones projectis. Modus suffitus est hic: Recipiantur tres dentes ex capite mortui viri, qui minutè pulveriscentur: hinc recipiantur 2. lateres novi, qui candelæ facti per crucem disponantur in terram, huic affundatur  $\nabla$  Rhénani optimi, & superimponatur pulvis dentium istorum contulorum, fumo imponatur membrum incantatum, & ita excipiatur fumus, donec membrum incipiat sudare: hinc hic sudor cum linteo mundo deorsum versus abstergetur. Quo facto inungatur membrum cum asa fœtida, hinc linteis involvatur, & ita incantatus cubitum se conferat.

Item expertum fuit aliquando, si quis emat Lucium piscem sexus masculini, huic per vim aperiatur os, & in os ejus mittatur urina maleficiati: hinc Lucius ita vivus immittatur in fluvium, idque contra ejusdem cursum, & ita sinatur. Si malum non sit nimis inveteratum, seu in maleficio novo, singulare etiam habetur secretum miſtio per anulum sponsaliticium, ante & post copulationem, eaque reciproca, aut per asseris ex reliquo trunco extrusum nodum: vid. Wedelius de *Medic. Facult.* pag. 225. Ubi hoc non sufficit, accipiatur simul rasura annuli sponsalicii, quæ interiùs in potu vini assumpta singulare est experimentum in tali casu. Venefica docuit juvenem urinam mittere per columnæ patibuli foramen terebrâ factum, & liberatus fuit. Fuit aliquando curatus quidam similiter incantatus consilio ipsi à vetula supeditato, dum sc. in cœmiterio quodam misit urinam per ansam, seu anulum cujusdam epitaphii vel lapidis sepulchro incumbentis. Denique siquid aliud, singulare est, si quis accipiat ovum recens, hoc coquat cum urina propria ad absorptionem medietatis: quo facto urina superstes projiciatur in flumen secundum ejusdem cursum, ovum verò ita coctum leviter apertum immitatur in acervum for-

formicarum; unde, quando formicæ absumpserunt ovum, solutum erit fascinum: v. Hartmannus in *Praxi Chimiatri. ubi de Atrophia*. Quidam stercus proprium post duas horas excretum vesicæ includunt, & fumo exponunt: quo factò dolores aliaque mala à veneficio inducenda cessare, & veneficam eundem gustum percipere dicunt.

Interim observetur, quòd, prout variant media, quibus instituitur ligatio, ita etiam necesse sit variare remedia; unde cum dubii sumus, quomodo facta sit ligatura? etiam varia remedia tentanda sunt.

## CAPUT II.

### De *Penis Erectione aucta.*

#### ARTICULUS I.

##### De *Nimia Salacitate.*

**S**ecundum in erectione membri vitium est, quando nimium, aut sæpius, aut diutius, quam naturaliter fieri solet, imò ferè continuo, distentum & erectum est membrum, adeoque consequenter erectio & rigiditas nimis aucta est.

Affectus est duplex, qui occurrit in nimia membri erectione, secundum duplicem modum, quo fit; ita tamen, ut pars affecta semper sint muscoli circa radicem penis; qui contractione suâ comprimendo venam, impediunt sanguinis refluxum, & penem erigunt; quod tamen cum duobus modis fieri soleat, est etiam duplex affectus: Primus est modus, quando ægri ex stimulo Veneris huic acriter inhiant, & hinc sæpius & diutius membri tensionem cum prurigne in Venerem patiuntur, & tunc dicitur Salacitas, seu nimia in Venerem propensio, in qua per integram noctem tensionem penis insignem percipiunt, quod malum interdum eò usque excedit, ut etiam quandoque delirium aut furorem quandam Venerem inducat; idque ex nimia genituræ turgescencia & orgasmo, qui ipse furor vix, nisi genituræ uberiore excretionem sedari potest: Conf. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Obs. 54. & 55. p. 87. & 88.* tuncque affectus est similis brutorum cæstro Venerio, dum certis anni temporibus ex liquoris genitalis turgescencia, hincque juncta sanguinis aucta fermentatione, cum spirituum insigniore fervore in Venerem impetuosius ruunt. Hic affectus in maribus est summus salacitatis gradus, & ferè idem, qui in mulieribus furor uterinus dici solet.

##### C A U S A E.

Causa hujus salacitatis facilè pater: Est nempe genituræ naturaliter constitutæ & u-

berius collectæ, simulque spirituosæ ac acrioris, nimius fervor ac turgescencia, & inde natus stimulus ad Venerem, quem sequitur determinatus spirituum animalium motus & penis erectio.

Causæ remotæ sunt variz: omnia nempe, quæ genituram augment, vel spirituum animalium impetum excitant, aut acrimoniâ loca genitalia stimulant: hinc vita sedentaria, diæta lauta cum aromatibus condita, assumpta & propinata purgantia, aliæve Venerem stimulantia, meditationes Veneræ, aliæve occasiones externæ, ad hoc malum disponunt. Præsupponit laudabilem genitalium constitutionem, qualis deprehenditur in iis, qui sunt triorchides; item quando Salmuth *Cent. 1. Obs. 23.* refert Venericos insignes, in quorum altero magni renes, in altero tres venæ feminales dextræ visæ fuerunt. De Medicamentis purgantibus, Venerem stimulantibus, præter Platerum vid. Timæus von Guldensee in *Cas. pag. 193.* item M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 71. pag. 131.* Sin ulteriùs excedat hæc salacitas, ut coitu vix satiari possit, quin etiam post coitum Venerem adhuc membrum rigidum & tensum continuâ prurigne in Venerem stimulet, usitato vocabulo Satyriasis, summus nempe salacitatis gradus, dicitur à Satyris, qui membro erecto, & ad libidinem deplendam semper prono, finguntur & pinguntur. Exemplum talis Satyriasis, si quod aliud, insigne vid. in Timæo von Guldensee *lib. 3. Casu 52.*

##### DIAGNOSIS.

Diagnos salacitatis & satyriasis, ex relatione ægrorum, & suprà dictis per se pater.

##### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Ex salacitate & satyriasi nullum incommodum, nisi quod nimiam Venerem insequitur, metuendum est: nempe debilitas corporis, ejusque tabes, in specie actionum animalium insignis læsio, viriumque labefactorio, oriri solet; quin etiam vitam abbreviat.

##### C U R A.

Quoad curam: In salacitate ac satyriasi genitura ita imminuenda, ac spiritus animales fervidiores ac alacriores sunt absumendi & sistendi, & si aliqualis adsit genituræ acrimonia, appropriatis temperanda. Unde præter animum curis occupatum, vigilias nimias, victum tenuem, jejunium, labores, & motum corporis validum, aut vitæ genus exercitiis occupatum, ita, ut fortis sudor inde erumpat, &c. hic conducunt venæsectio, eaque subindè repetita; item omnia ea, quæ suprà de gonorrhœa ex turgescencia & abundantia genituræ fuerunt proposita. In specie acida fixa Blata, citrata, nitrata & Saturnina, hic conducunt, hinc opium & camphora. Opium & camphora spiri-



spirituum animalium impetum sistunt & refrœnant. Quoad acida : succus citri ac limonum, item acetum rutaceum sæpius usurpatum Salacitati nimie frœnũ injicit : quibus & succus menthæ est permiscendus, quibus opium & camphora maritanda sunt. Hinc nitrata sunt optima, ut nitrum crebrius & copiosius usurpatum notabiliter salacitatis œstrum temperat ; aliis namque omnibus irritis, per ☉ purum in ☐ nymphæ bis in die, manè & vespere usurpatũ, & crebrius continuatum, Timæus von Guldensee/ lib. 3. Cas. 52. pag. 173. curavit supra dictum salacissimum hominem ; Unde etiam ☉, & omnia ex nitro, acido spiritu adhuc turgida, sunt usurpanda. Quoad Saturnina : convenit R antiphthisica, saccharum Saturni, &c. vid. Wedelius de Med. Fac. pag. 237. De vitriolo & ejus spiritu D. Langius super Fabrum refert, quod crebrior aut diuturnior ejus usus notabiliter imminuere soleat vim testium genitalem, ut etiam hujus abusu structura testium penitus fuerit immutata, item R florum papaveris rhœados ac florum cyani & tunicæ cum phlegmate vitrioli acidulo crebrius hausta. Nec minùs conveniunt alia per experientiam cognita, quæ inter est nymphæa, præsertim flore albo, ejusque radix, quæ specificè commendatur, item lactuca, ejusque succus, portulaca : quibus addatur millefolium flore albo, ruta, & quæ excitationis internè usurpari possunt remedia ; item cicuta, quæ apud nos insens deprehenditur : Imprimis mentha his addita laudari solet. De vitice seu agno casto, cujus folia, flores & semen sunt utilitissima, res satis est notha. Post viticis semen, cannabis est etiam insignis laudis ; item semen lactucæ, portulacæ & similia. De salice res nota est ; nempe sunt ramuli tenelli salicis, ex quibus incisis liquor albus emanat, qui impetum Venereum solet extinguere : folia salicis cocta ; item cum his folia verbenæ mista, cocta diutius continuata mirè stimulum Venereum interimunt. His optimo consilio nitrata adduntur. Camphora est hic non negligenda, non quod absumat, ut volunt, semen, aut vim genitalem imminuat, sed quod certâ quadam virtute spirituum fixativâ sit prædita ; quâ ratione & deliriis febrim malignarum adeo potenter resistit. Quò facit, quod Zacutus Lusitanus lib. 3. Medic. Princ. Hist. 20. refert, coitum assiduum camphoræ usucuratum ; Item Electuarium ejus camphoratum, quod habet l. 2. Prax. Admir. obs. 108. Conf. Tachenius Hipp. Chim. Ratione cujus virtutis spirituum fixativæ & opiata conveniunt, quæ per se usurpata spirituum ferociam & agilitatem compescendo, impetum Venereum retundunt, spiritus figendo, & eorum impetum cohibendo. De opio dubium videri potest, cum in regionibus Orientalibus opium tanquam Venereum optimum usurpetur.

Tom. II.

petur. Ad hæc opium habet summam acrimoniam, quæ etiam in quibusdam sudorem pruriginosum infert ; nil tamen impedit, quò minùs & spirituum impetum figat, cum & hac ratione stimulantibus sociatum, actum Venereum diutius continuandum spirituum impetum impediat.

ix. sem. cannab.

melon. ana ʒij.

4. frig. maj. ana ʒj.

☐ lactuc.

acetos.

fl. nymph. ana ʒiij.

F. Emulsio, edulcoranda cum syr. pap. albi.

D. S.

Dämpfende Milch.

ix. ☐ fol. vitis

salicis ā ʒiʒ.

☉ dulc. l. ☉ li dulc. ʒʒ.

Edulcor. c. l. q manus Christi simpl. D.

ix. pulv. sem. agni casti

☉ depur. ā ʒij.

camph. ʒʒ.

laud. opiat. gr. vj.

M. pro 6. dosibus.

ix. ☐ acetos.

fl. nymph. ā ʒij.

liq. salicis ʒiʒ.

syr. nymph. q. l.

M. S.

Wasser zum Pulver.

Cum his externè comòdè applicantur partibus genitalibus, in specie scroto & pectini, succus plantaginis, solani, cicutæ, hyosciami, sempervivi, cum aceto vel simplici, vel destillato, & saccharo hni misti, & in forma epithematis applicandi ad compescendam nimiam salacitatem, & impediendam genituræ turgentiam : aut fiant ex his plantis cataplasmata aceto imprægnanda : Vel partes genitales similiter foveantur succo sempervivi aut lactucæ, in quo ☉ crudum vel purgatum q. l. solutum sit. Testibus hoc in forma epithematis applicatum, mirè spirituum impetus refrænât, quin & postea regio lumbaris, seu renes, ipsumque scrotum subinde humectari potest ; item partes genitales, pecten, scrotum, &c. foveantur aquâ nymphææ, in qua dissolutum sit opium : sin ob penetrationem ad aliqualem opii correctionem acetum admisceatur, eò meliùs erit. Suadent quidam laminam Saturni lumbis applicare circa regionem renum, sed malè ; quia quandoque sic insecuta est gravior urinæ suppressio.

## ARTICULUS II.

De

Priapismo.

Secundus modus nimie penis erectionis est, dum penis ita rigidus & ita distensus est (Aaa aa) in

in omnem dimensionem, ut exindè graviter doleat, in qua ipsa distensione nullum Veneris adest desiderium, unde & coeundo nullum aut paucissimum semen emittunt; coitu nullo levantur, quin potius malum insigniter exasperatur, adeò, ut si tales sæpius coitum tentare velint, incidant subindè in convulsionem totius corporis. Morbus hinc dicitur à Priapo, scortorum apud Gentiles patrono, qui tali membro semper erecto & rigido fingitur.

### C A U S Æ.

Causa proxima hujus Priapismi est convulsio musculorum penis, quorum spasmo & continuâ spasmodicâ contracturâ, & vena penis penitus occlusa, sanguis penem distendens, omninò impeditur & sistitur in refluxu, & simul dolorifica tensio in radice penis percipitur. Undè, dum sanguis copiosius in penis corporibus nervolis hæret coacervatus, tandem dolorifico tali distensionis sensu membrum cruciatur, & cum spasmo dictorum musculorum convulsi quid patitur. A tali nempe musculorum penis convulsione est, quod epilepticis quibusdam insciis & invitis in paroxysmo subindè membrum tendatur, imò & iisdem in paroxysmo epileptico genitura interdum elabatur, à tali scil. musculorum penis, vicinarumque partium membranarum convulsione: Item videtur hinc oriri, quod interdum quibusdam suspensis erigatur membrum, vid. Schenckius in *observat. ubi de Spasmo*: Confer simul Salmuth. *Centur. 3. observat. 21. & 40.* ubi tale exemplum recenter, similis scil. membri convulsione in Turca interfecto propter copiosum Maslah assumptum. Verum nè fiat confusio, dum superius dixi, inflammationem scroti, penis, ac testium fieri ex impedito sanguinis refluxu & motu; observandum moneo: quod sanguis in corporibus penis membranosis excavatis coercitus, & in refluxu impeditus, det membri pertinacem erectionem & tensionem: Ubi verò sanguis in ipsa substantia penis, quam irrigat, stagnet, tunc in procinctu esse solet periculosa ejus inflammatio.

Convulsione hujus musculorum penis, & inde oriundi Priapismi, causa est irritatio quæcunque, aut musculos penis aut horum nervos afficiens; unde spirituum animalium continuato influxu hi contracti & convulsi manent, & tandem Priapismum inferunt: non secus scil. atque punctura nervi cujusdam per irritationem partis, ad quas nervus tendit, convulsionem infert, unde hujus membri fit contractio & rigiditas. Irritatio hæc à causa tam inquam externa

excitatur, rariùs autem à causa interna, frequenter ex externa. Inter has externas priapismum obtinent cantharides, intempestivè & incautè usurpatæ: quæ sicut tam externa applicatione, quàm interna assumptione, urinam cruentam aut ulcus vesicæ inducunt: Ita quibusdam, Italis præsertim, loco stimuli Venerici inserviunt, sed quorum acce & salinum virus ad musculos penis delatum, continua irritatione, pertinacis priapismi subindè causa est. Imò etiam alia aphrodisiaca acriora, magisque aromatica, & copiosius assumpta, interdum Priapismum inferunt: Hinc enim curiosum est, quod observat Salmuth. *Centur. 3. observat. 29.* de sene defuncto, qui tertiâ die nuptiarum mortuus, pertinaci penis erectione repertus est, ex nimio abusu medicamentorum Venericorum, quibus usus fuerat, ut in nuptiis secundis noviter nuptæ juvenulæ satisfaceret, & melius placeret. Dubio procul convulsivus mortuus est; nam dum ante, & in ipsa morte, muscoli penis convulsi, rigidi sunt, facile libæ post mortem in eodem tono, ex contentis humoribus successivè condensatis, perstare, & ita ex sanguine successivè in pene coagulato etiam post mortem hujus tentigo continuari potest: Vid. Garmanus de *Mirac. Mortuor. & M. A. N. C. Ann. 9. & 10. observat. 34. pag. 98.* Sed malum hoc satis est rarum, ut plura addere verear. Borellus tamen *Centur. 2. observat. 31.* notat quendam in coitu instar canum junctum remansisse, quod à nimio ardore partium genitalium tumefactorum provenire existimat; vel quod è zibetho, quo consilio amici cujusdam, voluptatis augendæ gratiâ balanum inunxerat, partes hæ calefactæ & irritatæ fuerint.

### DIAGNOSIS.

Diagnos hujus affectus ex relatione ægroti & suprâ dictis addiscenda.

### P R O G N O S I S.

Priapismus, cum sit interdum satis dolorificus, ac dolorem inferre soleat similem tetano, metum infert, ne & aliarum partium superveniant convulsiones, ægerque sic moriatur; aut nunc tumorem, nunc inflammationem, nunc periculosum apostema membri post se trahat.

### C U R A.

Curatur Priapismus, convulsionem musculorum imprimis removendo, causam irritantem sistendo; nam sic sponte flaccescet penis. Ubi simul causa occasionalis excrementi-

CAPUT III.

De

*Penis Ereptione Depravata.*

tia latet in corpore, ad revulsionem comendatur vomitus, qui præ aliis purgandi modis confert, utur purgantia per inferiora eandem remove vidcantur; eorum tamen vis minus est valida; prætereaque notum, quod purgantia interdum tentiginem inducant, & Venerem stimulent; Exemplum habet de viduo Platerus, qui ex usu pilularum aromaticarum & mastichinarum tale quid percepit, unde purgantia rectè omittuntur. Potius ergo vomitoria laudantur in priapismo ad revulsionem, uti dicunt, causæ irritantis, vid. Forrestus *lib. 26. observ. 6.* idem habet Epiphanius Ferdinandus *Hist. Med. 26.* Post vomitoria conveniunt acida, mentha, ruta, vitex, ejusque semen: nempe decoctum lentium cum semine agni casti aliquandiu usurpatum, experimentum est Lindani, qui etiam refert, se aliquando curasse senem septuagenarium priapismo laborantem, in quo externè & internè ꝑ destillatum rutæ, aliàs ab Hartmanno insigniter commendatum, frustra adhibuerit, postmodum verò eundem restituerit decocto lactucæ & semine agni casti crebrius ac diutius usurpato. Opium, item camphora, & similia, cum succo citri copiosius usurpata etiam huc conferunt. Poterius, *C. 1. cap. 54.* refert, quendam 30. annorum diu pravâ tentigine tentatum, tandem per usum auri diaphoretici fuisse curatum. Hinc lac prodest, ubi ex cantharidibus malum ortum fuerit.

Externè epithema ex vino, in quo coctum sit cuminum & ruta, adhiberi debet, quod Joël *in sua Praxi* in usu habet; uti etiam ꝑ rutæ, menthæ, &c. genitalibus & perinæo illinendum. Cataplasmata quoque ex ruta, mentha, cumino, floribus nymphæ cum aceto & ∇ parata; vel ex ruta contusa & semine cumini cum aceto conveniunt. Conducunt quoque cataplasmata camphorata: Vel illinatur ꝑ amygdalarum dulcium, in quo soluta sit camphora, radici penis; vel applicetur camphora in aceto vini soluta, cum aqua nymphæ superfusa rutæ contusæ. Sedulo interim monent omnes Practici, ut in priapismi cura unâ cum genituram extinguentibus usurpentur medicamenta carminantia, ut est v. g. aqua carminativa communis, mista cum ∇ castitatis Quercetani; aut ∇ castitatis Riverii, mista cum ~u Qi dulci. Dico, comendant Practici, quibus tamen minimè possum consentire; hypothesis enim eorum est, quod oriatur priapismus ex flatibus penem distendentibus, hinc etiam Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. observ. 105.* aquam ex caryophyllis viridibus destillatam laudat. Potius acida vitriolacea comendo, & juxta hæc nitrata, quæ & ipsa priapismum curare valent. Deniq; clysteres carminantes laudantur à Zacuto Lusitano *lib. 3. Med. Princ. Hist. 21.* Imprimis si addantur urinæ pueri ʒij, fermenti acris ʒj.

Tom. II.

Tertium vitium in erectione denique erat depravata penis erectio seu contorsio. Nam depravatè erigitur membrum, dum non debita in figura & modo debito contingit, cum naturaliter penis tensus in figura recta absque dolore soleat extendi. Quando ergo contortus est penis, seu quando curvam aut aliam vitiatam figuram acquirit, dum erigi debet, læditur ejus actio, de cujus causa internanihil est, quod addam, nisi quod consulendus sit Henricus ab Heer *observ. 7.* ubi habet aliquot rara exempla contorsionum penis, & ex Aurantio refert modum, depravationem hujus erectionis & contorsionem penis corrigendi: item Sennertus *l. 3. Prax. p. 923.* Pertinet huc retractio penis omnimoda in anum ventrem per cucurbitularum appositionem curanda, secundum Henricum ab Heer *obs. 7.* item carminantibus applicandis restituenda. Vid. M.A.N.C. *Ann. 2. obs. 50. pag. 89.* Item penis tumor p. n. ut quando tumorem penis subitaneum tympaniticum, metu carminativo curandum, observant in M.A.N.C. *Ann. 3. observ. 99. p. 160.*

Depravatur etiam penis erectio subinde fræni, vel præputii vitio, quando non ritè potest erigi, vel extendi membrum. Frænulum quod attinet, si nimis breve est, & tenditur membrum, glans retrahitur, & membrum incurvatur, & sic non tantum generatio impeditur, sed etiam dolor oritur. Hoc ergo curatur Chirurgiâ, ubi frænulum simplici incisione secatur, uti videbitis ex Hildano *Centur. 6. Hist. 6.* Observandum tamen, ut aliquid potius detrahatur de membrana præputii, quàm de glande, si res est curta; factò hoc, applicetur stuppa cannabis cum albumine ovi & bolo imprægnata, quæ immergatur in locum, ubi facta est incisio.

Præputii verò ratione fit, quando hoc ita est angustum & strictum, ut glans commodè detegi nequeat; sic enim coercitus penis re ipsâ se explanare nequit. Vitium hoc aliàs phimosis dicitur.

ARTICULUS I.

De

*Phimosi.*

C A U S Æ.

Phimosis verò triplici ratione fit; nunc est malum nativum: nunc fit interdum à (Aaa aaa 2) coitu



coitu cum femina infecta, & inflammationem concipit: nunc præputium incipit corrugari, ut non possit detrahi, nisi concipiat fissuram.

### C U R A.

Phimosis hæc, quæ est à nativitate, sectione Chirurgicâ facillè curatur, & removetur: Scilicet cum incisura in præputium inciditur: interdum etiam per crucem fieri solet, observando saltem hoc, ut vitetur vena pudendi, seu istud vas, quod circa latus præputii se manifestat.

Si verò ex congressu impuro facta est inflammatio præputii, quæ solet habere conjunctum insignem pruritum, optimum est sequens fodus:

*℞. mucilag. sem. psyllii  
cydon.  
sanugr. c. ∇ plantag.  
extr. ā ʒj.*

*vitell. ovi. No. j.*

*laet. vaccini ʒiij.*

M. sub forma Fomenti: S.

**Linderender Schleim.**

Applicetur crebrò loco affecto.

*℞. flor. chamom.  
samb. ā M. j.  
hyosc.  
sem. anisi  
sanic. ā M. ʒ.  
bacc. lauri ʒʒ.*

Incis. & contusa coque in ∇Ψx. tʒj.

Colatura D. S.

**Linderender Umschlag.**

Applicetur calidè. Convenit etiam in paraphimosi.

Vel fiat cataplasma ex farina fabarum cum dicta ∇Ψx, invicem miscendo quod præputio affecto applicatum tumorem discutit, & malum curat.

In phimosi, in qua præputium corrugatum est, ut citra fissuram non possit detrahi, præter jam dictum cataplasma, in specie convenit cremor Ψx, qui subigitur cum butyro non salito.

## ARTICULUS II.

De

**Paraphimosi.**

**C**ontrarium vitium est paraphimosis, tanta post glandem præputii retractio, ut nequeat denuè retrahi, supra glandem duci, ut etiam glandis periculosam inflammationem inducat.

### C A U S A.

Vocatur paraphimosis, & imprimis ex violentiori oritur coitu, eoque sæpillimè primo, dum ex relaxatione freni in tantum ex impetuoso coitu præputium retrahitur, ut tumefactum non nihil infra glandem subsistat.

### C U R A.

Cura hujus vitii fit præprimis per emollientia, & cum præputii ut plurimum accidat tumor, per discutientia. Convenit e. g. fodus ex lacte, in quo flores sambuci ebulliant. Convenit etiam cataplasma ex floribus chamomillæ, parietariæ, rosæ rubris, cum lacte coctis & calidè loco affecto applicatis. Forestus applicat fodus ex decocto malvæ, violariæ, & hyoscyami propter dolorem: Aut etiam applicat decoctum rosarum aut meliloti cum farina fabarum & foliis hyoscyami. Quidam commendant ad talem præputii dolorem, si recipiatur cortex sambuci medius, qui coquatur in lacte, quo calidè suffumigetur priapus, & postmodum panno linteo, in isto decocto intincto, fomentetur: v. g.

*℞. HB. malv.  
parietar.  
alib. ā M. j.  
rad. alib.  
lil. alb. ā ʒj.  
flor. ros. rubr.  
chamom. ā p. ij.*

Coqu. in lacte ad consistentiam pultis, & applica.

D. S.

**Erweichender und linderender Brey:**

Vel applicetur fodus ex flor. chamom. sambuci, hyoscyami, &c. cum ∇Ψx, supra in phimosi laudatus: cui, si membrum insigniter simul doleat, addi potest croci momentum. Multum quoque præstat commune chirurgorum cataplasma, ex pane triticeo cum lacte.

*℞. Medull. panis similag. in lacte infus. bibl.  
vitell. ovi. No. iij.  
ol. rosac. ʒij.  
croci ʒj.  
M. f. Cataplasma.*

## ARTICULUS III.

De

**Penis Inflammatione.**

**P**ertinet huc etiam inflammatio penis, ut plurimum à causa externa, in qua confert cataplasma jam dictum ex floribus chamomillæ, parietariæ, &c. & ∇ calcis vivæ cum appro-

appropriatis additis. Iis fermè curatur remediis quæ retuli de inflammatione testium. Unum tantùm recensebo exemplum: Fuit aliquando puer, qui ad hoc, ut membrum acquireret paulò generosius & majus, inunxit non tantùm membrum, sed etiam scrotum, cum lacte esulæ seu tithymalli, unde facta fuit insignis harum partium inflammatio cum non levi dolore conjuncta: facile tamen fuit discussa & curata per fomenta ex lacte, tepidè sæpiùs iterata: cui, si flores sambuci incocti fuissent, effectus eò præstantior fuisset.

## ARTICULUS IV.

De

### *Penis Dolor.*


**U**Ltimò denique impeditur, seu depravatur debita membri erectio ex dolore, dum scil. impensius dolet membrum: Sic ex forti labore in coitu subindè fit, ut doleat, ut etiam intumescat glans, quod vitium insigniter leniunt cicutæ folia trita, & per patentem præputii hiatum immissa. Commendat hoc remedium etiam Henricus ab Heer *in observat.* 7. contra inflammationem

glandis crystallinam, in qua glans tumida & quasi perspicua instar crystalli erat cum gravi dolore, dum scil. sumptâ cicutâ, eâque immissâ per patentem præputii hiatum, sedatus dolor, & tumor discussus fuit. Quod si verò anguis sub herba latitet, & gonorrhœæ virulentæ conjunctus sit penis dolor ac reliqua hætenus dicta glandis vitia, quod tantùm non semper evenire solet, & huic quoque per interna prospiciendum erit. Purgantia nimirum, & balsamica terebinthinata, quæ supra, ubi de gonorrhœa virulenta, videantur. Optimum aliàs est balsamum Peruvianum, dum scil. hoc ipsum excipiatur filo crasso, albumine ovi durato, & hoc ipso balsamum Peruvianum infigatur & applicetur: sic enim dolor in virgæ initio à gonorrhœa facilè sedatur.

Denique dolet penis non rarò ex calculo vesicæ, in quo nihil præstantius est, quàm  $\nabla$  albuminis ovorum, cum lacte muliebri & camphoræ modico, quæ omnia calice excepta frigida actu vel tepida admoveantur peni, ita, ut membrum huic immittatur; sic namque statim omnem dolorem sedari, autor est Zechius *in Con-*

*siliis.*






# LIBER IV.

## DE MORBIS MULIERUM.

### SECTIO I.

*De*

### FLUORIS MENSTRUI VITIIS.



Æditur Mensium excretio tribus modis:

- I. Quando imminuta est, ita, ut aut parcius fluant, aut nullo modo appareant.
2. Quando eadem aucta est, ut uberiori rivo scateat, tam unâ vice, quam partitis vicibus, i. e. quando quovis mense aliquoties evacuantur.
3. Quando eadem depravata est, & non naturali modo cum variis symptomatibus, doloribus abdominis, &c. comitata se manifestat: vel per aliena loca, vel inordinato tempore fluit, vel sanguis adjunctas habet præternaturales alterationes, ut, quando menses decolores, atrii, aut fœtidi excernuntur, & quæ sunt præternaturales errores circa menstruationem evenientes.

### CAPUT I.

*De*

### *Mensium Emanatione.*

**Q**uod attinet primum vitium: sive imminuta, sive planè absit menstruatio hæc, vulgo mensium suppressio. potius tamen cum Lindano in *Meletematibus Emanatio mensium* dici debet: sicut, quando actu fluentes cohibentur, tunc optimè mensium suppressionem vocare possumus. Emanatio ergò hæc mensium est vel naturalis, vel præternaturalis. Naturalis est talis, aut ratione ætatis, dum post 49. vel 50. annum naturaliter deficient, aut ratione ipsius mulieris status seu conditionis, dum non observatur in gravidis; utut quibusdam habitioribus primis gestationis mensibus ad medium tempus fluat, item in quamplurimis lactantibus naturaliter emanet sanguinis fluxus menstruus: In convalescentibus denique seu talibus, quæ à gravi morbo resurgunt, etiam naturaliter deficient; in his enim depauperata massa sanguinea, partim in quan-

to, partim in quali, & exhausti plus minùs torpidique spiritus minus apti sunt ad fermentationem menstruam. Item naturaliter deficient menses in iis, in quibus alia quædam insignior evacuatio, aut sanguinis immediatè in gravioribus vulneribus, aut mediatè sub transmutationis forma, v. gr. saniei aut ichoris in ulceribus inveteratis, fit, aut facta est absorptio. Sic refert Bartholinus *Centur. 2. Hist. 87.* de fluxu mensium suppressio, qui postmodum apertis & consolidatis quibusdam abcessibus, denuò fuerat revocatus. Hæ & similes mulieres relinquendæ sunt naturæ, nec fatigandæ præposterè medicamentis, nisi ut lautâ diætâ sanguinis copia reconcilietur: id quod taxat Forestus *lib. 2 8. observ. 5.* in quodam Medico imperito, qui mcebatur evocare menses in puella planè extenuata. Hoc interim est notabile in iis, quæ ulcera vel vulnera habent graviora, & quibus ob id fluxus ordinarius plus minus est suppressus, quod hæc isto tempore, quo alias ordinariò fluere deberent, singularem quandam in vulnere aut ulcere alterationem in pejus semper sentiant: sc. percipiunt aut dolorem, aut tumorem & incipientem inflammationem, aut copiosiorrem & abundantiorrem fœtidæ saniei effluxum, qui, ubi aliquot dies ita duraverit, sponte cessat, donec post menstruum periodum ferè redeat usque ad mali curationem.

### CAUSÆ.

Quod ergò attinet causas, propter quas menses præter naturam supprimuntur aut emanant: sunt hæc ipsæ vel ex vitio sanguinis ipsius excernendi, vel ex vitio uteri & vasorum, per quæ debet effluere sanguis. Ex sanguinis vero vitio est ejusdem crassities, visciditas, & quicquid hunc ad fermentationem uberiorem ac turgescentiam ineptum reddere valer. Utriusque ratione defectus mensium est vel accidentalis, qui ex causa fortuita & improvisa evenit; vel habitualis, qui altius radicata in corpore habet causas antecedentes. In specie



specie defectus mensium habitualis vitio sanguinis fit imprimis ex cachexia seu sanguinis cruditate, ex chylo non sufficienter digesto, & hinc plus minus acido, nec ritè volatilifato, in sanguinem ingesto, unde & hujus spissitudo & viarum hypogastricarum infarctus & sanguinis fixitas, indeque ineptitudo ad turgescientiam fermentativam; quæ cum à particulis volatilibus spirituosus imprimis dependeat, hæ ipsæ, à cruditate ejus viscida obrutæ & oppressæ, vim suam exerere nequeunt.

Alii invertunt potiùs hoc, dicentes, quod vitium uteri sequatur ex cachexia. Uno nomine: est cruditas acida cum inertia bilis, adeoque defectus acidi volatilis oleosi seu spirituosus: econtrà excessus acidi fixioris in subiecto viscido sunt causæ, sanguinis fermentationem, & hinc evacuationem menstruam, impediētes, h. e. ut loquitur Sylvius, defectus bilis, & pituitæ excessus.

Origo autem hujus acidi est ex stomacho: oritur nempe ex chylo non ritè digesto, unde nil magis disponit mulieres ad defectum mensium, quàm cruditas acida stomachi, ratione cujus bilis hebetatur, & turgescientia sanguinis fermentativa supprimitur, impeditur, & consequenter mensium fluxus cessat: quin & scorbutus hic non rarò suam ludit tragœdiam, dum fœminæ scorbuticæ sæpissimè, si non totali mensium suppressione torquentur, parcè tamen admodum non sine difficultate expurgari solent, quin & his ipsis citra debitum ordinem inordinatè menses fluere solent,

Quoad causas remotas vitio sanguinis mensium suppressionem, tam habitualement, quàm accidentalem, inferentes: inter sex res non-naturales sunt primò aëris frigidi susceptio, tam in uterum sub tempore mensium, unde subita sanguinis coagulatio & grumescientia, qui in valis constrictis hæret: uti ex casu vel immersione in aquam frigidam sub menstruatione, mensium obstructionem, & hinc pleuritidem natam refert Timæus **von Guldensee** in *Casibus lib. 2. Cas. 7.* Hinc rectè Lindanus dicit: Nil magis posse sistere fermentationem sanguinis menstruam, quam frigus. *Dua sc. potissimum causa sunt, quæ illud præstant: (1) refrigeratio pedum, & quidem subita; (2) refrigeratio vehemens ventriculi. Sin gelidam aquam vel cerevisiam tempore fervoris bibant, refrigerando ventriculum percellunt sanguinem, vel potiùs spiritum, & sistitur fluxus: sic nonnullis bibito lacte acido sistitur, vel pomis acidis.* Sic namque observat Forestus *lib. 1. 8. observat. 2. & 3.* menses ex terrore & saltu in aqua frigida subito restrictos, unde summus angor circa præcordia secutus fuit, quæ ipsa tamen fuit curata per sudorifera, ita, ut spontè postmodum redierint menses. His enim sanguinis fermentatio & turgescientia per modum coagulationis sistitur, undè cessante ejusdem

fermentativâ turgescentiâ, & menstruus cessat fluxus; idque in specie solet nocere, quando vel instat excretio menstrua, vel quando excerni solet: Sic namque subita refrigeratio pedum eo tempore, quo menses fluunt, multum huc facit: Sic si mulieres sub fluxu mensium lotionibus in ∇ frigida indulgent, vel pedes in aqua frigida lavant, solet mensium fluxus cessare, & vel imminens, vel fluens supprimi: Facit huc etiam subitanea, seu suprâ dictum, refrigeratio ventriculi: Sic namque Timæus **von Guldensee** in *Casu 202.* observat menses fluentes suppressos ex haustu frigida post incalescentiam corporis, cum atrocissimo uteridolore. Simile exemplum recentet Forestus *cent. 1. observ. 3. Schol.* Item menses frigore suppressos vomitum sanguinis inferentes videb. in *M. A. N. C. Ann. 1. observ. 95. p. 224.* Sic ex frigida nive hausta mensium suppressionem Schenckius, item Zacutus Lusitanus *lib. 3. Hist. 4. Med. Princ.* annotarunt. Præter frigus ad suppressionem mensium multum conferunt assumpta; inter quæ sunt omnia difficulter digestibilia, in specie omnia acida, imprimis mineralia fixa, vitrioli, salis, nitri, &c. quæ admodum impediunt mensium fluxum, quatenus sanguinem inspissant, ejusdem fermentationem à volatilibus oriundam omninò tollunt, & coagulationem inferunt; quod etiam faciunt omnia cruda aut viscida, sanguinis fermentationem impediētia, obrundendo sal fermentativum, ut caseus: hinc & panis recens furno extractus aut calens admodum nocivus est puellis & mulieribus, cum viscido suo lentore promoveat cruditatem stomachi acidam, & sanguinis fermentationem insigniter impediat: Hinc etiam à lacte & omnibus lacticiiniis tempore menstruationis vel imminētis vel præsentis, abstineant mulierculæ: quo etiam faciunt carnes fumo induratae. Nam cum ex assumptis digestio stomachi vitietur, ita, ut exinde fiat cacoachylia, hinc cacoachymia, & hinc denique cachexia, ordinariò etiam ex sanguinis cruditate fermentatio menstrua impeditur, & hinc cachexia, quam specialiter virgineam vocant, seu febris alba, oritur; hinc ex hac causa Barbette in *sua Praxis pag. 83.* vitium mensium suppressorum à causis externis in stomacho radicari non ineptè asserit. Confirmatur hoc malum ulteriùs, dum ex mensium suppressione picæ laborare incipiunt, & variâ, imprimis insolita aut inconsueta, promiscuè ingerant: Sic namque Schenckius *lib. 4. Observ.* narrat mulierculam, quæ devorata magnâ copiâ prunorum mensium suppressionem & tumorem ventris incurrit, qui tumor tandem incredibili copiâ ossiculorum post annum excreta subsedit, & menses repetierunt: Sic Zacutus Lusitanus *lib. 2. Praxis admir. observat. 99.* refert quandam carbonum voracem ex pica, tandem, cum

cùm per 10. annos menses fuissent suppressi, curatam per conservam artemisiæ & menthæ. Denique & animi affectus multùm valent ad sanguinis fermentationem, hinc & crasin alterandam: hinc uti gaudium, uti moderata ira, quibusdam per auctam sanguinis exagitationem menstruum fluxum crebrius provocant; ita contrà terror subitaneus, tristitia, mœror, pavor ac metus insigniores, periculosè menses imminentes sistunt, vel subito suppressere valent fluentes: Sicuti notum etiam est, quod hæmorrhagia narium subito incusso terrore subinde soleat compesci. Observandum tamen, contrarios effectus subinde ab iisdem animi pathematis sub menstruatione observari, ita, ut ab iisdem nunc intendatur, nunc cohibeatur fluxus: Conf. Sylvius *lib. 3. Prax. p. 84. 85. seq. cap. 3. §. 263. seq.* Fumi carbonum multum nocent, si foveant se mulieres per inferiora, vid. Rodericus à Castro *pag. 76.* Vitio uteri fit mensium suppressio, vel vasorum, vel uteri orificiorum culpa: Vasa quidem obstruuntur à mucosa pituita inspissata, & sub menstruationis declinatione sensim condensata, vasa infarciēte. Orificium autem internum, idque frequentius, rarius autem externum, uteri occlusum est causa suppressionis mensium: Observatum nempe fuit subindè, clausum fuisse orificium externum uteri per membranam, nunc integram, ubi simul urinæ excretio læditur, nunc in medio sic perforatam; estque talis membrana nihil aliud, quàm hymen adeò decantatum p. n. auctum seu coalitum.

Denique vulnerati, aut excoriati, aut exulcerati plus minus vaginæ parietes sub consolidatione subindè coalescunt, & ita vias consuetas occludunt; sicut à pinguedine, cicatrice, vel tumoribus comprimentibus mensium suppressio observata fuit. Conf. Timæus von Guldenslee *lib. 4. Cas. 7.* Quò etiam pertinent læsiones genitalium post partum violentum subinde præternaturalem eorundem coalitum inferentes: Vid. Severinus *de Efficaci Medicina p. 285.* Platerus *lib. 1. Obs. Bartholinus Cent. 2. p. 221.* Hildanus *Cent. 6. Obs. 67.* Sed de huiusmodi atretis seu clausis & velatis plures & varias observationes vid. in Sennerti *Praxi lib. 4. Part. 1. Sect. 1. cap. 3. pag. 11.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica menses suppressos, nec ritè fluere, manifestatur imprimis ex relatione ægrorum, & ex symptomatis concomitantibus. In virginibus enim sanguis suppressus per venas hinc inde vagans per insueta nonnunquam & aliena loca expurgari solet; imò non rarò febres infert: item color corporis in talibus insigniter solet esse mutabilis, dum pallidæ fiunt, subtumidæ, & colore ad livorem inclinante, supervenit tandem

febris, quam vocant albam seu febrem virginæam.

Probè autem cognoscendum est: an menses sint suppressi naturaliter ex gravidatione? an verò p. n. suppressi?

Quibus emanent p. n. vel morbosè, præter observationes proprias conqueruntur de difficili anhelitu; quando nempe quodammodò moventur, præsertim adscendendo, mox suffocatio imminet: Ulteriùs patiuntur lassitudinem in omnibus artubus hinc inde, in specie circa lumbos, dolores tensivos graves percipiunt, hinc præcordiorum anxietates, pedetentim color corporis floridus perit, labia pallida superveniunt, fiunt apparenter cachecticæ, oculi tument: supervenire solent stomachi affectus, cibi fastidium, nausea, vomitus, pica, & tandem perfectè cachecticæ evadunt.

Sed hæc per se facillè pater.

Magis cognoscenda est differentia causarum, an vitio sanguinis, non debite turgescētis? an vero vitio uteri & obstructorum vasorum suppressantur menses? Si sanguinis non debite turgescētis vitio menses emanent, nulla symptomata abdominis aut lumborum, quæ menstruationem antecedere solent, observantur: alia tamen symptomata, quæ sanguinis labem ostendunt, adesse solent, in specie urinæ crudæ, alvi segnitie, ac symptomata hypochondriaca, & procedente tempore nullam penitus statâ periodo alterationem in corpore ampliùs percipiunt. Sin verò saltem uteri ejusque vasorum infarctorum vitio deficient menses, præfata symptomata consueto tempore vigeant, quæ ostendunt adhuc sanguinis impetum & modum excretorium, dum sanguis turgescens, quatenus consuetis viis effundi nequit alibi impetu facto per anastomosis effluit, unde nunc vomitus cruentus, nunc hæmoptysis superveniunt: Exempla vid. in M. A. N. C. *Ann. 1. Obs. 95. Ann. 6. & 7. Obs. 49.* item varia pathemata in his statibus temporibus, quibus aliàs fluere menses debent, percipiunt scemina, frequentes sunt dolores lumborum circa vasa lumborum, & quæ ex ramis iliatis oriuntur.

Conqueruntur ulterius de sensu cujusdam tensionis circa regionem pubis: item percipiunt pulsationes hinc inde in variis corporis locis, nec non circa hypochondria, nunc in artubus, adsunt murmura, borborygmi, dolores lancinantes in lumbis: qui ostendunt sanguinis tunc urgentem fermentationem & turgescētiā mēstruam, quæ propter impedimenta in vasis non potest emitti, unde quandoque in talibus sanguis per loca alia effluere solet, interdum etiam per excretionem cutaneam, quæ semper augentur, quoties tempus menstruationis instat; vel quando fluere debent menses, & siquid fortè effluat, mucosum albidum excernitur.

Sed

Sed quia nusquam tuta fides apud mulieres, & ipsæ interdum incertæ sunt, an sint gravidae? an reverà p.n. menses deficient? subindè solent interrogare Medicos de hac re, Quæritur ergò: an dentur signa, quibus possit demonstrari, an talis mensium emansio sit ab ingravidatione? vel an ab alia causa oriatur? Signa certa distinctiva non habemus, quia sunt admodum similia. Dicit Lindanus: *Soleo jubere, ut expectent medium gestationis tempus, quò certæ possint esse propter motum infantis: quod si se non prodat, nihilominus difficile est judicare, quia sunt, qui motum fœtus non percipiunt, etiam ultimo mense, & nihilominus pariunt. Summa: res est periculi plena, facile credere mulieribus. Itaque semper cauti estote. Habet tamen suppressio naturalis illustra etiam signa, sed non absolute vera; possunt enim etiam cum conceptu esse; itaque oportet Medicum valdè circumspèctum esse &c.* Nam pathemata, quæ insequuntur gravidationem: nempe appetitus prostratus, nausea, vomitus matutini, picæ, item lac in mammis, &c. hæc omnia etiam observata fuerunt insecuta suppressionem mensium, etiam in virginibus sine graviditate: vid. Theodericus in *Valetudinario* pag. 128. Hippocrates equidem *Sect. 5. Aph. 39.* hanc suggerit cautelam: quod nempe mulier, si nec gravida sit, neque puerpera, habeat verò lac, quod eidem deficient menses. Nihilominus tamen hoc ipsum *τεμπέριον* est fallax; Prostant enim multa exempla virginum, quibus, ut dixi, illibatis, mensibus etiam fluentibus, lac tamen genitum fuit: Imò Bartholinus in *sua Anatome* refert exemplum cujusdam familiæ, cui hoc fuit hæreditarium, ut omnes virgines, simul ac puberes fiunt, lac generent: Huic etiam Galenus assentit in *Comment. in Hippocratem*, qui licet id rarò evenire scribit, tamen aliquando fieri posse concedit: Scribit etiam Alexander Benedictus *lib. 3. Anat. cap. 4.* se vidisse mulierem, cui, cum virgo esset, quoniam infœcunda erat, menses substituerant, lacte mammæ semper diffluxerint: Et Christophorus à Vega *Comm. ad Aphor. Hippocratis* refert, se vidisse puellam Burgensem, cui mensibus suppressis lac in mammis inerat.

Certum est, quod cibi fastidium, aut etiam pica, sit admodum suspectum signum gravidationis, ita, ut ubi concurrat cum mensium suppressione, virgo quæ fuit, tanquam fœmina tractanda sit, juxta Hippocratem *Sect. 5. Aphor. 61.* *si mulieri purgationes non prodeant, neque errore, neque febre superveniente ubique fastidium accidat, tum pregnantem esse putato.*

Aliàs ordinaria signa, quæ naturalem suppressionem mensium sequuntur, sunt ferè ejusdem conditionis, quàm quæ sequuntur

graviditatem. Hæc tantum est differentia in paucis quibusdam, quod nempe

1. In gravidis successivè symptomata circa primas vias mitescant, venter attollatur, mammæ turgidæ fiant; quibus verò morbosè suppressi sint menses, semper magis, magisque in deterius labantur, cachecticæ evadant, pedes intumescant.
2. Quibus præternaturaliter suppressi, sunt menses, iis pallor non tantummodò in facie, sed etiam in toto corpore, cum tumore quasi inflativo supervenit.
3. Quod appetitus in gravidis ultra tertium mensem non soleat esse prostratus; sin verò fastidium sit perpetuum, magna est suspicio suppressionis præternaturalis.
4. Capitis continui dolores, & ipsi suppressionem præternaturalem arguunt.
5. Perpetuæ in lumbis gravitates & pulsationes, aut etiam in aliis corporis partibus insoliti arteriarum motus, similiter præternaturalem suppressionem arguunt.
6. Crebriores vicissitudines seu mutationes caloris & frigoris per totum corpus etiam præternaturalem suppressionem mensium innuunt, imprimis quibus deficiunt menses propter impedimentum venarum uterinarum, superest tamen adhuc motus & turgescencia sanguinis ad excretionem apti, tales phlogosi vagâ solent simul torqueri, hincque iisdem minùs dari convenit volatilia oleosa, olea destillata, nam sic magis intenduntur phlogoses.
7. Respiratio anhela & admodum difficilis ad levem etiam corporis motum, similiter non ex postremis est signis, quæ præternaturalem innuunt suppressionem.
8. Pulsus ibidem frequens, inæqualis, obscurus, interdum quodammodò deficiens, etiam præternaturalem innuit suppressionem.
9. Si in tempore non succrescat abdomen, infontes esse puellas certum est.
10. De hoc imprimis solent esse sollicitæ mulieres, an per urinas etiam possit cognosci gravidatio? Veteres imprimis, secundum Avicennam, affirmant, ex urinis hoc posse videri. Avicennæ dogma est, quod certum imprægnationis signum sit, si ineunte imprægnatione excernantur urinæ subalbidae, tenues, & cui grana innatent quædam instar cottæ carminatæ (*wie geschlossene Baumwolle*) quod tamen ab omnibus Medicis, etiam expertis-

(Bbb bbb)

simis,



formicarum; unde, quando formicæ absumpserunt ovum, solutum erit fascinum: v. Hartmannus in *Praxi Chimiatri. ubi de Atrophia*. Quidam stercus proprium post duas horas excretum vesicæ includunt, & fumo exponunt: quo facti dolores aliaque mala à veneficio inducæ cessare, & veneticam eundem gustum percipere dicunt.

Interim observetur, quòd, prout variant media, quibus instituitur ligatio, ita etiam necesse sit variare remedia; unde cum dubii sumus, quomodo facta sit ligatura? etiam varia remedia tentanda sunt.

## CAPUT II.

### De *Penis Erectione aucta.*

#### ARTICULUS I.

##### De *Nimia Salacitate.*

**S**ecundum in erectione membri vitium est, quando nimium, aut sæpius, aut diutius, quam naturaliter fieri solet, imò ferè continuo, distentum & erectum est membrum, adeoque consequenter erectio & rigiditas nimis aucta est.

Affectus est duplex, qui occurrit in nimia membri erectione, secundum duplicem modum, quo fit; ita tamen, ut pars affecta semper sint muscoli circa radicem penis; qui contractione suâ comprimendo venam, impediunt sanguinis refluxum, & penem erigunt; quod tamen cum duobus modis fieri soleat, est etiam duplex affectus: Primus est modus, quando ægri ex stimulo Veneris huic acriter inhiant, & hinc sæpius & diutius membri tensionem cum prurigne in Venerem patiuntur, & tunc dicitur Salacitas, seu nimia in Venerem propensio, in qua per integram noctem tensionem penis insignem percipiunt, quod malum interdum eò usque excedit, ut etiam quandoque delirium aut furorem quandam Venereum inducat; idque ex nimia genituræ turgescencia & orgasmo, qui ipse furor vix, nisi genituræ uberiore excretionem sedari potest: Conf. M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Obs.* 54. & 55. p. 87 & 88. tuncq; affectus est simillimus brutorum cæstro Venereo, dum certis anni temporibus ex liquoris genitalis turgescencia, hincque juncta sanguinis aucta fermentatione, cum spirituum insigniore fervore in Venerem impetuosius ruunt. Hic affectus in maribus est summus salacitatis gradus, & ferè idem, qui in mulieribus furor uterinus dici solet.

##### C A U S A E.

Causa hujus salacitatis facillè patet: Est nempe genituræ naturaliter constitutæ & u-

berius collectæ, simulque spirituosæ ac acrioris, nimius fervor ac turgescencia, & inde natus stimulus ad Venerem, quem sequitur determinatus spirituum animalium motus & penis erectio.

Causæ remotæ sunt variæ: omnia nempe, quæ genituram augment, vel spirituum animalium impetum excitant, aut acrimoniâ loca genitalia stimulant: hinc vita sedentaria, diæta lauta cum aromatibus condita, assumpta & propinata purgantia, aliæve Venerem stimulantia, meditationes Venereæ, aliæve occasiones externæ, ad hoc malum disponunt. Præsupponit laudabilem genitalium constitutionem, qualis deprehenditur in iis, qui sunt triorchides; item quando Salmuth *Cent.* 1. *Obs.* 23. refert Venereos insignes, in quorum altero magni renes, in altero tres venæ seminales, dextræ visæ fuerunt. De Medicamentis purgantibus, Venerem stimulantibus, præter Platerum vid. Timæus von Guldensee in *Cas.* pag. 193. item M. A. N. C. *Ann.* 2. *observ.* 71. pag. 131. Sin ulterius excedat hæc salacitas, ut coitu vix satiari possit, quin etiam post coitum Venereum adhuc membrum rigidum & tensum continuâ prurigne in Venerem stimulet, usitato vocabulo Satyriasis, summus nempe salacitatis gradus, dicitur à Satyris, qui membro erecto, & ad libidinem deplendam semper prono, finguntur & pinguntur. Exemplum talis Satyriaseos, si quod aliud, insigne vid. in Timæo von Guldensee *lib.* 3. *Casu* 52.

##### DIAGNOSIS.

Diagnos salacitatis & satyriasis, ex relatione ægrorum, & suprâ dictis per se patet.

##### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Ex salacitate & satyriasi nullum incommodum, nisi quod nimiam Venerem insequitur, metuendum est: nempe debilitas corporis, ejusque tabes, in specie actionum animalium insignis læsio, viriumque labefactorio, oriri solet; quin etiam vitam abbreviat.

##### C U R A.

Quoad curam: In salacitate ac satyriasi genitura ita imminuenda, ac spiritus animales fervidiores ac alacriores sunt absumendi & sistendi, & si aliqualis adsit genituræ acrimonia, appropriatis temperanda. Unde præter animum curis occupatum, vigilias nimias, victum tenuem, jejunium, labores, & motum corporis validum, aut vitæ genus exercitiis occupatum, ita, ut fortis sudor inde erumpat, &c. hic conducunt venæsectio, eaque subindè repetita; item omnia ea, quæ suprâ de gonorrhœa ex turgescencia & abundantia genituræ fuerunt proposita. In specie acida fixa Blata, citrata, nitrata & Saturnina, hic conducunt, hinc opium & camphora. Opium & camphora spiri-

spirituum animalium impetum sistunt & refrænant. Quoad acida : succus citri ac limonum, item acetum rutaceum sæpius usurpatum Salacitati nimie frænū injicit : quibus & succus menthæ est permiscendus, quibus opium & camphora maritanda sunt. Hinc nitrata sunt optima, ut nitrum crebrius & copiosius usurpatum notabiliter salacitatis æstrum temperat ; aliis namque omnibus irritis, per  $\Phi$  purum in  $\nabla$  nymphææ bis in die, manè & vespuri usurpatū, & crebrius continuatum, Timæus von Guldenslee / *lib. 3. Cas. 52. pag. 173.* curavit supra dictum salacissimum hominem ; Unde etiam  $\sim \Phi$ i, & omnia ex nitro, acido spiritu adhuc turgida, sunt usurpanda. Quoad Saturnina : convenit R antiphthifica, saccharum Saturni, &c. vid. Wedelius *de Med. Fac. pag. 237.* De vitriolo & ejus spiritu D. Langius *super Fabrum* refert, quod crebrior aut diuturnior ejus usus notabiliter imminuere soleat vim testium genitalem, ut etiam hujus abusu structura testium penitus fuerit immutata, item R florum papaveris rhœados ac florum cyani & tunicæ cum phlegmate vitrioli acidulo crebrius hausta. Nec minus conveniunt alia per experientiam cognita, quæ inter est nymphæa, præsertim flore albo, ejusque radix, quæ specificè commendatur, item lactuca, ejusque succus, portulaca : quibus addatur millefolium flore albo, ruta, & quæ excitatis internè usurpari possunt remedia ; item cicuta, quæ apud nos insons deprehenditur : Imprimis mentha his addita laudari solet. De vitice seu agno casto, cujus folia, flores & semen sunt ulitissima, res satis est notha. Post viticis semen, cannabis est etiam insignis laudis ; item semen lactucæ, portulacæ & similia. De salice res nota est ; nempe sunt ramuli tenelli salicis, ex quibus incisis liquor albus emanat, qui impetum Venereum solet extinguere : folia salicis cocta ; item cum his folia verbenæ mista, cocta diutius continuata mirè stimulum Venereum interimunt. His optimo consilio nitrata adduntur. Camphora est hic non negligenda, non quod absumat, ut volunt, semen, aut vim genitalem imminuat, sed quod cetrâ quadam virtute spirituum fixativâ sit prædita ; quâ ratione & deliriis febrium malignarum adeò potenter resistit. Quò facit, quod Zacutus Lusitanus *lib. 3. Medic. Princ. Hist. 20.* refert, coitum assiduum camphoræ usucuratum ; Item Electuarium ejus camphoratum, quod habet *l. 2. Prax. Admir. obs. 108.* Conf. Tachenius *Hipp. Chim.* Ratione cujus virtutis spirituum fixativæ & opiata conveniunt, quæ per se usurpata spirituum ferociam & agilitatem compescendo, impetum Venereum retundunt, spiritus figendo, & eorum impetum cohibendo. De opio dubium videri potest, cum in regionibus Orientalibus opium tanquam Venereum optimum usurpetur.

Tom. II.

petur. Ad hæc opium habet summam acrimoniam, quæ etiam in quibusdam sudorem pruriginosum infert ; nil tamen impedit, quò minus & spirituum impetum figat, cum & hac ratione stimulantibus sociatum, actum Venereum diutius continuandum spirituum impetum impediat. \*

℞. *sem. cannab.*

*melon. ana ʒij.*

4. *frig. maj. ana ʒj.*

$\nabla$  *lactuc.*

*acetos.*

*fl. nymph. ana ʒiij.*

F. Emulsio, edulcoranda cum *styr. pap. albi.*

D. S.

**Dämpfende Milch.**

℞.  $\nabla$  *fol. vitis*

*salicis ā ʒiʒ.*

$\sim \Phi$ i *dulc. l. Oli dulc. ʒʒ.*

Edulcor. c. f. q *manus Christi simpl. D.*

℞. *pulv. sem. agni casti*

$\Phi$ i *depur. ā ʒij.*

*camph. ʒʒ.*

*laud. opiat. gr. vj.*

M. pro 6. dosibus.

℞.  $\nabla$  *acetos.*

*fl. nymph. ā ʒij.*

*liqu. salicis ʒiʒ.*

*styr. nymph. q. f.*

M. S.

**Wasser zum Pulver.**

Cum his externè cōmodè applicantur partibus genitalibus, in specie scroto & pectini, succus plantaginis, solani, cicutæ, hyosciami, sempervivi, cum aceto vel simplici, vel destillato, & saccharo hni misti, & in forma epithematis applicandi ad compescendam nimiam salacitatem, & impediendam genituræ turgescentiam : aut fiant ex his plantis cataplasmata aceto imprægnanda : Vel partes genitales similiter foveantur succo sempervivi aut lactucæ, in quo  $\Phi$  crudum vel purgatum q. f. solutum sit. Testibus hoc in forma epithematis applicatum, mirè spirituum impetus refrænat, quin & postea regio lumbaris, seu renes, ipsumque scrotum subinde humectari potest ; item partes genitales, pecten, scrotum, &c. foveantur aquâ nymphææ, in qua dissolutum sit opium : sin ob penetrationem ad aliqualem opii correctionē acetum admisceatur, eò meliùs erit. Suadent quidam laminam Saturni lumbis applicare circa regionem renum, sed malè ; quia quandoque sic insecuta est gravior urinæ suppressio.

## ARTICULUS II.

De

*Priapismo.*

**S**ecundus modus nimie penis erectionis est, dum penis ita rigidus & ita distensus est  
(Aaa aaa) in

in omnem dimensionem, ut exindè graviter doleat, in qua ipsa distensione nullum Veneris adest desiderium, unde & coeundo nullum aut paucissimum semen emittunt; coitu nullo levantur, quin potius malum insigniter exasperatur, adeò, ut si tales sæpius coitum tentare velint, incidant subindè in convulsionem totius corporis. Morbus hîc dicitur à Priapo, scortorum apud Gentiles patrono, qui tali membro semper erecto & rigido fingitur.

### CAUSÆ.

Causa proxima hujus Priapismi est convulsio musculorum penis, quorum spasmo & continuâ spasmodicâ contracturâ, & vena penis penitus occlusa, sanguis penem distendens, omninò impeditur & sistitur in refluxu, & simul dolorifica tensio in radice penis percipitur. Undè, dum sanguis copiosius in penis corporibus nervolis hæret coacervatus, tandem dolorifico tali distensionis sensu membrum cruciatur, & cum spasmo dictorum musculorum convulsi quid patitur. A tali nempe musculorum penis convulsione est, quod epilepticis quibusdam insciis & invitis in paroxysmo subindè membrum tendatur, imò & iisdem in paroxysmo epileptico genitura interdum elabatur, à tali scil. musculorum penis, vicinarumque partium membranarum convulsione: Item videtur hinc oriri, quod interdum quibusdam suspensis erigatur membrum, vid. Schenckius in *observat. ubi de Spasmo*: Confer simul Salmuth. *Centur. 3. observat. 21. & 40.* ubi tale exemplum recentet, similis scil. membri convulsione in Turca interfecto propter copiosum Maslah assumptum. Verum nè fiat confusio, dum superius dixi, inflammationem scroti, penis, ac testium fieri ex impedito sanguinis refluxu & motu; observandum moneo: quod sanguis in corporibus penis membranosis excavatis coercitus, & in refluxu impeditus, det membri pertinacem erectionem & tensionem: Ubi verò sanguis in ipsa substantia penis, quam irrigat, stagnet, tunc in procinctu esse solet periculosa ejus inflammatio.

Convulsione hujus musculorum penis, & inde oriundi Priapismi, causa est irritatio quæcunque, aut musculos penis aut horum nervos afficiens; unde spirituum animalium continuato influxu hi contracti & convulsi manent, & tandem Priapismus inferunt: non secus scil. atque punctura nervi cujusdam per irritationem partis, ad quas nervus tendit, convulsionem infert, unde hujus membri fit contractio & rigiditas. Irritatio hæc à causa tam inquam externa

excitatur, rariùs autem à causa interna, frequenter ex externa. Inter has externas priapismum obtinent cantharides, intempestivè & incautè usurpatæ: quæ sicut tam externa applicatione, quàm interna assumptione, urinam cruentam aut ulcus vesicæ inducunt; Ita quibusdam, Italis præsertim, loco stimuli Venerici inserviunt, sed quorum acre & salinum virus ad musculos penis delatum, continua irritatione, pertinacis priapismi subindè causa est. Imò etiam alia aphrodisiaca acriora, magisque aromatica, & copiosius assumpta, interdum Priapismum inferunt: Hinc enim curiosum est, quod observat Salmuth. *Centur. 3. observat. 29.* de sene defuncto, qui tertiâ die nuptiarum mortuus, pertinaci penis erectione repertus est, ex nimio abusu medicamentorum Venericorum, quibus usus fuerat, ut in nuptiis secundis noviter nuptæ juveniculæ satisfaceret, & melius placeret. Dubio procul convulsivus mortuus est; nam dum ante, & in ipsa morte, muscoli penis convulsi, rigidi sunt, facile fibræ post mortem in eodem tono, ex contentis humoribus successivè condensatis, perstare, & ita ex sanguine successivè in pene coagulato etiam post mortem hujus tentigo continuari potest: Vid. Garmanus de *Mirac. Mortuor.* & M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. observat. 34. pag. 98.* Sed malum hoc satis est rarum, ut plura addere verear. Borellus tamen *Centur. 2. observat. 31.* notat quendam in coitu instar canum junctum remansisse, quod à nimio ardore partium genitalium tumefactorum provenire existimat; vel quod è zibetho, quo consilio amici cujusdam, voluptatis augendæ gratiâ balanum inunxerat, partes hæ calefactæ & irritatæ fuerint.

### DIAGNOSIS.

Diagnos hujus affectus ex relatione ægrorum & suprâ dictis addiscenda.

### PROGNOSIS.

Priapismus, cum sit interdum satis dolorificus, ac dolorem inferre soleat similem tetano, metum infert, ne & aliarum partium superveniant convulsionem, ægerque sic moriatur; aut nunc tumorem, nunc inflammationem, nunc periculosum apostema membri post se trahat.

### CURA.

Curatur Priapismus, convulsionem musculorum imprimis removendo, causam irritantem sistendo; nam sic sponte flaccescet penis. Ubi simul causa occasionalis excrementitia



# CAPUT III.

De

## *Penis Ereptione Depravata.*

tia latet in corpore, ad revulsionem commendatur vomitus, qui præ aliis purgandimodis confert, utut purgantia per inferiora eandem remove videantur; eorum tamen vis minus est valida; prætereaque notum, quod purgantia interdum tentiginem inducant, & Venerem stimulent; Exemplum habet de viduo Platerus, qui ex usu pilularum aromaticarum & mastichinarum tale quid percepit, unde purgantia rectè omittuntur. Potius ergo vomitoria laudantur in priapismo ad revulsionem, uti dicunt, causæ irritantis, vid. Forestus *lib. 26. observ. 6.* idem habet Epiphanius Ferdinandus *Hist. Med. 26.* Post vomitoria conveniunt acida, mentha, ruta, vitex, ejusque semen: nempe decoctum lentium cum semine agni casti aliquandiu usurpatum, experimentum est Lindani, qui etiam refert, se aliquando curasse senem septuagenarium priapismo laborantem, in quo externè & internè ꝑ destillatum rutæ, aliàs ab Hartmanno insigniter commendatum, frustra adhibuerit, postmodum verò eundem restituerit decocto lactucæ & semine agni casti crebrius ac diutius usurpato. Opium, item camphora, & similia, cum succo citri copiosius usurpata etiam huc conferunt. Poterius, *C. 1. cap. 54.* refert, quendam 30. annorum diu pravâ tentigine tentatum, tandem per usum auri diaphoretici fuisse curatum. Hinc lac prodest, ubi ex cantharidibus malum ortum fuerit.

Externè epithema ex vino, in quo coctum sit cuminum & ruta, adhiberi debet, quod Joël *in sua Praxi* in usu habet; uti etiam ꝑ rutæ, menthæ, &c. genitalibus & perinæo illinendum. Cataplasmata quoque ex ruta, mentha, cumino, floribus nymphææ cum aceto & ꝑ parata; vel ex ruta contusa & semine cumini cum aceto conveniunt. Conducunt quoque cataplasmata camphorata: Vel illinatur ꝑ amygdalarum dulcium, in quo soluta sit camphora, radici penis; vel applicetur camphora in aceto vini soluta, cum aqua nymphææ superfusa rutæ contusæ. Sedulò interim monent omnes Præctici, ut in priapismi cura unâ cum genituram extinguentibus usurpentur medicamenta carminantia, ut est v. g. aqua carminativa communis, mista cum ꝑ castitatis Quercetani; aut ꝑ castitatis Riverii, mista cum ~u Qi dulci. Dico, commendant Præctici, quibus tamen minimè possum consentire; hypothesis enim eorum est, quod oriatur priapismus ex flatibus penem distendentibus, hinc etiam Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. observ. 105.* aquam ex caryophyllis viridibus destillatam laudat. Potius acida vitriolacea comendo, & juxta hæc nitrata, quæ & ipsa priapismum curare valent. Deniq; clysteres carminantes laudantur à Zacuto Lusitano *lib. 3. Med. Princ. Hist. 21.* Imprimis si addantur urinæ pueri 3ij, fermenti acris 3j.

Tom. II.

**T**ertium vitium in erectione denique erat depravata penis erectio seu contorsio. Nam depravatè erigitur membrum, dum non debita in figura & modo debito contingit, cum naturaliter penis tensus in figura recta absque dolore soleat extendi. Quando ergo contortus est penis, seu quando curvam aut aliam vitiatam figuram acquirit, dum erigi debet, læditur ejus actio, de cujus causa internanihil est, quod addam, nisi quod consulendus sit Henricus ab Heer *observ. 7.* ubi habet aliquot rara exempla contorsionum penis, & ex Aurantio refert modum, depravationem hujus erectionis & contorsionem penis corrigendi: item Sennertus *l. 3. Prax. p. 923.* Pertinet huc retractio penis omnimoda in anum ventrem per cucurbitularum appositionem curanda, secundum Henricum ab Heer *obs. 7.* item carminantibus applicandis restituenda. Vid. M. A. N. C. *Ann. 2. obs. 50. pag. 89.* Item penis tumor p. n. ut quando tumorem penis subitaneum tympaniticum, fotu carminativo curandum, observarunt in M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 99. p. 160.*

Depravatur etiam penis erectio subinde fræni, vel præputii vitio, quando non ritè potest erigi, vel extendi membrum. Frænulum quod attinet, si nimis breve est, & tenditur membrum, glans retrahitur, & membrum incurvatur, & sic non tantum generatio impeditur, sed etiam dolor oritur. Hoc ergo curatur Chirurgiâ, ubi frænulum simplici incisione secatur, uti videbitis ex Hildano *Centur. 6. Histor. 6.* Observandum tamen, ut aliquid potius detrahatur de membrana præputii, quàm de glande, si res est curta; factò hoc, applicetur stuppa cannabis cum albumine ovi & bolo imprægnata, quæ immergatur in locum, ubi facta est incisio.

Præputii verò ratio fit, quando hoc ita est angustum & strictum, ut glans commodè detegi nequeat; sic enim coercitus penis reipsâ se explanare nequit. Vitium hoc aliàs phimosis dicitur.

## ARTICULUS I.

De

### *Phimosi.*

#### C A U S Æ.

**P**himosis verò triplici ratione fit; nunc est malum nativum: nunc fit interdum à (Aaa aaa 2) coitu

coitu cum femina infecta, & inflammatio-  
nem concipit : nunc præputium incipit cor-  
rugari, ut non possit detrahi, nisi concipiat  
fissuram.

### C U R A.

Phimosis hæc, quæ est à nativitate, sectio-  
ne Chirurgicâ facilè curatur, & removetur:  
Scilicet cum incisura in præputium incidi-  
tur : interdum etiam per crucem fieri so-  
let, observando saltem hoc, ut vitetur ve-  
na pudendi, seu istud vas, quod circa latus  
præputii se manifestat.

Si verò ex congressu impuro facta est in-  
flammatiо præputii, quæ solet habere con-  
junctum insignem pruritum, optimum est  
sequens fodus :

℞. mucilag. sem. psyllii  
cydon.  
sanugr. c. ∇ plantag.  
extr. ā ʒj.

vitell. ovi. No. j.

laet. vaccini ʒij.

M. sub forma Fomenti: S.

**Linderender Schleim.**

Applicetur crebrò loco affecto.

℞. flor. chamom.  
samb. ā M. j.  
hyosc.  
sem. anisi  
sanic. ā M. ʒ.  
bacc. lauri ʒj.

Incis. & contusa coque in ∇Ψx. ℥j.

Colatura D. S.

**Linderender Umschlag.**

Applicetur calidè. Convenit etiam in  
paraphimosi.

Vel fiat cataplasma ex farina fabarum cum  
dicta ∇Ψx, invicem miscendo quod præ-  
putio affecto applicatum tumorem discutit,  
& malum curat.

In phimosi, in qua præputium corruga-  
tum est, ut citra fissuram non possit detrahi,  
præter jam dictum cataplasma, in specie con-  
venit cremor Ψx, qui subigitur cum buty-  
ro non salito.

## ARTICULUS II.

De

**Paraphimosi.**

**C**ontrarium vitium est paraphimosis, tan-  
ta post glandem præputii retractio, ut  
nequeat denuè retrahi, supra glandem duci,  
ut etiam glandis periculosam inflammationem  
inducat.

### C A U S A.

Vocatur paraphimosis, & imprimis ex  
violentiori oritur coitu, eoque sæpissimè pri-  
mo, dum ex relaxatione freni in tantum ex  
impetuoso coitu præputium retrahitur, ut  
tumefactum non nihil infra glandem subsi-  
stat.

### C U R A.

Cura hujus vitii sit præprimis per emolli-  
entia, & cum præputii ut plurimum accedat  
tumor, per discutientia. Convenit e. g. fo-  
tus ex lacte, in quo flores sambuci ebul-  
liant. Convenit etiam cataplasma ex flori-  
bus chamomillæ, parietariæ, rosæ rubris,  
cum lacte coctis & calidè loco affecto appli-  
catis. Forestus applicat fotum ex decocto  
malvæ, violariæ, & hyoscyami propter do-  
lorem : Aut etiam applicat decoctum rosa-  
rum aut meliloti cum farina fabarum & fo-  
lius hyoscyami. Quidam commendant ad  
talem præputii dolorem, si recipiatur cortex  
sambuci medius, qui coquatur in lacte, quo  
calidè suffumigetur priapus, & postmodum  
panno linteo, in isto decocto intincto, fo-  
mentetur : v. g.

℞. HB. malv.

parietar.

alth. ā M. j.

rad. alth.

lil. alb. ā ʒj.

flor. ros. rubr.

chamom. ā p. ij.

Coqu. in lacte ad consistentiam pulvis, &  
applica.

D. S.

**Erweichender und linderender Brey.**

Vel applicetur fodus ex flor. chamom. sam-  
buci, hyoscyami, &c. cum ∇Ψx, supra in  
phimosi laudatus : cui, si membrum insigni-  
ter simul doleat, addi potest croci momen-  
tum. Multum quoque præstat commune  
chirurgorum cataplasma, ex pane triticeo  
cum lacte.

℞. Medull. panis similag. in lacte in-  
fus. bibl.

vitell. ovi. No. ij.

ol. rosac. ʒij.

croci ʒj.

M. f. Cataplasma.

## ARTICULUS III.

De

**Penis Inflammatione.**

**P**ertinet huc etiam inflammatio penis,  
ut plurimum à causa externa, in qua con-  
fert cataplasma jam dictum ex floribus cha-  
momillæ, parietar. &c. & ∇ calcis vivæ cum  
appro-

appropriatis additis. Iis fermè curatur remediis quæ retuli de inflammatione testium. Unum tantum recensebo exemplum: Fuit aliquando puer, qui ad hoc, ut membrum acquireret paulò generosius & majus, inunxit non tantum membrum, sed etiam scrotum, cum lacte esulæ seu tithymalli, unde facta fuit insignis harum partium inflammatio cum non levi dolore conjuncta: facile tamen fuit discussa & curata per fomenta ex lacte, tepidè sæpius iterata: cui, si flores sambuci incocti fuissent, effectus eò præstantior fuisset.

#### ARTICULUS IV.

De

##### *Penis Dolor.*


**U**Ltimò denique impeditur, seu depravatur debita membri erectio ex dolore, dum scil. impensius dolet membrum: Sic ex forti labore in coitu subindè fit, ut doleat, ut etiam intumescat glans, quod vitium insigniter leniunt cicutæ folia trita, & per patentem præputii hiatum immissa. Commendat hoc remedium etiam Henricus ab Heer *in observat.* 7. contra inflammationem

glandis crystallinam, in qua glans tumida & quasi perspicua instar crystalli erat cum gravi dolore, dum scil. sumptâ cicutâ, eâque immisâ per patentem præputii hiatum, sedatus dolor, & tumor discussus fuit. Quod si verò anguis sub herba latitet, & gonorrhœæ virulentæ conjunctus sit penis dolor ac reliqua hætenus dicta glandis vitia, quod tantum non semper evenire solet, & huic quoque per interna prospiciendum erit. Purgantia nimirum, & balsamica terebinthinata, quæ supra, ubi de gonorrhœa virulenta, videantur. Optimum aliàs est balsamum Peruvianum, dum scil. hoc ipsum excipiat filio crasso, albumine ovi durato, & hoc ipso balsamum Peruvianum infigatur & applicetur: sic enim dolor in virgæ initio à gonorrhœa facilè sedatur.

Denique dolet penis non rarò ex calculo vesicæ, in quo nihil præstantius est, quàm  $\nabla$  albuminis ovorum, cum lacte muliebri & camphoræ modico, quæ omnia calice excepta frigida actu vel tepida admoveantur peni, ita, ut membrum huic immittatur; sic namque statim omnem dolorem sedari, autor est Zechius *in Consiliis*.







# LIBER IV.

## DE MORBIS MULIERUM.

### SECTIO I.

*De*

### FLUORIS MENSTRUUI VITIIS.



Æditur Mensium excretio tribus modis:

- I. Quando imminuta est, ita, ut aut parcius fluant, aut nullo modo appareant.
2. Quando eadem aucta est, ut uberiori rivo scateat, tam unâ vice, quam partitis vicibus, i. e. quando quovis mense aliquoties evacuatur.
3. Quando eadem depravata est, & non naturali modo cum variis symptomatibus, doloribus abdominis, &c. comitata se manifestat: vel per aliena loca, vel inordinato tempore fluit, vel sanguis adjunctas habet præternaturales alterationes, ut, quando menses decolores, attri, aut foetidi excernuntur, & quæ sunt præternaturales errores circa menstruationem evenientes.

## CAPUT I.

*De*

### *Mensium Emanatione.*

Quod attinet primum vitium: sive imminuta, sive planè absit menstruatio hæc, vulgo mensium suppressio, potius tamen cum Lindano in *Meletematibus Emanatio mensium* dici debet: sicut, quando actu fluentes cohibentur, tunc optimè mensium suppressionem vocare possumus. Emanatio ergo hæc mensium est vel naturalis, vel præternaturalis. Naturalis est talis, aut ratione ætatis, dum post 49. vel 50. annum naturaliter deficiunt, aut ratione ipsius mulieris status seu conditionis, dum non observatur in gravidis; utut quibusdam habitioribus primis gestationis mensibus ad medium tempus fluat, item in quamplurimis lactantibus naturaliter emanet sanguinis fluxus menstruus: In convalescentibus denique seu talibus, quæ à gravi morbo resurgunt, etiam naturaliter deficiunt; in his enim depauperata massa sanguinea, partim in quan-

to, partim in quali, & exhausti plus minùs torpidique spiritus minus apti sunt ad fermentationem mensuram. Item naturaliter deficiunt menses in iis, in quibus alia quædam insignior evacuatio, aut sanguinis immediatè in gravioribus vulneribus, aut mediatè sub transmutationis forma, v. gr. saniei aut ichoris in ulceribus inveteratis, fit, aut facta est absorptio. Sic refert Bartholinus *Centur. 2. Hist. 87.* de Fluxu mensium suppressio, qui postmodum apertis & consolidatis quibusdam abscessibus, denuò fuerat revocatus. Hæ & similes mulieres relinquendæ sunt naturæ, nec fatigandæ præposterè medicamentis, nisi ut lautâ diætâ sanguinis copia reconcilietur: id quod taxat Forestus *lib. 2 8. observ. 5.* in quodam Medico imperito, qui nitebatur evocare menses in puella planè extenuata. Hoc interim est notabile in iis, quæ ulcera vel vulnera habent graviora, & quibus ob id fluxus ordinarius plus minus est suppressus, quod hæc isto tempore, quo alias ordinariò fluere deberent, singularem quandam in vulnere aut ulcere alterationem in pejus semper sentiant: sc. percipiunt aut dolorem, aut tumorem & incipientem inflammationem, aut copiosiorrem & abundantiorrem foetidæ saniei effluxum, qui, ubi aliquot dies ita duraverit, sponte cessat, donec post mensuram periodum ferò redeat usque ad mali curationem.

### CAUSÆ.

Quod ergo attinet causas, propter quas menses præter naturam supprimuntur aut emanant: sunt hæc ipsæ vel ex vitio sanguinis ipsius excernendi, vel ex vitio uteri & vasorum, per quæ debet effluere sanguis. Ex sanguinis vero vitio est ejusdem crassities, visciditas, & quicquid hunc ad fermentationem uberiorem ac turgescentiam ineptum reddere valer. Utriusque ratione defectus mensium est vel accidentalis, qui ex causa torruita & improvisa evenit; vel habitualis, qui altius radicata in corpore habet causas antecedentes. In specie

specie defectus mensium habitualis vitio sanguinis fit imprimis ex cachexia seu sanguinis cruditate, ex chylo non sufficienter digesto, & hinc plus minus acido, nec ritè volatilifato, in sanguinem ingesto, unde & hujus spissitudo & viarum hypogastricarum infarctus & sanguinis fixitas, indeque ineptitudo ad turgescientiam fermentativam; quæ cum à particulis volatilibus spirituosis imprimis dependeat, hæ ipsæ, à cruditate ejus viscida obrutæ & oppressæ, vim suam exerere nequeunt.

Alii invertunt potius hoc, dicentes, quod vitium uteri sequatur ex cachexia. Uno nomine: est cruditas acida cum inertia bilis, adeoque defectus acidi volatilis oleosi seu spirituosi: econtrà excessus acidi fixioris in subjecto viscido sunt causæ, sanguinis fermentationem, & hinc evacuationem menstruam, impediētes, h. e. ut loquitur Sylvius, defectus bilis, & pituitæ excessus.

Origo autem hujus acidi est ex stomacho: oritur nempe ex chylo non ritè digesto, unde nil magis disponit mulieres ad defectum mensium, quàm cruditas acida stomachi, ratione cujus bilis hebetatur, & turgescientia sanguinis fermentativa supprimitur, impeditur, & consequenter mensium fluxus cessat: quin & scorbutus hinc non rarò suam ludit tragœdiam, dum sceminæ scorbuticæ sæpissimè, si non totali mensium suppressione torquentur, parcè tamen admodum non sine difficultate expurgari solent, quin & his ipsis citra debitum ordinem inordinatè menses fluere solent.

Quoad causas remotas vitio sanguinis mensium suppressionem, tam habitualement, quàm accidentalem, inferentes: inter sex res non-naturales sunt primò aëris frigidi susceptio, tam in uterum sub tempore mensium, unde subita sanguinis coagulatio & grumescientia, qui in valis constrictis hæret: uti ex casu vel immersione in aquam frigidam sub menstruatione, mensium obstructionem, & hinc pleuritidem natam refert Timæus von Guldensee in Casibus lib. 2. Cas. 7. Hinc rectè Lindanus dicit: Nil magis posse listere fermentationem sanguinis menstruam, quam frigus. *Dua sc. potissimum causa sunt, quæ illud præstant: (1) refrigeratio pedum, & quidem subita; (2) refrigeratio vehemens ventriculi. Sin gelidam aquam vel cerevisiam tempore fervoris bibant, refrigerando ventriculum percellunt sanguinem, vel potius spiritum, & sistitur fluxus: sic nonnullis bibito lacte acido sistitur, vel pomis acidis.* Sic namque obiervat Forestus lib. 18. observat, 2. & 3. menses ex terrore & saltu in aqua frigida subito restrictos, unde summus angor circa præcordia secutus fuit, quæ ipsa tamen fuit curata per sudorifera, ita, ut spontè postmodum redierint menses. His enim sanguinis fermentatio & turgescientia per modum coagulationis sistitur, undè cessante ejusdem

fermentativâ turgescentiâ, & mensstruus cessat fluxus; idque in specie solet nocere, quando vel instat excretio mensstrua, vel quando excerni solet: Sic namque subita refrigeratio pedum eo tempore, quo menses fluunt, multum huc facit: Sic si mulieres sub fluxu mensium lotionibus in ∇ frigida indulgent, vel pedes in aqua frigida lavant, solet mensium fluxus cessare, & vel imminens, vel fluens supprimitur: Facit huc etiam subitanea, ceu suprâ dictum, refrigeratio ventriculi: Sic namque Timæus von Guldensee in Casu 202. observat menses fluentes suppressos ex haustu frigida post incalescentiam corporis, cum atrocissimo uterico dolore. Simile exemplum recenset Forestus cent. 1. observ. 3. Schol. Item menses frigore suppressos vomitum sanguinis inferentes videb. in M. A. N. C. Ann. 1. observ. 95. p. 224. Sic ex frigida nive hausta mensium suppressionem Schenckius, item Zacutus Lusitanus lib. 3. Hist. 4. Med. Princ. annotarunt. Præter frigus ad suppressionem mensium multum conferunt assumpta; inter quæ sunt omnia difficulter digestibilia, in specie omnia acida, imprimis mineralia fixa, vitrioli, salis, nitri, &c. quæ admodum impediunt mensium fluxum, quatenus sanguinem inspissant, ejusdem fermentationem à volatilibus oriundam omninò tollunt, & coagulationem inferunt; quod etiam faciunt omnia cruda aut viscida, sanguinis fermentationem impediētia, obrundendo sal fermentativum, ut caseus: hinc & panis recens furno extractus aut calens admodum nocivus est puellis & mulieribus, cum viscido suo lentore promoveat cruditatem stomachi acidam, & sanguinis fermentationem insignitè impediat: Hinc etiam à lacte & omnibus lacticinis tempore menstruationis vel imminētis vel præsentis, abstineant mulierculæ: quo etiam faciunt carnes fumo induratae. Nam cum ex assumptis digestio stomachi vitietur, ita, ut exinde fiat cacoehylia, hinc cacoehymia, & hinc denique cachexia, ordinariò etiam ex sanguinis cruditate fermentatio mensstrua impeditur, & hinc cachexia, quam specialiter virgineam vocant, seu febris alba, oritur; hinc ex hac causa Barbette in sua Praxis pag. 83. vitium mensium suppressionis à causis externis in stomacho radicari non ineptè asserit. Confirmatur hoc malum ulterius, dum ex mensium suppressione picæ laborare incipiant, & variâ, imprimis insolita aut inconfluenta, promiscuè ingerant: Sic namque Schenckius lib. 4. Observ. narrat mulierculam, quæ devorata magnâ copiâ prunorum mensium suppressionem & tumorem ventris incurrit, qui tumor tandem incredibili copiâ ossiculorum post annum excreta subsedit, & menses repetierunt: Sic Zacutus Lusitanus lib. 2. Praxis admir. observat. 99. refert quandam carbonum voracem ex pica, tandem,

cum

cum per 10. annos menses fuissent suppressi, curatam per conservam artemisiæ & menthæ. Denique & animi affectus multum valent ad sanguinis fermentationem, hinc & crasin alterandam: hinc uti gaudium, uti moderata ira, quibusdam per auctam sanguinis exagitationem menstruum fluxum crebrius provocant; ita contra terror subitaneus, tristitia, mœror, pavor ac metus insigniores, periculosè menses imminentes sistunt, vel subito suppressere valent fluentes: Sicuti notum etiam est, quod hæmorrhagia narium subito incusso terrore subinde soleat compesci. Observandum tamen, contrarios effectus subinde ab iisdem animi pathematis sub menstruatione observari, ita, ut ab iisdem nunc intendatur, nunc cohibeatur fluxus: Conf. Sylvius *lib. 3. Prax. p. 84. 85. seq. cap. 3. §. 263. seq.* Fumi carbonum multum nocent, si foveant se mulieres per inferiora, vid. Rodericus à Castro *pag. 76.* Vitio uteri fit mensium suppressio, vel vasorum, vel uteri orificiorum culpa: Vasa quidem obstruuntur à mucosa pituita inspissata, & sub menstruationis declinatione sensim condensata, vasa infarciēte. Orificium autem internum, idque frequentius, rarius autem externum, uteri oclusum est causa suppressionis mensium: Observatum nempe fuit subindè, clausum fuisse orificium externum uteri per membranam, nunc integram, ubi simul urinæ excretio læditur, nunc in medio sic perforatam; estque talis membrana nihil aliud, quàm hymen adeò decantatum p. n. auctum seu coalitum.

Denique vulnerati, aut excoriati, aut exulcerati plus minus vaginæ parietes sub consolidatione subindè coalescunt, & ita vias consuetas occludunt; sicut à pinguedine, cicatrice, vel tumoribus comprimentibus mensium suppressio observata fuit. Conf. Timæus von Guldenslee *lib. 4. Cas. 7.* Quò etiam pertinent læsiones genitalium post partum violentum subinde præternaturalem eorundem coalitum inferentes: Vid. Severinus *de Efficaci Medicina p. 285.* Platerus *lib. 1. Obs. Bartholinus Cent. 2. p. 221.* Hildanus *Cent. 6. Obs. 67.* Sed de huiusmodi atretis seu clausis & velatis plures & varias observationes vid. in Sennerti *Praxi lib. 4. Part. I. Sect. I. cap. 3. pag. 11.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa diagnostica menses suppressos, nec ritè fluere, manifestatur imprimis ex relatione ægrorum, & ex symptomatis concomitantibus. In virginibus enim sanguis suppressus per venas hinc inde vagans per insueta nonnunquam & aliena loca expurgari solet; imò non rarò febres infert: item color corporis in talibus insigniter solet esse mutabilis, dum pallidæ fiunt, subtumidæ, & colore ad livorem inclinante, supervenit tandem

febris, quam vocant albam seu febrem virginicam.

Probè autem cognoscendum est: an menses sint suppressi naturaliter ex gravidatione? an verò p. n. suppressi?

Quibus emanent p. n. vel morbosè, præter observationes proprias conqueruntur de difficili anhelitu; quando nempe quodammodo moventur, præsertim adscendendo, mox suffocatio imminet: Ulteriùs patiuntur lassitudinem in omnibus artubus hinc inde, in specie circa lumbos, dolores tensivos graves percipiunt, hinc præcordiorum anxietates, pedetentim color corporis floridus perit, labia pallida superveniunt, fiunt apparenter cachecticæ, oculi tument: supervenire solent stomachi affectus, cibi fastidium, nausea, vomitus, pica, & tandem perfectè cachecticæ evadunt.

Sed hæc per se facillè patet.

Magis cognoscenda est differentia causarum, an vitio sanguinis, non debite turgescētis? an vero vitio uteri & obstructorum vasorum suppressantur menses? Si sanguinis non debite turgescētis vitio menses emanant, nulla symptomata abdominis aut lumborum, quæ menstruationem antecedere solent, observantur: alia tamen symptomata, quæ sanguinis labem ostendunt, adesse solent, in specie urinæ crudæ, alvi segnitie, ac symptomata hypochondriaca, & procedente tempore nullam penitus statà periodo alterationem in corpore ampliùs percipiunt. Sin verò saltem uteri ejusque vasorum infarctorum vitio deficient menses, præfata symptomata consueto tempore vigeant, quæ ostendunt adhuc sanguinis impetum & modum excretorium, dum sanguis turgescens, quatenus consuetis viis effundi nequit alibi impetu facto per anastomosin effluit, unde nunc vomitus cruentus, nunc hæmoptysis superveniunt: Exempla vid. in M. A. N. C. *Ann. 1. Obs. 95. Ann. 6. & 7. Obs. 49.* item varia pathemata in his statis temporibus, quibus aliàs fluere menses debent, percipiunt fœminæ, frequentes sunt dolores lumborum circa vasa lumborum, & quæ ex ramis iliatis oriuntur.

Conqueruntur ulterius de sensu cujusdam tensionis circa regionem pubis: item percipiunt pulsationes hinc inde in variis corporis locis, nec non circa hypochondria, nunc in artubus, adsunt murmura, borborygmi, dolores lancinantes in lumbis: qui ostendunt sanguinis tunc urgentem fermentationem & turgescēntiam menstruam, quæ propter impedimenta in vasis non potest emitte, unde quandoque in talibus sanguis per loca alia effluere solet, interdum etiam per excretionem cutaneam, quæ semper augentur, quoties tempus menstruationis instat; vel quando fluere debent menses, & siquid fortè effluat, mucosum albidum excernitur.

Sed



Sed quia nusquam tuta fides apud mulieres, & ipsæ interdum incertæ sunt, an sint gravidæ? an reverà p.n. menses deficient? subindè solent interrogare Medicos de hac re, Quæritur ergò: an dentur signa, quibus possit demonstrari, an talis mensium emansio sit ab ingravidatione? vel an ab alia causa oriatur? Signa certa distinctiva non habemus, quia sunt admodum similia. Dicit Lindanus: *Soleo jubere, ut expectent medium gestationis tempus, quò certa possint esse propter motum infantis: quod si se non prodat, nihilominus difficile est judicare, quia sunt, qui motum fetus non percipiunt, etiam ultimo mense, & nihilominus pariunt. Summa: res est periculi plena, facile credere mulieribus. Itaque semper cauti estote. Habet tamen suppressio naturalis illustra etiam signa, sed non absolute vera; possunt enim etiam cum conceptu esse: itaque oportet Medicum valde circumspectum esse &c.* Nam pathemata, quæ insequuntur gravidationem: nempe appetitus prostratus, nausea, vomitus matutini, pica, item lac in mammis, &c. hæc omnia etiam observata fuerunt insecuta suppressionem mensium, etiam in virginibus sine graviditate: vid. Theodericus in *Valetudinario* pag. 128. Hippocrates equidem *Scēt. 5. Aph. 39.* hanc suggerit cautelam: quod nempe mulier, si nec gravida sit, neque puerpera, habeat verò lac, quod eidem deficient menses. Nihilominus tamen hoc ipsum τυχόν est fallax; Prostant enim multa exempla virginum, quibus, ut dixi, illibatis, mensibus etiam fluentibus, lac tamen genitum fuit: Imò Bartholinus in *sua Anatome* refert exemplum cujusdam familiæ, cui hoc fuit hæreditarium, ut omnes virgines, simul ac puberes fiunt, lac generent: Huic etiam Galenus assentit in *Comment. in Hippocratem*, qui licet id rarò evenire scribit, tamen aliquando fieri posse concedit: Scribit etiam Alexander Benedictus *lib. 3. Anat. cap. 4.* se vidisse mulierem, cui, cum virgo esset, quoniam infæcunda erat, menses substerant, lacte mammæ semper diffluxerint: Et Christophorus à Vega *Comm. ad Aphor. Hippocratis* refert, se vidisse puellam Burgensem, cui mensibus suppressis lac in mammis inerat.

Certum est, quod cibi fastidium, aut etiam pica, sit admodum suspectum signum gravidationis, ita, ut ubi concurrit cum mensium suppressione, virgo quæ fuit, tanquam fœmina tractanda sit, juxta Hippocratem *Scēt. 5. Aphor. 61.* si mulieri purgationes non prodeant, neque errore, neque febre superveniente ubique fastidium accadat, tum pragnantem esse putato.

Aliàs ordinaria signa, quæ naturalem suppressionem mensium sequuntur, sunt ferè ejusdem conditionis, quàm quæ sequuntur

graviditatem. Hæc tantum est differentia in paucis quibusdam, quod nempe

1. In gravidis successivè symptomata circa primas vias mitescant, venter attollatur, mammæ turgidæ fiant; quibus verò morbosè suppressi sint menses, semper magis, magisque in deterius labantur, cachecticæ evadant, pedes intumescant.
2. Quibus præternaturaliter suppressi, sunt menses, iis pallor non tantummodò in facie, sed etiam in toto corpore, cum tumore quasi inflativo supervenit.
3. Quod appetitus in gravidis ultra tertium mensem non soleat esse prostratus; sin verò fastidium sit perpetuum, magna est suspicio suppressionis præternaturalis.
4. Capitis continui dolores, & ipsi suppressionem præternaturalem arguunt.
5. Perpetuæ in lumbis gravitates & pulsationes, aut etiam in aliis corporis partibus insoliti arteriarum motus, similiter præternaturalem suppressionem arguunt.
6. Crebriores vicissitudines seu mutationes caloris & frigoris per totum corpus etiam præternaturalem suppressionem mensium innuunt, imprimis quibus deficient menses propter impedimentum venarum uterinarum, superest tamen adhuc motus & turgescencia sanguinis ad excretionem apti; tales phlogosi vagâ solent simul torqueri, hincque iisdem minùs dari convenit volatilia oleosa, olea destillata, nam sic magis intenduntur phlogoses.
7. Respiratio anihela & admodum difficilis ad levem etiam corporis motum, similiter non ex postremis est signis, quæ præternaturalem innuunt suppressionem.
8. Pulsus ibidem frequens, inæqualis, obscurus, interdum quodammodò deficiens, etiam præternaturalem innuit suppressionem.
9. Si in tempore non succrescat abdomen, infantes esse puellas certum est.
10. De hoc imprimis solent esse sollicitæ mulieres, an per urinas etiam possit cognosci gravidatio? Veteres imprimis, secundum Avicennam, affirmant, ex urinis hoc posse videri. Avicennæ dogma est, quod certum imprægnationis signum sit, si incunte imprægnatione excernantur urinæ subalbidae, tenues, & cui grana innatent quædam instar cottæ carminatæ (*wie geschlossene Baumwolle*) quod tamen ab omnibus Medicis, etiam expertis-

(Bbbbbb)

simis,

simis, tanquam vanum rejicitur. Probabilius procedit in hoc puncto Gabelchoverus *Cent. 1. Cur. § 5. in Annot.* ubi dicit: si urinæ in iis, quibus suppressi fuerunt menses, omni ferè labe vacarunt, & ferè ex toto naturales fuerunt, tunc conceptus spem has ipsas urinas fecisse; sin verò p. n. suppressi fuerint menses, hoc ipso vix fieri posse, quin mutantur, ac præter modum subindè aut tenuiores, aut pallidiores, ac flammeæ, interdum simul crassæ ac turbidæ, fiant urinæ.

II. Denique absentia tumoris uterini, qui gravidis paulatim magis magisque contingit: Conf. Lindanus.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: menses sistuntur vel in fluxu aut accidentaliter, vel supprimuntur ante fluxum: suppressio mensium accidentalis facile curabilis est, modò maturè occurratur; habitualis verò tardè, & subindè difficulter curatur: suppressio in ipso fluxu aut accidentalis gravia & periculosa subindè symptomata post se trahit, vid. Hippocrates *lib. 5. Aph. § 7. & l. 1. de M. M. T. 34.* difficile nempe anhelitum, lassitudinem tensivam totius corporis, sanguinis sputum, gravissimas cephalalgias, dolores abdominis, lumborum; imò etiam periculosa uteri mala, tumores inflammatorios aut scirrhosos, inflammationes, abscessus, ulcera, &c. vid. Hildanus *Cent. 2. obs. 46. 62. 63. & 64.* convulsiones manuum, vid. Salmuth. *Hist. 3. observ. 28.* quæ omnia maturam urgent curam.

In habituali mensium suppressione quò diutius suppressi sunt, eò difficilius, sæpe etiam nunquam, malum curatur, & tales mulieres successivè cachecticæ, hinc leucophlegmaticæ, evadunt: non quod cachexia sit effectus deficientium mensium, sed quod cachexia incipiens inferat menses deficientes. Quibus ergò deficiunt cachexia incipiente, his redditur confirmata.

Morbi, quibus supervenit mensium emissio, redduntur deteriores, in specie chronici: non solent rectè curari, nisi simul promoveatur mensium fluxus; est enim lerna malorum, adeò, ut indè tantum non omnes muliebres affectus excitentur & oriantur.

Unde quilibet Medicus, simul ac vocatus fuerit ad mulierem, quærere debet de statu mensium, eorumque fluxu: nam ex suppressis mensibus cachexiæ, hydropes, ulcera partium varia, asthmata, & anhelationis difficultas, ventriculi & hypochondriorum pathemata, melancholia, &c. imò tandem ipsa mors, ingruit.

Rectè monet Primerosius *lib. 1. cap. 2.* quod certum de mensium suppressione iudicium ferri non possit, cum pro varia ætatis, craseos,

& reliquarum circumstantiarum ratione quædam mulieres facilè, quædam nunquam curentur; facilius enim v. g. curantur, quibus menses à plethora & hæmorrhagia suppressi, quàm à cruditate massæ sanguineæ; sicut & hæc facilius curatur, quàm quæ à scirrho uteri.

Qui aliàs anginâ laborarunt, his propter menses suppressos facilè redire solet.

Quædam & hirsutæ sunt toto corpore; imò quibusdam barbam erupisse, & viris eas similes factas, observatum.

Et quidem magis læduntur mulieres, si penitus suppressi sint menses; si tamen per aliam convenientem viam sanguis, v. g. per alvum, nares, &c. evacuetur, minùs læduntur; hinc Hippocrates *Sect. 5. Aphor. 33.* *Mulier mensibus deficientibus sanguis è naribus profluens, benè est.*

Denique utina nigra in mensibus suppressis bonum signum est, vid. Joël *in Praxi T. 5. de Febr. Sect. 2. pag. 64.*

#### CURATIO.

Quod attinet curam mensium suppressionis: in hac ante omnia

1. Ventriculi chylosi imprimis est rectificanda.
2. Sanguinis cruditas volatilibus salinis aromaticis est corrigenda.
3. Humororum vasa uterina obstruentium visciditas iisdem incidenda; &
4. His simul adjunctis appropriatis fermentatio menstrua stimulanda.

Quod si à causa externa desubito restringantur menses, tunc labe inducenda emendanda, in specie sanguinem resolventibus & attenuantibus, fluxusque debitus appropriatis revocandus.

Pro scopo primo, nempe chylosi rectificanda conveniunt vomitoria, hinc aromatica volatilia: Pro secundo scopo conveniunt Martialia, & volatilia oleosa aromatica, quæ sal volatile oleosum sanguinis & bilis intendunt: Pro scopo tertio conveniunt imprimis gummata, gummi Ammoniacum in specie, & hinc Mercurialia, imprimis & dulcis: Pro scopo quarto conveniunt appropriata, & quæ per experientiam sunt cognita, quæ menses stimulant; quæ tamen ut plurimum vi acidâ destructivâ sanguinem dissolutum solent pellere.

Pro his scopis imprimis, ubi diutius suppressi fuerint menses, obtinendis, ulterius observandum:

I. Nunquam danda esse specifica menses moventia in confirmato malo, nisi præmissis universalibus, adeoque non sunt ciendi menses, nisi priùs mutata primæ viæ, & correctâ sit massa sanguinea.

II. Antequam menses moveantur, priùs consideretur: an fluere debeant; ratione nempe con-

pe constitutionis subjecti; nam emaciatis, aut à morbo resurgentibus, aut quæ nunquam viderunt menses, non, nisi cautè iidem stimulan- di sunt, aut potius penitus reliquendi. Con- fer. Hartmannus *Prax. cap. 219. §. 2. & 3.* ubi imprimis monet, curari non debere, quæ menstruationem nunquam habuerunt. Nam sæpè fit, ut virgo 18. vel 20. annorum non- dum menstruata sit, consulitur Medicus, si quoad cætera in omnibus sit sana, non de- bet curare, quamvis menses hætenus non processerint. Menstruatio enim est opus na- turæ, hæc cessante, quid agat Medicus? Nisi igitur gravia adsint symptomata, curam omit- tat. *Sæpe fit, ut virgines vel ter expertæ men- ses sint, & emanant per vices plurimas; quæ, si sana sint, nec incommodum grave sentiant, relinquenda, & siquid agendum, solis aroma- ticiis & roborantibus procedendum, nempe cin- namomo & similibus*, ut dicit Lindanus.

III. Tunc demùm menses stimulan- di sunt & provocandi, quando statutum & naturale fluxionis aliàs consuetæ est tempus. Adeo- que probè facienda est computatio, quando iidem naturaliter redire debeant, ut tunc propinentur remedia. Sed quando hoc pun- ctum seu tempus latet, ob nimiam diurni- tatem suppressionis, interrogandæ sunt, an- non singularem interdum in corpore perci- piant sanguinis motionem & agitationem? v.g. annon percipiant certo tempore insoli- tos lentivos dolores lumborum, aut etiam pulsationes in locis vicinis? aut annon inter- dum extraordinarias phlogoses, aut febriles effervescentias, aut corporis incalescentias aut effervescentias percipiant? Quando enim certis quibusdam temporibus talia eveniunt, certum est eadem provenire à turgescencia sanguinis menstrua, quæ urget quidem excre- tionem, sed non sufficiens est, adeoque tunc temporis imprimis stimulantia sunt propinan- da. Quod si verò ob confirmatum malum nec talia percipiuntur, monent Practici, quod convenientissimè dentur specifica tempore novilunii, mox sc. post peractam conjunctio- nem lunarium, præmissis præmittendis; hoc enim ipsum observavit optimo cum suc- cessu Rulandus *in sua Praxi & Obs. pag. 285.* & tunc simul temporis sub lunæ incremen- to turgescences, & quasi spumefacti humo- res facilius obsecundant.

IV. Inter universalia eminent imprimis e- vacuantia, & hinc venæsectio. Evacuantia sunt tam per superiora, quàm per inferiora. Nam vomitus, præmissis quibusdam dige- stivis, mirè convenit, sub principio curæ provocatus, aut etiam interdum repetitus ad evacuandam ventriculi & primarum via- rum saburram, sive instituat per antimo- nialia, sive per asarina. Uno nomine: cu- ra talis affectus eadem est cum cura cache- Tom. II.

xix, cui tandem adjungantur appropriata menses pellentia.

Hinc subministrantur purgantia: Nam pur- gationes, præsertim acriores, & in specie co- locynthis & helleborus niger, simul quoque menses stimulare, ac uterum sollicitare solent, quia, dum dejectiones promovent, etiam vici- ni uteri ejusque vasorum vim expultricem so- licitant, ut menses revocentur. Propterea etiam purgantia iis, quibus nimium fluunt menses, aut etiam in mulieribus gravidis, non nisi cum summa cautela, sunt administranda, ne sc. in his per hæc menses nimis movean- tur; & in illis, quibus substituerunt, plus sæpè catharticiis, præsertim si ea, quæ menses movent, simul commisceantur, quàm aliis, quæ tantùm menses vi propria movent, effi- citur. Purgatio talis rarò fiat confestim, po- tius successivè & per epicralin: in quem finè conducunt præsertim noduli in vino, aut et- iam pilulæ, tam usuales quàm etià his similes magistrales præsertim cum gummatibus con- cinnatæ.

Hæc inter purgantia eminet in specie aloë & aloëtica, hellebor<sup>o</sup> niger, qui non sine succes- su, in nodulis in specie, usurpatur; unde etiam in specie ejus extractum cum vino paratum confert, permistum cum Mercurio dulci item colocynthis, & omnia ex colocynthide para- ta. Helidæus Paduanus *p. 176.* mirè comendat turpethū, & ex hoc parata remedia purgantia; unde species diaturbith cū rha-barbaro à ʒß. ad ʒj. comendantur in decocto pulegii. Præ- terea pilulæ de tribus Ruffi; conf. Wedelius *de Medic. Facult. pag. 191.* item pilulæ de hiera cum agarico, pilulæ foetidæ, & de asa foetida, de sagapeno, mastichinæ, pilulæ aloëphanginæ cum extracto alhandal acuata, pilulæ expertæ Bartholini ex hiera simplici cum extractis aga- rici, castorei, aristolochiæ longæ, sabinæ, myr- rha rubra, & oleo destillato succini ac cinna- momi; quarum salutarem effectum sæpe se ex- pertum fuisse asserit *Cent. 5. Hist. Anat. 60. pag. 186.* Præter quæ purgantia etiam diuretica vel fortiora, vel aliquandiu continuata, menses promovere solent, Conf. M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. obs. 5. pag. 16.* in quem finem, præmissis præmittendis, præsertim Martialibus, fre- quentem usum quibusdam rob baccarum ju- niperi suasi cum successu; gummi enim hoc re- sinâ volatili acri aromaticâ imprægnatū mul- tùm confert. His purgantibus comodè præ- mittuntur pulveres digestivi salini.

℞. arcan. dupl. Myrs. ʒß.

crocis ʒiis cachect. ʒij.

⊕ ʒß.

M. f. Pulvis.

Div. in 2. part. æqu.

D. S.

Digestiv - Pulver.

His subnectuntur purgantia:

(Bbb bbb 2)

℞. extr.



*Rx. extr. panchym. Crollii, l. Cathol. ʒj.  
g. Amm. in 10 sol. ʒʒ.  
extr. croci*

*castor. ā gr. v.  
troch. alb. ā gr. jv.*

*c. f. q. ʒo succini f. Pilulæ pro aliquot  
dosibus. •*

*D. S.*

### Parirende Pissen auff etliche mahl.

Lindanus commendat oxymel helleboratum ā ʒj. ad ʒij. in potionibus convenientibus ac decoctis usurpatum. Barbette in sua *Praxi*, habet elegantes pilulas, ex gummi Ammoniacoparatas cum aliis.

De his & similibus capiat ægra dosin omnibus 4. vel 5. diebus: tempore verò intermedio in usu sint noduli vino infundendi ex alterantibus aromaticis, v. g.

*Rx. rad. angelic.  
levist. ā ʒj.  
galang. ʒʒ.  
fol. rorismar.  
matricar.  
fabrn. ā M. j.  
bacc. lauri, l. juniperi rec. ʒiʒ.  
cinnam. acuti. ʒiij.  
macis ʒj.  
croci ʒʒ.  
Θʒi ʒiij.*

Incisa & contusa includantur nodulo:

*D. S.*

### Eröffnender Mutter-Püschel.

Qui pro scopo alterativo simpliciter infundatur in vinum, & de quo quotidie, manè jejunio stomacho, & à meridie per bihorium ante cœnam, hauriatur bonus haustus.

Convenientius est, si omisso sale ʒi, nodulus infundatur in vinum chalybeatum, seu in quo limatura chalybis candefacta aliquoties fuit extincta; sic namque Marsipforum vegetabilium activitatem egregiè adjuvat.

Si nodulos hos volumus reddere laxativos, addi potest senna, radix hellebori nigri, radix rha-barbari, bryoniæ, &c. v. g.

*Rx. rad. helleb. nigri. crudi ʒʒ. ad ʒiʒ.  
fol. senn. f. st. ʒʒ. ad ʒvj.  
sem. cartham. contus. l. rad. bryon. ʒʒ.*

Quæ superioribus addita cum Θʒi corrigenda extrahendaque purgantia, infundantur, ut dixi, in vinum: Vel

*Rx. fol. senn. f. st. ʒiʒ.  
rad. helleb. nigri. ʒvj.  
rha-barb. el. ʒiij.*

Incis. & contus. misc.

V. Factâ hâc corporis præparatione & purgatione venæsectio est salutaris. Verùm disquisitio est, quando, & ubi, conveniat venæsectio? quæ lites facilè decidendæ. Res

ut pateat, 1. aut expectantur menses, qui nunquam aliàs fluxerunt; pro talibus inutilis venæsectio. Sufficiunt talibus balnea & infusus vel particularia pediluvia, seu magis universalia semicupia, junctis simul appropriatis.

Vel 2. Revocandi sunt menses, quando subsistunt, & diutius à fluxu cessarunt, sanguis coacervatur, & coacervatus tardius circulator, adeoque in talibus, in quibus quasi plethora præsupponitur, & dolor gravativus artuum, difficilis respiratio, &c. adest necessarium est, instituere evacuationem per venæsectionem. Ut plurimum in hoc conveniunt Practici, secandam esse imprimis venam saphænam, quâ ob eam etiam uterinam vocare solent: Sed præ ceteris omnibus hac in parte accurata est doctrina Lindani, qui 2. distinguit tempora in fluxu mensium deficiente, in quibus vena secanda; nempe vel instat mensium fluxus; vel actu fluunt menses, & quacunque occasione imminuuntur aut sistuntur. Jam ergo optimo consilio vena est secanda in brachio ad provocandam menstrua fluenda, seu dum imminet fluxus; sic enim auspiciò brevi post menses superveniunt, vid. M.A.N.C. *Ann. I. obs. 6. pag. 24.* Nam si secetur in pede, periculum est, ne sanguis concitatore fluxu ad inferiora tractus, stagnet circa vasa uteri, & menses supprimantur.

Aut 3. Revocandi sunt menses jam actu, sed non sufficienter, fluentes (nisi sit impedimentum in conformatione vasorum) aut casu, v. g. refrigerio, terrore, &c. in fluxu suppressi, aut jamjam fluere volentes, ad ea revocanda commodè saphænx aut alius apparentis sit sectio in pede vel crure; quia in eam regionem, in qua vena aperitur, sanguis rapidiori motu solet ferri propter vasa liberiora, & majus requirit spatium, &c. Merentur considerari, quæ docet Lindanus: *Si fœminis accadat, ut menstrui tempore laborent simul febre, unde tunc venam brachii secandam monui, & brevi post secuta menstruatio; in pede. verò nunquam secandam esse venam, nisi aut. menstruum actu fluat, aut ipse fluxus suppressus fuerit, & tunc non fallit; nam via eotempore laxa sunt. Ratio autem venæsectionis in brachio est, quod instantibus mensibus, dum turgescit & rarefcit sanguis, tunc in eo est omnis natura conatus, ut deorsum versus deducat sanguinem: itaque via cum sint exiles, non statim etiam aperiri possunt, sed potius distente quodammodo sanguinis fluxum sistunt. Quando itaque per saphænam apertam inferius sanguinis promovetur impetus, plus ad uterum ducitur, & ita malum augetur; sin vero apertâ brachii venâ sursum nonnihil revellitur, liberantur via ab oppressione, & sanguis facilius fluit. Nunquam certè experiemini saphæna sectionem menses provocasse, nisi aut actu fluentes, vel ex frigore, vel ex pavore fuerint restricti. Eadē leges observanda sunt circa puerperas: interdum*

dum instante labore part<sup>u</sup>, aut in ipso partu, secunda est vena in brachio. post partum verò, quando sunt suppressa lochia, tunc vena saphanea sectio aliquid valet ad revocandum illud, quod fluebat. In tam subitanea suppressione, licet non fluant menses, natura tamen conatus non perit, neque sanguinis rarefactio, sola causa externa impedit. Quanto major est dolor lumborum & rigor, tantò major est conatus deorsum, & tantò liberius potestis venæsectionem in brachio instituere. Hactenus Lindanus. Vid. M. A. N. C. Ann. 3. Observ. 53. Hæc, quæ dicit Lindanus, confirmata videbitis exemplo notabili à Riverio Cent. 2. Observ. 2. item Amato Lusitano Centur. 2. Observ. 28. Wallæo in M. M. pag. 98. Hæteroin Herc. Med. pag. 304. Deodato in Valetud. pag. 129. Hoffmannus tamen habet exemplum mulieris, quæ sub mensium fluxu in nimia ira perterrita, passa fuit suppressionem, Medicus secavit venam in pede, curata fuit: Inclinat etiam huc Febr Tract. de Absinth. pag. 138. qui dicit: Ubi magna est difficultas respirandi cum cephalalgia & cordis palpitatione, audacter medianam, vel cephalicam brachii tundendam suadet. Cum his etiam consentit Sanctorius in Methodo vit. Errores in Med. pag. 811. Sylvius lib. 3. Prax. 3. §. 95. sed quam periculosa etiam sint fluentibus mensibus in brachio venæsectiones, vid. Bartholini Act. Med. Hassniens. Vol. 2. p. 194. Velt-husius de Generat. p. 148. & Forestus l. 28. obs. 3. Imò mensibus actu fluentibus cucurbitularum dorso applicatarum quanta sit noxa, docet Gabelchoverus Cent. 4. Cur. 92. p. 215.

Aut 4. revocandi sunt menses, quando metus, quod circa ordinarium terminum non sint redituri: ubi venæsectio in talo pro concitando sanguinis motu deorsum, non inconcinna videtur.

Quod si adsint inflammationes auctæ cum mensium suppressione, aut etiam cum mensibus actu fluentibus, ubi secanda sit vena, prolixè ventilat Zacutus Lusitanus libr. 1. Med. Princ. Hist. 77.

5. His vicariæ sunt cucurbitulæ, præsertim scarificatæ, quæ in debilioribus venæsectionis loco sunt. Conveniunt autem hæc tam cum quàm sine scarificatione, præsertim iis in casibus, quando sanguis ad alia loca feratur, ut hic ad uterum revocetur, & commodè imponuntur primò locis remotioribus nempe cruribus, in specie femoris regioni internæ, & supra genu, vel hirudines labiis vulvæ, hinc propioribus, nempe coxis, & sic consequenter.

VI. His universalibus præmissis, progressus fiat pro corrigenda sanguinis crasi ad Martialia. Et quidem inveteratam emanationem mensium citra Martialia curare impossibile est, ad eò ut de his referat Lindanus, quod in Marte sit, quicquid ad ciendos menses desideratur. Operatur non quidem positivè, sed terè priva-

tivè, removendo nempe impedimenta, quatenus absorbent sc. acidum illud, cujus causa fermentatio menstrua supprimitur. Unde etiam aperientia sic dicta Martialia, quavis pulveres cachectici, Ræ Martiales, infusa & extracta Martialia, &c. aptè locum inveniunt. Convenit ergò limatura Martis cruda, vel sola pulverisata, vel cum paucis cinnamomo mista in vino Malvatico aut Rhenano pota; sic namque natura ipsa in stomacho extractum Martis egregium facit. Et certum est, in iis, quibus stomachus robustus potentiori abundat acido, aut etiam, in quibus validum acidum intestina occupet, his melius propinatur limatura Martis cruda præparata & pulverisata, quàm salibus vel acidis extra stomachum subacta, & in crocum corrosa. Zacutus Lusitanus laudat terram Martialem in ferrifodinis inventam. Post hæc eximia est essentia Martis, cum succo pomorum Borsdortianorum parata, aut R Oli Martis Zvvelferi. Vina etiam medicata extinctionis vel infusionis Martis non sunt contemnenda; it. claretum chalybeatum Mynsichtii, vinum Malvaticum Martiale Hartmanni.

Item convenit pulvis cachecticus Hartmanni cum stercore anseris junioris, vid. Hartmanni Prax. Chim. p. 266. & pulvis ad pallidos virginum colores Heinrichi ab Heer obs. 6. item O Martis compositum, liquor Martis solaris. Potus acidularum quoque egregiè promovet mensium fluxum. Hinc electuarium Martiale Horstii, Hartmanni, plura Martialia, huc facientia: vid. in ejus Praxi cap. 219. Optimè autem propinantur Martialia cum laxantibus, mutatis invicem vicibus.

Hisce denique socientur subinde volatilia aromatica amaricantia, in morbis cachecticis & chronicis usitata, ex quib<sup>9</sup> tamen speciatim eligantur, subjungantur aut permisceantur, quæ simul sunt appropriata menses stimulantia, tam interna quàm externa, v. g. rosmarinus, calaminta, cherefolium, levisticum, matricaria, centaurium minus, spica Celtica, marrubium, de quo vid. Borellus Cent. 4. Observ. 14. flores cheiri, flores item calendulæ, de quibus vid. Riverius in obs. à Pachequo communicatis obs. 30. flores item lavendulæ, sumina sale volatili vel acri aromatico prædita, v. gr. erucæ, nasturtii, fœniculi, anisi, dauci, cumini, baccæ itidem lauri & juniperi, semen millii Olib. semen ammeos violarum, quod Corbæus laudat cum granis aliquot piperis & myrrhæ, sabina, radix angelicæ, de qua vid. Petraræ Nosolog. Diss. 93. §. 28. radix item fœniculi, eryngii, bryonæ, rubiæ tinctorum, de qua v. Fonseca Tom. 2. conf. 23. & Riverius Pr. l. 15. c. 2. aristolochiæ rotundæ, gentianæ, enulæ, curcumæ ac pyrethri, artemisia, melissa, gentiana, cinnamomum, cassia lignea, costus, galanga, nux moschata, caryophylli, cardamomum, piperata, myrrha, essentia myrrhæ, elixyr proprietatis, R Qi composita,

(Bbbbbb 3)

posita, & omnia ex & cum myrrha parata, gummata, colocynthis, castoreum, splen bovis, borra, salia alcalia, primario volatilia, secundario fixa; item arcanum duplicatum Minichtii, &c. Hæc nempe sunt primaria præmissis præmittendis menses stimulantia. Radicis angelicæ aromatica vis singularis est uterina, & mensibus ciendis dicata, radix asari in aqua communi bullita; sic namque miscet ejusd. vis vomitiva, ac fit aromatica diuretica; marrubium album vino infusum specificum est Borelli *Cent. 4. Observ. 14.* Decoctum artemisæ rubræ cum oleo fæniculi destillato vel succini propinatum, mirè à Crollio commendatur; aut conserva artemisæ à Zacuto Lusitano pro corpore aliorum ingredientium. Collegium admodum elegans est pro mulierculis remedium: Rosmarinus singulariter affectibus internis & mulieribus convenit; baccæ lauri pulverisatæ saltem in communi sunt usu ad promovendos menses. Hinc decoctum roris marini cum croco, aut cum floribus cheiri in vino chalybeato, laudatur insigniter à Practicis, aliquandiu continuatum: Vulgo

℞. HB. roris mar. M. iij.  
rad. armor. rec. ℥iij.  
bacc. junip. rec. ℥i℥.  
sem. carv. ℥j.

Incil. & contus. misc. affundunt V, & digerunt in ☉.

Sabina est fortissimum remedium, præsertim ☉ ejus destillatum: quam ob causam adhibetur etiam ad pellendum fætum, sed tamen frustraneo sæpè cum successu, reluctante scil. ipsâ naturâ: hinc etiam pilulæ de sabina Mynichtii in usu sunt: item extractum sabina, cui etiam ☉ destillatum succini commodè potest surrogari. Viscus quercinum singulare quid obtinet in hoc casu. De Malicorio vid. Augenius, & Bartholinus in *Epistol.* Conducunt ulterius flores cheiri, lavendulæ: Nam decoctum radicis angelicæ cum floribus lavendulæ in vino eximie est commendationis: crocus mirè menses promovet, & optimum est remedium, quæ patiuntur difficultatem mensium actu fluentium: unde communiter cerevisiæ calidæ incoquitur crocus & cinnamomum, pro remedio menses remorantes fortiter ciente, in tantum, ut ex eo etiam lethalis mensium fluxus supervenerit: vid. Riverius. Præter crocum, cinnamomum cum supra dictis aromaticis est laudatissimum, quorum salia volatilia oleosa ad stomachi robur & sanguinis viciatam emendandam crasin, & acueudam fermentationem menstruam, mirè conducunt. Certum quorundam empiricum est hoc, nempe

℞. nuc. moschat. ℥jv.  
sacchari fini ℥xij.

Hæc probè miscent, exhibent quantitate nucis avellanæ manè & vesperi, præmissis universalibus.

De semine cicetis rubri notum est, quod hujus diuretica vis insigniter menses stimulet & lochia: vid. Sebizius. Sunt ergo, qui

℞. cicer. rubr. M. iij.

Macerant eos per 2. vel 3 ☉ in V pluviali tepescit, addunt deinde nonnihil croci, ut & parum fermenti, quo panis aliàs fermentari solet, miscent, transcolant, & colaturam ægræ subindè bibendam propinant.

Præter talia, & alia similia modò dicta, imprimis efficacissimum est castoreum, sive in substantia assumptum, sive ex eodem parata essentia & extractum cum V ☿ifato. Facit huc infusum & mixtura Barbette in sua Praxi, ubi castoreum extrahit per salia volatilia cum spiritu vini diluta, adque imitationem ejus potest fieri hoc modo:

℞. castor. ℥ij.

☉ volat. succini.

C. C. ā ℥j.

His affundatur q. s. V non adeò rectif. & diluatur c. V cinnam.

Stent in infuso in vase clauso in loco tepido, donec extrahatur R, quæ postmodum, prout plus vel minus menstrui assumptum fuerit, ad ℥j. vel cochl. j. poterit propinari.

Propius fit, si liquor cornu cervi succinatus affundatur castoreo; extrahit enim potenter ejus sal volatile oleosum, sibi que unit, & sic erit essentia ad menses admodum potens, ad guttas 30. l. 40. tempore solitæ vel debitæ saltem menstruationis assumenda.

Quidam etiam tutò castoreum usurpant in gravidis, aut in talibus, in quibus suspecta est graviditas cum mensium suppressione: Sic namque Corbæus in *Gynæcô* luo, si cum suppressione mensium suspecta sit conceptio, sequentem laudat pulverem:

℞. castor.

sem. anisi

apii ā ℥j.

Trita cum vino dissoluta exhibuit.

Castoreo non cedit myrrha, egregium balsamicum uterinum, quæ cum aliis mista mirè menses stimulat: Hinc omnia ex & cum myrrha parata conveniunt, unde R myrrhæ cum ☉ ci vinoso, item essentia salutis D. Langii, parata ex myrrha cum V ☿ifato vel cum R ☿i, est egregia medicina. Aliàs in officinis prostant trochisci de myrrha, qui ad ℥j. ad summum propinati potentis sunt efficaciz ad menses movendos, item essentia composita ex castoreo, myrrha & similibus, cum salib⁹ volatilibus in V dissolutis ad imitationem Barbette. Succinum & ipsum egregium est in hoc casu, imprimis, si cum cinnamomo aut croco propinetur:



pinetur:  $\Theta$  ejus volatile insigniter conducit, & ad multa prodest symptomata, ex mensium suppressione pronata. De aloë res nota est: Undè facilè patet, quod elixyr proprietatis, ut vulgò vocant, insigniter conducit ad stimulos menses; unde pro usu muliebri sunt, qui parant elixyr proprietatis sine acido, loco spirituum acidorum addendo Vni sal  $\Phi$ i fixum, quod egregiè extrahit aloën, crocum & myrrham: Alii parant cum spiritu  $\Theta$ is  $\star$ ci pro usu muliebri, tam menstruatarum, quam etiam pro usu puerperarum: aut ejusdem species in forma sicca seu massa pilularum pestilentialium Russi usurpantur. Quæ suprà dicta fuerunt de castoreo, intelligi quoque similiter possunt de asa fœtida, non minus efficaci in morbis muliercularum: hinc pertinet huc essentia anonyma D. Langii, parata ex castoreo & asa fœtida cum R  $\Phi$ i. Colocynthis, uti pro scopo laxativo deficientibus mensibus succurrit, evacuando visciditatem; ita correctæ per sal tartari amaritudine suâ specificè menses ciere potest: vid. Timæus von Guldensee in *Cas. p.* 207. Splen bovis specificè laudatur à Paracelso in suis scriptis ad menses remoratos, hinc fit decoctum splenis bovis, essentia splenis bovis composita cum V myrrhato parata, & extractum, indeque essentia ad menses composita frequenti fuerunt in usu D. Michaëlis ad mensium vitia: vid. Crollius & Hartmannus in *Praxi Chimiætr. pag.* 240. item decoctum splenis bovis Quercetani in Riverii *Praxi pag. m.* 188. Elixyr uterinum Crollii ad guttas XXX. l. XL. hinc essentia artemisæ, sabinæ, croci, castorei, in usu est: quibus & essentia ambre in virginibus, quibus minùs nocent odorata, commodè admisceri potest. Propinantur talia commodè in vehiculo aquæ cinnamomi, aqua pulegii, sabinæ, & similibus. Olea etiam destillata cinnamomi, aut caryophyllorum, aut succini, similiter pellunt egregiè menses.

Sanguis menstruus prius juvenulæ excipiat linteo, linteum probè tinctum exsicceatur, & sub usu cum aceto scillitico extrahatur è linteo R; quod acetum internè commodè ad promovendum menstruum fluxum propinari potest, vid. Helvetius. Helmontius *Tract. Tribut. Lunare* dicit, mulierem ex menstruo hausto esse suffocata.

Tandem borra potentissimè menses stillat, & aliis irritis optimè datur in decocto pulegii, addito croco, vel pulvere cinnamomi: vel additâ aquâ cinnamomi spirituosâ egregium est emmenagogum secundû Lindanum; sine cinnamomo enim nullum tale remedium dandum, quia hoc spiritus vitales egregiè roborat & excitat: Hinc trochisci de borra commendantur in M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. App. pag.* 140. item pilulæ aperientes & alterantes sequentes:

R. G. sagap. c.  $\dagger$ o solut. & infuss.  
succin. alb. præp.  
borrac. Ven. ā ʒj.  
myrrh. r.  
castor. ā gr. xv.  
croci ʒß.  
So caryoph. gutt. vj.

F. pilulæ tubindè capiendæ.

Item conveniunt pilulæ Cnœselii in M. A. N. C. loco allegato; item Poterii *Centur. 3. cap.* 32. ubi optima medicamenta ad promovendos menses enarrantur; item conf. *Centur. 3. Curat. 42.* Cum borra etiam salia vegetabilium fixa,  $\Theta$  melissæ, sabinæ, & sal uterinum Mynsichti, item sal succini volatile, commodè combinari potest. His omnibus palmam præripit arcanum duplicatum Mynsichti. Pertinet huc pulvis ex stercore columbino & croco, alibi explicatus. Cæterum  $\sim$  &  $\Theta$ ia volatilia cornu cervi, salis Ammoniaci, secundinæ humanæ, præsertim  $\sim$  carminativus, sunt egregia. Omnia hæc usurpentur eo tempore, quo menses fluere debent: in specie horum operatio eò est præstantior, si cum hujusmodi appropriatis jungantur, & post hæc imperetur corporis motus; vel expectetur post eorum usum blandus in lecto mator matutinus pro meliore alteratione & circulatione sanguinis, & feliciùs excitatur mensium recursus.

R. Oli  $\Theta$ is Zuvelf. l. solut.  $\dagger$  c. f. p. ʒij.  
essent. castor.  
croci ā ʒj.  
M. S.

#### Eröffnende Essentz.

Dosis 50. ad 60. guttæ bis vel ter in die in vehiculo calido, mulier nonnihil exerceat corpus blando motu.

R.  $\sim$   $\Theta$ ci  
secundin. human.  
liqu. C. C. succin. ā ʒj. M.

Dentur guttæ 30. vel 40.

R. Borrac. ʒß.  
myrrh. gr. xv.  
cinnam. ʒß.

M. pro 2. dosibus.

Pro vehiculo horum pulverum inserviat:

R.  $\nabla$  artemis. ʒij.  
cinnam. ʒj.  
essent. splen. bovis ʒij.  
castor. ʒj.  
syr. de canella ʒvj.  
M. S.

#### Träncklein zum Pulver.

Hiscæ annumerandum est simul balsamum sulphuris terebinthinatum & succinatum, & ipsum menses promovens.

Hæc ferè sunt ista, quæ ad mensium conducunt stimulum internè.

Cura suppressionis mensium, quæ fit uteri vitio, requirit, ut vala obstructa aperiantur incidenti-

cidentibus volatilibus, præsertim cum aliquali sudore usurpatis: membranæ remediis Chirurgicis incidantur; coalitus verò mutuus etiam separetur. Modum operandi videb. in Severino *de Efficaci Medicina lib. 2. cap. 88.* in Foresto *lib. 28. Obs. 55.* Schenckio *lib. 4. Obs. Hildano Centur. 3. Obs. 60.* Bartholino *Cent. 5. Hist. 42. & 43.* Viardel in denen *Anmerckungen pag. 47.*

Causæ, propter quos contingit mensium suppressio accidentalis, sunt duo:

1. nimia refrigeratio extremorum.
2. gravior animi affectus.

Curantur autem, causam, quæ menses suppressit, corrigendo & removendo: v. g. si fiat, ut actu fluentes menses à subito frigore, vel alio tali casu restringantur, præmissâ vel omisâ venæ saphenæ apertione, propinanda sunt volatilia oleosa aromatica, quæ sanguinem grumolum dissolvunt, &, accedente blando sudore, eundem denuò fluere faciunt, & in naturalem motum reducunt; hinc ~ *Θ*is \*ci & *Θ*ia volatilia oleosa non satis laudanda, cum castoreo vel myrrha propinentur, quorum usu, & blando subsequente sudore sanguis ad fluorem iterum disponitur: item sperma ceti ad ʒj. cum castoreo in cerevisia calida optimo jure exhibetur, & ægra ad blandum sudorem se componat; experimentum namque hoc est Timæi von Guldensee in *Casibus libr. 2. Cas. 7. pag. 91.* vel commodè potest usurpari *Θ* quoddam fixum, *Θ* artemisiæ aut sabinae, &c. In specie addantur remedia ex croco & cinnamomo. In tali casu interdum supervenit gravissimus uteri dolor, ex sanguine coagulato ibidem hærente, ubi inter alia convenit decoctum chamæmeli: externè imponere jubeo regioni pubis magma decocti in forma cataplasmati, quàm calidè fieri potest ad imitationem Timæi von Guldensee in *Cas. pag. 202.* Cum his necesse est, ut in graviore malo secetur vena in pede, quia actu fluentes menses fuerunt restricti.

Quod si ex graviore animi affectu, v. g. terrore subitaneo, iracundia, vel simili menses actu fluentes restinguantur, revocantur secundo venam in pede, hinc propinando internè spiritum salis Ammoniaci bis vel ter in die. Forestus *lib. 28. Obs. 2.* in tali casu non inconsultò usurpat decoctum florum chamomillæ ad ʒiij. cui addit oxymel. simpl. ʒj. l. ij. & propinat. His exhaustis, sudor secutus; unde menses à terrore restricti denuò fluxerunt. Loco hujus similiter myrrha & castoreum cum salibus quibusdam volatilibus oleosis, aliisque quibusdam appropriatis aromaticis, quietem & blandum sudorem simul imperando, in *∇* cinnamomi usurpari possunt.

Hæc remedia interdum conveniunt itidem in paucitate mensium, Hæferus *Herc. Med.*

in animi affectibus gravioribus extractis menses cientibus laudanum opiatum jungit, unde sopiuntur adjuncta symptomata, ut menses denuò fluant.

Hisce internis etiam adjungenda sunt simul externa, mensium fluxum promoventia, qualia sunt imprimis totus, balnea, infusus & semicupia, item, pediluvia crebrius instituta, quæ præmissâ in brachio venæ sectione, quando menses erumpere debent, instituantur parata vel ex simplicia aqua, vel ex emollientibus vulgaribus, & appropriatis aromaticis, v. gr. sabina, matricaria, artemisia, calamintha, pulegio, lauro, & similibus parata, vid. Gabelchoverus *Cent. 4. p. 214. item Horstius Observat. pag. 264 & 265.*

Post infusum inungantur partes circa lumbos, inguina & regionem hypogastricam unguento appropriato:

Pertinent huc thermæ, quarum infusus diuturnus menses solet levare & curare. Helvetius ad menses pellendos commendat, si immittantur pedes in secundinam calidam recentem extractam. Conveniunt quoque inunctiones externæ, circa regionem iliacam & pubis illinendæ, quæ fiunt ex oleo cheirino, laurino, irino; diacolocynthidos; &c. quæ acuuntur cum *℞* destillato sabinae, spicæ, lavendulæ, baecarum lauri, petroleo & similibus. Odorem fermenti quidam hic commendant. Odorem moschi menses promovere probabiliter admodum refert Bartholinus *Centur. 2. Histor. 87.* Suffitus etiam per siphonem & infundibulum excepti ad imitationem Timæi von Guldensee in *Casibus* ex colocynthide solâ per medium dissectâ, eâque in aqua simplici decoctâ, insigniter conducunt: subinde hoc decocto silices candefacti injiciuntur. Item fiant trochisci pro fumo appropriati, v. g. ex zinzibere, sabina, colocynthide, myrrha, & similibus, vel seq. egregii:

*℞. fol. sabinae Mß.*

*myrrh. ʒi. l. ʒij.*

*ligni aloës ʒj.*

*troch. alband. ʒij. ad ʒj.*

*M. f. pulvis grossius: S.*

**Eröffnend Räucher-Pulver.**

Injiciatur carbonibus ignitis, ut ita excitetur suffitus utero excipiendus.

Vel ex his pulverisatis c. balsamo *†*isterebinthinato & *†*o fiant trochisci, qui injiciantur carbonibus, & excitetur fumus.

Facit huc suffitus de sabina Mynsichti, &c. Omnium optimus fumus fit ex decocto scoriarum reguli ʒii: nempe

*℞. scor. reguli ʒii q. s.*

*l. lvanur in*

*∇ simpl. l. secundum alios in lixivio acris:*

*℞. solutionis hujus p. jv.  
vini malvat part. j.*

Hujus

Hujus mixturæ unum, 2. vel 3. cochlearia injiciuntur silicibus candentibus, & inde elevatus fumus nudo corpore excipitur, præsertim in mulieribus, quibus infundibulum pro suscipiendo hoc foku submittere possumus. Mirabiliter ciet menses, & pro certissimo remedio habuit B. D. Michaëlis, & ab Hartmanno, Petrazo, Agricola, Corbazo, multisque aliis laudatur Practicis. Si verò metuatur, ne præ nimio motu excitato sanguis non inveniat viam, venæsectio excitanda. Nec minus efficax est suffitus similis paratus ex scorris ignitis; vel limaturâ Martis candelata, cum urina, imprimis antiqua & foetida, irroratis; vid. Glauberus *de Furnis Philosoph.* cap. 86. Veteres ulterius exhibuerunt pessos, quos inter non inutilis est pessus factus est felle tauri, mixto cum succo Mercurialis, in quo cocta sit colocynthis: Hæc invicem mista dant pessum satis potentem, qui quatenus irritat parietes vaginæ uterinæ; hoc ipso stimulat, ut eò melius excernantur menses.

Item allium, ejusque capita cum oleo spicæ trita, in sacculum indita, tanquam pessus commodè applicantur. Extractum hellebori nigri cum melle exceptum sub forma pessi, qui syndone obducitur, & ita applicatur. Item hellebori pulvis à ℥ss. ad ℥j. nodulo inclusus, & vaginæ uteri intrusus: Laudatur imprimis ab Angelo Sala *in ejus Scriptis*.

Aut denique pessus ex ℥ss. croci post balneum applicatus est egregius. Sed horum usus solet esse rarus, & quia virginibus non æquè conveniunt, propterea loco horum applausum meretur instrumentum Glauberi ligneum, omnibus satis notum, quod est instar pollicis longum & crassum, in superiore parte est capitulum foraminibus pertusum, mediante quo spiritus urinæ concentratus, aut ☉❖ci bombace exceptus, vel ☉ volatile ☉is Ammoniaci, aut mixtura ex calce viva cum sale Ammoniaci, irroratis cum spiritu vini, vel alia salia volatilia, derivantur in genitalia mulierum; sic enim particulae exhalantes, irritando parietes vaginæ uterinæ, menses provocant: Potentius operatur, si phiola vitrea dictæ mixturæ q. s. repleta, carbonibus candentibus applicetur, sicque utero excipiat. Interdum in malo magis obstinato ad cantharides internè & externè accedendum; vid. Velschius *Hecet. 2. pag. 13.*

## CAPUT II.

De

### *Mensium Fluxu Nimio.*

**C**ontrarium mensium suppressioni vitium est, si nimis superflue fluant: ad quod pertinet, quando frequenter fluunt, id est quantum. 11.

do non expectant tempus menstruum, sed omnibus duabus vel tribus septimanis redeunt: Hic tunc venit curandus, quando debilitat mulieres.

#### C A U S Æ.

Antequam ad causarum fluxus nimii evolutionem accedamus, tria imprimis observanda sunt circa mulieres nimio fluxui obnoxias:

1. In omnibus nimio ac diuturno fluxu laborantibus stomachi robur enervatū, cum appetitu dejecto, carnisque plus minus nausea, observatur: ac raram est, appetitum sibi constare in ejusmodi mulieribus.
2. Observatur in talibus ut plurimum dolor in dorso circa lumbos tensivus & lancinans, continuo vexans, adeo, ut non raro putent, se nephritico obnoxias esse affectui. Nempe acidum est vitiosum, qui & nerveas circa lumbos vexat partes, & irritando simul uterum, excretionem per hæc loca stimulat, hujusque vasculorum ora plus minus aperit.
3. Scorbuticæ volatili acido imprægnatæ, aut his cognatæ, ferè obnoxias sunt huic fluxui, unde & fluidiore faciei colore in juventute, & ætate consistente præditæ, tactu molles, & habitu quasi aquoso tali affectui magis obnoxias.

His præmissis, causæ nimii fluxus sunt eadem, quæ reliquarum hæmorrhagiarum. Speciatim investigandæ sunt vel in utero, vel primario & frequentius in ipso sanguine: In utero hæret vitium, vel ex atonia uteri ejusque fibrarum, vasa eorumque orificia non debite firmantium; vel ex irritatione ipsarum partium in & circa uterum, unde spasmodica vasorum contractura supervenit, ut, refluxu per venas impedito, sanguis per arterias impulsus, quâ data porta, ruat; vel si uterus violentiâ quadam externâ fuerit læsus, aut vasa sint rupta; aut etiam in abortu, ubi p. n. separatur secundina, vasis multum dilatatis cum non levi uteridolore, unde copiosus fluxus; aut à partu laborioso; aut refrigeratione manuum & pedum à partu aut abortu; item apertura nimia osculorum vasorum ex distensione & quasi dilatatione; aut applicatione acriû eadem sint erosa, qualia sunt pessi acriores, in specie ex helleboro nigro: aut deniq; si ex motu inordinato corporis, in specie ex sternutatione nimia, ex nimio vomitu, aut laboribus, similibusq; aliis causis, quæ mensium fluxu laborantibus & actu fluentibus accidunt, à sanguinis impetu quasi disrupta aut aperta nimis fuerint vasa, & propterea sequatur nimia sanguinis hæmorrhagia: Sic namque refert Forestus *in lib. 2 8. obs. 16.* Mensium profluvium nimium ex uteri venis perruptis ex gravi pondere

(Ccc ccc)



dere sublato: Sic Hildanus *Cent. 3. obs. 58.* observat profluvium mensium gravissimum & periculosissimum, provocatum ex violenta & immoderata sternutatione. Speciatim aliquid præternaturale in utero hærens, vel sanguis grumofus, vel mola, aut foetus abortivus, vel pars secundinæ retenta, vel simile quid, &c. uteri hæmorrhagiam excitat; de quibus & similibus causis Forestus *lib. 28. observat. 11. & sequ.* videatur.

Frequentissima ergo causa hujus fluxus est in sanguine, qui tribus modis peccare solet:

Prima est, quia abundat, sed hoc rarissimè; nam cum ordinario fluxu vix plethora sanguinis conjuncta esse potest: ut taceam sanguinem abundantem per menses excretū potius levare vires suppressas, quàm easdem debilitare, unde non nimius, sed potius saltem sufficiens, hac occasione oritur fluxus: potius ergo peccat orgasmo Venereo, aliâve fermentatione auctâ & turgescencia nimia, ratione cujus tenuior fluxiliorque evadit, nimis cietur: unde immodicè turgescens uberius etiam per uteri vasa perrumpit. Hoc vulgò dicitur de sanguine bilioso; sicut & nimium coëundi desiderium in juvenili ætate in quibusdam, quæ à Venere abstinere, subindè sanguinem impetuosius effervescentem & erumpentem, hinc fluxum uteri nimium, intert. Pertinet huc aër calidior, exercitatio corporis insignior, gaudium, ira, potus generosi, aromaticorum, in specie crocatorum abusus, & omnia, quæ sanguinem nimis movere, & fermentationem ejus augere valent, &c.

Secunda eaque creberrima causa est sanguis serofus nimis, aquosus & tenuis, ac fluxilis. Nā imprimis mulieres habitus succulentioris, simul tamen serofi, obnoxie sunt huic uterino profluvio, unde etiam sanguis, quem excernunt tunc, ut plurimum est tenuior, fluidior, & qui minùs in grumos concreescere solet, nisi forsan intra vaginam diutius hæreat, qui facillimè vasorum ora aperit, & sic effluens subindè instar loturæ carniū similis esse solet. Fundamentum ferè est in stomacho, qui copioso potu, simulq; variâ & ineptâ diætâ onustus, minùs commodè alimenta digerit, sed nimis colliquefcere cogit, & in chylum nimis serofum transmutat, unde sanguis etiam serofus redditur: Hinc etiam Barbette *in sua Praxi pag. 91.* in nimio mensium fluxu primariò stomachum, & hinc renes affici, ceu radices & fomites mali asserit: Ille, non ritè chylum elaborando, sed aquosiorē gignendo: Hi, postmodum minùs evacuando laticem aquosum superfluum.

Tertia denique causa est serum massæ sanguinæ acrius, aut acido-salsius, undè quædam scorbuticæ per uterum solent purgari. Uno nomine: ut plurimum junctum est acidum sui generis, quod irritando partes membranaceas

ac sensibiles circa lumbos & uterum, hujus fluoris causa existit. Id quod manifestum est ex eo, quod præter dolores circa lumbos lancinantes, in talibus interdum ante aut post menstruationem sanies serota adeò acris paulatim effluit, ut etiam hinc erodantur plus minus genitalia. Disponunt ad hoc edulia acria copiosè assumpta: ut nihil dicam de acrimonia succorum in primis viis.

#### DIAGNOSIS.

Malum ipsum manifestatur ab ægris: supervenit vitium debilitas & membrorum languor. Nimium enim est illud, quod excedit, vel quantitatem, vel qualitatem, vel durationem solitam: Quantitas verò, ut ante à monui, in scæpinis non est incerta, nec semper adeò determinata.

Saltim causarum signa probè attendenda, quæ partim antecedentia, partim ipse sanguis, qui effluit suggerunt. Uteri lationes, cum manifestis dependeant ex causis, per se patent. Considerandus ergo sanguis est, qui excernitur: nam sanguinem ex nimia apertione vasorum, vel nimio orgasmo & turgescencia fermentativa effluere, constat ex phlogosis, genis rubentibus, venis turgidis, pulsū magno, celeri & frequenti, & quæ sunt similia signa sanguinis orgasmi: Qui effluit sanguis, solet esse floridus, naturaliter constitutus, facile grumescit, obscurioris nonnihil est coloris, &c. Uno nomine: signa adsunt sanguinis boni. Si sanguis aquosus sit fomes mali, tunc ipsa excretio & excreti conditio hoc monstrat: Qui enim effluit, est tenuis, nec adeò intensè coloratus: dilutus nempe color est, lintea, quibus capiuntur hæc catamēnia, multum tingens, sed non adeò concreescens.

Interdum etiam loturæ carniū similis effluit, vel etiam, si sanguis linteo exceptus ita appareat, ut lintheum habeat circulū pallidum, monstrat sanguinis serositatem. Accedunt alia signa, talem sanguinis statum confirmantia, ut pedum aliqualis tumor, facies subtumida, habitus corporis mollior & crassior, &c.

Quod si acrimonia feri aut sanguinis malum induxerint, dolor plus minùs rodens, morsicans, pruriginosus & genitalia vellicans, cum conatu quodam ejiciendi, simul percipi solet.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: molestum non saltem mulieribus, sed etiam periculosum malum est nimia menstruatio: Eadem enim mala, quæ aliàs insequuntur hæmorrhagias nimias, etiam nimium mensium fluorem insequuntur, cum præter virium debilitatem, digestionis primæ defectus, cachexia, pedum tumor œdematosus, ipse hydrops, item fluor albus, ut plurimum supervenit.

Quò autem diuturnior est fluxus, eò difficilius curatur: Observatū enim fuit à Lindano, quod

quod interdum ad triennium continuò duraverit.

In senescente muliere superveniens nimia menstruatō plerumque incurabilis est, & ad mortem eam comitatur.

C U R A.

His ita præmissis consideranda est cura, in qua fluxus sistendus est, observando tamen, ne fiat hoc subito nimis, aut uno quasi impetu, præprimis si aliquandiu suppressus fuerit, aut parçè prodierit; potissimum in plethoricis, & si crisis subfuerit. Nam plethoricæ habitiores, quando sine debilitate fluxum hunc perferunt, relinquendæ sunt, quia aliàs mille & gravia nocumenta infert subito restrictus fluxus, vid. M. A. N. C. *Ann.* 2. *obs.* 26. p. 47. nempe uteri inflammationem; vel si in alium locum sanguis derivatur, ut in pulmones, dyspnoeam, choleram, dolores abdominis, &c. quin potius, si debilitas, syncope, aut convulsiones superveniant, demum curandus venit, ubi causarum remotarum vis infringenda, & ita fluxus sistendus: vid. Merceus *de Ind. Med.* c. 3. & Sylvius *Pr.* l. 3. c. 3. Adeoque in cura causarum imprimis habeatur respectus, hinc

1. Opera danda est, ut sanguis vel immineatur inediâ, laboribus, sanguinis, detractio; vel alteretur absinthio, rha-barbaro; vel fervor & turgescencia ejus nimia compescatur, & plantagine, portulacâ, & blandis acidis coërceatur.

2. Ejus fluiditas inspissanda incrassantibus, & serositates acres Martialibus & absorbentibus dictis corrigendæ & temperandæ.

3. Atonia & vasa ejus nimis laxa coarctanda, l. laxa consolidanda, & adstringentibus, imprimis Martialib<sup>9</sup>, firmanda.

Ad hos scopos assequendos observandum:

I. Ne subito nimis, qui aliquandiu jam duravit, supprimatur fluxus, sed potius successivè; adeò omnis subita suppressio periculosa esse solet: Conf. M. A. N. C. *Ann.* 2. *loco allegato.*

II. Diæta probè observanda, & ordinanda, quæ consistit in potu calido, quiete corporis & animi perquam necessaria, extremorum fotu calido, vitando æm frigidum, & vinum; hujus enim usu ordinariò exasperatur insigniter fluxus.

III. Quoad purgantia: laudantur ab his, culpantur ab illis. Lindanus sanè ab his abstinendum esse ait. Interim tamen cum distinctione hoc accipiendum: Conveniunt nempe purgantia in subjectis serosioribus, ut ita serum nimium evacuetur, & ita subtracto sanguinem diluente latice, hic spissior redditus minùs effluat: deinde commodius ad præcavendum, antequam ille fluor super-

Tom. II.

veniat, non in ipso fluxu, adhibentur, cum, si in ipso fluxu propinentur, purgantia quæcunq; mensium fluxum potius stimulent & promoveant. Aut ergò penitus omittenda, aut, ubi iisdem utendum est, lenia sunt usurpanda, & quæ adstrictionem aliquam post se relinquunt; quæ inter eminet rha-barbarum, etiam à Barbette laudatum; quod in talibus casibus vi alterativâ plus juvat, quàm laxativa noceret, & myrobalani: vid. Sennertus *Prax.* l. 4. P. 2. S. 2. c. 6. Et quidem rha-barbarum propinatur ad ʒj. c. conserva rosarum mixtum, vel cum syrupo cydoniorum aromatizzato, seu simplici.

In ipso fluxu etiam nimio singulis septimanis bis rha-barbarum usurpari potest à ʒʒ. ad ʒij. vel solum vel cum nuce moschata, manè in vehiculo calido.

IV. Venæsectionem in brachio sunt, qui suadent, ut repellatur sanguis ad loca superiora, sed quocunque in loco instituat, pessimo adhibetur consilio. Quid enim opus est sanguinem ex nimio fluxu deficientem ulterius imminuere? potius removeantur causæ fluxum stimulant, & ipse cessabit fluxus. Stultum remedium venæsectionem vocat Lindanus, quod potius plus promoveat fluxum, quàm prohibeat. Ego, dicit, *plures tales absque venæsectione curavi; doctus enim, à venæsectione fluxum fieri vehementiorem. Neque etiam laudo cucurbitulas; licet enim aliquid agant applicata, tamen, quando attrahere cessant, rursus procedit fluxus.* Solent enim aliàs Præctici cucurbitulas nunc dorso, nunc etiam mammis applicare, secundum Hippocratem, S. 5. *Aphor.* 50. Has tamen novicas esse, etiam putat Barbette in *Praxi.*

V. Quin præstat, si in statu sanguinis serosi evacuatio quædam instituenda, loco purgantium aut venæsectionis persudores & diuresin eandem instituere, ut ita textura sanguinis alteretur, & etiam serosum vehiculum unâ cum acrioribus salibus nonnihil subtrahatur, unde reliqua massa sanguinea necessariò crassior ac spissior fieri debet. Et utur sub ipsa sudatione fluidior reddita massa sanguinea uberius per uterum excerni videatur, post peractam tamen sudationem, dum serum fuit evacuatum, & sanguis spissior factus, fluxus uterin<sup>9</sup> postmodum cessat. Idè est cū diureticis.

VI. Opiata in paroxysmo præcavendo & curando multum profunt, cum & spirituum impetum sistendo, & irritationem circa partes uterinas sufflaminando, notabiliter fluxum impedian. Habeatur tamen ratio in eorum usu virium, ne viribus nimis exhaustis copiosius usurpentur opiata.

Remedia ergò, quæ contra fluxum mensium nimium sunt in usu, sunt maximam partem vel absorbentia aut temperantia ratione sanguinis; vel adstringentia ratione uteri.

(Cccccc 2)

Sanè

Sanè vix reperitur hic fluxus nimius, nisi ut plurimum simul subit acidum sui generis eundem stimulans. In genere ergò, quæ aliàs ad hæmorrhagias sunt commendata remedia, etiam hîc habent suum locum: Et quidem, ubi æstus ac orgasmus sanguinis est nimius; & seu spiritus Oli in  $\nabla$  plantaginis propinatus; & subindè libatus sanguinem sistit, idque imprimis, ubi calor & ardor simul affuerint. Quando minor adest æstus, solum  $\odot$  præparatum, aut ex ipso paratus lapis prunellæ, sufficere possunt: quin & tunc alia blanda acida adstringentia Corallinis, cydoniatis, ac similibus mista, utiliter usurpantur, v. g. succus & syrupus granatorum, succus berberum cum coralliis præparatis, cum syrupo coralliorum Quercetani, ac similibus. In specie tamen appropriata sanguinem in-  
crassantia & adstringentia, & fluiditatem corrigentia, sunt plantago, succus plantaginis: Sic experimento Solenandri ex succo plantag.  $\text{3iv}$ . colophon.  $\text{3j}$ . exhibito, nimium menstruorum fluxum curatum, observavit Schlegelius: vid. Velschius *Mischom. Cent. I. obs. 43. annexis Ann. 4. & 5.* M. A. N. C. sicut etiam idem succus extrinsecus in vaginam uteri injectus, vasa adstringit; vid. Forestus: aut etiam mixtura ex pauco aceto & bolo Armena, simul etiam vulgari, externè imposita lumbis, & regioni hypogastricæ, aut genitalibus, aut utero, injecta, insigniter sistit fluxum. Post plantaginem est portulaca, item bursa pastoris, urtica major, millefolium flore albo, & imprimis horû succi, item muscus prunorum sylvestrium, & muscus quercinus ad  $\text{3j}$ . in ovo forbili mixtus, si non primâ vice, certè secundâ vel tertiâ vice, juvat. Porro singularis est *Lyfimachia* flore purpureo: item symphytum majus, ejusque radix, radix bistortæ, imprimis acori palustris, & ex eodem paratus syrupus adstringens Langii: sic etiâ nux moschata, cortices aurantiorum acidorum, eorumq; decoctum, item cortices radicis mori, cortices granatorum. De floribus balaustrorum res nota est. Semen papaveris & hyoscyami modò dictis convenienter additur, unde pulvis ex semine hyoscyami Plateri, achuic valdè similis Heurnii, conveniunt. Pyra, sorba, cydonia, mespila, & similia adstringentia, sunt nota. De semine argentinæ, vid. Burgois *Hebammen-Buch T. 4. c. 7.* Lignum lentiscinum, & ex eodem paratum decoctum, experimentum est Fonsæ. Ex hoc ligno lentiscino desumpta mastiche etiam egregiæ est virtutis, undè pro potu ordinario decoctum mastichis in vino austero usurpandum venit. Alii viscum quercinum ad  $\text{3j}$ . in ovo forbili propinant.

Ut plurimum tamen ad serum sanguinis, vel copiosius vel aquosius respiciendum erit: pro quo scopo remedia inter eminet Mars & Martialia quæcunque, siue sint aperientia, siue sint

adstringentia, imprimis ubi cachexia imminet; hinc excellit hîc liquor Martis solatis. Unde juxta hæc *R. O. is adstringens*, vel *R. O. is Oli*, vel *R. antiphthitica*, sunt optima: Pertinent huc alia subiecta Martialia, ut lapis hæmatites præparatus, in succo granatorum vel cydoniorum sumptus, *R. lapidis hæmatitis*, item liquor stypticus ex  $\text{O. i}$  ali, quæ in fodinis Martis reperitur, cum spiritu vitrioli paratus, & similia alia Martialia adstringentia. Præter dicta inter simplicia sunt adhuc corallia pulverisata vel præparata, *R. eorû cum*  $\text{li}$  lignorû parata, & alia ex coralliis parari possunt: Nam Poterius in *Cent. 3. cap. 43. & 95.* curavit immodicum, & inordinatû mensium fluorem, aliis irritis, essentiâ Martis adstringente ac *R. coralliorum*. Bolus item Armena, terra sigillata cum spiritu vitrioli irrorata, uti etiam medulla saxorum, egregia sunt remedia; Præter Martialia aliaque conveniunt in specietalia, quæ adhuc serositatem absorbent, acrimoniam temperant, & partes laxatas vi stypticâ firmant: qualia sunt succinum album, trochisci de carabæ à  $\text{3ss}$ . ad  $\text{3j}$ . de terra sigillata, os sepiæ præparatum, sanguis draconis. Pro vehiculo talium inservit aqua ad hæmorrhagiam uteri Mynsichti, tenellorum C. C. spermatis ranarum;  $\nabla$ , succus & syrupus plantaginis, portulacæ, millefolii, urticæ majoris; item syrupus granatorum, coralliorum Quercetani, papaveris, & similia.

Juxta hæc ex regno animali, sicuti alias hæmorrhagias, ita in specie uterinas, sistunt stercora: quæ inter primatû obtinet asininum, & hinc sultum, siue pulvis, siue ex iisdem exprimatur succus, qui cum tantundem syrupi myrtillorum miscetur & diluitur cum aqua plantaginis.

Vel ex hoc stercore asinino vino infuso, addito saccharo, fiat syrupus. Imò stercus caninum album pulverisatum, vel per se, vel cum aliis propinatum, nobile est remedium. Novi mulierem jam vetulam, quæ adhuc in media ætate seu flore ætatis aliquando desperatâ uteri hæmorrhagiâ laborabat, quæ aliis omnibus irritis, arrepto stercore canino ex platea, pulverisato, & vino acidulo propinato, sublevata & sic curata fuit: Sic jam dimidiis annus est, cum experimenti gratiâ mulieri rusticæ, graviter hoc malo afflictæ, svasi stercus caninû, quò assumptô, subito convaleuit. Aderant verò adhuc tormina, forsan ex grumis sanguinis adhuc resistentibus, quæ propinatâ *R. bezoardicâ* mediante blando sudore spontè sedabantur. Aliàs etiâ usnea cranii humani ad  $\text{3j}$ . intensius usurpata, aliis nihil juvantibus, multoties à D. Michaëlis experta fuit; vitellum ovi in vino rubro dissolutum, ac sæpius repetitum, experimentum est Hartmanni, quod dicit ex Amato Lusitano *Centur. 4. Cur. 12.* Conveniunt ulterius ossa & cornua animalium calcinata,



nata, C. C. uftum, cortices ovorum ufti, item rafura cranii humani pulverifata, &c. quæ ad ʒj. ſubindè aſumpta, etiam egregiè condu- cunt. Rafura dentis hippopotami in ∇ ſanguis- ſorbæ aſumpta ab Hœchſtedtero *Decad.* 4. *Caf.* 2. inſigniter laudatur. Quidam ſimiliter ulurpant ſperniolam Crollii, quæ tamen pro- pter myrrham & crocum minùs commodè applicari poteſt. Pulvis turturis certo modo præparatus eſt experimentum Foreſti, *libr.* 28. *Obſerv.* 10. & quod poſtmodum in uſu com- probavit Lindanus: Quin & eſſentia mumiz, aut ipſa mumia quantitate avellanæ in vino ru- bro, aut in ∇ plantaginis vitriolata aſumpta, cuidam in ſecretis fuit.

Cum his ex opio parata anodina nunquam omittenda ſunt ad ſanguinis excretionem ſi- ſtendam: quæ inter excellit laudanum opia- tum, theriaca, trochiſci de carabe, electuarium diaſcordii Fracaſtorii, cum vehiculo acido aſ- ſumpta: Nam ſi oritur fluxus ex nimia turge- ſcentia, eundem ſimpliciter ſiſtit ~ Oli in ∇ plantaginis: Sic pilulæ Poterii ex laudano o- piato paratz inſigniter profunt: Refert nam- que Poterius *Cent.* 3. c. 49. ſe aliquando con- tinuum ſanguinis ex utero fluxum duobus an- nis perdurantem curaffe per ☿ Martis & pilu- las laudinas, cùm jam cachexia & leucophleg- matia immineret. ☿ ʒii Tacchenii vi anodina hæmorrhagias uteri ſiſtit.

Denique alumen & aluminis uſus etiam ſunt experta remedia: alumen enim crudum à ʒʒ ad ʒj vel ʒʒ quotidie aſſumptum, vel per ſe, vel cum aliis, remedium ſummum eſt Zwelferi. Undè etiam à quibusdam balneum aquæ, in qua alumen pulverifatam decoctum, ceu infallibile experimentum com- mendatur.

Ex his multæ fieri poſſunt formulæ: e. gr. Lindanus ſequenti pulvere compoſito quam- plures reſtituit, ſpeciatiim dum ex nimia ſeroſi- tate ſanguinis malum ortum traxerit:

ʒx. Corall. r. prap.  
ſuccini flav.  
bol. Armen.  
ſangu. dracon. à ʒij.  
ſem. plantag.  
borrac. calcin. à ʒj.  
laud. opiat. gr. jv. l. vj.  
extr. croci Hartmanni ʒj.  
M. ſub forma pulveris.

Pulvere hoc ipſe innumeras mulieres, men- ſium nimio fluxu laborantes, reſtituiſſe dicit. Uſus eſt ter in die, manè, ante prandium, & ante cœnam ad ʒj. Vel c. ſ. q. ſyrupi de roſis ſiccis ſ. electuarium, cujus doſis nucis caſta- næ magnitudo. Sic ego ad imitationem hu- jus pulveris aliquando mulieri corpulentæ, ſed ſanguine ſeroſiore turgidæ & ſcorbuticæ, poſt abortum aliquo temporis ſpatio interjecto ſubinde in enormem uteri hæmorrhagiam re-

labenti, aliis ſerè fruſtraneis cum ſucceſſu præſcripti hoc electuarium:

ʒx. Conf. roſ. antiqu. ʒvj.  
diacydon. ſ. ſpec. ʒiij.  
corall. rubr. prap.  
off. hum. calc. prap.  
trochiſc. de carabe à ʒj.  
alum. crudi  
ſem. plantag. à ʒij.  
laud. op. gr. iij. l. iv. l. vj.

Cum ſyrupo corall. vel de roſis ſiccis q. ſ. ſ.  
electuarium.

Quod ipſum in principio propter alumen aliquo- liter turgeſcit, tanquam fermentans, ſed mox ſponte deſinit. Hoc ter in die magnitu- dine juglandis capiendum, & hauſtulus vini ſuperbibendus.

Juxta quæ ſubindè tamen etiam quædam externa, fluxum menſium nimium compe- ſcentia, & collo appendenda, & circa uterum applicanda ſunt. Jaſpidem collo appenden- dum, ſunt, qui laudant. Ego verò commendo buſonem violenter interemptum, exſiccatum, vel oſſa ejus collo aut ſub axillis appenſa, & ſic geſtata: Alii buſones vivos contuſos, aut etiam exſiccatos circa os ſacrum applicant, non abs- que ſucceſſu. Mindererus in *Medicina militari* producit nodulum appendendum, in quo ra- na viridis lentè exſiccata fuit. Peſſi ex ſtercore aſinino & ſuillò cum ſucco plantaginis, & mu- cilagine ſeminis cydoniorum formati, ſyndone excepti & applicati potenter ſiſtunt hos fluores: vel ex ſimo porcino fiat peſſus ad imitationem Cnæſelii *M.A.N.C. Ann.* 6. & 7. *App. pag.* 143. loco quorum clyſteres uterini ex ſimplicium adſtringentium decocto, vel ex eorum ſuccis, addito alumine; vel ex ſucco ac decocto ſtercoris aſinini c. ∇ appro- priata, vel injectiones ex ſucco plantaginis, vel ſolo, vel dicto ſtercore imprægnatz ſunt egre- giæ: e. gr.

ʒx. fol. querc. M. j.  
rad. torment. ʒvj.  
gall. contuſ. ʒʒ.  
ſtercor. aſinini ʒiʒ. l. hujus & ſterc.  
ſuill. à ʒvj.

Coqu. in ſ. q. ∇ ſimpl. ad ʒviiij. l. ix. Colatura  
D. S.

Anhaltende Einſprükung.

Pro doſi ʒij. iij. ad ʒjv.

Injiciantur per Metrenchiten.

Si ſimul dolor vehemens adſit, & ardor in vagina uterina, commodè etiam folia hyoſcy- ami & papaveris ſemen adſtringentibus deco- quendis poſſunt addi.

Cingulum ex helleborafiro, ſeu ex hellebo- ro albo, cujus folia ſunt inſtar plantaginis, ſed majora, experimentum eſt Hartmanni in *Præ- xi cap.* 220. §. 12. quò etiam felici cum ſuc- ceſſu utus fuit Lindanus in puerpera, cui ſtui-

(Ccccc 3) tarunt

tarunt nimis lochia: sed æstate tantum possunt haberi hæc folia recentia; unde in horum defectu potest substitui cingulum ex bursa pastoris & millefolio, quod lumbis circumdari potest: Hisce ferè præferrem polygonum seu centumnodium, quod intra duos lapides contritum, sub axillis, circa lumbos, item in regione pubis, commodè applicari potest. Panatollus in *Fascic. Arcanorum* pag. 414. pro cura magnetica ad fluorem sistendum commendat linteum sanguine fluente imbutum, & sub cineribus calidis positum, cujus fumus utero inspiretur & excipiat: Hoc succedit, ubi est ab æstu & turgescencia sanguinis: sed ubi est à nimia sanguinis fluiditate, frustra adhibetur. De pulvere sympathetico res nota est, quod etiam hunc fluxum soleat sistere. Affirmavit mihi hujus efficaciam quidam amicus, scilicet recepit hujus pulveris pug. j. quem dissolvit in ∇ tepida: solutioni immisit linteum, sanguine fluente recente tinctum. Et hoc ipsum prodest non tantum in vulgari hæmorrhagia uteri nimia, sed etiam, si eadem post abortum sequatur. Aliud experimentum refert Helvetius in *Diribitorio Med.* pag. 117. quod nempe menses sistat, si mulier tali fluxu laborans induat indusium per octiduum à viro gestatum: sed metuendum, dicit, ne exinde in tantum supprimantur menses, ut nunquam amplius imposterum fluant.

Cataplasmata ex gypso, vel terra cimelia, cum aceto irrorata, spinæ dorsū prope lumbos applicandum: vid. Timæus von Guldensee/ lib. 4. Cas. 29. & M. A. N. C. Ann. 6. & 7. app. pag. 142. Spongia marina in +o simpl. aut rosaceo, vel solo, vel cum vino rubro permixta, bulliat, imprægnetur, & supra pubem aut genitalia applicetur: Conf. Riverius *Centur.* 4. *Observ.* 86. Vel sperniola Crollii in ∇ spermatis ranarum dissoluta, cum spongiis vel linteis duplicatis admoveatur vulvæ. Item

℞. rubr. fabril.  
hamatis.

☞ Oli dulc.

bolis rubri à part. æqu.

Pulverisata misc. c. f. q. album. ovor. & +i in consistentiam cataplasmatum, abdomini, in specie regioni pubis applicandi.

D. S.

Anhaltender Umschlag.

Succus plantaginis etiam, vel ipsa plantago contusa, & cum aceto irrorata, manibus applicari debet. Id quod etiam fit, ubi aqua spermatis ranarum cum aceto permixta cum linteis aut spongia applicatur mammis: optimum est sperma ranarum recens collectum, non destillatum, sed methodo Zvvelfferiana per saccum transcolatum, & cum alumine conservatum, cum linteis duplicatis vel spongia frigidè, aut saltem tepidè, regioni pubis &

uteri aut lumbis, aut regioni ossis sacri, vel cum spongia vulvæ, applicetur, sæpius repetendo: cui parum aceti rosacei potest addi, e. gr.

℞. sperm. ranar. meth. Zvvelff asserv. 3iv.  
+i rosac. 3iB.

M. & in forma epithematis dicto modo applica. Si hoc non sufficeret:

℞. Oli ad albed. blandè calcin. q. v.

sperm. ranar. non destillat. q. f. pro incorporatione ad pultis mollioris formam.

Quæ mixtura cum panno crasso vel linteo triplicato aut quadruplicato dorso & lumbis versus & ad umbilicum usque applicanda.

De succo sempervivi, cum Mo & aceto, mammis applicato, vid. suprâ, ubi de phrenitide. Sacculus itidem ex stercore asinino in aceto calido immersus vel decoctus regioni pubis vel vulvæ applicatus est egregius. Chelidonium majus, aut plantago cum aceto contusa, pubi imponentur, item mammis. Unguenta sunt v. gr. Comitissæ, quæ applicantur ossi sacro vel spinæ dorsū. Sed verum ut fatear, hæc ipsa parum aut nihil juvant. Salviæ succus cum farina triticea extra pubi tanquam cataplasmata applicatus etiam compescit adstringendo hunc fluxum. Præterea suffitus ex thure, mastiche, ladano, vel vapor aceti, super scorias Martis ignitas effusi, exceptus genitalibus compescit nimium mensium fluxum: Nihil æquè etiam menses sistere dicitur, quam fumus seminis sinapi, vel salviæ herbæ, per infundibulum exceptus. Denique in malo chronico præmissis præmittendis usus externus thermarum naturalium est egregius. Fotus ex decocto aluminis pulverisati, vel solitario, vel addito centumnodio, radice bistortæ, aut similibus, cum linteis multiplicatis aut spongiis applicatis, regioni pubis quibusdam convenit.

## CAPUT III.

De

### Mensium Fluxu Depravato.

Tertium in menstruo fluxu occurrens vitium est, quando hic vitiosè seu depravate, & variis comitatus symptomatibus procedit, ad quod ipsum caput quamplurima accidentia & vitia pertinent.

## ARTICULUS I.

De

### Mensium Difficultate.

Utrum quidem citra ullum gravius symptoma seu accidens menses naturaliter fluant,

ant, sit tamen in quibusdam, imprimis corporis impurioris & cacochemici, ut eadem circa mensium tempus uno alterove die ante mensium proventum, aut etiam dum actu erumpere incipiunt, capitis dolores, ventriculi morfus ac dolores admodum gravativos, pulsatorios & tensivos in lumbis percipiant, qui subinde ad pubem usque se extendunt. Præterea non raro dolores atrocissimi, tanquam colici, abdomen excruciant, & variè scemellas torquent; qui dolores ab umbilico, abdomen vagè percurrentes ad genitalia continuantur, & hinc ad posteriora, ad lumbos, reflectuntur, & similes sunt doloribus parturientium. Ulterius imminentes quasi suffocationes, aut saltem insignes angustias in præcordiis, item cordis palpitationes, respirationes anhelas, ac similia pathemata perferunt, imprimis uno alterove die, dum menses instant, donec eorum fiat fluxus; quibus fluentibus, symptomata hæc aut remittunt, aut saltem continuant, licet non adeo atrociter, donec cessante mensium fluxu omnia denique pacata fiant. Affectus est satis frequens in mulieribus, quæ vitam agunt sedentariam, aut iis, qui nunquam pepererunt.

C A U S Æ.

Causæ difficiliorum horum menstruorum eadem sunt, quæ mensium suppressorum, nempe orgasmus & fermentatio sanguinis menstrui ordinaria quidem, qualis extra menstruationem solet observari, sed quæ ob vasa vaginæ uteri nimis constricta, aut à prægressa menstruatione infarcta, facile impediunt sanguinis egressum, unde isti lumborum, & circa regionem pubis dolores tensivi, istæque pulsationes. Imò ex sanguine in præcordiis turgescente plus minus quasi & stagnante istæ anxietates, palpitationes cordis & respirandi difficultas superveniunt. Quod si in cacochemicis vitiosa bilis, vitiosusque succus pancreaticus sub ista sanguinis fermentatione copiosius in intestina effundantur, hi vitiosa ex effervescencia, cum acidum pancreaticum vitiosum in talibus imprimis præpolleat, copiosos generant flatus. Præterea acor iste vitiosus per intestina delatus, indeque etiam ad mesenterium penetrans, membranas & nervos, horumque plexus afficiens, illorum spasmos & convulsivas contracturas, colicas convulsivas, ac inde lancinantes vagos ac mirè contorquentes dolores excitant, donec facta sanguinis evacuatione, & cessante ejus fermentatione menstrua, omnia fiant pacatiora, in statum naturalem redeant. Unonomine: tales mulieres patiuntur symptomata, simillima iis, quæ patiuntur passionem hysterica.

DIAGNOSIS.

Hæc mensium difficultas ex ægra facillimè patet.

P R O G N O S I S.

Quoad prognosin: non contemnendum malum est, partim, quia subindè, nisi maturè succurratur, omnino menses supprimuntur, partim interdum gravia pathemata hysterica dicta, aliaque symptomata superveniunt. Imò ubi virgines tales difficiles patiuntur menses, ex mulieres factæ, graves pati solent uteri suffocationes.

C U R A.

Quod attinet curam: in hac tempus paroxysmi, & extra eundem observandum est: In paroxysmo

1. Fermentatio sanguinis menstrualis promovenda, ut menses promptius erumpant, quod faciunt aromatica volatilia.
2. Vitiati succi, præsertim primarum viarum, qualis bilis & succus pancreaticus, effervescentes corrigendi: quod præstant Martialia, hinc acida fixa &c. Et
3. denique nati exinde spasmi & spasmodicæ convulsiones abdominis suppressendæ.

Extra paroxysmum verò vitiosa crasis sanguinis remediis anticachecticis, hoc est, Martialibus, & aromaticis volatilibus, additis vel interpositis blandè laxantibus, emendanda est.

Quoad tempus paroxysmi imitandus hac in parte est Horstius, qui in *libr. 5. Observ. 27.* habet exemplum sceminx juvenulæ, quæ singulis mensibus paulò ante fluxum vehementissimos dolores quasi colicos patiebatur, cum subsequente diarrhœa, sæpius etiam vomitu laborioso, maximaque tensione versus pubem: Hanc ipsam curavit præmisso per octiduum ante fluxum nodulo alterante & laxativo in vino, propinando in ipso mensium fluxu pilulas suas hystericas ex menses blandè stimulantibus compositas.

Conveniunt ergò in paroxysmo clysteres carminantes & blandè laxantes, imprimis terebinthinati. Item essentia ad menses composita, ex splene bovis parata, nunc sola, nunc cum essentia liquida Martis, vel solutione Martis cum succo pomorum permista, cui & addi potest essentia croci. Ipsum elixyr proprietatis vulgare, vel quod melius est, sine acido, & antiscorbuticum, R Qi composita, insigniter conducit, & destillatu anisi ad aliquot guttas propinatum convenientissimum est in doloribus abdominis quasi colicis, cum menstruorum eruptione conjunctis: id quod oïdici ex Riverio *Cent. 4. obs. 85.* præstantius tamen est & destillatum succini loco quorum ~ O \* ci succinatus & anisatus usurpari possunt. Parili ratione & destillatum cumini convenit. In genere Martialia & aromatica volatilia, speciatim appro-



appropriata, primatum ducunt, quin etiam omnia remedia aromatica volatilia, quæ in suffocatione uterina sunt proficua, in paroxysmo commodè præscribi possunt, in specie tamen pulveres cachectici &iales, castoreum & myrrha, & ex hac parata essentia myrrhæ c. R. ʒi compos. v. gr.

ʒ. R. Oli ʒis Zuvelf. ʒij.

ess. absinth. l. cent. min. ʒiβ. M.

Dulcia vitanda sunt in tali casu, quia malum exasperant fermentando.

Ubi graviora adsunt symptomata, in specie dolores, ubi metus est, ne menses supprimantur, sicut per dolores in partu lochiorum fluxus subinde impeditur, hinc ad ipsum laudanum opiatum potest fieri accessus: hæc tamen observatâ cautelâ, ut misceatur idem cum menses cientibus; notum enim est, quod laudanum opiatum sistat omnes omnino fluxus, in specie verò hæmorrhagias. Conf. Hæferus in *Herc. Med. l. 7. pagin. 306.* qui in his casibus commendat pilulas factas ex extractis aromaticis, calami aromatici, helenii, zedoariæ, radicis gentianæ, cardui benedicti, & aloës, cui laudanum opiatum admiscendum sit, uti granum unum alterumve extracti trochiscorum alhandal commodissimè talibus pilulis admisceri potest.

Quoad venæsectionem: Dum jamjam instant, aut etiam fluere incipiunt in graviore malo, eadem in pede secanda est; sin verò adhuc aliquot dies noctesque restent, antequam fluere debeant, vena in brachio nonnihil evacuanda.

Externè omnia ea, quæ in colica convulsiva & passione sic dicta hysterica præscribuntur, conveniunt, item sequens fons:

ʒ. fol. lauri

HB. artemis. ʒ M. ij.

puleg. M. j.

ʒ. chamom. Rom.

samb. ʒ M. β.

rad. angel.

levist. ʒ ʒij.

bacc. lauri ʒj.

junip. ʒβ.

sem. ʒ. cal. maj. ʒ ʒij.

Concis. & contus. coqu. in f. q. vini vase clauso.

Colatura D. S.

Neusserliche Behung.

## ARTICULUS II.

De

*Mensium Paucitate.*

**S**ecundum vitium in depravato mensium fluxu est mensium paucitas, dum fluunt equidem menses, sed parcius quàm fieri debet, & non sufficienter.

### CAUSÆ.

Causæ ferè sunt eadem, quæ menses nimium inducunt suppressos, præprimis in his culpanda est visciditas & lentor sanguinis ex chylosi læsa ortum ducens; qui exinde fermentationi debitæ ciendæ ineptus est; unde in tali casu observantur simul cum sanguine prodire cruda, viscida & mucilaginosæ excrementa.

### PROGNOSIS.

Cauti tamen sumus in hoc passu, ubi curandæ sunt maritatæ, quæ conqueruntur de mensium paucitate. Ut enim post conceptum ordinariò menses subsistant, nihilominus tamen in quibusdam usque ad medium gestationis tempus seu mensem quartum ordinariam periodum observant, aut saltim primis mensibus pauciore quantitate effluere videntur. Ubi ergo est suspicio gravidationis, cautus sit Medicus, nè intempestivè menses proriter.

### CURA.

In cura addendus est stimulus mensibus apparentibus, sed non satis fluentibus, propinando in ♀ pulegii aut cinnamomi borraginata borracem Venetam ʒβ. ad ʒβ. cum aliquot guttis essentia croci: aut etiam ex sabina paratum decoctum, ejusque extractum, aut aliquot guttæ ejus olei sunt egregiæ. Myrrha cum castoreo, cui ʒ volatile succini addatur, similiter potenter hîc succurrit; non minùs, quam ʒ ʒci, aut alius quicumque ʒ volatilis urinosus. Omnia ergò, quæ aliàs tanquam appropriata ad mensium fluxum promovendum dicta sunt, etiam hîc conveniunt: & quidem, si magis urgeat malum, conjungenda venæsectio in pede. Quandoquidem etiam loco venæsectionis in tali casu cucurbitulæ sine scarificatione possunt applicari cruribus vel femori in regione superiore interna: perineo etiam aut inguinibus applicatæ, promovent sanguinis fluxum. Zacutus Lusitanus applicavit hirudines orificio uteri externo.

Sic etiam Castro in hoc casu pessos ex aloë mirè ad sanguinem proliciendum deficientem commendat. Quod si forsan contingat, ut vasa vaginæ uteri citò nimis conniveant ac angustentur, externæ fomentationes ex emollientibus & stimulantibus, ex althæa, malva, meliloto, sabina, pulegio, majorana, & similibus applicatæ conducunt: Vel excipiat vapor ex horum decocto, & hinc cum oleo cheirino illinantur inguina.

## ARTICULUS III.

De

*Mensium Stillicidio.*

**P**aucitati huic mensium tertio loco oppositum est vitium, mensium, uteri stillicidium, affectus

affectus mensium fluxui nimio cognatus, nec nisi minoris ratione ab hoc differens. Est sc. continuus quidem, aut saltem unaquaque periodo diutius durans fluxus; sed qui non confestim more naturali, verum tantummodò successivè atque guttatim potius utero exstillet, quàm effluat.

C A U S Æ.

Causa hujus mensium stillicidii est acrimonia sanguinis, conjuncta cum ejus lentore & crassitie, quod tamen rarius est, frequentius concurrit simul viarum vasorumque angustia; unde irritatione quidem continuâ vasorum uteri sui excretionem continuo urget, sed ipse transire, aut sufficienter per angustiora loca transmitti nequit, hinc etiam continuata quidem, sed guttatim saltem fit mensium excretio. Unde etiam Forestus lib. 28. Obs. 37. observat stillicidium mensium diuturnum, quod tandem in exulcerationem uteri desit in muliere insigniter cachectica.

DIAGNOSIS.

Affectus ex relatione ægræ patet.

PROGNOSIS.

Si accedit lentor & sanguinis crassities, malum est magis contumax.

C U R A.

Simili ratione curatur, atq; fluxus nimius.

Præter universalia anticachectica, Martem & Martialia, præsertim adstringentia dicta, imprimis primatum ducunt internè, quæ huic medentur vitio, & cachexiam corrigendo, & acrimoniam acidam absorbendo, & simul partium tonum constringendo firmant; Unde pulvis cachecticus, item crocus Martis aperitivus, & Ræ ♂ is blandè adstringentes conducunt. Quarum ventriculo adhuc suus constat tonus, hæ capiant limaturam Martis, infundant vino cum cinnamomo; Vel recipiant vinum infusionis baccarum juniperi cum croco Martis, aut Marte crudo, & hauriant; fit enim blanda tunc Martis solutio, cuivis Martis tincturæ artificiali præferenda. Hinc noduli laxantes & alterantes cum uterinis additis ex fumaria, melissa, zedoaria, Rhabarbaro, & similibus conducunt. Forestus c. l. castorei usum insigniter commendat.

Externe cum frequenter adsit excoriatio in utero, conveniunt injectiones vulnerariæ.

ARTICULUS IV.

De

Mensium decoloratione.

Juxta hoc stillicidium observandum, quod menses interdum variis qualitatibus imbu-

Tom. II.

ti prodire solcant, quo pertinet mensium decoloratio, illud nempe mensium vitium, quando non debito colore, sed serosior est instat loturæ carniæ, albidus, lividus, flavescent, atrior, aut simul acris quasi rodens, & variis scedis coloribus tinctus, sanguis se manifestat. In specie quidem copiosus mucus viscidus & albicans simul prodire solet, ita tamen, ut adhuc sanguis abundet; alias enim ad fluores potius muliebres pertinerent.

C A U S A.

Omnia hæc cachexiæ filix & cacochyliæ nepotes existunt. Unde ad statum sanguinis cachecticum prospiciendum est, utut quandoque conjunctus sit fluor albus. Differentia horum est hæc, quod non semper continuet fluxus albus, interdum se societ cum mensium fluxu, & extra hunc etiam dispareat.

C U R A.

Colores scedos curamus, curato vel fluore albo, vel curato sanguinis vitio cacochemico, ubi præmisso vomitorio eminent Martialia, aloë, myrrha & crocus, sive in formâ solida, sive liquida elixyris aut Ræ ♀i compos. propinentur. Præter nodulos alterantes & purgantes hic præmittendos, in hoc casu autores laudant scordium: Item hisce addantur elixyr uterinum Crollii, uti etiam elixyr proprietatis, mistum cum essentia croci, ut fiat validius. Instituatur etiam purgatio, quibus pilulæ aloëticæ cum Mercurio dulci sunt conjungendæ. Denique bezoardicum Martiale, aut bezoardicum Joviale, item antihecticum Poterii, etiam hic insigniter conducunt.

ARTICULUS V.

De

Mensium fœtore.

Naturaliter equidem sanguis, qui profluit, nullo odore est imprægnatus, nisi ipsi calendulæ odorem tribuere velis, uti superius monui ex Riverii Observat. Interdum tamen ex sanguinis stagnatione & mora in vasis uterinis, fœtor contrahitur, & menses fœtidi seu cum fœtore conjuncti, excernuntur. Odor iste fœtidus interdum est hircinus, seu hircum olet certo tempore, interdum etiam alius quidam, vel ipsis mulieribus detestabilis.

C A U S Æ.

Fit ex inchoata putredine sanguinis in vasis uteri, dum alcali massæ sanguinæ dissolvit ejus sulphur, superveniente verò acido destruitur hæc actio alcali in pingue, unde oritur iste fœtor. In specie solet fieri, dum menses pedetentim solent effluere,

(Ddd ddd)

CURA.

## C U R A.

Cura est facilis. Opera danda est, ut per aromatica promovendo fluxum omnis sanguinis remora tollatur. Aloë, myrrha & crocus, quin & elixyr proprietatis, R<sup>xi</sup> composita, essentia myrrhæ, uti etiam succinum, essentia succini, & quælibet succinata, balsamum Ais terebinthinatum, aloë, & omnia aloëtica cum Mercurio dulci, ad absumendam putredinem, in specie volatilia, huic scopo egregiè satisfaciunt.

## ARTICULUS VI.

De

*Erratico & inordinato mensium fluxu.*

SExtò sit sæpius, ut non certam suam periodum observent menses, sed inordinato fluxu recurrant, nunc postponendo quidem, nunc anticipando, interdum vagè comparando: quod vitium inordinatus mensium fluxus vocatur.

## C A U S A E.

Sequitur hoc ipsum vitium ut plurimum vitiata sanguinis crasin, quatenus ineptus est ad turgescientiam, quæ sub tempore menstruationis observanda est, cum genitalium partium debilitate; unde vitiato sanguine inordinata, interrupta sc. & impedita, adeoque nunc maturè resurgens, nunc iterum deficiens oritur menstruatio aut fermentatio, ipso fermento menstruo à genitalibus inspirato, minùs volatili spirituoso existente. Rariùs vitium est in utero. Semper ergo ad sanguinem respiciendum est, quod confirmat cura.

## P R O G N O S I S.

Menses, quando fluunt inordinatè, semper sunt prodromi cachexiæ, malum, quod tandem in omnimodam suppressionem, aut leucophlegmatiam, terminatur.

## C U R A.

Faciunt pro curâ mensium inordinatorum utramque paginam Martialia & corallia, & quæ ex his duobus subjectis parantur remedia. Verùm necesse est, ut usus eorum sit continuatus, admiscenda subinde, quæ aut promovent nonnihil, aut sistunt fluxum: speciatim Martialia maritentur cum aromaticis, quod præstant vina Martialia ex infuso Martiali, addito cinnamomo, aut aliis menses pellentibus, nunc sistentia opiata, item temperantia socianda: nempe, si semper anticipare observetur fluxus, id quod ferè acrimoniam sanguinis stimulantem innuit, profunt imprimis præter Martialia ea,

quæ sanguinem purificare dicuntur, ex fumaria, scordio, rha-barbaro monachorum, centaurio minori, helleboro nigro, &c. & hinc, quæ ejusdem acrimoniam temperare solent, lac præsertim cum succo fumarie. Ex Marte, præter crocos & essentias, etiam acidulæ artificiales conducunt, item & vis artificiale purum; item pilulæ Poterii, quæ fiunt ex croco Martis cum gummatibus, vid. ejus *Cent. 3. cap. 42.* Ex corallis corallia cum & co sublimata, & ab eodem præcipitata conveniunt: Item insigniter profunt Ræ coralliorum cum spiritu cordis cervi, nec non R corallior. cum lignorum, aut in specie fassafrata, quæ hoc in casu tam in defectu, quàm in excessu est egregia; reverà enim aliquid Martis in corallis rubris inesse videtur. His nunc stimulantia aromatica, præsertim ex myrrha, croco, &c. nunc sistentia opiata, item temperantia, socianda: Nempe si semper anticipare observetur fluxus, id quod ferè acrimoniam sanguinis stimulantem innuit, profunt imprimis, præter Martialia, ea, quæ sanguinem purificare dicuntur, ex fumaria, scordio, rhabarbaro monachorum, centaurio minori, helleboro nigro, &c. & hinc, quæ ejusdem acrimoniam temperare solent, lac præsertim cum succo fumarie.

## ARTICULUS VII.

De

*Mensium per loca aliena effluxu.*

Denique depravatur mensium fluxus, quando hi per alia loca excernuntur, idque nunc ordinatè, nunc inordinatè. Loca sunt varia: Observatæ sc. fuerunt mulieres, quibus per gingivas, umbilicum, uterum aut vaginæ labia, pollicem sinistri pedis emanarunt menses: sicut ex modò dictis exempla refert Zacutus Lusitanus in *Prax. Admir.* & Bartholinus *Hist. 16. cap. 1.* menses ex pedibus fluentes observavit, quod propter vasorum uterinorum obstructionem à consueta via fuerint exclusi; aliis per mammas fluxerunt; imò ut plurimum per os, aut vomitu, aut, quod periculotius, sanguinis sputo, menses ejiciuntur. Præter Benivenium refert Panarollus *Pent. 1. Observ. 6.* de vetula septuagenaria, in qua ab adolescentia semper menses per os citra ullam jacturam seu noxam fuerunt excreti: Imò in *lib. 4. Observ.* Schenckii prostant notata exempla mensium per vulnera, mulieribus inflata erumpentium: Aliis quoque effluerunt per anum, aliis intra ungues, aliis ex oculorum canthis, quod Sala observavit, & per salvatellæ sectionem curavit.

CAUSÆ.



C A U S Æ.

Causa hujus perversæ mensium excretionis ferè querenda est simpliciter in vasis hypogastricis ad vaginam uteri terminantibus, (non enim fluit per uterum sanguis, nisi post partum) sanguini exitum querenti, viam intercludentibus, idque ex horum conformatione nativa vitiatis, vel ex horum angustia & obstructione impeditis, unde sanguis tali orgasmo hinc inde circulatus tandem aliis locis exitum querit, & eundem invenit.

C U R A.

Cura ergò, habitâ simul ratione corporis aut sani, aut cachectici, eò est dirigenda, non ut supprimatur fluxus ex metu graviorum symptomatum, vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Obs.* 24. p. 42. sed ut revertatur saltem & ad locum naturalem, nempe uterum, ut ibidem possit effluere: quod facilius fit, ubi aliàs per uterum jam fluxerunt menses; difficilius autem, ubi nunquam vestigia ista elegerunt.

Internè in paroxysmo pauca sunt in usu, quia ad uterum specificè non perveniunt, & tandem sanguinem plus excitant: Externè autem usurpentur, quæ sanguinis impetum vel ad inferiora trahunt, vel quæ uteri vasa hircere faciunt.

Extra paroxysmum ergo saltem usurpentur internè aromatica volatilia, vasa obstructa referentia.

Inter priora eminet imprimis saphænæ sectio, imminente fluxu instituta: item cucurbitulæ inguinibus aut pedum suris & femoribus in regione interna applicatæ, nunc cum, nunc sine scarificatione, uti hoc salubriter monet Tulpus *l.* 3. *obs.* cap. 23. qui suadet, ut quando sanguis menstruus per os rejicitur, cucurbitulæ inguinibus applicentur: Sic Amatus Lusitanus *Cent.* 2. *Cur.* 21. refert, mulierem per mammæ sanguinem menstruum emittentem, curatam tamen per saphænæ sectam: Idem Amatus Lusitanus *Cent.* 2. *Cur.* 17. refert mulierem enixam, quæ sanguinem menstruum per nares & os excernebat, sed saphænæ sectione, & cucurbitulis fœmoribus admotis, curatam: Notabile est, quod Sanchez refert in *Obs.* pag. 366. menses per aurem excretos sectione venarum utriusque brachii sanatos. Pediluvia etiam possunt institui. Inter posteriora sunt lotus externi utero admoti, aut suffumigia ex colocynthide, aut pessi ex helleborinis, aloëticis & similibus in mensium suppressione usitati; sicut clysmata acriora per consensum contiguitatis uterum vellicantia, tempore, quo menses redire debent, non omitenda: vid. Forestus *l.* 26. *Obs.* 25. Cum his instituantur injectiones uterinæ ex decocto pulegii, chamomillæ, sabinæ, unâ cum colocynthide, quæ in uteri vaginam injectæ penetrant, & aperiunt facilius vasa uterina. Omnia

Tom. II.

etiam, quæ in mensium suppressione pro usu externo fuerunt allegata, huc possunt applicari, habitâ simul ratione corporis ægri, an sani? an cachectici? ut intermedio tempore vitiis ejus maturè occurratur.

Sed quid de gravidis? Gravidis interdum primis mensibus gestationis per loca insueta erumpit sanguis, menstruo succedaneus: Sic namque Salmuth *Cent.* 3. *Hist.* 36. refert mulierem quandam gravidam, cui statis temporibus & quantitate sufficiente per urinas fuerunt excreti menses. Imò interdum gravidis per mammæ sanguis erumpere solet, signum ab Hippocrate habitum pessimum, insignioris sc. fœtus debilitatis, quod tamen non est universale. In talibus ergo, ne periculum subsequatur, corrigatur perversus fluxus, aut ubi in benè habitis ex redundante sanguinis quantitate oriatur; tunc in specie ex superioribus locis, v. g. mammis, effluat, venæsectione in brachiis institutâ commodè iste sanguinis motus & effluxus corrigi potest.

CAPUT IV.

De

Fluore albo.

Fluor albus mulierum frequens malum est, in quo præter sanguinem, quem nunc naturaliter, nunc præternaturaliter, genitalia muliebria plorant, etiam interdum liquor alius serosus, item plus minùs pituitosus, ut vocant, excerni solet: à quibusdam appellatur gonorrhœa muliebris: à quibusdam tamen hi duo, tanquam affectus distincti, à se invicem separantur. Consideranda ergò historia hujus fluxus: nempe fluxus uterinus est excretio colluviei variz per genitalia muliebria, dum sc. nunc humor pituitosus seu crassus & mucosus, nunc aquosus & serosus effluit, isque interdum paucior, interdum copiosior, interdum plus minus acris & salinus & mordax, interdum verò benignus, mitis & blandus. Ut plurimum hic fluor initio morbi solet esse mitis, pedetentim magis magisque accrescit, ut etiam subindè excoriationem genitalium inferat: Albus quidem est ut plurimum, progressu tamen temporis varius color confluit, rarius lividus est aut flavescens, interdum, sed rariùs, nigrescit, in maligno statu viridescit, interdum alio, sed vitioso, colore est tinctus; Inodorus est ut plurimum, rarius solet esse graveolens, aut fœtidus, nisi simul quædam exulceratio conjuncta sit, ex qua purulentia fœtor tunc simul oritur. Occupat hic fluxus omnis ætatis & omnis status fœmellas, tam virgines, quàm maritatas: testantur namque observationes, præter vetulas etiam puellas triennales, septennales, vid. M. A. N. C. *Ann.* 9. *Observat.* 28.

(Ddd ddd 2)

noven-

novennes; item puellas 13. annorum, quæ nunquam nec menstruum fluxum, nec virum passæ fuerunt, huic ipsi fluori albo fuisse obnoxias. Item mulieres, quas affligit, non solum extra graviditatis tempus, sed etiam dum gravidæ fuerint, solet affligere: Sic mulieres, dum gerunt gemellos, fluore hoc continuo corripuntur: ipse memini mulierem gemellos gestantem toto ferè gestationis tempore hoc fluxu admodum affectam fuisse; quod observandum contra eos, qui dicunt, ex utero effluere, quod in gravidis impossibile est. Unde etiam hic fluor albus longè aliud vitium est à mensium decoloratione, cum æqualiter menstruatas & non menstruatas affligat, tam quæ nunquam adhuc menstrua viderunt, quàm etiam, quibus ratione ætatis & lege naturæ menstrua non amplius fluunt. Et quidem maritatas familiarissimè affligit hic fluxus, rariùs verò virgines aut puellas. Typum aut periodum certam hic fluxus observat nullam, sed nunc continuus, nunc interruptis quidem, sed inordinatis, vicibus recurrit, nunc copiosius, nunc parcius; nunc menses comitatur, nunc iisdem cessantibus aliquandiu perstat; circa menstruationis legitimum tempus tamen copiosius ferè & ulterius antè aut post scaturit.

Dico ergò, hunc fluxum album mulierum nihil esse aliud, quàm gonorrhœam muliebrem; nunc veram, quando liquor seminalis ex prostaticis glandulis effluit; nunc notham, quando alius ichor seu liquamen serotum variis quandoque coloribus effluit, ubi necesse est, adesse transcolationem quandam. Analoga autem est hæc muliebris gonorrhœa virili. Hoc negotium per se pateret, si ex veterum hypothese mulieres in testibus semen elaborare, illudque in uterum, & tandem in vaginam effundere, statuere velim; sic enim, qualis esset gonorrhœa, per se pateret. Sed quia huic sententiæ minorem fidem habeo quàm vulgò fieri solet, cum testes muliebres potius ovarium muliebre dicam, ob id hic fluor albus, seu gonorrhœa alio modo explicanda venit.

Liquor igitur iste excernitur partim ex binis lacunis, juxta pudendi muliebris labia sitis, adeoque ex prostaticis glandulis circa meatum urinarium constitis, partim verò ex ipsa vagina uterina, quæ à modernis membranosoglandulosa dicitur. Ex quibus glandulis in coitu mediante attritu membri virilis etiam genitalem hujusmodi lympham turgescentem mulieres unà excernunt, adeoque tam gonorrhœa muliebris, quàm fluor earum albus, etiam partim ex prostaticis glandulis, partim ex textura vaginæ glandulomembranea, explicanda venit: Nam immediate tales fluxus procedere ex massa sanguinea asseri nequit, cum in œconomia humana nun-

quam liquoris à sanguine distinctio, vel generatio, vel separatio, aut transcolatio sine certo cribro vel filtro, fiat. Ergo & tale organum hic pariter necessarium erit, nisi exulceratas semper has partes dicere velimus, & materiam profluentem purulentam saniem esse.

#### DIFFERENTIÆ.

Pro meliore ergo distinctione observanda est differentia quædam in hoc fluore muliebri, dum alius est levior, in quo lymphæ genitalis pauca albicans, idque non adeò frequenter, sed interruptis vicibus, & nonnihil, parum tamen, spissa, glutinosa, mitis, sine sensu ardoris aut rosionis excernitur, & sine graviore corporis vitio ac labe est adjuncta; estque gonorrhœa vera, in qua materia hæc est lymphæ genitalis, quæ solummodò ex dictis prostaticis glandulis circa vesicæ collum effluit: Id quod probatur ex Graafio *l. 4.* qui in muliere gonorrhœa laborante has prostaticas exulceratas observavit. Econtrà observetur alius fluxus copiosus & continuus, ubi multa serosa subindè, variè colorata, interdum admodum acrida & similia, uberiore rivo excernuntur, concurruntque tunc simul procedente malo Leucophlegmatia, cachexia totius corporis plus minus confirmata, interdum accedit tumor pedum œdematosus, torpor actionum, flacciditas membrorum, febres lentæ, & quæ sunt hujusmodi alia concurrentia symptomata: Estque hic posterior fluor gonorrhœa notha, seu propriè dictus fluor albus, & hic iterum vel benignus, vel malignus. Benigna gonorrhœa notha est, modò enarratus lymphæ vitiatæ fluxus ex glandulosa textura vaginæ uterinæ, forsàn & prostaticis illis glandulis simul, vitio massæ sanguinæ totius cachectico, ex vitio stomachi circa chylicationem imprimis enata: Nam quod ex his prostaticis solis effluere nequeat, copia subindè ejus insignis manifestè persuadet. Præ cæteris accuratè hos duos fluores, gonorrhœam hanc notham à vera distinguit Heurnius, vocans priorem profluvium uterinum, tanquam quod solummodò ex uteri orificii vitio accidat: Posteriorem verò profluvium muliebre, ceu id, quod ex tota muliere effluat. Denique est & gonorrhœa notha maligna seu virulenta, h. e. fluor muliebris Gallicus, à contagio Gallico oriundus, nec nisi congressum cum infecto insequens, in quo acrida saniosa plus minus purulenta ac livida subindè excerni solent. Plura, quæ ad cognitionem harum gonorrhœarum seu fluorum muliebrium, qui cupit, is videat Hœchstederum *in Decad. 4. obs. 1. in Scholio pag. 287. imprimis pag. 296. & ex hoc etiam Schneiderum lib. 3. de Catarribus, ubi pag. 282. & sequ. fusè & prolixè historiam hujus affectus cum primis ex aliis autoribus*



toribus declarat in integro cap. 8. item Syl-  
vium lib. 3. Pr. cap. de Fluore mulier. pag. 147.

C A U S Æ.

Causam ergo quod attinet fluoris primi, seu gonorrhœæ veræ: est materiæ istius genitalis copia & ubertas, aut ejus spirituosior turgescencia, vel ejusdem acrimonia, conjuncta tamen cum aliquali orificiorum binarum glandulosarum prostaticarum laxitate seu flacciditate, quæ sola etiam hanc gonorrhœam inducere solet; unde hæc facilius dilabi ex se permittunt dictam materiam, &c. Frequentissima causa ex his videtur acrimonia istius lymphæ irritans, & ita sui excretionem provocans. Accedit & imprimis coitus ad aliquod tempus intermissus, aut ingens coeundi tam in maritatis quam in virginibus desiderium: Virginibus enim salacibus, & quæ propter humiditatem vasa spermatica habent laxa, & semen aquosius emittunt, hi fluores solent esse familiares, imprimis, ubi adest simul laudabilis victus ratio, vita sedentaria, & curis ac meditationibus vacua, & quæ minus gravibus turbata est affectibus.

Causæ remotæ eadem ferè sunt cum istis, quæ gonorrhœam in viris inferunt.

Posterioris verò fluoris seu gonorrhœæ nothæ benignæ causa proxima investiganda est in lymphæ, in dictis locis collectæ & alteratæ, nimia acrimonia, eaque quidem nunc salsa muriatica simpliciter, nunc acido-salsa, unde subinde excoriationem, dolores, & interdum dictarum partium exulcerationem infert: Accedit simul successivè à crebriore fluxu texturæ illius glanduloso-membranosæ laxitas & flacciditas, seu tonus earum ita læsus & laxatus, in specie orificii, quâcunque ex causa contractus, unde eò contumacior emergit fluxus. Scilicet vitiatæ & acrioris hujus lymphæ ratio partim est in ipsis glandulis nimis flaccidis, mollioribus & laxioribus, earumque jam vitiato acido fermenti instar lympham transcolendam in tale liquamen alterante, partim est in ipsa massa sanguinea & chylo vitiatis, ex quibus fit lymphæ istius secretio: vid. Sylvius lib. 3. Prax. c. 4. p. 167. Nam observatur in talibus vitium sanguinis plus minus cachecticum ex vitio ventriculi circa chylicationem imprimis enatum, vid. Zechius Conf. 37. & 97. unde partem primariò affectam stomachum esse Barbette asserit in sua Praxi. Hinc per dictas partes glandulosas, tanquam per emunctorium quoddam universale massæ sanguineæ cruditates cachecticæ, copiosiore sero acriore dilutæ, evacuantur & transcolantur, ac ita tardiosè & continuò istæ nymphæ, aliàs in sicco ludentes, humectantur & maculantur. Cum verò simul de spiritibus ac nutritivo rore plus minus evacuetur, habitus cor-

poris perfectè fit cachecticus, ac tandem perfecta quædam leucophlegmatia; hinc tumores pedum œdematosi, febres lentæ, appetitus Veneræ extinctus, & similia concurrentia symptomata manifestè se exhibent. Quòd verò in specie per has partes glandulosas genitalium ista effluant sanguinis liquamina, in causa est junctum proprium glandularum vitium, harum sc. vel nimis laxatarum, flaccidarum, erosarum, & quasi resolutarum. Unde præter alias causas remotas etiam partus difficilis (vid. Blasius P. 5. Obs. Anat. 3.) aut abortus interdum in causa est, ut oriatur talis fluxus ex laceratione, aut alia læsione harum prostaticarum, vel earundem sensibiliùs irritatarum, hinc liquorem uberiùs transmittentium, vel quavis alia occasione interna aut externa, unde semel facta excretionem continuata postmodum transcolatio succedit.

Scrupulum movere videtur huic asserto abundantia seu excessiva subindè copia materiæ excretæ, quæ cum parvo colatorio vix consistere potest: Sed quando modò consideremus, quantum materiæ subindè unicâ die & nocte, dum coryzâ laboramus, per nares excernatur, quantum materiæ in cacochymicis subindè ulcusculum quoddam plorare soleat, quantum materiæ continuò stillent lippientes oculi, &c. faciliè possumus concipere, quod & per has prostaticas vitiatas ex massa sanguinea cacochymica copiosius tale liquamen continuò effluere possit in malo inveterato. Nempe quod est in naribus coryza, in oculis nimia lachrymatio, in faucibus copiosior tussis & scretus, hoc est talis, tam in maribus quam in sceminis, gonorrhœa notha, adeoque tam ad materiæ & cæterorum contentorum vitium, quam ad partis solidæ affectæ morbosam constitutionem, simul respiciendum. Speciatim acidum sui generis seu specificum est, quod alterando materiam lymphæ, quàm afficiendo istas glandulas circa genitalia, hunc fluorem album mulierum infert, cujus primus faber in ventriculo residere videtur, utur semel factâ per ista loca excretionem ulteriori postmodum quælibet vitiatæ sordes unâ evacuentur. Scorbuticæ præsertim & graviùs & pertinaciùs fluore ejusmodi albo laborare observantur. Simul tandem observandum est pro ulteriori scrutinio, quod habet Hornius l. a. nempe orificium uterinum internum esse glandulosum, ex quo etiam succus seminalis soleat emitti: videatur David von der Beke in Meditat. circa principia rerum natur. pag. 193. ubi refert, vaginam uteri esse porosam, & continuò quandam lympham solere transsudare, & humectare genitalia viri in congressu: Interim Sylvius asserit, totam substantiam uteri & vaginæ esse membranoso-glandulosam,

(Ddd ddd 3)

quæ



quæ hypothesis & fermento menstruo & huic fluori albo, præterea nutrimenti sætus transcolationi, & quamplurimis similibus problematis solvendis, aptissima esse solet.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Morbus hic patescit Medico ex relatione ipsarum ægrarum: Et quidem imprimis distinguendus fluor hic, qualis sit gonorrhœa? an vera? an vera notha? quæ differentia ex adjunctis & ex effectu pater. Prior enim fluor paucus est in moderata quantitate, crassiusculus, glutinosus, serosus, citra ullam materiæ acrimoniam, nunc stasis, nunc vagis temporibus evacuat, & talis gonorrhœa vera subinde diu sine insigni incommodo perdurare potest: Sin verò copiosiora acria, serosiora, viridescencia, fœtida, tenuia, aut similia plus minus alterata affluant, accedente comite cachexia, prostrato appetitu, tumore pedum, ructibus, virium prostratione, omnium actionum torpore, nausea à coitu, cum spiritus deficient in genitura, dolore in lumbis, & circa os sacrum, &c. talia fluxum gonorrhœæ nothæ ostendunt: cui, ubi & acrior simul concurrat lymphæ, febris nocturna seu vespertina, quasi catarrhalis, seu febricula quædam lenta, imprimis vespertino tempore exacerbans, solet simul supervenire.

### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Gonorrhœa vera nihil habet in recessu; notha verò præter alia mala hoc habet incommodi, quod subinde fœminas reddat infœcundas & steriles.

Quodsi fluores hi diutius duraverint, graves morbos, diabetem, languorem totius corporis, cachexiam, hydropem, tabem, atrophiam, item prolapsum sinus pudoris, infert.

Rarum interim est, quod refert Ballonius *consil.* 59. de fluore muliebri continuò suppresso, quod exinde mutatus fuerit in diabetem lethalem.

Quò diutius duraverit gonorrhœa hæc notha, cò difficilius curatur, & imprimis sedulâ medicamentorum continuatione opus habet; hinc fœminas nonnihil seniles malum hoc plerumque ad mortem usque comitatur. In juveniculis autem facilius curationem admittit hic fluxus.

Si acrior sit materia proflua, pruritus, ardores, exulcerationes genitalium, gangrænam, & tandem mortem infert.

### C U R A.

Ubi fluxus hic est de natura gonorrhœæ veræ, tunc observandum est monitum Helicæ Paduani, qui in *Observat.* pag. 179. dicit: *Si singulis mensibus biduo vel triduo durat, & postmodum cessat, hinc suo tempore redit, non est*

*cohibenda; si verò perpetuò durat, maturè sistenda est.* In cura ergò gonorrhœæ veræ eodem modo procedendum est, atque in gonorrhœa vera virili, aut absumendo lympham genitalem, aut temperando eandem, aut adstringendo partes laxiores. Optima medendi ratio est copula cum viro, quâ in viduis & virginibus deficiente usurpentur ea, quæ aliàs in gonorrhœa virili ex tumescencia aut acrimonia nimia genituræ sunt in usu. In specie mala citria & limonia, eorumque succus ad ʒij. vel iij. singulo manè ad temperandam caliditatem genituræ, h. e. acrimoniam, & inde dependentem fervorem lymphæ genitalis, usurpantur, imprimis ubi cum ipso fluxu titillatio quædam aut pruritus ad Venerem fuerit conjunctus: sed continuanda sunt hæc. Item terebinthina in ovo sorbili, vel mediante ovi vitello cum ʒ flor. salicis mista omni manè assumpta, & aliquandiu continuata, conducit. Folia & flores seu cimæ salicis decocta in vino & potata, crebrius etiam hæc conducunt; item succus exstillans ex surculis salicum verno tempore incisis, aliquandiu propinetur. Decoctum & extractum florum urticæ mortuæ seu galeopsidos flore albo in hac gonorrhœa specificè laudatur; vel mentha & urtica hæc mortua, item sclarea, injicienda cerevisiæ, & ita potus hauriendus. Tanquam efficax & expertum commendatur sequens decoctum:

*ʒ. Rasur. rad. liquirit.*

*sem. myrtill.*

*coriandri,*

*plantag.*

*viticæ ā ʒj.*

*papav. albi ʒij.*

*hyoscyami ʒss.*

*hord. mundat. M. j.*

*acacia,*

*sem. sumach. ā ʒj.*

Contusa coq. in l. q. ʒ chalybeatæ:

Colaturæ ʒiij. addendo postmodum trochisc. de alkekeng. ʒj. M.

Præter dicta pulvis mandibularum lucii piscis ā ʒss. ad ʒj. usurpatus & continuatus, itidem conducere solet. Trochisci etiam de ʒ sigillata, de carabe, itidem in usu esse solent. Ipsum succinum etiam præparatum, & similia etiam sunt usus laudati; item balsamus sulphuris terebinthinatus.

Externè balnea & fomenta blandè adstringentia, facta ex cortice radicis pruni sylvestris, cortice ligni guajaci, &c. cum alumine in ʒ chalybeata, adjecto paucio aceto, decoctis, vel applicatis, vel injectis, vel cum parva spongia instar pessi applicatis, flacciditatem prostaticarum coercere, & hos fluxus sistere valent.

In gonorrhœa verò nothæ benigna, seu fluore

fluore mulierum albo posteriore & deteriorē, curanda

1. Stomachi chylicatio procuranda & emendanda per vomitum, & stomachica: vid. Jul. Cæsar Claudinus *Resp. pag. 220.* & Rechius *Conf. 97.*
2. Sanguinis cruditas cachectica corrigenda, partim per appropriata cachectica, aut remedia Martialia, partim salia volatilia & aromatica, præsertim ex lignis.
3. Ipsi fluori, & partibus à fluore læsis adstringentibus & nervinis est succurrendum.
4. In specie appropriatis seu specificis malo occurrendum: quæ ferè sunt talia, quæ acidum salum specificum temperant, serositates superfluas quasi imbibunt, & hinc adstrictionem quandam post se relinquunt, qualia ferè in gonorrhœa virorum notha, aut quæ ex genitura acriore oritur, in usu esse solet.

In specie observandum:

I. Non statim est supprimenda hæc gonorrhœa notha, præsertim, si diutius duraverit, cum aliàs gravia pathemata inducat, uti videri potest in *M. A. N. C. Ann. 3. pag. 344.* item in *Ballonio lib. 1. Conf. 56.* Quin potius præmissis præmittendis demùm per specifica & appropriata fluxus sistendus. *Conf. Helidæus Paduanus loco allegato.*

II. Sanguinis detractiones quævis nihil adjuvamenti afferunt; interdum tamen fonticuli in crure pro scopo aversorio aliquid efficere possunt.

III. Quoad evacuantia: Vomitoria commendavi, quæ præmissis digestivis imprimis sunt egregia; hæc inter specificè convenit pulvis radice asari ad *℞ij.*

Repetenda sunt etiam, ubi necessitas postularit. Nam reliqua purgantia propriè dicta circumspectè & rarissimè usurpanda sunt, quia parum vel nihil juvant; quin potius fluorem album magis augent: autore enim Platero observatum fuit, quod purgantibus fluxus talis interdum fuerit excitatus in iis, quæ aliàs eundem nunquam passæ fuerunt. Ubi verò necessitas postulat eadem, maritanda sunt imprimis jalappa & rhabarbaro, quod etiam vi alterativâ in specie convenit, & cujus adstrictione relicta emendetur à purgante inducta noxa; unde species diaturbith cum rhabarbaro insigniter commendantur ab *Helidæo Paduano.* Juxta pulverem jalappæ ejusque refinam, Mercurius dulcis aliis additus proficius videtur, quatenus cachexiam sanguinis emendat: Sic laxativa ex helleboro nigro, ejusque extracto, *MP.* de hiera cum agarico, &c. cum Mercurio dulci conveniunt: item bryonia appropriatum

est purgans. Quæ omnia laxativa colocynthide, vel potius extracto trochiscorum alhandal sunt acuenda. Loco purgantium verò sola sufficiunt sudorifera: uti & diuretica cum appropriatis, præsertim in subjectis humidioribus, serosioribus aut scorbuticis, &c.

Ratione ergò sudoriferorum in usu sunt ligna, lignum sassafras, speciatim decoctum lignorum, juniperi, guajaci & sassafras, cum agrimonia, fragraria, essentia lignorum composita, & ligni sassafras, item & corall. cum ~u lignorum, expectando sudorem: Sic *Zacutus Lusitanus lib. 2. Prax. Admir. Obs. 89.* refert uteri profluvium, unde tabes secuta, decocto lignorum curatum: Et & coralliorum cum ~u lignorum egregium usum præmissis præmittendis videbitis in *M. A. N. C. Ann. 8. Observat. 25. pag. 46.* Pro scopo diuretico conveniunt in specie terebinthina & terebinthinata, terebinthina in vitello ovi soluta, balsamum sulphuris terebinthinatum.

Unde etiam *Riverius Cent. 1. Obs. 40.* tanquam utiles commendat pilulas ex terebinthina cum & rhabarbaro efformatas.

Quoad II. conveniunt stomachica, salia volatilia oleosa aromatica, chyli & sanguinis alterativa & anticachectica, quæ secundum *Sylvium lib. 3. Prax. cap. 3. pag. 80.* præservant à fluore albo, unde etiam eundem jam præsentem corrigunt, sanguinis vitium, radicem fluoris albi eradicando, & corrigendo. In specie verò ad corrigendam cachexiam, simulque inde oriundum fluorem album, si quid aliud, expertum specificum est rosmarinus, ejusque decoctum. Hoc namque solo decocto rosmarini diutius continuato quosvis fluores mulierum albos semper felicissimè curari asserit *Lindanus in suis Practicis,* nec opus esse alio remedio. Huc essentia & ~torismarini, essentia lignorum, elixyr proprietatis sine acido; elixyr proprietatis cachecticum, elixyr cachectium alterativum & laxativum, etiam conferunt: ut de balsamo ~pis terebinthinato, juniperino & succinato nihil dicam. Sunt, qui totimartino adjungunt folia menthæ & melissæ: ex quo ternatio medicamenta quæcunque continuato usu administranda moneo. Conveniunt etiam alia ad cachexiam appropriata, ut sunt v. g. radix galangæ, cyperi, caryophyllatæ, majorana, antophylli, caryophylli, & ~ horum destillatum; etiam vulneraria, ut alchimilla, agrimonia, veronica, baccæ lauri, &c.

Inter Martialia eminent liquor Martis scularis, & ~is ~fata Ludovici, solutio ~is cum succo cydoniorum, Borsdorffianorum, &c.

Specificæ verò internæ, quæ in hoc fluore conveniunt, sunt ea, quæ acre salum acidum temperant, serositates imbibunt, & hinc aliqualem adstrictionem relinquunt, & talia imprimis

primis in gonorrhœa virorum ex semine ferroso acriori usurpari debent. Talia sunt imprimis viscus quercinum, tam in substantia, quam in decocto: hinc Panarollus in *Pent.* 2. *obs.* 48. laudat decoctum nucis pineæ cum ligno visci quercini. Hinc radix filipendulæ, tormentillæ, sigilli Salomonis, angelicæ, & similes conducunt. Sclarea, tam propriè dicta quam horminum sylvestre, singulare est specificum interno externoque usu, quacunque ratione usurpata, in specie si infundatur vino, & crebrius hauriatur, præprimis decoctum sclaræ cum rore marino in vase clauso, vel essentia; unde etiam essentia contra fluxum album D. Michaëlis ex sclarea, tanquam basi, est constructa. Post sclaream galeopsis flore albo, est nobile, cujus  $\nabla$  conserva, & decoctum in vino, mirè conferunt. Post hanc etiam cortices avellanarum, millefolium album, radix filicis, melilotus flore albo, item plantago, cymæ rubi idæi, equisetum, hyssopus & similia laudantur. Horum simplicium flores, & in specie nymphææ albæ, item bellis flore albo, diutius continuata specificè album fluxum sistere à quibusdam laudatur. Lignum lentiscinum, guaiacum, in specie sassafras, commodè, ubi placet simul movere sudores, usurpatur. Modus utendi sub forma decocti & essentia est satis cognitus. De aromaticis nihil dico, quoniam ratione cachexiæ per se commendantur. Porro vinum, in quo extinctum est aurum, tanquam experimentum laudatur tam à Foresto, quam Corbejo. Lac etiam suum usum habet, siquidem lac chalybeatum cum bolo Armena mistum, crebrius usurpatum, in biliosioribus & melancholicis in usu esse solet, id est, ubi acrius acidum est, quod affectum hunc pertinaciorē reddit. Essentia castitatis Michaëlis magno est in pretio. Hisce porro etiam adjunctenda sunt putamina ovorum post exclusos pullos, tam crudè pulverisata, quam calcinata, dosi  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$ . assumpta, os sepis præparatum, maxilla lucii piscis cruda & calcinata, cancri fluviatiles calcinati, cranium seu caput caponis exsiccatum & pulverisatum, item suber ustum, quod ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ . propinatum, fuit experimentum Helidæi Paduani. Præ cæteris ebur sine  $\Delta$ e præparatum, aut, quod melius, raspatum & pulverisatum, succinum album cum ovo sorbili, vid. Forestus *lib.* 28. *obs.* 23. & omnia succinata, trochisci de carabe, crystallus præparata, osteocolla præparata, item pumex, vel pulverisatus vel calcinatus, & diaphoreticum, alumen plumosum, item lapis amianthus pulverisatus  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ . in haustu vini vel  $\mathfrak{V}$ , priapus cervi & ceti à  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$ . ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ . præmissis præmittendis est egregius. Horum omnium vis eò collimat, ut destruat acidum aut salum, quæ in gonorrhœa primariò peccare solent. Osteo-

collæ lapis est unum ex primariis specificis ad curandum fluorem album mulierum in specie usitatum.

*℞. Magister. osteocoll.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$ .*

*carneol. præp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .*

*corall. alb.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .*

*smaragdi  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ .*

*M. f. Pulvis.*

Lapidis amianthi pulverem Boëtius miscet cum aqua vitæ & saccharo, vid. *Tract. de Gemmis*. Amatus Lusitanus commendat albumen ovi cum  $\nabla$  rosarum conquassatum, & ita repetitis vicibus usurpatum: vid. *Cent.* 4. *Car.* 12. Efficacius erit, si aliquot mastichis grana ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ . huic adjungantur. Emulsione seminis lactucæ cum  $\nabla$  chalybeata præparata, addito ebore, plurimas restituit Meynoldus, vid. Velschius *Mistomim. C.* 5. *Obs.* 95. in *M. A. N. C. Ann.* 4. & 5. Riverius & Corbæus coagulum leporis in decocto fol. quercus commendant, quo Mercurialis fluorem album se curasse testatur.

Medicus quidam egregius seu experimentum contra fluorem album cortices seu putamina dura avellanarum cum semine anisi multum commendat. Ad ejus imitationem præscripti sequentem pulverem:

*℞. Cort. avellam.  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ .*

*sem. anisi  $\mathfrak{z}\mathfrak{i}$ .*

*M. f. Pulvis pro 4. vel 5. dosibus. Sed necesse est, aliquandiu continuetur.*

Externa quod attinet remedia: decantatum est hoc unguentum evaporiton ex sclarea, de quo Corbejus *de Morbis Mulierum*, item Stæckerus in *sua Praxi*.

*℞. Sclaream.*

Quæ contusa cum butyro subigatur, in quo aliquandiu putrefiat: postmodum coquatur aliquantulum, coletur.

Hoc ipso mulieri ab umbilico inferiora versus ad regionem pubis usque sedulò inunge, immittendo simul parum de hoc ipso unguento per pessos vulvæ. Comedat quoque herbam ipsam. Hoc unguentum etiam commendatur ad omnes graviores post partum dolores compescendos. Thermae itidem præmissis præmittendis, sunt perquam proficua, primariò naturales, imprimis Töplienceses, ut & Wolckensteinenses, quarum loco fiant artificiales ex sulphure, calce viva, alumine, adjunctis vegetabilibus, nunc nervinis, nunc uterinis, nunc adstringentibus, & parum aluminis parandæ, v. g. cum plantagine, cum salvia, sclarea, matricaria, artemisia, & similibus. Horum loco balnea & foras adstringentes, vel injectiones uterinæ, adhiberi possunt, in specie sessio in decocto radicis ebuli laudari solet. Inter Fomenta pro ventre inferiore & pube excellit decoctum vineæ pervinæ cum alumine, quod commendatur à Foresto. In specie

cinis



cinis nucleorum juglandium cum vino mistus, in uterum injectus, mirificè hunc fluxum sistere asseritur.

Aliàs suffitus ex thure & mastiche, item ex ladano, gummi juniperino, mastiche, nucis moschata, succino, bdellio, & similibus est egregius: vid. Lotichius *lib. 5. c. 1. Obs. 12.* Suffitus salviæ per infundibulum exceptus est

secretum Corbeji. Adstringentibus simul abstergentia combinanda sunt cum essentia succini, essentia travmatica, &c. Nec inutiles sunt fonticuli, femori, tibiis ac humero, pro scopo evacuatorio & averforio inurendi: vid. Vincentius Alfarius à Cruce *de Quasit. C. 14. pag. 287.* Riverius *lib. 15. c. 4. & Zecchius Consult. 35.*

## SECTIO II.

*De*

### APPETITUS VENEREI VITIIS.



*L*editur appetitus Venereus,

1. Quando est imminutus, aut in totum deficit.
2. Quando excedit, quod frequentius observatur.

#### ARTICULUS I.

*De*

##### *Appetitus Venerei Defectus.*

**D**eficientis appetitus Venerei rara sunt exempla; adfunt tamen: Nempe, ubi quædam mulieres Venerem non desiderant, nec ex congressu voluptatem percipiunt, quod symptoma Platerus impotentiam foeminarum appellat. Ejusque exempla videbitis in Platero *Pr. T. 1. pag. 554.* & Riverio *Obs. 19.* à Pacheco communic. Voluptas tamen non est necessaria, quia etiam quandoque sine voluptate possunt concipere: qualia exempla singularia per totum aboluti appetitus Venerei, ac deficientis omnis in coitu voluptatis, recensentur à Platero *lib. 1. Obs. pag. 243.*

#### C A U S Æ.

Causæ deficientis appetitus Venerei variæ equidem esse possunt: In genere tamen omnes ferè referendæ eò,

1. Quod vel omnimodum defectum, vel paucitatem saltem, liquoris istius genitalis minusque spirituosus insequantur; unde & tales foeminae steriles ferè permanent: Hinc scorbuticæ quædam confirmatæ minus ad Venerem inclinant, quia iste liquor seminalis minus spirituosus generatur: Hinc in gonorrhœa notha benigna inveterata, seu fluore albo mulierum etiam paucæ, & nulla in Venerem est propensio.

2. Ubi nullus in Venerem est stimulus, cujus rarissima sunt exempla, ibi malum ex vitio conformationis oriri ar-

Tott. II.

bitror, in specie in his, qui nunquam habuerunt appetitum Venereum: quod etiam pertinet castratio, cum certum sit, foeminas brutorum, factâ in latere incisione castrari, extractis testibus in extremitate cornuum uterinorum sitis. Hanc in foeminis etiam possibilem esse, arbitratur Platerus *in loco supra cit.* Reverà autem factam eandem esse in foeminis, ex aliis refert Sennertus *lib. 3. Pr. P. 2. S. 2. cap. 1. de appetitu Veneris laeso*, dum ovaria seu testes eximunt, faciendo incisuram in regione inguinum superiore. Sed castratio, ut uteriles reddat castratas, appetitum tamen Venereum ex toto an possit delere? ferè dubito. Nam & eunuchi viriles, infœcundi licet, salacitate tamen & voluptate Venereâ aut stimulo non carent, dum liquor prostaticum loco virilis seminis ipsis quodammodo satisfacere possit: cui analogum puto liquorem istum genitalem foemellarum, ex labiorum pudendi lacunis emanantem.

#### DIAGNOSIS.

Signa diagnostica recensentur ab ipsis foemellis.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: malum est extra periculum, nisi quod ferè steriles esse soleant foeminae, quæ nullam perferunt in coitu voluptatem, aut appetitum Venereum.

#### C U R A.

Cura, nisi vitium sit à conformatione nativa,

1. Instituentia per aromatica volatilia, quæ volatilitate suâ & acrimoniam turgescientiam & vellicationem quandam in liquore genitali excitare valent.

(Ecc ecc)

2. Suppe-

2. Suppeditando simul uberiore copiâ alimenta euchyma, illius & spirituum copiam præbentia.
3. Si adsit morbus quidam primarius, scorbustus, fluor albus, &c. à quo dependeat, hic ipse ante omnia erit removendus.

Inter remedia omnia sunt eadem, quæ conveniunt in genituræ generatione deficiente, & penis erectione læsa, imprimis ambrata, moschata, zibethina, &c. Inter alia vid. Riverius *Obs.* 19. communicata à Pacheco, cujus experientiam ipse fecit ad stimulandam in fœminis Venerem.

Externa remedia imprimis ex formicis sunt petenda: scilicet fiat infessus aut balneum ex formicis cum earum cubili collectis, cui balneo insideat fœmina, & sacculo isto formicarum cubili repletum, pudendis admoveat. Item fiat inunctio pubis & pudendorum regionisq; uteri cum o. formicarum volantium id quod commendatur à Riverio *loco supra cit.* Item olea aromatica zibetho & moscho mista, aut balsamum apoplecticum cum zibetho & moscho inungantur genitalibus, in specie clitoridi.

## ARTICULUS II.

De

### *Appetitu Venereo aucto.*

**C**ontrarium abstinentiæ Veneræ in appetitu læso vitium est nimia appetentia Veneris, seu appetitus Venereus auctus, qui aliàs, salacitas, item satyriasis, appellari solet: non secus enim ac in viris penis, ita in talibus fœminis ad Venerem proclivibus clitoris tensus, turgidus, & plus minùs prominulus esse solet. Affectus est talis, in quo mulieres continuo Veneri inhiant, & instar Messalinæ lassari potius, quàm satiari volunt & solent: cujus extremus gradus furor uterinus appellatur.

Ad appetitum hunc Venereum auctum non parum facit pruritus & pustulæ pudendorum & uteri: quæ duo imprimis vitia, si non subindè simul ad Venerem exercendam, saltem tamen ad genitalia scalpenda, continuo impellunt.

## MEMBRUM I.

De

### *Uteri & genitalium muliebrium pruritu.*

**P**ruritus pudendorum seu sinus pudoris, est titillatio in labiis pudendorum & vagina uteri, quæ continuum scalpendi & vellificandi desiderium excitat. Hoc præterquam

quod à fœminis spontè manifestetur, ipse vix possunt celare, cum continuo aut saltem sæpius manus genitalibus admoveat, aut pedes saltem successivè mutuò attollere, & similes motiones exercere soleant: vid. M. A. N. C. *Ann.* 4. & 5. *Obs.* 47.

C A U S A.

Causam hujus pruritus credo esse humorem illum genitalem, qui naturaliter vaginam & pudenda blandè humectare, in congressu verò copiosius excerni solet, utrobique ex glandulosa harum partium textura scaturiens, qui ipse vel retentus diutius, vel in specie acrior aut salior, aut nonnihil acidior factus, talem pruritum inducere solet. Unde & interdum est, ut adsit pruritus uteri cum superveniente liquoris genitalis ejectione, quale exemplum refert Manardes *lib.* 13. *Epist.* 5. hinc & vetulis frequentior contingit, quàm junioribus. Adest interdum simul cocundi libido. Refert Zacutus Lusitanus *lib.* 2. *Prax. Admir. Observ.* 83. talem pruritum uterinum diuturnum & ferè incurabilem factum, tandem causticis seu fontanellis duabus in femoribus excitatis fuisse curatum.

## PROGNOSIS.

Malum hoc interdum est adeò molestum, ut continuo pruritu somnum etiam impediatur.

C U R A.

Quod attinet curam: præmissis, ubi opus fuerit, blandis laxativis, aut blandis sudoriferis, item temperatâ nonnihil, ubi opus fuerit, lymphæ acrimoniâ, externis, quod superest, absolvendum.

Conveniunt ergò infusa & decocta ex fumaria, cichorio, scabiosa, melissa, pulegio, radice bryoniæ, hellebori nigri, polypodii, & similibus. Imprimis Mercurius dulcis est appropriatus, item extractum trochilorum alhandal. Medicamenta nunc vino, nunc, idque sæpius, sero lactis infundi possunt in biliosis, h. e. in quibus acidus sapor, nunc magis nunc minùs volatilis, imprimis dominatur. Hinc essentia rob sambuci, essentia lignorum, & coralliorum cum spiritu lignorum pro scopo alterativo, & diaphoretico imprimis, conducunt.

Externa inter excellent Saturnina, hinc Mercurialia: imprimis linimentum ex lithargyrio auri, quod per diem & noctem in aceto acerrimo maceratum fuit, si hujus recipiatur ℥i. & misceatur c. o. violar. ℥i. vel ℥i. Exinde enim, imprimis si ducantur in mortario plumbeo, fit linimentum molle, secretum expertum Helidæi, quo ipso illinantur partes affectæ. In tali uterino pruritu etiam acetum, in quo solutum sit plumbum calcinatum; pro lotionibus

lotione pudendorum applicatum, insigniter conducit. Alii usurpant acetum per alembicum plumbeum destillatum. Sin contumacius fuerit malum, tunc fiat unguentum ex p. j. unguenti de tutia, & parte dimidia olei hyoscyami: Hæc duo subacta in mortario plumbeo illinuntur labiis pudendi ad sedandum pruritus. Vel

ix. Ungu. de ceruss. ʒss.  
lithargyr. ʒj.

℞ rosac. parum.

Ducantur in mortario plumbeo, f. unguentum. D. S.

Rindernd Sâblein.

Quo imbutus pannus applicatur locis pruritu affectis, & plus minus excoariatis.

Usurpari etiam potest hîc in pertinaciori malo unguentum Foresti lib. 27. Obs. 8. Item ubi contumacius adhuc fuerit malum,

ix. Ungu. pomati ʒiv.  
q̄ii dulc. ʒij.

M. in mortario marmoreo pistillo lapideo f. Linimentum.

Potest etiam addi cerussæ aut sacchari Saturni ʒj.

Pertinaciori in malo vesicatoria in femore, vel fonticulus in crure, possunt excitari ad imitationem Wedelii in Opiol. pag. 137.

Rarum est, quod pruritus uteri fiat ab ascaridibus, injectionibus amaris & abstergentibus evacuandis: vid. Sennertus lib. 4. Prax. P. 2. Sect. 2. c. 14. p. 204. in specie M. A. N. C. Ann. 8. Obs. 75. p. 224.

## MEMBRUM II.

De

### Genitalium pustulis & scabie.

EX simili forsan vitiosa ac nimis acida lymphæ retenta corrosio in labio pudendi ac sinu pudoris, hinc furfures, pustulæ, ac denique pudendorum scabries, interdum oriri solent, adest simul intensus pruritus, interdum simul coeundi desiderium.

Pustulæ hæc nunc sunt saltem mitiores & insigniter prurientes, ac reverà scabiem saltem pudendorum specialem constituunt; quædam verò earum sunt maligniores, & in specie epinyctides vocantur, quarum dolor insigniter intensus est, & qui longè excedit proportionem magnitudinis pustulæ; nunquam enim fabâ majores visuntur, sæpè sunt minores, scabræ, pruriginosæ ac furfuraceæ, squamas de se projicientes, interdum insignem ardoris sensum excitantes,

### CAUSÆ.

Ex causis internis retentis excernendis pustulæ tales benignæ generantur. Præter has

Tom. II.

enim etiam aliæ malignæ oriri solent, à contagio acido Venereo natæ ex congressu cum infectis, rodentes & dolentes insigniter, & successivè in exulcerationes abeuntes.

### DIAGNOSIS.

Malum hoc seu pustulæ tam tactu ægrarum, quàm adpectu Chirurgi, facillimè per se cognoscuntur.

### PROGNOSIS.

Omnes hæc pustulæ, præter molestiam, quam excitant, ac præter contumaciam, dum difficulter curantur, simul contagiosæ sunt, & viros, qui talium sceminarum consuetudine utuntur, simul inficiunt.

### CURA.

In cura universalia ista, quæ vel in genere in scabiosis usurpantur, præmittenda, vel in specie eadem, quæ jam de pruritu uteri fuerunt insinuata, adhibenda, imprimis noduli laxantes, cum radice bryoniæ & esulæ parati. Quod si Venereæ sint pustulæ, ad luen Gallicam cura est dirigenda, aut huic saltem similis instituenda; unde Mercurialia, & quæ ex lignis ad impugnandam luen Veneream usurpantur remedia.

Præter talia imprimis conducunt externa applicanda, quæ aliàs ad scabiem usurpari solent, in specie ℞ rosarum, mistum cum vitellis ovorum, agitur in mortario plumbeo tamdiu, donec colorem mutet; item decoctum calcis vivæ, cui additum sit saccharum Saturni.

Aut, ubi contagium est suspectum, loco sacchari Saturni addatur Mercurius dulcis ad ʒj. vel præscribatur Mixtura composita, quam Sennertus tanquam expertam describit l. 4. Prax. P. 1. Sect. 1. c. 4.

Remedium hoc insigniter commendat Castro in suo Tract. de Morb. mulierum, utpote quod ipsum etiam sine omni nocumento præter pustulas omnia ulcera pudendorum sanat & emendet, si per siphonem injiciatur.

Sequitur post hanc l. 4. alia injectio, quæ fortior est, ubi malum est à lue Venerea.

Aliàs ad furfures & pustulas conducit etiam unguentum, factum ex melle cum myrrha, cui alumen sit additum. Ulteriùs unguentum album camphoratum, aut de lithargyrio, mistum cum ℞ aut ℞ per deliquium in benignis, aut cum Mercurio dulci in malignis, imprimis conducit, si post istas lotiones inungatur. Denique si contumaciores sæpiùs verè pullulantes fuerunt hæc pustulæ, observandum id, quod dicit Castro: *Aperiat fonticulus in crure, ac diu apertus servetur*; quod, ut sit palliativum, forsan etiam impostorium, nihilominus tamen interdum contulisse observatum fuit.

(Eccccc 2)

MEM.



## MEMBRUM III.

De

*Furore uterino.*

**S**UMMUS salacitatis gradus vocatur furor uterinus, dum appetitus Veneris nimium augetur, & eò usque exurgit, ut delirium libidinosum tandem inferat, ad maniam blandiorem, & mitiorem accedens. Nempe affectus hic est complicatus ex nimio Veneris desiderio & delirio, tam virginibus, quam maritatis accidit; quarum sc. mariti aut ægrotant, aut peregrè absunt, hinc illæ diutius à congressu abstinere, item viduis: magis tamen iis, quæ jam gustarunt aliquoties Veneris delicias, quam virginibus. In hoc affectu jam ad delirium propius accedente sceminae fiunt garrulae, loquaces, interdum vociferantur & jubilos edunt, inquietæ sunt, & vix intra domos coerceri possunt, quin foras se proripiant, & interdum per plateas vagentur, iracundæ sunt simul, & non raro obviam venientes, & in specie viros, aggrediuntur, quos ad Venerem interdum sollicitant, renuentes verò verbis interdum, interdum verberibus, malè puniunt: in specie inconditis sermonibus suis multa & varia de rebus Veneris interferunt, & cuicunque argumento aliquid de concubitu semper intermiscere solent: interdum frequenter detrectant genitalia: Imò lascivius interdum in præsentia virorum se denudant, & quæ sunt alia, modò majora, modò minora symptomata. Congressus validus & nervosus, sæpius repetitus, citra ullum aliud remedium, tales sceminas optimè curat. Inter alia Schenckius in *obs.* pag. 142. ubi de Mania, refert, quandam virginem furore uterino percitam hinc inde per plateas oberrasse, & mares ad concubitum sollicitasse, idque diutius, donec tandem in taberna moratoria unâ nocte à 15. viris fuerit compressa, undè optimè sanata, manè domum rediit: Simile exemplum habet Bartholinus *Cent. 2. Histor. 69.* Panarollus *Pent. 3. Obs. 9.*

## C A U S A E.

In perferenda autem hujus furoris uterini natura duo sunt consideranda:

I. Quidem liquoris seminalis fermentatio & turgescencia, & hinc derivanda ipsa Veneris exercendæ appetentia seu salacitas.

II. Adjunctum insigne delirium, quod mitior quædam mania species esse videtur.

In genere effectus hic simillimus est æstro illi Veneris, quo bruta certis anni temporibus percita, v.g. cervi & damæ, simili furore in Venerem ruunt. Jam verò sicut hic brutorum furor est ex turgescencia & effervescencia quadam genituræ in maribus, ita etiam ex lymphæ genitalis turgescencia in sc-

minis contingit, quæ partes genitales irritatæ, & fervidiores redditæ, suavem ac voluptuosam Veneris titillationem concipiunt: unde etiam quædam bruta, v.g. canes Veneris luxuriantes, (*die Bâßen*/) materiam albidam aquosam & nonnihil mucilaginosam sponte & continuo per genitalia effundunt, quod alio tempore non fit; & talibus simul per sanguinem & lympham turgescens, à paribus genitalibus refluam, simili fermentatione massa sanguinea reliqua inquinatur, turgescit & effervescebat uberius. Unde successive spiritus animales & volatiliores & concitatiores fiunt, à quibus velocius simul in cerebro servesscente agitatis, accedente isto pruritu Veneris genitalium, tam insignis in Venerem impetus consequitur: similiter etiam se res habet in mulieribus, quæ lymphæ propria genitali quasi turgidæ aut gravidæ, ista sc. quæ in prostatica circa urethram generatur aut coaccervatur, hujus excitato orgasmo & fermentativa turgescencia, accedente simul forsitan acrimonia ejus volatili ex quodam blando in genitalibus vellicationis aut titillationis sensu, prius in Veneris desiderium auctum incidunt, idque imprimis, si antea consuetæ fuerint aut congressui, aut aliàs habuerint suas pollutiones nocturnas, quæ utraque ubi cessant aut deficiunt, tunc clitoris simul in isto orgasmo tenditur, & turgidus Veneris desiderium magis magisque incendit: Nam hunc clitoridem manifestè tumere, & in furore uterino phlogosin quasi quandam & ruborem concipere, asseritur in *Epist. Bartholinianis Cent. 3. Ep. 94. pag. 407.* Jam verò occasione hujus Veneris titillationis in genitalibus talis spirituum animalium in cerebro excitatur motus, cujus occasione anima concipit actum Veneris: Quo motu spirituum animalium diutius & vehementius continuato, tandem inordinatio quædam supervenit, unde delirium, sed Veneris, excitatur.

Effectum hunc obscurum nonnihil declarant sufficienter pollutiones nocturnæ virorum: In his enim turgescens ex quacunque causa genituræ in veliculis seminalibus, inchoata sua titillatione excitatur talis spirituum animalium motus, unde exinde oritur somnium exercitii Veneris, vel aliud simile, indeque genituræ tandem fit excretio in somnio.

Quoad causas externas seu remotas, disponentes ad hoc malum, sunt omnia ea, quæ istum liquorem genitalem vel augere, vel acriorem reddere, & in turgescenciam insolitam concitare possunt: Qualia, præter assumpta varia aromatibus condita & potum generosiora, sunt vita sedentaria, curisque vacua, lauta diæta, abstinencia à Veneris, habitus succi plenus, &c. Sic Sennertus *lib. 4. Prax.*

*Prax pag. 255.* refert, observatam fuisse quandam feminam ex haustu vini Hippocratici, in quo aliquantulum borracis dissolutum fuit, hoc malum incurrisse; Aliis idem accidisse post congressum cum viris, qui ad Venerem augendam, & voluptatem feminis conciliandam, virile membrum moscho & oleis calidioribus inunxerunt. Nempe effluvia talia odorifera & lympham genitalem & totam inassam sanguineam imprægnarunt. Præter causas istas nonnunquam evenit interdum, ut moniales subindè obnoxie sint huic passioni, cum ordinaria remedia iis non admittantur. Et sanè, si quid aliud, mirabilis uterini furoris in moniali cum copiosissimis pollutionibus nocturnis exemplum Bartholini *Cent. 3. Epist. 39.* ex literis Horstii refert: Quò referenda etiam similis ferè historia Amati Lusitani *Cent. 6. Cur. 97.* Furoris uterini in mortali; sic ex imminente primitus mensium fluxu furorem uterinum norant Bartholini *Acta Hafniensia Vol. 1. pag. 164.* in quem desierat pleuritis spuria, vid. *Acta Hafniens. Vol. 4. pag. 167.*

## DIAGNOSIS

Signa diagnostica ex modò dictis suprâ de habitu mulierum mutato facillè patent.

## PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Recens facillè curatur; si verò negligatur, periculum est, ne malum diutius durans (nam per paroxysmos interdum recurrere solet) nisi maturè supprimatur, in perfectam tandem maniam degeneret.

## CURA.

Quoad curam: Ista, quæ fit per nervosum, validum, & crebrius repetitum congressum, est optima; quæ ipsa tamen, cum interdum denegetur, 4. scopi observandi sunt: Opera ergò danda est,

1. Ut materia peccans in primis viis evacuetur.
2. Genituræ ubertas inhibeat: quod præter diætâ tenacem ea omnia faciunt, quæ peculiari vi genituram absumere, aut saltem alterare, per experientiam cognita sunt, & qualia suprâ in gonorrhœa tam mulierum, quàm virorum, fuerunt recensita.
3. Effervescencia sanguinis, & hinc nata turgescencia liquoris seminalis, dometur per venæsectionem, per absorbentia, & lenia diaphoretica.
4. Spiritus animales corrigendi, eorumque impetuolus motus ad Venerem plus minus impellens sistendus ac coercendus: quod faciunt imprimis opiate & camphorata.

Priori scopo satisfaciunt imprimis vomitoria in paulò maiore dosi, partim, quæ ægram mitigando, partim lymphæ genitalis materiam revellendo, item ægras debilitando & delassando, optimè conducunt.

Pro secundo scopo ad genituræ ubertatem omnia ferè remedia conveniunt, quæ suprâ circa gonorrhœam, salacitatem, ac satyriam virorum dicta sunt, ut radix nymphææ albæ, & quælibet ex ea parata; item vitex, in specie ejus semen, & ex agno casto parata remedia, lactuca, ruta, portulaca, cicuta; in specie ejus semen, folia salicis: dum tempore verno amputantur rami salicis tenuiores, effluere solet ex iis liquor limpidus & aquosus, qui propinatus, ac cum farina in pastillos redactus, mulieribus furore uterino laborantibus omnem ad Venerem propensionem extinguit. Quod etiam facit decoctum foliorum salicis, in specie junioris, aliquoties epotum jejuno stomacho; nam & hoc omnem appetitum Venerum in feminis cohibet, quin & tandem mulieres steriles facit; item extractum foliorum salicis, de quo vid. Ludovici *Pharm. pag. 716.* Hinc semen cannabis, viticis, papaveris & similia laudantur. A quibusdam propterea hæc commendatur emulsio:

℞. *Sem. cannab. ʒij.*

*lactuc.*

*portulac. ā ʒij.*

c. f. q. ▽ *nymph. l. portulacæ f.* emulsio: edulcoranda cum syrupo de nymphæa, pro aliquot dosibus.

Si addatur aliquid de camphora vel opiato quodam, remedium erit eò efficacius: cautè tamen usurpetur propter cannabim. Vel ex semine viticis possunt fieri emulsiones.

Pro tertio scopo ad massæ sanguineæ turgescenciâ convenit venæsectio repetita; hinc usurpentur acida sæpius laudata, in specie succus citri & limonum, granatorum, nitrum, & omnia nitrata, aliquandiu continuata: quibus addantur sudorifera, item serum caprillum copiosè haustum. Alia, ut saccharum Saturni, corallia, & similia, quæ sanguinis effervescenciam etiam compescunt, non sunt omittenda. Quin & bolum ex rebinthina ad evacuandam materiam seminalem commendat Riverius.

Pro quarto scopo optima sunt papaverina, & quælibet opiate, & hinc camphorata. Confirmat hoc Horstius *Epist. ad Bartholinum*, ubi dicit: Se sæpius expertum fuisse in virginibus hoc malo correptis, quod ferè nihil melius contulerit, quàm camphora incensa, & sæpius in potu ordinario extincta, & ita pro potu ordinario ægræ propinata; vid. Bartholinus *Cent. 3. Epist. 39. pag. 147.* Unde camphora tum his omnibus remediis miscenda, imò præferenda, cum simul habeat vim nar-

(Eccccc 3) coticam

coticam & spirituum fixativam. De opio & ejus laudano itidem constat, quod conducatur in genituræ compescenda turgescencia, & spirituum cohibendo motu impetuoso. Exemplum hujus rei clarum refert Bartholinus *Cent. 5. Histor. Anat. 85.*

Externæ conveniunt cataplasmata, balnea & fomenta, tam regioni uteri externæ, quam mammis, ex mandragora, solano, portulaca, ruta, papavere & similibus applicata.

Cicuta quacunque ratione usurpata genitalibus, vel folia recentia, vel succus, impri-  
mis commendatur. Alii laudant Mercurialem cum lenticula palustri, sub forma cataplasmatibus pectini & lumbis impositum. Denique succus agni casti, salicis, lactucæ, hyoscyami, sempervivi majoris, cum aceto lacharo Saturni, camphorâ, & similibus, frigide dictis locis utiliter applicantur.

## SECTIO III.

De

### AFFECTIBUS TOTIUS CORPORIS, QUI SEQUIORI SEXUI EX VITIO UTERI VULGO CONTINGERE DICUNTUR.

**P** Athemata ista, quæ vulgò tribuuntur utero, dictum est originem ducere ex liquoris genitalis plus minus turgescencia & menstruum suppressione. Quod attinet lympham genitalem: si retenta ista materia & coacervata turgescendo, & stimulo dat Satyriasin, adeoque ipsum & furorem uterinum, non dubium est, si hæc ipsa materia diutius retineatur & supprimatur, quod minus aut consuetis pollutionibus, aut congressibus excernatur, & ex retentione diuturniore insigniter alteretur, eam omnino tandem depravari, ita, ut postmodum hæc ipsa insignes in toto corpore mutationes inferre possit. Saltem considerentur alterationes, quæ mulieribus tempore pubertatis accidunt, simillimæ iis, quæ viris obveniunt ex causa eadem: multò magis ergo ex inquinata massa sanguinea, quæ inquinata est ab hoc liquore seminali, varia eveniunt symptomata.

#### CAPUT I.

De

##### *Chlorosi.*

**H**As inter corporis mutationes primo loco considerandus est color pallidus virginum seu chlorosis, quæ alio nomine etiam febris alba virginea, item icteritia alba, appellari solet, & malè ab omnibus ferè autoribus cum cachexia muliebri, quæ vel menstruum secum trahit suppressionem, vel ex menstrui suppressione sequitur, & in qua mulieres non secus ac viri cachectici pallidæ etiam & decolores fiunt, confunditur. Nam posterior hæc cachexia in genere ita dicta ex

æquo omnibus mulieribus, quocunque in statu sint, contingere solet, tam virginibus quam maritatis, tam junioribus quam vetulis; Et hanc cachexiam, quam mulieres cum viris habent communem, semper aut antecedit aut insequitur mensium suppressio. Nam & nominis ratio sufficienter monstrat, esse hunc affectum proprium aut virginibus aut viduis, aut similibus extra viri consortium viventibus, aut quibus mariti non satisfaciunt. Tales enim pallent, aut sublivido potius aut fædo nonnihil colore tinctæ apparent, imprimis sub oculis coronam quandam quasi subcæruleam & subrubescens habere solent, anxie sunt, & non rarò tristes citra manifestam causam, menses non semper suppressi sunt, sed fluunt sæpius ferè statis temporibus, donec malo ulterius procedente tandem & illi emanent. Febricula sæpius adest lenta, & quasi erratica, obscura tamen & ægris ipsis vix sensibilis, pulsus sunt inæquales & varii, vomitus etiam interdum infestat, ac præcordiorum anxietas, &c.

C A U S A E.

Tales vulgò putantur laborare vitio utericali, quod contrahatur ex mensibus suppressis; quod non semper verum est, sed menstrui suppressio supervenit quandoque tanquam effectus: & posito, quod menstrui suppressio sit causa hujus affectus, sicut nec hæc suppressio ex causarum numero omnino excludi potest, cum hanc in maritatis æquè ac non maritatis similia symptomata sequantur: vid. Horstius *lib. 5. Obs. 5. & 6.* ac Timæus von Guldentlee *lib. 4. Conf. 16.* quaeritur; quare tales juvet, & felicissimè restituat congressus cum viro? idque eò melius, quo frequentius



quentius hic ipse reiteratur, habita simul circumstantiarum ratione, quod non fit in suppressione mensium laborantibus. Sanè congressus, qua talis, ad cachexiam sanguinis in genere, & hinc mensium suppressionem curandam, parum aut nihil facit. Scilicet vitium est in liquore genitali suppressio, indeque alterato, & tandem nonnihil corrupto, cuius corrupti vitium massæ sanguineæ communicatum instar fermenti & hanc corrumpit, unde & reliqui hinc discernendi corporis succi, ut & lymphæ, similiter corrumpuntur; hinc successivè talis color, febris lenta, & majores calamitates, & citra ullum diætæ vitium talis pallor & malus habitus, cui tandem necessariò quoque supervenit mensium suppressio, virgines tales affligit. Nam uti genitalis liquor naturaliter constitutus sub pubertatis tempore tam notabiliter corpus fœmineum alterat, & alacritatem, robur, venustatem, & similia cum menstrua fermentatione & mammarum fororatione inducit: item sicut idem liquor genitalis luxuriâs copiosius impetum quendam plus quam humanum, furiosum & quasi brutalem, in furore uterino infert, idque per auctas sanguinis spiritualescentias; ita retentis e contra & corruptis ac alteratis simili fermentativa virtute & totum sanguinem, hinc & spiritus inquinat, & tandem alterat & vitiat, & consequenter corporis habitum pessundat. Pessimum Venerem ergò excreto isto liquore, & à spiritu genitali maris novo quasi fermento genitalibus muliebribus inspirato, denuò spiritualecit, & impetuosius fermentare incipit massa sanguinea, & spiritus alacriores ac volatiliores, motuique elastico aptiores, totam corporis machinam pererrant, & omnes corporis partes animant; unde totum corpus denuò restituitur in statum sanum, & sic redditur ejus color floridus. Hinc postmodum tales fœminæ per conjugium tandem tam elegantes & formosæ fieri solept, quæ antea erant pallidæ & decolores, ut tantum non omnibus sint admirationi. Quæ dixi, confirmari possunt observationibus & historiis affectuum plurium ex simili causa natorum: in specie Panarollus *Pent. 3. Obs. 14.* rectè talem febrem albam ex amore puellarum nubium deducit.

A liquore ergò spermatico coacervato & retento, hinc morâ diuturniore corrupto & inquinato, etiam vitari dixi massam sanguineam & lympham, donec successivè ipsi adeò spiritus & reliqui corporis succi inquinantur. Hinc ex liquore isto genitali retento horrendos hystericos cruciatus cum tetano convulsivo totius corporis mirabili, ac oris tortura in vetula enatos, recenset Panarollus *Pent. 4. Observ. 1.* quæ tamen pristinam consecuta est sanitatem, superveniente uberiore liquoris

genitalis ad aliquot & P profluvio: Id quod etiam Lemnius *de occult. Nat. Mir.* confirmat *cap. 6. lib. 1.* Deodatus *Valesud. p. 177.* Conf. Hæserus *in Herc. Med. pag. 137.* & Hildanus *Cent. 4. Obs. 32.* item *C. 6. Obs. 25.* qui etiam hac ex causa in monialibus graves vomitus oriri asserit. Facit huc etiam, quod in superioribus monui de virgine, sensu tactus in toto corpore destituta, salvo tamen motu in omnibus partibus, idque ex vitio simili, unde & per exercitium Venereum repetitum postmodum fuit curata, teste Boyleo *in Philos. Experiment. P. 2. pag. 75.* Nec rarum est, convulsiones graviores varias & epilepticos membrorum cruciatus supervenire virginibus nubilibus, aut viduis salacibus, quatenus propter liquorem seminalem retentum nervis uterinis, hinc reliquis abdominis plexibus, graviter irritatis, si ulterius spasmos convullivos continuant, & ita ad superiora loca quoque retorquent: Conf. hic Hæchstetterus *Dec. 4. Cas. 2. pag. 110.* Sed rari sunt tales ex vitio liquoris seminalis muliebri affectus, imprimis apud nos, quia aut conjugio præveniuntur, aut ipsa natura pollutionibus spontaneis, vel nocturno tempore, vel cum ipsa menstruatione evenientibus, se liberat.

#### DIAGNOSIS.

Cognitio affectuum horum, & qui ex vitio liquoris genitalis retenti, corrupti & alterati oriantur, difficillima est, ac sagacem, prudentem & solertem præsupponit Medicum.

Febris alba quidem virginea, ex eo ferè cognoscitur, quod citra ullum errorem diætæ successivè inchoaverit, & citra manifestam causam, etiam citra mensium obstructionem, ita processerit, donec negotio ulterius progresso ita curata fuerit. Quin & confirmatur tunc conjectura simul ex eo, si aut virgo humilis, & jamdiu talis fuerit, quæ aliàs per se procax & nonnihil petulantior fuerit, quæ postmodum ita successivè tristis, anxiosa, & in alium statum permutata apparuit: Item si vidua sit, quæ viro juncta cum fuisset, optimè semper se gessit, sed post hujus obitum ita successivè affecta fuerit, imprimis, ubi aliæ causæ, diætæ lauta, vitæ sedentaria, curis vacua, conversatio cum juvenibus, potus generosus & similia alia, liquorem seminalem augentia, accesserint. Reliqua & alia vitia, præter febrem albam virginicam, occasione lymphæ genitalis oriri, præter dictas rationes ex eo ferè conjecturatur, si alia ferè nulla adsit, vel manifesta, vel saltè probabilis causa, vel nulla alia effingi possit occulta, si menses ritè fluant, aut haud ita pridem adhuc fluxerint, sique subjecto modò enarratz conditiones & circumstantiæ simul respondent.

PRO.

## P R O G N O S I S.

Prognosis pro ipsorum affectuum varietate & ipsa etiam variat: Nam quò diutius durant, eò deteriora insequuntur symptomata.

## C U R A.

Curam quod attinet: in ea nil facilius aut melius est; quàm jucundo congressu levare tam molesta hæc mala: vid. Boyle *Phil. Experim.* P. 2. pag. 73. Hippocrates *de Morb. Virgin.* T. 3. Langius *Ep.* 2. & Panarollus *l. 4.* Quod si hoc ipsum non liceat, ad remedia alia accedendum. Verùm pauca admodum, ut ita explicatorum affectuum, ita & remediorum, apud Practicos prostant vestigia, aut si horum remediorum sit mentio, sunt anticachectica. Eò ergò imprimis, quoad indicationes, est collimandum: ut liquoris genitalis vitium corrigatur; & massæ sanguineæ hinc derivata crasis vitiata emendetur; ac denique variis indè ortis symptomatis debitis appropriatis obviam eatur.

Ut à posteriore incipiam, symptomata ipsa quæcunque obvia, eorumque truculentiam, optimè suspendunt & mitigant opiata, specificis mista. Sed hæc ipsa in talibus non curant radicaliter morbum, sed saltem ferocitatem ejus palliando occultant. Quæ ergò liquoris genitalis corruptelam & virulentiam corrigere valent, imprimis erunt camphora & camphorata, quæ non tam absument quantitatem, quàm corrigunt liquoris dicti virulentiam, hinc & massæ sanguineæ dyscrasiam, & spirituum animalium vitia mirè emendant. His adjungatur succinum & succinata. Nam præter vim corrigendi malignitatem liquoris genitalis, & ejus volatile oleosum acidulum ad hystericas & alias convulsionem mirum est auxilium. Myrrham etiam non contemnendi usus putarem, cujus balsamica vis corruptionem liquoris seminalis efficaciter emendat, in specie essentia myrrhæ cum spiritu &is dulci aut spiritu niri dulci parata. Convenit etiam castoreum, & omnia castorina, liquor c. c. succinatus, & &ci, quo febris virginea ferè desperata in Belgio curabatur, præmisso vomitu. Denique ex Saturno parata remedia, tam ejus & seu saccharum, quàm cum &u Di, aut solo, aut & acuato, paratæ ex minio, aut ex minera Saturni pura, crystalli: nam & hæc egregiæ sunt in hujusmodi affectibus primariò, quando occasione talium delirium imminet; siquidem vitiosos sapes succorum corporis corrigere, & præternaturales sanguinis alterationes potenter emendare valent. His addantur moderata acida, ex citro imprimis petita, item ex granatis ac cydonio erunt proficua, non secus ac &, omniaque nitrata omnibus addantur, utpote quæ mala ex corruptione liquoris seminalis & ejus turgescencia solent sistere: c. g.

℞. Conf. meliss. ʒiſſ.  
pulp. citri  
cydon. condit. ā ʒvj.  
ess myrrh. ʒi.  
succini præp. ʒij.  
crist. miner. hni  
castor. pulveris. ā ʒj.  
caryophyll.  
macis  
zedoar. ā ʒj.  
camph. ʒiſſ.

c. f. q. syr. granat. f. Electuarium. D. S.  
Alterirende Latwerge.

His intermiscenda semen extinguentia dicta, ut ex vitice, salice, cannabe, ac similibus parata remedia. Forſan & balsamica vis terebinthinæ, genitalibus locis præsertim dicta, quatenus urinam promover, & loca urinaria emundat, erit proficua.

Venæsectio denique cum prudentia institui, interdum etiam pro circumſtantiarum ratione repeti potest: vid. Hippocrates *l. 4.* quia liquoris genitalis elaborationi obicem ponit, & per consensum ejus turgescenciam refrænât. Verùm, cum rarò occurrant tales affectus, eorum medelam primariam innuisse sufficiat.

## CAPUT II.

De

## Cachexia muliebri.

**A**ltera species affectuum utero vulgò adscriptorum oritur ex mensium impedita excretionem: Inter quos primariò refertur cachexia muliebris in genere sic dicta, eadem omninò cum ista cachexia, de qua alio loco & tempore jam locutus sum, nisi quod in muliebri sexu semper simul mensium adſit suppressio, quæ ipsa mensium vulgò quidem, nunc istius cachexiæ causa, nunc potius, idque ut plurimum, effectus esse solet. Habitus enim sanguinis cachecticus & caco-chymicus, à naturali salina volatili aut spirituosâ crasi deficiens, & in massam crudam ex caco-chylia degenerans, imminutam sanguinis fermentationem menstruat, indeque subsequentem deficientem excretionem, infert.

Certum interim est, quod menses ex quacunque ratione demum suppressi mala cachectica exacerbent, & mille malis mulierum sceminas, speciatim si actu fluentes ex terrore, vel ex alia quadam causa subitanea, suppressantur. Sic enim non tantum inflammationes partium erysipelaceas, ex acido sanguinem coagulante natas, ut pleuritides, anginas, uteri inflammationes, epilepsias, & similia mala inducent; sed & in specie omni menstruat periodo, dum turgescere solet sanguis,



guis, & tamen per loca consueta erumpere nequit, miras ludit tragœdias, superveniunt picæ & insolitæ appetentiæ, disponuntur mulieres ad periculosas passiones sic dictas hystericas, superveniunt epilepsiæ, ac stupendæ interdum convulsiones, tandem melancholiæ ex utero dictæ, similes ex asse melancholiæ hypochondriacæ; superveniunt etiam interdum tumores & scirrhi viscerum, in specie lienis, unde postmodum mala omnia ex splene, tanquam radice esse vulgò dicuntur, cum potius ex morbo primario alio tanquam productum dependeat lien affectus, & consequens sit mensium suppressionis. Ulterius cephalalgia infantæ & contumacissimæ talibus mulieribus sunt frequentes, item palpitaciones & pulsationes, tam in corde, quam in variis corporis partibus, se manifestant, in specie quidem in dorso & lumbis, & hinc in hypochondriis, & quæ alia quamplurima sunt symptomata, donec tandem ex successivè magis magisque corrupto ventriculi fermento digestivo, vitiatoque bilis balsamo, & denique succi pancreatici corrupta natura, variæ cachexiæ, icteri, leucophlegmatis, hydropes, atrophici, ut plurimum chronici affectus difficilè curabiles, ac nescio quæ non mala exinde scaturiant: v. g. epilepsiam ex retentis menibus Venere & puerperio curatam videb. in M. A. N. C. Ann. 1. obs. 86. pag. 204. Melancholiam uterinam cum pertinacibus vigiliis in Horstio lib. 2. obs. 18. convulsiones virginis cum risu ex utero in M. A. N. C. Ann. 3. obs. 304. p. 526. Sic Schenckius lib. 1. Obs. de Epileps. observat uteri vicio suscitatum epilepsiam in puella, erumpentibus primùm menstruis curatam.

### C A U S Æ.

Causam ergò horum symptomatum omnium in cachexia muliebri occurrentium dixi esse interdum suppressionem menstruum.

Utut autem ex omni suppressione sanguinis menstrui omnia hæc mala sequantur, in specie tamen hæc oriuntur, si ex improvise repente iidem fluentes supprimantur, idque ex duplici ratione:

1. Ex sanguinis excernendi retenti quantitate.

2. Ex sanguinis retenti vitiosa qualitate.

I. Quod attinet quantitatem sanguinis excernendi: certè dum nimius est sanguis, ineptus est æquabili per vasa circulationi & debet in præcordiis fermentationi: Unde hic ipse sanguis à debita turgescencia & fermentatione cohibitus, instar musti vasis arctè & strictè obseratis inclusi, minùs spirituosus, minusque volatilis, sed potius crassius, plus minùs viscidus, glutinosus, & à debita crasi omninò degener, vappidus & inertis evadit; unde angustia præcordiorum, pulsationes &

Tom. II.

palpitationes variæ, cephalalgia, aliarumque partium dolores, inflammationes partium, quin & viscerum, in specie splenis intarctus, & similia mala.

II. Quoad secundum: præmonendum, quod licet sanguis excernendus singulis mensibus, ejusdem sit conditionis & naturæ cum eo, qui post excretionem retinetur citra nocumentum in corpore, tamen eo ipso, quo tanquam excernendus separatur per fermentationem menstruum à reliqua massa sanguinea, alterationem quandam singularem circa uteri vasa, ubi effunditur, induit, & proprietatem quandam acrem, erosioni aptam, seu Rm aluminosam, acquirit, ut scitè loquitur Helmontius, & demonstrat in *Tract. Lunare tributum*, & supprimitur. Unde sanguis tali vitioso caractere insignitus, & peregrino acore inquinatus, reliquæ massæ sanguineæ permixtus, insigniter ejus crasin alterare, & à naturali statu deturbare solet; quin & inquinando simul & alterando reliquos corporis succos, vitiosum appetitum, digestionem pravam, & picam, abdominis cruciatus & tormina, tam à mucilagine acida, quam hinc oriundis flatibus nata, passiones & tensiones hypochondriorum, melancholica deliria, & similia mala inducit. Nam in fœminis, quibus ex mensibus suppressis oriuntur morbi, in iis imprimis acidum vitiosum austerum, idque primariò in prinia abdominis regione abundare & tragœdiam ludereprehenditur: id quod & affectus postmodum in nervoso genere & aliis locis inde nati, & methodus medendi per acidum destruentia sufficienter declarat.

### D I A G N O S I S.

Cognito horum affectuum sit aperta per relationem ægræ, quæ referunt, sibi menses esse obstructos.

### P R O G N O S I S.

Prognosis plus minus est periculosa, prout vel minus invaluerint dicta vitia, aut prout eadem vel mitiora vel graviora fuerint: Restituto enim fluxu, omnia cessant, quò verò diutius suppressi sunt, tandem post varias calamitates intereunt.

### C U R A.

In cura ergo talium passionum duo sunt attendenda:

1. Est corrigenda sanguinis & reliquorum succorum inde dependentium vitiosa crasis: speciatim corrigendum est acidum austerum.

2. Stimulanda est fermentatio sanguinis menstrua, ut redeant menses in debitum fluxum.

Conjunctim ut plurimum, & quidem præmissis debitis evacuantibus, remedia utriusque scopo satisfacienda erunt usurpanda; nam

(Fff fff)

fructu



frustrà menses cientur, nisi crasis & fermentatio sanguinis debita restituatur; & denique hæc ipsa vix restituetur plenariè, nisi menses denuò apparere incipiant. Conducunt ergo pro primario scopo Martialia ac similia, vitiosos saponem absorbentia & corrigentia, hinc aromatica, naturalem fermentationem ac volatilitatem sanguinis restituentia. Pro secundo scopo ea conducunt, quæ alias menses suppressos revocare solent, qualia sunt aromatica volatilia, seu salia volatilia plus minus oleosa & aromatica. In genere omnes hi affectus curantur istâ methodo, qua alias cachexia vulgaris, & postmodum mensium suppressio, ab autoribus curari solet, habitâ tamen simul ratione symptomatum urgentium, quæ subindè simul mitiganda veniunt.

Radice curæ constituit vomitus, qui interdum sæpius repetitus mirè confert, sive per antimonialia, sive per asarina, sive denique in robustioribus per helleborismum, instituitur. Sic v. g. oxymel helleboratum Gesneri ad ʒij. propinatum promptè vomitum ciet. Ex purgantibus pilulæ tartareæ & de Ammoniaco Quercetani hîc mirè conducunt; similiter etiam pilulæ de hiera, item de agarico: Nodulis diligenter admiscendæ sunt radices bryoniæ ac hellebori nigri, quibus omnia pro stimulo ratione mensium inserviunt ex colocynthide parata medicamenta. Hinc Martialia & alterantia, quæ vulgò vocantur aperientia, sunt usurpanda. Ex his Martialibus nota est R. ʒ. is Zwelferi. Potest etiam fieri aptissima Martis R. beneficio ~ ʒ. is ʒ. ci, juncti cum ~ vini: Alii croci ʒ. is aperitivi ʒ. ini, cum ʒ. ibus fixis parati, item aliz R. ʒ. is jam notæ sunt. Item vina Martialia, infusionis nempe Martis, v. g. vinum Malvaticum cum limatura ʒ. is & cinnamomo infusa; item vinum Rhenanum extinctione chalybis imprægnatum, & similia, sunt proficua. Pertinet huc vinum medicatum Cnæfeli ad cachexiam virginum.

Pulverem cachecticum Quercetani, item pulverem ad pallidos virginum colores Henrici ab Heer in Obs. 6. lubens prætereo, cum alias sit notus. Remedia hæc Martialia, ubi non habent pro vehiculo vinum, optimè assumantur in decocto vel infuso rorismarini.

Post Martialia sunt aromatica dicta, quæ inter sunt vulgaria omnia aperientia, imprimis lignum sassafras, galanga, semina calida majora, bæccæ lauri & juniperi (quæ simul sunt diuretica.) Hæc autem aromatica, ut superius dixi, cum Martialibus juncta, usurpanda sunt: e. g.

R. Conf. fl. anthos,  
meliss.  
fl. salv. ā ʒij.  
cortic. citri l. anran. cond.

zing. in Ind. condit. ā ʒij.

solut. ʒ. is c. f. p. ʒ. ʒ.

pulv. cach. ʒ. ial. ʒij.

borrac. Venet.

spec. diosabina Myns. ā ʒj.

zedoar.

galang.

cinnam. ā ʒj.

ʒo destillat. sabina ʒ. ʒ.

c. f. q. syr. de artemis. f. Electuarium.

Item convenit ~ ʒi volatil, elixyr proprietatis sine acido paratum.

## SYMPTOMATA.

### I. EPILEPSIA.

Symptomatis cum his morbis conjunctis simul nonnihil est resistendum, pro quorum autem varietate etiam specifica ordinanda sunt: v. g. si supervenit epilepsia, vel morus convulsivi, præter cinnabarina, remedia ex castoreo & succino sunt optima.

### II. CEPHALALGIA.

Si cephalalgia sit uterina, ut vocant, seu cum mensium suppressione conjuncta, tunc habita ratione primarii morbi ordinatis remediis ʒia volatilia & antiscorbutica, ut liquor C. C. succinatus, addenda veniunt, quin & ipsum ʒ volatile succini usurpatum est conveniens.

Externè ad tollendam cephalalgiam convenit sacculus ex succino pulverisato cum essentia piperis irroratus, capitis vertici impositus: Loco hujus ipsum ʒo succini destillatum etiam convenit cum balsamo Peruviano mistum, paucis guttis vertici illitum.

### III. PALPITATIO CORDIS.

Ubi palpitationes cordis, & similes apparenter periculosi affectus, conjunguntur, remedia ex coralliis sunt miscenda, imprimis R. corall. cum spiritu cordis cervi, item ipse ~ CC. maritatus cum camphora, aut liquor C. C. succinatus. In pauperculis convenit pulvis zedoariæ, cum coralliis rubris præparatis mistus, & propinatus.

### IV. MELANCHOLIA.

Quod si melancholica deliria mensibus superveniant suppressis, antimonialia vomitoria sæpius repetenda: hinc appropriatis miscendi spiritus, item pulvis secundinæ humanæ.

## CAPUT III.

De

### Passione Hysterica.

Suffocatio uterina seu passio hysterica appellatur, à primario symptomate, & quod maximè urgere solet, utut non semper, nempe

pe ab angustia præcordiorum, & adjuncta summa in respiratione difficultate, ita appellatur. Nam hæc ipsa respirationis difficultas subindè tanta est, ut mulieres se suffocari singulis momentis putent, imò interdum suffocatz quasi sine ullo sensu & motu sine pulsu aut respiratione sensibili ad aliquod tempus mortuorum instar jacent: Observavit namque Lindanus aliquando mulierem per sex horas sine ullo sensu ac motu ac respiratione & pulsu sensili instar mortuæ jacentem: Imò interdum ad aliquot dies sic jacent, ita ut jamjam sepeliendæ interdum denuò ad se redierint. Exempla præter Schenckium de tali casu videb. in Salmuth *Centur. 2. Hist. 86. & 87.* Aliàs etiam hic morbus strangulatus uteri, item ascensio uteri, ab Helmontio verò uteri asthma muliebre, à Paracello, qui ad epilepsiæ speciem refert, caducus uteri seu matricis, appellari solet, *Tract. de Caduco Matricis §. 2.* Communiter passio ceu affectus hystericus, ab *ὕστέρα*, uterus; à modernis quibusdam suffocatio hypochondriaca dicitur. Ratio tam diversæ appellationis ex dicendis patebit. Ante omnia ejus historia observanda est: nempe tales mulieres, quibus imminet paroxysmus seu jam adest, in ventre infimo seu abdomine lubinde rugitus & borborygmus percipiunt, hinc sentiunt motum quasi undulatorium (*es waltet im Leibe* /) in eodem interdum velut globi cujusdam hinc indè impetuosè moti & agitati, & ab imo loco ad superiora pedetentim adscendentis; adest ferè semper hypochondriorum nunc tensio, nunc distensio: Et quidem tensio, quando conqueruntur de dolore tensivo; distensio autem, quando conqueruntur de inflatione regionis hypochondriorum: item murmur, unà cum flatuum copiosa imprimis per os eruditione, quandoque per anum expiratione, à quorum emissionem notabile levamen percipiunt: copiosissimorum ructuum notatu dignum exemplum habet Bartholinus *Cent. 2. Hist. Anat. 21.* Cum his flatibus subindè oscillationes & pandiculationes crebræ ac similia symptomata junguntur, & imprimis paroxysmum imminuentem antecedunt, aut inchoantem comitantur: speciatim dolores crebri & admodum atroces in abdomine nunc lancinantes, nunc distendentes, nunc ut plurimum contorquentes, nunc fixi, nunc hinc inde vagi sunt conjuncti: rarum est, quod nulli penitus percipiantur: appetitus, imprimis in paroxysmo, ut plurimum est prostratus, & omnia, quæ assument, vitiosa & quasi corrupto quodam sapore imprægnata videntur: Rarum est, quod observata sit intensa fames post paroxysmum: alvus ut plurimum est constipata, & mulieres tales ordinario alvi durioris esse solent; quâ verò apertâ, sive spontè, sive per clysteres, levamen egregium exinde per-

cipiunt, præsertim si flatus simul copiosi erumpant: quinimò mirandi interdum tonitus, & quasi voces horrendæ quædam, ex intimis visceribus exaudiri solent, ut etiam à dæmone credantur obsessæ tales mulieres: Exempla talia videb. in Schenckio: Subindè vomitus ac aliæ dejectiones superveniunt in quibusdam materiæ viridis, flavæ, sæpius acidæ, interdum alieni ac peregrini saporis: quasdam in paroxysmo sæpè inanis vomendi conatus admodum affligit, sed rariùs, semper tamen cum levamine: accedunt his insignes anxietates & angustia circa præcordia, *Hergens-Angst und Bangigkeit* / conqueruntur: *Es sey ihuen nicht anders / als wolte es ihnen das Herz abdrücken*; item dicunt: *Es sey ihnen / als wann es das Herze mit 2. Häusten feste zusammen drückte / oder / als wenn es in einer Presse läge*; Unde mox accedit palpitatio cordis tremula, cum pulsu raro, parvo & debili, subindè intermittente, aliquando superveniente periculosa lipothymia & syncope, & sæpius recurrente, ad sensum omninò abolito: Respiratio imprimis difficillima est, inæqualis, impedita, ita ut suffocatio imminet: Imò in malo graviore respiratio ad sensum est abolita, percipiuntq; mulieres tales simul angustiam in collo & faucibus, simulq; constrictionis quendam sensum, non secus ac si laqueo injecto fauces præcluderentur: vertigo capitis & visus obscuratio imminuentem paroxysmum ordinariò innuunt, in iis sc. quæ sæpius solent eodem malo affligi, & mulieres tales, si easdem incipiat corripere vertigo, certæ sunt de imminente paroxysmo, & hanc esse per consensum stomachi aut abdominis: in ipso paroxysmo quandoque perfecta adest scotomia cum oculorum rotatione, inversione & obtenebratione, & tandem corruunt: Interdum in copiosum risum, ægris licet invitum & inscium, terminatur, qui etiam aliquandiu continuatur; quin & subindè delirium varii generis adest, & in paroxysmo varia non rarò ridicula loquuntur, & differunt delirando: Subindè in paroxysmis gravioribus convulsionem artuum & gravissimi epileptici totius corporis superveniunt insulsi, & tam atroces, ut stuporem injiciant adstantibus, quale robur habent in membris ab epilepsia correptæ, & tunc mutato nomine epilepsia uterina vocatur, & superveniunt nitæ non rarò artuum, brachiorum aut pedum, ac corporis gesticulationes: adest interdum ferè sensuum omnium, tam inquam externorum, uti & motus abolitio: Interdum sensibus omninò integris talia fiunt, utut ægræ aphoniâ correptæ in paroxysmo nil dicere aut significare possint, donec redeunte paroxysmo omnia secum acta memorarentur, eademque etiam enarrent: rariùs tamen in epilepticas perfectas terminatur convulsionem, sæpius abdominis & thoracis tantum-

tantummodò adfunt hujusmodi symptomata. Interdum in graviore paroxysmo, & quidem in principio & incremento, ad tactum frigent: supervenit ut plurimum in statu calor præternaturalis, ac si adesset febris, in largum tandem sudorem finiens, qui calor etiam post paroxysmum aliquandiu perdurare solet, & non sunt securæ, nisi largus sudor superveniat.

Quod attinet subjectum; infestant hæc symptomata omnis ætatis omnisque conditionis scemellas, juniores ac vetulæ, etiam virgines, imò interdum etiam ante mensium fluxum; sicuti etiam non rarò vetulæ, quibus jam naturaliter defecerunt menses, hoc ipso interdum frequentius conflictantur. Symptomata autem talia non sunt in omnibus simul, nec in omnibus eadem, sed in quibusdam pauciora, in quibusdam plura, atrociora & mitiora, sic schlagen oft nach den paroxysmis an dem Mund / Lippen und Gesichtre aus: Ordinariò motiones & plus minus dolores, murmurationes, distensiones, & alia symptomata abdominis, cum præcordiorum angustia & respirationis difficultate, flatibus & scotomiis vel vertiginosa affectione, adesse solent, quæ passionis hystericæ rationem formalem constituunt. Est affectus, si quis alius, complicatissimus; unde tres ferè gradus hujus paroxysmi statuunt:

1. Dum respiratio est libera.
2. Quando hæc impedita; & pulsus ferè cessat.
3. Quando etiam convulsiones superveniunt.

#### C A U S Æ.

Inter causas remotas, quæ tales paroxysmos hystericos in consuetis aut dispositis excitare, aut influetas ad easdem disponere solent, imprimis sunt (1.) passionēs animi graves, in specie ira, in quibusdam etiam terror. Sicut rectè Primerosius ab ira, mœrore, item malo nuncio, affectum uterinum excitatum fuisse memorat. Deinde (2.) odores fortes naribus admoti, aut fortiter nares ferientes, hinc admodum potentes, & mirabilium ac stupendorum sunt effectuum, tam in excitando hoc affectu in iis, quæ sæpius jam conflictatæ fuerunt, quam etiam in eodem compescendo. Ut plurimum equidem suaveolentia, moschus, ambra, zibethum, & interdum rosarum odor, naribus admota cum suscitant: Hæferus certè in *Hercule Medico* p. 311. refert suffocationem hystericam lethalem in muliere puerpera ex odore rosarum; sicuti in virgine ex eadem causa, odore rosarum sc. similem passionem annotavit Langius in *Miscell. Curios.* pag. 46. & ex eadem causa periculosam uteri suffocationem etiam annotavit Timæus von Gindenflee in *seis Cas.* p. 216. quem verò graveolentia subtilia, casto-

reum, asa foetida, cornua raspata & accensa, camphora, &c. odorata compescunt; sicut contrà suaveolentia genitali antro applicata paroxysmum leniunt. Imò ex, quibus maxime infesta sunt suaveolentia odoretenus hausta, iis eadem in paroxysmo ad eum curandum, aut extra paroxysmum ad eum præservandum, intrò propinata optimè conducunt, modò nares non feriant, seu modò talia mulieres non olfaciant. Prostant tamen contraria exempla mulierum, quibus suaveolentia optimè profunt in paroxysmo passionis hystericæ naribus admota, graveolentia verò potius nocent; adeò, ut hac in parte in specie idiosyncrasia muliebris insignis habenda sit ratio. Conferatur hinc imprimis Horstius *lib. 5. Obs. 26. pag. 582. & lib. 10. Obs. 3. pag. 482.* Similiter Bartholinus *Cent. 3. Hist. Anat. 28.* Hæchstetterus *Decad. 4. Cas. 2. Schol. item Decad. 9. & Horatius Augenus lib. 12. Epist. 7.* Conf. Sachsii *Gamarol. pag. 584.* Præterea quoque, quibus profunt foetida, nocent verò luaveolentia, earum omnium non est par ratio, dum quibusdam hæc foetida magis proflint, aliis alia. Mira hæc res est, quoad odores in paroxysmo hoc hystericico: quædam levantur pice incensa, sulphure incenso, castoreo, balsamo apoplectico, &c. Nam si est odor contrarius, paroxysmos incurrunt. Observavi etiam quasdam; quæ maximum solamen à graveolentibus, v.g. castoreo, habent in paroxysmo, hoc discusso, & affectu percurato, dum denuò restitutæ sunt, non sine motione animi & alteratione insigni odorem castorei postmodum perferre potuisse. Ad causas remotas (3.) mutatio status virginitatis, seu virginalis in uxoratum, subinde etiam multum huc facit, in specie si mox fiant gravidæ, & supprimantur menses. Hinc enim observare licet totâ die virgines, quæ optimè odoratissima quæcunque perferre possunt; factæ postmodum mulieres tales, & hinc gravidæ, talia postmodum non amplius citra præsentaneum periculum talis passionis perferre potuerunt: aut etiam si tanquam uxores, nondum tamen gravidæ, eadem perferunt, gravidæ tamen factæ ab iis omninò abhorrent, idque ita toto gestationis & puerperii tempore ferè continuatur, imprimis, si sint nonnihil cacochymicæ: quo transacto, dum denuò ventre sunt vacuo, quædam minùs adhuc citra paroxysmi metum dicta odorata ferunt; quædam e contra eadem iterum optimè perferunt, donec denuò gravidæ fiant. Denique (4.) inter causas remotas, inter assumptadulcia imprimis sunt, quæ ordinariò exacerbant paroxysmos, aut eosdem excitant: v.g. omnia saccharata, omnia syrupifata, mellita, & similia dulcia facilè fermentescibilia, adeoque partim promptè aclescentia flatusque generantia, partim fermentativo impetu conten-



ta primarum viarum alterantia; nociva sunt his mulieribus. Sic novi vetulam quandam ferè 60. jam annorum, quæ à solo passulæ unius usu graves passiones hystericas perlescit. Interim tamen & hic idiolynerasiam habenda est ratio, cum in Bartholini *Act. Med. Hafn. Vol. 2. pag. 207.* referatur hysterica ab omnibus abhorrens, dulcia tamen seu saccharum ferens: Sic aliam novi juvenculam, quæ spiritum cochleariæ non absque passione hysterica assumpsit. Imprimis dulcia si excitarent paroxysmum, optimè tunc curatur per amara, in specie absinthium; amarorum enim ☉ Dosum dulcem saporem, & inde ortam æscendentiam, fermentando optimè corrigit & transmutat: Docet hoc Forestus *lib. 28. obs. 28.* dum refert, quod talibus mulieribus, quæ ex dulcibus paroxysmos incurrunt, decoctum absinthii optimè conferat: Refert idem mulierem, quæ ex ira frequenter suffocationem uterinam passa fuerat, in specie, si aliquid dulcium simul assumeret; cui consuluit, ut extra paroxysmum biberet cerevisiam absinthitem, qua ipsa postmodum à paroxysmo præservata fuit: Plura de syrupo absinthii vid. in *Obs. 30. cit. lib. 28.*

His ita præmissis, in specie pergendum est ad complicati huius affectus causam proximam, & subjectum patiens: de quibus notum est, quod in huiusmodi pathematis vulgo incusetur uterus (vel juxta Riolanum testes & tubæ) qui nempe sanguine menstruo & genitura, aliisvè humoribus vitiatis & corruptis, turgidus, esse soleat subjectum horum affectuum, quatenus partim ipse commoveatur sursum, unde ex commotione catarinæ; in eodem retentæ, tam tetra & maligna miasmata & halitus seu effluvia expirent, quæ superiora versus per corpus nostrum ubiq; perspirabile, effumando, nervosum genus & cor afficiant, indeque omnia hæc symptomata tragica excitent, dum uterus ipse sursum delatus sub formâ globi alicujus in abdomine variè & violenter moti versus cor & diaphragma, tactui se offerat, donec tandem diaphragma comprimendo, & sic respirationem impediendo, anxietatem & suffocationis periculum inferat, unde anxietates. Hæc est vulgaris theoria, quam sufficienter refellunt,

1. Uteri situs, firmissimaque ejus, & quidem immediatè cum intestino recto, & mediare per ligamenta teretia cum osse pubis connexio atque agglutinatio, ita ut non, nisi summâ vi ex hoc situ sursum divelli possit.

2. Anatome ipsa, quæ fraudem similiter detexit. Sæpius in tali passione mortuis mulieribus uterus parvus in naturali situ & constitutione citra excrementorum humorum præsentiam repertus fuit: vid. Sylvius Highmorus de *Pass. hyst.* & Willisius *Tract. de affect. hypochondr. & hyst.* nec non de *Morb.*

*convuls. cap. 10.* uti & *c. 6. p. 92.* Hanc quoque sententiam probat Sylvius aliique modernorum. Ruit ergo Helmontii monarchatus uteri, & ignota actio regiminis. Quod autem vel clitoridis contrectatio, vel odorum ad uterum applicatio, paroxysmum levet, ratio est, quod titillatione istius sensibilissimæ partis voluptuosa spiritus fortiter afficiantur, & ad determinatum motum redigantur, unde motus inordinatus, convulsiones nempe, cæteraque symptomata, remittunt.

Denique 3. quod viri interdum, qui tamen omnium consensu utero carent, simili omnino passione, atque est in mulieribus, dictâ hysterica afficiantur, unde etiam in paroxysmo à forti ligatura hypochondriorum levamen sentiunt: & tales mares semper graviter malo hypochondriaco laborare solent; & non tantum simillima abdominis, quæ tales mulieres patiuntur, percipiunt pathemata, & eundem globi ascendens motum uterum esse, multi muliercularum instar ridiculè asserunt, sed etiam suffocationis præsentissimæ, & faucium constrictionis sensu, apertè & manifestè afficiuntur: item sunt viri, qui odores suaveolentes non possunt ferre. Exemplum apprimè huc faciens viri passione hysterica correpti, unâ cum globo isto in abdomine violenter moto, videb. in Willisio de *Morb. convuls. cap. 5. obs. 6. pag. 77.* Facit huc etiam historia Bartholini *Cent. 1. Hist. Anat. 45:* cujus aurigæ affectus, si mulierem corripuisset, hysterica passio lethalis citra dubium ab omnibus vocata fuisset: Pertinet huc etiam contractiva gulæ affectio cum variis symptomatis hypochondriacis, simillimis hystericis; quam annotat Hæchstetter. *Dec. 5. Cas. 2.*

His ergo ita consideratis, moderni alio modo affectum hunc, tot symptomatibus complicatum, explicant, quorum hypothesis est duplex: I. Sylvius, & qui cum sequuntur, ex acido pancreatis nimis austero, vitiosè in intestinis effervescente, hinc copiosos flatus & vapores gerente, & dolores abdominis & præcordiorum aliaq; symptomata inferente; hinc ad massam sanguineam delato, eam non nihil coagulante, &c. originem huius passionis deducunt; adeoque ad affectus hypochondriacos graviores passionem hanc vulgò hysterica referunt, & per salia volatilia oleosa optimo consilio eam curandam suscipiunt.

II. Alii econtrâ, ut imprimis Willisius, & ejus sectatores, ad convulsivos morbos ac spasmodicos affectus passionem hanc hysterica referunt, quales spasmi imprimis in scorbuticis & hypochondriacis affectibus frequentes esse solent, quorum symptomatum syndrome vocatur *passio hysterica*. Dicit enim Willisius de *Morb. convuls. c. 10. p. 165.* se mulierem illustrissimam passionem hysterica demortuam aperuisse, & utero insonte, invenisse in occi-

(Fff fff 3)

pite

pite principium nervorum sero acri madidum, ac ferè immersum; Deducit ergo passionem hystericam à spiritibus animalibus, principia nervorum intra cerebrum occupantibus, malè affectis, quatenus in confusionem acti, vel humoribus vitiosis perfusi, copulam explosivam sibi adsciscant, quam unà secum in canales nerveos deducant: quod etiam ante Willisium insinuavit Heechstetterus *Dec. 4. Cas. 3. p. 385.* qui apertè asserit, sibi videri ad spasmodicam affectionem accedere uteri errorem, quæ, si reliquis cognatis partibus nervosis communicetur, in hostem assurgant, maximè si vellicatio major accesserit.

Mihi mediâ placet incedere viâ, & utramque certo modo combinare opinionem: Nam quod materialiter seu occasionaliter acidum peccet primariò in hoc affectu, idque vitiosum, tam in quanto quàm in quali, à naturali statu degenerans, multa in hoc affectu occurrentia demonstrant:

1. Quod scorbutica & hypochondriaca subjecta cujuscunque sexus imprimis obnoxia sint huic affectui; unde & scorbuticæ & hypochondriacæ mulieres, licet lenia etiam ipsis propinentur purgantia, ex moto tamen ad intestina copiosius peccante acido acri succo, vel pancreatis, vel quod probabilius, in plexibus nerveis mesenterii, præter tormina acerba, facillimè in hystericos incidunt insignes paroxysmos.

2. Quod sanguis in talibus quodammodò coagulatus esse soleat, à cujus stagnatione in præcordiis anxietates, *ἀσφυξία* & syncopes non leviter exacerbantur, de quo vid. Willisius *c. l. cap. 5. p. 78.* Unde

3. Et per vomitus, à natura sponte aut arte provocatos, bilem æruginosam, porraceam, in quibus peccat primariò acidum, præcipitans bilem in istum viridem colorem, acerbam ac similia in talibus rejicere solent. Unde &

4. Dulcia, quæ facilitè fermentatione accedunt, & hinc copiosos generant flatus, hypochondriacis sunt molesta, & paroxysmos hystericos insigniter excitant, & copia quæ adest flatuum in paroxysmo insignis, ab acido est oriunda, à quacunque oriatur causa externa. In specie acidum pancreatis vitiosum in paroxysmo semper præsens multum huc facit; unde

5. Martialia extra paroxysmum præservativè, & si verò volatilia spirituosâ & oleosa in paroxysmo curativè, præ cæteris succurrunt, quatenus acidum vitiosum absorbendo destruunt & corrigunt, teste experientia: Hinc Barbette *in sua Praxi pag. 81.* medicamenta antiscorbutica applicanda ad passionem hystericam suadet. Et Langius *Commentar. super Fabri Pathol. p. 10.* omnia nobiliora anticolica, & ea, quæ ardorem stoma-

chi, nec non stranguriam compescunt, in hystericâ passione quàm maximè appropriata remedia esse affirmat. Qui affectus modò recensiti omnes ab acido vitioso primarum viarum dependent.

Quod verò præter tale acidum in primis viis etiam spasmi & convulsiones, tam partium abdominis membranarum, quàm partium thoracis & colli musculosarum, simul concurrant, tantum non manu palpari potest. Ut enim

1. Convulsiones istas epilepticas, quæ in fine paroxysmi, interdum & in medio, variis ridiculis subinde & horrendis, ab ignaro vulgo pro dæmoniâ habitis, gesticulationibus superveniunt, taceam; ceterè

2. Spasmos & convulsiones testatur globus iste in abdomine commotus, & sursum versus cum impetu retractus, qui dependet à plexibus mesenterii nervinis, iisque inferioribus uno aut pluribus convulsivis, à quibus simul imæ hypogastrii partes & convelli, & quasi attolli solent, & ita molis cujusdam agitatae aut adscendentis speciem tactui representant. Hinc

3. Sub fine paroxysmi hystericis risus observatur interdum, & quidem hystericis invitis supervenit, qui est reverà risus quidam Sardonicus ex convulsione clonica seu motu convulsivo diaphragmatis primariò dependens; sicut diaphragma tonicè convulsus difficillimam istam respirationem & dolorem circa regionem cinguli infert: Quod & scæminæ post paroxysmum haud obscurè indicant, dum post graviolem paroxysmum sibi zonam, (*die Gürtelstärte* /) i. e. regionem istam, ubi diaphragma costis annectitur, dolere conqueruntur. Convulso autem plus minus diaphragmate, & reliqui thoracis motui dicati muscoli simul convelluntur, dum hos inter musculos cum diaphragmate ex communitate nervorum intercostalium, ex quibus muscoli habent suos surculos, perpetua motus sit proportio.

4. Spasmos etiam testantur dolores illi in abdomine lancinantes, contorquentes, vagi, & hinc inde oberrantes, qui oriuntur à violentis contorsionibus & spasmodicis convulsionibus intestinorum: quales dolores etiam intestinorum in scorbuto, item sexui scæminino in & post partum, solent esse frequentissimi: Nam & hinc est, quod feminis nephriticis cum dolore calculi simul cum vomitibus passiones hystericæ satis dolorosæ contingant; unde tunc dicunt communiter: *Der Stein macht die Mutter reg.* Sicut enim in viris colicæ nephriticæ dictæ tunc oriuntur, dum sc. nervis renum convulsis continuata crispatione ad horum usque principium, plexus sc. mesaraicos, vergit, hi convulsi intestina & stomachum spasmò,



fimo, ratione suorum nervorum ex istis plexibus oriundorum, corripere solent; eadem ratione hæc in nephritide contingunt per consensum, atque alias per se hysterico dicto affectu contingere solet. Talem dolorem abdominis lacerantem & contorquentem, frequentem in infantibus, item in viris, mulieres appositè vocant: **Die schwere Noth im Leibe** / convulsiones sc. quasi epilepticas partium abdominis internarum.

5. Quod si tandem post tormina & manifestæ artuum externorum superveniant convulsiones epilepticæ, hinc dicunt: **Die innerliche Noth bricht aus.** Dum verò ita intestina convelluntur, flatus ab acido vitioso effervescente in iis enati, conclusi, & variè agitati, ac tumultuosè oberrantes, istos borborygmus, murmura, ac similes sonitus varios, quales in passione hypochondriaca & hysterica sentiunt, repræsentant.

Quod ergò modum fiendi passionis hystericae attinet: ex hæcenus dictis innotuit, complicatissimum sanè affectum esse, qui passio hysterica dicitur: compositus nempe, (1.) & quasi materialiter ex vitiosa in intestinis ab acido præternaturali, vel stomachi, vel pancreatico, aliarumque glandularum intestinalium, cum succo biliioso effervescencia; unde copiosi admodum flatus & eructationes proveniunt: & irritationis talis occasione simul acidum in plexibus nerveis mesentericis commovetur, à quibus consequenter isti sonitus & borborygmi, aliaque tam varia & multiplicia abdominis symptomata, quo vitioso acido ulteriùs promoti, etiam sanguinis coagulationes, & in præcordiis stagnationes, oriuntur. His simul conjungitur (2.) quasi formaliter depravatus & perturbatus spirituum animalium motus, primariò quidem in nervo intercostali & vago, hinc consequenter interdum etiam in reliquis nervis, in quibus inordinatus ac explosus iste motus spirituum animalium percipitur: unde sub hujus inchoamento in cerebro vertigines & scotomix, variaque deliria, & sub progressu spasmi insignes in partibus abdominis membranosis, intestinis, mesenterio, & similibus, item simul in partibus thoracis musculosis, ipsoque adeò cordis musculo quodammodò convulso; unde hujus palpitatio, aut ex ejus continuata ferè systole iste compressionis in corde sensus.

Quoad fiendi ordinem: talis est inter symptomata, ex effervescencia ab acido vitioso in intestinis nata; unde ex irritatione ab isto acido partium nervosarum & surculorum nervorum spasmi interni, hinc consequenter capitis perturbatio, & denique membrorum externorum periculosa convulsiones superveniunt, ut v. g. in ira, in esu dulcium, in nephritide; in doloribus abdominis scorbuticis.

Interdum verò præcedunt, præsertim in malo habituali, spirituum animalium impetus & explosiones inordinatæ ex cerebro, eorumque agitationes vitiosæ per nervos; unde scotomix, varii colores ante oculos apparentes, sensus & motus deficiens, & similia inchoante paroxysmo primitus corripunt ægras, & dum ab his inordinatè motis constringuntur & quasi concutiuntur abdominis viscera & ductus, effusa tandem uberius pancreaticâ lymphâ, adeoque commoto sic acido, & abdominis superveniunt symptomata. Et hoc evenit, quoties ab ira, aut terrore; aut ab odoratis nimium, aut simili causa externa, organa sensuum afficiente primariò malum procedit; odores enim fortiter afficiendo commovent sensuum organa, & percellunt spiritus, eosque ad motus inordinatos cogunt, quâ occasione pancreas & porus biliaris conquassata effundunt suos succos. Et prout plures vel pauciores afficiuntur nervorum surculi, rami aut plexus, etiam plurium partium symptomata & actiones laxæ conjunctæ sunt: Sic v. g. interdum tantummodò plexus nervei lienares, interdum saltem stomachici, primariò afficiuntur, & tunc paroxysmi à sinistro hypochondrio incipientes, non uteri, sed lienis vitio, oriri dicuntur, utut sit unum pathema. Sed hæc imprimis, quoad adjuncta convulsiva symptomata, & uberius & elegantius etiam explicata, videb. in Willisio de *Morb. convuls.* cap. 10.

Ex his ergo patet, quod reverà passio hysterica sic dicta uterina sit saltem paroxysmus gravior mali hypochondriaci & scorbuti admodum exacerbati, oriundi imprimis ex irritante acido vitioso, sive vitio stomachi, quod sæpius adjunctum est, sive in specie vitio succi pancreatici genito, & in intestina effuso, à quo primariò oriuntur dicta pathemata, quatenus nervi afficiuntur, affligens potissimum mulieres & fœminas, quàm mares: idque ex debiliore, imbecilliore, teneriore, & magis sensili systematis nervosi textura, & spirituum eorum animalium subtiliorum majore raritate, & faciliore promptitudine in varias motuum exorbitantias & ataxias: vid. Willisius *l. a.* vel saltem, quibus non placet affectio hypochondriaca, est cetera species colicæ convulsivæ gravioris: Nam hæc, dum intestinorum spasmi, ex irritante acido in plexus mesenterii continuati, ad alias superiores partes ex connexione & crebriore concursu nervi vagi & intercostalis evibrantur, etiam angustia, difficilis respiratio, & similia urgent: id quod ex anatome nervorum, quæ hic exactè debet esse cognita, perspicendum, hinc **der Männer rechte Colica/ und der Weiber rechte Mutter-Beschwerung** / à quibusdam ex vulgo pro iisdem habentur.

Odorum



Odorum vis spiritus animales promptè afficit, eosque ad varios distinctos & enormes motus subindè disponit: Et prout variè constituti sunt ipsi spiritus animales, variatque intrinseca eorum specialis differentia, hinc idiosyncrasiæ, eatenus etiam distincti odores in distinctas motuum anomalias eos adigunt: Unde etiam literati, quorum spiritus animales magis sunt volatiles, rarò possunt ferre odores fortes, quin patiantur aut cephalalgiam, aut angustiam quandam circa præcordia; unde mulieres etiam ab odoriferis istis tam facilè alterantur, & in iisdem suffocatio hysterica resuscitatur. Observandum tamen, quod odorifera seu effluvia ista volatilia subtilia non tantùm afficiunt spiritus animales in naribus, sed etiam circa ipsas partes genitales, dum nempe effluvia odorata promptè spiritus istius loci afficiunt, & hos ita alterando eosdem ad determinatum, minusque erroneum seu convulsivum motum disponunt: Id quod ex eo patet, quod augeatur utrique sexui Venerea voluptas, si zibetho, ballamo apoplectico, vel similibus odoratis volatilibus inungatur membrum: conf. Willisius *l. 4.* Præterea tamen & odores tam naribus applicati vel hausti, quàm cum aère attracti, prout variè alterant massam sanguineam in pulmonibus fermentando æstuantem & spiritus animales, similiter non parùm contribuant ad levanda aut exasperanda hysterica symptomata, quæ ex massæ sanguineæ motu, & ejusdem impedito trajectu per pulmones, oriuntur: Nam hinc fumus cornuum aut pennarum accensarum, item castorei olfactus, & similia, angustias præcordiorum lenire, & amplius quasi in thorace spatium efficere asserunt ægræ, quatenus sal volatile istorum subjectorum incensione sui juris factum, cum aère inspirato interiùs attractum sanguinem dissolvit, acidumque ejus absorbet, sicque diuturniorem in pulmonibus moram & stagnationem tollit, & liberiores circuitum ipsi ferè reddit.

Ex dictis hætenus patet: paroxysmatim ingruere passionem hysterica, unde sub hoc respectu nunc accidentale, nunc habituale malum esse, observatur: Habituali in malo uti plures possunt esse causæ, à quibus excitatur paroxysmus; ita etiam variis in partibus internis potest delitescere fomes seu causa occasionalis quæcunque, cujus commotæ occasione propter irritationem hinc inde factam paroxysmus hystericus provocari potest: ut v. g. quando Tackius in *Chrysgon. pag. 93.* notat uteri suffocationem ferè lethalem ex deglutitione frusti integri pellis lardi cocti: Sic in tali respectu non semper eximendæ sunt partes genitales in mulieribus, quia interdum habent rationem fomitis morborum, non quidem, quasi uterus aut te-

stes soli cum vulgo accusandi sint, aut quod uteri perversus motus talia symptomata inferat; sed vel quatenus mentes suppressi, & inde coacervatum fermentum vitiosum, occasionem præbent, uti variis aliis affectibus totius corporis, ita & huic complicato Protheo, uti superiùs monitum, vel eveniendo, vel postmodum exasperando: aut quatenus liquor genitalis retentus & corruptus, & specificè acrior factus, uti partes nerveas irritando, ita & succos corporis quoscunque inquinando, in specie spiritus animales viciando & pervertendo, hos ad varias motuum anomalias disponit, & varia symptomata infert, & ita sicut epilepticos paroxysmos, ita & hystericos affectus inducit: v. g. quoad prius, Poterius *Cent. 3. Cur. 50.* habet rarum exemplum uterinorum affectuum ex suppressione mensium curatorum his apertis. Quod verò ex liquore genitali retento superveniant talia symptomata, patet ex observationibus: Refert namque Forestus *lib. 8. Observ. 25. & 26.* se observasse suffocationem uterinam in vidua ex retentione excernendorum per coitum, & ex vellicatione pudendorum curatum: item *cap. 1. Obs. 29.* lethalem uteri suffocationem annotavit in muliere ex semine, ut inquit, retento ortam: in specie Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. Obs. 85.* quorsum etiam facit exemplum Fonseca *lib. 2. Cons. 33.* qui observavit suffocationem hysterica in virgine, quæ semper, antequam paroxysmus incederet, inexplicabili coeundi libidine tenebatur: præceteris elegans est historiola, quam recenset Gabelchoverus *Cent. 4. Curat. 95. in Schol.* ubi mulier hysterica fuit exsuscitata frictione forti partium genitalium cum oleo spicæ, unde copiosus liquor seminalis fuit excretus. Confirmat denique hoc, quod nempe modò dictæ alterationes circa partes genitales aliquid conferant interdum, quod videamus mulieres quasdam, dum virgines sunt, nihil perpeti de hoc malo aut odoribus, uxoratæ vel maritatæ postquam fuerint, aut gravidæ redditæ, huic malo insigniter obnoxie deprehendi, quatenus in maritatis per spiritum genitalem virilem, & in gravidis per retenta menstrua, succorum varietates & alterationes, & consequenter diversæ spirituum animalium immutationes oriri solent. Sed hæc saltem interdum observantur, adeoque respectu passionis hysterice saltem causæ cujusdam specialis remotæ, non verò proximæ, locum habent.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa hujus mali diagnostica: suffocatio uterina seu affectus complicatissimus pathognomonicum signum vix habet; cognosci tamen facilè potest, ex iis symptomatis.

ptomatis, quæ in historia hujus affectus supra proposita fuerunt recensita.

Suffocatio tamen uterina ab epilepsia vera differt parte affectâ, quod nempe in epilepsia affectæ sint partes externæ; in suffocatione uterina internæ. In epilepsia vera solet deprehendi spuma circa os, id quod non æquè, aut non nisi in desperata ferè suffocatione uterina contingit.

Præterea in epilepticis pulsus cum valido nisi ferit manum tangentis, cujus contrarium evenit in suffocatione uterina.

Et epilepticæ veræ (nempe in 2. vel 3. classe) post paroxysmum vix reminiscuntur eorum, quæ circa ipsas dicta gestavè fuerunt; hysterica verò non rarò istarum rerum firmam habent memoriam.

A syncope differt: quod hæc ex improvviso magis invadat; passio verò hysterica per dicta similiaque ingruentia signa se prodât: in syncope pallor faciei est major; in hysterica verò passio minor, imò ut plurimum rubedo: vid. Riverius *lib. 15. cap. 6.* Sudores in syncope sunt frigidi; nunquam autem in affectibus hystericis: Syncope brevior fit, siue ad salutem, siue ad mortem terminetur; hysterica verò passio ad horas & dies durat; utut interdum syncope cum passione hysterica sit conjuncta, aut illa huic superveniat, quando nempe ab hujus pertinacia vires nimis enervantur: in syncope pulsus cessat; in passione autem hysterica semper percipitur, utut debilis sit: imò ab odoribus gratis syncope sedatur; hysterica verò passio ut plurimum exasperatur.

Ab apoplexia differt, quod antecedentia fuerint alia, ac in apoplexia, nisi suffocatio uterina confirmata sit, non semper pulsus & respiratio abolentur, sed satis vegeta sunt: interdum, ubi gravior est paroxysmus, mortuæ apparent.

Signa, quibus à verè mortuis discerni possunt, sunt vulgo specula & plumæ: optimum est sternutatorium, si nempe forrè in nares insufflatum nihil operari velit: item si vomitorium generosum infusum citra effectus deprehendatur, tunc est suspicio, esse mortuam. Aliàs & D. Prævotius Patavinus nulum remedium efficacius observavit, quàm vesicantia coxis applicata: ubi vesicas excitant, spes est clara de vita, si frustra applicantur, res est desperata.

A colica, malo hypochondriaco, scorbuto &c. non differt realiter, sed saltem variatione symptomatum.

### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: malum hoc rarò est lethale, nisi superveniat gravior syncope, aut graviores convulsiones, utut subindè redeat, & graviores paroxysmos mulieribus inferat,

Tom. II.

quò gravior est paroxysmus, eò periculosior est.

Interdum si non maturè occurratur, potest mulierem, in specie gravidam, necare.

Interim, quò plures partes in consensum trahuntur, adeoque graviora symptomata excitantur, & quò respiratio & pulsus magis aboletur, & lipothymia accedit, eò malum est periculosius: vid. Forestus *lib. 28. obs. 29.* & Platerus *Obs. pag. 187.*

Periculosior interim est, si ex liquoris genitalis retentione & corruptione, quàm aliundè oriatur: vid. Gabelchoverus *Cent. 4. obs. 75. in Scholio*, & Forestus *l. a. in Schol.*

Mulieri graviore suffocatione uterinâ laboranti si superveniat sternutatio, res salva est, juxta Hippocratem *lib. 5. aph. 35.* signum enim est, ut sic dicam, naturæ se ipsam resuscitantis.

In juvenibus ut plurimum cessat hoc malum in partu, aut saltem tempore puerperii cum lochiorum fluxu; in senibus verò, quibus catamenia fiunt suppressa, in iisdem raro perfectè curatur, quin sæpius recurrat.

Præ cæteris pręgnantes, & hinc puerperæ, periculosius laborant hoc affectu: Pręgnantes quidem propter metum abortus, puerperæ verò propter metum suppressionis lochiorum, ac propter insignem debilitatem vitium, aliaque gravia, quæ jungi ferè solent, symptomata.

Interim tamen, utut pulsus, respiratio, omnesque actiones animales quoad sensum cessent, non statim desperandum est, quin potius generosis remediis succurrendum. Sic de hystericis pro mortuis habitis jam sepeliendis, vid. Salmuth *Cent. 2. Hist. 86. & Hist. 87.* Quò etiam pertinet inchoata anatome mulieris, ex uteri strangulatu mortuæ putatæ, quam refert Paræus *lib. 23. cap. 46.* & ex eo Scennertus *lib. 4. Prax. ubi de suffocat. uteri pag. 239.* Vide etiam Forestus *l. a. obs. 27. & 29.* & Lossius *lib. 4. obs. 13.*

### C U R A.

Quoad curam: cum per paroxysmos ut plurimum læviat malum, hi ipsi si verò subitaneam postulent opem, ob id duplex tempus in passione hysterica distinguendum: nempe tempus paroxysmi, & extra paroxysmum. In paroxysmo eò est attendendum, ut

1. Acidum vitiosum corrigatur & alteretur, indeque flatuum proventus nimius inhibeatur.
2. Ut convulsiones & spasmi, sistendo effectos spirituum motus, sopiantur & placentur.

Adeoque in paroxysmo utrique scopo, speciatim priori, optimè satisfaciunt salia volatilia spiritiosa, nunc macria, nunc oleosa: pro posteriore scopo opiatas & camphoratis

(Ggg ggg)

tis

tis in quibusdam mista; Nam omnes non ferunt camphoram.

Extra paroxysmum verò successivè alterantibus, inter quæ primatum obtinent Martialia, evacuantibus & similibus, radix mali tollenda, & quantum possibile, evellenda.

Quod attinet curam in paroxysmo, usurpantur tam interna, quàm externa.

Inter externa eminent.

1. Odorata, tam naribus applicanda, ut plurimum graveolentia, aut saltem fortiter penetrantia, quàm sinui muliebri intrudenda, ut plurimum suaveolentia, eaque nunc sub forma spirituum, aut salium volatilium urinosorum, nunc sub forma suffitus, nunc oleorum: vid. Tachenius *Clave Hipp. Med. pag. 224. & seq.* Pertinent huc sternutatoria in graviore paroxysmo usitata:

2. Umbilico inungenda, aut abdomini applicanda.

3. Clysmata appropriata injicienda ad referendam alvum.

I. Quod attinet: mulieribus hystericis mox odores fortes & graveolentes, pro ratione ægræ, admovendi sunt naribus. Omnibus præfero salia volatilia fortiter penetrantia, naribus admota, v. g.  $\sim$   $\Theta$ is  $\times$ ci acriorem naribus admotum, in vitro angustis, sed longiusculi, colli contentum. Loco hujus etiam  $\sim$  C. C. vel alius  $\sim$  urinosus volatilis naribus applicari potest. Hic spiritus si sit maritatus ac imprægnatus cum castoreo, eò magis præsentaneam affert opem. In usu aliàs communis est castoreum, item asa foetida, naribus admota. Ubi gravior syncope urget, castoreum immittitur in vinum generosum & spirituosum, & ita naribus applicatur; nam sic reactivum, magisque penetrativum evadit remedium. Radix levistici in vino macerata applicatur naribus: Vel

*℞.  $\nabla$  hyster. Lud.  $\mathfrak{z}$ ij.  
essent. castor. vol.  $\mathfrak{z}$ ij.  
 $\dagger$  rutac.  $\mathfrak{z}$ j. vel  $\mathfrak{z}$ iss.*

M. S. *Weiber Schlag Wasser.*

Naribus etiam commodè admoventur suffitus: Quos inter primatum obtinet suffitus succini; item suffitus nucis moschatæ carbonibus injectæ: hinc plumæ & pennæ avium, imprimis perdicum combustæ, vid. Forestus *lib. 26. obs. 32. in Schol.* pili item & cornua animalium combusta, quorum  $\Theta$  volatile acce oleosum nares porenter ferit. Lignum agallochum incensum etiam dat egregium fumum naribus admovendum in hystericis.

Riverius dicit, quod fumus tabaci citissimè excitet hystericas, quod tamen mihi adhuc videtur paradoxon; non minùs, quàm qui fumum sulphuris accensi naribus admovent; nam hoc ipsum omninò rejicio, quia

rarissimè conducere solet, & periculum est, ne acidum sulphuris stigma, quod aliàs in sanis angustias præcordiorum, & difficultatem anhelitus infert, in ægris malum exasperet. Verùm habeatur ratio idiosyncrasia; quibusdam enim magis placent suaveolentia, vid. Horstius, & Hæchstetterus *l. 4.* Interim observandum, quod mulieres, quas lædunt suaveolentia naribus admota non lædant interiùs assumpta, ut moschus, item zibethum cum castoreo, modo mulieres non percipiunt odorem: vid. Horstius *lib. 5. obs. 26.* Solenander *Secl. 5. Conf. 15.* & Horatius Augennius *lib. 1. Epist.* qui utitur pulvere ex moscho, cinnamomo, caryophyllis, & nuce moschata.

Juxta dictos suffitus naribus admotos etiam interdum utero, imprimis genitalibus, quædam admoventur: quæ sunt balsamum apoplecticum, vid. Simon Pauli *Q. B. p. 201.* allium dissectum orificio vulvæ admotum: vel fiat suffitus, per tubum aut infundibulum ad uterum mittendus, quos inter eminet experimentum Paracelsi, quod est suffitus paratus ex verrucis equorum, de quo etiam affirmat Fohseca, nullam esse ab utero suffocationem, quæ ab hoc fumo non sistatur.

*℞. Verruc. equor.  $\mathfrak{z}$ j.  
asa fatid.  $\mathfrak{z}$ j.  
ung. capra  $\mathfrak{z}$ ij.*

M. f. Pulvis: cujus  $\mathfrak{z}$ j. vel  $\mathfrak{z}$ j. carbonibus injecta pro suffitu, per tubum vel infundibulum in uterum suscipiendo, inserviat.

Oleum etiam, ut  $\mathfrak{z}$  succini destill.  $\mathfrak{z}$ o gatis, &  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}$ i foetidum,  $\mathfrak{z}$ o cornu cervi destill. & similia naribus admota, valdè conducunt: observandum tamen, quod hujusmodi oleosa nimis fortia cautiùs sint usurpanda, ubi in apertas convulsiones epilepticas malum desinit.

Quæ si non sufficiant, sed ægræ mortuæ ferè jaceant, ad excitandos & refocillandos ægros inspiretur naribus sternutatorium, ex nicotiana aut radice hellebori nigri, aut per radicem & flores liliorum convallium & majoranæ folia: v. g.

*℞. Castor.  $\mathfrak{z}$ j.  
piperis longi  $\mathfrak{z}$ ss. vel gr. xv.  
rad. helleb. albi  $\mathfrak{z}$ ss.  
pyrethri gr. v. vel vj.*

M. f. Pulvis sternutatorius. D. S. *Erweckend Niese-Pulver.*

Cujus tantillum subindè per calamus ægræ naribus insuffletur; sed cautè.

Cum his II. simul consultum est, abdominis regioni, nempe umbilicali, & scrobiculo cordis, aromatica illinere, aut imponere, quæ spasmus intestinorum cohibent. Ratione inunctionis inungitur  $\mathfrak{z}$ o rutaceum, anethinum, laurinum, castorei, succini,  $\mathfrak{z}$ o  $\mathfrak{z}$ i foetidum, oleum ligni guajaci, spicæ, & c. unguen-



unguentum factum ex sclarea, in butyro cocta, mistum cum tacamahaca abdomini illinitur: quod penetrantius erit, si impragnetur simul camphorâ in oleo amygdalarum dulcium soluta. Mirè enim per se à quibusdam laudatur camphora, itidem cum oleo amygdalarum dulcium soluta, umbilico admota. Inter alia eminet galbanetum Paracelsi.

Mihi saltem in usu est ol. destillatum succini, mixtum cum ana vel dimidio olei destillati spicæ, illinendo spinæ dorsû, regioni umbilicali & scrobiculo cordis; vel quando sunt acriora, excipiantur cum oleo castorei, irino, vel corpore pro balsamo; vel

℞. Ol. destillat. succini  
spicæ ʒ ʒss.  
cumini ʒss.  
macis gr. ix.

M. S. Eufferlich Mutter-Öel.

Consultum est, ut his linimentis desuper imponantur emplastra, idque in specie ex galbano. Utilitissimè galbanum solutum corio rotundo inductum, instar emplastri applicatur regioni umbilicali. Addunt alii tacamahacam, alii castoreum, picem, &c. In medio hujus emplastri recondunt aliquot grana zibethi, ita ut zibethum exactè umbilico imponatur, & hinc forti ligaturâ supra umbilicum firmetur; zibethum enim umbilico illitum suffocationes hystericas insigniter alleviat, modò non nares nimium feriat, v.g. emplastrum, matricale de galbano usitatum, q. s. vel solum, vel cum part. j. galbani in ʒo soluti, malaxetur q. ʒo ʒi foetid. l. cum ʒo succini, vel castorei, vel spicæ inducatur super linteum in forma rotunda.

Vel ad imitationem Hertodtii in Crocol. p. 222. fiat emplastrum magistrale:

℞. Galbani in ʒo l. vino solut. & ad pulvis consistent. inspissati, vel quod melius, simpliciter lento Δe in terebinth. liquat. ʒiij.

Extract. castor. l. castor. pulveris.  
croci ʒij. vel ʒss.

ʒo destillat. succini  
coriandri,  
spicæ ʒ ʒss. vel ʒij.

M. pro emplastro efficacissimo ad usum, asservando in vasculo clauso. D. S. Mutter-Pflaster.

De hoc f. q. induc super alutam in forma rotunda, & ita imponatur abdomini & regioni umbilicali, ut firmiter conglutinetur, facto prius debito litu, imponendo desuper laterem calefactum, ut eò melius operetur remedium. Quibus displicet agglutinatio, in his mediante syndone rubra, emplastro obducta, applicari potest.

Tom. II.

Prodest etiam allium contusum & umbilico impositum. Juxta hæc fortis ligatura circa hypochondria cum quocunque cingulo ut plurimum multum conducit ad levandos paroxysmos & symptomata abdominis: Nam simulatque laxant, mox præcordiorum angustias, imminemtem quasi syncopen, aut imminemtem suffocationem, sentiunt. In specie laudatur cingulum factum ex corio humano sceminino, de cujus usu vid. Bartholinus Cent. 3. Hist. Anat. pag. 177. Sunt, qui commendant cingulum ex corio cervi in coitu transfossi. Neque inconsulta est vellicatio pilorum pubis à multis ceu expertum remedium laudata, quâ facilè ad se redeunt, aut suaveolentium genitalibus circa clitoridem applicatio, imprimis si adsit turgescencia liquoris genitalis: Scilicet immittitur pessus inunctus cum balsamo Peruviano, aut cum oleo nucis moschatæ, in quo solutum est parum zibethi, aut illinantur vulvæ in loco clitoridis balsamum apoplecticum, zibethum, moschus: vel

℞. Styrac. liquid. ʒss.  
bals. apopl. gr. vj.  
zibethi gr. iij.

Ex quibus facta mixtura illinatur lanæ bombicinæ, & ita indatur pudendis.

Vel celebretur coitus, si licitus, vid. Forestus Obs. 25. & 29. in Schol.

Unâ cum his externis ita administratis Ill. perquam necessaria sunt clysmata, quæ optimo cum successu sedulò injiciuntur, ex carminantibus imprimis, aromaticis, & non-nihil penetrantibus parata: quibus interdum salia volatilia addi possunt. Hæc tempore certo applicata & retenta, evacuando intestina, & promovendo flatuum expulsionem, mirè levant paroxysmos.

Alii tanquam singulare laudant clysmata, parata ex decocto hederæ & stris ad ʒbj. & ʒj. Mithridat. Egregiè etiam conferunt clysmata terebinthinata. Vid. Horstius Cent. 8. Observat. 17. item Velschius Hecatost. 2. pag. 42. Willisius de Anima Brut. ubi de Colica pag. 293.

Injiciuntur hæc clysmata vel semel, vel partitis vicibus, præsertim quando flatuum impetus remoratur debitam clysmatis applicationem, vel retentionem. In casu fortiori Willisius de Morbis Convuls. commendat enemata acriora, v.g. ex radice bryon. & carminat. &c.

Clysteres ex fumo tabaci, ut in colica, ita in passione hysterica, perquam sunt egregii.

Denique interdum usu venit, ut in ipso paroxysmo vel lipothymia, imprimis in plethoricis, vena aperienda sit, cautè tamen & circumspectè. Præ cæteris observationem notabilem de hoc habet Panarollus

(Ggg ggg 2) Pens.

*Pent. 3. Obs. 32.* dum hystericam virginem ex nimia sanguinis copia, & circa cor stagnatione, ad mortem usque deductam in ipsa lipothymia per institutam phlebotomiam liberavit. Willisius *l. 1.* in casu fortiori commendat frictiones crurum & pedum, & si ad fortiora procedendum est, cucurbitulas abdomini aut inguinibus applicandas. His ipsis externis adjungenda simul interna, supra insinuata in paroxysmo, omniaque ea penetrantia, nempe  $\Theta$ ia volatilia oleosa & spirituosae; quia promptè sudorem movent, hi autem paroxysmi per sudorem finiri solent: Quibus addantur subindè opiatà ad impetum spasmis coercendum. In usu ergo vulgari sunt amara, zedoaria, abrotanum, absinthium, levisticum, angelica, radix gentianæ, mentha, galanga, pulegium, matricaria, sclarea, hujus decoctum & spiritus, chamomilla Romana & vulgaris, cortex majorum aurantium, semen dauci, baccæ juniperi, allium haustum cum vino, electuarium de alio, crocus, rosmarinus, & similia: quæ omnia eò collinant, ut  $\Theta$ e volatili plus minùs oleoso acidum destruant. De castoreo & asa foetida res est notissima, quod singulariter conducant in hoc affectu, quatenus sua oleositate salinà acidum vitiosum, ejusque effervescentiam, promptissimè compescunt. Johannes Angelicus commendat semen pastinacæ vel aquilegiæ in vino, vid. Willisius *de Morb. convuls. pag. 20. & pag. 84.* Sed modernis eminent ipsa  $\Theta$ ia volatilia, quæ immediatè agunt; unde mixturæ ex  $\Theta$ ibus volat. cum castoreo & opiatis paroxysmum hystericum sedant optimè. Et quidem inter  $\Theta$ ia volatilia, quæ autores ab experientia commendant, primum obtinent  $\sim$   $\Theta$ is  $\ast$ ci ritè præparatus, cornu cervi,  $\Theta$  volatile succini, & omnia succinata;  $\Theta$  sc. volatile à gr. v. ad vi. vel viij. usque ad xij. in  $\nabla$  hirundinum cum castoreo per os propinatum seu infusum. Essentia etiam succini cum  $\nabla$  rectificatissimo parata, à 3ß. ad 3j. in adulta muliere insigniter prodest. Aliàs aliquot saltem guttæ olei succini destill. utut propter nimios ructus, quos solet ciere, ingrati, insigniter tamen conferunt in paroxysmo, vid. Borellus *Cent. 2. Obs. 66.*  $\sim$  &  $\Theta$  volatile fuliginis, & quæcunque  $\Theta$ ia volatilia, interno usu quocunq; modo usurpata, sunt perquam convenientia, hinc etiam  $R$   $\nabla$ i,  $R$  scoriarum reguli  $\delta$ ii, propter alcali nempe, item liquor C. C. succinatus, sunt egregia remedia à gtt. xv. ad xxx. seu 3ß. cum appropriato vehiculo infusa. Pertinet huc etiam essentia castorei, quæ cum  $\nabla$  paratur. Meliori ratione paratur cum  $\nabla$ , maritato cum  $\Theta$ e volatili seu spir.  $\Theta$ ino volatili oleoso, ad imitationem Barbette, qui promptè penetrat castoreum, illudque dissolvit & elegantem & penetrantissimam suggerit essentiam. Quin &

$R$   $\nabla$ i,  $\sim$   $\Theta$   $\ast$ ci vinosus, liquor C. C. succinatus,  $\sim$  carminativus de tribus, &c. castoreo affusi, elegantem tincturam eliciunt. Item  $R$  anonyma D. Langii est essentia specifica hystERICA ex castoreo, asa foetida, myrrha & paucis croco, per  $\nabla$   $\nabla$ isatum parata: quibus speciebus comodissimè baccæ sambuci exsiccata, item zedoaria & galanga, addi potuissent. Baccæ enim sambuci benè maturæ cautè exsiccata, item baccæ chamæactes seu ebuli similiter exsiccata & contusa, cum  $\nabla$  dant tincturam, cujus cochl. j. vel ij. propinata in paroxysmo, eundem mirè levant, provocando brevi post sudorem. Tinct. hæc tanquam expertissima commendatur à Lindano. Loco horum baccæ hederæ arboreæ, seu potius extractum baccarum hederæ mixtum cum tryphera magna est experimentum Prævotii. Loco horum ex granis kermes, aut juxta alios ex baccis juniperi, eodem successu essentia præparatur in hystERICA passione conveniens. Sclarea, ejusque decoctum, ac cum spiritu vini parata essentia, nobilissima sunt, si propinentur in paroxysmo hystérico, imprimis essentia cum camphora mista, non secus ac gentianæ pulvis. Trochisci de myrrha vulgò à  $\delta$ j. 3ß. ad  $\delta$ ij. propinati, egregiè paroxysmum sedant. Potentior est essentia myrrhæ absque acido, cum alcali, tam fixo quam volatili, cum spiritu vini maritato parata, v. g. cum  $R$   $\nabla$ i vel spiritu  $\Theta$ is Ammoniaci vinoso; Sic enim dat essentiam admodum elegantem. Pertinet huc etiam elixyr proprietatis muliebri sine acido per alcalia paratum, item essentia asæ foetidæ, vel cum  $R$   $\nabla$ i, vel cum  $\sim$   $\Theta$ is  $\ast$ ci vinoso parata. Multum etiam conducunt  $\delta$  destill. & rectificata fuliginis,  $\nabla$ i foetidum, ligni guajaci, sassafras, &c. His addendum elixyr uterinum Crollii, dosi  $\delta$ j. ad 3ß. in paroxysmo propinatum, sudorem expectando: hoc enim, præterquam quod paroxysmum levet, si singulis mensibus appropinquante menstruo fluxu propinetur, præservare hunc morbum dicitur, ut nunquā revertatur. Huc etiam pertinet tinctura uterina Mynsichti. Camphora singulariter conducit, in specie si sublimetur cum  $\Theta$ e volatili spiritus  $\Theta$ is  $\ast$ ci, aut si paretur  $\sim$   $\Theta$ is  $\ast$ ci camphoratus; sic enim efficacissimum acquiritur remedium multis affectibus, in specie suffocationi uterinæ, dicatum: quin & camphora accensa in potu ordinario extincta non est frustranea: sicuti camphoram cum oleo amygdalarum dulcium in desperata suffocatione adhibuit cum successu Johannes Pistorius, vid. Velschius *Micromim. annexu Ann. 4. & 5. M. A. N. C. no. 7.* Spiritus secundinæ, imprimis primiparæ, putredinem paratus; item pulvis secundinæ à 3ß. ad 3j. usurpatus insigniter conveniunt. Hisce ultimum, sed nulli cedens remedium, annumerandum est, steruus



stercus equinum maris non castrati, in quo, vulgari licet subiecto, singulare est experimentum contra suffocationem uterinam: vid. Joël *Prax. l. 8. Sect. 1.* Loco succi sunt, qui extractum stercoris equini, vel extractum lichenum equi Schræderi vel Hartmanni commendant. Cum quibus etiam fixa, ut bezoardicum Martiale, cinnabaris ðii nativa, à ðß. ad gr. xv. ☉ card. benedicti & similia usurpantur possunt. Vulgò notum est, quod Jovialia remedia usurpentur: sunt namque, qui rasuram stanni in ∇ appropriata propinatam admodum laudant: loco hujus magisterium Jovis Mynsichtii, item antihecticum Poterii, item bezoardicum Joviale, aut sudoriferum magnum Fabri, sunt usurpanda. Panacea Holstática & ipsum est egregium, Remedium domesticum, sed satis prolicuum, est fuligo furni splendens, *der Spiegel-Ruß* / ut vocant, à ðß. ad ðj. usurpata. Partes animalium ossæ seu duræ, & flores sulphuris, in eadem dosi imperando sudorem, propinantur. Item flores ☿is aut ☿is crudi part. ij. mistæ cum parte j. nucis moschatæ, à ðj. ad ðij. subindè usurpata, singulare experimentum est ad curandam & præservandam uterinam suffocationem: Quibus simul auxiliares manus fert opium, adeoque laudanum hystericum, laudanum opiatum, mithridatium, theriaca, aliaque theriacalia simul proficua sunt in passione hysterica; theriacæ enim parum in vino dissolutum si propinetur, hystericum paroxysmum mirè levat. Potentiùs hoc facit, si addatur ðß. castorei, vel ~ theriacalis camphoratus, in quo extractum vel pulvis castorei dissolutus cochleatim propinetur in paroxysmo; sicut & essentia theriacalis ratione opii & virtutis diaphoreticæ, egregiè conferunt, & 600. alia his similia composita locum inveniunt: vid. Thonerus *l. 7. de morb. uteri Obs. 7.* vel possunt ex tempore præscribi misturæ, quæ in hoc conspiciant, ut sint salinæ volatiles oleosæ: observando semper, attendendum esse, ut paroxysmus largo finiatur sudore; quia sic tuti magis esse possumus à metu recidivæ, siquidem simul atque excitatur sudor, levamen atque declinatio paroxysmi ferè sequitur:

℞. ∇ *menth.*  
*fl. sambuci*  
*matricar. à ðj.*  
*essent. castor. ðiß.*  
 ☉ *volat. C. C. gr. xij.*  
*succini gr. vj.*  
*laud. byster. gr. ix.*  
*syr. cort. aurant. ðij.*

Potest etiam addi ~ ☉xi ðj.

In suffocatione uterina ex nephritide cuiusdam sequentem præscripsi formulam cum successu:

℞. ∇ *cerasor. nigr.*  
*mentha à ðj.*  
*liqu. C. C. succin. ðij.*  
 ~ ☉xi *anis. ðj.*  
*laud. byster. gr. vj.*  
*syr. cort. aurant. ðvj.*  
 M. pro Potione.

Adhuc notandum, quod castoreata, & huiusmodi ☉ia volatilia oleosa fortiter nares ferientia, non omnibus hystericis, quæ spiritus animales & systema nervosum nimis sensibile habent, conducant. Talibus ergo ☉ia volatilia macra, præscribenda. Si vero ab his ☉ibus volatilibus oleosis paroxysmus exasperatus fuerit, ad sistendum eum ~ ☉i dulcis usurpetur, qui hunc impetum in corpore excitatum figit & sistit.

Quando occasione dulcium excitatur paroxysmus, talibus in specie amara, v. g. decoctum absinthii, cerevisia, & vinum absinthites, in & extra paroxysmum conveniunt: item pilulæ ex castoreo & asa foetida: confectur Forestus *lib. 28. obs. 28.*

His & similibus depellitur paroxysmus. Quod si semel sedato paroxysmo metus sit, ne ex acido austero acriori facilius redeat, Martialibus ferè hoc præcaveri potest.

Extra paroxysmum autem passio hysterica, ceu alius aliquis morbus chronicus, curandus est. Opera ergo detur, ut præcaveatur ejusdem recursus, & fomes mali corrigatur & eradicetur. Præmissis digestivis usurpentur vomitoria, & remedia antihypochondriaca & antiscorbutica.

Juxta hæc conveniunt imprimis aromatica, blandis laxativis temperata. Ea ipsa ferè, quæ in paroxysmo ceu appropriata internè assumuntur, itidem post paroxysmum ad curam ipsius mali commodè usurpari possunt, imprimis eadem ferè medendi methodus atque in malo hypochondriaco pro eradicando malo extra paroxysmum instituitur. Unde communiter nodulorum alterantium vino infundendorum usus admodum proficuum est, qui præscribuntur ex carminativis & nervinis uterinis. Huc tamen omnia collimant, quod vel de alcali volatili, vel de ☉e volatili oleoso aromatico plus minus amaro participant, vel acidum absorbeant, vel vi anodynâ plus minus conducant: hinc præter modò allegata sunt radix angelicæ, petasitidis, zedoariæ, levistici, gentianæ & similes, item cortices aurantium, omnia aromata. In specie sclarea est experimentum singulare paucis notum in suffocatione uterina, sive decoctum ejus sive alia ex eadem parata remedia usurpentur. Hinc melissa, rosmarinus, artemisia, salvia, matricaria, & tanacetum: hinc semina carminativa, quæ vocantur calida, cum omnibus aromatis: quibus addantur blanda laxantia, speciatim

(Ggg ggg 3) helle-



helleborus niger, & bryonia, v. g. fit nodulus alterans & laxans:

℞. HB. meliss.  
matricar.  
puleg. ā M. j.  
fol. senn.  
rad. gentian.  
helleb. nigri ā ʒj.  
esula prap.  
costi aromat. veri ā ʒiij.  
zedoar.  
Θ ʒi ā ʒʒ.

Incis. & contus. includ. nodulo.

D. S.

Eröffnender Mutter-Püschel.

Juxta quæ etiam Martialia admodum solent esse proficua pro more aliorum affectuum chronicorum & hypochondriacorum, si ne Martialibus vix curabilem, utut ~ Θ ❖ci succinatus, similiaque volatilia ad gr. 30. simul vesperti tempore somni, assumi possint. Quæ ipsa Martialia etiam curative in ipso paroxysmo, præsertim in iis, quæ volatilia non æque ferre possunt, etiam sunt egregia, quæ inter eminet Θ ❖is compositum mulieribus hystericis admodum conveniens, qualia ex supra dictis de cachexia, de malo hypochondriaco jam nota sunt; uti etiam alia appropriata plus minùs absorbentia.

Cum his usurpanda sunt blanda laxativa: pro quo scopo Helvetius in *Dir. Med.* pag.

116. laudat infusum sennæ & rhabarbari, cui addenda sit ʒʒ. pulveris secundinæ humanæ. Aliàs pilulæ hieræ cum agarico, cum myrrha & castoreo acuatæ, item pilulæ scetidæ communes ad ʒj. (vid. Riverius l. 4.) addito ʒio dulci, pro expurgandis talibus mulieribus conducunt. Verum in talibus hystericis laxandis duo consideranda:

1. Quod in earum malo confirmato, ubi nempe crebrius recurrunt paroxysmi hystericæ, aut difficiliùs sopiuntur, adfit simul pituita vitrea acida, h. e. mucus viscidus, specifico acido austero sapore inquinatus, primas vias occupans.
2. Ut blandis tractentur laxantibus, quia alias paroxysmus redit, & in talibus facilis est dysenteria, si acrioribus stimulantur purgantibus. Ergò saltem blandè stimulantia cum salinis acuatæ usurpentur, aut purgantia blanda beneficio gummatum propinanda sunt.

Ad præcavendum paroxysmum & dysenteriam purgantibus quoque opiata admisceri possunt.

Præter hæc dicta tam in quam extra paroxysmum ulterius conducunt R uterina Mynsichti, item ejusdem extractum specificum uterinum. Riverii pilulæ præservativæ à paroxysmo similiter conveniunt, factæ ex castoreo, asa scetida & laudano opiato.

## SECTIO IV.

De

### VIRI ADMISSIONE LÆSA.

**E**oemina quæcunque, quæ cum mensium fluxu ad generationem quasi se habilitat, & cui pruritu Venereo titillant genitalia, à viro præstanti satisfactionem desiderii recipit per debitum congressum, seu potius per debitam in congressu admissionem. Læditur hæc viri admissio vario officii uteri externi, & vaginæ uterinæ vitio, vel nimis clausæ, aut nimis strictæ, aut angustæ, vel nimis patulæ; seu denique impedita est admissio hæc in affectu, qui vocatur vulgò procidentia uteri, & in inflammatione atque exulceratione uteri.

#### CAPUT I.

De

#### Vaginæ Uterinæ Angustia.

**Q**uoad nimiam angustiam seu clausuram uteri, hæc est vel naturalis, vel præter-

naturalis: Naturalis, de qua suprâ dictum: Præternaturalis verò, quæ est hujus loci.

#### C A U S A.

Fit à coalitu vulneris, rupturæ, erosionis &c. inconcinno, per quem aut vaginæ uterinæ parietes justo arctius conglutinantur, aut excrecentia carnea meatum hunc occludit, cujus exemplum videbit. in Wieri *Obs.* pag. 114. Plures causas, utut infrequentiores videb. in Roonhuysio pag. 114. & 118. nec non Wiero pag. 99.

#### C U R A.

Nimia angustia subinde repetito coitu solet curari. Optimum aliàs remedium est, ut recipiatur rapa exsiccata debitæ magnitudinis, quæ immittatur sinui pudoris, & ita per diem relinquatur; intumescendo enim clausuram laxiorem facit: sin minùs id fiat, per speculum uterinum dilatanda venit. Si verò clausa sit vagina nimis, methodo chirurgicâ

gicâ curatur. At si vagina uterina forsan coalescat post excoriationem aut exulcerationem, malum difficile est, & citra sectionem non potest curari; quæ tamen etiam maximè dubia est.

## CAPUT II.

De

### Procidentia Uteri.

**U**teri procidentia vocatur ita, quia communiter putant, quod uterus extra situm suum naturalem fermè progrediatur, exeat, & ita per pudenda propendeat, ita, ut procidere observetur corpus quoddam rotundum colore carneò, in medio perforatum, nunc magis nunc minus. Verum illi sanè errant, quamvis illam communem opinionem defendere conetur Graafius *de Part. mulier. Generationi inservient. cap. 11.* argumentis tamen maximè imbecillibus. Nam si jam consideramus firmam istam uteri connexionem circa os sacrum cum intestino recto ac partibus vicinis, item per membranas (quibus ligamenta ejusdem lata laxè connectuntur per firmam cum lumbis connexionem) sanè per se patet, uterum planè esse immobilem, & omninò impossibile, ut talis fiat uteri prolapsus, à causa sc. interna, sed necesse est, ut semper concurrat insignis violentia externa, atque ita sit potius uterus protractus, quàm uterus prolapsus. Evenit hæc protractio interdum in partu difficili, dum obstetrices sæpè malè tractant mulieres parturientes & puerperas: fit itidem hoc à nimis valida & violenta secundinarum, utero interdum adnatarum, extractione, cum quibus simul & uterus tandem necessario foras extrahitur, & violenter à situ naturali divellitur. Id quod tamen fieri nequit citra ingens vitæ periculum, ita ut tales mulieres propter vasorum ruptionem & lacerationem partium, ut & inflammationem gangrænescentem, vix ac ne vix quidem salvari possint. Exemplum tale recenset Bartholinus *Cent. 2. Hist. Anatom. 91.* ubi habet uteri extractionem cum secundina lethalem: videatur itidem Hildanus *Cent. 4. obs. 60.* ubi etiam habetur uteri extractio propter violentam secundinæ tractionem. Plura videb. in Berengario, Diemerbroccio *Anat. lib. 1. cap. 24.* Carpo *Isagog. Anat. pag. 25.* Mauriceau *de M. M. lib. 9. cap. 6. Obs. 76.* & Primerosio *de M. M. lib. 2. c. 15.* Affectus autem iste, qui vulgò nomine procidentie seu prolapsus uterini venit, minimè utero propriè sic dicto competit, sed tantùm vaginam uterinam afficit, utero semper in situ ac constitutione sua naturali permanente: ac ob id à modernis genuino nomine prolapsus sinus pudoris rectè vocatur, sitque duobus modis:

1. Quando vagina uteri tota nimis relaxata aut extensa propendet foras, quod interdum fit in partu difficiliore, aut improvida obstericis manu; vid. Roonhuysius *Obs. Chir. lib. 2. pag. 91.* in quo nimis laxatur, extenditur & distenditur vagina uteri, ejusque imprimis membrana interna rugosa: post talem enim difficilem partum facilè evenit, ut non rarò duos digitos latos globosè extra genitalia propendeat, ac in medio sui foramen exhibeat, quod falso pro uteri orificio interno veteres habuerunt. Quod si etiam ab alià quacunque causa, vel interna vel externa, relaxata, aut nimis extensa, & in naturali tono vitiata fuerit ista vaginæ interna membrana, facilè citra uteri affectionem, vel in situ mutationem foras propendere, vel in labiis pudendi hæerere, vel ulterius plus minus procidere potest.
2. Etiam fit prolapsus uteri, quando rugæ vaginæ uterinæ in quadam sui parte laxatæ, aut exesæ, aut erosæ nonnihil, sanguine vel aliis humoribus repletæ, successivè in tantum à naturali tono relaxantur, ut pedetentim extra vulvæ labia propendere incipiant, ita, ut tandem repræsentent corpus amplum, rotundum, angusto collo anhexum; quod collum ulterius intra sinum pudoris se abscondit. Corpus propendens istud interdum in tantum augetur, ut tandem ad capitis infantis magnitudinem quoque accedat, & interdum ad genua usque propendeat; imò interdum alteratum ab aëre externo, vel humoribus, tandem ulceratur, & graveolentem fœtorem exspirat, & pondere suo ac situ dolorem molestum, pariter & impedimentum in progressu, mulieribus affert.

#### C A U S A E.

Causæ hujusmodi protuberantiarum, quas uteri procidentiam dicunt, sunt sæpius internæ, ut plurimum post hæmorrhagias uteri nimias, à sanguine serosiore, aut post diutius continuatum fluxum album, oritur, dum laxatis fibris aut membranis, rugas vaginæ constituentibus, hæ successivè sanguinem aliosque humores colligunt, coacervant, tandemque in tale corpus successivè augentur. Humores isti conclusi successivè corrupti putredinalem tandem acorem contrahunt, sicque in ulcera fœtida corpus proprium exedunt. Quod si tandem superveniente gangrænâ propendens moles abscindatur, tum uterum prolapsum, vel integrum ulceratum, citra vitæ periculum abscissum esse & abscondi posse,

posse, veteres jactitarunt: & cum tactu intus inæqualitatem quandam repræsentet propendens tumor, testiculos vel similia corpora in utero inverso latere putarunt: quæ tamen omnia veterum asserta de utero propendente sufficienter refellit modernorum experientia Anatomico-Chirurgica, in specie Roonhuysen *Obs. P. 1. pag. 91.* & Job van Meeckern, qui in *Observat. Medico-Chirurg. 51. §. 2. pag. 310. sequ.* & in *Append. c. 14. pag. 491.* elegantibus observationibus docet, post mortem mulierum, quæ cum aliis affectibus variis complicatis lethaliibus, & procidentia sic dictâ uterinâ insigni laborarunt, post factam corporis apertionem in talibus uterum verum naturali suo loco & situ constitutum fuisse, & id quod propenderit, solum in vagina uterina relaxata, aut ejus aliquot rugis nimis protensis fuisse, adeo, ut aliquando ingentem talem procidentiam post convenientem in parte sui angustiore, seu collo ligaturam Chirurgi absciderint & relicto filo in loco abscissionis intus reposuerint, post mortem mulieris aliquot dies postmodum eventientem, reppererunt filum parti cuidam laterali in collo seu vagina uteri, ubi relaxatæ quædam rugæ collum istius tumoris constituunt, fuisse annexum, utero in situ naturali laudabiliter constituto. Occasio excrecentiæ talis ferè esse solet læsio quædam in interiore vaginæ superficie, excoriatio aut exulceratio in locis hujusmodi membranosis, Conf. hic Meeckern *l. a.* item Roonhuysen *Heil-Gut lib. 2. cap. 49.* Bartholinus *Cent. 2. Hist. 58.* Salmuth *Cent. 1. Observ. 44.* Kerkringius in *Spicileg. Anat. Observ. 53.* qui refert exempla sarcomatum, nunc in orificio uteri interno natorum, nunc propendentium ex vagina uteri, quæ pro utero prolapsa habita sunt. Sic in *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 121. pag. 199.* prostant exempla excrecentiæ fungosæ vaginæ, uteri prolapsum mentientis.

#### DIAGNOSIS.

Quod ergo attinet diagnosin hujus procidentie sic dictæ uterinæ, duplex solet esse gradus: nempe vel saltem ejus descensus, vel ejusdem prolapsus: moles enim foras propendens vel adhuc est in labiis, vel circa labia pudendi, & hoc saltem descensus uteri appellatur, tuncque apparet exiguus tumor labia pudendorum occupans, quasi extensa pellis, & simul pondus quoddam instat cujusdam ovi majoris circa labia pudendi hærentis: quod si ulterius tumor pergat, ut etiam foras propendeat, propriè prolapsus seu procidentia dicitur, atque tunc apparet tumor ovi anseris instar, modò minor, modò major: interdum habet in medio sui foramen, & tunc est vagina tota relaxata, quæ

foras prominet: interdum citra tale foramen tumor est rotundus, globosus, & tunc aliquot vaginæ uteri rugæ affectæ esse solent: adest in principio imprimis insignis dolor quidam tensivus partium, quibus annectitur uterus, lumborum, hypogastrii, pudendi, & circa os sacrum, aut partibus vicinis annexis, tumore propendente violentè protrahis & tensis: interdum supervenit febris, interdum etiam convulsiones, & substantia propendens corrupta ulceratur non rarò, imò gangrænescit: postquam aliquandiu duravit malum ob consuetudinem dolor mitigatur, & solum ponderis molestia quædam sentitur.

#### PROGNOSIS.

Quoad Prognosin: Prolapsus seu protrahus uteri veri, affectum pronunciat incurabilem Lindanus, utut curâ palliativâ, si non sit lethalis, intus retineri possit. Fit enim talis protractio uteri violenta non, nisi & avulsis & ruptis ligamentis latis, quorum consolidatio, aut repetita connexio, vix per artem potest perfici.

Quod verò attinet reliquas prolapsus putati differentias: descensus facilius potest curari, idque imprimis in junioribus, quàm procidentia.

Quod si dolor, febris, convulsio, aliavè gravia symptomata accedant, mortis causa esse possunt.

Quo magis id, quod prolapsus est, ab ambiente aère alteratum, inflammatum, & gangrænâ plus minus corruptum fuerit, eò periculosius est, nec nisi manuali Chirurgi excisione curabile.

Quod si diutius malum fuerit (nam interdum per plures annos sine vitæ nocumento durat, uti observavit Morisonius *de Morbis mulierum p. 386.*) eò difficilius ad scopum optatum cura pervenire potest.

Alias sinus pudoris prolapsus per se rarò est lethalis, valdè tamen molestus, & periculosus admodum, supervenientibus ulceribus tædiosissimis propter fæctorem.

Si sit à causa interna per successivam relaxationem, facilius curari potest eò, qui fit per violentiam externam: qui verò fit per impetum obstetricis incurabilis est.

#### CURA.

Quod ergo attinet curam: Prolapsus sinus pudoris ex vaginæ vitio quocunque curare qui vult, sequentes tres attendat scopos:

1. Partem prolapsam convenienter in situm naturalem reponere.
2. Repositum adstringentibus commodis vel verè, vel aliis mediis palliativè, in debito situ firmare.

3. Quod



3. Quod si vel reponi nequeat, aut alterata, aut jam corrupta & ulcerosa, aut etiam jam gangrænosâ substantiâ propendens fuerit, abscissione totaliter extirpari debet. Excreſcentia verò qualibet eradicanda venit, idque omnium optimè ferro.

Repositio fieri debet citò, partim ne alteretur ab aëre vel urina, partim quia sic facilius curari potest. Mulier debite corpore situetur, nempe in dorſo jaceat elevatis cruribus, & constrictis natibus, ut ita commodius intrudi possit: Quo factò, manuum ope linteum fotui ex aromaticis blandè discutientibus intinctum circumvolvatur digitis, & interiora versus blandè substantiâ emittens intrudatur, atque in situm naturalem reponatur: postmodum ægræ quies injungenda est. Ante repositionem autem, imprimis si alteratus & relaxatus nimis fuerit tumor propendens ab aëre, commodè fotus aromatici confortantes & appropriati usurpandi sunt, quorum ope denudò restituitur uterus: v. g. fiat fotus ex rorè marino, salvia, absinthio, &c. decoctis in vino, aut vini & aquæ partibus æqualibus, aut ∇ ferrariorum: Item fotus ex decocto allii in lacte, quod Joël commendat: aut coquantur folia & baccæ lauri, menthæ, flores sambuci, ac summitates artemisæ, in vino adstringente: quo fomento humido, repidè cum linteis applicato, aliquandiu fomentetur sinus pudoris prolapsus, ut partim tumor propendens, partim labes contracta cortigatur. Hinc pro scopo repositionis & firmationis conveniunt omnia alia remedia, quæ in ano prolapsò, item quæ in hernia intestinali, dicta sunt. Communiter suaveolentia naribus, foetida tumori propendenti, applicant, persuasi de antiquata opinione, utrum, ut talem, delectari suaveolentibus, quibus ut vicinior sit, sursum repat. Aliàs ubi repositio est difficilior, singulare experimentum est Helidzi suffitus institutus ex stercore bubulo siccato, cui adhuc præstantior, & ab omnibus decantarum experimentum, est suffitus pellis anguillæ salitæ, in fumo exsiccata & pulverisatæ, ex qua, carbonibus imposita, fumus vulvæ per tritorium excipiat; suffitum enim præbet excellentissimum ad repositionem uteri. In defectu hujus quibusdam experimentum est ovum gallinæ putridum, quod, rupto cortice ipsius, panno subtili vel lanâ exceptum immediatè tumori propendenti applicatur, & mirè confert ad reponendum prolapsum sinus pudoris. Est experimentum Foresti, Stœckeri, & aliorum. Quidam laudant pro hoc scopo inunctionem regionis ossis sacri & circa os coxendicis pinguedine ursinâ, aut erinacci, item applicationem emplastri magnerici contra herniam: Sed an hæc tan-

Tom. II.

tum valere possint? dubito. Jubent quidam pro utero reponendo, ut mulier terreatur; quia sic ferè spontè retrahatur sinus: nempe ut Chirurgus, vel Medicus, ferrum candens ipsi tunc manu ostendat, ac stimulet, quasi vellet uterum eo tangere; sic enim, muliere terrefactâ, introcedere, uti ex Castro refert Sennertus *lib. 4. Prax. pag. 95*. Zacutus Lusitanus, & ex eo Riverius *in Praxi*, terrorem per mures vivo filo alligatos per mulieris crus sinistrum discurrere permittunt. Quidam cucurbitulas majores cum flamma inguini, umbilico & sub mammis apponunt.

Repositus sic sinus prolapsus firmandus & retinendus est, vel verè, vel palliativè: verè remediis convenientibus adstringentibus, tam inquam externis: Nam & internè vulneraria adstringentia, & ex iis parata decocta à quibusdam usurpantur, quæ sunt ex herniaria, pilosella, polygono, radice lymphitij, nucè cupressi, betonica, totmentillâ, & similibus.

Cum etiam flatus intestinorum, turgescentiâ suâ stimulant alvum, malum exasperare, & ad recidivam disponere possint, propterea crebriorem usum seminis anisi & fœniculi convenienter suadet Poterius. Ad dantur etiam semina 4. calida majora decoctis vulnerariis, ut præcaveatur statum nimis proventus, ne quodammodò denudò protrudatur substantiâ modò reposita.

Prolapsui sinus pudoris per externa fomenta adstringentia, nunc sub formâ injectionum, nunc fomentorum vulvæ extrinsecus applicandorum, nunc suffitiuum modò laudatorum, nunc pessi ex lana carminatâ hujusmodi decoctis adstringentibus intincti applicantur. Parantur talia fomenta ex adstringentibus alias cognitis, v. g. ex gallis, foliis quercus, myrti, prunorum sylvestrium, ex equisetis, alchimilla & millefollo, corticibus granatorum, sumach, & similibus, quæ decoquuntur in ∇ ferrariorum: quibus etiam potest addi parum aluminis, eo nempe in casu, quando partes non sunt excoctæ aut exulceratæ, & quando sunt indolentes; alias talia acia intermittenda sunt: e. g.

℞. Rad. symph. maj. ʒj.  
gland. no. vij.  
malicor. ʒj.  
alum. ʒj.

Coqu. in vino rubro ad medias.

D. S.

Anhaltende Behung.

Hoc ipso decocto fomentetur sinus pudoris, & etiam pessus ex lana vel spongia hoc ipso ebria immittatur, ut eò melius firmetur.

(Hhh hhh)

Præterea

Præterea decoctum aluminis aut musci quercini pro foru, aut etiam pro injectione in vaginam uterinam, commodè usurpatur. Decoctum etiam gallarum in  $\nabla$  ferrata, utero injectum, ceu admodum proficuum laudatur: Si in forma pessorum & globulorum usurpentur, cauti simus, ne pessi tales nimis magni sint & irritent vaginam uterinam; metus enim est, ne excitetur fluxus albus, qui tunc solet malum subinde exasperare. Radix & folia urticæ contusa, & instar cataplasmatibus imposita conferunt. Præterea non incongruum est, ut continuentur suffitus ex stercore vaccino aut equino. Item ex pelle anguillæ aliisque similiter foetentibus. Loco horum ex aceto, succino, thure, mastiche, gummi juniperi, & similibus forsan magis sunt proficui. Hinc pinguedine ursi inungatur regio ossis sacri, item regio pubis. Quidam ceu singulare laudant, si sumatur chrysanthemum Peruvianum, quod vulgò vocatur flos solis, qui coquatur, & decocto pars benè fomentetur, quo facto regio dorsi lumbaris cum axungia seu pinguedine ursi inungenda, ut firmetur tumor uteri prolapsus.

Quibus placent, possunt applicare emplastrum regioni umbilicali & hypogastricæ, ita ut pubem versus pertingat, aut ossis sacri, ex opoponace, galbano, tacamahaca, & similibus, aut etiam ceratum ex solo galbano. Alii præscribunt tale emplastrum:

*℞. Olibani,  
mastich.  
opoponac.  
galbani  
serapini  
terebintib.  
styrac. liquid.  
pic. sic. à p. æqu.  
cera parum.*

Fiat Emplastrum.

Hoc posterius circa lumbos, & anterius circa pubem imponendum pro firmando prolapsu.

In malo graviore, aut inveterato, aut sæpius recidivante, thermarum usus est optimus. Conf. M. A. N. C. *Ann. 6. p. 89. & 7. obs. 57.*

His si nequeat denuò firmari propendens tumor, palliativè firmetur, & intrudatur in vaginam uterinam globulus cereus, & gestetur; vel factus ex subere, cerâ candidâ; aut massa emplastri, facta ex cera, colophonia, gummi elemi & similibus obducto: qualium globorum, aut rotundorum, aut oblongorum, aut pyriformium, optimam descriptionem & delineationem videbitis apud Rhumelium, & imprimis in Morisonio *de Morb. mulier. lib. 3. c. 5. Part. 1. 23. cap. 41.* Sculteto *lib. 22. in Hildano Cent. 4. Obs. 61.* Hi globi immittendi exactè respondeant amplitudini vaginæ, ne nimis parvi procidentiam non im-

pediant, nimis verò magni vaginam non irritent, aut nimis dilatent, & ad fluxum album stimulent; unde commodius erit, subligaculis idoneis pessum firmare. Consultum autem est, ut in medio sint perforati, & instructi filo, ut partim mensibus concedatur transitus, partim verò, ut pro lubitu possint extrahi, quando libuerit, in specie, si forsan maritus ingressum moliatur; sic diu superviunt sine molestia, quin imò concipiunt & pariunt: extra tempus aut congressus semper debent gestari hi globuli.

Putant vulgò, hos globulos intrudi in uterum, quod impossibile, sed hærent tantum in vaginæ summitate; nam replendo exactè laxitatem, & simul hinc propendentem tumorem impediunt & fulciunt: Cavitas enim uteri tam parva est, ut impossibiliter possit capere, aut si capiat, non possent tam facile extrahi & reponi hi globuli. Loco globulorum Sennertus facit mentionem annulorum sinui pudoris intrudendorum, quibus similiter prolapsus tumor superius retinetur. Hi similiter nullo modo ad uterum pertingunt, sed rugas saltem vaginæ distentas & laxatas, inde egressum molientes, firmant & fulciunt, & ita malum palliativè curant.

Quod si verò excrescentiæ sint, aut saltem tumor ex relaxata una alterave vaginæ ruga, aut sinus pudoris prolapsus sit, alteratus ab aëre, & vel corruptus vel ulceratus, in tali casu optimum est, ut radicitus abscindatur: quod fit sine periculo, injectâ prius ligaturâ cum filo; hinc instar ulceris curetur, vid. Paræus *lib. 23. cap. 41.* & Rousselus *de Partu Cas. cap. 4.*

## CAPUT III.

De

### Inflammatione Uteri.

C A U S Æ.

**U**teri inflammationis causa proxima, sicut omnium inflammationum, est sanguis intra poros uteri stagnans.

Causæ remotæ & occasionales frequentius sunt coitus nimius, aër frigidior post menses, aut mox à partu admissus, partus difficilis, contusiones & lacerationes uteri à partu difficili, & vulnera, vid. Forestus *lib. 28. obs. 42.* nec non menses & lochia intempestivè suppressa.

### DIAGNOSIS.

Cognoscitur, & à vicinarum partium inflammatione distinguitur per tumorem, æstum, dolorem tenivum & gravativum genitalium, inguinum, hypogastrii & umbilici, qui post immissum digitum in genitalia auge-

CAPUT IV.

De

Uteri ejusque vaginæ ulceribus.

augetur, & interdum ad coxas, spinam dorſi & ſcapulas uſque extenditur; unde propter diaphragmatis compreſſionem & pleuræ conſenſum, ſuffocatio imminet: percipitur ſimul fervor, unâ cum oriſicii interni duritie & retractione: vagina uteri fit rubicundior cum venulis turgidioribus, menſes & lochia ſupprimuntur, mammae quaſi inflantur & dolent, adeſtque ſimul nunc alvi, nunc urinæ ſuppreſſio: conjuncta eſt febris ardens continua, interdum lypyria cum ſiti, linguæ ariditate, cephalalgia & delirio, convulſionibus: de quibus vid. Hippocrates *lib. 2. de Morb. mulier. 1. 20. 54.*

PROGNOSIS.

Inflammatio uteri malum ſatis periculolum eſt, quæ, imprimis ejus fundus, facile in gangrænam abit: vid. Hippocrates *Aphor. 43.* & Hercules *de Saxonia Praelect. P. 3. p. 208.*

De cætero tutius eſt, quando inflammatio hæc diſcutitur, quam ſuppuratur; quia ſuppuratione abſceſſus, ſi ad cavitatem abdominis pertingat, novum periculum excitat; quia pus per inguina rarius evacuatur, uti hoc Benediſtus *de Curat. Morbor. cap. 5.* annotavit; aut per alvum expurgatur, quod obſervavit Rhodius *Cent. 2. Hiſt. 89.*

Denique uteri inflammatio interdum in ſcirrhum degenerat, qui affectus difficilis ſatis eſt, & ur plurimum hydropem conjunctum habet: quo præſente, doloris & ardoris & reliquorum ſymptomatum remiſſione tumor, renitentia & gravitas hypogaſtrii, atque crurum remanet.

CURA.

Quoad curam: In primo inflammationis principio revulſionis cauſa venæſectio inſtituatur in brachio, & altero die interjecto clyſtere in malleolo: vid. Sennertus *lib. 4. P. 1. S. 2. cap. 13.* & Hercules *de Saxonia l. 4. p. 208.* Poſt clyſteres applicentur temperati, emollientes & reſolventes, ex lactuca, malva, violaria, floribus chamomillæ, ſambuci, verbaſci, in  $\nabla$   $\Psi$  decocti, & cum electuario lenitivo, ſyrupo roſarum ſolutivo atque  $\Phi$  injecti. Ratione alvi evacuandæ ulurpetur decoctum tamarindorum vel paſſularum minorum, cui infuſa folia ſennæ cum cremore  $\zeta$  ad imitationem Timzi.

Externè ſotus aut cataplaſmata reſolventia & anodyna, qualia parantur ex malva, althæa, pulegio, artemiſia, meliloto, floribus verbaſci, chamomillæ, in  $\nabla$ , vel ſimplici, vel  $\Psi$ , aut cum vino coctis, peſtini applicentur in incremento, & ſtatu morbi continuanda: ſicut etiam emplaſtrum de galbano crocatum & reliqua reſolventia ulurpâri poſſunt.

Tom. II.

Interdum uterus ejusque vagina exulceratur.

CAUSÆ.

Cauſæ horum ulcerum ſunt vel internæ, ut lochia retenta, & inflammationes ſuppuratæ, ſordes intra rugas retentæ, foetus & mola corrupta, gonorrhœa maligna, fluor albus nimis acris, aliorumque humorum acrium diuturnior affluxus; vel externæ, ut frequens & violentior coitus, vaginæ attritio, partus difficilis, &c.

DIAGNOSIS.

Ulcera hæc cognoscuntur nunc ſolis oculis, nunc vagina uteri per ſpeculum uterinum diſtenta; vel ſi profundiora & in ipſo utero fuerint, ex dolore & mordicationis ſenſu, & quidem moleſtiore, ſi partes hæc contrectentur, v. g. in coitu, vel acrioribus injectis.

Signa hæc confirmant fluor albus, retentio lochiorum, & acriorum applicatio, excretio purulenta, ulcus veſicæ propinquius, miſctio frequens, ardor urinæ, & ſi poſterior pars vaginæ affecta, tenemus: quibus tandem febris ſymptomatica lenta ſupervenit, cum crebris horroribus & lipothymiis: vid. Hippocrates *lib. 1. de M. M. 1. 88.*

PROGNOSIS.

Uteri ejusque vaginæ exulceratio ſemper eſt periculola; ulcera enim horum difficiliter conſolidantur, & in fiſtulas plerumque degenerant, tandemque hydropem excitant, imprimis ſi ulcera fuerint majora.

In vetulis, & quibus major humorum affluxus, difficiliter curantur.

Ulcera ipſius uteri, etiam poſt inductam cicatricem, mulieres reddunt ſteriles, vid. Hippocrates *l. 4.* utut Primerofius *l. 2. c. 12.* & Rouſſetus *de Partu Caſar. cap. 4.* teſtentur, quasdam poſt enormiora ulcera concepiffe.

CURA.

In cura habenda eſt ratio cauſarum & ſymptomatum: unde ulcera à cauſa externa, v. g. coitu violentiore, ſolis conglutinantibus tractanda: ubi humorum acrimonia peccat, hæc corrigenda & vacuanda. Ante omnia dolor mitigandus, pus & reliquæ ſordes aciores detergantur.

Internè conveniunt vulneraria mundificantia, e. g. Decoctum ſummitatum hyperici in cereviſia vel ſero lactis, quocunque tempore bibitum; vel

(Hhh hhh 2)

Æ. HB.



℞. HB. heder. terr. m. j.

plantag.

sanic.

summ. hyperic. ā m. fl.

ras. C. C. ʒiij.

Coq. in f. q. ∇ simpl.

Colat. ʒviii. adde

ʒyr. corallior.

de symph. Fern. ā ʒj.

M. D. S.

Mutter-reinigender Wund-Tranck.

De quo quater in die bonus haustus cum  
gutt. 3. vel 4. bals. sulph. hauriendus.

Convenit quoque elixyr proprietatis, manē 30. ad 35. gutt. à meridie liqu. ʒis Oar. ad 25. gutt. Externè conveniunt injectiones uterinæ ex decoct. summitat. hyperici & florum verbasco. c. ∇ ʒx: Item

℞. Lact. chalyb. lbj.

tereb. c. vitello ovi sol. ʒß. ad ʒvj.

mellis rosat. ʒj.

Misc. S.

Reinigende Einspritzung.

Sæpius vaginæ uterinæ injiciatur pro ulcere mundificando & consolidando.

## SECTIO V.

De

### CONCEPTIONE LÆSA.



Conceptio læditur quatuor modis:

1. Quando est falsa, ita ut mulier quidem se æstimet gravidam, cum tamen non sit: quod fieri solet in inflatione uteri; item in hydrope uteri.
2. Imminuta, ita, ut sit vel nulla, vel admodum rara in sterilitate.
3. Quando est aucta, & copiosi fœtus concipiuntur, gestantur, & excluduntur una vice.
4. Quando est depravata, ut est in mola.

#### CAPUT I.

De

#### Conceptione falsa.

#### ARTICULUS I.

De

#### Uteri Inflatione.

**H**As inter conceptiones falsas, quæ sæpissimè mulieres fallunt, est uteri inflation, seu insignis ejusdem intumescencia à flatibus, in cavitare uteri collectis. Dubitant autem Practici quidam: an possint contineri flatus in uteri cavo? sed utique verum est, quia quædam post remedia copiosos flatus ex utero emisunt. Uterus ergò inflatus intumescit, & non tantum tumor abdominis, non secus ac in gravidis, sensim sensimque augetur; sed menses etiam simul supprimuntur, aut parcius saltem nonnihil fluere solent; quin & lac in talium mammarum genitum observatum fuit; unde tandem tales mulierculæ se gradidas firmiter credunt. Interim tamen nihilominus interdum fit, ut ultra solitum partus tempus ad

annum integrum, imò ad biennium, se utero concepisse ita sibi videantur, & postmodum vel medicamentis, vel supervenientibus doloribus parturientium, aut etiam interdum sine his, excludant ex utero solummodò aliquos bombos & flatulentias, subsideatque denuò venter. Unde hic affectus etiam à quibusdam mola ventosa seu flatuosa appellari solet. Interdum verò sine manifesta talium flatuum eruptione impetuosa sensim & insensibiliter omnino flatus exhalant, venter subsidet. Vid. exempla in Gabelchovero *Cent. 1. Cur. 25.* Hœchstettero *Decad. 6. observ. 4.* Welsch im Hebammen *Buche pag. 580.* Sennerto *de Morb. Mulier. lib. 4. Part. 1. cap. 10.* M. A. N. C. *Ann. 6. Obs. 45.* & Hartmanno.

#### C A U S A.

Inter causas hujus inflationis, quæ mulieres sæpius decipiuntur, primaria & frequentissima est susceptio aëris frigidi externi in uterum, idque imprimis post partum aut abortum, intra aut post menses, post usum balnei, &c. quales historias videbitis in Foresto *lib. 28. observ. 38. & 39.* atque Salmuth *Cent. 2. obs. 57.* Dum enim citò nimis aëri externo se exponunt mulieres, non benè circa genitalia munitæ, subinde in tantum inflatur uterus, ut quasi denuò fœtum gerere videantur: quod si fiat, ut simul supprimantur lochia, dolores acerbi & crudelissimi totum abdomen cruciantes sunt conjuncti: imò etiam interdum, si post peractum debitum lochiorum fluxum in secunda post partum septimana mulier audacius paulo aëri libero se exponat, ventus in utero nondum perfectè clauso, sed adhuc connivente, susceptus, in loco isto calido uberiore dilatione turgescit, & tandem talem uteri & abdominis tumorem & distensionem successivè infert.

infert. Rarius enim à causa interna citra talem causam manifestam externam accidit talis uteri inflatio, & ferè sequitur conceptionem falsam, videturque fieri occasione genituræ maris, sine conceptione in utero contentæ, seu vix solet observari, nisi forsan parvus quidam uteri hydrops conjunctus, aut ejus principium flatuum copiam simul inducat; cum alias pura talis inflatio citra ulum materiæ concursum aut collectionem rarius reperitur; attendendum tunc simul ad primas vias, & digestionem ibidem perfectam, circa quam ferè flatuum proventus copiosior observari solet.

### DIAGNOSIS.

Quod ergo attinet signa hujus inflationis uterinx, tunc intumescit quidem successivè uterus. Verùm non præcisè prominet in medio abdominis, sed potius in omnes dimensiones abdominis se expandit; & cum contenta flatulentia nunc augeatur, nunc imminuatur, nunc magis sese expandat, nunc minus, etiam uterus nunc plus nunc minus turgidus & extensus apparet. Adest præterea simul vitium quoddam in hypochondriis & stomachi digestionem, dum circa ista loca flatus & borborygmi copiosiores non rarò persentiuntur. Præterea insignis tensio dolorque tensivus uterum occupat, adeò, ut dum tumor premitur, exinde doleant mulierculæ propter nimiam distensionem: quin & nullus motus fœtus, aut similis in talibus percipitur subjectis, & quando fœmina se volvit in hoc vel istud latus, uterus eò non volvitur, sed manet in loco.

In hac inflatione uteri considerandum est, ut probè distinguatur à conceptione vera: ob id probè observanda sunt omnia indicia & signa, in specie causæ antecedentes, ex quibus aliàs concludere potest mulier, se esse gravidam, quorum uno alterovè absentibus, inflationis saltem suspicio oboritur. Et quidem distinguitur in eo, quod

1. Flatus, cum nunc minui, nunc augeri, nunc magis dilatari, nunc magis condensari, nunc plus minus distendere partem inflatam soleant, uterus etiam vi eorum elastica nunc plus minus intumescere, aut detumescere videbitur: secus ac fit in vera ingravidatione, ubi tumor æqualis est, successivè excreescens.
2. Quando observat mulier medio gestationis tempore motum aliquem, sedulò attendendum: an motus sit genuinus ex fœtu, nec ne? Nam utut palpitationis aliquis sensus, si abdomen fortius manu comprimatur, percipitur, isque ex flatuum saltem impetu oritur, præterea quoque disten-

sus ac instar tympani, vel vesicæ protuberans magis videtur uterus, quàm revera à fœtu contento fieri assolet: vid. M. A. N. C. *Ann.* 1. *Obs.* 1. p. 14. Ad hæc

3. In uteri inflatione distensio abdominis est multò major, quam in legitima gravidatione: econtra pondus est minus, quam in legitima conceptione, & vulva minus gravata, minusque pressa sentitur. Interdum, sed rarius, manu percussus venter instar tympani, & sonitum edere videtur, verum in conceptione moles est minor, & in specie pondus est majus: uterus & abdomen compressa primò cedunt, sed successivè attolluntur iterum.

### PROGNOSIS.

Quod attinet Prognosin: Inflatio uteri per se rarò aliquid periculi infert, cum interdum vel sponte cesset: sin verò mox à puerperio contingat, & impediat mensium vel lochiorum fluxum, per accidens solet gravissimes in utero dolores & alia mala excitare, & tunc res est satis periculosa, quicquid Sennertus aliique contradixerint. Vid. Forestus *lib.* 28. *Observ.* 28.

### CURA.

Quod ergo attinet curam: Flatus uterum distendentes ejiciendi sunt aperto uteri orificio interno, & discutiendi. Cum verò frequenter simul adsint signa vitiatæ in stomacho digestionis, & oborientium hinc copiosiorum flatuum, propterea hæc debitis alterantibus & laxantibus stomachum & primas vias est corrigenda. Modum hujus curæ videb. in Foresto *l. a. observ.* 39. & Timæo von Guldensee in *Cas. pag.* 203. Pro his scopis, si malum oriatur ex purgatione post partum vel menstruis actu suppressis, vena saphæna ferè incidi potest. Hinc inter remedia, quæ huc conducunt, ordinariò sunt & carminativa aromatica dicta. Primatum obtinet castoreum & omnia castorina. Flores chamomillæ, tam vulgaris, quàm etiam Romanæ, quacunque ratione usurpati internè & externè mirè conducunt in hoc affectu; decoctum scilicet, aut essentia, & ꝑo destill. saphirinum ex his parata: Nam conducit hæc chamomilla etiam egregiè in inflatione uteri mox partum, & ubi lochia suppressa crudeles minantur dolores. Addi huic chamomillæ, in specie Romanæ, potest pro varietate circumstantiarum etiam rosmarinus, matricaria, pulegium, salvia, &c. Decoctum calendulæ florum, chamomillæ, senecionis, &c. item radix helenii, zedoariæ, & gentianæ; semina itidem 4. calida majora seu carminativa, cum galanga & zingibere, ex quibus

(Hh h h h h 3) bus

bus conveniens vinum medicatum ad imitationem Timæi von Guldentlee / confici potest, macis in vino cocta, decoctum nucis molchatae cum matricaria in vino, &c. & destillatum macis, ~ carminativus vel aromaticus Sylvii, vel de tribus D. Michaëlis, ~ aut essentia zedoariae, item ~ & essentia rob juniperi cum essentia castorei crebrius usurpata, sunt egregia.

Ratione stomachi præ cæteris conveniunt remedia fassafrata, decoctum nempe ligni fassafras cum carminativis haustum, & ab omni pastu assumptum tragema, v.g. ex zedoaria & cardamomo, quibus additur elæosaccharum caryophyllorum, macis, cumini, carvi, &c. Timæus von Guldentlee lib. 4. Cap. 5. cum fructu usurpat decoctum ligni fassafras & ligni sancti cum seminibus anisi, fœniculi, & similibus carminativis, per integrum mensem, exhibendo sub introitum lecti essentiam zedoariae.

Sed hæc & similia carminativa interna per se patent.

Hiscæ pro scopo blandè abstergendi purgantia amara, species hierarum, MP. de hiera cum agarico, extractum elaterii subjungenda.

Externè conducunt imprimis fœtus & sacculi abdomini instrati ex chamomilla parati: in specie si fiat ex milio, & sale tosto, cui addantur postmodum chamomilla & semina carminativa: coquantur hæc in vino & aqua, & sic sacculus admoveatur regioni pubis, seu uteri extensi. Item litus cum oleo chamomillæ, castorei, lauri, &c. addi possunt. In specie præmissio infessu seu semicupio in decocto chamomillæ hujusmodi litus applicatus convenit, in lectum benè calidum immittendo postmodum ægrum, &c. Sunt qui cataplasma ex stercore caprino cum seminibus carminantibus in vino coctis paratum ceu singulare laudant. Item emplastrum de baccis lauri & gummi carannæ, malaxatum cum s. q. balsami Peruviani aut 3. destillat. baccarum juniperi, insternatur abdomini: emplastrum quoque ex galbano & tacamahaca, malaxatum cum oleo destillato chamomillæ, vel cum oleo fœniculi, cumini, macis & carvi, expertissimum est, & quod tam à Solenandro Sect. 5. Conf. 15. & Hartmanno Praxi p. 27. quàm Lindano, & aliis commendatur, suffitus nucis molchatae per infundibulum utero exceptus. Modus utendi vid. in Hartmanni Praxi Chimiætr. pag. 279. Convenit etiam vapor Theriaci genitalibus exceptus, de quo vid. Sylvius M. lib. 2. cap. 21. §. 18. Aliis irritis imprimis thermæ conducunt,

## ARTICULUS II.

De

## Uteri Hydropæ.

Post inflationem uteri non rarò etiam hydrops uteri seu tumor ejus aquosus foeminas decipit, ut se gravidas æstiment: vid. Sennertus de Morb. mul. cap. 11. Verùm quia de hoc hydropæ uteri confusè admodum loquantur autores Practici, propterea doctrinæ melioris gratiâ distinguo hydropem uteri propriè sic dictum à mola uteri aquosa. In illo copiosæ limpidæ aquæ, rarius crocæ, in utero collectæ cum tuentem reddunt: Hic verò liquor ut plurimum nonnihil viscidus & subindè aquosus, membrana inclusus, propria, & quidem nunc unâ, nunc pluribus distinctis, coacervatus. ita ut tot vesiculas, modò majores, modò minores, repræsentet, foras excluditur; unde etiam à quibusdam hydrops uteri vesicalis appellatur. Talis molæ illustre exemplum habet Tulpius lib. 3. Obs. cap. 32. item Schenckius lib. 4. Obs. de mola.

## CAUSÆ.

Verum & propriè dictum hydropem uterinum quod attinet, seu copiosam aquarum in utero collectionem & stagnationem: causa hujus sunt variz. Antecedentes proximæ sunt in triplici differentia: nempe 1. interdum conjunctus est hydrops uteri cum conceptione & gravitatione vera, adeoque cum fœtu vero, quale exemplum videbitis in Dodonæo Obs. 49. in Schol. Primerosio lib. 2. cap. 7. Schenckio Obs. pag. 620. & in Hildano Cent. 2. Obs. 56. Vid. etiam Salmuth Cent. 1. Obs. 59. Talis hydropis cum gravitatione conjuncti origo est abundantia liquoris istius limpidi & albicantis seu chylosi nutritivi, sed copioso vehiculo aquoso diluti, qui pro nutrimento & augmento fœtus affluens ad uterum secernitur, qui non totus in alimentum fœtus cedens, tandem uberius congestus talem molem constituit. Unde, uti non rarò causa est, quò minus motum fœtus mater perſentiat; ita, ubi copiosior congestus fuerit, ruptâ membranâ extimâ fœtum cingente, aut aliquot menses ante partum, aut in partu ipso ante fœtum, copiosius erumpit, salvâ matre & fœtu. Forſan etiam est vitium in vasis lymphaticis, quibus obstructis lymphæ uberius congesta, molam hanc constituit. Pro usu ergo Practico observetur, si ante partum erumpat, cautus sit Medicus, ne abortum instare, aut, ut mulierculæ clamant, molam aquosam adeste, statim existimet, quin omnia prius benè perpendat, ut analeptici matremque

robo-



roborantibus potius insistat, quàm temerè quippiam inchoet. In habitioribus enim fit, ut aquæ in chorio inclusæ effluant, reliquis in corpore restantibus, quod fit sine nocumento; si verò ex amnio, abortum infert.

2. Deinde hydropem uterinum etiam interdum inferunt menses & lochia suppressa, eaque vel planè non, vel parè admodum fluentia, vid. *Tulpius lib. 4. obs. 45.* ita ut sanguis licet primò effluerit, materia tamen ista serosa & quasi lactea, quæ hinc succedit, remaneat, cum coëscatur; successivè congesta uterum in tumorem attollit, & hydropem constituit: cum quali hydropes subinde simul ex fermentatione retenti liquoris flatus conjuncti esse solent. In talibus hydropicis ordinariò postmodum fluunt menses, & tamen uteri tumor & abdominis remanet imò observatum fuit, quod tales denuò conceperint & pepererint, & secundò demum partu copiosè effluerint lochia cum ventre & utero detumescente: Imò non rarò fit, ut suppressa talis evacuanda materia aliò ruat, & in aliam quandam partem per metastasin congeratur, & ibi liquefiat in materiam serosam.

3. Denique observatur subinde hydrops uteri sine gravitatione, rariùs licet detur, quando nempe in utero colliguntur spontè quasi & subinde à causa interna, cumque perquam tumentem & inflatum reddunt; qui tamen ut plurimum ob mensium suppressionem contumacem, aut impeditum lymphæ ex utero refluxum aut simile vitium internum quoddam interdum præsupponit. Facit huc imprimis hydrops abdominis observatus ex mensibus suppressis, in quo collecta fuit materia in duplicatura peritonæi: item facit huc hydrops cornuum seu tubarum uterinarum, qualem singularissimum observat *Tulpius lib. 4. Obs. cap. 34.* Forfan intelligit hydropem collectum in alis vespertilionum.

### DIAGNOSIS.

Signa hydropis uteri accuratè percenset Hippocrates *de morbis mulierum*, dum inquit: *Si hydrops uteri adnascatur, menses pauciores & parvi fiunt, & ante tempus desciunt, imus venter intumescit, mamma solidae alias molliores fiunt, lac nullum habet, utut putet, se in ventre habere.* Scilicet cognoscitur imprimis hydrops uteri:

1. Ex tumore, qui primariò hypogastrium occupat.
2. Ex fluctuatione, quando tumor tangitur, aut se movet mulier.
3. Ex indolentia loci pressi, quod nullus adit dolor seu tensio.
4. Ex insigni gravitate vulvæ seu sinus pudoris à pondere materiæ incumbentis.

5. A delapso in latus secundum motum mulieris decumbentis.

Ante omnia necesse est, ut probè cognoscat Medicus distinctionem hydropis uteri, qualiscunque fuerit, à vera conceptione; nempe ex eo ferè suspicio est, esse hydropem uteri, quando

1. Tumor aliququaliter distenditur juxta uteri & ventris amplitudinem, nec sit acuminatus, ut in vera conceptione.
2. Si mulier adultior sit, & quæ amplius non concepit, & simul sit bono faciei colore, ferè hydropem uteri innuit.
3. Si alia signa mulieris gravidæ ab sint, & uterus tamen intumescat, suspicio est de hydropes uteri.
4. Si decimus gestationis putativæ mensis sit præterlapsus, tunc etiam suspicio adest, abesse veram conceptionem.
5. Si nullus motus fœtus conveniens unquam perceptus fuerit.
6. Si mulier sub primo gestationis putativæ tempore commodè se habeat, nec alia indicia, præsertim primis mensibus familiaria gravidarum symptomata non observata fuerint. Vel
7. Si patiatur symptomata, & hæc post medium gestationis tempus non cessent, signum est, esse vel hydropem, vel inflationem uteri.

Ab abdominis verò hydrops uteri discernitur, si color faciei est bonus, sitis nulla, tumor incipit à parte inferiore, & adscendit in medio sui versus superiora, &c.

### PROGNOSIS.

Si è sola contenta lymphæ oritur, diuturnus quidem, sed absque periculo, esse solet: Si verò liquor contentus sit pravus seu vitiosè corruptus, periculosum malum propter varia hinc inde symptomata esse solet, quod tandem ad mortem usque deducit mulieres.

Si mulier post conceptionem hydropes uteri corripitur, fœtus intra aliquot menses ab illuvie humorum ferè enecatur, adeoque abortu rejicitur; rarò enim ad legitimum partus tempus servatur.

Observandum quoque est, quod post fluxum & tandem intereant mulieres.

### CURA.

Quoad curam: ubi constiterit per conjecturam, esse collectionem copiosarum aquarum in utero, considerandum est, an sint cum fœtu, aut absque eo? Si cum fœtu, parum aut nihil omninò tentandum est, sed relinquatur mulier, aut saltem blandis hydragogis sic dictis, & quasi per epicrisin evacuandum est nonnihil serum copiosum. Diuretica non sunt tuta, quia stimulant menses, & metus est abortus. Sin verò nulla suspicio sit de fœtu, sed vel molam, vel pura liquamina

mina adesse, conjecturæ sint, tunc maturè & audacter fortioribus purgantibus stimuletur uterus & partes vicinæ, ut aqua evacuetur, & sudoriferis, diureticis, & in specie remediis fortioribus foetum pellentibus, urgeatur uterus ad excludendas aquas. Ubi verò constiterit, esse aquas, aut hydropem vesicalem in utero, necesse est, ejiciatur.

In genere eadem remedia, & eadem methodus medendi adhibenda, quæ aliàs in hydropse ascite sunt laudata: hinc imprimis purgantia conveniunt, inter quæ eminet extractum elaterii, quod cum Mercurio dulci aliquoties potest propinari. Convenit etiam radix esulæ, ejusque infusum & extractum, item radix bryoniæ ad ʒß. in infuso, vel ejus syrupo ad ʒß. Radix ireos nostratis in lacte coquatur, succus expressus propinetur. Item resina jalappæ, & resina gummi de Peru conducunt.

Vomitoria propter nisum, quem exserunt, ferè ab omnibus commendantur: in quorum locum acres saltem clysteres, uterum simul stimulant, etiam injiciuntur commodè; quin & clysteres uterini purgantes.

Juxta hæc evacuantia etiam sunt usurpanda interna uterum irritantia, & excretionem contentorum sensilem promoventia, aut insensibiliter discutientia: qualia sunt decoctum nepethæ, pulegii, & cepæ albæ cum saccharo, teste Zacuto Lusitano *lib. 2. Prax. Admir. Obs. 144.* Item borra cum croco & extracto sabinæ succoso redigatur in bolum, quem commendat Riverius: Castoreum, myrrha, crocus, aromata quælibet, elixir proprietatis, rosmarinus, calamintha, salvia, &c. & ex his parata remedia plura. In fine decoctum lignorum usurpari potest; sicut ad præservationem species diacurcumæ cum vino Malvatico pro corroborando utero commendat Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. Obs. 143.*

Inter externa conveniunt imprimis pessi purgantes & stimulant.

Item injectiones seu clysteres uterini, parati ex decocto foliorum pulegii, sabinæ, calaminthæ, &c. in  $\nabla$  &  $\square$  humana coctis, electuario hieræ simplicis imprægnatis, injiciantur.

Præstat etiam ante horum applicationem prius balneis & infusibus ex blandè emollientibus & leniter stimulantibus fomentare uterum & genitalia ad meliorem excretionem: quibus subjunguntur litus ex oleo irino, cheirino, laurino, destillato anisi, carvi, sabinæ; vel cataplasma imponendum tumori ex foliis & radice bryoniæ, angelicæ, ireos nostratis, cum calamintha, rore marino, satureja, additis floribus calendulæ & croco; vel ex stercore caprillo, fermento & sapone, quod suadet Joël *in sua Praxi*: item empla-

strum de baccis lauri, & hydropicum Augustanorum, vel de stercore caprillo cum castoreo imponi potest. Thermae etiam hæc hic locum suum inveniunt.

Rarum est, quod refertur in Bartholini *Act. Med. Hafniens. Volum. 1. pag. 194.* de hydropse dextræ rubæ uteri, paracentesi curato.

Sed hæc & similia ex cura hydropis antea sunt cognita.

## ARTICULUS III.

De

### Hydrope Pudendorum.

Propter argumenti affinitatem observandum est, gravidæ subinde circa labia pudendorum intumescere, adeoque hydropem particularem labiorum pudendorum, nunc utrorumque nunc alterius, pati. In tali casu lotus discutiens ex  $\nabla$  calcis vivæ est egregius, teste Lysero *in Obs. Cultr. Anatom. p. 279.*

## CAPUT II.

De

### Conceptione imminuta & abolita.

## ARTICULUS UNICUS.

De

### Sterilitate.

Conceptio læsa, ita ut rara aut etiam nulla sequatur, repetito licet coitu, vocatur vulgò sterilitas.

C A U S Æ.

Hujus sterilitatis causæ tantum non innumeræ, & subindè imperscrutabiles sunt: nam ex parte viri potest esse vitium circa seminis generationem & excretionem: ex parte foeminae vel vitium in ejusdem vel ovario non ritè generante ova; vel tubis uterinis angustis, tumore obsessis, obstructis &c. vid. Veslingius *Anat. lib. 7.* Tulpius *lib. 4. Obs. 43.* in utero scirrholo, aut calloso & cartilagineo, vid. Boneti *sepulchretum lib. 3. S. 34. obs. 4. §. 2.* & Riolanus *Anthropol. lib. 2. c. 32.* non ritè fovente ova fecundata, ipsique annexa vagina, in conceptus retentione aut excretionem, &c. hinc est, quod sæpius, post abortum laboriosiore foemina postmodum fiant steriles: quò pertinet vitium ex sanguine ad uterum non ritè distributo: item ex parte utriusque simul potest esse vitium absolute, uti & respectivè, (respectiva est certa & requisita proportio spiritus genitalis maris ad

ad ova fœminea fœcundanda, h. e. ut masculina hac fœmina, generare non possit, qui tamen cum alia optinè generat, & contra potest esse, ut fœmina cum hoc mare sit infœcunda, quæ postmodum alii nupta satis fœcunda fit.

In specie tamen magis in sexu fœmineo, quam in masculino causam sterilitatis propriè latere, ex eo confirmatur: quod major apparatus partium sit in fœminis, quibus variè læsis frustratur conceptus; e contra vitium in viro sit primario unicum, & imprimis in semine lateat, ex quo vitiato generationi est ineptus: Nam membri vitia aut parum obsunt, aut facile corrigi, aut emendari possunt. Unicum ergo vitium est in genitura maris, si aut deficiat, aut nimis aquosa ac tenuis, atq; minus spirituosam sit, id quod facile ex congressu patet: quisi languidior sit, aut diutius cum tædio protrahatur, minus spirituosam, & ob id ferè defectuosam genituram innuit. Hinc frequentissima causa sterilitatis in maribus est, si nimis citò Veneri indulgere incipiunt, & sub primis pubertatis annis crebrius eandem exercere solent; enervantur enim ferè sic testes & cæteræ partes genitales, unde postmodum minus fœcunditales fiunt. Fœmina e contra, quæ & concipere, conceptum fovere, & tandem excludere debet, variis ac multiformibus, & ovarii & tubarum seu oviductuum, & uteri, & vaginæ, omniumq; harum diversarum partium imò totius corporis vitiis, laborare potest: Itè sub gestatione variis infortuniis & rerum non naturalium insultibus est obnoxia, ratione cuius conceptum potest minus comòdè fovere, ac retinere. Et quidem præ cæteris internis ferè & latentibus causis in fœminis accusatur defectus genituræ, qui ex modernorum hypothese in ovulorum vel defectu, vel deficiente in uterum injectione, vel eorum ad fœcunditatem concipiendam ineptitudine, consistit. Hinc accusari solet in fœminis defectus materię chylosæ, ex qua albumen, ut sic dicam, seu incrementum ovi uterini, & tandem nutrimentum fœtui in utero, suppeditetur: hinc enim nutrices, aut mulieres, quæ lactant, rarius concipere solent, aut conceptum fovere. Par ratio est in nimis pinguibus, cum materia albuminis istius in supplementum pinguedinis suppeditetur, & ipsæ etiam minus fœcundæ observentur; cum nutrimentum chylosum pro humectatione uteri ac fœtus nutrimento, in talibus ob corporis uberiores nutritionem ferè deficiat: hinc ulcera manantia inveterata, aut fistulæ & fontanellæ uberius fluentes, massam sanguineam exhauriendo, ad sterilitatem disponere dicuntur: conf. Sennertus l. 3. *Prax. pag. 946.* & Hœfferus *Herc. Med.* Imò mæiores etiam & aridiores fœminæ rubicundæ, & ut vocantur, cholericæ, die garzu bisig seyn/ interdum minus fœcundæ esse solent, ex ovulorum partim ineptitudine ad

Tom. II.

fœcundationem, partim ex defectu albuminis ad ovum fœcundandum necessarii: Ut taceam, uterum in talibus, partesque genitales externas, minus aptè ad congressum fœcundum esse dispositas; hinc enim virgines adultiores non tam facile fœcundæ esse solent, utero aridiore & quasi exsucco existente, adeoque ad fomentationem ovuli minus apto. Ulterius & ipsa uteri membranosa structura vitiata, nimis laxa sc. & flaccida, & cuius imprimis orificium internum aptius minus conñvet, etiam insigniter ad sterilitatem disponit, quia ovula non continere, aut sinu suo fovere solet. Et hoc observare datur in mulieribus cachecticis, fluxu albo laborantibus, hæmorrhagiâ uteri nimia ex sanguine serosiore afflictis, & similibus. Vocant hoc vulgò intemperiem uteri frigidam & humidam, aut inundationem ejus ab excrementis serosis aut piritosis. Pertinet huc conformatio vitiosa: Sic tumores orificium uteri internum obsidentes, scirrhi orificii interni, item hujus laceratio, quæ fit in difficili partu vel abortu, mulieres reddunt steriles, quatenus impediunt retentionem ovi uterini & fœtus.

Deniq; externa quædam à quibusdam, ceu conceptionem impediencia, aut eandem jam factam tollentia, allegantur, quorum tamen fides sit penes Autores: qualia sunt, v. g. abusus borracis ante vel post conceptum assumptæ. Decoctum salicis junioris, aut aqua seu liquor limpidus ex salicibus tenellis incisis emanans, vel succus expressus, jejuno ventriculo aliquoties epotus, appetitum Venereum extinguere, conceptionem impedire affirmant: Item lapidis specularis seu glaciei Mariæ 3j. in decocto salicis vel vino statim à coitu hausta ceu singulare experimentum contra conceptionem comendatur: Item mox post congressum pessus ex helleboro albo cū castoreo intrusus etiam conceptionem tollere ajunt.

### DIAGNOSIS.

Signa conjugii infœcundi cognoscere res est difficillima, cujus sit vitium? maris an fœminæ? ut exindè impediatur conceptio, aded, ut tantum non penitus sit impossibile. Equidem vitia viri, item vitia uteri externa, v. g. scirrhus uteri, ulcus, &c. facile cognosci possunt: sed vera interna causa in muliere latens, & ista utriusque sexus ad se invicem proportio, in specie, an fœmina absolutè? an verò respectivè solum cum hoc vel isto viro sit sterilis? ut à priori cognoscatur, omninò impossibile æstimo. Probationem per suffitum, de qua vid. Sennertus *Prax. lib. 4. ubi de sterilitate*, cum sine fundamento sit, meritò rejicio; licet primam originem habuisse videantur ex Hippocrate *Scē. 5. Aphor. 59.* Item quod quidam de pessu ex melanterio utero intrudendo proponunt, hoc ceu minus certum, aut omninò

(lii iii)

fabu-



fabulosum, arbitror. Hippocrates etiam jubet alii caput deraſum in utero ſubdi, & ſi poſtridiè odor ad os pervenerit, mulierem ad conceptionem aptam; ſin minus, ineptam fore affirmat. Amatus Luſitanus etiam recipit coaguli leporini ꝑj. quod diſſolutum in aqua calida mulieri in balneo exiſtenti propinat: Quod ſi ſentiat dolores & ventris tormina, ſœcundam eſſe; ſin minus, contra aſſerit. Alii peſſarium ex galbano intrudunt, capite benè fumigato & circumvoluto; Si manè odor galbani ex vertice exierit, mulierem ſœcundam dicunt; ſin minus, contra. Borellus *Cent. I. obſ. 11.* obſervavit pilos albos in adoleſcentis pene reſertos ſterilitatem denotaſſe. Alii ad probandam ſterilitatem recipiunt urinam mulieris, & affundunt malo ſylveſtri, quæ ſi exſicceſcit tri-duo, ſignum eſſe ſterilitatis dicunt. Nonnulli hordeum in urina maceratum ſepeliunt, ſi eo die germinet, ſœcunditatem; ſi minus, ſterilitatem arguere putant. Alii aliis probationibus utuntur.

Equidè, quando mas emittit genituram largiter, & quando nullū adeſt vitium conformationis, mas abſolvitur, & vitium eſt in ſœmina, quæ mille modis poteſt impediri, præprimis quando adſunt conformationis vitia.

### PROGNOSIS.

Prognosis, an ſterilitas poſſit corrigi & emendari? ſi non impoſſibilis, tamen difficilis eſt. Certè ſi dependet malum à vitiis & cauſis manifeſtis, facilis eſt; Si verò vitia ſint latentia, aut incognita harmonia & proportio in utroque ſexu, cautus ſit Medicus in prognofi, quia nihil poteſt determinari, cum in negotio adeò obſcuro & dubio quoad diagnofiſin, etiam quoad prognofiſin, pariter difficultates urgeant.

In ſpecie ſterilitas, ubi uterus exulceratus, incurabilis eſt: Vid. Hippocrates *lib. 2. Prædict. 24. & 34. & l. I. de M. M. 7. & 11.*

Alias eſt ſine periculo, quia ſi non alterantur vires, ad longævitatē perducit. Habitiores verò lautā diætā utentes, ſucceſſivè diſponuntur ad morbos chronicos, quibus ſœcundatio eſt ſalutaris.

### C U R A.

Cura, ut mulier fiat gravida, pro varietate cauſarū varianda eſt; ſed quia hæ ſunt partim manifeſtæ, partim verò valdè abſtruſæ, neque huc uſq; ſatis determinatæ, ſpecialiter tractari non poteſt. In genere tamen præmiſſis, ubi opus fuerit, univerſalibus, danda ſunt ante omnia aromatica blanda, quæ utero ſunt amica, ut conſervetur ejusdem & ovarii tonus: hinc ad promovendam conceptionem danda ſunt alia, quæ eeu Venerem ſtimulantia alias commendantur, & quæ etiam viris propinari ſolent: hinc ſubjicienda & ea, quæ per experientiam ut cognita ad ſterilitatem muliebrem

remedia comendantur; habitā tamen ſemper ſimul ratione conſtitutionis, & craſcos ſubjecti propriæ, imprimis, an macra? an pinguis? an ſana? an cachexia ſeroſa affecta fuerit mulier? ubi præſupponitur conſtitutio uteri laxa, & minus firma præ cæteris circa tempus menſium & poſt illos inſtituenda cura, & ad tempus continuanda; quia ſic melius operantur: v. g. ante menſes præmittantur univerſalia, totum corpus reſpicientia, poſt menſes verò demum continentur ſpecifica utero appropriata, quæ eum in ſpecie roborant, firmant, & ad conceptum diſponunt, tam interna, quā in ſpecie externa: Videatur hîc in ſpecie Platerus in *Praxi, & lib. I. obſ. circa finem.*

Quoad remedia ergo, obſervandum eſt eſſe fatum Lindani ſuper Hartmannum, qui dicit: *Sterilitas ſi à nimia caliditate & ſiccitate ſanguinis fuerit, optimè prodeſt lac; ſi à nimia frigidityte & humiditate ſanguinis, optimum eſt roſmarinus, & ſaſſafras.* Et quidem poſterior cauſa frequentiffima videtur; unde etiā volatilia & aromatica imprimis talibus conducunt, quæ uterum, & ejus tonum nerveum cum ovario legitimè conſtitutum aſſervant, & virtute ſalina volatili roborant, hinc præter rorem marinū, qui in mulierum ſterilitate corrigenda egregius eſt, & ejus decoctum ad methodum Zwelferi paratum uſurpatur; de effectu roriſmarini vid. etiam Pauli in *Quadrip. Bot. p. 133.* Confert propterea ſalvia, lavendula, majorana, meliſſa, pulegium, radix pimpinellæ, zedoariæ, galangæ, caſſia lignea, macis, anthylli, coſtus aromaticus, cardamomum, nuxmoſchata, myrrha, & ſimilia. Lignum Guajacum, præſertim ſaſſafras, eſt unū, quod præ cæteris ad ſterilitatem muliebrem emendandam & corrigendam commendatur, in ſpecie, ſi aut ad cachexiam ſeroſam non nihil inclinent, aut ſanguine nimis ſeroſo turgēant. Talibus aquoſioribus aut ſcorbuticis ad maſſæ ſanguinæ craſin immutandam dicta ſudorifera ex decocto lignorum, præſertim ſaſſafras, cum aliis appropriatis inſtituenda, & ſudores in conopeo eliciendi veniunt; aut ſecundum Hœſerum in *Herc. Med.* vina medicata, præſertim inſuſionis ligni ſaſſafras, item eſſentia lignorum in ſpecie ſaſſafras cum ſpiritu ſerpilli parata, copioſius & crebrius uſurpata egregiè conferunt. Unde etiam R coralliorum ſaſſaſrata admodum laudari ſolet. Nam eſſe ita remedia contra ſterilitatem pro varietate temperamentorum immutanda, videb. in Velthuyſio de *Generat. pag. 119.*

Præter dicta, quæ alterationem ſubjecti totius reſpiciunt, conveniunt etiam appropriata & ſpecifica, tam interna quā externa, quæ Venerem blandè ſtimulant, & mulieres aptas reddunt ad coitum ſœcundum. Quò enim voluptuoſior eſt congreſſus, eò magis ſœcundantur; quod tamen non univerſale eſt, cum

ſine

sine sensu voluptatis quandoque etiam concipiant. Hinc scopo satisfaciunt nuxmoschata, anthophylli, melissa, satyrion & eryngion, item aromata, semina acria, eruca, sinapi & similia Venerem stimulantia. Inter reliqua excellunt quoque ambra & quælibet ambra, ac moschus, etiam externè post mensium fluxum cum pessis vaginæ uteri intrusa, hinc ex frequenti ambra usu fœminam, quatuor annos sterilem, fœcundam redditam fuisse testatur Rolfinckius in *Ord. & Meth. Sect. 6. c. 1.* Imprimis paranda essentia ambra pro usu muliebri cum ~u melissæ, hinc propinanda cum essentia roris marini, vel essentia satyrii, vel cum ~u formicarum. Confectio alchermes, species diambra, &c. alias notæ, transeant. Hartmannus tanquam experimentum commendat sal satyrii, si à ℥ss. ad ℥j. in ∇ vitæ mulierum alba, vel vino Hispanico assumatur. Ulterius etiam in viperis singulare quid latet ad conciliandam fœcunditatem; unde viperarum usus, earundem remedia, essentia viperina, aut in specie ∅ volatile viperinum, non erunt frustranea, cum notum sit, quod viperarum esus mares reddat fœcundos, aut carnes pullorum aliorumque viperis nutritorum, usurpentur à Principibus ad fœcundationem, quo remedio fœcundum se reddidit defunctus Dux Bavarie: Brodium item, in quo carnes viperinæ decoctæ, conducit: Præ cæteris observationem curiosam & notatu dignam habet Helidæus Paduanus in *obs. p. 294.* ubi in priori seculo brodio, in quo carnes viperinæ decoctæ fuerunt, una cum columba juveni, myrobalanis, floribus cordialibus, epithymo, polypodio, anetho & similibus, curavit non tantummodò mulierem leprosam à lepra, sed prætereà quoque jam quadragenariâ, cum antea semper sterilis fuisset, hoc ipso decocto tantum & sanata à lepra, & simul fœcunda facta est. Pulvis cancrorum fluviatiliū blando calore balnei exsiccatorum, uti abortum præcavet, ita etiam contra sterilitatem laudatur.

Juxta hæc ulterius specificè commendantur testiculi cervæ & apri, qui fuerunt secretum Corbeji & Hartmanni, ex quibus hic parat suam essentiam contra sterilitatem, quæ cum essentia Satyrii Crollii, aut cum essentia florum anthos, laudari solet in vino generoso vel aqua spirituosâ post fluxum menstruum usurpata: Vid. *Prax. ejus Chym. c. 227.* in Schenckio *obs. lib. 4.* porci testes laudantur. Aliàs notum est, quod matrix suilla, vel leporina, vel cervina exsiccata & pulverisata, mulieribus sterilibus commendetur. Porro formicæ egregium subministrant remedium. Spiritus formicarum, & ex his parata essentia uterina, additis aliis specificis appropriatis uterinis, insigniter confert, unde ∇ magnanimitatis & spiritus formicarum, vel cum hoc, aut cum spiritu roris marini parata essentia testiculorum cervæ;

Tom. II.

vel essentia horum testiculorum propinata una cum essentia ambra post mensium fluxum, & continuata, est remedium non contemnendum: Quod etiam pertinet essentia satyrii cum spiritu formicarum parata, & flores anthos, melissæ, radix satyrii condita, cortex aurantium conditus, tasura eboris cum vino rubro. Quidam commendant Electuarium, factum ex priapo cervi & tauri cum floribus stachadis Arabicæ & melle: cui ipsi electuario convenientissimè ex formicis parata remedia addi, aut his hoc electuarium largiter irrorari potest. Alias sunt etiam, qui pulverem secundinæ humanæ ad ℥j. usurpatæ laudant.

Externè præter thermas naturales, conveniunt, præmissa debita corporis præparatione, præsertim balnea, finitâ menstrua purgatione aliquot diebus continuanda, parata vel ex decocto aromaticorum uterinorum, vel, quod præstat, balnea, quibus incoctum cubile formicarum cum ipsis formicis, in constitutione præprimis succulenta: vid. Balneum Mynsichti contra sterilitatē, & Cunradi, medulla destill. Balnea ex cicuta aliqui commendant: vid. Platerus *loc. sup. cit.* sic etiam oleum formicarum volantium externè utero illitum ad conceptionem disponit. Item convenit ulterius suffitus ex appropriatis uterinis, resinis suavolentibus & aromaticis, v.g. gummi juniperino, baccis juniperi, succino, thure, styrace, mastiche, benzoë, castoreo, gummi carannæ, animæ, & similibus, post mensium fluxum frequenter institutus. Post quem applicantur pessii uterum nonnihil expurgantes ex allio cum oleo spicæ ad imitationem Riverii parati, item pessii ex foliis matricariæ & Mercurialis contulis, & pauco oleo spicæ irroratis, qui pessii post suffitum vespertinum applicati per noctem postmodum retineantur. Borellus *Cens. 1. obs. 29.* pro secreto communicat, si mulieres steriles, modò à vitio conformationis non dependeat sterilitas, antequam virum accedant, placentulam menthastri vulvæ impo-  
nant, coronæ instar effigiarum, idque sub fine menstruarum purgationum fieri debere; uti sequenti Observatione herbæ clandestinæ potentiam ad sterilitatem arcendâ mirè deprædicat. Inunctio etiam glandis membri virilis cum balsamo apoplectico, vel cum zibetho, vel moscho, ante congressum; qua uti utrique coitus redditur voluptuosus, ita mulieribus sub voluptuoso congressu ad promovendum conceptum non parum confert. Ulterius sunt, qui inungunt regionem uterinâ seu pubis cum oleo cheirino irino, nucistæ expresso, & oleis Ratis, ut nucis moschatae Rato, majoranæ, spicæ, caryophyllorum, macis, melissæ & similibus, styrace liquida exceptis, & pro balsamo usurpatis: sicuti etiam emplastrum ex mastiche, tacamahaca, carannæ, cum balsa-

(Iii iii 2)

mo

mo Peruviano subactum, alutæ superinductum, & regioni uterinæ supra juncturam impositum, pro utero confortando sterilibus non inutiliter suadetur.

### CAPUT III.

De

#### Conceptione Auclta.

**H**Abuimus in superioribus de conceptione deficiente, ex qua etiam facile possumus judicare, quando rarius contingit conceptio. De auclta non opus est, ut multa addam, quia ordinariò aut gemelli aut trimelli, rarius plures unâ vice excluduntur fœtus.

### CAPUT IV.

De

#### Formatione Fœtus Læsa.

**N**Otum est, quod, postquam concepit mulier, successivè in ovo uterino fœcundato formetur fœtus, qui corpore aut est similis speciei humanæ, aut est dissimilis: similis est, quando ab hominibus generatur homo perfectus, & est formatio naturalis: Verum si dissimilis, est formatio præternaturalis, quæ ad 2. capita referri debet, nempe

1. Ita dissimilis est speciei parentum, ut ad certam aliam quandam viventium speciem, sed vitiosè formatam, accedat, à qua etiam primario denominationem habet, & tunc vocatur monstrum: Vel
2. Ita vitiosè conformatum est id, quod loco fœtus ex utero prodit, ut ad nullam certam speciem viventium corporum propriè referri possit, & tunc Mola appellatur.

### ARTICULUS I.

De

#### Partu Monstroso.

**P**Artus monstrofi sunt, quando animalia perfecta à mulieribus ex utero excluduntur, dum nempe imaginatione seductæ alia animalia, e. g. mures & ranas, in utero formant & pariunt: qualia exempla observat Borellus *Cent. 3. obs. 73.* sicut Salmuth. *Cent. 1. obs. 65.* refert, mulierem mures admodum horrentem, molas exclusisse, mures repræsentantes: sic molas instar ranarum ejectas notat Amatus Lusitanus *Cent. 1. Curat. 27.* quod in quibusdam Regni Neapolitani locis familiare esse, ex Antonio Torquemata Deltio *Disqu. Mag. lib. 2. Quest. 7.* item avem mordentem

vivum cum fœtu editum, qui fœtus partem absumperat, in Comitissa Mansfeldia observat Salmuth. *Cent. 1. obs. 66.* In Schenckio *lib. 4. obs.* sunt exempla mulierum, porcos, leones, canes, serpentes, astacorum copiam, &c. edentium: gliris à puerpera editi exemplum habet Bartholinus *Cent. 1. Hist. 10.* mola volatilem vivam, aliaque animalia excreta ex utero, videb. in M. A. N. C. *Ann. 1. obs. 1. Schol. p. 12.* nec non *Ann. 2. obs. 160. p. 255.*

### C A U S Æ.

Monstrorum horum causæ consistunt simpliciter in imaginatione materna, si enim ex imaginatione materna fœtus capite canino aut felino, aut pede equino, generari possunt, quidni etiam totius corporis formatio ita transformari, & in alia animalia monstrosè compingi possunt. Verum cum partus himonstrofi, qua tales sub Praxin medicam non cadant, sed ad Physiologiam potius pertineant, pauca de his dixisse sufficiat.

### ARTICULUS II.

De

#### Mola.

**M**Ola dicitur à pondere, dum quasi moles quædam incondita fœminæ uterum premit, maleque afficit: quas quidam adhuc pluribus inter se distinguunt, sed citra necessitatem. Est nempe mola massa quædam informis in utero, ex conceptu loco fœtus ordinarii genita, & ita malè formata, ut ad nullam certam animalium speciem referri possit.

Excludo ergò hic virgines & viduas, quæ, qua tales, sine viri societate molas parere non possunt. Reperimus quidem multos Autores, qui asserunt, virgines, & viduas, castas licet, molas ferre ex sanguine menstruo & semine proprio, instar gallinarum, ova hypone-mia seu subventanea citra galli contactum parientium: vid. Hæchstetterus *in obs. p. 293.* & Kerckringius *in Spicil. obs. 81.* nihilominus tamen hoc in nullo viviparorù genere vel specie observatur, ut sc. aliquid tale in se generent, citra prægressum maris congressum & contactum: Unde nec homini hoc solum tribuendû est citra necessitatem: Et ob id etiam raræ sunt adeò molæ inter virgines & viduas, licet multas & annosas, observatæ: quæ (2.) si naturaliter citra viri adjumentum generentur, quidni, quæso, essent frequentiores saltem in brutis alias ordinariò multiparis, uti in canib⁹, felibus, ovibus, & similibus? Deinde (3.) etiam est differentia inter molas, dum quædam ejiciuntur animatæ seu potius vitales, & motu vitalitatem & animalitatem testantur, cum edant motum exercitum, & actu secundo & vitali animali gaudeant; quædam verò sunt non



non vitales: Sic Salmuth *Cent. 3. Observ. 98.* refert molam viventem, se moventem: sic pariter Zacutus Lusitanus *lib. 2. Prax. Admir. Observat. 144.* refert molam carneam mirabilem viventem tribus oculis ejectam. Jam ergo, si citra viri consortium generaretur mola, unde quæso vitalitas? Nam ova subventanea, & quæ citra fecundantis galli contactum excluduntur, nunquam vel tantillum vitalitatis exhibent, quin potius sub incubatu putrescunt brevi, & corrumpuntur. Ergo solæ saltem erunt vitales molæ, quæ à mulieribus maritatis excluduntur. Virgines verò suppositæ saltem non vitales excluderent molas. Jam verò (4) falsum est, esse molam ullam non vitalem, i. e. quæ nec in utero vitam habuisset, licet vel ante exclusionem, vel sub exclusione ex utero, vitalitatem amiserit, cum etiam sæpè diutius informes molæ in utero gestentur, quæ postmodum citra ullum vitalitatis signum excluduntur: Sanè talis substantia omni vitalitate orbata citra sui corruptionem & putrefactionem tamdiu in utero persistere nequiret (nisi in scirrhosam duritiem, vel simile concrementum durius & siccius abeant; tales enim molas esse, quas per plures annos subindè mulieres in utero gestant, probabile est, & confirmatur ex Paræo, *lib. 2. cap. 34.* cum etiam infans verus, quamdiu vivit, citra corruptionem in utero hæreat: simul atque verò moritur, ad corruptionem & putredinem breviter tendit. Par ratio etiam est cum secundina uterinaque placenta, quamdiu est foetui viventi in utero juncta, ejus vitæ communi fruitur, tamdiu sana & salva perstat; simul verò atque separato foetu illa in utero remanet, vitalitate spoliata corrumpitur & putrescit. Ut taceam molas omnes à parvo principio per veram nutritionem & augmentationem successivè accrescere, item conformari plus minus, licet vitiosè, molas, quæ operatio vitalis citra vitæ possessionem exequi nequit: Sic Horstius in *Observat.* refert molam muris formam referentem, à virgine in lucem editam: Sic mola bufonem referens refertur ab Hæfero in *Herc. Med. pag. 344.* Ex quibus dictis concludo: non dari molas non vitales, alias putrescerent, & dum sunt vitales, non esse ova hypenemia, sed vera: Molas ergò quascunque nullo modo neque à virginibus neque à viduis citra viri consortium excludi aut generari posse. Plura quoad hanc controversiam videb. in Sennerto *de Morb. Mulier. cap. de Mola*, ubi viduis castis molas citra viri contactum concedit, non verò virginibus, cum tamen viduæ cum virginibus pari passu ambulent. Rigorosè satis pro nostra parte stat Paulus Zacchias in *Quest. Medico-Legal. lib. 1.*

Molæ hæc Germanis vocantur *ein Connen-Kind/ ein Mutter-Kalb/* item quibus-

dam *Mond-Kinder:* Dicunt namque obstetrices, si mas post coitum emittat urinam, ut radii lunares tangant membrum virile, generari molam. Ordinariò verò vocantur *ein Gewächse/* utut quidam rigorosè inter has tres molas, tanquam 3. species distinctas, distinguere velint, quod tamen superfluum, Observandum autem, non confundendas molas propriè sic dictas cum excretis aliis ex utero: siquidem subindè quædam fœminæ, declinante mensium fluxu, aut etiam alio tempore, excludere solent ex genitalibus massam apparenter carnosam, quæ etiam reverà nihil aliud sunt, quam majores grumi sanguinis firmitus coagulati, utut sine textura carnosâ aut membranosa, qualis in molis observatur: Sic pariter observantur fœminæ, quæ quavis menstruatione excludunt parva corpora quasi membranosa, quæ quidem pro pituita viscida condensata habentur, quæ forsitan ovula sunt ex ovario matura, sponte suâ in uterum per tubas decidua. Conf. huc Mauriceau *de Mulier. Morb. lib. 1. cap. 10.* & hujusmodi rejectanea, quæ non sunt molæ, tam virginibus quàm maritatis sunt communes.

Conjunguntur molæ propriè sic dictæ ut plurimum cum fœtu vivo & vero: imò refert Kerckringius *Spicil. Anat. Observat. 65.* infantem molæ inclusum repertum; & interdum unâ cum fœtu, aut brevi post, interdum etiam aliquot menses vel septimanas ante fœtum, excluduntur, ipso fœtu adhuc in utero subsistente, & suo tempore in lucem emergente: Id quod fit imprimis, si ex quocunque accidente mola moriatur; tunc enim ceu excrementitium à consortio vitalitatis, proscriptum ex utero ejicitur, vivo subsistente fœtu; interdum post fœtum & secundinas prodeunt, fœtu legitimè constituto; frequenter tamen occasione molæ fœtus abortu rejicitur: interdum mola fœtui juncta huic nutrimentum subtrahit, unde sanguifuga dicitur, vid. Bartholinus *Act. Hassniens. Tr. 1. Observ. 26.* & Lemnius *de occult. Nat. Mirac. c. 8.* Quæ verò sunt absque fœtu molæ, interdum diutius in utero subsistunt, & ipsi firmiter accrescunt aut saltem in scirrhosam similemve duritiem degenerant, ac cum mulieribus convescunt, quas tandem trucidare solent.

#### C A U S Æ.

Quod ergò causam proximam attinet, & generationis modum in mola, res perquam intricata est. Qui veterum vestigia, imprimis Hippocratis *l. 1. de M. M. & de sterilitate*, legunt de generatione fœtus ex seminibus utriusque sexus mistis, & sanguine menstruo, indeque molam ex sanguine fœminæ copioso, & semine utriusque sexus, in specie virili, paucò vel debili, generari asserunt, illos suo

sensu abundare permitto. Qui verò ex Harveyanis aut Hornianis & Graafianis principiis de ovo uterino generationem molæ explicare vult; is videat Claudium de la Courvee, de *Nutrit. Fetus in utero* P. 3. cap. 4. Nempe quoad rationem conceptus nulla est differentia inter verum conceptum, qui dat fœtum, & inter conceptum, qui dat molam, sive in principio, sive in progressu formationis hoc ipsum fiat: scil. inter duplicem membranam, amnion & chorion, fœtus tam perfectus, quàm ejus rudimenta, continentur: Amnion quidem tenuior est membrana, quæ tanquam munimentum est, in quo & fœtus formatur & etiam custoditur, ne humor albugineus nutritius affatim ex chorio irruat in colliquamentum ovi, & inchoatam tenelli embryonis delineatione & formatione omnino interrumpat. Si igitur fiat, ut lædatur ista interna amnii membrana, indeque fiat liquorum amborum inordinata confusio, exinde impeditur formatio, & ex confusione istorum humorum, nempe nutrimenti, & ex quo & in quo formatur fœtus, loco fœtus perfecti emergit hinc tandem moles talis incondita & inconcinna; quæ tamen nunc proprio motu secundum agentia & patientia naturalia oriri, nunc à superveniente imaginatione materna, ejusque forti impressione sub ista incondita forma, figuratione plus minus quadam certa, & charactero sæpius rudi, insigniri tandem solet: Sic enim refert Forestus in *lib. 28. Observat.* 67. de muliere, quæ molam carneam cum capite & quasi rostro cujusdam aquilæ conformatam ejecit, cujus rictus cartilagineus utrinque diduci potuit, natam ex imaginatione matris, cum antea monstrosas figuras similibus capitibus depictas adspexisset: Platerus *lib. 3. Prax.* pag. 898. molam vidit stellam arboream marinam perfecte representantem. Molam figuram capitis ovilli æmulantem, habet Bartholinus *Cent. 4. Hist.* 48. molam, quæ muris figuram representavit, videb. in Horstio *lib. 5. Observ.* 39. & Salmuth *Cent. 1. Obs.* 65. refertque Diversus in *Annot. in Altom. cap. 112.* se novisse mulierem, quæ 3. molas ad similitudinem pudendi virilis formatas peperit: Matthæus de Gradibus in *cap. 9. Rhasis* vidit bis vel ter frustum aliquanquid figuratum: Conf. Garmannus in *Dissert. de Gemellis & Partu numeroso* c. 1. §. 1. Exemplum quoque Kerckringius in *Observ. Anat. Obs.* 95. pag. 184. adducit, cui mola instar cyprini exhibita fuit, in bifurcatam caudam desinens, capite & ore perforato & in medio molæ ventre infans perfecte efformatus, quantus solet unius mensis fœtus esse: Simile exemplum etiam Alexander Benedictus *lib. 25. cap. 29. de Cur. morbor.* refert. Quod si ergo liquores hi confundantur, & formatio fœtus interrumpatur sub primis gestationis mensibus, in principio nempe conformationis, tunc

humores isti albuginei confusi, & vel una chorii membrana communi, vel ex rupto amnio, quasi pluribus membranaceis particularibus capulis muniti, dant molam istam aquosam vesicularem, de qua vid. Loffius *lib. 4. Observat.* 167. & Tulpius *lib. 3. Observat.* 32. Sin vero talis humorum confusio & formationis interruptio tardius fiat, cum stamina sanguinea sint efformata, & sanguis copiosus genitus, tunc ut plurimum mola sanguinea & carnea, quasi parenchymata viscerum representans, apparet. Si denique adhuc longius protrahatur talis humorum confusio, & ubi jam in fœtu stamina fibrosa nervorum fuerunt deducta, & spiritus animales geniti ac distributi, tunc motum simul quendam, interdum ordinatum, interdum palpitantem tantum, mola obtinere solet. Imò in tali mola interdum etiam unum alterumve membrum, v. g. os, nasus, oculi, aut cerebrum, aut parenchyma quoddam, exacte satis jam elaboratum deprehenditur. Nempe sunt sanè membra & viscera fœtus tenella juxta se quidem posita, sed minus firmiter connexa, & quæ non, nisi ultimo gestationis tempore, cute ac tegumentis membranaceis firmiter investiantur: unde confuso humore chorii crassiore cum liquore amnii tenuiore facillimè formatarum partium solidarum tenellarum translocatio, confusio, & tandem extensis jam firmiter vasorum sanguifluorum canalibus tenuibus aliqualis sanguinis circulatio, & sic molæ inconditæ nutritio, & informis plus minus augmentatio, contingere potest, donec mola insignis & variformis emergat.

Negotium hoc ulterius declarant ova fœcunda gallinarum, quæ ipsa vel ante incubatum, vel dum jam aliquandiu fuerint incubata, si fortiter concutiantur vel agitentur, impeditur fœtus formatio, & nullus exinde excluditur pullus, confusis & permixtis invicem vitelli & albuminis liquoribus, aut translocatis ex toto sub vitio conformationis partibus tenellis jam nonnihil formatis, pullus imperfectus in testa reperitur. Hinc etiam est, quod tonitru forte, dum gallinæ incubant ovis, debitam conformationem impediat, aut pulli moriantur: Unde etiam sub fervido æstatis tempore minus solent feliciter excludi pulli, propterea, quia ab aëre subtili & calore ambiente humores, facile colliquescent & confunduntur. Simile si fiat in ovo humano, facile hinc frustratur formatio, & hinc molæ, vel aquosæ vel carnosæ, vel sanguineæ, vel denique ruditer, plus minus licet, in varias figuras formatæ, generatio sequitur: Vid. Harveyus de *Gener. animal.* cap. 16. Quod verò subinde cum fœtu deprehendantur molæ, fieri videtur, quatenus vel gemellorum, pluriumque fœtuum conceptio simultanea, aut saltem super-

superfœtatio facta fuerit, aut alia ratione plurium ovulorum sub congressu fœcundo, aut uno aut pluribus, exclusio contigerit, inde ovum unum in fœtum perfectum successivè adolevit, cæteris impeditis, & sub formatione inchoata quacunque occasione vitiatis, in molam degenerantibus.

Causæ remotæ, quod generetur mola, sæpissimè sunt in matre, & subindè externæ: sic interdum ex inconciño motu matris, aut ventris nimia percussione, aut saltu, vel casu, aut ira, aut aliis gravioribus animi pathematibus, formatio conceptus impeditur, membrana amnii dissolvitur, humores confunduntur, & ita molæ oriuntur. Item iis, quæ sunt salaciores, aut quæ subindè pariunt gemellos, non rarum est, quod cum fœtu prodeant molæ, ubi sub congressu plura ova fœcundata, unde alter magis, alter minùs fœcundatur. Allegantur etiam hîc à quibusdam mulieres fervidiore sanguine præditæ, unde aut coliquescent humores, & extra debitam consistentiam abeunt, & ad conformationē inepti fiunt, membrana amnii adhuc tenera rumpitur, ac ita humores ovi uterini distincti inordinatè confunduntur, sicque formationis negotium interrumpitur, ut fiant molæ.

#### DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: molam ritè cognoscere, & à vera gravitatione discernere, difficile est, & res accurato scrutinio digna: vid. Forestus *lib. 28. obs. 62*. Equidem mola sine fœtu facilius cognoscitur, quam quæ cum fœtu: In specie primis mensibus, aut ante quartum mensem, aut medium gestationis tempus, vix minima ejus præbetur suspicio.

Signa autem, quæ molam produnt, mense quarto, vel instante proximo, magis innotescunt, quæ inter imprimis sunt:

(1.) Motus, qui latentem molam nonnihil manifestat; nam fœtus tunc moveri successivè incipit, primò motu pulsatorio, qui magis fit validior successivè, quod non fit in mola. Hæ enim si adsunt, vel nullum motum sensibilem edunt, vel si aliquem habeant, ipsæ mulieres illum facilè à motu genuino fœtus discernere valent: Nempe ante tertium mensem tremulus, saltem minus validus & palpitatorius est, vel constrictorius & dilatatorius saltem: vid. Riverius *Cent. 2. obs. 100*. Non verò in omnem situs differentiam, ut in fœtu perfecto accidit, qui interdum calcitrando firmius se movet, & tumorem quasi facit. Interdum etiam insignes motus observantur sub præsentia molæ, qui tantum sunt uteri, non verò molæ contentæ: sunt nempe species motuum convulsivorum matricis irritatæ à mola, non vero ipsius molæ, cum interdum observentur fœminæ cum motibus adeò violentis, quasi plura animalia in eodem essent ventre: Vid. hîc Mauriceau *suprà citatus*.

(2.) Si jam fœmina de latere in latus se vertit, mola parili etiam ratione, instar lapidis, & insignis ponderis dorsum prementis, impetuosè volvitur; quod longè majus sentiunt, quam dum in utero fœtum perfectum gestant, cum in legitima gravitatione fœtus citra talem ponderis motum in utero firmiter expanso, quocunque se moveat mulier, ferè eundem situm obtineat: Hinc etiam ponderis major sensus percipitur, & quasi incumbit utero, dum gestatur mola, quàm quando gestatur fœtus verus, & istud pondus deorsum versus vulvam premit in gestatione molæ, quod non æquè fit in fœtu vero, qui potius in ventre sine molestia gestatur, nisi ultimo mense, circa tempus partus, ubi magis ad inferiora declinat &c.

(3.) Si tempus motus fœtus, mensis nempe quartus vel quintus gestationis, præterierit, & nihilominus nullus motus in utero percipitur, interim verò venter intumescat, nec tamen vel hydropis ascitis, vel hydropis uterini signa adsint, molæ latentis indicium est.

(4.) Fœtus verus à mola ventris figurâ discernitur; nam in fœtu vero venter præsertim ad umbilicum versus attollitur & protuberat, versus latera nonnihil coarctatur: In mola verò venter non antrosum versus apparet turgidus, sed potius ubique tam ad latera, quàm anteriora, circa hypogastrii imprimis regionem intumescit, & in omnem dimensionem æqualiter attollitur, & quasi globulus seu massa in utero & lumborum regione posita tactu percipitur.

(5.) In ritè gravidis quamplurimis, in specie habitioribus, lac verum circa quartum mensem aut medium gestationis tempus subindè generari incipit; in mola verò mammæ rarò intumescunt, aut utut intumescant, tamen verum lac non generatur, sed cruda saltem quædam massa & liquamen seroso-excrementitium ad mammas derivatur, & ex iisdem effluere solet, quædam successivè denuò evanescit.

(6.) Molam dolor quidam in utero, punctio- nis sensum inferens, subsequitur, teste Foresto *lib. 28. observ. 61*, & punctiones has dolorificas subindè molestas peculiare molæ carneæ esse notas, quibus eam à vero conceptu distinguere queamus, asserit Scholzius *in Conf. 355*.

(7.) Graviora molas, quàm uterum verum gestantes, mulieres habent symptomata, præsertim minus coloratæ & pallidiores quasi cachecticæ apparent, viresque magis prosteruntur, ac cachexiæ similia, circa universi languorem, difficilem respirationem, decolorationem, &c. patiuntur; in verè autem gravidis medio gestationis tempore symptomata gravia remittere solent.

(8.) Si post decimum mensem, adeoque præterlapso tempore partus legitimo, venter adhuc



adhuc tumeat, nec hydropis & inflationis signa adsint, de mola suspicio adest, quæ postmodum successivè magis, magisque se prodit, quo diutius in utero ita retinetur. Et dum

(9) Gravidis menstrua purgatio omnino cessat, plerumque molam gestantibus ex intervallis, tertio quovis mense, vel etiam longioris temporis intercapedine effrænes uterini fluores sanguinei fœminis superveniunt, sed colore vitioso: id quod minus convenit in vera fœtus gestatione, si est sanus vel vitalis. Interdum quoque per aliquot dies mictio laboriosa & dolorifica est, ægreque procedit. Item tempore mensium consueto gravidæ neque dolores neque tensiones percipiunt, sed potius tantum fortiolem motum fœtus; contrarium verò fieri solet in mola. Quibusdam menses fluunt, ut plurimum vero hi ipsi, non secus ac in legitimè gravidis, suppressi sunt.

Hæc signa facilius apparent, ubi mola est sola, & citra adjunctum fœtum verum, ex quibus probabilia eruuntur, ut præsens mola cognoscatur. Mulieres gravidæ semper solent optimè de se sperare; unde etiam, nisi varia adsint symptomata, difficulter iisdem potest persuaderi, quod gestent molam. Quod si fœtus verus & vivus sit conjunctus, hoc difficilius omnino cognoscitur, nisi forsan ex quantitatis pondere, ventris mole majore, ac symptomatibus gravioribus, quoad motum ab uno latere in alterum, & similia alia supervenientia signa, suspicio oritur.

In genere cognoscitur rectissimè mola ex pondere & gravitatis sensu, in utero, & ex motu ejus, quem ægra, dum se erigit, vel ambulat, vel de latere in latus movetur, percipit. Si ergo hæc conjectura adest, relinquatur mulier usque ad tempus partus.

Qua ratione autem mola & fœtus simul probabili conjecturâ possint cognosci, conf. Sennertus *libr. 4. Prax.*

### P R O G N O S I S.

Quoad prognosin: Mola semper periculosus affectus est, matrem lædens, & multa symptomata, tam cum retinetur, quam cum excluditur, inferens, cujus occasione dum retinentur menses, tam uterus quam universum corpus exindè insigniter læduntur.

Quo citius ejicitur mola, eò melius.

Quo major eadem, vel diutius retinetur, eò majus periculum imminet, & interdum in ascitem lethalem degenerat, vid. Forestus *l. a. Observat. 62.* Hildanus *Centur. 2. Observat. 55.*

Interdum tamen etiam celeri satis morte enecat, vid. Zacutus Lusitanus *libr. 3. Princ. Histor. cap. 16. Observat. 2.* aut si prodeat,

dolores acerbissimos, hæmorrhagias, aliaque symptomata periculosa excitat, & egrediendo enecat.

Si verò in plures partes divisa fuerit, minus periculi affert, cum successivè frustula aliquot diebus aut mensibus interjectis ejici soleant.

Si fœtui mola jungatur, eum vel enecat, vel insigniter lædit, sæpiusque causa est, ut mulier abortiat; aut si cum fœtu excluditur, partum laboriosum facit.

Si est citra fœtum, quando corrumpitur, antequam ejiciatur, putrescendo uterum inquinat, ac ad similem putredinem disponit: quod quidem perquam rarum est, observatum tamen à Schenckio *libr. 4. Observat.*

Molæ si hydrops uteri junctus sit, ferè lethalis est, cum duos gravissimos morbos vix superare possit mulier, quin jugulent.

Molæ solæ, si non corrumpantur, & inalteratæ persistant, subindè pluribus mensibus, quin & 2. 3. imò etiam decem annos in utero hærent citra gravidationis læsionem, & cum eadem consenescent, imò matrem usque ad mortem comitari solent, utut non sine insigni mulieris nocumento, & successivè viribus languescentibus matrem propriam jugulent.

Si excludatur tandem sponte, quod rarius est, vel medicamentorum vi per artem, cruciatus insignes, & imprimis periculosa hæmorrhagiæ uteri, supervenire solent.

### C U R A.

In ea observandum est, ante omnia, antequam ad indicationes procedatur, an mola sit conjuncta cum fœtu? an verò sine eo? Si mola est cum fœtu perfectio, nihil temerè agendum est, sed saltem abortus præservandus, & hujus exclusio expectanda; tunc enim ut plurimum simul ejicitur mola. Ubi verò observandum, subindè placentas uteri insignes grandævæ, aut varieformes, haberi subindè pro molis, quod tamen non est: aut si præter spem retineatur, tunc demum vel manu chirurgica, vel ope pharmaceutica extrahenda aut expellenda erit. Sin verò nulla fœtus suspicio adsit, id quod imprimis fit, si ultra 10. menses, aut ultra annum integrum in utero persistat, tunc opera danda est, ut quantocius ejiciatur, ne diuturnâ morâ vel fiat grandis, vel matrem gestantem lædat. Ob id ergò omnia fortiora menses pellentia, & partum difficilem promoventia, & denique omnia fœtum mortuum ejicientia, usurpanda sunt. Conveniunt ob id eadem M. M., eademque remedia, quæ in partu difficili, fœtu mortuo, secundinis retentis, mensibusque suppressis, usurpantur.

Uc

Uc ergo hoc fiat, præmittantur quædam præparantia, hinc pellentia. Inter præparantia infessus, balnea, fomenta, inunctiones & clysteres alvini & uterini, & similia ex emollientibus & laxantibus parata, sc. Infessus in decoctis plantarum emollientium, laudantur: Clysteres uterini ex oleo; alvi ex lacte, solent laudari: Fomenta uteri ex oleo & lacte applicanda, & quæ sunt alias satis cognita, & de partu alibi recensentur, quæ vias laxant, uterum ejusque fibras, ac ambientes membranas, molliores, flaccidiores, & tractabiliores & distensionem aptiores reddunt. Præparatis sic viis, convenit venæsectio, primò in brachio, postmodum in pede. Post hanc in usu sunt vomitoria valida, sive sint glia seu vitriolata, inter quæ est  $\Theta$   $\Theta$  i vomitivum. Juxta hæc præscribantur purgantia fortiora: qualia sunt pilulæ fœtidæ, pilulæ de hiera cum colocynthide, aut ejus extractum, species diaturbith cum rhabarbaro; Item decoctum fennæ, pulegii, sabina ana mß. in sero lactis, ad aliquot  $\sigma$  haustum, ad imitationem Rulandi in *Thesaur. pag.* 300. Item extractum & remedia ex helleboro nigro & colocynthide, & similia drasticotera. His subindè addantur pellentia menses, fœtum & similia, imprimis ex ruta, artemisia, pulegio, sabina, bryonia, gentiana, asaro, anetho, & similibus: Ex baccis item juniperi, semine nigellæ, ciceribus & similibus, quibus commodè  $\nabla$  spirituosæ in magna copia, & similia ex cinnamomo & cannella remedia adduntur; Decoctum anethi & rutæ in vino secundum Forestum *lib.* 28. *obs.* 61. Essentia &  $\sigma$  caryophyllorum, & pilulæ de sabina Mynsichti, hæc etiam locum habent: item decoctum ac  $\sigma$   $\sigma$  tum sabinae cum aliquot guttulis olei destillati caryophyllorum cum saccharo in elæosaccharum redacta, diutius continuata, simulum potentem inferunt: Vel fiat pulvis ex borracis, myrrhæ, castorei ana part. æqu., addito  $\Theta$  c vol. succini; de quo pulvere 3ß. in  $\nabla$  cinnamomi quotidie semel aut bis repetitis vicibus assumatur. Pertinet huc asa fœtida; aut fiant pilulæ ex trochiscorum de myrrha 3ß. ad 3j. cum gran. iij. euphorbii, cum essentia myrrhæ, quæ pro 3. dosibus per 3. dies successivè hauriantur. Præ reliquis experimentum est pulvis secundinæ blando igne exsiccatur ad 3j. in  $\nabla$  cinnamomi aut alia appropriata propinatus, specificum est Hartmanni in *Prax. Chim.* commendatum insigniter à Lindano, & adhuc usitatum Sylvio. Est singularis hæc secundina ad præternaturalia ex utero pellenda. Spiritus secundinæ per putrefactionem est optimus. Zacutus Lusitanus *lib.* 2. *Prax. Admir. obs.* 145. ceu experimentum commendat pilulas ex euphorbii 3j. cum syrupo artemisiz paratas; Nam & hæc potenter expellunt. Hæc & alia aliquandiu internè continuanda sunt, donec

Tom. II.

provocetur successivè uterus ad molæ exclusionem.

Hiscæ simul addantur externa: præter clysteres fortiter stimulantes & menses provocantes acriores, aliaque vaginam uteri & orificium uteri internum irritantia, & spasmus promoventia, usurpanda sunt. Hinc fiant clysteres alvini, imprimis ex pulegio, matricaria, sabina, pulpa colocynthidos in nodulo ligata ac similibus injiciendi: Vel fiat clyster uterinus sequens:

$\mathcal{R}$ . HB. artemis.

sabina à M. j.

$\Theta$   $\nabla$  3ß.

Coqu. inf. q.  $\nabla$  simpl.

colat. 3iv. l. tßß. addo

Ess. myrrha

asa fœtid. à 3j.

castor. 3ß.

$\sigma$  Laurin.

irin.

lit. albor. à 3vj. ad 3j.

vitell. ovi No. j.

syr. de artemis. 3j.

Mista sub forma clysteris uterini per mētrēniten in vaginam uterinam injiciantur, & repetantur:

D. S.

### Außtreibend Mutter-Clystier.

Courvée laudat pessos acutos ex galbani 3ij cum 3ij. hellebori albi, qui satis acres sunt & violenter stimulant. Accedunt etiam suffitus ex sabina, colocynthide & cinnamomo, galanga, myrrha, mace, galbano, & similibus, & per infundibulum excipiantur: Suffitus ex anetho & cumino, cum rasura unguis alini, commendatur à Corbejo: item suffitus ex scoris reguli 8ii  $\sigma$  dialis, vel cum vino, vel cum  $\nabla$ , vel  $\square$  fœtida institutus: item  $\Theta$  ia volatilia fœtida, aut saltem  $\sim$   $\Theta$  \*ci cum calce viva paratus, & cum hoc parata essentia castorei, mediante Instrumento Glauberi, aut mediante phiolâ carbonibus imposita, pudendis excipiat, præmissis inunctionibus emollientibus, cum oleo dia-colocynthidos vel cheirino & anethino, additis paucis guttis olei  $\sigma$  ti succini, sabinae, &c. & ex his cum fimo bovillo subactis fiat cataplasma pectini imponendum, quod commendatur à Foresto *lib.* 28. *obs.* 61. His ipsis opera danda, ut stimulatâ naturâ ejiciatur mola. De cætero eò melius operantur hæc remedia quælibet, si simul mulier fortiore motu, in specie saltu, similivè exercitio crebrius se exercuerit, quin etiam si sanguine turgeat mulier, venæsectio largiter institueda est.

Quod si his & similibus superveniat nixus excretorius, quavis operâ hic ipse promovendus est, ut ejiciatur mola.

Quod si difficiliter succedat negotium, ad manualet Chirurgi operam confugiendum

(Kkk kkk)

crit.

erit. Speculum uterinum applicandum vaginæ uteri, & orificium uteri internum dilatandum, & vel manu immissa à Chirurgo, vel instrumentis, mola extrahenda, eaque tota, ne frustula relicta turbas inferant. Encheireses pro tali operatione videbitis in Hildano *Cent. 2. observ. 52.* item in ejusdem Epistolis. In specie Chirurgica operatio hinc necessaria est eo in casu, quando cum nisu excretorio uteri magna hæmorrhagia adest, quæ cum remediis internis & ejicientibus multò magis exasperari solet. Revera tali in casu Chirurgica auxilia præferenda sunt pharmaceuticis, vid. Mauriceau *lib. 2. cap. 23.* Nec desisten-

dum est, si operatio Chirurgica in principio non statim succedat, quia post aliquot dies eadem reiteranda venit, ut rectè hoc monet Hildanus *Cent. 1. Epist. 39.*

Ejectâ molâ quacunque ratione, subinde non leve periculum imminet à nimio sanguinis fluxu, & hinc graves dolores uterini insequi solent, quæ symptomata eodem modo curanda sunt, atque si eadem post partum naturalem accidant: v.g. ad nimium ac desperatum sanguinis post molam fluxum, remedia nimium mensium aut lochiorum fluxum sedantia conducunt: Expertum est electuarium Foresti *lib. 28. obs. 62.*

## SECTIO VI.

De

### REGIMINE GRAVIDARUM.

**D**Um nempe concepit mulier, in eaque generatur & formatur fœtus, gravis dicitur, quasi à fœtu in ventre gravata: unde in his, tam ratione hygienes quam therapeuscos semper ad 2. primaria in toto earum statu, vel naturali vel præternaturali respiciendum est:

1. Ad fœtum simul, ne huic noxa, sed potius robur inferatur, neque ad præmaturam sui exclusionem disponatur.
2. Quod naturaliter suppressi sunt menses, ratione quorum ut varia oriuntur symptomata, ita etiam ratione causarum & curæ symptomatum, semper ad menses respiciendum est.

#### CAPUT I.

De

#### Diæta Gravidarum.

**C**onsuetudinis, uti in aliis, ita etiam in gravidis præsertim habenda est ratio, idque jam olim nos docuit Hippocrates *lib. 2. Aph. 50. & 52.* Speciatim ergo quoad res non naturales: ad conservandam gravidarum sanitatem, imprimis ratione aëris, odores nimis fortes, croci & aliorum, siue sint suaveolentes ob hystericas passionem, siue graveolentes ob metum abortus, vitandi sunt. Tales enim simul exagitant massam sanguineam, propterea, eosdem fugiant, imprimis, si mulier proclivis est ad passionem hystericâ: Notum namque est, quod odor carbonum incensorum, & fœtor candelarum extinctarum, maximè nocivus sit fœtui, ut in quibusdam abortum provocare soleant.

Deinde quoad assumpta ut plurimum appetitus audiatur, & assueta assumantur, modò sub moderata dosi appetitus desiderio satisfiat: In specie tamen fructus horæ non nimis capiantur propter vim fermentativam; partim quia fermentatione ista subindè diarrhœas aut dysenterias, gravidis imprimis funestas, inducere solent; partim quia præter flatus inde natos subinde passionem hystericam solent excitare; partim etiam, quia facillè acefcunt, qui acor inimicissimus est fœtui tenello. Aromata quod attinet: & ipsa etiam moderatè sunt usurpanda, speciatim acriora, quia sunt spirituosâ ac volatilia, indeque facillimè massam sanguineam commovere, hincque partum, lochia, secundinas, menses, aliasque uteri hæmorrhagias, vel similes periculosas excretionem excitare possunt. Notum enim est de cinnamomo, caryophyllis, galanga, croco, pipere, zedoaria, zingibere, quod, præter mensium vim pulsivam, lochia, &c. promoveant: Metus enim est, ne fœtum ad abortum disponant: Moderatè ergo usurpentur, saltem ut flatus discutiant. Acida etiam imprimis nocent, & toto gestationis tempore, cujuscunque sint generis, vitentur: præter hoc enim, quod sexui sequiori minus conveniant, speciatim fœtui, cujus systema nervosum debile & facillimè irritabile est, hostilia sunt, unde uterum, ceu membranofum & nervosum, insigniter irritando ad abortum disponunt: Sic mulieres, quæ crebro utuntur aceto, aliisque acidis, pariunt infantes dispositos ad epilepsiam, & sine epidermide natos: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 47. pagin. 233.* Butyri esum prægnantibus & suffocationi uterinæ crebriori detentis noxium asserit Borellus *Cent. 3. observ. 26.* quod tamen falsum existimo.

Hinc



Hinc vinum non semper conducit gravidis, imprimis vegetis; disponit enim foetum ad epilepsiam, & in specie si mulier fuerit paulo spirituosior & vegeta; Vinum etiam ad abortum disponit. Parcè ergo & moderatè bibatur. Dulcia magis conveniunt utero membranoso, ipsique foetui gratiora. Præterea etiam facilè fermentescibilia quæcunque esculenta & potulenta, indeque flatulenta, sedulo aut studiosè sunt à gravidis vitanda, cum abdomen uberius distendatur, & difficilem respirationem matri, & angustiam foetui, tormina, passiones hystericas, choleras aut diarrhæas, inferre soleant.

Omnis motus violentus caveatur, ac manuum extensio sursum, cum facilè abortum patiantur mulieres propter uteri compressionem, & abdominis attractionem: Contracto ita sic abdomine, valdè comprimitur & coarctatur uterus, subindè concitantur dolores uterini, & distentâ & extentâ vaginâ dilatur nimis orificiû uteri, & sæpius membranz foetum ambientes rumpuntur, & præmaturus aquarum excitatur effluxus: Item omnis gestatio aut sublatio oneris gravioris cum nisu tali, ut inspirent propter retentionem halitus, ac depressionem diaphragmatis inferiora versus, est novica, quia sic premitur uterus, & deorsum movetur: Saltus item pedum quilibet deorsum, in specie primis gestationis mensibus, mulieribus gravidis ob metum abortus propter placentæ avulsionem nocet; Movetur enim sic ovum uterinum inferiora versus, ut exinde ejusdem fiat effluxus, uti quidem abortus primis mensibus vocatur. Motus autem moderatus ultimis imprimis gestationis mensib<sup>9</sup>, ut saltatio blanda, satis conveniens est, quia tali motione uterus nonnihil subsidet, foetus magis deorsum inclinatur; hinc successivè distenduntur & dehiscunt viæ angustiores orificii uterini & vaginæ, & ista subsidencia ac motu deorsum nonnihil incipit laxari os pubis: unde post moderatum motum ultimis mensibus facilius sequitur partus, & facilius secundina separari potest: sed cautè admodum, ne hujus occasione foetus situm præternaturalem in partu acquirat, ut rectè contra communem opinionem hoc urget Mauriceau de Morb. Mulier. lib. I. cap. 11. & lib. 2. cap. 6.

Vigiliæ nimis autem diutius protractæ gravidis multum periculosa, Autore Bartholino Cent. 4. Hist. 70.

Veneris exercitium vitandum, ut ut raro soleant abstinere ab eodem; quia metus est, ne in fecundioribus primis mensibus ex repetita Venere fiat superfœtatio, aut etiam periculosa molæ generatio: ultimis mensibus penitus omittenda, ne venter tumidus nimis compressus noxam foetui inferat.

Tom. II.

Animi pathemata graviora etiam suas merentur cautelas; imprimis terror, hinc ira, fugienda sunt: Ira enim, cum insigniter moveat massam sanguineam, & excitet lochia, & hæmorrhagias uteri graviores, ad abortum disponere solet: Terror verò maximè signat foetum, cui adeo est nocivus, ut interdum exindè interimatur foetus, aut exinde ad epilepsiam lethalem jam in utero materno disponatur; sicut mulieres primo gestationis tempore terrefactæ interficiunt foetum, ultimo verò reddunt epilepticum: Sic mulier ultimo momento gravidationis vespere gravi terrore afficiebatur, post mediam noctem pariebat, foetus erat mortuus. Gaudium moderatum, lætitia & similia sunt saluberrima, in specie gaudium sæpius feliciorem solet præcedere partum.

Inter excreta & retenta in gravidis studendum est, ut alvus quotidie sit laxa seu aperta, cum retenta scybala & suppressi flatus graves alias dent turbas, in specie ultimis mensibus: Quod si sit clausa, fluida servanda est omni studio. Pro hoc tamen scopo sedulo vitanda sunt suppositoria, in specie acriora, tam primis quàm ultimis mensibus, idque ob metum abortus ex irritatione vaginæ uterici intestino recto arctè connexi, ne uterus disponatur ad spasmum. Item vitentur clysteres quicunque in gravidis, nisi interdum ad horum usum cogatur Medicus, iique cautè in minore præscribantur dosi, & non, nisi ex blandè emollientibus & carminantibus, lacticiis, jusculis avenaceis, non verò ex aromaticis acris præparandi. Adstricta ergo si fuerit alvus, potius uberior assumendus est, qui hic solet emollire, & ulterius derivare fæces: aut juscula pinguiora, aut copiosiora, aut similia fluida aut liquidiora, crebrius deglutiantur: aut cremor Qi, vel solus ad ʒss. l. ʒij. vel quod melius, cum dimidio Qi mistus, cum jusculo carnis fervido subindè usurpatus, est optimus; sic enim alvum retinet laxam. Aloëtica vitentur omnia, etiam pilulæ, quas vocant Francofurtenses; Nam menses stimulant, & vellicativa vi ad abortum disponunt: præterea aloë nimiam post se adstrictionem relinquit, & ita, quantum juvat, tantum nocet: Vitetur etiam Senna, quia tormina admodum gravia excitat, quæ mulieribus gravidis sunt novica, propter metum abortus: Si tamen adduntur Qea, sine torminibus operatur. Postmodum purgantia quæcunque vitentur studiosè, quia omnia sunt venenosa, virulenta, & vim habent enecandi foetum, & corrumpendi ejusdem nutrimentum proximum. Vix ex veris purgantibus aliud, quàm rhabarbarum tuto potest concedi gravidis, idque non solum propter adstrictionem, sed semper vel sociatum Qi, vel cum passulato vehiculo usurpatum. Cassia, quæ à quibusdam

(K k k k k k 2) pro-

propinatur prægnantibus, est novica, ob tormina & flatus, quæ ab illa excitari solent: item propter vim fermentativam passiones hystericas in quibusdam causatur; Item Manna nocet, quia propter dulcedinem fermentativam, adeoque propter flatulentiam, hystericam passionem inducit. Oleum denique amygdalarum dulcium recens expressum, ad ℥j. l. ℥i℥. in jusculeo calido jejuno stomacho haustum, optimè conducit ad emolliendam alvum, in specie, si à scybalis induratis fuerit adstricta. Ova etiam tremula seu liquida sorbilia, cum paucis saccharo, optimè profunt. Conducunt ergo passulæ minores laxativæ, tamarindum & tartarea, aut ex passulis & tamarindis lavativa leniora, vel sola, vel cum tartareis mista, quæ imprimis convenientia sunt mulieribus pro lavanda alvo.

℞. pass. min ℥j.

Contundantur in mortario, f. exinde pasta: quæ coquatur in tibi℥. ▽ communis.

Colaturæ ferventi infundantur.

fol. senn. f. st. ℥ij.

crem. q. ℥j.

sem. anisi ℥i℥.

st. violar. p. ij.

Stent in loco calido per ̄o; Manè coletur:

D. S.

#### Laxier-Trank.

Elegans admodum & proficua est potio, suavis saporis, cujus haustulus, quoties opus est, assumptus facillimè alvum laxat.

Quod si forsan dulcia ex passulis nonnihil sint adversa, ad acidula ex tamarindo commodè potest fieri accessus; pulpa enim extracta à ℥ij. ad ℥i℥. vel etiam, si cum tali pulpa misceatur tantillum rha-barbari, etiam commendatur.

℞. pulp. tamarind. ℥ij. ad ℥i℥.

crem. tartari gr. xv.

Θq. i gr. vj. l. viij.

syr. de cichor. c. rhabarb. q. s.

F. Bolus: S.

#### Laxierende Lattwerge auff einmahl.

Item tamarindum contusum, nodulo inclusum, & vino vel cerevisiæ infusum, hauriatur pro potu: Vel coquatur, aut ebulliat leniter in vino, vel in ▽, & hinc colatura vel simplex, vel tantillo rubi idæi, vel rosarum solutivi edulcorata, datur pro laxativo gravidarum blando, subinde haustum capiendū. Hinc Horstii electuarium de tamarindis pro laxandis gravidis describit in *observat. lib. II. pagin. 560*. In hujusmodi laxativis flatuum proventus vitandus: Ob id semen anisi aut fœniculi contusum hujusmodi decoctis, aut olea horum destillata pul-

veribus & electuariis, commodissimè adduntur, cum hæc ipsa flatus egregiè discutiant, & proventum flatulentiarum insigniter impediant. Fœtus ratione etiam de caryophyllis aut cinnamomo, aut parum de nuce moschata, intermisceri potest. Elæosaccharum anisi & fœniculi etiam amicum est fœtui.

## CAPUT II.

De

### Fœtu Debili Roborando.

Mater etiam respiciat ad fœtum, ejusque robur spirituosum conserve. Profectu ergo custodiendo & roborando gravidis conducit interdum ▽ cinnamomi bottiginata, aut cydoniata ritè parata: ut blandâ istâ volatilitate oleosa recreentur ~ animales exerciti in fœtu: item convenit succus, syrupus & miva cydoniorum, attemperata cum paucis pulveris caryophyllorum, & macis aut nucis moschatae; Atomata enim gravidis profunt pro conservando fœtu: Panarolus præ cæteris laudat ova sorbilia recentia, jejuno ventriculo assumpta: Item amygdalatum, factum more consueto ex amygdalis ambrosinis, cum semine fœniculi & paucis syrupo cydoniorum subactis. Haustulus vini interdum post pastum in adsuetis & in debilibus non est novicus; in robustioribus verò aut spirituosius, non semper est tutum vinum; haustulus tamen vini dulcis à pastus in adsuetis potest usurpari. Vel fiat vinum aromaticum infusionis plantarum aromaticarum, ut radice galangæ, levistici cum cinnamomo, aut temperantibus aromaticis, de qua interdum, sed rarò, capiat haustus.

Externè pro hoc scopo commodè frustum panis ▽ vitæ mulierum, aut balsamo embryonum sic dicto, vino generoso Malvatico, & similibus, irroratus applicetur umbilico, aut supra regionem pubis: item quando adsunt tormina abdominis aut dorsi, & metus est abortus. Panis piperatus irroratus vino Malvatico, & adpersus pulvere caryophyllorum & nucis moschatae, similiter pro fœtu roborando optimè conducit. Vel sacculus interpassatus fiat ex mentha, melissa, zingibere, galanga, caryophyllis, anthophyllis, semine anisi, fœniculi, coriandri, & similibus oleis & atis aromaticis, citri, cort. aurantium caryophyllorum, cinnamomi, &c. adspargendis, qui sub introitum lecti applicatur ventri calidus circa regionem umbilicalem vel siccus, vel vino generoso irroratus.



# CAPUT III.

De

## Gravidarum Regimine in Morbis.

**Q**Uoad therapiam seu regimen gravidarum in morbis, tam acutis quam chronicis, eadem sanè in his curandi est ratio, quæ in aliis subjectis, nisi quod accuratè semper uno oculo ad menses, altero ad fœtum, sit respiciendum, ne aut aliquid noxæ, aut quoad ejus corpus, aut quoad ejus in utero retentionem superveniat.

### ARTICULUS I.

De

#### Vena Sectione in Gravidis.

**Q**Uod ergo attinet sic dicta remedia universalialia: de venæsectione imprimis quaeritur, an conveniat gravidis? Notum est ex aphorismis, quod mulieribus venæsectio si administraretur, abortum inducat. Verùm Hippocrates vixit in climate fervidiore, & ubi mediâ diætâ utebantur mulieres. Apud nos, ubi luxuriantes sunt mulieres, administrare venæsectionem subindè consultum est, nempe junioribus, habitioribus & plethoricis. In iis sanè, qui sunt habitus laudabilioris, quæ corpore sunt succulento, & denique lauto utuntur victu & vino, in iis interdum necessaria est venæsectio medio gestationis tempore, scilicet quarto, quinto, vel septimo mense instituta, quia præservat eas ab abortu: Refert Panarolus *Pent. 1. Observat. 10.* se novisse mulierem quinto mense semper abortientem, quæ tamen instituta phlebotomia fuit præservata; unde in *Pentec. 2. Obs. 23.* tanquam optimum præservativum gravidarum plethoricarum, laudatur, ubi audacter primis mensibus venæsectionem instituere suadet. Interdum etiam binâ, interdum tertiâ vice, secatur vena medio gestationis tempore, interdum etiam ultra: Conf. *M. A. N. C. Ann. 2. Obs. 47. Ann. 6. & 7. Observ. 204. pag. 301. & Ann. 9. & 10. obs. 48. pag. 123.* Petrus Salius Diversus *de Affect. Part. cap. 22.* Zacutus Lusitanus *libr. 2. Pr. Admir. observ. 144. & Riverius Prax. libr. 15. cap. 16.* Non verò administranda est venæsectio ex intentione Hippocratis, qui dicit: si secetur vena, medio gestationis tempore, tunc esse talem innoxiam à purpura; quod falsum est. Et quidem instituatur venæsectio imprimis in brachio quocunque, non verò in pede, quicquid etiam dicat Zacutus Lusitanus. Interim tamen non sumus nimis profusi in sanguine exhauriendo in gravidis, sed sanguinis thesaurum

conservemus sartum testumque, ne partum reddamus difficiliorem debilibus gravidis. Instituatur potius venæsectio, si opus est, repetita vice, quam ut semel nimis de sanguine detrahatur: Nam & in talibus etiam in partu interdum, ad facilitandum hunc ipsam laboriosorem, necessarium est, venæsectionem administrare, ut melius negotium succedat: Id quod pariter tamen in morbis acutis observandum, in quibus, urgentibus indicationibus venæsectio convenit; tutius tamen medio gestationis tempore, minus verò primis aut ultimis mensibus, præsertim in his nostris regionibus temperatis, non semper adeò necessaria est venæsectio; aut, si instituitur, parcius institui potest, quam in climatibus calidioribus, & ubi diætâ magis lauta & spiritiuosa in usu est, uti in Gallia & Italia. Unde etiam apud nos non imitanda consuetudo istorum in venæsectione nimis excedentium, nec nisi observatis superioribus conditionibus, ad eam accedendum; nec ad exemplum illius gravidæ, cui 48. vicibus secta fuit vena sine periculo matris & fœtus, quod refertur à Mauriceau *libr. 1. cap. 11.*

### ARTICULUS II.

De

#### Purgatione Gravidarum.

**P**urgationem quod attinet: in iis, quæ facile vomunt, quæ continuo nausæ, aut picæ, aut stomachi dolore & similibus symptomatis laborant, leviora & blanda vomitoria primis mensibus propinare sæpè proficuum est. Nam ipsa natura hac in parte subinde nostra est magistra, quæ nobis viam præmonstrat, & in primis mensibus crebros, interdum continuos provocat vomitus, in specie, ubi adsunt symptomata stomachi, citra matris aut fœtus noxam. Hanc ipsam ergo & cautè imitari, cui erit prohibitum? Sic gravidam melancholicam vomitorio sine fœtus noxa curatam videb. in *M. A. N. C. Ann. 9. & 10. observat. 73.* Imo hoc tempore vomitoria tutiora longè sunt purgantibus fortioribus per inferiora.

Quod verò purgantia per inferiora attinet: præter ista emollientia, laxantia & blandè abstergentia superius proposita, omnia ea, præsertim acriora, omninò damno; utut exempla testentur non pauca, gravidis citra ullam noxam etiam frequentiora & vehementiora propinata & usurpata fuisse solutiva: vid. Scholzius *libr. 4. observat. 2.* item Zacutus Lusitanus *l. 3. Med. Princ. Hist. 14.* Cum sanè alias difficillimum sit, arte provocare abortum; nihilominus tamen in talibus nullus cordatus Medicus exempla talia suspecta saltem, & dubia alia, quæ accidentariò saltem

(Kkk kkk 3)

con-



contingunt, studio & temerè imitari deber. Nam purgantia propriè sic dicta

1. Ob malignitatem suam, quæ succum nutritium corrumpunt & alterant, foetui sunt nocentissima.
2. Ex torminibus & spasmodis intestinorum, si non hystericam in gravidis passionem excitare, tamen per consensum uterum ad sui contracturam & abortum periculosè stimulare possunt.

Quod si ergò purgans aliquod interdum, propinandum sit, cautissimè, ac saltem 4to vel 5to mense id fiat, idq; medio tempore gestationis, & probè circumspecta ejus quantitate, omnibusque ritè simul pensatis circumstantiis, vitando omnem irritationem ac tormina: conf. Hippocrates *libr. 4. Aphor. 1. & 1. 5. Aphor. 29.* Riverius *Prax. libr. 15. cap. 16.* Sennertus *Prax. libr. 4. P. 2. Quest. 3.* & Zacutus Lusitanus *libr. 3. de Medic. Princ. Hist. 14.*

### ARTICULUS III.

De

#### *Opiatorum Usu in Gravidis.*

**S**ymptomatis: utut omnibus ferè facile succurrat opium, ejusque laudanum, vix tamen tutò hoc usurpare licet in gravidis, saltem tremula manu, & in succincta admodum dosi: Observatum namque fuit, sæpissimè quævis opiata incautè administrata imprimis utero & gravidis maximè esse nociva, & omni gestationis mense, etiam circa ultima tempora, ut plurimum abortus & foetus immaturi ejectionem sæpius induxisse. Nocentissima sunt foetui renello, cum spirituum animalium exercitum destruere, & foetum enecare possint: Item in causa sunt, ut torpentibus, ab adhibitis opiatibus spiritibus motus æquabilis & blanda fibrarum nervosarum inflatio cesset, unde & fibræ uteri quasi resolutis & relaxatis, elabi ferè foetum patientur sub forma abortus, tono uteri sic resoluta. Interdum tamen, ubi metus est nimix uteri irritationis, aut nimix spirituum animalium commotionis in gravidis, ne commotione tali vel noxa inducatur utero, vel provocetur foetus ad abortum, consideratis prius benè omnibus circumstantiis, tantillum laudani opiatum una cum aliis adhiberi potest. Item aliis irritis in affectibus matris catarrhalibus nocturnis contumacioribus, v. gr. tussi ferina, virgiliis nimis, &c. necessitate urgente interdum ad laudanum opiatum, cautè tamen & appropriatis mistum confugere licet: vid. Horstius *libr. 10. Observat. 111.* In genere quoad purgantia & opiata: in gravidis observandum, an magis vel minus ferat mulier eadem? namque, quæ debili sunt stomacho, & facile

moventur à purgantibus, iis cautè propinanda laxantia: sicuti quæ debiliore sunt systemate nervoso, & quorum spirituum animalium rarior textura est, talibus non, nisi cautè, opiata propinanda.

## CAPUT IV.

De

### *Gravidarum Symptomatibus.*

**Q**uod in specie graviora attinet Symptomata, quæ gravidas subindè vexant, horum quadruplex ferè causa observanda venit:

1. Activitas auræ genitalis maris, cujus occasione mox post conceptionem varia pathemata gravidas affligunt.
2. Motus sanguinis fermentativus menstruus humoribus adhuc impressus, cujus occasione ex denegata excretionem varia pathemata ex commotis humoribus superveniunt, idque ferè primis gestationis mensibus.
3. Menses retenti, hinc sanguis uberius congestus, & ex retentis aliis excernendis multiplices actionum alterationes.
4. Consensus uteri alterati, & successivè distenti cum aliis partibus abdominis, præsertim cum ventriculo.

### ARTICULUS I.

De

#### *Vomitu Gravidarum.*

**V**omitibus nunc saltim primis gestationis mensibus molestus est, & partim ex vi auræ genitalis, partim ex motu humorum fermentativo menstruo resfluente, oritur, sicut vomitus quotidianus cruentus in gravida innoxius observatus fuit in M. A. N. C. *Ann. 9. & 10. Obs. 6.* Nunc mediis gestationis mensibus gravius affligit, & ferè ob mensium suppressionem in plus minus cacochymicis oritur: nunc etiam ad ultimos usque gestationis menses perdurat, & modò dictas pariter agnoscit causas: nunc verò ultimis gestationis mensibus saltim supervenit, qui antea non adfuerat, & partim ex consensu ventriculi cum utero nimis distento, partim ex irritatione ventriculi ab utero sursum nimis elato, originem ducit, pro varia hujus in fiendi modo ratione diversimoda instituenda est

C U R A.

Vomitibus, qui primo, secundo, aut tertio gestationis mense accidit, non facile sistendus, sed

sed naturæ negotium committendum, cum plerumque post unum alterumve mensem spontè cessare soleat; quo crebrius enim vomunt, eò facilius habent puerperium. Quod si diutius continuetur circa medium gestationis tempus, potius venæsectione quàm remediis compescendus. Quod si ex cacochymia, adeoque retentis acrioribus, forsàn vomitus contingat, præsertim ultra medium gestationis tempus blandè absorbentia & abstergentia ac temperantia conducunt, non negligendo, quæ stomachum confortant. De vomitu autem observetur, quod diversimodè affligat mulieres: Quædam, simulatque gravidæ factæ fuerint, etiam mox primis diebus vomitu affliguntur, rejiciendo per os varia aquosa & limpida, qualia subitò non sunt sistenda; aliæ in fine primi, & principio secundi mensis vomunt, usque ad medium gestationis tempus; quædam etiam usque ad partum, & nausæa laborant. Sed ultimis gestationis mensibus admodum periculosus esse solet, adeoque tunc maturè est compescendus. Pro sistendo ergò gravidarum vomitu, imprimis si pertinaciter hæreat, tam secundo, tertio, quàm ultimis mensibus; tunc præmissis aut interpositis blandè laxantibus appropriata stomachica sunt usurpanda: quæ inter conveniunt remedia quæcunque ex cydoniis, succus, miva cydoniorum, item syrupus ribium, agrestæ, de citro, & acetositate citri. Grana mastichis manè assumpta & comesta, item  $\nabla$  menthæ, cinnamomi cydoniata, ~ mastichis acidus cum  $\nabla$  cinnamomi propinatus: item liquor  $\nabla$  fol.  $\nabla$  i, in specie quando adest nausea propter mucum salsum vel pituitam salsum, vellicantem orificium stomachi: in talibus hic liquor est egregius, dosi  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . Ex his possunt fieri misturæ, quarum descriptiones seu compositiones sunt facillimæ.

Tinctura etiam Oli  $\sigma$ is Zvvelferi in mulieribus gravidis nimis vomentibus ad 30. vel 40 guttas non est inconcinna. Alia Martialis Marte magis imprægnata minus tuta sunt, cum eorum usu tormina parturientium similia excitata observaverim: ~ mastichis, ~ Oli  $\sigma$ is, hinc conserva rosarum, aut conserva menthæ parumper cum ~ u Oli  $\sigma$ is acidulata, &c. in usu sunt. Quod si acriores succi sunt, præsertim ultimis mensibus, à quibus omni mane vomitus stimuletur:

*℞. corall. rubr. præp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .*

*lap.  $\sigma$  præp.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .*

*pulv. caryoph. gr. xv.*

M. f. Pulvis: S.

Magen-Pulver.

Externè regioni stomachi in vomitu nimio imponendum est emplastrum stomachale Cratonis, mistum cum tacamahaca: Emplastrum ex theriaca, imprægnata cum aliquot

guttulis  $\sigma$  ei  $\sigma$ ati menthæ & macis: aut imponatur cataplasma ex fermento cum speciebus stomachicis, in specie aromaticis. Item fiat inunctio stomachi cum oleo mastichino: oleo absinthii, cum oleo  $\sigma$ ato mastichis, menthæ, & nucis moschata, tam expresso quàm destillato. Præterea crusta panis in vino generoso intincta, & aromatibus adspersa, ventriculo applicata conducit. Vel balsamum Peruvianum inducatur linteo denso, cui inspergatur pulvis gallarum confusarum, & aliquantum macis, & ita subindè applicetur stomacho. In vomitu contumaciore, ac gravi nimis vomendi conatu, ubi mulieribus excitantur pathemata hysterica, vel si primis gestationis mensibus urgeant passionēs hystericae cum vomitu, in tali casu, præter Ram Oli  $\sigma$ is Zvvelferi, emplastra hysterica, v. gr. emplastrum matricale de galbano & tacamahaca, malaxatis invicem cum balsamò Peruviano, regioni umbilicali applicata conducunt. Isti enim vomitus sunt simpliciter convulsivi.

## ARTICULUS II.

De

*Pica.*

**E**st ea appetitus insignior rerum insolitarum, superveniens ferè circa secundum mensem, dum menstruus sanguis in suo motu fuit impeditus, unde stomachi fermentum alteratur, quod à sapore naturali in acidum degenerat, &  $\sigma$  volatile  $\sigma$ sum obtundit. Appetuntur in pica vel consueta, vel alias esui insolita: Si appetuntur esui insolita, vix tutò concedi potest; nam, utut talia comesta non semper noceant, si non nimia quantitate assumantur, tamen vix tutò semper, imprimis si sint res absurdiores, concedi possunt: Sin verò appetantur res esui alias aptæ, tunc sanè concedendæ sunt: Nam res appetitæ facilius digeruntur & concoquuntur, & sæpè tales gravidæ citra noxam hujusmodi cibos assument, quæ non-gravidis ipsi vix essent absque noxa.

## PROGNOSIS.

Malum hoc nihil habet in recessu, nisi mulier fiat languida & debilis, cum si comedat nimis intensè, periculum est, ne varia symptomata superveniant, & foetus ad abortum disponatur.

## CURA.

Quoad curam: utiliter ea usurpari possunt, quæ de vomitu dicta sunt. Quod si verò talia appetunt, quæ haberi nequeunt, ne exinde foetui accidat nocumentum, exhibendum est gravidæ aliquid de nucè moschata cum

cum pauco melle. Alias in pica succus citri & aurantiorum, aqua corticum aurantiorum, syrupus de corticibus aurantiorum & citri, syrupus de absinthio, item pulvis nucis moschatæ, cortex aurantiorum & citri laudantur. Tenella etiam folia vitis, ex quæ iis expressus succus purificatus, vel solus, vel cum succo, syrupo, aut miva cydoniorum haustus: item  $\nabla$  vitis, quæ Majo mense spontè ex pampinis incisus exstillat; aut  $\nabla$  acidula tenellorum vitis foliorum destillata, oleum  $\Omega$ atum corticum aurantiorum, & eorum essentia, etiam utiliter propinantur. Hinc granata, eorumque succus acidus, cydoniorum &c. & panis in his ipsis maceratus comestus etiam picam tollere solet. Quod si appetantur res insolitæ, quæ apparenter sunt difficilis digestionis, ut creta, calx, carbones, &c. tunc fixa acidum absorbentia conveniunt, ut sunt corallia præparata, mater perlarum, lapilli cancerorum, cornu cervi, item ebur, tam sine igne, quàm ustum, quæ vel cruda, vel cum tantillo aceti irrorata, aut cum vino pauco assumantur interius.

### ARTICULUS III.

De

#### *Nausea & Fastidio Cibo- rum.*

**D**UO hi affectus non raro ad tertium usque protrahuntur mensem, quo transacto, spontè cessare solet omne hujusmodi fastidium. Hoc fastidium, tanquam gravidationis signum, proponit Hippocrates *Sect. 5. Aphor. 45.* dum inquit: *Si mulieri cessent purgationes, neque horror, neque febris superveniat, & cibi fastidia accedant, judica, ipsam in utero habere.*

#### C A U S Æ.

Origo horum est ex alteratione contentorum corporis, ac fermenti stomachalis, partim ab aura genitali maris, partim à retentis menstruis.

#### PROGNOSIS.

Mala hæc nihil in recessu habent, nisi mulier languida & debilis fiat, &c.

#### C U R A.

Ne ergo ex fastidio graviore corpus contabescat, aut etiam generatio ovi uterini, & albumini vestimentum, ut sic dicam, seu albumini generando materia deficiat, propter eam ad tollendum fastidium quædam à Medico sunt ordinanda. Primò lene vomitorium propinatum, imprimis in nonnihil cacoehymicis, sæpius utile est: Quod si non tollatur, potest propinari fortius vomitorium. Præ-

ter hæc pilulæ aloëphanginæ sine purgantibus paratæ convenienter propinantur; aromaticæ enim cum sint, stomachum detergent, eumque roborant. Juxta hæc subinde sunt acida assumenda, ad corrigendum succum stomachalem inquinatum. Hinc syrupus conservativus radicis zingiberis, aut ipsum zingiber in India conditum, vel etiam nux moschata in India condita, vino acidulo irrorata, & parum ejusdem tempore matutino haustum, fastidium ciborum delet. Vinum generosum malvaticum cum buccella panis assumptum, mala cydonia condita, miva, succus, & omnia ex cydoniis parata, & quæ de vomitu commendata, conducunt. Fœniculum aceto conditum, item cappares aceto conditi, elixyr item stomachale ac similia commodè usurpantur. Præ cæteris ~ mastichis acidus, item ~ salis dulcis, convenientissimè fastidium gravidarum tollit, si assumatur in vino malvatico, vel pauco vini generosi.

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  menth.  $\mathfrak{z}$ ij.

cinnam.  $\mathfrak{z}$ vj.

~ mastich.  $\mathfrak{z}$ ij.

theriac. camph.  $\mathfrak{z}$ j.

$\Theta$ is dulc. gtt. xij.

syr. de succ. cydon.  $\mathfrak{z}$ ss.

M. f. Mixture.

D. S.

#### *Magen-stärke und Träncklein.*

De qua interdum cochleare exhauriat gravis primis mensibus, quæ ipsa in stomachi affectibus earundem insigniter conducit.

Externè commodè oleum mastichinum, menthæ, cydoniorum, cum pauco oleo stomachi Cratonis regioni stomachi inungitur, & later calidus desuper applicari potest: aut etiam ceratum seu emplastrum de crusta panis, malaxatum cum oleo mastichino, item ceratum de tacamahaca, commodè imponitur regioni stomachi.

### ARTICULUS IV.

De

#### *Torminibus Ventris Gravidarum.*

**U**Lterius sæpè tormina ventris dolorosa molesta sunt gravidis; nunc quidem in fine gestationis, quo tempore dolores nothos parturientium constituunt, de quibus infra; nunc verò etiam prioribus mensibus iisdem gravia sunt; nunc ex flatibus, ab acido vitioso in intestinis per fermentationem suscitatis, sicut in passione hysterica; nunc à mucilagine viscida pontica intestinis adhærente, & ea vellicante ortum habet, & colligitur, quando non vomunt & voraces sunt.

CURA.



C U R A.

Utroque absorbentia cum aromatibus temperatis sociata, carminantibus imprimis, sunt in usum vocanda. Non tantummodò semina 4. calida majora & carminativa notissima, in vino bullita; sed præterea etiam cortices citri & aurantiorum cum maxillis lucii piscis; item vina aromatica, seu clareta Hippocratica, & etiam & zedoariæ, ubi à flatibus est malum, corticum citri & aurantiorum Ræ seu essentia, & olea Rata: anisum etiam & fœniculum, horumque olea, in vehiculis appropriatis cum coralliis & similibus propinata, R tartaricum & Rato anisi imprægnata, egregia sunt. Præ reliquis convenit vitæ mulierum cum oleo fœniculi aut corticum aurantiorum. Potest hinc fieri talis mistura:

℞. ▽ fœnic. ʒij.  
cinnam. ʒß.  
carminat. ʒj.  
~zedoar. ʒij.  
Qi dulc. ʒß.  
syrup. de cort. aurant. ʒß.  
M. f. Potio:

Convenit etiam gummi \*cum in forma potionis liquidæ assumptum, pro abstersione mucaginis acidæ. Externè inungantur superiores abdominis regiones oleo rutæ, laurino, chamomillæ, acuatò cum oleo destillato chamomillæ. Item fomenta seu sacculi ex carminantibus, v.g. ex Oleo & milio tosto cum seminibus istis calidis majoribus, qui sacculi interpassati & aut vino irrorati abdomini applicati conducunt ad sistendos dolores: Aut, quod est experimentum à Castro: fiat placenta mollis ex vitellis ovorum num. 17. quibus fortiter agitatis addatur pulveris anisi, cumini, fœniculi, à ʒj. & cum s. q. oleo laurini misc. pro placenta insternenda abdomini. Vel fiat cataplasma molle ex seminibus 4. calidis contusis, cum vitello ovi exceptis, linteo superinductum, & abdomini instratum.

ARTICULUS V.

De

Diarrhœa Gravidarum.

Uterius tam primis, quam etiam subindè ultimis mensibus, alvi fluxus seu diarrhœa, nunc simpliciter talis, nunc cruenta, est molesta gravidis, periculum abortus inducens.

P R O G N O S I S.

In principio gestationis periculosior ac mali ominis esse solet, adeoque sistenda: Circa ultimos verò menses sine causa manifesta obveniens, nisi sit nimia, relinquenda; siquidem prægnantes nonnunquam hujusmodi diarrhœas, interdum & leves dysenterias, cum

Tom. II.

euphoria ferunt usque ad partum citra noxam, quo tempore sponte cessant per lochiorum fluxum: vid. Scholtzius *Conf.* 340.

Nimia autem est affectus periculosus, uti jam suo tempore monuit Hippocrates *Scet.* 5. *Aphor.* 34.

C U R A.

Sin ergo fiat quocunque gestationis tempore sine virium prostratione, nec sit adeò copiosus, nec inturbet somnum, & quæ sunt similes circumstantiæ, non adeò facillè sistatur, sed aliquandiu relinquatur diarrhœa, & potius stomacho prospiciatur; quoniam naturâ ductrice sanguinis excernitur excrementum, & sic purgatur. Sin verò sit diarrhœa nimia medio gestationis tempore, aut vires deiciat, ut metus sit abortus, speciatim si dysenteria maligna apprehendat mulieres gravidas, ferè semper abortiunt. Si ergò sistenda sit diarrhœa, tunc purgantia omninò exulent, aut saltem rhabarbarum usurpandum est. Potius conferunt blanda, adstringentia acidula, qualia imprimis sunt: Cydonia cocta condita, succus cydoniorum fumo sulphuris asservatus, rob. cydoniorum, item syrupus & omnia remedia cydoniata, corallia soluta, etiam syrupi & Ræ coralliorum, C. C. ustum, &c. decoctum radicis tormentillæ aliis permistum. Item gelatina, C. C. ad ʒß. in potu ordinario dissoluta quotidie bibita. Denique theriaca, vel electuarium diascordii Fracastorii, aliis irritis in vehiculo appropriato, admisto quodam acido, usurpatum est efficax. Cautus tamen sit ejus usus propter opium simul ingrediens: unde cum tantillo acetivi vel aliis temperandum est.

℞. ▽ menth. ʒiß.  
succ. cydon. ʒvj.  
~mastich. ʒij.  
elect. diascord. Frac. ʒj.  
extr. torment. ʒß.  
syr. corall. ʒß.

M. f. Potio subindè haurienda.

Quibus accedat subindè blandus sudor:

Spiritus mastichis etiam confert: item conserva rosarum vitriolata, cum coralliis rubris præparatis, & syrupo aut succo cydoniorum instar electuarii, repetitum comesta conducit:

℞. conf. rosar. Olat. ʒij.  
elect. diascord. Frac. ʒij.  
corall. r. præp. ʒj.  
nuc. moschat. ʒß.

c. s. q. syr. cydon. f. Electuarium.

D. S.

Anhaltende Stärck & Lattwerge.

Dosis quantitas nucis moschatæ.

Externè commendatur emplastrum ex mastiche, subacta cum oleo rosarum, & sufficiente quantitate ceræ umbilici regioni appli-

(LII III)

plicandum. Vel fiat cataplasma ex cydoniis coctis, cum cujus pulpa misc. pulvis macis, caryophyllorum, nucis moschatæ, mastichis & similibus, quod ipsum imprimis stomacho est applicandum.

## ARTICULUS VI.

De

### *Dolore Lumborum, Coxendicum & Pubis.*

**D**olores lumborum, coxendicum ac pubis, subindè multum affligunt gravidas, & ferè oriuntur ex distensione uteri, ejusque ligamentorum & membranarum ipsi connexarum: vel à pondere uteri magis subsidentis, aut anteriora versus prominentis: idque in dolore pubis. Ligamenta ista & partes vicinæ interdum adeò distenduntur, ut etiam ruptio in uno alterovè loco fiat, unde vomitus, dolores, febres, &c. superveniunt: vid. Mauriceau de Morb. Mul. l. I. cap. 13. Observandum autem hic, varium esse fœtus situm in abdomine: Nam quædam fœminæ portant fœtum altè, unde nullas sentiunt infra molestias; aliæ admodum infra, id quod dolores inguinum & coxarum infert; aliæ gestant fœtus, ut insigniter promineant; aliæ, ut iidem intus sint quasi reconditi, unde dolores dorsi & renum inducuntur.

C U R A.

Pro doloribus his leniendis litus blandè emollientes & laxantes ex o. lumbricorum terrestrium, amygdalarum dulcium recenti, chamomillæ, &c. acuatæ cum paucis o. ciñati juniperini: item pro coxarum doloribus subindè graviter lancinantibus ∇ articularis ad extra cum spiritu lumbricorum terrestrium benè affricetur.

## ARTICULUS VII.

De

### *Odontalgia Gravidarum.*

**C**ommunis etiam querela est gravidarum, Cut molestias dolorosas percipiant ex dentium dolore: quem, primis mensibus molestum, optimè sistunt decocta appropriata in ore detenta, v. g. ex absinthio, quinquefolio, oxylapatho, urtica majore & ligno sancto: quorum in ∇, paucis addito aceto, detineatur decoctum in ore, & subindè exspuatur. Quod si dolores dentium forsitan sint ex scorbutico, loco ∇æ & aceti fiat, decoctum in lacte vel fero lactis. Alias etiam decoctum nicotianæ in ore derentum, etiam potenter dolorem dentium sistit. Vel o. camphoræ, aut o. origani Cretici, aut o. statum caryophyllorum, bombace exceptum immittatur, aut imponatur interius denti. Item essentia ligni Guajaci

aut sassafras cum V parata est admodum efficax: Si in hac solvantur aliquot grana laudani opiatæ, dant Rm odontalgicam, cum bombace salubriter applicandam: Nam veteres Philonum Romanum non sine successu denti dolenti imposuerunt ratione papaveris: Externè temporibus applicetur emplastrum in forma thaleri ex mastiche & tacamahaca.

## ARTICULUS IIX.

De

### *Cordis Palpitatione & Syncope Gravidarum.*

**J**uxta hæc procedente successivè gestationis tempore, supervenit gravidis etiam molesta palpitatione cordis, cui interdum syncope supervenit: & quidem

1. Paulò habitioribus juvenculis, & imprimis, si ambulando se movere incipiunt: Talis palpitatione est ex abundantia sanguinis.
2. Affliguntur gravidæ hypochondriacæ, in quibus supervenit vitio sanguinis, & affectu nervorum spasmodico, à vitioso acido ad congruescentiam dispositi & apti, ut in ventriculis cordis stagnet.

C U R A.

Priori in casu, si palpitatione sit vehementior, si superveniat circa medium gestationis tempus, si sit in constitutione corporis laudabilior aut succulenta, optimè tollitur per venæsectionem: quæ si non possit admitti, vel non profit, ad alia appropriata est accedendum. Posterore in casu acidum destruat: quæ inter eminent Marina, & hinc quædam Siavolatilia in parva dosi. Hinc conveniunt corallia, & omnia ex coralliis ritè parata, in specie R coralliorum antiscorbutica, R coralliorum cum ~u cordis cervi: aut saltem loco hujus in pauperulis solutio coralliorum cum succo citri saccharo edulcorata propinanda est. Conveniunt etiā mater perlarum præparata, testæ concharum & ostrearum. His addi potest parum de Se volatili macro, v. g. Se volatili ☐æ probè rectificato, vel Siis \*ci; hinc spiritus rosarum & melissæ, & cum his parata essentia ambræ; Elixir etiam citri cum modico proprii succi in paroxysmo egregiè convenit. Interdum etiam theriaca in haustu vini propinari potest. De cætero ∇ cordis cervi composita, ∇ cordialis Herculis Saxoniz, Confectio alchermes cum succo citri soluta, & similia, per se sunt nota. Externè melissa cum vino irrorata regioni cordis; vel lintheamina spiritu cordiali calida madida imponantur: Vel fiat inunctio pulsum & regionis cordis cum oleo Rto melissæ citri, ciñamomi, quæ

quæ cum corpore pro balsamo inungantur contra lipothymiam & cordis palpitationem.

## ARTICULUS IX.

De

### *Tussi Gravidarum.*

**S**Ubinde graviter & periculosè vexat tussis gravidas, quæ, quò major & grandior est fœtus, eò periculosior, propter concussionem abdominis, & hinc abortus metum. Circa hanc tamen ejus differentiz observandæ; cum nunc sit nocturna, adeoque imprimis catarrhalis, ex lymphæ acri imprimis oriunda laryngem vellicante, in qua pauca & modica ejiciuntur; nunc verò diurna, quæ est continua, & ut plurimum ex vitio stomachi oritur, & in qua rejecta viscida & mucilaginosa malum leniunt; nunc sicca, seu à materia tenui, sive à causa externa, sive à lymphæ acriore; nunc humida seu à materia crassa.

Quod si tussis sit nocturna, & à materia tenui, curatur optimè mox in principio, mediantibus remediis temperantibus anodynis, seu incrassantibus; hæc inter conducunt species diaireos temperatæ, dia-tragacanthi, frigidæ, conspersæ aliquot guttulis olei Rati fœniculi vel anisi, &c. semen fœniculi saccharo obductum, quod roborare simul fœtum, & oculos ejus elegantes reddere dicitur; Decocta avenacea cum syrupo violarum, pulpa passularum, syrupo diacodion Montani, qui cum baculo de glycyrrhiza capi potest. Juxta hæc in usu sunt passulæ, à quibus V deflagavit, & passulata, loh de passulis, pulpa passularum, imprimis cum spiritu vel elæosaccharo anisi imprægnata. Elæosaccharum anisi, fœniculi, ac similia temperantia olea Rata, ac grata carminantia. Rotulæ paratæ ex speciebus diâ-ireos cum o. Rati fœniculi & anisi; quæ sub introitum lecti in ore detineantur. Quod melius adhuc faciunt pilulæ de styrace moderata dosi, propter ingrediens opium; quæ ipsæ post moderatam cœnam sub introitum lecti deglutiantur. Propinantur imprimis cum pulvere pectorali ex benzoë, antihectico Poterii, radice ireos Florentinæ, &c. Aliàs syrupus de jujubis, de hyssopo, & tussilagine, ac similes etiam profunt.

In tussi verò humida & diurna optimum est usurpare alterantia & incidentia, in specie stomachica; Adeoque optimè leniunt fœniculata, anisata, V asthmatica Rudolphi, mista cum dimidio ~ Ois aut g. \*ci cum viridæris, quæ ad 40. vel 50. guttulas usurpatur. Item syrupus & remedia ex hyssopo, syrupus & decoctum de marrubio, helenio, mixtura ex oxymelle scyllitico, cum V hyssopi & cinnamomi, cui parum ~ Ois dulcis sit additum, Item species diâ-ireos, passulæ sæpius

Tom. II.

deglutitæ, vel etiam decoctum helenii cum passulis in vino subindè delibatum, electuarium ex pulvere helenii cum melle, &c. Succus raphani est egregius, modò ut præcaveatur ejus flatulentia, addendo de elæosaccharo, ex oleis seminum carminativorum parato.

## ARTICULUS X.

De

### *Hæmorrhagiis Gravidarum.*

**H**Æmorrhagiæ variz non rarò terribiles & periculosæ mediis & ultimis mensibus gravidis sunt molestæ; quæ nunc sunt per uterum; nunc verò sunt per alia loca: Uterinæ nunc sunt periodicæ, nunc vagæ. In his cautus sit Medicus, ne utiles supprimat, superfluas verò relinquat. Quæ sunt per uterum, ut plurimum funestæ sunt, utpote quæ præsentaneum abortus inferunt periculum. Cum verò etiam plures prostant observationes mulierum gravidarum, quibus mensium fluxus innoxius fuerit, v. g. in Horstio lib. 5. observ. 38. item in M. A. N. C. Ann. 1. pag. 224. obs. 96. & Ann. 9 & 10. observ. 29. propterea non confundenda est hæmorrhagia uteri præternaturalis, & quæ abortum minatur, cum hæmorrhagia vaginæ uterinæ. Nempe sanguis, qui effluit in gravidis, aut prodit ex ipso utero per orificium ejus internum, aut prodit saltem ex vagina uterina: prius si fiat, periculum abortus imminet; posterius vero sine periculo est, & instar fluxus menstrui se habet. Fluxus hic menstruus ex eo ferè cognoscitur, quod periodicè & tempore consuetò eveniat, idque sine dolore, & quod successivè ac pedetentim ex collo matricis effluat, internum verò orificium uteri exactè clausum observetur: Si verò ex ipso utero fluat, dolores adsunt hypogastrii, lumborum lancinantes, parturientium similes, subitò accidit, & sanguis in magna abundantia effluit, continuò quoque prodit, nisi à grumo sanguinis aliquandiu sistatur, sed brevi post majori impetu adhuc redit.

### C U R A.

Hæmorrhagiæ hæc uterinæ sequuntur occasione mensium suppressorum: si tamen sunt periodicæ, singulis duabus aut 4. septimanis repetentes, sive sint ex utero, sive ex aliis locis, & fiant cum euphoria gravidæ, & mensium excretioni vicariæ sint, relinquendæ sunt, nisi sint nimix; tunc enim moderatà venæsectione, & remediis appropriatis adstringentibus, non nihil sufflaminari possunt. Item observatum est in aliis, cum menses non fluant per ordinaria loca, toto gestationis tempore subinde per alia erumpere: nunc quidem per nares; vid. Observ. in lib. 4. observ.

(LIIII 2) Schen-



Schenckii pag. 573. Sic Salmuth *Cent. 2. Hist.* 54. & Solenander *Secl. 5. Conf. 15. §. 36.* observant vomitum sanguinis, imò quibusdam hæmorrhoidum supervenit fluxus admodum salubris, vid. *M. A. N. C. Ann. 4. & 5. p. 299. & Ann. 6. obs. 63.* si supprimatur forsan, per hi-  
rudines revocandus. Singularem hujus rei habet observationem Zacutus Lusitanus *lib. 1. Med. Princ. obs. 27.* Si verò hæmorrhagiæ sunt vagæ & extra uterum, signum est, quod subsit vitium sanguinis acrioris, aut inclinantis ad scorbutum, quæ uti minus sunt periculosæ, ita pro circumstantiarum ratione nunc relinquendæ, nunc per venæsectionem aver-  
tendæ, nunc curandæ, per Martialia. Verum hæmorrhagiæ gravidarum vagæ, quæ ex utero immediate proveniunt, plus habent in recessu: si primis gestationis mensibus mulieribus effluat sanguis ex utero, nunc florens, nunc aquosus, sive fiat cum torminibus, sive sine his, semper pessimum est: Nam innuit molam, nunc simplicem, nunc foetui conjunctam, quibus occasionibus irritatus uterus ad contenti præternaturalis exclusionem se accingit. Si verò, quod pejus, in mediis aut ultimis gestationis mensibus graviores hæmorrhagiæ uteri vagæ, & interruptæ accidunt, periculum adest vel abortus, vel foetus jam mortui, vel debilis, vel molæ: fiunt nempe ex imbecillitate uteri, qui irritatur ex re præternaturali, unde ex irritatione ferè avulsio & separatio placentæ ab utero sequitur.

His & similibus consideratis benè, perpendat Medicus, an sit opus naturæ talis hæmorrhagia, an verò sit quoddam symptoma? Nam ex Hippocrate jam scimus, quod sanguis ex utero aut ex mammis effluens, foetus debilitatem & imminentem abortum innuat: Si mulieri consuetus sit sanguinis fluxus, si citra virium debilitatem contingat, si cum euphorio hoc fiat, si alias abortum fecerit ex sanguine abundantiore, & quæ sunt similes circumstantiæ: In talibus casibus sinendus est fluxus, & saltem ejus copia est moderanda, non verò citra necessitatem ex toto supprimendus est, in specie, si simul certam quandam periodum observare videatur.

Quod si non fiat, sed gravior hæmorrhagia uteri superveniat, & mater percipiat debiliorem foetus motum, ipsa fiat lassæ & debilis, sentiat gravius solito pondus in utero, appetitus ipsi dejiciatur, superveniant dolores vagi lancinantes in dorso & regione lumbæ, cò pejora sunt: In talibus casibus vix aliis remediis est locus, quàm promptè liberare foeminam, vel per molæ ejectionem, vel ut abortum promoveat; minus quidem auxiliis pharmaceuticis, utpote, quæ hæmorrhagiam magis intendunt, sed potius auxiliis Chirurgicis manuum opera, tam orificium uteri internum diducendo, magis magisque aperien-

do, & ita molam aut abortum extrahendo: conf. Mauriceau *lib. 1. c. 20. & lib. 2. c. 273.* item Velschius *Mictom. Cent. 3. obs. 89.* Non enim sisti solet & potest sanguinis profluvium, sed si aliquandiu persistit, tam matrem quam infantem è medio tollit: si verò foetus statim ejiciatur, matris viribus constantibus, illa servari potest. Notatu digna est observatio Riverii in *Cent. 3. obs. 24.* circa fluxum sanguinis in gravida immodicum, eventientem ex foetu mortuo, qui alio modo nec potuit nec debuit curari, quàm foetus mortui expulsionem. Quod si ante hujusmodi auxilia manualia aliquid tentare locus superest, semper respiciendum est ad foetum, ut robur partim externis analepticis, partim internis probè nutrientibus & nonnihil spirituosius concilietur. Juxta hæc blandè adstringentibus firmetur uterus, & simul nonnihil coercetur sanguinis impetus, ne abortus tandem superveniat: Quod si verò hæmorrhagia fiat per alium locum, minus periculosa esse solet, & consideratis circumstantiis, imprimis habitæ ratione gravidæ, nunc sistenda, nunc, si moderata fuerit, relinquenda. Pro hæmorrhagia compescenda usurpetur v.g. mistura polychresta Sylvii *cap. 9. l. 1. Prax. §. 20.* item corallia rubra præparata cum lapide hæmatite, terra sigillata in succo granatorum vel cydoniorum &c. remedia ex tormentilla, syrupus plantaginis, syrupus paratus ex succo symphyti & portulacæ, cui necessitate urgente parum syrupi papaveris albi admisceatur. Propinetur in  $\nabla$  tormentillæ, portulacæ, &c. Syrupus item coralliorum, ribium, myrtillorum, cydoniorum & similes usurpentur. Tinctura coralliorum cum spiritu lignorum, bis vel ter quotidie usurpata, optimè convenit: Aut fiat electuarium ex conserva rosarum antiqua vitriolata, cui corallia rubra & terra sigillata intermisceantur, cum syrupo cydoniorum, irrorandum cum  $\mathcal{R}$   $\Delta$ is vitrioli, vel liquore styptico: de quo electuario bis vel ter quotidie quantitate nucis juglandis vel castaneæ accipiat.

$\mathcal{R}$ . Rad. tormentill.

bistort.  $\mathfrak{a}$   $\mathfrak{z}$ ss.

b. consol. maj.

sanic.

pyrol.

summit. hyper.  $\mathfrak{a}$  M. j.

Coqu. in  $\nabla$  chalybeata q. s.

Colatura  $\mathcal{R}$ .  $\mathfrak{z}$ xv. ad  $\mathfrak{lb}$ ss.

adde

$\nabla$  cinnam.  $\mathfrak{z}$ ss.

Syr. de symph. Fernel.  $\mathfrak{z}$ ij.

D. S.

Anhaltender Trans.

Item in statu sanguinis serosi bolus Armena, C.C.ustum, &c. usurpanda sunt. Interdum etiam

etiam ad syrupum dia-codii, vel ad mitiora opiata fugiendum, nempe si dolores lancinantes crebrius repetant. Conveniunt præter alia, quæ in nimia narium, mensium & uteri hæmorrhagiis, fuerint commendata, una cum corporis quiete, & externorum à frigore munitione. Observavi aliquando gravidæ scorbuticæ, & facili hæmorrhagiis nimis uteri obnoxie, ex propinata R<sup>q</sup>i composita hæmorrhoidum fluxum esse curatum, cum in non-gravidis subindè menses stimulet.

## ARTICULUS XI.

De

### *Suppressione Urinae in Gravidis.*

**S**ubindè, speciatim ultimis gestationis mensibus, supprimitur gravidis urina, ex utero distento, & propter pondus inferius subsidente, ac vesicam comprimente. Fit hoc pro variolitu fœtus & uteri, quod rectè observavit Guillimeau de felici Puerperio, & hinc imprimis urina est suppressa, quando fœmina stat erecta, eadem verò jacente, facilius prodit.

C U R A.

In tali casu monet Guillimeau, ut mulieres suis manibus attollant ventrem prominus superiora versus, blandè tamen, ne corpus matricis prematur; quod fit eò facilius, si simul adjungant fœtus emollientes, ut relaxentur vasa uteri. Internè à diureticis abstinendum, aut leniora saltem eadem sunt propinanda. Externè potius regio vesicæ in pube illinenda est oleo scorpionum; vel balnea & fomenta instituantur ex althæa, malva, meliloto, parietaria & similibus; optimum est cataplasma, factum ex parietaria cum pinguedine anserina & oleo scorpionum, pubis regioni impositum:

℞. HB. parietar. m. ij.  
cherefol. l. flor. chamom. m. j. ad  
miss.

Coquantur ad mollitiem:  
Pulpæ per setaceum trajectæ  
adde

busyr. rec. ʒj. l. ʒij.  
℞. scorpion. ʒss. l. ʒiij.  
M. f. Cataplasma. S.

**Harn-treibender Umschlag.**

Applicetur calidè regioni pubis, imponendo operculum calidum.

## ARTICULUS XII.

De

### *Stranguria in Gravidis.*

**D**e hac optimè dicit Gesnerus lib. 3. Epist. pag. 84. desperatam stranguriam miti-

gari posse in gravidis, si per intervalla iis alvus solvatur cum syrupo de floribus Persicorum; sic enim partim evacuantur, partim revelluntur humores, & interdum, si biberit decoctum radice althææ recentis cum passulis & saccharo, aut cum simili decocto emulsio ex amygdalis præparetur. Item convenit decoctum jubarum cum lapillis percarum, &c.

## ARTICULUS XIII.

De

### *Spasmi Gravidarum.*

**S**pasmus interdum gravidas torquet, præsertim crurum, item surarum ac pedum. Convenit dens equi marini præparatus, & externè annulus ex dente equi marini, pollicis pedis applicatus: item ℞ & ~ lumbricorum ʒss. trium pro litu: item ℞ scorpionum, amygdalarum dulcium cum pinguedine viperina: vid. Velschius Hecat. 2. pag. 57. Euporiston etiam est matricaria recens contusa, & cervici imposita, nunc sola, nunc cum verbenâ mista.

℞. ∇ hirund. c. castor. ʒj.  
sberiacal.  
cephal.  
~ lil. convall. ā ʒij.  
Misc.

Qua mistura pedes calide suère inuncti.

Simile exemplum habet Horstius doloris pedum periodici acerbissimi & diuturni, in quo externè insigniter profuit ∇ hysterica camphorata, cum spiritu liliorum convallium & ceraforum nigrorum mista. Alias ∇ articularis ad extra, mista cum spiritu lumbricorum terrestrium in talibus doloribus insigniter confert externè.

## ARTICULUS XIV.

De

### *Dolore Tensivo, Fissuris & Rimis Abdominis in Gravidis.*

**F**it interdum, ut mulierculæ ultimis mensibus, quando nempe prima vice utero gerunt, ex distensione pellis abdominis gravem dolorem tensivum & lacerantem percipiant: imò distensio hæc interdum est tanta, ut si forte cutis sit tenerior, interdum fissuras agat, ac rimas malas dolentes & molestas. Huic malo ut succurratur, optima sunt unguenta & linimenta laxantia & emollientia, quæ sunt v. gr. ex mucilagine seminis lini, semine fœni Græci, radice althææ cum medulla crurum vituli, addito simul oleo amygdalarum dulcium ac liliorum alborum, item

(Llllll 3)

pin-

pinguedine gallinacea & anserina ac simili-  
bus: vel linimentum ad præmaturum aqua-  
rum effluxum mox dicendum, quibus ipsis  
manè & vesperi illinatur abdomen; laxat  
enim cutim abdominis, eamque flaccidam  
ac mollem reddit, in specie, dum eo illini-  
tur regio pubis: Vel solum unguentum po-  
matum calidè abdomini dolenti illitum con-  
venit.

## ARTICULUS XV.

De

### *Aquarum ex utero Effluxu immaturo in Gra- vidis.*

**U**Lterius interdum per mensem, interdum  
per aliquot septimanas, ante partum fit  
aquarum ex utero effluxus immaturus, qui est  
symptoma grave ac periculosum.

1. Quia metus est, ne fœtus moriatur.
2. Quia hæc  $\nabla x$  nonnihil viscidæ & gluti-  
nosæ in partu sunt necessariæ ad la-  
xandas & lubricandas vias, pro faci-  
litando partus labore.

Distinguendus ergò semper est à fluore al-  
bo mulierum. In quibusdam enim nunc  
toto gestationis tempore, nunc certis mensi-  
bus, humiditates rubicundæ, item fluores  
albi, non tam ex matrice quàm potius collo  
ejus, prodeunt, & nihil commercii habent  
cum immaturo aquarum effluxu: Hi linquen-  
di sunt, nisi forsan interdum nimiam quantitate  
excedant, & periculum sit, ne abortum pro-  
vocent, aut insignis impuritas vel etiam fœ-  
tores adsint; tunc enim infusum rhabarba-  
ri, aut etiam pulvis ejus optimo cum successu  
datur. Verùm observantur subinde fœminæ,  
quas Hippocrates vocat aquosas propter ab-  
undantiam  $\nabla$ rum, quas evacuant: quæ loco  
purgamentorum post partum cruentorum &  
benè coloratorum emittunt saltem  $\nabla$ s, &  
paucò tempore multa linteamina his ipsis re-  
plent: Conf. de his Guillemeau de *Felici Par-  
tu* l. 3. ubi observavit quasdam, quæ uno die  
in pelvi supposita plusquam tibiß.  $\nabla$ arum ta-  
lium evacuaverint, per tres & amplius septi-  
manas continuando, sine hoc, ut guttam san-  
guinis evacuarint. Tales mulieres conque-  
runtur de facili lipothymia ac virium imbe-  
cillitate, ac necesse habent, quando tales  $\nabla x$   
impetu quodam prodeunt, aliquantulum vini  
bibere. Simile quid evenit honestæ mulieri,  
quæ 8. diebus absque doloribus per diversos  
dies plus quam quatuor pintas aquarum lim-  
pidarum evacuavit:  $\nabla$  talis non fluebat ex  
matrice ejus, quoniam interius orificium ex-  
actè clausum, sed saltim ex venulis vaginæ  
uterinæ: post octiduum feliciter peperit,

paucis cum cruentis evacuationibus, & per  
3. septimanas puerperii nil aliud, quàm aquas  
limpidas evacuavit. Notabile est, quod ipsa  
in aliis gravidationibus labia pudendorum  
inflata habebat, & aquis plena, uti etiam  
coxas & latera abdominis. Confer. etiam de  
hujusmodi aquis Harvæus de *Generat. Ani-  
malium Exercitat.* 56. Talibus, quæ sunt  
magis terosæ, interdum aliquot septimanis  
vel diebus ante partum aquæ fluunt citra  
noxam, molestiam, & sine dolore. Noxa  
imminet fœtui periculosa, quando tam ex  
amnio, quàm chorio, ex copiosa aqua di-  
stentis, ruptis & læsis, effluit humor sculi-  
quor; deficit enim sic fœtui nutrimentum  
per os hauriendum, quia fœtus adhuc intra  
amnion contentus probè nutritur per pla-  
centam uterinam: Sin verò ex solo chorio  
læso aut rupto effluit, minus periculi subest.  
An verò ex ambobus? an ex una tantum ef-  
fluat? perfectè cognosci nequit, nisi ex effe-  
ctu: si enim fiat effluxus harum aquarum  
etiam ex amnio, speciatim generantur dolo-  
res lancinantes in regione lumbari, & peri-  
culum est, ne insequatur abortus, vel ne  
fœtus reddatur debilis, vel viæ, per quas  
fit partus, fiant aridæ & siccæ, & laboriosus  
postmodum sequatur partus. Notandum  
est, quod recenset Guillemeau, in effluxu a-  
quarum attendendum esse, an dolores veri  
ad partum adsint? aut an effluentes aquæ re-  
verà sint istæ, in quibus natat infans? in qui-  
busdam enim longè ante partum effluunt.  
Ordinariè quidem aquas effusas dolores par-  
tus intra trium horarum spatium sequuntur;  
nihilominus tamen sæpissimè partus, aquis  
jam effluxis, retardatur ad 6, 10, interdum  
etiam ad 20. horas, imò Amstelodami ad  
trium septimanarum & trium dierum spa-  
tium observatum fuit: vid. M. A. N. C. *Ann.*  
3. *Observat.* 132. Notabile est, quod Comi-  
tissa de Starenberg semper 15. diebus ante par-  
tum aquam puerperii rejecerit sine gravino-  
cumento, ubi masculum peperit; non item,  
ubi fœmellam: vid. M. A. N. C. *Ann.* 2. *Ob-  
serv.* 13. Ergò sub tali aquarum effluxu non  
statim partus instans concludendus venit: Sic  
Guillemeau *cap. 2. libr. 7.* refert de fœmina  
septem mensium gravida, gravi colicâ afflicta,  
quotidiè ferè per 2. menses certis horis eam af-  
fligente; quæ postquam evasit, copiosam si-  
mul aquam evacuavit, & colica etiam cessavit,  
ita ut putaret, se non amplius esse gravidam:  
nihilominus tamen post 5. dies peperit filiam  
citra insignes dolores, cum paucò admodum  
aquarum effluxu. Aliis plus 10. diebus ante  
partum copiosæ  $\nabla x$  effluunt, aliis longius. Id  
quod probè observandum, ne nimis accele-  
retur partus: si enim sunt saltem aquæ ex  
chorio, nihil periculi subest: alias si dolo-  
res debiti & legitimi non superveniant, tales mu-



mulieres quasi hydrope uterinâ simul laborare videntur, ut loquitur Mauriceau *libr. I. cap. 23.* In tali ergo casu, quietam se contineat mulier, ne vehementiore motu fluxum augmentet. Quod si, cessante fluxu, sed superveniente partu, hic laboriosior fiat, loco aquarum tunc effluxarum substituantur oleorum mucilagines, linimenta, & unguenta blanda emollientia (de quibus, ubi de fissuris & rimis abdominis, dictum,) quibus inungenda vagina uteri ac loca vicina, unde & instar aquæ sub partu effluendæ conti- nuè laxentur, emolliantur, ac lubrica reddantur, & ita partus facili- tetur:

*R. mucilag. sem. lini  
fenugr.  
rad. alth. ā c. ▽ lil. alb.  
extr. ʒj.*

*axung. anserin.  
ʒi lil. albor.  
amygd. dulc. ā ʒvj.  
cera alba q. s.*

M. S.

*Erweichend Gölblein.*

Item injiciendum est oleum amygdalarum dulcium, aut liliorum alborum, chamomillæ &c. in vaginam uterinam, ac similia.

## ARTICULUS XVI.

De

### *Tumore & Inflatione Crurum in Gravidis.*

**I**nterdum circa ultimos gestationis menses gravidis crura tumore seroso insigniter insigniter inflantur & intumescunt. Talis autem tumor & inflatio pedum frequenter & ordinariò illis accidit, quæ ante conceptionem fluore albo laborarunt; non secus ac quæ sunt constitutionis humidæ ac serosæ, seu quæ sanguinem habent serosum, in talibus crura inflari & tumescere solent. Fit hoc saltem duobus ultimis mensibus, in quibusdam etiam secundo gestationis mense, & tamen sine periculo, saltem est molestum, & ferè usque ad subsequenter partum relinquitur; tunc enim per lochiorum fluxum evacuatur, & spontè evanescit. Sin verò sit nimius tumor & excessivus, inungantur crura tumida vespertino tempore cum oleo anethino, chamomelino, hyperici & similibus: aut, quod optimum est, applicentur foci, vel cataplasma ex chamomilla, ejusque floribus, quod dissipat tumorem: vel involvantur crura sacculo sale & cineribus pleno, item aqua calcis vivæ foci instar applicata: Vel fiat etiam foci cum lixivio sarmentorum vitis cum vino paratus, in quo si-

mul incoqui possunt origanum, chamomilla, pulegium, calamintha, & similia: c. gr. sit sequens foci ac cataplasma:

*R. fol. salvia  
majoran.  
ebuli,  
rorismar. ā m. j.  
fl. chamom.  
meliloti,  
hyperici  
lavendula,  
rosar. ā p. j.  
balaust.  
bacc. lauri  
juniperi ā ʒß, ad ʒj.*

Coqu. in lixivio sarment. vitis.

adde

*alum. crudi ʒj.  
+ i ʒij.*

F. foci cum spongiis applicandus.

D. S.

*Bertheilende Bebung.*

Post hunc applicetur tale cataplasma:

*R. farin. fabar.  
hordei,  
orobi ā ʒiij.*

Coqu. in decocto superiori:

adde

*fec. vini rubri ʒiij.  
terebinth. ʒiß.  
unguenti rosar. Mes.  
ol. chamom.  
ruta ā ʒij.  
pulv. rad. ireos  
rosar. ā ʒiß.*

M. f. cataplasma: S.

*Bertheilender Umschlag.*

Admoveatur parti calidè, præmisso foci.

In leviori malo sufficit foci ex lixivio sarmentorum vitis, in quo parum chamomillæ bullierit; post hunc cataplasma sequens:

*R. farin. fabar.  
lupinor. ā ʒij.  
ʒis ʒj.  
sterc. columb. ʒß.*

c. ▽ chalybeata l. decocto chamomilla & calamintha, bulliendo redigantur in consistent. cataplasmat. is.

Vid. Sennertus *Pr. lib. 4. P. 2. S. 5. & 6.*

Sed mediocres crurum hujusmodi tumores ferè relinquuntur naturæ, cum ferè ultimis gestationis mensibus accidant, post partum verò penitus cessent.

Post partum in puerperio frequenter su-

ARTI-

## ARTICULUS XVII.

De

*Hydrope Pudendorum in Gravidis.*

**G**Ravidis quibusdam supervenit hydrops pudendorum, in quo labia pudendi nunc utraque, nunc alterutrum, ita tument, ut viderit Guillemeau accedere hunc tumorem ad capitis infantis magnitudinem, unde femora ad se invicem movere nequeunt.

Tumor hic observatur clarus & pellucidus instar hydroceles, cum solam aquam contineat.

C U R A.

Necesse est autem, ut curetur ante partum. In tali casu convenit imprimis  $\nabla$  calcis vivæ sub forma fomenti crebrius applicata; vid. *Observat. in Cultro Anat.* Lyseri pagin. 223. Sufficit etiam simpliciter cataplasma carminativum impositum. His non sufficientibus, putat Guillemeau, loca tumida scarificanda longitudine & profunditate, & aqua clara per aperturas cum lancetta factas removenda: Vid. *M. A. N. C. Annotat. 3. Observat. 256.* & Mauriceau de *Morbis Mulier. l. 1. c. 24.* Item optimum quoque est, applicare hirudines.

## ARTICULUS XVIII.

De

*Varicibus Gravidarum.*

**F**Requens etiam est, ut circa ultimos ge-

stationis menses varices seu venarum intumescentiæ crura gravidarum occupent, quæ ferè naturæ ad partum usque relinquuntur. Verum cum interdum adeò sint magnæ & tumidæ varices, ut periculofam ruptionem venarum inferant, tunc optimum consilium est, inungere venas tumidas cum oleo laurino & unguento de bacis lauri, aut cum oleo de ranis, aut lumbricorum terrestrium, & tunc cum fascia non nihil latiori vino intincta, aut decocto quodam nonnihil adstringente madefacta, constringantur.

## ARTICULUS XIX.

De

*Hæmorrhoidum Tumore in Gravidis.*

**D**Enique radiosum symptoma, quod ultimo gestationis tempore supervenit gravidis, est hæmorrhoidum tumor, nunc dolorosus, nunc indolens: pro quo resolvendo applicanda est spongia, decocto adstringente mitiore in vino imbuta: vel inungatur tumor hæmorrhoidum cum oleo ovorum, cum oleo mastichino. In specie oleum momordicæ per infusionem est experimentum optimum: unguentum linariæ applicatum etiam confert. Ac denique, si gravior videatur malum, applicanda est pulpa pomorum coctorum, cui intermisti sint millepedes, aut saltim additum oleum millepedum.

## S E C T I O VII.

De

## PARTU, ET PARTURIENTIUM REGIMINE.

**P**Artus nil aliud est, quàm foetus maturi & perfectè formati debito tempore legitima facta exclusio.

Uterus scilicet membranofus & fibrosus, mole & motu foetus inclusi distentus, successivè subsidere incipit, *er senket sich nach dem Schooße* / uti dicunt, & magis ad os pubis deorsum vergit: hinc tandem foetus, se validè movet, & agitat artus, ac invertendo sese, qui antea erat convolutus, capite deorsum versus prornit, ita ut tandem

caput aut ossi pubis aut orificio uteri interno perfectè insistat & immineat: Si ossi pubis, *sagen sie / es steht auff dem Bogen.* Hinc uterus membranofus & fibrosus isto foetus conatu irritatus, se validè spasmodico & convulsivo quodam motu successivè & partitis vicibus contrahere nititur; unde nunc graves isti dolores lancinantes & contorquentes mulieresprehendunt. Vocantur hi dolores *die Wehen*: Qui si sunt legitimi ad partum, *die rechten Wehen* / sint frequentes, subinde repetant. Si inchoant, prope umbilicalem regionem, & in dorso

dorso circa regionem renum, hinc successivè deorsum versus pubem, & ex sinu pudoris denuò posterius sursum versus ad lumbos & dorsum retorquentur, ibique ingentem lancinationis sensum inferunt, minusque inferiora versus vergunt, non sunt dolores partus veri, sed vocantur nothi, *Die wilden Wehen* / & nunc vomitus, nunc tremorem brachiorum, nunc alia inferunt symptomata. Ast melius sunt dolores, qui continuò ex lumbis incipientes secundum abdomen deorsum protenduntur ad regionem pubis usque, hinc clunes & coxas occupant, & ita tremorem genuum inferunt; qui sunt spasmi dolorosi musculorum, quando convelluntur. Fiunt ergo hi dolores ex spasmio uteri & partium membranarum connexarum, unde tales spasmi sunt conjuncti ex his partibus simul affectis. Sub his doloribus orificium uteri internum se pandere & aperire incipit: Nam in hujusmodi cavitatum contractionibus & constrictionibus semper orificii accedit amplitudo; unde etiam tunc, quando uterus se contrahit, orificium uteri internum se aperit, quod etiam obstetrices facillè immisso in sinum pudoris digito studiosè ex plorare solent & debent. Percipiunt enim tunc foraminulum, & supra foraminulum membranam quandam adhuc integram, collectis etiam & inclusis aquis distentam per dictum orificium ampliaturum prominens, in forma ferè ovi mollis, cui exterior dura testa deficit, quod vocant, *Das Wasser zeucht sich*. Nec prius mulieres ad labores partus facillè admoneant, aut reluctantes cogant, nisi digitis orificium hians uteri, & jam vel foetum, vel membranas densas foetum cingentes, & à conatu foetus fortiter distensas deprehenderint, doloresque isti parturientium veri simul accesserint: Continuato ergo foetus motu, & repetitis uteri spasmis, rumpuntur tandem membranæ foetum cingentes, effluuntque liquores in iis contenti, unde dicunt vulgo: *Das Wasser springt*; qui liquores rarò sunt sinceri, sed subindè nonnihil sanguine tincti, quod fit ex orificio uteri interno aperto: Quoties enim hoc aperitur, solet sanguinem plorare qui nunc solus, nunc cum his liquoribus solet effluere. Liquor hic seu aquarum effluxus laxat, emollit, ac lubricat vias, ut facilius hæc distendi, foetusque per easdem, alias satis angustas, promoveri possit. Patienter autem, necesse est, expectet obstetrix spontaneam membranarum rupturam, aquarumque effluxum, nec unguibus suis membranas rumpere debet, id quod fieret cum insigni foetus & matricis nocumento, semperque partus impedimento; Conf. Mauriceau *lib. 2. cap. 7.* aut in tali casu quando membranae tenuiores unà cum foetu prodeant,

Tom. II.

& multum admodum promineant; tunc enim aquas rumpere licet, vid. Idem *lib. 2. cap. 11.* uti etiam, si in præternaturali partu placenta prius se offerat; tunc enim etiam membranas pro facilitando partu aperire licet: vid. Idem *lib. 2. cap. 28.* Hæc dum fiunt, mulier mater sellæ appropriatæ imposita (cujus figura prostat in Dn. Doct. Welschii *Sebammen-Buche* / *lib. 1. cap. 23.*) aut alias commodè situata, nempe per transversum lecti cruribus inflexis, vid. Viardel *im Ammen-Buche* *pagin. 33.* item Mauriceau *lib. 2. cap. 8.* comprimendo abdomen expulsionem foetus multum adjumenti affert. Sub hoc conatu imprimis, dum trement genua, ex utroque latere adsideat foemina robusta, quæ dicta genua fortiter teneat & firmet, alias gravia symptomata in coxis post partum percipiunt. Imò si negligenter firmantur, tam debilitantur pedes, ut difficulter incedere queant, mulier autem gravida adjuvet motum foetus. Quod si ergò debilius in labore fiat, pauco vino generoso, aut  $\nabla$  cinnamomi spirituosa, aqua vitæ mulierum, aut pauca aqua hirundinum cum castoreo, si forsan hystericae passionibus imminant recoilletur, ut strenuò pergat in incepto labore, dum obstetrix interea temporis ante & intra genua parturientis posita & situata expectet, manus & digitos oleo liliorum alborum, aut amygdalarum dulcium, aut oleo cheirino aut similibus illitas in vaginam uteri immittat, foetum approximantem digitis blandè arripiat, ordinet, locet, & tandem capite prius ita nonnihil protrahat, arreptoque hinc umbilicali fune simul placentam uterinam cum conjunctis membranis seu secundinis unà extrahat, studiosè observando, ne tantillum aëris externi aut frigidiusculi in uterum parturientis ante aut post partum irrumpere possit. Hinc omnia linteis, stragulis & similibus bene munita esse solent circa partum, ut aëris impediatur accessus, quia alias metus est, ne lochiorum suppressio, hincque uteri inflammatio, aut uteri inflatio, aut similia sexcenta mala, exinde superveniant.

## CAPUT I.

De

### *Partus Læsionibus.*

**L**æditur partus. (1.) Quando tempore minus legitimo prodit. (2.) Quando foetus debitum situm non occupat. (3.) Quando graviora symptomata eundem stipant.

(Mmm mmm)

ARTI.



## ARTICULUS I.

De

*Partu immaturo,*

Seu

*De Abortu.*

**P**rimum ergo est vitium nempe foetus nondum perfectus immaturè ejectus, quod id non, nisi rarissimè, vitalis, lato sensu abortus dicitur: *Es gehet ihnen unrichtig/nicht wohl/* dicunt de hominibus; de brutis verò: *Sie habē verworffen.* Græci rectius & accuratius rem distinguunt pro varietate temporis, dum scilicet ejectionem ovi ab abortu propriè sic dicto & foetu mortuo accuratè distinguunt; Nam Græci habent *ἐκπολὴν* & *ἐκτρώμα*: *ἐκπολὴν* propriè est ovi exclusio seu rejectio conceptus seu foetus non formati sub forma ovi, quale exemplum in Hippocratis scriptis reperitur: *ἐκτρώμα* verò est abortus seu ejectio foetus jam constituti, *ἐκπολὴν* fit intra sex primas à conceptione septimanas: postmodum conceptus à formatione ad decimam sextam septimanam, vel ad tempus motus, vocatur *ἐκτρώμα*: Nam post quartum mensem, ubi foetus moveri incipit, à medio gestationis tempore ad verum partus tempus, dicitur foetus mortuus. Quæ ipsa tamen à Latinis sub generali abortus nomine comprehendi solent.

## C A U S Æ.

Causa autem proxima, propter quam foetus & conceptus non retineatur ad absolutum gestationis & partus tempus, est in utero, cujus vel præternaturalis coarctatio ex irritatione, contractum fibrarum occasionem præbente, conceptum foetum excludit: id quod frequentissimè, vel ejus præternaturalis relaxatio, e. g. à fluore albo aut cachexia serosa, vid. Hippocrates *lib. 5. Aphor. 45.* & Amatus Lusitanus *Cent. 6. Curat. 50.* item ab opiat, eundem ad tempus debitum retinere nequit, hocque rarius; membranose enim uterus & hinc fibrosus est, ex quarum tono naturali dependet, ut retineatur foetus.

Sed ut hæc legitimè & decenter expediam, ad contractionem quidem nimiam, & præmaturum spasmum, hinc præmaturam foetus exclusionem ex utero, irritatur vel stimulat uter, vel à foetu ipso, vel sui ipsius vitio, vel matris, pro varietate sex rerum non-naturalium.

Primò quoad foetum uterum irritantem & ad sui exclusionem stimulantem, fit abortus, quando foetus est admodum debilis, ut quasi sarcina iners in utero retineatur, aut ægrotat, aut etiam moritur, vel quando non

ritè utero cohæret: hinc enim ex præternaturali contento irritatus uterus, affluentibus spiritibus animalibus, se contrahit, & exinde excluditur foetus; Afficitur etiam foetus, si ex erroribus diætæ foetui debitum deficiat nutrimentum, debitam cohæSIONem cum utero impediens. Sic etiam matris morbi in foetum derivati, hunc ad abortum disponunt, quod de variolis Bartholinus *Cent. 2. Epist. 85.* & Platerus *Prax. Tom. 3. pagin. 250.* & ictero, Kerckringius *Spicil. Observ. 57.* & Panarolus *Pentec. 4. obs. 44.* testatur.

Secundum in utero vitium, quo irritatus & contractus foetum excludit, est vel per essentiam, vel per consensum aut partium vicinarum læsiones & irritationes. Per essentiam, quando est vitiosè constitutus, nimis angustus & exulceratus, aut quando tumoribus dolorosis est affectus, v. g. scirrhus, qualem observavit Hildanus, aut quando laborat abscessu occulto. Ex tali enim occasione uterus, dum debet extendi, ex dolore irritatus convellitur, hincque foetus conceptus ejicitur. Hujusmodi affectus à priori semper sunt imperitcrutabiles. Facilius patient per consensum, v. g. si dysenteria corripiantur intestina, aut anus tenesmo, aut etiam, si aciora clysinata & suppositoria acia inconsideratè admoveantur, quæ ratione contiguitatis vaginam uteri & uterum ipsum stimulant ad contractionem & expulsionem: quò etiam pertinent hæmorrhagiæ graves: Hinc etiam est, quod mulieres nephriticæ, aut gravidæ nephritico dolore, præsertim primis gestationis temporibus, correptæ sæpius abortiant: Vid. Mauriceau *lib. 1. capit. 13.* per consensum enim uterus irritatur, se stringit & foetum excludit: & hinc etiam Panarolus *Pentec. 3. observat. 20.* refert, se frequentissimè observasse, abortus causam in femellis quibusdam fuisse nimiam renum debilitatem. Faciunt huc tormina colica, ex fructibus horreæ fermentantibus interdum in gravidis oborta: item quæ conjunguntur cum passione hysterica; nam & hæc similiter interdum abortum provocant.

Tertio ipsa mater pro rerum sex non-naturalium varietate diversimodè affecta solet irritare uterum, & abortum provocare. Eminent hic assumpta, in specie acida, quæ nimis aut frequentius usurpata, & ad uterum delata, hunc irritant, foetui nocent, eundem ad epilepsiam disponunt, & ad abortum cogunt: Vid. David van der Becke *de Princ. Rer. Natural. pagin. 214.* Porro ex alimento generosiore & potu spirituosiore assumpto, quæ sanguinem nimis spirituosum & turgescere faciunt, v. g. ex aromatis acioribus, ex usu vini generosi, &c. subinde sequitur abortus; Vinum enim pellit foetum

fœtum in iis, quæ sunt saniores, vegetiores & spirituosiores, seu, ut vulgò dicuntur, calidioris naturæ. Id quod imprimis ab initio conceptionis primis mensibus, & medio gestationis tempore observandum est: Nam tribus ultimis mensibus haustus vini generosi sub introitum lecti est optimus & proficiuus interdum: vitetur tamen vinum Hispanicum aut Malvaticum, quod nimis est spirituosum ac fermentativum. Faciunt huc odores fortes, imprimis fœtor candelarum extinctarum, hinc fumus carbonum extinctorum, de quo Mauriceau *lib. 1. cap. 1.* Irritant nempe hi ipsi membranosi uteri nimis extensi, adeoque admodum irritabilis, systema, unde contractio & fœtus exclusio. Notabile est, quod Borellus *Cent. 2. observ. 98.* abortum, cum fœmina sæpe pyxidi camphoræ insedisset, referat. Pertinent huc excreta & retenta, ubi consideretur sanguinis in gravidis suppressio; unde etiam in quibusdam sanguinis abundantia, fermentatio, & hinc uberior spirituum proventus, obruendo fœtum, hinc irritando uterum, adeoque communiter sic dicta plethora, dum imprimis sanguis in gravidis, ex suppressis mensibus circa uterum coacervatus, hujus contractione occasionem præbet non rarò abortui, imprimis in juveniculis alacrioribus, spirituosioribus, & similibus; qui abortus præcavendus est sectâ venâ vel cucurbitulis mediogestationis tempore, aut etiam repetitur bis vel ter hæc ipsa phlebotomia, in regionibus imprimis calidioribus: Vid. Sylvius *lib. 1. Prax. cap. 6. §. 6. &c.* Imò Zacutus Lusitanus refert de venæsectione singulis mensibus instituenda ad præcavendum abortum. Deinde affectus animi nonnulli graviores, qui massam sanguineam insigniter commovent, & spiritus animales in vagos & inordinatos motus cogere solent, sæpissimè ad abortum inducendum multum in recessu habent; his enim facilè quoque uterus commovetur, sicque fœtus expellitur. Excellunt inter hos terror, tristitia, gaudium nimium, iracundia, & similia: Et quidem frequentissimè mulieres nimis iracundæ abortus patiuntur; commotis enim sic spiritibus & tota massa sanguinea exinde non tantum humores in fœtu, & quibus fœtus includitur, conturbantur, sed etiam spirituum animalium impetus pervertitur, systema nervosum convellitur, & uterus hinc commotus contrahitur, sicque fœtus expellit. Motus quoque nimius & exercitatio corporis incondita, imprimis mediis gestationis mensibus, si sit nimia, noxia est, & maximè facit ad abortum: Hinc corporis equitando agitatio, saltatio nimia, cursus & casus vel ab alto, vel pronus in abdomen, & rerum ponderosarum sublatio, item fortis extensio brachiorum & manuum

Tom. II.

supra caput, & omnia ejusmodi, quæ corpus graviter moveant, fœtum commovent, & placentam avellunt à cohæsiōe cum utero: Vid. Sinibaldus *Geneanthr. lib. 8. Tr. 2. cap. 3. pag. 701.* Burnetius *Thef. Pract. lib. 1. sect. 5. pag. 6.* A sublatione enim ponderis gravioris propter retentionem halitus, & depressionem diaphragmatis, inferiora versus premitur uterus, & deorsum movetur: Ab extensione autem manus supra caput uteri orificium ampliatur, uterus dislocatur, & interdum membranæ fœtus rumpuntur. Facit huc etiam sternutatio, tussis item ferina, imprimis vomitus, qui si sint contumaciores, aut graviores, omnia hæc commovendo nimis, & plus minus irritando uterum, facile abortum fœminæ provocant: Conf. Sylvius *loco cit.*

Præterea dantur causæ adhuc aliæ, exque rariores, nempe quæ uterum nimis laxant eumque laxatum ita disponunt, quo minus commodè fœtum retinere possit. Talis causa adest in fœminis, graviore & diuturno fluore albo correptis, ante vel etiam post conceptionem: item in iisdem, quæ cachexiâ ferrosâ sunt afflicte; in his enim fibræ & membranæ uteri nimis laxatæ, flaccidæ & debiles, & uteri orificium internum nimis patulum, convenienter detinere nequit fœtum. Spectat huc *Aphorismus* Hippocratis *45. sect. 5.* Vid. Amatus Lusitanus *Cent. 6. Curat. 56.* Præterea facit huc imprimis etiam defectus sanguinis & spirituum, unde & debitus tonus uteri deficit: hinc nempe hæmorrhagiæ insignes, aut etiam venæsectiones intempestivæ, ac similes causæ, sanguinem & spiritus animales malè afficientes, aut depauperantes, ad abortum etiam ex parte disponunt.

Tandem terror & pavor subitaneus uti fœtui non rarò necem, ita & utero relaxationem nimiam inducunt. Notum enim est, quod in terrore & pavore omnes partes exteriores subito spirituum sentiant defectum: hinc uti in terrore subitaneo firmiter apprehendere, aut res apprehensas retinere non possumus, sed gravi terrore percussî rem aliquam continentes dilabi sinimus; ita simili ratione à terrore & pavore disponitur uterus, ut brevi post elabatur fœtus tanquam moles iners, unde & syncopes & similes aliæ contingentes causæ, lipothymia, &c. subito abortum provocare possunt: quâ ratione etiam timor ac mœstitiæ diuturnæ sæpius abortum inducunt.

Denique, opiata sæpius abortus sunt causa, quatenus spiritus animales figendo, eorum volatilitatem ac debitam in motu agilitatem non nihil sistunt, unde etiam membranarum ac fibrarum uteri tonus relaxatus ab-

(M m m m m 2) ortum

ortum infert, utut etiam opiata ipsi foetui existant nocentissima.

### DIAGNOSIS.

Quod jam attinet signa, abortus praesentis, nempe exclusionis foetus immaturi, per se patent. Potius ergo praenoscendus est abortus instans, ut commodè praeservari possit à Medico.

Imminentem ergo abortum innunt in specie gravitas quaedam insolita circa lumbos & coxas, cum qua concurrat segnities quaedam ad motum; adhuc conqueruntur tales gravidæ, de sensu quodam insolito ponderis incumbentis sinui pudoris, ac prementis vulvam. Nam alias fortes mulieres gravidæ per gestationem salubres, sunt satis agiles, & nunquam tale percipiunt pondus, nisi ultimis septimanis, quando imminet partus, & quando uterus subsidet.

Quodsi præterea accedant vagi dolores lancinantes crebrius recurrentes in abdomine & circa umbilicum, & ad sinum pudoris usque deorsum sese extendentes, periculosum admodum est signum, ne subsequatur abortus; imprimis si simul adsit quidam involuntarius conatus quasi egerendi ex utero.

Certè hæc duo sola signa, nempe gravitas insolita à regione lumbari deorsum tendens, & supervenientes vagi dolores deorsum ad sinum pudoris protensi, sæpe soli sunt certum signum imminentis abortus.

Item tenesmus in gravida abortum portendit:

Insolita admodum segnities, inappetentia in gravida, situs uteri vel abdominis mutatus, qui antea sursum supra regionem pubis in medio ventre blandè eminebat & protuberabat, jam conglobatus deorsum versus pudenda inclinet, & omnis tumor ossi pubis nimis quasi appropere, varia etiam vaga symptomata, rigores quidam & horrores, quos subinde comitantur subitanæ phlogoses, idque reciprocè, item tremores, cordis palpitantes, &c. imminentis abortus sunt prodromi, qui magis urget, si jam circa ventrem & lumbos dolores percipiuntur, qui versus pubem & os sacrum desinunt cum quodam egerendi conatu. Quod si post aut cum huiusmodi doloribus simul sanguinis, vel puri vel serosi, ex utero per orificium ejus internum observetur aliqualis effluxus, jamjam minitantis partus indicium est. Item si mulieribus gravidis ex quacunque causa, quæ ad abortum disponere potest, serum cruentum, vel etiam sanguis ex utero effluere incipiat, etiamsi non statim sequatur abortus, si etiam stillicidium tale perduret, aut subinde repetatur, ante septimum vel nonum diem à prima apparentia, securi ab abortu esse non possumus, quin hic duobus die-

bus ut plurimum subsequatur. Liquoris seu aquarum eruptio, qualis ferè oriri solet in partu, innuit jam factam esse membranarum ruptionem, & hiare insigniter orificium uteri internum, adeoque instare proximè abortum.

Ex antiqua Hippocratis doctrina etiam ex mammis solet desumi signum futuri abortus: Vid. *Sec. 5. Aphor. 35.* dum ex flacciditate & extenuatione mammarum aut etiam ex fluxu lactis, aut sanguinis ex iisdem, metum futuri abortus praesagit; innuit enim hoc ipsum corruptionem ac depravationem nutrimenti foetus in utero; cum quo eadem est materia, quæ mammæ reddit turgidas, & consequenter mammarum lac constituit: Vitiata ergo ista materia, ita ut aut omnino deficiat, aut in mammis corrumpatur, forsitan motum foetus deorsum, & per consequens futurum abortum, innuit.

Hæc inter signa diagnostica etiam hoc observandum simul probè: fieri scilicet interdum, ut ex foetu adhuc in sua matre mortuo, & ad aliquot dies gestato, matre scilicet inscia, etiam irritetur uterus ad exclusionem; unde signa & symptomata abortientium superveniunt. Apparentibus ergo signis excretionis & abortus, cavendum est, ne foetus mortuum excernendum, tanquam foetus vivum abortientem retinere studeamus. Cognoscitur foetus mortuus ex signis infra declarandis: in genere, quantum ad præsens negotium, sufficiant hoc loco signa ab Hippocrate in *lib. de Superfætis*. recensita, dum dicit: *Cum mortuus fetus fuerit, dilabitur in utero, quocunque se vertat mulier, tanquam saxum aut aliud quippiam simile, & per æthinem frigidum ordinario habet mulier.*

### PROGNOSIS.

Notum est, quod in abortu omni mulieres longè periculosius laborent, & quidem gravius, quam in partu genuino & naturali, quia violentia subest, & post eundem vel mox vel post aliquot septimanas gravi hæmorrhagia uteri corripuntur: hinc metus est, ne secundina retineatur, & dolores, hæmorrhagias graviores, ac aliæ graviora patiantur symptomata, quæ si superent, subinde multis adhuc symptomatibus, iisque variis, per plures interdum annos infestantur.

Ex abortu graviore etiam interdum steriles redduntur ex læsione uteri ac vaginæ, speciatim si primus conceptus fuerit abortu rejectus.

Quò grandior etiam foetus est, eò quoque periculosior solet esse abortus: & quò minor & imbecillior est idem, eò minus periclitantur.

Ex



Ex casu ab alto ovi uterini primæ conceptionis rejectionem novi in juvenula. Sine ominoso aut abortus ulterioris aut omnimodæ sterilitatis periculo: quin jam 35. annos nata, 12. liberorum fecunda mater superest; semel tamen post sextum partum, ex terrore ferè circa medium gestationis tempus idem se passam esse, mihi retulit.

C U R A.

Quoad curam: Ea in abortu est nulla, dum nempe jam fit, seu quando jam foetus à connexionione cum utero est separatus; sed potius adjuvetur à Medico, ut eò citius & cum minoribus symptomatis eveniat. Nam si præsentente abortu adstringentibus aliisvè similibus remediis jam imminensem indubitato, aut incipientem, aut jam quodammodo factum abortum, & in quo sanguis jam incipit erumpere, aut foetus jam extinctus est, retinere velimus, periculosum est, & verendum, ne foetus mortui retentionem, & hinc ejus & secundinæ putredinem, aut tandem ex sanguinis impedita excretionem hujus coagulati congestionem, aut periculosissimam uteri inflammationem inferamus: ut taceam alia millehinc metuenda symptomata. *Alias religio summa sit Medico, quocunque in casu vel tantillum dare mulieri, quod ad abortum facere possit*; sicuti ad hoc tenetur juxta juramentum Hippocratis. Nam ut taceam, non tam facile esse, in sanis provocare abortum, quin non simul subinde ipsius matris vita periclitetur; sanè in ægris, si abortum provocare velimus, tamen incertum est, an hoc ipso gravida per abortum salvari possit. Rarus interim & notabilis casus est, quem refert Castro *Tract. Quæ ex quibus*: Hoc ergo opus incumbat Medico,

- (1.) ut abortus præcaveatur,
- (2.) ut post abortum factum mulier ritè tractetur, & mala imminencia maturè præcaveantur.

Quoad præservationem: imprimis instituenda hæc est, dum adhuc in suo situ naturali foetus est constitutus in utero, eaque pro causarum remotarum, quæ aut irritatione, uterique præmatura constrictione, aut nimia ejus relaxatione, & membranarum tonum lædendo, abortum inducere valent, varietate varia instituatur. Nam prima causa est frequentissima, etiam in primis gestationis temporibus; posterior verò rarior, & foeminis saltem circa secundum, tertium, ac principium quartimensis, obvenit. Ubi in genere observandum, in plethoricis venæsectionem interdum ab abortu præservare, vid. Amatus Lusitanus *Centur. 2. Curat. 95.* item M. A. N. C. *Ann. 2. Observat. 47. pag. 86. & Ann. 6. & 7. Obs. 204. pag. 301. Ann. 9. & 10. Observat. 40* Imò ad præcautionem abortus singulis mensibus ge-

stationis sectam venam refert Riverius *Cent. 1. Observ. 53.* item Binninger in *Observat.* Consideratur etiam Heinrichus ab Heer *Observ. 14.* Aperitur vena ferè in brachio; nec nisi cautè, & certis solum in casibus venæ saphænæ sectio instituenda, de quo vid. Zacutus Lusitanus *libr. 2. Prax. Admir. Observat. 150.* Interdum in impetuosiore spirituum motu, aut graviore uteri irritatione aut spasmo, subinde consideratis probè quibusvis circumstantiis, ad opiata confugiendum erit: Ubi verò laxitas in causa est, vitanda sunt, quin potius in hoc casu cura præservatoria instituatur cum aromaticis nervinis utero gratis, laxitatem & tonum corrigentibus; quin etiam cura similis pro cachecticis per remedia ex lignis cum aromatibus instituenda est. In genere tamen contra quemcunque abortum præservandum commendatur ex vegetabilibus quocunque in casu primariò verbena, cujus usus sive sit internus in decocto, vel etiam aqua ejus destillata frequentius cohobata, essentia, extractum aut succus; sive etiam externus, est præsentissimum euporiston muliercularum: quibus admisceri potest parum aquæ cinamomi, quia confortat foetum & uterum. Granorum chermes pulvis, vel elicita tinctura Zwelferi, item confectio alchermes sine ambra & moscho, si gravida perferre possit dulcia, optima sunt. De adstringentibus, millefolio, ejusque decocto, historta, tormentilla, plantagine, ejusque succo, de remediis mastichinis, & ex cydoniis, & similibus adstringentibus, nihil addere volo. Semen plantaginis ad 3ß. cum granis coccineis ex ovo sorbili toto gestationis tempore adhibitum, abortum præcaver: Vid. Velschius *Mictom. Cent. 3. Obs. 66.*

Inprimis ex regno animali contra abortum conducit ebur sine igne, gelatina eboris in potu dissoluta, ac similia, ac tandem cancri fluviatiles: Sic eorum pulvis in fumo lentè exsiccatorum specificum est Poterii, non secus atque succus cancrorum fluviatilium contusorum, cum bono vino expressus, & omni mense repetatis vicibus à gravida haustus, experimentum est singulare Hartmanni *p. 228.* ab aliis etiam succus astacorum, aut etiam cancrorum fluviatilium, cum jusculis pullorum contusorum & expressorum laudatur, conf. etiam Sachsi *Gammarelog.* Loco horum pulverem cancrorum fluviatilium calcinatorum etiam cum successu usurpare possumus.

Denique ad omnem abortum ex regno minerali, optimè conveniunt corallia præparata, eorumque tincturæ & quæcunque corallata, in specie tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, si in foeminis aliquoties per septimanam in liquore conveniente hauriatur: item hypochondriacis & scorbuticis tinctura coralliorum assafrata & antiscorbutica  
(Mmmmm 3) est

est egregia: quo etiam syrupus coralliorum Quercetani referri potest. Ex his varia parantur composita, ut pulvis contra abortum Augustanorum, pulvis Marchionis, Margaritæ præparatæ, &c. propinanda in aqua verbenæ cum succo & syrupo cydoniorum, coralliorum Quercetani, de corticibus citri, & similibus:

*Rx. Pulv. contr. abort. Aug. ʒij.*

*Matr. perlar. præpar.*

*Ebor. f. Δe ana ʒij.*

M. D. S.

### Anhaltend Stärck-Pulver/auff etliche mahl.

*Rx. ʒ ceras. nigr.*

*fl. til.*

*epil. Lang. ana ʒj.*

*Corall. rub. præp.*

*Ebor. f. Δe ana ʒʒ.*

*Syr. corall. Querc. ʒvj.*

M. D. S.

### Anhaltend Stärck-Träncklein.

Externè in genere optimè conducit panis piperatus, in forma rotunda, melle illitus, & pulvere caryophyllorum, macis, cumini, & similibus benè aspersus, & utrinque, tam lumbis quàm abdomini, regioni pubis, calidè applicatus, dum nimis subidet uterus; hinc enim fit interdum, ut denuò sursum versus in naturalem situm se disponat ac redeat. Nec inconueniens est, ut fermentum cum paucis cinamomi & caryophyllorum, & aliis aromaticis, mediante vino subactum, in forma cataplasmatidis applicetur infra regionem umbilicalem & ad lumbos; vel dum jam dolores incipiunt corripere mulieres, optimum est applicatus sacculus ex herbis menthæ, absinthii, rorismarini, melissæ, & similibus, in vino generoso bullitis, calidè applicatus: præsertim quando foetus est debilior, aqua vitæ mulierum, vel balsamus puerorum, vel vinum Malvaticum cum pane tosto abdominis regioni umbilicali convenienter imponitur. Optimum est cataplasma ex melle cum melissa, chamomilla, pipere, nuce moschata, zedoaria & similibus, quod nunc umbilico, nunc lumbis, ubi ad ilia descendere incipiunt, applicetur. Thermæ à quibusdam usurpantur: Sed hoc intelligitur eo in casu, quando mulieres ex nimia laxitate abortiunt, tunc quando nondum sunt gravidæ, sunt saluberrimæ. Alias, ubi imminet abortus ex relaxatione uteri, conducunt bdellium & mastix aceto dissoluta, linteis inducta, & instar cataplasmatidis seu emplastri regioni abdominis hypogastricæ applicata.

*Rx. Empl. de galb.*

*Tacamahac. ana q. s.*

*malax. c. s. q. bals. Peruv.*

D. S.

### Anhaltend Pflaster.

Et applicetur lumborum regioni.

Heurnius in tali casu commendat balnea aluminosa, quæ tamen in ultimis gestationis mensibus minus sunt tuta, quoniam notum, quod vaginam alias reddant angustam, unde sequitur partus laboriosus.

Juxta hæc in specie, pro varietate causarum remotarum, imprimis ex sex rebus non-naturalibus, & variarum indicationum, varianda etiam est cura, cum sæpissimè causæ sint graviores animi affectus, primariò iracundia, terror & pavor. Et quidem si ex medicamentis acerbis irritantibus, imò acido vel assumpto vel intus genito uterum irritante, & iracundia, appropriata quædam absorbentia, præcipitantia dicta, quæ acidum corrigunt, & sanguinis imminuentem coagulationem & stagnationem impediunt, in usu esse solent. Convenit ebur sine igne & medicamenta ex ebre, (& quidem sin ab ira imminet abortus, ebur sine igne propinetur in vino acidulo, vel in aceto rosaceo: convenit etiam gelatina eboris acida reddita, in vehiculo appropriato hausta, vel in potu ordinario dissoluta;) cancri fluviatiles, & omnia cancrina pulvis contra abortum Augustanorum, cinnabaris antimonii, pulvis Marchionis, specificum cephalicum, pellicula cartilaginosa ex ventriculo gallinarum sumpta, tali leporis, præparata ex dente hippopotami, castoris, & similibus; quibus addantur blanda aromatica, nux moschata, caryophylli, tantillum cinamomi, item coralliorum tinctura, in specie sassafrata, quæ à terrore imminuentem abortum præservant.

In specie si iracundia fuerit gravior, consultum est, ad orgasmum succorum & perturbatum spirituum animalium motum sistendum, ut nonnihil de laudano opiato, usurpetur, ut sistatur facilis uteri irritatio & contractio. Quod si uterus aut foetus roborandus sint, tormentilla, decoctum millefolii, grana chermes, mastix, thus, & similia adhibenda veniunt. Sin à nimio frigore externo, imminet abortus, ita ut foetus quasi torpidus & nonnihil stupefactus hæreat, convenit aqua vitæ mulierum, balsamus embryonum, sive internè sive externè, aqua caryophyllorum composita; vid. Velschii *Microm. Cent. 1. Observat. 10. annexa M. A. N. C. Ann. 4. & 5.* & similes aquæ spirituosæ. Externè conveniunt inunctiones cum oleo mastichino, cui additum sit oleum destillatum macis, caryophyllorum, aliquot guttæ olei destillati cinnamomi cum balsamo Peruviano.

Sin à lipothymiis metuendus abortus, quæ cinnamomi borraginata, tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, confectio de hyacintho,

cintho, syrupus florum tunicæ, &c. conducunt.

Quodsi à cachexia serosa sit malum, lignorum decoctum ad præcautionem abortus sunt optima; sic enim Platerus *libr. 3. Observat.* abortum frequentem alias per crebriorem decocti guajaci usum curavit. In quo casu, uti etiam in albo fluore nimio fontanellæ in crure apertæ, non sunt inutiles: conf. Zacutus Lusitanus *Prax. Admir. Observ. 150.*

Ubi ex torminibus seu doloribus abdominis nothis imminet periculum abortus, convenit panis iste piperatus cum melle abdomini applicatus ac superimpositus: internè verò pulvis zedoariæ, vel per se, vel cum pane, cui illitum sit butyrum, assumptus.

Facto jam abortu, Medicus præcaveat symptomata. Adduo ergò respiciat:

(1.) Ut secundina & placenta post fœtum simul excernantur integra: Nam post abortum pertinaciter adhæret utero, unde periculum est, ne lacerata secundina, quando ab obstetrice paulò fortius tractatur, ex parte prodeat, & ex parte remaneat: Conf. M. A. N. C. *Ann 1. Observ. 128. pag. 287.* Si non excernatur, manu imprimis cautè extrahenda: Conf. Mauriceau *libr. 2. cap. 10.* cum interna medicamenta secundinam pellentia propter hæmorrhagiæ metum ferè suspecta sint. In specie verò mulier mox post abortum in lectum benè calefactum se componat, extensis probè simulque invicem superimpositis cruribus quietà jaceat, & ab omni frigore, quantum possibile, imprimis etiam extremorum, manuum & pedum, se muniat, nec manus etiam, si tempus sit frigidiusculum, extra lectum exserat. Nam

(2.) frige factis externis vel modicè, vehementissima ac periculosa ut plurimum uteri imminet hæmorrhagia, nunc immediate post abortum, nunc post quartam demum septimanam, ut ferè periculum mortis incurrat mulier: in qua propinanda tandem ea, quæ infra circa lochiorum nimium fluxum proponuntur.

Externè verò spongiæ aceto ac vino rubro madefactæ applicentur secundum Riverium *Cent. 4. Observ. 46.* Aut fiant sacculi ex rosis, balauftis, malicorio, & similibus, qui in vino rubro bulliti calidè applicentur.

## ARTICULUS II.

De

### Partus Situ Vitioso.

Quod attinet II. partum præternaturalem, ratione situs infantis vitiosi, cujus

modi quindecim enarrantur, hujus correctio imprimis obstetrici expertæ incumbit, quæ manibus, oleis appropriatis inunctis, fœtum in naturalem situm, reponere debet, siue sit vivus, siue mortuus, ut repositum commodè extrahat. Cum verò hoc rarissimè fieri possit in omni situ fœtus vitioso, optimus succurrendi modus est, ut pedibus arreptus fœtus extrahatur, de quo consulenda venit experientia Viardel in *seinem Ammen-Buch* / & hinc Mauriceau *de Morb. Mulier.* Quodsi hoc fieri nequeat, qua data faciliore occasione ac situ fœtus extrahendus, & hac ratione matris vita salvanda. Modi videantur in iis, qui scripserunt, ex professo de hac materia, imprimis Ludovica Bourgeois, item Scipionis Mercurii *Tractatus.* Si enim fœtus non est vitalis, non semper necesse est, ut in debitum situm reponatur, sed in malo graviore imprimis etiam quocunque modo eum extrahere nitatur obstetrix. Præ cæteris casus est periculosissimus, quando pedibus primò prodit infans, ita ut etiam manus deorsum versùs inclinent; nam sic fit, ut egresso tempore orificium uteri internum circa collum iterum se stringat, ita ut fœtus extra uterum, caput autem ejus adhuc in utero hæreat, & reddat partum difficilem. Tales fœtus dicuntur Agrippæ. Ubi non potest emendari talis positura infantis, obstetrix saltem alterutrum infantis brachium eo dirigat, ut sursum versus ad caput vergat; sic enim fit, ut propter brachii extensionem sursum factam uterus non possit se contrahere circa collum: quo brachio retracto se vel ultrò fœtus ad sui exitum accingit, eumque insigniter adjuvat, ut non sine gravissimis cruciatibus matris. Si fœtus ita est mortuus, ut nequeat arripì, chirurgicis instrumentis frustulatim discissus extrahatur.

## ARTICULUS III.

De

### Symptomatis in & circa Partum.

## MEMBRUM 1.

De

### Doloribus Parturientium Nothis.

Fit subinde, ut graves dolores abdominis circa umbilicum, regionem lumbarem & totum ventrem, ad pubem protens, interdum per mensem, interdum per aliquot septimanas aut aliquot dies, antequam partus instet, semper fœminas mirè torqueant, qui non tantummodò totum abdomen instar tormi-

num



num colicorum & iliacorum occupant, sed interdum etiam subinde inferiora versus ad pubem usque descendunt, & incautis tanquam veri partus dolores imponunt. Quod si tunc mulieres cogantur ad laborem partus, id cum summa difficultate, labore & anxietate contingit: imo fit interdum, ut, dum maxime eniti in talibus doloribus volunt foeminae, denuò remittant dolores & evanescant, & interdum adhuc pertres, vel quatuor, vel octo, interdum per 14. dies, & interdum ultra integrum mensem, foetum denuò retineant. Tales ergò dolores vocantur vulgò Dolores nothi, *die falschen Wehen*.

### CAUSAE.

Nempe oriuntur hi à convulsionibus intestinorum & mesenterii, adeoque ad colicas convulsivas reverà pertinent; unde etiam vicinae utero partes simul nonnihil convulsae similem dolorem, instar parturientium, repraesentant. Uno verbo: Sunt nihil aliud, quam dolores intestinorum colici & iliaci graviores, qui fiunt ab eorum dolorificis spasmodis & convulsionibus, aut, qui interdum hystericam passionem aut antecedunt, aut comitantur, & non tantum ab assumptis flatulentis, aut ab ingestis acidis, similibusque, sed etiam interdum ex effervescentia vitiosa succi pancreatici, & bilis, in primis viis corruptorum, oriuntur, praedominante etiam acido plus minus austero, unde & imprimis suffocationes hystericæ talibus doloribus in praedispositis subinde superveniunt, vel lipothymia. Fiunt item interdum tales dolores nothi à mucilagine pontica acida, tenacius intestinis affixa, quavis occasione commota aut resoluta; unde dum eam crispationibus dolorosis excutere nituntur intestina, facile tales falsi parturientium dolores succedunt: Sic mulier quædam aliquamdiu ex esu raphani incidebat sequenti nocte in graves dolores abdominis, ita ut accesserit obstetrix, & aliae mulieres; volebat eniti, nihil procedebat, instabat laboribus per integram noctem, manè dolores cessabant, & expectabat adhuc 14. dies. Sæpissime in partu veris partus doloribus nothi, uti subinde antecedunt, ita quandoque conjunguntur, & non raro post partum etiam ad tempus durant, dum nempe uterus in partu spasmò correptus & contractus pro excludendo foetu, motus istos convulsivos ratione suorum nervorum, ex mesenterii plexibus derivatorum ad hos plexus nempe, continuat; unde & reliqui nervi ex his oriundi similes spasmos & contracturas concipiunt, sibi que annexas partes membranosas, intestina & mesenterium, dolorificè convellunt: adeo ut tali in casu subinde epileptici insultus, in

partu imprimis laboriosiore, superveniant, istaeque atrociore, quo propior foetus insit, & qui excluso foetu sponte ferè sua denuò cessant. vid. M. A. N. C. A. 2. *Observat.* 67. pag. 124. Non ergò apparentibus quibusvis abdominis doloribus statim ab obstetricibus ad enixum cogendæ sunt mulierculæ. Nempe nunquam prius ad partum excitandæ sunt gravidae, nisi (1) tumor abdominis benè ad inferiora, ad regionem pubis, descenderit. (2) Dolores ex lumbis deorsum versus supervenientes fortes & sæpè recurrentes urgeant, (3) orificium uteri internum apertum sit; & (4) in protuberantibus membranis ritè vix formatæ sint, Conf. hic Mauriceau l. 2. c. 2, Hæferus in *Herz. Med.* p. 326. Facit huc observatio Hilderi de *lithotom. vesicae* p. 741. ne quæ calculo vesicæ affliguntur gravidae, & exinde summum quasi enitendi conatum patiuntur, pro parturientibus habeantur. Sic refert Viardel pag. 60. dolores colicos pro doloribus partus vulgo habitos.

### DIAGNOSIS.

Dolores isti nothi à doloribus veris parturientium non adeò facile distinguuntur, nisi à mulieribus, quæ jam sæpius pepererunt, aut ab expertis obstetricibus: Cognoscuntur tamen

1. Si nimis intempestivè mulieremprehendant, antequam nempe ex ejus calculo verum partus tempus insit.
2. Quando alia signa ad partum naturalem requisita non adsunt.
3. Si in his doloribus nothis mulier lectis calidis & stragulis, item lintheaminibus calefactis ac fomentationibus siccis probè calefactis, abdomen foveat, pedesque blandè incurvet, & ad corpus attrahat, & dolores cessent; cum e contra dolores partus veri talibus calidis fomentationibus, & pedum attractione, protinus exasperantur & promoveantur, observante hoc Ludovica Bourgeois in *Sebammen-Buch*.
4. Si internè cerevisiam calidam decoctionis seminis cumini bibat, cessant ferè dolores nothi; cum e contra dolores partus veri talibus calidis, potius exasperentur & promoveantur.
5. Si conjuncti sint dolores partus veri cum doloribus nothis, cognoscitur ex eo, quod non solum ad regionem pubis & uteri gravius & acerbius torqueantur, sed etiam quod superiores abdominis partes, nempe circa umbilicum & regionem coli, simul crucient, & vagis, modò simul distinctis vicibus mulieremprehendant, ut etiam vomitus superveniant.

PRO.

PROGNOSIS.

Dolores hujusmodi nothi hoc incommodi habent, quod interdum primariæ sint causæ, quod abortivus excernatur fœtus, vel mulieres ultimo mense nimis citò abortiant: item quod conjuncti cum doloribus partus veris, hos impediunt & imminuant, seu contractionem uteri, & ex hoc fœtus exclusionem tollant, adeoque parturientem debilitent, partum diutius protrahant, & laboriosiores reddant.

CURA.

Non opus est semper, ut curentur hujusmodi dolores nothi, nam subinde quiete & operatione stragulorum spontè disparent denuò: sin verò nimis diuturni sint, internè ea, quæ superius de torminibus gravidarum dicta sunt, applicari possunt, imprimis aqua & zedoariæ, item spiritus nitri dulcis in parva dosi, detur.

Externè fomenta calida, tam sicca quam humida, ex plantis anodynis carminantibus, chamomilla, imprimis Romana, conveniunt. Item cataplasma, ex melle cum zingibere, nucem moschata, cinnamomo, caryophyllis, & similibus lumbis & abdomini insternatur. Vel recipiantur mentha, absinthium, caryophylli, &c. subigantur & leviter bulliant cum vino Malvatico, ut fiat cataplasma, applicandum regionibus prædictis. Vel recipiatur panis piperatus, illinatur melle largiter, quod adspargendum cum dictis aromatibus, & tepidè applicandum lumbis & umbilico: Dolores autem veri potius his stimulantur. Interdum clysteres, imprimis abstergentes, ex lacte, vel quæ sine stimulo intestina abstergunt, aut carminantes blandiores, possunt injici.

MEMBRUM II.

De

Partu Difficili.

**P**Ræternaturalis quoque est partus, quando tempore & situ naturalis, laboriosior tamen & gravioribus comitatus symptomatibus, accidit partui, qui dum in conatu partus, vel tardè nimis procedit, ita ut diutius, quam par est, & gravioribus doloribus laboret fœmina, aut si dolores non benè continentur, aut si anxietates summæ adsint, quæ non rarò insigniter augentur à flatibus in intestinis parturientis retentis, atque non tantum totum abdomen expandentibus, sed etiam musculorum ejus & diaphragmatis, & ita exclusionem fœtus insigniter imminuentibus, aut à superveniente passione hysterica, anxietates intendunt. Ut plurimum tamen sub nomine partus difficilis naturalis partus tardior, & qui difficulter ac lentè succedit, intelligitur.

Tom. II.

CAUSÆ.

Causæ, sunt vel in fœtu, vel in matre, vel in viis, per quas transire debet fœtus.

In specie mater est causa partus difficilis, quando debilis est, & viribus plus minus exhausta, ut minus sufficiat pro labore partus; si sit

1. Morbosa, aut conflictata morbis gravioribus variis gestationis tempore. Vires requisitæ ad partum sunt fundatæ in spiritibus animalibus, quorum impetu spasmus isti perficiuntur, mediantibus quibus fœtus excluditur.

2. Ex parte matris redditur partus difficilis, si graviores dolores nothi vel præcesserint, vel etiam conjuncti sint veris. Huc

3. Pertinet parturientium sudor nimius, nam quo plus sudant in partu, in specie circa caput, eo magis ex spirituum nimia dissipatione decrescunt vires.

4. Si interruptus, & nunc irritus, nunc denovo urgens sit pariendi conatus, i. e. *Wenn die Wehen nicht anhalten/wenn es foinmet und bald wieder aufhört* / &c. quia ex inordinatis spirituum motibus ferè enervantur vires: Item quando dolores non rectè ferunt uterum & partes & genitales, sed in locis inferioribus ad loca superiora, caput, stomachum, brachia, &c. retorquentur.

5. Insigniter etiam huc faciunt animi pathemata matris graviora, quæ per accidens matris pariendi conatum impediunt, spirituum animalium maximè necessarium motum ad uterum ab eo avertendo, v. g. in parturientibus nimis verecundis, imprimis primiparis, in nimis timidis, aut etiam delicatulis dolores fugientibus, &c. Sint ergo hilares, recreentur à jocosis mulieribus adstantibus spe futuri partus, precibus atque cantu animentur ad constantiam laborum, subinde haustulus vini generosi concedatur, ut reddantur animosæ; sic melius succedit labor, & etiam promptius expurgantur lochia; externè aquæ hystericæ, &c. admoveantur naribus.

Fœtus est causa difficilioris partus.

1. Si morbosus aut aliàs per se debilis sit, ita ut ipse in suo conatu deficiat, & sola mater necessitet labores.

2. Si gemelli fuerint, & ambo æquali enixu egredi tentent.

3. Sin membranz, secundinam constituentes & fœtum cingentes, non rumpantur, sed tenaciores & firmiores hæreant, unde fœtus is obvolutus progredi tentet, & orificio uteri interno immineat: id quod fit interdum, ut integris membranis obvolutus fœtus prodeat, partu etiam maximè difficili, ita ut interdum necesse sit, ut obstetrix unguibus digitorum aut singulari quodam scalpello, superius obtuso, rumpat & separet membranas, (quod dicunt *das Wasser kneipen*) quo aquarum effluxus promoveatur, & fœtus egressus adjuvetur.

(Nnn nnn)

tur.

tur. Rarum enim est, nisi in foetibus admodum parvis, & quorum matres habent loca patentiora paulo, ut una cum secundinis prodeat foetus: Vid. Harvæus *de Partu*. Non tamen semper consultum est membranas discindere, & non faciendum, nisi indicia imminenti partus sufficientia adsint, & foetus legitimum habeat situm. Fiant ergo foras & fomenta ex plantis emollientibus, lacte & similibus, ut sic emolliatæ membranæ à foetu perrumpi possint.

4. Si funiculus umbilicalis, qui cingit communiter frontem foetus, aliquot gyris sit circa collum aliamve partem circumvolutus, ita ut quasi laqueos suffocandus prodeat foetus.

5. Si foetus fuerit mortuus.

Ratione viarum est partus laboriosus, si nimis

1. Angustæ aut impeditæ sint; hinc in primiparis, in specie paulo senioribus, partes sunt altiores, firmæ, densæ, & magis robustæ: Vid. Bartholinus *de Infol. Partus viis cap. 3.*

2. Si viæ sint minus lubricæ, ut in defectu aquarum harum, nempe retentione ob membranas nondum ruptas, vel propter harum citam nimis aliquot septimanas ante partum profluxionem, vel quando planè nullæ in partu effluant; Vid. Bartholini *Acta Med. Hafn. Volum. 3. pag. 257.* Item M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 132. pagin. 241.* Adeoque rarum est, quod præmaturè, innocuo tamen partu effluerint aquæ, Vid. M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 13. pagin. 31.* Ubi tamen distinctio aquarum effluentium supra insinuata probe observanda venit.

3. Si os pubis nimis firmum & fortius junctum sit, indeque hujus cartilago minus relaxari queat. Utut enim hujus aliqualis apertio aut dehiscencia ad partum non requiratur à Mauriceau *l. 2. cap. 1.* tamen in foetu grandiori, & ubi major conatus adest parienti, quin sæpius non nihil laxetur, & ita plus minus hiscant ossa pubis, haud adeo absolum videtur, cum præter experientiam, quam allegat Guillemeau *lib. 2. cap. 1.* dislocationem ossium pubis in partu referant M. A. N. C. *Ann. 3. observ. 255. pag. 458.*

4. Facit huc etiam, si ipse infans capite prono super os pubis imminet, quod vocant, **Wann das Kind über den Bogen steht.** Tunc enim maximo conatu & omnibus foetum pellentibus nihil juvatur, quin potius datis stimulantibus malum deterioratur; nil præstabitur tunc quibuscunque remediis, nisi à manu obstetricis foetus caput blandè sursum adigatur, ut ita postmodum ab osse pubis remotus, in naturalem vaginæ transitum seu orificium uteri internum redeat, & istud orificium ingrediatur.

5. Pertinet huc etiam, si os coccygis durius sit & fortius, & minus reflectatur ad

posteriora; Nam hoc os coccygis incurvatum in partu extrosum versus flectitur, unde prope anum intensos admodum dolores percipiunt mulieres: Vid. Bartholetus *Encyclop. pagin. 49.* & Bartholinus *de Infol. partus viis, cap. 3.* Econtra interdum fit, ut luxetur os coccygis. Ut autem redeat denuo in locum & situm naturalem, obstetrices habent egregiam encheirisin. **Sie binden eine Quetsche um den Leib / und ziehen sie durch die Beine / und bringen also das os coccygis in situm naturalem.**

6. Causæ etiam, sunt vesica urinæ repleta, vel alvus excrementis nimis onerata. Nam excrementa alvi retenta, & juxta intestinum rectum collecta, ob viarum angustiam insigniter impediunt partum, & reddunt difficilem; Hinc frequentius in laborioso partu & mingunt & cacant. Notabile exemplum de intestinis plenis, partum impedientibus videb. in *Tract. Guillemeau lib. 2. cap. 11.*

7. Pertinent huc etiam tumores, scirrhi, excrecentiæ aut similes, aut in vagina uteri vel pudendis, vel orificio uteri multiplices: Exemplum habet Hildanus *Cent. 3. observ. 57.* Sic Horstius *lib. 2. observ. 5. pag. 163.* partum impeditum observat ex leirrho orificii uteri, de quo conf. *observat. 64. Centur. 1. & observ. 57. Centur. 4.* item partus impeditus ob abscessum uteri observatur in M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 180. pagin. 277.* Quo etiam hæmorrhoides cæcæ, aliaque anipathemata spectant.

8. Si ipse foetus interdum hydrocephalo laboret in utero; nam tunc caput aqua inflatum ineptum est, ut transeat per ista loca; & in tali casu desperato interdum necesse est, scalpello aperire tumorem, ut evacuentur aquæ, & foetus eximatur, ne unà cum foetu mater intereat.

9. Pertinet huc nimia laxitas rugarum vaginæ uteri in iis, quæ vel crebrius pepereant, vel quæ diutius fluore albo laborarunt, ubi hæ rugæ nimis laxæ aut flaccidæ, ut minus se contrahere valeant, partum laboriosorem reddunt, quem obstetrices interdum manu juvare necessum habent. Aliàs rugæ hæ, contrahendo sese, multum faciunt ad exclusionem foetus.

## DIAGNOSIS.

Quod attinet signa: Partus difficilis & laboriosus per se patet.

Causarum signa imprimis cognoscenda, quod facile fieri potest, modò omnes circumstantiæ partus pensitentur à Medico.

Matris vitia ac debilitates, eamque minus esse promptam ad partum, ex ejus relatione & causis antecedentibus facile cognoscuntur,



scuntur, si dolores partus sint remissiores, si sint interrupti.

Meatuum vitia, ex obstetricis relatione imprimis cognoscantur, si & strenuè laborante matre, & strenuè se movente fœtu, & continuantibus partus doloribus, nihilominus tamen viæ angustæ maneant, aut orificium uteri pertinacius clausum fuerit: in quo casu emollientia & laxantia injicienda.

Fœtus vitia ex circumstantiis, præsertim ex deficiente ejus motu ac debito conatu, cognoscuntur, si partus, licet doloribus continuantibus, hic tamen tardius aut imbecillius moveatur, imò interdum omnino in motu cessat, ut quibusdam fœtus putetur mortuus: Scilicet obstetrix inungat manum aquâ vitæ mulierum vel alia spirituosa, & ita, eadem in uterum immissâ, fœtum tangat; qui vivus subito se movere incipit; sin minus, mortuus est.

In specie tres sunt circumstantiæ, quæ, monente Guillemeau *Traët. de Felici Partu Mulier.* Partum difficilem & periculotum reddunt, & specialem evolutionem merentur:

1. Quando fœtus mortuus est.
2. Quando nimia hæmorrhagia uteri partum præcedit.
3. Quando partu imminente adsunt vel superveniunt convulsiones.

Quod attinet hæmorrhagiam uteri: sæpius evenit, ut nonnullæ uterum gerentes obnoxie sint fluxui sanguinis per uterum; si igitur imminente partu accedat, observet Medicus, ex quo loco sanguis prodeat? an nempe saltem ex vagina uteri? an ex matrice? ex qua non prodit, si mulieres nullos patiantur partus dolores; item, si orificium uteri internum clausum & non apertum sit; sed sanguis prodit saltem ex vagina uteri.

Interim simul observetur, quando orificio uteri aperto sanguis prodit, ut tunc attendat Medicus, quid istud sit, quod orificio uteri immineat? an sit secundina? an fœtus? si sit secundina, signum est, eam esse disruptam à connexionem cum utero, & imminere mortem fœtus, adeoque accelerandam esse fœtus exclusionem.

Quod verò attinet convulsiones parturientibus supervenientes, plures sunt mulieres, quæ sine convulsionibus pariunt, nisi aliàs affectibus convulsivis affecta sit mulier. Hinc quibusdam fœtibus epilepsia sub partu est salubris, quibusdam lethalis: Vid. M. A. N. C. *Ann. 2. observ. 67. pagin. 124. & Ann. 3. observ. 317. pagin. 534.* Interim si adsunt, oriuntur ut plurimum ex impetu fœtus in utero, dum summo conatu exire nititur.

His signis diagnosticis adjungatur notatu Tom. II.

digna observatio Horstii *lib. 5. observ. 37.* ubi fœtus ante medium gestationis tempus, & adeo ante motum, incia matre ejus mortuus relictus fuit, qui postmodum ex supervenientibus variis symptomatis cachecticis gravioribus lypothymiis, posteriori ceu mortuus cognitus, ac feliciter expulsus fuit.

### PROGNOSIS.

In primiparis partus non rarò solet esse paulò laboriosior: nec tamen id perpetuè observantiz putandum est, cum crebriores prostant observationes, quod sæminæ, quæ primum partum facilius absolvunt, sequentibus temporibus de partu in partum ferè difficilius habeant, & tales sæpius in partu, aut etià sæpius in puerperio moriantur: Econtra partus primus quo difficilior, eo faciliores secundi & insequentes esse solent.

Virginibus etiam seriùs maritatis imprimis periculosior & difficillimus imminet partus, imprimis quando circa trigessimum vel trigessimum quintum annum nubent: Nam quo propius tales virgines appropinquant ad quadragesimum annum, eò periculosius in partu se habent, sæpè & hæ solent mori, vel in partu, vel in puerperio; idque propter fortem juncturam & firmitatem partium uteri membranacearum.

In valdè juvenculis verò difficilis est partus, quia membra omnia teneriora sunt, & exitus non adeo apertus; infantes enim primipari valdè magni esse solent ut plurimum.

Interim tamen partus difficilis omnis periculosum malum est, cum exhaustis successivè viribus, vel matri vel fœtui, vel utriusque vitæ subinde immineat periculum, quia matri graviora superveniunt symptomata, ut hæmorrhagiæ uteri, febres, &c.

Porrò partui difficili superveniunt non rarò convulsiones & paroxysmi epileptici funesti & lethales, nisi brevi post sequatur fœtus; nam ubi sequitur fœtus tunc cessant vel spontè.

Quod si v. fœtus non ritè fuerit situatus, vel inversus, tam ingentem uteri distensionem facit, ut metus sit, ne utero lacerato mater gravius malum, aut periculum vitæ, incurrat.

Interdum in partu laborioso rumpitur vagina uteri in pudendo, ita ut sinus pudoris cum podice in unum abeant foramen.

Si mulier quatuor diebus partu difficili laboret, vix potest fieri, fœtum permanere vivum quin, tandem moriatur, matris scilicet & fœtus viribus collabescentibus.

Partus difficilis, qui fit ex angustia viarum, speciatim ossis structura validiore, periculosus  
(Nnn nnn 2) sus

susest, & subinde cum periculo foetus est conjunctus, & Chirurgi accedat opera, necesse est.

## C U R A.

Ut plurimum duplex instituitur, partim præservatoria, partim curatoria.

Aliquot ergo diebus ante partum, qui metuitur difficilis, ad hunc facilitandum, utatur mulier balneis & infusibus emollientibus, laxantibus & nervinis, ex althæa, malva, meliloto, chamomilla, pulegio, artemisia, serpililo, matricaria, & similibus: c.g.

*℞. Herb. Malv.*

*Arthemif.*

*Matricar.*

*Mercurial.*

*Puleg.*

*Meliss.*

*Alth.*

*Violar.*

*Branc. ursin.*

*Parietar.*

*Flor. Chamom.*

*Sambuc.*

*Malv.*

*Melilot.*

*Lin. aa. M. j.*

*Radic. alth. ʒj.*

*Malv.*

*Lil. alb.*

*aa. ʒj. ℞.*

*Sem. lin.*

*Fenu Gr.*

*Aneth. aa. ʒij.*

*Incisa & contusa S.*

*Species zum Baden.*

Cui & lactis mentiur. una vel duæ infundi possunt.

His poma momordicæ quidam addenda suadent, propter signaturam: nam si hæc contineantur in manu, crepitu edito per medium disrumpuntur, & sua semina ita effundunt; unde per similem signaturam, clysteribus incocta, etiam in partu facilitando in *M. A. N. C. Ann. 6. observ. 72.* laudantur; loco balneorum usurpant quædam fomenta, ex dictis simplicibus, facculo insutis, in aqua vel lacte probè coctis, & subinde hypogastrio tumentis admotis, concinnata. Post balneum aut talem fotum, vel sine eo, illinatur regio abdominis inferior, item pudenda & regio lumbaris, cum mulcilaginis, oleis & pinguedinibus.

*℞. Mucil. sem. Lin.*

*Fenugr.*

*• Radic. Alth.*

*Malv.*

*aa. ʒj.*

*Ol. lil. alb.*

*Cheirin.*

*Ol. Chamom.*

*Momord.*

*Amygd. d. aa. ʒ℔.*

*Bals. Peruvian. ʒij. M.*

Conveniens etiam est, quando aquæ præmaturè effluxerint, & genitalia nimis arida existant. Vel oleum amygdalarum dulcium & oleum liliorum alborum sola conveniunt.

Dum verò jam partus instat, & dolores mulieremprehendunt, optimum est, alvo existente vel clausa, vel intestinis flatu turgidis, applicare enema carminativo-emolliens: imò ubi dolores partus nothi, aut etiam colici, aut pathemata hysterica, gravius parturientes simul affligunt, talia clysmata ad facilitandum partum optimè conducunt; & in ipso partu difficili, aliis ferè frustraneis, se aliquoties felicem successum extali enemate observasse, scribit Timæus von Guldenslee/ in *Epist. 16. lib. 6. pag. 432.*

His etiam factis, dum partus instat, obstetrix ante mulierem collocata manibus inunctis oleo liliorum alborum, amygdalarum dulcium, cheirino, aut pinguedine gallinacea, aut anserina, aut ursina & similibus, blandè vaginam dilatet, abdomen mulieris tumidum, & lateralem regionem lumborum similiter inungat, subinde etiam abdomen mulieris blandè deorsum versus premar. *Sie streichen sie auff allen beyden Seiten ober herunter werts.*

Quodsi in longum partus protrahatur, & dolores non sint continui, sed per longa intervalla interrupti, mulier non statim cogatur in sellam, & ad puerperii conatus ac labores instigetur, quin potius, cum anxiosa sit mulier, & subinde stare, subinde sedere, subinde decumbere aut ambulare velit, tamdiu parturienti libertas & blandus motus, in specie blanda ambulatio & inclinatio ad parietem concedatur, ut foetus situs deorsum versus eò melius promoveatur, quamdiu post effluxam aquam uterus nondum perfectè apertus, nec foetus capite uteri orificio immineat, & ad partum jam dispositus sit: tunc enim sellæ impositam in eodem situ obstetrix constanter retineat & firmiter ad partus labores urgeat, nec prius dimittat, nisi foetus subsequutus sit: Nam tunc, quando ita imminet partus, neque sedere, neque ambulare debent; quin potius periculum est, ne vitietur positura sit<sup>o</sup> infantis, & qui erat naturalis, nunc semotus vel ventre vel brachio vel aliâ parte orificio uteri incumbat, & ita partus præternaturalis reddatur. Interea dum longius labor protrahitur, obstetrix oleo cheirino, pinguedine anserina, oleo succini, liliorum alborum, & similibus supra dictis linimentis abdomen gravidæ & vaginam uteri inungat, ut uterus & abdominis muscoli relaxentur, & blandâ manu puerperam tractet, & eam auda-

audacter ad partum stimulet, Borellus *Cent. 2. Observat. 25.* habet, à potu olei olivarum ante partum mirè eundem facilitari, ita ut nec tormina ulla patiantur puerperæ, cum oleum hoc vias molles & lubricas reddat, præsertim si etiam extra admoveatur.

De obstetricum officio vid. Ludovica Bourgois, Joannes Veslingius in *Observat. Anatom. posthumis*, à Casparo Bartholino editis, pag. 159. & pag. 168. Bartholinus in *Actis Hassniens. Volum. 1. Observat. 139. pagin. 286. ad pag. 292. & Volum. 2. Observat. 22. pagin. 53. sequ. & Murald. Clav. Med. pag. 429. De Qualitatibus & Requisitis earum Viardol. in *Anmerkungen vom weiblichen Gebülthe/ pag. 159. seq. de earum examine* Pechlinus *l. 1. observat. 33.**

Interea temporis, si foetus in ipsis oris inhæreat, & metus sit, ne vel foetus, vel mater debilitetur, ad roborandam matrem & foetum, Medicus vocatus interne tam analeptica varia propinet, quàm externè admovenda ordinet: Internè propinet ea, quæ per experimenta partum promoveri cognita sunt, miscendo simul cum spirituosissimis urinosis volatilibus, & acerbis aromaticis, spiritus animales roborantibus, & ita ad enixum melius disponentibus; & neque his sufficientibus ad specifica, fortiter pellentia, per experientiam confirmata, progressus fiat, in specie cum cinamomo, sine quo nulla remedia pro facilitando partu propinanda veniunt. Utut autem spirituosissima analeptica, matrem & foetum roborantia, semper convenient, posteriora tamen aromatica acris volatilia, & specifica foetum pellentia, non prius danda sunt, nisi aliis irritis, omnibusque ad partum ratione matris & ratione foetus jam prædispositis, atque hic saltem tardius procedat, i.e. nisi aquæ effluerint, orificium uteri hiet, dolores parturientis rectè se habeant, & ipse foetus in convenienti situ positus, aliàs enim, foetu malè situato, aut tempore ad partum nondum requisito, ab internis partum pellentibus, omnino est abstinendum, quia subinde frustrâ & cum periculo propinantur.

Remedia ergo, quæ parturientibus conveniunt, sunt; vel spirituosissima analeptica, adeoque nervina, motum partium beneficio spirituum promoventia, atque matrem & foetum refoecillantia; vel aromatica volatilia acris foetum stimulantia; vel specifica per experientiam cognita, uterum speciatim irritantia, & spasmos concitantia.

Quoad 1. spirituosissima: sunt cinnamomum, vinum generosum, spiritus vini, aqua vitæ mulierum, aquæ hysterica spirituosæ, aqua cinnamomi spirituosæ, aqua pulegii & mellissæ cum vino destillata, cum syrupo de

canella, de artemisia, de cortice aurantiorum: imò hæc spirituosissima insuper id commodi habent, ut, dum commovent massæ sanguineæ circulum, postmodum lochia melius fluant.

II. Aromatica foetum stimulantia sunt diastamus Creticus verus, salvia, artemisia, aromata omnia, in specie cinnamomum, costus Arabicus, anthophylli, cassia lignea & crocus. Vid. Amatus Lusitanus *Cent. 5. Curat. 34. & 157. Centur. 6. Curat. 87. Centur. 7. Curat. 86.* Horstius in *Observat. Anat. 31.* Henricus ab Heer *Observat. 14.* Quibus addantur omnia salia alcalia fixa & volatilia, speciatim volatilia oleosa, & olea aromatica, essentia croci, &c.

III. Succedunt specifica, inter quæ flores cyani & calcatrippæ in vino cocti, essentia ad partum D. Michaelis, antheræ liliorum alborum, flores calendulæ, semen lavendulæ, milii Qis, &c. Pauperculis in usu est haustus urinæ mariti, ut dicit Hartmannus. Porro castoreum, & omnia ex eo, succinum album; nam succinum præparatum solum ad ʒij. vel ʒj. propinatum, promptè promovet partum; & essentia succini, seu potius oleum succini destillatum, quod sub nomine quintæ essentia succini laudat Borellus *Centur. 3. Observat. 52.* sicut Rulandus in *Theaur. Curat. pag. 320. & 321.* oleum succini egregio cum successu expertus, quod a guttis xiii. ad xxx. in aqua melissæ cum vino, vel aqua pulegii spirituosæ intus propinatum, est singularissimum remedium, in casu difficili simul externè umbilico inungendum: si acuat aliquot guttis olei destillati cinnamomi, erit eò magis præsentaneum remedium. Loco hujus efficacius longè experimentum est Rulando *l. 4. in usu positum* oleum Heraclinum, quod tam internè assumptum ad guttas xv. usque ad xxv. & externè umbilico illitum, mirè partum promovet. Essentiam succini tartarizatam cum essentia castorei mistam, & ad guttas xxiv. aliquoties exhibitam, Ludovici commendat in *M.A.N.C. Ann. 9. & 10. Obs. 35.* cui essentia Croci etiam associari potest. His non cedit sal volatile succini, dosi ʒß. vel gr. xv. in aqua liliorum alborum, quod fuit secretum Sultzbergeri; unde liquor cornu cervi succinatus à ʒß. ad ʒj. est remedium egregium.

Porro myrrha, aia foetida ac similia sunt expertissima: Hinc pilulæ foetidæ, ad ʒj. cum decocto sabinæ propinatæ, mirè stimulant partum. Myrrha imprimis & trochisci de myrrha usitati sunt propinati à ʒß. ad ʒj. Quod pertinet etiam sabinæ, it. decoctum; imprimis decoctum sabinæ vid. Velschius *Hecat. p. 32.* Præ ceteris eminet secundina humana, cujus spiritum per putrefactionem paratum, & rectificatum, ceu summum specificum, primariò primiparæ, instar omnium vobis commendo.

(Nnnnnn 3)

Hinc



Hinc quoque cum hoc ipso spiritu secundinæ humanæ parantur essentia ad partum, imprimis D. Michaelis. Qui non habent spiritum secundinæ, assumunt secundinam, eamque blandè exsiccant in clibano, aut phlegmatis in Mariæ balneo abstractione; cujus pulveris ʒʒ. ad ʒj. propinant æquali ferè effectu. De fuligine res nota est, quod in substantia ad ʒj. propinata insigniter conducat. Hinc loco spiritus secundinæ etiam spiritus fuliginis benè rectificatus est egregius ad pellendum foetum: in specie ubi vires deficiunt mulieri, doloresque parturientium desinunt. Secundinæ humanæ & fuligini succedit jecur anguillarum, una cum suo folliculo fellis exsiccatum & pulverisatum, quod specificum singulare Helmontii est, *Tractat. Jus Duumvirat. §. 47.* Conf. Panarollus in *Observationibus Pentec. 3. Observat. 21.* Binneringer in *Observat. du Hamel de Affect. Corp. pag. 309.* Zwelliterus *Apol. pag. 103.* & Boyle in *Philosophia experimentalis pag. 478.* Loco hepatis anguillæ etiam potest usurpari hepar serpentis, aut viperarum, similiter cum suo folliculo fellis exsiccatum & pulverisatum. Testes equini, exsiccati & pulverisati, sunt specificum. Singularem horum & mirabilem efficaciam à ʒʒ. ad ʒj. vel si soli propinantur, vel si cum tantillo borracis in aqua liliorum alborum hauriantur, mirè commendat Claudinus *Consil. 107.* & Henricus ab Heer in *Observat. 14.* & basis sunt pulveris ad partum difficilem Helidæi Paduani; sterco equinum, ejusque succus cum vino expressus, loco urinæ mariti haustus egregium est remedium. Borra Veneta unum ex optimis & potentissimis est. Si à ʒj. ad ʒʒ. & ʒj. propinetur in decocto vel syrupo appropriato. Zacutus Lusitanus l. 2. *Prax. Admir. Observat. 41. 49. & 158.* Porro Mercurius vivus propinatus expertum est remedium à Bartholino *Cens. 4. Epistolar. pag. 492.* Sicuti ab aliis mirè commendatur aurum fulminans. Langius in *Misc. Cur. pag. 101.* mirè extollit tanquam expertissimum in hoc casu specificum cephalicum D. Michaëlis, præprimis si epilepticis insultibus stipatus partus difficilis.

Jam ex his paucis & selectis mille possunt fieri formulæ: v. gr.

℞. ▽. *Matricar. ʒij.*  
*Cinnam. ʒʒ.*  
*Borrac. Venet. ʒʒ.*  
*Myrrha ʒj.*  
*His volat. succini ʒʒ.*  
*Syr. de canella ʒij.*  
 m. f. Potio pro duabus dosibus.

Pertinet huc mixtura experta Timæi von Guldensee / ex myrrha, croco & succino, in *Casibus libr. 4. cas. 25. pag. 223. & 28.*

Pertinent huc species dia-borracis Mynsichtii, cum decocto matricariæ vel sabinæ propinatæ: & in *Curationibus* Hillerus curavit fœminam triduo partu laborantem, propinando tandem borracis ʒj. cum unicorn. animal. ʒij. Pulveres aliquot compositos expertos videb. in Hertodtii *Crocol. pag. 224.* item convenit pulvis ad partum Augustanorum, & pulvis ad difficilem partum Helidæi Paduani.

℞. *Borrac. Venet. ʒʒ.*  
*Myrrh. el. ʒj.*  
*Croci opt. ʒʒ.*  
*Cinnam. acut. gr. viij.*  
 M. f. pulvis pro duabus dosib.

quæ ex mixtura spirituosâ propinentur.

Hæc equidem sunt talia, quæ partum promoveant, & dolores imprimis reterare faciunt: quod si tamen nimii sint dolores, ita ut ab his ipsis fatigetur nimis ac debilitetur fœmina, tunc Sylvius hisce foetum pellentibus aliquot grana laudani opiati tutò addenda suadet, si propinetur imprimis in aqua appropriata cum tinctura castorei.

Cum his internis sæpè necesse est, ut usurpentur quædam externa: inter quæ præ cæteris convenit cingulum ex exuviis serpentum, circa hypochondria vel lumbis circumligatum, vel unguentum ex exuviis serpentum, quas sponte deponunt, axungia vulpis, leporis, lumbricis terrestribus, & succo cancrorum fluviatilium, abdomini illinendum; vid. *Gammarel. Sachsi pag. 782.* Sed mox abstergendum propter nimiam pellendi virtutem. Item convenit suffitus ex benzoë, ladano, succino, thure & mastiche; vel fiat suffitus Stœckeri, item unguentum ex oleo cheirino, liliorum alborum, unguento althææ, &c. quæ acuuntur cum oleo destillato succini & spicæ q. s. pro litu externo abdominis.

℞. *ungu. nervin.*  
*Ol. laurin. aa ʒʒ.*  
*Dest. succin. ʒʒ. ad ʒj.*  
 M. pro linimento.

Item subigatur succus sabinæ pinguedine anserina, & moderato igne redigantur in formam linimenti. Alii commendant zibethum humanum seu pinguedinem circa testiculos virorum quam vulvæ & umbilico illitam foetum pellere affirmant. Præ cæteris specificè laudatur axungia viperina & serpentum; sed post partum mox abstergatur: item oleum destillatum succini, mistum cum axungia serpentum, umbilico illitum.

℞. *Pingu. Viperin. ʒvj.*  
*Ol. cheirin. vel momord. ʒij.*  
*Destill. spica ʒj. M.*

Vel fiat fots abdomini applicandus ex plantis aromaticis pellentibus, Mercuriali, dictamno Cretico, radice ircos, cucumeris agre-

agrestis, floribus chamomillæ, pulegio, artemisia, postmodum verò illinatur abdomini unguentum de artanita. Vel fiat cataplasma ex decocto colocynthidos, succino, ruta & cum farina hordei. Pelli intruduntur ex fabina viridi contusa cum croco, vel ex galbano in aceto dissoluto, cui myrrha & crocus addita sint: c. g.

℞. Galban. in acet. dissol. ʒj.

Myrrh. ʒij.

Croci ʒb.

Cum Ol. Irino ꝑ. Pessus.

Alia externa, nempe cingulum ex corio humano, lapis ætites coxæ alligatus, per se sunt nota. Frustum cutis tigris fœmori sinistro alligatum partum facilitare, vid. in M. A. N. C. Ann. 6. Obs. 59. Oculos leporis exsiccatos, vertici aut umbilico applicatos, laudat Hartmannus, Macasius in *Promptuar. Med.* item Major, in *Tr. de Inunct. Vers.*

His verò & similibus adhibitis, ubi separatus non succedit effectus, & fœtus adhuc in partu hæreat angustis, aliquantisper fortiora adhibenda sunt. Neesse ergo est, ut subjungantur simul sternutatoria quædam, dum sternutationis nisu per vices quasi irritantur fœminæ, & ita forti diaphragmatis & abdominis concussione concutitur uterus, & partus simul promovetur. Vid. Heer *Observat.* 14. Harvæus *libr. de Partu.* Hildanus *Centur.* 3. *Observat.* 53. Fiant autem ista ex nicotiana, helleboro albo & nigro, majorana, radice & floribus liliorum convallium, pipere, castoreo, caryophyllis & similibus.

Quibus frustra adhibitis, tandem in causa non nihil difficiliore & desperata videtur necessarium, ut ad vomitoria fiat accessus. Hæc inter eminent Mercurius vitæ, quem mirificis extollit laudibus Langius *Misc. cur. pag.* 101. Hoffmannus *Meth. Med. lib. 1. cap. 9.* & Biliarius in *suis Paradox. & Observ. Chemicis*, Sunt qui succum nicotianæ in pillatum pro vomitorio hic laudant, sed est nimis violentus, nimisque malignus: Potius ergo Mercurius vitæ in substantia, vel infusum antimoniale ex Mercurio vitæ est usurpandum. Quinimo modernorum audacia pro facilitando partu venæ sectioni locum interdum concessit, & aliquot novi exempla mulierum, quæ cum aliàs laborarent ordinariò partu difficili, sibi, dum inciperent dolores partus venam aperire in brachio, curarunt, unde facilè postmodum fuerunt liberatæ: & ipse Patinus Parisiis mihi retulit, se plus quàm ter in partu difficili secasse venam in cubito, unde brevi post liberatæ fuerunt fœminæ à fœtu. Nec res est impossibilis aut absurda, in paulò scilicet habitioribus juvenculis, & in magis plethoricis, quæ sanguine spirituosiore & magis turgescente abundant. Id quod etiam docuit de la Cour-

vee in *Parad. de Nutrit. Fœtus in utero, qui cap. ultimo circa finem pag.* 357. cujus felicem utum etiam Bauhinus observavit. Imò jam vestigia prostant in Hippocrate *l. 1. de Morb. Mulierum*, ubi V. Sectionem in talo instituendam hic commendat, vid. Zacutus Lusitanus *l. 2. Prax. Admir. Observat.* 64. Borellus *Cent. 4. Observat.* 24. & Riverius *Prax. l. 15. c. 16.* Apud nos non videtur necessaria hæc V. S. In climatibus calidioribus, & in habitu fœmellarum succulentiore paulò, aut quæ utuntur pro potu ordinario vino, in his venæ-sectio in ipso partus labore instituta admodum necessaria & proficua est.

Quodsi hæmorrhagia uteri accedat, huic alio modo succurrere non possumus, nisi ut quantocius à fœtu liberetur mater, aliàs impossibile est, ut sistatur sanguis: vid. Mauriceau *de Morb. Mulier. cap. 21.* idque præprimis, si dolores parturientium præcesserint, aut adint: Item si simul  $\nabla$ æ vel effluunt, vel effluere incipiunt, etiam si fœtus vel sex vel septem vel octo fuerit mensium; item si orificio uteri aperto secundina imminet. Si verò orificio interno clauso sanguis ex vagina uteri saltem prodeat, tunc mulieres non sunt urgendæ ad partum, sed curandæ sunt ad modum curationis aliarum hæmorrhagiarum.

Si ad sunt in partu convulsiones, quæ ut plurimum ex impetu fœtus in utero, ejusque summo egrediendi conatu, oriuntur, in hoc casu egregiè segerit specificum cephalicum D. Michaelis ad ʒj. in  $\nabla$  quadam spirituosa exhibitum: vid. Langius *Miscell. Cur. pag.* 92. Hoc non sufficiente, & metu uteri lacerationis aut alius gravioris mali, subito mater à fœtu liberetur, in specie manuali operatione secundum modos, quos docet tam Guillemeau, quàm Mauriceau *l. 8.*

Sæpè etiam evenit, ut in partu difficili fœtu vivo existente mater intereat, ubi vix aliud salvandi fœtus est medium, quàm Sectio Cæsarea, seu abdominis in regione laterali hypogastrica, ibique facta apertio, & ex eo fœtus vivus extrahendus: quæ sectio abdominis pro partu Cæsareo non, nisi in hoc casu, toleranda. Vid. Mauriceau *l. 2. cap. 33.* Hujus feliciter administratæ exempla, præter Rousseum *de Partu Cæsareo*, & Sennertum, vid. Valeriola *l. 2. Observat.* 22. Marcellus, Donatus *Histor. Medic. l. 7. c. 12.* Bartholinus *C. 2. Histor. 8. in Epist. Medicin. Cent. 4. Epist. 41. pag.* 237.

### MEMBRUM III.

De

*Fœtu Mortuo.*

**P**ericulosè difficilem partum præ cæteris casibus fœtus ipse mortuus reddit, quia omnis

omnis ejus conatus tunc cessat, sæpeque etiam perversum habet situm, & totum negotium matri, sæpissimè tunc debili, unicè incumbit; unde vel postmodum mater debilitata tandem & ipsa in labore fatiscit & moritur, vel non sine labore fœtus tardè enititur: Imò in tali casu evenit interdum, ut mortuo fœtu in matre debilitata, cessante fœtus motu & conamine, omninò dolores partus cessent & evanescant, nec unquam redeant, quicquid etiam ad promovendos eos adhibeatur; aut si redeant, non tamen sufficiant pro excludendo fœtu, imprimis si vitiosè simul situatus fuerit infans in utero materno, adeoque omnia medicamenta sunt frustranea.

### C A U S Æ.

Moritur fœtus aut in partu, aut aliquot diebus vel mensibus ante partum: In partu moritur ex iisdem ferè causis, ex quibus aliàs difficilis fit partus, v. g. aut ex propria fœtus; aut matris debilitate, aut ex viarum angustia, ex quibus eniti nequit, quin suffocatus quasi hæreat, & quandoque capite vehementer compresso intereat. Imò perversus ejus situs multum etiam simul tribuere potest ad ejusdem internecionem, si scilicet accedat simul fortior matris conatus, quatenus subinde aut collium ejus invertendo, aut laxando, mors hinc fœtui in utero acceleratur. Ante debitum verò part<sup>o</sup> temp<sup>o</sup> sæpissimè externis ex causis moritur fœtus, v. g. ex nimia matris ira, terrore aut ejus pavore, à quo etiam in utero adhuc constitutus tenellus loco mortis epilepticis convulsionibus corripitur. Item etiam perit fœtus ex prolapsu matris in abdomen ex percussione gravi abdominis, & similibus. Ex causis internis febres acutæ, alii morbi acuti matrem graviter affligentes, sæpiùs fœtum adhuc in utero interimunt.

### DIAGNOSIS.

Quod attinet diagnosin fœtus mortui: circa hanc imprimis arduum negotium incumbit Medico, ut cognoscat, an revera fœtus sit mortuus? aut saltem, an sit debilitatus quidem, & adhuc vivus? Et quidem si hoc evenit, vel suspicio sit de fœtu mortuo, observetur; an tempore legitimo partus hoc eveniat? ut exinde sciat, an chirurgica applicanda sint instrumenta? sin verò ante tempus partus moritur, necesse est cognoscat, an fœtus sit mortuus? ut eundem inortuum maturè ejiciat, ne eundem tanquam vivum retinere studeat.

Signa, fœtum esse mortuum, infallibilia & certò demonstrantia non dantur, potiùs aliquot vel plura simul sumpta accuratiùs inter se collata & bene pensitata, rem tandem certiore reddere valent. Nam fit subinde, ut à doloribus nothis irritatus & uterus & fœtus,

epressum moliatur mense septimo & octavo, sub quo molimine adeo interdum debilitatur fœtus, ut non ampliùs se moveat, adeoque interdum tanquam mortuus in utero hæreat. In tali casu, ne fiat deceptio omnes omninò circumstantiæ probè sunt pensitandæ.

Horum ergo signorum, quæ manifestant fœtum vel in partu, vel alias esse mortuum, sunt sequentia:

1. Quando mater & obstetrix, si est in partu, motum fœtus ampliùs non percipiunt, etiam si roborantia, aut aliàs confortativa spirituosæ exhibeantur, siue interna, siue externa.

2. Quando gravida de latere in latus se vertendo ac volvendo fœtum simul ex una parte in alteram lapidis aut molis cujusdam inconditæ instar, dilabi & moveri sentit. Sed sæpè fallit hoc.

3. Facies & imprimis labia puerperæ admodum pallent.

4. Partes extremæ interdum sublividæ, & ad tactum frigidæ apparent.

5. Uteri regio extima, & pecten ejusque cervix, frigida tactu deprehenduntur.

6. Mammæ, quæ antea blandè turgebant, & surgebant, flaccescere ac emolliiri incipiunt, & lac emulgetur, instar feri candidi.

7. Temporis progressu anhelitus gravidæ fit fœtidus.

8. Aqua & sanies tandem fœtida ex utero effluit.

9. Superveniunt hinc subinde febres admodum graves, periculosis lipothymis, cordis palpitatione & deliriis conjunctæ: Et

10. Subitò horror febrilis sine manifesta causa accidit tali matri: & curiosum est, quod extincto fœtu mox sequatur horripilatio ingens, vid. Salmuth. *Cent. 2. Observ. 69.* Sunt, qui hoc signum tanquam intallibile putant; non tamen est universale: semper quidem, quando fœtus moritur, matres corripuntur horrore, sed non vice versa, cum nihilominus ab experto quodam Practico mihi relatum fuit, se observasse frigus cum tali horripilatione, fœtum tamen adhuc superstitem fuisse vivum, sæpe enim parturientes horrore percipiuntur, utut vivus sit fœtus.

11. Subinde graviora animi deliquia superveniunt.

12. Stomachi & capitis dolores interdum, si fœtus mortuus aliquamdiu retineatur, superveniunt.

13. Interdum & convulsiones horrendæ, accedunt.

14. Si ante fœtum secundinæ excludantur, vel vasa umbilicalia flaccida, item si obstetrix funiculum umbilicalem contingens, non percipiat arteriarum pulsum, fœtus in utero extincti & mortui signum admodum certum, & Riverio signum certissimum est. Cessante enim debito sanguinis circulo inter fœtum & pla-



placentam, item inter placentam & uterum, necesse est mori fœtum. Exemplum contrarium, nempe in partu difficili secundinam ante fœtum prodiisse, matre & fœtu salvis, observavit Loffius *in observ.* pag. 380.

15. Si prægnaus, quæ suspicatur de fœtu mortuo, manum in calentem aquam imponat, in eaque aliquamdiu teneat, nec fœtum moveri sentiat, signum etiam est, cum mortuum esse.

16. Dolores parturientium, si subito penitus ex toto intermittant noxam fœtui illatam testantur; id quod adhuc validius est signum, si succedat adhuc horror & pandiculatio.

17. Manus aquâ frigidâ madida cujusdam adstantis ventri matris imposita manifestat ex subsequente motu fœtum vivum; si enim hinc non moveatur; fœtum mortuum esse, signum est; vid. Bartholinus *Cent. 5. Hist.* 78.

18. Majorana viridis digitis trita umbilico imponenda est; fœtus enim se movebit, si adhuc in vivis sit.

19. Panis vino Malvatico intinctus applicetur ventri, in pede verò fiat parva venæsectio, & fœtus, si est vivus, movebitur: Vid. Barbette *in Chirurg.*

20. Caput infantis in partus loco situatum, si fontanella ejus in interstitiis ossium cranii est flaccida, nec fortiter tensa, tunc ex tali flacciditate ejus arguitur, fœtum esse mortuum.

21. Ultimò denique unum ex primariis & certissimis fœtus mortui in partu signum est, si in partu meconium ante fœtum prodierint. Nihilominus tamen Rulandus hujus rei habet contrariam experientiam *in Thef.* pag. 300.

Plura signa videbitis in Mauriceau *lib. 2. de Morb. Gravida. cr.* 12. Ex hæcenus dictis signis primatum obtinet deficiens motus fœtus, horripilatio matris, secundinarum aut meconii prægressus, & denique membrana fœtus flaccida.

### P R O G N O S I S.

Quoad mortui fœtus prognosin: Hic reterentus, præter hoc, quod difficilem reddat partum, ad putredinem ruit, & gravissimum periculum vitæ matri variis modis afferre solet: his enim, præter anhelitum difficilem, superveniunt appetitus dejectus, cachexia, febres erraticæ, lipothymia, pathemata convulsiva, ac varia symptomata, tandem & ipsa mors.

Rarissimum est, fœtum mortuū ad tempus citra corruptionem putredinalem, aut citra sensibile matris incommodum, fuisse in utero retentum, nisi exsiccatus fuerit: de quo Vid. Bartholinus *Cent. 1. Hist.* 12. & M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. observ.* 13. p. 23.

Interdum autem, utut fœtus mortuus sui putredine matri mortem intendat, putrefactus tamen frustulatim per uterum ejusque

vaginam excernitur: Conf. M. A. N. C. *Ann. 2. observat.* 256. pag. 382. Interdum partes molles in liquamen corruptæ profluunt, du-rrioribus ossibus relictis, ita ut mater sceleton in utero gestet: Interdum ex putredine fœtus uterus corruptus, & ipse putrescit, unde vicinæ partes simili putredine correptæ putrilaginem fœtus aut per umbilicum, aut per alvum, aut per inguina, aut per alia similia loca erosa corrupta, ejiciuntur. Miræ hujusmodi historiarum fœtuum mortuorum, in utero matris putrefactorum, per varia loca illasâ matre frustulatim ejectorum, videbitis in Sennerto *l. 4. Prax.* & in Schenckii *Observationibus*, in specie Bartholino, *Tract. de Infolis. Partus Hum. Vis.*

### C U R A.

Si ergo mortuus sit fœtus, opera danda est, ut quantocyus, quocunque tempore mortuus fuerit, excludatur. Omnia igitur validiora, partum difficilem promoventia, fœtumque pellentia, hic locum habent, modò præmissa sint prius, quæ primas vias emolli-re, laxare, & lubricas reddere valent, idque imprimis, si fœtus mortuus ante legitimum partus tempus sit excludendus.

Et quidem, si in ipso partu extinctus fuerit fœtus, quantocyus promovendus venit, tam internè fœtum pellentibus, quàm externis, manuum opera, vel speculi, vel instrumentis armata admotis.

Quoad interna: præ cæteris remedia ex secundina, myrrha & borrace, hic conveniunt: v. g.

℞. *Trochisc. de Myrrh.* ʒʒ.

*Borrac.* gr. xv.

M. F. pulvis.

In aqua artemisizæ vel alia appropriata propinandus.

Vel ʒj. pulveris secundinæ; cum unicornu vero in vino Malvatico vel aqua cinnamomi exhibeatur; aut loco hujus Lindanus sequentem substituit pulverem:

℞. *Troch. de Myrrh.*

*Borrac. Ven.* aa. ʒʒ.

*Cinnam.* ʒj.

c. *decocto rad. lil. alb. f. Potio.*

Aut in forma pulveris pro una dosi in haustu vini vel aquæ cinnamomi assumatur.

Quin & succinata, in specie oleum succini ad guttas xx. usque ad xxx. in haustu vini internè propinatum, & externè simul umbilico ac musculis abdominis illitum, mirè conducunt. Reliqua interna ex superioribus jam sunt cognita. Vomitoria itidem ex aquis benedictis infusionis antimonii, aut etiam gr. jv. Mercurii vitæ internè propinati, vomitu forti fœtum pellunt.

Externè balnea & fomenta, imo emollientia, laxantia & lubricantia, similiaque ejectio-

(O o o o o) nem

nem præliminariter faciliorem reddentia, ex malva, althæa, Mercuriali, floribus gemistæ, chamomillæ, artemisia, pulegio, oleo uliorum alborum, amygdalarum dulcium, chamomillæ, adipe anseris, &c. sed post horum usum fortiter pellentia usurpentur. Inter balnea convenit, quod præscribit Joël in sua Praxi.

Post balneum & fomenta usurpantur unguenta pellentia, inter quæ conveniunt etiam unguentum de artanita cum oleo succini subactum, & largiter regionibus umbilicibus & hypogastricis inunctum, præmisso fortu expellentibus seu irritantibus, aut cataplasmata expellentia, in specie ex decocto colocynthidos: post quæ inunctio cum oleo succini instituitur, aut unguento jam dicto.

His etiam sociandi sunt pessi stimulantés, qualem, ceu validissimum, sequentem commendant:

℞. *G. Ammon.*  
*Opoponac.*  
*Asphalti aa. ʒj.*  
*Ellebori nigri.*  
*Sem. staphisagr.*  
*Rad. Aristol. long.*  
*Pulp. Colocynth. aa. ʒiʒ.*  
*Scammon. ʒj.*

Ex quibus cum s. q. fellis tauri conformetur massa, quæ lanæ involuta, & syndone obducta, instar pessi applicetur.

Quin & suffitus instituantur orificio pudendorum per infundibulum excipiendi.

℞. *Uvar. putridar. ʒiv.*

Projice in ∇m ferventem per horæ dimidium; hinc supra arduentes prunas impone, & suffumigium excipiat fœmina septies in die per vulvam quadrantis spatio.

Vid. Sculteti *Observ. Chirurg. Observ. 77.* uti etiam in Zacuto Lusitano *Praxi Historiar.*

Aliàs etiam suffitus ex ungula alini vel alinæ cum galbano ac myrrha institutus, ad promovendum fœtum insigniter commendatur.

Denique ubi res est admodum periculosa, imitandum est experimentum Bartholini, quod recenset in *Cent. 6. Histor. Anatom. Hist. 83.* Nempe imponitur orbis ligneus seu stanneus abdomini tumido matris, in casu scilicet, quando fœtus est in situ, ad partum naturali, sed tamen mortuus: & validâ manû Medico percutitur; hac enim forti percussione quasi cum impetu ejicitur fœtus.

In contumaci uteri clausura, mediante instrumento Glauberi volatilia utero veniunt applicanda, conf. Bartholinus *Cent. 3. Epist. pag. 67.*

Quod si hæc pro fœtu ejiciendo non sufficiant, ad chirurgiam progrediendum, vel instrumentis, in specie uncis aut hamulis aut sub mento aut circa claviculas infixis extrahatur fœtus totus, sive, quando vitiosè nimis est situatus, novaculis & scalpellis artificiosè adhibitis, in frustra discissus extrahatur, vid. Sennertus in *lib. 4. Præcos ubi de Fœtu mortuo*, Scultetus, Parcus, & Barbette.

## SECTIO VIII.

De

### REGIMINE PUERPERARUM.

**V**Bi ergo jam peperit mulier, studiosè sibi caveat ab omni aëris externi frigidi insultu, ne uterû lædat, quia metus est, ne ex talis aëris susceptione inflatio uteri superveniat, aut ne coagulatus sanguis inde stagnet in utero, & inde periculosam inflammationem, lochiorumque defectum inferat, imò dolores gravissimi partum insequantur. Unde obstetrix mox post egressum infantis cum funiculo umbilicali secundinam extrahat, quo facto puerpera circa costas (*unter Rippen im Weichen*) cingulo vellinteo probè cincta (in specie cum cingulo ex corio humano,) mox in lectum transferatur, & pedibus probè extensis vel blandè incurvatis, quietis, labiisque vulvæ spongiis aut linteis probè munitis, pro excipiendo sanguine effluente: Posthinc quieta jaceat, & ab omni corporis jectatione, aut etiam extremorum frigido aëri expositione, studiosè caveat; aliàs enim suppri-

muntur lochia. Jam verò, dum lectum petunt, ut plurimum insigniter ex labore partus incallescunt, subinde etiam non parum debilitantur, & speciatim ordinariò siti gravi ex æstu, sudore, & lochiorum fluxu premuntur, hinc vulgò receptum est, propinari post partum juscula gallinacea, eaque calida recentia pro refocillandis viribus, ratione gelatinæ blandæ, quam continent, & fallenda siti: loco quorum etiam haustulus cerevisiæ calidæ imprimis, cui cuminum pulverisatum incoctum sit, commodè propinari potest; sic enim non nihil recreantur, quin etiam promoventur lochia, & sistuntur post partum, dolores supervenientes. Interim ditioribus propinari queunt juscula gallinarum calida, sed cautè: nempe ea sint non nimis pingua, neque nimis diu gallinæ coquantur, ne juscula ista carniū nimis substantiâ carnis imprægnata, sed diluta, & quibus

quibus pinguedo detracta, nec adeò nimis sint nutritiva, sed talia, qualia pro viribus sufficiunt: nam quando nimis diu fuere cocta, non sunt puerperis convenientia, cum talia juscula nutritia postulent prius stomachum, qui eadem digerat & concoquat. Jam verò periculum est, ne loco digestionis laudabilis talia juscula aut alimenta nimis nutritiva cadaveriscentur & corrumpantur in stomacho mulieris, noviter à partu liberatæ, non secus atque alias fieri solet in febrientibus, cum semper puerperæ recentes plus solito caleant, & quasi febrile quid patiantur. Nam earum pulsus est frequens, celer, mollis, magnus, aut saltem in magnitudine & vehementia moderatus & quasi febrilis, prout plus vel minus debilitata fuerit puerpera. Est scilicet tunc aucta insigniter sanguinis turgescencia & fermentatio, & rapidior fit ejus circulus, similis isti, qualis sub quavis menstruatione contingit, mediante quâ & lochiorum promovetur fluxus, & simul quicquid heterogenei est in ejus massa, simul expellitur & separatur. Unde non tantum suffocationes hystericæ ratione inordinati motus spirituum animalium, & copiosius effusorum succorum, biliosi & pancreatici ad intestina, sed etiam febres ardentes, aut malignæ & petechiales, item purpuratæ, subinde talibus superveniunt. Nullo autem modo impedienda est talis in partu sanguinis ebullitio, cum multum salutis hinc foeminis emergat: quæ etiam observanda sunt circa alimenta, ne scilicet mulier post partum laute nimis nutriatur: putrescunt enim, cadaveriscentur, & exinde mulieres ad febres continuas malignas, petechiales purpuratas, & similes disponuntur. Quibus verò minus arriident alia juscula nutritiva, ut in specie debilitatis, iis haustulus parvus vini generosi non nimis frigidi est concedendus, ac stultè mulieres nostrates horrent vinum, dicentes: *er seye ißnen zu hisig*: aut mica panis similaginei mollior vino intincta propinanda; hinc enim mirè denuò refocillantur tales mulieres debiliores: nec ex ficta ista vini caliditate, aut aciditate, febris vel caloris intensio superstitione inde metuenda est; nam potius restau- rat, & lochiorum simul promovet fluxum, quibus fluentibus vix febris intensio supervenire potest, modò hoc observetur, ne frigidum præbeatur: quod etiam de omnipotu cerevisiæ & aëre ambiente intelligendum, si enim hoc fiat, ut frigida assumantur, subito supprimuntur lochia, & dolores abdominis graves excitantur. Quædam etiam non inconsultò præbent buccellam panis butyro illitam, ad- spargendo eidem pulverem zedoariæ, vel etiam hunc solitariè cum cerevisia exhaustiendū suadent: his enim mox à partu appropriatis dolores sistuntur, & promoventur lochia. Re- focillatæ ita post aliquot horas possunt assu-

Tom. II.

mere ovum forbile cum pauco cinnamomi, ac tantillo nucis moschatæ, vel vitellum ovi cum jusculo gallinæ & tantillo cinnamomi. Pro medicamento verò analeptico excellit tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi.

Porro mox à partu puerpera somno non indulgeat, sed aliquot horas ad minimum vigilet: interdum enim quibusdam post partum hystericæ suffocationes aut lipothymiz sub forma soporis gravioris, aut nimis in somnum propensionis, imminet. Insuper odorifera omnia & nimis spirituosæ à puerpera studiosè fugienda sunt, & in specie, dum fluunt lochia, cum non tantum promptissimè hystericam passionem, sed etiam affectus capitis, in specie graves cephalalgias, & contumaces agrypnias, facile excitare possint, nisi in imminente hystericæ passione interdum odor castorei, aut similis olfactus appropriatus, præter voluntatem sit concedendus.

Præ cæteris ex omnibus animi pathematis etiam ira ac terror maximè nocent puerperis, cum mille gravissima post se trahant symptomata. Nam ex ira periculosa febris, incoercibiles ferè uteri hæmorrhagiæ & lipothymiz; ex terrore vero lochiorum suppressio, & multa alia mala supervenire solent: Vid. Tulpius *obs. cap. 20. lib. 2.* & Salmuth. *Cent. 3. hist. 49.*

Remedia inter, puerperis primis à partu diebus propinanda, imprimis laudo misturam aliàs polychrestam, quæ pluribus scopis, tam præservatione quàm curatione, recentissimis puerperis confert:

℞. ▽ *Cerasor.*

*Matricar.* aa. ʒiʒ.

*Acet. vini* ʒʒ.

*Lap. Cancr. præp.* ʒj.

*ʒii diaphor.* ʒj.

*Syr. Artemis.* ʒʒ, ad ʒvj. M.

Mixtura hæc est quasi vulneraria, genitalium in partu plus minus læsiones, inde metuenda symptomata, maturè restituit, lochiorum grumescenciam dissolvit, & hinc eorum fluxus promovet, corpus in diaphoresi & blando mado- re conservat, æstus plus minus febrilem, moderatè coërcet, cephalalgiam earum tollit, sitim earum minuit, &c. Ubi animus est promoveri lochia, myrrhæ ʒʒ. ad gr. xv. ad ʒj. addi possunt. Si dolores abdominis aut uteri adsint, lochiorum fluxum plus minus impedi- entes, commodè Laudani opii gr. ʒʒ, addi potest.

Interdum ordinariò post partum alvus contumaciter est clausa, quam validioribus remediis movere, aut acrioribus clysmatis stimulare, religio est, nisi forsan lochia parcius fluant, potius illa tertio aut quarto die à partu, nisi sponte soluta, aperiatur, antequam nempe superveniat febris lactea, unde aut blandis clysmatis vel suppositoriis, aut, quod optimum,

(Ooo ooo 2)

glo-



globulis zibethinis proritetur, aut observatis circumstantiis, assumptione pilularum pestilentialium Ruffi ad gr. xii. xv. & ℥j. alvus se-  
gnior denuo aperiatur, vel mediante elixyr proprietatis cum rhabarbaro, ad guttas 30. 40. 50. propinatum, referetur, cujus ingredientia simul lochia pellunt; vel, quod satis com-  
modum est:

℞. *Crem.* ♀. ℥ss. ad gr. xv.

‡ *Ialappa* gr. iij.

M. F. pulvis.

capiatur in vehiculo jusculi calidi.

Quod si autem simul non ritè fluant lochia, imprimis locum habent clysmata fortiter sti-  
mulantia, ut ita cum alvo etiam lochiorum fluxus provocetur; habitâ tamen semper ra-  
tione, an adsit febris maligna ex genere pete-  
chialium, an purpuratarum? nam in his alvum vel suppositoria stimulare, non caret periculo, imprimis si fuerit febris purpurata alba, in qua vel minimus error est lethalis.

De venæ sectione notandum, quod hæc in principio puerperii, lochiis ritè fluentibus, ma-  
gis noceat quàm profit, licet indicatio ejus ad-  
fuerit; cùm sanguinis evacuationem natura tunc temporis rectè agens dirigat; sin verò lochia suppressa vel imminuta fuerint, venæ sectio maximè necessaria erit, tanta nempe, quæ lochiorum fluxui tum temporis naturali proportionata sit. Quod si verò progressu de-  
mum temporis ejusmodi affectus venæ sectionem postulant, eveniant, intra terminos ni-  
hilominus adhuc lochiorum, ac mulier non perfectè purgata sit, venæ sectio omninò lo-  
cum habet: imò licet puerpera commodè evacuata fuerit, propter morbum tamen in-  
gravescentem, ejusque symptomata, parca ve-  
næ sectio administranda: sin autem post lochi-  
orum fluxum, & in puerperii declinatione, morbus venæ sectionem urgens evenerit, ab hac indicata neutiquam erit metuendum: vid. Riverius *Prax. lib. 15. cap. 24.* & Tulpius *lib. 2. observ. 2.*

## CAPUT I.

De

### *Secundinæ Retentione.*

**S**ecundinæ relictæ in naturali partu ut plu-  
rimum tertiâ die sponte sua sequuntur &  
citra vim facillimè ex utero per funiculum  
umbilicalem extrahuntur. Fit tamen subinde,  
ut secundinæ post partum restitent, quando  
eædem aut cum difficultate separantur, aut  
quando omninò non prodeunt, sed rupto um-  
bilicali fune intra uterum subsistunt, adeoque  
quando nunc integræ, nunc frustulum earum  
in utero remaneat; tota enim secundina ejici  
debet, quia vel tantillum relictum frustulum  
non vulgares dare solet turbas.

### C A U S Æ.

Causæ, quare secundina nunc tota, nunc  
verò quædam frustula, in utero matris retine-  
antur, nec debitè excernantur, sunt:

(1.) Quando eadem suis vasis pertinaciter  
uteri poris inosculata & agglutinata quasi fue-  
rit, & sic firmitus adhærescit: siquidem Pla-  
terus *obs. pag. 231.* Secundinas utero connatas  
refert, qui coalitus sit imprimis, quando præ-  
maturè excluditur fœtus, ut in abortibus fieri  
solet: Firmiori coalescentiæ occasionem sug-  
gerunt, præter partum ante debitum exactè  
tempus supervenientem, interdum causæ ex-  
ternæ ex contusione vel simili modo lædentes  
placentas aut uterum, & ita sub alterutris sa-  
natione firmiorem coalitum inducentes. Huc  
facit, quando mulieres, præprimis ultimis ge-  
stationis mensibus, vitam nimis sedentariam  
agunt; nam & in his firmitus adhærent.

(2.) Quando funiculus umbilicalis tene-  
rior in labore partus rumpitur, & à secun-  
dina avellitur, vel propter vim infantis, vel  
propter ipsius funiculi corruptelam, vel pro-  
pter intempestivam funiculi umbilicalis in  
fœtu rescissionem vel similem læsionem; aut  
ineptè ab obstetrice tractatur, tunc enim fit,  
ut instar chordæ contortæ funiculus umbili-  
calis separatus in se invicem retrocedat, ac  
subito uterum introëat: unde defectu hujus  
funiculi non potest trahendo separari secun-  
dina. Non enim semper necesse est, ut ob-  
stetrix immissa in naturalia manu secundinam  
arripiat, præprimis si manu non prius prehen-  
derit funiculum; sed potius blanda contor-  
sione saltem funiculi umbilicalis secundina-  
rum avulsionem procurare debet.

Caveat ergo obstetrix separare funiculum  
umbilicalem à fœtu, antequam post eum et-  
iam prodierit secundina: aut si forsan diutius  
retineatur in utero, ita ut fœtus periculum  
immineat, tunc resecandus quidem venit fu-  
niculus umbilicalis, sed separatus forti filo  
alligandus est femori, ne denuò intra uterum  
reperire, & secundinæ exclusionem impedire  
possit; permittendo tamen, ut sanguis è fu-  
niculo probè exstillet, ut ita placenta in ma-  
gnitudine imminuta faciliùs extrahi possit.

De obstetricum aliàs malitia circa negle-  
ctionem secundinæ extrahendæ videri potest  
Kerkringius *observ. Anatom. 36.*

(3.) Quando cervix uteri seu orificium u-  
teri internum tumet, adeoque angustum,  
aut citò nimis clausum est.

(4.) Denique si puerpera non benè mu-  
niatur in partu, sed aer frigidiusculus in ute-  
rum irrepit, facile hinc uteri contractura,  
sanguinis coagulatio, secundinarum reten-  
tio, &c. accidere possunt.

Aliæ causæ minus frequentes, ut re-  
frigeratio extremorum subitanea, &c. trans-  
eant.

DIA.

DIAGNOSIS.

C U R A.

Secundinam retineri, vel integram, vel ex parte, ipsis oculis patet.

Sæpius, licet rarius, supprimuntur simul nonnihil lochia, semper venter turget, magnus fit; sicuti econtrà, si frustulatim prodeat secundina, retentum frustulum continuò irritando uterum subinde crudelem uteri hæmorrhagiam excitat: superveniunt difficultas anhelitus, halitus foetens intolerabilis, li-po-thymia, & tandem convulsiones.

Quæ per genitalia excernuntur post aliquot dies, sunt saniosa, foetida, ac horrendè olentia, unde etiam lochia foetorem cadaverosum referentia secundinarum partem in utero relictam indicant, quæ successivè sub putrilaginis formâ, seu liquaminis putridi specie, ex utero effluit, de quo vid. Riverius *Centur. 1. Observat. 61.* Conf. Horstius in *Observat. pag. 293.* Kerkringius *Spicil. Anat. Observat. 36.* & Primerosius de *Morb. Mul. lib. 4. cap. 9.* sic Velschius *Hecat. 2. pag. 4.* M. A. N. C. *Ann. 6. & 7. Observat. 322. pag. 2.*

Rarum est, quod retenta secundina in utero exsiccata fuerit secundum Riverium *Cent. 2. Observat. 3.* Rarius adhuc, quod observavit Kerkringius in *Spicil. Anat. Observat. 36.* de secundinae portione quarto demum mense à partu incorrupta & innoxia edita: sicut & in M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 117. pag. 107.* de secundina, ultra mensem incorrupta in utero reperta: aut quando post quatuordecim septimanas integra excernitur, Conf. Bartholinus in *Act. Med. Hafn. Vol. 2. Observ. 22.* Kerkringius *Observat. Anat. 30.* Scilicet evenit subinde ut pertinaciter secundina vel tota, vel saltem pars ejus non tam adhæreat, quàm firmiter utero connectatur, ipsique quasi adnascatur, unde fit, ut secundina non vivat foetus vitâ, sed matris, & ceu pars uteri se habeat, atque hoc in casu, citra sui corruptionem in utero hæret, utpote sanguine & spiritu vitali matris ad uterum delato adhuc perfusa; secus fit, si eadem vitâ foetus vivat, uti ordinariò contingit, unde detracto foetu, & sic impeditâ sanguinis & spirituum animalium in secundinam distributione, in cadaver degenerat & putrescit.

PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Gravissima pericula, & omnia eadem mala, quæ foetum sequuntur mortuum, comitari etiam solent secundinam retentam, tandem quoque mors: Nam aut retenta putrescit, indeque febrem malignam periculosam, uteri corruptelam, aut saltem deterrima & gangrænosa ulcera, ac tandem mortem infert: aut putrefacta tandem, sub forma saniei putridæ foras excluditur, quod tamen rarò fit citra notabile damnum.

Quoad curam: Pro ea optimum est, secundinam maturè, quantum fieri potest, totam, non discissam, extrahere. Quodsi gemelli adfuerint, hi ipsi interdum unam, interdum duplicem habent secundinam: ubi secundina fuerit duplex, post foetum propria secundina prodit: si verò gemelli unicam habent secundinam, aut saltem unam placentam cum duplicibus membranis, tunc, cum primus infans in lucem prodiit, prudentiores obstetrices ejusdem fœniculum umbilicalem rescindunt, & ipsius residuum, cujus superior pars secundinis intra uterum adhæret, parturientis femori alligant, quoad alterius infantis intus manentis umbilicus ab utero, unâ cum placenta, divellatur, & ita cum secundo foetu amborum secundina integra excernatur; sicut hoc facillimè succedens negotium rectè urget Rodericus à Castro *Part. 1. libr. 3. de Morb. Mul.* Quodsi post foetum egressum vel moras agat secundina intra uterum, vel particula ejus remaneat, jubeatur, ut dum ægra vel puerpera adhuc sellæ insidet, tussiat subinde, & tussiendo aut quasi sternutando, concusso utero & abdomine, ea separetur; quæ tussis si non sufficiat, infletur naribus sternutatorium, ut sic concussione totius corporis promoveatur separatio secundinae: vid. Bartholinus *Centur. 5. Histor. 39.* unde non nisi in graviore casu, & ubi circumstantiæ aliæ id urgent, vomitoria conveniunt. Quibus irritis, ne frigus puerperam corripiat, imponatur ea lecto firmiter ligata, obstetrice interea continuò abdomen ægræ comprimente deorsum versus, ut ita secundina discedat, & facilius excernatur. Et his medelis mulieres ordinariò utuntur, quibus nonnunquam opera Medici est addenda; adeoque in retentione secundinae usurpanda sunt remedia secundinas expellentia, & eadem ferè omnia, quæ in partu difficili, aut mola & foetu mortuo promovendo, usurpantur. Præ cæteris expertus pulvis & decoctum prostat in Tulpio *lib. 4. Observat. 41.* quæ ceu experta sæpius multumque proficua in secundina retenta commendat:

Alia, quæ vulgo exhibentur ad pellendam hujusmodi secundinam retentam, satis nota sunt in specie cherefolium, & jusculum ex decocto cherefolii, vid. M. A. N. C. *Ann. 3. loc. alleg.* item decoctum Artemisæ rubræ cum antheris liliorum alborum, quibus & sabina adjici potest, laudatur à Corbejo: sicut fimus equinus, vino infusus & expressus propinetur. Omnibus palmam præferunt pulvis & spiritus ex secundina, primario quidem ex humana, secundario etiam ex secundina ovis vel capræ, nam & hanc commendat Corbejus. Pulveris item Sabinæ ꝓ cum Croci ꝓ in aliquot uncis aquæ liliorum alborum secundinas pellit.

(O o o o o 3)

De

De oleo Heraclino ex Rulando res nota est; loco ejus olei ligni juniperini guttæ 30. aut olei succini destillati guttæ 18. propinatæ, non vulgares possident vires. His adnumeretur myrrha, & trochisci de myrrha, in aqua cinnamomi, vel vino generoso propinati; item borra, castoreum, succinum, sal volatile succini, & similia, nec non oleum destillatum succini.

Ex his sub forma pulveris vel decocti usurpantur remedia ad pellendam secundinam: Conf. Tulpus *libr. 4. Observat. cap. 48.* Conveniunt etiam mixtura Timæi von Gilden: *Plee in Casib. l. 4. Cas. 25. pagin. 223. & Casu 28. pag. 227.*

Quodsi incipiat putrescere secundina retenta, vel tota vel frustulatim, & in saniem colliquescere, commodè elixyr proprietatis propinari potest, ut scilicet præter hoc, quod pellat secundinam, simul putredinis noxa cohibeatur, nec aliæ vicinæ partes sanz simili contagio inquinentur, unde illud tam simplex, vulgari modo acidulatum, aut quod melius cum alcali fixo paratum, egregio progressum putredinis præcavet, idque imprimis, cum spiritu theriacali camphorato extractum.

Insuper cum his internis conveniunt quædam externa abdomini imposita, uti vulgo in usu habent, ut recipiant semen lini contusum, illudque coctum in oleo lini in formam cataplasmatidis calide abdomini insternunt.

Alias quoque conveniunt suffitus per vulvam excipiendi: quos inter suffitum expertum ad extrahendam secundinam, fœtum, molam ipsumque sanguinem in matrice coagulatum, commendat Stœckerus in *sua Praxi.*

Quodsi secundina non exierit, non amplius quid tentandum, sed injiciendum est unguentum Basilicon putrefactionem promovens.

Convenit etiam suffitus ex scoriis reguli antimonii.

Alii usurpant exuvias serpentum ad coxam alligatas, mox tamen removendæ sunt, ubi prodierint. Juxta hæc clysteres uterini ex decoctis simplicium stimulantium, & acriorum aromaticorum, imprimis artemisiæ, salviz, calaminthæ, sabinz, pulegii, colocynthidos, conveniunt, partim ut stimuletur uterus ad secundinas pellendas, partim ut sanies ex putrefactis secundinis exhauriatur; modo maturè fiat, antequam orificium uteri internum denuo se stringat; sicut etiam eadem ingredientia commodè sub forma fœtus vel cataplasmatidis calidè insterni possunt. Item applicentur pessi ex sabina, salvia, colocynthide, helleboro

cum oleo cheirino, felle bubulo, aut melle, &c. Imo etiam inunctiones cum oleo cheirino, & oleo colocynthidos, quibus aliquot guttæ olei destillati sabinz vel succini additæ sint, crebrius repetitæ conveniunt. Vel usurpetur mixtura  $\Theta$  \*ci &  $\Theta$  ♀ in instrumento Glauberi vel vitro longioris colli, vaginæ uteri intruso, ut ~ subtilis sensim in uterum se insinuet, & secundinæ aut frustulorum relictorum excretionem stimulet, simul etiam sternutatoria consilio Hippocratis *libr. 5. Aphorism. 49.* Vehementius quoque puerpera sub specie tussis expiret.

Sed optimum est, vel mox, vel saltem primis diebus à partu, manuum operâ admotâ arripere, blandè intorquere, & ita ex utero extrahere secundinam; vid. in Borello *Centur. 5. Histor. 39.* Mauriceau *lib. 2. cap. 9.* Siquidem non adeo citò apertus uterus se contrahere solet, quin per octiduum à partu amplius & spissus esse solet, antequam se contrahat, ut loquitur Platerus in *Observat. pag. 231.* His tamen non sufficientibus, si suspicio sit secundinam penitus retentam tandem putrescere, injiciantur in uterum decocta emollientia, secundinæ putrefactionem blando promoventia;

℞. *HB. Malv.*

*Aleb.*

*Parietar.*

*Matricar.*

*Chamom. aa. Mß.*

coqu. in  $\nabla$  *simpl. lbß.*

Colat. *lbß.* adde

*Myrrha*

*Aloës*

*rad. Aristol. rot. aa ʒß.*

*ol rosat. ʒß.*

*Acet. vini ʒj.*

M. pro injectione: S.

### Befördernde Einsprügung.

Quibus subinde addantur vel subjiciantur etiam injectiones cum unguento basilico, vel paucò unguento Ægyptiaco, ut ita putrefacta separetur, & uterus à putredine præservetur. Forsan aqua calcis vivæ hisce liquoribus addita, aut etiam cum aqua calcis vivæ parata decocta, proficuo cum usu applicari poterit. Par omnino ratio est de mola retenta. At si tales casus superveniunt, rarò solent supervivere puerperæ.

Sin fiat, ut uterus denuo conniveat, ac se claudat, præter interna stimulantia externæ injectiones emollientes & lubricitantes denuo sunt injiciendæ in vaginam uteri, & inungendus uterus laxantibus & emollientibus.



## CAPUT II.

De

### Lochiorum Vitiis.

**L**ochiorum excretio, vitatur triplici modo:

1. Quando deficit omnino, aut saltem imminuta est.
2. Quando est nimis copiosa ac abundans.
3. Quando per aliena loca ejiciuntur.

## ARTICULUS I.

De

### Lochiis Retentis.

#### CAUSÆ.

**H**ujus causæ non solum in sanguine aut humoribus circa uterum coacervatis, sed simul etiam tum in vasis ipsius uteri, per quæ fieri debet excretio, tum imprimis in spiritu movente, quærendæ sunt. Quoad vasa uteri; eadem constricta & obstructa suppressionis lochiorum sunt causa, quando adstringuntur in subita uteri refrigeratione, si in partu, aut brevi post eundem, frigus aeris externum subito irrumpat in uterum, vid. Timæus von Guldensee in Cas. pag. 626, vel etiam linteamina frigida, tam sicca quam humida, admoveantur, quæ subito sanguinem plus minus coagulant. Par ratio est, si frigidum potum hauriat, aut etiam mammæ & extrema, manus pedesque refrigerentur; item in dolore uteri undecunque nato, cujus occasione etiam stringuntur fibræ, & angustantur vasa. In movente spiritu est causa suppressionis lochiorum, quando per graviora animi pathemata, iram, terrorem, pavorem, tristitiam, metum & similia, subinde diversimodè determinatur ejusdem motus, sicq; simul sanguinis motus & spirituum animalium impetus, hinc consequenter etiam lochiorum fluxus modificatur, & naturalis cohibetur; ex stagnatione verò & coacervatione sanguinis retenti per alia loca evacuatio instituitur; ipseque observavi in muliere foetum mortuum pariente, quod ob dolorem & inde natam tristitiam nil lochiorum evacuaverit, nisi arte postmodum succurreretur: ipsæmet etiam mulierculæ nimis verecundæ exhibent occasionem, quod sistantur lochia: item si in succulentioribus primo post partum impetu uberiorius proruant excrementa uterina; à quibusdam insulse per internè propinata, aut externè applicata adstringentia, perniciosè sistuntur lochia.

#### DIAGNOSIS.

Quoad signa: Deficere aut imminui lochia præter ipsum vitium aut relationem ægræ,

confirmant, dum abdomen ordinariò tumidum inanet, tenditur & induratur, nec debite subsidere potest, dolor gravativus, distendens & lancinans, item pulsationis & ardoris, ventrem imum, lumbos & inguina occupat, uterus interdum inflammatur: hinc rigor & febres periculosæ, præcordiorum angustia & anxietates, respirationes difficiles, plus minus anhelosæ, dicunt: *Es will ihn das Herz abdrücken*; animi deliquia sudores frigidi, pulsatio temporum, cephalalgia crudelis, & similia symptomata, à sanguinis motu per inferiora impedito enata, deliria, & interdum ipsa mors, superveniunt.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Ex dictis sponte manifestum est, quot pericula mulieri ex lochiorum suppressione imminere possint; idque eò periculosius, quò magis sanguis supprimitur, ut neque arte possint per uterum evacuari, neque per alia loca, mammæ, alvum, nares, & similia exitum quærant. Vid. Bartholinus loc. all. & M. A. N. C. Ann. 2. Observat. 184. pag. 282.

Quod si uterus inflammatur, perquam periculosum est, si alia superveniant pathemata, melancholia, sanguinis sputum, pleuritis, hydrops, &c. Hæc omnia difficillima curata sunt. Si tamen copiosius sudor in puerpera erumpat, aut successivè livida, nigra, foetida, &c. copiosè tamen ex utero fluere incipiant, hæc ipsa lochiorum vices supplere possunt.

#### CURA.

Cura pro causarum varietate & suppressionis ratione plus minus varianda. Primarius scopus esto, ut, quantum potest, restituantur lochiorum fluxus: Obtinebitur hoc partim per remedia chirurgica, partim per pharmaciā.

Inter remedia chirurgica eminet venæ sectio, aut hirudinum applicatio, imprimis ubi metuitur sine hac vel non suffectura, vel non citò satis operatura interna remedia: in specie, ubi aut sanguinis abundantia absoluta, aut hujus turgescencia fermentativa, febris nimia, &c. magis subitaneum postulant auxilium, ad apertionem venæ est accedendum. Malè enim communiter à saphænæ sectione initium promovendorum lochiorum faciunt, quin potius internis stimulantibus præmissis, & non sufficientibus, aut his adjunctis, vena aperienda est: sin lochia non sufficienter fluant, & sanguinis minor adsit abundantia, sufficit saphænæ sectio, & ibidem pro circumstantiarum varietate plus vel minus evacuetur de sanguine pro revulsione particulari, & ut sanguini eò major impetus concilietur ad uterum, & hanc solam ferè

fere autores adhibent, vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Observat. 53.* istam, quæ in brachio fit, omnino rejicientes, contra quos tamen rectè disputat Mauriceau *de Morb. Infant. libr. 3. cap. 11.* In Gallia & Italia loco hujus, vel etiam præmissâ eadem, pro derivatione applicant hirudines interiori vulvæ parti: vid. Theodatus in *Valetud. pag. 191.* Sic Zacutus Lusitanus *libr. 1. Med. Princ. Histor. 4. in annexa observatione* refert, & puerperio recente febrim continuam cum pleuritide, hirudinibus internæ uteri parti applicatis curatam; item Theodatus *Valetud. pagin. 171.* Ast verò hoc remedium nostrates mulierculæ horrent. Loco venæ sectionis cucurbitulæ, vel cum vel sine scarificatione, suris vel interiori femoris parti commodè applicari possunt. Quod si in juvenula aut succulento corpore, cui suppressa sunt lochia, major sanguinis abundantis sit turgescencia, & hinc superveniat inflammatio uteri cum febre acuta, difficili respiratione &c. in tali casu, ne nimio impetu deorsum provocetur sanguis, præmittenda est in brachio moderata, & hinc subjungenda sufficiens saphænæ evacuatio. Nempe suppressantur lochia, uti superius jam dictum, vel ex causa, quæ in ipso sanguine ejusdemque motu hæret, vel etiam suppressantur saltem ex vitio in ipso utero ejusque valis latente. Prius accidit v. gr. à terrore, quale exemplum prostat apud Nicolaum Tulpium *lib. 2. Observat. 2.* à mœrore, quale exemplum vidit Sylvius in *Praxi*: Posterius fit, quando ex grumo sanguinis in utero, ex ejus præternaturali contractura, &c. idem accidit. Si prius; venæ sectio in pede omnino convenit, ut ejus medio modificetur quasi & determinetur illius motus ad uterum, aut saltem in plethoricis præmissâ illâ in brachio in pede demum instituenda venit: sin verò in utero sit vitium, venæ sectio in pede inutilis erit. Mulier partu octavo abortiebat, hinc lochia supprimebantur, superveniebant anxietates præcordiorum, æstus, sitis, &c. cui ex venæ sectione in pede statim lochia redibant, unde sub fluxu myrrham internè exhibui. Ubi verò alia superiorum partium ex lochiis suppressis urgeant pathemata, ut cephalalgia, dyspnœa; vomitus aut sputum cruentum, &c. venæ sectio saltem in brachio instituenda venit, pro urgentibus istis mitigandis symptomatis.

Quoad remedia pharmaceutica: ea sunt interna & externa.

Inter interna, conducunt remedia appropriata, menses aliàs aut fœtum, tam vivum quàm mortuum, pellentia, blandis aromaticis diaphoreticis mista; ut ab his aut à frigore coagulatus sanguis resolvatur, aut cessans sanguinis turgescencia post partum restituatur & corrigatur, sanguis fluxilis magisque

fermentativus redditus, & ejus circulus concitior procuretur, dum illa uterum imprimis irritant, ut per hunc evacuetur sanguis. Inter appropriata in specie conducunt, myrrha, tam in substantia, quàm essentia myrrhæ cum tinctura tartari, vel spiritu vini probè tartarifato parata; unde & trochisci de myrrha, hinc crocus, borra veneta, zedoaria, essentia zedoariæ, dictamnus Creticus, castoreum, succinum, cuminum cum cerevisia coctum. Nostratum muliercularum ordinarium *ἐνπρόσθεν* sunt ciceres rubri, quorum decoctum vel per se; vel cum radice petroselinii in jure carnis paratum, addito croco exhibitum, non inconveniens est; eleganter lochia ciet, & uterum purgat. Aliàs syrupus vel decoctum absinthii, si à frigore supprimantur lochia, est optimum; item decoctum pulegii, decoctum & aqua florum cheiri, matricariæ cum artemisia & chamomilla; vel decoctum betonicæ vel chamomillæ usurpatum cum elixyr proprietatis.

*℞. fl. chamomill. nostr. M. j. β.*

*Cort. aurant. sicc. ʒj.*

*coqu. in f. q. cerevisia.*

Potest aliquid addi de myrrha, vel propinetur in eodem elixyr proprietatis, præsertim sine acido.

Hinc essentia sabinæ, essentia ad menses, & castorei conveniunt.

*℞. ʒii diaphoret. ʒj.*

*Zedoar. ʒβ.*

*Myrrh. elect. gr. viij.*

*Cinnam. gr. vj.*

*• Croci gr. v.*

*M. f. pulvis pro una vel duabus dosibus:*

Exhibentur in modo dicto decocto, vel cerevisia calida.

Externè simul flores chamomillæ decocti regioni pubis, adhuc tumenti, imponi possunt.

Faciunt huc mixturæ Timæi von Gûlden. Nec expertæ in partu difficili, secundinis & lochiis retentis; ex myrrha, castoreo, succino & croco.

*℞. Myrrh. elect. gr. xv.*

*Borrac. ʒj.*

*Croci gr. vj. M. pro 2. dos.*

Pulvis radicis zedoariæ à ʒβ. ad ʒj. multis symptomatis puerperarum medetur, in specie, si sit conjuncta lochiorum retentio cum dolore post partum vel pulveris zedoariæ ʒj. pro duabus dosibus propinetur, acuendo cum aliquot guttis olei destillati rosmarini: Vid. Bartholinus *Act. Med. Hafniens. Volum. 2. pagin. 209.*

Pellentibus his etiam possunt annumerari elixyr proprietatis absque acido; pilulæ pestilenciales Ruffi, Avicennæ, vel de sagapeno.

Quod si

Quodsi à frigore sanguinis grumosi aut plus minus coagulati subsit suspicio, his ipsis appropriatis sperma ceti addi potest, quod cum paucis castoreo multum conducit ad solvendo sanguinis grumos; vel etiam mixtura, quam ingrediuntur lapilli cum aceto.

Quodsi cum lochiis suppressis gravia urgeant symptomata, aut insignis perturbatio in corpore juncta sit aut dolores uterini, in specie ubi aut adest crudelis cephalalgia, aut periculosum imminet delirium, commodè tali mixturæ & dictis stimulantibus ac lochia pellentibus laudani opii gr. j. vel gr. iij. addi potest, monente hoc Willisio *Tract. de Febr. pag. 284.*

Externè fomenta & sacculi ex chamomilla cum sabina & serpillio; quin & litus emollientes, sanguinis grumos resolventes & blandè stimulantibus sunt optimi; timentando & ungendo partes abdominis inferiores cum oleis penetrantibus laxantibus & aromaticis, oleo cheiri, cui additum sit oleum destillatum succini, baccarum juniperi; item parum olei destillati spicæ: v. gr.

℞. Ol. Cheirin. ʒij.  
destill. Cumin.  
bacc. juniper. aa. ʒj.  
succini ʒij. M.

Hoc calidè inungatur largiter abdomen ab umbilico usque ad genitalia, litui superimponatur later calefactus, vel sacculus emolliens, resolvens, plusminus ciens, probè calidus, ex artemisia, absinthio, matricaria; mentha, pulegio, serpillio, melissa, floribus chamomillæ, radice angelicæ, seminibus quatuor carminativis majoribus, nunc in forma sicca, nunc in vino coctis. Conf. Hildanus *Cent. 5. obs. 42.*

Ubi simul adest urinæ suppressio, convenit cataplasma ex parietaria, cherefolio, & oleo scorpionum.

℞. H. Parietar. M. ij.  
Cherefol.  
ʒi. Chamomill. aa. M. j.  
coqu. ad mollitiem:  
pulpa per setaceum trajecta adde  
Ol. scorpion. ʒij.  
Butyr. rec. ʒij. M.

Imponatur calidè regioni pubis, applicato desuper operculo calido.

Insuper cum his, quando puerpera sub mutatione stragulorum, aut lectum petens, metuit de periculo imminente, consultum est, ut in sella perforata fiat suffitus ex sagapeno, myrrha, succino, gallia moschata, trochiscis de myrrha, bdellio, scoriis reguli antimonii. Præ cæteris optimi sunt suffitus, parati ex colocynthide; vid. in *Cas. Timæi von Guldenslee/ pag. 226.* Lateres quoque igniti  
Tom. II.

in lixivium scoriarum reguli antimonii injiciantur, & per infundibulum fumus attrahatur. Item si forsan adsit inflatio uteri dolorifica, optimè convenit suffitus ex nuce moschata, de quo vid. Hartmanni *Praxis Chymiatr.*

Quibus tandem accedant clysteres alvini, ex emollientibus blandioribus, aromaticis, carminantibus & uterum stimulantibus, ano injecti, imprimis ubi mulieres simul laborant suppressione alvi, qui tanquam fomentum sanguinem circa uterum stagnantem incidunt, fluxilem & excretioni aptum reddunt, vid. in Bartholino *Cent. 3. Hist. 19.* & Timæo von Guldenslee/ in *Cas. lib. 4. cas. 28. pag. 227.*

Instrumentum Glauberianum hic locum suum invenit; sicut hellebori nigri pulvis inclusus nodulo, & vaginæ uteri intrusus, mirificè prolicit lochia.

Lotio denique pedum in auxilium quasi revulsorium institui potest.

## ARTICULUS II.

De

### Lochiorum Fluxu Nimio.

Contrarium vitium est nimius lochiorum in partu seu mox post partum fluxus. Sæpius etiam usu venit imprimis post abortum, item post rejectam molam, aut post exclusionem foetus mortui, item, post legitimum partum, ut graves subsequantur sanguinis fluxus obscuri nigricantis grumosi, vel sanguinis floridi, tenuis, coccinei; prius ex venoso genere; posterius ex arterioso, fluere solet.

#### C A U S Æ.

Causæ nimii lochiorum fluxus sunt:

1. Sanguis uberius aut serosior & aquosior, adeoque fluxilior.
2. Idem concitior, aut etiam magis turgescens.
3. A læsione uteri, imprimis ex placenta avulsa.
4. Irritatio uteri, vel à sanguine grumoso, vel à frustulis placentæ, vel à mola in utero relictis.

Primum quod attinet: aut effluit interdum quidem naturaliter sanguis copiosior in juveniculis succi plenis, calidioribus, coactatus gestationis tempore: aut evenit, ubi sanguis sua natura est serosior, aquosior, ac paulò acrior, adeoque fluxilior, ut patet in scorbuto & similibus.

Secundum quod attinet: in specie in puerperis, dum insigniter incalescit corpus & sanguis fermentescit, ordinario quoque adest pulsus celer, frequens, magnus, ubi sub turgescencia in partu uberius effluunt lochia.  
(PPP PPP) Item



Item evenit non raro, ut in ipso pariendi conatu, ubi paulo fuerit difficilior, propinata copiosius spirituoſa, nempe vinum, aqua vitæ, mulierum, &c. nec non ſalina, fœtum pellentia, &c. maſſa ſanguinea poſtmodum exagitetur, rareſcat, turgeſcat, & uberius ejus profluviū per uterum inducatur: ſanè muliercularum plebejarum mos eſt, aut vino generoſo tantum non inebriare feminas parturientes, aut loco hujus aquas apoplecticas ſpirituoſas, ſeu ſpiritum baccarum juniperi, aut ſimilia, copioſius ad vomitum uſque interdum propinare, à quibus volatiliſata partim, partimque fluxilior & magis fermentativa reddita maſſa ſanguinea, uberius poſt partum evacuatur.

Quoad tertium, fit hoc imprimis in abortivis aut intempeſtivis partibus; aut etiam, quando alio quocunque tempore firmius ſecundina cum utero adhæreſcit, tunc hæc abrupta vafa uterina læduntur. Quo etiam pertinet vaginæ uteri plus minus excoſiatio, aut ejusdem in parte quadam ruptio: vid. Veslingius in *obſervat. pag. 162. Bartholiniana Editionis.*

Quartus denique periculofus uteri fluxus fit ab irritatione uteri ob res moleſtas. Rectè enim hæc loquitur Amatus Luſitanus *Cent. 7. Cur. 54. Enixo fœtu & ſecundinis ſapius nimium ſanguinis ſequitur profluviū, quod nullis reſtringi poteſt remediis, idque ob molam quandam in utero adhuc latentem, quæ excreta, vel ſponte ſiſtitur iſtud ſanguinis profluviū.* Quod etiam facit obſervatio elegans Riverii in *Cent. 3. obſerv. 24.* ubi gravis uteri fuit exorta hæmorrhagia, cum fœtus mortuus in eodem contineretur. Omnia hæc præternaturalia ſua præſentia continuo irritando uterum graves hæmorrhagias inferunt, ita quidem, ut vel impoſſibile ſit has ſiſtere, vel easdem ſine recidivæ metu compeſcere, niſi dictæ illæ res moleſtæ in utero exiſtentes prius fuerint remotæ, quæ quamdiu durant, tamdiu etiam fluxus lochiorum non ceſſat. Quin & reſtenta inteſtinorum præternaturalia, aut excrementa viſcidiora aut duriora, abdominis dolores ac tormina inferentia, per acciſens etiam ex conſenſu nimiam lochiorum excretionem inferre poſſunt. Notabilis in hunc finem eſt obſervatio, quam habet Mauriceau *lib. 3. de Morb. Mulier. cap. 5.*

### DIAGNOSIS.

Quod attinet ſigna: fluxus & quantitas ſanguinis excreti nimia facilè & ſponte per ſe patent & cognoscuntur, idque eo magis, ſi in ipſo partu non pauca hujus effluſerit copia.

Num arterioſus, an venoſus ſanguis effluat? reſtantur conditiones in fluxu, nempe materia excreta.

Cauſæ per antecedentia ſiunt manifeſtæ: primariò tamen vires puerperæ innuunt, an nimium ſit, quod effluſerit? an ſecus? ubi enim deſciant vires, ac pulſus debilis ac frequens ſupervenit, ubi ſaſtidium, viſus obſtnebratio, aurium tinnitus, & quodammodo animi deliquium tandem imminere videtur, tunc ſatis patet, nimium eſſe id, quod effluir.

### PROGNOSIS.

Quemadmodum omnes hæmorrhagiæ uteri ſunt nimis periculofæ, ita mulieribus periculofus eſt nimius lochiorum fluxus; quia in laboribus partus vires debilitatæ, & maſſa ſanguinea nimis agitata & exhausta, eandem plurimum ſolet labefactare: quin imò mœſtitia, melancholia, & alia gravia ſuperviunt ſymptomata, imprimis deliria & ſyncope, quibus ſi convulſiones ſuperveniunt, eo pejus eſt, vid. Hippocrates *ſect. 5. Aphor. 56.* dum etiam interdum mors ipſa ſupervenire ſolet.

Cæterum diſtinctionem hic faciunt mulieres inter ſanguinem, ut ſic, ſeu venoſum, &, ut dicunt, inter *Herp. Gebliſch*; id eſt ſanguinem arterioſum; Nam qui effluit poſt partum, iſ eſt ex venis, quod monſtrat color obſcuroſus & ex rubro nigricans. Si ergo ſanguis intenſè floridus ſeu magis coccineus, & ex rubro ad flavum colorem inclinans, emanat, revera indicium eſt, quod immediatè ex arteriis evacuetur. Periculofius ergo eſt, ſi arterioſus effluat ſanguis.

Porò lochiorum hæc hæmorrhagia nimia frequentius acciſit poſt abortum, quam poſt partum legitimum: Illa, quæ ſequitur vel violentam ſecundinæ ſeparationem, vel abortum, ſolet eſſe longè periculofior & gravior, quam quæ ſequitur partum naturaliter conſtitutum: Aut ſi poſt abortum parum videtur excerni ſanguinis, tamen ſub menſtrua periodo & graviorem & periculofiore hæmorrhagiam ſupervenire obſervavi.

Ex ingenere: Quæcunque vitia alias hæmorrhagias inſequi ſolent, iſta in ſpecie ſequuntur lochiorum nimium fluxum.

### CURA.

Quoad curam: In hac optimum eſt, ut habeatur ratio cauſarum remotarum. Opera ergo danda eſt, ut ſanguinis nimius fluxus ſiſtatur; idque pro cauſarum varietate vel ſanguinem incræſſantibus, demendo ſimul ipſi ſuperfluum ſerum, vel ejusdem motum fermentativum, à ſpirituofis excitatum, compeſcentibus; vel læſiones uteri ab avulſa placenta conſolidantibus, adſtringentibus; vel denique iſtud, quod uterum irritat, fruſtra nempe ſecundinæ, ſeu molas retentas, remonentibus.

Ex quibus patet, venæ ſectiōem in brachio eſſe auxilium minus conveniens in lochio-

chiorum fluxu, utut hanc admodum ceu probabilissimum remedium approbet Guillemeau *lib. 3. cap. 10.* nisi vel in habitioribus, vel in casu adeo gravi, ut ex necessitate pro aliquali saltem revulsionem venæ sectionem in cubito instituere cogatur Medicus, qualem refert Sylvius *lib. 3. cap. 8. §. 55.*

Quod ergo attinet remedia: ea sunt pro varietate causarum varia: hinc, dum sanguis est serosior & aquosior, mediantibus sudoriferis serum derivetur per loca aliena. Sudorifera certè ex omnibus evacuan- di rationibus, sola conducunt: nam utut in ipsa sudatione ex fluidiore massa sanguinea, & rapidiori ejusdem circulo, incrementum contingat ipsius fluxus, tamen hic, ubi sufficienter sudavit corpus, sponte imminuitur, ut postea sanguis inspissatus parcius effluat per uterum. Etiam in ipsa sudatione spongia acetosacea imbuta genitalibus ac regioni pubis applicanda est. Ratione sanguinis turgescientis conveniunt blanda acida, sanguinis ferociam compescencia, & eundem modocriter ad coagulationem disponentia, qualia sunt ex tormentilla, portulaca, plantagine, Lyfimachia flore purpureo.

Ratione causæ tertie, adstringentia blanda & vulneraria conveniunt: quæ inter eminent cheretolium, quibus addatur plantago, cydoniata quæcunque, &c.

In quarta causa necesse est, ut expellatur secundina retenta. Cum verò omnia pellentia simul soleant promovere lochiorum fluxum, & stimulent uteri excretionem, idè cauti simus in utendis his ipsis, quin potius, cum ista retenta sint causa profluvii, pellentia aromatica ratione retenti frusti, & simul incrassantia seu blanda adstringentia ratione uberius fluxus, sunt conjungenda; applicando externè pessos, aut irritando uterum; internè verò, quæ possunt nonnihil adstringere, simul tamen secundinam aut molam promovere: v. g. Sylvius *in Prax. lib. 3. de Morb. Mulier. cap. 8. §. 2.* habet mixturam ex radice bistortæ, herba majoranæ, pulegii.

Succinata imprimis conveniunt in hoc casu, ut succinum præparatum, trochisci de carabe, quæ & sanguinis fluxum cohibent, & simul pellunt contenta uterina. Quod si debilius promoveant, acuenda sunt aut sale volatili succini, aut aliquot guttulis ejus olei destillati, aut granis sufficientibus borracis Venetæ.

Plurimis satisfaciunt scopis cydonia & omnia cydoniata, succus nempe cydoniorum, vel vinum seu succus granatorum. Conducunt itidem corallia & coralliata, in specie tinctura coralliorum assafrata, corallia rubra mixta cum succo granatorum acidorum recenter expresso, quibus etiam possunt addi succus aut syrupus portulacæ, imprimis in a-

Tom. II.

crimonia sanguinis aut utero læso. Pulvis dentis hippopotami, vel unicornu verum, à 3℔. ad 3j. ceu specificum experimentum laudatur à Minderero *in Medic. Militari, & Velschio Hecat. 2. pag. 26.* In genere autem in quibuscunque lochiorum fluxibus nimis conveniunt imprimis Martialia, & hinc terrea, adeoque eminent lapis hæmarites præparatus, bolus Armena, terra sigillata, cornu cervi ustum, crocus Martis adstringens, tinctura Martis adstrictiva, tinctura sulphuris vitrioli, liquor Martis solaris.

Sunt, qui laudant sperniolam Crollii: sed hæc propter myrrham & additum crocum minus conveniens videtur: potius convenient trochisci de carabe, item de terra sigillata, vel per se in vehiculo quocunque, vel in vino austero acidulo, vel etiam cum cochleari aceti: in specie conducunt, ubi vel læsio induc- ta est utero ex avulsa secundina, vel ubi subest sanguis serosior & aquosior: uti etiam antihecticum Poterii, imprimis Bezoardicum Joviale.

Conveniunt aliàs hic omnia ea, quæ superius de hæmorrhagiis in genere, aut nimio mensium fluxu commendavi, imprimis Laudanum opiatum, & ex eo parata remedia, desperatam enim uteri hæmorrhagiam post partum hoc ipso Laudano opiato curavit Timæus von Guldentlee *in Casibus.* Vehiculum horum allumendorum constituunt aqua tormentillæ, fragorum, plantaginis, item vinum granatorum, aqua ferrata; imprimis aquam tenellorum cornuum cervi, cochlearim propinata. Nam hæc aqua arcanum fuit Cratonis, cum qua propinavit pulverem de osse cordis cervi: in specie, si sanguis arteriosus fluere percipiatur.

Observandum tamen adhuc est, non subito esse suppressendum sanguinem, in specie mox à partu, quia subinde, ubi primus impetus cessaverit, sponte denuo soleat sisti: quod si non fiat, tunc demum ad appropriata accedendum erit.

In graviore autem malo, aliis desperatis, ultimum refugium sit Bolus ex conserva appropriata, nempe rosarum rubrarum vel radicis symphyti majoris, in quo parum aluminis propinetur, scilicet à 3℔. ad gr. xv. aut ʒj. & 3℔. ad ʒij. pro una vel duabus vicibus exhibendum.

Cum his internis externa blanda, vel sanguinem sistentia, vel vasa circa uterum nonnihil adstringentia, adjungenda sunt. Quibusdam in usu sunt injectiones in uterum ex decoctis adstringentibus. Commendat Valerola *lib. 4. obs. 6.* injectionem ex decocto aut succo plantaginis aut portulacæ, ex decocto stercoreis suilli, in aqua ferratiorum decoctis, injiciantur cum syphone in uterum, imprimis ubi suspicio est læsi aut excoriati uteri: quibus

(Ppp ppp 2) necessi-

necessitate urgente unguentum Comitissæ adstringens addendum monet. Vel fiant decocta adstringentia cum aqua ferratorum, in quibus succus acaciæ nostratis, item sanguis draconis aut bolus Armena dissoluta sint: ite fiat cataplasma ex fuligine cum aceto rosaceo & albumine ovi, quod regioni lumbari prope os sacrum applicandum & subinde repetendum suadet Riverius. Vel argilla calcinata simili modo cum aceto subacta, circa regionem renum lumbarem applicari potest. Item pubi ac genitalibus applicetur. Epithema ex aqua spermatis ranarum ritè destillata, aut spermate ranarum cum aceto rosaceo paucum mista, cum spongia, vel tepidè vel frigidè, admovenda. Nec incongruū est, ut applicentur mams quædam, & quidē si fluunt nimium lochia ex sanguinis turgescencia & nimio orgasmo: nempe epithemata ex aceto, succo semper vivi, nitro & aqua spermatis ranarum, frigidè applicata & sæpe reiterata, imprimis in iis, quæ nolunt lactare; Vel applicentur cucurbitulæ cum magna flamma sub mammis, ut ita motu sanguinis quasi contrario sursum concitato impediatur ejus nimius raptus ad vasa uteri.

Tandem cingulum, factum ex foliis hellebori albi est experimentum Hartmanni.

### ARTICULUS III.

De

#### *Lochiorum per Loca Aliena Excretionem.*

NEmpe ubi impeditur lochiorum excretio, non mirum est, ut regurgitantes in massam sanguineam fermentativā turgescentiā per alium quendam locū moliantur egressum. Pro partium natura, in quas fit metastasis, multiplicia symptomata superveniunt, quæ ratione Bartholinus refert *Cent. 3. Histor. Anatom. 19.* se observasse aliquoties lochia salutariter non rarò per alvum expurgata: sic Salmuth refert *Cent. 4. obs. 89.* quod à retentis lochiis febris acutissima doloresque abdominis in puerpera fuerint oborti, donec lochiis per nares erumpentibus hæc omnia cessarint: Vid. M. A. N. C. *Ann. 2. obs. 184. pagin. 282.* Quin & observatum fuit aliquando, per mammæ suppressa lochia salutariter fuisse evacuatæ: gravissimum morbum ex lochiis retentis videbitis apud Hildanum *Cent. 5. observ. 42.* scabiem foedissimam & ferè leprosam c. *l. obs. 43.* Salmuth *Centur. 1. observ. 82.* observavit melancholiam & oblivionem; Forestus in *Resp. Medicis pag. 25.* Apoplexiam: phthisin & pulmonum corruptelam Cattier *observ. 11.* paralyfis etiam supervenit, imprimis in partibus inferioribus; quale exemplum habet Theodatus in *Valetud. pag. 112.* sicuti etiam epilepsiam observavit Timæus von Guldensee in *Epist. pag. 26.*

C U R A.

In tali casu cautus sit Medicus, ne turbet motum naturæ, quem facilius est impedire quàm corrigere, & nisi notabile damnum adferat excretio lochiorum per aliena loca, semel cœpta vestigia ne turbet, sed naturæ motum permittat: sin verò malum aliquod immineat, v. g. si tussi aut hæmoptysi rejiciatur, tunc per externa lochia suppressa revocanda ad uterum, & perversè excretorum lochiorum corrigat fluxum.

## CAPUT III.

De

### *Doloribus post Partum.*

MIrè cruciant frequenter puerperas post partum dolores, iique varii, qui ipsi nunc similes sunt doloribus partus, nunc verò sunt dissimiles: Non tamen confundendi sunt varii hi dolores, qui possunt mulieribus à partu supervenire: propterea, qui forsan superveniunt orificio interno læso, vel vaginæ uteri laceratæ, illi huc non pertinent propriè, sed iidem dolores, qui affligunt puerperas post partum in ipso abdomine, adeoque dividuntur in dolores veros propriè dictos, & nothos seu impropriè dictos, *falsche Wehen.* Nothi sunt, qui affligunt intestina, mesenterium, partesque his connexas.

Dolores veri sunt nihil aliud, quàm continuatus pariendi conatus, dum ex quacunque causa adhuc post partum uterus vel irritatus, vel insigniter læsus, continuato spasmo violento & convulsione se contrahere, & rem irritantem excutere nititur: propterea etiam sunt vagi, non continui, sed nunc insurgunt, nunc remittunt. Imò & hi ipsi dolores post partum, interdum atrociores & crudeliores sunt, quàm ipsi dolores in partu, ita ut patientes dicant: se libentius partum ipsum, quàm dolores hos perferre velle.

C A U S A E.

Causa horum dolorum in genere est saltem irritatio uteri, & hinc laboriosus & ferè frustraneus egerendi conatus, seu, ut sic dicam tenesmus uterinus.

Causa autem, quæ uterum irritare, & eundem in spasmum concitare valet, est duplex: nempe, vel frigus extrinsecus admissum; vel grumi sanguinis in utero retenti, aut secundinæ frustula, vel etiam mola, vel simile quid post partum adhuc in utero restans, quod aliàs excernendū fuisset; Quibus occasionibus uterus irritatus, continuatis sic spasmis dolores superveniunt. Hoc observavi in quadam muliere, quæ vespere ante partū convivio præfens vescebatur nimio pulmento, hinc nocte inlequente, urgente tunc frigore, corripiebatur diar-



diarrhœa cum copiosis flatibus, unde ter aut quater lecto surgens alvum exonerabat: hinc frigus contrahebat, post horam pariebat, peractoque partu integris 24. horis gravibus doloribus cruciabatur. Id quoque similiter fit, quando extrema, v. g. manus vel pedes, non nihil refrigerati sunt. Par terè ratio est potius frigidi mox post partum aut saltem in puerperio crebrius hausti; nam & hinc uterus læditur, ferè tumidus & quasi inflatus redditur, & plus minus dolet. Vel (2) infert tales dolores post partum interdum plus minus violenta secundarum, utero firmiter connexarum, avulsio, indeque nata uteri læsio & quasi excoriatio; unde læsus uterus à partu dolet, qui dolores continui, nec lancinantes, sed angentes esse solent, & hoc habent conjunctum sibi, quod abdomen, non verò corpus angant, ut dicant: *Sie dürffen den Leib nicht anrühren/er sey/ als wenn er unterkötzig wäre/* quod ipsum signum est læsi uteri, & vel a placenta impetuosè avulsa, vel ab excretis ibidem acrioribus, sanguine nempe acriori, falsiori, &c. uterum in suo transitu plus minus irritante, & ad dolores stimulante. Quod si autem dictæ causæ concurrant, dolores sunt cògraviore, utut rariores sint, qui ab utero læso, frequentiores ratione frigoris suscepti, vel sanguinis grumosi. Cæterum his causis simul adde flatum, quibus si inflatus uterus, dolores post partum oriuntur cum gravissima regionis hypogastricæ distensione, dicuntque ejusmodi ægræ: *Es sey/ als wenn ihnen der Leib zerspringen wolte.*

Dolores vero nothos & colicis similes, *die falschen Wehen/* quod attinet: simillimi sunt iis doloribus, qui sub mensium difficultate subinde mulieres affligunt, & eandem rationem fiendi & curandi habent: Nempe circa umbilicum tensiones percipiunt, dolores ad cor properant, uno nomine; sunt saltem tormina ventris seu dolores colici & iliaci, aut hypochondriaci, &c. oriundi à dictis locorum spasmis quasi hysterici, qui ipsi graviter interdum excruciant mulieres, & excitantur ab excrementis retentis ante partum, vel succis in intestina effusis, qui ubi effervescent, flatum & tormina inferunt, vel similibus causis, quibus intestina irritantur, atque ita post partum dolores non tam uteri, quam abdominis partium contentarum inferunt, unde injectis clysmatis facile, levantur.

#### DIAGNOSIS.

Puerperæ ipsæ hos dolores & indicant, & nothos à veris facile discernere possunt: partim à loco; in doloribus enim veris loca abdominis inferiora affliguntur, quia sunt similes genuinis partus laboribus & doloribus; reliqui verò hypochondria, specialiter sinistrum, magis occupare solent, vagi sunt, & modò traocius, modò remissius cruciant; quin & ad

superiora magis recurrunt, cum veri dolores post partum descendant deorsum ad pubem, & hinc reflectantur ad lumbos, partim à dolore; in doloribus enim veris est irritatio in utero, ubi dicunt: *Es ziehe ihnen nach dem Schooß/ und sey/ als sollten sie noch einmal gebähren.* si verò uterus sit læsus, dicunt: *Es thue ihnen so schrecklich wehe im Schooße;* si flatum distendunt uterum, tunc in specie lochia simul suppressa sunt.

Causæ, an sanguis congruatus? an aer susceptus? ab antecedentibus, item ab excretis lochiis, aliisque circumstantiis & relatione ægræ, facile cognosci possunt.

Vana interim est muliercularum persuasio, quasi salubres & admodum proficui sint hi dolores post partum, quatenus lochiorum promoveant fluxum, quod tamen falsissimum est, quin potius interdum impediunt eundem: quando enim uterus est irritatus, inflatus, aut excoriatus, ulterius ejus orificium interius se stringit, lochiaque supprimuntur, & sic dolores fiunt longè acerbiores, subindeque magis excruciant puerperas, quam veri dolores.

Interdum occasione lochiorum suppressorum exsuscitatur febris cum delirio, adeoque virium defectum & inde varia mala inferunt, utut in ipso partu mulier non adeo debilitata fuerit; unde potius dolores præcavendi sunt.

#### PROGNOSIS.

Molestissimi puerperis sunt hi dolores à partu, reddunt illas inquietas, & præter lochiorum suppressionem graviores si fuerint, ad convulsiones ac deliria disponunt: imò ex istis doloribus universo corpore commoto interdum occasionem suggerunt, ut febrim contrahat mulier periculosam, in specie summam virium prostrationem post se trahant, unde symptomatis aliis terendis post impares sunt. Conf. in specie Sylvius libr. 3. Prax. cap. 9.

#### C U R A.

In hac ergo opera danda est, ut dolores maturè removeantur & sistantur, tam per interna aromatica carminantia, & sanguinis fluxum nonnihil promoventia, quam per externa fomenta uterina aromatica, uterum, ut vocant, roborantia, succurrendo tamen in specie causis variis. Hinc si malum fuerit ex frigore suscepto, tunc præter remedia ex chamomilla optimè conveniunt fomenta & litus, in specie suffitus ex nuce moschata. Si sint ex retentione sanguinis grumosi vel lochiorum, præter misturam polychrestam supra laudatam nil melius est cherefolio, cujus aqua & decoctum, ac quoque efus, multiplici usu prodest puerperis: consolidat simul, si quid læsum est in utero, & sanguinis grumos optimè dissolvit, aliaque retenta ejicit: (P p p p p 3) addi

addi potest crocus & macis, sic enim magis stimulat. In specie convenit spema ceti à ʒʒ. ad ʒj. in aqua cardui benedicti vel decocto florum chamomillæ exhibitum; nam & hōc talem dolorem ex sanguine congrumato curavit Timæus von Gūlden: *See in Casibus* pag. 34.

℞. Rad. gramin. ʒʒ.

HB. Cheresol. M. j.

coqu. in ∇ font.

addendo in fine crocum & macin:

Colatura pro libitu edulcorata S.

### Zertheil- und linderender Trancß auff etliche mahl.

Hujus potus sanguis grumofus in utero optimè dissolvitur.

Quod si lochia minus benè fluxerint, usurpari potest:

℞. R̄j ʒij.

Ess. myrrh. ʒj.

M. S.

### Zertheil- und lindrende Esseng. dosi guttæ 40.

Si actior sanguis hos dolores concitaverit, cornu cervi ustum convenit, item oleum amygdalarum dulcium recens expressum ad aliquot uncias subinde repetitis vicibus à partu assumptum: Vel

℞. Ol. amygd. dulc. rec. ʒij.

Syr. violar. ʒj.

∇ Borræ. ʒʒ.

M. D. S.

### Lindernde Mixtur/ Pöffel-weise.

Quod si verò dolores illi sint ab excoriatione vel læsione uteri, tunc præter misturam polychrestam, vulneraria supra allegatis anodynis addita, conveniunt, ut & corallia & coralliata, blanda Martialia & hæmatites, in vehiculo specifico. In genere omnium optimè conducunt, præter semina calida ista carminantia, cumini, fœniculi, anisi, carvi, & remedia ex iis specifica. Juxta hæc nobile est simplex ad sopiendos post partum dolores uteri chamomilla, tam communis, quàm Romana, cujus decoctum commendat Forestus libr. 28. *Observat.* 75. & 81. Amatus Lusitanus, item Rosencruzerus in *Astronom. inferiorum*: unde etiam aqua & essentia florum chamomillæ, tam vulgaris quàm Romanæ, cum spiritu proprio parata; non minus quàm oleum chamomillæ utriusque destillatum sapphirinum mirè conducit. Sic potest etiam in decocto chamomillæ assumi elixyr proprietatis, vel essentia myrrhæ, imprimis dum non rectè fluunt lochia. Addi potest interdum artemisia rubra, ut fiat remedium eò magis appropriatum. Convenit etiam lavendulæ decoctum, in vino vel cerevisia. De remediis ex secundina res nota est, quod in his doloribus ex conatu ejiciendi oriundis sit singulare & infallibile experimen-

tum, si vel pulvis secundinæ à ʒʒ. ad ʒj. vel spiritus secundinæ in simili dosi, calidè exhibeatur in jusculo gallinæ. Quibus addatur castoreum cum myrrha sociatum, & omnia ex iisdem parata, essentia castorei, essentia myrrhæ cum tinctura tartari parata, item tinctura hysterica seu anoryma D. Langii ex castoreo & asa fœtida cum spiritu vini confecta, item spiritus salis Ammoniacy anisatus. Juxta hæc est zedoaria, item galanga, quarum pulvis ana à ʒʒ. ad ʒj. in haustu vini calidi assumatur. Obstetrices nostræ laudabili consilio ad præcavendos nimios tales dolores propinant post partum panem butyratum, cui pulvis zedoariæ largiter adpersus, aut saltem in vino calido propinant, subinde etiam repetunt. Ad præcavendos æquè atque sopiendos post partum dolores, *ἐν ὀπίσσω* muliercularum plebejarum est aqua seu lotura butyri, *Butter-Wasser*/ quantitate trium cochlearium hausta, admotio naribus pane tosto, ne excitetur vomitus: nec ignotum est vinum, post partum tepidè haustum, mirè refocillare.

Præter dicta etiam conveniunt ex artemisia, item ex matricaria parata remedia, uti etiam angelica, essentia zedoariæ, succini, &c. cum aqua cinnamomi propinata, cinnamomum, zingiber, cardamomum, oleum destillatum baccarum lauri, &c.

His ipsis non sufficientibus in graviore malo ad opiata, necessitate coacti confugimus, addendo tamen simul, quæ nonnihil stimulant, ne lochiorum impediatur fluxus: e. g.

℞. ∇ Puleg.

Chamomill. aa ʒj.

Carmin. ʒʒ.

Ess. castor. ʒj.

Ol. chamom. sapphir. gutt. ij.

Laud. opiat. gutt. ij.

Syr. artemis. ʒvj.

M. t. potiuncula.

Quod si febricula simul adsit aut superveniat, his commodè parum de spiritu nitri dulci addi potest.

Sin dolores post partum sint nothi, tormina nempe abdominis & hypochondriaca, optimo cum consilio applicantur clysmata ex carminantibus & aromaticis confecta, quæ istiusmodi dolorem brevi sopiunt. Internè propinetur zedoaria, spiritus carminativus ex tartaro & nitro, ut & spiritus salis ammoniaci.

Juxta hæc externè in genere conveniunt fomenta abdomini applicata, paranda imprimis ex artemisia, matricaria, pulegio, absinthio, floribus chamomillæ, roremarino, foliis & baccis lauri & juniperi, & similibus aromaticis carminantibus, in vino vel aqua decoctis: quæ vel intinctis linteis vel facculis inclusa, quàm calidè fieri potest, abdomini applicantur. Primatum obtinet fomentum ex decocto artemisiz.

℞. HB.

℞. *HB. Ruta.*  
*Fol. lauri* aa. M. ij.  
*Summ. Aneth.*  
*Fl. Chamom. Rom.*  
*Samb.* aa Mß.  
*Rad. Angel.*  
*Levisß.* aa ʒij.  
*Bacc. lauri* ʒj.  
*Juniperi* ʒß.  
*Sem. 4. cal. maj.* aa ʒij.

coqu. in f. q. *Vini*, vase clauso:

Huic lintheamina immersa tepidè applicentur, imponendo desuper laterem calefactum.

Item litus ex oleo cheirino, liliorum alborum, chamamelino, anethino, lumbricorum; item ex axungia castorei cum oleo destillato spicæ, succini, cumini, angelicæ, & baccarum lauri, nisi fortè unum horum ægra ob odorem non possit ferre.

Si potest mulier ferre odorata, zibethum illinatur calidè abdomini, & reiteretur, vel linimentum mollius ex axungia gallinarum, mixta cum oleo destillato chamomillæ, illinendo abdomini; præsertim quando puerperas jam aliquot post partum diebus dolores lancinantes & pulsantes in hypogastrio vixant.

Vel applicetur emplastrum matricale de galbano, malaxetur cum oleo destillato chamomillæ, & insternatur abdomini. Vel applicari potest sequens cataplasma.

℞. *Bacc. lauri* ʒij. ʒß.  
*Rad. Alth.* ʒj.  
*Calam. arom.* ʒij.

coqu. ad spissitudinem puliculæ in ∇. fontana:

adde  
*Pingu. Capon.*  
*Anserin.*  
*Gallina* aa ʒiß.

subigantur deinde blando Δe ad consistentiam cataplasmatissimioris; ubi refrixerit, subinde reperatur.

Nec inconueniens est cataplasma ad imitationem Courvei de *Morb. Mulierum*.

℞. *Cepas* in ∇ coctas. No. iij. vel jv.  
 his comminutis adde

ʒ *Sem. cumini*  
*Lini*  
*Fl. chamomill.* aa. M. j.  
*Farin. bord.* q. s.

c. f. q. ∇ a, in qua coctæ cepæ f. cataplasma, quod applicetur calidè abdomini infra umbilicum.

Sclarea cum butyro frixa, & umbilicali regioni & infra eam inuncta, quosvis à partu dolores etiam sistit.

Quod si ex inflatione uteri dolores ortum trahant, clysteres carminantes ex herba matricariæ, calamintha, pulegio, artemisia, radice

altheæ, liliorum alborum, &c. Vid. *Timæus Lall. Cas.* 30. injecti per anum; & suffitus, imprimis si à refrigerio malum fuerit, ex nuce moschata institutus optime conveniunt: Vid. *Hartmannus Prax. pag.* 279. & *Solenander Sect. 5. Conf.* 15.

## CAPUT IV.

De

### *Lipothymias Puerperarum*

Et

### *Uteri Suffocatione.*

**S**uffocatio seu strangulatio uteri gravior, ut vocant, sæpe mox à partu, interdum aliquot post partum diebus, affligit puerperas, eaque duplici modo: Interdum enim mox à partu lipothymia imminet, ac tunc dormire volunt, quod ipsum revera est passio hysterica: vel passiones tales hystericae superveniunt postmodum in cursu puerperii, atque sunt vel solitariae, vel conjunctæ aliis morbis.

Prius si sit, optimum est, ut utamur saltem sale quodam volatili: v. gr. solus spiritus salis Ammoniaci cum liquore cornu cervi succinato in vehiculo calido dissipat imminentes lipothymias hystericas, repetendo aliquoties, donec mulier evadat immunis. Verum si posterius sit, est malum difficilius, partim quia non potest facile cognosci ob alios morbos, partim quia in cura respectus habendus est ad ipsum partum: Nempe si aliquot dies à partu tales superveniunt suffocationes uteri, hæ ipsæ imprimis se manifestant maximis cordis anxietatibus, & insigni compressione præcordiorum, cum difficili respiratione, adjuncta symptomata abdominis vel pauca sunt vel nulla, nisi postmodum tandem superveniant; adeoque ut interdum quibusdam pro alio affectu imponat, & ipsæ interdum puerperæ nesciant, se laborare hysterica passione.

### C A U S Æ.

Imprimis excitatur hoc symptoma, si pro cura alius affectus propinantur remedia aut dulcia, aut aliàs ingrata & fastidiosa. In specie verò apud nostrates mulierculas cum purpura imminente & erumpente se solet frequenter conjungere, adeo ut nesciamus sæpe, an febris & purpura? an hysterica passio magis excruciet puerperam?

### DIAGNOSIS.

Interim tamen in passione hysterica anxietates præcordiorum affligunt circa regionem stomachi & hypochondriorum; quibus verò imminet



imminet purpura, conqueruntur simul de difficilianhelitu, non quod thoracis motus impediatur, sed quod pectus repletum sit: Dicunt, *die Brust sey ihnen ganz voll*: quod ipsum sit ex aliquali sanguinis itali, propter vitiatam fermentationem circa præcordia.

## C U R A.

In tali ergo casu, utut præter absorbentia & remedia ex castoreo ac myrrha, optima essent clysmata, tamen ubi purpura incipit erumpere, cavendum studiosè ab omni evacuantem, aut alvum stimulantem, idque eò magis, si purpura fuerit alba. Ubi ergo suspicamur, esse complicatam passionem hystericam cum imminente purpura aut alio morbo acuto, aut adjunctus æstus aut intensus calor cruciet puerperam, simus cauti in remediorum volatiliu exhibitione; quia non semper eadem ferunt morbi acuti. Potius ergo, cum semper simul habenda sit reflexio ad lochiorum fluxum, temperata, e.gr. castoreata, hinc myrrhata, ac denique ex succino, quibus semper simul fixa temperata ex matre perlarum, antihectico Poterii, antimonio diaphoretico, cinnabari antimonii & similibus, item salia fixa, cardui benedicti, &c. cum myrrha, salibus volatilibus, cornu cervi & succini, sociata, usurpari debent, ut ita utrique affectui urgenti, nempe passioni hystericæ, & morbo acuto, simul occurramus.

℞. Ebor. s. Δe.

℥ii diaphor.

Specif. cephal. velcin. ℥ii aa ʒj.

Myrrh. ʒss.

Castor. gr. vj.

⊖ vol. C. C.

Succini aa gr. ix.

M. f. pulvis pro tribus dosibus.

Propinatur in aqua hirundinum cum castoreo, acuata cum tantillo de essentia castorei. Est pulvis nauseosus, sed bonus.

Aliàs, ubi nullus metus est purpuræ, volatilia oleosa castoreata vel sola sufficiunt, modo observetur, quod vel solæ anxietates præcordiorum citra sensibile abdominis symptoma, sufficiant pro passione hystericæ. Item vitentur omnia dulcia in puerperis.

## CAPUT V.

De

*Insultibus Epilepticis Puerperarum.*

**I**nterdum mox post partum, aut suppressis lochiis, aut interdum etiam ritè fluentibus

lochiis, sed cum suffocatione quasi hystericæ superveniunt epileptici insultus; qui ubi adsunt, nisi subsit singularis malignitas, sæpius vitium lochiorum subito suppressorum, aut hystericæ passionis plus minus manifestæ præsupponere solent, vel hanc sibi comitem adsciscunt: sicut etiam Timæus von Guldener *in Epist. pag. 26.* Epilepsiam ex retentione lochiorum observavit.

## C U R A.

Conveniunt ergo in hoc casu, præmissa tamen vel omissa venæ in talo sectione, imprimis liquor cornu cervi succinatus, qui utrique scopo satisfacit, cum castoreatis propinatus. Conducit etiam essentia hystericæ D. Langii, aut ex myrrha & castoreo parata essentia cum spiritu salis ammoniaci oleoso, aliaque castoreata & myrrhata cum volatilibus mista; aut saltem usurpentur antimonialia fixa, præsertim cinnabaris antimonii cum succinatis volatilibus mista.

## CAPUT VI.

De

*Gravidarum Cephalalgia, Vigiliis & Deliriis.*

**P**ar ratio est, si vigiliæ, deliria, ac similia pathemata capitis ac nervosi generis, superveniunt puerperis, in his enim primariò ad lochiorum fluxum respiciendum venit; sic Salmuth *Cent. 1. Observat. 82.* refert melancholiam & oblivionem puerperæ ex lochiis retentis: Forestus *in Resp. Med. pag. 25.* observat puerperam ex non ritè fluentibus lochiis apoplexiam incurrentem, clysteribus & venæ cephalicæ sectione curatam.

Quod si vigiliæ comitentur febres acutas, levantur optimè per medullam crurum vituli temporibus bis vel ter illitam. Opiata non faciliè usurpantur.

## CAPUT VII.

De

*Pudendorum Excoriatione.*

**E**st interdum, ut in parto, idque imprimis difficili & violento, contundantur, excoriantur aut lædantur pudenda; in quali casu in specie prodest, si oleum hyperici & rosarum misceantur cum ovis integris probè contusis, & sub forma linimenti mollioris applicentur.

CAPUT

CAPUT VIII.

De

Tumore Pudendorum.

**E**Venit interdum, ut in partu, vel primo vel difficili, ex dilatatione nimia & quasi fibrillarum & membranarum laceratione oriatur tumor inguinum & pudendorum, & aliqualis eorum inflammatio, aut saltem tumor cedematosus post partum, quod vocant, die Mutter sey geschwollen.

C U R A.

In tali casu convenit oleum verbasci & chamomillæ: Imprimis fatus ex floribus chamomillæ & sambuci in vino & aqua coctis, qui cum linteis calidè & crebrò applicatus discutit tumorem. Vel recipiatur beccabunga viridis contusa cum floribus chamomillæ, quæ calidè instar cataplasmatismis imponantur pudendis tumidis; Item herba Meliloti cum semine fœnu Græci in fœtus forma usurpata laudatur à Pauli in *Quadrip. Botan.*

CAPUT IX.

De

Fissuris Labiorum Pudendi.

**I**N fissuris & laceratione labiorum vulvæ ac orificii uteri exterioris à partu difficiliore usurpant nostrates decoctum raparum exsiccatarum in Torgaviensi cerevisia, cum butyro pauco non salito: Hoc decocto eluunt, mundificant & purgant partes læsas, quod etiam convenit in pudendorum excoriatione. Optimè etiam convenit emplastrum sequens:

- ℞. Cera alb. ʒʒ.
- Ol. Amygd. dulc. ʒj.
- Liquefactis adde
- Bals. Peruv. ʒiij.
- Misc. pro Linimento.

Agitando, donec refrigerescat, & cum plumaceolis applicetur in loco affecto:

In majoribus verò fissuris:

- ℞. Ol. hyperic. ʒʒ. vel Bals. Peruviani ʒiij.

- Axung. porc. ʒij.
- Ol. vitell. ovor. ʒiij.
- Terebinth. Venet. ʒj.
- M. f. Balsamus.

Applicetur cum plumaceolis intinctis.

Tom. II.

CAPUT X.

De

Ruptura Vulvæ seu Perinei.

**I**nterdum in primiparis, vel ex angustis viarum, vel ex partu difficiliore, vel à grandiorescetu, contingit ruptura perinei.

P R O G N O S I S.

Affectus, si quis alius, est molestus & dolorosus, qui non ritè tractatus, facillè in inflammationem, hinc gangrænam degenerat, & ita mortem infert.

C U R A.

Malum hoc nunc est recens, nunc inveteratum, ita ut loca disrupta jam cicatrices contraxerint. Recens si fuerit, ante omnia vulnus recens eluatur cum decocto calido pruni sylvestris, in quo dissolutum sit rob acaciæ: hinc futura conjungenda, sive cum filo consuantur, sive mediante futura per glutin adstringens, linteis inducendum, & utrinque labiis ruptis imponendum; quæ ubi probè cohererint, per ansulas mutuo colligantur: Factâ conjunctione imprimis convenit radix consolidæ majoris, si scilicet pulverisata saltem inspergatur, aut misceatur cum albumine ovi, & ita rimæ in spatio illo factæ blandè illinatur, aut cum filamentis carptis imponatur; sic enim breviter fit consolidatio foraminis. Alii faciunt cataplasma ex decocto radices consolidæ majoris cum herba verbasci, situando ita puerperam, ut clunibus elevatis, cruribus & pedibus probe angustatis, supina continuo jaceat ad octo vel novem dies, vitando omnem motum tussis, sternutationis, & similem. Vel cum plumaceolis subinde immitatur balsamum quoddam vulnerarium, v.g. balsamus sulphuris ad extra, nunc solitarius, nunc cum balsamo Peruviano imponatur; aut solus balsamus Peruvianus, qui si fuerit acrior, diluatur cum vitello ovi: aut imponatur balsamus sulphuris terebinthinatus, promptè consolidans, aut alius expertus balsamus in vulneribus recentibus, cum oleo hyperici aut momordicæ, donec perfectè fuerit consolidatum, ægrâ intereâ ab omni motu corporis abstinente, & quieto in loco jacente. Optima methodus medendi est, quam docet in *Cas. Medic. Timæus von Guldensee / l. 4. Cas. 31. p. 230.* ubi solo glutine, utrinque labiis rimæ ruptæ applicato, curavit talem rupturam.

Quod si accidat, ut ex urina effluente, & neglecta ruptura imminet gangræna, quale exemplum refert Rulandus in *Theaur.* tunc abscissâ parte gangrænosâ applicetur crebrò aqua calcis vivæ cum linteolis dupli-

(Qq qqq) . catis,

catis; quò factò, illinatur balsamus sulphuris terebinthinatus, ut pars gangrænosa consolidetur.

Sin verò jam inveterata fuerit ruptura, ita ut utrinque cicatrices jam sint adnatæ, cura ad eum modum, quo labiorum leporinorum cura instituenda venit, vulnerando aut leviter exulcerando labia cicatrifata, hinc consuendo eadem, & cum balsamo vulnerario consolidanda. Conferatur hic Viardel *in seipsum Ammen-Buch/cap. ult. pag. 210.* Alias curiosum casum & singulare exemplum rupturæ vulvæ ad anum habet Guilleméau *in lib. 3. cap. 7. de felici Puerperio*, quæ rupturâ neglectâ cicatrices induxit, ita ut unum foramen remanserit: interim mulier denuò concepit, & postmodum sequente partu ab eo fuit curata, eodem modo, quo labia leporina curari solent, scilicet abscindendo primò pellem cicatrifatum, post per filum circa anum transfixum denuò ductum labia uniendo, & postmodum in extremitatibus levibus suturis conjungendo, & pro consolidatione balsamum Elemi compositum, applicando.

## CAPUT XI.

De

### *Inflammatione Uteri cum Gangræna.*

**P**ORRò in difficiliore partu ex contusione & laceratione uteri subinde hujus inflammationem cum gangræna & sphacelo supervenire, supra dictum. Quod si hoc fiat in ipso utero, conveniunt injectiones, qualem describit Viardel *in Ammen-Buche/cap. 24.*  
Vel

℞. *H. Lactuc.*

*Nymph.*

*Plantag.*

*Scord.* aa. M. j.

coqu. in f. q. *seri lact.* vel in *lacte ipso*:

Colatura D.

Sed si mala hæc ipsum uterum afficiunt, rarò curari eundem arbitror, quin potius intereant puerperæ: sin verò partes exteriores affligantur, imitari possumus Rulandum, qui gangrænâ vulvæ curavit præscindendo quotidie partes, utpote carnes emortuas: Post præcisionem affecta loca mundificavit intus & extus aqua calcis vivæ, ungebat oleo sulphuris suo, postea desuper applicabat emplastrum diasulphuris, quibus dolor mitius agebat, & partes corruptæ indies consanescabant: vel fortes è profundo faciendæ sunt incisiones, hinc instituenda ablutio cum vino, melle, sale & aceto, hinc linimenta mundificantia usurpanda. Vid. Riverius *observ.* 22. & 23. communicata à Fomio.

## CAPUT XII.

De

### *Hæmorrhoidibus Cæcis.*

**I**N quibusdam hæmorrhoides cæcæ, à partu prorumpere incipiunt, & doloribus acerbis puerperas affligunt, tam internè, quàm externè. Non statim applicandæ sunt hirudines, ne per derivationem lochiorum impediatur fluxus, sed potius dolor sistatur hoc foru:

℞. *Fl. Chamomill.*

*Verbasc.*

*Sambuc.*

*HB. linar.* aa. Miß.

Mista & concisa ebulliant in lacte:

Colatura D.

Partim sub forma fomenti usurpetur, partim spongia decocto imprægnata ano applicetur.

Item radix fabariæ vel scorphulariæ recens in dorso suspensa convenit: Vel

℞. *Ol. Verbasci* 3ij.

*expr. sem. Papav.* 3j.

*Ceruss.* 3℔.

*Camph.* gr. iij.

Mista probè ducantur in mortario plumbeo pro Linimento.

## CAPUT XIII.

De

### *Diarrhœa Puerperarum.*

**P**ERICULOSUM vitium est, quando puerperis supervenit diarrhœa, ut plurimum, nisi fuerit à causa externa funesta & lethalis; nam interdum puerperæ sunt nimis siticulosæ, & bibunt frigidum potum, parum quidem una vice, sed crebrius, unde supervenit tandem diarrhœa, quæ à tali manifesta causa non est adeò periculosa, nisi forsan in adjuncta purpura & petechiali febre similive casu retrocessum excernendorum inducat; nam in hoc casu esset admodum periculosa.

C U R A.

Hæc diarrhœa à potu copioso, in specie si frigidiusculus hauriatur, sistitur inungendo umbilico & regioni stomachi oleum destillatum macis, cum oleo destillato succini: Item propinantur ova ad duritiem cocta, quibus parum pulveris nucis moschatæ recentis inditur. Nam hæc denuò diarrhœam supprimunt.

Imprimis in diarrhœa puerperarum duæ circumstantiæ sunt considerandæ:

1. An ritè fluant vel fluxerint lochia.

2. An adjunctus sit morbus acut⁹ malignus. Si su-



Si superveniat diarrhoea lochiis rectè fluentibus, sistenda venit, in specie blandis sudoriferis, & simul stypticis, si verò vel non manant, vel non sufficienter fluxerunt, relinquenda. Interdum enim fit, ut diarrhoea superveniat lochiis suppressis, naturæ conatu admodum salubri: quale exemplum vid. in Bartholino *Cent. 3. Histor. 19.* Sin verò febri malignæ à causâ interna, efflorescentiis cutaneis, &c. superveniat diarrhoea, res est periculo plenissima, & quia impeditur eadem naturæ motus, propterea venit curanda, atque tunc externè aromaticis, internè præcipitantibus sudoriferis fixis, nonnihil stypticis malo obviam eundum est. Conveniunt ergo cornu cervi iustum, terra sigillata, magisterium coralliorum cum succo citri, quibus pro circumstantiarum ratione addendū est nonnihil de Laudano opiato, imprimis ubi lochia sufficienter fluxerunt: sic enim prohibetur causa motus, & causa ipsa per sudorifera evacuat: styptica verò fluxum sistunt, & diarrhoeam compescunt. Subinde intermiscenda sunt cydoniata blanda, stomachum & intestina modicè adstringentia.

## CAPUT XIV.

De

### Incontinentia Urinae Puerperarum.

**P**ORRò fit interdum in laborioso partu, ut foetus grandior, nimis distendendo vaginam uterinam, adeo distenter collum vesicæ urinariæ, vaginæ uterinæ insertum, ut puerperæ continere nequeant urinam: id quod accidit etiam interdum vitio obstetricum ignararum vel incautarum, malè digitis genitalia tractantium, in specie carunculam istam myrtiformem majorem, isti vesicæ orificio in vulva instar pessuli oppositam, & simul sphincterem vesicæ, lacerantium, vel alio modo lædentium: vid. Hildanus *Cent. 6. obs. 39.* Salmuth. *Cent. 1. obs. 39.*

#### PROGNOSIS.

Sævissimum hoc symptoma ratione molestius est: exindè enim excoriantur & exulcerantur pudenda, malum est difficulter, aut si inveteratum, non curabile: vid. Henricus ab Heer *Cent. 1. obs. 14.*

#### CURA.

Talis urinæ incontinentia ex fibrillarum laceratione aut nimia distensione orta, & recens curatur imprimis per fatus aromaticos nervinos, fibras læsas in naturalem tonum restituentes. Fiunt scilicet decocta aut sacculi decoquendi ex foliis lauri, rorismarini, pu-

Tom. II.

legii, origani & similibus, quæ in vino cocta instar fotuum vel sacculorum applicantur pubi, item lintea humectata intruduntur vaginæ instar parvorum pessorum, ut ita fibris nervis læsis in vagina & orificio vesicæ, redeat suus tonus. Alii Autores infusus & balnea ex nervinis, additis adstringentibus, instituunt: item conveniunt injectiones adstringentes vulnerariæ, linimenta & similia, imprimis unguentum de catellis, quod habet Senner-tus *Prax. lib. 4. P. 2. sect. 7. cap. 9.* aut oleum ab Horstio *lib. 5. observ. 20.* laudatum. Bufones legitimo tempore occisi, vel vivi, in olla nova calcinati & appensi, ut immineant regionistomachi, hanc urinæ incontinentiam sistant & compescant, teste non tantum experientia Henrici ab Heer. *observ. 14.* sed præterea etiam Boyle in sua *Philosophia Experimentalis* similem in Anglia factam experientiam notat pag. 216.

## CAPUT XV.

De

### Suppressione Urinae Puerperarum.

**C**ONTRARIUM vitium urinæ retentio est, quando interdum supprimitur urina in puerperis, quando, quod rarius est, tumet nonnihil vagina uteri aut collum vesicæ post partum laboriosum: aut, fit talis suppressio aliquot à partu diebus, dum sanguis quidam grumi circa vesicam in vagina uteri hærent, aut etiam in vicinis locis in vasis sanguis stagnat & grumescit, à quibus grumis impeditur urinæ excretio, ut non fiat aut fieri possit, nisi cum summo excernendi conatu, postmodum verò, si resoluti sint tandem grumi isti, sponte denuo urina fluit.

#### CURA.

In tali suppressione urinæ à partu externè inunctio cum oleo scorpionum, pubi & vesicæ regioni illito, convenit, aut applicentur fomenta ex simplicibus sanguinis grumos res solventibus & urinam stimulantibus, v. g. ex parietaria, cherefolio, floribus chamomillæ, cum radice rubiæ tinctorum: quibus si addantur lumbrici contusi, aut oleum lumbricorum, erit eò melius: Hinc

℞. HB. *Parietar.* M. ij.

*Cherefol.* M. j. vel iij.

℥. *Chamomill.* M. j.

Incisa coquantur ad consistentiam pultis: adde

*Butyr. rec. non Oit.* ℥j. vel ℥ij.

*Ol. Scorpion.* ℥ij.

*Terebinth.* vel *Junip.* ℥j. M.

Imponantur calidè regioni pubis, & desuper adhuc operculum calidum.

(Q q q q q 2)

Inter-

Internè quando sanguinis grumus urinæ impedit excretionem, post usum sanguinem grumosum dissolventium, imprimis decocti cherefolii cum spermate ceti, denuo urina fluit. Reliqua ad sanguinis grumos dissolvendos nota sunt ex supra dictis de lochiorum fluxu imminuto post partum ex sanguinis grumis. Convenit item emulsio seminis violarum cum aliis usurpata.

Ceterum præter interna conveniunt etiam clysmata aciora & similia injecta, alvum laxantia & fortiter stimulantia; nam ab his stimulantur etiam sanguis stagnans, non minus quàm urina resistans.

## CAPUT XVI.

De

### Ventris Rugis.

Conqueruntur etiam sæpe puerperæ imprimis delicatiores, de rugis ventris post partum: quæ cum perquàm tædiosa sint illis, fiat unguentum ex spermate ceti cum oleo nucistæ expresso, cera & pauco croco, mixtis in consistentiam unguenti vel emplastri, calidè abdomini applicandi, vel adhibeatur emplastrum de spermate ceti Mynsichti;

Vel

℞. Cera nov. ℥iij.  
sperm. Ceti ℥iij.  
Terebinth. ℥ij.  
Ol. Amygd. dulc.  
Hyperici aa. ℥j.  
Myrtin.  
Mastich. aa. ℥ss.  
Sed. cervin. vel medul. crur. bubul. ℥ij.  
M. f. Ungu.

## CAPUT XVII.

De

### Febribus Puerperarum.

Restant adhuc duo primaria symptomata Puerperarum, nempe febres & morbi acuti, ut plurimum febres continuæ, & acutæ raro absque malignitate, & præ aliis affectibus specialiter periculosa vel infesta; vel communes sunt omnibus puerperis; vel saltem quibusdam particulares.

## ARTICULUS I.

De

### Febre Lactea.

Communis omnibus est febris lactea, ita dicta: Nempe à partu successivè mammæ turgent, colligitur in iisdem colostrum seu serum lacteum, donec, dum perfectum

lac in iisdem generari incipiat, ordinariò sub primo lactis propriè sic dicti in mammas impetu circa tertium aut quartum diem à partu præter propter supervenit simul febris, quam vocant lacteam, *das Milch-Fieber*; tunc enim, à proventu hujus subitaneo levi horrore concutiuntur, postmodum insequitur æstus continuus moderatus, biduum vel triduum durans, & circa nonum, interdum septimum à partu diem, blando sudore & madore fausto finitur. Nihilominus tamen observatum etiam est, quod hæc febris lactea subinde pro subjecti & circumstantiarum varietate variare soleat, & demum septimo, imò nono die à partu superveniat, utur jam ante mammæ lacte turgidæ conspiciantur.

### C A U S A.

Oritur ex materia lactis, quæ alias per uterum ad fœtum pro nutrimento derivata fuit, quæ sub uteri contractura vasorumque clausura regurgitat ad massam sanguineam, in eaque motus hujusmodi inordinati febrilis occasionem præbet, donec deposita eadem in mammas, hinc successivè extretâ, & ita continuo promotâ, febricula cesset, id quod sub turgescentiæ motu simul ex massa sanguinea secretum fuit, per sudorem tandem excernitur: Conf. Willisius de Febr. cap. 16. Per fermentationem enim & per præcipitationem aliquam lac disponi, ut facilius à sanguine secedat; præter febrem ipsam lacteam inde constat, quod feminæ lactantes mox, antequam ad mammas deferatur, sitim quandam & phlogosin percipiant; quam sitim, licet nonnulli à feri seu succi nutritivi detractione & ad mammas depositione deducant, quia tamen illa sitis, antequam mammæ turgescant, tales affligit, tunc scilicet, quando intra vasa adhuc hæret secernendum lac; imò postquam hæc secretio lactis denuo cessat, ab agitatione fermentativa potius, hancque excipiente præcipitatione seu secretionem sola, hæc sitis derivanda erit.

Plura de hac febre non addo, cum rarò aut nunquam cadat sub praxin Medicam, & quæ de eadem notatu sunt digna, eadem in specie à Willisio loc. cit. sufficienter declarata sunt: Hoc saltem moneo, observandum esse, non tantum febrem hanc lacteam ordinario oriri sub primo lactis in mammas impetu tertia & quarta à partu die, sed si casu fiat, ut lac in mammis vel non exsugatur, vel alia ratione in corpus ex mammis regurgiter, tunc simili quoque ratione & rigorem & subsequentem æstum non levem inferre, itidem per sudores discutiendum, aut lactis continuata exsuctione curandum.

Ex hoc saltem colligitur, quam proficius sit sudor puerperis, ita ut, quando à partu mox madere incipiunt, & mador talis plus minus

minus copiosus postmodum continuet per aliquot dies, in specie usque ad septimum vel nonum, hoc ita conducere puerperis, ut per reliquum puerperii tempus incolumes sint, aut licet interdum febres aliz etiam superveniant, tam malignæ quàm purpuratæ aliæve, tamen modo corpus continuo madeat, has ipsas faciliores fore: è contra dum sine madore sunt puerperæ primis à partu diebus, vix sine febribus aut aliis gravioribus symptomatis puerperium transigunt.

*C U R A.*

In febre ergo lactea curanda natura sibi ipsa fere prospicit, per sudorem quasi criticum malum levans. Pro levando tamen male, si quid agendum, optimum est, ut sudor blandè promoveatur, & lochia nonnihil stimulentur. Observandum autem; an lactare velit mater? an secus? si prius, lochia non stimulanda sunt; sin verò posterius, pro imminuendo lactis quanto lochia eò copiosius movenda. Ut ergo compescatur æstus & concurrens cephalalgia, quin & diaphoresi blanda magis ventiletur massa sanguinea, hunc pulverem ordinare soleo:

℞. *℞i diaphor.* gr. xv. ad *℞j.* vel *℞℞.*

*Myrrh. el.* gr. jv. v. vel vj.

M. F. pulvis.

Propinetur ægræ pro dosi, subinde repetendus, blando sudore & lochiorum fluxum promovendo hanc febrem finiens, nisi puerpera in laboribus partus vel post partum largiter sudarit, aut lochia sufficienter fluant.

Vel

℞. *Lapill. Ser. præp.* vel *℞i diaph.* *℞j.* ad *℞℞.*

*℞is Absinth.* vel *card. bened.* *℞℞.* ad gr. xij.

*Myrrh. el.* gr. v. vj. vel viij.

M. div. in 2. part. æqual.

Item mixtura polychresta supra laudata optimè quoque convenit.

Quod si verò fiat, ut ingruente hac febre die quarto simul angustia præcordiorum & difficilis respiratio oboriat, ex eo, quod tunc uberius lac turgescat in sanguine: tunc præter dicta utilis est emulsiō ex seminibus expellentibus cum antimonio diaphoretico, v. g. ex semine cardui benedicti, napi, aquilegiz, &c. cum pauco myrrhæ, addita antimonii diaphoretici sufficiente quantitate.

ARTICULUS II.

De

*Morbis Acutis Puerperarum.*

**Q**uod verò attinet cæteros puerperarum morbos acutos febresque, rarò hæc sunt

benignæ, sed ut plurimum malignæ, unde etiam in pluribus, quoad principaliora capita, imprimis quoad excretionem cutaneas, cum reliquis conveniunt febribus malignis, tam in theoria, quàm praxi, de quibus alio tempore pluribus actum. Ea saltem monebo, quæ circa puerperarum febres, tanquam ipsis peculiaris & propria, imprimis sunt consideranda. Superveniunt hæc febres puerperis, aut dum fluunt rectè lochia, aut dum hæc p. n. sunt imminuta aut suppressa, aut dum hæc naturaliter non amplius fluunt, ritè tamen fluxerunt; nam lochiorum excernendorum in his febribus summa habenda est ratio.

Cum enim ex lochiis suppressis alterentur hi succi insigniter toto gestationis tempore, prout plus minus cacochymicum fuerit corpus, indeque tam varia pathemata circa primas vias oriri soleant, ob id succi circa partum commoti, adeoque plus minus effervescentes, observandi sunt probè, qualia symptomata in primis viis post partum inferant? speciatim an simul pathemata hysterica, aut alia pathemata, excitent? ut partim præcaveri, partim etiam maturè coerceri queant.

DIAGNOSIS.

Febres puerperarum acutæ primò invadunt cum rigore, quem mox insequitur æstus continuus, ac vehemens cum siti inextinguibili, pulsu celeri, inæquali & debili, virium prostratione, vigiliis, inquietudine, urina crassa & rubicunda lochiorum suppressione: quibus tandem superveniunt passionēs hystericae, deliria stupor, convulsiones, similiaque generis nervosi symptomata.

P R O G N O S I S.

Febres hæc puerperarum satis periculosa sunt, nisi statim in principio diarrhœa, lochiorum fluxu, aut simili evacuatione solvantur.

In specie tinnitus aurium, & gravitas capitis, tertio aut quarto die supervenientes, generis nervosi symptomata graviora innunt: quibus si accedant summa præcordiorum anxietas, respiratio difficilis, cum pulsu debili & inæquali, res desperata est.

*C U R A.*

Febres ergo superveniunt puerperis, vel dum fluunt ritè lochia, vel dum hæc præternaturaliter sunt suppressa, vel dum hæc non amplius fluunt. Et quidem, si supprimantur lochia, immediatè febrilia pathemata, & ipsa, denique febris, superveniunt. Unde primum quod attinet: agendum est, ut revocetur lochiorum fluxus, si verò lochia non amplius fluant, antea autem ritè fluxerint, febres supervenientes ut aliz febres curandæ ferè sunt. Si verò lochia adhuc fluant, horum motus ita

(Q q q q q q 3)

guber-



gubernandus erit, ne alia symptomata ab iisdem augeantur, vel motus naturæ in sanguine turgescere, aut nimio eorum fluxu impediatur, aut imminuto eorum fluxu perturbetur aut impediatur.

Verum cum hæ puerperarum febres ut plurimum sint malignæ, imprimis quæ superveniunt ritè factæ expurgationi per uterum, tunc cautus sit Medicus, ne nimis sudorem provocando lochiorum sistat fluxum: aut etiam caveat sibi, ne, dum lochia fluant copiosius malignitati hac ratione pandatur accessus ad interiora; cum notum sit alias, quam periculosa sint quæcunque in febribus malignis evacuationes, tam sanguinis quam aliorum humorum, nisi ea, quæ est per sudorem. Et imprimis cum tales febres interdum per excretionem cutaneas, sive petechiales, sive pustulares, sive miliares, salubri naturæ conatu mitigentur. Ob id inter ea remedia, has febres curantia, primatum obtinent ea alexipharmaca, quæ & blanda diaphoresi maligna fermenta removere, naturæque conatum excretorium adjuvant, & simul nonnihil stimulo æquabilem lochiorum fluxum conservant, ne cum diaphoresi & leni subinde madore lochia imminuantur. Si tamen fluant nimio, addantur talia, quæ blanda vi adstrictoria lochiorum fluxum nimium sistant, ut terra sigillata & cornu cervi ustum, ut adeo cum moderatis alexipharmacis nunc stimulantia, ut myrrha, nunc adstringentia, combinanda sint. Fortiora tamen pellentia addenda, ubi supprimi incipiunt, aut cum omnino jam suppressa sunt. Quæ si revocari nulla arte possint, fortius moti & profusius emissi sudores eorum defectui & inde ortis malis mederi ferè possunt. In genere ergo in febribus puerperarum malignis remedia ex cornu cervi parata, item ex antimonio diaphoretico, bezoardico minerali, item myrrha & succino, & hinc salibus volatilibus, fuliginis, cornu cervi, viperarum & hinc fixis concinnata remedia, in his febribus primatum obtinent, ac quidem cornu cervi, tam sine igne præparatum, quam solare, quod imprimis in febribus purpuratis egregium est. His addi possunt, præter antimonia alia, etiam alia diaphoretica nota, imprimis cinnabaris antimonii ritè præparata. De sale volatili succini & cornu cervi, ana mixtis, & additis fixioribus in pauca quantitate res nota est.

Quoad purgationes vero: ex in febribus his malignis cautissimè instituendæ sunt, quin potius omnino omittendæ, cum certo observatum sit, etiam clysteres applicatos in his febribus cum excretionem cutanea junctis subinde fuisse periculosissimos: imo purpuram albam, vel suppositorium applicatum, retrocedere facit. Unde cautus hac in parte sit Medicus, & mox in principio puerperii secun-

do vel tertio die, ubi suspicio est, imminere morbum malignum, primas vias eluat, v. g. pilulis pestilentialibus Ruffi, & similibus, vel clymate aliquo temperato præveniat. Sicut venæsectio, ubi ritè fluunt aut fluxerint lochia, locum nullum habet, imo nociva est: idque præsertim in nostro climate; nam alibi quod fit apud Hispanos, Gallos, &c. in corporibus ex sex rerum non naturalium varietate diversimodè dispositis, apud nos æque non imitari potest. Suppressis vero mox in principio lochiis, ubi urget malignitas, nemo cogitet de aperienda vena; sin in minus periculosis malignis, aut etiam in simplici febre, institui necesse sit, consideret Medicus habitum ægræ, an juvencula sit? In plethoricis enim seu sanguineis juvenculis, ubi ebullit sanguis, applicatis prius utero emollientibus ac nonnihil stimulantibus convenientibus, sanguinem ibidem hærentem resolventibus, meatus laxantibus & ad fluxum disponentibus, secetur saphæna in talo, ut ita concilietur sanguini impetus inferiora versus. Sin verò graviter affligat malum, & corpus sit succulentum, & sanguinis insignior copia adsit, quod tamen vix apud nos locum habet, interdum præmittenda est brachii venæ apertio, & hinc subjungenda istius est postmodum incisio, quæ est in cruribus.

Dixit in quibusvis puerperarum febribus, non secus ac in primis puerperii diebus, sit tenuior, aut saltem pro consuetudinis ratione mediocris, quæ sustentet saltem corpus, & vires hinc non augeantur. Notabile est effatum Fossæ Consult. 45. Tom. I. ubi refert, quod febres acutæ puerperarum ex retentis lochiis ob pleniorē plus debito victum sæpius recurrant, sed semper sequentibus sudoribus salubriter solvantur: Ubi observatur, quod in tantum noceat liberalior victus, in quantum profunt diaphoresis aucta atque sudores.

Quod si lochia suppressa dent febres benignas ardentes, sive solitarias, sive inflammatorias, v. g. comitatas cum pleuritide, angina, uteri inflammatione, tunc tutior res est, ac præmissa, aut etiam omissa venæsectione in pede, sudoriferis, aut salinis volatilibus potentioribus, aut antimonialibus fixis, similibusque acidum absorbentibus, adjunctis myrrhæ, sanguinis coagulatio & stagnatio, & hinc lochiorum suppressio est corrigenda. Mox ergo usurpentur talia, quæ sanguinis grumos ab acido natos promptè dissolvunt, & effuso sudore sanguinem stagnantem in debitum circuitum revocare possunt; unde, præter remedia ad inflammationes laudata, item myrrhata & castorina, sæpius sperma ceti usurpetur.

De cetero ad sitim fallendam, & temperandum sanguinis effervescentis æstum, acida nimis

nimis non bene conveniunt in his ardentibus acutis, ut & in reliquis malignis puerperarum febribus, ex eo, quia periculum hic est, ne alterando sanguinem, fluxum lochiorum sistant propter coagulationem, cum & acida utero membranoso, & à partu plus minus læso & facile adhuc irritabili, indeque doloroso, sint inimica. Potius ergo temperata, aut sub-acida temperatis mista, in casu majoris sitis & æstus sunt convenientia, v. gr. tincturæ florum aquilegiæ aut cyani, gelatina cornu cervi acida, citri, granatorum, berberum, cydoniorum, cum decocto cornu cervi infusa blanda acida, quibus in moderata dosi, aut etiam, ubi nimis urget æstus, spiritus salis aut nitri dulcis parum potest addi.

Qualis cura & qualia remedia his febribus imprimis conveniant, ex supra dictis per se patet; nempe præcipitantia dicta & diaphoretica, simulque lochiorum fluxum conservantia primatum ducunt: Hinc variaz solent fieri formulæ variis in casibus. Res ut pateat, ad febres puerperarum malignas hæc formula est admodum conveniens imprimis in principio.

R.  $\nabla$  *Puleg.*

*fl. sambuci.* an.  $\mathfrak{z}$ ss.

*Acet. vini*  $\mathfrak{z}$ vj.

*Lapill.*  $\mathfrak{S}$   $\mathfrak{z}$ ij.

*Bezoard. mineral.*  $\mathfrak{z}$ j.

*Myrrh. el.*  $\mathfrak{z}$ ss.

*Syr. artemis.*  $\mathfrak{z}$ ss. M. f. Potio.

In pleuritide à partu superveniente, & quidem imprimis cum lochiis suppressis:

R.  $\nabla$  *Puleg.*

*Papav. errat.* aa  $\mathfrak{z}$ j.

$\mathfrak{z}$ ii *diaphor.*  $\mathfrak{z}$ j.

*Sis vol. Fulig.* gr.  $\mathfrak{z}$ v. vel  $\mathfrak{z}$ vj.

*succini* gr.  $\mathfrak{z}$ ij. vel  $\mathfrak{z}$ vj.

*Myrrh. el.* gr.  $\mathfrak{z}$ v.

*Castor.* gr.  $\mathfrak{z}$ j.

*Syr. card. bened.*  $\mathfrak{z}$ ij. vel  $\mathfrak{z}$ ss. M.

Hæc potio & pellit per sudorem, & lochia simul stimulat & promover.

Bezoardicum Joviale, solare, antihecticum Poterii, &c. commodè etiam propinari possunt: item tinctura coralliorum antiscorbutica in nostratibus purpura afflictis: item tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi in hisce febribus, in quibus vires una debilitantur, est egregia. Laudano opiato in his cautè & parcè utendum est, ne sufflaminando symptomata, motus naturæ inhibeatur, lochiorum fluxus imminuatur, & ad deliria ac convulsiones disponatur ægra: interdum tamen laudanum opiatum cum croco aut aliis appropriatis mistum usurpari potest, etiamsi lochia suppressa sint, si insignior sanguinis & humorum agitatio in corpore adsit, conf. Wilhelms de Febr. Puerperarum pag. 285. & 293.

Vinum generosum puerperis malignè febricitantibus cautè exhibetur, imprimis mox post partum, ut rectè monet Hæferus in *Herc. Med.*

## ARTICULUS III.

De

### *Purpura seu Febre Miliari Puerperarum.*

**S**peciaticim ex omnibus malignis ferè imprimis apud nos, pessimæ notæ est febris purpurata mulierum, *der Stiesel* seu febris miliaris; sive rubra fuerit, quod pustulæ saltem rubræ sint, eaque ferè salutaris; sive alba fuerit, dum milii instar candida grana copiosissima, ceu tot pustulæ, corpus incrustant, eaque periculosior. Purpura hæc est maligna, quæ tamen, ut mihi videtur, radicem quodammodo ac fomitem suum acquirit ex scorbuto, idque ideò, quod observaverim, unà cum reliquis remediis in febribus malignis usitatis etiam remedia antiscorbutica usurpata promovere insigniter purpuræ eruptionem.

### DIAGNOSIS.

Imminere febrim miliarem, aut saltem aliam excretionem cutaneam, ferè ex hoc cognoscitur: si puerperæ graviter febrientes, cum aliquali tamen madore, percipiant subinde vagos ac leves horrores, dorsum aut peripheriam corporis occupantes, aut si pungi dorsum hinc inde, tanquam si ab aciculis fiat, sentiant.

### PROGNOSIS.

Salutis spes affulget, si tempore critico per universum corpus cum symptomatum levamine confectim purpura erumpat, hinc prurire incipiat, donec pustulæ exsiccatae sub minutarum squamularum forma erumpat: Alterutrum istorum si deficiat, semper periculum subesse innuitur, speciatim in purpura alba, quæ præ ceteris admodum periculosa.

### C U R A.

Scilicet ad instar variolarum duplex tempus observandum est in purpura:

1. Tempus ebullitionis,
2. Tempus excretionis.

In tempore ebullitionis, ratione effervescentiæ succorum compescendæ, conveniunt simpliciter remedia effervescentes humores compescencia, & blanda diaphoretica: quibus semper vel parum de myrrha, ceu appropriatum malignitati purpuræ in specie resistens, vel parum de sale volatili, addendum.

Post-

Postmodum, ubi imminet tempus excretionis, & vestigia purpuræ incipiunt apparere, simpliciter expulsiua conveniunt: adeoque v. gr. in principio morbi excellunt partes animalium duræ & antimoniatæ, cornu cervi ustum, & solare ad ℥j. bolus Armena, terra sigillata, bezoardica mineralia quæcunque, cinnabaris antimonii, Jupiter diaphoreticus. Si quod aliud, in his febribus miliaribus periculosum est symptoma diarrhœa, quâ uti impeditur excretio cutanea, ita huic supervenienti absorbentia modo dicta optimè resistunt; item sal volatile cornu cervi, & succini ana mista, & in parva dosi cum dictis pulveribus sociata; quin & conveniunt salia fixa vegetabilium, ut cardui benedicti.

In progressu purpuræ, ubi vestigia se ostendunt, egregia est tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi, & tinctura coralliorum antiscorbutica. Loco hujus prodest sequens mixtura nobilis:

℞. ▽ scord.

scorzonæ, vel tenell. C. C. vel liqu.  
vitis aa ʒiʒ.

~ cochlear. ʒiʒ.

Mag. corall. c. succ. citri

ʒii diaphoret. aa ʒʒ.

Syr. de scord. vel de Calend. ʒvj. M.

Capiatur pro una vel bina dosi, vel usurpetur subinde cochleatim.

Vel etiam, ubi incipit apparere purpurâ, optimè conveniunt emulsiones ex seminibus expellentibus, cardui benedicti, napi, aquilegiæ, citri cum vel sine myrrha: aut essentia myrrhæ pro ratione lochiorum, additisque simul cornu cervi sine igne, antimonio diaphoretico, bezoardico minerali, pulvere bezoardico Sennerti.

In specie tamen observetur:


1. Quod acida, nisi admodum temperata puerperis purpurâ laborantibus minus conveniant, propter uterum à partu læsum, propter lac in mammis, & etiam propter lochiorum fluxum.
2. Ut etiam calidissimè tractentur, ex eo, quia tantillus halitus frigidus facit retrocedere omnem purpuram: Unde subito difficultas respirationis, anxietates præcordiorum, jectigationes corporis, subindeque diarrhœa lethalis, & similia superveniunt; speciatim hoc advertatur in purpura alba, præ reliquis puerperis periculosa.

Quod si purpura prurire incipiat, & sub formâ squamarum decidat, continentur remedia antiscorbutica; sic enim reliquæ ejus radicitus evelluntur.

## SECTIO IX.

De

### LACTIS ET LACTANTIUM VITIIS.



Irea lac & ejus generationem vitiatam tria vitia considerata sunt:

1. Quando deficit.
2. Quando nimis abundat.
3. Quando depravatum est in mammis & corruptum.

#### CAPUT I.

De

#### Lactis Defectu.

C A U S Æ.

**D**eficit lac vel vitio seu defectu materiæ, ex qua lac generandum est; vel vitio mammarum, materiam alterantium. Materia deficit, dum vel non generatur, vel genita licet, absumitur, vel aliorum transfertur: hinc nimis macræ, juvenulæ, teneriores, febrientes, nimis sudantes, &c. parum vel planè

nihil comedentes & bibentes, ac illæ, quibus immensius fluxerunt lochia, quibus uberius evacuatur materia candida serosa, &c. minus lacte abundant; item quæ gravidationis tempore vel ex nausea alimentorum parum comederint, vel ex ratione picæ vitiosa alimenta assumerint, rarè à partu lacte abundare solent: item mulieres sicciores lacte minus abundant, cum chylus promptè in sanguinem assimiletur. In morbis acutis lac quoque imminuitur, puerperæ etiam nimis sudantes, nunc vitium, nunc totalem lactis defectum patiuntur: unde quæ lactare nolunt, præter copiosiores lochiorum fluxum, copiosius imprimis sudant. Tempore quoque gestationis lactantibus lac partim imminuitur, partim notabiliter alteratur, dum econtrâ majori quantitate ad uterum defertur. Vinum, item acida & austera quælibet, lactis copiam imminuunt, in specie vinum acidulum, v. gr. Rhenanum. Denique mœror, tristitia, item interdum terror



terror subitaneus, lac imminuunt. Communiter post animi pathemata dicunt, *die Milch ist zuruck geblieben*/ dum spirituum perturbato motu etiam contentorum corporis motus alterari, ac plus minus perturbari solet.

Mammarum vitio deficit lac, quando nempe harum glandularum transcolatoriarum sunt vitioſæ, quarum primum vitium est, quando vel scirrhoræ, vel induratae, vel obstructæ, vel nimis adstrictæ, minus porosæ & poris arctis constantes, aut quando viæ ad mammas aut tubuli glandularum excretorii nimis angustati fuerint; id quod fit in specie arte, quando mulieres adhuc virgines nimis constringunt vestimentis thoracem: Et hæc est causa, quare nostrates puerperæ tam rarò possint lactare proprios fœtus. Præterea huc etiam faciunt, quando externis variis admotis mammarum augmentum aut turgescencia & glandularum debita structura, sub pubertatis annis impeditur, aut etiam, quando mediis gestationis mensibus, dum mammarum itidem augeri incipiunt, similibus earundem augmentum coercent. Accedit huc, infans debilis, non sufficienter sugens ac quasi attrahens lac ex mammis: quò magis enim hoc allicitur, eo magis illabitur, eoque magis ampliantur vasa; hinc tales puerperæ interdum prius catellos aut alios infantes robustiores admovent mammis, ut horum sucu promoveatur lactis affluxus. Notabile exemplum lactis, solius fœtus ope in mammas attracti, vid. M. A. N. C. *Ann. 2. Observ. 135. in Schol. pag. 219.* & in vetula *Ann. 3. Observ. 10. pagin. 14.* item Salmuth *Cent. I. Hist. 62.* Si ipsæ mammarum in culpa sunt, subtile istud acidum volatile, quod chylum in mammis præcipitando coagulat, si vitiosum sit, causa est supervenientis lactis defectus.

Cæterum præter hætenus enarratas causas lactis defectus, simul in specie consideranda venit certa quædam conspiratio aut quasi sympathia uteri, & mammarum, dum imprimis post conceptum, item post partum, lac ad mammas moveri incipit; item quod uterus & mammarum iisdem ferè morbis, in specie scyrro & canceris, affligi soleant, ita quidem gravitatione lac alterari & imminui solet; sicut in aliis, quamdiu lactare solent, ferè conceptio impediti solet, &c.

### DIAGNOSIS.

Deficere lac per se patet, idque imprimis, si simul accesserint mammarum flaccidæ ac pendulæ minusque turgentes, ex quibus parum vel nihil lactis effluere possit.

Causarum signa ex circumstantiis & antecedentibus sunt pensanda.

### PROGNOSIS.

Puerperis equidem per se parum aut nihil

Tom. II.

mali infert lactis defectus, modò ritè fluant lochia, utut infanti subinde novicum sit, quia non potest ritè nutriri, hinc viribus deficere, ex ploratu verò continuo varia mala accelerari solent; *Zuweilen wann die Kinder nur an einer Brust trinken / bleibt die Milch in der andern stecken / macht die Brust hart / und will nicht heraus.*

### CURA.

In hac aut externis emollientibus, mammas irritantibus, admotis viæ ampliandæ, laxandæ, & mammarum quasi spongiosiores & molliores reddendæ, aut internis appropriatis lactis proventus accelerandus, subministrando simul victum *ευχρημον* & laudabilem, imprimis lacticia, ova torbilia, pulres ex ovibus cum lacte, butyro, item ex amygdalis, oryzam aut hordeum excorticatum contusum, in lacte coquendo, & instar pultis capiendo, quæ plus condienda est cum cinnamomo, galanga, caryophyllis ac similibus. Nostrates secale contusum in aqua coquunt, & ita iusculi forma assumunt: carnes mammillarum vaccæ juveniculæ, quæ etiam cocta, indurata & pulverisata, cum aliis miscentur. Inter remedia appropriata eminent flores sambuci in lacte moderatè cocti: Vid. Langius *in Miscell. pag. 46.*

Juxta hos in specie eminet fœniculum totum, cujus summitates recentes comestæ egregiè conducunt ad lactis proventum augmentandum; unde aliæ decoquunt summitates fœniculi ut plurimum, vel cum potu ordinario, vel in lacte, & ita hauriunt: adeoque ipsum semen fœniculi copiosius assumptum, item radix fœniculi, & decoctum summitatum fœniculi, sunt experimentum Amati Lusitani *Cent. 6. Curat. 86.* unde etiam oleum destillatum fœniculi, in usu esse solet. Decoctum lumbricorum terrestrium cum fœniculo est experimentum Helidæi Paduani in brodio fœniculi, item pulvis lumbricorum terrestrium ad 3j. aliquamdiu propinatus. Sic semen anisi, sive in substantia assumatur, sive ejus oleum destillatum subinde gustetur, sive in lacte coquatur. Post hæc semen carvi, cardui Mariæ, dauci, nigellæ, &c. optimè conducunt. Semen anethi, vel solum, vel cum semine cardui Mariæ, nutricibus lac auget. Item hic in usu sunt lac lunæ, à 3ß. ad 3j. crystallus præparata ad 3j. assumpta, species diacrySTALLI Mynsichti, & marga saxorum, privativè scilicet operantur removendo vitiosum acidum, lactis profluxum impediens, nunc solum in cerevisia calida, nunc addito semine fœniculi. Olea destillata præfatorum seminum, præsertim anisi, juxta hoc, quod lac generent, simul etiam lac medicamentosum reddunt.

(Rrr rrr)

℞. Lact.

℞. *Lact. De Zij.*  
*Cryſtall præp. 3i.*  
*Ol. deſtill. aniſi*

*Fenic. aa. grr. ix.*

M. f. Pulvis pro tribus doſibus:

Capiatur vel in brodio gallinæ, vel in brodio decoctionis fœniculi.

Quoad externa; uſurpentur partim emollientia mammas, partim irritantia & lac promoventia; unde confert ſotus ex decoctis ſimplicium appropriatorum, cum emollientibus miſtorum, crebrius mammis applicatus: v. g. ex herba & radice fœniculi, ex malva, mentha, floribus ſambuci, meliloti, ſemine fœniculi, aniſi, nigellæ: quæ vel in lacte vaccino, vel in aqua ſimplici coquantur. Item ſunt, qui commendant cataplaſma ex farina hordei, herba malvæ, & fermento, mammis applicatum. Item inunctio mammarum cum oleo lumbricorum terreſtrium laudatur, vid. Hildanus *Cent. 4. obſerv. 27.* quod imprægnandum venit cum aliquot guttis olei deſtillati aniſi. Item herba pimpinellæ mammis appoſita, aut vinca pervinca contuſa, mammis circumdata lac augmentat, quin & poſt paſtum & abſolutam digeſtionem frictio mammarum moderata cum pannis aſperis, ut incaleſcant nonnihil, Mercurius in nuce avellana excavata intra mammas alligatus commendatur: Vid. Wedelius *de Fac. Med. pag. 196.*

## CAPUT II.

De

### *Lactis Abundantia.*

**F**It interdum, ut lac nimis redundet, ita ut plus debito luxuriet lac, dum non tantummodò ſufficit nutriendo fœtui, ſed præterea etiam ſponte effluit: idque fit vel abſolutè, vel reſpectivè; reſpectivè in iis, quæ lactare nolunt, & ita lac in mammis colligitur; abſolutè lac abundat, quando mulieres, etiam lactantes, plus lactis congerunt, quàm fœtus exſugere poteſt.

### C A U S A.

Origo ejus inveſtiganda eſt vel in materiæ copia ſeu uberiori alimento aſſumpto in ſubjectis ſanis & ſalubribus, hinc in laudabili digeſtione ſtomachi; vel mammarum laxitate mollitieque, hinc ſpongioſitate glandularum copioſarum & melioris conſiſtentiz, & in ſpecie volatili acido, præcipitante lac ex maſſa ſanguinea: quò & ipſe fœtus robuſtior & famelicus, fortiùs exſugens lac, ac proinde majorem ejus influxum per acciſſens excitans, pertinet.

### D I A G N O S I S.

Sequentia obſervanda ſunt:

(1.) Evenit interdum, ut mulieres lactantes, dum lac promptè vel uberiùs affluit ad mammas, vel quibus jam lac copioſum in mammis eſt, in iis percipiant inſignem turgescen-  
 tiam à lacte retento, & dolorem quaſi prementem & contundentem in regione ſpiræ dorsi, quod ipſis perquàm moleſtum eſt. Et hoc ſæpiſſimè evenit ex abundandia lactis, vel quando ſimpliciter redundat, vel quando non ſufficienter emulgetur ex mammis; quod ipſe obſervavi non ſolùm in mulieribus lactantibus, ſed etiam habitioribus & ſucculentioribus, quibus mediis geſtationis menſibus, dum ſcilicet lac in mammis ſuboriri in quibusdam ſolet, qui tamen dolores evanuerunt, ubi lacti patuit exitus per mammas.

(2.) Quod lac, quando vel uberiùs ad ubera movetur, & copioſius in iis retinetur, interdum ſimul tumorem glandularum mulieribus, ubi ſub axillis, muſculus pectoralis, qui brachium attrahit, inferat, quod ineptè Chirurgi pro abſceſſu radicali interdum habent: unde puerperæ lactantes brachium movere ſine dolore non poſſunt.

(3.) Lactis abundantia patet ex copioſiore excretionem ejus, quæ imprimis tunc eſt curanda, quando ſponte effluit, ut exinde emaciatur fœmina, aut etiam nonnihil debilitetur.

### P R O G N O S I S.

Malum per ſe innocuum eſt, & benignum naturæ beneficiū.

Moderata ergo abundantia minus mala eſt, cum fœtus ſucceſſivè grandior ac robuſtior, plus ejus in ſui nutrimentum abſumat.

Non tamen adeo contemnendum eſt, ſi enim nimis abundet, ut atrophia ſequatur, aut virium debilitas, curationem omnino poſtulat. Metus quoque eſt, ne lac in mammis redundans ex tumore nimio dolorem, inflammationem, hinc lactis corruptionem inferat: Imò ipſum lac in mammis uberiùs congeſtum, quam vel fœtus exſugit, vel in mulieribus, quæ lactare non volunt, proprio motu ad ſui corruptionem & aceſcentiam vergere, coagulari, & ita mammarum doloroſa irritatione ſcirrhos, ſcrophulas & abſceſſus, aliaque mala, inferre poteſt: minus tamen adeſt periculum, quando uberiùs fluunt lochia.

### C U R A.

In hac duo ſcopi obſervandi ſunt:

1. Nimius lactis proventus tam internis appropriatis, quàm externis, præcavendus.
2. Genitum verò copioſum, vel mediante ſudore, vel mediante per papillas effluxu, removendum.

Effluxus per papillas promovetur vel emulſione ſpontanea; vel ſuſtione per canem, qui dentes non habet; vel mediantibus ſacculis

culis orizâ, aut nilio aut hordeo contuso plen-  
nis, quam fervidè ferripotest, mammis im-  
positis, idque in specie, si prius impositum fue-  
rit emplastrum de spermate ceti Mynsichti, ut  
integras mammas tegat; sic præcavetur lac à  
sui coagulatione: fiant nempe sacculi polli-  
cis crassitie, iique interpassati probè calefacti  
imponantur dicto emplastro crebrius repe-  
tendo.

Post moderatam ergo dictam interna quæ-  
dam appropriata, in specie autem externa,  
vel adstringentia, vel resolventia, vel appro-  
priata, quæ ad lactis redundantiam usurpanda  
veniunt.

Quoad remedia interna: Mentha, ejusque  
aqua & decoctum, est unum ex optimis lac ab-  
sumentibus: item cicuta, apium, ejusque aqua  
vel decoctum radicis bibitum, item vitex, e-  
jusque semen, rosmarinus & cherefolium.  
Nicotianæ usus lac potenter absomit, auto-  
re Sanchez in *Observationibus*. Ex anetho et-  
iam, cherefolio, item cumino, coriandro &  
myrrha lac imminuunt. Semen lactucæ lac  
imminuere solet, quando nimirum in nimia  
copia affluit, temperando illud; quod qui-  
dem non solum, sed cum vitice facit. In gene-  
re omnia ea lac muliebri imminuunt, quæ aliàs  
ad genituram extinguendam & imminuen-  
dam in gonorrhœa in usu sunt; sed parcius ea  
usurpari solent, ne vis genitalis imminuatur,  
quibus accedat uberior lochiorum fluxus, aut  
revocentur in ordinarium cursum menses,  
qui ut plurimum sunt suppressi lactantibus; aut  
instituantur venæ sectio in brachio.

Potius tamen externis hic insistendum est,  
quæ sunt imprimis aqua apii & menthæ appli-  
cata, quæ epithematum instar lac imminuunt;  
sicut ipsa mentha contusa, instar cataplasma-  
tis mammis circumposita, lac discutit & dis-  
solvit in iis, quæ lactare nolunt, uti & calamin-  
tha. Quædam ideò mulierculæ aquam men-  
thæ rejiciunt, quod postea nunquam lactare  
possint. Fetus ex semine cumini contuso in a-  
ceto & aqua decocto applicatus, vel decoctum  
cumini cum aceto, cum vel sine pauco alumi-  
ne, fetus instar calidè subinde mams applica-  
tur; aut paratum cataplasma ex semine cumi-  
ni contuso cum aceto simplici, & ita calidè ap-  
plicatum, convenit. Cataplasma ex farina fa-  
barum & lentium in oxycrato decoctum est  
expertissimum mams impositum: Vid. M.A.  
N.C. Ann. 6. & 7. pag. Append. 36. Vel

Rad. Apii 3j.

Sem. Cumini

Coriandr. aa. ʒß.

Coqu. in s. q. + & ∇ *Mentha*, vel in ∇ &  
vino, adjuvando parum ✕.

Colatura D. pro epithemate.

cum linteis multiplicatis calidè applicando  
mammis, cui interdum etiam aliquid alumi-  
nis addi potest.

Tom. II.

Expertus est hic fetus sæpissimè à D. Mi-  
chaëlis. Cautè tamen applicandum, ne lac  
coaguletur.

Folia & radix petroselini nonnihil siccata;  
vel in nodulis infusa & externè applicata, lactis  
abundantiam impediunt. Eminent cicuta &  
mentha, vel recenter contusa & mams appli-  
cata; vel ex his paratum fomentum cum semi-  
ne cumini & coriandri in aqua vel vino; linteis  
multiplicatis applicatum mammis calidè; vel  
ex decoctis fiat cataplasma addita farina faba-  
rum cum oxycrato; vel cicuta cum aqua che-  
refolii, vel succus cicutæ aceti tantillo tempe-  
ratus, item folia cucurbitæ & plantaginis cum  
aceto contusa, applicata, item emplastrum de  
cicuta mams impositum, simul lactis coagula-  
tionem, & glandularum indurationem præ-  
cavet, uti etiam succus plantaginis mammis  
illitus; quod etiam facit vinca pervinca in for-  
ma cataplasmatibus dorso applicata. Papyrus gri-  
seus, *das graue Lösch-Papier* / melle vir-  
gineo illitus, mammis impositus ac denique  
canceri fluviatiles calcinati, sacculo lineo in-  
clusi & mammis applicati.

Quod si mulier lactare nolit, ut evanescat  
lac denuò, convenit imprimis cataplasma ex  
mica panis, pulvere menthæ, aceto & sale, quò  
usus subinde Timæus von Gilsdenflee. Vid.  
Wedelius de Med. Fac. p. 197. Nec inconveni-  
ens est emplastrum Hæferi in *Herz. Med.* p. 340.

Wedelius l. 4. & pag. 199. mammis applicat  
emplastrum diachylon simplex, exceptis pa-  
pillis, quæ liberæ sint; dorso verò emplastrum  
de spermate ranarum cum ana albi cocti, ut in-  
fluxum lac in via etiam impediatur, nec in  
mammas perveniat. Euporiston mulierum  
nostratum est, ut mox post partum, aut quan-  
do lac se manifestat, aut etiam dum jam effluere  
incipit, herba asine viridis, leviter contusa  
nonnihil calidè applicetur mammis, & subin-  
de renovetur. Vel folia brassicæ capitata al-  
bæ, leniter conquassatæ, imponi solent, aut so-  
litaria, aut petroselino viridi nonnihil contuso  
repleta, calidè applicant. Quidam recipiunt  
folia brassicæ capitata, & huic imponunt al-  
sinem contusam, & calidè admovent mam-  
mis, crebrius repetendo. De cætero etiam  
optimum est experimentum sympatheticum,  
quando mulier vel recusat lactare, vel infan-  
tem ablactavit, pro lactis ubertate tollenda, si  
de suo lacte emulgeat aliquid in carbonem vel  
in ferrum candens; Omne enim lac, quod re-  
liquum est in mammis, exsiccatur, & succes-  
sivè breviter absomitur. Notat hoc Helmon-  
tius in *suis Scriptis*. Expertum etiam fuit à Pe-  
tro à Castro. Si post infantis ablactationem  
lac adhuc restitans mammis dolorem conci-  
liet, prodest tunc, si succinum & crystalus ap-  
pendantur in regione dorsi mammis opposita  
in nodulo; sic enim lac successivè ex mammis  
moveri, & per alvum egredi, asserunt.

(Rrr rrr 2)

CAPUT



## CAPUT III.

De

*Lacte in Mammis Depravato, & Variis inde Natis Affectibus.*

## ARTICULUS I.

De

*Coagulatione Lactis.*

## CAUSÆ.

**L**Ac depravatur ac vitiosum fit: variis modis in sapore, colore & consistentia, pro vario usu sex rerum non-naturalium, & hinc digestionum varietate: qua ratione Meara contra Willisium observavit lac cæruleum ex mammis excretum. Præ cæteris tamen familiarissimum & nocentissimum vitium est in lacte, si in mammis concreseat & coaguletur in grumos, ac in caseationem secedat; quod fit, quoties acidum, tam lactis proprium quam aliunde superveniens, excessivum, lac condensaverit, sive coagulatio hæc in mammarum substantia fiat, sive in ductibus & glandulis ad papillas derivatis. Jam verò promptissimè accescit & coagulatur lac, partim quod in se ipso occultum gerat acidum, hinc enim acorem, & per consequens coagulationem, lacti inducunt omnia ea, quæ ejus alterationi vel aliquali corruptioni occasionem præbent: hinc namque subito accescit, unde ejusmodi congrumescencia partim quod in glandulis mammarum à lymphâ acidula, tanquam peculiari fermento, probabiliter specifico acido, corrumpatur: quibus si accedit spirituum animalium defectus, ex motu nempe eorum sub animi pathematis gravioribus perturbato, necessariò acidum antea blandum & occultum fit manifestum, indeque lactis proprii coagulativum. Coagulatur nunc ergo lac sua sponte, nunc à rebus non-naturalibus: Suâ sponte, quando quocunque modo in mammis alteratur, aut etiam diutius in iisdem retinetur; sic enim retentum, nec excretum, tepore loci occultâ fermentatione alteratur, alteratum facillimè accescit & grumescit, & hinc mammarum supervenit tandem inflammatio, sicut subito id accidit in rebus non-naturalibus, v.g. animi pathematis, mœrore, terrore subitaneo gravi, ira ac similibus. Facit huc etiam si post sudorem mamma subito exponantur aëri frigido; sic enim subito induci solet, sicut sanguini, ita etiam lacti, ab acore suborto coagulatio. Porro acida quælibet assumpta, in specie austera, nisi corrigantur maturè in primis viis, vel extra inconsultò & intempestivè mammis applicata, lac quoque coagulare valeat; quæ ratione fomenta nimis acida, & quæ recipiunt acetum ab aliis admixtis non rite tempe-

ratum facilè lacti coagulationem inducere possunt. Rigor febrilis in intermittentibus lac pariter in mammis coagulat, ut observat Schneiderus in *Observ.* pag. 228.

Causæ hæc si fuerint graviores, lac totum coagulant, mammaeque induratas reddunt: leviores si fuerint, lac tantummodo in una alteravè glandula grumesciunt, aut exindè saltem aliquot loborum infarctum inducunt, unde tunc fit, ut permaneat adhuc lactis per papillas effluxus, utur grumosum & caseosum in mammis deprehendatur tactu.

## DIAGNOSIS.

Lac in mammis in grumos abiisse, subito percipiunt fœminæ; sed aliud est durities mammarum à lacte nimio mamma distendente, aliud lac coagulatum in mammis. Ordinariò in puerperio, quando tertio vel quarto die lac defertur ad mammae, mammae durissimæ apparent, sed tunc sunt æqualiter duræ: Verum quando lac coagulatum est in mammis, mammae inæqualiter tument: nempe hinc inde tumores duri, tactui renitentes, nunc simplices, nunc multiplices, subito deprehenduntur, modò majores, modò minores, modò continui, modò interrupti, prout plus vel minus continuæ, vel secretæ aut discretæ, fuerint affectæ glandulæ; basis enim semper est glandula lacte circumfessa.

Tumor hic in principio est sine dolore; successivè autem mulier dolorem obtusum, gravativum & quasi contudentem percipit, nisi maturè dissolvatur grumus coagulatus.

Malo occasione grumi caseoli procedente supervenit calor, rubor, & insignis æstus mammae in loco lactis caseati, cum pulsu & pathematis totius corporis febrilibus, hinc dolor punctorius, intensissimus ardor, &c. mammaeprehendunt, magis magisque phlogosi seu inflammatione intumescit, ac ex fibrarum spasmopropter irritationem doloris indurescit, hinc insigniter augentur dolores ardentes, pungentes, pulsantes, non secus ac si spina digito infixa est: hinc sub his tormentis inflammatio successivè suppuratur, ac simul lac caseatum in pus mutatur; factâ suppuratione aperitur abscessus. Hæc ordinaria sunt phænomena, quæ insequuntur lac coagulatum: quibus semper suppurationis negotio febricula plus minus intensa jungitur, nisi lac jam grumosum factum maturè dissolvatur. Nam ubi perfectè semel induraverit coagulum lacteum, non nisi suppurationis negotio solvi, & ex mamma ejici potest. Nempe ex lactis coagulatione tres sunt modi evadendi; aut successivè emollitum disparet; aut superveniente inflammatione beneficio abscessus, nunc spontanea aperturâ, nunc chirurgicâ per lancettam, vel cauterium potentiale apertione evacuatur; aut promptè induratur & in scirrhum abit.

Quod si

Quodsi ab animi pathematis, speciatim à terrore, fiat lactis coagulatio, ordinariò mox inflammatio erysipelacea primitus occupat mammam, cum intenso rubore, ardore, dolore pungente, in superficie māmā simul induratur, & in profundo grumi lactis caseati apparent; qui discussā inflammatione erysipelacea adhuc contumaces perstant, & ita suprā dicto modo, superventu genuinæ inflammationis & suppurationis, dissolvuntur.

### PROGNOSIS.

Patet ex his prognosis facilè: scilicet non leve malum esse lactis acescentiam, cum dolorosissima mammarum sint apostemata, febris etiam adjuncta, plus minus intensa esse solet, & ex his occasionibus ulcera mammarum diuturna & cacoëthea, cum sint partes glandulosæ, facilè oriri possunt.

Tota ergò hujus ratio consistit in grumo lactis, qui si dissolvatur maturè, res in vado: si verò hæreat pertinax, non nisi mediante abscessu potest curari, qui nunc ritè mundificatur, nunc in ulcus sinuosum & fistulosum abit, nunc ipse tumor in scirrhum induratur, nunc facilè etiam in cancerum degenerat.

### CURA.

In cura ergo, ubi adest suspicio vel præsentia lactis coagulati in mammis, lac nondum concretum quantocyus removendum, coagulatum maturè resolvendum, & lac resolutum vel insensibiliter discutiendum, per sudores nempe, vel sensibilibiter emulgendum; grumus verò si resolvi nequeat, saltem suppuratio promovenda, & abscessus maturandus, ut citius & jucundius, h. e. minori doloris tormento, liberetur.

Unde pro his scopis obtinendis subito, quantocyus mulier coagulum lactis, vel exinde sibi nasci tumorem in mamma percipit, mammam emulgeat, quantum potest; vel si non possit lac emulgere, mammam exsugendam canipræbeat, aut exsuctio per vitra instituat, ut id, quod nondum concretum est, maturè removeatur, ne & hoc concreescere incipiat. Quo facto, ut grumi citò dissolvantur, usurpentur internè sudorifera absorbentia seu acidum coagulans infringentia, atque hinc sanguinem & lac grumosum resolventia, qualia sunt sperma ceti. Hinc etiam emplastrum de spermate ceti Mynsichti, externè mammis mulierum lactare nolentium statim impositum, ad præcavendos lactis grumos non habet æquale remedium, præcavet simul, ne reliquum lac tam facilè in mammis concreescere possit. Propinentur ergò lapilli cancerorum, qui vulnerarii, & acido absorpto lac resolvunt, imprimis si myrrhæ paululum iis addatur, cornu cervi sine igne, antimonium

diaphoreticum cum salibus fixis, carduibenedicti nempe, absinthii; nunc in forma pulveris, nunc cum rob sambuci in forma boli, & mediante sudore acidum infringatur, & lactis grumus dissolvatur. Pulvis mille pedum seu asellorum crebrius hauriatur, idque experientia Riverii *Centur. 4. Observat. 89.* ulceraque mammarum cavernosa mirabiliter curat. Porro semen fœniculi, cumini, anisi, crocus, salvia, mentha, cherefolium internè usurpata etiam lactis præcavent & resolvunt grumos. Præ cæteris salia volatilia, primariò spiritus salis ammoniaci probè rectificatus, liquor cornu cervi succinatus, conveniunt dosi à ℥j. ad ℥j. & blandum sudorem, istis propinatis, mulier expectet. Et si rectè sudant, mox sensibile levamen in mammis percipiunt, tam in lactis coagulatione, quam etiam, si supervenit inflammatio. Si spiritus salis Ammoniaci usus sit nauseosus, commodè dissolvitur & assumitur cum lacte; sic enim sapor & odore jus fit insensibilis.

Quoad externa: ubi sudaverunt, mox in principio ad dissolvendos lactis grumos maturè imponatur emplastrum de spermate ceti Mynsichti, imponendo desuper suprā laudatos sacculos ex oryza, milio vel hordeo contuso. Sin jam grumi quidam appareant, aut coagulum lactis durius & pertinacius fuerit, ita ut dicto emplastro cedere nolit, vel coagulum hoc modo resolutum iri vix suspicio sit, tunc optimum est emplastrum de galbano crocatum Mynsichti probè calidum integræ mammæ instratum, ad motis simul modò dictis sacculis, & continuatis internis, imprimis cum sudore.

℞. *Empl. de Galb. crocat. Myns.*

G. \*ci + solut. vel lento Δ liquat.  
aa q. s.

Liquefacta malax. & sign.

Resolvirend Plaster.

Inducatur super alutam seu linteum crassum, ita ut integram mammam obtegat transscindendo foramen pro papilla; post imponatur mammæ probè calidè, & imponentur sacculi fervidi jam dicti, & mulier disponatur ad sudorem. Sed necesse est, ut fiat in principio; si enim per biduum aut triduum lac coagulatum in mammis hæserit, frustrà est, ut dissolvantur grumi, & insensibiliter dispareant. Convenit etiam hujus emplastri usus iis, qui infantes ablactant, & quibus ex lacte retento & coacervato dolor & grumescentia imminet. Sanè si ex terrore vel alia subitanea occasione lac in grumos abeat, etiam emplastra dicta imposita cum sacculis istis sæpius renovatis, & internè sudoriferis propinatis, in principio administrata multum prosunt. Externè quotidie bis sequentem spiritum illinire jubeo:

(Rrrrr 3)

℞. —

℞. ~Θ \*cic. Ψ, vel ∇Ψ *saltem*. ℥i℥.

Ess. Croci iij.

Diluantur cum *sp. Vini*, non ad ebre-  
tilificatio plus minus: D.

Misturâ hac calida illinantur loca grumosa, & sic imponatur dictum emplastrum, quotidie bis renovando illinitionem, & idem emplastrum denuò, & desuper sacculum oryzâ & avenâ repletum calefactumque imponendo. Vel

℞. Empl. de Galb. crocat. ℥i℥.

diachylon simpl. ℥iij.

Liquefacta malax. c. f. q. *sevi cer-  
vini*.

Inducatur super linteum amplum.

Novi mulieres, quæ ubi ex quodam affectu animi, vel alia quavis occasione duritiem mammæ cum rubore & phlogosi erysipela- cea observant, & hinc lactis coagulationem metuunt, mox emplastrum Norimbergeniæ dictum applicant, & hinc potentem sudorem eliciunt.

Juxta hæc etiam hic in usu est, ut ad lactis coagulati grumos dissolvendos ruta & mentha contusa, & tanquam cata- plasma mammas imponatur per octiduum, quotidie novam recipiendo: imprimis si si- mul propinetur internè omni manè ℥j. semi- nis anethi. Hinc cicuta contusa & impo- sita etiam lac grumofum resolvit. Quidam etiam fots suadent ex decocto chelidonii majoris applicato, vel ex decoctis fœniculi, anethi, abrotani, chamomillæ, cherefolii, ci- cutæ, menthæ, quo etiam pertinet fots Pauli in *Quadr. Botan. pag. 396.* ex herba men- thæ, & rutæ cum tantillo seminis carvi in aceto cœrevisiæ coctis, & instar cataplasmatibus applicatis.

Sed quoniam hujusmodi humida admota faciliè refrigerantur, unde & tenera & sensilis mammarum cutis occasione frigidi & humidi ambientis poros contrahit, indeque ex insen- sili transpiratione impedita dolor, irritatio & hinc inflammatio exasperatur, propterea fo- tum loco majoris facio emplastra. His etiam adnumerentur folia & radix petroselinii im- posita, quæ lactis grumescientiam impediunt: verum hæc saltim juvant in principio. Quod si nihilominus in duriores grumos abierit lac, ita ut dictis modis discuti nequeant, tunc super- venit vel inflammatio mammarum, vel gan- græna, vel indurantur in scirrhum.

## ARTICULUS II.

De

### *Abscessu Lactantium.*

SI ergo hætenus dicta sint irrita, ita ut ex lactis coagulo jam immineat mammæ in- flammatio, suppuratio & futurus abscessus, ut

maturetur inflammatio, & promoveatur sup- puratio, internè propinetur pulvis ex lapillo cancerorum, sale cardui benedicti, myrrha & similibus, quæ nimium acorem in primis viis absorbent & destruunt. Simulier sudet, inter- dum est curatio magis prospera.

Externè egregium est pro maturando abs- cessu, ut mamma tumida illinatur spiritus salis Ammoniaci cum calce viva & spiritu vini pa- rato; melius est, si addantur crocus & caryo- phylli, & destilletur; e. g.

℞. ~Θ \*cic. Ψ ℥vj.

Ess. Croci ℥iij. M.

Vel

℞. ∇ artic. ad extra ℥j.

~Θ \*cic. Ψ ℥vj. M.

Illinatur, quàm calidè ferre possunt, cum lin- teolo mammæ tumidæ, quousque ruber, tu- met & dolet, ter quotidie, imponendo desuper calidè emplastrum diachylon cum gummis, vel modò laudatum emplastrum de galbano crocatum Mynsichti, malaxatum cum suffi- ciente quantitate olei tartari fœtidi, superim- ponendo calide sacculum oriza vel milio tur- gidum. Reiteretur hoc quotidie bis vel ter; his enim mediis facilitatur in tantum suppu- ratio abscessus, ut ne dimidios dolores perci- piant, quos alias sentirent, si cataplasmata Chi- rurgis usitata applicentur: Vel illinatur mam- ma isto spiritu, & imponatur desuper empla- strum diachylon cum gummatibus, vel solum, vel cum aliis inixtum.

℞. Empl. de galb. croc. Myns. ℥ij.  
diachyl. simpl.

G. \*cic. + o dissol. aa ℥ij.  
malax. c. f. q. Ol. Philos.

Hoc post factum istum litum temper denuò probè calefactum imponatur, idque quotidie ter reperatur; sic pederentim suppuratur abs- cessus. Nam successivè in quodam loco levius emergit tuberculum, quod si appareat, digito contingendum est, an sub eo omnia sint mol- liora? nam si durum est, continentur reme- dia; sin verò molle, aperiendum est cultello. Aliàs pro promovenda suppuratione in usu est, ut imponatur emplastrum ex mica panis cum lacte, vel medulla panis cum succo apii imprægnata; sed faciunt dolores: sin verò su- spicio supervenientis inflammationis absit, sed futuræ apostematis apertionis, commendatur Hildani *Cent. 2. Obs. 58.* cataplasma, quod vel solum impositum mammæ interdum dissolvit coagulum, & cessare facit inflammationem; vel si hoc non fit, faciliè ad abscessum ducit in- flammationem. Accipitur etiam ad matu- randam suppurationem succus fimi ovilli, qui mistus cum aqua agrimonie imponitur, aut ipsa herba agrimonie vel cheretolii cum ra- dice contusa, addito butyro & melle, suppu- rat, & maturat suppurationis abscessum ad- juvat.

℞. Rad.



℞. Rad. Ireos nostr. vel Florent.  
Cepar. sub. E cal. coct. aa ʒiij.  
Fermenti ʒij.  
Vitell. ovor. Nō. iij.  
Axung. porcine. rec. non salut. ʒʒ.  
Ol. rosar.  
Farin. fœnugr. vel fabar.  
sem. lini aa ʒj. ad ʒij.

Omnia contund. & misc. pro cataplasmate  
mammis imponendo:

D. S.

*Erweichender Brei.*

Quodsi maturatus sit abscessus, convenientissimum est, ut lancettâ aperiatur; dolorum enim atrocitas non permittit, ut expectetur spontanea apertura. Aperto abscessu evacuandum est pus, postmodum mundificandus est, partim ut grumi foras eliciantur, partim ne in ulcus sordidum degeneret. Pro purificando & consolidando abscessu optimum est applicare cum turundis balsamum Peruvianum, balsamum sulphuris terebinthinatum, oleum hyperici, aut saltem digestivum quoddam commune ex vitello ovi, melle terebinthina. Egregiè etiam mundificat abscessus mammarum oleum nucis juglandis cum turundis applicatum. Loco hujus præstantius longe est oleum stercoris humani. Præterea commendatur oleum momordicæ per infusionem, vel infundantur poma momordicæ rubicunda & spinosa in oleo olivarum vel lini. Hoc cum turundis applicatum, vel blanda manu instillatum in abscessum, est admirabile in mammarum abscessibus & ulceribus. In defectu hujus sumitur balsamus sulphuris vel communis Rulandi cum oleo papaveris, vel oleo nucum, vel amygdalarum dulcium expressio, vel nobilior cum oleis destillatis, terebinthinæ, &c. & vel solus, vel si acrior fuerit, mixtus cum vitello ovi applicatur, applicato desuper emplastro diaphanum Rulandi, vel emplastro diachylon composito. Solis etiam foliis tussilaginis ulcera mammarum curata sunt. Abscessus servatur tamdiu apertus, donec parum vel nullum tumoris duri supersit indicium.

### ARTICULUS III.

De

*Mammarum Fistulis.*

**Q**uodsi fiat, ut abscessus apertus degeneret in fistulam (quæ in hujusmodi locis glandulosis admodum sunt contumaces) sinuosaque ulcera, sanè oleum modò laudatum momordicæ est præstantissimum, aut usurpanda sunt medicamenta Foresti *libr. I. Observas. 24.*

Alia remedia fistulis dicata pro mammis videbitis in Sculteti *Armamentar. Chirurgico Observat. 75.*

### ARTICULUS IV.

De

*Inflammatione Mammarum.*

**I**N genere in omnibus mammarum affectibus observandum est, quod mamilla affecta rarò ad sanitatem perducatur, nisi altera sana lacte exsicceatur, ut rectè hoc observat Amatus Lusitanus in *Centur. I. Curat. 47.* quia, dum lac influit ad unam mamam, etiam fluit ad alteram, & sic malum exasperatur.

#### CAUSÆ.

Sæpe ergò ex lactis coagulo in mammis, aut quod alias stagnat, acescentiâ vitiosâ, aut quacunque ex causa, inflammatio vel simplex, vel erysipelacea, mamam mulieris, præsertim puerperæ,prehendit: id quod præter intensum ruborem & dolorem gravativum ac nonnihil lancinantem simul rigor febrilis cum insequenti æstu, & in medio sui vehemens pulsatio ostendit. Rarius oriuntur inflammationes mammarum ex contusione externa, aut etiam ex angusta nimis mammarum constrictione.

#### DIAGNOSIS.

Signa ex dictis patent: Nempe ex tumore, dolore, ardore & pulsationis sensu, ratione arteriarum in sanguinis distributione impeditarum: quæ si percipiuntur, certum signum est, properare tumorem mamæ ad inflammationem & suppurationem.

#### PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Inflammationes omnes mammarum sunt periculosæ, quia ut plurimum abeunt in abscessus, & hinc in ulcera sinuosa, interdum etiam in fistulas: si non abeunt in abscessus, indurantur in scirrhus, qui levi errore abeunt in cancos. Rarissimè enim inflammationes mammarum, in specie ex lactis coagulo, discuti possunt.

#### CURÆ.

Quoad curam: mox opera danda est, ut lac sedulò emulgeatur, inflammatio verò resolvatur ac discutiatur quantocyus: aut, si hoc fieri nequeat, sanguinis aut lactis grumi ex acido coagulati & stagnantes, per suppurantia maturentur, & in abscessum transmutentur. Internè sudoriferum fixum ex pulveribus diaphoreticis cum salibus fixis, lapillis cancerum, myrrha, sale absinthii, cardui benedicti, propinandum, ut largiter sudent. Conveniunt etiam

etiam remedia ex mentha & cherefolio; vel sola aqua ex mentha & cherefolio destillata mirificè in inflammatione mammarum conducit. Hinc ex carduo benedicto blandè & moderatè usurpata sudorifera sanguinis stagnationem egregiè tollunt. Hisce spermata ceti primario est addendum, si parum ejus misceatur cum myrrha.

Præ cæteris tamen externis imprimis insistendum, quæ inter ad inflammationem mammarum discutiendam imponatur papyrus griseus, vel cæruleus propter colorem, qui est ex cobalto, bene confricatus, melle virgineo illitus. Si verò fuerit inflammatio gravior, est optimum phlegma vitrioli, purum sine acido, aliquoties à proprio capite mortuo cohobatum; quia singulares habet vires à sulphure vitrioli: Item aqua cicutæ, plantaginis, in specie spermatis ranarum. Convenit itidem decoctum thuris & myrrhæ in aceto & vino tepidè applicatum. Aqua calcis vivæ, si quæ alia, inflammationem omnem avertit, resolvit & discutit; vid. Wedelius *de Med. Facult. pag. 199*. Ulterius unum ex expertissimis remediis est cataplasma, factum ex farinis, v.g. ex farina fabarum, lupinorum & lentium in oxycrato, coctis & subactis, & cum albuminis ovi pauco mistis, imponatur mammæ: vid. Riverius *in Cent. 2. Observ. 39. Cent. 3. Observ. 1. & Cent. 4. Observ. 74.* & Amati Lulitani *Cent. 2. Cur. 34.* idque calidè sæpius repetendo; sicuti loco hujus alii usurpant linimentum ex farina seminis lini cum melle subacta. Porro etiam canceri fluviales triti crudi, tumentibus mammillis illiti, mirè prosunt. Tandem emplastrum de spermate ceti Mynsichti, emplastrum de cicuta Hildani, & similia, inflammationes similiter resolvunt. Præ cæteris observatu dignum est, quod manus, in qua talpa viva tamdiu fuit detenta, donec meriatur, si imponatur mammæ, in principio statim inflammationes egregiè sistant; quæ ipsa manus etiam cancerum mammæ occultum, singulariter curat: Vid. Schmuck *in Curat. Magico-Magnet.* & Horstius. Denique pinguedo serpentum in tumore mammarum ex lacte abundante cum metu inflammationis mirificè confert; uti etiam in jam dicto casu singulariter utile est, si recipiatur medulla panis, imbibatur cum succo apii, & imponatur mammæ.

## ARTICULUS V.

De

### *Erysipelate Mammarum.*

#### C A U S Æ.

**D**istinctio facienda est ab inflammatione mammarum, quæ ab alia causa supervenit, & etiam ab erysipelate. Interdum enim

terrori puerperarum supervenit similis erysipelacea inflammatio in mammis, una cum lactis coagulo; exinde enim horrore corripiuntur; postmodum gravem æstum incurrunt & vehementem pulsationem in mammis percipiunt.

#### DIAGNOSIS.

Erysipelas mammæ mox apparet, mamma rubet, calet, coccineo colore tincta est, & dolores lancinantes & pungentes in ejus superficie percipiuntur.

#### C U R A.

In cura lac emulgeatur. Internè verò, dum calor durat, propinentur remedia diaphoretica fixa, in specie alcalia, acidum absorbentia, v.g. bezoardica antimonialia, cornu cervi, lapilli cancerorum, &c. cum sale absinthii, cardui benedicti, &c.

Expectetur sudor, sub quo mammæ linteis calidis probè obtegantur.

Hoc facto, si levius fuerit erysipelas, pro discussione applicentur sacculi ex floribus sambuci, qui interpassati cum spiritu vini probè rectificato largiter irrorentur, suffumigando pulvere succini & thuris, & quam calidè fieri potest, admoveantur, aliquoties repetendo. Vel, si gravius fuerit malum, optimum est, ut fiat emplastrum ex theriaca & sale absinthii.

Loco horum est optimum rob sambuci, quod inducatur linteo, & postmodum probe calefactum tam calidè, quàm mulier perferre potest, imponatur, & hoc omni horâ repetatur calidè. Vel pulvis erysipelatodes Mynsichti cum spiritu vini tartarizzato ebrius, calidè manibus applicandus, & imponatur vel linteum vel sacculus ex floribus sambuci & chamomillæ, mulierque blandè sudet, aut semper madeat. Convenit itidem decoctum thuris & myrrhæ in aceto & vino tepidè applicatum. Ubi dolor intensior, aut folia hyoscyami, aut laudani opii tantillum, aut similia, commodè addi possunt.

## ARTICULUS VI.

De

### *Scirrho Mammarum.*

#### C A U S Æ.

**V**erum hi ipsi tumores, sive sint ex sanguinis sive lactis coagulo, non semper resolvuntur, neque etiam suppurantur, sed sæpius non ritè tractati ab acido proprio, contracto in materia coagulata, indurantur in tumores duros & indolentes: Et quidem si sint ex sanguinis grumis, ex inflammatione indurata & coagulata, oriuntur imprimis scirrhii; sin

sin verò sint ex lacte, in glandulis mamæ coagulato & indurato, oriuntur scrophulæ, utut hoc rarius fiat, quin ut plurimum per suppurationem gruniorum lactis, tanquam spina exotica à natura ejicitur. Alias causas vix habent scirrhii & scrophulæ, nisi interdum in mulieribus ex mensium emanatione naturali aut suppressione præternaturali.

### DIAGNOSIS.

Tumor tali tactui renitens, indolens, & instar lapidis in parte infixus ponderosus hæret.

Scirrhii mammarum sunt varii; oriuntur enim vel à causa manifesta, & sunt indolentes; vel pedetentim ab interna causa, qui subinde sunt non nihil dolentes. Scirrhii hi, si duri, indolentes, sine insigni caloris naturalis mutati vestigio fuerint, scirrhii legitimi dicuntur, & specialiter ex acido fixiori, lac aut sanguinem fortius condensante & coagulante, oriuntur. Sin verò pulsare & hinc dolere incipiunt, & punctiones acutæ in eodem observantur, calor etiam, obscurus licet, non nihil in eodem observatur, & color ad aliqualem livorem degenerat, signum est scirrhii illegitimi seu cancerosi: aut saltem ad canceri naturam declinantis, & ab acido volatili corrosivo facillimè effervescenti originem ducit: unde relinquendi sunt, ne exasperentur, & crabrones irritentur; reliqui verò scirrhii curandi sunt.

### PROGNOSIS.

Cautè & circumspectè admodum curari debent; nam facili errore in caneros degenerant; idque imprimis in mulieribus, quibus jam naturaliter deficiunt menstrua.

Imò qui ex mensium vitiis superveniunt scirrhii aut scrophulæ, scirrhii imprimis, non nisi cautè attingi debent, quia ut plurimum, si non semper aliquid cancerosi subest.

### CURA.

Quando ergo tumorem durum scirrhosum, ut plurimum inveteratum, patiuntur mamæ, hic si indolens fuerit, durum coagulum, sive sanguinis sit in scirrho, sive lactis in scrophula, nunc relinquendum, nunc verò successivè emolliendum, discutiendum & resolvendum est. Nam ut suppurantia applicentur, nisi ipsa natura eò tendat, nemini auctor ero; periculum enim est, ne suppurantia & emollientia propriè sic dicta acidum scirrhii attenuent & volatilisent, & ita promptissimè hos tumores in cancerosam naturam degenerare faciant. Acria ergo res solventia, penetrantia, & potenter emollientia, sunt applicanda. Internè ex fumarja & vulnerarijs parata remedia, & similia, sunt usitata.

Externè primatum obtinet ad scirrhum legitimum & scrophulas mammarum emol-

Tom. II.

liendum gummata, speciatim gummi ammoniacum in aceto solutum, & instar emplastri mammis inductum. Easdem vires cum Ammoniaco obtinet etiam galbanum, & in genere quælibet emplastra ex gummatibus composita. Semper autem, antequam applicentur, præmittendus suffusus ex vino & aceto, silici seu lateri candenti affuso. Convenit itidem unguentum de cicuta Hildani, mistum cum ana gummi Ammoniaci, vel succus cicutæ cum gummi Ammoniaco in forma emplastri. Item emplastrum de ranis Vigonis cum Mercurio duplicato, emplastrum de cicuta, de Ammoniaco Foresti, diachylon magnum. Vel fiat linimentum tenuè ex succo solani, subacto cum lithargyrio in mortario plumbeo. Si non suffecerint, mammarum scirrhosus tumor emolliari & discuti potest emplastro Thoneri in *Observ.* quo tumorem dextræ mamæ scirrhosum chronicum alijs irritis facili cum successu curavit:

℞. Empl. diachyl. magn.  
de Melil.

Ceron. vel de Petro aa. ʒj.

G. \*ci in +o dissol. ʒʒ. ad 3vj.

Misc. instar emplastri.

Sin verò scirrhus sit illegitimus, adeoque ad canceri naturam degeneret, cautissimè abstinendum est ab omnibus emollientibus, ac vel minimum scirrhum irritantibus; periculū enim est, ne in cancerum exulceratum abeat. Quod ne fiat, optimum est unguentum contra tumores scirrhosos ad cancerum degenerantes Hildani in *Cent. 6. Observ. 75.* Habetur etiam cataplasma excellens in tumoribus mammarum duris, in cancerum degenerantibus, curandis in *Methodo Medendi Hoffmanni pag. 417.* factam ex pulpa pomorum Borsdorthanorum cum alijs.

Hoc cataplasma potest adhuc meliorari, si lumbrici contusi aut horum succus simul applicetur. Sin verò dictus scirrhosus tumor subinde punctiōibus molestus fuerit, non attingendus est, quia talis facillimè in cancerum degenerare potest.

## ARTICULUS VII.

De

*Scrophulis seu Strumis Mammarum.*

Sed præter modò dictos scirrhos in specie glandulæ mammarum tumores contrahunt, duos, plus minus magnos, propriè scrophula seu strumæ mammarum dictos ex lymphâ in iisdem coagulata, & condensata ab acido sui generis; unde etiam nunc legitimæ, nunc illegitimæ, plus minus cancerosæ esse solent. Tumor est circumscriptus & qui

(S s s s s)

Specia-



specialem suam habet figuram ad glandulæ modum, non adeo indeterminatus, ut scirrhus.

## C U R A.

Curatur autem iisdem ferè, quæ modò de scirrho monita fuerunt.

## ARTICULUS VIII.

De

## Cancro Mammarum.

**D**Enique quoad cancerum mammarum: hic aut per se incipit, aut alios mammarum affectus, inflammationes, ulcera, scirrhos, &c. insequitur. Verum hoc ipsum acidum in scirrhis mammarum, aut etiam earundem cancris, interdum vel sponte adeo est excessivum, vel remediis nonnullis fermentando exasperatur, ut corrosivitatem arsenicalem acquirat, ac in cancerum degeneret. Et quidem si per se oriatur cancer, tunc primitus se saltem manifestat sub forma tuberculi parvi, quod in profundo situm vix ciceris aut fabæ, primum rubicundi, hinc livescens, & nonnihil nigritantis, magnitudinem servat. Tuberculum hoc successivè augmentum capit, donec pulsatione & punctiõibus quibusdam acutis in eodem se manifestet, & tumor evadat paulatim magnus, & cum venis circumcirca tumentibus & liventibus instar pedum cancrinorum, unde etiam nomen habet, se prodatur. Scirrho vel scrophulæ si supervenit, tunc hi tumores duri, aut alias indolentes, continuis puncturis acerbum dolorem, ardorem & æstum concipiunt, citra hoc, ut inflammatio quædam suppuratoria superveniat: Huic accedit partis tumor, color tumoris livescens, venæ tumidæ, &c. Hujusmodi cancer est vel occultus vel manifestus: Occultus est, cujus acidum nondum fermentando eo usque exaltatum est, ut possit mammarum corrosionem constituere, sed quod adhuc à propria materia concentratur & saturatur: Quod si verò acidum hoc per fermentationes exasperetur, & partes vicinas etiã aggreduatur, & exesa cute exulceretur, & acorem putrefactivum corripit, ulcus emergat fœtidum & sordidum, labra habeat inverti, loco puris sanies acris, & successivè latius se diffundat, tunc cancer manifestus seu exulceratus appellatur.

## C A U S A.

Proxima causa est acidum volatile fermentativum.

Causæ remotæ sunt ferè occasiones externæ, compressio, contusio, percussio aut contrectatio inclementior mammarum in quodam loco. Menstruatio multum ad cancerum con-

fert, eundem plus exasperando, prout plus minus menses fluxerint: Quantum enim ad cancerum mammarum producendum conferant mensium suppressiones, vid. in Bartholini *Med. Hafn. Vol. 2. pag. 195.*

## P R O G N O S I S.

Observandum est Autore Hippocrate *sect. 3. Aphor. 38.* quod nempe cancri occulti non sint attingendi, quia sic diutius supervivunt: econtra si attingantur, facillimè abeant in cancos incurabiles.

## C U R A.

In cura occultus cancer, quamdiu talis est, ita relinquendus; adeoque saltem palliativè est curandus, ita ut universum corpus expurgetur, fonticuli in loca vicina inurantur, acredo ejusdem, quantum possibile, temperetur, & hac temperatâ tumor successivè insensibiliter resolvatur.

Faciunt huc ex regno minerali imprimis remedia Saturnina, quæ absorbendo successivè acidum illud in dulcedinem adstrictivam aluminosam transmutant, hinc ejus effervescentiam ac suppurationem, adeoque in cancerum manifestum exasperatione impediunt.

Ex regno vegetabili huc faciunt vulneraria, alcali temperato & quodammodo occulto prædita, quæ alias frigida appellantur.

Ex regno animali imprimis conducunt cancri, & ex his quæcunque parata remedia, similiter alcali occulto, sed copioso, prædita; loco quorum etiam ranæ in aquis puris viventes commodè usurpari possunt.

Externè ex geranio Rupertiano, Agrimonia & Persicaria, & similibus usurpata, sunt optima. Imprimis Saturnina conveniunt; unde ad cancerum occultum omnia linimenta & unguenta, omniaque emplastra, diu multumque subigenda sunt in mortario plumbeo, ut ramenta Saturni successivè commisceantur cum iisdem. Præter cerussam & saccharum Saturni in cancro imprimis emplastrum Saturninum Mynsichti est usitatum pro extirpando cancro occulto, dum impedit, ne fiat manifestus: vid. Timæus von Gildentlee *in Cas. pag. 240.* Hinc ceratum Prævotii, vid. Scultetus *in Armament. pagin. 155.* Unguentum de cerussa album, diapompholygos, lamina plumbea imposita, & similia, cum fructu conducunt; vid. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. Observ. 161.* Ex vegetabilibus herba & succus onopordi contuli sæpe admove-ridebet; vid. Borelli *Observat. pag. 151.* Item plantago eidem substitui potest; aut succus plantaginis extra impositus, subigendo plantas has recentes aut succos in mortario plumbeo, ut sic fiat magis appropriatus. Præter dictum hoc geranium Robertianum, sonchus, scabiosa, agrimonia, persicaria, & ex his

his parata externa, sunt optima, non minus quam succus aut aqua pomorum putridorum, imprimis Borsdorffianorum: Quoad vulneraria alia, quomodo cancer occultus sit conservandus, ne fiat manifestus, vid. Timæus von Guldensee / in lib. 4. Consil. 39. & 40. ubi habet egregia remedia.

Quod si verò fiat, ut nihilominus cancer occultus fiat manifestus & exulceratus, talem, incurabilem judicant Hippocrates & Galenus, nisi ferro & igne eradicetur, nisi, præmissis præmittendis ferro cancer excindatur, & hinc ferro ignito hæmorrhagia sistatur, & sic ipsa mamma cancerosa radicitus extirpetur. Sententia hæc stetit hætenus inconcussa in scholis Medicorum, donec ante sex, & quod excurrit, annos D. Allioth, Lotharingicus, Archiater Ducis Lotharingici, novum modum invenit curandi cancerum exulceratum citra ferrum & ignem, cujus curationis aliquot singularia & illustria exempla fecit Parisiis. Arcanum curæ fundatum est super hypothesen has dictas de acido canceri arsenicali, quod curandum præcipit per alcalia, tanquam acidis omnibus contraria: alcalia verò jubet sumenda non pura; quoniam alcalia illa pura concurrentia cum acidis, effervescentiam inducunt periculosa, unde postmodum tumor & dolor mammæ major conciliatur. Propterea temperare jubet alcalia per sulphur, ut sulphuribus temperata alcalia promptè postmodum acidum canceri corrosivum jugulent citra supervenientia periculosa symptomata. Verum cum non omnibus liceat adire Corinthum, ubi exulceratus est cancer, neque torturam ferri aut ignis velit subire fœmina, saltim applicatis externis malignitas corrosiva canceri est mitiganda, & sic uberior ejus progressus per palliativam curam, ne uberius serpere possit, inhibendus.

Præ cæteris singulare quid obtinet cancer vivus, cui colligatæ sunt chelæ cancro exulcerato impositus: dum enim ad tempus geritur, moritur; hinc renovanda est impositio cum novo cancro, idque toties, quoties moritur, donec in vita permaneat; tunc enim signum est, virulentiam fermenti cancerosi esse jam temperatam. Hinc conveniunt pro temperando acido fere suprâ dicta, quæ cancerum occultum sistunt: v.g. imponenda est cancro lamina plumbea, aut etiam pulveres, parati ex bufonibus, ranis & cancris, unguentis & emplastris Saturninis aliisque appropriatis permiscendi. Aqua item pomorum putridorum, aqua calcis vivæ, sunt egregia. Notus etiam est pulvis benedictus hinc inde proflans apud Autores. Fuligo furni etiam singulare est remedium in cancro exulcerato, sive ipsa fuligo inspergatur, sive liquor ex sale fuliginis per deliquium paratus inungatur, sive cremor

Tom. II.

calcis vivæ, de natura temperaturarum alcalium, illinatur. Alias nota sunt emplastra & unguenta parata ex succis scrophulariæ, urticæ, geranii Robertiani, virgæ aureæ, solani & similibus, cum pompholyge mistis, & in mortario plumbeo subactis: qua ratione linimentum ad cancos mammarum Spigelii impedit ejus nimium progressum.

Huic, sic addatur (quod non habet Spigelius,) sal calcis vivæ, aut ejus cremor, est remedium satis potens.

Plura de mammarum tumoribus uberius explicata videb. in specie in Barberte *Chirurg. de Affect. Mammillar. & Sennerto lib. 4. Prax. ubi de Cancro Mammarum.*

## CAPUT IV.

De

### Lactatione Læsa.

PRÆTER hæc lactis vitia etiam vitiatur lactatio, vitio nempe papillarum: v.g. quando papillæ aut sunt nimis parvæ, aut omnino deficiunt, aut quando papillæ agunt fissuras seu rimas, propter quarum dolorem non possunt admoveere nutrices infantes: aut denique, quando ulcusculis corripiuntur papillæ.

## ARTICULUS I.

De

### Papillarum Defectu.

PAPILLÆ aut parvæ nimis, aut minus prominentes, facillè extrahuntur beneficio cucurbitulæ superimpositæ: vel habetur vulgò instrumentum quoddam vitreum, quo applicato, oris succu facillè extrahitur papilla latens. Verum licet papillæ pateant, non tamen satis sint perforatæ, tunc foraminula eorum fiant ampliora imprimis per succum, institutum aut per catellos admosos, aut si mulier quædam fortius sugat; sic enim aperitur meatus in papilla.

## ARTICULUS II.

De

### Fissuris Papillarum.

#### C A U S Æ.

PORRò frequenter rimas agit & fissuras papilla, quæ acerbissimum lactantibus dolorem pariunt, adeo ut lactationi haud sufficiant. Interdum eousque procedunt fissuræ hæc mammillarum, ut per ipsas papillas penetrent, adeo, ut frustulatim earum particulæ decidant; Interdum ipsius papillæ integræ jacturam faciunt lactantes, quod fit interdum, si serum lactis acrius sit paulo, quod

(S s s s s 2) corro-

corrodendo nonnihil valet exulcerare ipsas papillas : Fit etiam quando infantes lactentes papillas lacte humiditas relinquunt : unde ab aëre ambiente alteratum lac acefcens teneriorem papillarum substantiam subtiliter erodit, ut rimas & fissuras agant.

## C U R A.

Pro hoc malo præservando optimum est, ut mulieres ante partum aliquamdiu recipiant nucem moschatam, eamque excavatam, adeo ut exactè papillæ respondeat, huic imponant, & ritè aliquamdiu gestent. Vel fiat linimentum ex bolo communi exactè pulverisato, cum pinguedine porcina subactò, quo ipso aliquamdiu ante partum manè & vespere illinantur papillæ, quæ exinde majorem firmitudinem acquirunt, quo minus tam facile scindi queant.

Quodsi jam factæ sint rimæ seu fissuræ papillarum, curantur facilè cum balsamo Peruviano. Expertum etiam quoque est oleum momordicæ, potentius fit hoc, si misceatur oleum ovorum ; nam & hoc est egregium remedium ad papillarum fissuras, si illinantur crebro, papilla prius salivâ madefacta : quod etiam facit oleum ceræ, florum hyperici, pinguedo crurum vituli crebrius illita. Oleum seu liquor sacchari etiam est egregium remedium ; item oleum nucum cum saccharo : vid. Riverius *observ.* 14. à Pacheco communicata. Deckers in *Praxi* flores zinci commendat. Pinguedo cochlearum est experimentum Hartmanni. Geranium Robertianum viride contusum & impositum, vel gossypium hujus succo imprægnatum & applicatum, est præstantissimum : vid. Velschius *Micromim. Cent.* 2. *observ.* 38. Mucilago tragacanthæ cum aqua appropriata parata fissuris illita easdem consolidat ; aut etiam pulvis tragacanthæ inspergatur iisdem : vid. Velschius *l. a. Cent.* 3. *observ.* 95. sicut etiam Joël vernicem & mucilaginem tragacanthæ, item mucilaginem cydoniorum cum aqua rosarum aut succo plantaginis paratam : quæ omnia tamen an-

cellit succus millepedum cum vino expressus & applicatus. Item unguentum de Saturno, de tutia, aut tutia præparata cum oleo liborum alborum continuata agitatione in mortario plumbeo in linimenti formam redacta, & applicata sunt egregia. His applicatis sæpius quotidie vel folium hederæ recens desuper imponatur, vel folium lilii albi recens, vel calcei corium desuper admoveatur, vel passulæ magnæ exacinatæ superimponantur papillis :

In fissuris grandioribus :

℞. ▽ *Plantaginis.*

In qua dissolv. parum de *Saccharo Em.*

D. S.

*Heilende Mixtur.*

Illinatur, & imponatur desuper folium hederæ vel plantaginis, &c. bene abluendo papillam cum aqua calida, ne relictum intra fissuras lacacefcendo malum intendar.

Sic in fissuris hisce remedium incomparabile dicitur coagulam albuminis masculum, Italis dicitur Gallatura, cum aqua rosarum & saccharo applicatum : Vid. Velschius *Microm.* 26. *Cent.* 1. Idem præstat quoque oleum albuminis ovorum.

Quodsi verò altius serpat malum, ita ut potentiora requirantur remedia, tunc faciendum est unguentum :

℞. *Lithargyr.* ʒ℞.

*Myrrha* ʒij.

*Alum.* ʒj.

quæ cum oleo rosaceo subacta in formam linimenti.


Quodsi ulcera contrahant papillæ, quæ ut plurimum gravem simul habent dolorem, tunc præter remedium ultimo loco positum convenientissima est aqua seu decoctum calcis vivæ, si eadem laventur papillæ.

Graviora si fuerint ulcera papillarum, huic aquæ calcis vivæ parum Mercurii dulcis additum, est optimum remedium.



LIBER





# LIBER V.

De

## MORBIS INFANTUM.

### CAPUT I.

De

#### *Infantum Regimine.*



**S**cilicet infans, simul atque utero materno relicto in lucem egreditur, excipitur cum sequente & simul annexa secundina ab obstetrice, balneo aquæ dulcis tepidæ abluitur, & probè mundificatur, & sordes istæ mucilaginosæ, quæ in naribus, auribus, ano & similibus locis reperiuntur, probè eluuntur, ut ita infans purificetur. Antequam autem in balneum cum imponat obstetrix, umbilicalem placentæ funem probe ligatum ab umbilico refecat per tres vel quatuor transversos digitos supra umbilicum, lintheaque tepidiuscula superimponit, & ita lintheolis involutum in lectulum reponit, ut collectis in utero materno recrementis excretis aptior fiat pro nutrimento lactis ex mammis, vel maternis vel ad id conductæ nutriticis, emulgendero. Studiosè quoque incumbendum, ut copiosæ impuritates gestationis tempore collectæ ejiciantur. In hunc finem subindè post balneum recens natis parum sacchari albißimi vel penidii, aut oleum amygdalarum dulcium recens expressum ingeritur; aut conjunctim, c. gr.

℞. *Ol. amygd. dulc. rec. expr.* ʒv.

*Sacch. albiss.* vel *penidii* ʒii.

M. S.

#### *Abführende Mixture.*

horum enim ope lubricantur & absterguntur stomachus & intestina, & copiosæ sordes, gestationis tempore collectæ eliminantur: aut, quod optimum, parum de syrupo cichorii cum rhabbaro, vel de syrupo rosarum solutivo, aut de melle rosato solutivo feliciori sanè cum successu in os imponitur, ut lentè deglutiatur. Soli enim huic oleo non fidentum est; cum vel rarescendo facillimè, non leve incommodum in primis viis inferat; vel

non rancidum licet, vix tamen omnia ex iis tam exactè eliminat, quin subinde aliquid sordium remaneat. Mihi convenientissimum semper & in usu est præscribere pulpam passularum minorum cum ana syrupo de cichorio cum rhabbaro mistam, addito pauxillo coralliorum rubrorum præparatorum & lapillorum cancerorum præparatorum ana, horum ʒj. vel ʒß. ad illorum ʒß. addendo: Vel

℞. *Syr. rosar. sol.* ʒij.

*de Cich. c. Rhab.* ʒj.

*emet. A. S.* ʒß.

M. S.

#### *Ausführend Gäftlein.*

quæ cum parvulo cochleari subindè & successivè propinantur infanti recens nato, idque toties & tam diu, donec copiosè partim per vomitum auspicatum à copioso sero mucilaginoso ventriculum occupante, partim per secessus à meconio, seu nigricante illo & spisso excremento, in intestinis stabulante, evacuetur, & in specie vitiosa ejus & succorum aliorum acescentia absorbeatur & tollatur: nam hæc excrementa, præsertim meconium, retenta vitiosa sui acescentia lac ingestum inquinant, & mille malis, præsertim epilepsia mulctant infantes: vid. M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Observ.* 201. Denique syrupus de spina cervina seu domesticus est optimum & convenientissimum abstergens omnium sordium, & laxans infantum, speciatim si loco sacchari cum melle per se depurato sub insolatione confectus fuerit, vix unquam fallens, & sine ullo incommodo evacuans, imprimis cum pulvere lapillorum cancerorum præparatorum & coralliorum præparatorum si subactus fuerit. Nec infans facillè prius mammæ admovendus, quam aliquoties supra aut infra purgatus fuerit. A partu infantes ante decem vel duodecim, quatuordecim vel quindecim horas non admovendi sunt mammis, sed quò longius post partum esuriunt, eò melius est, donec interea in mammis matris se colligat colostrum seu lactis primum rudimentum, serum nempe lacteum: Hoc ipsum equidem tanquam nocivum, sunt qui præbere infantibus prohibent:

(Sss sss 3)

bent:

bent: sed pessimo consilio, cum blandum sit infantum laxativum, abstergens optimè sordes ejus, & purificans intestina, & cum minus negotii facessat stomacho pro digestionem, hoc ipso facilius transit, minusque lacte ipso corrumpitur in eodem, dum interea lacti perfecto, tertio vel quarto die supervenienti, concoquendo adsuescat melius infans, & hujus nutrimento magis largo sustentetur. Colostrum namque & alimentum medicamentosum, quod natura eum in finem generavit, ut modicè nutriendo, leviter pro infantis imbecillitate purget per aliquot dies, ut rectè asserit Spigelius *Tractat. de Form. Fæt. cap. 13. pagin. 17.* Ab ipsa matre lactetur infans, si est sana, & lac habet, quod huic negotio sufficiens; aliàs eligenda est nutrix. Vulgo examinant hujus lac per colorem, odorem, sapor, &c. an scilicet crassum, tenue, dulce, pingue, &c. sit? sed ridiculo planè consilio: Non enim hæ & similes proprietates lac vel bonum vel malum reddunt, cum occulti sæpius defectus maximi momenti hoc ipso cognosci & videri nequeant, qui tamen sæpius longè majoris sunt conditionis, & insensilia ut plurimum vitia, quæ lactis corrumpunt miscelam, ut non tantum in seminibus morbosus cum lacte transplantatis, sed in specie vitiiis moralibus per lac insensibiliter communicatis, est manifestum. Sed, ut rectè loquitur Helmontrius *Tractat. Sextupl. Digest. §. 74.* æstimanda est lactis conditio ex sanitate nutricis & bestię, vita & cibis. Modò ergo sana sit nutrix, bonis utatur alimentis, aut talibus saltem, quibus alias consueta sit, & quæ faciliè ferat, & denique ab affectibus animi gravioribus se temperet, laudabile erit lac, sive crassum, sive tenue, sive plus minus album, sive flavescens non nihil fuerit. Nam conditiones lactis etiam sani sunt varię: cum, uti digestio prima in unaquaque specie & individuo certa ratione variat, ita etiam variant conditiones inde oriundorum corporis succorum, & per consequens lactis. Potest nutrix lue Venerea inquinata lac apparenter optimum habere, & alia sana non. Lac enim in mammis pro nutrimento fœtus extra uterum ejusdem ferè naturæ & rationis est, cum alimento fœtus chyloso intra uterum, ut ob id minus audiendus sit supra laudatus Helmont. interdicens ipsum lac tenellis. Nam, quod obiter moneo, omnia ea mala, quæ infantibus incumbunt, exhausto lacte è mammis, & recensentur ab Helmontio, eadem ipsa mala impendent & adhærent iisdem in utero ab eorundem alimento chyloso simul deglutito. Uti autem nihilominus providissimo consilio natura infantes nutrit in utero materia lactea; ita simili ratione extra uterum eodem nutrimento naturalissimè sustentandus est. Lactet autem mater infan-

tem utrâque mammâ; quia infantes alias fiunt lusciosi, seu Strabismo laborant, si unum tantummodò admoveantur mammæ, continuo oculos ad hanc conferunt, & ita tandem ex consuetudine lusciosi fiunt. Id quod aliàs in situ infantum in cunis observandum, ne ex alterâ tantummodò parte candelas lucentes & fenestras adspiciant; sed ita situati sint, ut vel promiscuè modò dextrum modò sinistrum latus illuminetur, & etiam candelæ utrique parti admoveantur & situentur, propter vitandum Strabismum infantum.

Jam verò tam sub tempore lactationis, quam post eandem, infantes variis corripiuntur morbis, qui dum exactè considerantur, ad duos ferè principales causarum fontes referri possunt remotè, excluso tamen semper vel vitio parentum hæreditario, vel aliunde hausto fermento contagioso. Nempe est primus fons obstinata retentio excernendorum, & secundus perversa ingestio nutriendorum. Hæc faciliè inferunt cruditatem acidam & viscidam, ex qua, tanquam causa proxima, omnes eorum morbi oriuntur. Ibi quidem eminet (1) fecum primarum viarum, & meconii in specie, suppressio; & hinc (2) insensibilis transpirationis occlusio: Hic verò offerunt primariò se vitia lactis & errata pultis. Hæc quatuor suppetunt capita generalia affectuum infantium.

## CAPUT II.

De

### *Morborum Infantium Origine.*

**N**ON absque præmeditata ratione miratur Harveus de *Generation. Animalium Exercitat. de Partu pag. m. 501.* qui fiat, quod fœtus non tantum ultimis gestationis mensibus in utero, sed etiam tandem extra uterum, dum membranis adhuc integris est opertus, & etiamnum in aqua sua manens, per aliquot horas citra suffocationis periculum superstes sit? idem tamen secundinis exutus, si semel aërem intra pulmones attraxerit, postea ne momentum quidem temporis absque eo durare possit, sed confestim moriatur? Ast æque, si non magis mirabile videre possit, quod fœtus ex tam subitanea, adeoque apparenter periculosa mutatione, quam subit, simul atque ex claustris vapidis uteri materni in liberum apertumque irrupit aërem, non statim graviter & fere lethali ter ægroter? quidni enim loci calidi cum frigido, humidi anxiosi que æstuarii cum aura sicca patulaque permutatio, & ab aëre in pul-

pulmones primo irrumpente, & inde succedente reciproco respirationis negotio maxima in sanguine facta mutatio, totius corporis sensibilem inducat alterationem? Tantam sanè, quantam post primam hanc inspirationem usque ad ultimam expirationem per totum vitæ cursum vix perferre videtur animal. Hæc ipsa, quam tunc suscipiunt corporis mutationem infantes, non ad ejus destructionem, sed perfectionem potius tendit.

Solutum facile est problema: qui fiat non rarò, quod matres quædam cacochymicæ, & in specie nostrates scorbuticæ, quos in utero feliciter gestarunt, & optimè lacteo nutrimento aluerunt fœtus, postmodum facta exclusione citra periculum lactare ipsæ nequeant, quin potius, si eosdem sanos conservare velint, conductæ ad id nutrici committere necesse habeant, qui alias sub proprio matris lacte, eo nempe, ex quo ipsæ partes corporis primo coaluerunt, adeoque iisdem appropriatissimum sit, continuo ploratu, torminibus, non rarò quoque supervenientibus epilepticis insultibus, aliisque variis pathematis, non leves ægitudines testentur, subinde ad mortem terminantes: quæ omnia alieno lactis superveniente succu, successivè evanescent, & non rarò cum optimo infantis habitu permutentur? Solutionem hujus dubij subministrat sanguinis & totius corporis per inspiratum aërem alteratio, sub qua ipsa sanguis citiori fermentatione turgescit, & ab inspirato aëre resolvitur, unde simul morbosa semina, sub nutrimento lacteo in utero matris communicata, excitantur, & ceu fermenta exotica partim sanguinis crasin vitiant, partim alios à sanguine dependentes succos, in specie lympham & bilem alterant, aut ipsum stomachi fermentum protopepticum inquinant, unde successivè largæ morbosorum affectuum segetes progerminant: Idque eò magis, quò amplius simili, inquinato nempe à morbosæ matris lacte, nutritur infans, & ita seminibus morboris, nempe igni oleum, aptissimum se multiplicandi subiectum subministratur. Simile ferè hic evenit atque id, quod tempore verno sub renovati quasi aëris inspiratione adultis etiam crebrius accidit, ut scilicet eodem tempore latentia & antea sopita morborum semina quasi evigilent, & varios affectus, & corporis passionem, ceu tot flores, protrudant. Mature ergò à mammis propriis abigant necesse est matres tales suos fœtus, & alienis in tali casu tradant, pauperculis licet, mulieribus, modò sub moderata diætâ, & laborum continuato exercitio, sanæ magis & vividæ existant, ut temperato & salubri tali lacte opprimantur

morbosa fermenta, imprimis salina scorbutica, & corrigantur sanguinis dyscrasie, quo constans & firma magis exinde conservetur sanitas. Ex hoc ipso etiam ratio indaganda, quare infantes, speciatim nostrates, recens nati, subinde tertio aut quarto à partu die efflorescentiâ cutis miliari, purpurâ, Germanis *der Griesel* dicta, affligantur, quatenus scilicet ex respiratione facta massa sanguinea intensiori fermentationis gradu agitata, salia heterogenea præcipitando separant, & ceu feculentias non ritè miscibiles ex suo misto extrudit, quæ ipsa seroso latice, ceu communi nutrimenti & excrementi vehiculo imbibira, occasione balnei in recens nato instituti, & promotæ hac ratione liberioris perspirationis, ad corporis peripheriam, in specie glandulas intercutaneas miliares, deponuntur, ubi cum rubedine, pruritu, & aliquali subsequente excoriatione seu cuticulæ desquamatione pedetentim exhalant. Revera purpuræ nostratis origo, ex scorbutica affectione matrum, originem ducere videtur.

Monitum fuit suprâ ex spiritus ascensu majori ab inspirato aëre promota, indeque spirituum vitalium concitatori impetu, in organis quibusvis insignem ad motum nisum excitari. Exinde namque originem ducit, quod fœtus recens editus non tantum artus validè moveat & vibret, adeoque digitos variè inflectat, sed quod in specie urinam brevi post per urethram emittat, crebriori vomitu cruditates stomachi ejiciat, & alvicrementa varia protrudat: Quæ ipsa in utero nunquam naturaliter excernuntur, adeò, ut certum signum fœtus in partu ex labore & nimio conatu mortui referatur Velschio de *Ægagrop. Dissertat. 2. pagin. 61. Curat. 61.* si meconium seu alvi excrementum, antequam fœtus prodierit, emittatur; ut ut contrarium huic asserto exemplum reperiatur apud Rulandum, *Thef. Curation. Empiricar. Centur. 3. c. 66. pag. 300.* Sternutare etiam interdum fœtus recens exclusus observatur, dum ex membrana narium irritata, nervis intercostalibus per consensum connexionis affectis etiam convulsiva partium, cui inseruntur, sequatur commotio & concussio. Hæc ipsa tamen omnia cum opera potius sint naturæ, quam morbosa symptomata, ob id propius ad affectus præternaturales accedamus.



## CAPUT III.

De

*Retentione Excrementorum  
in Fœtu, & Assumtorum  
Vitiis.*

## ARTICULUS I.

De

*Retentione Meconii.*

**P**Ræter ventriculum albicante plus minus lentaque materia refertum, pituitosa, flava, & variegata recrementa interdum intestina tenuia occupant, in crassioribus verò excrementa dura, crassiora & quasi picea, ex nigro viridescencia, papaverculum seu meconium quibusdam appellata (utut meconii vox generaliter Hippocrati *de Vi&eacute;. Acutorum Sc&eacute;t. 69. Nom. 9.* quo primum natis exit excrementum, denoter) hospitantur, & omnia hæc ex nutrimento, per os sub formatione & nutritione fœtus in utero hausto, genita sunt. Hæc ipsa verò maturè ex corpore infantis expurganda sunt, ne diutius retenta aut pertinacem alvi obstructionem inferant, aut lactis nutritivi distributionem impédiant, aut sub distributione per intestinorum gyros idem corrumpant, & æruginoso virore tinctum ad corruptionem & cadaverisationem disponant; aut intestinis pertinaciter adhærendo, & aciditate rodendo, tormina crudelia inferant. Quemadmodum & meconium retentum (æpissimè est causa; quare recens natis interdum tertio aut quarto die à partu efflorescat Icterus, imò ipsis interdum connascatur; item meconium retentum (æpissimè causa est, quod infantes afficiantur aphthis seu ulcusculis oris, quatenus hoc meconium lac haustum coagulat, spissat, & acescere facit: Unde si meconium tempestivè vel per assumptum vel per colostrum evacuetur, ab omnibus his malis possunt præservari. Hinc ipsa natura provida ordinaria lege mox à partu est occupata, ut partim vomitu, partim secessu, infantes expurget, etiam antequam aliud quid moliatur, præmonstrans his ipsis viam ministro Medico, quid sub tardiori ejus conatu ipsi agendum sit? Præ ceteris meconium malè audire solet, idque suo merito; nam acidum præternaturale est, quod in ejus recessu peccat. Cum enim oriatur ex nutrimento fœtus quasi lacteo in utero, nil aliud esse videtur, quam crudior caseus, à reliqua substantia nutritiva separatus & quasi præcipitatus: qui ipse acorem in stomacho semel conceptum plus minus retinere solet, indeque occurrente in

intestinis bile obscurum, ex nigro viridescens: tem colorem contrahit, & pedetentim in intestinorum cellulis sub mora diuturnioris coagulatur firmius, & eò magis nocens evadit: quæ ipsa mutatis mutandis & reliquis recrementi accommodari possunt.

Pro meconio ergò purgando nil æquè convenit, atque colostrum, quod est aquosius, salius, & vi abstersiva præditum: & cum alimentum medicamentosum infantes blandè purgat. Hoc si fieri nequit, studiosè incumbendum est in id, ut pharmacis nihilominus evacuentur dictæ sordes ex primis viis, tam per vomitum quàm per secessum.

## ARTICULUS II.

De

*Transpirationis Occlusionē.*

**I**Nfantes cum copioso sustententur nutrimento, ob id necesse est, ut copiosè quoque transpirent, partim ut nutrimenti, tam universalis seu remoti in massa sanguinea, quàm particularis seu proximi hinc inde distributi puritas, ab omni vel heterogenea vel effœta feculentia, partibus non assimilabili, facta rectaque conservetur, partim etiam, si quid feculenti sub nutritione enatum ipsis commissum sit, ex partibus solidis eliminetur. Jam verò notum est, infantum corpora ordinariò crusta quasi aut mucilagine viscida & glutinosa obducta esse, quæ lanugo oritur ex liquore nutritivo, in quo innatat, à quo mucosè successive cuti extrinsecus adhærente insensibilis halitus effluxus insigniter impediri solet. Retenta igitur talia transpirabilia in massa sanguinea si coacerventur, hujus æquabilem turbant fermentationem, & ad febres ordinariò disponunt; sin verò sub poris cutis deposita hæreant, & variam corruptionem subeant, & cum simul sint naturæ salinæ, & sapore salso, adeoque composito prædita, plus minus licet: Vid. Tachenius *Hipp. Chim. pagin. 78.* exinde facilè sub cute hærendo suâ corruptione intensam acrimoniam contrahunt, nunc salam simpliciter, nunc acido-salam, nunc urinoso-salam, ut plurimum acido-salam, unde digestiones particulares seu privatæ partium subcutanearum turbantur, & cutanei affectus efflorescunt, alterato & corrupto ab illis retentis nutrimento dictarum partium proximo, simulque destructo plus minus fermento dictarum partium digestivo; qui affectus eò promptius eveniunt, quò magis excrementa transpirabilia ex mucilagine minus temperata, sed magis aciore, vel saliore, vel facilè accessibili, vel alio modo vitata, originem ducunt; sive fiat vitio nutriticis perversè lac infanti præbentis; sive vitio digestionis primæ in infantibus, vel non corri-

ARTICULUS III.

De

Vitiis Lactis.

corrigentis nutrimentum minus adæquatum, vel ipsum acore præternaturali inquinantis. Quodsi verò dicta transpirabilia retenta fuerint magis temperata, & nonnihil pingua, adeò ut minus ad acrimoniam falso-acidam degenerare queant, fit, ut cohibeantur partim sua sponte, partim tepore loci humido, in infantibus semilacteis ad putredinem ruant, & emergente tunc alcali destruyente acidum larga seges animalculorum variorum pedentium emergere soleat.

Ut verò insensibilis promoveatur transpiratio, auspicatò solent mulierculæ recens natos infantulos immergere balneo aquæ dulcis tepido seu subcalido (non, qui asperimus & sanæ rationi pariter ac constitutioni sanæ reluctans erat veterum Germanorum mos, de quo vid. Sennertus *lib. de Morb. Infantum Part. 1. cap. 4.* aquæ frigidæ aut flumini) ut illius medio abluantur sordes viscosæ, lanuginis instar tegentes tenerrimam cutim, & accedente blandâ frictione aperiantur & magis patuli reddantur conniventes aliàs cutis pori. Non ineptum est, ut simul saponis adjumento fiat sordium ablutio, & hujus alcalinâ lixiviali acrimoniam promptius detergantur ista caseosa quasi concretamenta extracutanea, quia satis sunt viscosa, & difficilius removeri possunt: postmodum si reiterantur crebrius hæc balnea, ipsi aquæ, quæ abluuntur, parum lixivii communis addendum erit, ut eò melius tam resolvantur & detergantur dictæ sordes, quam etiam hujus alcalini salis beneficio præcaveantur maturè affectus infantum cutanei; sicuti hos affectus jam inductos dicta alcalia fixa optimè tollunt. In communi recipiunt farinam pisorum, & hujus medio abstergunt infantes toties, quoties balneantur: Nempe reiteranda est sæpius hæc balneatio, quoties sanitas infantis & vires permittunt, idque in specie primis septimanis, in quibus quotidie balneandi sunt infantes, reliquis alternis aut tertiis diebus, donec exactè purificatus, glaber, mollis, rubicundus atque nitidus appareat fœtus; aliàs enim suggerunt occasionem vel febrium, vel affectuum cutaneorum. Unde non rarum est, quod flavedine quodammodo croceâ, adeoque ictèritio colore tincti in lucem prodeant infantes, aut tertio vel quarto die post partum dictus color superveniat; qui extraordinarius color vix melius dictis balneis detergi penitus & deteri poterit; quibus convenit etiam, si gr. j. croci optimè triti in lacte nutriticis vel alio conveniente liquore exhibeatur fœtui, & aliquoties in die propinetur, quo ipso dicta cutis defœdatio extingui potest.

Tom. II.

Lactis vitia sunt varia: quorum primum est, quando fuerit alienum, h. e. dum non à propria matre tenellis porrigitur mamma, sed nutricibus hoc negotium committitur. Quod ut pateat clarius, præsuppono:

1. Fœtum in utero materno nutriri non solum per umbilicum, sed simul etiam per os.
2. Nutrimentum utrobique non esse sanguinem, sed lac sive chylum lacteum, cum sanguine per arterias ad uterum delatum: Vid. præter l. c. Needham *or. Tr. de Form. Fœtus cap. 1.*
3. Lac mammæ & ipsum revera esse chylum, in mammæ glandulis secretum, & ductibus particularibus exinde ad papillam delatum: Vid. Deusingius *de Lacte*, & Charleton *Exerc. de Galaxia*.

Jam verò unicuique mulieri suum proprium est lac, seu specialis lactis proprietas ac idiosyncrasia (ut taceam lac diversum in una mamma observatum fuisse ab eo, quod erat in altera, à Lysero *Observ. XI. annexa Cultro suo Anatomico*) eaque oriunda ex speciali fermenti digestivistomachalis differentia. Diversum ergo lac mammæ nutriticis, à lacte uterino matris necessariò in stomacho infantuli tali lacti aliàs non adjecti, (cum consueta longo tempore, licet deteriora, insuetis minus molesta esse soleant, juxta Hippocratem *sect. 2. Aph. 50.* idque ob intimam symbolizationem alimendorum cum fermento) alterationem insignem infert, & plus minus ad corruptionem pergit, aut digestionem primam necessariò insigniter turbat; quin undò lac istud alienum distributum ulterius in massa sanguinea heterogeneitate sua turbat hujus crasin, & fermentationem vitalem, antequàm successivè stomachi fermento alterato, & sanguinis crasi immutata, conveniens magisque homogœneum fiat nutrimentum, cum generalis stomachi digestio præsit quibusque singularum digestionum culinis. Speciatim cum matres subinde vivant opiparè, & ita cæteris paribus lac nutritivum generent, nutritices verò adscititiæ sit ut plurimum pauperculæ, & quibuscunque eduliis subinde latranti satisfaciant stomacho, vix fieri potest, quin & cacochymia in iis superveniat: Vid. Sennertus *de Cura Infant. Part. 1. cap. 1.* & sic lac maximè est diversum & contrarium lacti matris, ex quo co-aluit fœtus: unde per dictum lac tam vitia naturalia, quam moralia à nutricibus traducuntur

(Tcc tcc)

tur

tur in infantes, de quo meritò conqueritur Helmontius *Tractatu Infant. Nutrit. pag. m. 623.* cum legitimo sentu verillimum sit illud Galeni, quod mores sequantur temperamentum corporis: sic puella v. g. observata fuit admodum siticulosa ex nutrice bibacula à Deodato *Valetud. pag. vigesima sexta.* Cum & brutales proprietates & mores cum lacte in infantem penetrent ac in vitam perseverent, ut in pueris à cervæ, item à capræ lacte nutricis observatum fuit; Reyes *Camp. Elyf. quest. 41. pagin. 586.* Hic Lipsiæ aliquando infans ob defectum nutricis lacte caprino nutritus fuit, qui adhuc vocem capræ imitari potest. Sed hæc cum minus faciant ad scopum nostrum, ob id vel summis labris ea delibasse sufficiat. Quæ ipsa de lacte ex chylo elaborato explicata hætenus, fortius adhuc eos stringunt, qui ex sanguine lactis fontes derivant. Proprium igitur matris lac, si fieri possit, infanti est propinandum, quod est omnium optimum; quia ex hoc primò concrevit infans, nec sine insigni alteratione alterius lacti adsuescit, imprimis si mater sana sit, vel non admodum morbosa, & habeat lac negotio sufficiens, alias in ejus locum, utut deteriolem, eligenda est nutrix, quæ mammas infanti præbeat: Vid. Sennertus *Tr. de Morb. Infant. Part. I. cap. I. quest.*

Hæc ipsa simul ostendunt, quàm aliena sit à vero eorum opinio, qui consideratione facilis corruptionis lactis in infantulis, indeque natorum variorum malorum, alio potius nutrimento, quàm lacte, tenellos cibare & educare malunt; Adeoque vel hordeata jacula, vel ex crepatura hordei addito vitello ovorum emulsioni similem misturam, vel jacula avenacea, vel amygdalorum emulctum lacteum succum, aliudvè simile substituunt: quo etiam nutrimentum Helmontii pro pueris, *Tr. Infant. Nutrit.* pertinet, ex pane tantisper cum tenui cerevisia bullito cum melle. Si quidem nec frustra, nec sine prægnanti ratione, aut ornatus saltim gratiâ, mammæ mulieribus, & in iis mox post partum lac, non secus ac reliquis brutis terrestribus, uti & quibusdam aquatilibus, concessum fuit à natura; quin hæc ipsa potius digito quasi intento hanc foetuum nutritionem monstraverit. Hinc aves mammis carentes earum defectu grana deglutita, & in ingluvie aliquali mora macerata, ac ita ad fundendum citius lacteum suum nutrimentum prædisposita evomunt denuò, pro melliori pullorum sustentatione. Tenerior siquidem infantum est stomachus, minusque exaltatum fermentum eorum digestivum, unde quæcunq; ferè ingesta laboriosam saltem, si non & defectuosam penitus redderent digestionem; quæ facillima & summè nutritiva erit, dum lac ceu chylus jam ante in nutrice elaboratus ipsis suggeritur: Talis scilicet suc-

cus, ex quo & primitus machina eorum corporea constructa fuit, & ipse foetus jam in utero sustentatus, & quem ceu jam consuetum facillimè digerere & concoquere potest. Quod si quædam ex lactis alteratione in infantibus metuenda erunt pericula, ea sanè in se sunt facillè corrigibilia, modò maturè & legitimè iisdem occurratur. Unde & rarissima eorum observata fuerunt exempla, qui defectu nutricis feliciter adoleverint.

2. Secundum lactis vitium est, si fuerit morbosum: sive ergo nutriatur à matre, sive à nutrice sitiens puerulus, nisi vegeta & sanà gaudet corporis œconomiâ, indubitatum est, varia morborum semina radicesque firmissimas tanquam per medium fomitem transplantari in foetum: Si Lithiasin ex nutrice calculosa derivatam in puerum, cujus fratres priores à calculo liberi fuerunt, not. Helmontius *Tr. Nutritio Infant. ad Vitam long. & de Lithiasi*: Sic lues Venerea, scorbutus, &c., quorū contagiola indoles per se notissima, per lac communicata sunt foetibus, ita ut quæcunque contagia morbosa ex nutrice vel matre facillè deriventur in infantem, si non sint sanæ: Luc Venerea per matres infectas puellas inquinatas binas observavi in nosocomio Patavino: Nutrices habitus serosioris ad affectus catarrales proclives reddere, quos nutriunt infantes, compertum est. Sed res ipsa cum loquatur, quid opus ulteriori diductione? quin etiâ sana licet in proprio corpore deprehendatur nutrix, si tamen propriæ constitutionis causâ, idque ex ratione peculiaris in stomacho digestionis, vel serosioris & salisioris sanguinis constitutionis, vel certæ in glandulis mammarum texturæ, serosius, acrius aut salisius, alio vè modo minus conducens infanti lac colligat, etiam citra sugentis noxam id propinari nequit, quin nutrimentum tale, ipsi minus appropriatum, hostile & inimicum evadat.

3. Tertium lactis vitium est, si fuerit nimis nutritivum. Scilicet utut sanissima etiam sit mater vel nutrix, tamen tenello infantulo ipsum lac probè excoctum, crassius, spissius, adeoque magis butyrosus & nutritivus, non æquè primò statim haustu convenire videtur, quia in utero materno adhuc conclusus foetus nutrimento lacteo tenui & limpidò fuerit sustentatus; unde mox à partu si tale lac hauriatur, ab eodem oneratur ejusdem stomachus, & exinde varia recrementa coacervantur. Ob id nempe provida mater natura post partum matribus in salutem editi foetus in marnas derivat colostrum, h. e. serosiores tenuioresq; chylum, quod præmittitur lacti perfectò, pinguiori & spissiori, 3. vel quarto die demum supervenienti. Matres ergo quàm pessimè infantes statim nutricibus robustis, obesis aut pinguibus, aut quæ jam aliquamdiu lactarunt, exponunt, quia ab harum lacte butyroso & caseoso



casco nimis oneratur stomachus tenellus, & digestionis opus inde insigniter retardatur, ac cruditati acidæ, lactisque coagulo, promptissima occasio subministratur. Illustrat hæc epilepsiæ exemplum aliquot filiabus lethale, ex nimia lactis, materni licet, butyrositate & pinguedine, quod recenset Hoffmannus *Tr. de Usu & Abusu Medic. Chym. pag. 49.* de quo etiam imprimis contra Medicum quendam sufficienter egregiè disserit Veslingius *in Epist. & Obs. 28. pag. 123.* & antè eum Spigelius *in erudito scripto de Format. Fætû, cap. 13. pag. 16.*

Sed tolerabile adhuc, quia facilè corrigibile, esset hoc erratum, nisi IV. gravius, longe familiarissimum licet, se offerret vitium, nempe superflua & inordinata lactatio & tantum non per vim lactis infusum in os & stomachum infantis, ut subinde mater aut nutrix pueros suos nimis alendo sæpius nocet, aut lactando macet, ut rectè observat Kerckringius *in Spicileg. Anat. Obs. 40.* Familiare enim est, ut infantibus ad quemvis ex quacunque causa excitatum ejulatum, ipsis renuentibus licet, sæpius præbeant mammam, & una die decies imò vigesies lactent, antequam prius lac haustum ex toto digestum; unde crudum adhuc & subacidum in stomacho hærens, à superventu novi lactis grumescit, caseatur, & ab it in mucilaginem acidam, viscidam & tenacem, atque sic unum corrumpit alterum: unde ab hac inordinata ingestione & corruptione pylorus indignatur, ut vel, salutari licet effectu, omnia ista viciata vomitu rejiciat, vel eadem corrupta, & caseata se pertinaciter stringendo transmittere nolit, hinc infantibus mille impendent mala. Secundum Kerckringium enim I. a. pylorus in infantibus se firmiter claudit, unde ea ulteriori mora in stomacho retenta, in loco isto tepido in deterius, ac ex cruditate acidam corruptionem putredinalem delabuntur, & in liquamen putridum, flavescent, nidorosum, viridescens, &c. tandem degenerant: Vid. Helmontius *Tract. Infant. Nutrit.* qui tragœdiam hanc graphicè & eleganter delineavit.

Lactet ergo nutrix fœtum, quantum sufficit, cavendo imprimis, ne crebrius seu sæpius accopiosius fiat: nam alias aut acori seu cruditati acidæ, aut nidori seu corruptioni nidorosa lactis occasio datur. Præstat sanè peccare hic in defectu, quam in excessu, cum repletiones ad extremum productæ graves esse soleant, teste Hippocrate *Sect. 1. Aphor. 14.* & sicut in adultis omnis repletio, in specie panis, est pessima: ita sanè lactis in infantibus nocet: hinc enim consequenter impura corpora, quo magis nutriveris, eò magis læseris, Vid. Hippocrates *Sect. 2. Aphor. 10.*

Unde V. periculosius jam urget fatum missellos lactentes, si lac per perversam & sæ-

pissimè inordinatam dietam matris vel nutricis fuerit depravatum. Dietæ peccata sunt.

1. Varia alimentorum ingluvies.
2. Affectuum neglecta refrænatio; &
3. Excernendorum pariter ac retinendorum neglectus.

1. Quod attinet assumpta; Equidem sanis omnia sunt sana, modò per internam appetentiam assumantur, & sobriè ingerantur; quod enim sapit, nutrit. Adeò ut in sanis scrupulosus alimentorum delectus revera sit frustraneus, quin potius, si appetitus circa aliquid objectum feratur intensius, imprimis consuetum (nam in insuetis appetitus subinde medicamentum quærit) vix denegandum sit, quia fermentum digestivum potenter quælibet in sui ditionem trahit & coërcet, ut ut talia cum moderamine mediocritatis propinanda sint, cum sobrietas rectè cardo totius dicatur dietæ. Res nota est de purgantibus, quæ à nutrice assumpta subinde graviter infantem laxant, & omnia imprimis propriè dicta infantibus sunt inimicissima. Notum est de aniso, quod pro augmentando & corrigendo lacteo chylo propinatum nutrici, sui in eo vestigia odore repræsentet. Tacebo peculiare idiosyncrasias infantum quoad certa assumpta, à parentibus transplantatas, quæ à nutricibus neglecta graviter tenellos lædunt, quorum exempla recenset Digby *de Nat. Corpor. Tr. I. cap. 38. p. m. 424. & 436.* Imprimis autem urgentur quæcunque acida aut acescentia, sive sint condimenta sive potulenta, mox sui vestigia in dulci lacte, ut ut sensibus abscondita, relinquunt, quæ ordinariò ejus coagulatio & congrumescencia, & corruptio in excreta viridia & acria, manifestè acorem spirantia, &c. sequuntur; unde tunc temporis tormina infantibus molestissima, ab acido intestina torquente, convulsiones & epilepsiæ, ardores & insultus febriles, ab acore peregrino sanguini infuso, aphthæ, achores, favi, tinez, abdominis inflationes, & similia. Casco itidem non immeritò interdicitur nutricibus, ne hoc, tanquam præmaturo coagulo, ad grumescenciam præternaturalem jam in marnis lac disponatur. Cerevisia non ritè fermentata, aut à fecibus depurata, ut ut nutrici sine torminibus aliaque noxa propinetur, à fermento stomachi ferè subacta, tamen lac corruptum ab ea pueris diarrhæas torminosas excitare solet. Quod etiam de fructibus horæis succulentis, uvis, musto, prunis, & similibus facilè fermentescibilibus, verum est, quorum esu infantes solent disponi ad diarrhæam torminosam: sicut aridiores e contra alvum pertinacius sistunt, dum refert Timæus von Guldenslee *in Cas. lib. 5. Casib. 15. pagin. 252.* ex eo, quod nutrix castaneas copiosius assumpserat, alvum infantis pertinaciter obstructam; sicuti ex

(T t t t t 2)

florum

florum sambuci lacti incoctorū uberiori haustu & nutricem & fœtum copiosè purgatas esse observavi : Conf. Bartholinus *Cens.* 2. *Hist.* 93. pag. 338. utut aliàs insons soleat esse potus, imò admodum proficius pro lactis augmento.

Affectuum exorbitantiæ jam attingendæ sunt, quorum inordinatus insultus, ut generaliter spiritus animales, totumque genus nervosum, & his mediantibus massam sanguineam & reliqua corporis contenta liquida commovendo, insigniter alterat; ita specialiter nutrientium corrumpit lac. Imprimis dum nutrix affectuum agitata fluctibus nunc irâ, nunc libidine æstuat, nunc terrore perculsa; ex his enim lac inspissatur, & ad coagulationem & corruptionem disponitur: unde lac ita alteratur, ut exinde epileptici insultus frequentes, in specie ab ira, superveniant infantibus. Turbant sanè affectus omnes concoctionis primæ negotium, adeo ut ex tristi nuntio esurienti inopinatò allato, adeoque incusso sic terrore, statim pereat omnis appetitus, unde digestionis consequenter impedimenta, & cruditatum acidarum occasiones: qui effectus itidem ex iræ furore expectandi sunt, sub cujus fervore vel maximè sanguinis ebullitio & quasi febrilis effervescencia cum bilis orgasmo consideranda veniunt. Ex alterato ergo ac depravato chylo simile generabitur lac, aut hoc genitum licet in statu pacato, sub intestina tamen affectuum rebellionē, & inde nata omnium corporis contentorum à spirituum vario ac præternaturali impetu, non potest non insigniter alterari, & variè commotum & quasi secundum minima concussum, in partes secedere, & butyri ac casei ex seroso vehiculo quasi separatione præternaturalem pati: Sic terror non minus, quàm iracundia mediante lactis coagulo, ac in mammis grumescencia, inflammationes, dolorosissimosque abscessus, & in specie erysipelas mammarum sæpissimè inferunt; Nihil magis autem infantes ad epilepsiam ordinariò disponit, quàm terror & iracundia nutricis: sic quædam puerpera voluit nutrire proprium fœtum, sed simul lactare catellum, ut lac uberius alliceretur: aliquo die casu patella porcellanea ex hypocausto decidit & frangitur, unde graviter perterrescit, unde repente ad se cùm redisset animus, mox catellum mammis, ut lac terrore alteratum exsugatur, applicat, ne isto fœtui noceret: quo facto intra dimidiam horam gravi epilepsiâ catellus corripitur; propinat eidem theriacam, unde oborto gravi somno fuit curatus. Sed præter has sensiles coagulationis & grumescentiæ qualitates novicas, & alias multifarias difformitates induit lac, ex tam variis affectuum fluctibus, quibus sanè non tam matres, quàm specialiter nutrices, obnoxie succumbunt, quarum singulæ infantis nutrimentum lacteum

morbosè disponunt; hinc in varia liquamina cadaverisatur, unde excrementa nunc intensè flava dulcia, nunc fœculenta fœtida, instar fecum cerevisiæ: nunc ex nigro putrida, aut alio modo corrupta, imprimis in diarrhœa infantum, rejiciuntur: quin & vomitus, febres, atrophia tandem, aut saltem varii cutanei affectus superveniunt, quæ ita fœtus sanitatem graviter labefactant.

Præter dictas lactis materni depravationes, ab affectuum exorbitantiis oriundas, matres etiam gravidæ occasione subitanei terroris, & inde ortæ fortioris impressionis; suos in utero materno adhuc conclusos fœtus notabiliter signare, aut horum cutim variis maculis de-fœdare solent, unde

Denique tertio superest consideranda ratio excernendorum ac retinendorum in nutricibus. Excreta quod attinet: hæc inter primatum obtinent menstrua muliebria; nam sicut gravidis, ita etiam in lactantibus naturaliter supprimuntur menses, probabiliter in salutem fœtus. In habitioribus tamen, sanguine turgescentiore præditis, viragimbus dictis, vel plethoricis, subinde primis gestationis mensibus, etiam adhuc sub ipso lactationis tempore iisdem ordinariâ periodo crebrius fluunt, qualia collegit exempla Schenckius in *obs. p.* 754. & 630. Jam verò observandum, quoties nutrici fluunt menses, quod tunc fœtus minus commodè se habeat, & sensibilis in eo observetur alteratio, languidus, lachrymosus ac imbecillis sit toto menstruationis tempore; quò cessante cessat etiam dictus languor fœtus: Id quod itidem observatū à Paulo Zacchia *quest. Medico-legal. lib. 7. Tit. 3. quest. 3. pag. 599.* Nempe certa fermentatione massa sanguinea sub menstruatione agitur, & turgescit, unde & menstruum febrim, sive omni mense, cum sanguis per genitalia evacuetur, recurrente, ex aciori scilicet sanguinis effervescencia observavit Lindanus in *Coll. Manuscr. super Hartm. Præx. Chymiatricam*, sub qua commovetur camarina caco-chymix; unde tunc menses partim curant, partim præservant multos morbos chronicos. Si ergo commovetur camarina sub lactatione, exinde lac tunc temporis alteratum, & similem fermentativum concipit motum, qui & turbat infantis primam digestionem, & vitalem sanguinis fermentationem vitiat, fœtum lædit, & eundem ægrotum reddit; forsân simili quodammodo ratione; atq; quando adulti cerevisiæ potui vel vini adfucti, ex potu talis liquoris adhuc non nihil fermentantis, ceu extraordinariè affecti subinde non leviter læduntur. Imprimis insigniter alteratur lac, si furtivâ nutrix utatur Venere, aut clanculū dehuò fuerit imprægnata; corrumpitur hinc lac, & horridam quodammodo acquirit impressionem, fœtui novicam; unde istud nauscat infantis stomachus, ut subinde spontè se abla-

se ablaſcent infantes: id quod & in brutis obſervabile eſt, ut curioſo exemplo obſervatum à Græſio *de Organ. Virorum Genital. pag. 126.* de cane ſelem lactante. Lac ita depravatum, ne dicam corruptum, ab infante hauſtum, tanquam hoſtile, aut in ejus ſtomacho in peregrinum caſei coagulum abit, tenello infantis ſtomacho mirè infeſtum; adeo ut eidem exinde ſtigma, caſei averſatio multis familiaris, & per totam vitam durabilis imprimatur; aut lac aliâ ratione in liquamen dulce putridum, flavescens, &c. alteratum, diarrhœas, maciem, ac modo dicta mala infert. Ob id & Medicorum eſt præceptum, ut toto lactationis tempore nutrices à coitu abſtineant; unde etiam lactantes matres à redditione debiti excuſat, propter inſignia fœtus nocumenta, Paulus Zacutus *loco ſupra citato.* Quod verò ex alteratione lactis poſt imprægnationem, & inde in ſtomacho ejus facta caſeatione, oriatur averſatio caſei, poſtmodum per totam vitam durabilis, præ cæteris eleganter deducit Martinus Schoockius *Tract. de Averſatione Caſei, & Digby Tr. Immortal. Anima hum.* uti & *de Nat. Corpor. cap. 38. pag. 437.* & denique Schottus *in Phyſ. Curioſ. pag. 534.*

C U R A.

Lactis hæc & lactationis vitia aut errata ex iis, quæ hætenus dicta ſunt, facillimè quivis corrigere valet; nempe ſemper habeatur reſpectus, ut omnis ejus ſub digeſtione prima oriunda vitioſa aceſcentia, hincq; grumofa coagulatione, ceu familiariffima vitia, præcaveantur. Unde in infantum curis vel maximè nutricum habenda eſt ratio, cum peccatorum earum pœnas ſæpiſſimè luant infantes inſontes. Propterea mulieribus vel nutricibus commendatiſſimus ſit uſus aniſi, & hinc fœniculi, ſive ſemina eorum poſt ſingulos paſtus comedantur, ſive radix ſaltem & herba fœniculi quacunque ratione uſurpetur, & ex his parata medicamenta; nam præter lactis ubertatem, etiam ſaluberrimam vim, & corruptioni minus obnoxiam, ipſi ſimul conciliant, aromaticâ volatili oleoſa naturâ vitioſam & præmaturam lactis aceſcentiam & coagulationem prohibent & corrigunt; quin & tormina & ſtatus infantis feliciter tollunt, blandeque inteſtina abſtergendo infantes laxant. Caveat nutrix ſimul ſedulo, ne aquæ frigidæ diutius aut crebrius manus immergat, vel ne crebrius pedibus nudis in loco frigido ambulet, & ſtatim lac infanti infundat; ſic enim ſtatim lac in mammis alteratur, nec infantes tantum, ſed & ipſa nutrix, ventris tormina ſolent pati.

Quod ſi inopinato terrore percuſſa, vel ira commota fuerit mulier vel nutrix, lactisque graviorem alterationem metuat, primò omne lac ex mammis prius emulgeat, poſtea aſſumat ſpermatis ceti ꝑ. ad ꝑ. cum lapillorum

cancrorum, vel antimonii diaphoretici, vel coralliorum gr. xv. ad ꝑ. in hauſtu cereviſiæ calidæ, & ad blandum ſudorem ſe componat, quo omnis lactis corruptela ſic emendetur; Vel

℞. C. C. ſ. Δe ꝑ.

Θis card. bened. xv. M.

capiat in aqua ſorum ſambuci, & blandum ſudorem expectet.

Vel in tumore, dolore, & duritie ſuperveniente, & ita inflammationis metu:

℞. C. C. ſ. Δe ꝑ.

Θii diaphor. ꝑ.

Θvol. C. C. aut viper. gr. viij. M.

Vel horum loco ſpiritum ſalis Ammoniaci à ꝑ. ad ꝑ. in aqua cardui benedicti hauriat, & ſudorem plus minus largum expectet, imponendo ſimul mammæ, in leviori quidem affectu, emplaſtrum de ſpermate ceti Mynſichti; in graviore verò inducendo mammæ emplaſtrum de galbano crocatum Mynſichti, cum ana gummi Ammoniaci, in aceto deſtillato ſoluti, invicem liquefactis, & linteo denſo inductis, conſectum, quàm calidè perferre poſteſt: utroque in caſu de ſuper ſacculum interpaſſatum ex oryza conſectum probè calefactum imponat, ut per ſudorifera iſta alcalina diſſolutum lac horum adjumento promoveatur in motum, & ſtagnatio ejus ac grumeſcentia ita corrigantur maturè. Aliud emplaſtrum, lactis coagulationem à terrore præcavens, habet Sylvius *in Praxi pag. 387. §. 45.*

Uti autem in infantibus adhuc lactentibus imprimis habenda eſt ratio corruptelæ lactis, & inde natorum liquaminum multiplicium, in ſpecie cruditatis acidæ, ita in infantibus ablaſtandis habenda quoque eſt ratio digeſtionis primæ, propter voracitatem ſeu adiphagiam cumulatorum excrementorum acidorum viſcidorum, unde morbi infantum ablaſtatorum maximam partem oriuntur.

Quoad ablaſtationis tempus: lactet infantem mater præter propter annuo ſpatio; ablaſtandus poſtmodum venit commodiſſimè verno & autumnali tempore poſt æquinoctia, idque potius creſcente luna, quam decreſcente. Sub alteratione hac maximè læduntur infantes à potu nocturno cereviſiæ, vel aliorum liquidorum; hinc enim ſtomachi atonia, inflatio totius abdominis, diarrhœa, & mille mala ſuperveniunt. Propterea potui nocturno ſemper aliquantulum eſſentiæ abſinthii addendum, partim ut amarore hujus deterreantur ab ulteriore potu, partim ut hoc modo medicatus ipſe potus ventriculo & primis viis medicamentofus evadat, nec ampliùs noceat. Sin verò ſupradicta mala ex potu nocturno jam orta ſint, corriguntur optimè, paxillum vini malvatici propinando: externè verò ſacculum

(T t t t t 3)

culum



culum ex mentha, roremarino, angelica, caryophyllis, mace, & similibus aromaticis, confertim abdomini applicando.

## ARTICULUS IV.

### De Vitiis Pultis.

**S**unt hæc potissimum

1. Præparatio.
2. Propinatio.

Quoad 1. detestor in pulte imprimis farinæ crudæ usum, quæ vel cum aqua simplici, vel cum lacte subacta & cocta, ac in pulmentum viscidum, crassum & glutinosum, &c. *ein Buchbinder-Kleister* / redacta, quid aliud dabit, quàm pastam tenacem, crudam & viscidam, utiliore bibliopegis pro glutinandis chartis, quam infantibus pro nutritione? Jam verò notum est, quod farina quæcunque cum aqua sufficienti subacta, & in loco tepido asservata, sponte sua & faciliè incipiat insigniter acescere, & hinc fermentare, atque spumose turgescere, etiam citra fermenti additionem: quid jam fiet in stomacho infantis, quem talis puls ingreditur, & postmodum lac butyrosus superfunditur? Ex hoc nempe præternaturali & stomacho peregrino pultis acore emergit materia acida & viscida, cui superingestum lac mox corrumpitur, & in grumos caseosos coagulatur, adeoque digestio prima exinde depravatur. Siquidem ob fermentationis farinæ in panificio pro adultis etiam summe necessariæ defectum difficillimæ eadem pasta existit digestionis, quia laboriosæ in ventriculo fermentationis. Perspexerunt hoc, & rejecerunt ob id tales pulles jam olim plures insigniores Medici, uti de hoc videri potest Velschius *de Vena Med. seu Dracunculis, Veter. Exercitat. de Verm. capill. infantum. pag. 291.* Conf. simul Hildanus *Cent. 6. Observat. 34.* qui periculosissimam pylori obstructionem, à tali spissa pulte natam, observat.

Quoad 2. culpo etiam ejus usurpationem, dum consuetæ sunt nutrices, ut pulcem prius ingerant in proprium os, & cum saliva ad debitam fluiditatem subactam postea in os infantis intrudant. Consideremus ergò salivam, & ejusdem singularem fermentativam vim, (ratione cujus proficua sanè esset ejus cum pulte miscela, si exactè sana nutrix eam institueret) quam promptè sub ejus vehiculo ratione hujus virtutis fermentativæ etiam morbi contagiosi promptissimè soleant communicari: ob id minus istam nutricis delibationem permittere possum, cum exinde facilimè ad morbosam corruptelam puls dispona-

tur, imprimis si tantillum scorbutici fermenti gingivas & salivam inquinaverit. Si ergo saliva talis nutricis vel tantillo cacochymiz vel scorbuti est inquinata, eo etiam inquinat infantem, cum tamen per se plus sit satis nocens.

Superest pultis correctio, quæ consistit in eo, ut loco farinæ sumatur panis triticeus, vel, ut vocant, similagineus, *Semmel* / qui non nihil exsiccat vel induratus, probè tritus, cum lacte vel cum aqua, adjecto vitello ovi, in pulvis consistentiam mollem coquatur, tantillum seminis anisi pulverisati superaddendo. Experientia me hætenus docuit, talem optime conducere tenellis, & ubertim eos nutrire, variaque mala præcavere. Pauciores enim sic elevabuntur flatus, & mucus erit longè liquidior post ejus usum, & minus viscidus, qui etiam facilius potest abstergi, quàm è communi pulte fieri solet. Sed etiam non nimia quantitate propinetur puls, verum tantum saltem, quantum citra coactionem absument infans.

## CAPUT IV.

### De Morbis Infantum præcipuis.

**S**ed quàm faciliè hæc imperantur, quæ tantum non impossibilia sunt, ut observentur, idque tam à matre, quàm à nutrice, non poterit tamen tam rigorosum regimen institui, quin propter multiplices circumstantiarum varietates colligatur tandem succus acidus, copiosior vel parcius, acidior vel temperatior, viscidior & pituitosior vel serosior; unde morbi infantiles plerique successivè propullulant. Sub hoc enim nutritionis cursu frequentissimis tenelli obnoxii sunt ægitudinibus, quæ & ipsæ post ablaetationem non statim desinunt, quin interdum facta ablaetatione demum se prodant, ob errores circa nutritionem commissos. Primitus intestinorum tormina frequentissimè cruciant illos, cum quibus excreta alvi à consueta flavedine subinde deflectunt, & obscuriori colore subinde viridi omnino, porraceam vocant Practici bilem, tincta apparent: quin & cum hoc peregrino colore, eadem ipsa non in debita fluida æqualiter permixta consistentia cernuntur, sed in parvos quasi grumulos discepta: *Es gehet von ihnen wie Gehacktes* / procedunt: præter quas vitiosas excretiones & copiosior alvi fluxus seu diarrhœa non rarò eos delassat. Juxta has passiones, & vigilæ pertinaces maximè necessariam junioribus somnolentam quietem tollunt, aut interrupti pavores eandem turbant,

turbant, prodromi scilicet gravioris maliepileptici, cui vel maximè ista ætas est obnoxia, sive interiores abdominis tantum convellantur partes & thoracis (quod nostrates vocant *die schwere Noth im Leibe*) sive externa concutiantur membra, hypochondriorum præterea flatulenta intumescencia, tumorq; præcordiorum angustat eosdem, non minùs quàm difficilis respiratio, tussisq; perquàm vel ex eo molesta, quod aut nesciant aut nequeant rejicere ea, quæ ad tussim proritant, nisi repetitus vomitus sponte natura vitiosa auspiciò eliminet. Utut autem viscerum & membrorum mollis extensilitas aptissima si pro uberiori augmentante nutritione; crebrò tamen exarescunt potiùs, aut deficiente nutrimento atrophia laborant, aut nutriantur licet, vitiò tamen hujus nutritii succi prava non rarò deflorescunt tubercula, in ulcera saniosa & cutaneas partes instar favorum in mellificio excedentia, aut tinea instar cranii tegmina erodentia: quibus malis nec linguæ artificiosus musculus, nec palati concamerata structura carent, quin ulcusculis, aphthis appellatis, infestentur. Ut nihil dicam de febribus variis, in specie lentis, item de variolarum, & morbillorum contagioso insultu, musteum tenellorum sanguinem, non minùs quàm paulò adultorum magis, febrili turgescencia & tantum non effervescentia turbante. Supervenit tandem & dentitio, dolorosa eadem, & pessimorum symptomatum concitatrix: non secus ac intertrigo, sive cuticulæ tenerrimæ hinc inde facta excoarctatio. Ac ne malorum aliquid desit, lumbricorum incondita turba quibus non malis mulctat infantes: in intestinis qui hospitantur, dum crinones seu capillares vermiculi intercutanea loca cætervatim inhabitant.

#### CAUSA PROXIMA.

Detectis hætenus remotioribus causarum morbificarum fontibus, dum exactiùs consideramus omnia hæc vitia, & nocendi rationem proximam seu rationem causandi, perspicuum evadit, succum vitiosè acidum, nunc viscidum, nunc aqueo-serosum, defectu primæ digestionis in ventriculo, ejusque in intestino duodeno perfectionis, adeoque ex cruditate acidæ coacervatum, esse causam proximam & radicem omnium ferè affectuum infantilium. Hunc, sive Galenicorum pituitam acidam, sive Paracelsistarum sal acidum, sive tartarum fecalem appellare velitis, mihi perinde est. Nempe omnia vitia lactis in stomacho concurrunt, inque eò magis alterantur, & in coagulum acidum abeunt. Confirmat etiam hoc medendi ratio, quæ ordinatiò & optimè instituitur per alcalia, tam fixa quàm volatilia, in specie per salia volatilia, aromatica oleosa, infantibus optima remedia, quæ acidum destruant, & serosum evacuant.

Hæc tamen non ita intelligenda sunt, ac si hæc quasi solitaria sint causa proxima horum affectuum, sed quod etiam subinde alia errata in corpore tenello observentur; ubique enim excipiendi sunt morbi hæreditarii, utut occasione tali subinde maturius expurgantur, uti & à lactantibus transplantata morborum seminaria, aut aliorum hausta contagia. Præterea lac in sui corruptione mille larvas induit, mille inde nocendi artes, non tantum, dum adhuc in mammis turget, sed in specie, dum nunc in stomacho, nunc in intestinis à bile & succo pancreatico diversimodè alteratur, subinde à restitante meconio similibusque excernendis inquinatur, quin & propriâ sponte de facili corrumpitur, unde diversimodè dulcescit, amarescit, colliquescit, viridescit, livescit, putrescit, vermineicit, aliasque quam plurimas peregrinas adsciscit sibi qualitates: nam & jam in tenellis sexcenta seu potius infinita Hippocratea, de quibus Autor *libri de Priscæ Medicina*, locum inveniunt.

Verùm hoc quibusdam paradoxum videtur, infantibus tenellis semilacteis, adeoque dulci rore chyloso ubique perfusis, ex lacte dulci primitus concretis, & eodem cum pulte insipido dulci enutritis, peccare posse acidum adeò novicum, & subinde excessivum. Sed clarius redditur facilè totum negotium, modò consideremus assumpta tam matris utero gestantis, quàm nutricis lactantis, & postmodum ipsam naturam lactis, tum facilè patebit, quod subinde acidum, etiam satis excessivum, in fœtu tenello possit congeri. Frequens est, ut mater & nutrix ex dictamine appetitus ingerant manifestè acidæ; sed posito, non vesci talibus, certum tamen est, matrem & nutricem vesci saltem pane, & bibere cerevisias: Jam verò in pane omni, in specie secalino, semper adest spiritus acidus, volatilis tamen, saluberrimus quidem in se, sed adeò potens, ut etiam duriora corpora, v. gr. corallia, vitrum antimonii, Martem, Saturnum, aliaque rodere & dissolvere queat. Jam verò panis cum aliis assumptis etiam materiam lacti suggerit, unde hic ipse acor, quamvis in stomacho sub digestionem, & in jejuno ab alcali bilis alteretur plus minus in falsum volatile; nihilominus adhuc in lacte occultus hæret, qui per se quidem est innocuus, datâ tamen occasione facilè denuo se exserit & operatur, & dicta mala infantibus infert, hinc enim tam facilis lactis acescentia, & assumpta acidæ matri ac nutrici innocua, tamen infantibus per lac, revera ad gustum dulce, sunt torminosa, & vel maximè hostilia. Cerevisiæ quoque facillimè acescunt, cum modica lupuli pinguis aromatica conditura non semper sufficiat, quin tandem acescat. Si ergò cerevisia novella, vel à fecibus nondum sufficienter depurata, fermentando in stomacho facilli-

facillimè accescens, aut cerevisia inveterata jam nonnihil acidula à nutricibus subindè ingeratur, facillè in his suo acore lac inquinat, ut consequenter in fœtu quoque evigilando lac dictum acorem possit inferre. De fructibus horæis, effervescentibus facillimè, acerariis & similibus, gravidis pariter ac lactantibus, citra reflexionem in fœtum familiarissimis, res nota est. Adeò ut acidum sit, quod morborum infantilium frequentissimus est autor; sicut subjectum ejus viscidum eos contumaces subindè reddit aut crebrius recidivantes; vehiculum vero aquosum etiam in remotioribus locis, & extrema corporis peripheria eosdem propullulare facit.

### CURA IN GENERE.

Pro horum correctione, & inde natorum morborum cura, in genere, remedia talia conveniunt, quæ acidum absorbent vel destruunt, viscidum incidunt, seu attenuant, & utrumque pro ratione occasionis, tam per urinam, tam insensibilem transpirationem, quam per alvum evacuare, primasque vias seu fomitem morbosum abstergere valent. Adeoque mox à nativitate propinanda sunt, & subindè repetenda remedia temperata, his indicationibus satisfacienda: inter quæ optima sunt ex animalium partibus parata salia volatilia, in specie oleosa, quæ optimè acidum corrigunt, & in salsum alcalinum blandum mutant, diureticum pariter & diaphoreticum; quin etiam penetrando potentissimè attenuant & resolvunt quascunque obvias cruditates viscidas, & sic lac salubre & à corruptione præservant; unde spiritus salis Ammoniaci vel simplex, vel cum aromatibus destillatus, sicque factus oleosus, item spiritus salis Ammoniaci anisatus & caryophyllatus convenit. Optimè etiam valent aliquot guttæ spiritus cornu cervi, & quem mille encomiis extollo pro curandis infantibus, liquor cornu cervi succinatus, à B. Doctore Michaëlis primitus in usum vocatus, &, hætenus mille experimentis multis in casibus adultorum pariter ac juniorum utriusque sexus comprobatus. Hæc enim salia volatilia hostiles acores altius in corpus tenellum penetrantes, & inde ortas convulsiones & epilepticas passionem corrigunt & sedant, eorumque declinantem sanitatem firmant, hinc etiam spiritus cornu cervi succinatus, pusillo ad duas vel tres, infanti unius anni ad septem vel octo guttulas, est expertum remedium in epilepsia infantum. Nec est, quod generosa nimis nimisque graduata pro infantibus putemus salia volatilia; nam circumspèctus usus in lacte nutricis, vel in aqua aut syrupo menthæ, fœniculi, &c. & limitata ad guttulas saltem dosis, optimè potest accommodari tenellis pariter ac paulò robustioribus infantibus, & li-

cet, dum propinantur infantibus, mirè mutantur, nemo tamen interit; mox enim ad se redeunt, & aliquot dosibus repetitis, iisdem quatenus consuetis minus solent angii. Volatilibus hisce alcalibus & fixa per spiritum vini temperata in solutiones tinctas etiam subjungenda erunt; imprimis tinctura tartari, & tinctura scoriarum reguli antimonii.

Præter salia hæc volatilia aciora & aromatica, conveniunt etiam infantibus ægris subiecta alia aromatica & oleosa, suo volatili sale non destituta. Inter hæc eminet anisum, ejusque semen pulverisatum recens, dosi ℥j. ad ʒß. aromatica vi vitiosas accescencias corrigit, & inde productionem flatuum impedit, blandeque intestina abstergendo tenellos laxat; sicuti commendatur ab Heurnio in *Meth. ad Prax. libr. 2. cap. 26.* Juxta hæc castoreum benedicta est medicina, mirè temperans acidum austerum, & quascunque convulsiones & tormina leniens. Myrrha quoque omnem corruptionem & acorem tollit, & balsamicâ vi quancunque corruptionem putredinalem inhibet, indeque ad vitam longam ab Helmontio commendatur *Tract. Arcan. Paracels. pag. 626.* Unde Paracellus ipse in *Consil. anti-pestil. Sterzingens.* Myrrham junioribus & infantibus, seu optimum pestis præservativum, commendat: Propterea tinctura salutis B. Doctoris Langii ex myrrha cum spiritu vini tartarisato vel tinctura tartari parata, salutare est pueris remedium, corrigens acidum, & resolvens viscidum; loco cujus etiam spiritus salis Ammoniaci cum spiritu vini paratus pro menstruo pro elicienda essentia myrrhæ capi potest. Facit huc etiam elixyr proprietatis sine acido, per alcalia nempe; vel fixa, ut sal tartari, & hinc dissoluta cum spiritu vini; vel volatilia, cum spiritu salis Ammoniaci: hoc ipsum enim iis, qui adhuc lactis gaudent nutrimento, mirificè conducit; sicut post ablationem id, quod cum acido consueto modo vulgò conficitur, tutò concedi potest.

Hisce acidum corrigentibus volatilibus, partim salinis, partim oleosis, adjungenda simul erunt denique concreta quasi terrea & paulò fixiora, acidum, quod talia rodit, in se absorbentia: qualia sunt imprimis marina seu aquatilia, ut lapilli cancerorum, & cum his vix nobilioris usus, margaritæ præparatæ, maxilla lucii piscis, unicornu verum præparatum, dens hippopotami præparatus, corallia rubra, &c. in genere etiam quævis animalium partes duræ, ut cornu cervi, tam communi modo, quam sine igne aut philosophicè, ut vocant,ustum, ut & ebur simili modo tractatum, &c. ex quibus decantatus pulvis Marchionis ferè est compositus, qui ad tormina & epilepticos insultus infantum est usitatissimus: item mineralia absorbentia, in specie crystallus, terra sigillata,



sigillata, antimonium diaphoreticum, lapis bezoar. His denique pro scopo anodyno aut theriacæ aut Mithridatii, anniculis gr. j. vel grana ij. pro una vel duabus dosibus, aut cinnabaris antimonii, aut pulvis epilepticus antimonialis, addi possunt. Nec est, ut theriacæ aut Mithridatii vel caliditatem vel narcosin opiaticam metuemus, modò à grano dimidio ad gr. j. vel ij. pro ratione ætatis propinetur; quin & acida vitiosa temperent, & inde illatas noxas dolorosas blando sapore fallant. Opiata nimis generosa nocent infantibus, tam ante quam post ab lactationem: Conf. Panarollus *Pentec. 2. observ. 27.* v.g. loco pulveris epileptici Marchionis etiam feliciter usurpari solet pulvis pro pueris polychrestus sequens:

℞. *Lapill. Ser. prap.* ʒß.  
*C. C. f. de* ʒj. ad ʒß.  
*Corall. r. prap.* ʒß.  
*Myrrh. el.* gr. vj. vel ix.  
*Ther. Androm.* gr. iij. vel jv.  
*Ol. destill. anisi* gtt. iij. ad vj.  
 M. f. Pulvis: S.  
**Rinder, Pulver.**

De hoc, quantum sufficit, in lacte matris vel nutricis, vel in pulte, vel alio vehiculo, infanti propinetur, & loco salis cardui Benedicti vel absinthii grana quædam salis volatilis cornu cervi, vel salis volatilis cranii humani, vel viperarum, permisceri possunt.

Temperatus partim, partim resolutus mutus acidus viscidus, necesse interdum est, ut foras eliminetur, idque per alvum imprimis, obstetricante naturæ defectibus arte. Optatam hic ferunt opem clysmata, imprimis cum sale tartari aut simili lixiviali acuata, quæ mucum in crassioribus intestinis resolvunt, optimèque deducunt, & stimulo reliquis intestinalis ita injecto, cætero mucos descendenti vias patentiores reddunt. Optimè parantur ex decocto florum chamomillæ, v.g.

℞. *Decoct. fl. Chamomill.* ʒj. ad ʒij.  
 pro ratione ætatis,  
*Mell. rutac.* ʒß.  
 ʒi ʒi. ad ʒj.  
*Ol. destill. anisi* gtt. iij. vel jv.  
 M. pro Enemate.

Vel loco talium enematum injiciantur ex lacte dulci, sed cum terebinthina mediante vitello ovi dissoluta permixto, idque in specie, ubi dolorosi abdominis affectus simul urgent: c. gr.

℞. *Lactis* ʒij. vel iij.  
*Terebinth. c. vitello ovi dissol.* ʒij.  
 M. pro Enemate: S.  
**Rinderend Clystier vors Reissen.**  
 Tom. II,

Quin si & fortius agendum per clysmata, ubi stimulanda alvus, & detergendus mucus, non rarò vitreus, etiam talibus ex simplici vegetabili decocto paratis, pro fortiori acumine addendus est syrupus emeticus à ʒj. ad ʒij. aut etiam infusum quoddam antimoniale, nomine aquæ benedictæ alias cognitum: qualia pertinacioribus in malis, epilepsiam jam minitantibus, quæ ferè semper in infantibus fomitem obtinet in abdomine, convenientissima sunt: c. gr.

℞. *Decoct. carmin. c.* ʒß. vel ʒj. ʒi  
 par. ʒij. l. iij.  
*Syr. emet.* ʒß. ʒj. ad ʒij.  
*Mell. rosac.* ʒij.  
 M. S.

**Abführend Clystier.**

Quoad laxantia; sanè infantes benè possunt ferre purgantia, ut rectè observavit Wedelius in *Opiol. pag. 38.* Quod si opus sit ex lacte farinaque in pulte congestum mucum per vomitum evacuare, in specie in asthmatis aut gravioris suffocationis metu, sufficit pulvis radices Ireos Forentinæ ad grana aliquot propinatus. Instar omnium sit syrupus emeticus seu oxysaccharum emeticum Angeli Salæ. De hoc, ut apud nos paratur, infanti unius anni ʒß. trium annorum ʒß. sex annorum ʒj. propinatur: Quod si viscidior mucus occupet præcordia, parum de syrupo nicotianæ potest addi: v.g. Infanti unius anni adhuc lactanti:

℞. *Hyss.* ʒij.  
*Syr. Nicot.* ʒß.  
*emet.* ʒj.  
 M. D. S.

**Brech-Träncklein.**

Propinatur pro dosi.

Quando infantes teneriores, propter fordes in primis viis copiosas, vomitu sunt evacuandi, tutissima est methodus, ut recipiatur quantitas syrupi emetici, quoad dosin pluribus guttis ætatem infantis superans, diluatur cum aquæ menthæ vel fœniculi vel alias appropriatæ, ʒß. vel ʒj. & de mistura hac aliquoties, successivè tamen, idque tutius, quam semel pro una dosi, cochleare parvum unum vel duo ad tria propinetur, tamdiu continuando, donec sufficiens evacuatio successerit, suadente hoc itidem experto Ludovici c. l. *pagin. 197.*

Sedulo nempe hoc observandum in omnibus remediis, quæ infantibus propinantur, ca nunc plus nunc minus se exserere in operando posse, quatenus vel copiosior mucus, grumusque caseosus, vel parcius, aut prout tenacior vel minus tenax in stomacho & primis viis hæserit, Faucium irritatio cum penna oleo intincta molestissimum est remedium interdum enim frustra infantes ad vomitum stimulat.

(Uuu uuu)

Si per

Si per inferiora purgandi sunt infantes, præter ea, quæ supra pro meconio removendo laudavi, omnibus palmam præripit syrupus de spina cervina vel domesticus, vel solum, vel cum syrupo de fumaria mixtus & subinde exhibitus: item syrupus de cichorio cum rhabarbaro: v. g.

℞. *Syr. de Fumar.* ʒiij.

*domest.* ʒj.

M. S.

### Eröffnend Cäfflein.

Singulare alias pro referenda alvo infantum quid obtinet muscerda, non nisi superflue delicatis horrida, cujus minutæ pilulæ No. j. vel ij. aut iij. pulverisatæ, & cum lacte, vel pulte potius, exhibitæ ad imitationem Rulandi *Thef. lib. 3. pag. 220.* optimè solent purgare infantes; vel tales pilulæ vj. vel viij. aut x. dissolvantur in lacte, per lintecum exprimantur, & exhibeantur.

Jalappa quoque absorbentibus in parca dosi addi potest, ad imitationem Ludovici in *Pharm. dissert. 1. pag. 190.*

℞. *C. C. f. Δe* gr. xij.

‡ *Jalapp.* gr. iij. vel jv.

*Ol. destill. anis.* gtt. jv.

M. pro 3. dosi. S.

### Eröffnende Pulver.

Ablactatis infantibus eadem jalappa cum tartari cremore commodè potest propinati, semper grano uno alterovè excedendo annorum numerum; v. g. pro purgando infante quadrienni:

℞. *Crem. ʒi.*

‡ *Jalapp.* aa. gr. v.

M. f. pulvis.

His ipsi quoque nodulus ex rhabarbaro pulverisato in cerevisia suspendi potest, cui addenda subinde interdum radix Helenii, quæ duo pulverisata potui ordinario in nodulo suspensa, interdum expressa, commodè satis infantes laxant; non minus quàm dimidia vel unica pilula aloëtica ab eodem Ludovico *c. l.* præscripta. Habitioribus paulò eadem mutata saltem dosi conveniunt. Manna quoque calabrina purior in pulte & infantibus propinata quantitate plus minus aucta, ʒij. ad ʒß. pro scopi vel ætatis ratione, suaviter & blandè eosdem laxare solet, sed est simul fermentativa, & flatuum torminumque in infantibus autor. Præ aliis specificè infantes evacuat Mercurius dulcis & aurum fulminans. Nam cum gravissimi infantum morbi in lactantibus oriantur ex acido in fomite plus minus viscido, & in ablaetatis ex simili cruditate acida, convenientissimus est Mercurii dulcis usus, & corrigens acidum dissolvens viscidum. Infanti, dum adhuc lactatur. gr. j. iij. in lacte, vel potius in aqua quadam destillata, cerasorum, menthæ, &c. propinatur. Mirum quantum viscida & horrida evacuat. Datur

tutò etiam febricitantibus: Item quando suspicio est de nutrice mali moris, necesse est Mercurius dulcis sedulò infantibus detur. In ablaetatis verò datur ad plura grana ferè pro ætatis ratione, tot scilicet ferè grana, quot sunt annorum, in paulò robustioribus & vegetioribus stimulum grani unius alteriusvè Jalappæ addendo; v. g. infanti trium annorum:

℞. *ʒii dulc.* gr. iij. vel jv.

*Sacch.* gr. ij. vel vj.

M. S.

### Purgier-Pulver.

℞. *Pulp. passul.* ʒß.

*ʒii dulc.* gr. iß.

‡ *Jalapp.* gr. iij.

M. S.

### Purgier-Lattberge auff einmahl.

Hic, ubi non videtur sufficere, ad aurum fulminans me accingo, cujus operationes ordinariè in infantibus sunt, quod horridas dejectiones efficiat, interdum etiam vomitus moveat, ordinariò, ante vel post evacuationem, quiete insequente: nempe acrimoniam corrosivam, in infantibus absorbet, & simul viscidissimas, sordes notabiliter abstergit. Infantibus adhuc lactentibus gr. j. pro dosi, aut in delicatioribus gr. iß. pro duabus ferè dosibus sufficit, idque quamdiu lacte utuntur; robustiores si fuerint, aut tenaciores sordes primas vias occupaverint, ad gr. ij. etiam ascendere possumus: v. g. aliquando infanti septem dierum cum coralliis præparatis auri fulminantis gr. ij. pro duabus dosibus dedi in torminibus gravioribus, in quibus epilexiæ metuebatur proventus.

Quod si ablaetati fuerint, cautior hujus auri fulminantis sit usus: quia enim in his deficit lac, aut hujus in stomacho coagulū, à quo notabiliter aliàs temperatur aurū fulminans, propterea potentiùs operatur, adeoque secundum annorum rationem grana etiam ordinanda pro dosi, & hinc est, quod ablaetato subinde vomitus moveat, minus lactentibus; item quod infanti lactenti unius alteriusvè septimanæ tantum propinare queam, quantum ejusdem lactenti octo vel novem mensium: quia nempe, quò juniores sunt infantes, eò copiosiori utuntur lacte, adeoque eo magis temperatur aurum fulminans: item quò juniores sunt infantes, eo temperatius & acidum fermentum vitale in ventriculo, quod in ablaetatis potentiùs magis valet dissolvendo, vel acuendo auro fulminante, unde in talibus etiam potentiùs operatur. De cætero, quando infantibus, tam lactentibus, quàm ablaetatis, copiosæ sordes occupant primas vias, præsertim acido plus minus corrosivo imprægnatæ, unde hypochondriorum inflationes, epilepsia partium internarum & externarum, asthmata con-

convulsiva, tormina, æstuationes universi corporis, convulsiones, &c. in talibus casibus sacra anchora est aurum fulminans, repetito in usu adhibendum. Sunt qui scammonii usum reliquis præferunt, & ejus aliquot granula in forma emulsionis propinant, vel si ejus gr. j. aut ij. syrupo de cichorio addantur. Sed acrius est, & infantibus perniciosius simplex, & vix, præterquam in ablactatis & robustioribus, locum habet. Horreo esulinam vel rithymalinam scammonii virulentiam, adultis & robustis gravem, & subinde nocivam, tantò minus infantibus tolerabilem. Quidam etiam mediante nutrice purgare volunt infantes; sed consilium est inconstans seu incertum, prout scilicet plus vel minus alterari potest remedium purgans in stomacho nutricis; item prout citius vel tardius purgabitur infans. Huc pertinet aliquomodo, quando papillis pulvis quidam laxativus inspergitur, de quo Panarollus *Pent. 5. Observ. 10.* sed propter summam incertitudinem doceos, quæ in tali casu ad fœtum certò determinari nequit, adeoque ob metum, ne plus debito purgentur tenelli, minus tutum negotium existimo: Vid. Bartholinus *Cent. 2. Histor. Anatom. 93.*

## CAPUT V.

De

### Morbis Infantū Specialibus.

**J**Actis hisce fundamentis facilis est via ulterius indagandi suprâ enarratorum morborum generationes.

## ARTICULUS I.

De

### Torminibus Ventris.

**F**amiliarissimè affligunt infantes, præsertim recens natos, tormina abdominis, *das Reissen im Leibe*/ quæ ipsis ferè sunt inevitabilia, unde infantes sunt inquieti, continuo plorant, pedibus calcitrant, mirè se torquent, & hinc inde jactant, mammas recusant; præterea subinde simul venter inflatur, aut crepitus copiosi emittuntur, alvus plus minus adstricta esse solet; & quæ excernunt, sunt aut viridia plus minus, & æruginosa, quæ ordinariò acidum odorem spirant; aut flava, sed quæ brevi post in aëre viridescent, aut sunt grumosa. Tormina hæc formaliter sunt motus convulsivi intestinorum; unde non rarum est, quod gravioribus his torminibus, cum convulsivis spasmodicis junctis, non rarò superveniant epilepsie. Materialiter seu occasionaliter oriuntur à corruptela lactis, quia lac accescendo, aut in stomacho aut post-

Tom. II.

modum in intestinis præternaturali hostili ac viscido acore intestina afficiendo, rodendo, lancinando &c. tormina talia inducit, eaque eò crudeliora, quò acidum viscidius & glutinosius se affixerit parietibus intestinorum: quin & ex acido per vitiosam cum bile fermentationem excitantur flatus, à quibus simul & hypochondria infantum, uti vocant, & præterea totum abdomen, mirè distenditur. Vidi ego aliquando tantam à flatibus abdominis distensionem, ut etiam hernia scrotalis sequeretur.

Tales infantes, qui torminibus ab acido excessivo & vitioso infestantur, habent excrementa ut plurimum viridia, sive, ut vocant porracea, sive æruginosa cum grumulis lactis excreti, cum bile salina oleosa volatili permista, ex quorum miscela viriditas ista exsurgit. Comprobat hoc experientia quotidiana, dum acida, imprimis acria, bilem solent in viridem colorem transmutare; unde simile acidum in intestinis concurrens & effervescens cum bile, istum virorem inducere potest.

Equidem viridis color revera sub concursu plurium ex miscela flavi & cœrulei emergit: flavedo in bile clara est & conspicua: cœruleus color in nullo succorum corporis unquā nec naturaliter nec præternaturaliter, observatus fuit; unde rarissimum & ferè unicum est exemplum, quod recenset Meara de lacte nutricis, sapphirinum colorem exactè referente in *Exam. Diatrib. de Febris Willisii pag. 75.* Cum tamen cœruleus color ad nigrum accedat proprius, adeoque in certa luminis maximam partem introsusceptione in poros, & cum umbralis mistione consistat, loco hujus in corpore absentis acidum, perspicuum licet, constringendo tamen & angustando aliquali subjecti coagulatione poros flavi corporis, sufficiet, imprimis si dictum acidum & ipsum in subjecto nonnihil densiore & crassiore hæreat, ut exinde viridis ceu medius inter cœruleum & flavum color emergat. Comprobat dicta experimentum Grafi *de Succo Pancreatico Thes. 145. & 147.* ubi bilis flava ex miscela cum spiritu vitrioli atro-virescentem induit colorem. Nec est, quod quoad experimenti fidem objici possit, id quod alio mihi obtigit tempore, in spiritu vitrioli adhuc contentas esse, & sub rigoroso ignis examine cum acido simul elevatas metallicas cupreas & Martiales particulas, quæ attractu alcali bilis præcipitatz virorem representent; sic ut eadem attractu gallarum in vitriolo atrum colorem induant: nam idem experimentum tentavi & cum spiritu salis purissimo, non secus ac cum spiritu nitri, & ubique idem fuit successus & eventus, id quod simili ratione de lactis vitioso acore, virorem cum bile producente, verum erit. Hinc talia sub infantum torminibus excreta,

(Uuu uuu 2) licet



licet non semper simul viridia, subinde sunt tamen grumosa; qui grumi sunt lac à præternaturali acido condensatum & coagulatum, quod istam larvam induit. Talia grumosa etiam nunc sunt viridia, nunc flava, quorum excrementorum discoloratio oritur à bile per acidum mutata & corrupta; in intestinis mox virorem contrahunt; sæpe tamen evenit, ut feces excernantur flavæ, quæ paucò tempore postmodum colorem viridem acquirunt. Causa hujus phænomeni est: (1.) Quod acidum in corpore in bilem, quamdiu in corpore fuit, non sufficienter egerit, propter impedimentum à lacte, continuò vel brevibus intervallis tantum assumpto, quippe quod ejus vim temperando infringat: (2.) quia non nisi finitâ effervescencia & factâ præcipitatione mutationem rerum accuratam observare licet, unde post factam præcipitationem, dum aer externus accedit, finitâ mutua actione & reactione permistorum, color tandem tertius emergit. (3.) quia & ipsa commista excreta facilius forsan in aëre libero novum coloris schema arripiunt, quam dum in intestinis adhuc sunt coercita. Observandum quoque hoc loco, atrocissima non rarò adesse tormina, excretis alvi aquæ instar leviter flavescens fluidis, quæ nimis fluida, subinde adeo acria observantur, ut & podex excoriari exinde soleat.

Corrumpitur lac nunc à meconio retento, nunc ex proprio suo motu alterativo in ventriculo. Meconium quidem pessimè corrumpit lac, unde sedulo à partu hoc evacuandum, cum hoc retentum ex lactis inducta vitiosa corruptela epilepsiæ sæpius recurrentis fomes existit. Proprio motu acescit lac, vel quia, nutrices acidis vinosis utuntur, vel quia copiosius nimis infanti ingeritur, unde recens priori nondum digesto supergressum promptè acorem contrahit. Vulgo refrigeratio corporis non immeritò hic accusatur; nam frigidum faciliè lædit tenellum infantis stomachum, ut exinde non ritè digeratur lac, sed acore corruptivo inquinatum ad intestina descendat.

### PROGNOSIS.

Dolores hi infantum vires prosternunt, crebrò convulsiones & epilepsias excitant.

### CURA.

In cura imprimis opera danda, ut alvus sit aperta, cum alvo obstructâ pathemata hæc insigniter exasperari soleant: hinc ea, quæ acidum temperant, viscidum incidunt & abstergunt, sunt convenientissima; adjungendo subinde blanda anodyna, dolorem sedantia.

Pro his scopis conveniunt injecti clysteres suprâ laudati, reiterandi: attendendo sedulo, an magis acrimonia acida, an visciditas causæ peccantis urgeat: ut ita delectus aliquis insti-

tuatur in clysmatibus injiciendis, speciatim si tenuia & liquida, laticis cujusdam instar, plus minus flavedine tincta, utut acerrima, rejiciantur per alvum, ut etiam, præter gravia infantum tormina, excorietur podex, sufficiunt clysmata simplicia ex lacte bubulo, vel cum vel sine terebinthina, aut cum paucò saccharo imprægnata, injecta, quibus dicta acrimonia temperari, & quæ imminet intestinorum crassiorum gravis læsio ac excoriatio, tutò præcaveri potest: si verò viscida sint, conveniunt clysmata ex decocto simplici, chamomillæ imprimis, parietariæ, foliorum & baccarum lauri atque juniperi, imprimis pisorum, cum sale tartari vel simili sale lixiviali. In quo decocto olei destillati rutæ aliquot guttæ possunt dissolvi, vel aliquot guttæ olei destillati anisi commodè dissolvantur; Electuarium etiam de baccis lauri commodè dissolvitur in his clysteribus. v. g.

℞. *Spec. carmin.* M. j.

Θ̄i ʒj. ad ʒʒ.

coqu. in l. q. ∇ a simpl.

Colat. ℞. ʒʒ. ad ʒij. (prout pro uno vel duplici clystere præscribitur.)

adde

*Mell. rosat.* ʒʒ. ad ʒj.

*Ol. dest. anisi.*

*Bacc. juniper.* aa. gtt. iij.

M. pro Clysmate, S.

*Uinderend Clystier.*

℞. *Decoct. Pisor.* ʒij.

*El. de bacc. lauri* ʒʒ.

Θ̄i ʒ.

*Ol. dest. succini* gtt. jv. ad vj.

M. t. Enema.

Præter ista clysmata internè conducunt lenia abstergentia, quæ sunt syrupus rosarum solutivus, item pulvis seminis anisi ad ʒj. propinatus, qui maxime conducit tenellis, dum non tantummodò corruptionem lactis acidam corrigit, sed etiam aromaticâ vi flatuum generationem impedit, & ut suprâ monui, blandè infantes laxat; vel, præter laxativa superius allegata, pulvis Comitæ de Warwick ad ʒʒ. propinatus, à Riverio *Cent. 2. Observ. 27.* commendatur. Inspecie, ubi tormina cum flatibus aut excretis viridiusculis & porraceis aliisvè dejectionibus præternaturalibus conjuncta sunt, in tali casu non crebrò nimis præbenda est mamma, sed interea

℞. ∇ *Fenic.* ʒj.

~Θ̄ \*ci anis. ʒʒ.

*Lap. Er. prap.* ʒj.

*Syr. de Spin. cerv.* ʒʒ. M.

Detur cochleatim crebrò.

Aqua etiam carminativa Dorncrellii, in qua cum syrupo de chamomilla, aliquot guttæ olei destillati anisi sint permixtæ, & syrupus de cor-

de corticibus aurantiorum non inconuenienter præbetur tenellis.

Conueniunt porrò cum lacte corallia præparata, & lapilli cancerorum, additâ semper anatica portione pulueris seminis anisi; item crySTALLUS præparata, quæ in horridis torminibus ventris à bile æruginosa optimum remedium est; aut loco talium pulvis Marchionis, aut qui præsentanei magis est auxilii, pulvis suprâ dictus puerilis propinetur, augmentando dosin olei destillati anisi; vel istis acidum torminosum absorbentibus castorei parum addendum, & quacunque ratione fieri potest, propinandum. Sin pertinacius malum fuerit, nec talibus crebrius repetitis quiescat, ita ut jam vel epilepsia metuenda, salia volatilia, v. gr. sal cornu cervi, & suprâ dicti spiritus & liquores salini volatiles, imprimis blandè aromatizati oleosi, liquor cornu cervi succinatus, spiritus salis Ammoniaci anisatus, &c. theriaca aut Mithridatium pili vel minoris vel majoris magnitudine, vel quantum cultelli parvi cuspide capi potest, sub vesperam exhibitum plus minus pro ætatis ratione, blandam quietem inducit: item Laudanum opiatum ad gr. j. in misturâ ℥iij. ℥iv. usurpari potest. Castoreum quoque mirè conuenit: hinc aliis irritis aurum fulminans, idque imprimis, ubi simul contumacior ac obstructa alvus fuerit, magnæ hoc in casu observatur efficaciz. Datur infanti aliquot dierum, aut etiam unius septimanæ, gr. j. cum gr. iij. nitri depurati vel antimoniat: datur etiam solum vel absque addito in iis, qui jam fuerint aliquot septimanarum, gr. ij. vel iij. pro ratione circumstantiarum: propinatur in lacte, vel quod melius, in aqua florum tiliz aut cerasorum nigrorum, vel alia aqua destillata idonea.

Quodsi cum torminibus adsint simul alui dejectiones crebræ, fluidæ, acres, podicem excoeriantes:

℞. C. C. nsi ℥ß.  
Corall. r. præp.  
¶ Sigill. aa gr. xij.  
Ol. dest. anisi gtt. jv. M.

Econtra, ubi cum torminibus alvus simul laxanda venit, in infante v. g. trium mensium:

℞. Lap. Er. præp. ℥j.  
CrySTALL. præp. ℥ß.  
Sis vol. CC. gr. jv. ad vj.  
¶ Falapp. gr. iij. ad v.  
Ol. dest. anisi gtt. iij.

M. f. pulvis pro 4. vel 5. dosibus.

Externè abdomini & umbilico infantis inungendum venit oleum septem florum Mynsichti, acuaturn cum oleo destillato sceniculi, anisi, caryophyllorum, rutæ, &c. Item scrobiculo cordis & umbilico utiliter inungi po-

test oleum anethi, chamomillæ, rutæ, per infusionem seu corpus, aut oleum nucistæ expressum, aut oleum stomachale Cratonis, acuaturn cum oleo destillato angelicæ, carvi, cumini, chamomillæ, corticum aurantiorum, & similibus, ne hæc destillatorum acrimonia dolorem ex excoeriatione inferat: e. g.

℞. Ol. destill. cumini.  
Chamomill. aa ℥ß.  
Succin. gtt. vj.  
Corp pro bals. q. l.  
M. S.

#### Vindernder Balsam.

Quibusdam commendatur linimentum, factum ex spolio vel exuviis serpentum coctis in pinguedine propria cum oleo anethi. Item pulvis caryophyllorum cum aqua menthæ, applicetur calide abdomini secundum Velschium in *Hecatoest.* 2 pag. 22. Fetus parati ex aniso & chamomilla cum summitatibus anethi & foliis lauri, etiam commodè imponuntur abdomini.

Quod si tormina oriantur à mucilagine acida viscida, pertinaciter intestinis adhærente, & quæ per clysmata conuenienter abstergi nequeat, conuenienter paratur unguentum ex gummi Ammoniac & hujusmodi liquefactis vel in vino, vel in aceto destillato, e. gr.

℞. G. \*ci in 10 sol. ℥ij.  
Terebinth. ℥j.  
Aloes hepat. ℥j. vel ℥ij.  
Sevi hircin. vel cervin.  
Butyri non Siti aa q. s. pro consistentia debita.

M. f. Unguentum.

Huic ulterius semper, quoties illinitur, olei destillati anisi vel cumini ℥ß. conuenienter additur, & ita abdomini, vel umbilicalibus dictis locis, imponitur, ac quoties opus fuerit, aliquali portione fellis tauri acuaturn.

## ARTICULUS II.

De

### Inflatione & Tensione Hypochondriorum.

**D**Ixi hætenus, quod lac acidum, aut aciditate corruptum, in intestinis cum bile concurrente per fermentationem generet flatus, qui collecti in intestino colo sub hypochondriis juxta tormina recens natis sæpius inferunt inflationem & tensionem hypochondriorum, quam vulgò vocant, *das Herz-Geßpann*/ seu affectionem cardiacam, dum nempe hypochondria utrinque tumida, inflata, & insigniter distenta sunt, unde difficilem respirationem cum inquietudine & agrypnis fere patiuntur.

(Uuuuuu 3)

CAU.

## CAUSÆ.

Oritur malum ex nimia lactis aut pulvis ingestione, dum plus assument, quam digerere valent, unde ex cruditate acida fermentando emergunt flatulentia, speciatim hypochondria distendentes. Oritur etiam, quando infantes aëre ventoso nimis exponantur, hinc enim quoque hoc malum supervenit.

## DIAGNOSIS.

Solo visu facile patet; Wenn man nicht unter die Rippen kommen kan.

## CURA.

In cura imprimis radicis angelicæ pulvis convenit cum pulicula propinatus, vel gutta una aut altera olei destillati simul cum lacte infantibus porrecta, & omnia hætenus recensita ad inflationem hypochondriorum, aut tympaniticam quoque abdominis distensionem, optima sunt: præ reliquis convenit semen cumini & anisi, ejusdem oleum, & spiritus salis Ammoniaci anisatus, species diacumini, item emulsio seminis violarum & cardui Mariæ, secundum Velschium *Hecat. 2. pagin. 53.*

℞. Sem. anisi ℥ss. 3℔.

Corallor. præp. gr. xv. M.

Detur in pulve infantibus tenellis.

Item oleo-saccharum anisi propinetur cum lapillis cancrinis, &c. item theriacæ parum propinari potest. Herba botryos, à quibusdam tanquam experimentum singulare laudatur, si aqua ejus destillata sæpius propinetur infantibus, imprimis sæpius cohobata à nova planta; cui commodè syrupus corticum aurantiorum addi poterit.

Externè quoque conducit oleum rutaceum & laurinum, cui aliquot guttæ olei destillati angelicæ sunt additæ:

℞. Ol. Chamom. 3j.

dest. Cumin. vel anisi 3j.

Misc.

Illinantur calidè hypochondria.

Item extractum angelicæ illinatur umbilico, item butyrum rubrum, acuetur aliquot guttis olei destillati angelicæ, & loco tumentis illinatur. Sunt qui semen botryos contusum in oleo communi infusum & digestum, si externè inungatur hypochondriis inflatis; Item cataplasma ex cherefolio cum butyro contuso commendatum à Pauli in *Quadrup. pagin. 257.*

## ARTICULUS III.

De

## Anorexia &amp; Vomitu.

**I**uxta hæc observetur; quod si copiosior tenaciorque grumus ex lacte & pulve sto-

macho incumbat, cui per pylorum transitus denegetur, appetitus hinc deiciatur, & adivitate fermenti digestivi à lacte, vel copiosiore vel coagulato, obrutâ horror mammarum oriatur cum absoluta apepsia; cum quotidie observemus, istud quod semel stomachum læserit, ceu hostile postmodum diu ab eodem averfari.

Quod si gravius adhuc oneretur stomachus, & irritetur pylorus, infantes continuo vomunt, eaque varia, nunc albicantia viscida, nunc tenuia flavescentia, nunc viridia acrida, quæ vulgò vocantur æruginosa, nunc similia.

## CAUSÆ.

Causa vomitus querenda est in lacte imprimis, quod vel per se vitiatum, vel in stomacho infantis corruptum, irritando pylorum vomitum infert: imprimis equidem copia lactis sola sæpè est causa vomitus, imprimis si ingeratur lac novum, priore nondum concocto. Hinc enim fit, ut lac recens super infusum congrumescat aut coaguletur, aut saltem transeat in liquamen viscidum aut mucilaginosum, quod obstruendo pylorum, eumque oppilando (de quo vid. Hæferus *Herc. Med. pag. 149.* item Hildanus *Cent. 6. Observat. 34.*) vel irritando quoque, causa est hujus convulsivæ contractionis, quam vomitus violenti sequuntur, in quibus cum lacte assumpto copiosa viscida rejiciuntur: qui vomitus tenellos infantes insigniter quidem lædunt & debilitant, salutare tamen sunt, quatenus excrementa ista rejiciuntur, & grava mala jamjam imminencia præventur. Eingite enim, hæreere talia diutius in ventriculi bursa, facile ex acore fermentativo pasta instar farinacæ intumescunt, & impetuoso flatuum proventu intumescunt præcordiorum, hinc diaphragmatis impedito motu, difficilem respirationem & ex horum flatuum in orificium sinistrum impetu, hujusque pertinaci stricture, præcordiorum anxietates, inde inquietudines, somni impedimenta, vigilias, &c. inferent; & quamdiu tales grumi, aut talia liquamina viscida, pylorum infarciunt, tamdiu vomitus etiam continuat, ac præterea inquieti sunt infantes, & interruptis clamoribus in somno perturbantur. Nec tantummodò lactis copia, & inde orti grumi ac viscida, in pyloro hærentia, sed etiam quæcunque ejusdem corruptiones in ventriculo vomitum inducunt. Unde si nidore corripitur lac, flavescentia fœtida excernuntur: Sin vitiosis succis ex intestinis in stomachum regurgitantibus, in specie acore peregrino, in stomacho inficitur lac, hoc viridescens & æruginosum per vomitum rejicitur.

DIA-



DIAGNOSIS.

Affectus per se patet: cognitio saltem circa causas versatur.

Copiam lactis adesse, vomitus materiz albicantis & viscidæ testantur.

Nidore corrumpi-lac, foetida flavescentia rejecta loquuntur.

Viridia & similia per se patent.

PROGNOSIS.

Quoad prognosin: Utilis est vomitus in infantibus, ex quacunque causa oriatur, si non sit nimius; innit enim robustum stomachum (vulgò dicitur stomachus flaccidus, quod tamen falsum est) id est, satis sensilem & validè se contrahentem, molesta rejicientem, quin & interdum promovendus est vomitus, si signum adsit ventriculi malè digerentis ingurgitatum lac.

Et quidem minimum periculum habet vomitus, si sit à copia lactis; suspectus autem est nonnihil, quando vario colore, crocea, viridiuscula ac nigricantia, rejiciuntur.

Prævus est, & non absque cautela considerandus, qui est foetidus, cum putredinem lactis insignem subesse connotet.

CURA.

Quoad curam, si vomitus turbet infantes, isque per essentiam, ut vocant fuerit, sinendus est, donec mucus vitiosus aut acris latex evacuati fuerint; postea cum moderato lactis usu pulvis ex nuce moschata, coralliis & caryophyllis paucis propinetur, & subinde repetatur: e.g.

℞. Corall. r. præp. ʒʒ.

Nuc. mosch. gr. vj.

Caryophyll. gr. iij. vel iv.

M. f. pulvis: S.

Unhaltendes Magen-Pulver.

Vel temperatior aqua cinnam. spirit. iis infundatur. Theriacz etiam externus pariter ac internus usus in iusta dosi non negligatur, idque etiam si per consensum fuerit; quod si ablactati fuerint infantes, & sufficienter evacuatus stomachus, pro quo scopo syrupus de cichorio cum rhabarbato interdum conducit, tunc ad quemcunque infantum vomitum non immerito commendat Joel in Pr. libr. 9. Sect. 4. membr. 3. pag. 344. Decoctum, quod fit ex caryophyll. ʒʒ. & gran. mastich. ʒij: quæ simul concisa in ʒvj. vini rubri bulliant; cujus colaturæ subindè cochleare unum vel alterum infanti propinandum est.

Imò commendat hic ipse etiam in absentia febris; gutt. ij. olei destillati caryophyllorum in pauxillo vini. Sunt, qui oleum menthæ destillatum, item zedoariz, imprimis ubi simul

sunt tormina, commendant; hinc talem potiunculam præscribere possumus:

℞. ▽ Mentha ʒʒ.

Corall. rub. præp. gr. xv.

Ol. dest. zedoar. gutt. iv.

Mentha gutt. ij.

Syr. Cydonior. ʒvj.

subacta invicem misceantur, & in absentia febris propinetur cochlear unum vel alterum contra vomitum infantum.

Ex cydoniis alias quæcunque parata & aromatica condita, ut acor temperetur, conducunt, & talia subacida rutius usurpari possunt, quando ablactati sunt infantes, quoniam tunc lactis coagulatio non æquè metuenda est. Conveniunt itidem grana mastichis cum pulvere galangæ & caryophyllorum infanti propinata; item nux moschata pulverisata; puliculæ instrata acescentiam lactis prohibet, concoctionem adjuvat, & in specie vomitum sistit.

Quod si variegata seu diversicolora & multiformia vomitu rejiciantur recrementa, & suspicio est, non ritè fieri separationem chyli à fecibus in intestinis, cum talia non absque perverso regurgitationis motu ex superioribus intestinis in ventriculum eveniant, imprimis clysmata suprâ laudata conducunt, quæ stimulando inferiora perversum superiorum peristalticum motum inferiora versus corrigunt, materiam ex superioribus deorsum versus proliciunt, & ita vomitus violentiam cohibent. Clysmata hæc componenda sunt ex carminantibus imprimis aromaticis, quibus pro stimulo parum salis gemmæ addatur.

Aliàs externè inungatur stomachi regio cum oleo mastichis & cydoniorum, quibus aliquot guttæ olei destillati caryophyllorum & menthæ simul adduntur, vel aliquot guttæ olei destillati macis cum oleo nucis moschatæ expresso exceptæ commendantur.

℞. Ol. stomach. Cras. ʒʒ.

dest. bacc. junip. ʒʒ.

Mentha gutt. v. M.

Aut recipiatur frustulum panis madefactum vino malvatico, imponatur regioni stomachi; aut irroratum aceto destillato, cui inspergatur pulvis caryophyllorum & nucis moschatæ; & hoc epithema imponatur externè regioni stomachi & hypochondriorum. Vel recipiatur parum fermenti, & misceatur cum pulvere menthæ, nucis moschatæ & caryophyllorum, quæ invicem subacta, calefacta apponantur stomacho.

Cerotum stomachale ex Lindano & ipsum convenit infantibus non minus quàm adultis.

ARTI-

## ARTICULUS IV.

De  
*Singultu.*

**S**i tenacior aut acidior mucus in superiori ventriculi orificio firmitus adhæserit, per consensum firmissimæ connexionis diaphragma simul irritatur; unde hujus sub inspiratione facta convulsiva contractio, indeque singultus subinde etiam infantibus contumax & pertinax obvenit.

## C U R A.

Vomitibus imprimis conducit, evellendo acres acidas sordes, stomacho & orificio superiori adhærentes. Propinetur postmodum pulvis Joëlis in omni singultu ab eo æstimatus, ex cornu cervi ustis & coralliis præparatis ana mistis, cui interdum consulto gutta una vel altera olei destillat. anisi aut cinnamomi aut caryophyllorum addi potest. Nec omittendus theriacis usus, & anisum, singultui etiam adultorum appropriatum, externo pariter ac interno usu, non minus quam polychrestum castoreum.

## ARTICULUS V.

De  
*Alvi Adstrictione.*

**P**orrò frequenter infantes affligit alvi adstrictio, ita quidem, ut infantes, qui naturaliter bis quotidie ad minimum egerunt, interdum ad biduum & ultra nil excernant; unde abdomen intumescit, inflatur, indurefcit, difficulter respirant, inquieti sunt, immoderatiùs æstuant, &c.

## C A U S Æ.

Causa sæpissimè est mucilago viscida, crassa & tenax, ex vitio lactis crassioris, spissioris, minus debitè digesti, magisque caseosi, quæ cum sit tenax & viscida, difficulter mobilis, hinc inde obstructioni alvi occasionem præbet: nunc oritur ex vitio assumptorum à nutrice, si nempe nutrices vescantur alimentis adstringentibus, unde lac crassum, aut adstrictorium redditur, & hinc interdum infantibus alvus obstruitur: Sic Timæus von Guldensee in *Cas. pag. 252.* refert pertinacem alvi obstructionem in infante ex nimio esu castanearum à nutrice: Nunc causa hujus morbi sunt grumi lactei, ex lactis benè constituti corruptela in intestinis nati, hinc inde cellulas intestinorum occupantes, sicque secessus remorantes.

Denique accedit his simul bilis defectus in intestinis, cujus vis salina attenuat & lique-

facit feces alvinas, easque mobiles reddit ac fluidas. Unde si vel mox post partum infarctus sit ductus cholodochus à meconio, aut si mucilago similis tenax eundem ductum opplevert, ut plurimum infans solet esse obstructæ & adstrictæ alvi.

## D I A G N O S I S.

Ipsa vitium per se est manifestum.

Causæ ipsæ latere non possunt, imprimis si est à matre vel nutrice.

Sin viscida & tenax mucilago sit causa, excreta sunt crassa & tenaciora.

Bilis denique defectus in intestinis si fuerit, ea quæ rejiciuntur, alba sunt, cineritia, minusque ordinariè tincta.

## P R O G N O S I S.

Periculosum quidem malum hoc non est, nisi nimis diuturnum.

## C U R A.

In cura ergò alvi obstructæ conveniunt blandè emollientia & laxantia, nempe syrupus florum Persicorum recentium decerptorum, non sponte decidentium, syrupus de cichorio cum rhabbarbo, syrupus rosatus solutivus, syrupus de pomis Regis Saboris: item passulæ laxativæ officinales propinatæ; aut saltem brodium passularum laxativum subinde infusum cochleatim. Manna pro ratione ætatis à ʒss. ad ʒj. vel ʒij. in lacte dissoluta, vel una cum pulve propinata, egregiè laxat infantes; nam dulcedine sua blandiente non rejicitur ab infantibus; item cum ʒj. olei amygdalarum dulcium manna commodè propinari potest. Aliàs oleum raparum saccharatum movet felicissimè alvum: Conf. M. A. N. C. *Ann. 4. & 5. pag. 74.* Præ omnibus præstantissimum est remedium muscerda. Vel propinatur tenello spermatis ceti tantum, quantum cuspis cultelli potest capere in cerevisia calida: sicut in paulò robustioribus pulvis mechoacannæ insipidus, & tamen qui pituitam viscidam suaviter detergit, optimè confert, à ʒj. ad ʒss. cum pulve vel cum pane Martio propinatus. Denique, ubi magis adultus fuerit infans:

ʒj. Crem. ʒi ʒj.

Diagryd. gr. v. M.

Datur à ʒss. ad ʒj. pro conditione nempe ætatis.

In malo graviore ad Mercurium dulcem aut aurum fulminans confugere licet.

Externè imprimis conducunt balnea. Quibus præmissis suppositoria ex ʒss. stercoris muris cum melle ad duritiem cocto, aut saltem domestica ex sapone, vel simplici vel Veneto confecta applicentur, & ubi fortius stimulandum, oleo diacolocynthidos Quercetani illinant.

illinantur. Vel omnium optimè conducunt clysteres emollientes ad ℥iij. vel jv. pro ratione ætatis: quibus, ubi opus est absterfione, simul mel addi potest, item clysteres ex brodio pisorum cum saccharo Thomæ. Sin meconium seu excrementa indurata sint in colo ejusque cellulis, clyfma solum ex oleo lini & raporum paratum commodè eadem educit. Quod si opus sit fortiori stimulo, decocto emollienti addi potest extractum hellebori nigri. Præterea etiam opomphalica seu unguenta laxativa umbilico imponantur pro solvenda alvo: nempe specierum hieræ piceæ ℥j. cum scammonii gr.v. misceantur, cum nuce juglande applicentur umbilico. Item pomum Borsdorffianum putridum cum pinguedine anserina subactum applicetur abdomini. Item oleum diacolocynthidos Quercetani, item oleum chamomillæ, cui incocta sit pulpa colocynthidis, similiter illinatur. butyrum vel adipēs gallinarum cum felle bubulo, & scammonio subactum, etiam illinatur.

℞. Ungu. de Artan. ℥ij.

Fell. taur. insp. ℥i.

Cum f. q. Ol. Colocynth. f. Linimentum.

Item

℞. Aloës ℥ij.

Fell. tauri ℥j.

Scammon ℥j.

Butyr. rec. q. s.

M. f. Linimentum.

Illinatur umbilico.

Vel fiat linimentum ex succo cy claminis, subacto cum adipe gallinæ, quæ blando calore decoquantur ad consistentiam linimenti, umbilico illinendi.

## ARTICULUS VI.

De

### Intertrigine.

**I**ntertriginis frequenter acerbo dolore excruciantur infantes tenelli, Germani vocant *das Gratt seyn der Kinder*/ & nil aliud est, quam excoriatio circa genitalia & clunes, item sub axillis, in rimis colli, & similibus locis: quæ oritur partim ex urina, qua continuo humectatæ partes ab hujus salina acrimonia tenerrimam epidermidem amittunt, & ita pedetentim penitus excoriantur, aut quando lintea humectata minus sedulò permutantur & exsiccantur, partim verò à sudore, vel insensibili transpiratione in articulorum flexuris, & sub axillis aliisvè locis retenta, acrimonia simili cuticulam erodente: quâ ita abrasa nuda cutis admodum dolet, interdum plus minus exulceratur, unde agrypnix, & continuati infantum vagitus aliaque pathemata subsequuntur, quæ exulceratio etiam ad

Tom. II.

mortificationem partis subinde tendit. In multis nempe sudor & urina convenit, adeoque affectuum identitatem comitem secum trahere solent.

### C U R A.

In cura ergo ea, quæ acre temperare, humidum imbibere, & blanda exsiccatione & adstrictione poros cutis firmare possunt, adhibenda.

Inspargatur ergo nihil album, cornu cervi ustum, creta, cerussa, tutia, lapis calaminaris, lac lunnæ, & similia. In specie vix citius aut jucundius removetur intertrigo, quàm croco Martis ex vitriolo Martis præcipitato, qui sine ullo vel minimo sensu excoriata loca restituit: cujus defectu & terra vitrioli dulcis consultò substitui potest, nisi macularum in linteis exinde nata flavedo sit obstaculo. Nempe abluantur prius partes intertrigine affectæ aqua calida, hinc pulveres isti, nodulo inclusi raro, ita inspergantur, verbi gratia:

℞. Lap. calam. ℥iij.

Tut. præp. ℥ss.

Ceruss. leca ℥j.

℥ li dulc. gr. xv. M.

℞. C. C. usti præp. ℥ij.

Creta alba præp. ℥iij.

Ceruss. ℥ss.

℥ Rosar. rubr. q. s. pro gratia coloris: M.

Gravius si malum fuerit, & ad aliqualem exulcerationem jam devenierit, aut ubi rubor saltem & color adjunctus sit intensus, saccharum Saturni commodè additur: vel loco hujus cerussa, vel unguentum de lithargyrio, aut unguentum album seu de cerussa camphoratum, aut unguentum diapompholygos, &c. hisce locis commodè inungitur.

## ARTICULUS VII.

De

### Umbilici Prominentia.

**P**orrò infantibus recens natis subinde umbilicus laxior insigniter protuberat ac prominere, & in formam parvi & angusti farciminis inversi protenditur. Nullus adest ardor, nullus mutatur color, nec tumor, specialiter umbilicus ita protuberat, & in medio sui prope peritonæum foraminulum quasi exhibet. Accidit hoc malum, cum funiculus umbilicalis à partu non debite ligatur, parsque ejus major quam debebat, relicta est, quæ ita in altum attollitur & protuberat, vel cum peritonæo nonnihil relaxatur, unde vel omentum, vel intestinulum quoddam relaxatum, se insinuat, id quod frequentius à fletu infantum nimio, item à tussi vehementiori accipiunt.

(Xxx xxx)

PRO-



## PROGNOSIS.

Malum non contemnendum est, quia temporis successu successivè incrementum, & ita in omphalocelen seu perfectam umbilici herniam degenerare potest.

## CURA.

In cura probè observandum est, ut præcaveantur sedulò flatus in infante, in quem finem semen anisi exque eo parata remedia, sedulò usurpentur.

Externè verò, imprimis si ruptura adest peritonzi, convenit herba perfoliata contusa, cocta, umbilico imposita; item rob acaciz nostratis, dissolutum in liquore appropriato ad consistentiam linimenti, illinatur umbilico relaxato, donec denuò coeat: Vel, pulvis mastiches, pauxillo therebintine in mortario calido subactus, & cum linteo impositus, vid. Velschius *Hecad.* 2. pag. 22. Item plantago & muscus pruni sylvestris in vino rubro probè cocta, & cataplasmatismâ imposita, & aliquamdiu continuata. Semen perfoliatæ cum adipe ursino probè subactus etiam confert. Optimum est, si formentur globuli ex corio, magnitudine rotundi grossi præter propter seu quanta est prominentia umbilici, qui linteo obvoluti obducendi sunt emplastro oxycroceo aut mastiche, & ita imponendi cum firma ligatura umbilico prominenti. Conducitur etiam, si oleo ovorum illinatur umbilicus prominens toties, quoties ligatur infans novis fasciis, & post inunctionem hanc imponitur globulus latus, factus ex cera flava cum mastiche permixta, convenienti fasciâ firmandus. Nostrates ex cera flava faciunt pileolum parvum, quem inverso situ umbilico imponunt, & ita ligaturâ firmant, aliquamdiu ita relinquunt, donec denuò spontè sua coalescat peritonzum, atque curetur malum.

## ARTICULUS VIII.

De

*Umbilici Inflammatione.*

**R**ecens decusus umbilicus interdum inflammatur, unde ejusdem tumor, rubor, & ad tactum insignis calor percipitur, durus est, nec tactui facilè cedit, & si attingantur infantes, ejulatu dolorem produunt.

## CURA.

Oritur ferè, cum ligatura ante abscissionem non firma satis facta fuerit; hinc enim ex abscissione propter dolorem, aliamve similem occasionem facilè inflammatio excitari potest, quo rupto intestina procidunt. Imò interdum simul ipsa intestina afficiuntur, ita ut excretio fecum alvi, per umbilicum suppuratum observata & curata fuerit in M. A. N. C.

*Ann. 3. Observat. 64. pagin. 110.* Fit etiam ex alteratione ejus ab aère externo, vel etiam interdum ex nimio clamore & tensione abdominis.

## PROGNOSIS.

Facilè curari potest, si maturè fiat; sin verò cura tardius instituatur, & factus sit abscessus, periculum est prolapsus intestinorum infantis per umbilicum.

## CURA.

In cura ergo inflammatio subito, & quantocyus fieri potest, discutienda & resolvenda est; in quem finem optimè convenit, ut maturè illinatur locus inflammatus oleo rosarum, aut oleo lumbricorum terrestrium, cum cerussa vel saccharo Saturni probè subactus: item saccharum Saturni in decocto Malvæ solutum, addito oleo rosaceo, cum linteis multiplicatis imponatur: item emplastrum de spermate ceti Mynsichti, emplastrum album seu de cerussa camphoratum, aut emplastrum de spermate ranarum, imponendum.

Sedatâ denique inflammatione oleum chamomillæ vel anethi tepidiuscula illinenda sunt ad reliquias omnino discutiendas.

## ARTICULUS IX.

De

*Ani Procidencia & Tenesmo.*

**C**ognatus his intestinalibus affectibus est frequens in pueris observabilis ani procidencia, eoque frequentior, quo laxior magis, magisque flaccida existit substantia intestini recti & musculorum ejus.

## CAUSÆ.

Causa ergò quare interdum foras promineat anus, est sæpius tenesmus, seu continuus, frustraneus tamen, egerendi infantum conatus; qui tenesmus oritur ex mucilagine acida & viscida, intestinum rectum obsidente, à qua continuo irritatum continuo egerere nititur, unde tandem foras protruditur intestinum rectum. Præter talem tenesmum etiam nimia laxitas ac nimia flacciditas musculorum intestini recti subinde causa est hujus procidentiz, in specie quando nimis frequenter suppositoriis molestantur tenelli.

## PROGNOSIS.

Facilis est restitutionis, si tempestivè fiat: aliàs periculum est, ne ab aère ambiente alteratum intestinum in gangrænam dilatatur.

## CURA.

C U R A.

Ut ergò denuò restituantur anus prolapsus, si est ex laxitate, sufficit sola cum linteo calido repositio, aptaque infantis fasciatio, ut pedibus extensis ita permaneat.

Sin verò causa prolapsus sit tenesmus; tunc ad corrigendum & tollendum tenesmum conducit imprimis sacculus, aut etiam infusus, balneum.

℞. *Fl. Verbasc.* M. iij.  
*Furfur. tritic.* M. ij.  
*Sem. Cumin.* ʒj.  
*Bacc. laur.* ʒss. M.

Sacculo insuta coquantur in sufficiente quantitate aquæ; sacculus expressus calidus supponatur, ita ut eidem infideat infans; nam hic tollit tenesmum.

Utilis etiam est ad tenesmum suffitus ex terebinthina prunis injecta:

℞. *Colophon.* ʒss.  
*Sarcocoll.* ʒij.  
*Bacc. lauri.*  
*Sem. fenic.* aa. ʒj.

quæ pulverisata prunis injiciantur, & inde exiens fumus excipiat ano.

Curato tenesmo facile postmodum restitui potest anus prolapsus.

Quod si citra tenesmum anus sit prolapsus, si ab aëre alteratus nonnihil intumuerit, ante repositionem fovendus est decocto malvæ & feminis cumini in aqua & vino.

Forus ita anus denuò blandè reponendus, qui repositus in suo loco maneat. Optimum est, si infans infideat asseri plano calido, cui mastix sit illita; aut etiam loco mastichis, sebum hircinum aut cervinum sufficit, si asseri dicto calido illinentur; Vel etiam fovendus est anus hoc ipso sævo hircino aut cervino liquefacto, & ita reponendus.

Conducit etiam infessus ad umbilicum usque in decocto adstringentium, gallarum nempe, glandium, corticum granatorum; foliis myrti & similibus, adjecto, si opus sit, paucò alumine: Aut etiam intrudatur vel applicetur ano parum bombacis imprægnatæ pulvere sanguinis draconis, mastichis pulverisatæ, balaustrorum, thuris & similibus: Nam his facile anus repositus in loco suo firmabitur.

ARTICULUS X.

De

Urina Suppressione.

Non rarum est, quod infantes tenelli, præsertim pueri, retentionem aut difficultatem urinæ patiantur, ita ut vel planè non, vel cum insigni difficultate aut dolore eandem excernant, idque interdum mox à partu observatur; in talibus materia instar sabuli sub-

Tom. II.

tilis rufescentis, meatum urinarium obsidet, & cum urina interdum excernitur. Putant mulierculæ esse calculi rudimentum, quod tamen non est, cum successivè subtili hoc sabulo excreto, ordinariè & ritè profluat urina.

C A U S A.

Frequentior causa est pituitosus humor viscidus & crassus, quacunque ratione ad meatum urinarium delatus, qui in cervice vesicæ denuò quasi inspissatus aut concretus, meatum urinarium plus minus obstruit, unde talium urina crassa & feculenta quasi excernitur.

Origo hujus mucilaginis est ab assumptis, imprimis pultaceis viscidioribus, dum propinantur pultes ex farina, aut pane similagineo non ritè fermentato, quo viscidum in stomacho difficulter digeritur, & viscida copiosa inde in primis viis generantur.

Denique pueri interdum revera calculo observantur obsessi.

D I A G N O S I S.

Malum per se patet, dum nihil vel parum ab infantibus excerni conspicitur.

Item ejulatus & aliqualis tumor circa regionem vesicæ sufficienter malum declarant.

Calculus præsens vix alia ratione, quam per catheterem in infante jam nonnihil robustiore cognosci potest.

P R O G N O S I S.

Quoad prognosin: Malum in pueris non contemnendum est hæc urinæ suppressio, cum nulla excretio præternaturaliter sine periculo in infantibus supprimatur, quin plura alia symptomata, nempe dolor, ejulatus, vigiliæ & similia exinde oriri queant.

Imò si diutius protrahatur malum, periculum est, ne exinde mors imminet infantibus.

C U R A.

Ergò primò quidem mucilago tenax & viscida est evacuanda: quod præstat imprimis mechoacanna propinata cum syrupo rosarum solutivo.

Evacuato corpore promovenda est blandè urina. Conveniunt imprimis flores cyani & calcatrippæ; si propinetur horum aqua destillata, minoris tamen efficaciz, si decoquantur in aqua simplici vel potu ordinario cerevisiæ, & propinetur decoctum infantium: aut in iis, qui jam sunt ablactati, fiat infusio horum florum cyani & calcatrippæ in aqua polygoni & ononidis cum spiritu salis dulci acidulatis; sic enim extrahitur elegans tinctura, cui gratia saporis concilianda cum syrupo capillorum Veneris, aut cum syrupo artemisiæ. Convenit imprimis

(Xxx xxx 2) deco-

decoctum cicerum & radices & summitatum fœniculi. Therebintinata omnia, in specie spiritus therebintinæ, egregius est. Expertus est succus pastinacæ luteæ recens expressus, & infantibus ita propinatus. Semen violarum, & ex hoc parata emulsio cum dictis aquis appropriatis, in specie ononidis, etiam egregium est medicamentum.

℞. *Sem. violar.*

*Amygd. dulc.* aa. ʒj.

c. l. q. ▽ *Petrosel. f.* emulsio:  
cui adde

*Lapill. & præp.*

*Corall. r. præp.* aa. ʒß.

edulcoretur parum.

Farina ex lycopodio seu sulphur vegetabile nobile specificum est, etiamsi jam exinde epilepsia imminet: vid. M. A. N. C. *Ann.* 3. *Observ.* 15. in *Schol. pag.* 20. Datur ʒß. in-  
fanti trium annorum,

Externè illinatur regio pubis & perinei cum oleo scorpionum simplici; Vel

℞. *Ol. lil. alb.*

*Chamom.*

*Scorpion* aa. ʒj.

‡ *Scorpion.* ʒj. ad ʒiß.

quod linimentum post balneum aut fotum inungatur.

Aur etiam unguentum dialtheæ cum oleo scorpionum permixtum, iisdem in locis illinendum est. Si fortius agendum, oleum scorpionum cum paucis oleo ceræ illinatur regioni vesicæ, item cataplasmata ex parietaria cum oleis aut pinguedine anserina applicata: item cataplasmata ex chamomilla vulgari applicata regioni vesicæ sunt optima. Possunt etiam simul addi modò dicto cataplasmati ex parietaria cepæ sub cineribus coctæ.

℞. *Herb. Parietar.* M. j.

*Cherese.*

*Fl. Chamomill.* aa. M. j.

coqu. ad molliorem:

pulpæ per setaceum trajectæ adde

*Ol. scorp.* ʒß.

*Butyr. rec.* ʒj. M.

Applicetur calidè regioni pubis.

Balnea denique sunt usitata, quæ emolliunt & resolvunt non nihil sordes istas mucilaginosas.

## ARTICULUS XI.

De

### *Incontinentia Urinae.*

**C**ontrarium vitium est, quando infantes retinere nequeunt urinam, malum quod in ætate tenella vix potest judicari, quoniam imprimis infantes in somno excernunt ne-

scientes & nolentes; postmodum verò ubitalia intelligere incipiunt, si urinam retinere nequeant, vitiosum est, siue fiat ex consuetudine, siue fiat interdum ex vitio partium vesicæ, in specie ex resolutione ejusdem sphincteris, aut ex læsione ejusdem à calculo, aut quacunque alia læsione.

An sit ex consuetudine, vel non? non potest cognosci, nisi in infantibus non nihil robustioribus.

Talis urinæ incontinentia ex consuetudine nihil mali sub se habet; si verò vitium sit in sphinctere hoc ipsum maturè corrigendū est, imprimis per balnea ex nervinis & adstringentibus parata, uti sunt in specie ex foliis quercus, salvia, satureja, fœniculo & similibus. Inungi etiam potest oleum mastichinum, quod valdè adstringit, uti etiam unguentum Comitissæ cum oleo irino, & oleo costino.

Internè pulverem ex castoreo & myrrha cum oxymelite propinandum commendat Joël, si subsit affectus quodammodo paralyticus.

Commodè etiam propinatur internè pulvis ex erinaceo usto, herba & semine agrimonix, mastiche, medulla saxorum, & similibus.

## ARTICULUS XII.

De

### *Herniis Infantum.*

**M**ultum etiam infantes teneriores obnoxii sunt herniis, tam umbilici quàm scroti, ex peritonei frequentius relaxatione, rariùs ex ejusdem ruptione.

Occasionem peritonæo relaxando suggerit clamor nimius aut continuus ejulatus, tussis crebrior ac vehementior, ac denique intensior feces egerendi per alvum conatus; quæ ipsa eò magis ad hoc malum disponunt, quò magis infantum abdomen, vel naturaliter vel præternaturaliter tumet, aut prout magis vel minus flatibus fuerit turgidum.

## DIAGNOSIS.

Signa herniarum, scroti & umbilicalis per se patent, dum imprimis violenta talis causa præcesserit, v. g. ejulatus, clamor, tussis, vehemens egerendi conatus, &c. sicut etiam, quod altera tantummodò scroti medietas ordinariò ferè sit affecta & tumida.

Ab hydrocele seu tumore ex aquositatibus ex abdomine in scrotum descendantibus nato hernia distinguitur, quod ille utrumque scroti latus occupet, scrotum quoque tumidum magis, quàm in herniis, observetur, nec tam facilè recedat tumor, atque recedit iste, qui est ab intestinis; atque denique ad morâ can-



candelâ quasi limpidus & perspicuus iste tumor apparere solet, si est hydrocele; in herniis verò intestina prolapsa tactu ferè possunt deprehendi, secus ac in alio scroti tumore.

Herniæ umbilicales etiam per se manifestæ sunt, dum foras prominet & tumet citra dolorem, & citra omnem ad tactum dolorem.

Causæ antecedentes faciliè patent per se.

### PROGNOSIS.

Propriè dictæ herniæ in infantibus faciliè curantur, modò debitum regimen accedat, peritonæo adhuc molliori existente, & quidem naturali augmento faciliè firmatur denuò ac consolidatur.

### CURA.

In cura ergò herniarum internè pulveres, decocta, aut syrupi ex vulnerariis præparati imprimis conveniunt, v. gr. decoctum herniaræ edulcoratum cum syrupo symphyti, aut decoctum perfoliatæ cum fanicula; aut detur pulvis seminis perfoliatæ, herniaræ, consolidæ majoris, &c. &c. item harum, uti & faniculæ, plantaginis, &c. aquæ destillatæ; observando simul, ut, quantum possibile, flatus arceantur ab intestinis.

Externè singulare experimentum est, si admoveatur frustum pellis anguillæ solummodo obtinētæ cum albumine ovi; internè simul propinandum est semen nasturtii vino infusum. Quod si ipsa cutis anguillæ hoc modo applicata non sit sufficiens, pellis anguillæ salitæ, coquatur in lixivio forti ad consistentiam emplastri, alutæ inducendi, quod loco rupturæ applicatur. Vel fiat emplastrum ex gummi carannæ p. ij. & seminis nasturtii p. j. subactis cum pauxillo terebinthinæ coctæ quod inducatur super linteam crassum, & applicetur loco hernioso, ut probè adhæreat. Item emplastrum diasulphuris Rulandi, aut cerotum ex pice imponatur, relinquendo tam diu, quàm diu firmiter adhæret, simul subligaculis aut fasciis muniendo loca herniosa, ut intestina & omentum in loco naturali retineantur.

Ubi reposita fuerint intestina, superimponant fomenta adstringentia ex vulnerariis, perfoliata, herniaria, plantagine, myrtillo, rob acaciæ & alumine, in aqua & aceto nonnihil coctis, superimponendum quoque est loco rupto aut laxato emplastrum ex gummi elemi, in aceto macerato, denuò inspissato, cum oleo ovorum in formam emplastri subactis. Vel fiat emplastrum adstringens & quasi corrugans ex maltiche, ichthyocolle, racamahacæ, & gummi Arabico ana ʒij. thuris, picis Græcæ ac picis nigræ aa ʒiʒ. quæ subacta alutæ vel linteo inducta imponantur loco rupturæ. Aut illinatur frequenter locus rupturæ cum oleo

hyperici & oleo ovorum, & superimponatur postmodum emplastrum de pelle arietina.

Communiter lapis ceraunius ad curandas hernias infantum laudatur. Novi infantem ejus beneficio curatum, qui ex nimis clamoribus enterocelen scroti contraxerat: nempe mater omni manè & vesperi, quoties infantem lecto imponeret, cum lapide fulminari saliva probè humectato, aliquoties compressit sursum versus lapidem ducendo, & ita continuo usu herniam curatam vidi. Porro radix consolidæ majoris conteratur, & cataplasmatibus instar loco affecto imponatur, omnibus duodecim horis renovando.

Quodsi copiosi flatus adsint, litibus, aut fomentis ex foliis lauri, floribus chamomillæ & sambuci, cum quatuor seminibus calidis majoribus, aliisque carminantibus, vino incoctis, & instar fomenti applicatis, sedulò hi sunt discutiendi.

## ARTICULUS XIII.

De

### *Scroti Tumore Aquoso.*

**O**bservandum præter hujusmodi hernias umbilici ac scroti, etiam infantes subinde alio adhuc Scroti tumore, nempe aquoso, laborare, in quo, peritonæo salvo, scrotum à collectis aquositatibus serosis intumescit, & insciis pro hernioso affectu imponit.

### DIAGNOSIS.

Signa Hydroceles ex *Artic. antecedente* patient.

### PROGNOSIS.

Tumores hi sine periculo sunt, cum nisi sint nimii, sponte suâ evanescant, vel solius arcani duplicati usui cedant.

### CURA.

Tumor scroti aquosus & hydrocele curatur litu olei laurini & chamomillæ, vel cataplasmate ex farina fabarum, pulvere seminis cumini ac similibus in aqua coctis, impositis. Cataplasma ex stercore caprillo, aut solus fons ex succo stercoreis caprilli admotus est optimus.

## ARTICULUS XIV.

De

### *Aphthis.*

**F**amiliale perquam malum est interdum paucis à partu diebus affligens, quod aphthas vocant, German. *Schwämme/oder Blasen* auff der Zunge der Kinder. Sunc  
(Xxxxx 3) scilicet

scilicet tubercula parva, seu pustulæ quasi vesicales, quæ hinc inde in lingua, carne gingivarum, faucibus, palato, œsophago &c. elewantur, in medio sui albicantes: in circumferentia intensè rubent, infantibus verò insigni ardore & dolore non levi impedimento sunt, quò minùs lac sugere possint. Hæ ipsæ vesiculæ successivè, nisi curentur, interdum in perfectâ abeunt ulcuscula, exesâ scilicet superiori tunicâ seu pelliculâ, quæ tamen postmodum facilè curantur: non rarò in ulcera serpentina abeunt, & aliqualem imprimis gingivarum putredinem inducunt: interdum acriori dum constant materiâ, fœtere solent. Affligunt imprimis fauces, linguam, hinc gingivas & palatum, interdum tamen etiam œsophagum & ventriculum, imò & ipsa intestina occupant: id quod tunc temporis imprimis patet, quando in excrementis rejectis parvæ squamulæ hinc inde conspiciuntur.

### C A U S Æ.

Causa est acre acidum, excorians & exulcerans plus minùs dictarum partium superficiem. Fons peccantis acidissimè est corruptela & acescentia nimia pultis & lactis tenuis aquosi in ventriculo. Ut ut enim aut lactis nutricis aut salivæ ipsius infantis à quibusdam nimia accusetur acrimonia, vix tamen in infantibus aliam originem agnoscunt, quàm acres halitus, qui successivè ex stomacho assurgunt & os quodammodo inflammant. Nam & in adultis frequenter contingere solet, ut correpti febribus, cruditatibus recrementosis, in specie porraceis in stomacho existentibus, aphthis molestè laborent, nisi maturè fomes removeatur à Medico ex ventriculo.

### P R O G N O S I S.

Per se nihil periculi habent aphthæ, nisi sint nigricantes aut sublividæ; tales enim sæpè abeunt in ulcera depascentia & periculosa: sicuti etiam aphthæ reliquæ, si perfectè exulcerentur, & in ulcuscula abeant serpentina, non sunt adeò contemnendæ.

### C U R A.

Maturè removendæ sunt, partim quod ut plurimum suctionem lactis impediunt, partim quod periculum ulterioris exulcerationis inferant. Conducunt ergò collutio aphtharum cum urina propria, eaque repetita, vel aqua ferrariorum, in qua salvia & parum mellis bullierint, pro ablucendo ore: item succus sempervivi & portulacæ cum aqua rosarum permistus usurpatur.

℞. ∇ Rosar. ʒij.

Misc. cum vitello ovi probè con-

quassato, & sacchari albi vel candi parum: quâ misturâ abluantur aphthæ.

Ubi nimis æstuaverint, tunc loco aquæ rosarum commodè aqua spermatis ranarum, aut aqua fragorum; cum tantillo aluminis potest adhiberi. Mucilago etiam seminis cydoniorum cum aqua spermatis ranarum extracta, etiam cum succo sempervivi majoris subacta, linimentum præbet non inconveniens. Plures in usu habent fungos sambuci, auriculæ Judæ dictæ, quos infundunt aut coquunt in aqua salviæ vel lacte, & abluunt aphthas. Præ cæteris rapæ egregiè conveniunt, si recipiatur succus raparum in aqua coctarum expressus, cui aliquid sacchari vel mellis addatur, si decoctum raparum, si rapæ supra ignem tecto vase sine aqua assata, ex quibus expressus succus, etiam sine saccharo, est optimus. Item oleum raparum saccharatum est præstantissimum. Vid. Sylvius libr. 3. Prax. Item Misc. Acad. Nat. Curios. Ann. 4. & 5. pag. 73. Bartholini Aët. Med. Hafn. Volum. 4. pag. 49. Si deteriores sint aphthæ, pro lotionis oris decoctum Veronicæ in aqua simplici factum cum melle mistum; aut loco Veronicæ potest sumi fatureja. Decoctum salviæ in vino vel hydromelite fricando aphthas & bene os ablucendo: aut etiam decoctum foliorum & florum ligustri in aqua communi, addito pauco melle, pro aphthis perfectè exulceratis sanandis compertissimum est.

Gingivarum putredo curanda per sequens decoctum:

℞. HB. Cheresfol. M. j.

Salv. Mß.

quæ in aqua simplici decocta, cui parum aceti, & in fine paululum mellis additum sit, dat gargarisma.

Vel ubi adhuc plus ulcerantur, convenit linimentum ex myrrha, thure, gallis, & melle; quæ invicem mista exulceratis locis illinuntur.

In aphthis exulceratis periculosioribus adeoque serpentibus, idque in ablaetatis imprimis.

℞. ∇ Plantag.

quæ imprægnetur spiritu vitrioli ad suavem saporem, addito vel omisso melle aut syrupo violarum.

Hoc ipso tangantur aphthæ.

Porro ubi alia non juvant, linimenta ex melle rosato, vel simplici, cui tantillum spiritus sulphuris vel vitrioli, vel salis fuerit admistum, illinantur aphthæ exulceratæ. Aut denique ulcera oris serpentina curat linimentum ex melle despumato, cui album græcum est immistum. Colluatur postmodum os cum aqua vincæ pervincæ cum aqua salviæ plantaginis, & similibus.

Sed

Sed etiam in rerna, partim absorbentia, partim blandè laxantia, interdum anodyna usurpanda sunt: Conf. Riverius *Centur. 2. Observat. 43.* & *Centur. 3. Observat. 35.*

## ARTICULUS XV.

De

### Vigilia Nimiis.

**V**igilia nimia, subindè graviter vexant infantes, unde non solum nutritio eorum impeditur, sed etiam aliis malis occasio simul suggeritur. Ut plurimum alios sequuntur affectus, & adsunt non per *παραπύθνας*, sed per *διρρηγνάθνας*.

#### CAUSÆ.

Causa omnium frequentissima est (1) abundantia lactis & pultis, quo infanti infantes ex digestionelaboriosiore minus dormire possunt. (2) Lac acrius plus minus, irritans præcordia aliasque partes nervosas, cum quotidie in Praxi observemus, lac unius nutricis longè magis quietos reddere infantes, quàm alterius; quo minus nempe temperatum, sed magis butyrosus fuerit, eò minus dormire valent. (3) Cruditates & acria contenta præternaturalia in stomacho & primis viis, lac plus minus viciantia, & partes nerveas circa hypochondria irritantia, in specie, ubi cruditates vitiosæ fermentando simul inflationes hypochondriorum effecerint. (4) Denitio difficilis. (5) Lumbrici subindè pertinaces: Vid. M. A. N. C. *Ann. 8. Observ. 36. pag. 66.*

#### PROGNOSIS.

Affectus per se est manifestus, & periculosus, quoniam vires infantum notabiliter dejicit, atque occasionem dat epilepticis insultibus.

#### CURA.

In cura ergo præmissis præmittendis, in specie blandè laxantibus ac primas vias abstergentibus, papaverina, nempe syrupus de papavere, emulsio ex semine papaveris & similia, nec nisi præmissis aliis, idque cautè, admovenda, vel in imminuta dosi propinentur, quia stuporem & torporem insignem inducunt spiritibus animalibus, ut postmodum talia semper habere soleant ingenia stupida. Aut quod tolerabilius est, sufficit pulmentum ex lacte, in quo cortices capitis papaveris cocti fuerunt. Nostrates propterea Mithridatii vel theriaces tantillum propinant, vel fiant emulsiones:

*℞. Amygd. dulc. ʒj.  
Sem. papav. alb. ʒʒ.  
c. ʒ Fenic. f. Emuls.*

adde

*C. C. f. De gr. xv.  
⊕ vol. C. C. gr. iv. vel v.  
edulcoretur parum.*

Item syrupus papaveris albi, aut diacodium, cum aliis, in parca dosi exhibetur; vel etiam lac syrupi papaveris simplicis, syrupus papaveris rhæados, tanquam minus malignus, est usurpandus; interdum unum alterumve parum cochlear cum aqua hypnotica Dorncreilii propinari potest. Cinnabaris antimonii cum cervinis similibusque absorbentibus propinetur.

*℞. ʒ Fenic. ʒj.  
Farin. licopod. ʒj.  
Gran. hum. præp. gr. xij.  
Syr. fl. Tunic. ʒj. M.*

Propinetur crebrius.

Externè,

*℞. Ol. expr. nuc. mosch. ʒj.  
dest. ruta ʒj.  
Succini ʒʒ. M.*

Hoc ipso illinantur præcordia & nucha.

Etiã oleum anethi destillatum ad aliquot guttas commodissimè misceri cum oleo nucis moschatæ expresso, & temporibus blandè illini potest: quibus etiam commodè applicatur lac muliebre cum paucis croco temporibus; vel fiat emulsio ex nucleis persicorum cum lacte muliebri, quæ instar epithematis tepidè fronti admovenda est. Item pinguedo lucii piscis, plantis pedum applicetur. Item medulla cervina vel medulla crurum vituli liquefacta temporibus illinatur, aut, quod tutius est, plantis pedum inuncta commodè usurpatur.

## ARTICULUS XVI.

De

### Pavoribus in Somno.

**O**riuntur ex explosivo ferè impetu spirituum animalium in nervos, qui cum sub somni requie blando tardoque gressu influere debeant, impetuosius irruentes inopinato totius infantis corpusculum ex fibrillarum nervearum momentaneo nisu contractivo inferunt ejusmodi concussionem. Fomitum imprimis cruditatem acidam semper agnoscunt, in primis viis circa ventriculum & intestina, iisdem ferè ex causis, ex quibus agrypnias induci modò insinuat fuit. In specie ad acre acidum volatile hic imprimis respiciendum, quod vellicando præcordia, os ventriculi, &c. somnum ita interrumpit, & pavidos infantes reddit; unde subindè etiam plorant. Sæpius etiam torminibus infestantur infantes pavore nocturno corrupti.

PRO-



## P R O G N O S I S.

Pavor hic est periculosus, non per se, sed quod prodromus ut plurimum sit epilepsiæ.

## C U R A.

Propterea in cura ea, quæ hoc acidum temperare possunt, primatum ducunt, semper simul respiciendo ad epilepsiam, propterea etiam subinde antepileptica cum successu usurpari possunt. Conveniunt ergo crystal- lus præparata, cranium humanum præparatum, cornu cervi sine igne, smaragdus præparatus, pulvis Marchionis, cinnabaris antimonii, pulvis epilepticus antimonialis, corallia rubra præparata, dens hippopotami, &c. in aqua pæoniæ, menthæ, fœniculi, &c. cum quibus etiam semen pæoniæ non inconcinnam præbet emulsionem. Hinc pulvis ex semine anisi, aquilegiæ, & succino præparato, commodissimè propinatur infanti cum pulte; sicut & specificum cephalicum cum semine anisi permistum commodè propinatur. Item mechoacannæ pulvis pro abstergendo lacte corrupto ex primis viis subinde propinatur.

Externè clysmata acria pro scopo revulsio- nis injiciuntur. Hinc oleum stomachale Cratonis, cum oleo destillato anisi acuatam, ventriculo, umbilico & hypochondriis illi- natur; vel oleum nucis moschatæ expressum cum oleo destillato anisi imprægnatum tam ventriculo quàm temporibus illinatur, sed in parva dosi. Vel sacculus ex aniso contuso vertici capitis impositus, una cum reliquis commodè usurpari potest.

## ARTICULUS XVII.

De

*Epilepsia.*

**M**Ater puerorum, seu potius eorum no- verca, quibusdam dicitur epilepsia, nata ex inordinato & perverso spirituum animalium motu, in cerebro & violenta explo- sione in nervos. Frequentissimè autem pa- ris vagi & intercostalis ramificationibus an- nexæ partes abdominis & thoracis præ ceteris partibus convulsionibus hujusmodi epilepti- cis tentari solent, iisque subinde gravia tor- mina in abdomine superveniunt, quia dictæ partes internæ prius affliguntur, quæ tormina mulierculæ convenienter admodum *Die schwere Noth im Leibe* appellare solent. Post repetita autem talia pathemata superve- niunt etiam convulsionibus epilepticæ in parti- bus externis, quia continuus & nunquam interruptus spirituum animalium in hos ner- vos est motus & influxus, pro continuando motu cordis, diaphragmatis, & respirationi

intervientium muscutorum primariorum, ut & ventriculi & intestinorum motu peristal- tico perficiendo; unde consueto quasi tra- mite longè promptius irruunt in dictarum partium nervos spiritus animales, quàm in membra externa in infantibus magis quieta, adeoque dictos spasmos internos frequen- tius concitant. Quod si verò crebrius repe- tant, tandem totum spirituum animalium exercitum, integrumque systema nervosum per consensum & continuitatem motus simi- liter afficiunt, unde universalis tandem super- venit epilepsia, de qua dicunt, *die schwere Noth bricht aus*.

## C A U S A.

Malum hoc ferè semper per consensum partium nervosarum cum partibus nervosis & membranis oriri solet, insequitur nervo- rum & horum fibrarum quocunque in loco irritationem, quæ tamen effectivè excitatur occasione vitiosi volatilis & corrosivi acidi, per se nervis inimicissimi, multò magis ner- vis tenellorum, quorum fibrarum nervea- rum textura mollior, tenerior & subtilior, facillimè mobilis, & ita in convulsivos mo- tus crispabilis, ut sic dicam, existit. Hinc quò propinquiores sunt partes fonti vitiosi acidi, stomacho nempe & intestinis, aut mediantibus nervis connectuntur iisdem, etiam frequentius patiuntur convulsivos spasmos, qui continuati ulterius in tantum, donec totum nervorum systema in cerebri ce- rebellique confiniis concutiant, universalem tandem epilepsiam, superveniente spirituum impetu, inferant. Uti in adultis subinde in membro quodam externo focus later epilepticus, qui per continuatos spasmos sub apparente auræ frigidæ sensu sursum delatus ad cerebrum, tandem universum microco- smum concutit; ita pari ratione ex acido, quod imprimis viscidum in intestinis aut glandulis mesenterii hospitatur, tam spasmi leviores interni, quàm epilepticus totius cor- pusculi insultus, oriuntur: propterea absor- bentia rariora, & hinc liquor cornu cervi succinatus, aliaque salia volatilia acria, quæ acidum destruunt, & viscidum incidunt, ex- perientiâ teste infantibus epilepticis solent esse convenientissima. Adeò ut rarissimam infantum existimem epilepsiam, cujus fo- cus acidus non in abdomine lateat, aut ex abdomine non derivetur, ita tamen, ut ci- tra halituum aut fumorum impossibilem ad- censum malum dicto modo explicari queat. Fomittem epilepsiæ infantilis existere ferè in abdomine, ex eo concludi potest, quod imminente malo ferè semper soleat tendi abdomen, &, ut arbitròr, peritonei mem- brana spasmo afficiatur; hinc infantes solent difficulter & quasi cum suspiriis respirare, Vid.

Vid. M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Obs.* 201. qualis difficilis respiratio in iisdem ferè semper originem ex hypochondriis ac stomacho, harumque partium vel repletionem, vel tensionem habere solet. Oboriri autem nocturnos pavores & epilepsiam infantum primariò ex acido peccante, etiamsi nulla hujus indicia vel adsint, vel præcesserint, nisi ex dentitionis dolore epilepsia superveniat, ex eo fit manifestum:

1. Quod frequenter tormina infantes cum excretis æruginosis aut nigricantibus simul affligant, & si diutius continuentur, tandem in infantibus epilepsiam inferant, teste præter Quercetani in *Tetr. Graviss. Cap. Aff. cap. 11. pag. m. 116.* Lindano super *Hartm. in Prax. Chimiasticam*, qui vix virorem æruginis instar intensam in infantum excretis observati asserit citra epilepsiam. Quod si dicta materia ita sit acris, ut febris eam accedat, plerumque interimit infantes. Epilepsiam ab hac causa ortam prægredi solent ejulatus infantum ferè continui, tormina, & dolores abdominis, & jectigationes infantum, tormina verò talia excreta ex acido lactis corrupto superius derivavi.

(2) Juxta Hippocratem *lib. de morbo sacro* post curatam epilepsiam undecunque natam pustulæ & achores, aut scabies, nunc in universo corpore, nunc in capite, nunc circa aures, nunc in facie, nunc in nucha & dorso, efflorescere solent, quæ cum pruritu suppurantur, hinc decidunt, idque cum euphoria: Vid. Sennertus *de Morb. Infant. Part. 2. cap. 3. pag. 28.* quas exulcerationes etiam ex acido lymphæ deduxi.

(3) Accedit cura epilepsiæ infantilis per alcalia volatilia, item per terrea acidum absorbentia.

Aliàs frequentissimæ epilepsiæ occasiones solent esse

(1) Meconium à partu non sufficienter expurgatum, vid. M. A. N. C. *loco alligato.*

(2) Lactis in stomacho corruptela, & inde natus vitiosus acor, atque tunc excreta infantum solent esse viridia aut nigricantia.

(3) Dentitio difficilis propter dolorem, & propter fibras nervosas in gingivis à dentibus erumpentibus punctas, concitando inordinatum spirituum animalium motum, & commovendo in corpore acidum vitiosum.

(4) Vehementiores ac subitanei animi affectus, tam nutritis quam infantis, præsertim illius ira, hujus verò terror.

(5) Excreta retenta aut cohibita, v. g. achores, variolæ.

(6) Lumbrici. Vid. M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Obs.* 107. & 235.

#### DIAGNOSIS.

Signa epilepsiæ per se patent.

Tom. II.

Causæ etiam latere non possunt, partim ratione ipsius infantis, ex retento meconio, difficili dentitione; partim relatione nutritis, partim ex acescentia lactis.

#### PROGNOSIS.

Funestum malum est infantibus, licet familiare, ex quo sæpius periclitantur, mortemque obeunt, præsertim si in tenuiore constitutione crebrius malum repetat.

In principio variolarum minus periculi habet; nam ubi erumpunt variolæ, spontè cessat epilepsia.

#### CURA.

Pro cura causarum habenda est ratio: cum verò ut plurimum ex stomacho & acido acri ibi genito malum oriatur, absorbentia & acidum destruentia, tam fixa quam volatilia, & hinc anodyna mineralia, sunt optima. Specificè conveniunt radix pœoniæ, & internè & externè justo tempore collecta, emullio ex semine pœoniæ, vid. Strobelbergerus *Tr. de morb. Infant.* & omnia ex pœonia parata. Majoris pretii tamen est viscus corylinus, & post hunc viscus quercinus, succinum & farina lycopodii. Multò magis tamen convenit similis farina ista seu pulvis flavus primo vere ex julis coryli collectus. Deinde non rejicienda communia euporista, unicornu marinum præparatum; dens hippopotami, crystallus præparata, imprimis si excernantur per alvum viridia, acidum enim interimit, cum aptopriatis imprimis si permisceatur; spina mustelæ picis, cranium humanum, lapis bezoar animalis, pulvis Marchionis &c. Quæ si non suffecerint, sit pulvis secundinæ humanæ primiparæ, quilibet spiritus urinosi, ac salia volatilia, in specie spiritus & sal volatile cornu cervi, cranii humani, secundinæ humanæ, sal volatile succini, & liquor C. C. succinatus; sicuti gr. j. camphoræ in aqua florum chieiri post paroxysmum assumptum præservat, ne tam facile recurrere possit. Porro cinnabaris antimonii, cinnabaris nativa præparata, depurata, & super ejus basin compositum specificum cephalicum. Sulphur antimonii, ex scorii reguli ultimâ vice certo modo præcipitatum. Infantibus datur ad gr. j. & in robustioribus paulò ad gr. iß. ad summum gr. ij. Aurum quoque fulminans mirabilis est efficaciz in corrigendo & eradicando fomite epileptico, cum arcano duplicato vel nitro depurato propinatum. Si à terrore sit malum, smaragdus laudatur.

℞. Ebor. f. Δe Ὠ.

Ὠi fulmin. gr. j. M.

℞. Unic. veri præp.

Cran. hum. f. Δe aa. Ὠ.

Ὠi fulmin. gr. ij. M. pro 2. dof.

(Yyy yyy)

℞. ∇ Fl.

℞. ▽ *Fl. Pæon.* ʒiʒ.  
*Cinnam. c. vino* ʒj.  
*Syr. fl. Tunic.* ʒiʒ. M. S.  
*Wässerlein zum Pulver.*

Pro infante aliquot dierum :

℞. *Unic. mar. prap.* gr. viij.  
 ʒ *epilept. ʒial.* gr. ʒ. M.

Infanti duorum annorum :

℞. ʒ *epil. ʒial.*  
*Œi fulmin.* aa. gr. iij. M.

℞. *Farin. lycop.* ʒʒ.  
*Cinn. nativ.* gr. iv. M.

Farina lycopodii etiam commodè cum pulve propinari, & ita variis infantum affectibus succurri potest.

Quoad externa ; optimè confert & præservat cinnabaris nativa, de collo tantum suspensa, vel, ut aliis placet, carpis applicata. Usneam cranii humani externè prodesse scribit Kircherus in *Regn. Natura sympath.* Ossiculum bufonis pulsui infantis applicatum, ob ideam pavoris, epilepsiam ex ira vel terrore nutricis, & infantem paulò post lactantis, natam sistit. Vertici, si paulò robustior fuerit infans, oleum succini commodè illinitur. Aliàs litus pro vertice, præcordiis & abdomine ex oleis & balsamis rutæ, torismarini, fœniculi, imprimis balsamum succini, sedulo in usum vocandi ; quibus & paucum castorei vel extractum ejus subinde addi potest ; quin & oleum castorei pedum plantis utiliter admoveatur. Quò etiam pertinet oleum seminis ricini majoris seu granorum tilli expressum, cujus p. j. cum p. iv. pinguedinis erinacei in linimentum rediguntur, quod umbilico illinitur.

℞. *Cerot. pro bregm. usitat.* q. f.

Malaxetur c. oleo succini aut rutæ, aut, si penetrantiora hæc videantur, cum balsamo Peruviano, & imponatur capiti : qualia potentius in infantibus operantur, quàm in adultis, quoniã fontanella in iisdem est adhuc aperta.

## ARTICULUS XIIX.

De

### *Dentitione infantum difficili.*

**O**Ritur dentitio infantis difficilis, partim, dum intra alveolos incrementum capiunt, partim, dum extra gingivas jam robustiores dentes prorumpunt. Nam dentium pulpa radicalis in formatione fœtus inseritur gingivis in forma mucilaginis mollis : postmodum dum quinque vel sex mensium sunt infantes, successivè indurata & augmentata penetrare incipit per gingivarum carnem spongiosam. Si ergo facilè penetrat, & hanc carnem perforat, est dentitio facilis ; quod si propter tenacitatem aut duritiem gingiva-

rum difficilior erumpat, propter concurrentia gravia symptomata, est dentitio difficilis. Unde sub dentitione hac, dum non possunt satis penetrare, insignem pruritus, hinc intensum dolorem, ardorem febrilem, &c. percipiunt gingivæ, dum ab aculeatis talibus ossibus incrementibus perforantur, eadem insigniter intumescunt, simul plus minus inflammantur, inde inquietudines, ploratus, agrypnia, &c. superveniunt. Dolor qui primariò urget, similis quodammodo est illi, dum acido morbofo gingivæ in dentium radicibus punguntur, & quasi perforantur. Sed cum senilis gingivarum ex interspersis variis nervulis substantia cum partibus vicinis insignem consensum habere soleat, quod ex odontalgia adultorum, subinde dimidiam capitis sphaeram per consensum afficiente, interdum muscoli temporalis aliquem spalinum inferente, notissimum est, de facili evenit, ut atrocioribus sub doloribus tandem universum ferè nervorum systema simul vellicetur, & inde convulsiones, epilepsia superveniant : idque eo promptius, quò vel per se & in se ipso nervorum systema infantum tenerius & mobilius extiterit, vel ipsum ex perversa dicta matris vel nutricis, acidis abutentibus, in primis suis staminibus debilius & facilius irritabile redditum, vel ex lymphâ vitiosa commota hinc inde irritatum fuerit : item cum doloris gingivarum occasione vicina glandularum, præprimis salivarum, vasa, & illas integentes membranæ, vellicari soleant simul, hoc ipso copiosior saliva in os effundatur, ordinariè copiosè admodum salivant infantes ; quâ salivâ copiosius etiam deglutitâ læditur appetitus, nunc turbatur digestio prima, relaxatur ventriculus & intestina, interdum supervenit vomitus cum tussi ferina, aut certè copiosa diarrhœa plus minus serola, quæ hoc tamen habet commodi, quod quò copiosius fuerit, eò minus epilepsia tentari soleant infantes. Item cum copiosiori ex saliva, regionisque vicinæ dolore, simul irritantur fauces, etiam copiosior lymphæ ad fauces & asperam arteriam affluxus supervenire solet : quæ lymphæ, si & ipsa minus temperata, sed falso acida plus minus fuerit, ejus occasione, præter rosionem faucium & laryngis, tussis creberrima sicca seu inanis cum respiratione stertoria quibusdam accidit : Imò cum in infantibus minus sanis doloris & agrypnia ratione, commotis nimis spiritibus, quælibet in corpore turbari soleant, facilè vitiosum acidum comoveri, hinc epilepsia tam frequenter dentitioni supervenire solet, donec erumpentibus tandem dentibus ista symptomata successivè cessent. Observatus fuit interdum in infantibus, sub dentitionis tempore genarum tumor, qui linquendus est ; nam superveniens diarrhœa interdum eundem solvere



solvere solet. Contingunt hæc ferè, dum sex septemve mensium fuerit infans: idq; omnium maximè in dentibus caninis erumpentibus, hinc in molaribus, omnium minimè in incisioribus, symptomata talia observari solent.

**DIAGNOSIS.**

Signa diagnostica patent ex jam dictis, ex dolore, saliva, tumore, caloris sensu, &c. imprimis facile sentiunt nutrices imminentes dentes, quando nempe infantes, dum sugunt, papillas gingivis acius & fortius apprehendunt, ac adstringunt: item calor infusus in ore infantis percipitur, ipsique infantes manibus ori ingestis doloris locum ferè ostendunt.

**PROGNOSIS.**

Dentitio ipsa per se malum est minus periculofum, saltem propter supervenientia symptomata, nempe convulsiones epilepticas, aut diarrhœas excessivas, periculum incurtunt, quæ tamen & leviores sunt & minus periculofæ, si adjuncta sit diarrhœa moderata, aliàs sæpius sunt funestæ. In specie autem ex caninis dentibus graviter laborare solent infantes, propter eorum duritiem & majorem acutiem.

**CURA.**

In cura omnis intentio eò dirigatur, ut emolliantur gingivæ, ardor & dolor earum sopiatur, symptomata supervenientia mitigentur, atque erumpentes dentes facilius transmittantur: in quem finem recipiatur mucilago seminis cydoniorum & psyllii cum  $\nabla$  spermat. ran. extr. quæ dentibus subinde illinenda. Vel

*R. Mucil. sem. Psyll.*

*Rad. alth. c.  $\nabla$  semper v. par. aa. ʒʒ.*

*Ol. amygd. dulc.*

*Papav. aa. ʒij.*

*M. D. S.*

*Lindernder Schleim.*

Mel etiam vel solum, vel cum medulla crurum vituli subactum, & gingivis illitum, dolorem sistit. Frustulum radice althææ recens, vel aridum in aqua malvæ maceratum, sæpius detur infantibus, ut istud probè mastificent, & masticando mucilago radice extracta successivè emolliat gingivas; cujus loco non ineptè alii frustulum corii lardi recentis substituunt. Non enim approbo communem sententiam, quâ dens lupinus aut crystalli frustum infantibus pro masticatione porrigitur, quoniam durities horum facit, ut gingivæ fortiori attritu magis potius indurentur, quam ut emolliantur. Item medulla crurum vituli, aut unguentum dialthææ, gingivis illinendum venit, succus cancerorum fluviatilium, cum aqua florum cyani contusorum illitus gingivis: vel fiat balsamum pectorum dentientium, quò illinantur gingivæ,

Tom. II.

quale elegans describit Johann. Daniel Horstius in *Dispens. pag. 567.* vel M.A.N.C. *Ann. 6. & 7. pag. Append. 576.* Præ aliis sanguis ex crista galli parum incisa exstillans gingivis illitus, ad dentium eruptionem promovendam quibusdam laudatur. Vel ipsa crista à gallo nigro rupta vel decisa pro masticatione quasi, vel gingivis conterenda porrigitur infanti. Potentissimum remedium dicitur cerebrum leporinum gingivis illitum, quod potenter dentium quasi extractionem promovet, coctum tamen & cum melle in forma linimenti mixtum, tutius esse dicitur, quam crudum; ejusdem enim vis nimia sic mitigatur. Huic cerebrum agni aut hirci alii substituunt. Aliis irritis, si protuberantia gingivarum, & superior ejus candidior reddita pars, dentis jam proximè absconditi signum exhibeant, scalpello eas incidit Paræus *lib. 23. cap. 67.* quod ceu tutum sibi que compertum & lumè proficuum commendat Borellus *Cent. I. Observ. 97.*

Extra fiunt totus maxillarum, item inunctiones ex emollientibus, discutientibus & lenientibus; hinc butyrum recens insultum, medulla crurum vituli, oleum amygdalarum dulcium, liliorum alborum, chamomillæ, unguentum dialthææ, mucilago radice althææ aut seminis psyllii, theriaca, &c. maxillis & regioni temporum loci dolentis illinatur pro leniendo spatino doloroso, & intensiore dolore. Quidam linimentum ex axungia leporis cum melle despumato, ana, post aures vel ante aures illinunt, ut faciliter & denti eruptione, & præcaveatur vicinarum partium tumor.

Intra os supra dicta emollientia ex mucilagibus & axungis non adeo nimis copiosè aut frequenter usurpanda sunt, quando nempe adest diarrhœa, quia periculum est, ne talibus laxantibus & lubricantibus successivè deglutitis exasperetur potius quam leniatur diarrhœa, utut dentibus conducatur.

Ut verò reliqua interea mitigentur supervenientia symptomata, qualia primariò sunt febres & convulsiones, optimum fuerit, si alvus, quantum possibile, servetur probè fluida: nam quibus, cum dentes erumpunt, alvus crebro laxatur, minus convulsione tentantur, inquit Hippocrates *de Dentit. lib. I.* Hinc vel sponte alvus fluidior servetur talis, vel eadem clysmatis, similibusque remediis laxior reddatur; conf. Hæferus *Herc. Med. pag. 355.* Idque speciatim in iis, qui ex nutrice cacochymia minus laudabilem sanguinis, reliquorumque contentorum crasin obtinent: nam & tales ordinariò gravius sub dentitione laborare assolent. Internè gelatina cornu cervi recens, crebrius quocunque vehiculo propinata, & hinc liquor cornu cervi succinatus, ob convulsionum imprimis metum medicamenta sunt tutissima & utilissima.

(Yyy yyy 2)

ARTI-

## ARTICULUS XIX.

De

*Dentitione Notha.*

**R**eperitur præterea etiam dentitio notha, quod vocant *Beul-Zähne* / quando scilicet erumpunt tubercula in gingivis, eaque insigniter dolentia, ex quibus tamen nulli dentes erumpunt, quin potius lactationem impediunt, & lactando infantes suum solum edunt, sic *schmagen dabey*.

## D I A G N O S I S.

Imprimis huiusmodi dentitio notha cognoscitur, si infantes juxta aures digitis premantur, tunc enim incipiunt ejulare.

## P R O G N O S I S.

Malum hoc propter dolorem aut subsequentem inflammationem est satis periculosum.

## C U R A.

Cura consistit in eo, ut inungantur infantes circa & penes aures auxungia leporina: ipsi vero tumores illinendi sunt & fovendi oleo amygdalarum dulcium recenti, sic enim successivè evanescent.

## ARTICULUS XX.

De

*Diarrhœa.*

**A**lvi fluxus sæpissimè est dentitionis difficilioris comes, cum quo conjuncta esse solet eorundem imbecillitas: sæpius adest dejectus appetitus, & tandem nonnihil atrophiam corripere incipiunt infantes.

## C A U S A.

Quoad causas; ordinariò, dentitionis tempore supervenit diarrhœa, dum continuò os madet saliva, quæ copiosius deglutita lactis digestionem prohibet, & intestina nimis laxat, cum simul propter dolorem & inquietudinem lac minus commodè concoqui possit, quod sponte ex pyloro denuò egeratur. Præterea tamen etiam nutricum lac nimis aquosum, tenue, acrius, salius, serosius, &c. sæpissimè diarrhœæ est causa, irritando intestina ac ventriculum. Id quod fit imprimis, quando nutrices crebrius usurpant potum frigidum, aut etiam quando mammas libero aëri nimis exponunt; tunc enim lac crudius & serosius generari solet. Aut denique ipsa infantis digestio læsa, indeque nata liquamina acria, salsa aut æruginosa, alvi fluxum inducere valent.

## P R O G N O S I S.

Per se quidem proficua observatur alvus

laxior infantibus, præmissis in dentitione, in qua, potius conducit, quàm nociva est: sin verò crebrius affligat, imprimis si ad septimum usque porrigatur diem, funesta esse solet.

Mitior tamen est alvi fluxus, ubi albicantia aut flavescentia rejiciuntur; deterior, ubi acria, viridia, in specie fœtida plus minus nigra excernuntur.

Si appetitus adhuc constat, res benè habet; hoc nimis dejecto, res non caret periculo.

In febre ardente, aut acuta, si nigra rejiciantur, infantibus ferè periculum mortis imminet.

## C U R A.

Ordinatà ergò debità nutricibus dietà, præsertim ex oryza, milio & similibus, potius calido, ut ita lac ejus nonnihil alteretur, conveniunt internè cornu cervi ustum, terra sigillata, maxilla lucii piscis, crystallus, corallia, pulvis tormentillæ, nux moschata, theriaca, & similia. Ulterius mumia cum spermate ceti permixta, ad ℥j. optimè sistit alvum infantum, etiam ubi laborant dynteria. Gummi Arabicum ad ʒj. juscule galinæ aut carnis exhibitum insigniter conducit. Item pilulæ ex extracto tormentillæ, cui granulum semis, aut etiam adhuc minus, laudani opiatum sit additum, offerri etiam possunt infantibus, in lacte dissolutæ, v. g.

℞. C. C. ussi præp.

☞ sigill. aa. gr. viij.

Extr. rad. Torment. gr. xij.

Theriaca. gr. ij.

M. pro 2. dosi.

℞. ∇ Menth.

scord. aa. ʒvj.

C. C. ussi præp. gr. xv.

☞ sigill. gr. xij.

Theriaca. gr. ij. vel iij.

Syr. Plantag. ʒij. M.

Grana mastiches cum paucis nucis moschatæ permixta etiam stomachum roborant, & alvi fluxum sistunt: vel subigatur mastiche cum paucis syrupo de rosis siccis & cydoniorum, aut etiam cum syrupo mastichino, & subinde lambenda offeratur infanti. Tincturæ coralliorum imprimis commendantur à modernis, si nimio acore non sint inquinatæ; unde tinctura coralliorum cum spiritu cordis cervi in parva dosi propinari potest infanti, in specie si cum febre maligna vel torminibus conjunctus sit alvi fluxus.

Item in diarrhœa infantis cum excretis viridibus & acribus, æstu corporis, &c. ex acrimonia contentorum aut lactis nata.

℞. ∇ Plantag. ʒj.

Mentha ʒij.

Gel. C. C. rec. ʒß.

Lap. S. præp. gr. vj. M.

Usurpando simul clystima ex lacte, & illinendo.

nendo regioni ventriculi & umbilici, vel balsamum nucis moschatae vel theriacam.

Clysmata lenientia imprimis, quando acres succi peccant, egregie conveniunt.

Hiscæ, si dysentericus superveniat fluxus, bolus Armena, crystallus præparata, maxilla lucii piscis, ac similia acidum absorbentia, addi possunt.

In infantibus ablactatis:

℞. ▽ fl. sambuc.

Fenic. aa. ʒi.

Succ. Cydon. ʒvj.

Corallor. præp. ʒj.

— Sigill. ʒss.

Syr. Papav. alb. ʒiii. M.

Externè infantibus convenit pro litu umbilici theriaca, aut oleum destillatum menthae, macis, absinthii, spicae, excepta cum theriaca aut balsamo Peruviano aut similibus; aut etiam oleum mastichinum & nardinum, cum aliquot guttis olei spicae umbilico illitum: vel cataplasma ex cydoniis coctis, per setaceum trajectis. Item forus ex decocto rosarum rubrarum, radicis tormentillae, menthae, plantaginis, &c. in vino rubro coctis, cui simul nux moschata & caryophylli sunt addita, & ita cum pannis multiplicatis applicatur calidè abdomini, ut nimius impediatur fluxus.

## ARTICULUS XXI.

De

### Lumbricis.

**P**Ræteris mille malorum autores infantibus existunt lumbrici, iique saltem longi, die Spulwürmer; raro enim lumbricus latus seu tinea aut cucurbitinus in infantibus observatur, exemplum tamen videatur in Bartholini *Act. Med. Hafn. Vol. 3. pag. 116.* Non raro etiam ascaridibus torquentur, quæ scilicet incolunt intestinum rectum. Nullum ferè est symptoma, quod non excitatur à lumbricis, in intestinis infantum stabulantibus, adeo ut etiam horrendas epilepticas convulsiones in iisdem excitent. Ob id accuratiores Prædici studiosè monent, in omnibus affectibus infantum curandis, imprimis abstrusioribus, semper ad lumbricos esse attendendum, ut certa eorundem indicia vix dentur & sæpiissime in obscuro lateant. In specie tamen infantibus talibus os copiosâ salivâ, & quidem semper jejuno stomacho, continuò abundat, item crebrò nares fricant, admodum turbulenti & pavidus in somno sunt, strident præter solitum dentibus in somno. His accedunt, quod tussis sæpius adsit sicca, sitis plerumque infantes, præsertim mane evigilantes, graviter infestat, appetitus etiam subinde nimius est, cum quo

nihilominus marcescunt, & minus nutriuntur, interdum planè dejicitur venter, interdum simul inflatur & intumescit, alvus ut plurimum lubrica est & laxa, tormina ventris rosiva crebro adsunt, præsertim ventris vacuo existente; quæ tormina ferè cessare solent, ubi aliquid alimenti assumpserint; color faciei est inconstans, interdum phlogosi quadam rubere videtur, interdum subito denudò pallet. Superveniunt tandem febres, eæque sæpius malignæ, aut saltim varii typi inconstantis, quæ mirè infantes excruciant: interdum periculosa epilepsia & convulsiones capitis, manuum ac crurum: vid. M. A. N. C. *Ann. 3. Obs. 63. & Ann. 6. & 7. Obs. 137. & 187.* Thonerus *lib. 2. Obs. pag. 94.* Bonnetus *lib. 1. Med. Sept. sect. 15. cap. 5. pag. 133. & lib. 3. sect. 16. cap. 4.* Avicenna *fen. 16. 3. Tr. lipothymia*; aliaque lethalia interdum symptomata superveniunt, quæ omnia, sive plura sive pauciora horum adsint, suspicionem de vermibus eò magis confirmant, si interdum unus alterve mortuus per alvum excretus observatus fuerit, aut ex plurium jam dictorum symptomatum syndrome de vermibus conjectura fieri potest: ex quibus potiora sunt copiosior saliva, stridor dentium in somno, narium crebrior scalptura, sitis matutina, ventris tumor, &c.

### C A U S Æ.

Generantur lumbrici in intestinis, imptimis tenuibus, & sæpius oriuntur ex ἀδυσία, lactis aut pultis, aliorumque alimentorum; hæc enim copiosius ingurgitata, dum non ritè digeri possunt, in mucum degenerant. Mucus hic blandus tamen & dulcis, ex alimentorum, vel non digestorum, vel ritè licet digestorum, reliquiis, si in intestinis diutius hæserit, mediante calore levi, & consequenter inchoata successivè putrefactione, semina lumbricorum recondita gerit. Nempe semina vegetabilium, imprimis cerealia, speciatim secalina & triticea, vel immediate in pulve infantum farinacea, vel mediate in lacte nutticiis, ex pane ingesto nata, & seminali insectorum variorum contagio quasi imprægnata, data occasione & quasi evigilando in infantibus dictos lumbricos excludunt. Accedit, ut monui, tepor loci blandus, simulque in infantibus vis digestiva ventriculi debilitata, quando digerendo non subigitur exacte omnia dictorum animalculorum seminalia principia, sed vivos fetus emittunt. Præterea etiam dulcia imprimis saccharata, quibus infantes delectantur, facillimè animalia subministrantia, eaque varia, faciunt, ut eo promptius in infantibus lumbrici generentur. Et hinc est, quod etiam lumbrici per dulcia ex lacte, saccharo, melle, &c. parata, imprimis alliciantur & inescunt.

(Yyy yyy 3)

Acce-



Accedit denique temperata bilis acrimonia, minusque amara in infantibus, aliàs succos, quos attingit, à tam prompta putredine & verminatione defendens; quæ cum deficiat in infantibus, ubi vis digestiva stomachi est imitior, & bilis temperata, minus corruptelam humorum animatam temperare ac præcavere potest, atque in adultis. Uti namque sal volatile oleosum bilis instar balsami condit chylum, eumque præservat ab omni corruptione, idque eò magis, quò acrior magisque salina volatilis fuerit, uti est in juvenibus adultis; ita cum in infantibus sit magis temperata & minus salina, ob id minus condire potest chylum, minusque defendere eundem à putredine & verminatione; unde tandem mucus lacteus subdulcis in intestinis putrefactus lumbricos excludit: hinc & ubi bilis deficit balsamus, lumbricorum est patria, rectè dicit Helmontius *Tract. sextupl. Dig.* §. 82. hinc etiam tinearum in adultis causam refert Hartmannus potissimum in obstructionem folliculi tellis, in *Prax. Chim. cap.* 156. §. 11. unde etiam talia, quæ amaricantia sunt, & bilis balsamo cognata, uti sunt myrrhata, absinthiaca, aloëtica, colocynthiaca, & denique ipsum fel bubulum, promptè lumbricos fugant & pellunt.

Denique in ablactatis fructuum horzorum esus vi fermentativa uti corrumpit lacticia & pultacea, ita promptissimè infantes ad lumbricos disponit. Talibus ergo occasionibus facile viva ista putredo excitari poterit. Diutius equidem lumbricis subinde affliguntur infantes sine notabili detrimento, ut plurimum tamen pessima symptomata inducunt, ex quibus non rarò periclitari contingit infantes. Quodsi suspicio sit de eorum præsentia, maturè ejiciendi & excludendi sunt.

#### C U R A.

In cura eorundem conveniunt omnia amara, quæ eos aut enecant, aut ceu ipsis adversa fugant. Si propinentur enecantia, simul vel brevi post subjungenda sunt purgantia, eos expellentia. Nam licet semel enecati sint, si tamen adhuc hospitentur in corpore, ex eorum corruptione novi exsurgunt lumbrici.

Conveniunt ergo internè mechoacanna, item paululum de jalappa: syrupus florum persicorum, si paulò robustior fuerit fœtus, species diaturbith cum rhabarbaro à gr. viij. usque ad xv. propinatæ, vel ꝯ dulcis.

Commodissimè autem cum conserva florum Persicorum in forma boli, vel cum saccharo in rotulas redactus, usurpatur:

℞. *Conf. rosar.* vel *Conf. flor. Persic.* ℥ss. 3ß. ad 3j.

ꝯii *dulc.* gr. iij. iv. ℥ss. vel gr. xv. ad xvij.

c. f. q. *Syr. fl. Persic.* f. Bolus. S.

**Parier-Zucker gegen die Würmer.**

Ubi infans fuerit jam aliquot annorum, commodè etiam pro stimulo aliquot grana jalappæ addi possunt.

℞. *Conf. fl. Persic.* ℥ij.

ꝯii *dulc.* gr. xij.

℥ Jalapp. gr. v.

Cum *Syr. fl. Persic.* f. Bolus pro duabus vicibus infanti 3. annorum.

Juratus enim lumbricorum hostis est Mercurius, si cum saccharo, quod succum singularem vocat Schræderus in *Pharm. lib.* 3. cap. 15. pag. 398. subigatur probè tamdiu in mortario vitreo, donec pulvis gryseus emergat, qui pulvis aliàs notus est sub nomine pulveris ad vermes D. Michaëlis, à ℥j. ad 3ß.

Etiam aqua Mercurialis hermetica, quam vocant, vel anthelmintica Helmontii, seu quæ sit ex infusione Mercurii vivi, ejusque agitatione aut ebullitione, certum est experimentum. Nempe recipiatur ℥j. ꝯii vivi bene purgati, aut revivificati infund. in ℥bj. ꝯx simpl. vel radiceis graminis, vel hyperici & probè agitantur invicem in lagena vitrea, vel decoquuntur: Reponitur hæc mixtura, ut ꝯ omnis fundum petat, & ꝯ superflans contagio ꝯii infecta clarescat.

Præter dicta ulterius lumbricos enecant & pellunt omnia ex cornu cervi parata, quælibet ex Marte; hinc absinthium, hypericon, corallina, ejusque pulvis, zedoaria, scordium, pulvis item summitatum & seminis tanaceti, gentianæ pulvis cum cornu cervi sine igne & tantillo myrrhæ, tinctura sautis, aloë & similia amaricantia, sal volatile & spiritus cornu cervi probè essentificatus, vel sale volatili proprio acuat, adeoque & polychrestus liquor cornu cervi succinatus; hic enim promptè lumbricos pellit, & commodè usurpatur, ubi simul imminent epilepticæ convulsionum cum lumbricis.

Ex his aut similibus parantur essentia composita contra vermes, qualem habet Scharffius in *Descript. Juniperi.* Aqua destillata raphani rusticani, de qua vid. M. A. N. C. *Ann.* 6. & 7. *Obs.* 187. Aliàs decoctum radiceis filicis in lacte commendatur. Crocus Martis ex vitriolo præcipitatus huc quoque pertinet: c. g.

℞. *Croc. Ois per stat.* 3ij.

*sem. tanaceti* 3j.

℥ Zedoar. ℥ij.

c. f. q. *Sacchari* f. Rotulæ.

Certissimum experimentum etiam pro adultis est præcipitatum Veneris, quod & Timæus von Guldenslee tanquam arcanum, & Zwelferus commendat: Nempe vitriolo Veneris affundit phlegma vitrioli Veneris acuat cum paucis spiritu proprio, solutio filtrata

filtrata præcipitatur cum oleo tartari per deliquium; sic acquiritur pulvis, vel cæruleus, vel exactè viridis, qui optimè edulcoratus ad gr. v. vel vj. pro ratione ætatis in vehiculo convenienti propinatur.

Ubi non amplius lactantur infantes, optima sunt remedia spiritus sulphuris, seu vitrioli; si nempe quicumque potus & aqua appropriata, aut etiam saltem aqua communis acidulata præscriptis spiritibus modicè imbuetur, de qua interdum pro lubitu hauriat infans.

Cum his internè assumptis vermes pellenribus simul per clysteres semper injiciantur dulcia, quæ lumbricis sunt amica, & deorsum versus ad se alliciunt; qualia sunt ex lacte vaccino vel muliebri ad ʒij. vel iij. cum sufficiente quantitate sacchari, aut ex decocto passularum cum saccharo, aut ex decocto câricarum aut similibus.

Externè simul umbilico applicetur linimentum sequens:

℞. Aloës ʒij.

Myrrha ʒß.

Cum felle Tauri f. linimentum.

D. S.

Salbe gegen die Würmer.

Cum oleo colocynthidos acuaturn indetur frusto vesicæ bubulæ vel suillæ, & ita applicetur umbilico, & quamdiu adhæret, retineatur; quodsi adlinc lumbrici, fortiter adhæret, nec prius cadere solet; nisi enecati & fugati fuerint lumbrici, quo tempore sponte cadit: Quodsi vero applicatum non adhæreat, est signum non improbabile, non adesse lumbricos.

Præterea etiam oleum absinthii, diacolocynthidos, nucleorum persicorum expressum, unguentum contra vermes Augustanorum, de artanita, & similia, umbilici regioni illinantur.

℞. Ungu. de Artan. ʒij.

fellis tauri inspiss. ʒj.

Ol. diacoloc. Querc. q. f.

destill. Absinth. gtt. vj.

M. f. l. a. linimentum.

Quibusdam in usu est, applicare etiam theriacam cum succo vel oleo ablinthii aut rutæ. Vel

℞. ▽ Absinth. lbj.

in qua dissolv.

Aloës ʒij. M.

probè terendo & subigendo.

Valet contra vermes, corpora puerorum in balneo fricando.

## ARTICULUS XXII.

De

Verme Umbilicali.

**S**Ed præter hos lumbricos in intestinis instantum stabulantibus, notabilis est vermis

umbilici, quem vocant den Nobel-Wurm / den Zehr-Wurm / den Geiß-Wurm: de quo vid. pauca in specie Sennertus lib. 3. Prax. P. 10. de Morb. Abdominis cap. 4. p. 984.

## DIAGNOSIS.

In tali casu infantes cum nutrice optima; optimè sugentes licet, successivè emaciantur, labia pallent, & deficiunt à nativo calore, inquieti sunt, & quasi tormina ventris patiuntur, interdum se jactitant.

CURATIO.

Ubi adest suspicio talis vermis, applicetur fundulus umbilico sub introitu lecti, quem depascit vermis, idque bis vel ter repetitur, imponendo novum fundulum, ut simus certi de præsentia hujus vermis umbilicalis, postmodum applicetur putamen nucis juglandis internum, die harte Schale / excavatum, pulvere vitri Veneti & sabinae cum sufficienti quantitate mellis repletum; hoc modo dulcedine mellis allectus vermis cum sabina & pulvere vitri postmodum enecatur, ut extrahi queat. Dum ergo apparet, nil absumi ex mistura nuci juglandi insita, tunc appropriata purgantia ulurpentur, ut vermis enecatus quacunque via evacuetur.

## ARTICULUS XXIII.

De

Tussi.

**I**Nfantes ulterius subinde tussi & affectibus catarrhalibus laborare solent, circa quam ante omnia observanda venit differentia tussis, vel humidæ vel siccæ; item vel stomachalis, vel pectoralis.

Tussis sicca pectoralis est à lymphâ nimis acida, vellicante fauces & membranam eam subcingentem, in specie istam, quæ cingit interius laryngem / peramque arteriam. Alias omnis tussis infantum est humida. Par ratio est circa tussim istam, quæ sub dentitionis tempore frequenter oritur, cui successivè propter copiosioris salivæ subindè falso-acrioris defluxum in stomachum, & imprimis membranas pituitarias copiosam lympham plorantes, & per gulam in ventriculum dimittentem, & inde defectuosam redditam digestionem primam & coacervatas cruditates, etiam tussis stomachalis humida supervenire solet tandem. Item aëris inclementioris afflatus liberiorque inspiratus suo modo infantes subinde ad tussim siccam pectoralem disponit, ex lymphæ nempe ab aëre copiosius effusione, quæ tandem evadit humida ex successiva mucii generatione cum stertore affligens. Pertinet huc tussis puerorum convulsiva, de qua Willis. in Pharm. Rat. Part. 2. sect. 1. cap. 6. pag. 101.

Sed

Sed frequentior est tussis infantum ferina, seu quibusdam furibunda dicta, in qua infantes multum ac diu tussunt, & quæ subinde tanta violentia repetens vix sisti potest, nisi spontaneus tandem supervenerit vomitus copiosiusque muci rejectio, post quem vomitum cessat tussis ad tempus, donec revertatur post dimidium diem præter propter similis fere tussendi paroxysmus, simili vomitu claudendus. Talis ordinariò ex ventriculo esse solet. Oritur ordinariò vel ex adiphagia infantum, vel lactis acrioris & serioris crebriore haustu, vel ejusdem in stomacho corruptione, & acrimonia singulari ventriculum vellicante: quæ duo nimia copia cum imparia fiant fermento stomachi digestivo ex defectu concoctionis, degenerant in liquamina viscida, crassa & mucilaginosa, quæ ipsa nunc flatuum subministrant materiam, unde difficilis respiratio, quandiu supini jacent infantes, aut etiam hæc pituitosa acidula aut salso-acida in stomachi cavo magis fluctuantia, successivè irritando orificium stomachi sinistrum, & cum hoc arctè connexum diaphragma, tussim pertinacem, & primo quidem inanem, hinc cum rejectione mucilaginis viscidæ conjunctam inferunt; sicut in ablactatis frequentior hæc tussis ex muco viscido, utut pauco, orificium inferius obsidente, oriri solet; vel insensâ & molestâ sui præsentia, vel saltem halitibus acrioribus, excitant sub expiratione per consensum vellicati diaphragmatis, & ipsi compatiuntur musculorum thoracis expirationi inservientium horum convulsivos motus, unde tusses sæpius repetentes tenella pectora concutunt.

Idem sentiendum est de asthmate infantum, quod ut plurimum etiam ex stomacho onerato oritur, propter cruditates acidas mucilaginosas coacervatas, quæ si turgescant, & in flatum abeant, fermentando in tantum diaphragmatis deorsum versus impeditur contractio, ut molestus talis asthmaticus paroxysmus imminet; hinc enim etiam provocato vomitu statim liberantur, autore *Primærosio de Pueror. Morb. pag. 73.*

### DIAGNOSIS.

Affectus per se patet.

In specie quando est sicca tussis, conjuncta solet esse sternutatio, involuntaria oculorum illachrymatio, & qui sunt similes affectus ex lymphâ paulò acidiori oriundi.

Tussis humida ex eo luculenta est, quod cum stertore quodam respirare soleant infantes, item quod tussiendo materiam rejiciant, aut resolutam denuo deglutiant.

Subinde etiam inflatio quædam in præcordiis, & quædam ibidem locorum intumescencia adesse solet.

### PROGNOSIS.

Non negligenda est tussis in infantibus, quia præter vigilias & vomitus, etiam hernias, suffocationes &c. inducere solet.

### CURA.

Si prodromus est variolarum tussis, vix curari solet, cum sponte postmodum cesset, imprimis autem tussis humida sub curam Medici cadit. In tussis enim cura, uti etiam asthmatis infantilis semper supra insinuata observanda venit differentia. In genere tamen tussis infantum inveterata, humida quælibet, & hinc ista, quæ est ex stomacho, præ ceteris tussis speciebus furibunda, vix curari poterit absque vomitu; quo uno, aut, si opus fuerit, repetito, plus præstare possumus, quam pluribus aliis remediis, diu licet continuatis; hinc nisi sponte superveniat vomitus, arte provocandus est.

Provocatur facilè in infantibus, si digito oleo illito irritentur fauces, aut etiam si penina similiter oleo tincta faucibus intrudatur.

Ubi per inferiora volumus evacuare, mechoacanæ pulvis adhibetur utilissimè.

In tussi ergo contumaci sicca pectorali sæpius nocturna, aut larynge potius affecta, & à lymphâ acriore, vel aëre inclementiore irritata, convenit imprimis loch ex passulis cum mucilagine seminis lini aut cydoniorum permixtum. In tali etiam tussi euphoriston est Cratonis, jusculum raparum, in specie siccarum cum saccharo, item succus raparum, &c. Adultioribus paulò decoctum radicis helenii cum uvis Corinthiacis in vino Malvatico, pauco addito saccharo, ut fiat quasi syrupus, ad levandam tussim mirè conducit. Syrupus diacodium egregius est, uti & succinum & succinata, succinum catarrhale, species diatragacanthi, pulvis contra tussim infantum Mynsichti, item flores sulphuris cum saccharo pauco mixti. Sperma ceti ad ʒss. in cerevisia calida, vel in jusculo aut cum lacte probè calido propinatum, aliove simili calido vehiculo; item syrupus de jujubis, de scabiosa, de glycyrrhiza, &c. quibus & spiritus salis Ammoniaci anisatus pro lubitu addi potest: etiam ubi difficilior dentitio talem tussim, infantibus excitaverit, quo in casu vomitorium interdum præmittendum erit. Præ ceteris tamen liquor cornu cervi succinatus, nunquam omittendus est. In affectibus catarrhalibus quibuscunque, infantum præcipuè, & inde in tussi sicca primum meretur locum. Pinguedo itidem caponis in jure pisorum liquefacta & propinata, mirè commendatur.

Et hæc incrassantia dicta in quavis tussi infantum sicca, tam pectorali quam stomachali, locum inventiunt. Nostrates mulieres in tali tussi infantibus ablactatis non absque



que successu propinant caricas pingues, in minutas particulas concisas in spiritu vini maceratas, deflagrando; caricas relictas propinant vesperi felici cum successu.

Forestus asserit, infantem tussi laborantem curari per mures coctos, esitatos, manducatos prius à nutrice, & in os infantis inditos.

Quoad externa; præ ceteris in tali tussi sicca in usu est lotio pedum in cerevisia calida; quâ peractâ pinguedo lucii piscis recens, vel loco hujus sebum hircinum, aut medulla cervina, liquefacta in cochleari, & plantis pedum inuncta, prodest, in specie si misceantur cum oleo laurino. Linimentum ex pinguedine caponis cum capitibus alliorum factum, ceu notum, hic præsuppono. Item si ex catarrhali fuerit vitio, suffitus ex succino, thure, gummi juniperino, &c. hombace exceptus, capiti imponitur; vel cerotum pro bregmate usitatum, cum tacamahaca mistum, oleo destillato majoranæ irroratum, capiti imponitur.

In tussi convulsiva convenit liquor C.C. succinatus essentia castorei, & remedia à Willisio l. 4. commendata. Vel

℞. ▽ *fenic.*

*hyssopi* ā 3vj.

~ Θ *sci lavendul.*

*succin.* ā gutt. xx.

*syr. papav. simpl.* 3℔. M.

Quodsi tussis fuerit humida, atque juncta copioso mucro acido viscido, præter vomitum incidentia & attenuantia conveniunt: quæ inter primatum ducit spiritus salis Ammoniaci anisatus: item syrupus de nicotiana incidendo & attenuando mucum & liberando infante à suffocatione; hinc syrupus de hyssopo, item de scabiosa, vel syrupus de erysimo &c. qui propinari possunt in aqua hyssopi, scabiosæ, vel menthæ, ac similibus. Vel

℞. *Syr. Nicotian.*

*Hyssopi* aa. 3iij.

*emet.* 3j. M.

Resolvit mucum, & vomitum blandè mover.

Succus item raphani recens cum saccharo depurato temperatus, vel, qui mitior & temperatior, qui ex raphano excavato & saccharo repleto in frigido per deliquium, aut ex raphano in taleolos in iso, saccharoque largiter interperfo, defluit, aut intra duos orbiculos stanneos exprimitur. Item succus feniculi, mistus cum lacte & propinatus, non parum levat infantum tussim. Convenit etiam ad mucilagines stomachi resolvendas sperma ceti, si in pauca quantitate pro ratione ætatis in lacte calido propinetur infanti. Elæosacchara feniculi & anisi optimè conducunt, si lambenda præbeantur, infantibus: Hinc pulvis radicis ireos, aronis, liquor coriæ cervi succinatus, pulvis contra tussim infantum Mynsichti, &c.

Tom. II.

In asthmate infantum, vinum infusionis millepedum est optimum, auctore Hertode in *Crocol.* pag. 129.

Externè oleum chamomillæ & amygdalarum dulcium pectori illitum convenit.

## ARTICULUS XXIV.

De

### *Obstructione narium in infantibus.*

**N**Ares infantum in summitate narium dum sunt obstructæ ac infarctæ mucro crasso, optimum est auxilium sequens:

℞. *Oli albi* gr. iv. ad v.

▽ *Major.*

*Ceras. nigr.* aa. 3℔.

Misce & filtra.

Filtratura detur, de qua cum linteolis naris intrudatur.

Extra nares supremæ inungantur butyro sine sale, vel oleo amygdalarum dulcium, cum aliquot guttis olei majoranæ destillati misto: hoc enim aut externè illitum summitati narium, aut labris narium externè applicatu, resolvit sordes, & denuo respirationem per nares liberam reddit; vel naris butyrum non salitum pili magnitudine indatur.

## ARTICULUS XXV.

De

### *Crusta lactea, seu achoribus, favis & tineis.*

**P**orro lactationis tempore frequenter infantes affligunt exanthemata faciei & capitis seu pustulæ & ulcuscula, quæ cutim faciei, hinc superficiem capitis pilosam, interdum etiam quodammodo universam cutim, incrustant. Vocantur aliàs hæc ipsa ulcuscula & pustulæ crusta lactea seu lactumina, Germanis *der Ansprung* / Græcis *ἀχόρη*, qui si profundius eroserint cutim, favi appellantur. Post ablactationem autem simile vitium capitis partem pilosam affligit, quæ tinea dicitur, Germanis *der böse Brind*. Lactumina sunt pustulæ prurientes rubræ, quæ successivè suppurantur, hinc exulcerantur, & nunc exsiccando in crustas abeunt, quibus deciduis subindè de novo propullulant, nunc post exulcerationem ulcera manantia, plus minus sordida, supermanent. Occupat malum hoc ordinariò faciem, hinc ad caput etiam subinde se extendit; interdum et ambrachia, crura, ipsumque corpus hinc inde plus minus affligit. Tinea verò caput saltem occupat, pruritu imprimis incipit, hinc furfures copiosi decidunt, donec pustulæ hinc inde erumpant, quæ suppurantur & ex-

(Zzz zzz)

ulce-

ulcerantur, & nunc saltim in crustas vel squamas siccas abeunt, nunc verò ulcera manantia & copiosas sordes plorantia inferunt. Uno nomine: sunt hæc mala nil aliud, quam scabiei quædam species, infantibus magis propria. Crusta lactea quidem, sive infantes lactentes infestet, sive post lactationem denuo se manifestet, ferè ex acido vitioso lactis non dissilabili & resolubili per poros corporis oritur; à quo acido nutrimentum partium cutanearum inficitur, unde pustulæ, pruritus, exulcerationes, non secus ac in variolis aut scabiæ humida vel sicca oriri solet. Tinea verò, quæ interdum plures annos post ablationem demum infantes affligit, oritur ex simili vitio acido, intra corporis cutim coercito, ex massa sanguinea tamen & lymphæ secreto, & ad partes intercutaneas beneficio sanguinis circuli deposito; unde semper ferè tumores glandularum in collo pone aures & pone cervicem comitari solent tineam. Si enim cum sanguine & lymphæ plus minus acida, acris & viscida, nutrimentum exinde pro augmento & sustentatione partium confectum has ipsas subintret, nullo modo iis perfectè assimilari potest, sed potius volatili acore, antea quidem apparenter occultato, & aliquali simul visciditate ipsis inimica, hinc inde in pustulas extollitur, in quibus acor denuo successivè manifestatus, cū vicinis partium succis acrius effervesceat: hinc altior tumor, intensior rubor & ardor supervenit, donec mutua temperatura nunc in pus nunc in saniem, nunc aliud simile liquamen abeat, & per pruritus in pustulas vel alio modo exeat, relicto adhuc post se fermento subtili acido viscido, quod etiam aliud inculparæ notæ alimentum inquinat, istudque in similes sordes transmutat, & consequenter dicta mala magis magisque propagat; hinc etiam adjacentes partes à dictis pustulis pruritu & ardore inquinantur, unde favi, tinea, crusta lactea, uti etiam furunculi infantum, primitus nascuntur. Quæ edò facilius eveniunt, eoque pertinaciores radices figunt, quò minus transpirabiles sunt partes ita affectæ, & quò magis poris earum clausis dicta excernenda successivè congeruntur.

Differentia autem has inter capitis dejectiones observatur, quod materia peccans, prout est nunc acrior, aut acidior & tenuior, soleat inferre ulcuscula manantia, & copiosam acrem saniem fundentia: Sed quatenus eadem est minus acris, sed ferè magis temperata & viscida extiterit, tunc crustæ crassiores & densè subinde compactæ, & sibi invicem superstratæ, induci solent, successivè decedentes: imò etiam pro lymphæ ita peccantis ratione varia glandularum quoque observatur constitutio, de quo uberius experientia adhuc consulenda venit. Et sanè non

levis est cognatio horum lactuminum cum adultorum scabiæ: nam & subinde contagiosa sunt, & mediantibus lintheaminibus in alios etiam infantes propagantur: unde siisdem ferè remediis, in specie nicotiana, sulphure, Mercurio, &c. quibus adultorum pertinax & ferina scabies curatur, etiam curari possunt; & retropulsa, ut vocant, paria planè infert symptomata, ita ut quasi particularis capitis sit scabies.

Quæ hætenus sunt exposita, videtur confirmare, dum observavi in puerulo novem mensium præterpropter, vitio nutritis caco-chymico-scorbuticæ insigniter crusta lactea super cranii hæmisphærium & faciem fere integram mirè deformato; quæ cum spontè evanisset, successit gravissima tussis, tenebrum pectus insigniter & continuo quatiens, cum copiosi muci in stomacho & œsophagi præsentia, una cum diarrhœa serosa adeo acris, ut etiam extrema pedicis & vicina loca excoriarentur: totum corpusculum insigni æstu fervebat, & insultus quidam epileptici subinde istud convellebant. Factam hic fuisse arbitror lymphæ peccantis metastasin, præter alia loca in specie ad glandulas salivales, & quæ laryngem irrorant, ut & ad pancreaticas, per quas lymphæ ista acida acris, non adeo viscida, uberius effusa speciatim dictam tussim & diarrhœam, alia ut transeam symptomata, induxerunt. Dicta modò etiam rationem aurium humiditatis fluentis, excoriationis & exulcerationis, item labiorum, manifestam reddunt.

#### PROGNOSIS.

Omnes hi affectus bonum equidem sunt signum malæ causæ: Bonum signum, quod non tam inquinant massam sanguineam, sed potius in partibus intercutaneis defixa hæreant; malæ causæ, innuunt enim acidum vitiosum, quod massam sanguineam inquinavit, & hinc expulsiōe sua ista ulcuscula interdum periculosa excitat. Subinde tamen horum affectuum medio ab aliis gravioribus malis, in specie epilepticiis, præservantur & liberantur; sicuti retropulsis his ipsis pustulis, aut exsiccatis subitò ulcusculis (id quod sæpius fit occasione supervenientium dolorum dentitionis) multa mala, in specie febris lymphatica plus minus lenta, convulsiones, diarrhœæ, tusses pectorales diuturnæ, & similia superveniunt.

Sponte naturæ subinde sanantur: interim tamen si diuturniora seu contumaciora fuerint hæc ulcera saniosa, interdum in ulcerà maligna & depascentia degenerant.

#### CURA.

In cura ergo dyscrasia contentorum corporis corrigenda & evacuanda, acidum intercu-

tercutaneum fermentativum corrigendum, blanda diaphorici ad partes ambientes beneficio sudoris est promovendum & hinc nata mala admodum externis removenda.

Internè ergo conveniunt medicamenta ex fumaria, syrupus ex fumaria simplex & compositus, essentia de fumaria simplex & composita, essentia cardui benedicti, essentia helenii, essentia lignorum composita, tinctura coralliorum assafrata, item remedia ex sambuco, rob sambuci, aqua, spiritus & essentia ex floribus & rob sambuci parata, item aqua betulæ, liquor cornu cervi succinatus, cornu cervi sine igne, omnia ex cornu cervi parata diaphoretica, quælibet viperina. In adultioribus infantibus, una altera gutta olei destillati viperarum foetidi miram vim sudorem pellendi, & hujus medio hos affectus curandi, obtinet: c. g.

℞. C. C. f. Δe gr. xxiv.  
 ℞ii diaph. gr. xvj.  
 Θ vol. C. C. gr. iv.  
 Theriac. gr. iij. M.

Decoctum florum acaciæ cum radice helenii est elegantissimum laxativum & alterativum; specificari potest cum fumaria. Quælibet alcalia, vel salia volatilia sæpe laudata, essentia myrrhæ, vel lapilli cancerorum, aut cornu cervi sine igne, aut antimonium diaphoreticum cum pulvere myrrhæ propinata & sæpius repetita, curationem horum ulcusculorum mirè facilitant. Convenit etiam cinnabris antimonii, & tinctura antimonii ex scoris supra laudata, crebrius guttatim exhibendo, ut destruat acidum primarum viarum, quod subinde nutrimentum solet inquinare. v. g.

℞. R ℞ii.  
 ℞i aa. ʒiʒ. M.

De purgantibus præmittendis studio taceo. Præ omnibus Mercurius dulcis ceu appropriatissimus convenit.

Quodsi gravis affectus aut symptomatis alicujus occasione introcedat crusta lactea, pro expellenda eadem convenit emulsio seminis napi, nasturtii, aquilegiæ cum myrrhæ, cornu cervi, &c.

Externè in his malis pro lotionibus specificum est oxylapathum acutum, nicotiana, helenium, malva, pista; item linimenta, vel sulphurea, vel quælibet Saturnina, acidum absorbentia aut temperantia blandè inunguntur; hinc pro ratione circumstantiarum tutia præparata, pulvis lapidis calaminaris, unguentum diapompholygos, unguentum enularum: quibus si addatur parum salis tartari, habebitur effectus magis tutus. Unde unguentum de cerussa camphoratum, vel diapompholygos, vel unguentum enulatum, mistum cum floribus sulphuris & sufficiente

Tom. II.

quantitate olei nicotianæ vulgaris, addendo salis tartari plus minus, prout acrius vel mitius postulamus linimentum, egregiè convenit. Unguenta & linimenta vulgaria meritò fugimus, ubi simplicia cerâ, oleis, terebinthinâ, pinguedinibus, resinis, similibusve permixta, & partim saturata, partim obruta & subacta, nullam operandi vim exserere valent, nisi quod poros cutis densè incrustando malum longè deterius reddant.

Meritò autem duplex harum in cute efflorescentiarum status duplicem medendi rationem insinuat; unde in specie observanda est differentia ulcerum, an sint crustosa? an manantia? quando interdum pustulæ ex acriori acido in ulcuscula manantia jam degeneraverint, acrem plus minus tenuemque saniem jugiter plorantia; præmissis præmittendis internis imprimis laudo inter externa in ulceribus manantibus insersionem pulverum, acida absorbentium, viscida modicè resolventium & abstergentium, & ita, ut vocant, exsiccantium & detergentium: quales componuntur ex creta, lacte lunæ, succino, cornu cervi usto, cerussa, tutia, myrrhæ, floribus sulphuris, & similibus, quibus tantillum salis tartari, quantum nempe sine doloris sensu perferre potest, imprimis si contumaciores fuerint, aut subinde repulularint desecrationes dictæ, consultò addendum: v. gr.

℞. Lap. calam. præp. ʒiʒ.  
 C. C. usti præp. vel ceruss. ʒʒ.  
 fl. ʒis ʒj. l. ʒij.  
 Θ ʒi gr. xij.  
 M. i. Pulvis subtilissimus.

Ulcusculis cum linteolo vel spongiola, aqua spermatis ranarum imprægnata, abstergis blandè inspergatur.

℞. Creta ʒiʒat.  
 Tutia præpar. ʒj.  
 fl. ʒis ʒʒ.  
 Θ ʒi  
 Myrrh. aa. gr. xij. M.

Quibus omnibus præfero & propterea addendum suadeo pulverem seu crocum ex vitriolo Martis per oleum aut lixivium salis tartari præcipitato factum, & probè ablutum, qui solum ex nodulo inspergius mirè absument acida, & prædicta ulcera ad sanitatem perducit, cui pariter tantillum salis tartari admisceri potest; c. g.

℞. Croc. ʒis per ʒat. ʒj.  
 Lap. calam. præp. ʒʒ.  
 Creta præp.  
 Ceruss. aa. ʒj. M.

Quodsi sicca fuerit crusta crassa, sufficiant simpliciter alcalia fixa, tales crustas blandè emollientia, & acidum vitiosum in radice penitus destruentia, ita ut sponte decidant: quem in finem optimum est, ut blandè hume-

(Zzz zzz 2) Stentur



Atentur subinde dictæ pustulæ, vel cum lixivio vulgari, vel blandè quasi illinantur cum oleo tartari per deliquium, vel illinantur oleo amygdalarum dulcium recenti, aut butyro recenti non salito, addita tamen pauca camphora, sic emollitur crusta, ut ita blandè auferatur, relinquendo vel naturæ, quod superest, conficiendum, vel si supersint ulcera manantia, blandè istos pulveres inspergendo. Commodè etiam oleo amygdalarum dulcium expresso; aut dicto butyro parum olei tartari per deliquium addi potest pro linimento blando & tenui, cum in finem, ut eò melius corrigat fermentum acidum: moderatè tamen hoc fiat, ne acriori litu doloris ratione exasperetur malum. Quin & ulterius conducunt balsamus sulphuris temperatus cum axungia porcina & illitus; quæ cum sola camphora subacta in mortario plumbeo, dat unguentum admodum conveniens.

Par curandi ratio est tineæ capitis infantum, nempe præmissis & continuatis internis, quoad externorum usum, tinea est vel sicca crustosa, vel est humida manans. In tinea crustosa sicca saltem litu emolliente suprâ insinuato crustæ semel factæ emolliantur (non tamen cito nimis, ne remotis crustis curis eadem exulcerata appareat) & hinc lotionem facta ex decocto radicis oxylapathi, chelidonii majoris, betonicæ, saponariæ, herbæ malvæ cum pilis in cerevisia secundaria, quibus commodè furfures addi solent, abluatur, idque non adeo crebro, sed intra tres, quatuor ad sex septimanas semel, prout necessitas requisiverit, lotio talis instituat, istud, quod de crustis internè subnatum fuerit, & interdum à litu emollium, petine sive scopa blandè removendo. Convenit etiam decoctum radicis althææ cum urinâ infantis, pro lotionem capitis usurpatum. Generosissima Comes à Fleckenstein tineâ & alopeciâ correpta, purgata est pilulis Mercurii dulcis & pulvere viperarum sæpius ex vino sumpto, caput lixivio cynoglossæ abluendo, & pinguedine natricum Germ. illinendo, convaleuit: Vid. Velschius *Micromim. Cent. 1. Observ. 23. annex. Ann. 4. & 5. M.A. N.C.* Sic porro tinea in puella Nobili, pileolo ex carne suilla salita imposito brevi percuratus est Patavii, vid. *loc. all. Cent. 2. Obs. 68.* Si verò tinea manans & ulcerosa fuerit, ante omnia crines abluendi sunt: Si enim hi ipsi à sordibus manantibus inviscantur, crustam tam densam inducunt, sub qua non solum cuniculos profundos agit sanies, sed etiam generantur copiosi pediculi, quorum morsificationibus stimulatî infantes scalpendo caput, eò magis malum exasperant, ac deterius reddunt; remotis crinibus filamenta carpta locis exulceratis imponantur, item absterfis sordibus pulveres suprâ insinuati le-

niter inspergantur, & hinc dictis filamentis muniantur, donec successivè crusta sicca supernascat, sub qua, ne nimis colligantur sordes, illa ipsa subinde exprimenda est, ut saniei pateat exitus, deinde ubi sicca appa-ruerit, litu emolliente attenuanda, & hinc pedetentim separanda.

Tumores grandiores glandularum in collo & capite, si qui supersint, emplastro de Ammoniaco, de cicuta, de galbano matricali, &c. applicatis attenuandi & discutiendi. Vel emplastrum de meliloto malaxetur cum oleo Philosophorum: vel fiat compositum ex eodem cum emplastro de galbano crocato Mynsichti, & ita imponantur, aliquamdiu relinquendo.

Hicce quidem modis mitiori malo commodè succurri potest; si verò gravius fuerit, non secus atque scabies curandæ veniunt. In specie in capitis tinea graviore vulgi experimentum est lotio capitis ex decocto nicotianæ pulverisve ejus inspersio: sed pessimo cum consilio, cum ebrietatem turbulentam, anxietates præcordiorum, lipothymias, vomitus, copiosos secessus, & alia gravia symptomata inferre soleat: Conferatur Boyle *in sua Philosophia Experimentalis*, & Heer *Tract. de Absinth. pag. 90.* qui similem ebrietatem observavit ex pulvere nicotianæ ulceribus capitis manantibus insperso: Sic novi exemplum de puero aliquot annorum pediculis affecto, cui inunctum fuit caput unguento ex pulvere nicotianæ parato, additis aliis, quo ipso brevi post infans percipit angustias præcordiorum, superveniunt purgationes crebriores supra & infrâ, unâ cum lipothymis repetitis. Causa omnes latebat. Tandem deveniebant in suspicionem unguenti, quod abluunt & cum linteolo detergunt; & omnia cessarunt supra dicta symptomata.

Præter nicotianam contra tineam capitis etiam utuntur Mercurialibus litibus, nunc ex Mercurio crudo, nunc vario modo præparato constantibus: Sed hoc non semper absque periculo, quia imprimis in tenerioribus gravissima inducere solet symptomata Mercurius capiti applicatus: e. g. infans achoribus laborans ex inunctione capitis Mercuriali epilepsiam lethalem contraxit; referente Timæo von Guldenslee *in Resp. 43. pag. 106.* In robustioribus etiam infantibus Mercurialia cautè sunt usurpanda propter metum salivationis, quæ superveniens tam spontè & facile sisti nequit: ob id Mercurius vivus necessitate cogente in pauca quantitate est permiscendus remediis. Tutius adhuc usurpatur Mercurius præparatus, imprimis cum spiritu nitri præcipitatus, qui communiter appellatur arcanum corallinum: Item conducit etiam Mercurius dulcis, qui non inconvenienter unguentis & linimentis permisceri potest.

potest. Aliàs cingulum Mercuriale seu, ut vocant, cingulum sapientiæ, lumbis saltem circumdatum achores & tineas, uti etiam phthiriasin, optimè curat: Paratur ex cingulo panneo benè insuccato, ut sic dicam, cum Mercurio vivo, vel subigatur Mercurius vivus cum axungia porcina, & benè illinatur in cingulum ex panno paratum. Turò usurpatur in adultis tale cingulum, si præmissa fuerint universalia, si continuò simul usurpentur corpus in blanda diaphoresi conservantia, illudque non nimis exponatur frigori, quin calidum & probè munitum continuò conservetur: Sic Fontanus in *Annal. cap. 9. Exempl. 6.* refert, rusticum achoribus & phthiriali laborantem, præmissis universalibus zona Mercurio vivo tincta lumbis circumdatâ curatum.

℞. Ungu. ros. ʒij.

ʒii vivi

℥ sem. staphysagr. aa. ʒij. M.

Tutius est, quod describit Joël in *sua Praxi* ad tineam capitis contumacem, post lotionem capitis cum decocto Malvæ, aut aliam appropriatam illinendum:

℞. Lithargyr.

Ceruss. aa. ʒij.

Fl. ʒii.

ʒii vivi aa. ʒj.

Cum f. q. ol. rosar. commisc. in mortario plumbeo diutissimè, & f. unguentum.

℞. Ungu. pedicul. ʒij.

Ol. Nicot. ʒvj.

Θ ʒi ʒiss. M.

℞. Ol. ʒi p. d. ʒiij.

Amgd. dulc. rec. expr. q. l. pro consentientia linimenti:

adde

Ol. destill. spica ʒß. M.

Sed non, nisi extremo in casu, Mercurialibus, iisque cautè, utendum erit. Tutius est, quod unguentum commendat Panarolus in *Pentec. 5. Obs. 31.* quod paratur ex sulphure, axungia porcina & succo limonum. Item linimentum de amiantho paratum miraculosum dicitur ad tineam puerorum à Bootio lib. 2. de *Gemmis & Lapid.* pag. 204. quo etiam non sine successu usus fuit Scultetus in *Armam. Chirurg. Observ. 96.* Oleum non contemnendum contra capitis tineam est & hoc:

℞. Vitell. ov. ad durit. elix. No. xvj.

Myrrha ʒß.

Rad. ari

Serpentar. aa. ʒß.

Helleb. nigr. gr. iv.

Misc. probè, & coquantur super carbonibus ignitis absque flamma, donec spumescente incipiant, tuncque exprimaturs oleum usui reservandum.

In specie decrescente luna commodè instituitur cura tineæ; nam achores & favi sponte naturæ cessant. Ubi pertinaciora aut periculosiora fuerint ulcera, lapis medicamentosus Grollii dissolvatur in aqua nicotianæ, & ita levi manu inungatur.

Quodsi verò ex malo incresciente cranium fuerit læsum, præmissa ablutione ulcerum inungendum est mel rosaceum cum spiritu vini, hinc applicetur pulvis aristolochiæ subactus cum balsamo Peruviano.

## ARTICULUS XXVI.

De

*Affectu Pediculari seu Phthiriasi.*

Tineæ capitis conjunctus & familiaris est affectus pedicularis seu phthiriasis, infantes sæpissimè mirè torquens, etiam interdum adultos.

C A U S A E.

Causa hujus est in singulari seminio, ex quo generantur pediculi, quod imprimis in corpore infantili se exerit, & fœtus suos excludit.

Ex internis causis ficus sunt, qui infero dicuntur phthiriasin, uti hoc observavit Henricus ab Heer in *Observationibus* oppidò rariss.

C U R A.

In cura conveniunt lotiones capitis cum semine staphisagriæ, item cum scordio, absinthio, colocynthide, centaurio minori, radice hellebori nigri, & similibus in aqua appropriata coctis. Vulgò commendatur lotio capitis cum decocto nicotianæ, sed pessimo cum consilio, ex rationibus supra dictis. Sanè tutius est usurpare aquam lavendulæ aut spicæ nardi, si his abluantur loca pediculis infestata, aut oleo spicæ, vespere sub introitu lecti caput leviter illinatur, operiendo post inunctionem istud vittâ. Quodsi acrius fuerit oleum, subigi potest cum paucis butyro non salito, aut oleo amygdalarum dulcium, aut unguento nicotianæ; abluendo subsequente manè caput cum lixivio decoctionis spicæ. Etiam si inquinant loca pudenda pediculi, oleum spicæ est tutissimum. Vel succus absinthii depuratus, in quo probè agitatus fuerit Mercurius vivus, & hic denudò subsederit, optimus est, si illinantur loca pediculis infestata. Semen staphisagriæ coquitur in lixivio, vel cum butyro recenti fit unguentum; item cocculi de Levante pulverisati, & cum butyro non salito subacti, suo litu in margine primò, deinceps vertici & toti capiti, potenter enecant quosvis pediculos. Vel

℞. ℥ Coccul. de Lev. vel rad. Gent. ʒiss.

Rad. Helleb. albi ʒß.

(Zzz zzz 3)

Cum

Cum l. q. *Ol. Nicot.* vel *Laurin.* f. Linimentum,  
irrorandum sub miltione cum aliquot  
gutt. *Ol. dest. spica.*

Aloë etiam, & cum hac parata aqua aloëtica Tinzæ von Guldentlee in *Cas. pag. 444.* imprimis etiam confert ad affectus pediculares, si hæc aqua abluantur loca pediculis inquinata: Præ omnibus equidem juratus pediculorum hostis est Mercurius, minus pulicibus infensus, conf. Bartholini *Acta Med. Hafn. Vol. 4. pag. 156.* Sed non semper tuto uti licet Mercurio in phthiriasi, quia graviora infert symptomata. Interim præsentissimum remedium, quò omnes fugantur & interimuntur pediculi, ratione Mercurii est, si pediculi hæreant in locis secretis, in superciliis, &c. si abstergantur hi loci linteolis istis, quibus aurifabri pocula sua post deaurationem detergere solent; sic pediculi adhærent vitæ privati. Aliàs certum est, quod Mercurius vivus, aut dulcis, aut cum spiritu nitri præcipitatus, quibusvis unguentis additus subito quosvis enecet pediculos. In specie ex pinguedine porcina, succo absinthii, farinâ lupinorum, & pulvere seminis staphisagrie paratur linimentum Mercuriale, sed pauco addito Mercurio acuendum. Denique vel solum cingulum Mercuriale seu sapientiz, etiam certò pediculos fugat, saltim si lumbis circumgestetur; vel Mercurius vivus in bursula secum gestatus in vestimentis pediculos fugat, eosque interficit.

## ARTICULUS XXVII.

De

### *Variolis & Morbillis.*

**H**ætenus dicta occasionem suggerunt in morbillorum, & in specie variolarum, originem & abstrusam aliàs naturam meditando & inquirendi, quæ, quâ tales, cum dicta crusta lactea, &c. quoad faciem externam, fiendi modum & effectum, in quamplurimis conveniunt, cum etiam tinea capitis non rarò post variolas superesse, aut etiam easdem insequi soleat. De quibus vid. supra inter Febres.

## ARTICULUS XXVIII.

De

### *Subluxatione Infantum.*

**I**nfantès paulò adultiores vehementiori sub motu frequenter subluxationem incurrun (sic thun sich wehe) unde hypochondriorum tumor, difficilis respiratio, totius corporis æstus, appetitus dejectus, vigiliz, &c. superveniunt.

C U R A.

Curatur optimè si infantes imponantur ventri, & manus & pedes per crucem sibi invicem admoventur.

## ARTICULUS XXIX.

De

### *Macie & Atrophia Infantum.*

**F**requens & sæpè difficillimum curatu, simulque periculosum malum est, quando sub nutritione subindè deficiunt infantes, ita ut eorum corpus succo nutritivo priveretur, & ejus partes musculosæ flaccidæ & molles fiant; uno verbo: quando non nutriuntur & augentur, sed successivè, utut alimenta capiant, macilenti fiant, adeoque plus minus macie & atrophiâ corripiantur.

Macies hæc in genere est vel symptomatice, vel morbose. Symptomatica est, quando alium morbum, febrim, diarrhœam, vel similem affectum sequitur: Morbosa est, quando citra prægressum alium morbum, ex se ipso radices egerit, vel ex se ipso inceperit.

Talis maciei causæ sunt plurimæ, quas ordine pertractabo.

C A U S A I.

De

### *Nutrimenti Defectu.*

**P**rima quidem causa est defectus nutrimenti laudabilis, quando lac nutricis minus proportionatum est ad crasin fœtus seu infantis nutriendi, quin potius acrius & falsius existit. Id quod fit imprimis in nutricibus cholericis, ut sic dicam, seu habitus minus succulenti, & quæ quodammodo ad phthisin aut hæticam inclinant, in specie, si jam diutius lactaverint alios infantes: nam talium lac asperum nonnihil est, & minus aptum ad nutriendum infantem; vel viciatum, ubi illinc atrophia, hinc cachexia supervenit.

### DIAGNOSIS.

Cognoscitur hoc ipsum vitium, si ipsa nutrix talis sit, & infantes citra manifestam aliam quamcunque causam successivè emacientur, & parum vel nihil proficiant.

### PROGNOSIS.

Affectus non est contemnendus; semper enim periculum infantis viribus intendet.

C U R A.

Propterea in cura lac & nutrimentum laudabile suggerendum; pro quo scopo imprimis mutanda est nutrix, aut etiam si infans quodammodo sponte minus aptus sit nutritioni, aut si contabescat & minus nutriatur propter



propter vitium nutriticis, commodè balneatur infans in lacte bovino vel caprino: quo ipso subinde blandè fricanda sunt ejusdem membra, & postmodum capiatur hederæ arborea, crescens in quercu, ex qua destillatur aqua: sicuti etiam ipsa folia hujus hederæ pulverisata ad ʒj. cum paucis syrupo violarum sunt propinanda.

Præter hæc etiam aqua filicis destillata mirè laudatur, ex qua etiam culetras sub dorsum ponendas suadent. Sunt etiam, qui in tali casu post balneum lactis commendant unguentum ex butyro non salito, quo subinde membra tenella fricanda sunt.

## CAUSA II.

De

### *Lumbricis.*

Cæterum præter lactis vitium secunda causa maciei infantum est, quando nutrimentum, licet laudabile, absumitur à lumbricis, item crinonibus, qui ubi sunt copiosiores, aut etiam diutius retenti fuerint in infantibus, tandem maciem inducunt. De lumbricis, cum eorum signis & cura, supra dixi.

## CAUSA III.

De

### *Crinonibus seu Comedonibus.*

Sequitur causa tertia maciei & atrophix, Sdracunculi sive vermiculi subcutanei capillares infantum, quatenus hi ipsi atrophiam simul junctam semper habere solent. Incognitus & indictus antiquioribus fuit morbus, cujus passim superiori ac hodierno seculo à Medicis non minus, quam medicastis mulierculis, fit mentio, & ab istis quidem morbus pilaris infantum communiter appellatur, proprio autem nomine comedones ab adjuncta infantis tæbe, quasi vermes qui nutrimentum infantum comedendo largius absumant, item crinones à figura, quod, si in balneo rite tractentur, crinium seu pilorum curtorum nigrorum forma foras interdum prominere per poros cutis soleant, appellantur, Germanis *die Mit-Esser / die Zehr-Würme* / quæ pro animalculis intercutanea loca inhabitantibus ab aliis habita fuerunt. Differunt à sironibus seu eironibus, vermiculis minutis, quasi pedicularibus, in pustulis serosis prurientibus sub cuticula manuum imprimis & pedum enatis, de quibus vid. Sennettus *lib. 5. Prax. P. 1. cap. 24. pag. 118.* Langius *lib. 2. Epist. 42.* Gœdartius *Metamorphos. Part. 1. pag. 126.* sicuti & sironum & crinonum formæ, per microscopium consi-

deratæ, differentes planè deprehenduntur. Dicit crinones vermiculi capillorum spissiorum seu setarum curtatum formâ nudo oculo aspicienti se exhibent, qui mellis dulcedine per frictionem allecti in loco calido foras prorumpere nonnihil, frigoris verò ipsis inimici sensu denuò introrepere, observantur; sic enim apparent vermiculi forma singulari, oculis rotundis grandiusculis, coloris subcineritii & plus minus nigricantis, cornubus seu potius antennis binis longe prominentibus instructi, cum caudis oblongis in fine villosis, uno nomine: aspectu satis horridi, prout nuperrimè ab amico curioso & artificioso, Dn. Christiano Schæffero, Srenissimi Ducis Saxonix Mauriti Apelle aulico dexterrimè hacce sub forma accuratè per microscopium observati & delineati fuerunt: quorum iconismus videri potest in *Valetud. Infant. cap. 2. §. 33.* Occupare magis loca musculosa, imprimis dorli, sive totius interscapilii tantum, maxime tamen scapularum, humeri, item surarum & crurum, sub cuticula assolent. Infantes imprimis teneriores, minus robustiores, affligere solent.

## CAUSÆ.

Originem iis subministrat suppressa insensibilis transpiratio, ut rectè id suspicatur Hostius *lib. 4. Obs. 53. pag. 254.* quæ temperata si fuerit, minusque acris, dulcis & pinguis, retenta diutius ad putredinem ruit, unde occultata antea & oppressa penitus principia seminalia, quæ in minimo, seu, ut vocant, in atomo sensibus imperceptibili latere possunt, sui juris facta, destinationes naturales exequuntur, & in viva animalcula prouunt. Nempe in lacte, ratione alimentorum, ex quibus generatur, non secus ac in pulve milleformia insectulorum & vermiculorum latent semina, quæ in renello infantis stomacho non adeo exactè alterata, faciliè darà occasione evigilare, & in actum secundum erumpere valent: hinc & quidam crinones hos illis vermiculis seu ascaridibus similes asserere volunt, qui in antiquis caseis innasci observantur. Hi ipsi crinones animati molestiam admodum prurientem & continuo lacessentem, plus minus tamen, sub cuticula admodum sensili excitant, indeque inquietos, ejulantes & vigiles reddunt infantes, quibus ut ut sæpius porrigant mammas nutritices, quas etiam exhausti, tamen inquietudine, vigiliis & plotatu confecti, minus dictum alimentum digerere aut ritè assimilare possunt, donec emacientur tandem, & ita successivè in tabem proruant: ut ob id existimem, non tam ratione nutrimenti à vermibus exhausti, quam ratione symptomatum ab istis introductorum, maciem & tabem consecutivè supervenire. Ubi ergo adsunt talia sympto-

mata,

mata, mulieres statim dicunt, aut subesse fascinationem, aut adesse crinones.

## C U R A.

Quoad curam : Crinones sunt eliciendi. Hi cognoscuntur & removentur simul, si infans deducatur in balneum aquæ dulcis, in quo benè fricetur cum melle farinâ subacta; sic enim sub lotionē hujus dulcedine allecti cum sudore per poros erumpunt sub forma pilorum nigrorum crassiorum, wie kleine schwarze Härchen / qui tamen postmodum, dum ita emittunt capita, commodè vel cum unguibus acutioribus, vel novacula exigua, vel cum crusta panis acuta, subtiliter abraduntur, & ita tolluntur; id quod aliquoties reiterandum erit, unde melius habere infantes observantur. Aliis in more positum est, ut ablutos in balneo infantes manu melli intinctâ blandè perfricent : & hinc proleptos vermiculos vel crustâ panis duriore in formam aciei cultri rescissâ, idque tutius; vel scalpello, idque minus securè, abradant & removeant. Petrus à Castro *Tr. de Coloastro* mulierum Lusitanarum experimento fuliginem caminariam cum melle & lacte mixtam, dorso illitam laudat. Quidam loco talis unguenti ex melle imponunt infantes in lixivium, in quo sterces pullorum gallinarum bullivit: Huic ipsi lixivio ad collum usque immergunt infantes, & ita nonnihil ad sudorem disponunt, postmodum levi manu melle illita crinones proritant, quos postmodum dicto modo vel novacula vel crusta panis acuta abradunt : repetitur toties (ad biduum, triduum) quamdiu præsentia talium hospitem se manifestat.

Quodsi copiosiores sint, aut subinde regenerentur, radicitus evellendi sunt secundum modum Timæi von Guldenslee / quem habet in  *suis Casib. lib. 5. de morb. infantum cap. 23.* nempe ut propinentur internè tincturæ antimoniales; loco quarum tamen essentia myrrhæ & remedia viperina non erunt minoris pretii. Externè verò in balneis talibus & post talem frictionem quotidie abstergendi sunt infantes cum aquæ absinthii ℥ij. in qua dissolutæ sint aloës hepaticæ ℥ij. Quin imò putarim, aquam hermeticam seu decoctionis Mercurii vivi, uti lumbricis & scabiei optimè conferre solet, etiam eandem in balneo cutim abluendo usurpatam, citra ullum periculum dictos crinones necare & tollere posse. Plura de his videb. in Velschio *supra citatis locis*. Unguentum contra sirones vid. in Sennerto *Pr. lib. 5.*

pag. 118.

## CAUSA IV.

De

*Vasorum lacteorum & glandularum mesenterii obstructione.*

Porro causa atrophiz & maciei infantum, hætenus ferè incognita, est, quando commodè nutrimentum distribui nequit, ex infarctu & obstructione viarum ac ductuum abdominis, vasorum lacteorum & consequenter glandularum mesenterii. Vocant hunc affectum mulieres, Das Unterwachs der Kinder / quando scilicet intumescit abdomen infra costas : conf. M. A. N. C. *Ann. 2. Obs. 152. pag. 237.* Sylvius *Prax. lib. 1. cap. 14. §. 56. pag. 168.* Barbette in *Prax. lib. 3. cap. 2. obs. 3. & Anat. Pract. lib. 1. cap. 14.* Hæferus *Herc. Med. lib. 7. pag. 349.* & Sydenham. *de Feb. pag. 89.*

## C A U S A.

Causæ sæpissimè sunt pulmenta viscidiora & tenaciora uberius ingesta; Nutrices enim interdum vix desistunt, quin infarciant talia pulmenta, ut tantum non digitis attingere ferè possint. Hinc fit, ut talia pulmenta loco nutritivi succi distribuendi sæpissimè degenerent in mucilaginem crassam, plus minus acidam viscidam, quæ successivè intestina aut admodum incrustando, aut orificia & ductus lacteorum obstruendo, etiam ipsas glandulas mesenterii consequenter infarciendo, debitum nutrimentum corpori deficere facit.

## D I A G N O S I S.

Signa ex modo dictis facile patent, imprimis ex causa prægressa, ex tumore abdominis, item ex aliquali ejus ad tactum duritie; quæ excernuntur, solent esse viscida, albicantia.

## P R O G N O S I S.

Periculosum est hoc malum; nam atrophia lethalis tandem necessariò sequitur.

## C U R A.

Si ergò ex denegato nutrimenti transitu, & debitâ distributione cessante, atrophia infantes corripit, pro cura hujus mali internè conveniunt alimenti depravationem corrigentia, & hujusmodi mucilaginosas sordes, vasa obstruentes, alterantia & resolventia. Conveniunt ergo laudata sæpius salia volatilia, quæ forti penetratione obstructos antea meatus reserant, præmisso & interdum iterato subindè blando laxativo, ob id lactationis tempore subindè iteranda: sicuti post ablactationem convenit tartarus vitriolatus Tacchenii, ut & arcanum duplicatum

carum Mynsichti, in brodio seu decocto pas-  
sularum propinata, quotidie reiteranda. Pa-  
riter liquor terræ foliatæ tartari seu sal essen-  
tiale tartari resolutum in liquorem, infanti  
subindè guttulatim propinatum, à Barbette  
laudatur in *Praxi lib. 3. cap. 2. pag. 3.* Item  
tinctura tartari. Commodè etiam usurpan-  
tur Martialia, liquor seu tinctura vitrioli Mar-  
tis tartarifata; vid. *M. A. N. C. Ann. 3. obs.*  
*250. pag. 454.* & crocus Martis aperitivus  
cum tartareis permixtus. Hinc ceu præsen-  
tissimum sæpeque expertum remedium in  
tali casu commendat Hæferus in *Herc. Med.*  
*pag. 349.* Pulmentum illud, quod vertex  
ferreus rotæ molaris inter movendum collig-  
git, extra illitum, quod nihil aliud est, nisi  
subtilissimus quidam crocus Martis ista agi-  
tatione è ferreo vertice abrasus: unde Hor-  
stius propinat in tali casu aquam istam, quæ  
in acuandis instrumentis ferreis sub cote col-  
ligitur. Commodius est, ut usurpentur tin-  
cturæ Martiales, imprimis permixtæ cum re-  
mediis tartareis.

Externè commodè fiunt unguenta & lini-  
menta abdomini illinenda pro resolvenda &  
attenuanda ista mucilagine spissiore & mea-  
tibus referendis, quæ attenuata postmodum  
in intestinis blandè per laxantia est evacuan-  
da. Imprimis convenit linimentum ex gum-  
mi Ammoniaco; vel unguentum Martia-  
tum, unguentum althææ compositum & ole-  
um Philosophorum, mixta; felle tauri acua-  
ta, & abdomini illita. Unguentum Barbette,  
quod habet in *Anatomia Practica lib. 1. cap. 14.*  
est egregium.

Conveniens etiam est, si fiat unguentum  
Sylvii *Prax. lib. 1. cap. 14. §. 56. pag. 167.*

## C A U S A V.

De

### Fascinatione Puerorum.

**Q**uinta denique causa maciei puerorum  
sæpius est aut saltem dicitur fascinatio  
seu fascinum, quod vocant, wenn die Kin-  
der beschryen sind. Vim talis fascini cum  
Paracelso multi moderni ex impressione ima-  
ginativa deducunt, quæ per solum visum po-  
test nocere. Alii hoc ipsum negant, & to-  
tum negotium veneficio attribunt. Suffi-  
ciat subsumptionem esse fascini & veneficii,  
vel in tali statu, ubi nulla adest sufficiens  
causa, quæ monstret affectum alium: item  
quando cum macie simul præter spem nimis  
imbecilles & debiles fiunt infantes: Item  
quando subsumptio est aut suspicio de vetula  
quadam, quæ familiaris aliquando cum in-  
fante fuit conversata. Prolixum tractatum  
de Fascinatione edidit D. Frommannus. Sed  
ad hoc, ut cognoscatur, an fascinatus fuerit  
infans? so seget man unter die Wiegen

Tom. II.

ein Faß voll fließend Wasser / in dasselbe  
wirft man ein Ey / schwimmt dasselbe in  
die Höhe / so ist das Kind beschryen; fällt  
es aber zu Boden / so ist nichts daran: Ra-  
tio, die gebundenen spiritus wollen liberiret  
seyn / ziehen also das Ey nach sich in die Höhe.

## C U R A.

An tollendum hunc fascinum & venefi-  
cium partim supersticiosa quàm plurima, par-  
tim naturalia revocantur remedia.

Internè suadentur alias contra fascina co-  
rallia, viscus coryli pulverisatus, aut etiam  
pulvis baccarum uvæ inversæ: Item pulvis  
Gansii de coralliis ex semine antirrhini, co-  
ralliis rubris & albis, & dente hominis mor-  
tui. Unde tincturæ coralliorum quacunque  
ratione paratæ, in specie in vehiculo ex hy-  
perico propinatæ, insigniter laudantur. Es-  
sentia hyperici, spiritus secundinæ primipa-  
ræ, pulvis secundinæ primiparæ, quæ uti ali-  
as ad quæcunque veneficia, ita in specie ad  
fascinum seu maciem ex fascino insigniter  
commendantur, si remedia ex secundina  
parata interius propinentur infanti.

Externè conducit sacculus appensus ex  
floribus seu summitatibus hyperici, &  
baccis uvæ inversæ cum semine & herba an-  
tirrhini: item suffimigium ex herbis contra  
fascinum & veneficia decantatis, v.g. ex co-  
nyza flore cæruleo, hyperico, antirrhino,  
dentibus hominis emortui, visco corylino &  
quercino ac similibus. Quibus adjungenda  
etiam sunt balnea, quæ inter præservat à ma-  
cie balneum, cui cortices & folia salicis sunt  
incocta, commendatum ab Hartmanno &  
Gabelchovero. In ipsa macie cum foliis &  
corticibus salicum possunt simul incoqui flo-  
res aquilegiæ, adianthum, antirrhinum, hy-  
pericon, conyza, folia & baccæ inversæ. Si-  
deritide cum filagine, vel solitario, vel cum  
hyperico & tanaceto, mulieres utuntur pro  
balneo, fricantes eosdem una cum herbis,  
& tunc comparent copiosæ sordes extrinsecus  
incantationis indices habitæ: conf. Hæferus  
*Herc. Med. pag. 207.* Convenit etiam inun-  
ctio ex unguento corylino ad veneficia Hen-  
rici ab Heer; aut imponatur regioni stoma-  
chi emplastrum Mynsichti contra veneficia,  
malaxatum cum hoc ipso unguento seu oleo  
corylino Henrici ab Heer. Ex sola asa fœti-  
da etiam potest fieri emplastrum contra ma-  
ciem ex veneficio seu fascino oriundam, ven-  
triculo imponendum.

Solent etiam Hispanicæ mulieres suffumi-  
gare partes fascinatas gummi Ammoniaco;  
cui commodè asa fœtida potest addi. Sæpe  
etiam observavit à Castro sufficere suffitus  
ferrei calcei equini nigri, candentis, aceto ter  
excoctatus, quo suffumigandus est puer.

(Aaaa aaa)

ARTI.



## ARTICULUS XXX.

De

*Febribus.*

**D**Enique quoad febres infantum: hæ sunt variz, quæ eos infestant, rariùs tamen intermittentes, nisi in infantibus paulò adultioribus, aliquot nempe annorum, ordinariò plus minus acutæ & continuò ardentes, hæque ipsæ sæpius cum pustulis & exanthematis conjunctæ, quæ vulgò vocantur variolæ & morbilli.

Omnes autem febres, nisi malignæ ex contagio natæ fuerint, originem habent ex cruditatibus viscidis acidis primarum viarum, sive lactentur adhuc, sive ab lactati fuerint.

*Febres lenta.*

In specie, si succus nutritivus minus viscidus, crudus tamen, & vitioso acore inquinatus, vel saltem acrisalfo sapore infectus, distribuatur ad massam sanguineam, pro hujus augmento & corporis nutrimento necessariò ex tali alimento inepto depravatur massæ sanguineæ crasis, vitiatumque insigniter sanguificatio, & inde oritur præternaturalis ejus effervescencia, unde febres variz, imprimis tamen lentæ, sub vesperam præcipuè exacerbantes, supervenire solent. Hinc etiam consequenter vitiatum lymphæ, & redditur nimis acidæ, acris & simul subinde nimis viscidæ, unde & circa glandulas tumores, & varii affectus catarrhales infantibus superveniunt, in specie tussis siccæ nocturnæ. Obtunditur e contra bilis sal volatile oleosum, unde perfectio digestionis primæ in intestinis deficit ultima; & ita magis magisque propullulantes jam confirmantur ægitudines.

*Febres ardentes.*

Cæterùm præter has & aliæ febres variz, plus minus acutæ & continuò ardentes, aut periodicæ continuæ, aut catarrhales, similesve frequentes sunt inter tenellos, quarum ratio omnis ex corruptione lactis interna, aut ex obstructione pororum cutis externa, optimè explicatur. Nam præter cruditatem acidam lactis & pulvis in stomacho infantili, unde ejus febres frequentissimè nunc lentæ nunc acutæ scaturiunt, & jam variz aliæ omnino sunt lactis corruptiones, jam supra insinuatæ, sive in stomacho sub digestionem primam, sive in intestinis sub hujus digestionis perfectione & fecum separationem superveniunt; in specie cruditas nidorosa appellatur, dum flava, copiosa aut foetida, ab infantibus ejiciuntur. Excreta talia flava non sunt beneficio bilis tingentis; talis enim copia bilis in foetu juniore non adest, nisi infantulos ferè omnes primo

sui initio biliosiores viris ipsis dicere velimus; neque amarescunt semper hæc ipsa, sed dulcescunt potius subinde, & avidè à canibus amari omnis osoribus comeduntur. Sed ista excreta nidorosa & flava sunt frequentissimè ex lactis vitiatæ digestionem, & ejus multiplici corruptione; Lac enim, vitiatæ quacunque ratione digestionem ventriculi, spontè de facili citrinescere, sufficienter declarat Helmontius *Tr. Schol. Pass. Decept. cap. 3.* Adeo ut hujus digestionis primæ multiplicia errata ex alimentis, & hinc affectibus nutriticis primariò oriunda, cum non corrigi possint in secunda digestionem, necessariò sanguineam crasim in tantum alterent, & diversas vitiosas in sanguine effervescencias febriles inevitabiliter inferant: id quod pariter in quibuslibet infantum, etiam ab lactatorum febribus, tam lentis quam acutis, observandum venit, quæ omnes ferè pro causa interna errata digestionis primæ in ventriculo & intestinis, propter ordinariam eorum addiphagiam, agnoscunt. Et quidem si cruditate nidorosa, ex oleosa parte lactis corrupta, fuerit inquinatum lac, tunc febrem ardentem gravem infert cum insigni virium imbecillitate conjunctam: idque eo magis, si vel vigilæ præcesserint, vel nutritrix iracunda fuerit, vel alio quoque latente vitio correpta; nam quæ dentitionem infantum superveniunt febres, cum ferè tantum non sint symptomaticæ, huc non pertinent. Eò citius autem ex enarratis occasionibus fiunt febres, quanto minus transpirant infantes per cutim, vel ob defectum caloris ambientis, vel crebriorem linteorum non sufficienter calefactorum mutationem, Ad hæc pertinet neglectus balneorum.

## DIAGNOSIS.

Patent facillè febres infantum, dum inquieti sunt, facies rubet, artus infantis insigniter æstuant, infantes siticulosi sunt, &c.

## PROGNOSIS.

Vacant autem ut plurimum periculo hæc febres, utut, nisi in tempore occurratur corruptioni lactis, etiam lethales tandem fieri possint.

Si superveniat diarrhæa non nimis violenta, optimè curantur sponte quasi per motum criticum.

## CURA.

Febres intermittentes, quæ rariore sunt in infantibus ab lactatis, curantur ut febres adultorum præmissio vomitorio, & interdum repetito, cum syrupo emetico, v. g. pro infante duorum annorum ad ʒj. bihorio ante paroxysmum; vel purgatione repetitâ cum Mercurio dulci, qui promptius confert, si simul vomitum moverit. Vel

Re. *Pulp.*

℞. *Pulp. Tamarind.* ʒj.  
 ʒ *Mechoacann.* gr. xv.  
 ʒ *is* ʒi gr. v.  
*Syr. de Stachad.* f. Bolus.

quem aliquando præscripsi infanti sex annorum in febre quotidiana intermittente, cum elixir proprietatis sine acido, aut febrili cum essentia absinthii, & similibus, die intermittente crebrò usurpatis, ante paroxysmum propinando lapillos cancrorum cum sale absinthii fixo, vel sale Holfatico, oleo destillato caryophyllorum; aut loco horum spiritu salis Ammoniaci, liquore cornu cervi succinato, spiritu carminativo de tribus, &c.

Si verò infans adhuc lactens febre intermittente corripitur, qualiscunque fuerit, curatur præmissio vomitorio, aut purgatione Mercuriali, imprimis per aurum fulminans ante paroxysmum propinatum. Sic infans decem mensium quartana duplicata affectus præmissio vomitorio antimoniali curabatur, propinando ante paroxysmum sequentem pulverem:

℞. *Oi fulmin.* gr. j.  
*Ebur.* f.  $\Delta$  e gr. viij. M.

Detur aliquoties, donec cesset paroxysmus, observando, ut aliquot horis ante paroxysmum jejunos servetur infans, ne lacte in ventriculo nondum digesto paroxysmus superveniat; quin etiam non prius mamma porrigenda venit, nisi in statu paroxysmi, ubi æstus jam invaluit.

Lactis loco profiti fallenda commodè propinetur:

℞.  $\nabla$  fl. samb.  
*Card. bened.* aa. ʒvj.  
 ʒ  $\Theta$  \*ci gtt. xv.  
*Lap. Br. prap.* gr. xv.  
*Syr. fanic.* ʒij. M.

Externè verò cepa, contusa applicetur capis, & aliquandiu relinquatur.

Continuè verò lentæ, ex acido viscido, ut & cognatæ febres catarrhales ex lymphâ nimis acidâ, curantur, præmissis laxativis & clysmatis optimè spiritu salis Ammoniaci, vel simplici vel anisato, aut liquore cornu cervi succinato, in specie posteriores. Non curemus æstum, qui tempore vespertino adest; nam quia est ab acido, sistitur à talibus volatilibus. Item tinctura myrrhæ salutariter convenit. Quodsi verò ablactati fuerint, optimè liquor tartari, item sal Ammoniacum cum dimidio lapillorum cancrorum sæpius reiteratum eas profligabit. Item

℞.  $\nabla$  fl. samb. ʒj.  
*Mentha* ʒß.  
*Acet. vini* ʒij.  
*Lap. Br. prap.* ʒß.  
*ʒii diaphor.* gr. xij.  
*Syr. fl. Tunic.* ʒij. M.

Quoad febres verò continuas ardentes &

benignas, aut his similes, utut rarius affligant tenellos, nihil ferè peculiare habent, quam quod has, præmissio imprimis vomitorio, vel aliis primas vias evacuativis, præ cæteris curent abstergentia, cornu cervi sine igne præparatum, & cum eodem compositus pulvis febrilis Ludovici in *Pharm.* pag. 280, & 282. quam etiam salia volatilia:

℞.  $\nabla$  fl. samb. ʒij.  
 ʒ  $\Theta$  \*ci gtt. xv.  
*C. C. f.  $\Delta$  e*  
*Maxill. Lucii piscis* aa. gr. xv.  
*Syr. Papav. albi* ʒij. ad ʒiij.

Vel propinetur pulvis ex cornu cervi sine igne, myrrha, &c. item cinnabarina, antimonium diaphoreticum fixum & similia, non secus atque gelatina cornu cervi recens parata, tam infanti, quam in specie etiam nutrici, in potu ordinario frequenter dissoluta, temperando acre, & sale volatili corrigendo acidum, simulque conservando corpus in debita diaphoresi, multum infantibus prodest. Stercus equinum recens potui ordinario, quem præter lac avidè appetunt, infusum in nodulo & subinde expressum, multum prodest in mitigando æstu harum febrium. Aliàs, si robustiores paulò extiterint, nitrum antimoniatum, uti & arcanum duplicatum Mynsichti modò laudatum cum jam dictis exhibita, sunt egregiè proficua.

Quin & nitrum præparatum in jusculis, aut cum pulicula commodè permiscetur & propinatur.

Sin ablactati infantes fuerint, etiam blanda acida addi possunt, tinctura nempe rosarum cum spiritu nitri parata, item syrupus granatorum acidorum, syrupus de citro, & ex similibus paratæ misturæ blandè acidulæ.

℞.  $\nabla$  scorzon.  
*Rubi idai* aa. ʒj.  
*Succ. Rubi id.* ʒvj.  
*Ra fl. Papav. err.* ʒj.  
*C. C. f.  $\Delta$  e* ʒj.  
*ʒii diaphor.* gr. xv.  
*Syr. rubi idai vel Papav. alb.* ʒß. M.

Sicut & feri lactis cum succo citri acidulati potus non est ingratus.

Externè convenit imprimis oleum rosarum, cui camphora sit permista, spinæ dorsii illitum. Item ruta viridis contusa, ac aceto mista, plantis pedum alligatur. Lutum etiam fornacum cum succo rutæ mistum, & aceto irroratum, applicatur plantis pedum. Optimum est, si recipiantur herbæ ankerinæ M. v. quæ planta contusa & probè concisa miscetur cum paucis sale: additur his succus ex radice armoraciæ minutim rafa expressus, pulicula vel cataplasma ex his confectum excipitur lintei & applicatur plantis pedum.

(Aaaa aaa 2)

Quodsi

Quodsi etiam, quod interdum evenit, simul cum febribus infantum conjuncti sint pedum tumores, hi ipsi hoc ipso remedio promptè discutuntur & resolvuntur.

Quodsi malignitas adfuerit, eodem modo curandæ veniunt atque variolæ aut morbilli. Unde, præter modò enarrata, etiam emulsiones in variolis cum cornu cervi sine igne, antimonio diaphoretico, terra sigillata & similibus conveniunt. Pulveres quoque ex cornu cervi sine igne cum myrrha &c. interdum etiam theriaca & mithridatium, uti & mixturæ cum electuario diascordii Fracastorii, aut moderata theriacæ dosi imprægnatæ, in paulo robustioribus tutò in usum revocari possunt.

#### EPILOGUS.

Hæc & similia, quæ hætenus tractata fuerunt, uti primariò de tenerioribus, & qui nutricis adhuc sustentantur lacte, intelligen-

da veniunt infantibus; ita etiam eadem mutatis mutandis de facili applicari possunt ablactatis, & vegetiore robore jamjam adolescentibus, & usque ad duodecimum annum provectis; saltem observando, quod quicunque infantes, & speciatim qui lautiori gaudent diætâ, & à teneris unguiculis luxuriosè magis, quam salubriter, educari solent, propter communem iis addiphagiam, & quasi nimiam voracitatem, coacervent succos crudos acidos, & pituitam viscidam, quæ se habent simili modo ac lac coagulatum, vel ex pulte congestus mucus, ex quibus, ceu uberima scaturigine, similia iis, quibus sub lactatione, ex lactis præternaturali aciescentia & corruptione, &c. conflictari solent, mala in eosdem largiter redundare solent, unde eadem ferè aut similia medicamentorum genera ablactatis, quæ infantibus lactentibus conveniunt, usurpari possunt.

### FINIS COLLEGII PRACTICI.













